

景岳全書

卷四十二

痘疹論

麻疹全

卷四十三

痘疹論
痘瘡上

R2-52
1-2

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章 下

須集

七卷

傷寒典 上 有目二張

八卷

傷寒典 下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒
附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書麻疹詮目錄

謨集

卷之四十二

麻疹余

述原

疹逆順

疹證

麻疹初熱

疹形色

疹吉凶

名義

疹脈

疹期

疹出沒

疹滌

總論治法

景岳全書

目錄

疹禁忌 十三

疹發熱 十四

疹喘嗽 十五

疹吐瀉 十六

疹飲食 十七

疹飲水 十八

疹渴 十九

疹汗衄 二十

疹躁妄狂亂 二十一

疹咽痛 二十二

疹唇口瘡 二十三

疹腹痛 二十四

疹後諸證 二十五

附麻疹 二十六

水痘 二十七

論列方 二十八

景岳全書卷之四十二麻疹詮

謨集

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯超

謙菴訂

麻疹

全

述原

景岳子曰痘之與疹原非一種雖痘之變態多證而疹之收斂稍易然疹之甚者其勢凶危亦不減於痘最為可畏蓋疹毒痘毒本無異也第古人重痘而忽疹多不詳及使後人無所

述原 名義

宗法余實悵之自得羅田萬氏之刻見其理透法精鄙念斯
慰今悉從其訓備述於此雖其中稍有裁訂亦不過正其疑
似詳其未詳耳使此後患疹者幸獲迷津之指南亦以見萬
氏之功爲不少矣

名義二

疹者痘之末疾惟二經受證脾與肺也內應於手足太陰外合
於皮毛肌肉是皆天地間沴戾不正之氣故曰疹也然其名
目有異在蘇松曰沙子在浙江曰醋子在江右湖廣曰麻在
山陝曰膚瘡曰糠瘡曰赤瘡在北直曰疹子名雖不同其證

則一但疹在痘前者痘後必復疹惟痘後出疹者方爲結局

疹逆順三

萬氏曰疹以春夏爲順秋冬爲逆以其出於脾肺二經一遇風寒勢必難出且多變證故於秋冬爲不宜耳夫天行不正之氣致爲人之瘍疹然古人於痘疹二字始終歸重於痘並不分別疹爲何物豈可以二證歸於一證耶想當時重痘不重疹故爾略之致使後人不得心法因而害事者往往有之今以吾家四代傳流以及今日心得之法開載於後用此應病定不差矣敢有毫釐隱匿天其鑒之

疹脈 四

凡出疹自熱起至收完但看右手一指脈洪大有力雖有別證亦不爲害此定存心之要法也

景岳曰按此卽陽證得陽脈之義若細軟無力則陽證得陰脈矣元氣旣弱安能勝此邪毒是卽安危之基也故凡診得陰脈者卽當識爲陰證而速救元神宜用傷寒溫補托法參酌治之若執以麻疹爲陽毒而槩用清寒則必不免矣

疹證 五

雖非痘之比然亦由胎毒蘊於脾肺故發於皮毛肌肉之間

但一時傳染大小相似則未有不由天行癘氣而發者此其源雖內發而證多屬表故其內爲胎毒則與痘證同外有表邪則與傷寒類其爲毒也總由君相二火燔灼太陰而脾肺受之故其爲證則有欬嗽噴嚏面腫腮赤目胞浮腫眼淚汪汪鼻流清涕呵欠悶頓乍涼乍熱手足稍冷夜臥驚悸或惡心嘔噦或以手搯面目唇鼻者是卽出疹之候便宜用解毒散邪等藥不使畱停於中庶無他患且凡是疹證必其面赤中指冷而多嗽又必大熱五六日而後見紅點遍身此其所以與痘與傷寒有異也

痘欲盡發而不留疹欲盡出則無病邪氣鬱遏則留而不去
正氣損傷則困而不伸毒歸五臟變有四證歸脾則泄瀉不
止歸心則煩熱不退而發驚歸肺則欬嗽血出歸腎則牙齦
爛而疳蝕

程氏曰麻疹初出類傷風寒頭疼欬嗽熱甚目赤頰紅一二日
內即出者輕必須解表忌見風寒葷腥厚味如犯之恐生痰
涎變爲驚搐必致危矣如初起吐瀉交作者順乾嘔霍亂者
逆欲出不出者危亾立至

徐氏曰痘自裏而出於臟故重疹自表而出於腑故輕

景岳曰痘疹之屬有四種曰痘曰疹曰麻曰斑也痘則陸續漸
出自小而大或稀或密部位顆粒有辨也疹則一齊發出大
者如蘇子次者如芥子小者如蚕子而成粒成片者是也麻
則最細而碎如蚊迹模糊者是也斑則無粒惟成片紅紫如
雲如錦者是也大都疹與麻斑同類卽發斑傷寒之屬而痘
則本非其類也蓋痘毒本於肝腎出自中下二焦是以終始
不妨於食而全賴水穀爲主所以能食則吉不能食則凶故
治痘者不可不顧脾胃麻疹之毒則由表邪不解而內犯太
陰陽明病在上中二焦所以多不能食故治麻疹者但宜解

散火邪邪散則自能食矣是痘疹之治當各有所重者如此

疹期六

出疹之候初熱一日至次日鷄鳴時其熱即止止存五心微熱

漸見欬嗽鼻流清涕或腹中作痛飲食漸減到申酉之間其

熱復來如此者四日用手滿按髮際處甚熱其面上熱少減

二三分欬嗽連聲面燥腮赤眼中多淚噴嚏頻發或忽然鼻

中出血至五日其熱不分晝夜六日早時其疹出在兩頰下

細細紅點至午時兩手背並腰下及渾身密密俱有紅點七

日普徧掀發其鼻中清涕不流噴嚏亦不行七日晚兩頰顏

色漸淡此驗出疹之要法

凡疹熱六日而出一定之規也若醫人無識用藥太早耗散元氣及至出時變害多矣或嗽而變喘或出一二日卽隱或作大瀉或合目而喘此醫人用藥不當之害也吾家治法定不在五日內用藥必待見疹方用徐徐升表然用藥亦有次第凡一劑必作十餘次飲之况疹在皮膚之間若作一次服則藥性催之太急每致譫語煩躁故當慎之

景岳曰按此萬氏之法謂醫人用藥太早恐致耗散元氣故必待見點而後施治及作一次服恐藥性催之太急皆惟恐

無益而反以致害此固其心得之法也然以愚見則醫有高下藥有宜否但使見有確真發無不當則於未出之前或解或補必有得愈防之力以潛消其毒者既出之後亦必有善調之方而不致催急者此在善與不善或不嫌早與不早也嘗見庸流之誤治者多是誠不服藥爲中醫也此萬氏之說所以不可不遵

凡疹熱五六日必出矣醫人用藥見不能散父母見藥不效醫人見熱嗽不能除或以別證治之主家又或更醫此世之所以誤者多矣

麻疹初熱 七

麻疹發熱之初與傷寒相似惟疹子則面頰赤欬嗽噴嚏鼻流
清涕目中有淚呵欠喜睡或吐瀉或手搐者目面赤爲異耳
但見此候卽是疹子便宜謹避風寒戒葷腥厚味古法用升
麻葛根湯以表散毒邪余製透邪煎代之更佳或柴歸飲亦
妙但使皮膚通暢腠理開豁則疹毒易出不可作傷寒妄加
汗下也妄汗則增熱而爲衄血欬血爲口瘡咽痛爲目赤腫
爲煩燥乾渴爲大小便不通妄下則裏虛爲滑泄爲滯下經
曰必先歲氣毋伐天和言不可妄汗妄下也

全書卷四十二
凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥總有他證必待五日腮
下見疹方可用升表之劑嗽多連打嚏噴鼻流清涕或流鼻
血飲食減少好飲涼水只宜調理飲食戒麪食葷腥

一疹子初發熱時未見出現欬嗽百十餘聲不已上氣喘急面
目胞腫時臥時起此火毒內蒸肺葉焦舉宜甘桔湯合白虎
湯加牛蒡子薄荷主之○如疹出之時欬嗽口乾心煩者此
毒在心肺發未盡也瀉白散加天花連翹玄參黃連主之

一疹子欲出未出之時宜早爲發散以解其毒則無餘患若不
預解便之盡出多致毒蓄於中或爲壯熱日久枯瘁或成驚

癰或爲瀉痢或爲欬血喘促或作疔蝕而死此雖一時戾氣之染然未有不由於人事之未盡也

疹出沒

一疹子出沒常以六時爲準假如子後出午後卽收午後出子後卽收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之數也凡此旋出旋收者輕若一出連綿三四日不收者乃陽毒太甚宜大青湯或用荆芥牛旁子甘草玄參石膏桔梗主之○若逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜荆防敗毒散主之一疹已出而復沒者乃風寒所逼而然若不早治毒必內攻以

致痒癩而死急用升麻湯加荆芥牛旁子甘草熱服則疹必復出而安矣

一發熱六七日以後明是疹子却不見出此必皮膚堅厚腠理閉密或爲風寒所襲或曾有吐瀉皆能伏也急用托裏散表之劑如麻黃湯去杏仁加蟬退升麻外用胡荽酒之類○如一向未更衣者必毒甚於內伏而不出局方涼膈散加牛旁子注之

一疹子只怕不能得出若出盡則毒便解故治疹者於發熱之時當察時令寒暄酌而治之○如時證大寒以桂枝葛根湯

或麻黃湯發之○時證大熱以升麻葛根湯或合人參白虎湯發之○不寒不熱以荆防敗毒散發之○如兼疫癘之氣以人參敗毒散發之○如盡一劑不出再作本湯服之外用胡荽酒又以苧麻醮酒遍身戛之務令亟出如三四作更不出加腹中脹痛氣喘昏悶則死證也

景岳曰按此萬氏之法極得隨時制宜之善已盡發表之義矣然發表之義亦最不易卽如營衛不足而疹有不能出者其證甚多若徒知發之而不知滋之則營衛有弱者非惟不能發而且恐窮其源矣此其或在脾胃或在血氣必得其神

庶乎有濟如傷寒三表之法實亦有關於此

一 疹毒出盡則邪氣解散正氣自然和平如發熱煩悶或嘔吐
或泄瀉此毒邪壅遏尙未出盡也○煩熱者黃連解毒湯○
嘔泄者柴胡橘皮湯○並外用胡荽酒及苧麻戛法如前待
疹子出盡則煩熱自去嘔吐自止矣

一 疹有既收而餘毒未盡至三日之外又復發出或至五六次
不已者此因發熱之時不避風寒致令邪氣鬱於肌肉之間
雷連不散雖曾解散終屬未暢耳若兼雜證亦當隨證治之

凡看麻疹初出之法多於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而勻淨者吉也若色見通紅則疹發於心紅者火之正色也若疹色淡白者心血不足也養血化斑湯主之或四物湯加防風色大紅燄或微紫者血熱也或出太甚者並宜大青湯主之或四物湯去川芎加柴胡黃芩乾葛紅花牛旁子連翹涼血滋陰而熱自除所謂養陰退陽之義亦五死一生之證也若黑色者則熱毒尤甚而十死一生之證此尤不可不明察之而混爲施治也

凡疹初出色赤者毒盛之勢也但大便調咳嗽多右手一指脉

輕重取皆有力雖勢重不碍但當隨證調理若嗽少右手一
指脉無力雖三日後收其渾身疹瘡變爲紫色壅結於皮膚
之間若用解利之藥其色漸轉紅色嗽多流涕頗思飲食者
生若投二三劑難變者難療也

大疹涕

十

凡疹出至二三日必兩鼻俱乾待收完看毒氣輕者清涕卽來
乾思飲食此不必服藥若清涕來遲不思飲食者須要清肺
解毒必俟清涕出方可不用藥

疹古函

十一

或熱或退五六日而後出者輕

透發三日而漸沒者輕

淡紅滋潤頭面勻淨而多者輕

頭面不出者重

紅紫黯燥者重

咽喉腫痛不食者重

胃風沒早者重

移熱大腸變痢者重

黑黯乾枯一出即沒者不治

鼻扇口張目無神者不治

鼻清糞黑者不治

氣喘心前吸者不治

總論治法 十二

一疹喜清涼而惡濕痘喜溫煖而惡涼此固其大法也然亦當
有得其宜者如疹子初出亦須和緩則易出所以發苗之初
只要發出得盡則疹毒便解非若痘之苗而秀秀而實而後
毒解也痘子成熟之時若太溫熱則反潰爛不收是痘之後
亦喜清涼也故治痘疹者無過熱無過寒必溫涼適宜使陰

陽和平是爲得之

一痘宜內實可用補劑疹忌內實只惟解散惟初熱發表時略相似耳既出之後痘宜補氣以生血疹宜補陰以制陽何也蓋疹熱甚則陰分受其熬煎而血多虛耗陰金被尅故治以清火滋陰爲主而不可少動其氣若燥悍之劑首尾皆淡忌也世知痘證所係之重而不知疹之殺人尤甚方書多忽而不備良可太息也矣

一斑疹之毒皆由於火內經曰赫曦之紀其病瘡瘍故或遇二火司天或司運之歲肺金受制感而發者居多輕則如蚊迹

之狀或壘腫於皮膚間名曰癧疹重者如珠點紅暈或片片如錦紋名曰斑疹大抵色赤者吉色黑者凶其證似傷寒發熱凡三四日而出七八日而靨也凡此之類皆屬邪熱治之之法惟辛涼解利而已卽若吐瀉亦斷不可用溫補也如豆蔻乾薑之類切勿輕用而初發之時尤不可大汗只宜升麻葛根透邪煎之屬微表之耳故用宜斟酌有不可一槩取必也

一標出不紅現而發熱轉甚或頭痛身痛煩躁者升麻湯或透

邪煎

一色赤稠密身痛煩躁者升麻湯加紫草連翹

一寒熱併作頭痛背强者升麻湯加羌活防風連翹

一頭項面腫升麻湯加牛旁子荆芥若脉强火盛熱渴者宜清降其火以白虎湯加減用之

一自汗煩渴氣壅脉數者化斑湯

一身熱煩渴泄瀉者柴苓湯或四苓散如夏月益元散

一熱甚小便赤澁譫語驚恐者導赤散四苓散加辰砂夏月益

元散加辰砂

一欬嗽甚者二母散麥門冬湯清肺湯

一喘者小柴胡湯去人參加五味子

一熱甚鼻衄或便血溺血熱甚者黃連解毒湯血甚者犀角地

黃湯

一傷食嘔吐六君子湯加藿香乾葛或減去人參○熱甚嘔吐

者解毒湯○小便不利而嘔吐者四苓散一二日不通者導

赤散

一大便秘結發熱身痛者大柴胡湯腹脹氣喘者前胡枳殼湯

一咽喉不利甘桔湯兼風熱欬嗽者加防風

一寒熱往來似瘧小柴胡湯如兼欬嗽去人參

一 屬後身熱不除者升麻湯或去升麻加黃芩黃連各酒炒用
一下痢赤白腹痛者黃芩芍藥湯或加枳殼身熱腹痛者解毒
湯

一 餘毒未盡變生癰疽瘡癤者升麻湯加防風荆芥牛旁子

景岳曰按以上萬氏治疹諸條皆極詳妥然其中惟瀉痢氣喘
二證則最多疑似蓋二證之由疹毒固當如其治矣然有不
因疹毒者如俗醫但見是疹無不槩用寒涼不知有可涼者
有不可涼者其有脾氣本弱而過用寒藥或以誤食生冷致
傷脾胃而爲泄瀉者亦多有之此一證也雖曰由疹而發而

實非疹毒之病矣。但察其別無熱證，熱脉而兼之色白氣餒者，便須速救。脾氣急從溫補，宜溫胃飲五君子煎，胃關煎之類。主之若執謂疹毒不可溫，則無不危矣。此醫之當知本也。又如氣喘一證，大有虛實。蓋十喘九虛。若察其本非火證，又非外邪，而或以大瀉或以大汗而致喘者，必皆氣脫之候。此非六氣煎或貞元飲必不可也。凡此二者皆不可不加細察。而或者以氣促作氣喘，則萬萬大誤矣。又痘瘡總論中有因人因證之辨，與此麻疹實同一理所當參閱。故不可以麻疹之邪悉認爲實火而不知虛火之爲害也。

徐東臯曰痘難疹易之說此俗談耳其有胃氣原弱所感入深
又或因瀉利而發有不快或發之未透而隨現隨隱久之邪
氣漸入於胃必瀉泄不已出而復出加之喘促則必危矣凡
若此者又豈可以易言哉所以但有出疹若見虛弱急當先
補脾胃其有欲出不出急當托裏發表以助之且首尾俱不
可瀉一如痘證同也

疹禁忌 十三

凡疹瘡發表之後紅影出於肌膚切戒風寒生冷如一犯之則
皮膚閉密毒氣壅滯遂變渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛

氣喘悶亂諸證作矣欲出不出危亾立至醫家病家皆不可不慎

一疹瘡之證全在調治禁忌如鷄魚炙燻鹽醋五辛之類直過七七之後方可食之惟宜食淡不可縱口致生他疾也若誤食鷄魚則終身皮膚粟起如鷄皮之狀或遇天行出疹之時又令重出悞食猪肉則每歲凡遇出疹之月多有下利誤食鹽醋致令欬嗽則每歲出疹之月必多欬嗽誤食五辛之物則不時多生驚熱此痘疹之家皆所當慎也

瘡疹非熱不出凡疹子欲出必遍身發熱或煩躁或頭眩或身體拘急及既出則身便涼諸證悉解此一層疹子隨即收者極輕者也如疹子既出而熱甚不減此毒盛者也宜大青湯解其毒便澁者宜黃連解毒湯合白虎湯或大連翹飲解其裏大便不通者局方涼膈散加牛旁子主之

疹喘嗽 十五

凡疹證多嗽此頓出頓入之勢也但有疹毒須假嗽多而散故疹後旬日之內尚宜有嗽切不可見嗽多而治嗽也宜慎之疹證屬肺與脾胃肺受火邪則嗽多嗽多則頓出頭面并及四

全書卷五十二 痢疾
肢大腸受火邪則上連脾胃而爲泄瀉若早瀉則嗽必減而
變爲喘蓋喘嗽二者皆屬於肺然嗽實喘虛得嗽者出得喘
者入入則合眼多痰胸滿腹脹色白而毒不盡出證則危矣
此疹之宜嗽不宜喘而最不宜於泄瀉也

疹吐瀉 十六

凡疹子初起發熱吐利純是熱證不可作寒論此乃火邪內逼
上焦則多吐下焦則多利中焦則吐利並作自利者宜黃芩
湯吐利者宜黃芩湯加半夏二錢生薑二片自利裏急後重

宜黃連解毒湯合益元散

凡疹出一二日或三四日忽然大瀉嗽多者用升表之藥加以分利治之若瀉而兼喘復見悶亂搖頭者凶

一麻疹現後大便下膿血或因泄瀉而變成膿血者或徑自利者但看瘡疹出多而色紅又多嗽者只宜表疹俟其收後方宜解毒兼治其痢

一疹之初起最忌泄瀉然亦有始終泄瀉而不妨者稟之強弱異也若因瀉嗽減而變爲喘者則危矣詳前喘嗽條

一身熱煩渴泄瀉者柴苓湯四苓散如熱甚或夏月益元散
一疹後作痢亦有看手咬指甲撕口唇皮及咬人等證當以解

毒分利藥治之若所下稠涎紅白相兼者務要用解毒之藥
○若晝夜有三五十次漸減至二三次或漸多嗽右手一指
脈漸起清涕復來者方可望生○若痢變煤色或成屋漏色
或如青菜色肛門如筒喘促音啞飲食不進午後腮紅皆不
治

景岳曰自古方書凡發揮未盡及用治未當者間亦有之而惟
於泄瀉一證則尤其爲最何也蓋古人以泄瀉爲熱者什九
故多用河間黃芩芍藥湯爲主治而不知凡屬泄瀉最多脾
腎虛寒也卽如出疹一證雖有由疹毒而瀉者然果係實熱

多不作瀉但致瀉者率由脾胃之弱若但知清火解毒則脾胃必日敗而漸成屋漏青菜色及氣促絕食不治之證矣病而至此豈猶熱耶總屬誤耳故凡治泄瀉者卽雖是疹亦必察其有無熱邪如無熱證熱脈卽當於痘瘡泄瀉條求法治之庶最危者猶可望其生也故余於諸法之外而獨言其要者有如此

疹飲食 十七

凡出疹者多有五六日不飲食此胃爲邪氣所侵亦爲邪氣所養故不食亦不妨切不可着意治之只宜治疹疹瘡出盡毒

氣漸解卽思飲食尤不可與麩食雖用粥飲每次只可少與
候氣清神爽身全不熱漸漸加添但宜少而頻也

凡出疹之先平昔過用麩食者或正出時喫麩食者或胃氣漸
開卽思麩食而用早者因動胃火以致清涕不來身體作熱
兩眼看手咬指摳鼻撕口唇皮及撕眼剝毛者此皆疹後食
復之病也當清肺解毒加消導之劑治之

疹飲水 十八

凡患疹之人不拘大小自起至收必皆喜飲涼水此不必禁但
宜少不宜多宜頻不宜頓則毒氣隨之漸解

疹渴 十九

凡疹子渴喜飲水純是火邪肺焦胃乾心火內亢故也初熱發渴者升麻葛根湯加天花粉麥門冬渴甚者人參白虎湯合黃連解毒湯主之

疹汗 二十

凡疹子發熱或自汗或鼻衄者不須止之此亦散越之義汗者毒從汗散衄者毒從衄解但不可太過如汗太多人參白虎湯或合黃連解毒湯衄太多者玄參地黃湯

疹躁妄狂亂 二十一

疹渴 燥妄狂亂

凡疹有初熱而見煩擾譫妄狂亂者宜升麻葛根湯調辰砂益元散主之

一疹收之後餘熱未盡日夜煩躁譫語狂亂者辰砂益元散用燈心湯調下或四苓散加燈草黃連黃芩調水飛硃砂五分主之

黃疹咽痛 二十二

痘疹咽痛亦是常候乃火毒上薰而然也勿以喉痺同論妄用針刺蓋此非喉痺癰腫原無惡血可去也痘疹喉病只是咽乾作痛宜甘桔湯加牛旁子或射干鼠粘子湯細細嚥之更

以玉鑰匙吹之

疹唇口瘡 二十三

凡出疹之先或有胃火及出疹之後餘毒不散此熱毒收於牙齦上下故並唇口生瘡遇有此證每日用溫米泔水洗十餘次急用解毒之藥治之若或失治多變走馬疳也

疹腹痛 二十四

凡疹初熱一日至五六日之間多有腹痛之證此大腸之火鬱於皮竅之中故作腹痛俱不可認作傷食用消導之藥或以手揉俱能致害但解疹毒毒散則腹痛自止最宜慎之

疹後諸證 二十五

凡疹後餘毒未盡隨當解之若停畱日久不解則必致喘嗽或
喉中痰响或爲四肢冷痺或目無光彩面色青白或鼻孔如
烟筒或嗽聲不出若右手一指脉輕取散亂重按全無則成
難治之證矣

一疹子收後身有微熱者此虛熱也不須治之待血氣和暢其
熱自退若熱勢太甚或日久不減宜用柴胡麥門冬散甚則
黃連解毒湯或合人參白虎湯

一疹後熱不退而髮枯毛豎肉消骨立漸漸羸瘦爲骨蒸勞瘵

之證者宜萬氏柴胡四物湯主之或蘆薈肥兒丸加當歸連翹治之遲則變證爲睡則露睛口鼻氣冷手足厥逆遂成慢脾風瘵瘵不治之證矣

一疹後熱不除忽作搐者不可以急驚風同論宜導赤散加人參麥門冬送七味安神丸小便清者可治短少者難治如見多痰或用抱龍丸或以四物湯加麥門冬棗仁淡竹葉甘草龍胆草黃連茯苓辰砂石菖蒲之類治之或以此藥爲末用蒸餅豬心血爲丸服亦可

一疹退後多有欬嗽之證若微嗽不已者此餘毒未盡也用清

肺飲加生甘草牛旁子主之○若嗽甚氣逆發而不已者此
肺中伏火金虛葉焦也宜清肺飲或清肺湯合人參白虎湯
六一散之類主之○若身熱頓嗽甚至飲食俱噎出或欬出
血皆熱毒乘肺而然宜多用門冬清肺湯或加連翹或清金
降火湯主之○若欬甚而面浮目腫胸高喘急血出口鼻面
色青赤昏躁搖頭者死證也○又有肺氣本虛爲毒所逼而
發喘不已但無嗽血噎食等證者宜用清肺飲倍加人參治
之不可拘於肺熱之說而純用清肺解毒之藥也

一疹後餘熱未盡或熱甚而失血者四物湯加茵陳木通犀角

以利小便使熱氣下行則愈若血在上者去川芎

一疹後餘毒入胃久而不散以致牙齦黑爛肉腐血出臭氣衝人者名爲走馬疔用馬鳴散主之甚者急用人中白蘆薈史君子龍胆草黃連五靈脂浸蒸餅爲丸滾水服之以清胃火

○若面頰浮腫環口青黑齒脫唇崩鼻壞者死證也

一疹退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養外雖無病裏實虛損偶然爲惡氣所中謂之中惡此朝發夕死之證

痘之外有疹疹之外又有麻疹痧疹者亦疹之類卽斑疹也但

正疹則熱至五六日而後一齊湧出出皆粒粒成瘡非若麻

疹之皮紅成片也且麻疹之出則不拘三四日以火照之遍

身如塗朱之狀此將出之兆出則細碎皮紅成片如蚊蚤之

迹者卽麻疹也亦或有六日始出出而又沒沒而又出不過

一周時許世俗謂一日三出三日九出後方齊出透徹然亦

有不拘者只三日間從面至胸背手足雖隨出隨沒然只要

出透以遍身紅潤者爲美重者遍身膨脹眼亦封閉色有赤

白微黃不同只要紅活最嫌黑陷及面目胸腹稠密纏鎖咽

喉者爲逆發不出而喘者卽死所謂麻者以遍身細碎如麻無有空處故也然又有遍身但紅而絕無斑點者是又謂之火丹亦其類也故痘家有夾疹夾麻夾丹等證總皆熱毒所致俱當詳辨也

一麻疹初起呵欠發熱惡寒欬嗽嚏噴流涕宜升麻葛根湯如蘇葉葱白以解肌切忌大汗○若潮熱甚者加芩連地骨皮○譫語者調辰砂益元散○欬嗽加麻黃杏仁麥門冬石膏○欬甚熱甚者用涼膈散加桔梗地骨皮○泄瀉者宜四苓散便紅合犀角地黃湯○吐血衄血用犀角地黃湯加山梔

小便赤加木通○寒熱似瘧小柴胡湯

一麻疹已出煩躁作渴者解毒湯合白虎湯○喘而便閉者前

胡枳殼湯加五味子○便秘甚者小承氣湯○譫語溺閉者

導赤散○小便如泔者四苓散加車前木通○譫語如狂者

解毒湯調辰砂益元散○大小便血者犀角地黃湯合解毒

湯○吐血衄血解毒湯加炒山梔童便○泄瀉解毒湯或四

苓散○喘兼泄瀉溺赤澁者柴苓湯○煩熱大渴作瀉者白

虎湯加蒼朮猪苓○熱盛乾嘔者解毒湯○傷食嘔吐四君

子湯○夏月因熱作嘔四苓散加人參

麻證初起及已出已沒一切雜證俱與痘疹大同但始終藥宜清涼雖曰麻喜清涼痘喜溫煖不易常道然虛則補實則瀉寒則溫熱則涼方是醫家玄妙故治麻亦有血虛而用四物湯氣虛而用四君子湯傷冷則溫中理中之藥皆當因證而用也

一麻證收後餘毒內攻凡尋衣摸床譫言妄語神昏志亂者死
○如熱輕而餘毒未除必先見諸氣色若有所見須預防之
始終以升麻葛根湯為主或四味消毒飲或六味消毒飲解毒湯隨證選用仍忌魚腥葱蒜等物

水痘 二十七

凡出水痘先十數點一日後其頂尖上有水泡二日三日又出
漸多四日渾身作痒瘡頭皆破微加壯熱即收矣但有此疾
須忌發物七八日乃痊

一水痘亦有類傷寒之狀身熱二三日而出者或欬嗽面赤眼
光如水或噴嚏或流涕但與正痘不同易出亦易靨治而清
熱解毒為主

麻疹論列方 二十八

四君子湯 補一
五君子煎 新熱六

六君子湯 補五

四物湯 補八

六氣煎 新因二二

人參敗毒散 散三六

化斑湯 寒三

白虎湯 寒二

人參白虎湯 寒三

小柴胡湯 散十九

大柴胡湯 攻七

荆防敗毒散 痘三一

甘桔湯 因一七五

解毒湯 痘五一

黃連解毒湯 寒一

麻黃湯 散一

升麻湯 痘一三九

升麻葛根湯 散三十

透邪煎 新因二三

托裏散 痘四

局方涼膈散 攻十九

柴歸飲 新因十五

清肺飲 痘八七

清肺湯 痘一四五

柴胡橘皮湯 痘二九

仲景黃芩湯 寒百五

二母散 痘百五十

射干鼠粘子湯 痘七七

麥門冬湯 痘一四二

導赤散 寒一二二

萬氏柴胡四物湯 痘一四三

四苓散 和一八七

柴苓湯 和一九二

養血化斑湯 痘十八

小承氣湯 攻二

益元散 寒百十二

門冬清肺湯 痘一四七

大青湯 痘一五三

瀉白散 寒四二

清金降火湯 痘一 九

溫胃飲 新熱五

貞元飲 新補十九

柴胡麥門冬散 痘二四

胃關煎 新熱九

抱龍丸 小八五

玄參地黃湯 痘八六

大連翹飲 寒七八

玉鑰匙 因一九三

七味安神丸 小七二

胡荽酒 痘百十八

馬鳴散 痘一三八

犀角地黃湯 寒七九

四味消毒飲 痘四八

六味消毒飲 痘四九

蘆薈肥兒丸 小百十四

桂枝葛根湯 痘三七

前胡枳殼湯

痘九四

黃芩芍藥湯

寒百九

備用方

貝列痘疹方末所當詳閱

未天輔式

小十二

時疫

或百十六

李時珍

寒十八

王餘慶

因一或三

李時珍

寒十八

文參配黃芩

寒十八

李時珍

寒二四

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

李時珍

寒十八

三

原

三

景岳全書痘疹論目錄

烈集

卷之四十三

痘瘡上

總論 一

初辨痘證 二

論脈 三

形色情性 四

日期 五

五臟證 六

分氣血 七

辨虛實寒熱 八

部位吉凶 九

痘形痘色吉凶 十

吉證 十一

凶證 十二

怪痘形證 十三

死證日數歌 十四

發熱三朝辨吉凶 十五

報痘三朝辨吉凶 十六

起痘三朝辨吉凶 十七

灌膿三朝辨吉凶 十八

結靨三朝辨吉凶 十九

落痂後辨吉凶 二十

痘瘡上論列方 二十一

卷之四十四

痘瘡 中

總論治法 二二

熱證論治 二三

發熱三朝治欵 二四

報痘三朝治欵 二五

起發三朝治欵 二六

灌膿三朝治欵 二七

結靨三朝治欵 二八

靨後落痂治欵 二九

痘後餘毒發熱 三十

禁忌 三一

出不快 三二

陷伏 三三

痒癢抓破 三四

作痛 三五

頭面腫 三六

痘疔黑陷 三七

飲食 三八

咽喉口齒 三七

痘瘡中論列方 四十

卷之四十五

痘瘡

下

總論吐瀉

四一

嘔吐

四二

泄瀉

四二

寒戰咬牙

四四

煩躁

四五

喘急

四六

聲音

四七

驚搐

四八

昏睡

四九

腰痛

五十

腹痛

五一

腹脹

五二

厥逆

五三

發渴

五四

失血

五五

發痧

五六

潰爛 五七

多汗 五八

夾疹 五九

夾班 六十

晝夜啼哭 六一

大小便閉 六二

目證 六三

痘癰痘毒 六四

疔蝕瘡 六五

痘藥正品 六六

痘家藥忌 六七

痘瘡下論列方 六八

蘇容樂局

六十一

蘇容不備候衣

六十二

蘇容樂局

六十三

蘇容樂局

六十四

蘇容樂局

六十五

蘇容樂局

六十六

蘇容樂局

六十七

蘇容樂局

六十八

蘇容樂局

六十九

蘇容樂局

七十

蘇容樂局

蘇容樂局

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯

超

謙菴訂

痘瘡

上

總論

痘瘡一證俗曰天瘡原其所由實由胎毒內藏而復因時氣外
 觸其毒乃發故傳染相似是亦天行疫癘證也但考之內經
 則止言瘍疹卽今斑疹之屬也故自越人仲景元化叔和諸

公皆無一言及痘可見上古本無是證而今則何以有之愚
謂近代之毒必以醇酒五味造作太過較古人之恬淡相去
遠矣或者未信余言第觀藜藿膏粱之家卽有不同今之北
虜亦不出痘原其所由實由是耳豈果彼無胎毒耶故凡多
遭此害者當以余言熟味之

一痘瘡變幻百出虛中有實實中有虛要非曲學偏見者可以
窺其堂室若目力心思一有不到則害不小矣設或知證而
不知形則無以洞其外知形而不知脈則無以測其內知脈
而不知本則無以探其源知本而不知因則無以窮其變知

因而不知藥則無以神其治只此數事今醫果能全之否設
有不能而強以爲能則致害於人獲罪於天能無畏乎故余
于痘疹一門畱心既久積驗已多因蒐採先哲之最精於此
者如文中陳氏仲陽錢氏立齋薛氏羅田萬氏晨峯程氏東
臯徐氏改齋友氏并其他襍錄等書有述其舊者有發其未
發者有剖其疑似者有因涉歷而吐其心得者盡我愚衷集
而成帙痘疹玄秘似無出此

初辨痘證

二

痘疹發熱大抵初時與傷寒相似然傷寒之邪從表入裏故身

各經之證痘疹之毒則從裏出表故見五臟之證如呵欠閉
 頰肝證也乍涼乍熱手足稍冷多睡脾證也面燥腮赤欬嗽
 噴嚏肺證也驚悸心證也飢涼耳冷腎證也○又觀心窩有
 紅色耳後有紅筋目中含淚或身熱手指皆熱惟中指獨冷
 乃知是痘證也便當察其虛實隨證治之

辨痘歌

五指稍頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒中指獨自
 冷脈痘證相傳女右男分左分明好細看

看耳歌

兩耳紅筋痘必輕紫筋起處重沉沉急須用藥相攻治十個難
求三五生

看痘法

凡初看痘法以紙撚蘸油照其顆粒次以手摸面頰如紅色隨
手轉白隨白轉紅謂之血活生意在矣若指之太白舉之不紅
是謂血枯縱踈亦危○又看目睛神光口唇舌尖紅活如常無
燥白之色乃爲吉兆自可無憂此觀痘疹之大法

察脉法

凡看痘之法一見發熱卽當先察其脉蓋凡痘瘡將出者未見

形迹必先發熱既見發熱脉必滑數但微見滑數有神而不失和緩之氣者其痘必輕而少若滑數加倍而猶帶和緩者其痘必多而重尙亦無害若滑數之甚又兼弦躁或芤急無神而全無和緩之氣者其痘必甚而危故余於初熱時便能斷其吉凶人多驚服而不知所窺在脉也凡診此之法但全握小兒之手而單以拇指診之亦最易也看痘之法此爲第一而今醫多不知之亦以古人之未之及耳

認痘法

凡痘瘡緊小光實者名曰珍珠痘此則易壯易靨高大飽滿者

名曰大瘰此則早壯而遲收四圍起而中心陷者名茱萸瘰疔平
扁不突者名曰蒸餅瘰疔此則有凶有吉稀者輕密者重

論脈三

瘰疔自發熱以至起脹毒從內出陽之候也脈宜浮大而數不宜
沉細而遲自貫膿收靨以後毒已外解陰之候也脈宜和緩
不宜洪數又曰瘰疔之脈中和為貴不可過於躁疾或見微
小故曰脈靜身涼者生脈躁身熱者死又陽病得陰脈者死
大抵四時以胃氣為本胃氣者以四時之脈而皆兼和緩即
胃氣也蓋滑數浮洪為太過太過為實實者邪氣實也弦澀

五言卷四十三
五疾
四
微弱為不及不及為虛虛者正氣虛也設以太過不及之脈
而中無和緩之氣是皆死候之脈故曰人無胃氣則死

形色情性 四

凡天行痘疹之時有於未出之先察其形色情性可以預知吉

凶也○一觀其色如面頰紅白明潤與平日同而無變者吉

如忽見紅赤而太嬌或眊白而無彩頓然改變異於平時者

凶又如額有青紋目有赤脈口有黑氣耳有塵痕者皆大凶

之兆○二觀其形凡精神暢爽動止便利語言清亮者無病

而吉也如精神衰弱動止遲留言語低微異如平時者凶又

原且壽相者吉如有天相則凡頭破顱解項小脚細聲微目
無精彩或睛光露神啼聲斷續無喜無情而自語自笑聰慧
太早肉浮骨嫩者皆不吉之兆○三觀情性凡未發熱時忽
生喜心若與父母愛戀不忍捨者及聞見怪異言語妄誕者
皆凶兆也

日期五

痘瘡大約之數發熱三日報痘三日起脹三日貫膿三日結靨
三日共十五日乃大率常數此其正也惟痘密毒甚者常過
其期痘疎毒微者常不及期固有不可一例拘者但得痘色

明潤根窠紅活飲食二便如常又無表裡雜證雖遲數日不
妨設有當出不出當起不起當膿不膿當靨不靨者須詳察
其證或爲元氣虛弱不能運行則補其元氣或爲雜證攻剝
不能通貫則去其雜證又六日以前毒發未盡有雜證者常
也六日以後毒該盡出雜證當除而不除者爲逆須詳辨而
急治之

五臟證 六

痘疹二證古人有二痘自裏而出於臟其毒深故久熱而難出
爲重疹自表而出於腑其毒淺故暴熱而易出爲輕余謂此

說未必然也蓋痘疹皆出於臟腑未有表裏不相通者但出於腑者在痘亦輕出於臟者在疹亦重所以凡是疹子必發熱至五六日而後出不可言易且疹子多屬肺經豈肺經非臟耶

一心經痘證心主火凡紅赤煩渴或上竄咬牙者心臟熱也心熱者導赤散心虛者人參麥門冬生地黃當歸之類煩渴邪盛者葛根解毒湯○脾經痘證多有吐瀉腹痛者訣云發熱肚中痛斑瘡腹內攻發多防未透發少更防癰可見瘡疹腹痛乃爲惡候當察腹痛吐瀉各條治之○肺經痘證凡發熱

之時喘息氣逆喉中涎響此肺經惡候也蓋毒火內蒸刑肺
而然當察本條治之○肝經之痘凡發熱之初多有驚搐等
證蓋痘毒多熱熱則生風風熱相搏故發驚搐然有當速治
者有不必治者詳見本條○腎經痘證初發熱時便覺腰痛
蓋腎與膀胱爲表裏今毒由太陽傳入少陰所以腰痛此其
毒陷陰分最非佳兆宜察本條治之

一毒歸五臟證有不同當詳辨也○毒歸於心則爲斑疹爲驚
悸爲壯熱爲咽乾爲痛爲渴爲汗爲丹瘤爲癰瘍潰爛○毒
歸於肺則爲欬爲喘爲癢爲衄血爲瘡乾燥皴揭爲肩臂痛

○毒歸於脾則爲吐爲瀉爲腫爲脹爲腹痛爲唇瘡破裂爲
舌本強爲手足痛爲不食○毒歸於肝則爲悶亂爲水疱爲
目病爲邪腫爲乾嘔爲筋急拘攣爲吐虵爲寒戰咬牙○毒
歸於腎爲腰痛爲黑陷爲失音爲手足逆冷爲咽乾痛爲饑
不欲食爲多唾○毒歸於腸胃爲泄瀉爲痢膿血爲腹鳴失
氣爲大便不通○毒歸於膀胱爲小腹滿痛爲溺血爲遺溺
爲小便不通爲頭頂腫痛爲反張爲目上視○以上五臟之
證舉其槩耳凡諸證治俱備襍證各條之中宜詳究之

一氣血各有所主○凡痘之終始無非藉賴血氣但得血氣克暢則易出易收血氣不足則變證百出故治痘者必當先顧血氣然氣屬陽無形者也血屬陰有形者也故無形之屬皆氣主之有形之屬皆血主之是以氣主標血主本氣主發血主肥氣主形血主色氣主橐籥血主根基故氣能起脹以主郭郭血能貫漿以成飽滿至其為病則凡為白為陷為灰色為不起發為頂有孔為出水為痛為痒為浮腫為豆殼為不靨不落為飢表不固為膚腠不通等證皆氣之為病也又如為紫黑為乾枯為無血為無膿為黑陷黑靨為腫痛牙疳為

疔癰斑疹爲津液不達爲痘後餘毒皆血之爲病此氣血
之分固有如是然血無氣不行氣無血不止氣至而血不隨
雖起發而貫必不周血至而氣不至雖潤澤而毒終不透故
治此者有不可不兼顧也

辨虛實寒熱八

一察痘之要惟在虛實二字蓋實者邪氣實也邪實者宜清宜
瀉虛者血氣虛也血氣虛者宜溫宜補且痘本胎毒非藉元
氣不能達非藉元氣不能收故凡欲解毒清火亦須憑藉元
氣使元氣無力則清亦不能清解亦不能解設有不支尙能

全書卷四十三
痘瘡
一
堪此清解否此痘瘡之終始皆當斟酌元氣爲主

一痘瘡表實裏虛者必易出難靨表虛裏實者必難出易靨若表裏之氣俱克實其瘡必易出易靨故凡自始出以至十日之外外則渾身壯熱內則飲食二便俱如常此卽表裏俱實者也其瘡必光澤起發且易收易靨也

一表裏各有虛實○凡表虛者或惡寒或身不大熱或寒熱往來四肢厥冷或面青色白多汗惡風或怠惰嗜卧或痘色灰白頂陷不起發不光澤或色嫩皮薄痒癢或如水泡摸不碍手或根窠不紅或倒靨不能結痂脈必浮細而弱是皆表虛

之證治宜溫補陽分○裏虛者凡痘瘡已出未出之間有爲
吐瀉嘔惡或喜熱飲食或爲少食不思飲食或食亦不化或
爲二便清利爲溏瀉爲不滑爲氣促聲微爲神昏多睡爲腹
膨脹氣爲吞酸爲脉弱無力是皆裏虛之證治宜溫補陰分
表實者爲身體壯熱無汗爲面赤唇紫頭疼身痛眼紅鼻塞
皮焦膚赤手足熱甚爲痘色紅紫掀腫疼痛爲皮厚而硬爲
癰腫斑疔爲脉浮洪滑大是皆表實之證治宜清解表邪○
裏實者爲二便秘結胸膈脹滿爲唇燥咽乾口瘡舌黑爲大
渴欬嗽痰涎喘粗爲煩躁驚狂聲高譫語爲脉沉數洪滑是

皆裡實之證治宜清解裏邪

張翼之曰吐瀉少食爲裏虛陷伏倒靨灰白爲表虛二者俱見
爲表裏俱虛用異功散救之甚至桂附靈砂亦可用若能食
便秘而陷伏倒靨者爲裏實輕則射干麝粘子湯重則前胡
枳殼湯下痢多血能食者爲裏實若實其裏則結癰毒紅活
綻突爲表實若補其表則潰爛不結痂

一痘瘡表裏皆有寒熱熱則陽證寒則陰證寒則血氣凝滯而
不章熱則血氣淖澤而不斂然熱證多實最忌芪朮桂附及
諸熱燥之物若元氣虛弱者卽有熱證總不可執爲實熱寒

證多虛最忌芩連梔柏及諸苦寒之物雖形體強盛但見虛脈虛證總不可認作有餘

表寒者不起發不紅活根窠淡白身涼癢癢倒陷乾枯皆肌表無陽之證治宜補陽溫表

裏寒者爲吐瀉爲嘔惡爲腹脹爲腹痛爲吞酸爲不欲食爲寒戰咬牙氣寒喜煖爲二便清利完穀不化皆臟腑無陽之證治宜溫中補陽

表熱者爲肌膚大熱根窠紅紫頂赤發斑頭面紅腫紫黑焦枯癰腫疔毒痛甚皆火在肌表之證治宜散邪解毒

裏熱者爲煩躁狂言口乾大渴咽腫喉痛內熱自汗小便赤
澀大便秘結衄血溺血皆火在臟腑之證治宜清熱解毒

虛實寒熱等證雖表裏之分各有如此然表之虛實表之寒
熱孰不由中氣之所使故惟善治中氣則未有表不和調者
也是卽必求其本之道

一純陰無陽之證凡痘瘡發熱手足却宜和煖若手足厥冷必
其人曾有吐瀉脾臟氣虛也脾主四肢所以冷爲惡候卽有
外證亦不可單用發散反損脾胃之氣此當溫中兼表宜黃
芪建中湯或六氣煎五物煎加防風羌活生薑荆芥之類以

補養脾胃血氣而助痘疹之成就也

部位吉凶 九

五臟之屬皆見於面故但察部位可知吉凶蓋人之面部左

頰為肝右頰為肺額上為心頰下為腎鼻為脾土又目為肝

之竅鼻為肺之竅口為脾之竅耳為腎之竅舌為心之苗若

痘疹未出之先但得面中諸部明潤者吉燥暗者凶又山根

為命宮年壽為疾厄宮此二宮紅黃光明者吉青黑昏暗者

凶

三陽之脉皆會於面正額為太陽脉之所會唇頰為陽明脉

之所居兩耳前後爲少陽脉之所過痘爲陽毒故隨陽氣而先見於面惟陽明經乃胃與大腸積陳受腐血氣俱多之處故痘疹初發但於本經口鼻兩傍人中上下腮頰年壽之間先出現者爲吉如太陽經則水火交戰之處少陽經則木火相并之鄉若於其位先現者凶凡起漿收靨亦皆如是

一 通身部位皆有所辨如頭爲諸陽聚會之處兩頤兩頰爲五臟精華之腑咽爲水穀之道路喉爲呼吸之關門胸腹乃諸陽受氣之海爲心肺之所居脊背乃諸陽之統會爲十二經

截氣之所繫凡此五處稀少者吉○若頭額多者謂之蒙頭

頸項多者謂之鎖項胸前多者謂之脯胸蒙頭則陽毒九真
陰竭鎖項則出入廢氣化絕脯胸則心腹近神失守兩頰兩
頤多至成片或如塗朱則肝盛尅脾凡此者至八九日間多
見滑泄瀉青或不能食最爲險候故皆不宜多也惟四肢雖
諸陽之本然乃身所役使卒伍卑賤之屬故雖多亦不致害
凡起發成漿收靨俱如此也○又心窩手足心謂之五心痘
俱多者必重若頭面胸項手足細碎稠密一樣者恐氣血衰
微脾胃虛弱不能周流灌注則無不危矣

痘形痘色吉凶

十

萬氏曰形乃氣之克色乃血之華凡看痘者舍此更無他法是

改形貴尖圓起發若瘡皮厚硬而平塌者凶色貴光明潤澤

根窠紅活而慘黯昏黑者凶然形有起發而或致變者由色

不明潤根不紅活故耳若痘色光澤根窠紅活雖平塌亦爲

可治然色以紅活爲貴而猶有圈紅暎紅舖紅之別圈紅者

一線淡紅緊附于根下而無敗走之勢吉之兆也暎紅者血

雖以附而腳根血色隱然不聚險之兆也舖紅者痘色與肉

不分平舖散漫凶之兆也以此察之則死生可預決矣○根

窠者血之基膿者血之成故六日以前專看根窠若無根窠

必不貫膿六日以後專看膿色若無膿色必不結痂此必然之勢也

吉證

一看口唇舌尖紅活無燥白之色者吉

二看根窠紅潤圓活地白分明者吉

三看心窩額上稀少者最爲順候

四看痘頂出來不焦不紫者吉

五看頰色無黑陷痘頂內暗而黃如蒼蠟色外潤而黃如油色者吉

全書卷四十三
痘疹
一凡看痘之法須察部位并察多寡大抵痘少者毒少而吉痘多者毒甚而凶如上而頭面次而咽喉前而胸腹後而腰背下而四肢凡此五處但得二三處稀少而頭面別無危證卽吉候也若五處通身皆密卽雖顆粒分明恐氣血不能周給必難盡貫或旣貫而不能收或旣收而不能脫客強主弱而外盛內虛小舟重載而力不勝任鮮不覆矣此多寡之宜察勿謂雖多亦吉也

凶證 十二

痘未出而聲啞喉者不治已出五日內見者亦不治

痘未壯而先抓破無氣血者不治

痰涎壅盛氣急者不治

痘未出已出而神昏氣促躁亂不寧者不治

腹痛而瀉膿血者不治

肌肉黎黑如被杖者不治

漿水米粒不入口或飲食噎喉者不治

眼內黑珠起浮油混睛者不治

眼中神光不明珠色轉綠轉赤者不治

閉目昏睡舌捲囊縮者不治

頭溫足冷悶亂飲水者不治

吐瀉不止藥食不停不化直下及肛門如竹筒者不治

胃熱發黃身如橘色下利者不治

痘初出卽青晦焦黑者不治

密如蚕種全不起發平片花搭者不治

痘瘡癢癩寒戰不止者不治

舊有瘡瘍走漏氣血而敷藥不效者不治故曰不怕五心有痘

只怕原瘡泄漏原瘡卽是未痘之先有瘡泄去膿血最爲凶

也若果五心稀少而飲食如常者亦不妨事

痘後傷風傷食肌肉瘦脫者不治

右除此之外雖有襍證險證及痘之稠密但畧有潤澤興起之意須伏醫之高妙患家之心託弗惑細心調理自有可收全功者

怪痘形證 十三

怪痘者乃逆痘中之尤甚者形證不一不可不辨

一痘初出時面胸手足已見紅點却不起發不成膿漿隨即收斂若加氣促聲啞悶亂者即死此名內陷證也○此證若無煩喘悶亂等候者名曰試痘過五七日後必復發熱而痘出

者其痘必重

一痘瘡初出如蚊蚤所咬三日後反不見者名反關痘五日死

一痘子出現三兩成叢根脚堅硬成塊者此名痘母六七日死

一痘子將出身上有紅腫結硬處似癰非癰似癰非癰者亦名

痘母三五日死○以上二證俱宜真人解毒湯救之

一痘初出便成血泡或水泡隨即破壞者此名爛痘二三日死

一痘出後遍身都是空殼不作膿水者此名空痘八九日死

一痘當出現起發之時中有乾黑者此名鬼痘宜用臙脂水塗

之勿使蔓延若不急治則乍起乍癩當靨不靨或多作番次

而出綿延日久而死

一痘出起發之時中有痛甚如刀剝叫哭不停者此名痘疔五
六日死

一痘當起發之時枯燥不潤癩伏不起皮膚皴揭者此名乾痘
五六月加煩滿喘急而死

一痘於起發之時皮嫩易破摸之溫手者此名溫痘六七日癢
癩而死

一痘起發之時瘡色嬌艷皮薄光潤鮮紅可愛者此名嫩痘八
九日後不能成痂必痒癩而死

全書卷四十三
痘疹
一痘於起發養漿之時瘡頭有孔漿水漏者此名漏瘡五六日
後痒瀉而死

一賊痘者是諸痘未漿而此痘先熟也又名假雲泛多在太陽
喉口心胸等處三日見者六日死四日見者七日死五六日
見者十一二日必死也

一痘出雖稀根窠全白無血色三四日後雖亦起脹然按之虛
突此亦名爲賊痘氣血太虛至灌漿時必變成水泡大如葡
萄皮薄若紙抓破卽死

一膿水將成之時其瘡自破有孔而深者此名倒陷

一將靨之時不能成痂皮脫骨黑者此亦名倒陷俱不治
一痘於收靨之時不能成痂皮肉潰爛膿水淋漓者此名痘癩
能食則生不能食則死○凡以上者皆不治之證

死證日數歌_十

初出頂陷連肉紅。過至九日一場空。又如血點帶紅紫。斑證只在六日中。發斑黑者在朝夕。斑青頃刻去匆匆。無膿痒癢期二日。不治腰疼及挺胸。報痕似痈如蚕種。舌捲囊縮命不克。紫泡刺出黑血者。飲食嗾喉證俱凶。難療鹵腫痘不腫。青色黑陷及無膿。二便流利下腸垢。更有吐瀉出虻虫。頭溫足冷

好飲水。痘先驚後藥難攻。氣促泄瀉渴不止。目無神者數當
窮。聲啞失音叫與哭。痘色縱好也難終。有種氣急亦難治。庶
幾貫好是傷風。見此宜服參蘓飲。起死回生須見功。

發熱三朝辨吉凶 十五

一初發熱時身無大熱或熱或退神清氣爽唇鼻滋潤腰腹不
疼自始至終皆飲食如常大便稠實小便清利而無雜證者
吉不必服藥

一初熱時先發驚搐一二次而隨止者此痘出心經也乃爲吉

兆不必治之若甚驚不止日發三五次或連日不止痘出多

而密者乃凶兆也

一初發熱時吐瀉不甚而隨止者吉

一正發熱時或得大汗一身汗隨止而脉見稍平者吉

一初發熱時用紅紙條蘸麻油點照之如心窩或遍身有成塊紅者八九日後決死

一發熱一日卽遍身齊出或稠密如蚕種摸之不得手者決死

一發熱時腹中大痛腰如被杖及至報痘而痛猶不止者決死

一發熱時頭面上有一片紅如胭脂者八九日以後決死

一發熱時口鼻或大小便俱失血者決死

一發熱時妄見妄語昏不知人者死

一發熱時腹脹而痛大叫不止者死

一正發熱三日之內其熱忽退而反煩躁悶亂坐卧不安此外

雖清涼內却熱也若見手足冷腹脹氣喘者即死○以上諸

證俱不必治

報痘三辨吉凶 十六

一見點之時頭面稀少胸前背上皆無根窠紅潤頂突碍手如

珠光澤此為上吉不必服藥

一發熱三日或四五日熱稍退乃於口鼻腮頤地閣頸項之間

或四肢先放數點大小不一淡紅潤色痘與肉色紅白分明者吉

一痘作二三次出三日後手足心方纔出齊出齊後頭面胸背稀少尖圓緊實飲食二便如常者吉如無他證不宜妄行用

藥

一痘之初出三五相連者必密單見者必稀

一痘瘡上身多下身少者吉反是者險

一發熱至五六日痘應出不出以燈照之只在皮膚中有紅點但其色脉和平別無逆證忽然眩冒大汗出者毒氣痘瘡一

齊從汗而出者此名冒痘再無壅遏之患乃吉兆也○一痘
瘡變化莫測有等身無大熱亦見報痘但不貫膿結痂或出
而復沒者此名試痘不可誤作輕看再過數日忽然大熱必
然復出宜審治之

一發熱一日便出者凶或一齊湧出如蚕種密布者決死

一大熱未退而見紅點數粒先見於太陽額角髮際天庭或山
根以上等處此陽毒乘虛上侵陽位也大非吉兆再加目紅
唇裂痰鳴色紫或白者尤甚又或有三五粒聚於一塊者此

名銅錢痘皆不吉之兆急宜涼血解毒以防其危

一痘瘡初出紫色紅片者名紫雲痘四日死

一痘瘡初出當頂紅者六七日死蓋痘欲淡紅如線附於根下

不欲當頂紅也

一痘已出一遍又出一遍心腹疼痛不止口氣臭色紫黑者決

死

一痘瘡皮薄色白而光根窠全無紅色或根帶一點紅三五日後仍如綠豆樣此痘決不能成膿只成一胞清水擦破即死

一色紅帶艷皮肉盡紅者必不成膿痒癢而死

一報痘之時全不起頂有如湯泡及燈草火燒者十餘日後必

一 疥瘍而死

一 報痘之時有黑斑如痣狀或肌肉有成塊黑者卽死

二 報痘時若口鼻及耳有紫紅色或血出不止者決死

一 報痘之時應出不出或起紅斑如蚊跡者六日後必死

一 報痘之時腰腹痛或狂言煩躁大渴吐瀉不食者俱不治

一 報痘之後痘已齊而身熱不退反甚者死

一 痘齊之後毒已外達則內當安靜而反見煩躁悶亂譫妄不

止者此邪毒盛極神機無主也必死

起發三朝辨吉凶

十七

日報痘三朝之後不疾不徐先出者先起後出者後起大小分明不相連串尖圓堅實紅活肥滿面目漸腫依期灌漿飲食二便如常而無他證者此表裡無病大吉之兆不必服藥

一痘雖起發而色見灰白腫如錫餅者看其人臟氣何如如能食便調無他證者吉若不能食或吐利或瘙痒者凶

一痘起一分則毒出一分至五六日不盡起發又色不紅活者

一夫無生理

一起脹三日已足痘皆滿頂紅紫者凶面目腫甚者亦凶

一痘當起脹之時遍身雖起而頭面全然不起或痘不脹而肉

張頭面皮肉紅腫如瓠瓜之狀而痘反不起者決死

一起脹之時遍身痘頂有眼如針孔紫黑色者決死

一痘色乾燥不潤慘黑不明或灰白漸至倒陷或發紫泡者皆

死

一起脹時凡腰腹大痛或腹脹不能飲食或氣促神昏或悶亂

不寧或泄瀉煩渴或唇白痰鳴或狂言妄語啼哭呻吟如見

鬼神者皆死

一起脹時吐利不止乳食不化或二便下血者死

一手足間見而復隱起而復癩或通身隨脹隨沒躁而發喘者

光澤此時毒化成漿由綠色而漸變蒼蠟以手按之其皮堅
硬膿漿厚濁約束完固無少破損飲食二便如常此上吉候
也不必服藥

一痘密者自起至漿漸至壯大未有不相串者雖相連屬只要
根腳分明陷者盡起無處不透則毒從漿化膿成而毒自解
無伏畱者矣此亦吉候

痘之初出或頂平或中心陷下或白色只要其人能食二便
如常治無乖謬以及貫膿之時陷者微起平者微尖淡白者
紅活窠中血水盡化爲膿但得如此毒已解矣又表無痛痒

之證裡無吐瀉之證是表裡俱無病也如此者坐待收靨不可妄投湯劑

一貫膿時紅紫黑色外剝聲啞者死

一貫時純是清水皮薄而白如水泡者三四日必抓破而死

一膿不能貫而乾枯焦黑或全無血水瘍陷者卽死

一頭面腫大瘡盡搔破臭不可近而足冷者決死

一貫膿之時吐利不止或一便下血乳食不化痘爛無膿者決死

一貫膿之時二便不通腹脹肉黑發斑謔妄氣喘或寒戰咬牙

者決死

一回漿之時漸當蒼黑收斂而反光嫩不斂者此氣血兩虛漿

不能乾必發痒搔破而死

一膿漿未成忽然乾收或青紫焦黑者死

一忽然作痒正面抓破皮脫肉乾者死

一諸痘有漿而天庭不起或額上如沸湯澆破臭連兩頰水去

而乾似靨非靨者死

結靨三朝辨吉凶

十九

一痘至十日之外血化毒解膿必漸乾如蒼蠟色或如葡萄色

從口鼻兩傍面部收起以至胸腹而下然後額上與脚背一齊結靨而落別無內證飲食二便如常或從手足心手指尖或陰上先收者俱吉候也

一痘既蒼蠟收靨而身有微熱者乃燒癩之證但飲食如常俱不必治

一痘當靨時遍身臭爛目無神氣者決死

一當靨之時遍身發痒搔破無膿皮捲如豆殼而乾者決死

一當靨之時無膿而氣急聲啞或手足顫掉或寒戰咬牙或腹脹痰响或足冷過膝或小便少而大便頻者皆死

一當靨時兩臉乾硬按之如石者死

一痘至收靨飲食不進口中常如食物動而不止者死

一面部胸腹未靨而脚先靨者危陰勝陽也

一遍身俱靨內遺數粒獨不靨者尙能殺人如蛇之退皮中有

一節被傷不能全退者終死其有靨至項下或至胸住定而服藥不效者亦死

一痘瘡未該靨而卒然焦紫者死

一痘當靨時遍身未見膿成而口唇上下痘先黃熟者毒氣內

攻於脾也凶

一痘瘡有膿結靨者則爲吉證若無膿收靨則立見其危
一痘未收靨而口唇腐爛及口白到舌者危

一收靨時前後有紅紫泡者不治

落痂後辨吉凶 二十

一痘瘡收後其痂先後自脫痂厚落連離肉不粘者吉

一自食痘痂者雖有他證不死

一痘痂雖落而痘瘢雪白畧無血色者氣血脫盡也若不急培

元氣則過後必死

一痂落後每發驚而神無所依者心氣絕也危

一痂落後手足顫掉咬牙噤口目閉腹脹足冷過膝者不治

一原痘乾燥膿少不貫雖結靨落痂而疤白者或有餘熱不退

者雖過一月亦要死

痘瘡上論列方 二十一

真人解毒湯 痘五二

一或表外過而口中或或...

一或...

一或...