

瘡瘍經驗全書



瘡瘍經驗全書目錄

第三卷

胃疽鼠疽圖說方二

脾癰圖說

右搭肩發圖說方四

兩肩兩脇癰疽發圖說

血潰流注疽圖說方三

癰發圖說

委中毒圖說方二

腿遊風圖說方三

又圖說

三串毒圖說

右搭肩發圖

左右甲說圖

癰瘡圖說方三

腎癰圖說方

陰毒瘡圖說方十

左右便毒圖說方

穿襠發圖說方四

又圖說



女陰蝕瘡圖說方二

冷漏濕毒流注圖說方二

坐馬癰圖說方三

附骨癰圖說見上

鶴膝風圖說方三

人面瘡圖說

脚手發背圖說方二

脚拐毒圖說

跟疽圖說方一

血風瘡圖說方三

腎氣遊風圖說方二

小腸流注圖說方二

紫疥瘡圖說方四

貼骨疽圖說方一

臟毒症圖說方三

膝腿毒圖說方二

腕疽骨槽疽圖說

骨癭疽圖說

骨疽瘡圖說

鞋帶瘡圖說方二

風疔瘡圖說方一

裏外廉瘡圖說方五



飛遊毒圖說方二

楊梅瘡圖說方十八

雀子班圖說方二

大麻風毒圖說方八

冷疔圖說方一

眉疔瘡圖說方一

赤遊丹圖說方二十二

附痔漏症方五十二

紅絲瘡圖說方一

癰瘡圖說方十

諸瘤圖說方七

天泡瘡圖說方三

癩瘡圖說方九

頰疔瘡圖說方一

鼻痔圖說方九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

卷之三目錄

瘡瘍經驗全書卷之三

宋燕山寶漢鄉輯著

天都洪瞻巖  
桐川陳友恭  
全校

圖論方

上肩疽下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服加味托裏散

桔梗

厚朴

白芷

人參

黃芪

當歸



官桂

川芎

荆芥

黃芩

烏藥

防風

連翹

香附

枳殼

天花粉

右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁

熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬地骨五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃凡丸通氣散仍貼玄武膏金絲膏

如膿出盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澀用五苓散加黃連燈心膿之

其毒從小便中出

更服乳香護心散日進五服

又服黃凡丸日進三服

開胃散

治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂

甘草




麝香

厚朴

右水煎服

仍用神異膏貼之

# 三串毒



此毒上下生之其形雖一而中間皮好但肉肉潰爛初起紅色亦不大痛曰漸瀆爛此症之來亦屬憂情所感嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性度怡然而亦患此者想平居坐臥濕地而然也若無外症得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發音諸癰同



腎俞發及脾癱

卷之三




此症下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷脾受濕而得也陽發于  
 外可治痰發陰發陽于腎膜膿稀者為虛難治若老少婦人性氣  
 溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑  
 月以冷水沐浴而然脾癱發于左膊之間初發可用艾火灸之急  
 服追疔湯并之即散治法服藥同前蠟丸甚宜服之



右搭肩發

左搭肩發



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭肩骨上生者以  
動之處人可治難安串於右搭肩者必難治也此症由於風寒之  
來以脈斷之邪在表其症大小便如故飲食如常口能知味其  
不在裏也不惡風只燥熱脈不浮知不在表若表裏既和則邪在  
經絡中凝於經絡其癱斯出身半已上風從受之故云八風之變  
法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

摻藥

鷄黃皮炒

血竭

花蕊石

冰片

右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯

形實色黑背生經腫脾骨下通脈浮數而洪緊

食則嘔

生附子一錢 瓜蒌仁五分 羌活一錢 甘草節六分 人參一錢 青皮一錢

黃芪二錢 半夏六分 白朮一錢 山藥一錢

水二鍾 姜三片煎服 冬天加黃栢

牛膠欬 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻於內不傳惡血

牛皮膠四兩 右用好酒一碗入膠內重湯煮令膠溶透者為

用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷一錢 升麻五分 桔梗 甘草一兩 生地二兩 黃芩二錢

黃芪 連翹各二錢 紅花一錢 歸稍二錢 官桂三分 當歸一錢

生黃連五分 右十三味水酒各一碗煎至半碗服之須睡

龍情養心神不可妄想以動心火




左 右 串



此症發於左搭肩骨上生在移動之處可治難安串在右搭肩必  
 難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾為末濕則乾摻乾則清油調  
 如症發於右搭肩骨上生在動移之處可治難安串在左搭肩者  
 亦難治之用藥摻依前左搭肩藥治之  
 另有良方在前左串右二形圖後看方治之

兩肩兩脇癱疽發



凡兩肩兩脇邊成癱疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥  
 熱劑即補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜  
 服十六味流氣飲內疎黃連湯治法與發背癱疽同  
 湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

# 血潰流注疽



此症多生膏梁形重之人有此症者好食煎炒炙烤糖蜜之類其  
 疽大者如雞子形像猶如紫李其腫不紅肉串經絡之間流注骨  
 節之內遍身痠疼百節疼痛用內托散加木瓜一白芍 連翹  
 再服乳香護心散 黃凡丸 外用圍藥敷之不可遲也  
 凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

癩發


此症屬陰多生骨節之間初生如梅子大在於皮肉之間內不疼  
不痒無力之人二十日始作紅腫有力人一月方作紅腫內先潰  
爛皮面上紫黑色破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏  
則難治也急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯



蠟凡丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之

未潰之先用鐵箍散敷之能消其一半

瘡 癰



大抵下部之症以蒼朮為主佐以黃柏之辛行以青皮加以甘草  
隨症用引經之劑則得効矣此毒受在脾腎經痛不可忍用內托  
流氣飲治之



蒼朮

黃柏

青皮

甘草

芍藥

當歸

白朮

檳榔

川芎

羌活

獨活

白芷

木瓜

牛膝

杜仲

冬加薄薑

夏加黃芩

姜三片煎服

內托清氣飲

人參

茯苓

白朮

官桂

陳皮

木瓜

紫蘇

枳殼

甘草

芍藥

當歸

蒼朮

羌活

獨活

川芎

白芷

姜三片棗二枚煎服

再服紫蘘流氣飲

三香和氣飲

搽藥用腿遊風及婦人癩瘡藥通用



# 委中 毒

此毒受在腎經寒氣阻滯而成加減紫蘇流氣飲治之先用敗毒

流氣飲

先服敗毒流氣飲紫蘇

白芷

枳殼

桔梗

陳皮

烏藥

白芍

厚朴

香附

檳榔

木香

木瓜

牛膝

杜仲

防風

甘草



木香 木瓜 牛膝 杜仲 防風 甘草

姜三棗一煎服

後服紫蘇流氣飲

烏藥

枳椇

川芎

防風

排膿加人參黃芪

紫蘇

厚朴

杜仲

木瓜

當歸

姜三棗一空心服

甘草

香附

枳殼

桔槩

# 疝 腎



南京中醫藥大學圖書館藏

此癰受在腎經而腎屬少陽後此陰中之陰道遠位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒結聚成風故生此症也當用上下助難藥治之

收毒流氣飲

內托流氣飲

內托菴活湯

菴活

官桂酒洗

大黃

酒洗各四分

黃芪

一錢五分

藁本

連翹

歸稍各一

炙草

陳皮

蒼朮

白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心執服以被覆患上使藥力行之方能奏功如或不愈用鐵箍散姜汁醋火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥力



# 腿遊風

此癰受小腸腎經傷於寒熱邪氣毒流于腿此是遊毒也當用紫蘇流氣飲治之後服敗毒流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇

檳榔

厚朴

甘草

香附

烏藥

獨活

白芷

荆芥

蒼朮

黃柏

陳皮

木瓜

枳殼

川芎

防風



姜三棗一煎服

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

檳榔

陳皮

羌活

防風

荆芥

木瓜

桂枝

黃柏

獨活

烏藥

甘草

香附

山梅

熱服

先用金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之

搽藥

輕粉二錢

黃連末二錢

孩兒茶一錢

黃柏末二錢

白芷末一錢

荆芥末一錢

雞內黃一錢

冰片二分

沿粉三錢

枯凡二錢

右和勻為細末先用溫苦茶洗淨再用紙搥乾滋水乾搽



囊毒郎腎癰



此毒因脾經濕熱不利遂流毒于膀胱腎經感冒寒暑邪氣偏腎  
于陰之經絡以至血氣疑聚寒濕不散陰囊上腫而痛或潰爛皮  
脫腎子懸掛宜用瀉肝清熱湯服之

龍膽草 酒拌炒

當歸稍

車前子 炒 澤泄

生地

芍藥

黃連

黃柏

知母

木通

淡竹葉

防風錢

各二

甘草稍五分

右作一劑水二碗煎八分食前服

外用鐵箍散圍之

此症腐壞急用烏金散敷之

烏金散

麩不拘多少煨存性為末

紫蘇葉

俱為末香油調搽乾摻亦可

或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯

小柴胡

人參

黃芩

川芎

白朮

黃芪

當歸

甘草

黃柏

知母

各一錢

半夏

五分

白芍五分

右水煎服

痛甚加黃連

小便利加木通車前子

口渴加天花粉麥冬五味





癰腎



偏腎灸此雙關水  
左灸右右灸左

此毒年高者因宿行疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事  
所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻小注歸來二穴痛不可忍用手  
按之皮寬不急可用敗毒散加入當歸須川練子發散  
用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之

更服黃凡丸

倘或開刀須待其熱以油頭繩托住腎子以小刀開海底入其體  
血即流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色並避火湯風氣及諸毒物

陰 蝕 瘡



此陰蝕瘡之生也皆由臟用虛怯腎氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時痒以漸成瘡作疔膿水湧流若不早治命亦難保先用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳解毒湯外用搽藥先用金絲膏後用紫雲膏拔出毒水易能長肉

搽藥

輕粉 二錢

孩兒茶 二錢

紅絨灰 一錢

飛丹 一錢

冰片 三錢

珍珠 五分

射香 二分

雞內金 一錢

煨存性

蘆甘石 一錢

煨一錢

夫陰蝕瘡者即下疳也陰汗燥臭故莖根生疔瘡此處乃疳經所屬之分野

清濕瀉肝湯

升麻

羌活

柴胡

知母

黃柏

生甘草

澤泄

青皮

川芎

生地



蒼朮 龍胆草 木通 水煎 熱加黃芩

小便不利加車前子 虛加人參

又方 氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參 黃芪 當歸 柴胡 升麻 草梢

黃柏 知母 膽草 紅花 白芍 黃芩 能緩莖

中痛故用之

又方 補中益氣湯加南星蒼朮黃柏知母黃芩牛膝燈草

防風羌活湯 治下疳

防風 羌活 荆芥 獨活 黃芪 牛旁子

山梔 甘草 木通 蒼朮 車前子 天花粉

洗方 冬青葉 四五葉 甘草 黃柏 防風 煎湯洗之

下疳摻藥 輕者用輕粉末一味摻上

又方 孩兒茶 輕粉 黃柏 冰片 橄欖核錢煨 爲末摻

蛀疳 輕粉 韶粉 各等分爲末摻之

外蛀捍內蛀捍 冰片分二 輕粉分六 射香分五 爲細末摻乳肉

內外蛀疳瘡並小便一切疳疾

蒼朮錢二 黃柏錢二 秦艽錢一 滑石錢二 水煎服

如小便澀滯疼痛加甘草節蒲黃

又方 黃芪 白蒺藜 羌活 白附子各二錢

末之用猪腰子一付竹刀切破入藥在內線扎定白酒煮熟空心

服之

內外蛀疳身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍胆草黃連車前子



下疳摻藥 青橄欖燒灰一錢 孩兒茶 一錢 冰片 三分 爲細末

先用杏仁四分去皮 尖另研 又加輕粉 四分 和研如泥 先敷患上

泔洗之後用前摻藥

又方 紅棗去核嵌明凡二分 珍珠四粒 煨過有性末之乾摻

疼痛不可忍

黑羊角穿山甲煨過研末各二錢 乳香末各一錢 空心酒下

蠶法 菜豆一升 煮極爛 茶葉五錢 研末 乘熱傾在多年馬桶內 在

無風處薰之待出 身汗妙甚 男婦並用

小便疔瘡大爛者 面粉一兩 黃蠟八錢 白蠟 一兩

冰片 一錢 先用麻油三兩 火上熬化 二蠟隨下面粉 次下冰片

爲隔紙膏貼之 五日後病即止 肉即生矣



陰 蝕 瘡



婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝胃三經之火勃然而面起  
 遂致陰內生瘡其種不一或生陰蝕瘡或生陰茄或生陰節或生  
 疔瘡或生翻花瘡或生惡瘡極痛極痒狀如蟲行淋瀝濃汁等症  
 皆由濕熱與心火相擊而生惟陰難治性氣和緩之婦胸次坦

女界身全書

卷之三

南京中醫藥大學圖書館藏

夷服藥易愈若性急擇垢之婦習與性成服藥百帖方愈必須忌口絕慾戒性為要當以補心養胃與茯苓補心湯內補托飲間服之其陰中腫塊如棗核者名陰茄區如簞者名陰簞極痒者名蝕瘡名隱瘡餘類倣此

茯苓補心湯

白茯苓

乾葛

前胡

桔梗

甘草

陳皮

白芍

紫蘇

人參

半夏

當歸

熟地

川芎

枳殼

姜三片棗肉二枚燈心二十根水二鍾煎服

補心養胃湯

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

黃連

當歸

川芎

生地

青皮

白芍

檳榔

烏藥

遠志

滑石

山梔仁





車前子 玄胡索

內補托裏流氣飲 甘草節 茯苓 澤泄 猪苓

紫蘇 山梔 黃連 白朮 當歸 川芎

生地 白芍 人參 黃芪 木通 紫蘇

青皮 香附 苦參 澤泄 白茯苓

冰黃膏 用黃連二兩水二碗文武火煎至一碗濾去渣再重湯

火煎至一酒杯加冰片三分射香二分輕粉五分硫黃末一錢俱

研末調和用鵝毛潤陰內立效

抹散 黃連末 鹿角灰各一錢 紅絨灰七錢 雞內金灰一錢

孩兒茶七分 珍珠末五分 冰片五分 輕粉五分 射香三分

右為細末乾摻患處



洗方 芭蕉根搗爛煎湯溫洗避風

又方 川椒五錢蛇床子半斤礬三錢桃柳枝七艾一兩

苦參一兩米泔五六碗煎滾去查乘熱薰洗之

又方 治陰蝕瘡惡瘡 雄黃一錢 硫黃五分 桃仁七

木鼈字一級去艾五錢入前藥在內作條放在馬桶薰之濕即死

麻黃湯 陰腫或瘡或爛

麻黃 黃連 蛇床子各五錢 艾三錢 烏梅三枚 大戟

防風 白凡 右剉煎湯薰洗再用孩兒茶一錢輕粉冰片

杏仁灰五分為末搽之

陰中極痒及蝕惡瘡

用大蒜搗碎煎湯洗之後以杏仁燒烟盡研末絲綿包納陰戶



又方 取雞肝或牛肝猪肝煮熟乘熱納入陰戶其蟲入肝內

又方 水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星納陰戶

又方 以鯽魚膽搽之

陰疔 用茄根燒灰末之香油調勻鵝毛潤內

陰中堅痛

白凡五錢 生大黃 生甘草各二錢五分 爲末綿包如棗核大入陰中

陰中生瘡 黃芩湯 當歸 黃芩 川芎 大黃 白凡各二錢

黃連三錢 右剉水五碗煎薰洗洗敷雄黃硫黃輕粉末

陰爛 孩兒茶 雞內金各一錢 輕粉五分 冰片三分 爲細末乾搽

陰瘡 與男子垢精瘡畧同 黃丹 枯凡 扁蓄

藁本各一兩 硫黃五錢 蛇脫一條 爲末搽之如不乾息再用芍藥末搽



之或隱處疼痛鹽三合炒熱青皮包慰之立止

陰冷母丁香十粒研末縫紗袋如指大入藥內納陰戶

濕痛牛膝五兩酒二升煮半升去查作三服亦治

血結痛無故血尿龍骨一兩研末熱酒調下一匙

毒便右左



夫便毒者生於小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦或上或下  
低閃胸氣或房事所傷或男女大慾不得直遂其志故敗精滯  
留聚中途或夢寐之間而不泄或妄想不能忘情息念故精液  
然腎者作強之官伎巧所由一有所感精血凝滯此症遂生初起  
之時寒熱交作兩腿牽絆腫起不能屈伸乃症之漸也急服龍胆  
湯

龍胆草

錢一

木鱉

三枚

大黃

錢三

瓜蒌

一枚

桃仁

紅花

歸須

各等分

水酒各一碗

煎八分

去渣

夜露一宿

早空

荆防敗毒散

穿山甲

甘草

紅花

羌活

當歸

川芎

赤芍

生地

銀花

防風

木通

枳殼

烏藥

天花粉

各一錢

槐米末

二錢

牛膠

錢五



# 小腸流注

此症受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流

氣飲治之

敗毒流氣飲



白芍

香附

枳殼

防風

茴香

川芎

澤泄

羌活

玄胡索

獨活

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

姜三棗一煎空心服

清心流氣飲

白朮

茯苓

猪苓

澤泄

麥冬

青皮

防風

柴胡

羌活

赤芍

香附

生地

川芎

紫蘇

甘草

姜三棗

煎服

小便不利加車前子滑石木通

時服蠟凡丸

穿襠發一名瘰癧一名橫痃



此毒因辛苦得之生于窮骨穴上若不速治毒潰傷于谷道內爛臟腑即死急服蠲毒散

蠲毒飲

甘草

貝母

赤芍

當歸

金銀花

白芷

青皮

木通

連翹

桃仁

龍胆

花粉

各一錢

穿山甲

炮

如元氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲酒隨量以助藥力行癩十餘次其毒無膿血從大便中出

又方 欲作未作之時服之立消

皂角七片灰火煨黃色去皮陰地上去火毒為末酒下

代刀散

穿山甲

殭蚕

枳殼

姜黃

牽牛

赤石脂

大黃

白芷

貝母

各等分





爲細末每服五錢早晨空心用酒調下行利十餘次用薄粥禱之  
其膿血從大便中出

灸初起便毒臙毒法

用濕蚯蚓糞捻成餅如銅錢厚放患處以艾火在餅上灸之覺熱  
一二壯爲度或痛或痒卽可

後服鷓鴣毒散

冷漏濕毒流注



此毒或因足痒瓜破有傷湯火風氣或因寒濕流注於是脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色當出臭水水先用三稜針刺週廻出血盡然後金絲膏貼之呼出毒水腐肉然後將紫金膏貼之

紅活再合隔紙膏貼之方具後  
面粉三錢 輕粉一錢 白蠟一錢 黃連末一錢 黃柏一錢 血丹飛過  
爲細末清油燭調和攤隔紙膏貼之

又方搽藥

黃連末 二錢

輕粉 二錢

冰片 一錢

血竭 一錢


孩兒茶 一錢

右爲細末乾搽



紫 疥 瘡

此症五臟六腑之積毒其氣蒸肺而肺主皮毛故發于經絡相傳  
 頭面體膚手足形於紫疥或疼或痒遍生不拘何處項中黑陷久  
 則嘔逆沉重神思恍惚速治之方保無虞



清肌解毒湯

荆芥

連翹

薄荷

白芷

山梔

白朮

升麻

乾葛

粉草

防風

醫身要論全書

三

蒼朮

黃連

苦參

花粉

桔梗

羌活

胡麻

青皮

膽草

當歸

川芎

生地

赤芍

靈仙

白蒺藜

虛加人參酒煮加白

花蛇蟻脫

黃芩肉桂天麻馬鞭草等味以意消息之宜服苦參丸

煎湯洗法

荆芥

薄荷

苦參

白芷

蒼朮

栢樹枝

獨活

桑枝

柳枝

槐枝

鳳仙槓

金銀藤

用水不拘煎湯去渣在無風處薰洗之拭乾用搽藥

搽藥

杏仁一兩 去皮

風子肉一兩二味 另研如泥

輕粉真者 五錢

川椒末三錢

硫黃末錢

荆芥末錢

防風末錢

白芷末錢

樟水二錢

枯凡三錢

右各另末和勻雄猪膽汁加生猪油調勻搽入肌肉

不見藥為効



清肌燥濕解毒湯

蒼朮

白朮

防風

芥穗

胡麻子

白疾藜

苦參

減半

當歸

白芍

羌活

薄荷

白芷


川芎

石菖蒲

甘草

右十五味各等分磨末水和為丸每服二錢白沸湯送下

坐馬癰



此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷於內大腸之經並聚成毒而為漏瘡此乃毒症先用宣毒湯次用敗毒流氣飲

宣毒湯

白芷 赤芍 甘草五分 大黃三錢 連翹

當歸稍錢 枳殼各一錢

水酒各一鍾煎一滾去香早服

又方

紫蘇 人參 桔梗 枳殼 甘草

柴胡

川芎 羌活 白芷 防風 白朮

芍藥

金銀花 姜三棗一煎服

後用內托追毒飲

人參 黃芪 厚朴 甘草

桔梗

枳殼 金銀花 黃連 烏藥 當歸

芍藥

白芷 川芎 防風



附骨疽癰論

天貼骨癰者卽附骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此症之發盛暑身熱賊風入於骨節與執相搏復遇冷濕所折或老勞太過兩足下水或坐臥濕地身體虛弱而受寒邪然風熱伏於骨邊附骨成疽着大骨節間其急者身不得轉動按之應骨痛經日便覺皮肉生急洪洪如肥狀其緩者一點酸疼漸覺長大行步艱澁以致骨肉不相續若失治合身成膿不潰至死身變青黯但痛按之至骨久則結腫或結癰癰其附骨癰久而卽腫結膿以此爲異若治附骨疽作賊風中之則病深膿多凡偏枯攣曲之生乃附骨疽之漸也四肢困倦乍寒乍熱小便赤大便澁無汗須用紫蘇蘄艾鳳仙草煎湯熱熨之使腠理開發以布拭乾再用乾被覆之

燒乳香薰之如虛甚隨服人參膏畧加附子以助其氣復以艾火攻之萬無不愈者

貼骨疽



此症用筋頭按患處極痛是穴以墨點定艾灸自壯為期忽爾艾壯爆起不拘壯數乃其驗也不必灸矣獨活寄生湯加人參二錢一服





附骨疽癰之症其毒入于骨髓所犯甚深外膚若好而貼骨之內已先內潰骨肉已不相連曰輕夜重煎寒發熱至百日有膿者用火針刺之不若初起之際艾炙百壯方可保命若待其潰爛則人之中能生幾何急服蠟丸

久雨陰濕倍加

蒼朮

白朮

澤泄

防風

木瓜

附骨癰 治法同前



# 臟毒症

臟毒者其大腸盡處是臟頭一曰肛門又曰屎孔內是也毒者其  
 勢凶也皆喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和或房勞太過  
 或飲醞戾之酒或食五辛炙炒等味畜毒在內流積為癰肛門腫  
 痛大便堅硬則株痛其傍生小者如貫珠大者如李核煎寒作熱  
 疼痛難安勢盛腫脹翻行虛浮早治易愈失治潰膿孔爛陷內寸



許者難生血膿出而腫消痛減者易生也

一初起微腫即用濕蚯蚓糞捻成餅如錢厚放患上艾壯如半粒互大者燒之微熱即去再換餅燒之再易如前法以十四壯為期外

用木香散搽之

爐甘石

火煨二錢

黃連膏碎之紅乾乳末聽用

乳香

一錢另研

石膏

一錢另研

冰片

射香分

和研細末用螺搗爛取汁調塗患上如無田螺用黃連

汁亦可

先服行藥一劑追其毒

歸尾

二錢

生甘草

二錢

白芷

一錢

黃連

一錢五分

枳殼

檳榔

烏藥

赤芍藥

二錢

天花粉

一錢

生地

皂角刺

桃仁泥

二錢

紅花

各五分

大黃

三錢

山甲

二錢



玄明粉二錢

水二鍾浸一宿明早煎至一滾空心服之行利六七次用薄粥補之若早補腹反痛

清臟內托散

人參 黃芪 當歸 川芎 陳皮 甘草

黃連 生地 赤芍 白朮 黃芩 獨活

枳殼 白芷 防風 牡丹皮 槐花 升麻

烏藥

水二鍾廣膠五錢煎服倘寒熱脾胃餘症以意增減全在隨症活

法



鶴膝風

鶴膝風痲風鼓槌風之類也氣血相並而行週于一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作焉多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受和鬱爲瘀滯不得運行所以作痛夜則痛甚行於陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕而積熱得發其血自行與氣相和其病兇



止或因澁藥取効性急作勞常享厚味感冒風雨腿腫則痛甚者  
瘀血流于經隧行久不治恐成偏枯以致腠腫筋縮大痛兩足無  
力脚弱漸細髀脛枯槁拘攣不能屈伸治宜祛風順氣補血壯筋  
養陰除濕則氣血通暢自然愈矣

大防風湯

人參一錢五分羌活

獨活

甘草

牛膝

白芍

熟地

白朮

防風三錢

黃芪

杜仲

川芎

各二錢

藜朮

一錢五分

附子

二錢

水二鍾姜三片棗肉二枚煎服飲好酒以助藥力

追風除濕圍藥

五倍

一兩

白芷

一兩

龜板

配炙一兩

當歸

一兩

防風

一兩

白朮

三兩

多年陳小粉

四兩

焦色炒

乾姜

一兩

官桂

一兩

烏藥

一兩

乳香

一兩

右爲細末用老姜汁醃醋各半葱汁一分蜜少許火上熬熟調藥

乘通手搽四向空中出毒時用餘活熱潤之以助藥力

# 四妙丸

蒼朮二兩

白芍

龜板好酒炙酥各二兩五錢

黃柏五錢酒洗

右爲細末酒糊丸如桐子大每服六七十丸當歸湯下酒亦可服  
寒加附子二錢

## 膝眼毒



此毒受在腎經膀胱不流氣血凝滯而濕熱攻於膝眼結成毒丸  
圍藥用鶴膝風藥敷之煎劑用木香流氣飲

當歸 蒼朮 白芍 白朮 白芷 川芎

木香 牛膝 木瓜 烏藥 澤泄 薄荷

紅花 五加皮 茯苓 葳靈仙

水二鍾姜七片葱白二根煎服 次服大防風湯方在前

眼方治膝腫

歸須 赤芍 桃仁 蒼朮各一錢

黃芩 連翹 羌活各五錢 木通 紅花 甘草各二分

黃柏七分 金銀藤二錢

一人痰濕流注膀胱紅腫如腫毒相似脉浮滑用前藥十二味加南

星牛膝龍胆草





人面瘡



此症生於兩膝之上形如人面口眼俱全患人飽則不動飢則口  
眼俱動俗呼爲冤業瘡膝蓋之間然膝者筋之府屈伸不能而行  
則僕附筋將僵矣此係皮內堅硬之所且生疽瘡則裏先潰後膿  
皮膚攻作故成此形宜作善事解之須要真誠懺悔然後方可用  
藥初用流氣飲久不愈者服苦參丸補腎水再用猪蹄藥湯洗之

以生肌定痛散摻之後用膏藥貼上

流氣飲

苦參丸

方貝癩疽圖後

又方摻藥

貝母末用竹筒吹入瘡口內數日成痂而愈

疔疽 骨槽疽



脚手發背



疔疽腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知其因成膿在內一特  
 不能出皮膚須用內托發出方可用針刺破骨槽疽生于膝蓋  
 並脚踏上腕其痛時如刀割其痒似蟲鑽急用艾灸疽上三五壯  
 便貼乳香萬應膏更服黃凡丸  
 治法同附骨疽



此症因心經有熱行履高低傷于足跌血聚成疽治法同冷漏

毒流注

仰吟流氣飲 治足上

川芎

麻黃

甘草

肉桂

乾姜

半夏

茯苓

枳殼

白芷

厚朴

芍藥

陳皮

蒼朮

姜三片水煎服

木瓜板榔散 治足上

板榔

木瓜

紫蘇

陳皮

甘草

木香

當歸

赤芍

再服蠟凡丸

羌活散 治手上

羌活

獨活

前胡

荆芥

甘草

烏藥

桔梗

薄桂

升麻

當歸

葳靈仙



骨痠疽



毒好之 手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可忍漸長大  
 如力傷之壯血不出亦不生膿毒從經絡流於遍身有此疾者宜  
 當 不可視為輕疾昔日山東唐世民感此醫者云此疽生為  
 奇相恐是惡毒世民笑而言曰吾乃識字人天賜與吾為筆架後  
 及一月遍身攻串其疽只口內出臭黃血水三五碗出水不至十

口其亡矣後待洗浴停屍衆人持起遍體俱爛皮肉盡落今有此疾各宜仔細推情施治之宜用治疔之法加減行之

脚拐毒



此毒受在腎通於陽明筋聚之處疼痛傷心成毒也當用膝眼毒跟疽毒及鶴膝風藥治之

骨 疽 瘡



且骨疽瘡之發皆由血凝氣滯徹骨酸疼或房事過勞或乘虛入水感風合寒或風毒邪熱侵乎榮衛或憂入傷于心肝膽腎經或飲醇醪燒酒煎炒炙博等物或遠行又傷於酒色白然腫痛日久成膿初起宜灸百壯以骨熱為度久宜用銀火針破之血膿元氣盛易愈白膿氣弱難愈治法以獨活寄生湯兼服十全大補湯備

加茅山蒼朮新昌百朮及肉桂乾姜人參黃芪當歸爲先鋒之藥  
劑繼以霹靂靈應散治之無不愈者肉桂乾姜白芷防風蒼朮烏  
藥龜板酥炙五倍多年陳小粉炒黑各等分爲末射香少許和勻  
老姜汁五合醋三合葱半觔和蜜一兩同搗取汁火上熬滾取熟  
調藥擦患處四向空中出毒氣時用餘汁煎熱潤之以助藥力少  
勞戒氣絕欲除想十旬方愈若病人不遵從醫師之訓任一已見  
恣情傲物憂慮萬端不能制六氣七情之私雖天醫院靈官亦不  
能治而況中醫乎噫恬淡虛無病安從來心有佛人諸病生焉寔  
此之謂也凡患病者宜自修省恐懼洒落坦夷指曰可愈何須多  
服藥餌耗傷元氣並免饋送于良醫不亦善乎

治法與附骨疽治之亦同



眼 疳

一名牛蘭蚕 一名土栗



此毒生於脚跟之上因行動高下肭傷故生此疳形如琉璃色無  
膿惟有紫色便不可刺破先用金箍散或鉄箍散敷之避風戒色  
不宜行動先服蠲毒流氣飲後服除濕木瓜湯

蒼朮

白朮

茯苓

甘草

木瓜

薄桂



鞋帶瘡腳心毒



澤泄 薏苡仁 柴胡 青皮 蟬脫 當歸  
 白芍 生地 烏藥 牛膝 黃栢 知母  
 防風 痛加香乳 如虛加人參黃芪 冬加附子  
 待其將潰用針挑破出膿水貼金絲紫金二膏藥

鞋帶瘡受在寒濕足陽明為毒氣血相聚而成上當用定痛流氣  
飲治之

板榔散

紫蘇

枳殼

厚朴

甘草

芍藥

陳皮

青皮

腹皮

香附

板榔

防風

姜三片棗一枚煎服

脚心毒受在腎心經在脚心是為濕毒也乃名脚心癰當服定痛  
流氣飲並板榔丸治之

定痛流氣飲

人參

桔梗

芍藥

枳殼

烏藥

當歸

川芎

茯苓

白芷

甘草

乳香

黃芪



血風瘡

此瘡因婦人經血不調或二月兩次或過經不來以此血氣滯入足陽明經故生此瘡宜用木香流氣飲五積散

隔紙膏

黃柏蜜炙

飛丹各二錢

輕粉一錢

面粉一錢

錢

洞油調作隔紙膏貼之

又方

黃柏蜜炙

黃丹

蜜蛇僧 蘆會各一錢

錢



船底灰二錢

輕粉

樟冰

孩兒茶

五倍錢

右為細末清油調搽痛加乳香臭加射香浸淫加青黛  
又方 輕粉黃連黃栢飛丹五倍枯凡各等分

# 風疔瘡



且風疔者經連脾胃絡足陽明經寒濕相搏風毒交接客于谷道  
之間注于承山之側初生癰痂破有黃水浸淫成瘡攻于遍體或

麻木而破裂治法同前其中加減之法難以指明宜推類消息之  
如聖膏治一切風痞疥癬痒痛終年不效

麻油八兩 巴豆三錢 當歸五錢 輕粉二錢 黃蠟三兩

右為細末先將清油鍋內熬次入巴豆當歸末後下輕粉黃蠟搽  
患上治法與脚拐毒方同

# 腎氣遊風



腎氣遊走毒在脚肚受在膀胱經氣冷傷腎之實復在膀胱此乃風毒也當用紫蘇流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇

桔梗

厚朴

甘草

白芷

陳皮

檳榔

香附

腹皮

姜三棗

檳榔丸

檳榔

二兩枳殼

二兩大黃

四兩木瓜

兩半木香

一兩為末煉蜜丸如桐

子大每三十九丸空心任意送下用鐵箍敷之

裏外癩瘡



醫易經念全書

三

南京中醫藥大學圖書館藏

南京中醫藥大學圖書館藏

南京中醫藥大學圖書館藏

三里之傍陰交之側生之者因腎經寒氣攻于下焦內因風邪之所攻外有冷氣之所搏或因撞損而致生此瘡漸然潰爛膿水不乾蓋因濕熱風毒相搏而致然也治方於後

紫蘇流氣飲

三香和氣飲

又方 輕粉

黃丹

黃連

當歸

白芷

生地

用火熬作隔紙膏貼之

又方 伏龍肝即灶心土

輕粉一錢

黃丹煨過

沒藥

滑石分一

孩兒茶一錢 絨灰一錢

鳳凰窠灰一錢

血竭二錢

右為細末乾摻 肉深加天靈蓋

臭加射香

隔紙膏方 自然銅五分

乳香

沒藥

血竭各一錢

黃蠟五錢

銅青五錢

細芽茶

八錢各另研為末

黃栢末


四兩先用生桐油四兩煎滾取





出先加栢末後加茶末待髮溫再細藥次加射香五分

飛遊毒



此毒因榮衛受其肌熱故生此疽赤腫走注不定用溫水洗患處  
用三稜針刺毒上二三十針或磁鋒砭之亦妙用拔毒散付之

毒散

乳香

黃栢

黃連

雄黃

末之雜之清調付乾用水潤之

解毒生宣湯

猪苓

澤泄

當歸

生地

白芍

防風

荊芥

木通

甘草

黃芩

枳殼

小柴胡

天花粉

白水煎乳母及子同服尤妙

紅 絲 瘡



夫紅絲者心腸積毒氣血相凝灌于經絡之間發於肌膚之上紅絲貫穿或如一紅線或疼或痒皆由風熱相乘而生如箭之速者行至心間即死急當頭以磁鋒刺破擠出毒血其紅絲之中再次之方絕其根急用當歸連翹解毒之劑治之須戒酒數日

消心解毒飲

當歸

生地

赤芍

川芎

升麻

乾葛

連翹

山梔

蟬脫

黃芩

防風

桔梗

羌活

木通

青皮

枳殼

玄參

天花粉



楊梅瘡一名廣東瘡一名黴瘡

黴音



此瘡皆臟腑之積毒脾家之濕熱其起也有三曰男子與生疔瘡  
婦人交感薰其毒氣而生或體虛氣弱偶遇生瘡之人穢氣入於  
腸胃而生或先患瘡之人在于客廁去後其毒氣尚淨下客人之  
中不知偶犯其毒氣薰入孔中漸至臙斯或在頭頂中或在不下

或糞門边先起有雄有雌雄者大如白果遍身生五六十或百十  
分棵不成片雌者小如豆瓣遍身連片濃汁淋漓深能累人嬰孩  
患此者皆父母胎中之毒也宜用汗藥宜用服藥宜用搽藥不可  
服丸劑恐內臟輕粉易愈故也但輕粉乃水銀昇也腐爛骨害  
不旋踵

### 汗法

用槐花半升揀去石灰枝梗鍋內炒焦下酒三升煎滾濾去渣乘  
熱飲之以衣覆身出汗爲妙

又汗藥

升麻

白芷

甘草

蒼朮

當歸

穿山甲

赤芍

羌活

獨活

防風

荆芥

大柴胡

麻黃

連翹

木通

薄桂

桔梗

金銀花 水酒各一鍾煎八分乘熱服之以衣覆身出汗為妙

前藥方 防風一錢 木瓜二錢 白蘇皮半錢 連翹 黃芩

金銀花各錢 皂莢子大 當歸 薏苡仁炒 川芎 白芍

熟地各八兩 升麻 甘草各三人參一錢 白朮一錢 顛頂加薑本

冷飯糲四兩水六碗煎至四碗濾去渣每藥一劑用汗二碗煎至

八分瘡在上食遠瘡在下食前瘡在遍身不拘時服忌茄子糟物

及牛肉茶葉此藥服四十劑方無後患

薰洗方 夏天一日一洗冬天兩日一洗

防風 芍藥 苦參 山梔 薄荷 金銀籐

蒼朮 黃柏 地榆 黃芩 連翹 蘄艾

骨皮 花粉 葶草各三錢 加鉛一觔 紫蘇一把 金銀籐三錢



水二斗煎至數沸去渣傾在浴盆內將板一片放在盆上坐之

下週圍以竹圈或芦蓆遮護之無風處拭乾滋水然後搽點藥

點藥

珍珠一錢 另研

杏仁五錢 去心

輕粉五錢 另研

射香三分

右四味和勻每用雄猪膽汁調勻搽入肌肉不見藥為效如有膿

水出再搽再搽

又方 鴨背膽礬為末水調塗之亦可

又方 水銀 輕粉和研

杏仁 風子肉

孩兒茶各另研

右各等分和勻在頭面者用雞胆在身者用猪胆在脚用狗胆汁

調搽

服藥久不愈下行藥

白蠟三錢 炒

全蝎七枚 酒洗 焙

當歸

白芷

川山甲炮各一錢



大黃四錢 末之五更空心蜜湯調下作丸酒亦可用行利數次

薄粥補之明日或再隔一日如前服則濕熱虫毒自消矣

### 輕粉毒方

此毒之發皆由起瘡之初求速愈而服輕粉故生此毒也發于四肢者易治發于頭面者難愈

人參一錢 當歸二錢 杜仲一錢五分 茯苓一兩 牛膝

赤芍一錢五分 黃柏 知母俱用鹽酒炒 防風 甘草

白蒺藜 加皮各一兩 白木 陳皮 羌活 麻黃

白芷各一兩 五錢 冷飯糲四兩煎服二法同前

年久輕粉毒 土茯苓五兩 當歸四兩 鉛一斤 川椒八兩

大酒二十觔文武火煮焚三枝官桂為度埋土中三日出火毒飲





輕粉毒膏 輕粉三錢 蘆甘石一兩火煨過 牡蠣一兩鹽泥裏

真紫豆粉二兩 焙乾右為末用生桐油調勻入磁盆中以艾火薰熟作

隔紙膏貼之兩日一換

梅瘡破碎摻藥

五倍一兩去中間白末出屑為 雞內金半錢

黃栢一兩去粗皮 血丹少許

冰片二分 大紅絨灰二錢

天靈蓋煨存性 右各研細末和勻摻之

梅瘡摻藥家貧不能辨藥者

大黃一兩 信三錢 俱為末和勻外用麵糰包前藥炭火煨熟內藥

如糕樣再用火炙乾研細末先用防風荆芥湯或搽清洗過然後

摻之黃水出即愈

斷根丸

龜板童便浸七日酥

槐花淨

樺皮燬 各等分為末蜜



丸酒下一方加水香

石痛不能行動 紫花地丁草

蜂房煨

乳香

沒藥

升麻

各三錢

爲末每用五錢酒調下

輕粉毒爛深不長肉

乳香三錢

血竭五分

孩兒茶

三錢

天靈蓋

煨二錢

末之加水片二分乾摻

廣瘡輕粉煮酒方

車前草

一束生用洗去泥

蕪黃蛇

一條去頭尾

生地

四兩

白蠟

二兩

歸尾

二兩

藁本

四兩

川芎

二兩

牛膝

四兩

白芷

稍一兩

羌活

五錢

白朮

四兩

甘草節

一斤或半斤

石楠藤

二斤微香長沙一分半一斤

防風

八兩

薏苡仁

四兩

槐花

四兩淨炒

鬱金

四兩

小紅棗

四十個

冷飯團

一斤

江西白

色者好用好葱三十根好火酒十五斤將藥切片各稱淮酒放瓶

內將藥入瓶內白綿紙數層又放竹葉縛緊瓶口不合出氣重湯



煮之放大米在瓶口上米熟方好取瓶埋也下去火毒酒冷了取酒面上白蠟用鉛一斤打成餅將前酒內藥渣取出晒乾其為一處為末糊丸如桐子大每服六七十丸酒送下

### 廣瘡膏

松香 一斤四兩 熬去查

杏仁 四百九十粒去皮尖

乳香 一兩

沒藥 一兩

銅綠 二兩

黃蠟 一兩

輕粉 一兩

蓖麻子 四百九十粒去皮淨肉

射香 三錢

將各藥為一處放栢內搗及千餘下栢頭上抹油不粘栢頭不許雞犬見之不緣矣膏用紅絹攤之絕妙



瘡

癬



夫癬之生也由於脾經濕熱及肺氣風毒所致或坐臥當風酷暑  
 潰水以致皮膚不仁遂成頑癬或如雲或如銅錢或如荷葉或長  
 或歪其形不一發于上者屬陽易治發于下部腠間豚腿屬陰難  
 愈年久者癬內濕熱所化有疥蟲極痒其名有六焉

一曰乾癬搔則出白屑索然雕枯如蟹瓜路之形

二曰濕癬搔則脂末浸淫如蟲在內極痒遇熱湯浴之其痒不可當

三曰風癬搔則痺頑不仁全不知痛痒皮膚如木

四曰其壯如牛癬之皮堅而厚竹片刮之覺有脂水出水出

五曰狗癬時作微痒白點相連

六曰力癬輪廓皆無如雲岩之氣運行無定

治法當清心火散肺風之藥服之

疎風滌火湯一半夏菜油拌炒升麻

甘草 薄荷 石菖蒲

生地黃 當歸 防風

荆芥 苦參 白朮

天花粉 白芍 桔梗

白芷 連翹 羌活

白蒺藜 黃芩酒拌炒

三味丸 苦參淨末八兩白蒺藜炒去灰淨末四兩皂莢一斤煎膏加煉蜜為



丸如桐子大每用二錢或酒或湯下

黑魚湯 用稀荻葉鋪在鍋底中間放魚不拘多少上以藥覆之

白木煮熟食魚肉并汗其葉取出晒乾磨末煉蜜丸服

搽藥 川槿皮兩白芩兩 剪草兩俱為末加巴豆肉十四粒

木髓肉四枚剉碎川椒末一兩河水調勻入竹罐中用銀簪攪子

餘下埋飯肉煮一滾每用少許搽之先以穿山甲刮損方可搽藥

疥瘡受白癩瘡 用小麥一升鍋內炒焦下水銀一兩攪和如星

取出為末用菜油調搽

又方 雄黃一錢 硫黃二錢 檳榔二錢 枯凡五分 為細末香油調搽

又方 枯凡 苦參 白芷 花椒 蛇床子

風子肉各 輕粉五錢 右為細末栢油為丸搽入肌內

又方

防風

荆芥

白芷

五倍

枯凡

鏡水

硫黃

輕粉

檳榔

右為末菜油調搽

清肌湯

半夏

菖蒲

苦參

胡麻

防風

何首烏

蒼朮

當歸

生地

乾姜

紅花

威靈仙

水煎服

清心瀉火丸

蒼耳草葉二兩

當歸

天麻

苦參六兩

薄荷葉

荆芥各二兩防風

黃連

蟬脫

右為末酒糊丸每七十丸白湯送下

又方 何首烏艾各等分煎湯洗之

有掌散


檳榔五分 硫黃五錢 面粉五分

各為細末和勻每用

少許香油調夜臥時塗外各囊不可洗手但揩擦乾三日即愈



# 雀子班



雀子班者出於肺經或母受胎之際不守禁忌因夫醉酒當風行房感集邪氣况肺爲五臟之蓋故肺風發外而成雀子班也宜用驅風換肌膏治之 肥皂二斤 甘松二兩 三柰一兩 牙皂二兩

輕粉五錢 白芷二兩 薄荷二兩 天花粉兩 檀末二兩 細辛二兩

乾葛二兩 草果一兩 防風一兩 獨活一兩



右爲末成丸每早洗面用之再用玉面桃花粉

玉面桃花粉

曰其末分

射香分二

杏仁三錢研如泥

輕粉一錢

面粉二錢

冰片分二

用雞子白調勻每少許細細搽

筋瘤不治

夾痲田不治

發背瘤治

粉瘤可治

血瘤不治

筋瘤治

疔治

粉瘤

兩面顏粉筋瘤

瘡治

肘背瘤治

乳瘤不治

養身易經論

卷之三

三

南京中医药大学图书馆藏



消瘤方

蕎麥

燒灰半碗

灰料

燒灰半碗

風化石灰

一碗

同和

一處

淋針三

碗熬成膏後用木鱉一二枚巴豆五六十粒二仲去殼去油胡椒

四十九粒各研細爛再和研細入灰汁內再熬成膏入罐內蠟紙

封之如用時不分大小用藥點于瘤上其藥自至根再上候茶濕

色須臾間其瘤皆黑色不須再搽二三日其瘤乾枯自有瘡口用

紫金散敷之

紫金散

黃丹

一錢五分

輕粉

二錢五分

為末乾摻瘡口

藥線繫瘤法

先用芫花根洗淨帶濕不犯鐵器搗取汁用生絲線一條浸汁中

一宿以線繫瘤上一夜即落不過二次將龍骨細茶阿子末三味

付瘡口如無根以芫花煎濃汁浸之亦妙下部痔亦可用

痰瘤煎藥

升麻

鼠粘子

連翹

柴胡

昆布

黃芩

陳皮

半夏

茯苓

甘草

桔梗

時以白湯擦瘤上甚妙

大麻風毒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

治麻風毒用胡麻散

胡麻子十二兩 苦參 荆芥

白疾藜炒八兩 防風 菊花

甘草八兩 右為細末用好酒

日午半夜服之

白花蛇丸 白花蛇一條酒浸三夕

白附子 天麻 牛膝各

當歸酒浸一兩 何首烏二兩

疆蚕炒一兩 威靈仙二兩 羌活

獨活 防風 草薺 蔓荊子 苦參各一兩 甘草七錢

石菖蒲二兩 蟬殼一兩 白芍四兩 川芎一兩 蒼耳草四兩 雷丸三兩

赤芍一兩 風子肉三兩 枳殼一兩 雄黃五錢 皂角三兩 烏藥

右為細末蜜煉丸如桐子大每五十丸空心好酒送下

蕪荑酒 治久患枯癩三十年癩者林及諸惡風肩毛脫落



生地 獨活 丹參 白附 甘遂 二兩 赤脂 二兩

乾姜 蕪荑 麥冬 莞花 蘇子 一兩 栝子 仁

薤蓉 枝神 金牙 薯蕷 白朮 蔓荊子

杜仲 石楠 白芷 人參 烏頭 山茱萸

狼毒 川椒 防風 細辛 牛膝 寒水石

麻黃 當歸 柴胡 烏藥 牡礪 枸杞子

桔梗 狗脊 天雄 石斛 桂心

右計四十一味以酒二斗浸夏三日春秋六日冬九日合用

秦芫散 治手足痠疼皮膚一身盡痛眉毛脫落耳聾身濕痒

秦芫 川椒 人參 茯苓 牡礪 細辛

麻黃 瓜蒌 訖麥 白附子 白朮 桔梗



桂心

獨活

當歸

黃芩

柴胡

牛膝

天雄

石楠

杜仲

莽草

烏頭

甘草

川芎

防風

酒浸服之

又方

治眉毛脫落生髮

白芷

附子

防風

川芎

莽草

辛荑

細辛

當歸

川椒

大黃

猪膏三升

荆子

馬鬃膏五兩

大麻風論

人身中有八萬戶蟲共成人身無戶蟲則人身不成不立復有諸惡諸癩橫病諸風若生必害於人身也皆因喜怒不節坐臥濕地故為癩疾也宜服

黑白散

治大風麻癩眉毛脫落及療遍身生瘡遷延歲月猶如癩

倉真經

論

全書

卷之三

四



疥或如魚鱗其症不同痛痒不一若服百日眉毛再生仙效其癩

烏梢蛇四兩 白花蛇三兩將黑白二蛇用好酒浸一宿取出去皮骨用肉 何首烏

川烏一兩手切 草烏一兩同川烏用好麻油浸一宿取出油妙乾用 石葛蒲

荆芥 薄荷葉 白芍 木香 當歸 防風 白芷

天麻 羌活 獨活 甘草各一兩 大黃四錢生

自然銅三錢火燒赤色好醋淬七次另研細入用

如患人稟氣虛弱或遇中年將荆芥大黃羌活獨活薄荷各退一

半用 右二十味並製度為末每服一錢酒調服夏月冷冬月熱

服之一日三服午前茶清調服如能用一半末子打酒糊為丸每

服七丸至十丸加至十五丸茶清送下一日亦三服雙日服九子

雙日服末子按巢氏云風者十有九症為癩病有蟲者遷延年歲





多死余傳此方果爲應効可以全生洗浴除蟲法具述於後

淋洗浴湯法

治大麻風毒氣生瘡五蟲食肌痒痛如癩疥之類

如魚鱗之形赤黑癰疹瘡並皆治之

何首烏

苦參

荆芥

朴硝

右先用四味各剉四兩水四五碗煎沸却入雄黃白凡各五錢乳

末初入合煎二三十沸去滓淋瀝洗留滓再煎又加雄黃白凡末

共各一錢煎淋洗

末煎藥先用蠟脂同好麻油勻利用鵝毛掃遍身有瘡及膿血痒

甚處了部將藥湯同候少時其蟲聞香必出方用湯洗兼服煎藥

百日可愈如或有一切久遠年深風毒瘡者皆可服之

解風丸

荆芥穗

防風

白茯苓

苦參

胡麻子

薄荷



湯送下  
右各等分爲末皂莢水和爲丸一日服三四次用百沸湯或清飯

天泡瘡



此瘡之發不拘老幼受酷暑熱毒之氣蒸入肌肉初生一泡漸至遍體浸爛無休合家相染此症須要淨湯淋洗切勿以穢氣觸之內服清肌燥濕湯外用泥金刮毒膏

清肌燥濕湯

蒼朮

白朮

升麻

甘草

澤泄

木通

生地

白芍

苦參

黃柏

知母

黃芩

茯苓

枳殼

連翹

小柴胡

水二鍾姜三片棗肉二枚煎服

泥金刮毒膏

韭菜地上蚯蚓糞三錢

玄明粉二錢

滑石一錢

研細末用新汲井水調勻鵝毛潤患上兩三日然後再用擦洗淨將檳榔天花粉黃連黃柏末各一錢面粉四錢稍勻乾摻自愈

又方 白荷花貼之



冷 疔



夫冷疔者臟腑虛寒腠理毒惡腹中熱氣薰於肺而肺主皮毛故發于肌膚損傷榮衛乃有四疔之名血疔者風熱注于皮間紫疔



者赤暈行於時氣風疖者四肢於疥瘡之痒冷瘡者膿水長流不  
 得乾息若不早治日久深啞髓髓損傷元氣命必難保治法以消  
 風解毒活血除濕之劑為主並附搽藥于後

十神散

輕粉 三錢

松香 三錢

杏仁 三錢  
去皮尖

風子 三錢  
去毒

枯凡

栢末 三錢  
蜜炙

硫黃 二錢  
另研

飛丹 三錢  
煨水飛

面粉 三錢  
存性

雞內金 三錢  
煨存性

乾用桐油調搽入肌肉濕用乾搽

小兒癩瘡



醫易經論全書一八卷之三

兒

南京中医药大学图书馆

諸癩瘡  
松石 四兩  
川椒 二兩  
白凡 二兩  
輕粉 五錢

黃丹 五錢  
右為細末陳茶油調搽

如聖膏  
清油 八兩  
巴豆肉 三錢  
當歸 五錢  
輕粉 二錢

黃蠟 三兩  
右為末先將油鍋內次入巴豆歸末後下蠟溶收搽

頭耳面疔瘡  
枯凡  
松香  
黃丹  
輕粉

平底紅  
甘蕨灰  
五倍  
銅青  
各為末先用葱椒煎

湯洗淨  
乾擦或用菜油調和搽入肌肉見効

辣梨瘡  
先用黃蘗汁洗之醋湯亦可

皂莢 七莢  
洗淨柄乾火煨  
榆白皮 燒  
枯凡  
牛煙膏  
輕粉

銅青  
霜毒肉浸油調搽

又方  
諸小魚膽搗爛加生凡再搗搽瘡上入肌肉



又方 治一切風疔疥癬終年不効

輕粉 雞內金 銅青 檳榔 樟水 雀梅滕皮煨灰

名等分爲末擦入肌膚內

又方 剃去頭髮用糯米煮極爛搗碎泥頭上其蟲盡在糯米中

後脫落其髮日生方得除瘡此一妙法也

服酒製防風湯 防風 黃芩俱酒拌 升麻 甘草

蒼朮 金銀花 川芎 生地 當歸 白芷

連翹 鼠粘子

羊鬚瘡 五倍子和棗肉煨三錢 銅青一錢 枯凡二錢 輕粉二錢

松香二錢 羊須三錢煨灰如無 黃連一錢 樟水一錢 檳榔末

杏仁去尖 皮風子肉各三錢 有爲細末香油調付之



肩 疔 瘡

治小兒眉間瘡耳額瘡用射香散

射香散

香附一兩

銅青五錢

射香五分

右為細末用米泔洗淨瘡濕乾摻瘡乾用油調搽並治耳額牙疼  
治法宜在小兒癩之內





額疳瘡

凡治小兒鼻唇齲疳

此症受在心肝脾胃因食炙甘甜燂熱毒所

傷為瘡流滯皮處結成惡毒或有白風或有赤風此小兒之疾眉

瘡鼻唇牙齲先服牛黃清心丸次服敗毒流氣飲治之

如治牙口疳用米泔水漱淨用前喉科水片散內量加珠子銅青

枯凡齲音銀齒牙之根曰齲



南京中醫藥大學  
南京中醫藥大學圖書館藏

# 赤遊丹



小兒患此赤丹皆從母胎受蘊熱故發皮膚遊走不定但腹起于四肢收者輕四肢收於腹者重急治得生小兒赤遊丹固蘊熱所致卽胎毒也或母懷胎之時好食辛辣毒物沐浴熱湯冬天炭火以致熱氣入胎嗜慾無度或生下火烘衣裳或火烘牀褥以致熱毒內外交攻半歲上下無有不發者初起身體發熱然火視之其色

紅赤啼哭不止其光遊走不定發於四肢生發於腰腹者死急用碗鋒砭去其紫血自下而上則毒血流下不可逆砭急用乳香末雞子清調勻塗砭處時用芭蕉根汁塗之內服硃砂化毒丹生蜜調下再服紫金錠水磨汁下

拔毒濟生散

牛黃二分 珍珠五分 水片一分 鬱金如無蟬用姜黃

代之

犀角

錢二

辰砂

錢二

萊豆粉

錢二

蛤末

五分

或加化毒丹

生蜜蠶清調下若加粉草末尤妙

乳母流氣飲

歸須

赤芍

升麻

黃連

甘草

鼠粘子

連翹

生地

黃芩

薄荷

青皮

天花粉

木通

黃栢

檳榔

小柴胡

又方

露天客廁內糞清和水花珠搽之亦妙



又方 執蟾血塗之即愈

凡丹入於腹中飽悶臍凸體若燔炭倉公復生不能治矣

或遊丹發於頭者何以治之必須將患兒眠在牀上以脚根

磚一二塊以墜毒氣於頭以磁鋒砭之使毒氣毒血皆從頭頂而

出若乳母抱立在身砭下則毒氣順下遂壅咽喉必難生矣近觀

同道之友顛倒砭之不得其手法以害諸兒故不辭瑣瑣又明

之並附十月毒於後

一飛竈丹從頭頂腫起漸發紅腫頸頂俱浮眼睛紅色用生葱一束

搗爛取汁塗之又方以朴硝五錢雄黃末二錢和勻芭蕉根汁調

和用敗筆蘸汁潤之須令病者臥之將此汁自下潤至顛頂其毒

從百會穴出若隨下潤之則毒氣浸於咽喉亦難治者大人患此

從百會穴出若隨下潤之則毒氣浸於咽喉亦難治者大人患此

亦同治法

二舌竈丹從頭額腫痛用赤子豆末雞子清調付之前方亦妙  
三鬼火丹從面上起赤腫用伏龍肝末雞子清調付再用薑汁  
潤之益母草灰爲末醋調付之亦妙

四天火丹從背上起赤點用桑皮末羊脂調付之

五天竈丹從背上起赤腫黃色用柳樹枝燒灰爲末蜜調付之

六水丹兩脇虛腫用生鐵屑末或針砂或鏽丁末猪糞調塗

七胡次丹從臍上起黃腫用楫榔末米醋調付之

八野火丹從兩腳上起赤腫用乳香末羊脂調付之

九煙火丹亦從兩腳上起赤白點用猪槽下土麻油調搽

十胡漏丹從陰上起黃腫用漏處土羊脂調搽



又方 用芫花搗汁和水取汁同伏龍肝末塗潤之

小兒爛皮火丹 蓮蓬煨灰 面粉 伏龍肝 楨末和勻為末乾搽

凡小兒火丹或頭上起或背上起者俱用慎火草搗汁搽上鹹火草

又方 芊芊活隨處有之取汁搽之

並附小兒生下滿身無皮但是紅肉速以早稻米粉乾撲生皮方止

又方 以伏龍肝末雞子清調塗 土擊泥研末塗亦可

鼻痔 名息肉



鼻居面中爲一身之血運而鼻孔爲肺之竅其氣上通於腦下行於肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣盛一有阻滯諸病生焉鼻孔中息肉名曰鼻痔皆由六氣七情所感而成若生上入眼名曰鼻肉若生下入鼻中名曰息肉窒塞不通戒酒絕慾除燥燥戒憂愁內服煎劑外用點藥庶平復矣

通氣辛黃散

蔓本

羌活

防風

薄荷

白芍

辛黃

升麻

甘草

川芎

當歸

生地

黃芩

連翹

桔梗

白芷

黃連

麥冬

柴胡

山梔仁

水二鍾姜一片煎服

消痔散

蜜陀僧

錢一錢五分

白礬

一錢

煨法陀僧礬四邊信居其中放在新瓦上煨煙盡爲度入地下



夜出火毒取出加射香二分爲末吹入鼻孔內時用手指揉鼻上  
下三百度其藥味漸入痔易化水矣外用搜濕麩糰塞鼻孔使藥  
味上行一日三四次點之其藥磁磬收貯

又方

仰卧時用白葡汁滴入鼻孔中即消

雞內金

炙研末細如塵五錢

射香 三分

鴨嘴瞻礬 二錢

銅絲 二錢

枯礬 一錢

右各研極細和勻磁磬收貯以蠟固口勿令出氣臨用時點鼻中  
如前法夜間多點其息肉十日之內漸漸脫落或點藥揉鼻後  
出水不須憂慮此息肉所化也如不能盡脫用鑷子徐徐擺動取  
出亦可恐落後其根不能盡去再點藥四五日以絕其根凡點藥





務採之

附鼻不聞香臭通氣湯

羌活

獨活

蒼朮

防風

薄荷

荆芥

升麻

乾葛各一錢

甘草五分

川椒

白芷三分

冬天加麻黃一錢

水二鍾姜三片棗二枚葱白三寸煎

附酒齏鼻

四五年久藏糟茄露

調硫黃末塗之四日後即消連

仁細茶各半為末臨睡茶清送下三錢

附鼻衄

山梔燒灰為末吹鼻內

或田螺水滴入鼻內

耳鼻出血方

射香一分

沉香三分

白凡一錢

糯米五十粒

各為細末麵糊丸如豆大絲綿包之如鼻中出血塞於兩耳耳中

出血塞於兩鼻如左耳出血塞右鼻孔如右耳出血塞左鼻孔如



左鼻孔出血塞右耳孔如右鼻孔出血塞左耳孔即愈

煎藥二神湯耳鼻皆可服 生地

一兩

麥冬一兩

水煎服之

痔漏症並圖說附

凡痔有五卽牝痔牝痔腸痔脈痔血痔素問曰因而飽食筋脈橫解腸癆爲痔臟腑所發多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩胡椒辛辣炙燂醞酒禽獸異物任情醉飽既色不避嚴寒酷暑或久坐濕地恣意耽看久忍大便遂致陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃生五痔天道失常民心益肆今痔變成五五二十五類或左或右或內或外或狀如鼠竅形如櫻桃或膿或血或痛或癢或腫或骨久而不治斯成漏矣之法以涼血爲主徐徐取効切不可用砒霜毒藥亦不可輕易割取致成漏瘡又有肛門左右別有一竅出膿血

名曰漏瀉治之須以濕煖之劑補其內生肌之藥敷其外其皴  
 皮膚者易愈臍胸有損而致瘻者未易治也

甲子冬

十五類圖註

蓮子痔



狀如蓮子

通腸痔



其根生於  
 臟出糞門

氣一痔



感氣即下

漏痔



氣血衰敗  
 久勞瘡貳  
 不會洗淨

勾腸痔



其形遠

蓮花痔



形如蓮花



雞心痔



其形如雞

垂珠痔



其形垂

貫煉痔



穿而貫  
膿血

栗子痔



其形如栗

菱角痔



形如菱角

盤腸痔



盤腸而生

子母痔



一大一小

翻花痔



形如翻花

鼠奴痔



形如鼠

雙頭痔



右兩頭



洎腸痔



紫洎肛  
門者

血攻痔



卽血出

夫妻痔



一圓一長  
卽雌雄也

珊瑚痔



形如珊瑚

脫肛痔



肛門脫  
下痔漏

擔頭痔



其痔橫  
在肛門

三迷痔



有三味財  
迷色迷酒  
迷故多之

櫻桃痔



形如櫻

雌雄痔



酒色食毒  
不慎此門  
黑色



右諸壽名類不同其種則一何也皆由大腸傳道以成風熱深而  
腎虛為冷氣相攻飽食猪雞魚膾燒酒醞酒生酒辛辣等味或  
則臟虛為風邪所襲六氣七情所感人生素不能飲酒亦患房  
臟虛故也亦有父子相傳者母血父精而成腸風者血痔之漸也  
速服涼血補劑少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

治製粘藥法

信一兩

白凡三兩

飛丹五錢

硃砂五錢  
臨時生用

巴豆五粒  
去殼

先將凡一兩半安於瓦盆中隨將信摻在凡上再將凡覆上火熬  
枯取出為末加珠砂末五錢和勻碾細末如塵先用魚腥草煎湯  
洗淨每引少許點上少頂黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草  
或茶藤花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯亦可



金用藥開於後

護肉藥 鬱金五分 黃連五錢 白芨三錢

右為末用蜜水調稀先將此藥塗在痔四邊好肉上却用薄紙貼定固濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金秘方

用牡礪二兩煨過入地窖坑埋之去火氣為細末痔漏瘡者濕乾摻甚乾以律調搽痔上

又秘方 砒霜白色明淨者五錢

草烏頭二錢為末 骨去皮生用

白礬一兩二錢淨者 黃丹六錢水飛過二次焙

蝎稍上焙乾

右件用舊鐵拍或熟鐵鈹先將炭燒鐵鈹透紅放冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒冷滾沸將碎砒投礬內拌勻以文武火煨



旋旋攪入草烏蠟稍黃丹同研不收放新小瓶內如用先將痔漏  
 以甘草湯或葱湯洗淨將生麻油調藥少許以鴨翎掃藥在痔漏  
 上日三次第一日第二日瘡內必出黃水如膠其痔漸消若瘡深  
 淺就將薄綿紙裹瘡駿三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙擦  
 之藥插入漏內其藥紙燃久不取出如換藥紙燃方取出再換新  
 藥紙燃入漏內日三次蚤于晚用藥俱要洗淨漏用藥三五日  
 痔漏頭併瘡口俱黑色然後不用紙擦藥其漏瘡根自落如漏不  
 入內上用藥點搽如瘡紅活平復不收口一用生肌散藥敷之  
 立愈其瘡根永不再發矣

生肌長肉藥

血竭 五錢

龍骨 五錢

青粉 二兩

白芷 五錢

黃丹 三錢  
水飛炒

石膏 五錢

黃連 五錢

海螵蛸 一錢



黃柏一兩 五倍子一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾摻入內生肌平腹不用

點痔藥

冰片

乳香

沒藥

龍膽

俱爲末用鍋牛一枚碎其底入前四末放盞內化水以銀簪滴汁痔上甚効 田螺代之亦可

痔漏藥

用銅杓內制牛黃末一分先炒微煙卽下礮末二錢候煙起再下白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒煨安地上出火毒爲末後入乳香辰砂末藥冰片各一錢共爲極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量深淺短長用之如瘡孔爛大止用津唾調



之填入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡卽以五黃膏  
外如入錠時仍用唾調煎末藥付在痔根上如痔根脫落移生  
散並多服蠟礬丸

生肌散

龍骨煨

海螵蛸

赤石脂各一錢

乳香

沒藥

血竭

輕粉

雄黃各五分

小鼠末出毛一枚炙乾

各爲末如塵臨用加水片少許

又生肌散

寒水石煨一錢

龍骨煨五錢

乾胭脂三分

輕粉

爲細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡倍此

辰砂錠子

从痔成漏

信一錢

白凡二錢

蜜陀僧五分

辰砂五分

先研信細入磁盆中次用凡銀信上煙盡爲度再將

蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頑漏納瘡口腐去腹肉



方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石一錢

枯凡五分

白乾姜五分

草烏尖三枚

右為末葱汗調敷

痔腫者 用殼木鱉五倍為末蜜水調敷

諸痔 用螻蛄五枚搗碎水銀一錢射香三厘冰片五厘用銀簪

蘸汁滴患上

痔漏 用團魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰為末血

為丸如棗核大涼痔之大小為之入內

漏孔不合



用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯通手就將漏洗淨後將草  
面前牙齒四枚裝在小瓶內用木屑燃之待白煙出為度取出  
末用津液蘸牙末點入漏孔處出黃水為効 黃牛牙齒散製  
備用

益氣清臟湯

人參

當歸

條芩 大

黃連

生地

赤芍藥

槐角

川芎

升麻

枳殼 寬

秦艽

白朮

茯苓

甘草

水二鍾姜一片燈心二十根煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽 一錢 當歸 一錢

澤泄

防風 各三

蒼朮 五分

桃仁 一錢

檳榔末 五分

大黃 一錢

雖大便燥亦不宜多

皂莢 燒存

皮一錢

黃柏 五分

若大腸頭沉重者濕勝也更加之  
天氣大熱或燥熱喜冷者以意加之



右用桃仁槌皂二末另外餘作一服水煎去渣加三味末調勻  
上火煎一二沸空心服之再食美膳壓之不犯惡氣忌生冷  
桃李梅杏菓品油麵大科生薑胡椒之類第二服加煎如本各末  
三分

秦充防風湯 痔漏每曰大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也

秦充 歸身 防風 白朮 陳皮  
錢各一 錢半 黃栢五分

大黃 煨各三分 粉草 澤泄 各六分 紅花 一錢 桃仁 三十枚

右作一服水煎空心服

秦充活湯 痔漏成塊下垂疣瘡不任其痒惟雞心垂珠栗子雙

頭子母夫妻櫻桃下垂等痔

秦充 黃芪 各一錢 升麻 大柴胡 甘草 麻黃 各五分

菴活二錢 細辛 菴本 紅花各三分 防風七分

秦朮當歸湯 痔漏大便結燥疼痛

枳殼 當歸各一錢 桃仁二十枚 紅花三分 大黃四錢

澤瀉 白朮 皂角仁各五分 白朮煎

當歸郁李仁湯 痔漏大便硬澀大腸下垂多血苦痛不住

皂莢子另末 郁李仁 麻子仁各一錢 秦朮一錢 蒼朮

當歸 生地各五分 枳實七分 澤瀉 大黃各二錢

水二鍾煎成加皂莢子末切不可在風寒處大小便

紅花桃仁湯 痔漏如勾腸蓮花菱角翻花珊瑚盤腸等痔年久不

愈治法當補北方瀉中央

生地 當歸 紅花 防風 猪苓各三分 茯苓六分



澤瀉六分 麻黃二分 黃栢一錢五分 木香二分

槐角子湯

外痔併漏根帶落下然後服此藥除腹內之毒

白水煎

槐角子

枳殼

黃芪

黃連各五錢

薄荷二錢

右咬咀作二服水二鍾煎至八分空心服

木香散

用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子

木通

車前子各三錢

淡竹葉

生地黄

黃芩三錢

燈心三十根

右咬咀每服四錢水一鍾半煎

七分空心服

又方

痔點藥之後悉毒去盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至

三分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

蒼朮澤瀉丸

飲酒食熱物脾主大熱而助三焦氣盛火生上也當

瀉三焦若火熱退金得氣而反制木若木受制則五壘不生矣



蒼朮四兩 去皮地榆

皂莢子各一兩 燒存性

澤瀉

枳實

秦朮各二兩

末之搗飯丸每服五十丸温酒米飲任下一方去蒼朮加有木

秦朮白朮丸

痔漏有膿血大便結燥腫硬疼痛

歸尾

枳實

澤瀉

白朮各五錢

秦朮

桃仁

皂角仁燒存性 各一兩

地榆三兩

末之和

桃仁泥煉蜜丸每百丸鹽湯下乾物壓之

槐角丸

槐角去梗爲末入烏牛膽肉掛透風處爲末煉蜜丸每服

四十九丸平胃散作湯下

腸風痔漏下血臧毒

大黃煨

桃仁各三錢

當歸

枳榔

皂角仁

黃栢





荆芥

枳殼各五錢

蝟皮炙

黃連

秦朮

槐角各一兩

末之麵糊丸每五十丸食前白湯下鮮血下者加棕毛蓮蓬灰

大腸內結燥疼痛

秦朮

枳殼緊少者各一兩

桃仁四錢

皂角仁七錢

紅花三錢

澤泄

白朮

黃柏

黃連

防風

當歸各五錢

大黃四錢

末之麵糊丸每六十九丸白湯下

黃蠟丸

黃蠟四兩丸

如桐子大月朔服一丸次日服二丸三日服

三丸漸加至月盡三十丸

後每日減一丸至一丸止用酒送下

輪流服之其瘡自痊一則不必服

潤腸丸

當歸五錢

枳殼五錢

百草一兩

大黃五錢

包煨紙

右為細末糊丸桐子大每服三十丸白湯下



已破末破痔漏方

當歸酒浸二宿晒乾火焙

槐角子炒麩皮

蝟皮炒黃

地骨皮淨晒

右為末各等分每服三錢五分空心溫米湯調五更服之後晝  
一二刻少進米粥但宜乾餅一塊少言語自早坐至午怡情適性

方愈

一方 用青荷葉燒灰為末空心酒下三錢

又方 用金銀藤並花為末每日酒下三錢

療痔神方 橡子粉 糯米粉各二升為末炒黃

每用二合滾湯調成餅飯上蒸熟空心食之

壯氣收腸方 治翻花內痔痔頭落腸不收服此藥外痔不用

黃芪 白芷 防風 厚朴 當歸各一兩 川芎一兩



蔓荊子一兩 桔梗一兩 木香一兩 人參三錢 肉桂五錢

右為細末每服三錢 空心棗子湯調下日進三服力壯其湯

猪肚膏 用雄猪一枚 去垢淨入皂角刺一兩縛定兩

藥空心任意喫又不 可用鹽醬服三肚後即除根

一人患痔每日食海 螺螯半升因鹹以苦茶嗽口約及二升

清心寡慾痔即消矣 痔乃臟火屬陽海螯乃性寒味鹹屬陰寒能

敵火鹹能軟堅茶又 苦涼之味要又論之始有理也

小兒生痔空心服甘 草膏自愈

孫真入射香膏 射香二分 乳香三分 血竭四分

右為一處以小紅棗 煮去皮核肉和藥作餅依痔大小放痔上用

膏藥貼之痔內血水 黃膠水流出此痔患之毒也一二次即愈



丹溪先生治漏瘡先用補藥以生氣血參芪歸朮爲主大劑服之  
乃王道平平之劑外以附子末津液作餅如錢厚放漏處  
令微熱不可令痛餅乾再易之其餅隨症大小爲之如因倦  
明日再灸以肉平爲度仍前服補藥搽生肌長肉藥

### 薰痔方

用大雄雞宰出血在湯鍋內搏去毛取出雞將此搏毛垢湯燒  
二沸傾在淨桶內蓋定其氣少頃將陽物放桶上坐薰之候湯  
溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和稔成條放馬桶內  
坐薰之其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈  
加蜈蚣並艾薰後隨服益氣臟湯秦丸蒼朮湯調治之

### 洗痔方

馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐薰候湯溫洗之



又方 牛膝搗爛煎湯洗之 紅花子打碎煎湯洗之

又方 魚腥草煎湯洗之 白地松煎湯洗之

流痔國老湯 荆芥一兩 甘草一兩 藿香五錢

右不拘多少煎湯温洗洗一次用藥一次用藥之後如大便閉塞

用此外痔不用

又方 皮硝 鳳尾草 五倍子 葑萊子分等

水一桶煎數沸放桶內坐之薰洗

### 脫肛痔

肺與大腸相為表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之惟温補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣



血虛脫肛以四物湯爲主氣虛脫肛以參芪歸朮爲主血熱以涼  
血爲主四物湯加黃柏

摻藥

乳香五分

沒藥三分

血竭一錢

紅絨版五分

牛黃五分

冰片二分

珍珠三分

孩兒茶一分

象皮灰五分

昇藥三分

五倍二分

右爲極細末用後藥湯洗淨乾摻

須要避風

大人小兒摻藥

赤石脂

伏龍肝

各一兩

爲末付腸頭上日三次

升元大補湯

人參三錢

升麻五錢

白芍藥一錢

歸頭二錢

生地

一錢姜汁煮

黃芪三錢

黃精

知母

各一錢俱酒製

粉草

五分炙

山藥一錢

防風

一錢

肉桂

五分

附子七分



紅花六分 右作一服水二鍾姜五片棗肉二枚煎服川芎不用

因泄氣故止之 虛甚倍加參芪歸麻

虛人脫肛補中益氣湯

加黃栢知母蒼朮黃芩肛門痒加秦艽桃仁大便閉塞加枳實  
冬至前天道嚴寒其氣極況極降之際况人身小天地大  
居中地在下豈不相應乎治之不能即奏功也陽生後日長  
陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不効者病人一要戒氣少勞  
爲上策擇精明和暖吉日在不通風淨暖室中坐臥取頂上旋毛  
中百會爲以醬一七擦上艾炙三壯隨服升元大補湯其肛漸收  
矣蓋百會爲一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至  
前不可灸灸之何益次日再灸尾翳骨又灸臍中隨年壯此法余



用之甚効 諸痔漏亦治之

洗法 用生鐵五斤水二斗煎至五升出鐵洗之日三次明  
新鐵如前洗之

又方

枳殼

朴硝

川芎

當歸

桑椹

艾葉 略一 地榆

蒼朮

右煎湯洗之

但肛門收上十有一二須服補劑調攝之其餘者漸漸乾已  
偶偶喜樂之事忽然脫落一黑圈境此腸有餘乃截腸也

瘡瘍經驗全書卷之三

