


医案说约

庚辰之序  
1662年  
炳大學醫科系藏  
下祖望藏



光緒辛丑年重鐫

醫  
學  
宗  
說  
約

益元堂梓

醫宗說約易簡序

神農本草黃帝素問醫道所自肇也察  
寒溫而軫實鈞深探微其難其慎蓋醫  
者意之所之而人之死生係焉昔人所  
以等良醫於良相甚矣醫道之不容忽  
也每見古人立方君臣佐使溫涼補瀉  
之間若出人意表而妙在彀中猶夫品

律準繩出於自然之理非可意見叅也  
自南北方劑判爲二塗有斗火壺冰之  
喻使人疑成方之難合古方克棟而人  
罕究心肯堂王氏研精歧黃所著證治  
準繩鬱乎大觀而又類方數十卷可謂  
取無盡而用不竭矣乃後學望洋向長  
安而西笑求登堂入室者鮮矣粗識寒

溫之性畧辨浮沉之理輒思輕投奇中  
漫曰醫者意也等人命於鴻毛視醫學  
爲兒戲東坡所謂學醫費人良足歎息  
姑蘇仲芳蔣君本望族與予家世年誼  
棄儒學醫乃飲人上池杏輒成林也醫  
聲籍甚近乃得其所著說約讀之知其  
積學之久用心之深効不誣而名不虛

也說者論之定約者博之精神而明之  
變而通之豈惟王氏之學得蔣君而薪  
傳卽素問本草諸書有疏述爲羽翼無  
復斗火壺冰之歎其功豈出良相下哉  
予且拭目望之矣

康熙元年壬寅虞山錢朝鼎撰

醫宗說約自序

余年十二先母周夫人見背先君子君輔公杜門讀書道義自許口不道阿堵字以故家貧甚嘗寄食于佩舅氏家舅氏撫教有加焉於時明發有懷因思生戚遑遑大病每於誦讀之暇閒覽方書先君子遂謂小子曰汝有意於此乎古人不得爲良相每願爲良醫蓋良相良醫其功正相等耳果能精之則可以自

療并可以療人亦內典所謂自利利他之道也予拜  
訓之下深謝不敏長而遭滄桑之變寄迹於穹窿之  
陽人有疾者按方加減與之所投輒效因而叩戶求  
方者殆無虛晷竊思古人陳案雖各臻其妙然論多  
方雜未易窺測不免楊朱之歎故於晨窓夕凡究心  
靈素博涉羣書斟酌盡善成山居述四卷有論有方  
有經有變頗備苦心俱力綿不克就梓久置皮闔今

年春偶公遜叔過齋頭見而閱之謂曰汝有此而不  
與人共之不亦同於懷寶迷邦者乎且汝先子之言  
具在顧其忘諸予益唯唯謝不敏長夏無事因於山  
居述中簡其要者爲主方隨症加減一症一方以見  
其常加減附論以通其變編爲俚句名曰說約庶幾  
學岐黃者得會歸之源去煩苦之失耳若曰從此活  
人功與調元者等則予豈敢

康熙二年夏四月古吳自了漢蔣示吉仲芳氏識

醫宗說約凡例

望色聞聲問症相形俱業醫之首事也。今摘靈素之奧旨。百案之微論。取其切要者。置於編首。人初學登高之自。

一脈法行世者多矣。備者繁多。簡者缺畧。寸候二腸。高陽招辨。今以內經脈法爲主。附以先賢確論。二十九象。主病分明。熟讀細玩。指下自能了然。

一醫之用藥。猶將之用兵也。不論兵法。何以定亂。不知藥性。何以攻疾。今取本草之切用者。刪繁去泛。編成歌訣。以便記誦。兼注炮製於下。臨用自無疑惑。

君臣佐使湯丸法製俱製方之要。標本先後上下虛實乃治病之機。今取先哲成言。并獨得之秘。附十三條于後。以便考焉。

一卷二卷。俱係雜症。上究靈素。下採百家。勾稽摘要。編成是訣。前設言病之源。病之狀。中段述病之主方。後段隨症加減。或一句一法。或二句四句一法。以盡寒熱虛實之變。其言淺。其意深。其詞簡。其法備。細心熟究。貫能活人。

主方中藥名用一字者。則註一字於旁。二字者註一△于側。以便初學。至于藥物分約去少。不可移易者。已註明于下。或

可等分。或可隨病君臣隨意加減者。不敢先爲拘定。隨司命變通之也。

一條中方名。古人名用。一病用口。藥名用△。一段用上。以便記識。

一傷寒論。惟漢張長沙爲鼻祖。三百九十七法。一百一十三方。名曰活人書。頗費記誦。迨後節菴陶華提綱與領集方四十。各曰殺車椎法。人稱其便。亦半簡畧。今讀仲景之書。勾其精要。編賦二章。以節菴之方補其未備。約其六十。熟讀會通。自  
有補耳。

一小兒病名曰啞科。以其口不能言也。惟恃望色相形。觀紋中脈以知其臟腑之病。誠非易事。今以先哲察病等法編爲歌括。更得名家秘方條附于後。治幼者宜預爲修合。莫待臨渴鑿井。

一女科雜症與男子同也。所異者惟胎前產後調經種子崩帶乳疾耳。今此數條宗古人書採專科法并獨得秘編訣貝陳使學者知所宗。不致望洋而嘆。

一瘍家經絡表裏陰陽。古人言之詳且盡矣。醫者每以癰疽形象外見秘方可効。而忽之。遂至實實虛虛。禍不旋踵。冷以經

絡部分陰陽。善惡腫瘍潰瘍補瀉之法。總成一賦。其外治升丹降丹等方。起死回生。本不輕傳。其如濟人心急。不得不公諸同志。業瘍醫者。先爲條煉。庶不負一片婆心也。

讀古人書。如東垣升補。養正爲先。子和三法去邪爲急。河問火熱。丹溪濕痰。立齋溫補。各臻其妙。豈古人矛盾若是哉。蓋古人著書。議論非特見不傳。醫案非疑難不記。欲補前人所未補也。今之學者。讀是書。卽泥是說。往往有偏僻之弊。吁。人有南北。病有輕重。法有變更。豈一家言所能盡乎。此集總採古人之遺意。斟酌盡善。庶無偏僻之謬也。

醫言  
方例  
一醫自岐黃之神聖歷代之名醫。方書克棟精微玄奧。未易入門。是集也。病狀合。病脈病原合。病方變。何症而爲寒。兼何脈而爲熱。虛實有據。表裏無疑。一見了然。誠初學指南也。卽未詰醫者。一展卷。則脈症方治。虛實加減。燦然於目。亦可對症投藥矣。敢曰活人心切。聊爲濟衆者之一助也。高明其亮諸康熙元年中秋望日。虞山嚴燈文若氏識。

卷之四

張懷栢翠溪氏

山西

王正錫百朋氏

長洲

王盛鼎舜符氏

長洲

鄭林雲山氏

吳縣

沈頤朗仲氏

長洲

陳培養真氏

吳縣

吳德培羽仁氏

吳縣

沈嘉元方氏

嘉定

戈士儀用羽氏

吳縣

楊崇震叔起氏

吳縣

伍麟祥聞橋氏

長洲

吳樹滋如虹氏

長

毛鐘祥考生氏

吳縣

鄒嶧岱友氏

無錫

張玄宿樂天氏

太倉

葉朝采陽生氏

長洲

吳均以公氏

昆山

仇起元輔卿氏

吳縣

王弘度元坦氏

長洲

沈永澄文淵氏

吳江

吳士縉公紳氏

徽州

顧應選用霖氏

吳縣

趙士升序之氏

常熟

曹仙鍾英氏

吳縣

周揚俊禹載氏

嘉定

沈蓮子房氏

嘉定

吳玉富蒼嶼氏

長洲

許玉答天懷氏

無錫

湯哲愚谷氏

蘇州

周雲開杲氏

常州

王人鳳翔于氏

蘇州

范安宅如春氏

長洲

醫宗說約目次卷之一

望色 閱聲 問症

相形

頭

額

鼻

頤

耳

唇舌

內經分配臟腑脉法

內經三部臟腑圖

診法集要

六十條

脉象辨條

脉象主病

二十條

七絕脉法

藥性炮製歌

草部

一百三十九種

木部

五種

菜部

十種

人部

九種

禽獸部

十九種

魚蟲部

二十種

金石部

三十種

菓部

十八種

穀部

十一種

十八反歌

十九畏歌

君臣佐使法

製度引經法

服藥時候法

咬咀丸散合宜法

李時珍煎藥法

貴賤少長異法

病在

上而求諸下醫案

二條 痘在下而求諸上醫案

三條

虛中實實中

虛醫案

四條 治病須求其本

製方定見案

調攝得宜案

醫學全編  
雜症卷之二 中風 傷風 中寒 暑病 注夏 濕症

火症 內傷 傷食 調理脾胃 酒客病 五鬱 諸氣

痰症 咳嗽 喘急 哮症附治 瘟疾 霍亂 泄瀉 痢病

積聚 痰滿 嘔吐 噫膈反胃 呃逆 嘴氣 吞吐酸

餽雜 水腫 鼓脹 癪癥 失血吐血 衄血 咯血 尿血 欬血 咳血 呕

雜症卷之三 汗症 頭痛 心竊 腹痛 脇痛 腰痛

臂痛 背痛 痛風 眩暈 麻木 五痺 痰症 痘症

癲狂 驚悸 怔忡 健忘 虛煩 不寐 黃疸 斑疹

便濁 五淋 小便秘 大便秘 二便閉 脱肛 三消

夢遺 滑精 腳氣 七 積耳病 目病 鼻病

口舌病 牙齒病 咽喉症

傷寒科目次卷之四

傷寒賦

上下篇

太陽經

正傷寒

正傷風

陽明經

標炳本病  
自汗口渴

胃腑本實病

發斑  
譖語

癰黃

狂妄

少陽經

壞  
病

太陰症

腹滿

咽乾

頭汗發黃

自利不渴

吐衄  
奔脈

動氣

直中真寒

少陰經

厥陰經

兩感症

真陰症

逆結症

熱結  
膀胱

熱結

下利  
清水

三陽合症

自利腸垢  
膀熱

挾血症

鼻衄

瘀血

王焦  
熱

下焦蓄血

發斑

斑爛

陽極症

陰陽毒

陽厥

陰厥

剛柔症

陰格陽

如狂

過汗口渴

無陽

不能  
作汗

戴陽

水嗽

不欲  
嘔

撮空

及手當胸昏  
憊尋衣摸床

懊憹

下膿血

衄厥

狐惑

越經症 食積煩傷 脚氣類傷 挾痰 勞力傷寒 色復陰陽

寒

大頭傷寒

黃耳傷

易

百合癆後昏沉錯語勞復食復 晚發 大頭傷寒

黃耳傷

赤膈傷寒

二症俱胎前傷寒

產後傷寒

妊娠中寒

外治

法十七

辟瘟法

發汗止汗

吐法止吐

導法解火黃君

硝法

救陰寒法

去舌胎法

治鼻衄法

治陰

法呢逆法

裹結胸法

看斑法

治發狂法

治吐舌不收

法 大頭傷寒外治法

治咽喉痛腫法

小兒科女科目次卷之五

色診說

按眉端

面色

主病

虎口三關脉紋法

小兒脈法

心誠賦

虛實寒熱外感內

傷六症辨

初生調攝稀痘法

變症

胎熟胎寒

胎風

撮口急驚

慢驚

疳積

發熱

痧疹斑

嘔吐

泄瀉

暑症

痢疾

瘧疾

咳嗽

肺脹喘急

浮腫

黃疸

解顛通神散

瀉白丸

化毒丹

小牛黃丸

沉香末子

陳氏小紅丸

肥兒丸

紅燕丹

抱龍丸

蔣氏肥兒丸

玉樞丹

珍珠丹

雞肝藥

快活丸

夜啼方

吃泥上方

蟲痛方

遺尿方

治尿方

小便秘方

語遲方

齒遲方

龜胸方

灸法龜背方

炙法疝氣方

斷小兒乳法

牙疳口瘡

重舌木舌

頭面痘火

灸法丹毒方

眼痛方

耳痛流膿

鼻瘡方

頭瘡方

臍瘡方

小兒醫案六條

女科調經

先期

將來漏

經來不止

熱入血室

勞瘵經絕

帶下後

胎前諸症

惡阻

子懸

子淋

子癟

轉胞

子腫

子氣

胎水 船漏

胎動病

風寒頭痛

雜症

暑

濕泄

食傷

大便秘

催生

加味達

臨蓐

佛手散

冬月法

夏骨法

瘡疾

耳聾目暗

弄胎

試水

正產

子死腹中

交骨不開

瘡疾

音實

宿疾

胞衣不下

產門不閉

子宮不收

產後

音實

敗而痛

去血不止

血暈

薰

酸

冲胃

心音

躉勞

肉戰

中風

荳淋

法

大便結

泄瀉浮腫

食傷

嘔噦

胸脇痛

煩燥虛驚

不能言

飽悶

兒枕蒸乳

清源收帶方

軟溫飲

骨節痛

小產

固胎湯

陽金固丸

赤白

帶下

清源收帶方

乳疾

石乳

乳癰

乳漏

外吹

女子脈說

調經脈法

胎產脈法

癰癧七條

外科賦經絡氣血訣 二因病

半陰半陽訣

十惡症  
瘡瘍麻法

純陽症訣

純陰症訣

經絡部分

和禁得說

五善訣

七惡訣

壺寢辨

發表說

攻利說

抑陽散

抑陰散

和禁得說

艾灸法

藥灸辨

圓藥法

抑陽散

桑枝炙法

調攝法

藥湯溻腫

和禁得說

七日治法

十四日後治法

拔針法

藥筒吸毒法

和禁得說

宜針格說

火針法

敗症惡候

和禁得說

桑枝炙法

調攝法

和禁得說

腫瘍主治法

荆黃敗毒散

萬靈丹

內托復煎湯

四妙湯

內疎黃連湯

衛生湯

當歸黃芪湯

神仙活命飲

瓜萎托裏湯

復生散

蠟礬丸

回陽三建湯

潰瘍主治法

十全大補湯

加減法五十二條

托裏溫中湯

金匱腎氣丸

附六味八味丸方

白降丹

圍藥神應丹

神燈照法

金黃散

猪蹄湯洗法

鐵桶膏

太乙膏

紅升丹

桃紅散

八寶丹

太素膏

神化丹

干槌膏

白玉膏

疔瘡 龍飛奪命丹 立馬回疔丹

疔瘡單方四法  
紅絲症治法

瘰癧

潰堅湯

滋陰散堅湯

益氣養榮湯

桃蠅散

真人壁虎散

火針法○下疳

二靈丹

珍珠散

魚口便毒

山甲肉消散

通水丹

楊梅瘡

羊肉發藥

豬肉茯苓湯

胰子湯

仙遺糧湯

點洗法六條結毒

五寶丹

丹素丹

紫金丹

碧雲散

外治法一條○病

治痔良方

提肛散

熊胆散

汎痔黃消湯

藥線方

枯瘍方

○漏

推車客散

追毒丸

○瘰瘡

疖瘡

疖瘡丹

參聖丸

薰破法

黃赤丹

浮萍散件

燒瘡

外治法

三條

白赤癥風

鵝掌風

汗斑

杖瘡

金瘡

湯火瘡○損傷

和傷丹

活血丹

透骨丹

益母丹

活血丹

自終

望色

虞山元虛子嚴 煙文若氏較訂

經曰望其五色。以知其病。故望色者。活人之首事也。靈樞經曰。以五色命臟。青爲肝。赤爲心。白爲肺。黃爲脾。黑爲腎。內經云。五臟之氣色。見青如草茲者死。黃如枳實者死。黑如炁者死。赤如衃血者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。生于心。如以縞裹朱。生于肺。如以縞裹紅。生于肝。如以縞裹紺。生于脾。如以縞裹瓜蔞實。生于腎。如以縞裹紫。此五臟所生之外榮也。內經以一色之中。而分平病死三等。至

靈樞又分明臟腑部分及浮沉淺深。天澤散博等法。蓋以其道之不容忽也。予畧陳其要。天五色有光亮是也。五色有體潤澤是也。光者無形爲陽。陽主氣體者有象爲陰。陰主血氣。血俱亡其色。沉晦枯槁。經所謂草茲枳實。焰血枯骨。五者是也。氣血尚存其色光明潤澤。經所謂翠羽雞冠。蟹腹豕膏。烏羽。五者是也。此五色雖爲可生。終爲一臟之色獨亢。亢則害病也。非平也。蓋平人五臟既和。其一臟之色必待其旺而始榮于外。其榮於外也。稟胃氣而出于皮毛之間。胃氣色黃。皮毛色白。故云如縞裹。如縞裏者。朦朧光澤。雖有形影。猶未燦然。內因氣血無乖。陰陽不爭。五臟無偏勝故也。苟或不然。五臟衰敗。其見色也。昔

之勝臟者。一變而爲獨亢。昔之光明者。一變而爲沉澁。日之潤澤者。一變而爲枯槁。甚至沉濁枯槁。合而爲天。是光體俱無。陰陽氣血俱絕。不死又何待哉。六節臟象論曰。草生五色。五色之變。不可勝視。至于臟腑部分容色。上下淺深散搏等法。未能盡陳。容于望色金書中述之。

### 聞聲

經曰。聞而知之謂之聖。如辨音者。聽其聲。即可以知其物。雖非玄遠。誠非淺易。蓋不由音律之道造。必于靜定中得也。予姑以經書中要者言之。經曰。肝在音爲角。在声爲呼。心在音爲徵。在聲爲笑。脾在音爲宮。在声爲歌。肺在音爲商。在声爲哭。腎在音

爲羽在声爲呻口出無倫謔語也

有虛

無稽怒叫狂言也

實出

言壯厲先輕後重者外感也語言懶怯先重後輕者內傷也語

不接續鄭聲也無人始言獨語也

三症屬虛

鼻塞声重傷風也聲啞

唇瘡狐惑也卒口噤背反張痓症也

屬虛

鼻鼾語塞風溫也錯語呢

喃出言不正熱症也心下汨汨有声先渴後嘔停水也喉中濁

濁有声痰也腸若雷鳴氣不和湿也小兒驚風口不能言心热

也無還声爲鴉声死症也雜病發喘癆瘵声啞危病也已上種

種若能細察實能活人至于聞其五音以知其所苦是神聖之道在乎司命者之方寸耳

問症

示吉曰望聞切察病之四法也。望色聞聲切脉古人反復言之至于問而知之之謂王先哲尙未明發不無有疑焉。何以故

如至病家問其渴痢以知其渴痢。問其寒熱以知其寒熱則淺

矣。必非古人之意也。卽至病家問其病起于何日。日少爲新病

實症居多日多爲久病曾食何物。食冰而病藥用冰煎如傷內食

虛症居多。用草果山楂之類詳傷食本條曾有怒勞

房慾等事。怒則傷肝勞則內傷

及問初起何症。如初起口疼發

如初起心腹疼痛及後變何病。如痢變瀉變瘧爲輕瀉瀉變痢

渴痢等症俱屬內傷。爲重先喘後脹病在肺先脹後

渴病在脾先渴後。渴病在脾先渴後嘔爲停水之類。

今日渴思飲否。

口不渴內無熱也。口渴欲飲爲熟老人口乾不思飲主津

液少若漱水不欲嚥。喜熱喜冷否。喜熱內寒

口中淡苦否。苦熱

舌苔血上陰極發燥。喜冷內熱。

虛淡甘脾熱成。

思食否。傷食不思食雜症思食爲有

疳傷食口酸。

胃氣則生否則無胃氣則死

胸中寬否。

不寬傷食痰  
積氣滯之症。腹中有無痛處否。

無痛病不在內主虛有痛處主食積痰血之類有痛處手按則

減者

大小便如常否

小便秘結黃赤爲熱清白爲寒濁如米泔

爲虛

爲濕熱下陷大便秘爲實爲熱自利爲虛

暴瀉暴痢爲實久瀉久痢爲虛

虛下黃赤爲熱下清白爲寒

足冷煖否

足煖陽症足冷陰症乍

虛屬虛

如常屬虛

及平日勞逸喜怒憂思并喜食何物

勞則氣散逸則氣滯

肺思傷脾恐傷腎喜食厚味則生痰

醉酒則發熱

種種問法實爲活人之捷徑然以此

而盡古人問而知之之義尤未也

予於靜定之中若有所悟益

今人之病如咳嗽發熱瀉痢諸痛俱病之總名也

一症之中各有火有寒有痰有氣有虛有實致症之原不同如治咳嗽問得

有火症卽作火治有痰有氣症卽作痰氣治因此一問合病者

而治病原庶合古人之心也

昔丹溪翁名擅千古亦不過每症

分出寒熱虛實痰火氣等件。隨症調治此豈有異人之目。  
見臟腑者乎。亦惟問其症以知之也。予何人。斯敢叅末識。但願  
學岐黃者。見痰卽攻痰。見火卽治火。見食卽消食。莫爲病之總  
名所拘也。

相形

頭者諸陽之會也。頭重視身。名天柱骨倒元氣敗矣。因於濕首  
如裹。益至卑之邪。而犯至高之位。其象有物以裹其首也。又有  
頭搖頭眩。頭暉者。經所謂徇蒙招尤。目瞑耳聾也。益爲如有物  
以蒙其目。招搖尤甚。又兼瞑聾。是下實上虛之故。有痰有火。有虛有風。  
額。南方也。經曰。心熱病者。額先赤。若青黑色現。主有暴疾。

目肝之竅也。經曰：肝病者皆青脫陽者見鬼脫陰者目盲氣脫者目不明。陽氣盡陰氣盛，則目瞑。欲愈之病，目皆黃。目赤主熱，白睛黃主黃疸。眼胞腫主風。主濕，開目見人，病屬陽。閉目不見人，病屬陰。凡病目明，能識見者可治。若睛昏不認人，或目上視，或眼小目瞪直視，或目邪視，或目睛正圓，或戴眼反折，或眼胞陷下，皆死症也。若病人目睛微定，暫時稍動者，屬瘀宜吐。若目中不了了，大便不通者宜下。

氣者，肺之官也。肺病喘息鼻張。經曰：脾熱病者，鼻先亦甚。鼻色青者，腹中痛微黑者，有水氣。黃者，小便難。白者，爲氣虛。鮮紅有宿飲，鼻孔乾燥者，必切血。鼻燥如烟煤，屬陽毒熱極。鼻孔冷滑，

而黑屬陰。毒冷極。鼻燥息如鼾。睡屬風溫。鼻塞濁涕者。屬風熱。

鼻流清涕者。屬肺寒。鼻孔痔脹者。屬肺熱有風。

經曰。心病者。額赤。腎病者。額與顏黑黃。赤色出兩顴大如母指。主卒死。

肝熱病者。左頰先赤。肺熱病者。右頰先赤。

耳者。腎之竅也。經曰。耳焦枯。受塵垢病在骨。精脫者。耳聾耳問青脈起者。掣痛。足少陽經絡亦繞耳而入耳。故暴病而耳聾耳腫耳痛耳旁紅。皆屬少陽風熱。

經曰。唇舌者。肌肉之本也。肺不榮則肌肉軟。肌肉軟。則舌萎入中。滿人中。滿則唇反。唇反者。甲篤乙死。

經曰。足少陰氣絕。則骨肉不相親。而肉軟却齒長。而垢髮無潤。

澤戊篤已死。足厥陰氣絕唇青舌卷囊縮庚篤辛死。凡病

人舌乾口焦爲脾熱。焦而紅者吉。焦而黑者凶。唇口俱腫赤者是熱極。青黑者是寒極。口苦者是胆熱。口甜者是脾熱。口燥咽乾者腎熱。舌乾口燥者是心熱。口噤咬牙者是風痙。唇口生瘡聲啞者是狐惑。齒燥無津液是陽明熱極。前板齒燥脉虛者是中暑。唇口舌胎斷紋者難治。唇色白者主失血。主虛。唇口燥裂是脾熱。齒如熟齒者難治。若唇青舌卷。唇吻反青。環口黧黑。口張直氣口如魚口。唇口顫搖不止。氣出不返者死。

頸爲北方。腎水象也。經曰骨熱病者頸先赤。色赤又主腎與膀胱氣蒸熱結血小便不通。

舌心之苗也。經曰：心病者，舌短卷，觀赤少陰氣厥逆，走上則  
舌。凡見舌乾舌碎，舌裂主心火甚旺。總之，舌鮮紅濕滑者，苦燥  
滯者，凶。舌上白胎者，胸中有寒。丹田有熱，故胎白而滑。木入乎  
腑邪，在半表半裏間，法當和解。舌上黃胎者，必燥渴。胃腑有邪  
法當下之。舌上黑胎，燥生芒刺者，必燥渴亢極，則難治也。法當  
急下。若不燥渴，身不熱，舌上黑胎而滑者，屬陰寒，法當急溫。若  
舌卷焦黑而燥者，陽毒挑蠶亦當下之。若舌青而胎滑無挑蠶  
渴者，陰毒寒極，亦當溫之。凡舌色鮮紅者吉，青黑者凶。而紫  
者爲陰寒，赤而紫者爲陽熱也。但見舌硬舌卷舌腫舌短舌強  
囊縮者，難治。

經曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣。背者胸之府背曲肩隨府將壞矣。腰者腎之府轉搖不能。督將憊矣。膝者筋之府屈伸不能。行則僂俯筋將憊矣。骨者髓之府不能久立。行則振掉骨將憊矣。病人身輕。自能轉動者易治。身重不能轉動者難醫。掌中熱者。腹中熱。掌中寒者。腹中寒。四肢倦怠者。主中氣不足。手足牽引口噤。難言者。名曰風症。四肢強直。口噤。頭搖者。名曰痓症。父手目心多因過汗。尋衣摸床。名曰撮空。脚手難移。身重而痛。小便短赤。名曰風溫。若身熱口渴。揭去衣被。揚手擲足。脈來有力。陽也。熱也。寔也。無熱不渴。欲得衣益。或身重足冷。倦卧惡寒。或好向壁卧。閉目不欲見光明。懶與人言。陰也。寒也。

虛也。總之身輕手足和緩，開目欲言者吉。若身汗如油，喘而不休，形體不仁，乍靜乍亂，脈浮而洪者死。皮膚潤澤者生，枯燥者死。形如枯骨，脈脫者死。大骨枯槁，大肉陷下者死。若看小兒更有八候之說：兩手伸縮曰搐，十指開合曰搦，勢如撲曰撓，頭編側曰顫，身仰後曰反臂，如開弓曰引，曰直似怒曰竄，露睛不浩曰視。凡此者，風痰驚熱所爲。大人亦常犯之。

### 內經分配三部臟府脈法

脈要精微論曰：尺內兩傍則季脇也。

李脇六各尺內尺澤之尺內兩傍尺之外側也

外以候腎，尺裏以候腹中。

腎有二枝，二尺候之，候腹中者附上所以候大腸小腸膀胱之疾

附上

左外以候肝，內以候鬲，右外以候肺，內以候脾。

附上尺之上開所主質真

鬲也不及胆者

上附上。右外以候肺。內以候胸中。

上附上關之上寸位也。腎

寄于肝部也

中氣在外以候心。內以候膻中。

膻中氣海也

前以候前後。以候後上

竟上者胸喚中事也。下竟下者少腹腰股膝胫中事也。

示吉按經曰。持脈有道。虛靜爲保。古之神聖。尚以虛靜是戒。

今之學者。非古誰遵。而臟腑三部。不能一定于胸中。寧言虛

靜乎。舊訣以經絡相爲表裏。大腸小腸列于二十蔡西山戴

同父滑伯仁復以二腸之病。候于尺中。至先師李士材。非之


尤甚。及考丹溪脈訣二法並載。予以爲信招辨之訣。奚不遵

岐黃之典。上從脅喚。下至膝胫。三焦有序。內外無乖。由此而

再加虛靜之功。豈復有指下難明之謂耶。

內經三部臟腑圖

內經三部臟腑圖



寸闊尺者從魚際至高骨却有一寸故名寸從尺澤至高骨却有一尺故名尺。寸陽尺陰高骨爲陰陽之關界故名闊從闊至魚際經云上竟上也從闊至尺澤經云下竟下也膽寄于肝大小腸膀胱統于腹中故經文不及之。

診法

黃帝曰。診法何如。岐伯對曰。診法常以平旦陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。絡脈調匀。氣血未亂。故乃可診有過之脈。

黃帝曰。平人何如。岐伯曰。人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸定息脈五動。閏以大息。命曰平人。平人者不病也。醫不病故爲病人。平息以調之。

脈經曰。欲持其脈。令仰其掌。男先取左。女先取右。醫者覆手。以中指切至高骨。定其閏位。次下食指。切至閏前以定寸位。再下名指。切至閏後以定尺位。

叔和曰。下指之際。宜相病人長短肥瘦。人長臂亦長。指下宜深。

人短臂亦短指下宜密瘦人膚薄持之勿重肥人膚厚持之勿輕

樞要曰持脉之道有三輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲之曰尋初持脉時宜先輕手舉之以察其浮如脈浮膚上陽也。腑也內應心肺再重手按之以察其沉如脈沉肉下行于陰也。臟也內應肝腎又再不輕不重中而取之以察其中如脈行于血肉之間中和之應也內應脾胃若浮中沉俱不見則委曲而求之若隱若見三部皆然則爲陰陽伏匿之脉

經曰春胃微弦曰平夏胃微鈎曰平長夏胃微弱曰平秋胃微毛曰平冬胃微石曰平診家當隨四時而察胃脈慎勿執一

東垣云不病之脈不求其神而神無不在也有病之脈則當求其神之有無。蓋言不論脈之數熱遲寒脈來有力卽爲有神。但清其熱溫其寒自己若遲數無力是爲無神根本不固將何所恃耶。

秦越人云男子生于寅寅爲本陽也女子生于甲申爲金陰也故男脈在關上女脈在關下是以男子尺脈恒弱女子脈恒盛是其常也。反者男得女脈女得男脈也。男得女脈爲不足病在內女得男脈爲太過病在四肢右得之病在右左得之病在左隨脈言之也。

脈法曰反關脈者脈不行于寸戶由列缺絡入臂後手陽明大

賜之經也。以其不順行于閏上。故曰反閏。有一手反閏者。有兩手反閏者。此得之于有生之初。非病脈也。令人覆手診之。自見經曰。凡陰之所在。不應不應者。仰手而沉。覆手而沉也。是天色之氣使然。診家當先識運氣及南北二政之理。若不知而悞海之反代天和。

### 脈象辨

浮中沉伏脈之上下也。浮者爲上。浮于膚上。舉之有餘。按之不足。中者爲中。行于肌肉。按之不見。沉者爲下。行于筋間。附于骨上。重按不行。舉之不見。伏者又其下也。見推筋至骨始得。長短芤三脈。脈之盈虛也。長則過于本位。短則不及本位。中間有兩頭無。曰短。兩頭有中間空。曰芤。

平緩遲數四脈脈動之急慢也。一息四至五至曰平。一呼一吸爲一息一息三至曰遲。較之平脈稍遲。比之遲脈稍速。曰緩。一息六至曰數。

促結代濇四脈脈動之有止者也。脈動數時一止卽來曰促。脈動緩時一止卽來曰結。動而中止不能卽來良久復動曰代。往來遲滯似止非止三五不調曰濇。

大洪實長弦緊牢動革滑十脈脈之有餘之類也。較之平脈稍天曰大。大與洪相似但不十分浮而有力洪與實相似。但洪則重按稍衰。洪而長。浮中沉三部皆然。曰實長於本位曰長。長而端直如弓弦。曰弦。弦而急彈如切繩曰緊。緊與弦相似緊則長而端直切急而在右彈弦則惟長而端直而已

古人弦取象于弓弦繫浮有力重按則空曰革沉實有力取象于切繫繩可知矣浮洪有力重按則空曰革之不見曰牢狀如大荳厥厥動搖曰動中指克瀟往來流利曰滑。

小短濡弱微細濇七脈脈之不足之餘也。小於平脈曰小短于本位曰短浮小無力曰濡重按不見沉小無力曰弱舉之乃空細則僅存一線猶有常位可審微則似有若無可虞血脉將亡濇則三五不調惟見往來遲滯。

浮洪虛濡革散芤七脈皆浮脈之類也。浮于膚上舉之有餘曰浮洪則兼有力而大虛則兼無力而軟濡兼微少重按則無革兼洪大重手不見散則類乎浮大中乎便無根蒂芤則体原虛

軟重按傍有中空。

沉伏弱牢四脈皆沉脈之類也。沉于筋間重按不見曰沉重按不見推筋尋之始得曰伏。弱則兼無力而小舉之不見牢則兼有力而實輕手則無。

脈象主病二十九法

示吉曰。脈氣血之神也。隱于膚中視之不見。惟恃三指之巧。而識悔吝之机。誠非易事。故脈之理微。自古难之。然豈因其難也。忍置之不問乎。上稽靈素下考百家。凡脈應于指下者。數取形求。共得二十九種。其上下動止。盛衰虛實。往來跡象。雖極指下之幻。亦無遁情矣。從此而察三部之中。見是脈即有是症。脈症

相合內外五參爲治之法自彰也。然此二十九象散見諸經起而集之者代有其人由來已久但簡要者多所缺畧備全者不免煩多岐黃之旨難測高陽之訣招辨衆議紛集先哲諸書述其精要補其未補條附于後聊爲持脈者登高之自可也。

浮脈宜汗宜補不宜下 春夏順秋冬逆

浮脈在上而不沉也。浮于膚上舉之有餘按之不足曰浮陽也。  
扁散曰浮陽也心肺俱浮浮而大散者心浮而短濶者肺也

主風 浮而大者 風頭重鼻 中主脹腹脹浮大者順

主痞在外主表病 岐伯曰寸口脉浮 主外熱 經日諸浮不躁者皆在陽則爲熱一寒入于二

主氣喘浮疾爲宿氣浮滑爲風瘻浮緩主皮膚不仁 叔和云不

肉浮短主肺傷咳嗽。脈經云浮短者其人肺傷也。浮短主肺傷咳嗽。諸氣微小不過一年死。

浮緊有九爲傷

寒外症頭疼發熱無汗。

因勞役過度傷耗失範。

熱鼻塞白汗。

浮大而虛

主內傷元氣以致中氣陷下而發熱浮大而短。

分前陽明之至浮大而短寸浮風在上。主頭目不利。閔浮風在中。主胸滿脅。

主陽明旺立春後春

主腰痛便結脚膝疼痛。

痛尺浮風在下。主腰痛便結脚膝疼痛。

沉脈

宜下宜溫不宜汗。

肝子冬

心病及春夏忌見

沉脈在下而不浮也。沉于內下重手按之乃得陰也。

難經曰沉陰也。肝腎俱沉牢長者

肝也。按之需舉指來實者腎也。

主寒主氣。金匱云而子

主水。經云肝腎脈并沉爲衣水。

去鬱。兼滑痰鬱。兼數火鬱。

兼細溫鬱。非滯

沉緊主停飲。叔和云沉而弦。

主裏病。主癥瘕。

瘕破。

伯曰寸口脉沉

沉緊主停飲。叔和云沉而弦。

主裏病。主癥瘕。

瘕破。

伯曰寸口脉沉

主厥逆

沉遲爲寒極故手足厥冷

主洞泄沉數有力爲實熱

外症燥渴便沉

閉腹痛宜下沉

遲無力爲虛寒

外症手足厥冷自利踰臥宜溫補

主洞泄沉數有力爲實熱

主洞泄沉數有力爲實熱

諸細而沉者皆

利踰臥宜溫補

主洞泄沉數有力爲實熱

有陰則爲骨痛

沉滑主痰之戴氏作瘀鬱

沉伏主霍亂沉緊主

急痛

經曰寸口脈沉而監冬下有寒

時痛有積聚滑氏作足膝冷痛沉喘主寒熱沉短而敦主

厥陰旺

立冬前後得用子日

沉細懸絕主冬故以夜半死寸

沉主陽虛心氣鬱肺氣寒閉沉胸脇疼痛

尺沉主下元虛冷泄

鴻

數脈宜寒涼忌溫熱無熱不渴手足冷而脈數者外

數脈動太速也呼吸定息脈來六至過於平脈一至曰數爲陽

數者爲陽

盛陰虧之候主熱

越人云數者府

主煩經云數主吐脈經曰寸

則爲煩主吐口數卽吐

毒氣驚

黃帝曰脈至如數使人累驚

主三消。

寸數上消閑數中消尺數下消

主適得症

扁鵲云數爲適得病前大後小卽頭痛數而目脳前小後大卽胸滿短氣

數而

爲適得病前大後小卽頭痛數而目脳前小後大卽胸滿短氣

數而爲邪熱

數細無力

主陰虛發熱

血虛之症盜汗骨蒸日輕

夜重乾咳

爲虛熱宜辛甘發散

皮毛枝槁數之無力主內傷元氣

爲虛熱宜辛甘發散

數大有力主實熱

外症口渴煩躁面赤

數者爲陽主夏故以日中死寸數

內外皆熱或云便祕

數者爲陽主夏故以日中死寸數

左主面赤舌燥右乾咳聲嘶

歸數者爲陽主夏故以日中死寸數

左口苦脇痛右嘈雜善饑口

臭尺數左渴赤王淋右大便閉腸紅

遲脈

宜溫熱補忌寒涼克伐

經曰察九候猶遲者病

遲脈動太慢也呼吸定息脈僅二至減于平人之脈二至曰遲

爲陰盛陽虧之候主寒

扁鵲云遲者臟主不足

寸見爲氣不足

尺見爲血不足

主寒

主不足

遲而浮主寒。在表遲而沉主寒。在裏遲而沉細無力主中寒厥。  
冷倦卧指甲青舌卷囊縮。遲而滑者脈。遲而濁者有壅結。  
寸遲左心虛神怯。右冷痰氣短閉遲。左面青脇痛。右中滿吐瀉。  
尺遲左精冷小便餘瀝。右火衰不育泄瀉。

大脈已午月脈宜洪大。察九候獨大者病。

形瘦脈大胸中多氣者死。

大較之平脈稍大也。浮中沉皆然大之極。爲洪爲實爲陽有餘。  
陰不足之候。內經曰脈大者主熱。主脹。堅以濤者脈。經云寸口脈大主實主病進。經曰大則病進主寒。經曰脈大者主寒。熱在中。主癲病。岐伯曰大堅主不得偃卧。經曰肺氣盛脈大脈大主數大有力。主外感風寒邪氣有餘。豁大無力。主內傷不得偃卧。數大有力。主外感風寒邪氣有餘。豁大無力。主內傷元氣正氣不足。寸大左舌乾消渴善驚。右咳嗽喘急。閑大左口。

苦善怒右痞脹不食。尺大男子爲逆。主二便不利。女子爲順。尺獨大。傳手主有孕。

小脈察九候。獨小者病久。人身大而脈往來小者死。

小較之平脈稍小也。中外皆然。小之極。名微。名細。爲正氣不足

之候。主寒。主氣血皆少。

靈樞經曰。小者氣血皆少。主病在內。堅者主病在內。

主胃反。

經云。小弱而滯。胃反主泄。少氣。

靈樞曰。尺膚寒其脈小者。泄少氣。

小而數。主陰虛

發熱。小而遲。主虛寒。痼冷。傷寒。汗吐下後。脈小爲病退。若

乳子病熱。脈小爲順。

產後傷寒。脈小非陽病。見陰脈也。經曰。乳子病熱。脈懸小。何如。岐伯曰。手足溫則生。

寒則小。左神昏。忘驚悸。右懶言。氣怯。閑小。左目昏。易怒。不

少食。痞滿。尺小。下元虛冷。腰膝軟疼。

滑脈。人身濇而脈往來滑者死來滑而盛病日進。

滑脈行動不濇也。往來流利如珠之盤。風轉替替然與數相似。一日浮中。如有力曰滑。爲陰氣有餘之候。經云滑者陰氣有餘。身寒。伯丘曰滑爲血實氣壅之候。血不勝于氣也。二論雖異。實可互爲闡明。脈注曰。關土滑而脈注曰。關土滑而主癩疾。經曰。癩疾何如。岐伯曰。脈博大。小不匀。必吐送。主癩疾。滑久自己脈小堅急死不治。滑數心中結熱。滑疾胃中有寒。和脈盛滑堅者。病在外。脈滑浮而疾謂之新病。內經

女子二尺滑而和者主有子。滑而有斷絕者主經閉。尺脈偏滑疾而赤如醉。寸滑左心悸。瘀滯心包。右咳嗽。瘈喘。外熱者主經閉爲病。

閔渭左寒。右宿食。嘔吐。尺滑小便淋。相火妄動。腎濁。

濇脈。申酉月脈浮短而濇。病在外脈濱堅難治。

濇脈之行動不滑也。虛細而遲。往來極難。三五不調。無復次第。

如雨沾沙。如刀刮竹。曰濇。

岐伯曰。濇者。陽氣有餘也。爲身熱。爲無汗。滑氏曰。濇爲氣多血少之候。

陽氣有餘之候。主少血。主心痛。主血痺。

經曰。濇則心痛。濇則少而脈濇曰痺。

主亡

汗。主傷精濇而堅。內留惡血。

表熱脈濇。主中霧露。

孕主胎痛。無孕敗血爲病。

寸濇。左心神虛耗。驚悸。性忡。右短

氣冷。痞閑濇。

左目昏。脇痛。右心疼。痞滿。尺濇下元不足。男子傷

精。女人崩漏。

緊脈。夏至後得甲子太陰之至。緊大而長。

緊者。勁急而不和緩也。按之搏指長。而左右彈如切繩。絞索之。

狀曰緊。

滑氏爲邪風搏擊。於營衛之間。

主寒。主痛。主積聚。主吐逆。

叔和曰。緊則爲寒。緊

而滑者吐逆駛而盛而緊曰脹。經緊而急者遁尸。脈緊沖者爲實。篇浮緊主傷寒表症。沉緊主寒客腹中。名內傷寒氣口右閔緊盛左手平和者主傷食。寸緊左頭熱目痛。右鼻塞咳嗽。閔緊左風癟。肋脹指甲青。右惡心脹滿。尺緊呻腐腰脚臍下痛。二便不利。

緩脈 乳子中風緩則生急則死 腎病及二尺忌見

緩脈動舒緩而不緊急也。往來徐徐呼吸不及四至較遲脈和速爲榮衛向衰之候。主虛主濕主解体。經曰尺脈緩謂之解体。緩而滑爲熱中浮而緩主風。表沉而緩主內虛主冷。緩而澀爲渾土見之爲項強下見之爲脚弱。寸緩左怔忡多忘右氣短頭重閔緩

左風虛眩暈。右善嘔不思食。尺緩腳膝無力。下元虛冷。  
示吉曰。緩中州脾脈也。緩而無神。方可言病。若四至調匀緩  
而有神。不大不小。不浮不沉。不輕不重。意思欣欣。如春風楊  
柳之狀。平和之應也。倘認爲病脈。則誤矣。古人論脈。大人以  
五至爲平。小兒以六七至爲平。今若此。又覺偏于熱矣。豈古  
今時勢異耶。抑今人元氣薄也。

弦脈。經曰。春胃微弦。如持長竿未稍。日牛。脾病及右。閏  
及四季之末。忌見。

弦長而端直。如按絲弦舉之應手。按之不移。爲陰遏陽鬱之候。  
主瘧。主痛。主飲。主疝。主寒。熱往來。主傷風。主宿食。經曰。脈弦在  
主驚。續云。用胃井。主氣結。主勞倦。主經絡間爲寒所阻。弦數爲  
小弦欲驚。

勞虛爲傷寒。熱邪傳少陽。寒熱口苦。脇痛耳聾。雙弦脇急痛。  
弦長爲積。寸弦。左頭疼心惕。右咳嗽惡心。閏弦。左脇痛寒熱。  
右宿食痞滿。尺弦。小腹痛。下焦停水。

### 芤脈

芤浮大而軟。中空傍實。傍有中無。若捻葱葉爲血。不能統氣之  
候。伯仁曰。氣有餘血不足。血不能統氣。氣故脈來虛而大。若芤之狀。主失血。芤而數。主火盛而血  
妄行。芤而遲。主水上二臟虛寒。不能藏血。失血才芤。左心虛易  
驚。現紅星。右咳血。血絲閑芤。左脇痛吐血。右嘈雜嘔血。尺芤。

便血腸紅。女子崩漏。

洪脈立夏後得甲子太陽旺。右寸及冬忌見。宜寒涼。太陽之至洪大而長。

洪較大更盛也。浮大有力，騰上滿指來至大而去且長有類乎實。惟重按稍衰爲異。爲氣血燔灼之候。主煩主咽乾。主表裏皆熱。主二便濇。主傷寒陽明經病。寸洪左煩熱。古乾裂。右乾咳。唾粘上消。閑洪。左眼赤善怒。右火嘈易飢。脹滿尺洪。左小便赤濇。左大便難。火旺遺精。

### 虛脈

虛中下皆空也。浮大而軟。舉按無力。豁然不能自固。訣曰浮而無力爲虛爲榮衛俱虛之候。主暑傷元氣。主虛煩多汗。主恍惚多驚。主小兒驚風。病在中脈虛難治。肝腎脈並虛爲死陰虛陽搏謂之崩。內寸虛。左恍惚多忘。右內傷元氣頭言。閑虛。左目昏少寐。右

不思食虛痞尺虛。左腰膝酸軟遺溺。右

實脈

實表裏俱實也。弦大而長。舉按有力。浮中沉三取皆然。曰實爲邪氣益盛之候。經曰脈實以堅謂之邪氣甚盛訣云三焦氣滿主熱。主痛。主痢。主氣塞。主食積。主伏陽在內。寸實左口舌瘡。咽喉痛。右煩熱。咳嗽痰喘。急閉。貫左。脇痛。善怒。目赤。右中滿。痰飲。膄脹。食積。尺實。左便赤。小腹痛。右大便難或痢。

散脈老人忌見此脈

散到手便無根蒂。三五不調。類乎濶。又兼浮大。有陽無陰。似乎虛中指便空。來去不明。根由難覓。如散葉隨風。不常其狀。爲氣

醫門不詳錄 卷之二十一  
血耗散臟腑欲絕之候。主寒熱無時。主虛陽不飲。主心氣不足。  
主暴病而榮衛虧損。寸散左神虛驚悸。右氣散入喘。閑散左  
筋萎不寐。右飲食不化。瘦弱無力。大散精耗耳鳴。腰膝無力。

長脈 人短脈長者是中損二十歲

長指下有餘。如持長竿過于本位。爲陽氣有餘之候陽也。越人主

壯熱。主三焦煩鬱。王陽毒內蘊。

脈經

主氣治。

經曰長

主遺尿。

經云

脈長

過寸入魚

主足脛痛。

寸口脈中于

主逆氣喘急。

經云脈長出魚

際者遺尿。主足脛痛。

長者足脛痛

主逆氣喘急。

經云脈長出魚

際主逆氣喘急

寸長。左心經實。熱舌乾咽痛。右上焦氣壅悶。長左壯熱。脇痛。右

中滿。不食。尺長溺黃。革痛。大使實。陽事頻舉。

短脈 人長脈短是大損三十歲

短指下不足。中有傍無不及本位爲陰中伏陽之候。

滑氏云氣不足以前

導其血則脈短主氣病主頭痛

經曰寸口之脈中手短者曰頭痛

主酒病

脈法曰短疾而滑酒病

主三焦氣滯。主宿食不消。短而數。

主心煩心痛。寸短左心氣鬱頭痛。

右氣怯內傷。閑短。左胸痛引脇面青白。右惡心四肢怠惰。尺短二便不利。元精削弱。

濡脈

凡病初起見濡難治。若久病後瘥後見之爲順宜補

濡浮細無力也。輕于芤見重手却去如線之浮水中。爲氣血俱衰之候。主虛主濕。主少氣主無血主骨蒸盜汗。主癰積主下冷。主婦人產後客風面腫。寸濡。左心驚盜汗。右氣乏體倦閑濡。左目冒易怒。右不食虛滿。尺濡傷精脫血泄瀉腰膝虛冷。

醫學

弱脈

長夏胃散與弱曰平弱多胃少曰脈病  
老得之順少此得之逆

弱沉細無力也輕手不見重手按之快快不前欲絕未絕爲血氣欲絕之候主亡精主虛汗主痼冷主神昏身重主精氣不足主元氣虛耗寸口脈沉而弱曰寒熱脈弱以滑是有胃氣命曰易治經內寸弱左陽虛心悸右形寒氣短閼弱左筋萎無力右痞滿倦怠尺弱下焦冷泄瀉便數

革脈

經曰渾渾革至如湧泉病進而色弊

革浮而有力也輕手舉之洪大搏指重手則空如按鼓皮曰革爲裏虛表實之候主實熱在外主傷寒一二日表症壯熱無汗皮膚盡疼又主男子亡血失精女子半產漏下寸革左頭疼面

赤煩燥右咳漱聲嗌閉革左善怒嘔血右嘈雜善饑尺革夢遺

失精二便澁滯

牢脈越人云牢而長者肝也牢者爲實宜寒涼攻利

牢沉而有力也輕手不見重手按之實大搏指曰牢爲表虛裏實之候主實熱在內主傷寒熱邪傳裏大便燥結主骨間疼痛主勞陽痿極寸牢左煩渴舌裂右氣鬱引飲乾咳閉牢左兩脅急痛右不食腹脹尺牢小腹痛二便閉腰膝痛痺

示言曰牢革二脈俱在實脈中流出革爲實之浮牢爲實之沉陰陽亢害大抵與胃氣相遠故先哲皆不取之然有暴病而得是脈痼爲之也若久病而診得之胃氣全無鮮免免者

徵脈 經云微浮秋吉冬成病

微不顯也。依稀輕渺似有若無模糊難見爲氣血俱虛之候。主少氣主自汗主泄瀉主崩漏脫精。微而數主虛熱。微而遲主虛寒。浮而微者陽不足主身惡寒。沉而微者陰不足主臘寒下利。微而弱者主寒少氣。寸微左憂惕善忘不寐。右短氣不足以息。關微左脇肋虛瀉。右惡心不食虛痞。尺微切傷精女崩帶。脛膝無力。

細脈 形盛脈細少氣不足以息者危

細不粗也。往來指下極其小渺僅存一線如蜘蛛相似爲氣冷血虛不足以充之。傷濕主扁在內主元氣不足乏力無精。

主內外俱冷。痰弱。洞泄。主勞傷過度。神昏體倦。寸細。右心無血。  
養驚悸。予氣少。倦頰關細。左目暗。筋萎。右少食。虛渴。尺細精冷。  
下虛泄瀉。女子經事過期。

促脈

示吉曰。促無胃脈也。傷寒熱極及暴怒於厥急驚尚爲可生久病。久病及雜症見之者死。

促陽之極也。一息脈來六七至時一止復來曰促。爲陽獨盛而陰不能相和之候。主熱極。主暴怒。主氣壅。主傷寒陽毒。主瘀血發狂。寸口脈促上擊者。肩背痛。經寸促。左狂言風痰于心。右痰熱咳嗽。閔促。左吐血善怒。熱極。右脾熱。口臭引飲。尺促。腎水涸二便滯。

結脈

結陰之極也。一息脈來三四至。時一止復來曰結。爲陰獨盛而陽不能相入之候。主氣鬱。血壅。主飲食痰飲留滯。經絡浮結。主外有痼疾沉結。主內有積聚。寸結。左驚悸痰飲。右肺寒癆。嗽閑結。左脇肋痞痛。右食積痰飲留滯。尺結。小腹冷痛。硬滿。示吉曰。脈因熱而數。因數爲促。因寒而緩。因緩爲結。益促結者。寒熱之變也。滑氏曰。有氣血痰飲食五者。若有一留滯其間。脈亦爲之間斷。非必死脈也。故張長沙亦作病脈。予近診皿氣素虛之人。及有年老脈來不數不緩。但數動一至。或五六動一止。後亦無妨。蓋其榮衛固不足以充前導。而氣血飲食。痰易于留滯也。若兼數兼緩。則病上更病退。則生如則死。

矣蓋可忽哉

代脈長夏脈但代無胃口死曰代爲戊己惡脈右閼忌見

代脈

長夏脈但代無胃口死曰代爲戊己惡脈右閼忌見

代更代也動而中止良久復動動而又止如前復起曰代爲

臟無氣而他臟爲之代至也六脈皆然主呼吸危亡之候然亦

有暴病而致是脈者主霍亂吐瀉主心腹急痛主便膿血主心

中驚悸主積瘀停水主中風卒仆主瘀血飲食停滯以致元氣

不續寸代左恆仲言語蹇塞右氣塞瘻壅代左胸脇急痛

右暴痛吐瀉尺代亡陽失血陰疝上冲

伏脈經日按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也

伏浮中沉皆不見也附于骨上重手推筋取之乃得爲陰陽潛

伏閉膈閉塞之候。主寒主痛。主水主霍亂。主疝瘕。主飲食不消。主榮衛氣閉而厥。厥逆結爲積聚。一寸伏左沉憂失志。右氣滯痰積。閑伏。左血冷。脇腰痛。右吐瀉暴作。中脘積塊。尺伏腎寒。火蒸虛脫崩帶溺赤。

### 動脈

動狀如大音。厥厥動搖。舉之有舉之無不往不來不離其處。爲陰陽相搏之候。正理論 主痛。主驚。主崩脫。主泄痢。主虛勞體痛。陽動則汗出。陰動則發熱。婦人手少陰脈動者。妊子也。內經寸動左

心驚汗出。右自汗。痰喘。閑動。左寒熱日苦。右食積停滯。尺動骨蒸。虛脫崩帶溺赤。

七絕脈

一曰雀啄。連連搏指忽然止絕。少頃復來。如雀啄食肝絕也。一曰魚翔。本不動而未強搖似有似無。如魚之翔心絕也。一曰屋漏。如屋殘漏。下半時一滴。胃絕也。一曰解索。指下散亂。仁數不疎。如索之解脾絕也。一曰鯉遊。浮于指下。始則冉冉不動。少焉而去。久之忽然一躍。進退難尋。如鯉之遊大腸絕也。一曰釜沸。浮于指下。有出無入。無復止數。如釜湯沸肺絕也。一曰彈石。沉于筋間。劈劈急硬。如指彈石。腎絕也。凡此七脈。一見皆主胃氣消亡。職元已竭。死無時矣。

人參味甘。功專入肺。止渴生津。大補元氣。更能養肺。肺熱乃忌。  
細皮光潤者佳。去蘆切片用。肺中實熱。杏等洪大有力。勿用。  
反藜蘆。

黃芪甘溫。力專補氣。收汗固表。內傷有濟。專托潰瘍。生肝大利。  
綿軟箭幹者佳。托瘡生用。補氣蜜炙。一用鹽水咸。表邪實而無汗者勿用。托裏得防風而効速。

甘草甘平。健脾強胃。調和諸藥。解毒功最。蜜炙溫中。生用火退稍去小便溢痛節。主癰疽腫痛。俱生用身炙蜜溫。確若痞滿。嘔吐者勿用。反甘遂海藻大戟芫花。

當歸甘辛。補血歸經。扶虛益損。退熱滋陰。

既血上行。身養血。中守尾破血。下流金

活血不走。酒浸洗淨。用體肥瘦盛。姜汁炒恐沉脣也。

川芎辛溫。生血調經。能止頭痛。開鬱上行。

小者開醫不宜舉。

服久服酒浸川芎。

山藥甘溫。健脾補腎。補陰回精。寫痢能定。消腫長肉。助骨強盛。

遂軍食多食亦能滯氣

白朮苦甘健脾強胃除湿利水痰痞皆退大者為云木力大氣

氣清十炒微黃用之又滋陰藥中再用酒拌蒸

佐黃芩則安胎君風實則消癥傷寒動氣勿用

蒼朮甘辛健脾平胃燥濕寬中鬱結開遂

米泔水凌一宿去黑皮切片炒用并能發

汗定虛喚瘞沒士燥火旅乾咳嗽嘶啞虛便結者勿用

白芍酸寒能收能補平肝養血腹痛自可瀉痢崩漏安胎不苦

伐所生用口痛炒用利血神血酒炒斂血止血醉炒新鮮婦人勿用恐酸寒伐生生氣也反藜蘆

芍酸寒除熱清目破血通經癰腫宜服產後勿用

生地微寒專治血熱骨蒸煩勞止吐衄血

忌見銑器酒浸用畏菜菔及子血虛寒者勿用肥人多瘀

姜汁浸炒用

熟地微溫。滋腎補血。封填骨髓。勞傷易絕。烏鬚黑髮。目白清徹。  
用生地酒浸蒸熱晒乾再浸蒸加此九次其法用好酒石砂  
並內煮一夜其色如漆則熟矣忌畏同生地多痰苗江皆炒  
知母味苦滋陰止渴自汗骨蒸煩熱可合  
瀉腎火忌缺火封  
生用湯胃夫鹽酒炒

貝母微寒。止渴消痰。清心滿肺。開鬱除煩。  
去心研末用川西者佳性輕而治  
上焦之痰出浙江者各土貝母性重而燥惟治皮肉服外疚  
塊結腫癰瘻一切瘡也之痰然肺癰肺痿及人而瘡古人俱

用者反

烏頭

黃芩苦寒。枯瀉肺火。消痰利氣。風動皆可條芩安胎。除下焦火  
崩淋痛痢濕熱除苦。  
除風熱生用人血分酒炒研漬痰姜汁拌  
炒治服熱用猪胆汁拌晒乾細實而緊著

各條

芩

黃芩苦寒。瀉心除痞。止崩厚腸。濕熱自消。曰除煩益不  
起。

用馬糞下血去格大腸中者。抉用蘿蔔疔瘡生用。

大黃大寒破血消瘀快膈通腸積聚盡驅錦鉗者佳酒湯熱其  
達頭項治頭風目疾及久積潤病治瘍瘡姜汁拌炒治  
傷寒熱結生用治瘍瘡熱結酒炒血痢韭菜汁拌臘乾

桔梗味辛療咽腫瘍載煎上升痰嗽皆用寬胸利膈枳杭相共。  
去膚失用苦用之治腸紅久  
宿大腸氣鬱之疾須炒黃色

天花粉寒清熱止渴消痰定嗽解腫可奪。

瓜萎潤肺消痰下氣寬胸清熱更醫孔閉去壳打碎去油  
用湯者勿用

半夏味辛燥溫化痰止吐開鬱健脾消涎。有毒凡使用白礬生  
姜皂牙同者以半夏

中無白豆爲度止煩渴及  
血症胎前勿用一反烏頭

紫蘇甘辛風寒發表便下諸氣安胎之實。夏月不敢用麻黃  
以紫蘇葉代之

蘇子潤肺開鬱下氣定喘消痰乾咳是利

微炒  
飴末

白連辛溫陽明頭痛散風驅寒肺膿可用皮膚癰瘡通經亦中防風甘溫諸風通丹頭暈鼻塞骨節痙攣去蘆

獨活甘辛頸項難舒腰苦定按諸風皆除大肺

羌活溫平身痛頭疼祛溼除澁活骨舒筋入膀胱小腸

柴胡味苦寒熱往來和解瘧疾升陽宣用

犯火無功略噦氣急  
痰喘嘔逆者勿用

前胡甘辛消痰解熱止嗽除痞又開氣結

赤止咳  
喘異

香附辛甘疏氣開鬱止扁調經更消宿食

忘銖諸橘去毛發散消食生用入血分酒

炒軟堅止痛盐水炒降虛火童便浸開鬱醋炒止血童便浸

炒黑溫迷艾汁炒消炎姜汁炒又有鹽酒醋童便四昧合製

麻黃性溫解表出汗身熱頭疼風寒盡散

去節根逐熱用之霜後春分前易寒表

葛根甘平。陽明發表。解酒止渴。溫瘧可好。自汗者勿用

麥冬甘寒。清心潤肺。止咳滋陰。煩渴皆濟。更除勞熱虛火大利。  
溫水洗去心用。不合心

頃惟傷寒科帶心用之

天冬甘寒。保肺清熱。止嗽喘渴能絕。肺癰肺痿更治吐血。  
去心虛寒者勿用

五味味五。止渴生津。氣散能收。滋腎強陰。暑熱自汗。乾咳功成。  
北產者佳。寒邪初起咳嗽者勿用。少兒尤忌。凡用打碎。

升麻微寒。解毒散風。升提下陷。牙疼可攻。辟瘧止渴。清胃有功。

形輕堅賞色

青絲者佳

藁本苦辛。顛頂頭疼。陰寒腫痛。風濕俱行。

細辛辛溫。少陰頭疼。破結通閔。牙痛功成。風寒濕阻。驅散皆靈。

反藜薦去土葉

用云可單服

連翹苦寒。瀉六經熱。解毒消癰。通淋水洩。

去心打碎除陳火  
止用心亦鼻良駁

澤瀉月鹹。利水滲濕。通淋消腫。除汙可大

炒黃  
色

延胡索溫。血結諸竈。破瘀調經。跌撲堪用。

生用破血炒用絞酒  
酒炒行血醸炒立血

地榆微寒。血熱堪用。血痢帶崩。金瘡止

痛炒黑止血虛寒下陷  
血衰濕病者勿用

防己辛苦。風濕脚腫。手足掣急。散熱消癰。

去皮酒  
浸洗

當歸苦寒。專截癰疾。最開結癥。水脹可食。

有毒包人比此疾生  
用截癰醋炒或同烏  
梅用同子香或三陰癰疾老  
人小兒及虛弱外病者勿用

龍胆苦寒。療眼清熱。下焦溫痛。疽癧皆絕。

酒洗用

人肝腎

玄參鹹寒。清無根火目赤咽痛心煩俱可。散腫解熱。腎虛能補。

反藜芦勿犯銅氣堅

黑者佳入心肺腎

丹參味苦定志。養神生新破瘀。崩帶調經。安胎清目。癰腫能平。

酒浸去芦

用反藜芦

苦參苦寒燥濕清熱。癰腫瘡疥逐水散結。黃道腸風殺蟲妙訣。

反藜芦以糯米泔浸一夜去

淨面腥氣晒乾一用酒拌炒

紅花辛溫最消瘀血。多則通經少則養血。兼治跌撲瘡毒解。癰

三棱苦平行血行氣。消癰削堅。虛人當忌。麵裹煨切片醋

炒用畏牙硝

蓬米苦溫破積消聚。止痛行血。通經最易。消食開胃。醋炒用例。

天麻辛平。風熱眩暈。驚悸。風癇。癰瘍。俱應。

溫紙裏  
烟熟用

南星苦辛。能治風痰。破傷跌打。下氣開關。麻痺。風疾。癰腫。皆安。

姜湯泡透切片。姜汁浸炒用。

妊娠勿服

爲末入腊月黑牡牛胆中陰干。名胆南星。

秦艽苦辛去湿。活筋肢節。風痛。腸風骨蒸。

酒洗切片

遠志辛溫。益智寧心。清目利竅。壯陽補精。

甘草湯泡去心用

破故紙溫腰膝酸痛。只陽固精。鹽酒炒用。

卽補骨脂

葫蘆巴溫。煖補腎臟膀胱諸痛。脹痛皆除。

酒洗用

何首烏甘添精種子。黑髮悅顏。長生不死。

忌犯銚器九蒸九晒用之

骨碎補溫骨碎折傷。固齒驅風。殺蟲最良。

卽猴姜

威靈仙溫腰膝冷痛。積痰痃癖。風溫通用。

酒洗

牛膝味苦。除濕。利腰膝酸疼。益陰補髓。洗用

去蘆酒

黃精味甘。能安臟腑。五勞七傷。此藥大補。洗淨九蒸九晒用之。釣吻畧同切勿快用。蒲黃味甘。逐瘀止崩。止血炒黑。破血宜生。

續斷味辛。接骨續筋。跌撲折損。且固遺精。酒服。洗用

益母草甘。調經所宜。產後胎崩。生新去瘀。忌犯鐵器

從容甘溫。酸補精血。若驟用之。反動便滑。忌犯鐵器。酒

鎖陽性溫。補陰固精。大便燥結。酥炙用行。大便不實者勿服

車前性寒。溺澁眼赤。利水止瀉。帶濁有益。炒細研用

紫苑苦辛。血瘀上氣。補虛定喘。寒熱並濟。酒洗

百部微寒。肺熱咳嗽。傳尸骨蒸。殺蟲有力。酒洗

百合味甘。定心安膽。止嗽消浮。癰疽可啖。

款花甘溫。理肺消痰。肺癰喘咳。定悸除煩。

兜鈴苦寒。肺熱久嗽。定喘消痰。能薰痔漏。

根名青木香下氣甚速兼治小陽氣

青黛性寒。開一清火。驚癇瘧痢。發斑俱可。

甘菊味甘。除熱祛風。頭暉目赤。收淚有功。

酒洗、腥乾用

薏苡味甘。專除濕痺。筋節拘攣。肺癰肺痿。

去壳淨炒用、

丹皮苦寒。止血通經。和傷清熱。無汗骨蒸。

酒洗用

兎絲甘平。夢遺滑精。腰疼膝冷。補髓益陰。

水淘浮用白酒燙水潤同入砂罐內煮爛

成餅晒乾  
入諸藥用

茴香性溫。能除疝氣。腎臟虛塞。調中緩胃。

鹽湯浸炒

砂仁性溫養胃進食止。叶安胎通經破滯。

炒爲末

白蔻辛溫能却瘴。易氣調元止嘔開胃。

去壳炒爲末用

肉蔻苦溫脾胃虛冷瀉痢不休。功可立尋。

麵炭煨熟研碎用

草蔻辛熱治寒犯胃作痛嘔吐不能食。遂

用擣末

草果味溫消肉除腰截瘧逐痰解瘟辟瘴。

用擣末

菖蒲辛溫開心通竅去痺除風清聲至妙。

附子辛熱性走不守。四肢厥逆回陽功有。

厥冷回陽用生引諸藥行經用麵炭火燶

去皮臍切四片用童便浸透燒乾著入補益丸中切六片朱用甘草防風同煮三四滾去皮臍甘防再用童便者一日晒

乾方無毒也

天雄大熱壯陽補火陰寒止痛。尚風亦可。

製同附子

烏頭性熱溫經去風。手足拘攣。回陽兼用。

製同附子

射干味苦。咽喉腫痛欬逆上氣。消痰有中。

旋覆鹹甘驅風開結。腸滿稠痰水濕能絕。

大戟苦寒消水利便。腫脹癥堅其功瞑眩。

反甘草

商陸酸寒赤白各異。赤者消腫白利水氣。

葛根性寒利水消腫。瘀欬癰瘕治喘肺癰。隔紙炒用。

牽牛性寒利水消腫。蟲賰痃癖散滯除壅。

妊娠忌服。黑者屬水力遠白者屬金效遲

研爛取

頭末服

荳蔻甘苦。風寒溫痺腰背冷疼。添精益氣。

木通辛甘小腸熱閉利竅通經最能道滯乳閉。產淋渴皆治。

通草味甘善治膀胱消癰散腫能通乳房

燈草味淡清心定驚除熱利水喉如神

石斛味甘。却驚定志壯骨補虛冷門可恃。

去根酒洗一法密炙

石葦苦甘清熱利水癃閉五淋癰道司委。

拭去毛羊脂炒焦黃用

白蒺藜苦療瘧疾癰目癢頭瘡除白睛。

抖去刺用

青葙苦寒治風熱濕明目堅筋絡蟲有力。

木賊味甘益肝退翳能止月經積聚更奇。

茺蔚甘寒止血治淋利水和傷除熱通經。

拌酒用

仙茅辛溫腰足痺壯陽補血芳傷真離。

烏藥湯中浸一  
夜酒拌蒸用

玉金苦溫破血生肌吐衄漏血五結功奇玉金。

小者爲

薑黃味辛消癰破血心腹疼痛下氣最捷大者爲

薑黃

牛蒡辛溫能消瘡毒癰疹風熱咽疼可逐

一名鼠粘子打末用

紫草苦寒心腹邪氣利竅通水癰腫大利

酒洗用

白微苦鹹利水益陰中風帶下寒熱酸疼

酒洗用

白附辛溫治面百病血癰風瘡中風諸症

白蘚皮寒。董疽頭風咳逆濕癰疥癬功同

蘆薈性寒殺虫消癰癩癧驚癲之立安

胡黃連苦治芳苔蒸小兒疳痢盜汗虛驚

并治鼻漏

澤蘭甘苦。瘧腫能消打撲傷損月事可調

用葉調經酒洗用

苦蒿苦寒。治熱虛煩盜汗殺虫功烈

童便浸酒干用

巴戟天溫助賢添精疏風辟邪酒

浸方靈酒洗去骨

蘭葉甘辛散久鬱氣。膽痙消渴劫癥癬利。

用草利閉藥

決明子甘能除肝熱目疾收淚仍

止鼻血炒為末

革麻子辛利水消腫無名腫毒其功莫量

塗足心下胞胎全出  
項散生腸去壳搗用

蘆根甘寒客熱消渴噎膈吐逆利水皆活

炒用

蛇床苦辛風寒溫庫諸惡瘡癰陰痛能醫

炒用

金銀花甘療癰無對未成則散已成則潰

山豆根苦療咽腫竇敷蛇蟲傷可救急用

俗名金鎖匙用根  
嚼汁吞江咽喉腫痛

艾葉溫平驅邪逐鬼漏血安胎心疼必

委擣作織

灸百病

薄荷味辛最清頭目祛風化瘀舒筋宜服

稀養味苦。祛風除濕。明日補元。烏鬚引骨。酒蒸用

蒲公英寒。消瘡結核。化食散滯。乳瘡可食。

夏枯草寒。瘻癰癰癰。散血破瘀。目痛須求。

藿香辛溫。能止嘔吐。發散風寒。霍亂功大。

荆芥味辛。能清頭目。表汙祛風。治癆消毒。止血炒黑用  
祛風生用

香薷味辛。傷暑便澁。霍亂水腫。除煩解熱。

蒼耳甘溫。風寒溫痺。頭風腦漏。疥癬功奇。炒黑用

齒陳味苦。退溫除痘。明日發汗。清熱所揅。

使君子溫消疳。清浊瀉痢。諸蟲驅除。易樂。去壳取肉采蟲半生牛膝用

良薑性熱。下氣溫中。轉筋腹痛。宿食能攻。

石蓮葉寒。止口瘡疾解熱。開胃白濁淋癥去火。

列寄奴溫破瘀通經金鎗出血。下氣除癰。

木部共五十四種

茯神補心。善鎮悸驚。健忘善怒。益智安神。去皮未用

茯苓味淡。滲溫利竅。白化痰涎。赤通水道。去皮人乳拌蒸用

琥珀味甘。安魂定魄。破瘀消癥。利水通塞。

研細

松香性溫。主安五臟。杀蟲定痛。惡瘡皆當。

治瘡用葱汁  
生薑乾研用

柏仁味甘。補心益氣。斂汗扶陽。更除驚悸。

去壳去取霜用。

南桂辛熱。善通血脉。腹痛虛寒。溫補可得。

不見火。

桂枝小梗。橫行手臂。止汗舒筋。手足痺利。桂枝黃芩汗同芍藥止汗

木香微溫散滯和胃諸氣能調吐痢功最

治血分酒唐入氣分  
湯磨治溫治痰姜外

磨不

見火

山梔性寒解鬱除煩吐衄胃病降火不

難清上焦于熱用田灰  
炒黑清三焦生人生

用能清曲  
風之火

茱萸苦能調疝氣腑腹寒疼吐酸用利去便妙

山茱萸溫益髓滋精除腰膝痛賢虛耳鳴去核酒洗用一云核  
味濃者精者連核用

蔓荆味苦頭痛能醫能除眼淚拘牽溫痺

杜仲辛溫強筋壯骨足痛腰疼小便淋去粗皮姜汁浸  
水一用酥炙二姜汁炒

馬齒辛溫心腹脹痛小便滑數順氣通用

厚朴苦溫消脹除滿痰氣瀉痢其功不緩去粗皮姜汁浸  
水一用酥炙二姜汁炒

黃柏苦寒降火滋陰。肾蒸濕熱下血堪任。去粗皮切片蜜燒鹽

或生用隨  
病用之

桑皮甘辛止嗽定喘。瀉肺火邪其功不淺。

枸杞甘溫固精添精。明目祛風種子如神。酒洗

骨皮苦寒解肌退熱。有汗骨蒸強陰涼血。酒洗

棗仁味酸斂汗祛煩。多眠用生不眠用炒。去壳

益智辛溫安神益氣。遺漏遺精嘔逆皆治。去壳

檀榔辛溫破氣殺蟲逐水祛痰專除後重。

腹皮微溫能下膈氣。安胃健脾浮腫消去。水洗一次再用

甘草湯洗曬乾

丁香辛熱能除寒嘔。心腹疼痛溫胃可求。氣血胎

言以其  
也

冰片辛苦。善開喉閉。消風明目。殺蟲亦易。小兒驚癇。大人癲迷。

猪苓味淡。利水通淋。消腫除溼。多服損腎。去砂不

蘇木甘鹹。能行積血。產後月經。兼醫撲跌。

沉香降氣。緩胃追邪。呕逆足冷。壯陽破結。已見少生磨

乳香辛苦。療諸惡瘡。牛肌止痛。心腹痛良。去油爲夫

沒藥溫平。治瘡止痛。跌打損傷。破血通用。去油爲未

木瓜味酸。濕腫腳氣。霍亂轉筋。吐血有利。

竹葉味苦。自退熱安眠。化痰定喘。煩渴安然。用淡竹者佳

天竺黃寒。解煩除鬱。邪驅逐痰。明目清心。

金櫻子溫澀精除嗽。脾洩下痢。崩帶功奏。去心刺

前言皆川

郁李仁酸四肢浮腫潤腸破血下氣寬中去壳用

蕪荑辛溫痔瘻疥癬消瘡去積殺蟲不鮮去衣種炒黃用

五加皮寒祛痛風痺健步堅筋和傷並奇骨去

楮實味甘壯陽助脾堅筋益氣明目極少酒浸一宿蒸用

秦皮性寒散風去濕風熱驚癇目赤有力

密蒙甘寒主能明目瘡翳青盲服之効速

辛夷辛溫寒撓頭風面腫齒痛通鼻溫中

藜仁性溫理氣消痰目赤風腫止淚相關

破核取仁去皮尖研用酒浸曬

女貞味苦養精補陰去風除濕黑髮強筋乾用

酒浸曬

五倍苦酸消風癬疥止瀉澁精明目功快

醫宗詩集  
牙皂辛鹹通關開竅。頭目風濁。脹食皆効。

巴豆辛溫削堅蕩積。破癥消痰。通利有力。

去皮心膜或生或熱耗用

金鉛性寒。大熱顛狂。通水利便。心痛亦當。

雷丸苦鹹。解蟲殺蟲。胃熱癲癇。逐水有功。

釣藤味苦。小兒寒熱。驚癇胎風。舒筋活血。

止竭味鹹。跌撲損傷。生肌止痛。破血功良。

參薯微寒。解渴能濟。上清頭目。消痰下氣。

阿魏辛溫。除熯破結。禁瘧殺蟲。傳尸可減。

乾漆辛溫。通經破積。除痺殺蟲。心疼有益。

性冷  
盡用  
一召  
甚音

桂香辛苦。辟惡驅風。撻痛下痢。癰瘍有功。

蜀椒辛熱冷氣欬逆風寒積聚辟瘧消食者勿

微炒山口

菜部十種

生薑性溫散風驅寒。痰嗽嘔吐泄痢能安。

乾薑味辛溫中發表。沉寒痼冷其功不小。

炒黑能止血  
并治虛熱

蘿蔔辛溫下氣消食止嗽解渴消麵宜吃。

熟者補脾胃小子功  
相同炒研用

白芥子溫專化脇癰瘍瘡翻胃下氣除痰。

研炒

韭味辛溫補腎益陽遺精白濁瘀血堪嘗。

搗汁用子功用尤勝  
忌斜蒿同食

糖蜜

牛肉

大蒜辛溫化肉消穀霍亂轉筋散癰解毒。

多用  
傷目

胡荽辛溫頭疼消食散瘀驅痘肢熱有益。

忌斜蒿同食  
令人汗死

葱白辛溫散邪發汗。傷寒頭疼。安胎有幹。

畏密葵菜常山同食殺人

冬葵子寒療淋利便。主滑胎產通乳立見。

白冬瓜甘煩渴最善。消賊止淋能通二便。

八部九種

人乳味甘補陰益陽悅顏明目羸瘦仙方。

金汁甘寒解毒療瘡。下行狂熱虛熱可當。

屎蛆甘鹹療疳除積。肚腹脹滿小兒有益。

童便鹹寒勞熱吐衄。療喘咳嗽。產後營蓐。生津止渴。和傷功足。

髮灰苦溫治嗽。驅淋補陰止血。叶衄如神。多產婦人將髮洗所置盆中火犯遇人服

昇河草本圖說

指男培骨蒸培植根本

天靈蓋。傳屍勞瘵。瘧瘧血崩。授之右頰。人頂蓋骨。

燒存性。

死人枕。傳屍鬼疰。邪氣石虬煎湯可服。用墨送還原。

處人臘後骨。

禽獸部十九種

黑嘴白鴨。大補虛勞。兼除水腫熱毒可消。白目者雖殺人忌。

烏骨子雞。甘溫補虛。折傷諸癰。安胎止渴。

雄雀性熱。壯陽益氣。腦主耳聾。血點。能育。膏名自丁膏。能瀆難取。

雀卵酸酒。男子陰痿。益精種子。下氣可委。

伏翼味鹹。去翳明目。逐淋利水。延年久服。

屎名夜明珠。生熟積聚。

龍骨甘平。夢遺精泄。崩帶腸癰。瀉痢。蟹熟。

虎骨味辛。治脚膝定痛。追風能壯筋力。

和冬  
板未

犀角酸寒。化毒辟邪。解熱止血。頭狂目厥。

歸未  
用歸未

羚羊角寒。明日清肝。卻驚解毒。安神定魄。驚癲靈丹。

研末  
用研末

生黃芩苦大。治風痰。安魂定魄。驚癲靈丹。

研末  
用研末

麝香辛溫。善通關竅。伐鬼安驚。解毒甚妙。

易大  
蒜

鹿茸甘溫。益氣滋陰。潤精尿血。壯筋帶虛羸。

和多  
用

鹿茸甘溫。止欬。膿血。吐衄。胎崩。虛羸可醫。

脂粉炒成  
珠或麪炒

熊膽苦寒。風痰狂熱。驚癲黃疽。惡瘡。口絕。

辟塵  
者佳

膈畊膚熱。添精助腎。心腹疼痛。補虛培任。

用

狗肉鹹熱。此陽補傷。更益氣力。帶漏尤良。

用

羊內甘。熱補脾益氣。虛勞寒冷心驚能濟。

黃牛肉。甘健脾益氣。壯骨強筋。乳養心肺。更解熱渴。大腸滑利。猪肉性溫。補脾益氣。蹄能下乳。瘡瘍皆利。臘止腸紅。肺能潤肺。腎止腰疼。心定驚易。舌能健脾。油塗瘡例。腦治頭眩。頭有積刺。餐動風生瘻最忌。

### 蟲魚部共二十六種

蜂蜜甘平。益氣補中。止咳解毒。潤腸有功。除煩定驚。虛熱可攻。蟬能丘病。瘡瘍所通。密煉熟用。忌生葱。

牡蠣鹹寒。滋精止汗。崩帶脇疼。老痰祛散。火煅研末。左顧者佳。

珍珠氣寒。鎮驚除癇。開壅磨翳。止渴墜痰。研極細用。

石决明鹹。青肓內障。風熱骨蒸。益精可仗。九孔七孔者良以  
通裏煨研細用

龜甲鹹甘滋陰補腎逐瘀續筋更醫顱額。

酥炙研細用

鱗甲鹹平。勞嗽骨蒸散瘀理瘡去痞除崩。

酥炙研細用  
醋炙亦可

蘄州烏蛇專主諸風癰癧癩癤痒風溼有功。翳眉脫落塞耳治聾。

酒洗酥

炙用

花蛇性溫癱瘓喎斜大風癩疥諸毒莫嗟。

蝦蟆甘寒除邪破血解毒療疳瘡腫宜貼。

蠍味甘辛中風風癇手足抽掣風痰可捐。

去鹽上  
炙黃用

五靈脂溫力能行血心腹疼痛目翳能絕症暈見疳炒熟止血。

蜈蚣辛溫解虫蛇毒心腹結聚墮胎力足。

去頭足  
炙黃用

蟬牛角寒解肌治蠶朋肝膽痛疔毒兒痘或生研  
或炙用

僵蠶末減諸風驚癇濕瘻瘍瘧炒黃  
搗未

蟬退甘寒消風定驚殺疳除熱退翳催生

蝟皮苦甘腸風特漏翻胃腹痛陰腫奏酥炙黃  
搗未

土鼈味鹹折傷行血下乳通經去積光捷火酒浸瓦  
上炙乾用

差卿鹹酸通腸治脹破血墮胎驚風全仗

火炙

班貓有毒破血通經諸瘡瘻症水道能行去足  
足蟬糯米拌炒以

山甲性寒五邪驚悸惡瘡疥癬去風方易

土黃爲末

鯽魚味甘溫胃健脾補虛進食腸風能醫

燒灰研末

鯉魚甘平氣喘咳嗽水腫黃疸止渴安胎

烏賊骨鹹驅翳止淚崩漏帶下金瘡血遂

鰻鱺甘平療虛壯陽傳屍諸蟲帶下陰瘡

高升  
瘡瘍

鱠魚甘溫產後淋癆腸鳴腹痛胆氣補益

血堪  
瘀

蟹味鹹寒散血破癥養筋益氣胸煩悶洩

持塗擦瘡瓜  
主破血墮胎

金石部共三十種

金銀箔辛安心養神篤慄顛狂邪熱俱靈

多服有毒以  
鷓鴣肉解之

黃丹味辛性逆顛狂止痛生肌截瘧神方

換銘所作山東  
者在人血分

胡粉性寒殺蟲解毒破結消癰生肌長肉

化鉛所作  
大氣分

礬石性平鎮心墜結顛癇狂亂解毒亦捷。

鍼石性平鎮心墜結顛癇狂亂解毒亦捷。

水銀辛寒除熱除溼胎經孕昇丹功大

輕粉辛寒燒瘍拔毒蟲癬癩癲疳積亦服

即水銀所昇者

唯僧羊鹹鎮心墜痰嗽嘔瘧病癲痔俱閑

研細水飛用不可多服

丹砂甘寒明目鎮心除煩止渴益氣安神

研末水飛用昇

鍾乳甘溫壯元益陽利竅下乳解毒甚良

研末水飛用

白礬酸寒清喉明目寒熱汎痢諸瘡解毒

光明如水晶者佳故微之剝弗宜曝用

禹餘糧甘骨節疼痛寒熱咳嗽煩滿崩中

煅用

朴硝性寒攻下燥結留血停痰傷寒實熱

煉作芒硝性緩再煉作玄明粉性更緩

滑石甘寒利水解渴開胃降火傷暑能活

細水飛用

瓦膏性寒清胃解肌止渴生津頭疼可醫

大熱生用煨熟研末性緩兼敷熱瘡

青鹽性寒補腎益氣明目止痛更消積聚

食鹽味鹹能吐中痰心腹卒病過多損顏

炒熱熨心腹諸痛并洗服  
中無砂石者

雄黃甘辛辟邪解毒更治蛇虺喚風瘧肉

研細水飛用  
研細同火硝服紅

紫石英溫寧心定驚咳逆邪氣腫毒能傾

赤石脂溫保固腸胃潰瘍生肌瀉痢功最

火煅紗

寒水石寒能清大熱腹中積聚熱渴傷捷

研用

蓬砂性溫止嗽消痰善理喉痺破結開關

研用

膽礬性寒清熱殺蟲善吐風痰驚癇可攻

研末爲末吹乳竅立消

青礞石辛蕩滌宿痰消磨食積其功不凡

研細同火硝服紅水淘淨晒干用  
法蜡丸

無名異平消腫敗毒止痛生肌金瘡長肉

研細用

玉屑味甘明目發神除煩止渴寧心定驚

如米苔酒浸之消如泥用

自然銅辛主破積聚療傷續筋止痛最易

火煅噴淬九次

石燕性涼利便除淋陽風痔漏產難能平

火煅醋淬九次研細水飛用

磁石鹹寒能療濕痺目昏耳聾腫毒亦醫

吸鉄者任火煅醋淬七次研細用

硫黃大熱除癬疥瘡壯陽逐冷殺蟲妙方

甘草湯煮研用

藥部共十八種

陳皮甘溫順氣寬胸留白和脾消痰去白

麸炒

青皮苦寒能攻氣滞消堅平肝脇痛能治

醋炒去穰

枳殼微溫快氣寬腸胸中氣結脹滿爲良

麸炒去穰

枳實味苦消食除痞破積化痰冲墻倒壁

麸炒去穰

杏仁溫苦。風痰喘嗽。大腸氣閉。便難。功奏。

泡去皮尖  
炒爲未用

桃仁甘寒。能潤大腸。通經破瘀。血瘕堪當。

去隻仁泡去皮  
尖炒爲未用

大棗味甘。主和百藥。能益五臟。補氣虛弱。

人藥煎洗淨打碎入  
在棗煮爛去皮核

烏梅酸溫。收斂肺氣。止渴。生津。能安瀉痢。自汗。腸紅截瘧亦利。

利

藕味甘平。散關除畊。消食止渴。更解熱毒。汁止吐血。節和傷寒。

枇杷葉苦。止嗽。清痰。和胃。定嘔。解渴。除煩。

刷去黃毛蜜家用  
枇杷潤五臟止渴

榴皮酸澀。精漏。下痢。腸風。下血。染鬚。亦易子。能止渴。花醫吐血。

山楂甘酸。健脾消食。行血散氣。癩疝有益。

抖末用炒黑  
能治血積

梨性甘寒。消痰止嗽。清喉降火。解渴。功奏。

汁用  
抖爛取

桔甘酸寒。主潤心肺。痰熱渴。止血。須記。

桔乾補虛厚陽此橘  
同蟹食溫逆脚姜

次實甘平。補脾滻精。緩腰去濕。明目安神。去壳炒。

胡桃甘平。和傷通經。肌膚潤澤。腰痛如神。

龍眼甘溫。補虛益智。健忘。心明目同治。中滿氣隔者勿用去壳取肉。核中仁可食。

橄欖甘滻。開胃下氣。酒食渴瀉。魚毒皆利。

核中仁可食  
口唇燥裂

### 穀部共十一種

麥芽性溫。下氣消食。健脾開胃。止脹吐逆。炒黃研用

神曲甘溫。消食開胃。止瀉逐痰。脹滿能退。炒研

酒性太熱。辟穀禦寒。通行血脉。莫飲太酣。

外稼及樅傷寒酒水各尖煎行經藥煎熟

酒後入

醋消腫毒。胃脘氣疼。能消積聚。血暈如神。

飴糖甘溫潤肺和脾。喉渴自汗消痰補虛。中滿嘔吐湿熱者勿用

胡麻甘平潤肺填腦益氣補虛明目不老。

蒸九次

白扁豆溫補脾止瀉霍亂轉筋酒毒須藉。

葉主蛇蟲咳傷花主赤白帶下炒

赤小豆平止瀉利水排癰解熱便血功最。

或炒或煮

芝麻性甘行風通血滑腸潤肌白濁能絕油能解毒疥癬妙訣。

豆豉苦寒煩燥溼閑寒熱頭痛解表須問。

菉豆甘寒散癰厚腸消腫下氣熱毒最良。

### 十八反歌

夏瓜母白白頭藻大甘桔

木草明言十八反半蒌貝斂及攻烏海戟遂芫俱反草諸參辛。

芍叛藜蘆。

參謂人參丹參

十九畏歌

硫黃原是火之精。樸硝一見便相爭。水銀莫與砒霜見。狼毒最  
怕密陀僧。巴豆性烈最爲上。偏與牽牛不順情。丁香莫與砂金  
見。牙硝難合京三棱。川烏草烏不順犀。人參最怕五靈脂。官桂  
善能調冷氣。若逢石脂便相欺。大小修合看順逆。炮燼炙博莫  
相依。

君臣佐使法

弘景曰用藥猶如立人之制。若多君少臣。多臣少佐。則氣力不  
周也。按神農本經以養命上藥爲君。養性中藥爲臣。治病下藥  
爲佐。使岐伯曰方制君臣者。主病之謂君。佐君之謂農。應臣之

謂使非上中下三品之謂也。張元素曰。爲君者最多。爲臣者次之。佐者又次之。藥之于證。所主同者。則各等分。季果曰。凡藥之所用。皆以氣味爲主。補氣在味。隨時換氣。主病爲君。假令治風防風爲君。治寒附子爲君。治濕防已爲君。治上焦熱黃芩爲君。中焦熱黃連爲君。兼見何證。以佐使藥分治之。此制方之要也。本草上品爲君之說。各從其宜爾。

### 制度引經法

陳嘉謨曰。製藥貴在適中。不及則功效難求。太過則氣味反尖。火製四般炮炙炒也。水製三瀆泡洗也。水火共製蒸煮二者焉。法造雖多。不離于此。酒製升湜。薑製絳散。入鹽走腎而飲堅。用

醋注肝而注痛。童便製除劣性而降下。米泔製去燥性而和平。  
乳製潤枯生血。蜜製甘緩益元。陳壁土製竊真氣而驟補中焦。  
麥麸皮製抑酷性勿傷上膈。烏豆湯甘草湯瀆暴並解毒。致令  
平和羊酥油。猪脂油塗燒咸滲骨容易脆斷。去穰者免脹抽心  
者除煩。大概具陳初學熟玩。

### 服藥時候法

本經曰。病在胸膈已上者。先食後服藥。病在心腹已下者。先服  
藥而後食。病在四肢血脉者。宜空腹而在且。病在骨髓者。宜飽  
食而在夜。東垣曰。古人服藥活法。病在上者不厭頻而少。病在  
下者不厭頻而多。服則滋榮于上。多服則峻補于下。凡云分

再服三服者要令勢力相及并視人之強弱病之輕重以爲進退增減不必泥法好古曰用藥若寒熱各半晝服則從熱之屬而升夜服則從寒之屬而降或晴則從熱陰則從寒變化不一如此此三論各呈妙旨學者於此貫通之自能得其活法也

### 咬咀丸散合宜法

李杲曰湯者蕩也去大病用之散者散也去急病丸者緩也舒緩而治之也咬咀者古制也古無鐵刀以口咬細煎汁飲之則易升易散而行經終也凡治至高之病加酒煎去濕以生津補元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以密擣之者不活經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者自湯調氣味薄者煎

之和滓服去下部之病。其丸極大而光且圓。治中焦者次之。治上焦者極小。用麵糊取其遲化。直至中下一焦。或酒或醋。取其易散之意也。犯半夏南星欲去濕者。左以薑汁稀糊取其易化也。水浸宿炊餅又易化。滴水丸又易化。煉密丸者。取其遲化而氣循經絡也。蟬丸取其難化而旋旋取效。或毒藥不傷脾胃也。

### 煎藥法

李時珍曰。今之小小湯劑。每一兩用水二甌爲准。多則加少。則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥並忌銅鐵器。宜用銀器瓦罐。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭。芦葦爲雀。其水須新汲。味甘者。

醫門言系 卷之二  
流水。井水。沸湯等。各依方。若發汗。藥必用緊火熱服。攻下藥亦用緊火煎熟。下硝黃。再煎溫服。補中藥宜慢火溫服。陰寒急病亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩燥。及暑月伏陰在內者。皆水中沉冷服。

### 貴賤少長異治

宗奭曰。人有貴賤。少長。病當別論。病有新久虛實。理當別藥。蓋人心如面。各各不同。惟其心不同。臟腑亦異。欲以一藥通治衆人之病。其可得乎。張仲景曰。有土地高下。不同物性。剛柔良居亦異。是故黃帝與四方之間。岐伯舉四治之能。且如貴豪之家。形榮志若者也。衣食足則形樂而外實。思慮多則志苦而內虛。

故病生于脈與質下異。當因人而治。後世醫者委此不行。所失甚矣。又凡人少長老。其氣血有盛壯衰三等。故岐伯曰。少火之氣壯。壯火之氣衰。益少火生氣。壯火散氣。況衰火乎。故治法亦當分三等。其少曰服餌之藥。于壯老之時。皆須別處。決不可忽。

病在上而求諸下

示吉曰。凡病頭痛目痛耳紅面腫。咽喉腫痛。一切上焦等症。除清涼發散。主治外。更有三法。大便結。脈沉實者。用酒蒸大黃三錢。加入木湯中。微下之。名釜底抽薪之法。大便如常。脈無力。用牛膝車前引下之名。引火歸原之法。如大便洩瀉。脈沉足冷者。宜六味地黃丸。加牛膝車前肉桂。足冷甚者。加熱附子。是冷極

于下而追其浮火上升也。名導龍入海之法。若不知此。不免頭痛。醫頭之謂也。

一同學年二十餘歲患腮腫。醫以清涼散火之劑不效。一夜舌忽腫塞口。命在須臾。叩門求救。予診之。脈微細而不大便。四五日不行矣。微數雖屬虛火而便結。又不也實。予用百草霜吹舌上。內用酒蒸大黃五錢。肉桂一錢。引火下行。一劑而愈。

一友始而牙痛。既而咽腫。投涼藥痛轉甚。診其脈沉細。大便一日二三次。予曰。浮火上升也。其足必冷。察之果然。以金匱腎氣料作湯與之。服完即睡覺。來病失矣。

病在下而求諸上

示吉曰。凡治下焦病。用本病藥不愈者。須從上治之。如足痛足腫。無力虛軟。臘瘡紅腫。用木瓜米仁牛膝防己黃柏等之品。不愈者。定是中氣下陷。湿熱下流。用補中益氣升提之。若足軟能食。而不能行。名曰痿症。宜清肺熱。如治泄瀉。用實脾利水之劑。不効。亦用升提補中益氣。去當歸。加荳米炮姜。脈遲。再加故紙。肉蔻。如治下痢。曰數行寸口脈滑者。宜吐之。如治溺血。用涼血利水。不効。宜清心蓮子飲。清心復不止。再加升麻柴胡。如治大便下血。用地榆側柏。槐花棕灰。蒲黃荆芥。血餘阿膠等。件不効者。若兼泄瀉。再診其脈。如右關微細。或數大無力。是脾虛不能攝血。宜用六君子加炮姜。若右關沉緊。是飲食傷脾。不能攝

醫案二  
卷之二  
血。予製沉香末。子甚驗。若右寸洪數。大便如常。是實熱在肺。主流通傳于大腸。宜清肺熱。用麥冬花粉。玄參。枯芩。桔梗五味。枳壳之類。如小便閉。用五苓車前瞿麥。不効者。須加清肺藥。桑皮。桔梗。玄參之類。脈虛口渴者。用生肌散。加燈心。未通之類。經云。氣化則能出矣。若上部脈滑有痰。是痰壅于上。如玉漏之孔。竅塞而下竅閉也。宜用二陳四君煎。大劑頓服。鵝翎探吐之。

徐萬壽。楓江人。年二十餘歲。七月中。下血不止。徧醫不効。至十月初。屢次昏暈。事急矣。求治于予。予診之。右寸獨得洪數。是必實熱在肺。傳于大腸也。用麥冬花粉。桔梗。玄參。黃芩。山楂。五味。沙參。服數劑而愈。

朝明甫年五十餘患臙瘡三載沿皮瘤痒微腫色紫黑用膏藥  
蓋之則流水韓褪盡湿去膏藥卽又燥烈痒痛難忍易医數人  
白外兼治日甚一日不得已而求予予曰子非瘍医然亦識之  
此溫熱下流也人但知燥濕清熱解毒而不知溫熱之原從脾  
家下陷耳遂用補中益氣湯升舉其氣更加黃柏清熱蒼蠅燥  
濕。芥苓澤瀉利水。恭治溫下利小便非其治也。彼求外敷藥適  
在山中未便細思之燥濕散瘀者無如陳石灰清熱者無如側  
柏葉皆山中所有遂以石灰研末。抖柏汁調勻稍加火酒爲從  
治之。具試之明日則瘍乾矣。數日而全愈。

吳江吳姓者巨族也有子十餘歲下血已久百藥不效乘便過

湖乞藥子以沉香禾子數復與之一月後遇諸塗復索前藥甚急予曰尙未愈乎彼曰子愈矣猶子亦病此也後服之亦愈蓋小兒多因食積脾胃以致不能攝血也晉丹溪已言及之其外泄瀉漏塞瘻症治驗頗多然古人已有成案予又附之則蛇足

### 虛中實

虛中實者本虛而標實也如年老久病氣血兩虛若兼內有所積外有所感補之不應也至于傷寒熱病後元氣雖虛補之必復熱若多食復尤宜消導瘧後痢後中氣脾元未復飲食易傷風寒易襲最宜細察產後發熱血虛者多若兼惡露不行腹右塊痛其熱也血滯無凝若兼胸腹滿悶咽酸惡心其熱也停

食無疑若不用行瘀消導而慨施補血之品其能愈乎小兒痛後惟當補益而兼他病亦宜察風食而調理之。蓋表虛則風易入脾虛則食易傷也。

周忠介公夫人年六十餘患痰喘五六年。医莫無効。士材先師診之曰右寸浮洪肺有實邪須用麻黃石羔半夏防風細茶生薑等件藥雖峻而病當之無畏也。投之果愈。但麻黃止可用三分服後兼須避風耳。

山塘吳氏母年六十餘外患腹痛日瀉四五行已三四年矣遍治不愈。予診之二尺沉緊。予曰內有沉積也。用熟大黃三錢入本病藥中煎服一劑而病如失。

管子諫夫人小產後惡露不止。屢發昏暈面色恍白。恶心不食。自汗大脈微細而數。治以四物湯加參术姜灰服數劑。虛症稍退。而血亦止。但人便秘結腹痛不食如故。而嘔酸發熱尤甚。諸医束手。予于前方中加酒蒸大黃二錢。大便始潤而發熱嘔酸漸愈。

崇明蕭氏寄居吳門之西山。有婦二十餘歲。素虛弱患熱病。將一月。医者滿堂弗愈。一夕忽死。其父叩門求救。予曰。已死矣。又何救焉。彼曰。死其分也。若得一決。尤所甘心。不得已而往。至其家。帳已揭。帛已焚。動哭之声徹于中外。予就視之。脈雖無重按。尚存。心口微溫。子曰似有生机。卽用竹瀝燈心生姜湯灌之。咽

下一口少頃微動。細察之。腹痛甚。問其大便云二十日不食。亦不行矣。予以大黃一兩。芒硝五錢。桃仁當歸各三錢與之。衆駭曰。素有弱症。且病久。何能堪此。予曰。更有法在。強與之。遂去黑物半桶。卽用人參五錢。煎湯補之。益因其素弱急下後不得不峻補也。調理月餘而愈。今連生三子。此諸醫因其虛而不治其實。幾悞矣。從此亦可例推。

### 實中虛

實中虛者。今實而素虛也。如病人現在頭疼。体痛。身形相急惡寒發熱無汗。此表實也。宜汗之。若其人有虛症。或吐衄下血。或夢遺滑精。或小便淋濁。或大便瀉利。或內傷勞倦。或房勞陰虛。