

遠西醫方名物考

世

卷三十

和書門類			
二八六二四	八	八	四
號	函	架	冊
四	五	五	四
冊	冊	架	冊

內閣文庫			
二八六二四	八	八	四
號	函	架	冊
四	五	五	四
冊	冊	架	冊

內閣文庫	
番號	和 28614
冊數	45 (30)
函號	195 282




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak





遠西醫方名物考標目

卷三十

石灰水

石灰水

尋常石鹼

尋常石鹼 製法


白石鹼 製法

石鹼解凝丸

石鹼膏

石鹼軟膏

舍利別



明治十三年購求

遠西醫方名物考

卷三十

標目

鳳雲堂藏

石長生舍利別

接骨木傑列レ

接骨木昆設爾弗フ

接骨木水

旃那葉

旃那丁幾去爾ル

旃那涼解飲
孕險旃那飲

旃那越幾斯劑

旃那舍利別

舍謨字黜謨

舍謨字黜謨舍利別



遠西醫方名物考卷三十

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

石灰 カルキス 羅 カルク 蘭

是ハ石灰礦ヲ燒テ製ス。石灰礦ハ燒テ灰トナル一
種ノ石ニシテ或ハ堅剛ノ者アリ或ハ土塊ノ如キア
リ或ハ破碎スレバ針眼アリ或ハ麤鹵ニシテ光澤ア
ル碎片ヲ間錯シ或ハ貝類蝸牛殼石梅等ノ化石ヲ
夾ム者アリ○石灰礦ヲ燒テ石灰ト爲シ未ダ水ヲ
濕サズ。大氣ニ觸レズノ碎粉トナラザル者ヲ生石

灰ト曰フ。是多ク火氣ヲ含ム。盡ク酸性ヲ脱ノ純粹ナルアル亞兒加利性ノ石灰土トナル故ニ其礦石ノ秤量ニ比スレバ半ヲ減シ。又アル亞兒加利性ノ酷厲鹽ヲ含ム故ニ氣味極テ慄悍猛烈ニシテ侵蝕スルヲ焚カ如シ。是ヲ酸味ノ液ニ加レスモ沸騰セズ是盡ク脱除ノ純粹ノアル亞兒加利性トナル故ニ沸滓セズ沸滓ハ炭酸ヲ含ムニ因ル然レ是ニ水ヲ注ゲバ忽チ焚焯メ碎粉トナリ。或ハ大氣ニ觸テ濕氣ヲ受レバ亦碎粉トナリ。其性水ヲ沾ス者ト同シ。故ニ生石灰ハ硝子壘ニ入密封シ貯ベシ水ハ亞土ト交カ強カ強キ故ニ水ヲ注ケハ此ニ物緊合ノ生石灰ニ含所ノ火氣是水中ノ溫素共配偶ヲ喪ヒ

游逸熱ヲ生或焰ヲ發ス。○其既ニ水ヲ注テ碎粉トナル者ハ即尋常ノ石灰ナリ。是性緩和ナルヲ以テ酸味ノ液ニ加レバ沸騰ス。又石灰水後ト爲セカキガラ内服外用ノ侵蝕セズ。○蠟燭ヲ沸湯ニテヨク洗カキガラ粘穢ヲ去リ燒テ灰ト爲セ其性生石灰ト同シ。其燒テ冷定セ此時少許ヲ取り醋ニマカ掺マカテ少シモ沸騰セカキガラ即生石灰ト同様ナル微細カキガラ或ハ尋常ノ石灰ヲ燒テ通紅ト爲シ冷定メ少許ヲ取り醋ニ投メ少シモ沸騰セサルハ亦其性生石灰ト同シ。是酸性脱ノ純粹ノアル亞兒加利鹽トナル候トス。此モ亦濕氣ニ觸レハ復尋

常ノ石灰ト大ル故ニ硝子壘ニ收メ固封シ貯ベシ
 ○總テ亞兒加利鹽ヲ以テ製スル藥品ニ生石灰ヲ
 加レバ其氣極テ銳烈トナリ。若ハ腐蝕ノ品トナル
 假令バ急製硃砂精。硃砂加石灰精。釐乙典埴羅屈ノ
 如シ。是生石灰ヲ以テ其質ニ含メル酸性ヲ奪除ス
 レバナリ。蠟殼卵殼。蝸蛄石等皆石灰性土ヲ含メリ
 〔主治〕生石灰ハ多ク製劑ニ用フ。又外敷メ腐藥トシ
 腐蝕乾燥シ。疣贅息肉ヲ消ス。往古ハ惡厲ノ潰瘍ヲ
 淨刷スルニ用フ。○生石灰ニ蜜ヲ煉和シ傷冷毒痛
 腫股痛ニ貼メ多ク驗アリ。○面部ノ斑ヲ消スルニ

生石灰ト勿擗祭亞石鹼各等分。細末トシ。研和メ膏
 藥トシ。先蓋膏ヲ攤テ斑大ノ孔ヲ截開キ貼メ斑ヲ
 露シ。是ニ其石灰膏ヲ貼シ縛帶ヲ施ハ大抵六時ヲ
 經テ腐蝕シ痂ヲ結ブ。是ニ於テ其膏ヲ去。拔實栗膏
 ヲ貼メ膿潰セシメ愈スベシ。其斑大ナル者若ハ隴
 起セル者ハ右メ膏ヲ數貼メ漸次ニ侵蝕シ除ベシ
 石灰水 一升 水 十五升
 〔製法〕生石灰 一升 水 十五升
 右。石灰ヲ陶器ニ内レ。水少許宛加テ手ヲ住メズ攪

遠西各書考 卷三十 風雲堂藏

セ。終ニ靜定スル_レ六時。其間、時々振蕩シ、オリ沈ムヲ候_ヒ上清ヲ取り硝子燻ニ内_レ。固封シ貯_フ。石灰水一_ク中ニ精微ノ石灰四分_ハヲ含メリ

主治 性收瀋ス。内服ノ酸敗液ヲ消スル良藥トス。○下利荏苒トメ治セズ。胃腸ノ汚物ヲ疏滌メ後對症、藥劑ヲ處スレ_レ比効驗ナキ症ニ多ク驗アリ。○乳汁ヲ加、甘和シ服ノ刺戟セズ衰弱ヲ強壯ニシ内瘍ヲ治ス。又下利赤痢淋疾及_レ結石腎痛ニ甚_ク驗アリ。石灰水二十_ク許ニ乳汁ヲ適宜ニ加_テ毎日朝夕兩次ニ服ス。但_レ乳汁及_レ石灰水モ冷飲シ若_クハ微温ニ_テ服ス

ベシ。煮_テ熱セシム_ル勿_レ。○腎膀胱ノ結石ヲ溶解シ其疼ヲ消ス。但_レ結石ヲ溶解スルニハ蠟殼灰水尤_モ効アリ。結石ノ尖稜ヲ溶解メ刺戟セザラシム。日一二比宛_ツ内服ス。但_レ是ニ堪_タザル者ハ乳汁十分一ヲ加_ベシ。○經久淹滯ノ酷厲毒アル病、瘰癧毒ノ諸症及_レ癌瘡ニ良驗アリ。是_レ酸酷澁敗ノ汚液ヲ消スルニ因_ル。凡_レ腺腫瘰癧ハ弛弱ノ腺ニ酸敗ノ粘液凝聚スル故ニ石灰水ヲ用_テ強壯ニシ粘液ヲ溶解シ酸敗毒ヲ消メ良効アリ。○服量。四_ク宛用_ル日ニ數次_ニ但_レ是ヲ製メ速ニ硝子燻ニ固封シ貯_ヘ。若_クハ臨時ニ製

スベシ。氣ニ觸レバ精微ノ藥氣消散ノ効驗ナシ。○
 外敷ノ侵蝕セズ。稍收滲シ乾燥ノ纖維ヲ強壯ニシ
 粘稠液ヲ稀釋シ。酸敗毒ヲ消シ。腐壞ヲ遏ノ。敗膿ヲ
 淨掃ス。○凡、潰瘍癰瘡等ノ纖維弛緩虛衰ノ愈難キ
 症ニ外敷スレバ筋肉充張ノ勢力ヲ生シ膿ヲ排テ
 乾愈ス故ニ乾シ愈メ害アル症ハ是ヲ禁ス。○頑固
 惡厲ノ潰瘍。失苟兒陪苦及癩樣ノ潰瘍。腐骨疽。壞疽
 等ニ蒸扇劑トシ施メ甚驗アリ。○濕ヲ乾ス効ヲ以
 テ總テ腐爛ノ潰瘍及水樣腫ヲ治ス。○癰瘡ニ注入
 ノ敗膿壞液ヲ淨刷シ新肉ヲ生ス。○稀膿ヲ稠厚ニ

スル効アリ。故ニ潰瘍。腐骨疽等ノ稀涼ノ壞液多ク
 滲漏スル症ニ施メ良膿ヲ生セシム。又粘稠ヲ稀釋
 スル効アリ故ニ粘稠液ヨリ發スル腫瘍ヲ消散ス
 ○燒酒少許ヲ加。若ハ綠礬油一二滴加寒壞疽ニ外
 敷メ腐壞ヲ遏ム。○石灰水四系ニ羯布羅精一系ヲ
 研和シ蒸扇劑トシヨク炊腫ヲ解散ス。○創ヲ愈シ
 及火傷ヲ治スルニ蒸扇劑トシ甚驗アリ。但火傷ハ
 温テ施スベシ。ヨク其炊痛ヲ消散ス。○石灰水ニ阿利
 襪油。若ハ亞麻油ヲ適宜ニ和シ。硝子壘ニ内テヨク
 振蕩スレバ技爾撒謨ノ如キ稠厚ノ液トナル。是ヲ

遠西名物考

卷三十

一海雲堂藏

布片ニ蘸シ數外敷ノ火傷及焮腫ヲ消散シ又汚液
 多ク滲漏スル潰瘍ニ捷効アリ○石灰水ヲ黃銅ノ
 器ニ内_レ置_テ銅氣出_テ美碧色トナル是ヲ取_テ潰瘍
 及小瘡疥癬若_シハ眼赤痒等ニ塗_リ或ハ礬砂少許ヲ加
 眼眵及淚多_キ症翳膜痘眼等ニ點_テ良驗アリ○石灰
 水一比_ニ分_一汞一_分若_シハ二十五_分ヲ研和スレバ黃色
 トナル是ヲ亞括_ハ瓦埵_ニ加_ト名_ク條_ニ出_ル外敷_メ
 潰瘍膿腫ノ穿蝕腐爛臭穢ノ症ヲ淨刷シ膿ヲ排_テ
 良肉ヲ生シ乾愈ス但其毒多_ク鬱蓄セル症ニ是ヲ過
 用スレバ其毒ヲノ内攻セシム○膀胱尿道ノ潰瘍

及遺精淋疾ニ水銃ヲ以テ是ヲ尿道ニ注輸シ洗藥
 トシ排膿強壯ノ良効ヲ奏ス○微毒淋ニ是ヲ以テ
 陰頭及包皮ヲ洗淨_テ預_テ下疳ヲ防_ニ尤_モ良○吉利詞
 參兒トシ直腸_ニ注輸_テ蟻蟲ニ奇効アリ
 石鹼_ニ亞_サ波_ロセ_フ蘭
 石鹼ハ亞兒加利鹽_ト油_ト合_テ煮_テ製_ス其鹽ハヨク
 油ヲ翕收シ油ハ其酷厲ナル亞兒加利鹽ヲ甘和シ
 相抱_合少_シ速_ニ粘_結凝固_シ石鹼_トナ_ルナリ○其亞
 兒加利鹽ハ鹹蓬鹽_ト剝_テ篤_ニ亞_ス酒_ト石鹽_等ヲ擇_取生石

遠正名物考 卷三十

風雲堂藏

灰ヲ加テ水ニ溶シ灰汁ト爲者ナリ○其油ハ阿利
 穢油。榛子油。胡桃油。亞麻油。大麻油。薑薑油。罌粟子油
 等ノ火氣ヲ假ラスノ搾取者ヲ擇ニ用。臭氣アリテ
 下品ナル石鹼ハ鯨油或ハ獸類ノ脂膏ヲ用テ製ス
 ○亞兒加利鹽ニ乾性ノ土質ヲ加バ其鹽中ノ酸性
 ヲ剋制ノ極テ銳烈性トナル。故ニ必是ニ石灰ヲ加
 ルナリ亞兒加利鹽。銳烈ナレハ油ト合和スルト甚
 密ニ速ニ凝固ス。鹽氣劣弱ナレバ油ト合和スレ
 疋凝固セズ。故ニ此鹽ノ強弱ハ石鹼ヲ製スル一大
 要鍵ニ特ニ注意スベキ所ナリ○多ク酸收ヲ含

ル油ハ灰汁ト和スレ疋凝固シ難シ。斯ノ如キ油ハ
 慢火ニ上水氣ヲ蒸散ノ稠厚ト爲シ用ベシ○此物
 ハ各國製法ヲ異ニシ。鹽油ノ性。分量配合ノ多少同
 カラザル故ニ其品亦一樣ナラズ○尋常ノ灰白色
 及帶黑色ノ石鹼ハ味苛烈ニ舌ヲ刺戟ス。故ニ内
 服ノ害アリ但外敷藥トシ或ハ布帛ヲ晒シ潔白
 シ或ハ衣服ヲ浣洗シ脂垢汚點等ヲ除キ或ハ毛類
 ノ粘脂ヲ去リ羅紗毛布類ヲ淨刷スルニ必用トス
 皆石鹼水水ニ溶トシ用ス。尋常ノ灰汁ニ比スレバ
 悍烈ナラスノ布帛ノ質ヲ損セズヨク汚垢ヲ去ル

尋常石鹼製法是ヲ製スルニハ先ヅ固性、亞兒加利
 鹽ヲ製スベシ。其法生石灰一比ヲ鐵壺ニ内レ精製
 ノ鹼蓬鹽一比ヲ加コレヲ以テ其上ニ被テ固封シ
 置テ石灰盡ク碎粉トナルニ至リ是ニ水一貫六百
 錢ヲ加攪セ煮ルト一時、綴布ニテ數、瀦テ澄清ノ液
 ト爲シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾固ノ鹽ト爲シ是
 ノ坩鍋ニ内レ武火ニ上セ坩通紅トナリ烟氣ナキ
 ニ至レバ其鹽烱解ス。是ヲ温タル鐵版ニ寫シ。未ダ
 全ク凝固セザル片ニ截テ小片ト爲シ温乾シタル
 硝子壘ニ收メ、端ニテ其口ヲ塗封シ貯フ。此鹽外敷
 ノ腐藥ト

シ腐肉、肝、脾、肺、肉、贅疣等ヲ侵蝕スルト極テ捷ニメ
 其効刺必斯如鳥斯、鰐、屈、斯、ト同シ。又硫氣アル金石
 類ヲ侵蝕消化ス。○右ノ亞兒加利鹽ヲ取リ、少許宛
 温湯ニ溶シ是ニ雞卵ヲ投メ、浮ムヲ度トシ其汁ヲ
 適宜ニ分チ取テ水ヲ加ヘ雞卵ヲ投メ沈ムニ至リ
 是ニ油ヲ等分ニ攪和シ慢火ニ煮テ漸ク凝結スル
 至テ餘殘ノ灰汁卵ヲ投メ油ノ三倍量ヲ取テコ
 レニ加ヘ手ヲ住メズ攪セ煮テ凝固セシメ。試ニ少
 許ヲ取テ放冷スルニ溶解セズ。水ニ溶メ油氣ヲ見
 ハス下ナキニ至レバヨク煮熟スル候トス是ニ於
 テ火ヲ下シ稍冷定ノ適意ノ錠ト爲シ風乾ス若シ

水ニ溶ノ油ヲ見ハス片ハ右ノ灰汁ヲ取テ少許宛
 加ヘ煮テ油氣ナキニ至ルベシ或ハ其石鹼ノ味酷
 烈ニ舌ヲ侵刺スルキハ油ヲ加ヘ煮テ甘和スヘ
 シ○此劑ヲ煮テ凝固シ難キハ其灰汁弱キ候トス
 故ニ少許宛灰汁ヲ加ヘ煮テ凝固スルニ至ルベシ
 ○凡ソ上好ノ石鹼ハ亞兒加利鹽純粹ニシテ油良性
 ナルヲ用ルナリ○上品ハ乾固淨潔ニシテ黄色ヲ帶
 ニ澁敗セズ粉樣ナラズ柔軟ナラズ又印記アリ勿
 搦祭亞石鹼及ビ白石鹼製法次出ツハ最上品トス氣味
 香美ニシテ甘脂ノ如シ他ノ石鹼ニ比スレバ性緩和

ニノ專テ内服藥ニ用テ...
 ○按ニ依福云勿搦祭亞石鹼及ビ按ノ白石鹼ハ
 鹹蓬鹽生石灰阿利襪油ヲ以テ製シ特ニ内服藥
 ニ用フト然バ其二品ノ性功同様ナル故ニ次ニ
 舉ル白石鹼ト勿搦祭亞石鹼ト因テ相代用スベ
 シ○按ニ勿搦祭亞石鹼舶來アリ方形長三寸
 許濶二寸餘面ニ二寸許ノ印記アリ微透亮鮮黃
 淨潔ニシテ蠟ノ如シ又一種龍動龍動ハ都府製白石
 石鹼アリ形方長ニシテ長二寸餘濶一寸三分秤
 量十四錢許面ニ一雙ノ立獅其國ノ識號ヲ圍ム

圖アリ。其下ニ西文四行ヲ印記ス。共ニ陰識ナリ。白色微黄。每個紙ニ裹シ紅條ニテ結束ス。右ノ二品共ニ佳香アリ。削レハ屑片雪白色。味毫モ舌ヲ刺戟セス。芳美ニシテ乾酪ヲ嚼カ如シ。○本邦古來未ダ石鹼ヲ製セズ。予近時次ニ舉ル技ノ製法ニ倣ヒ上好ノ石鹼ヲ割製ノ居常内服劑ニ供ス。勿擲祭亞石鹼ト異ナルナシ。但製煉家宜ク阿利襪油等ノ清稀ニシテ良性ナル油ヲ以テ製スベシ。否ザレバ性味苛烈ニシテ内服藥ニ用難シ。○又按ニ本邦藥舖ニ尋常舶來ノ石鹼二品アリ。角樣

ト稱スル者ハ方形五六寸許白色光澤アリ。丸樣ト呼ブ者ハ灰白色ニシテ光澤ナシ。角樣ニ比スレバ下品トス。但ニ品共ニ味發多ク舌ヲ侵刺シ鹽氣多ク。白色ノ沙土ヲ雜ヘ久ク貯セバ鹽氣又生ス。故ニ内服藥ニ用ス。○
白石鹼 ガボメデカ左ス ウイソテキ
製法 生石灰 各四批
 右鹼蓬鹽晶ト生石灰ヲ攪セ水ヲ加シ煮テ布片ヲ

以テ瀝テ渣ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ静定メ壘
 ヲ去リ此灰汁ヲ慢火ニ上テ水氣ヲ減熬シ試ニ此
 液ヲ分テ取リ水六ヲ容ル量器ニ盛テ重サ八ヲ
 トナルヲ度シ灰汁ノ量水ニ比ス火ヲ下シ冷定メ
 磁鍋ニ内レ冷處ニ於テ左ノ油ヲ加フ

阿利襪油

新鮮上好者
 灰汁ノ一倍

右木棍ニテ手ヲ住メズ攪セテ混和セシメ漸ク凝
 結スルヲ候ヒ扁キ木型ニ寫シ凝固スルニ至テ取
 出シ適宜ノ截片トシ冷處ニ貯フ

主治性温是油質ト亞兒加利鹽ト抱合融和シ成ル

ト雖モ多ク亞兒加利鹽ノ効用ヲ爲ス但油質ヲ以
 テ其鹽ノ酷厲質生石灰ヲ以テ鹹蓬鹽ノ亞兒加利
刺激性ヲ扶テ大ニ酷烈ナラシム
 包攝メ其刺戟ノ性ヲ抑制スル故ニ是ヲ内服ノ侵
 蝕セズ且體中ノ油膩脂膏ト交和シ亞兒加利鹽ヲ
 啓導メ其効力ヲ逞發セシメ諸器脉管ニ牢著セル
 膠粘凝汚ヲ溶釋メ淨掃ス故ニ一切粘稠凝結ノ病
 毒ヲ疏解シ堅硬ヲ軟化スル要藥トス○酸敗液乳
 糜乳汁等胃中ニ凝滯メ發スル諸症ニ用ルバ其亞
 兒加利鹽ヲ以テ酸敗毒ヲ消シ膠粘ノ汚物ヲ溶解
 ヲ滌除ス殊ニ薄弱ノ小兒ハ乳汁胃中ニ停滯メ酸

敗シ其毒胃腸ヲ侵刺ノ腹痛吐乳搐搦等ヲ發ス此
 症ハ石鹼十五瓦若ハ二十瓦ヲ適宜ノ飲液ニ溶シ
 毎日用テ殊効アリ○凡シ小兒ノ腹痛痞脹便秘等
 多クハ酸敗液ヨリ發スル故ニ此藥良効アリ茴香
 水其他芳香ノ露水ニ溶シ用テ尤良○酸敗液腸中
 ニ鬱積ヲ發スル諸症ハ石鹼ヲ吉利詞參兒トシ施
 ノ良○此藥ハ肺肝脾腸間膜等ノ内部諸器及ヒ諸
 腺ノ頑固ナル壅塞凝結硬腫ヲ疏解シ治スル要藥
 トス大黃若ハ越謨安沒尼亞幾沒藥瓦爾拔奴謨等
 ノ解凝藥及ヒ苦味ノ越幾斯劑健實亞那瑪葛爾儒等ノ越

幾斯劑ヲ云ヲ加テ殊ニ良○石鹼ニ越謨安沒尼亞幾海
 葱ヲ加頑固ノ諸病ニ用テ治驗多シ即チ短氣喘息
 經久愈ス或ハ荏苒タル黃疸或ハ胸腹諸器壅塞硬
 結シ膠粘液凝固ノ諸脉管ニ壅塞シ神經液ノ融活
 順運ヲ阻遏スルヨリ發スル諸病ニ奇効アリ又驅
 水ノ偉効アルヲ以テ肝脾等壅塞ノ依剝昆垤兒ノ
 症アル水腫ニ尤驗アリ依剝昆垤兒ハ上腹ノ兩側
即チ重訂内科撰要第六十九章ニ出此藥品皆纖維諸管ニ鑽透シ膠粘
 液ヲ稀釋シ汚滯ヲ淨掃スルノ峻効アレバナリ即
 左ノ方尤良

護謨解凝丸

白石鹼 三錢

護謨安沒尼亞幾末 二錢

海葱末 一錢 若海葱缺ルハ同量ノシ

舍利別 適宜

右研和ノ丸藥トシ十二日ヨリ一月マデ一服トシ

朝夕一服宛用フ○痙攣ノ運動ヨリ胃痛ヲ發シ一

處ニ頑滯ノ轉移セザル症ハ左ノ劑奇効アリ

石鹼解凝丸

石鹼 四錢

失鳩答越幾斯劑 二錢

越扶屋布斯安質沒扭 一錢 水銀ノ條ニ出

瓦爾拔奴謨

牛膽 各半錢

右三氏ヲ一丸トシ四丸宛用ル一日ニ四次○萎黃

病様ノ諸症ニ石鹼半錢若ハ一錢宛毎日一兩上用

テ良驗アリ其朱性ノ粘稠液ヲ溶解ノ小便ニ利ス

○痛風傷冷毒ノ劇痛スル症ニ毎日三錢マデ用テ

大効アリ其痛極テ劇キ者ハ雙鸞菊越幾斯劑ト阿

芙蓉ヲ加用ヒ或ハ水銀劑其他解凝劑ヲ加ヘ用テ

峻効アリ。假令バ左ノ方ニ如シ

鹼硫丸

石鹼

的列

越扶

金硫黄

右三氏ヲ一丸トシ。朝夕十丸宛用フ。或ハ石鹼。越護

安没尼亞幾。孕鹼酒石ヲ丸藥トシ用ルモ良。患者粘

稠液多ク。若ハ胃腸ニ酸敗液アル症ハ右ノ諸劑殊

ニ驗アリ。○傷冷毒及ビ痛風ノ熱解散ノ其痛減セ

ス遊走スル症ハ石鹼ヲ丸藥トシ毎朝日中夜分ニ

半錢若ハ一錢宛薩撒弗刺斯。白檀。甘草ノ泡劑ニテ

送下ノ殊効アリ。○膽管ニ結石生ノ梗塞シ。膽液逆

流ノ血中ニ泛濫シ黃疸ヲ發スル者甚ク多シ。其候。

腹ノ右邊疼痛其症等ナリ。此症ハ石鹼ニ大黃ヲ加

テ服量多ク用ヒ。温湯若ハ乳汁ニテ頻ニ患部ヲ蒸

湯ス。其結石溶解シ自ラ大便ニ通利シ回復ス

○血液。淤衝甚ク。若ハ神經ノ感觸甚ク。纖維諸管。強

硬乾燥。以テ壅塞スルヨリ黃疸ヲ發スル者亦少カラ

ス。粘液壅塞ノ症。此症ハ石鹼ノ如キ熱性衝動ノ藥

ハ害アリ。宜ク答末林度。酒石英蘆根等ノ清涼解凝
ノ藥ヲ的當トス。○小便ノ質ニ酸敗毒アルヨリ腎
痛結石ヲ生シ。若ハ小便ニ沙石ヲ通泄ノ淋痛スル
症ハ石鹼三錢宛。毎日用テ結石ヲ溶解シ治ス。○石
鹼ハ酷厲毒ヲ解ス。殊ニ升汞。礬石等ノ毒ヲ解スル
効アリ。○凡ソ壯熱熾衝ノ諸病。及ビ諸失血ヲ患ル
者ニ是ヲ用レバ其病勢ヲ增長ス。又是ヲ久服スレ
バ飲食消化ノ機力ヲ害ス。○往古ハ以爲ク此藥ノ
解凝ノ効諸藥ニ超過シ諸壅塞頑固ノ病ニ久服セ
シメテ内部ニ膠著セル粘液汚物ヲ溶解スルニ宛

モ皮上ノ粘臍脂垢ヲ淨刷スルカ如シト然レ是附
會ノ臆説トス。此藥亦唯其亞兒加利鹽ヲ以テ纖維
諸管ヲ衝動ノ其運營ヲ増發シ是ヲ凝滯牢著セル
粘液ヲ推盪運輸シ驅除スルニ因ル。○尋常ノ石鹼
ハ勿擲祭亞石鹼及ビ白石鹼ニ比スレバ更ニ酷烈
ナル故ニ多ク琶布及ビ蒸湯劑等ノ外敷藥トス。大
抵琶布若ハ藥草三多ニ石鹼四錢或ハ一多許ヲ加
施スベシ。○外敷ノ解凝消散ノ峻藥トス。粘稠液ヲ
解キ酸敗液ヲ消シ堅硬ヲ軟化ス。○燒酒ニ溶シ琶
布トシ貼シ傷冷毒痛。臈股痛。脚痛。硬結塊腫等ヲ消

散スルニ殊効アリ ○失鳩答ヲ加ヘ乳房結核關節
塊腫脚痛ニ貼ノ良驗ヲ稱ス ○乳汁ニ溶シ蒸湯劑
トシ堅硬腫瘰癧腺腫ニ施メ消散ス ○温乳汁若ハ
迷迭香精ニ溶シ或ハ乳汁ヲ加テ罽布トシ若ハ膏
藥ノ如クシ諸瘡瘍ニ貼メ弛緩軟化シ腐穢潰爛メ
膿瘍疥癬等ニ貼メ膿ヲ排泄メ扶ケ淨刷ス ○乳汁
粘液類油類ニ溶シ施セバ緩和メ効メ爲シ又其劑
メ之酸敗セザラシム ○的列底那油燒酒メ適宜
ニ加ヘ寒腫及ヒ汚液滲漏メ止ガル瘡瘍メ施メ疏
散シ治ス ○小兒ノ大便閉ニ坐藥トシ施メヨク通

利ス

石鹼膏

「エムプラスト」ガホ子ス羅
セ「フ」フレイス「テル」蘭

製法

密陀僧 三比

黃蠟 六多

白石鹼 三比

右文火ニ上セ烱解メ煉和シ火ヲ下シ稍冷ルヲ候

ヒ龍腦四錢ニ阿利襪油少許ヲ研和メ本劑ニ煉和

シ硬膏ト爲ス

又法

若把兒麻膏 三比

白石鹼 細末 六多

龍腦 六錢

右若把兒麻膏ヲ文火ニ上テ煇シ。石鹼ヲ下シ。水少許ヲ加ヘ煉熬ノ硬膏ト爲シ。火ヲ下シ冷ルヲ候ヒ龍腦ニ油少許ヲ研合シ。本劑ニ加テ煉和ス。

主治 外敷ノ解凝消散ノ良藥トス。疼痛ヲ止メ。酸敗毒ヲ消シ。膜瘤。乳房結核或ハ頑硬腺腫。韌帶硬腫。或ハ肢節拘直。攣急或ハ關節強痛。屈伸シ難ク或ハ痛風。遊走痛ヲ消散ス。

石鹼軟膏

製法 石鹼 三匁

龍腦 一錢

迷迭香精 十二匁

右研和シ軟膏トス。

主治 外敷ノ傷冷毒痛。一切肢節痛。痲不遂。凍瘡等ヲ

治ス。

又法 石鹼 一匁

的列並底那油 二匁

剥篤亞斯 三匁

右研和ス

主治 溶解疏散ノ捷効アリ。肢節強直。硬強。牽痛。打撲

傷等ニ一ヲ水ニ溶シ一時毎ニ患部ニ擦テ捷効アリ底

舍利別

セイロプス羅「セイロプス」
ホウダヘシ「ホウダヘ」
蘭

製法

砂糖淨白者 八比
沸湯 四比

右調和シ文火ニ上テ烱化シ。瀝過ノ渣ヲ去リ。煮テ蜜ノ稠ト爲ス技

主治 急迫ヲ甘メ。枯燥ヲ潤シ。粘痰ヲ豁ノ吐シ易カラシメ。嗽ヲ治ス。又諸藥ニ加テ甘美ニシ。服シ易

カラシム疾

石長生 舍利別

ゼイロプス。カピルルス。ヘ子リス。羅

製法

石長生 莖葉剉者 一比

甘草

剉者 二比

砂糖

四比

右石長生。甘草ニ適宜ノ沸湯ヲ加ヘ浸ス。一晝夜。瀝テ滓ヲ去リ砂糖ヲ溶化シ。又瀝テ液ヲ取り。煮テ舍利別ノ稠ト爲ス

主治

胸中ヲ開利シ。擊急ヲ甘メ。粘痰ヲ稀豁ノ吐シ

易カラシメ。咳嗽。喘急。冒寒傷冷毒ノ諸症ヲ治シ。沸湯ニ攪和シ服ノ汗ヲ發シ小便ヲ利ス 疾

接骨木傑列 ゲレ コップ。サム。ビス。ス。羅。ゲレ。イ。ハン。フ。リル。又。ゴン。セル。フ。ハン。フリル。蘭。

製法 接骨木子ヲ適宜ニ取り搗爛シ。水少許ヲ加

慢火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ。徐クニ煮ル。四分時

ニノ篩ニ内レ。温ニ乘ノ押シ絞リ濾シ。其汁十五弓

ニ淨白ノ沙糖三弓ヲ和シ。速ニ煮沸セシメテ浮沫

ヲ抄ヒ去リ。火ヲ下セバ即チ傑列乙ノ稠トナル。是

丸磁壺ニ收メ貯フ 技

主治 輕キ發汗ノ良劑トス。凡ソ熱病。傷冷毒等ニ劇

キ發汗劑ヲ用レバ血液ノ運行ヲ衝動シ。壯熱。焮衝

ヲ發スベキ症ニ此劑四錢ヨリ三弓マデ與レバ其

熱ヲ増發セズ。蒸氣及ビ汗ヲ發ノ少モ害ナシ。又肺

ノ攣急ヲ緩解シ。胸中ノ粘痰ヲ疏豁シ。大小便ヲ利

ス。○熱病。膽液腐敗ノ諸症。疫熱。羅斯。痘瘡。麻疹。焮衝

病。胸脇痛等ニ用テ血液ノ沸騰ヲ鎮メ。清涼緩和鎮

痛ノ良効アリ 疾 叔 過

接骨木昆設爾弗 コンセルフ 接骨木傑列乙ト同シ

接骨木水 **製法** 薄荷水ニ條ニ出ツ

レバ殊ニ狭ク長クメ尖レリ。此亦藥用トセズ。○右ノ如ク葉形ニ隨テ上下品ヲ分ツ故ニ葉形全ク破碎セザルヲ擇ムベシ

○榕按ニ地滅門草。略旃那ニ似タレ。葉大ク柔薄ニノ味淡。不佳。氣ナク莢ヲ結バズ。角ヲ生シ大小指ノ如ク直ニノ彎ラズ。圓クノ扁ナラズ。核扁ニノ葡萄核ノ如クナラズ。其葉少モ瀉下ノ効ナシ。角ハ圓長ニノ裏ニ縱隔膜及臍帶アリ。莢ハ匾長ニノ縱隔膜及臍帶ナシ。是其分別ナリ。

○旃那和漢產未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用ベシ

主治 性平。瀉下ノ良藥トス。効力大黃ノ如クニノ腹

瀉ヲ發セズ。且瀉下後便秘ノ患ナシ。○揮發鹽及ヒ華爾斯質刺戟ノ瀉下シ。粘液酸敗液酷厲ナル。勿シ等ノ鬱蓄スルヲ滌除シ。胃腸ヲ害セズ。劇疾緩病ニ用テ妨ゲズ。○膽液熱紫斑熱ノ如キ連綿タル瀉下ヲ要スル病ニ尤良。○粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解スル効アル故ニ水腫停水及ビ膽液質ノ敗液ヲ瀉下シ。藥性酷厲ナラザル故ニ老人虛人孕婦ニ用テ害ナシ。小兒ハ此細末ヲ舍利別。若ハ砂糖ニ和シ與テ服シ易シ。○大便閉ノ諸症及留飲停水等ハ左ノ劑殊効アリ。曰ク瀉下ノ清涼シ腹痛ヲ發スルヲ大

シ。故ニ大便閉ニ諸、焮衝。替留熱。咽喉焮腫痔痛等ヲ
兼ルニ用テ亦的効アリ。此藥又胃弱胃不消化等ノ
[旃那煎] 一匕 或ハ水ニ合テ飲スルニ亦効アリ。此藥
下ニ旃那 四錢 又ハ水ニ合テ飲スルニ亦効アリ。此藥
又ハ酒石英 三錢 又ハ水ニ合テ飲スルニ亦効アリ。此藥
下ニ益智 二錢 又ハ水ニ合テ飲スルニ亦効アリ。此藥
一匕 水 一匕 又ハ水ニ合テ飲スルニ亦効アリ。此藥
右煮沸スルヲ候七火ヲ下シ稍冷ルニ至リ滓ヲ去
リ三弓宛服ス。○大便閉及瘧氣鬱滯ノ症ニ旃那丁
幾去爾良驗アリ。或ハ是ヲ葡萄酒ニ加服ス瘧瘵ノ

運動。寒粘液。酸敗液。等ヨリ發スル胃痛。疝痛ヲ治ス

旃那丁幾去爾

旃那葉 四弓


葛縷子 半錢

益智 十片

乾葡萄 四錢

燒酒 一匕

右浸藥氣ヲ出シ。漚テ滓ヲ去リ。分テ四服トス。○
又右ノ旃那煎一匕ニ旃那丁幾去爾二弓ヲ合和シ
用テ前說ノ諸症ニ甚ダ驗アリ。○壯熱病。膽液熱。發



斑熱タマ答末林度マリンヲ加良驗アリ。左ノ方モ亦良

旃那涼解飲

旃那 二錢半 生鮮ノ黄皮 四片

枸橼汁 二錢 沸湯 七片

右調和シテ微火ニ上セ藥氣ヲ出シ。瀝コシテ滓ヲ去リ。次

ノ藥ヲ加フ 十八

覆盆舍利別

右調和シテ半時毎ニ一小茶碗ヲ與フ○旃那ニ中和

鹽ニ石鹼質驅風ノ藥ヲ加ヘ瀉下ノ効ヲ扶テ尤良。假

令シテ左ノ方ノ如クニ事ニトシテス 胃ノ氣ヲ入

孕驗旃那飲

旃那葉 三錢 孕驗酒石

胡荽子 各二錢

右水適宜ニ加ヘ浸シノ藥氣ヲ出シ。瀝コシテ其液一匕ヲ

取リ次ノ藥ヲ加フ○ハハノ藥ノ氣ヲ入

薄荷舍利別 一多半 甘消石精 四片

右攪和シ半時毎ニ二匙宛用テ瀉下スルヲ度トス

旃那ヲ服ノ嘔氣ヲ發スル者ハ甘消石精ヲ用テ速

ニ治ス○旃那ニ茴香消石ヲ加ヘ泡劑トシ鼓脹ノ

便秘ニ殊効アリ○神經ノ感動シ易キ人ハ大黃ヲ

用テ腹痛昏眩スルコトアレハ旃那ハ其患ナシ。但一
頓ニ多ク服スレバ腹痛スルコトアリ。然レ水煎及泡
劑トスレバ其揮發鹽及華爾斯質。耗散スル故ニ其
害ナシ。但香竄藥ヲ加ヘ用レバ殊ニ良○服量一錢
ヨリ一錢半許。泡劑若ハ水煎トシ用フ。但一頓ニ多
服スレバ嘔氣ヲ發ス○凡ソ熱性ノ病便秘ノ症ハ
二三錢ヲ取り香竄驅風ノ藥ヲ加ヘ沸湯六多許ヲ
以テ泡劑若ハ煎劑トシ用フ或云濃煎スレバ粘稠
トナル故ニ泡劑トス
ルヲ良トス○峻下ノ劑ヲ忌ム症ハ半錢若ハ一錢ヲ泡
劑トシ用テ良或ハ酒石英一二錢。滿那一多若ハ大

黄ヲ加ルモ良○散劑ハ半錢ヨリ一錢許用フ○或
云莢及ビ葉柄ヲ雜ヘ用レバ腹痛ヲ發スト。然レ是
ヲ試ルニ否ラズ。効力。葉ト同シ。故ニ是ヲ雜ヘ用ル
モ害ナシ○旃那ノ華爾斯質ハ刺戟ノ性アル故ニ
壯熱焮衝ノ諸症ニハ清涼藥ヲ加ヘ。失血過多ノ症
ハ緩和劑ヲ加テ尤モ良叔叔福
物依伍○旃那越幾斯劑製法蒲公英越幾斯劑ト同シ○此
劑一錢ヲ服メヨク瀉下ス。末ニテ用ルト同シ。丸藥
トシ若ハ飲液ニ溶シ用ルニ尤モ簡便トス依疾

旃那舍利別

本草綱目卷之三十一 旃那 三十一

旃那葉 八多 沙糖 淨白者 三北

沸湯 四北

右旃那ヲ沸湯ニ浸ス下一時絞リ瀝シ其液ヲ靜定
ノ塗ヲ去リ沙糖ヲ加ヘ文火ニ煮テ舍利別ノ稠ト
爲ス〔按〕此劑甘美ニノ服シ易クヨク大便ヲ通利
ス感動甚キ症及ビ小兒ニ用テ良〔疾〕

舍謨字黠謨シムベイ 羅ハ コンソリダマヨルル羅

〔形狀〕此草莖二三尺許太サ指ノ如ク毛茸アリテ粗
糙中虛線稜アリ數枝ヲ分ツ葉ハ根ヨリ生シ又莖

枝ニ著ソテ互生シ葉柄ナシ長潤ニメ末尖リ黯綠色
土木香葉ニ似テ皺及ビ毛茸アリ手ニ觸レバ刺ガ
如クニメ柔ナリ邊平等ナラズ夏月莖枝ノ梢ニ數
花簇生ノ穗ヲ爲シ懸垂ス筒様ニメ鐸ノ如シ單瓣
ニメ五刻缺アリ或云本末窄クノ中差潤シ或云未
ハ莖枝梢ノ偏面 開ノ時ハ形ヲ蝎尾ノ如シ或云花
ニ著テ懸垂ス 黯赤或ハ白色或ハ紫赤青等ノ變
色アリ或ハ稀ニ黃色アリ五鬚蕊アリテ短ク未尖
テ白シ一心蕊萼底ヨリ生シ其色花ト同シ花謝ノ
心蕊萼底ニ残り其本ニ黯灰色滑澤ナル四ノ小子
生ス萼筒様粗糙深ク缺裂シ尖テ刺ノ如シ根外面

黒、裏肉白色。太サ指ノ如ク長クノ枝極ヲ分ツ。膠様
 ノ粘汁多シ。香氣ナク味淡ニノ粘著ス或云根白色
ナレバ赤色ヲ帶ブ①一種。莖短ク葉小ク花黄色ニ
 根塊節様ノ者アリ②此草叢林陰地水邊濕土ニ自
 ラ繁茂シ。礫确瘠地ト雖モヨク長ス。或ハ春月種ヲ
 下シ或ハ根ヲ分チ培植ス
 ③按ニ依福云。此草粘汁多ク殊ニ根ニ多シ。過爾
 託亞根ノ粘汁ノ如クニ微收瀦ス。性功大抵過
 爾託亞及ヒ葵根ノ如シト。代用ノ可ナリ④榕按
 ⑤鰓夷ニ産スルエライバズシト名ル草殆ト是

ニ近シ又按ニ此草略地黄ニ似テ異ナリ。地黄ノ
 生根黄色ニノ少モ膠粘ノ汁ナシ。其他充當セザ
 ルト右ノ譯説ニ就テ知ルベシ

主治 根ヲ用フ。性涼。滋潤。緩和。收瀦ス。○粘稠ノ質ヲ
 以テ稀涼ノ血液ヲ稠厚ニシ。酷厲液ヲ甘和シ。枯燥
 ヲ滋潤シ。急迫ヲ寛解ス。○血液ノ酷厲ナルヨリ發
 スル諸失血。殊ニ吐血ニ良効ヲ奏ス。○下利。赤痢。痔
 血。崩漏。尿血。膀胱潰瘍。血淋。痔痛。脫肛。或ハ痛風。關節
 痛ヲ治ス。血液ニ酷厲毒ノレバ侵刺ノ疼痛ヲ發シ
各部ニ壅滯ノ瘡瘍ヲ發シ。熱病ニ在テハ腐○乾欬
敗ヲ爲シ。肺ニ在テハ欬嗽ヲ發スル等ナリ

