

萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

農政全書

(九)
徐光啓著

商務印書館發行



農政全書

(九)

徐光啓著

國學基本叢書

農政全書卷之四十九

明特選光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士曠少保謹文定上海徐光啟纂輯
明欽天總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國祚鑒定

荒政

採周憲王救荒本草

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

草部

葉可食

山梗菜



山梗菜 生鄭州賈峪山山野中。苗高二尺許莖淡紫色葉似桃葉而短小又似柳葉菜葉亦小。稍間開淡紫花其葉味甜。

救飢 採嫩葉燂熟淘洗淨油鹽調食。

狗掉尾苗



狗掉尾苗 生南陽府馬鞍山中。苗長二三尺，莖蔓而生，莖方色青，其葉似莧，葉稍大而尖，顏色深綠，紋脉微多。又似狗筋蔓葉，稍間開五瓣小白花，黃心，眾花攢開，其狀如穗，葉味微酸。

救飢 採嫩葉，燂水浸去酸味，淘淨，油鹽調食。

石

芥



石芥 生輝縣鴉子口山谷中苗高一二尺葉似地棠菜葉而闊短每三葉或五葉叢生一處開淡黃花結黑子苗葉味苦微辣。


救飢 採嫩葉焯熟換水浸去苦味油鹽調食。

獮耳菜



獮耳菜 生中華平野中苗長尺餘莖多枝叉其莖上有細線楞葉似竹葉而短小亦軟又似篇蓄葉卻頗闊大而又尖莖葉俱有微毛開小點白花結細灰青子苗葉味甘
救飢 採嫩苗葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

回回蒜



回回蒜 一名水胡椒。又名蠍虎草。生水邊下濕地。苗高一尺許。葉似野艾蒿而硬。又甚花。又似前胡葉頗大。亦多花。又莖稍頭。開五瓣黃花。結穗如初生桑椹子而小。又似初生蒼耳實亦小。色青味極辛辣。其葉味甜。

救飢 採葉焯熟換水浸淘淨。油鹽調食。子可擣爛調菜用。

地槐菜



地槐菜 一名小蟲兒麥。生荒野中。苗高四五寸。葉似石竹子。葉極細短。開小黃白花。結小黑子。其葉味甜。

救飢 採葉燙熟水浸淘淨油鹽調食。

螺 屢 兒



螺屢兒 一名地桑。又名痴見草。生荒野中。莖微紅。葉似野人莧葉。微長窄而尖。開花作赤色。小細穗兒。其葉味甘。

救飢 採苗葉燥熟。水浸淘去邪味。油鹽調食。

治病 今人傳說治癆疾。採苗用水煮服。甚效。

泥胡菜



泥胡菜 生田野中。苗高一二尺，莖梗繁多。葉似水芥菜葉，頗大，花又甚深，又似風花菜葉，卻比短小。葉中攢萼，分生莖叉，稍間開淡紫花，似刺薺花。苗葉味辣，可食。採嫩苗葉，燂熟水浸淘淨，油鹽調食。

免兒絲



免兒絲 生田野中。其苗就地拖蔓節間生葉。如指頂大。葉邊似雲頭樣。小黃花。苗葉味甜。
救飢 採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

老 鶴 筋



老鶴筋 生田野中就地拖秧而生莖微紫色莖叉繁稠葉似圓葵葉而頭不尖又似野胡蘿蔔葉而短小葉間開五瓣小黃花味甜。

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸去邪味淘洗淨油鹽調食。

綾股藍



綾股藍 生田野中。延蔓而生葉似小藍葉短小軟薄邊有鋸齒。又似痢見草葉亦軟凌綠五葉攢生一處。開小花黃色。又有開白花者。結子如豌豆大。生則青色。熟則紫黑色。葉味甜。救飢。採葉焯熟水浸去邪味。涎沫。淘洗淨油鹽調食。

蒿 娘 捕



捕娘蒿 生田野中。苗高二尺許。莖似黃蒿莖。其葉碎小。茸細如針。色頗黃綠。嫩則可食。老則爲柴。苗葉味甜。

救飢 採嫩苗葉。熟換水浸淘去蒿氣。油鹽調食。

難 腸 菜



難腸菜 生南陽府馬鞍山荒野中。苗高二尺許。莖方色紫。其葉對生。葉似菱葉樣而無花
叉。又似小灰菜葉形樣微圓。開粉紅花。結碗子蒴兒。葉味甜。
救飢 採苗葉燂熟。水淘淨。油鹽調食。

水 胡 蘆 苗



水胡蘆苗 生水邊就地拖蔓而生。每節間開四葉。而葉如指頭大。其葉尖上皆作三叉味。
甜
救飢 採嫩秧連葉燂熟。水浸淘淨。油鹽調食。

胡 蒼 耳



胡蒼耳 又名回回蒼耳。生田野中。葉似皂莢葉。微長大。又似望江南葉。而小。頗硬。色微淡綠。莖有線楞。結實如蒼耳實。但長角。味微苦。

救飢 採嫩苗葉爛熟。水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。

治病 今人傳說治諸般瘡。採葉用好酒熬喫。消腫。

水棘針苗



水棘針苗 又名山油子。生田野中。苗高一二尺。莖方四楞。對分莖叉。葉亦對生。其葉似荆葉而軟。鋸齒尖葉。莖葉紫綠。開小紫碧花。葉味辛辣微甜。救飢。採苗葉爛熟。水淘洗淨。油鹽調食。

沙蓬



沙蓬 又名雞爪菜。生田野中。苗高一尺餘。初就地上蔓生。後分莖叉。其莖有細線楞。葉似獨掃葉狹窄而厚。又似石竹子葉亦窄。莖葉稍間結小青子。小如粟粒。其葉味甘。性溫。

救飢


採苗葉熟水浸淘淨。油鹽調食。

麥藍菜



麥藍菜 生田野中。莖葉俱深藍色。葉似大藍稍葉而小。頗尖。其葉抱莖對生。每一葉間
攢生一叉。莖叉稍頭開小肉紅花。結蒴有子。似小桃紅子。苗葉味微苦。
救飢 採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

女
妻
菜



女妻菜 生密縣韶華山山谷中苗高一二尺莖又相對分生葉似蕷旋花葉頗矩色微深綠
葉對生稍間出青苔萎開花微吐白菜結實青子如枸杞微小其葉味苦
救飢 採嫩苗葉燥熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食

委陵菜 委陵菜



委陵菜 一名翻白菜生田野中苗初掲地生後分莖叉莖節稠密上有白毛葉彷彿類柏葉而極闊大邊如鋸齒形面青背白又似雞腿兒葉而卻窄又類鹿葥葉亦窄莖葉稍間開五瓣黃花其葉味苦微辣

救飢 採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食


獨行菜



獨行菜 又名麥楷菜。生田野中。科苗高一尺許。葉似水棘針葉。微短小。又似水蘇子葉。亦短小狹窄。作瓦籬樣。稍出細莖。開小繁白花。結小青蓇葖。小如菜豆粒。葉味甜。
救飢。採嫩苗葉炒熟。換水淘淨。油鹽調食。

山

蓼



山蓼 生密縣山野間苗高二三尺葉似芍藥葉而長細窄。又似野菊花葉而硬厚又似水

胡椒葉亦硬開碎瓣白花其葉味微辣。

救飢 採嫩葉燥熟換水浸去辣氣作成黃色淘洗淨油鹽調食。

葛

公

菜



葛公菜 生密縣韶華山山谷間。苗高二三尺。莖方空而四棱，對分莖叉。葉方對生，葉似蘇子葉而小。又似荳子葉而大。稍間開粉紅花，結子如小米粒而茶褐色。其葉味甜微苦。救飢。採葉焯熟水浸去苦味，換水淘淨，油鹽調食。



鯽魚鱗 生密縣韶華山山野中。苗高一二尺莖方而茶褐色對分莖叉葉亦對生葉似雞腸菜葉頗大又似桔梗葉而微軟薄葉面微絞皺稍間開粉紅花結子如小粟粒而茶褐色其葉味甜。

救飢 採葉燥熟水浸淘淨油鹽調食。


尖刀兒苗



尖刀兒苗 生密縣梁家衝山野中。苗高二三尺。葉似細柳葉。硬而細長而尖。葉皆兩兩拗
音。莖對葉生。間開淡黃花。結尖角兒。長二寸許。蕊如蘿蔔角。中有白穰及小圓黑子。其葉味甘。

救飢 採葉焯水淘淨。油鹽調食。

珍 珠 菜



珍珠菜 生密縣山野中。苗高二尺許莖似萬稈，微帶紅色。其葉狀似柳葉而極細小，又似地梢瓜葉。頭出穗狀，類鼠尾草穗，開白花，結子小如菉豆，粒黃褐色。葉味苦澀，可救飢。採葉燂熟，換水浸去澀味，淘淨，油鹽調食。

杜當歸



杜當歸 生密縣山野中。其莖圓而有線。葉似山芹菜葉而硬。邊有細鋸齒刺。又似蒼朮葉而大。每三葉攢生一處。開黃花根似前胡根。又似野胡蘿蔔根。其葉味甜。救飢。採葉爛熟水浸成黃色。換水淘洗淨。油鹽調食。治病。今人遇當歸缺。以此藥代之。

薔

蘡




薔蘡音牆又名刺蘡。今處處有之。生荒野崗嶺間。人家園圃中亦栽。科條青色。莖上多刺。葉似椒葉而長。鋸齒又細。背頗白。開紅白花。亦有千葉者。味甜淡。

救飢。採芽葉。炒熟。換水浸淘淨。油鹽調食。

風

菜



風輪菜 生密縣山野中。苗高二尺餘。方莖四楞。色淡綠。微白。葉似荏子葉而小。又似靈仙葉。微寬。邊有鋸齒。兩葉對生。而葉節間又生子葉。極小。四葉相攢對生。開淡粉紅花。其葉味苦。

救飢 採葉燥熟。水浸去邪味。淘洗淨。油鹽調食。

拖

白

練

苗



拖白練苗 生田野中。苗塌地生葉似垂盆草葉而又小葉間開小白花。結細黃子。其葉味甜。

救飢 採苗葉爛熟油鹽調食。

酸

桶

筍



酸桶筍 生密縣韶華山。山間邊初發筍葉其後分生莖叉科苗高四五尺莖稈似水葷莖而紅赤色其葉似白槿葉而澀又似山格刺葉葉亦澀紋脉亦龐味甘微酸。

救飢 採嫩筍葉焯熟水浸去邪味淘淨油鹽調食。

鹿蕨菜



鹿蕨菜 生輝縣山野中苗高一尺許其葉之莖背圓而面窪五化切葉似紫香蒿腳葉而肥
闊頗硬又似胡蘿蔔葉亦肥硬味甜。

救飢 採苗葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

山

芹

菜



山芹菜 生輝縣山野間。苗高一尺餘。葉似野蜀葵。葉稍大而有五叉。又似地牡丹葉亦大。葉中攢生莖叉。稍結刺毬。如鼠粘子刺毬而小。開花點白色。葉味甘。

救飢 採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

金

剛

刺



金剛刺 又名老君鬚。生輝縣鴉子口山野間。科條高三四尺。條似刺蘆。音梅花條。其上多刺葉似牛尾菜葉。又似龍鬚菜葉。比此二葉俱大。葉間生細絲蔓。其葉味甘。

救飢 採葉爛熟水浸淘淨油鹽調食。

柳

葉

菜



柳葉菜 生中半荒野中。科苗高二尺餘。莖似蒿草。葉似柳葉而短。掃莖而生。開小白花。銀
褐心。其葉味微辛。

救飢 採嫩葉燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。



大蓬蒿 生密縣山野中莖似黃蒿葉色微帶紫葉似山芥菜葉而長大極多花又似風
花菜葉亦多又似漏蘆葉卻微短開碎瓣黃花苗葉味苦。
救飢 採葉焯熟水浸淘去苦味油鹽調食。

狗

蔓

筋



狗筋蔓 生中牟縣沙崗間。小科就地拖蔓。生葉似狗掉尾葉而短小。又似月芽菜葉微尖。
鞘而軟亦多紋脈。兩葉對生。稍間開白花。其葉味苦。

救飢 採葉焯水浸淘去苦味。油鹽調食。

農政全書卷之四十九

終

農政全書卷之五十

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯
明欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫順天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定


直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒定

荒政

救荒本草

草部 ○ 葉可食

花蒿



花蒿 生荒野中。苗葉就地叢生。葉長三四寸。四散分垂。葉似獨掃葉而長硬。其頭頗齊。微有毛。滋味微辛。

救飢 採葉焯熟。水浸淘淨。油鹽調食。

兔兒

兒

傘



兔兒傘 生榮陽塔兒山荒野中。其苗高二三尺許。每科初生一莖。莖端生葉一層。有七八葉。每葉分作四叉。排生如傘蓋狀。故以爲名。後於葉間擢生莖叉。上開淡紅白花。根似牛膝而疎短味苦微辛。

救飢採嫩葉爛熟換水浸淘去苦味油鹽調食。

地

花

菜



地花菜 又名穢頭灰。生密縣山野中。苗高尺餘。葉似野菊花葉而窄細。又似鼠尾草葉亦瘦
細。稍葉間開五瓣小黃花。其葉味微苦。

救飢 採葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食。

杓兒菜



杓兒菜 生密縣山野中。苗高一二尺。葉類狗掉尾葉而窄頸長。黑綠色。微有毛澤。又似耐驚
菜葉而小軟薄。稍葉更小。開碎瓣淡黃白花。其葉味苦。
救飢 採葉焯熟。水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

佛

指

甲



佛指甲 生密縣山谷中。科苗高一二尺。莖微帶赤黃色。其葉淡綠。背皆微帶白色。葉如長匙頭樣。似黑豆葉而微寬。又似鷺兒腸葉甚大。皆兩葉對生。開黃花。結實形如連翹。微小。中有黑子。小如粟粒。其葉味甜。

救飢 採嫩葉焯熟。換水淘洗淨。油鹽調食。

虎

草



虎尾草 生密縣山谷中。科苗高二三尺。莖圓葉頗似柳葉而瘦短，又似兔兒尾葉亦瘦窄。又似黃精葉頗軟。插莖攢生，味甜微澀。

救飢 採苗葉燂熟，換水淘去澁味，油鹽調食。

野

蜀

葵



野蜀葵 生荒野中就地叢生苗高五寸許葉似葛勒子秧葉而厚大又似地牡丹葉味辣
救飢 採嫩葉燥熟水浸淘淨油鹽調食。

蛇葡萄

葡萄



蛇葡萄 生荒野中。拖蔓而生。葉似菊葉而小。花又繁碎。又似前胡葉亦細。莖葉間開五瓣。小銀褐色。結子如豌豆大。生青熟則紅色。苗葉味甜。

救飢 採葉熟。換水浸淘淨。油鹽調食。

星

宿
菜



星宿菜 生田野中。作小科苗。生葉似石竹子葉而細小。又似米布袋葉微長。稍上開五瓣。
小尖白花，苗葉味甜。

救飢 採苗葉燥熟，水浸淘淨，油鹽調食。


水蓑衣



水蓑衣 生水泊邊菜似地稍瓜果而窄。每葉間皆結小青骨子。其葉味苦。可救飢。

牛

嫋 菜



牛嫋菜 出輝縣山野中。拖藤蔓而生。葉似牛皮硝葉而大。又似馬兜鈴葉極大。葉皆對節。生稍間開青白小花。其菜味甜。

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

小蟲兒臥單



小蟲兒臥單 一名鐵線草。生田野中。苗揭地生葉似星宿葉而極小。又似雞眼草葉亦小。其莖色紅開小紅花。苗味甜。

救飢 採苗葉熟水浸淘淨油鹽調食

兔兒尾苗



兔兒尾苗 生田野中。苗高一二尺。葉似水藻葉而短。其莖大。其葉味酸。
救飢。採嫩葉。煤熟水浸淘淨。油鹽調食。

地錦苗



地錦苗 生田野中。小科苗高五七寸，莖葉似闊蕷。音葉開紫花，結小角兒。莖葉味苦，
救飢。採苗葉熟，水浸淘淨，油鹽調食。

野西瓜苗



野西瓜苗 俗名禿漢頭生田野中。苗高一尺許葉似家西瓜葉而小頗硬葉間生蒂開五瓣
銀褐色紫心黃菜花罷作蒴蒴內結實如棟子大苦味微苦。

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸去邪味淘過油鹽調食。

治病 今人傳說採苗搗爛敷拔毒。

香 茶 菜



香茶菜 生田野中。莖方窓五化切。面四楞葉似薄荷葉微大。拗莖稍頭出穗開粉紫花結蒴。

如蕎麥莢而微小。葉味苦。

救飢 採葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食。

透

骨

草



透骨草 一名天芝麻。生中半荒野中。苗高三四尺。莖方扁面。四楞。其莖脚紫。對節分生莖。葉似薑蒿葉而多花。又葉皆對生。莖節間攢開。粉紅花。結子似胡麻子。葉味苦。

救飢 採嫩苗葉焯熟。水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。

治病 今人傳說採苗搗傅腫毒。

毛女兒菜



毛女兒菜 生南陽府馬鞍山中。苗高一尺許。葉似錦葵葉而微尖。又似兔兒尾葉而小。莖葉皆有白毛。稍間開淡黃花。如大黍粒。數十顆攢成一穗。味甘酸。救飢。採苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。或拌米麵蒸食亦可。

牻牛兒苗



牻牛兒苗音驅又名鬪牛兒苗。生田野中。就地拖秧而生。莖蔓細弱。其莖紅紫色。葉似蕓荽葉。瘦細而稀疎。開五瓣小紫花。結青蓇葖果。音骨笑兒上有一嘴切。即委甚尖銳。音音追如細錐子狀。小兒取以爲鬪戲。葉味微苦。

救餓。採葉爛熟。水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。



鐵掃帚

鐵掃帚 生荒野中就地叢生。一本二三十莖。苗高三四尺。葉似苜蓿葉而細長。又似細葉胡枝子葉亦短小。開小白花。其葉味苦。

救飢 採嫩苗葉燥熟。換水浸去苦味。油鹽調食。

山 小 菜



山小菜 生密縣山野中。科苗高二尺餘。就地叢生。葉似酸漿子葉而窄小。面有細紋。脉邊有鋸齒。色深綠。又似桔梗葉。頗長鰶。味苦。

救飢 採葉燂熟。水浸淘去苦味。油鹽調食。

羊角

菜



羊角菜 又名羊蹄科。亦名合鉢兒。俗名婆婆針扎兒。又名細絲藤。一名過路黃。生田野下濕地中。拖藤蔓而生。莖色青白。葉似馬兜鈴葉而長大。又似山藥葉。亦長大。面青背頰白。皆兩葉相對生。莖葉折之俱有白汁出。葉間出蘗。開五瓣小白花。結角似羊角狀。中有白穰。其葉味甘微苦。

救飢 採嫩葉焯熟換水浸去苦味。邪氣淘淨。油鹽調食。

樓

斗

菜



樓斗菜 生輝縣太行山山野中。小科苗就地叢生。苗高一尺許。莖梗細弱葉似牡丹葉而小。其頭頸圓味甜。

救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

甌

菜



甌菜 生輝縣山野中，就地作小科苗生莖，葉似山莧菜葉而有鋸齒，又似山小菜葉，其鋸齒比之却小，味甜。

救飢 採嫩苗葉燂熟，水浸淘淨，油鹽調食。

變

豆

菜



變豆菜 生輝縣太行山山野中。其苗葉初作地攤科生。葉似地牡丹葉極大。五花叉鋸齒尖。其後葉中分生莖叉。稍葉頗小。上開白花。其葉味甘。

救飢 採葉燂熟作成黃色。撈水淘淨。油鹽調食。

和尚菜



和尚菜 田野處處有之。初生掘地布葉，葉似野天茄兒葉而大，背微紅紫色。後擴苗高二三尺，葉似蕷蓬葉短小而尖，又似紅落葵葉，而色不紅。結子如灰菜子，葉味辛酸微醣。

救飢 採嫩葉熟，換水浸去邪味，淘淨，油鹽調食或晒乾，可食。或云不可多食，久食令人面腫。

農政全書卷之五十一

明特選光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯
印欽製總理糧餉提督軍務兼巡撫慶天等處地方都察院右僉都御史耿陽殿圖鑑定

直隸松江府知府穀城方岳貞同鑒

荒政

救荒本草 草部 ○ 根可食

沙參



沙參 一名知母 一名苦心 一名志取

一名虎鬚 一名白參 一名識美 一名文希生

河內川谷及寃句般陽續山并淄濟潞隨

歸州而江淮荆湖州郡皆有之。輝縣太行山邊亦有之。苗長一二尺叢生崖坡間葉似枸杞葉微長而有叉牙鋸齒開紫花根如葵根赤黃色中正白實者佳味微苦性微寒無毒惡防已反

藜蘆又有杏葉沙參及細葉沙參氣味與此相類但

醫經內不曾該載此二種葉苗形客未敢併入本條今皆另條開載

救亂 搖出浸洗極淨換水煮去苦味再以火萎熟食之

百合



百合 一名重箱。一名摩羅。一名中逢花。一名強瞿。生荊州山谷。今處處有之。苗高數尺。幹龜如箭。面有葉如鷄距。又似大柳葉而寬。青色稀疎。葉近莖微紫。莖端碧白。開淡黃白花。如石榴嘴而大。四垂向下。覆長葉。花心有檀色。每一顆須五六花子。色圓如梧桐子。生於枝葉間。每葉一子。不在花中。此又異也。根色白。形如松子。殼四面攢生。中間出苗。又如葫蘆重疊。生二三十用。

救飢 挑根煮熟食之。甚益人氣。又云蒸過與蜜食之。或爲粉尤佳。
毛邑先生曰。嘗過根本嘉蔬。不必救荒。

萎

蕤



萎蕤 本草一名女萎。一名莢。一名玉竹。一名馬薰。生太山山谷及舒州滁州均州今南陽府馬鞍山亦有。苗高一二尺。莖斑葉似竹葉潤短而肥厚。葉尖處有黃點。又似百合葉却頗窄小。莢下結青子。如椒粒大。其根似黃精而小異。節上有鬚。味甘性平無毒。

救飢 採根換水煮極熟食之。

天門冬



天門冬俗名萬歲藤又名婆羅樹本草一名頓勒或名地門冬或名筵門冬或名嶺棘或名
淫羊食或名管松生奉高山谷及建州漢州今處處有之春生藤蔓大如臘股長至丈餘延附
草木上葉如芭香梗尖細而疏滑有逆刺亦有雌而無荳者其葉如綠杉而細散皆
名天門冬夏生白花亦有黃花及紫花者秋結黑子在其根枝傍人伏後無花暗結子其根白
或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉
細似蘿而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服味苦甘性平大寒無毒
項衣地黃及貝母爲之使畏曾青服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之

救飢採根換水浸去邪味去心煮食或晒乾煮熟入蜜食。

章

柳根



章柳根 本草一名商陸。一名蕷根。一名夜呼。一名白昌。一名當陸。一名章陸。爾雅則謂之遂廣。雅則謂之馬尾。亦謂之莧。陸生咸陽川谷。今處處有之。苗高三四尺。幹龜似鷄冠花。幹微有線楞色微紫赤葉青如牛舌微潤而長。根如人形者有神。亦有赤白二種。花亦根亦赤花白根苗葉絕相類。不可用。須細辨之。商陸味辛酸。一云味苦性平有毒。一云性冷得大蒜良。凡製薄切以東流水浸二宿。

救亂 取白色根切作片子。燂熟。浸水浸。洗淨。淡食得大蒜良。凡製薄切以東流水浸二宿。擣出。與豆葉隔間入甑蒸。從午至亥。如無葉用豆依法蒸之亦可。花白者年多仙人採之作脯。可為下酒。

麥

門

冬



麥門冬。本草云秦名羊韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊蕡。一名禹葭。一名禹餘糧。生隨州陸州及山谷堤坂肥土石間。火燒處有之。今輝縣山野中亦有。葉似韭葉而長。冬夏長生根如橘麥而白色。出江寧者小潤。出新安者大白。大者苗如鹿葱。小者如韭味苦性平。微寒無毒。地黃車前爲之使。惡欬。冬苦瓠苦芙蓉木耳苦參青蘿。

救飢。採根換水浸去邪味。淘洗淨蒸熟去心食。

苧


根



苧根 舊云閩蜀江浙多有之今許州人家田園中亦有種者苗高七八尺一科十數莖葉如楮葉而不花乂面青背白上有短毛又似蘇子葉其葉間出細穗花如白楊而長每一朵凡十數穗花青白色子熟茶褐色其根黃白色如手指翁宿根地中至春自生不須藏種根味甘性寒。

救飢 採根刮洗去皮煮極熟食之甜美。

蒼朮



蒼朮 一名山薊。一名山蕡。一名山連。一名山精。生山漢中山谷。今近郡山谷亦有嵩山茅山者佳。苗淡青色。高二三尺。莖作蒿。葉披莖而生。稍葉似棠葉。脚葉有三五叉。皆有鋸齒小刺。開花深碧色。亦似刺菊花。或有黃白花者。根長如指大。而肥實皮黑茶褐色。味苦甘。一云味甘辛。性溫無毒。防風地榆爲之使。

救飢 採根去黑皮薄切浸二三宿去苦味煮熟食亦作煎。

菖蒲



菖蒲 一名堯韭。一名昌陽。生上洛池澤及蜀郡嚴道戎衛衡州。并嵩岳石磧上。今池澤處處有之。葉似蒲而屬有脊。一如劍刃。其根盤屈有節狀如馬鞭。幹大根傍引三四小根。一寸九節者良。節尤密者佳。亦有十二節者。露根者不可用。又一種名蘭蓀。又謂溪蓀。根形氣色極似石上菖蒲。葉正如蒲無脊。俗謂菖蒲生於水次。失水則枯。其菖蒲味辛性溫無毒。秦皮秦瓦爲之使惡地驅麻黃不可犯鐵令人吐逆。

救飢 採根肥大節稀水浸去邪味。製造作果食之。

元扈先生曰。難食。

薑子根



薑子根 俗名打碗花。一名兔兒苗。一名狗兒秧。幽薊間謂之燕薑根。千葉者呼爲纏枝牡丹。亦名綴花。生平澤中。今處處有之。延蔓而生。葉似山藥葉而狹小。開花狀似牽牛花。微短而圓。粉紅色。其根甚多。大者如小筋。長一二尺。色白。味甘性溫。

救飢 採根洗淨蒸食之。或晒乾杵碎。炒飯食亦好。或磨作麵。作燒餅蒸食皆可。火食則頭

暈破腹間食則宜。

元扈先生曰。嘗過吳人呼秧子根。棄地宜移植備荒。

荳

蔓

根



荳蔓根 俗名麴礪磚音牒 生水邊下濕地。其葉就地叢生葉似蒲葉而肥短葉背如劍脊樣葉叢中間攢莖上開淡粉紅花俱皆六瓣花頭攢開如傘蓋狀結子如韭花子其根如鷹爪黃連樣色如蠟泥色味甘。

救飢 採根揩去皮及毛用水淘淨蒸熟食或晒乾炒熟食或磨作麴蒸食皆可。

野胡蘿蔔



野胡蘿蔔 生荒野中。苗葉似家胡蘿蔔。俱細小。葉間攢生莖。又稍頭開小白花。衆花擴開如傘蓋狀。比蛇床子花頭又大。結子比蛇床子亦大。其根比家胡蘿蔔尤細小。味甘。

救飢 採根洗淨去皮生食亦可。

綿

棗

兒



綿棗兒 一名石棗兒。出密縣山谷中。生石間。苗高三五寸。葉似韭葉而濶。瓦礫樣葉中。擅萼出穗似鷄冠。莢穗而細小。開淡紅花。微帶紫色。結小蒴兒。其子似大藍子而小。黑色。根類獨顆。蒜又似棗形而白。味甜性寒。

救飢 採取根添水火煮極熟食之。不換水煮。食後腹中鳴有下氣。

土

圓

兒



土圓兒 一名地栗子。出新鄭山野中。細莖延蔓而生。葉似菉豆葉微尖鈍。每三葉撮生一處。根似土瓜兒根。微圓味甜。

救飢 採根煮熟食之。

野山藥



野山藥 生輝縣太行山山野中。蔓藤而生。其藤似葡萄條稍細。藤頗紫色。其葉似家山藥葉而大微尖。根比家山藥極細瘦甚。硬皮色微赤。味微甜。溫平無毒。
救餓 採根煮熟食之。

金 瓜 兒



金瓜兒 生鄭山田野中。苗初生似小葫蘆葉而微小。又似赤霞兒葉。莖方。葉俱有毛刺。每葉間出一細藤延蔓而生。開五瓣尖碗子黃花。結子如馬錢音大。生青熟紅。根形如雞彈。微小其皮土黃色。內則青白色。味微苦。性寒。與酒相反。

救飢 挖取根。換水煮浸去苦味。再以水煮極熟食之。

細葉沙參



細葉沙參 生輝縣太行山山衝間。苗高一二尺。莖似蒿乾。葉似石竹子葉而細長。又似水蓑衣葉。亦細長。稍間開紫花。根似葵根而龜如搘^{音母}大皮色灰。中間白色。味甜性微寒。本草有沙參苗葉莖狀。所說與此不同。未敢併入條下。今另爲一條開載於此。

救飢 挖取根洗淨煮熟食之。

雞

腿

兒



雞腿兒 一名蠟白草。出釣州山野中。苗高七八寸。細長鋸齒葉硬厚。背白。其葉似地榆葉而細長。開黃花。根如指大。長三寸許。皮赤內白。頭尖縮。味甜。救飢。採根煮熟食。生食亦可。

山

蔓


菁



山蔓菁 出鈞州山野中苗高二三尺莖葉皆萬苣色葉似桔梗葉頭長箭而不對生又似山小菜葉微窄根形類沙參如手指蘶其皮灰色中間白色味甜。

救飢 採根煮熟生食亦可。

老鴉蒜



老鴉蒜 生水邊下濕地中。其葉直生。出土四垂。葉狀似蒲而短。背起筋脊。其根形如蒜瓣。味甜。

救飢 採根燂熟。水浸淘淨。油鹽調食。

元扈先生曰。此草中顏料用。


山 蘿 蔔



山蘿蔔 生山谷間田野中亦有之。苗高五七寸。四散分生莖葉。其葉似菊葉而闊大。微有艾香。每莖五葉排生。如一大葉。稍間開紫花。根似野胡蘿蔔根。而帶黯白色。味苦。

救飢 採根燂熟水浸淘去苦味。油鹽調食。

地參



地參 又名山蔓菁。生鄭州沙崗間。苗高一二尺。葉似初生桑科小葉。微短。又似桔梗葉。微長。開花似鈴鐺樣。淡紅紫花。根如拇指大。皮色蒼。內紫白色。味甜。

救飢 採根煮食。

獐牙菜



獐牙草 生水邊。苗初塌地生葉似龍鬚菜葉而長窄菜頭頗圓而不尖其葉嫩薄又似牛尾
葉葉亦長窄其根如芽根而嫩皮色黑灰味甜。
救飢 挖根洗淨煮熟油鹽調食。

雞兒頭苗



雞兒頭苗 生祥符西田野中就地妄秧生葉甚疎稀每五葉攢生狀如一葉其葉花又有小鋸齒葉間生蔓開五瓣黃花根叉甚多其根形如香附子而鬚長皮黑肉白味甜
救飢 採根換水煮熟食。

農政全書卷之五十二

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書徵文淵閣大學士贈少保禮文定上海徐光啟纂輯
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫陝西等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政採周憲王救荒本草

草部實可食



雀

雀麥

本草一名鶩麥。一名蕎音。

生於荒野林下。

今處處有之。苗似鶩麥而又細弱。結穗像麥穗而極細小。每穗又分作小叉穗十數個。子甚細小。味甘性平無毒。

救飢 採子春去皮搗作麵蒸食作餅食亦可。

回回米



回回米 本草名薏苡音一一名解離音一一名屋莢音一一名起實音一一名藉音一俗名草珠兒又呼爲西番葛穢音一生真定平澤及田野交阯生者子最大彼土人呼爲藉珠今處處有之苗高三四尺葉似黍葉而稍大開紅白花作穗子結實青白色形如珠而稍長故名薏珠子味甘微寒無毒今人俗亦呼爲菩提子

救飢 採實春去殼其中仁煮粥食取葉貢飲亦可
元扈先生曰嘉穀良藥不必救荒

蒺

藜

子




蒺藜子 本草一名旁通。一名屈人。一名止行。一名刺人。一名升推。一名卽梨。一名天生。馮翊平澤道傍。今處處有之。希地蔓生。細葉小黃花。結子有三角刺人是也。味苦辛性溫。微寒無毒。烏頭爲之使。又有一種白蒺藜。出同州沙苑。開黃紫花。作莢子。結子狀如腰子樣。小如黍粒。補腎藥多用。味甘有小毒。

救飢 收子炒微黃。搗去刺磨麯作燒餅或蒸食皆可。

元扈先生曰。本是勝藥。嘗過。

穀子



穀子 本草名蕡與蕡同 實處處有之。北人種以打繩索。苗高五六尺。葉似芋葉而短薄。微毛澁。開金黃花。結實殼似蜀葵實殼而圓大。俗呼爲穀餕頭。子黑色如黃豆大。味苦。性平無毒。救飢。採嫩穀餕頭取子生食。子堅實時。收取子浸去苦味。曬乾磨麵食。元扈先生曰可食。

稗子



稗子 有二種水稗生水田邊旱稗生田野中。今皆處處有之。苗葉似稜子色深綠。腳葉頗帶紫色。稍頭出漏穗。結子如黍粒大。茶褐色。味微苦性微溫。

救飢 採子搗米煮粥食。蒸食尤佳。或磨作麵食皆可。

元扈先生曰。稗自穀屬。十得五米。下田種之。甚有益。野生者可採拾。積貯用備飢者。

穉

子



穉子 生水田中及下湿地內。苗葉似稻但差短。稍頭結穗彷彿稗子穗。其子如黍粒大。茶褐
色味甘。

救飢 採子搗米煮粥或磨作麵蒸食亦可。

川


穀



川穀 生汜水縣田野中苗高三四尺葉似初生菊穢葉微小葉間叢開小黃白花結子似草珠兒微小味甘。

救飢 採子搗爲米。生用冷水淘淨後以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯食皆可。亦堪造酒。

蕎
艸
子



蕎草子 生田野中。苗葉似穀，而葉微瘦，稍開開茸。音戎細毛穗，其子比穀細小，春米類折米。熟時卽收，不收即落，味微苦，性溫。

救飢 採蕎穗採取子，搗米作粥或作水飯皆可食。

野

黍



野黍

生荒野中。科苗皆類家黍。而莖葉細弱。穗甚瘦小。黍粒亦極細小。味甜性微溫。

救飢採子春去粗糠。或搗或磨麵。蒸餅食甚甜。

鷄

眼


草



雞眼草 又名搘不齊。以其葉用指甲搘之作剝不齊。故名。生荒野中。擗地生葉。如雞眼大似三葉酸漿葉而圓。又似小蟲兒臥單葉而大結子。小如粟粒。黑茶褐色。味微苦。氣與槐相類。性溫。

救飢 採子搗取米。其米青色。先用冷水淘淨。卻以滾水泡三五次。去水下鍋。或煮粥。或作炊飯食之。或磨麵作餅食亦可。

蕎




麥

蕎麥 田野處處有之。其苗似麥攢切官。莖但細弱，葉亦瘦細。抽莖而生結細長穗，其麥粒極細小。味甘。

救飢 採子春去皮搗磨爲麵食。

澣盤



澣盤 一名托盤。生汝南荒野中。陳蔡閒多有之。苗高五七寸。莖葉有小刺。其葉彷彿似艾葉。稍圓。葉背亦白。每三葉攢生一處。結子作穗如半柿大。類小盤堆石榴顆狀。下有蒂承如柿蒂。形味甘酸性溫。

救飢 以澣盤顆粒。紅熟時採食之。彼土人取以當果。

絲瓜

苗



絲瓜苗 人家園籬邊多種之。延蔓而生。葉似括樓葉。而花又大。每葉開出一絲。藤纏附草木上。莖葉間五瓣大黃花。結瓜形如黃瓜而大。色青。嫩時可食。老則去皮。內有絲繩。可以擦洗油膩器皿。味微甜。

救飢 採嫩瓜切碎。燂熟水浸淘淨。油鹽調食。

元扈先生曰：嘉蔬不必救荒，不實之花作蔬更佳。

地角兒 苗



地角兒苗 一名地牛兒苗。生田野中。撿地生。一根就分數十莖。其莖甚稠。葉似胡豆葉微小。葉生莖面。每攢四葉對生。作一處。莖傍另又生莖。稍頭開淡紫花。結角似連翹角而小。中有子。狀似豌豆顆。味甘。

救飢 採嫩角生食。硬角熟食。


馬齒兒



馬齒音毛兒 生田野中就地拖秧而生葉似甜瓜葉極小莖蔓亦細開黃花結實比雞彈微小味微酸。

救飢 摘取馬齒熟者食之。

山 薺 豆



山 薺 豆 一名山豌豆。生密縣山野中。苗高尺許。其莖空而劙。葉似竹葉而齊短。兩兩對生。開淡紫花。結小角兒。其豆圓如豌豆。味甜。救飢。採取角兒煮食。或打取豆食皆可。

龍芽草



龍芽草 一名瓜香草。生輝縣鴨子口山野間。苗高一尺餘。莖多澀毛。葉形如地棠葉而寬大。葉頭齊圓。每五葉或七葉作一莖。排生。葉莖腳上又有小芽葉。兩兩對生。稍開出穗。開五瓣小圓黃花。結青毛蓇葖。有子大如黍粒。味甜。救飢。收取其子。或搗或磨。作麵食之。

地 稍 瓜



地稍瓜 生田野中。苗高尺許。作地攤科生葉似獨掃葉而細窄。光硬。又似沙蓬葉亦硬。周圍攢莖而生。莖葉開小白花。結角長大如蓮子。兩頭尖。狀又似鴉嘴形。名地稍瓜。味甘。救飢。其角嫩時。摘取爌食。角若皮硬。剥取角中嫩瓢。生食。

錦 荔 枝



錦荔枝 又名蠟葡萄。人家園籬邊多種。苗引藤蔓延附草木生。莖長七八尺。莖有毛澁。葉似野葡萄葉。而花又多。葉間生細絲蔓。開五瓣花。碗子花結實如雞子大。尖角紋皺狀似荔枝而大。生青熟黃。內有紅瓢。味甜。

救飢 採荔枝黃熟者食瓢。

元扈先生曰。南中人甚食此物。不止于瓢。實青時採者或生食。與瓜同用。名苦瓜也。青瓜頗苦。亦清脆可食耳。閩廣人爭詐爲極甘也。此恒蔬。不必救荒。當過

鷄

冠

果



雞冠果 一名野楊梅。生密縣山谷中。苗高五七寸。葉似潑盤葉而小。又似雞兒頭葉微闊。開五瓣黃花。結實似紅小楊梅狀。味甜酸。

救飢 採取其果紅熟者食之。

羊

蹄

苗

草部
葉及實皆可食

羊蹄苗 一名東方宿。一名連蟲陸。一名鬼目。一名蕷。俗呼猪耳朵。生陳留川澤。今所在有之。苗初掘地生後叢生莖又高二尺餘。其葉狹長頗似萐苔而色深青。又似大藍葉微闊。莖節間紫赤色。其花青白成穗。其子三稜根似牛蒡而堅實。味苦性寒無毒。

救飢 採嫩苗葉煤熟水浸淘淨苦味油鹽調食。其子熟時打子搗爲米以滾水湯三五次

淘淨下鍋作水飯食微破腹。



蒼耳



蒼耳 本草名莧音徒耳。俗名道人頭。又名喝起草。一名胡菜。一名地葵。一名施音詩。一名常思。

名羊負米。詩謂之卷耳。爾雅謂之芥耳。生安陸川谷及六安田野。今處處有之。葉青白。類粘糊菜葉。莖葉稍圓。結實比桑椹短小而多刺。其實味苦甘。性溫。葉味苦辛。性微寒。有小毒。又云無毒。

救飢 採嫩苗葉燂熟。換水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。其子炒微黃。搗去皮磨爲麵。作燒餅。

蒸食亦可。或用子熬油點燈。
元尾先生曰。油可食。北人多用以燂寒具。

姑 娘 菜



姑娘菜俗名燈籠兒。又名掛金燈。本草名酸漿。一名醋漿。生荆楚川澤及人家田園中。今處處有之。苗高一尺餘。苗似水葷而小。葉似天茄兒。葉窄小。又似人莧菜。頗大而尖。開白花。結房如囊。似野西瓜。蒴形如撮口布袋。又類燈籠樣。囊中有實。如櫻桃大。赤黃色。味酸。性平寒。無毒。葉味微苦。別條又有一種酸漿草。三葉與此不同。治證亦別。

救飢採葉潔。熟水浸。淘去苦味。油鹽調食。子熟摘取食之。

土

茜

苗



土茜苗 本草根名茜根。一名地血。一名茹蘆。一名茅蒐。一名蒨。生喬山川谷。徐州人謂之牛蔓。西土出者佳。今北上處處有之。名土茜根。可以染紅葉似棗葉形頭尖下闊。紋脈堅直莖方。莖葉俱澀。四五葉對生節間。莖蔓延附草木。開五瓣淡銀褐花。結子小如菉豆粒。生青熟紅。根紫赤色。味苦性寒無毒。一云味甘。一云味酸畏鼠姑。葉味微酸。

救飢 採葉焯熱水浸作成黃色淘淨油鹽調食。其子紅熟摘食。

王不留行



王不留行 又名剪金草。一名禁宮花。一名剪金花生太山山谷。今祥符沙彌間亦有之。苗高一尺餘。其莖對節生叉葉似石竹子葉而寬短。葉對生。脚葉似槐葉而狹長。開粉紅花。結蒴如松子大。似罂粟殼樣極小。有子如葶苈子大而黑色味苦甘。性平無毒。

救飢 採嫩葉爛熟。換水淘去苦味。油鹽調食。子可搗爲麵食。

白
薇



白薇 一名白幕。一名薇草。一名春草。一名骨美。生平原川谷。并陝西諸郡。及滁州。今鈞州密縣山野中亦有之。苗高一二尺。莖葉俱青。頗類柳葉而濶短。又似女婁腳葉而長硬毛澀。開花紅色。又云紫花結角似地稍瓜而大。中有白瓢。根狀如牛膝根而短黃白色。味苦鹹性平。大寒無毒。惡黃芪。大黃。大戟。乾姜。乾漆。山茱萸。大棗。

救飢 採嫩葉爛熟水淘淨油鹽調食。并取嫩角燂熟亦可食。

蓬

子

菜



蓬子菜 生田野中所在處處有之其苗嫩時莖有紅紫線楞葉似鱗蓬葉微細苗老結子葉則生出叉刺其子如獨掃子大苗葉味甜。

救飢 採嫩苗葉爛熟水浸淘淨油鹽調食。曬乾燂食尤佳及採子搗米青色或煮粥或磨麵作餅蒸食皆可。


胡枝子



胡枝子 俗亦名隨軍茶。生平澤中有二種葉形有大小大葉者類黑豆葉小葉者莖類蓍草葉似苜蓿葉而長大花色有紫白結子如粟粒大氣味與槐相類性溫。

救飢 採子微春卽成米先用冷水淘淨復以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯皆可食加野菜豆味尤佳及採嫩葉蒸曬爲茶煮飲亦可。

米 布 袋



米布袋 生田野中。苗揭地生。葉似澤漆葉而窄。其葉順莖排生。稍頭攢結三四角。中有子如黍粒大。微圓味甜。

救飢 採角取子。水淘洗淨下鍋煮食。其嫩苗葉燂熟油鹽調食亦可。

天 茄 苗 兒



天茄苗兒 生田野中。苗高二尺許。莖有線。葉似姑娘草葉而大。又似和尙菜葉。卻小。開五瓣小白花。結子似野葡萄。大紫黑色。味甜。


救飢 採嫩葉。煤熟水浸去邪味。淘淨。油鹽調食。其子熟時。亦可摘食。

治病 今人傳說採葉傅貼。腫毒。金瘡。拔毒。

苦

馬

豆



苦馬豆 生延津縣郊野中。在處有之。苗高二尺許。莖似黃葵。莖上有細毛。葉似胡豆葉。微小。又似蒺藜葉。卻大枝葉間開紅紫花。結殼如拇指頭大。半頂開多虛俗呼爲羊屎胞。內有子。如蠶子大。茶褐色。子葉俱味苦。

救飢 採葉燂熟。換水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。及取子水浸。淘去苦味。曬乾。或磨或搗爲麵。作燒餅蒸食皆可。

苗 猪尾把



猪尾把苗 一名狗腳菜。生荒野中。苗長尺餘。葉似甘露兒葉而甚短小。其頭頗齊。莖葉皆有細毛。每葉間頸條開小白花。結小蒴兒。中有子。小如粟粒。黑色。苗葉味甜。

救飢 採嫩葉熟。換水浸淘淨。油鹽調食。子可搗爲麵食。

農政全書卷之五十三

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政


救荒本草

草部

根葉可食

草

三




奈

草三柰 生密縣梁家衝山谷中。苗高一尺許。葉似蓑草而狹長。開小淡紅花。根似雞爪形而
麤。亦香。其味甘微辛。

救飢 採根換水煮食。近根嫩者新葉亦可燂食。

黃精苗



黃精苗 俗名筆管菜。一名重樓。一名蕪竹。一名雞格。一名救窮。一名鹿竹。一名萎蕤。一名仙人餘根。一名垂珠。一名馬箭。一名白及。生山谷南北皆有之。嵩山茅山者佳。根生肥地者大如拳。薄地者猶如拇指。葉似竹葉或二葉或三葉或四五葉。俱皆對節而生。味甘性平無毒。又云莖光滑者謂之太陽之草。名曰黃精。食之可以長生。其葉不對節。莖葉毛鈎子者。謂之太陰之草。名曰鈎吻。食之入口立死。又云莖不紫花不黃爲異。

殺飢
採嫩葉爛熟換水浸去苦味。淘淨油鹽調食。山中人採根九蒸九暴。食甚甘美。具蒸暴用。貧去底安釜上。裝滿黃精密蓋蒸之。令氣溜卽暴之。如此九蒸九暴。令極然不熟。則刺人喉咽。久食長生辟穀。其生者若初服。只可一寸半。漸增之。十日不食他食。能長服之。食止三尺。服三百日後。盡見鬼神。俾必升天。又云花實可食。罕見難得。

元扈先生曰。昔過根本勝藥苗亦恒蔬。

地黃苗



地黃苗俗名婆婆嫋。一名地鬚。一名莖。生咸陽川澤。今處處有之。苗初塌地。生葉如山白菜葉而毛纖。葉面深青色。又似芥菜葉而不花。又比芥菜葉頗厚。葉中攢莖上有細毛莖。稍開筒子花。紅黃色。北人謂之牛嫋子花。結實如小麥粒。根長四五寸。細如手指皮。赤黃色。味甘苦性寒無毒。惡貝母畏無黃得夢門冬清酒良。忌鐵器。

救餓採葉煮羹食。或搗根汁搜麵作餅食。及冷淘食之。或取根浸洗淨。九蒸九暴。注意服食。或煎食。久服輕身不老。變白延年。

牛 旁 子



牛旁子 本草名惡實。未去萼名風粘子。俗名夜叉頭。根謂之牛菜。生魯平山澤。今處處有之。苗高二三尺。葉如芋葉。長大而灑花。淡紫色。實似蘿蔔而褐色。外殼如栗殼而小多刺。風過之。則綴落不可脫。故名殼中有子。如半粒麥而腫小。根長尺餘。莖如拇指。其色灰黯。味辛。性平。一云味甘無毒。

救飢 採葉燂熟水浸去邪氣。淘洗淨。油鹽調食。及取根洗淨煮熟食之。久食甚益人身。輕耐老。

遠

志



遠志 一名棘菀。一名蕡繞。一名細草。生太山及寃句川谷。河陝商齊泗州亦有。俗傳夷門遠志最佳。今密縣梁家衝山谷間多有之。苗名小草。葉似石竹子葉。又極細。開小紫花。亦有開小紅白花者。根黃色。形如蒿根。長及一尺許。亦有根黑色者。根葉俱味苦。性溫無毒。得茯苓冬葵子龍骨瓦殼。天雄附子。畏珍珠藜蘆。蠻齊蛤蟆。蟻。

救飢

採嫩苗葉。焯熟。換水浸去苦味。淘淨。油鹽

調食及搗取根。換水浸。淘去苦味。去心。再換水煮。極熟食之。不去心。令人心閑。

杏

葉

沙

參



杏葉沙參 一名白麵根。生密縣山野中。苗高一二尺。莖色青白。葉似杏葉而小。邊有叉牙。又似山小菜葉。微尖而背白。稍閒開五瓣白碗子花。根形如野胡蘿蔔。頗肥。皮色灰黑。中間白色。味甜。性微寒。本草有沙參。苗葉根莖其說與此形狀皆不同。未敢併入條下。乃另開於此。其杏葉沙參又有開碧色花者。

救飢 採苗葉爛熟水浸淘淨。油鹽調食。掘根換水煮食亦佳。

藤長苗



藤長苗 又名旋菜。生密縣山坡中。拖蔓而生。苗長三四尺。莖有細毛。葉似滴滴金葉而窄小。頭頗齊。開五瓣粉紅大花。根似打碗花根。根葉皆味甜。

救飢 採嫩苗葉焯熟水浸淘淨。油鹽調食。掘根換水煮熟亦可食。

牛皮消




牛皮消 生密縣野中。拖蔓而生。藤蔓長四五尺。葉似馬兜零。葉寬大而薄。又似何首烏。葉亦寬大。開白花。結小角兒。根類葛根而細小。皮黑肉白。味苦。

救飢 採葉焯熟。水浸去苦味。油鹽調食。及取根去黑皮。切作片。換水煮去苦味。淘洗淨再以水煮極熟食之。

菹

草




菹草

上音
辭

卽水藻也。生陂塘及水泊中。莖如虧線長三四尺。葉形似柳葉而狹長。故名柳葉菹。又有葉似蓬子葉者。根麰如釵股而色白。味微鹹。性微寒。

救飢 撈取葉連嫩根揀擇洗淘潔淨。剉碎熑熟油鹽調食。或加少米煮粥食尤佳。

水豆兒




水豆兒 一名蕨菜生陂塘水澤中。其莖葉比菹草又細狀類細線連綿不絕根如鋸股而色白根下有豆如退皮菉豆瓣味甘。

救飢 採秧及根豆擇洗潔淨煮食生醃食亦可。

水

葱




水葱 生水邊及淺水中。科苗彷彿類家葱而極細長。稍頭結蕚。莢彷彿類葱。莢而小。開繖白花。其根類葱根皮色紫黑。根苗俱味甘微鹹。

救飢 採嫩苗連根揀擇洗淨。焯熟。水浸淘淨。油鹽調食。

蒲

筍




蒲筍 本草名其苗爲香蒲卽甘蒲也。一名睢。一名熊俚俗名此蒲爲香蒲謂菖蒲爲臭蒲其香蒲水邊處處有之根比菖蒲根極肥大而少節其葉初未出水時葉莖紅白色採以爲筍後揀梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂蒲棒蒲黃卽花中藥屑也細若金粉當欲開時有便取之市屋間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒味甘性平無毒。

救飢 採近根白筍揀剥洗淨蒸熟油鹽調食蒸食亦可。採根刮去龜皴曬乾磨麵打餅蒸食皆可。

蘆

筍



蘆筍 其苗名葦子草。本草有蘆根，爾雅謂之葭葦。生下隰陂澤中。其狀都似竹，但差小而葉抱莖生，無枝叉。花白作穗，如茅花。根如竹根，亦差小。而節疎，露出浮水者不堪用。味甘。一云辛性寒。

救飢 採嫩筍，燂熟油鹽調食。其根甘，亦可生咂食之。

元扈先生曰：嘗過根本勝藥。北方亦作果食。其筍則北方者可食。南產不可食。



茅芽根 本草名茅根。一名蘭根。一名茹根。一名地管。一名地筋。一名兼杜。又名白茅。營其芽。一名茅針。生楚地山谷。今田野處處有之。春初生苗。布地如針。夏生白花。茸茸然。至秋而枯。其根至潔白。亦甚甘美。根性寒。茅針性平。花性溫。俱味甘無毒。

救飢 採嫩芽剥取嫩穰食。甚益小兒。及取根咂食。甜味久服利人。服食此可斷穀。

元扈先生曰嘗過。

葛



葛根 名雞齊根。一名鹿藿。一名黃斤。生汶山川谷及成州海州浙江并澧鼎之間。今處處有之。苗引藤蔓長二三丈莖淡紫色葉頗似楸葉而小色青開花似豌豆花粉紫色結實如皂莢而小根形如手臂味甘性平無毒。一云性冷殺野葛巴豆百藥毒。

救飢 挖取根入土深者水浸洗淨蒸食之或以水中揉出粉澄濾成塊蒸煮皆可食及採

花曬乾燥食亦可。

元扈先生曰嘗過。

何首烏

烏



何首烏 一名野苗。一名交藤。一名夜合。一名地精。一名陳知白。又名桃柳藤。亦名九真藤。出順州南河縣。其嶺外江南諸州及虔州皆有。以西洛嵩山歸德柘城縣者爲勝。今鈞州密縣山谷中亦有之。蔓延而生。莖蔓紫色。葉似山藥葉而不光嫩。葉間開黃白花。葛勒花結子有稜似蕎麥而極細。小如粟粒。大根大者如拳。各有五楞瓣狀似甜瓜樣。中有花紋形如烏獸山獄之狀者。極珍。有赤白二種。赤者雄。白者雌。又云雄者苗葉黃白。雌者赤黃色。一云雄苗赤生必相

對遠不過三四尺。夜則苗蔓相交或隱化不見。凡修合藥須雌雄相合。服有驗。宜偶日服。二四六八日是也。其藥本無名。因何首烏見藤夜交採服有功。因以採人爲名耳。又云仙草。其爲五十年者如拳大。號山奴。服之一年鬚髮烏黑。百年如碗大。號山哥。服之一年顏色紅悅。百五十年如盆大。號山伯。服之一年齒落重生。三百年如斗。栲栳大。號山翁。服之一年顏如童子。行及奔馬。三百年如三斗栲栳大。號山精。服之一年延齡。純陽之體。久服成地仙。又云其頭九數者。服之乃仙。味苦澀性微溫無毒。一云味甘。茯苓爲之使。酒下最良。忌鐵器。猪羊血及豬肉無鱗魚與蘿蔔相惡。若並食令人髭鬢早白。腸風多熱。

救飢 挖根洗去泥土。以苦竹刀切作片。米泔浸經宿。換水煮去苦味。再以水淘洗淨。或蒸或煮食之。花亦可爛食。

元扈先生曰。嘗過根本勝藥不必救荒。

瓜 樓 根



瓜樓根 俗名天花粉。本草名括樓實。一名地樓。一名果蓏。一名天瓜。一名澤姑。一名黃瓜。生宏農川谷及山陰地。今處處有之。入土深者良。生鹵地者有毒。詩所謂果蓏之實是也。根亦名白藥。葉似甜瓜葉而作花。又有細毛。開花似葫蘆花。淡黃色。實在花下。大如拳。

生青熟黃。根味苦性寒。無毒。枸杞爲之使惡。乾姜、吳牛膝、乾漆、反烏頭。

敷飢。採根削皮至白處寸切之。水浸一日。一次換水。浸經四五日。取出爛搗研。以絹袋盛之。

澄濾令極細如粉。或將根曬乾搗爲麵。水浸澄濾二十餘遍。使極膩如粉。或爲燒餅。或作煎餅。切細麪皆可食。採括樓根。煮粥食極甘。取子炒乾搗爛。用水熬油亦可。

元屬先生曰。嘗過。根本良藥。

磚

子

苗



磚子苗 一名鬱子苗。生水邊。苗似水葱而龐大。內實。又似蒲夢。稍開碎白花。結穗似水莎草穗。紫赤色。其子如黍粒大。根似蒲根而堅實。味甜。子味亦甜。

救飢 採子磨麪食。及採根擇洗淨。換水煮食。或曬乾磨爲麪食。亦可。

菊



花

菊花 一名節華。一名日精。一名女節。一名女華。一名女莖。一名更生。一名周盈。一名傳延年。一名陰成。生雍州川澤及鄧衡齊州田野。今處處有之。味苦甘性平無毒尤枸杞桑根白皮爲之使。

救飢 取莖紫氣香而味甘者。採葉燂食。或作羹皆可。青莖而大氣味作蒿苦者不堪食。名苦薏。其花亦可燂食。或炒茶食。

元扈先生曰嘗過。

金銀花



金銀花 本草名忍冬。一名鷺鷥藤。一名左纏藤。一名金釵股。又名老翁鬚。亦名忍冬藤。舊不載所出州土。今輝縣山野中亦有之。其藤凌冬不凋。故名忍冬。草附樹延蔓而生。莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔葉而青。又似水茶臼葉。頭微圓而軟背頗澀。又似黑豆葉而大。開花五出。微香。蒂帶紅色。花初開白色。經一二日則色黃。故名金銀花。本草中不言善治癰疽發背。近代名效味甘性溫無毒。

救飢採花燂熟油鹽調食及採嫩葉換水煮熟浸去邪味。淘淨油鹽調食。

元扈先生曰。嘗過花本勝藥。

望江南



望江南 其花名茶花兒人家園圃中多種苗高二尺許莖微淡赤色葉似槐葉而肥大微尖又似胡蒼耳葉頗大又似皂角葉亦大開五瓣金黃花結角長三寸許葉味微苦救飢採嫩苗葉焯熟水浸淘去苦味油鹽調食花可炒食亦可燂食。
元扈先生曰嘗過或名槐豆或直稱決明。


大

蓼



大蓼 生密縣梁家衝山谷中。拖藤而生。莖有線楞而頗硬。對節分生莖叉葉亦對生。葉似山蓼葉微短拳曲。節間開白花。其葉味苦微辣。

救飢 採葉焯熟。換水浸去辣味。作成黃色淘洗淨。油鹽調食。花亦可燥食。



草部
莖可食

黑三稜 舊云河陝江淮荆襄間皆有之。今鄭州賈峪山澗水邊亦有。苗高三四尺。葉似菖蒲葉而厚大。背皆三稜劍脊。葉中攢孽。孽上結實。攢爲刺毬狀如楮桃樣而三顆。瓣甚多。其顆瓣形似草決明子而大。生則青。熟則紅黃色。根狀如烏梅而頗大。有鬚蔓廷相連。比京三稜體微輕。治療並同。其孽味甜。根味苦。性平無毒。

救飢 挑嫩孽剝去龜皮。燂熟油鹽調食。

荇 緣 菜



荇緣菜 又名金蓮兒。一名耦蔬菜。水中拖蔓而生。葉似初生小荷葉。近莖有橢圓葉浮水土。葉中攏莖上開金黃花。莖味甜。

救飢 採嫩苗炒熟油鹽調食。


水 蕃 茄



水蕃茄 俗名爲剪刀草。又名剪搭草。生水中。其莖面竊背方。背有線楞。其葉三角似剪刀形。葉中攢生莖叉稍間開三瓣。白花黃心。結青青葵。如青桔桃狀。頗小。根類葱根而大。其味甜。救飢採近根嫩筍。焯熟油鹽調食。

茭

笋



草部 茭及實皆可食

茭 茭本草有菰根，又名菰蔴草。江南人呼爲茭草。俗又呼爲茭白。生江東池澤水中及岸際。今在處水澤邊皆有之。苗高二三尺。葉似蘆荻。又似茅菜而長闊。厚生菌音。細嫩葉可啜。名菰莖。三年已上。心中生莖如藕。白軟中有黑脈甚堪啜。名菰首。味甘性大。

救飢採茭菰笋。熟油鹽調食。或採子春爲米合粟煮粥食之。甚濟飢。
元扈先生曰。嘗過。

農政全書卷之五十四

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謹文定上海徐光啟纂輯

明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政採周憲王救荒本草

木部葉可食

茶



茶樹 本草有茗苦茶，圖經云生山南漢

中山谷，閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之。

惟建州北苑數處產者性味獨與諸方不

同。今密縣梁家衝山谷間亦有之。其樹大小皆類梔子。春初生芽爲雀舌麥類。又有新芽一發微龐如針。漸至環腳軟枝條之類葉老則似水茶。白葉而長又似初生青岡像葉而小。先澤又云冬生葉可作羹飲。世呼早採者爲捺，晚取者爲苦。一名芽，蜀人謂之苦捺。今通謂之茶。茶葉聲近，故呼之。又有研治作餅，名爲臘茶者，皆味甘苦性微寒無毒。如茱萸、葱姜等良，又別有一種。蒙山中頂上清峯茶，云春分前後多聚人力候雷初發聲併手齊採，若得四兩服之即爲地仙。

救飢 採嫩葉或冬生葉可煮作羹食或蒸焙作茶皆可。

夜合樹



夜合樹 本草名合歡。一名合昏。生益州及雍洛山谷。今鈞州鄭州山野中亦有之。木似梧桐。其枝甚柔弱。似皂莢葉。又似槐葉。極細而密。互相交結。每一風來。輒似相解了。不相牽綴。其葉至暮而合。故名合昏。花發紅白色。瓣上若絲茸然。散垂結實。作莢子。極薄細。味甘。性平。無毒。

救飢 採嫩葉。煤熟水浸淘淨。油鹽調食。晒乾煤食。尤好。

木槿樹



木槿樹 本草云木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮飲花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障亦有千葉者人家園圃多栽種性平無毒菜味甜。

救飢 採嫩葉燂熟冷水淘淨油鹽調食



白


楊

樹

白楊樹 本草。白楊樹皮，舊不載所出州土。今處處有之。此木高大，皮白似楊，故名。葉圓如梨，肥大而尖，葉背甚白。葉邊鋸齒狀。葉蒂小，無風自動也。味苦，性平無毒。

救飢 採嫩葉，熟作成黃色，換水淘去苦味，洗淨，油鹽調食。

黃
櫨



黃櫨 生商洛山谷。今釣州鄭州山野中亦有之。葉圓。木黃枝莖色紫赤。葉似杏葉而圓大。味苦性寒無毒。木可染黃。

救飢 採嫩芽。焯熟水。淘去苦味。油鹽調食。

元扈先生曰嘗過

椿

樹

芽



椿樹芽 本草有椿木。樗木舊不載所出州土。今處處有之。二木形幹大抵相類。椿木實而葉香可噉。樗木疏而氣臭。膳夫熬去其氣亦可噉。北人呼樗爲山椿。江東人呼爲虎目。葉脫處有痕如樗蒲子。又如眼目。故得此名。夏中生莢。樗之有花者無莢。有莢者無花。莢常生臭椿上。未見椿上有莢者。然世俗不辨椿樗之異。故俗名爲椿莢。其實椿莢耳。其無花不實木大端直爲椿有花而


樗味苦有小毒。性溫。一云性平無毒。
欽飢採嫩芽。熟水浸淘淨。油鹽調食。

元扈先生曰。嘗過

椒樹



椒樹 本草蜀椒一名南椒一名巴椒一名唐荳生武都川谷及巴郡歸峽蜀川陝洛間人家
團圃多種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉似刺蘚葉微小葉堅而滑可煮食甚辛香結實
無花但生於葉間如豆顆而圓皮紫赤此椒江淮及北土皆有之莖皆相類但不及蜀中者皮
肉厚腹裏白氣味濃烈耳又云出金州西城者佳味辛性溫大熱有小毒多食令人之氣口閉
月不食椒損氣傷心令人多忘杳仁爲之使農欵冬花
救飢採嫩葉爆熟換水浸淘潑油鹽調食椒顛調和百味香美



榆子樹 本草有榆子木。舊不載所出州土。今密縣山野中亦有之。其樹有大者。木則堅重。材堪為車輞。初生作科條狀。類荆條。對生枝叉葉似柿葉而薄小。兩葉相當。對生。開白花。結子細圓如牛李子。大如豌豆。生青熟黑。味甘鹹。性平無毒。葉味苦。

救飢 採葉焯熟水浸淘去苦味。洗淨油鹽調食。

雲

葉



雲葉 生密縣山野中。其樹枝葉皆類桑。但其葉如雲頭花。又似木欒樹葉。微潤。開細青黃花。其葉味微苦。

救飢 採嫩葉燥熟。換水浸淘去苦味。油鹽調食。或蒸晒作茶。尤佳。



黃 棟

黃棟樹 生鄭州南山野中。葉似初生椿樹葉而極小。又似棟葉色微帶黃。開花紫赤色。結子如豌豆大。生青熟亦紫赤色。葉味苦。

救飢 採嫩芽葉炒熟，換水浸去苦味。油鹽調食。蒸芽曬乾，亦可作茶煮飲。

凍

青

樹



凍青樹 生密縣山谷間。樹高丈許。枝葉似枸骨子樹而極茂盛。凌冬不凋。又似櫧子樹葉而小。亦似梅芽葉微窄。頭頗圓而不尖。開白花。結子如豆粒大。青黑色。葉味苦。

救飢 採芽葉。焯熟水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

椿芽樹



椿芽樹 生輝縣山野中。科條似槐條。葉似冬青葉微長。開白花。結青白子。其葉味甜。

救飢 採嫩葉焯熟。水淘淨。油鹽調食。

月

芽
樹



月芽樹 又名蕓芽。生田野中。莖似槐條。葉似歪頭菜葉。微短。稍硬。又似稗芽葉。頗長。其葉兩兩對生。味甘微苦。

救飢 採嫩葉。焯熟。水浸淘淨。油鹽調食。

女兒茶



女兒茶 一名牛李子。一名牛筋子。生田野中。科條高五六尺。葉似郁李子葉而長大。稍尖葉色光滑。又似白棠子葉而色微黃綠。結子如豌豆大。生則青。熟則黑。茶褐色。其葉味淡微苦。
救飢 採嫩葉燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。亦可蒸曝作茶煮飲。

省 沽 油



省沽油 又名珍珠花生。約州風谷頂山谷中。科條似刺條而圓。野生枝叉葉亦對生。葉似驥
驥布袋葉而大。又似葛藤葉而小。每三葉叢生一處。開白花似珍珠色。葉味甘苦性。
救飢 採葉焯熟水浸淘淨。油鹽調食。



回回醋 一名淋櫟樹生密縣韶華山山野中。樹高丈餘葉似兜櫚樹葉而厚大邊有大鋸齒。又似厚椿葉而亦大或三葉或五葉排生一莖開白花結子大如豌豆熟則紅紫色味酸葉味微酸。

救飢 採葉燥熟水浸去酸味淘淨油鹽調食其子調和湯味如醋。

白 檷



白槿樹 生密縣梁家衝山谷中。樹高五七尺。葉似茶葉而甚闊大光潤。又似初生青岡葉而無花叉。又似山格刺樹葉亦大開白花。其葉味苦。救飢採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

械
樹



械樹芽 生鈞州風谷頂山谷間木高一二丈其葉狀類野蘿蔔葉五花尖叉亦似綿花葉而薄小又似絲瓜葉卻甚小而淡黃綠色開白花葉味甜。


救飢 採葉熟以水浸作成黃色換水淘淨油鹽調食

老

葉

兒

樹



老葉兒樹 生密縣山野中。樹高六七尺。葉似茶葉而窄瘦尖銳。又似李子葉而長。其葉味甘。
微澀。

救飢 採葉焯熟水浸去澀味。淘洗油鹽調食。




青楊樹 在處有之。今密縣山野間亦多有。其樹高大葉似白楊樹葉而狹小色青。皮亦頗青。故名青楊。其葉味微苦。

救飢 採葉燥熟水浸作成黃色。換水淘洗。油鹽調食。

龍

柏

芽



龍柏芽 出南陽府馬鞍山中。此木久則亦大。葉似初生橡櫟小葉而短味微苦。

救飢 採芽葉燥熟換水浸淘淨油鹽調食。

兜

櫟


樹



兜櫟樹 生密縣梁家衝山谷中。樹甚高大。其木枯朽極透。可作香焚。俗名壞香。葉似回回醋樹葉而薄窄。又似花椒樹葉。卻少花。葉皆對生。味苦。

救飢 採嫩芽葉。焯熟水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

青岡



青岡樹 舊不載所出州土。今處處有之。其木大而結櫟斗者爲櫟櫟。小而不結櫟斗者爲青岡。其青岡樹枝葉條幹皆類櫟櫟。但葉色頗青而少花。味苦。性平無毒。

救飢 採嫩葉燥熟。以水浸漬作成黃色。換水淘洗淨。油鹽調食。

檀

樹

芽



檀樹芽 生密縣山野中。樹高一二丈葉似槐葉而長大。開淡粉紫花。葉味苦。

救飢。採嫩芽葉燂熟。換水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

山茶科



山茶科 生中半土山田野中。科條高四五尺。枝梗灰白色。葉似皂莢葉而圓。又似槐葉亦圓。四五葉攢生一處。葉甚稠密。味苦。

救飢 採嫩葉燥熟水淘洗淨油鹽調食亦可蒸晒乾做茶煮飲。

木

葛



木葛 生新鄭縣山野中。樹高丈餘。枝似杏枝。葉似杏葉而圓。又似葛根葉而小。味微苦。
救飢。採葉燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。

花 椒 樹




花 椒 樹

生密縣山野中。其樹高大葉似回回醋葉微薄又似兜櫞樹葉邊有鋸齒。其葉味

苦。

救飢。採嫩芽葉燂熟換水浸去苦味。淘洗淨油鹽調食。

白 辛 樹



白辛樹 生榮陽塔兒山崗野間樹高丈許葉似青檳樹葉頗長而薄色微淡綠又似月芽樹葉而大色亦差淡其葉味甘微澀

救飢 採葉爌熟水浸淘去澁味油鹽調食

木

藥

樹



木藥樹 生密縣山谷中。樹高丈餘。葉似棟葉而寬大稍薄。開淡黃花。結薄殼。中有子大如豌豆。烏黑色。人多摘取串作數珠。葉味淡甜。

救飢 採嫩芽葉炒熟。換水浸淘淨。油鹽調食。



烏棱樹 生密縣梁家衝山谷中。樹高丈餘。葉似省沽油樹葉。而背白。又似老婆布黏葉。微小而絅。開白花。結子如梧桐子大。生青熟則烏黑。其葉味苦。

救飢 采葉煤熟。換水浸去苦味。作過淘洗淨。油鹽調食。

刺 椅



樹

刺楸樹 生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有黃白班文枝梗間多有大刺葉似楸葉而薄味甘

救飢 採嫩芽焯熟水浸淘洗淨油鹽調食



黃絲藤 生輝縣太行山山谷中。條類葛條。葉似山格刺葉而小。又似婆婆枕頭葉。頗硬背微白。邊有細鋸齒。味甜。


救飢 採葉爛熟水浸淘淨油鹽調食。

山

格

刺

樹



山格刺樹 生密縣韶華山山野中。作科條。生葉似白槿樹葉頗短而尖鈍。又似茶樹葉而闊大。及似老婆布黏葉亦大。味甘。

救飢 採葉燥熟水浸作成黃色。淘洗淨油鹽調食。

穢

樹



穢樹 生輝縣太行山山谷中。其樹高丈餘葉似槐葉而大。卻頗軟薄又似欒樹葉而薄小。開淡紅色花結子如菉豆大。熟則黃茶褐色。其葉味甜。

救飢 採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食。

報

馬

樹



報馬樹 生輝縣太行山山谷間枝條似桑條色葉似青檀葉而大邊有花叉又似白羊葉
頗大而長硬葉味甜。

救飢 採嫩葉燥熟水淘淨油鹽調食。硬葉燥熟水浸作成黃色淘去涎沫油鹽調食。

樹 柏



柏樹 生輝縣太行山山谷間樹甚高大其木細膩可爲卓器枝叉對生葉似木槿葉而長大
微薄色頗淡綠皆作五花梗又邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦。

救飢 採嫩葉燥熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食。

臭

蕓



臭蕓，生密縣楊家衝山谷中。科條高四五尺。葉似杵瓜葉而尖鈍，又似金銀花葉亦尖鈍。五葉叢生。如一葉開花白色。其葉味甜。

救飢 採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

堅
莢
樹



堅莢樹 生輝縣太行山山谷中。其樹枝幹堅勁可以作檜皮色烏黑對分枝叉葉亦對生葉似拐棗葉而大微薄其色淡綠又似土欒樹葉極大而光潤開黃花結小紅子其葉味苦。

救飢 採嫩葉焯熟水浸去苦味淘油鹽調食

臭

竹

樹



臭竹樹 生輝縣太行山山野中。樹甚高大葉似槭葉而厚。頗鮮却少花。又似楊棗葉亦大。其葉面青背白。味甜。

救飢 採葉焯熟水浸去邪臭氣味油鹽調食。

馬

兒

魚

條



馬魚兒條 俗名山皂角。生荒野中。葉似初生刺蘚花葉而小。枝梗色紅有刺似棘針微小。
葉味甘微酸。


救飢 採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

老

婆

布

黏



老婆布黏 生鈞州風谷頂山野間科條淡蒼黃色葉似匙頭樣色嫩綠而光俊又似山格刺
葉却小味甘性平。

救飢 採葉燥熟水浸作湯淘淨油鹽調食

農政全書卷之五十四 終

