保嬰撮要目錄

卷之一

初誕法
噤風撮口臍風
變蒸
心臟症
肺臟症
卷之二
面上症
護養法
脉法
肝臟症
脾臟症
腎臟症
發搐

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

目睛瞤動
驚搐目直
目動咬牙
偏風口噤
卷之三
急驚
驚癇
天釣内釣
胎驚
唇口蠕動
睡中驚動
搖頭便血
角弓反張
慢驚
驚風
盤腸氣痛
胎風
五輭
卷之四
風熱風症
夜啼
胎症
目症
鼻塞鼻衄
卷之五
鶴膝行遲
五鞕
瘛症
悲哭
解顱顖填顖陷
耳症
龜胷龜背
齒遲

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

咬牙
痦
腹痛
癖塊痞結
卷之六
發熱
寒熱
欬嗽
喘
語遲
滯頓
腹脹
積滯
潮熱
傷寒夾驚夾食
百晬內嗽
黃疸

吐乳
卷之七
熱吐
霍亂吐瀉
冷瀉
食瀉
諸痢
卷之八
脫肛
吐舌弄舌
寒吐噦逆
賊病
熱瀉
驚瀉
諸瘧
肛門作癢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

便血尿血
小便不通
遺尿
諸痺
卷之九
吐血
胃氣虛寒
腫脹
疝氣
大便不通
諸淋
白濁
二便色白
虛羸
食積寒熱
蚘蟲
渴症

煩躁
卷之十
自汗
噫氣
不寐
吞酸
尋衣撮空
卷之十一
腫瘍
注夏
盜汗
下氣
驚悸
脾弱多困
喜笑不休
潰瘍

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胎毒瘡瘍
胎毒瘰癧
驚風結核
熱毒瘡疥
諸痱口瘡
卷之十二
疔瘡
流注
天泡瘡
熱毒瘡瘍
熱毒瘰癧
胎毒瘡疥
諸痱瘡疥
熱毒口瘡
時毒
天蛇毒
楊梅瘡
赤白遊風
黃水粘瘡
眉煉
卷之十三
喉痺
臂癱
脇癱
臀癱
鶴膝風
腮癱
腋癱
腹癱
腿癱
發痤
頭面瘡

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷之十四
肺癰肺瘻
痔瘡
便癰
足指凍瘡
翻花瘡
漏瘡
卷之十五
作痛不止
腸癰
下疳陰瘻
囊癰
湯火瘡
多骨疽
五瘤
作嘔不止

出血不止
發熱不止
大便不止
小便不止
敷寒涼藥
用刀針法
卷之十六
跌仆外傷
舌斷唇瘡
肌肉不生
大便不通
小便不通
作渴不止
服敗毒藥
五善七惡
跌仆內傷
腦骨傷損

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷之十八
寒戰咬牙飲水瀉渴
頂陷灰白瀉渴
渴吐稠粘大便堅實
欲嚴不嚴欲落不落
痘瘡出遲屬各經所主
泄瀉咬牙作渴
痘瘡發熱屬陰屬陽之異
痘瘡大便不通
卷之十七
痘疹受病之由
腹脹氣促根窠不赤
發熱口渴煩躁不止
腹破腸出
金木所傷
風犬傷
破傷風
顫振
陰囊被傷
漆瘡
瘡瘍發痤
癍癗
痘瘡輕重

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷之十九
痘稠密
痘自汗
倒靨
痘癇搐
痘潮熱
痘咳嗽
卷之二十
小便不和
痘便血或黑屎
痘吐瀉
痒塌
癍爛
痘風
痘吐逆
痘喘症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不靨悶亂便氣腹脹
兩目生翳痘黯凹凸
靨後癸振咽痛不利
頂陷心煩狂躁氣喘
作痒振破膿水淋漓
風邪搏於肌肉患痒蝕
瘢痘
痘瘡生癰毒
夾疹痘
水痘瘡痘
痘疔

痘瘡煩裂出血　痘衄血吐血
痘煩躁　痘腹痛
痘腰痛　痘面青
痘痕赤白　痘瘡
痘瘡痛　痘身疼

保嬰撮要目錄終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之一

古吳薛　鎧編集
男薛　已治驗
後學宋　璞校閱

初誕法

小兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸藉胎液以滋養受氣既足自然生育分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

發爲瘡疹須急於未啼時用軟帛裹指挖去其血用黃連豆豉硃砂麝甘草解之後雖出痘亦輕矣有嚥入即時腹脹嘔吐短氣不乳者用茯苓丸治之但黃連性寒若稟母氣膏粱積熱者宜服苦滋味淡薄胎氣元弱者又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以牛黃分許麝調與吮爲佳世多用犀角解毒丸其胎氣虛寒虛弱者反傷脾胃生氣甚致不育又有嬰兒因其難產或胃風寒而乖戾者切不可便斷臍帶急烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙捻於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦尤戒洗浴恐腠理不密元氣發泄而外邪乘之也

黃連法臨月用黃連細切爲末綿裹百沸湯拭口甘草法預以甘草細切少許臨産時以綿裹沸湯泡盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連法硃蜜法

硃蜜法用黃連細切沸湯泡良久濾淨拭兒口中吐去惡汁更與硃砂一大豆許細研以蜜一覩

殼抹兒口服之非獨鎮心定魄安神解毒更能
益肝膽除煩熱辟邪氣也
又牛黃法與硃蜜同少加牛黃能益肝膽除熱定
精神止驚邪辟惡氣除小兒百病
茯苓丸
赤茯苓　黃連去鬚炒各　肉豆蔻去殼面裹煨　枳殼炒各等分
右爲末煉蜜丸桐子大每服一丁九乳汁化下
護養法
巢氏云小兒初生肌膚未實宜用舊物絮護其背背不
可太煖更宜數見風日則血氣剛強肌肉緻密若
藏於重幃密室或厚衣過煖則筋骨軟脆不任風
寒多易致病衣服當隨寒熱加減但令背煖爲佳
亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺亦不宜過飽
若宿滯不化用消乳丸治之陳氏所謂恐二十分寒
吃七分飽頻揉肚少洗澡要肚煖頭涼心胸涼皆
至論也須令乳母預慎七情六淫厚味炙煿則乳
汁清寧兒不致疾否則陰陽偏勝血氣沸騰乳汁
敗壞必生諸症若屢用藥餌則臟腑陰損多變敗

痘可不慎歟大抵保嬰之法未病則調治乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母爲善

消乳丸

縮砂仁　陳皮　京三稜 煨　蓬朮 煨　神麴　麥芽 各半兩　香附子 炒一兩

右爲末麵糊丸麻子大每服二十九白湯下

小兒初生噤風者因胎中受熱毒流心脾生下復爲風邪所乘致眼閉口噤啼聲不出舌上如粟口吐白沫在百日內見撮口者因胎熱兼風自臍入於心脾致面目黃赤氣息喘急啼聲不出舌強唇青聚口撮面腹脹青筋吊腸牽痛吐白沫者不救法當疎利臍風者因斷臍之後爲水濕風邪入於心脾致腹脹臍腫四肢柔直啼不吮乳甚者發搐先用龍膽湯天麻丸之類以去痰涎後用益脾散之類補脾胃若臍邊青黑手拳口噤是爲內搐不治受病之源皆因乳母七情氣鬱厚味積熱所致

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

若瓜甲黑伸引努力臍突者用大連翹飲子之類
又斷臍不盈尺多患此者以舊綿燒灰糝之齒齦
有泡如粟以綿裹指蘸温水擦破口即開不用藥
七日內患者百無一生古人治法大率如此又甲
氏治噤風用天南星末一錢片腦少許以指蘸姜
汁擦齦立開丹溪用赤足蜈蚣去足炙爲末以猪
乳調五分徐徐灌之或用牛黃以竹瀝調服一字
隨以猪乳滴於口中聖惠方用鬱金藜蘆瓜蒂爲
末水調搐鼻中錢氏云撮口因浴後拭臍風邪所
入而作用蓋黃散補之無攄云視其齒齦有泡擦
破口既開用眞白僵蠶爲末窗調塗口內保嬰集
云小兒百日臍風馬牙當作胎毒瀉足陽明火用
針挑破以桑樹白汁塗之又云初生小兒時時宜
傅桑汁不然多有舌硬撮口之症竊謂臍風果因
浴拭外傷皮膚者用綿灰或枯礬抹擦之即愈若
因乳母肝脾鬱怒致兒爲患當治其母若因剪臍
短少或因束縛不緊或因牽動風入臍中或因鐵
器斷臍冷氣傳於脾絡以致前症者口內有小泡

急捐破去其毒水以艾灸臍中亦有生者

千金龍膽湯治月內臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及變蒸客忤鬼氣驚癎加人參當歸

龍膽草炒黑　釣藤鉤　柴胡　黃芩炒
桔梗　甘草
大黃煨各二錢五分　虵蛻二枚去翅足　芍藥炒　茯苓
右爲末每服一二十錢水煎量兒加減
天麻丸治釣腸鎖胜撮口
天南星炮二錢　白附子　牙硝　天麻

五靈脂　全蝎煨各一錢　巴豆霜一字輕粉半錢
右爲末每服一字薄荷湯調下
定命丹治天釣撮口通利痰熱

全蝎七枚　天麻
白附子二錢半　青黛一錢五分　輕粉
片腦一字
右爲末米糊丸菉豆大每服一丸荊芥薄荷湯下先研半丸吹入鼻中

南星炮各二錢半　朱砂錢半
麝香各五分
硃銀丸治胎風壯熱痰盛翻眼口噤或胎中蘊毒

水銀 和棗肉研 全蝎 南星 朱砂 各一錢
白附子 錢半 牛黃 蘆薈 各三分 鉛霜 半錢 和水銀研
片腦 一字 麝香 五分 眞僵蠶 炒七箇
右爲末米糊丸芥子大每服二十丸薄荷湯下
紫霜丸治變蒸發熱不解或食澼先寒後熱或乳哺失節宿滯不化腹痞嘔吐或大便酸臭
代赭石 煆用醋淬七次 赤石脂 各一兩
杏仁 五十箇 麪炒 巴豆仁 三十枚去膜油心
右先將杏仁巴豆研成膏入代赭石脂末研勻湯浸蒸餅丸粟米大每服三十五丸米飲送下
消食丸方見黃疸
控痰散治風嗽先用此藥吐風涎次與光明胃散和胃又與辰砂膏利驚握拳噤口者不治
蝎尾 銅青 各五分 朱砂 一錢 麝香 少許
右爲末每服一字茶清調下輕者勿用或以甘草湯吐之
甘草湯治撮口

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

甘草生一錢
右水煎以綿毬蘸吮令出痰涎却以猪乳點入口中即差

益脾散

白茯苓 人參
甘草 陳皮
右爲末每服一錢薑棗水煎
辰砂膏治服閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫

草菓煨 木香濕紙裹煨
厚朴薑製 紫蘇子炒
等分

辰砂二錢 鵬砂錢半 馬牙硝錢半 玄明粉
全蝎 真珠各錢
麝香一分

右爲末每服一豆許諸驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月内用乳汁調塗乳頭令吮之

慈號散治初生小兒七日不下小便

慈白三四寸 人乳
右同搗如泥傅兒口内即與吮乳

蠶號散治初生兒七日不乳名撮口

殭蠶四箇去嘴略炒 茯苓少許

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右爲末密調傳兒口中
僵蠶膏治撮口用眞僵蠶二十枚去嘴畧炒爲末蜜
調搽口中
撮風散治撮口
鉤藤鉤　朱砂　眞僵蠶焙　赤腳蜈蚣半條
蝎稍各一錢　麝香一字
右爲末每服一字竹瀝調下
瓜蒂散治臍風撮口
瓜蒂七箇赤小豆　秫米各七粒
右爲末用一豆許吹兩鼻內令出黃水更調服
吐黃水即瘥
大連翹湯治胎熱臍風小便不通及諸般瘡毒
連翹　龍齒　荊芥　木通
赤芍藥　當歸　防風　柴胡
滑石　蟬殼　甘草炒各一錢　山梔子
黃芩各五分
右爲末每服二錢加紫草水煎熟甚加大黃更
詳症加減

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

安臍散

羚羊角一錢 麝香炒亂髮一團燒存性 蝟皮一寸赤脚者炙

右爲末斷臍後即傅之以絹帕緊束恐犯風也

脉法

錢仲陽云小兒之脉氣不和則弦急傷食則沉緩虛驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部分既別逆順難明若遇寸口之浮沉必乃橫山於孩子須明虎口辨別二十關消詳用藥如無差誤未至二十歲看虎口食指第一節名風關脉初見易治第二節名氣關脉見病深難治第三節名命關脉見死不治二十關青是四足驚赤是水驚黑是人驚紫色瀉利黃色雷驚二十關通度是極驚之症必死或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾必發驚熱左右一樣者是驚與積齊發有二十條或散是肺生風痰或似鼾鼻聲有赤是傷寒及啾如紅火是瀉紅黑相兼主下痢青多白痢紅多赤痢紫色相兼加渴虎口脉紋亂主胃氣不和青是

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

驚與積青黒發慢驚脉入掌乃肉鈎指紋曲裡風盛鬱外食積此論二十歲以上之法若二十歲以下更用一指按高骨乃分二十關定其息數呼吸八至爲平脉九至不安十至危困浮主風沉遲主虛冷實主有熱緊主癪痛洪主熱盛沉緩主虛瀉微遲有積有蟲遲滿主胃脘不利沉主乳食難化沉細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛牢實主大便秘沉而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數乃驚風爲患四肢掣顫浮洪乃胃中有熱沉緊主腹痛有寒虛濡者有氣又主慢驚乳主大便利血四歲以下用一指交轉尋二十部以關爲準七八歲移指少許九歲次第依二十關部位尋取十一十一歲亦同十四十五歲依大方脉部位脉先定浮沉遲數陰陽冷熱沉遲爲陰浮數爲陽更兼看部位青主驚風白主虛瀉赤主痰熱黒色病甚黄主脾痺以此相參察病治療庶無誤矣又全幼心鑑云小兒半歲之際有病當於額前眉端髮際之間以名中食二十指曲按之兒頭在左舉右手在右舉左

手食指爲上中指爲中名指爲下二十指俱熱主感
風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若二十指俱冷主外感風
寒內傷飲食發熱吐瀉若食中一十指熱主上熱下
冷各中一十指熱主夾驚之疾食指熱主胸滿食滯
又當參辨脉形主之○流珠形主飲食所傷內熱
欲吐或腸鳴自利煩躁啼哭用助胃膏消飲食分
陰陽若食消而病仍作用香砂助胃膏以補脾胃
○瑠珠形主脾虛停食胸膈脹滿煩渴發熱用五
味異功散加山查枳實健脾消食後用六君子湯
調養中氣○長珠形主脾傷飲食積滯肚腹作痛
寒熱不食先用大安丸消其積滯次以異功散健
其脾氣○來蛇形主脾胃濕熱中脘不利乾嘔不
食此痰邪內作先用四味肥兒丸治痰後用四君
子湯補脾○去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短
喘急不食困睡先用六君子湯加和實健脾消積
次以七味白术散調補胃氣○弓反裏形主感冒
寒邪哽氣出氣驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳
嗽吐涎先用惺惺散助胃氣祛外邪後以五味異

功散加茯神當歸養心血助胃氣若外邪既解而驚悸指冷脾氣受傷也宜用七味白朮散補之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治脾虛甚故也○弓反外形壯實痰熱心神恍惚夾驚夾食風癇痰盛先以天麻防風丸祛外邪又用五味異功散調中氣○鎗形壯風熱生痰發搐先用抱龍丸如未應用牛黃清心丸若傳於脾肺或過用風痰之藥而見不一切諸症者專調補脾胃○魚骨形壯驚痰發熱先用抱龍丸治之如未應屬肝火實熱少用抑青丸以清肝隨用六味丸以補肝或發熱少食或痰盛發搐乃肝木尅脾土用六君子湯加柴胡補脾土以制肝木○水字形壯驚風食積胸膈煩躁頓悶少食或夜啼痰盛口噤抽搐此脾胃虛弱飲食積滯而木尅土也先用大安丸消導飲食次以六君釣藤鉤補中清肝若已服消食化痰等劑而病不愈者用四君升麻柴胡釣藤鉤升補脾氣平制肝木○針形壯心肝熱極生風驚悸頓悶困倦不食痰盛搐搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子加

鈎藤鈎平肝實脾○透關射指形主驚風痰熱聚於胸膈乃脾肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾肺化痰涎次用六君子湯加桔梗山藥補脾土益肺金○透關射甲形主驚風肝木尅制脾土之敗症急用六君木香鈎藤鈎官桂温補脾土未應即加附子以回陽氣多得生者嘗聞古人云小兒爲芽兒如草之芽水之漚蓋因臟腑脆嫩口不能言最難救劑當首察面色而知其所屬次驗虎口以辨其所因實爲治法之簡要也

虎口三關脉紋

十三指形

流珠形

長珠形



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.



來駝形

弓反外形

去駝形

環珠形

弓反裏形



魚骨形

鎗形

針形

水字形



透關射甲形

透關射指形



流珠只一點紅色環珠差大長珠圓長已上非謂圈子總皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖去蛇亦如此分上下朝故曰來去角弓反張向裡爲順向外爲逆鎗形直上魚脊分開水字即三十脉並行針形即過關一十粒米許射甲即命脉向外透指命脉曲裡雖然余常治之亦有不專執其形脉而投劑者蓋但有是症即服是藥而亦多驗

治驗

一小兒發熱吐瀉腹脹不乳其紋如流珠此脾胃氣傷先用香砂助胃膏後用六君子湯全愈

一小兒寒熱作嘔飲食不入按其腹乃哭脉紋如長珠此飲食停滯也用大安丸吐瀉宿滯遂安但唇白抽動大便稀黃此病邪去而虛熱所迫也用六君子湯加藤鈎而愈

一小兒胸腹膨脹發熱頓悶脉紋如環珠以手按腹即哭此屬脾胃虛而飲食停滯也先用保和丸一服前症如失更加煩渴按其腹而不哭此宿食去而脾胃復傷也用五味異功散加柴胡治之頓瘳

一小兒不時乾嘔乳食不進脘腹膨脹脉形如來蛇此脾胃虛而成痃也用四味肥兒丸治痃佐以四君加蕪黃健中而痊後傷飲食吐瀉完穀形氣甚困四肢微搐視其紋如去蛇余曰且勿用藥次日吐止但搐而瀉青黃此脾土虛而肝木勝也用六君子加鈎藤鈎而瘥

一小兒未及周歲氣短喘急乳食少進晚或吐

乳視其形如土坠駝乃脾傷而食積先用六君子
加山查枳實漸愈後乳食復傷吐瀉作渴先與
胃苓膏繼與白术散而愈
一小兒睡卧驚悸發熱痰盛脉形如弓之向外
此因驚木旺傷脾而食不消也先以天麻防風
丸祛風定驚後用五味異功散壯脾止搐全瘥
一小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏
此屬胃氣虛而外感寒邪也先用裡裡散以解
外邪調胃氣諸症頓愈但手足逆冷又用六君

子湯調補元氣而安
一小兒患咳嗽服牛黃清心丸加喘促腹脹余
視其右臉色赤紋指如鎗屬脾氣復傷用六君
子湯頓安
一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚
骨此風熱急驚之症也先用抱龍丸少許祛風
化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝而愈
一小兒咳嗽發熱右臉赤色作渴煩悶倦怠少
食肚腹作脹脉紋如針此風邪傷肺而飲食傷

脾也先用六君子湯加桔梗杏仁柴胡一劑諸症少愈後去杏仁柴胡再劑而安

一小兒發熱夜啼乳食不進昏迷抽搐痰盛口噤脉紋如水字此脾肺氣虛風木所乘痰食積於胸腹也先用大安丸後用六君子加鉤藤鉤而愈

一小兒發熱右臉赤咳嗽痰盛其脉紋透關射指余以爲風邪蘊結於肺而痰作也用二陳加桑皮杏仁桔梗治之自用發散降火之劑風痰不退發熱益甚余曰此脾肺氣虛治失其宜遂用五味異功散加炒桔梗漸愈又用六君子湯而痊

一小兒停食發熱服芩連三稜厚朴等劑飲食日少胸腹膨脹其紋透至指甲用補中益氣湯加木香鉤藤鉤温補脾氣平制肝木數劑漸効又用六君子湯加炮薑治之而安其間泛用金石腦麝祛逐之劑變驚而歿者不能枚舉惜哉

香砂助胃膏　方見熱吐

五味異功散 方見內鈎
六君子湯 方見內鈎
太安丸 方見虛羸
四味肥兒丸 方見嘔吐
四君子湯 方見內鈎
七味白朮散 方見腹痛
惺惺散 方見咳嗽
天麻防風丸 方見咳嗽
抱龍丸 方見傷寒

牛黃清心丸 方見急驚
抑青丸 方見驚啼
六味丸 方見腎臟
保和丸 方見虛羸
胃苓湯 方見霍亂吐瀉
二陳湯 方見寒冷嘔吐

變蒸

巢氏云小兒變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者體熱仲陽云變者易也又云變蒸者自內而長自

下而上又身熱故每變畢即覺性情有異於前何者長生藏腑意智故也何謂二十二十日長骨添精神人有二百六十五骨以象天數以應暮歲以分十十二經絡自初生至二十二十一變生癸屬足少陰經腎藏精與志六十四日二十變一蒸生壬屬足太陽經膀胱腑其發耳與骸冷腎與膀胱合俱主於水天一生水地六成之至九十六日三十變生丁屬手少陰經心藏神其性爲喜至二百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽經小腸腑其發汗出而微驚心與小腸合爲火地二生火天七成之至二百六十日三五變生乙屬足厥陰經肝藏魂喜哭至一百九十二十日六變三蒸生甲屬足少陽經膽腑其發目不閉開一作而赤肝與膽合主木天三生木地八成之至二百一十四日七變生辛屬手大陰經肺藏魄主聲至二百五十六日八變四蒸生庚屬手陽明經大腸腑其發膚熱而汗或不汗肺與大腸合主金地四生金天九成之至二百八十八日九變生己屬足太陰經脾藏意與智至三百二十

十日十變五蒸生戊屬足陽明經胃腑其發不食腹痛而吐乳脾與胃主土天五生土地十成之又手厥陰經心包絡爲臟手少陽經三焦爲腑此一臟一腑俱無狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃天地之數以生成之此後乃生齒能言知喜怒故受血故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治又六十四日爲二十六蒸計四百四十八日又六十四日爲二十六蒸計五百一十二日至五百七十六日變蒸既畢兒乃成人也變者生五臟也蒸者養六腑也變者上氣蒸者發熱每經一變一蒸情態即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或汗或吐或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷骶冷上唇發泡如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹

中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨循環各有證應其治法平和者微表之實熱者微利之可服紫霜丸黑散子柴胡湯有寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之變蒸之外小兒體貌情態自然平和大抵人得中和之道以爲純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血和平而百脉順所以心智益通精神俱備臟腑充實形體固壯齒細髮黑聲洪睡穩此乃受氣充足真性得全而無疾爾前症蓋小兒所不免者雖勿藥亦可也前藥峻厲非惟臟腑之不勝抑且反傷氣血余嘗見一小兒至二變發熱有痰投抱龍丸一粒至三至不救觀此可驗慎之慎之其有不熟不驚畧無症候而暗變者蓋受胎氣壯實故也

紫霜丸 方見撮口

紫陽黑散治變蒸解利熟氣

麻黃 二兩不去節 大黃半兩 杏仁 去皮尖分半研

右以前二十味和二十處杵碎畧焙存性後入杏仁

膏和之容盛貯無用一日豆許乳汁和嚥之

柴胡湯治變蒸骨熱心煩啼哭不已

人參二錢　茸草微炙　柴胡五分　麥門冬去心二錢
防風　龍膽草酒炒黑各一錢

右每服一錢水煎

當歸散治變蒸有寒無熱

當歸二錢　木香　官桂辣者　甘草炙
人參各一錢

右每服一錢薑棗水煎

調氣散治變蒸吐瀉不乳多啼微發溫及驚

木香　香附子　人參
藿香　甘草炙各一錢

右爲末每服一錢薑棗水煎服

橘皮
肝臟

錢仲陽云肝主風實則目直大叫頂急頓悶虛則咬牙呵欠氣熱則外生風氣溫則內生風大青膏散之若能食飲水不止用大黃丸微下之肝熱則目直不搐手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱

飲水喘悶瀉白散主之肝病秋見肺性不能勝肝也當用益黃散補脾瀉青丸治肝肝有風則目連眨得心熱則搐用瀉青丸治肝導赤散治心甚則身反張目直不搐心不受熱也當用地黃丸補腎瀉青丸治肝唇白者不治又張潔古云肝主風自病則風搐拘急若心乘肝爲實邪肺乘肝爲賊邪腎乘肝爲虛邪凡肝得病必先察其肺腎腎者肝之母肺者肝之賊今肝得病若非腎水不能相生心是肺金鬼邪來尅故其來在肺先治其肺次

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

其鬼也其來在腎先補其腎滋其源也然後審其本臟之虛實而寒溫之竊謂前症若肝經實熱而外生風者宜用大青膏散之若既服而前症仍作或益甚者此邪氣已去而脾氣虧損也宜用異功散加芎歸補之若肝經虛熱或因尅伐而內生風者宜用異功散地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便秘結者此邪氣內實也宜用大黃丸下之若既下而食少飲湯或腹作脹者此脾氣內虛也宜用白朮散補之氣血素弱或因病後或服攻伐

之劑而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者乃肝經虛甚也急用地黃丸以補腎肝哽氣短氣長出氣乃肺經虛甚也急用異功散以補脾肺若申酉時哭直視呵欠頓悶項急驚悸手足搥動發熱飲冷者此風火相搏而勝肺金也用柴胡梔子散以治肝火生肝血用異功散補脾土王肺金若唇白者爲脾絕不治夫嬰童之症多因雜嬉厚味七情或兒乳哺失宜或乳母飲食變怒所致病氣既見形氣已虛當推其所因用藥加減麤以治其母兒飲

一二十匙後做此

大青膏治傷風痰熱發搐

天麻　青黛各一錢　白附子煨　烏蛇酒浸取肉焙

鶺尾各五分　天竺黃　麝香各一字

右爲末生蜜丸如豆大每服用半粒薄荷湯化下

大黃丸治風熱裹實口中氣熱便秘赤飲水不正

黑牽牛一半生一半炒　川芎各半兩　甘草一錢

大黃 一兩酒洗飯上蒸

右爲末糊丸麻子大每服數丸温蜜水乳後服以滯利爲度太小用

愚按前症既屬裏實二十使秘法當疎下若初服雖未通利而病勢已退不可再服如二十使未利病勢未退當減數丸研化服之恐過劑則元氣傷而變病也

瀉青丸治急驚發搐眼赤睛疼

當歸 龍膽草 炒 川芎 防風

大黃 炒 羌活

山梔仁 各等分

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸砂糖湯化下

愚按前方足厥陰經解散肌表疎通內熱之藥也若大便秘結煩渴飲冷飲食如常者屬形病俱實宜用此以瀉之若大便調和煩渴飲冷目淡青色屬病氣實而形氣虛宜用抑肝散平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠者屬形病俱虛宜用地黃丸補之大抵前症若因肝經血虛風熱先用四物湯加釣藤鉤以生肝

血次用四君子湯以補脾土若因肝經血燥痰盛用地黃丸滋腎水生肝木四君加芎藥實脾土以平肝木若因攻伐而致脾土虛寒者急用六君子湯加丁香木香溫補脾土否則必變慢脾風也

抑肝散治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡卧不安

軟柴胡 甘草 各五分 川芎 八分 當歸 白朮炒 茯苓 鉤藤鉤 各一錢

右水煎子母同服如蜜丸名抑青丸

小柴胡湯 加山梔牡丹皮治肝膽經風熱瘧癘寒熱往來日晡發熱潮熱身熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或脇痛胸滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐動唇目抽劄並宜用之 變一蒸二

異功散 方見天鈞

地黃丸 方見腎臟

白朮散 方見積滯

柴胡梔子散方見諸熱
導赤散方見心臟
四物湯方見急驚
四君子湯方見內鈎
六君子湯方見內鈎
加味清胃散方見天鈎
補中益氣湯方見虛贏

心臟

錢仲陽云心主驚實則哇哭發熱飲水而搐虛則困卧驚悸不安又云執則睡中口氣温及上竄咬牙而合面卧有青筋冬之意皆心熱也導赤散主之若仰面卧者乃心氣實氣不得上下流通也瀉心散主之心病冬見火勝水也當補腎治心輕者病自愈下竄不語者腎虛性也又張潔古云心主熱若肺乘心爲微邪肝乘心爲虛邪脾乘心爲實邪腎乘心爲賊邪凡心臟得病必先調其肝腎肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求其肝清其源也五臟受病必傳其所勝腎之邪必傳於

心故先治其腎逐其邪也若肝腎脉俱和然後察其心家虛實治之竊謂仰而臥者因其心胸實熱故喜仰而向虛也合而臥而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡其狀矣其咬牙等症多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反甚急温補元氣其心氣冬見或亥子時病益甚或下黑不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸其乳下嬰兒須母服之

錢氏瀉心散治心經實熱

黃連

右爲末每服五分臨臥温水化下

愚按前症若叫哭發熱作渴飲冰抽搐有力仰臥而睡者屬心經實熱宜用瀉心散或導赤散若發熱飲湯抽搐乏力驚嚢咬牙合目而睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤北熱飲冰肺乘心也用瀉白散若搥頭目劄身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱

脾乘心也用瀉黃散若寒視驚悸咬牙足熱唇乘心也用安神丸若因乳母致症亦用前藥以治其母

導赤散治小兒實熱小便秘赤

生地黃　木通　甘草等分

右爲末每服一錢入淡竹葉水煎

愚按瀉心小腸實火之劑蓋心心既病則脾土益虛矣用爲脾母脾爲心子然心經虛熱其所用藥多屬瀉心者審之

錢氏生犀散治心經虛熱

地骨皮　赤芍藥　柴胡　乾葛各一兩

甘草五錢　犀角二錢鎊

右爲末每服一二錢水煎新增

愚按前方云治心經虛熱其所用藥多屬瀉心瀉肝脾之劑虛熱二字恐魯魚也如心經自病而血虛熱者用秘旨安神丸脾虛奪心之氣而熱者用秘旨補脾湯肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

秘旨安神丸治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參 半夏湯炮 酸棗仁炒 茯苓各一錢
當歸酒洗 橘紅
甘草炙 三分 五味子 五粒杵
右爲末姜汁糊丸芡實大每服一丸生姜湯下

地黃丸方見腎症

補心散方見驚啼

瀉白散方見肺臟

柴胡清肝散方見熱症

瀉黃散方見脾臟

秘旨補脾湯方見驚啼

脾臟

錢仲陽云脾主困實則困睡身熱飲水或不飲水虛則吐瀉生風脾胃虛寒則面皖白目無精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下利用調中丸傷風手足冷者脾臟怯也先用益黃散補脾後用大青膏發散脾病見四季皆做此

順者易治逆者難治脾性當面赤黃若兼五臟相勝隨症治之又張潔古云脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦若肝乘脾爲賊邪心乘脾爲虛邪肺乘脾爲實邪腎乘脾爲微邪凡脾之得病必先察其肝心二十臟蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼邪有餘心氣虧則生氣不足當用平肝氣兼益心氣若診其脈肝心俱和則脾家自病察其虛實而治之竊謂前症實者病氣實而形氣虛也若面色晄白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬冀水侮土宜用益黃散若面青唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒用乾薑理中湯若面色萎黃手足不冷此脾土虛弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升麻散外邪若發於寅卯之時用六君柴胡升麻補脾土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土爲順面青者木尅土爲逆當平其所勝以補元氣爲善

大青膏方見肝臟

調中丸方見脾胃虛弱傷乳食嘔吐瀉痢
人參安胃散治脾胃虛寒
人參一錢　黃芪一錢　生甘草　炙甘草各五分
白茯苓四分　陳皮二分　黃連炒二分　白芍藥酒炒七分
右爲末每服一大錢水煎
愚按東垣云益黃散內有丁香青皮之辛熱蓋爲寒水侮土而設也若因熟藥巴豆之類損其脾胃或因暑熱傷乳食而成吐瀉口鼻氣熱而致慢驚者宜用前散

益黃散治脾虛吐瀉不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并疳虛盜汗涎流口角
陳皮一兩　丁香二錢　訶子炮去皮　青皮去白
甘草炙各半兩
右爲末每服一錢水煎服
愚按前症若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉手足並冷或痰涎上壅睡而露睛不思乳食宜用此方若因脾土虛弱吐瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬虛寒也更加木

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

香炮薑若因乳母脾虛肝侮必治以前藥若乳母鬱怒致兒患前症母服加味歸脾湯

錢氏瀉黃散 一名瀉脾散 治脾熱吐舌

藿香葉 甘草 各七錢 石膏五錢 防風二兩

右用蜜酒微炒爲末每服一二十錢水煎

右用蜜酒微炒爲末每服一二十錢水煎

恩按前症若作渴飲冷臥不露睛手足熱甚或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯臥而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤驚悸身熱昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白术散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

人參理中湯 方見傷寒表裏

五味異功散 方見天釣內

六君子湯方見天鈞內鈞

肺臟

錢仲陽云肺主喘實則悶亂喘促或飲冰虛則硬氣出氣短氣若肺盛復感風寒則胸滿氣急喘嗽用瀉白散肺熱則手捻眉目鼻白用甘桔湯肺虛熱則唇色深紅少用瀉白散肺怯則唇色白用阿膠散若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺病久唇白者此脾肺子母皆虛也若白如豬脂者吉白如枯骨者死如肺病春見肺勝肝也用地黃丸補肝腎瀉白散以治肺目淡青必發驚更有赤者當指爲肝怯也又張潔古云肺主燥自病則喘嗽燥則潤之若心乘肺爲賊邪肝乘肺爲微邪腎乘肺爲實邪脾乘肺爲虛邪凡肺之虛實若心火鑠金當和心滋肺若脾氣虛冷不能相生而肺氣不足則風邪易感宜補脾肺若脾實中痞熱氣上蒸於肺宜瀉脾氣若心脾平和而肺自病當察虛實治之竊謂肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火

炎爍用人參平肺散中焦實痞用大承氣胖不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脉右寸必浮而有力宜用瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱傷肺之說而不用人參誤矣仍參某症治之

瀉白散化痰止嗽寬氣進食

地骨皮 桑白皮 炒各一兩 甘草炙一錢

右爲末每服二三錢入粳米百粒水煎

愚按活人方云喘者肺氣盛而有餘欬然氣盛當謚作氣衰有餘當謚作不足蓋肺氣盛者肺中之火盛也有餘者肺中之邪有餘也其脉右寸必浮而有力右頰色赤用前藥以瀉之前症若乳母感冒風寒肺經蘊熱致兒爲患用參蘇飲若乳母膏粱醇酒積熱致兒是病用清胃散甘桔湯治風熱上攻咽喉疼痛及喉痺妨悶

苦梗一兩 甘草炒二兩

右每服二錢水煎

阿膠散治肺虛咳嗽喘急或咳而哽氣喉中有聲

阿膠一兩蛤粉炒 鼠粘子二錢半炒香 甘草一錢炙
馬兜鈴半兩炒 杏仁七箇去皮尖 糯米一兩

右每服一二十錢水煎去
愚按前方乃宣治肺金之劑經云虛則補其母
若前藥未應當用五味異功散以補脾

地黃丸方見腎臟
四君子湯方見內鈎
參蘇飲方見諸證
人參平肺散方見咳嗽

大承氣湯方見痙症表裏
異功散方見天鈎內鈎
清胃散方見天鈎內鈎

腎臟

錢仲陽云腎主虛無實症惟痘疹實則黑陷更當分別症之虛實假如肺病又見肝症咬牙呵欠者易治肝虛不能勝肺也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋肺病虛參肝強實而勝肺也視病新久虛實虛則補其母實則瀉其子夫腎虛者由胎

氣不盛則神短顴開目多白睛而色皖白此皆難
養縱長不過八八之數若恣色慾不及四旬而亾
或有因病而致腎虛者又云腎氣不足則下竅蓋
腎虛骨重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則
目無精光畏明皆用地黃丸腎病見夏水勝火也
輕者病自退重者當驚發搐又張潔古云腎主寒
自病則足脛寒而逆腎無實瘡疹黑陷乃實是水
制火也若心乘腎爲微邪肺乘腎爲虛邪肝乘腎
爲實邪脾乘腎爲賊邪木臟虛弱正令不行鬼賊

尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽見於初春
當補腎見於夏救肺見於秋救脾見於冬補心瀉
本臟乃名寒嗽大抵五臟各至本位即氣盛不可
更補到所尅位不可更瀉然五行之中惟腎水一
臟毋盛而反受邪何則肺屬金射於皮毛所主者
氣腎屬水主於骨髓所藏者精氣之輕浮能上而
不能下精之沉重能下而不能上此物性之自能
今肺氣得熱而上蒸則不能下生於腎而受邪矣
急服涼藥解之此腎病必先求肺或脾經之濕刑

起於腎宜去脾濕若脾肺平和而腎自病則窓其本臟而治之竊謂下竅羞澁遺溺等症足不喜覆若蓋腰以下皆腎所主乃心氣下行於腎部也法用地黃丸壯腎水以制心火若因脾肺虛而不能生腎水者用補中益氣湯六味地黃湯以滋化源其瘡疹里證陷乃腎虛而邪氣實也法尤當用地黃丸

地黃丸

熟地黃 八錢杵膏 山茱萸 肉乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢

右爲末入地黃膏量加米糊丸桐子大每服數九溫水空心化下行遲鶴膝加鹿茸牛膝五加皮

愚按前九治腎肝血虛燥熱作渴小便淋秘痰氣上壅或風客淫氣患瘰結核或四肢發瘡眼目瞤動或咳嗽吐血頭自肢暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或自汗盜汗便血諸血或漏赋不足肢體瘦弱解顱顧朱音或畏明下竅五遲五軟腎痿肝痿或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎

肝諸虛不足之症宜用此以滋化源其功不可
盡述
補中益氣湯方見虛勞

傷寒撮要卷之一終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之二

古吳薛　鎧編集

男薛　已治驗

後學宋　璞校閱

面上症

錢仲陽云左腮爲肝右腮爲腎口色青主驚積不散欲發風候紅主痰積驚悸黃者食積癥傷欲作痃癖白主洩瀉水穀不化欲作吐黑主臟腑欲絕○甲堂青主初患驚瀉紅主大

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

驚夜啼黑主客忤○山根青主二次驚瀉後發躁
黑黃甚者死○年壽平陷主大青主發熱生驚黑
主利死紅主躁死微黃曰平黃甚曰霍亂○承漿
青主食時被驚黃主吐逆亦主血利黑主驚風○
両眼黑睛黃主有熱白睛黃主食積痃痢白睛青
主驚風黑睛黃主傷寒○眉上青吉忽紅主煩躁
夜啼黃主霍亂久病紅者死○風氣二十池青主風
候紫主吐逆或發熱黃主吐逆赤主煩躁夜啼○
兩顴赤主肺有客熱○兩太陽青主二次受驚青

自太陽入耳者死紅主血淋○兩臉青主客忤黃
主痰溢赤主風熱○兩頰赤主傷寒兩顧青主吐
蟲○兩金匱青主第二次驚風黑遠日一十日死青
連目入耳七日死○兩風門紅主風熱黑主痛青
主水驚黑從眉入耳即日死唇黑不食者死○面
青眼青肝病面赤心病面白肺病面黃脾病面黑
腎病○額間赤色主心經有熱煩躁驚悸若飲水
或叫哭屬本經實熱用瀉心散以清心火微赤困
卧驚悸熱渴飲湯屬虛熱用秘肓安神丸以生心

血青黑主驚風腹痛或瘛瘲啼叫用五味異功散加木香柴胡鈎藤鈎補脾肝青黑主心腹作痛此寒水乘心用芫花黃散微黃主驚癖用安神丸○左臉青或兼赤主肝經風熱項強頓悶目劄瘛瘲用柴胡清肝散色微赤倏熱咬牙屬虛熱用地黃丸青黑主肝尅脾而驚搐腹痛用六君子加薑桂微赤主潮熱血虛心躁先用秘旨安神丸次用地黃圓○右臉赤主風邪氣羅咳嗽發熱飲水爲實熱用瀉白散若哽氣出氣唇白氣短屬虛熱用五味異功散若脾熱所傳用清胃散心火所刑用人參平肺散淡赤主潮熱心躁或大便堅秘用宣明柴胡飲子以疎導如潮熱未止更用鈎藤飲以清肝色青白主咳嗽惡心先用惺惺散解表邪健脾土更以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內鈎用六君鈎藤鈎平肝補脾○鼻微黃爲平赤主脾胃實熱身熱飲水乳食如常用瀉黃散清熱理脾微赤主脾經虛熱身涼飲湯乳食少思用五味異功散補中健脾色深黃主小便不通鼻中

乾燥氣龍鉤血乃脾熱傳於肺腎先用清生犀角地黃湯後用地黃丸色淡白乃脾虛泄瀉乳食不化用六君子湯調補中氣青色主脾土虛寒肝木所勝用五味異功散加木香炮薑温中平肝黑爲久候○頻閒色赤主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通用五苓散以分利鼻準微黃兼右腮微赤乃脾肺燥熱不能化生腎水用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若頻閒微赤乃膀胱陽虛陰無所化用六味地黃丸若小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯用六味丸加車前牛膝脾肺氣虛不能通調水道者亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有熱用六味地黃丸如不應則用補中益氣湯益脾肺生肝腎若小便後出白津或莖中作痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸○甲堂青黑主腹痛夜啼此脾氣虛寒也脾爲至陰故夜間腹痛而啼用釣藤飲色淡白主泄瀉乳食不化屬脾氣虛弱用五味異功散加木香○人中黃主傷乳胃逆青主下利乳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

食不化噯氣酸腐此脾虛停滯先用大安丸消食後用異功散健脾黑王蛔蟲咬痛○唇色白王止涎嘔逆或吐血便血乃脾氣虛弱不能攝涎統血歸源急用六君子湯色赤乾燥而皺者王脾經熱渴水便不通煩熱不寐先以清胃散治其熱次以四君黃連山梔調其脾黃王食積泄瀉乳食不化以六君子湯健脾色赤兼白王亡血乃脾肺虛熱不能攝血歸源用聖濟犀角地黃湯清熱補血用四君子湯以補脾氣如久不應用麥門冬散或人參安胃散○目睛色黃王脾經積熱用清胃散久病用四味肥兒丸以治疳熱唇白抽動王驚熱不安用異功散加山梔釣藤鉤補脾手肝若口流涎唇色紫乃脾氣虛寒用異功散加炮薑木香若腹中痛口吐涎乃蟲作痛先用蕪荑散後用調中丸不吐涎是積痛也用異功散手足厥冷用理中湯加烏梅溫補中氣而痛自止或吐後或大便去後而痛止者先用下積丸後用異功散○白王失血久青王驚風久黑色繞口者不治耳後微赤此少

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

陽經風熱用柴胡飲子清肝生血微黃王冊中驚悸咬牙用四君子加芎歸朮麻以調理脾氣〇耳乾燥王冊骨蒸熱作渴盜汗用地黃丸若小便後出白津或玉莖疼痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯後用地黃丸若稟賦腎氣不足或早近女色致小便泄滯或作痛如淋者急用地黃丸補中益氣湯滋其化源或大小便去後穀道牽痛者其虛尤甚用前丸加牛膝車前肉桂如手足逆冷或畏寒少食陽氣虛寒也急加附子多可得生大抵多因稟賦臟氣不平或乳食寒暑失節或娠乳母飲食起居六淫七情所致若初病元氣無虧乳母如常發熱壯熱一十便秘結作渴飲冰聒不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢體畏寒而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣更宜審胎氣之虛實臟腑之相勝而治之庶無悞矣

瀉心散 方見心臟

秘旨安神丸 方見心臟

五味異功散 方見內鈎
朱砂安神丸 方見發搐
柴胡清肝散 方見諸熱
地黃丸 方見腎臟
六君子湯 方見內鈎
補中益氣湯 方見虛羸
人參安胃散 方見脾臟
瀉白散 方見肺臟
清胃散 方見內鈎

宣明柴胡飲子 方見發熱
鈎藤飲 方見慢驚
惺惺散 方見咳嗽
瀉黃散 方見脾臟
濟生犀角地黃湯 方見便血
五淋散 方見五淋

發搐

錢仲陽云驚癇發搐男左視無聲右視有聲女右視無聲左視有聲此相勝也蓋左爲肝部右爲肺

部金木相勝故耳若寅卯辰時身熱目上視手足動口流涎項強急此肝旺也巳午未時身熱發搐心神驚悸目上視牙緊流涎手足搐動此心旺也申酉戌時身熱微搐而喘目微斜睛露睛手足冷大便淡黃水此肺旺也亥子丑時微搐卧而不安身微熱目緊斜喉中有痰大便色白困睡流涎此腎虛也若握拳拇指在內女爲順拇指在外男爲順順則易治逆則難愈若涎入心肝則不能言用涼心鎮驚下痰逆搐者不治吐瀉後變症者亦不治如手足冷汗搐眉搐脏日夜不止名眞搐當用人參湯川烏全蝎等藥平其胃氣傷風發搐口中氣熱呵欠手足動者名假搐用大青膏發散風邪傷食後發搐身熱困睡嘔吐不思乳食者當先定搐後用白丸子下之百日內發搐眞者內生風一二十次必死假者外生風雖頻發不死外傷風者用大青膏塗顖門及浴體法○寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便結屬肝膽經虛熱用柴芩參苓散作渴引飲自汗盜汗屬肝膽經血虛用地黃丸口吻

流涎屬肝木尅脾土用六君子湯○巳午未時發搐若兼作渴飲水屬風火相搏以地黃丸補肝導赤散涼驚丸治心若作渴飲湯體倦不乳土虛而木旺也用地黃丸以補腎六君子湯以補脾○申酉戌時微搐而喘目微斜身似熟睡而露睛大便淡黃屬脾肺虛熱用異功散手足逆冷或喘瀉不食屬脾肺虛寒用六君炮姜木香名病而元氣虛者用六君子六味丸二藥主之○亥子丑時微搐身熱目睛緊斜吐瀉不乳厥冷多睡屬寒水侮土用益黃散未應用六君薑桂傷風發搐口氣不熟肢體倦怠用異功散補脾土鉤藤飲清肝木若因風邪內鬱發熱而變諸症者當理肺金清風邪若外邪既解而內症未除當理肺補脾若肺經虛損而致驚搐等症者當補脾肺以平肝心則驚搐自止矣若停食發搐嘔吐乳食者宜用消食丸若食既消而前症仍作或變他症者脾土傷而肝木乘之也用六君子加鉤藤飲以健脾平肝若百日內搐者因胎氣所禀亦有乳母七情厚味所致者當

兼治其母而以固胃爲先不可逕治其兒也

治驗

一小兒寅卯時發熱痰搐服抱龍丸而愈後復患因自用前藥更加咳嗽氣喘不時發搐面赤或青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘乃脾肺氣虛不時發搐乃木乘土位面青而黃赤乃肝助心脾浮腫流涎乃脾氣虛弱用益智丸以補心神補中益氣湯以養脾肺頓愈

少參王陽湖孫跌傷股骨正體科已續余視其面色青黃口角微動此肝木侮脾之症且氣血筋骨皆資脾土以生但壯脾氣則所傷自愈遂用六君鉤藤當歸三十餘劑諸症悉痊

一小兒兩目連劄手足發搐服天麻防風丸之類每發饑時益甚得飲食稍定此肝木制脾土也用六君升麻柴胡鉤藤鉤二劑而病痊又用補中益氣湯而全効

一小兒巳午時搐熱驚悸發時形氣俱急而黃

瘦食流涎飲湯此心火虛而不能生脾土也不

信自服涼心之藥更加吐瀉而露睛幾成慢脾風用六君薑桂佐以地黃丸而愈

一小兒七歲驚搐發熱不已巳午未時益甚形氣殊倦熱定飲湯此心脾氣虛朝用補中益氣湯加益智仁夕用六君當歸鈎藤鈎尋愈後飲食過多復作吐瀉或治以保和丸反加寒熱發搐此脾土復傷而肝木所侮也用六君柴胡寒熱止而飲食進但午未時仍泄用補中益氣湯加茯苓半夏鈎藤鈎而愈

一小兒百日內患痞痰涎自流用驚風藥益甚視其面色黃中隱白乃脾虛不能攝涎也用六君子補中益氣一十湯而愈後復患兼氣喘自欲表散行痰余謂此肺虛不能納氣歸源耳用五味異功散加鈎藤鈎柴胡調補脾肺清理肝火而安

一小兒患前症面青黑或瘧黃審其母素有鬱怒用加味逍遙散加味歸脾湯治其母而子亦愈

一小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以蔥頭七莖生薑一片細擂攤紙上令置掌中令熱急貼顖門少頃鼻利搐止

一小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加漏蘆令母服之子亦服愈許遂愈

一小兒驚悸痰盛瀉乳不消此感風邪夾驚肝侮脾而氣虛先以天麻防風丸祛風定驚後用五味異功散壯脾止搐而愈

一小兒發熱拘急四肢痿瘓左腮赤此心肝二十經風熱先用柴胡清肝散次用六味地黃丸而愈

一小兒發搐啼叫手足指冷左腮青黑此脾土虛弱腎水反所侮也用六君薑桂一劑頓安又以四君芎歸及補肝散而愈

一小兒發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎仍欲瀉火余曰鼻準青白多而黃色少屬脾

胃虛寒肝木所侮蓋口角流涎脾氣虛而不能攝也大便重墜脾氣陷而不能升也不信另用涼驚之劑果眉唇微動四肢微搐余曰此虛極而變慢風矣始用六君當歸木香炮薑釣藤鉤二十劑未効意欲更藥余曰此藥力未至也仍加附子一片服之即安後去附子又二十劑而愈

一小兒目內色青發搐目直上視叶哭不已或用牛黃清心丸更加咬牙頻悶小便自遺余謂此肝脾虛甚用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熟先用柴胡清肝散以清肝後用六味地黃丸以補腎而愈

涼驚丸治驚癎熱搐心神驚悸白睛赤色牙關緊急潮熱流涎手足動搐

黃連五錢　龍腦一錢研　防風　龍膽草酒拌炒黑

青黛研三錢　牛黃

麝香各一字　鉤藤鉤子二錢

右各另爲末麵糊丸粟米大每服二三五丸至二十一丸煎金銀湯下

愚按前方治心肝二經風熱若心肝虛而見驚

搐潮熟用秘旨安神丸肝木乘脾者用異功散加柴胡釣藤鈎心脾虛弱而潮熟流涎者用異功散若虛寒更加木香不應更加炮薑詳見滯中滯留擦牙通關散治風搐搦閉窻不通痰塞中脘

百節

南星二錢 麝香一字 牙皂二錠燒存性

赤脚蜈蚣一條 僵蠶各二錢

右爲末薑汁蘸藥少許擦牙或調服二三錢涎自出

至聖保命丹治胎驚肉鈎腹肚緊硬啼叫不安及急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事

全蝎十四箇去毒 防風二錢 白附子

炮南星 蟬殼 天麻 僵蠶去絲嘴炒

朱砂各一錢 麝香五分 金箔

右爲末米糊和每兩作四十九每服一九白湯化下有熟者以膽星易炮星

白餅子治傷食嘔吐肚疼噯氣先用此藥一服推下食積却用惺惺散加減參蘇飲不可服冷藥

滑石　半夏　膽南星　各一錢
輕粉　巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛
右以二味爲末入巴豆輕粉研勻飯充菉豆大每服二三五丸紫蘇湯下忌熱物量兒加減
十味安神丸治驚
人參　茯苓　麥門冬　山藥　各二錢
片腦二分　朱砂　井草　寒水石　各五分
龍齒一錢　金箔二片
右爲末蜜丸鷄頭大燈心湯調下一方有馬牙硝

浴體法
天麻二錢　蝎尾去毒　朱砂　各五分　烏蛇肉酒浸焙
白礬各二錢　麝香一字　青黛二錢
右爲末每用三錢水三碗桃枝一握煎至數沸温洛之勿洛背
塗顏法治發瘡
麝香一字　蝎尾去毒　薄荷葉三分　輭蚘
牛黃　青黛末各一字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼顖上四方可出一指許火上炙手頻熨百日裹外小兒可用此

瀉青丸方見肝臟

導赤散方見心臟

地黃丸方見腎臟

益黃散方見脾臟

蘇青膏方見慢驚

大青膏方見肝臟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

目睛瞤動

目者肝之竅也肝膽屬風風木二十經兼爲相火肝藏血血不足則風火內生故曰睛爲之瞤動經曰曲直動搖風之象也宜用四物益其血柴胡山梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣若因肝經血燥而自病者用六味丸以滋其源因肺金尅肝木者用瀉白散以平金邪若眼胞瞤動者肝木乘脾土也用抱龍丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙目睛瞤動者血虛不能榮筋脉也用補中益氣湯或

歸脾湯加茯苓五味蓋有餘者邪氣實也不足者眞氣虛也凡病氣有餘當認爲不足況此症兼屬肝脾多爲慢驚之漸尤當審之

治驗

一小兒三歲因驚抽搐發熱久服抱龍丸等藥面色或赤或青余曰始因肝有實邪故宜用前藥今面色青赤乃肝經虛熱傳心矣遂用六味丸以養肝腎佐以生君升麻柴胡以補脾胃諸症頓痊

大尹周應昌子患瘧癉恪服化痰之劑虛症迭出殊類驚風又進祛風至寶丹小便頻數肢體抽搐或兩目連劄咬牙呵欠或嘔瀉懶食大便重墜此脾土傷而肝木乘之也用補中益氣湯六味地黃丸而愈

冬官朱小溪子項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此木尅土症也用六君子湯九味蘆薈丸而愈

憲幕顧斐齋玄孫二歲頸項結核兩臂反張索

敗毒之藥余意其症屬風熱傷肝血燥筋攣末
致付藥亟草請治果屬前因遂與六味丸一服
侵晨灌之午後肢體舉動如故
儒者王丈遠予患瘰癧痰盛發搐服金石香燥
之劑手足筋攣此肝血復傷而致急驚風也用
加味小柴胡湯加釣藤山梔芎歸二劑又以六
味丸料加五味麥門煎服而安
瀉青丸 方見肝藏
六味丸 方見腎藏

四君子湯 方見天鈞
瀉白散 方見肺藏

唇口瞤動

唇爲脾之華口乃脾之竅又陽明之脉環唇口而
交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此症不獨
病後而已夫脾主涎脾虛則不能收攝多兼流涎
或誤認爲痰而用祛逐之藥則津液益枯不能滋
養筋脉遂致四肢抽搐病勢愈甚原其治法與慢
脾風相同當用大補脾胃之藥加升麻柴胡以勿

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用青皮龍膽草之類兼察其色黃者脾弱也青者肝勝也青黃不澤木來尅土也青赤相兼木火風熱也黑爲寒水反來侮土白爲氣虛从陽亢此宜用六君子湯加小柴胡湯若四肢微搐或潮熱往來或泄瀉嘔吐面色痿黃皆脾胃有傷也宜用白朮黃芪川芎當歸人參陳皮肉豆寇神麴乾葛白芍藥黃連炙甘草白茯苓以補胃氣若脾胃虛弱者用五味異功散虛寒加木香炮薑若脾氣下陷者用補中益氣湯以升其陽作渴者用七味白朮散以生津液若肝木侮脾者用補中益氣湯加茯苓半夏芍藥以制肝補脾

治驗

一小兒傷食發熱屢動或用養胃湯枳實黃連山查之類更加腹脹午後發熱按其腹不痛余以爲服前藥飲食雖化而脾胃復傷也用六君子湯數劑而痊

一小兒傷食發熱嘔吐屢動服消導清熱之劑飲食已消熱赤如故余曰此胃經虛熱耳用四

君升麻柴胡四劑而愈

一小兒素面白忽然目唇微動時面色黃青良久其唇口手足亦微動此脾虛而肝侮之也用五味異功散加釣藤鉤白附子二劑而面青少退再二劑唇口動亦止又用異功散加升麻柴胡四劑而痊

一小兒暑月吐瀉目唇微動面色青白手足並冷仍用玉露散余謂已變慢脾風也當温補脾胃不信後果歿

五味異功散 方見天釣內鉤

補中益氣湯 方見虛亂

七味白术散 方見積痛

六君子湯 方見天釣

小柴胡湯 方見痙症

四君子湯 方見天釣

驚搐目直

小兒忽然驚搐目直者皆肝之風熱也若肝虛生風則目連斜而不搐及多欠呿牙若肝經風實則

目直大叫呵欠項急頸悶若肝經有熱則目直視不省得心熱則搐氣熱則外生氣温則内生其症手寸不須反亂參物宜用瀉青丸壯熱飲冰陽悶宜用瀉白散凡病之新久皆能引肝風風内動則上入於目故目爲之連劄若熱入於目牽其筋脉兩脊俱緊不能轉視故目直也亦有飲食停滯中焦致清陽不升濁陰不降肝木生發之氣不得升致生虚風者須詳審之若胸滿腹痛嘔吐惡食輕則消導化痰重則探吐滯積更須審其所傷寒物熱物亦有因感胃吐瀉致使土敗木侮而生虚風者不可遽服驚藥宜用六君子加芍藥木香柴胡制肝補脾若因脾土虚而自病者用五味異功散凡飲食停滯痰涎壅滿而見驚症者實因脾土虚弱不能生金金虚不能平木故木邪妄動也宜健脾消食其症自愈若輒用驚風之藥反成其風而益其病也況臟腑脆嫩不可投以峻厲之劑治者慎之

治驗

姚儀部子每停食則身發赤暈此飲食內停不消欝熱發外用清中解鬱湯而愈後患搖頭咬牙瘀盛發搐吐出酸味伺其吐盡翌日少以七味白朮散調理脾胃遂不復患

一小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈

一小兒兩目動劄手足發搐數服天麻防風丸之類前症不愈其瘀益甚得飲食稍愈視其準頭及左頰色青黃余曰脾主涎此肝木尅脾土不能統攝其涎非瘀盛也遂用六君升麻柴胡劑二劑飲食漸進諸症漸愈又用補中益氣湯而安

九味養脾湯治小兒大病後面黃肌瘦目動咬牙髮少未能強步因誤服解表瀉利傷尅諸藥而致者宜長緩調理全復胃氣

白朮一錢二分　人參　陳皮　黃芪酒炒各八分　當歸酒洗各四分　白芍藥　白茯苓各六分　川芎　甘草炙　半夏

山查　麥門冬　各六分

右用薑棗水煎服

六君子湯 方見天鈞

五味異功散 方見天鈞

清中解鬱湯 方見丹溪

七味白术散 方見積痛

參苓白术散 方見虛羸

補中益氣湯 方見虛羸

天麻防風丸 方見傷風嗽

睡中驚動

小兒睡中驚動由心腎不足所致蓋心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與恐小兒臟腑脆弱易爲驚恐恐則氣下驚則心無所依神無所歸且夫人之神氣寤則行於目寐則棲於腎今心腎既虛則不能寧攝精神故睡中驚動也治宜清心安神用茯苓補心湯加酸棗仁茯神五味亦有驚嚇而作者因擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定魂用安神鎮驚丸若飲食間因驚而停滯者用

六君子加神麴厚朴食既消而驚未定用茯苓補心湯若木火太過而心神不寧者用導赤散風熱相搏者用柴胡梔子散食鬱生痰驚動不安者用四君以健脾神麴半夏以化痰山梔芍藥以清熱

治驗

一小兒夜睡忽然驚動如搐大便酸臭而色青此飲食傷脾而肝旺也先用異功散加柴胡升麻山梔又用四味肥兒丸而愈

一小兒不時睡中驚動發搐作渴飲冷左顴青額間赤先用柴胡清肝散加鉤藤鉤四劑以治肝火後用五味異功散以健脾又用地黃丸補腎陰而安

導赤散 方見心藏

柴胡梔子散 方見諸熱症即梔子清肝散

六味丸 方見腎藏

四君子湯 方見天鈞

六君子湯 方見天鈞

五味異功散 方見天鈞

扶苓補心湯方見痙

安神鎮驚丸方見急驚

目動咬牙

小兒驚後目微動咬牙者皆病後以津液不能榮其筋脉也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之其日中發熱飲冷而動者氣有餘也用瀉青丸夜間盜汗及睡不寧而動者血不足也用地黃丸或因肝經風邪傳於脾腎者亦令咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味地黃丸若因脾胃虛熱用補中益氣湯加芍藥山梔實熱用瀉黃散蓋牙紫屬手足陽明故也若肝腎熱用六味地黃丸

治驗

癸氏女六歲忽夕發驚目動咬牙或睡中驚搐痰涎壅盛或用化痰祛風等藥益甚余曰面青而見前症乃屬肝木尅土不能攝涎而上湧也當滋腎水生肝血則風自息而痰自消矣遂用六味丸而愈

一小兒患前症痰涎自流用驚風之藥其症益甚脾胃益虛視其面色青黃口中吐痰用六君子補中益氣湯而愈

導赤散　方見心藏

地黃丸　方見腎藏

瀉青丸　方見肝藏

補中益氣湯　方見虛證

六味地黃丸　方見腎藏

六君子湯　方見天

搖頭便血

經曰諸風掉眩皆屬肝木木得風則搖動乃肝經火盛而生虛風也湯氏治鄭都承子搖頭便血七年用祛風藥止血藥百試無効此肝經風熱所乘土受木尅不能攝血而潰入大腸故便血不止遂製清肝益胃湯以平肝益脾祛風熱兼服胃風湯旬餘諸症悉愈便血者風木搖動則土受凌虐而不能統血也或食酸味過多以益其肝致令陰結經曰結陰者便血一升再結二十升二十結三十升又邪

在五藏則陰脉不和陰陽不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行滲入腸間故便血也血亦有乳母恚怒風熱熾盛或肝木傷脾使清氣不升或風邪侵入大腸者治法若因風熱用柴胡清肝散若因怒火用加味小柴胡湯若清氣不升脾氣下陷者用補中益氣湯若風邪侵於大腸者用清肝益胃丸肝經血熱妄行者用六味地黃丸脾土不能培肝木者用六君柴胡鉤藤鉤肝木勝脾土者用四君芍藥鉤藤鉤結陰者用平胃地榆湯

治驗

一小兒傷風咳嗽痰湧余謂脾虛肺弱腠理不密風邪外乘用六君子湯加桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹脹仍用六君子加山查厚朴而安又停食作瀉服消導之藥更加咳嗽余謂當調補脾土不信自用發表尅滯前症益甚更加搖頭余以天麻散倍加鉤藤鉤及異功散而愈

一小兒項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽

搐頭搖目劑此肝木尅脾土也用六君子湯及
九味蘆薈丸頓愈
一小兒病後遇驚即痰甚咬牙抽搐搖頭作瀉
恪服腦麝朱砂等藥以致慢驚而卒
清肝益胃丸
犀角屑　甘草
麻黃去節一錢　黃芪炙炙各半兩
白芍藥　天花粉　全蛇蜕黃炙鉤藤鉤子
羌活　防風
右爲末棗肉杵丸桐子大每服五十丸食後薄

苛湯下
海藏食療云駝蛇主去風邪明目治小兒一百
二十種驚癎寒熱等症蠱毒安胎炒用又治風
癎弄舌搖頭故前方用之
平胃地榆湯　治結陰便血
白朮　陳皮　茯苓　厚朴
葛根各五分　地榆七分　乾薑五分炙甘草
當歸　炒神麯　白芍藥　人參
益智各三分　升麻
附子炮各一錢

右每服一錢水煎服
胃風湯 方見偏風口噤
柴胡清肝散 方見諸熱症
加味小柴胡湯 方見肝藏
補中益氣湯 方見虛贏
六味地黃丸 方見腎藏
瀉白散 方見肺藏
六君子湯 方見天鈞
四君子湯 方見天鈞

天麻散 方見內嗽
異功散 方見天鈞
九味蘆薈丸 方見痃症

偏風口噤

小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經症也噤者筋急由風木太甚而乘於脾以勝木濕則筋太燥然燥金主於收斂勁切故也又曰風之爲病善行而數變或左或右其因一方也治須審而藥之若足陽明胃經氣虛風邪所乘其筋脉偏急者屬外因若

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

足厥陰肝經風熱乘脾筋脉偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亾津液不能養肝致口眼歪斜或半身不遂諸症皆屬肝血不足肝火生風宜滋腎水養肝血壯脾土治法脾胃虛而動風者異功散加柴胡鉤藤鉤脾肺虛而外邪所乘者用鉤藤飲肝火血燥者用六味地黃先津液不足者用白术散若兼目緊上視寒熱往來小便淋瀝面色青漾兩脇脹痛之類皆肝經之本病也或唇口歪斜腹痛少食目胞浮腫面色青黃肢體倦怠之類皆肝木乘脾之症也當審五臟相勝而主之設執其見症槩投風藥反成壞症者有矣

治驗

一小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也朝用柴胡清肝散夕用異功散加鉤藤鉤而愈其時有患前症服祛風導痰之藥者皆不能起

一小兒痢後患前症發搐面色痿黃肢體倦怠

此元氣虛怠惰伐多矣余用補中益氣湯加釣藤鉤子服而漸愈後因乳母乍情飲食失宜或兒乳食過多前症仍作服補中益氣湯五味異功散而應

錢氏全蝎散治驚風口噤喎斜言語不正手足偏廢不舉

全蝎去毒炒　僵蠶直者炒　川芎　黃芩

甘草　桂枝　麻黃去節　赤芍藥各一錢

天麻六錢　天南星去臍二錢

右爲末每服二三錢薑五片水煎服

胃風湯治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下血日夜無度

人參　白茯苓　芎藭　桂

當歸　白芍藥　白术各等分

右散每服二錢入粟米數粒同煎食前服

異功散方見天鈞

六味丸方見腎藏

白术散方見積痛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

柴胡清肝散方見諸熱
補中益氣湯方見虛羸

角弓反張

錢仲陽曰角弓反張者由風邪客于太陽經也經曰風從上受足太陽主周身之氣其脉起於目下項背而行於背肝屬木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其症益甚者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補之若因肝經虛熱或因慈伐眞氣虛熱生風者宜用異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊腹脏膨脹者此中氣損也宜用白术散補之若氣血素弱或服攻伐之劑而手寸衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急用地黃丸以補之仍與肝臟參覽

治驗

一小兒忽腰背反張目上視面青赤白青屬肝

主風赤屬心主火此風火相搏用柴胡梔子散倍加鉤藤鉤頭宴而痰如膠又用抱龍丸而愈一小兒忽腰背反張服治驚之藥後不時舉發而色黃白肢體甚倦余用五味異功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨用前藥即愈遂以參术每服五七分炮薑大棗煎湯調下服至二十兩而不發已上二症元氣虛而病氣實也若用攻邪之藥皆誤矣

一小兒素患前症痰盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二十服以平肝隨用六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非一味痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用人參五錢炮薑三分水煎服而醒至第四劑後加棗二枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執常方鮮不有誤者

人參羌活散 方見驚風

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小續命湯 方見五硬
瀉青丸方見肝藏
異功散方見肺藏
地黃丸方見肺藏
柴胡桂子散 方見諸熱即桂子清肝散
抱龍丸方見傷寒夾驚
六君子湯方見天鈞

保嬰撮要卷之二終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛鎧編集
男薛已治驗
後學宋璞校閱

急驚

錢仲陽云急驚者因聞大聲或驚而發搐搦止如故此熱生於心身熱而赤引飲口中氣熱一十便黃赤甚則發搐蓋熱盛生風陽盛而陰虛也宜以利驚丸除其痰熱不可用巴豆之藥蓋急驚者陽症

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

也俱腑受病而屬實乃少陽相火旺經曰熱則生風風生痰痰熱客於心膈間則風火相搏故抽搐發動經所謂木太過曰發生其動掉眩顛疾是也當用利驚丸導赤散瀉青丸等藥搐止與安神鎮驚丸婁全善亦曰急驚屬木火土實木實則搐而有力及目上視動劄頻瞚土實則身熱面赤而不吐瀉腹膨合睛治法宜涼宜瀉而用涼驚利驚等丸亦有因驚而發者牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動唇口眉眼胠引口中熱氣頻赤唇紅二便秘結脉浮洪數緊此內有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退即宜調補脾氣東垣云若因外物驚者宜黃連安神丸因氣動所驚者宜安神鎮驚丸之類大忌防風丸如因驚而瀉青色宜朱砂丸大忌涼驚丸蓋急驚者風木旺也風木屬肝盛則必傳於脾欲治其肝當先實脾後瀉風木若用益黃散則誤矣經曰邪氣盛則實正氣奪則虛前所云實者乃病氣有餘而形氣不足

也當先瀉而後補虛其急當補脾爲先少以攻邪之藥佐之其所云虛者乃病氣形氣俱不足也當純補眞氣爲要若肝經風火相搏抽搐目瞤筋急痰盛者當用四物湯以生肝血加鈎藤鈎山梔以清肝火更用四君子以補脾六味丸以滋腎若肺金尅木而兼呵欠者用瀉白散以泄肺邪地黃丸以益肝血若邪入肝則用柴胡清肝散加龍膽草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黃連亦通邪入腎用六味地黃丸邪入肺用地骨皮散邪入脾用六君子加柴胡山梔大抵此症屬肝膽經血虛風火相搏而善行數變者爲多若不養肝血不補脾氣純用祛風化痰之藥則脾益虛血益損邪氣延綿必傳慢驚矣

治驗

一小兒九歲因驚發熱抽搐頓悶咬牙作渴飲冷便秘面色青赤而印堂左腮尤赤此心脾二十經風熱相搏乃形病俱實之症也先用瀉青丸料炒黃連一劑大便隨利熱搐頓減繼用抑青

丸一服諸症悉退但面色痿黃肢體倦怠飲食少思此病氣去而脾氣未復也用補中益氣湯及地黃丸而全安

一小兒發熱抽搐口噤痰湧此膽經實火爲驚風也先用瀉青丸一服六味丸二十服諸症即退又用小柴胡湯加芍歸山梔鈎藤鈎次以補中益氣湯而愈

一小兒忽然發熱目動咬牙驚搐痰盛或與祛風化痰藥益甚面色青黃乃肝木尅脾脾之液爲涎虛則涎不能攝上湧而似痰也法當生肝補脾則風自息痰自愈矣遂用六味丸及六君子湯而愈

一女子十二十歲善怒膈中抽搐遍身作痒飲食少思此肝經風熱脾土受尅也用參术柴苓湯以清肝健脾而愈

一小兒二十歲患急驚面赤發熱作渴飲冷用瀉青丸一服熱衰大半因見得効翌早又自製二丁服反加吐瀉發搐面色青白手足指冷此熱既

去而妄自傷脾也用六君薑桂升麻柴胡二十劑得安是以前哲謂小兒易爲虛實攻伐之藥妄其太半乃止不可過之羅謙甫約方約囊之論恪矣

一小兒三歲因驚抽搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安

一小兒潮熱發熱左腮青赤此心肝二經血虛

之症也用秘旨安神丸及四物湯加防風酸棗仁治之而愈

一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷申酉時左腮青色隱隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而愈

一嘉興王一山女七歲因跌傷腿膝兩膝腫潰面色青潔左關無脈余謂驚則氣散而風熱鬱滯於肝故其脈隱伏用四君升麻柴胡釣藤鈎一劑脈至隨愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒印堂青黑至夜啼搐余謂脾土虛寒也用釣藤飲而安後因驚發搐夜啼仍用前藥一劑諸症復愈又用異功散而痊

一小兒七歲患急慢馬將愈而發熱驚悸候服祛風化痰之劑更加驚搐吐痰喘嗽腹脹少食惡寒再用抱龍丸大便似利寒熱往來殊類風症先君治之以爲脾氣虧損諸經無所滋養而然用四君子湯爲主少加升麻柴胡以升補陽氣而愈

一小兒驚風後痰嗽不止晒卧不寧諸藥無効余用牛黃清心丸少許頓止後復傷風那痰盛喘急飲食不下仍用牛黃丸少許而安再用異功散加桔梗而愈

利驚丸　治急驚痰盛發熱潮搐

青黛　輕粉各二錢　牽牛末半兩

右爲末麵糊丸如麻子大每服十丸薄荷湯化下安神鎮驚丸驚退後調理安心神養氣血和平預防之劑也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

天竺黃另研 人參 茯神 南星薑製各五錢 酸棗仁炒 麥門冬 當歸酒洗 生地黃酒洗 赤芍藥炒各三錢 黃連薑汁炒 山梔炒 薄荷 木通 龍骨煅各二錢 青黛一錢另研 辰砂另研 牛黃另研

右爲末蜜丸菉豆大每服三五丸量兒大小加減煎淡薑湯送下

四物湯 治血虛發熱煩躁或脯熱作渴頭目不清若因脾虛不能生血者用四君子湯

當歸 熟地各二錢 川芎各一錢

右水煎服

參朮柴苓湯

人參 白朮 茯苓 陳皮各二錢 柴胡 升麻各七分 山梔炒入分 鈎藤鈎一錢 甘草炒五分

每服一二錢薑棗水煎

黃連安神丸 治心經血虛頭暈驚悸

黃連酒洗六錢 甘草炙五分 生地黃

當歸各一錢五分　硃砂飛過五錢

右爲末飯糊丸梧子大每服十五丸空心白滾湯下如二三十服不應當服歸脾湯補之

牛黃清心丸　治諸風癮疹語言蹇澁健忘恍惚頭目眩運胸中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憒等症或小兒風熱上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大人傷寒汗下之後煩躁發熱不解並宜服之

牛黃一錢二分半　麝香　龍腦

羚羊角各一錢　當歸　防風

黃芩　白朮　白芍藥各一錢半

柴胡　桔梗　麥門冬　白茯苓

芎藭　肉桂　白朮　大豆黃卷

蒲黃　人參　杏仁去皮尖各一錢二分半

神麯各三錢半　雄黃八分

甘草五分　白歛七分半　犀角二錢　乾山藥七錢

乾薑三錢　金箔一百二十片　大棗十箇蒸熟爛研

右爲末煉蜜丸每兩作十丸金箔爲衣每服一丸溫水化下

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

朱砂丸 方見發搐
瀉青丸 方見肝臟
導赤散 方見心臟
抑青丸 方見肝臟
補中益氣湯 方見虛羸
地黃丸 方見腎臟
小柴胡湯 方見發痙
六君子湯 方見天鈞
秘旨安神丸 方見心臟
異功散 方見天鈞

慢驚

錢仲陽云慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷口鼻氣微手足爰瘛昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也溫白丸主之蓋慢驚者陰症也瀉脾肺俱虛肝木所乘而俱臟受病而屬虛因吐瀉脾虛則搐而無力經所謂木虛則搐致瘛瘲微搐爰全善所謂木不及曰委和其病搖頭是也（謂手足搐動火泄瀉心悸）虛則身寒口中氣冷土虛則吐瀉睡而露睛治宜

溫補脾胃用六君子湯五味異功散之類徐用誠云乙木屬陰乃肝臟病故慢而難治況有夾熱夾食夾痰與外感症相似者當宗錢氏方主之保嬰集云急驚屢發而屢用直瀉之藥則脾陰愈消而變爲慢驚多矣大率吐瀉痰鳴氣喘眼開神緩昏睡露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷面淡青白或眉唇青赤其脉遲沉數緩是也當溫補脾氣爲主而佐以安心制肝東垣亦云慢驚風由脾胃虛而生脾虛者因火邪乘其土位火旺能實其木

木旺故來剋土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼致脾土中金旺火衰風木自虛矣亦無賊不足或久病脾虛及常服剋伐之藥者多致此症若因土虛不能生金金不能平木木來侮土而致前症者以五味異功散加當歸酸棗仁佐以釣藤飲子補土平木若脾土虛寒者用六君子加炮薑木香不應急加附子以回陽氣蓋陰血生於脾土宜四君子當歸酸棗仁

凡元氣虧損而至昏憒者急灸百會穴若待下痰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療因脾虛不能攝涎故津液妄泛而似痰者當依前法自効若不審其因泛用祛風化痰之劑則脾氣益傷陰血益損病邪益盛而危矣

治驗

舉人余時正子傷食發冊服發表之劑手足抽搐脈抱龍丸目瞤痰盛余謂脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜温補胃氣遂用六君加附子一劑而一小兒抽搐痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君桔梗桑皮杏仁肺而愈

一小兒傷風咳嗽痰湧用六君加山查厚朴而安又復停食作嘔或用藥下之更加咳嗽余謂脾肺俱虛宜用調補彼以爲緩自服發表祛滯前症益甚頭項顫動余用天南星散

倍加釣藤鉤及異功散而愈

一小兒遇驚即痰盛咬牙發搐搖頭作瀉恰服腦麝朱砂等藥以致慢驚而卒

术附湯　治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風症頭目眩重等症

白术四兩　茸草炒二兩　附子炮去皮臍一兩

右爲末入附子每服二十錢薑五片棗一枚水煎服

愚按附子温中回陽爲慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不應須用每隻重一兩二十四錢端正不尖底平週圍如蓮花瓣者佳否則悞用川烏也製法切去皮尖以童便浸之秋冬七日春夏五日每日一換浸畢切作四塊以濕草紙包數層微火煨半日取出切開無白星爲度如急用炮至烈紋即投童便中良久浸透切片如色白再微炙之氣脫甚者急生用亦効

太乙保生丹　治慢驚尚有陽症者

全蝎青者十四箇　白附子生用　真殭蠶
蟬殼　琥珀　防風　牛膽南星
朱砂各一錢　麝香五分

右爲末米糊丸大金箔爲衣每服一二十丸
薄荷湯化下ス

聚寶丹　治慢驚

人參　茯苓　琥珀　天麻
真殭蠶　全蝎炙　防風　牛膽南星
白附子生用　朱砂五分　麝香少許　烏蛇肉酒浸焙一錢

右爲末煉蜜丸大每服二丸菖蒲湯下ス

金箔鎮心丸　治風痰痰熱心神不寧驚悸煩渴
唇焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

朱砂一兩　白茯苓　人參　甘草各半兩
山藥一兩半　片腦　麝香五分
牙硝一錢半
金箔十二貼爲衣

右爲末煉蜜丸每用五錢作五十丸以金箔爲衣每服一丸薄荷湯化下ス含化亦得

草紫河車二錢半黑豆煎湯

温白丸　治驅風豁痰定驚

人參　防風　白附子生用眞殭蠶　全蝎各一錢焙　天麻　南星湯洗七次焙各二錢　烏蝎四君子湯卽四君子湯加　末每服三五分薑棗水煎服次服去川烏

天南星散　治慢驚驅風豁痰

南星重一八一九一錢者一簡堀地坑深尺許先用炭五斤燒赤通紅以好米醋一碗酒一坑中卽投南星二以火一炭密蓋又用盆覆時許取出去炭為末入琥珀全蝎各一錢每服二字煎生薑

防風湯下ス

烏沉湯　治慢驚驅風助胃

天麻二錢　人參　南星焙　木香　眞川烏生用全蝎焙　沉香各一錢　甘草炒五分

右為末每服三五分薑水煎服ス

沉香散　治助胃氣止吐瀉

茯苓二錢　沉香　丁香　木香　藿香　厚朴製　甘草炙各一錢

右為末每服一字米飲湯調下ス

蘇合香丸一分 青州白丸子二分

右和勻每服五分薑湯調下

銀白散 治胃虛吐瀉

糯米炒二兩五錢 扁豆蒸二兩 藿香二錢

白朮炒一兩 丁香二錢 甘草炙三錢

右爲末紫蘇米飲調下直指方加炮白附子全蝎木香石蓮薑水煎

釣藤散 治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鉤二錢 蟬殼 天麻 防風

蝎尾去毒 人參各半兩 藿香五分 麻黃

殭蠶炒 甘草炙 川芎各二錢五分

右爲末水煎服虛寒加附子一錢

黑附子湯 治慢脾風四肢厥冷

附子炒去皮三錢 木香 人參各一錢

白附子一錢 甘草炙五分

右爲散每服三錢薑五片水煎若手足既温之即止後服

生附四君子湯　治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以正胃氣

人參　白朮　附子　木香
茯苓　橘紅　甘草　各等分

右爲末每服五七分薑棗水煎服

辰砂膏治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐者

黑附子一枚重一兩以上者去皮臍頂上空孔入辰砂末一錢仍用附子塞之炭火燒存性　白附子炮　五靈脂　蝎稍各二錢半　牛膽南星半兩

右爲末煉蜜九桐子大每服二三十錢生薑汁泡湯下

七寶辰砂丹治風痰奇効慢驚慢脾以辰砂爲主

木香佐之用開元錢一箇背後上下有兩月片者放鐵匙上炭火內燒少頃成珠子取入盞中作一服用木香煎湯送下大人參湯亦可

天麻防風丸　方見膽風

參苓白朮散　方見虛羸

異功散　即五味異功散方見虛羸

四君子湯 方見天鈞
益黃散 方見脾臟
六君子湯 方見天鈞
補中益氣湯 方見虛癆

驚癎

錢仲陽云小兒發癎因血氣未充神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所觸亦有因娠七情驚怖所致者若眼直目牽口噤涎流肚膨搐背項反張腰脊強勁形如角弓終日不醒則爲痙矣如面赤目瞪吐舌嚙唇心煩氣短其聲如羊者曰心癎面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折其聲如犬者曰肝癎面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如豬者曰腎癎面如粘骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫其聲如鷄者曰肺癎面色赭黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癎五癎通用五色丸爲主仍參以各經之藥心癎屬血虛者用養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱用妙香散肝癎者虛症用地黃丸抽搐有力爲實邪用柴

胡清肝散大便不通用瀉青丸腎癇者用地黃丸
紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之肺癇者
屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生也用五
味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸
脾癇者用五味異功散若面青瀉利飲食少思用
六君子加木香柴胡若發熱抽掣仰卧面色光澤
脉浮病在腑爲陽易治身冷不搐覆卧面色黯黑
脉沉病在臟爲陰難治凡有此症先宜看耳後高
骨間先有青脉紋抓破出血可免其患此皆元氣
不足之症也須以紫河車（即小兒胞也）丸爲主而以補
藥佐之設若泛行劫伐復傷元氣則必不時舉發
久而變危多至不救又有驚風食癇二種詳見後
方仍參驚風胎風治之

治驗

一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐似驚癇
過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益氣
湯而愈

一小兒十歲一小兒七歲各有癇症歲發二次

後因出痘及飲食停滯舉發頻數用六君子補中益氣一二湯而愈

一小兒患前症每發吐痰困倦半餉而甦諸藥不應年至十二而頻發用紫河車生研爛入人參當歸末丸桐子大每服三十五十九日進二五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈

一小兒七歲發驚癲每作先君令其痊飲人乳後發漸疎而輕至十四歲復發仍用人乳不應余令用肥厚紫河車研爛入乳調如泥日服一二次至數具而愈後常用加減八味丸而安至二十三歲發而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊

五癲丸治諸癲

雄黃　真珠各一兩研細　朱砂水飛半兩

水銀二錢半用鉛三兩溶化入水銀炒結候冷

右爲末煉蜜丸麻子大每服二三十丸金銀煎湯下

錢氏駝黃丸治驚癲因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃 眞者三箇 火煆醋淬 鬱金 七分一處爲末 麝香另入一匙

右爲末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水化下

牛黃丸 治風癇因汗出解脫風邪乘虛迷悶搐掣涎潮屈指如計數是也

牛膽南星 全蝎 各二錢半 曬脫 各二錢半

防風 白附子 生天麻 各二錢半 炒

麝香半字

右爲末棗肉和丸水銀半錢研細入藥丸綠豆大每服一二丸朱砂爲衣

妙聖丹 治食癇因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

赭石 煆醋淬二錢半 巴豆三箇去心油三錢

雄黃 蝎稍 生薑湯下

麝香各一匙 朱砂各一錢 輕粉 杏仁微炒二錢

右爲末棗肉丸梧子大每服一二丸木賊草煎

星蘇散 治諸風口噤不語

湯送下

天南星 醫炮製

右每服五七分薑四片紫蘇五葉水煎入雄猪膽少許温服

斷癇丹治癇瘧後復作症候多端連綿不除者

黄耆蜜炙 釣藤鉤 細辛 甘草炙 各半兩
駝駝二寸 酒炙蟬駝四箇 牛黄一錢另研

右爲末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

消風丸治風癇先宜此藥

牛膽南星二錢 羌活 獨活
防風 天麻 人參 荆芥
川芎 細辛各一錢

右爲末蜜丸桐子大每服二十丸薄荷紫蘇湯調下

祛風保安丸諸風久遠治之並驗

川烏去皮尖二錢生用 五靈脂半兩

右爲末猪心血丸桐子大每服一二十丸薑湯化下

雌黃丸治癲癎搐掣惡聲噤口舌

雌黃　黃丹 微炒 各半兩　麝香五分

右爲末用牛乳汁三大合熬膏杵丸麻子大每服二十三十丸温熟水下

比金丸治驚癎先用此藥

人參　琥珀　白茯苓　遠志 薑製取肉炒　朱砂　天麻　川芎　石菖蒲 細密者　南星　青黛 各一錢　麝香一匙

右爲末蜜丸桐子大每服一二十丸金銀薄荷湯下

虎睛丸治驚癎邪氣入心

虎睛 細研　遠志 薑製浸　石菖蒲　麥門冬 各等分　犀角 銼屑　大黃 濕紙包煨　雄黃 去足翅炒三枚

右爲末米糊丸桐子大每服一二十丸竹葉煎湯或金銀薄荷煎湯下

清神湯治驚癎

犀角 銼　遠志 薑制焙　人參　茸草 炒各一錢半　白蘚皮　石菖蒲

右爲末每服五七分麥門冬煎湯調下
窓陀僧散治心癇不語及諸驚失音用窓陀僧爲
末每服一匙米醋湯調下大人服二錢熱酒下
蝎虎散治驚癇
褐色生蝎虎一箇連血細研
右入朱砂麝末少許同研用薄荷湯調作一服
數年者亦効蓋癇疾皆心血虛滯生蝎虎管守
其血繼服二陳湯若無生蝎以帶性雄猪心血
代用入代赭石散尤妙

代赭石散治陰陽癇
代赭石煅醋淬研爲末水飛過晒乾
右爲末每服五分以金銀煎湯和金箔銀箔調
連進二十服腳脛上有赤斑則難治
化風丹涼風化痰退熱定搐
羌活 獨活 防風 牛膽南星
天麻 人參 川芎 荆芥
粉草各一錢 全蝎一箇

右爲末煉蜜丸皂角子大每服一錢薄荷湯化下

茯神湯治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼不能獨處或是驚癎

茯神　酸棗仁炒　柏子仁炒　白芍藥炒
五味子炒黃者　炒各一兩　柱心　熟地黃自製
人參　甘草炒　五分

右每服二錢水煎

酸棗仁丸治膽氣實熱驚癎或睡卧不安驚悸怔忡

茯神　酸棗仁炒　柏子仁炒
防風　枳殼炒各半兩　遠志
香竹茹二錢五分　生地黃杵膏半兩

右各另爲末蜜丸粟米大每服七八十丸滾湯送下

定志丸治心神虛怯所患同前或語言鬼神喜笑驚悸

人參　茯苓各一兩　菖蒲半兩　遠志各一兩

右各另爲末蜜丸如前服
養心湯治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐發熱煩躁
黃耆　白茯苓　茯神　半夏麴
當歸　川芎　辣桂　栢子仁
酸棗仁　五味子　人參各三錢　甘草炒四錢
右每服一二錢薑棗水煎
妙香散治心氣不足驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐或精神恍惚虛煩少寐
盜汗等症

辰砂三錢　麝香一錢　木香煨二錢半　茯苓
山藥　茯神
桔梗　甘草炒
右各另爲末每服一錢溫酒或白湯調服
遠志　黃芪炒各一兩
人參各五錢
八味地黃丸即六味地黃丸加附子肉桂各一兩治禀賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多溏瀉等症經云益火之源以消陰翳蓋謂此也或乳母命門火衰兒飲其乳致前症者子母並宜服之方見驚癇

加減八味丸治ニ禀賦腎陰不足或ヘ吐瀉久病津液虧損口乾ク作レ渴或ヘ口舌生レ瘡兩足發熱或ヘ瘧氣上湧或ヘ手足厥冷等症ノ卽地黃丸ニ加ニ肉桂一ニ兩五味子四ニ兩

地黃丸治ニ小兒肝經虛熱血燥或ヘ風客滿氣而患瘰癧結核或ヘ四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治ニ腎弱腦熱肢體消瘦手足如レ氷寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齦潰爛瓜黑面黧遍身或ヘ兩耳生レ瘡或ヘ耳內出レ水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等症其功不レ能レ盡述ノ卽六味地黃丸方見腎臟

八珍湯治ニ氣血俱虛ニ陰火內熱或ヘ因レ犯ニ伐之劑脾胃虧損肌肉消瘦等症ノ卽四君四物二湯方見十全大補湯治ニ氣血虛弱或ヘ禀賦不足寒熱自汗食減ニ體瘦ニ發熱作レ渴頭痛咳嗽最宜用レ之方見熱症補中益氣湯方見虛勞

六君子湯方見內鈎

紫霜丸

天麻丸二方見膧風

驚風

驚風者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來夫泄瀉色青若驚入心則面赤夜啼用栀子清肝散加黃連入肝則面青眼窩用柴胡清肝散入脾則面黃嘔吐虛汗嗜卧用六君加柴胡山栀入肺則面白喘急用異功散加柴胡桔梗入腎則面黑嚙妳咬牙用六味地黃丸若因乳母恚怒肝火或膏粱積熱遺兒爲患或兒吐瀉傷脾清氣不升風木陷入太陰傳變等因皆能致此當隨玉治否則必成慢脾也須預慎防爲善

治驗

一小兒十五歲御女後復勞役考試失意患癎症二年矣遇勞則發用斗全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米爲末丸如桐子大每服百丸日二三五服而痊後患遺精盜汗發熱仍用前藥及地黃丸而愈此症治不拘男婦老幼皆効

一小兒周歲從高上仆地良久復甦發搐吐痰涎驚即復作婣後不時

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

發而難愈形氣俱虛面色痿黃服十全大補補中益氣二十湯而愈

至寶丹治諸驚癇心熱及卒中客忤煩躁風涎痛搐或傷寒狂語伏熱嘔吐

生犀角鎊生玳瑁 朱砂水飛 雄黃水飛
虎珀各一兩 銀箔五十片 金箔五十片 牛黃半兩爲末 酒煎成膏 安息香一兩半爲末 麝香一錢 牛黃半兩 酒煎成膏 安息香一兩 去砂取一兩

右各另研爲末和勻入安息香膏如乾入蜜丸

少許九桐子大每服一二十九人參湯化下量兒加減

神妙奪命丹七月內取青蒿節內蟲入朱砂麝爲丸麻子大每服三十五丸薑湯下

人參羌活散治傷風驚熱

羌活 獨活 前胡 柴胡
川芎 白茯苓 桔梗 枳殼
人參 地骨皮 天麻各等分 茸草減半

右生薑薄荷水煎治驚熱加蟬蛻

防風導赤散治初驚

生地黃　木通去節　防風　芽茶各等分

右每服二三錢竹葉少許水煎有熱加黃芩赤芍藥羌活

驒騱鉤藤飲治肚疼驚啼

鉤藤鉤　天麻　茯苓　白芍藥

川芎各一錢　牛膝　驒騱各一兩

右入燈心水煎

七寶洗心散治煩熱生瘡兼治驚風

生地黃　荊芥穗　防風　甘草

黃芩　羌活　赤芍藥各等分

右爲末每服一錢燈心薄荷湯調下

神芎丸治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疼

痛或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大

便澁滯或積熱腹滿驚風潮搐等症

大黃生　黃芩炒各二兩　滑石四兩　生牽牛末一兩

黃連　薄荷葉　川芎各半兩

右爲末水糊丸桐子大每服三十丸温水下

清心丸治驚熱煩躁ヲ

人參　茯神　防風　朱砂

柴胡各三錢　金箔三十片

右爲末煉蜜丸桐子大每服一丁卄丸竹瀝調下ス

化風丹 方見驚癎

安神丸 方見心臟

辰砂膏 方見急驚

柴胡清肝散 方見熱症

六味地黃丸 方見腎症

梔子清肝散 方見諸熱

十全大補湯 即八珍湯加黃耆肉桂

異功散 方見天金

補中益氣湯 方見虛癆

六君子湯 方見天釣

天釣內釣

天釣者發時頭目仰視驚悸壯熱兩目反張淚出テ不流手足搐掣不時悲笑ス如鬼祟所附甚者爪甲皆青蓋因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰

鬱滯或外挾風邪爲患法當解利其邪用鈎藤飲
上焦氣喘粗者用烏蝎四君子湯內鈎者腹痛多喘
唇黑囊腫偃僂反張眼尾赤此胎中受風及外驚
所致若內臟抽掣作痛狂叫或泄瀉縮脚內症一
作外症亦然極難調理內症服聚寶丹外症服鈎
藤飲進乳食者可治若腹痛唇黑囊腫之類用聚
寶丹若外驚內臟抽搐之類用鈎藤飲若因乳母
醇酒厚味積毒在胃用加味清胃散若因乳母鬱
怒積熱在肝用加味逍遙散加味歸脾湯俱加痛

蘆子母俱服凡母食膏粱厚味飼兒之時先擯去
宿乳然後吮之

治驗

一小兒因乳母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭
而曲腰用四物加柴胡防風又用加味逍遙散
加熟地黃以清肝熱生肝血再用地黃丸滋腎
水以生肝木母子俱安

一小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘內鈎
腹痛也用五味異功散加沈香乾薑一劑與母

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

服之頓愈後因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母服其子亦安

一小兒曲腰乾啼手足並冷用六君加乾薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而愈

一小兒忽乾啼作瀉腄中搐手足冷此脾土虛寒肝木侮之而作發搐乃內鈎也用益黃散一劑而安用四君加柴胡升麻乳食漸進而安

一小兒乾啼面青或赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝火氣滯用加味逍遙散及越鞠丸以治其母時灌子數滴不旬日子母並愈

一小兒患前症服藿香散而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘粗此元氣虛寒也余先用烏鵲四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補中益氣湯及五味異功散而痊

一小兒因母每感寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實熱之天鈞也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐瀉面色或青或白

手足並冷屬脾氣虛用六君木香乾薑而愈
三歲後傷食腹痛唇黑作瀉數去後而無糞或
糞少而青此脾氣虛寒下陷用補中益氣湯漸愈
一小兒啼哭陰囊腫大眼白上翻赤脉流淚此
肝熱內鈎用柴胡清肝散加鈎藤鈎治之諸症
漸愈又用鈎藤飲而痊後復發或用祛病根之
藥致乳食日少肚中脹痛手足浮腫余先用六
君升麻柴胡數劑諸症稍愈又傷乳食吐瀉用
平胃散一服即愈

一小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈
用加味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母太
怒發厥而甦兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先
用小柴胡湯二劑母子並服少愈其母又嚥酸
腹脹用越鞠丸加味歸脾湯佐以加味逍遙散
而痊

鈎藤膏治腹痛乾嘔作嘔名盤腸內鈎

乳香　沒藥　木香　薑黃各一錢
木鱉子二箇去油

保嬰撮要 卷之三

右爲末蜜丸皂角子大鈎藤鈎湯磨半丸入一蜜服未止再服魏香散

魏香散

阿魏二錢先用温酒溶化 蓬术五錢

右將蓬术浸阿魏酒中二伏時焙乾爲末每服二十三分紫蘇米飲調下

鈎藤飲治小兒臟寒夜啼陰極發躁此方主之

鈎藤 茯神 川芎

當歸 木香 茯苓

甘草 芍藥各一錢

右爲末每服一錢薑棗水煎若心經熱臉紅舌白小便赤澁用鈎藤飲去木香加朱砂末一錢

木通湯下

乳香丸治驚風內鈎腹痛驚啼

乳香五分沒藥 沉香各一錢 鵝梢十四箇

鷄心檳榔一錢五分

右爲末蜜丸桐子大每服二十三錢菖蒲鈎藤鈎

煎湯下

木香丸治病同前

三十四

木香　全蝎各五分　沒藥　茴香
鉤藤鉤各一錢

右各剉爲末以大蒜研爛和丸綠豆大每
服二十丸鉤藤煎湯下

清胃散治胃火牙痛或連頭面

升麻五分　生地黃　牡丹皮　黃連炒
當歸各三分

右水煎服加柴胡

愚按前方治脾胃實火作渴口舌生瘡或唇口
腫痛齒齦潰爛煩熱連頭面或惡寒發熱或重舌
馬牙吐舌流涎等症子母並宜服之若因脾胃
氣虛寒涼尅伐或虛熱上行口舌生瘡弄舌發
熱飲食少思或喘吐困睡大便不實流涎齦爛
者用五味異功散

四君子治脾氣虛損吐瀉少食

人參　白朮　茯苓　甘草各等分

右每服一錢薑棗水煎新增

愚按前方若胃氣虛弱尅伐傷脾飲食少思或

食而難化若作嘔作泄尤宜用之如兼痰嗽氣逆肢體倦怠面目浮腫者宜二六君子湯

六君子湯即四君子加陳皮半夏治脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺虛痰嗽喘促惡寒或肝虛驚搐目眩自汗諸症並宜服之以滋化源方見四劑

錢氏異功散治吐瀉不食脾胃虛冷者先與數服以益中州之氣

人參 茯苓 白朮 甘草炒

陳皮各等分

右爲末每服二三錢薑棗水煎

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有症致兒患此者子母並服之

加味歸脾湯去芎皮山梔即歸脾湯治脾虛弱損徒忪驚悸等症

人參 茯神去木 黃耆各一錢 甘草

白朮炒一錢 木香五分 遠志去心酸棗仁
龍眼肉 當歸
右水煎服
牡丹皮 山梔炒各一錢
愚按前方若乳母憂患傷脾血虛發熱食少倦或脾虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調脯熟肉熟或面唇流注等症致兒爲患者令子母俱服之
加味逍遥散去牡丹皮山梔即逍遥散治肝脾血

等症
當歸 芎藭 炙芍藥 酒炒茯苓
白朮炒 柴胡各一錢 牡丹皮 山梔炒各七分
右水煎服
愚按前方若乳母肝脾血虛內熱寒熱遍身搔癢腹體作疼頭昏重怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛胸乳腹脹小便不利致兒爲患尤宜用之又治婦人陰虛發熱兒飲其乳以致患者

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

越鞠丸治六鬱飲食少思或胸滿吐酸齒痛瘡疥等症

蒼朮　撫芎　香附　神麴炒
山梔炒　麥芽炒　山查各等分

右各爲末水煮神曲麥芽末糊丸粟米大每服百丸白湯送下

鎮心丸治急驚化痰鎮心

朱砂　龍齒　牛黃各一錢　鐵粉
琥珀　人參　茯苓　防風各二錢

全蝎七箇炙

右爲末蜜丸桐子大每服一二十丸薄荷湯送下

聚寶丹

烏蝎四君子湯二方見慢驚

平胃散方見胃氣虛寒

益黃散方見噤風

人參理中湯方見傷寒

補中益氣湯方見虛熱

六君子湯方見內鈎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鈎藤散 方見慢驚
地黃丸 方見腎臟
柴胡清肝散 方見熱症
四物湯 方見急驚
小柴胡湯 方見痎症

盤腸氣痛

小兒盤腸氣者痛則曲腰乾啼額上有汗皆由肝經風邪所搏也肝腎居下故痛則曲腰乾啼額上有汗者風木助心火也口燥其液故無淚也額上有汗者肝木乘脾也閉足冷者脾氣不營也下利青糞者肝木乘脾也皆由產下澡洗受風冷所致當服鈎藤膏之類若兒額間有乳母及兒受寒邪者用沉香湯之類若兒額間有汗口閉脚冷乃虛寒也用當歸散或沉香降氣湯之類若面赤唇焦小便不通小腹脹痛者乃小腸熱也用人參湯送下二黃丸若痛不止煎葱湯淋洗其腹就以熱葱熨臍腹間良久尿出痛止或以乳香沒藥木香各少許水煎灌甦許若因乳母飲食停滯者用保和丸懷抱氣鬱者加味歸脾湯悉

動肝火者加味逍遥散子母俱服並佳

治驗

一小兒曲腰啼吐右膁青黑此臍腹肉痛因脾土虛冀肝木乘之也用六君子加木香釣藤鈎即愈

一小兒因乳母大怒亦患前症面赤而喘小便不利用加味逍遥散加木通車前子母子服之並愈

一小兒啼吐面赤手足不冷用釣藤飲隨愈後其母飲酒厚味仍作啼手足發熱又用前藥生地黄而愈後又面青手冷啼吐瀉其糞在穢用助胃膏一服而安

一小兒患前症曲腰而啼額間出汗足冷唇青糞青先用釣藤膏治愈後復患仍用釣藤鈎膏而痛減半又煎葱湯熨洗其腹腹痛遂安

一小兒唇青足冷啼聲不絶用助胃膏一服稍安又食生冷之物前症仍作更泄瀉不止先用六君子加木香乾薑二劑乃去木香乾薑又二

劑其瀉頓止又用四君子少加升麻四劑飲食加進

一小兒十四歲腹痛吐瀉手足常冷肌體瘦弱余謂所稟命門火虛也用六君子湯八味九漸愈畢姻後因房勞勤讀感冒發汗繼以飲食勞倦朝涼暮熱飲食不思用六君子十全大補湯尋愈後不愼飲食起居午前膞下熱起則遍身如炙午後自足寒至腰如氷熱時脉洪大按之如無兩尺微甚寒時則六脉微細如絕湯劑稍離火食之即腹中覺冷此亦稟命門火衰之症也用補中益氣湯八味丸各百餘服漸愈後大吐血別慮服犀角地黃丸一劑病益甚飲食頓減面色皎白手足厥冷或時發熱寒時脉微細而短者陽氣虛微也熱時脉洪大而虛若陰火虛旺也余用十全大補及八珍湯六君子之類俱能扶持而血不止復因勞役吐血甚多脉洪大鼓指按之如無而兩寸脉短此陽氣大虛也用人參一兩附子一錢佐以補中益氣湯數

劑諸症漸退乃減附子五分又各數劑脉症悉退乃每服用人參五錢炮薑五分月餘始愈

當歸散治臟寒腹疼面青手冷夜啼不乳

當歸　白芍藥　人參　茸草各一錢去白

桔梗　橘皮各一錢半

右爲末水煎半盞時時少與服之

沉香降氣湯治氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧不食

沉香　砂仁各一錢　茸草七錢半　香附子二兩半

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點平且空心服

愚按前方若乳母中氣鬱滯不能升降患此症致兒作痛者亦用之

二黃丸　方見痞氣

加味歸脾湯

加味逍遥散

釣藤膏　三方見內傷

助胃膏 方見熱吐
魏香散 方見內鉤
六君子湯 方見內鉤
四神丸 方見脫肛
八味丸
地黃丸 並見腎臟
補中益氣湯 方見虛贏

胎驚

小兒胎驚風者因娠婦飲酒忿怒驚跌或外挾風

邪內傷於胎兒生下即病也若月內壯熱翻眼握拳噤口出涎腰強搐掣驚悸啼叫頭縮頤開頰赤面青眼合者當散風利驚化痰調氣及貼頤法甚則以朱銀丸下之若面青拳搐用保命丹鉤藤散之類切不可候作脾風妄用溫藥若眉間色赤或虎口指紋曲裡者可治用鉤藤散仝蝎散若眉間青黑或指紋反出外者不治大抵小兒臟腑脆弱不可輒用銀粉鎮墜之劑反傷眞氣多致不救者且娠婦每月各有經脈滋養二月屬肝二月屬膽

三十月屬心四月屬小腸五月屬脾六月屬胃七月屬肺八月屬大腸九月屬腎十月屬膀胱多因娠時受患而作也須察於某月受病病在某經和其陰陽調其脾胃兼以見症之藥佐之無有不愈

治驗

一小兒患胎驚諸藥不應用紫河車一研爛如泥每用錢許乳化服之更以十全大補湯加鉤藤鉤漏蘆與母服兩月餘舉發漸輕服年餘不再發至出痘後復發取紫河車研入糯米粉丸小菉大每服百丸以乳送下又服一具全瘥畢姻又發仍用前丸及十全大補湯六味丸加當歸黃耆肉桂五味子年餘喜其能遠帷幕得痊後因勞役更作又用前丸及十全大補等藥不應用大劑獨參湯服數斤然後舉發稍緩乃用人參二十兩附子一十錢數服頓止仍用前藥間用獨參湯而瘥

一小兒患胎驚用紫河車丸及十全大補湯及鉤藤膏而愈畢姻後復發用大劑獨參湯六味

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

丸加五味子黃蘗煮當歸煎服半載舉發稍輕年
餘不再發後每勞役怒氣仍發即用前藥隨愈
又傷寒愈後復作虛症悉具莫能名狀用紫河
車二具獨參煎湯十餘斤而瘥後患傷風咳嗽
咽乾內熱用六味地黃丸料加五味子煎服及
十全大補湯而瘥一
十全大補湯 即八珍湯加黃蓍肉桂四物四君合
八珍湯 去黃蓍肉桂即四君四物二湯是也四君
見內鈎四物見急驚
地黃丸方見腎厥

硃銀丸方見噤風撮口
保命丹方見發搐
鈎藤散方見慢驚
全蝎散方見偏風口噤
貼顖法方見發搐一
鈎藤膏方見天鈎
紫河車丸方見前症

胎風

小兒初生其身有如湯潑火傷者此皆乳母過食

膏粱所致也其母宜服清胃散及逍遥散以清其氣血見亦飲數滴可也有身無皮膚而不瘡赤者皆由產母脾氣不足也用粳米粉傅之瘡赤發熱者皆由產母胃中火盛也用石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如腦額生瘡者火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治如脚上有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而發如未滿月而撮口握拳腰軟如隨者此肝腎中邪勝正弱所致也三十日內必不治如男指向裡女指向外尚可治眉紅亦不可治可治者用全蝎散釣藤散等類治之若因大病虛損胃氣而諸臟虛弱所致者用補中益氣湯錢氏地黃丸若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軟者內稟氣不足肌肉未堅也當參五軟而施治之

清胃散

逍遥散二方見內

全蝎散方見口噤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

鈎藤散 方見慢驚

補中益氣湯 方見虛羸

錢氏地黃丸 方見腎臟

五軟

五軟者頭項手足肉口是也夫頭軟者藏腑骨脉皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨弱腎主骨足少陰太陽經虛也手足軟者脾主四肢乃中州之氣不足不能營養四肢故肉少皮寬飲食不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅上下齦屬手足陽明陽明主胃脾胃氣虛舌不能藏而常伸出也夫心主血肝主筋脾主肉肺主氣腎主骨此五者皆因稟五藏之氣虛弱不能滋養充達故骨脉不強肢體痿弱源其要總歸於胃蓋胃水穀之海爲五藏之本六腑之大源也治法必先以脾胃爲主俱用補中益氣湯以滋化源頭項手足三軟兼服地黃丸凡此症必須多用二十藥仍令壯年乳母飲之兼慎風寒調飲食多能全形

治驗

吳江史萬湖子七歲患吐瀉煩渴頭痛天柱骨倒兼面赤色余適在彼先用補中益氣湯加附子二十劑吐瀉止而諸症愈又用錢氏地黃丸料煎服頓安

一小兒七歲夏間過食生冷之物早間患吐瀉面赤作渴手足並熱項軟頭痛午後面色頓白手足並冷脉微欲絕急以六君子湯加附子一劑諸症頓退頭頂頓起而安小兒元氣易虛易實故雖危症若能速用對病之藥亦可回生者

一小兒九歲因吐瀉後項軟面白手足並冷脉微細飲食喜熱余先用六君子湯加肉桂五劑未應更加炮薑四劑諸症稍愈面色未復尺脉未起佐以八味丸月餘面色微黃稍有胃氣矣再用前藥又月餘飲食畧增熱亦大減乃朝用補中益氣湯食前用八味丸又月餘元氣漸復飲食舉首如常又月餘而肌肉充盛諸病悉愈

一小兒十二歲瘧疾後項軟手足冷飲食少思粥湯稍離火食之即腹中覺冷用六君子湯加

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

肉桂乾薑飲食漸加每食中加茴香胡椒之類月餘粥食稍可離火又用前藥百劑飲食如常手足不冷又月餘其首能舉後飲食停滯患吐瀉項乃痿軟朝用補中益氣湯夕用八君子湯及加減八味丸兩月餘而項復舉畢姻後眼目昏花項骨無力頭目覺大用八味丸補中益氣湯二十月餘元氣復而諸症退後每一入房勞役形氣殊倦益汁發熱服後一藥即愈

一小兒十五歲手足痿軟齒不能嚼堅物內熱脯熟小便澁滯如淋服分利之劑小便如淋服滋陰之劑內熱益甚服燥濕之劑大便重墜余謂此稟腎氣不足早犯色慾所致故精血篇云男子精未滿而御女以通其精五藏有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀痛如淋若陰已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛正謂此也遂朝用補中益氣湯夕用六味丸加五味子煎服各三十餘劑諸症漸愈後

夢遺諸症復作手足時冷痰氣上急用十全大補湯加減八味丸料各八劑二十便稍利手足稍温仍用前二十藥三十貼餘元氣漸復飲食如常又飲食停滯吐瀉腹痛按之不爽此脾胃受傷也用六君子湯加木香肉荳蔻治之其吐未已左尺右關二十脉輕診浮大按之如無經云腎開竅於二陰用五味子散四服大便頓止後又傷食嘈酸作瀉大便重墜朝用補中益氣湯夕用六君子湯加木香乾薑而痊

一老年得子四肢疼軟而惡風寒見日則喜余令乳母日服加減八味丸三十次十全大補湯一劑兼與其子年餘肢體漸強至二十週而能行

一小兒五歲稟父腿軟不便於行早喪天真年至十七畢姻後腿軟頭顱自覺開大喜其自謹寡居道舍遂朝服補中益氣湯夕用地黃丸料加五味子鹿茸煎服年餘而健

一小兒項軟服前二十藥而愈畢姻後患解顱作渴發熱汗出藥作大劑煎熟代茶恣飲兩月餘

而渴熱減年餘而顧顧合又年餘而廢體強若
非慎疾難藥不起
星附膏治項軟
天南星　附子　各等分
右爲末用生薑自然汁調敷項間乾則潤之
六君子湯方見天鈞
加減八味丸即六味丸加肉桂五味子方見腎臟
十全大補湯即八珍湯加黃蓍肉桂
補中益氣湯方見虛羸

地黃丸方見腎臟
五味子散方見
五硬
五硬者仰頭取氣難以動搖氣壅作痛連於胸脇
脚手心冷而硬此陽氣不營於四末也經曰脾主
四肢又曰脾主諸陰今手足冷而硬者獨陽無陰
也故難治若肚筋青急者木乘土位也急用六君
炮薑肉桂柴胡升麻以復其真氣若係風邪當汗
驚風治之此症從肝脾二臟受患當補脾平肝仍

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

參痙症急慢驚風門治之
卜續命湯治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃　人參　黃芩　川芎
官桂去皮　甘草炒　杏仁去皮尖炒　漢防己
芍藥各半兩　防風七錢半　附子炮去皮臍二錢

每服一錢水煎服

六君子湯方見天鈞

保嬰撮要卷之三終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之四

古吳薛鎧編集
男薛已治驗
後學宋璞校閱

風熱風症

中風之症面光方有之東南氣温腠理疎泄人患之者皆類中風也況小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱神掣氣粗涎漏甚至痰憤口噤即似中風候以續命等湯投之多至不救

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大人且無真中況小兒乎凡有前症當難其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者爲外因足厥陰肝火熾盛筋脉偏急者爲內因腠肺虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生風之類中風之類症也

治驗方藥散見各症

痙症

發痙之症因傷風汗出或發汗或濕症汗多所致若項背強直腰背反張搖頭掣瘛口不語發熱腹痛病在足太陽也若面赤色無汗惡寒牙關緊急肢體反張痰涎壅盛昏憒煩渴小便赤澁先譫語而發者名剛痙當發汗若大便滑泄不語不渴有汗而不惡寒先手足厥冷而發者名柔痙並以小續命湯加減主之剛痙去附子用麻黃柔痙用附子去麻黃若壯熱譫語口乾手足微寒大便滑泄此兼剛柔無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯若痰塞氣盛用南星半夏茯苓以消痰枳實

陳皮紫蘇以順氣更審其熱輕者用敗毒散熱盛者用小柴胡湯壯熱有汗胸滿口噤咬牙便閉爲內熱以大承氣湯下之後用大柴胡湯解之過二十日則難治此皆治法之不善也若小兒多因驚駭停食或乳母六淫七情飲食起居失宜所致更當審之兼治其母大要因驚目直視久項強頭搖屬肝經實熱用抑肝散咬牙呵欠手尋衣領屬肝經虛熱用地黃丸若肺金不能平木用異功散脾不能養肝用六君子湯水不能

字未用地黃丸

治驗

一小兒感冒發熱咳嗽咬牙余以爲脾肺氣虛不信乃用解散之藥果項強口噤汗出不止手足並冷遂用五味異功散加柴胡木香治之漸愈但日晡微熱睡而露睛用補中益氣湯而痊

一小兒因驚發熱誤行表散出汗面白日晡發痙先兒謂脾肺氣虛而肝膽邪盛以六君子加柴胡升麻治之乃發於寅卯時此肝邪自旺也

用加味逍遥散一二劑其熱頓退又用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一小兒患瘰癧潰而發痙頓悶咬牙寒熱此屬肝經風熱先用柴胡梔子散一二劑寒熱頓止次用四物參芪白朮柴胡漸止又用補中益氣湯加芍藥茯苓而痊

一小兒頭患瘡潰而發痙或寒熱作渴或手足厥冷其脉洪大浮緩按之皆微細此元氣虛而邪乘實也用十全大補湯加柴胡山梔數劑諸症漸退而胍漸飲又十餘劑而愈

一小兒驚風服抱龍丸保生錠吐涎甚多又汗出發痙仍欲祛痰余曰此肝脾血虛而內生風耳吐痰不止脾肺氣虛不能攝涎也汗出發痙脾肺氣虛而上陽也用六君子湯加炮薑木香頓愈又用四君子加歸芪二而安

一小兒傷風發熱服解散之藥汗出不止痓痙悉具其脉洪大鼓指按之微細此汗多亡陽脾肺氣虛之症也用異功散加芍歸黃芪其汗頓

止又用補中益氣湯而痊

一小兒停食腹痛發熱嘔吐服峻厲之劑吐瀉汗多手足並冷發痙不止其脈浮洪按之如絲用六君子湯加升麻炮薑痙痙頻已惟寒熱往來又用四君升麻柴胡而愈

一小兒年八歲發痙服降火消導之劑其脈浮洪寒熱如瘧余用四君子加升麻柴胡炮薑鉤藤鉤及補中益氣湯間服漸愈但胸下作痛去炮薑加木香肉桂而痊

一小兒因乳母大怒發熱脇痛亦患前症兼汗出作嘔先用小柴胡湯一劑子母俱服頓愈但日晡潮熱以異功散加升麻柴胡治之並愈

一小兒因乳母發熱吐瀉二小兒因乳母食厥昏憒同患前症各治其母而子悉愈

桂枝加乾葛湯治頭疼項背強几几汗出惡風者

桂枝　芍藥　甘草　葛根四錢

右每服二錢薑棗水煎

小柴胡湯治身熱惡寒風痙項強直急胸脇滿痛

嘔噦煩渴寒熱往來或身面皆黃小便不利大便秘澁或驚過不解潮熱不除及差後勞復發熱疼痛加瘧發作有時 方見肝臟

加味小柴胡湯 即小柴胡加山梔牡丹皮

保生錠子 治慢驚尚有陽症

全蝎 白附子炮 僵蠶 牛胆南星

蟬蛻 琥珀 辰砂各一錢 麝香五分

防風一錢

右爲末糊搜和捏成錠子金銀箔爲衣用薄荷湯磨服

大柴胡湯 治表裡熱大便秘澁胸脇痛

柴胡 枳實各二兩二錢 半夏一兩五錢

赤芍藥一兩八錢 黃芩二兩 大黃三兩七錢五分

右生薑紅棗煎不拘時服

小續命湯 方見五硬

抑肝散 方見肝臟

地黃丸 方見腎臟

敗毒散 方見發熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六君子湯

五味異功散二方見內傷

補中益氣湯方見虛勞

加味逍遙散方見內鈐

柴胡梔子散方見發熱

四物湯方見急驚

十全大補湯八珍湯加黃芪肉桂即四君四物二湯合用

抱龍丸方見傷寒

四君子湯方見內鈐

大承氣湯治剛痙胸滿內實口噤咬牙大熱發渴大便秘澁

大黃　芒硝各五錢　厚朴一兩　枳實

葛根湯治太陽病項強几几惡風無汗及惡寒剛痙

葛根四兩　麻黃三錢　桂一兩

右每服二錢水煎

夜啼

夜啼有二一日脾寒日心熱也夜屬陰陰勝則脾臟

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之寒愈盛脾爲至陰喜温而惡寒寒則腹中作痛
故曲腰而啼其候面青白手腹俱冷不思乳食是
也亦曰胎寒用鈎藤散若見燈愈啼者心熱也心
屬火見燈則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其
候面赤手腹俱煖口中氣熱是也用導赤散若面
色白黑睛少屬腎氣不足至夜陰虛而啼也宜用
六味丸若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也用六神散若
兼吐瀉少食脾胃虛寒也用六君炮木香大便不
化食少腹脹脾氣虛弱也用異功散心血不足者
秘肯安神丸木火相搏者柴胡梔子散肝血不足
者地黃丸木抵此症或因吐瀉內亡津液或禀父
腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火侮金
當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水
以滋肝木若乳母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳
母暴怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱搏柴胡梔
子散仍宜參客忤驚啼乳食不進昏迷抽搐痰盛

治驗

一小兒發熱夜啼乳食不

禁此脾肺氣虛風木所乘痰食積於胸腹也先用大安丸後用六君釣藤鉤而痊

一小兒三歲面白夜啼小便青而數此肺腎虛弱朝用補中益氣湯加肉桂一分夕用地黃丸而愈大凡小兒面色青黑睛少或解顱足熱者出痘多在腎經須用地黃丸補腎氣多得無恙者

一小兒二歲夜啼而色赤黑睛色淡小便頻赤朝用補中益氣湯加山藥五味夕用地黃丸而愈

龍齒散　治拘哭肚疼驚熱

龍齒　蟬脫　釣藤鉤　羌活　茯苓各等分

右爲末每服一錢水煎服

碧雲散　治渾身壯熱夜啼

栢葉二分　南星　鬱金　雄黃各一錢

右爲末每服一字用薄荷湯入蜜調服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

六神散　治腹痛面色青口中氣冷及四肢俱冷曲腰而啼或泄瀉不乳

人參　山藥　白朮各五錢　甘草炒二錢
茯苓　扁豆炒各一兩

右爲末每服一大錢薑二片棗水煎一方有芍藥當歸人參各二十錢五分甘草桔梗陳皮桂各一錢

愚按前症悉屬脾土虛寒元氣下陷本方更加柴胡升麻升提元氣而補脾土爲善

神綠散

全蝎去足翅不拘多少　青薄荷焙乾

右爲末每服五分薄荷湯調下

無擇燈花散　治心燥夜啼

燈花三二顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日二三服一法用燈花塗乳上令兒吮之無燈花用燈草燒灰辰砂少許亦妙或用燈花七枚暖砂一字辰砂少許蜜調塗唇上立安

安神散　治夜啼

蟬蛻四十九枚只用後半段截去前半段并
蚵去足翅

右爲末分四服用鈎藤鈎湯調下

人參黃連散　治心經蘊熱夜啼

人參二錢半　黃連一錢半炒　炙甘草五分　竹葉二十片

右薑水煎服

太乙丹　治驚夜啼青糞

桔梗一兩五錢　藿香葉五錢　川芎二錢五分　白芷三錢

白扁豆五錢炒

右爲末煉蜜九櫻桃大辰砂麝香爲衣每服半
九薄荷湯磨下糞色青棗湯下夜啼燈心鈎藤
湯下加白朮茯苓白芍藥尤妙

地黃散　治身熱口乾咳嗽心煩

生地黃半兩　麥門冬去心七錢　杏仁炮去皮尖

款冬花　陳皮各三錢　甘草炙二錢半

右爲末每服二三錢水煎溫服

鈎藤散方見慢驚

導赤散方見心臟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

地黃丸 方見腎臟

六君子湯

五味異功散 二方見內鈎

秘肯安神丸 方見發搐即十味安神丸

柴胡梔子散 方見諸熱症即柴胡清肝散

加味歸脾湯 方見內鈎

小柴胡湯 方見痙症

大安丸 即保和丸加白朮方見內鈎

補中益氣湯 方見虛羸

悲哭

悲哭者肺之聲淚者肝之液也若六脉弦緊者先以溫湯漬其身取汗次以涼隔散之類清其內熱此張子和治法如此若因乳母怒火遺熱於肝肝火炎熾反侮肺金金木相擊故悲哭有聲者宜用六君柴胡山梔以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚風過服祛風燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液而致者及禀父腎陰不足不能生肝者治各審之若小兒忽然大叫作聲者不治此禀

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

腎陰不足虛火炎上故也用六味丸多有生者仍
衆覺夜啼客忤驚啼重吉口瘡天鈞內鈞等症

治驗

一小兒每忽哭白睛多每悲面色赤余謂熏賦
腎虛火妄動而然也用地黃丸半載後雖哭面
面色不赤諸症皆愈

一週歲兒痰嗽哭不已用抱龍丸少止良久亦
然余視其右腮潔白左腮青赤此肺肝二經相
擊而作先用瀉白散祛肺邪次用柴胡梔子散
平肝木後用地黃丸滋腎水而痊

一小兒瘧痰啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾
腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡鉤藤
鉤啼叫漸緩更加當歸又二十劑而安

一小兒發熱夜啼乳食不進昏迷抽搐痰盛口
噤脈紋如氷字此脾肺氣虛風木所乘痰食積
於胸腹也先用大安丸後用六君子加鉤藤鉤
而痊

涼膈散 方見瘡瘍

防風通聖散 方見風症
六君子湯 方見內劑
六味地黃丸 方見腎臟
抱龍丸 方見傷寒
瀉白散 方見肺臟
柴胡梔子散 方見發熱
大安丸 即保和丸加白木 方見內劑

胎症

小兒胎症謂胎熱胎寒胎黃胎肥胎弱是也胎熱

者初生旬日之間目閉色赤眼胞腫啼哭驚煩壯熱溺黃此在胎中受熱及膏粱內蘊宜用清胃散之類胎寒者初生百日內或手足攣屈或口噤不開此在胎母過食生冷或感寒氣宜用五味異功散之類胎黃者體目俱黃小便秘澁不乳啼哭或腹膨泄瀉此在胎母過食炙煿辛辣致生濕熱宜用生地黃湯之類熱盛者瀉黃散之類胎肥者肌肉稟厚遍身血色彌月後瀕瘦五心煩熱大便不利口吻流涎此受母胃熱所致也乳母服大連翹

飲兒用浴體法以疎通其腠理胎弱者面無精光肌體瘦薄身無血色大便白水時時哽氣目無精神亦宜用浴體法

消風散　治諸風上攻頭目昏眩項背拘急肢體煩疼肌肉顫動耳若蟬鳴鼻塞多噓皮膚頑麻瘙痒癮疹月澁昏困

白茯苓　芎藭　羌活　荊芥穗
防風　藿香葉　蟬蜕微炒　白殭蠶炒去絲嘴
甘草　陳皮炒　厚朴去皮姜汁製

右爲末每服五分茶清或薄荷湯調下荊芥湯亦可

生地黃湯　治婙娠食酒麵五辛積熱小兒生下遍體面目皆黃也乳母仍忌酒麵五辛等物

生地黃　芍藥　川芎　當歸各等分

右每服五錢水煎產婦服仍滴兒口數滴

大連翹飲　方見噤風撮口

瀉黃散　方見脾臟

清胃散

異功散 二方見內鈎

浴體法 方見發搐

解顱顖塡顖陷

錢仲陽云小兒解顱或久不合者因腎氣有虧腦髓不足故兒多愁少喜目睛多白而身瘦蓋人乏腦髓如木無根有數歲而成廢人者服錢氏地黃丸更用南星微炮爲末米醋調傳縫帛烘熱貼之其栢子仁散三辛散封顖散俱效夫腎主骨腎氣實則腦髓充而顖早合骨脉盛而齒早生腎氣怯則腦髓虛而顖不合此由父母精血不足宜用地黃丸補之若在乳下當兼補其母更以軟帛緊束其首使其易合皆虛火上衝當調補脾腎爲善顖塡顖陷亦因所稟腎氣不足及乳哺失宜脾胃虛損所致夫脾主肌肉氣逆上衝而爲塡脹元氣下陷而爲顖陷也並用補中益氣湯地黃丸及用狗頭骨炙黃爲末以鷄子清調敷顖門亦有瀉痢氣血虛脾胃不能上充者亦用前法若手足並冷前湯加薑桂未應虛寒甚也急加附子緩則多致不

保嬰撮要 卷之四

救

治驗

一小兒顱解足軟兩膝漸大不能行履用六味地黃丸加鹿茸治之三十月而起

一小兒十四歲解顱自覺頭大視物昏大畏日羞明此稟賦腎氣怯弱用六味丸加鹿茸及補中益氣湯加山藥山茱萸半載愈二十載而顱合既婚之後仍覺顱門開解足心如炙喜其斷色慾薄滋味日服前藥二劑三載而愈後入房兩腿痿軟又教以服前丸守前戒而愈

一小兒年十四歲而近女色發熱吐痰至有室兩目羞明頭覺脹大仍不斷慾其頭漸大顱門忽開用地黃丸益氣湯之類斷色慾年餘而愈

一小兒年十三歲患前症內熱晡熱形體倦怠食少作渴用六味丸加鹿茸補之不越月而痊

一小兒吐瀉發熱顱陷作渴用七味白朮散毋子並服而愈

一小兒久病發熱其顱或陷或填手足或溫或

令余用補中益氣湯加薑桂治之而安
一小兒顧陷吐瀉手足並冷用白朮散加木香
炮薑治之而愈後傷食腹痛手足復冷用六君
炮薑治之更加昏憒口角流涎此脾胃虛寒之
甚也急加附子遂愈
一小兒病後其顧或陷此脾胃虛熱也朝
用補中益氣湯加薑桂荊子炮薑木香治之而顧
半但作瀉口乾用白朮散以生胃氣而愈
栢子仁散治顧門不合

防風 一兩五錢 栢子仁 一兩

右爲末乳汁調塗顧門十日自合

三辛散治腦角骨大顧門不合

細辛 桂心 各半兩 乾薑一錢

右爲末乳汁調塗顧上乾時再塗

玉乳丹 治解顱

鍾乳粉 如法製 熟地黃 自法製 各半兩
栢子仁 研膏 當歸 各半兩 防風 補骨脂 各一錢

右各另爲末入一膏加煉蜜丸黍米大每服一

一方丸煎荷香湯送下加黃芪茯苓亦可
封顯散 方見發搐
地黃丸 方見腎臟
濟生當歸散 方見黃疸

目內症

經曰目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所常主也又曰諸脈者皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而爲之精故白睛屬肺黑睛屬肝瞳人屬腎上下胞屬脾兩皆屬心而內皆又屬膀胱五臟五色各有所司心主赤赤甚心實熱也用導赤散赤微者心虛熱也用生犀散肝主青青甚者肝熱也用瀉青丸淡青者肝虛也用地黃丸脾主黃黃甚者脾熱也用瀉黃散淡黃者脾虛也用異功散目無睛光及白睛多黑睛少者肝腎俱不足也用地黃丸加鹿茸晝視通明夜視罔見者因禀陽氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰故不能視也用沖和養胃湯凡赤脈翳物從上而下者屬足太陽經用東垣選奇湯從下而上

者屬足陽明經用局方流氣飲蓋翳膜者風熱內
蘊也邪氣未定謂之熱翳而浮於外邪氣已定謂
之氷翳而沈於內邪氣既深謂之陷翳宜升發之
退翳之藥佐之若上睛眼皮下出黑白翳者屬太陽
寒水從外至內者屬少陽風熱從下至上綠色者
屬足陽明及肺腎合病也瞖眼者因肝火濕熱上
衝脾氣有虧不能上升清氣故生白翳睛閉不開
睅淚如糊久而膿流遂至損目用益氣聰明湯茯
苓瀉濕湯及四味肥兒丸目閉不開者因乳食失
節或過服寒涼之藥使陽氣下陷不能升舉故目
不開用柴胡復生湯若胃氣虧損眼睛無力而不
能開者用補中益氣湯暴赤腫痛者肝火熾盛也
用龍膽瀉肝湯多淚羞明者肝心積熱也用生犀
散亦有肝腎虛熱者用地黃丸風沿爛眼者膈有
積熱也用清胃散時時作痒者膿潰生蟲也用點
藥紫蘇膏眼睛連劄者肝經風熱也用柴胡清肝
散若生下目黃壯熱大小便秘結乳食不思面赤
眼閉者皆由在胎時感母熱毒所致兒服瀉黃散

母服地黃丸若乳母膏粱積熱致兒目黃者令母服清胃散若肢體面目爪甲皆黃小便如屙塵色者難治又有痘癥後餘毒未盡上侵於目者屬腎肝虛也用滋陰腎氣丸前症多宜審治其母兼調其兒厥有未盡悉詳原機啓微集中宜參考之

治驗

一女子年十四因恚怒先月經不行寒熱脇痛後兩目生翳青綠色從外至內余謂寒熱脇痛足厥陰之症也翳從外眥起足少陽之症也左關脈弦數按之而濇肝經風熱兼血滯也遂以加味逍遥散加防風龍膽草四服而寒熱脇痛頓減用六味丸月餘而翳消

一小兒十五歲兩目白翳腹脇遍身似疥非疥脯熟口乾形體骨立此肝痨之症也用六味肥兒丸而痊後陰莖作痒小便澄白痰疥益煩狀如大風用大蘆薈四味肥兒丸諸症漸愈又用大蕪荑湯而痊

一小兒白睛多吐痰發搐先用抑青丸四服而

痰搐止後用地黃丸年許而黑睛多

一小兒白睛多三歲不能行語聲不暢兩足非熟則冷大便不實朝用補中益氣湯加五味子乾山藥以補脾肺夕用地黃丸加五味子牛膝鹿茸補肝腎不三十月而瘥

一小兒眼白腿軟兩足熟而倦愁容服地黃丸兩月餘漸健服年餘白睛漸黑出痘無恙

一小兒雀盲眼劄服羌肝丸而目明服四味肥兒丸而目不劄

一小兒目無光芒視物不了了飲食少思大便不調服大蕪荑湯九味蘆薈丸而愈後飲食停滯妄用消導劑目症仍作至晚尤甚用人參補胃湯漸愈又用五味異功散四味肥兒丸而瘥

一小兒九歲素有肝火兩目生翳服蘆薈肥兒等丸隨愈至十四歲後遇用心過度飲食不節即夜視不明用補中益氣湯人參補胃湯四味肥兒丸而愈

一小兒眼胞微腫咳嗽惡心小便淸白余謂脾
痺食積以五味異功散爲主佐以四味肥兒丸
而愈後不節飲食夜視不明余曰此脾胃復傷
須補養爲主不信乃服峻厲之劑後變風症竟
不起

一小兒因發熱表散出汗眼赤發搐審其母素
有肝火發熱以異功散加柴胡升麻子母並服
稍愈又用加味逍遥散其熱頓退繼用補中益
氣湯六味地黃丸母子壽痊

一小兒目赤作痛咬牙寒熱余謂肝經風熱用
柴胡飲子一劑而赤痛止又用四物參芪白朮
補中益氣湯而飲食加

一小兒眼素白或青患眼赤作痛服降火之劑
眼如血貫脉洪大或浮緩按之皆微細用十全
大補湯加柴胡山梔數劑外症漸退而脉漸斂
又數劑而愈

一小兒停食腹痛服巴豆之藥更加目赤作痛
寒熱往來飲食少思手足並冷余用六君升麻

炮薑諸症頓愈惟寒熱未已用四君升麻柴胡而安

一小兒眼赤痛服大黃之藥更加寒熱如瘧余謂脾胃復傷用四君升麻柴胡炮薑釣藤鈎而寒熱愈又用補中益氣湯間服而目疾痊

一小兒因乳母恚怒患發熱等症兒患目痛兼作嘔吐先用小柴胡湯子母俱服頓安但兒哺熱仍嘔以異功散加升麻柴胡治之瘥

一小兒生下目黃二三日面赤黃一小兒旬日內目黃而漸至遍身此二者胎禀胃熱各用瀉黃散一服皆愈

一小兒旬日面青黃此胃熱胎黃也用瀉黃散以乳調服少許即愈後復身黃吐舌仍用前散而安

一小兒患目黃知其乳母食鬱身黃所致以越鞠丸治母瀉黃散治子並愈

一小兒面青寒熱形氣瘦弱眼目生翳用九味蘆薈丸五味異功散目翳漸退乃以四味肥兒

仁齋直指小兒方論 三十

九五味異功散而肌肉生

一小兒眼每生翳皆因乳母恚怒而作用九味蘆薈丸柴胡梔子散母子服之並愈

一小兒乳哺失節服藥過劑腹脹少食大便不調兩眼生花服治驚之藥漸生浮翳余用異功散加當歸柴胡飲食漸進便利漸調少佐以九味蘆薈丸其眼漸明乃用人參補胃湯肥兒丸而痊

一小兒未週歲目內有翳余謂此稟母肝火所致詢其母果素多恚怒見患瘧癘目疾自乳其子余用地黃丸治之其母稍愈後彼無此藥其子遂瞽

一小兒十二歲傷寒咳嗽發熱服發散之藥日漸不明服降火等藥飲食日少目漸生翳余謂中氣虛用人參補胃湯飲食漸進又用千金補肝丸及薰眼之法而痊

一女子十二歲目生白翳面黃浮腫口乾便泄用四味肥兒丸而痊

仁齋直指小兒方論卷之四

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒目羞明癮瘋兩足發熱大便不實食少時咳仍欲治肝祛風余曰兩足發熱小便不調腎肝虛也大便不實食少時咳脾肺虛也朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸元氣漸復乃佐以四味肥兒丸又月餘而瘥

一小兒目痛恪服瀉火治肝之藥反加羞明癮瀝睡中驚悸悲啼此肝經血虛火動傷肺也用五味異功散加山梔補脾肺清肺金用地黃丸滋腎水生肝血而安乃兼服四味肥兒丸而瘥

一小兒目青發搐直視哼哭或用牛黃清心丸加咬牙頓悶小便自遺余謂肝經血氣虛甚也用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散治其肝後用地黃丸補其腎而愈

一小兒目痛兼痒因膏粱積熱仍口渴飲冷便秘先用瀉青丸疎導肝火更用清胃散煎熟磨生犀角服之以解食毒又用四味肥兒丸以治肝症而瘥

一小兒目疾久不愈用大蕪荑湯五劑瘳驗九數服又用四味肥兒丸九而愈

一小兒十四歲用功勞苦半載後自汗盜汗形體殊倦朝用補中益氣湯加五味子蔓荊子夕用十全大補湯毒愈婢姆後因嗜痰頭運恪服清痰理氣之藥忽目不能開余用地黃丸十全大補湯三十月餘而瘥

吳汀史萬湖之孫自乳兒時患目疾年二十目劄頭搖用金櫃腎氣丸愈而復作兩目生翳用聰明益氣湯及前丸而瘥

一小兒因驚眼劄或搐先用加味小柴胡湯加蕪荑黃連以清肝熱又用地黃丸以滋腎生肝而瘥

一小兒兩目連劄或色赤或時拭眉此肝經風熱欲作肝痒也用四味肥兒丸加龍膽草十丸而瘥

一小兒白睛多吐痰發搐用地黃丸爲主佐以抑青丸而搐止後用世傳方地黃丸而黑睛多

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一女子十四歲兩目作痛或發痒或頭運或頭痛或兩脇作痛或寒熱內熱口渴少食經候不調此肝脾二經氣血虛而有熱也用補中益氣湯柴胡清肝散而愈後左鬠上結一核如菩薩漸大如栗腐而作痛此肝經火燥而血病也用加味逍遥散月餘腐肉自脫乃用八珍湯及前藥而愈

一小兒十二歲目久痛漸生青綠翳後赤爛左關脈弦數用九味蘆薈丸加味逍遥散而愈婢

姻後復發用滋陰腎氣丸爲主佐以加味逍遥散而痊

一小兒十五歲因大勞目赤作痛發熱作渴脈洪大而虛用八珍湯加炒黑山梔二劑諸症頓退又用補中益氣湯而痊後因夢遺目仍赤痛用六味地黃丸料加五味子二劑而痛止又三十餘劑而復明

生犀散治心經虛熱

生犀取末二錢　地骨皮　赤芍藥　柴胡

乾葛各一兩　甘草半兩

右每服二十錢水煎

生熟地黃散治眼初患之時因悞築到厥肝受驚風致目腫赤痛痒

生地黃洗　熟地黃各一兩　麥門冬半兩

當歸　甘草炙　防風　枳殼米泔浸麪炒

赤芍藥　杏仁湯炮去皮尖用麪炒赤色　各二錢五分

右每服一錢墨豆七粒水煎

犀角飲治脾火眼疼

犀角一兩　射干　草龍膽炒　黃芩炒各半兩

人參二兩　茯苓二錢五分　甘草三錢　鉤藤鉤七錢半

右每服一錢水煎

牛黃丸治肝受驚遂致患目

牛黃　白附子　全蝎　肉桂

芍藥　石膏各二錢半　白芷　藿香各半兩

辰砂　麝香各少許

右各另爲末煉蜜丸桐子大每服二十丸臨卧薄荷湯化下乳母亦忌熟物之類

世傳方地黃丸治腎虛目睛多白
鹿茸半兩 澤瀉 茯苓 山茱萸
熟地黃 牡丹皮 牛膝各一兩
右爲末蜜丸桐子大每服二十丸鹽湯下
羅氏煮肝丸治疳眼翳瘼羞明大人雀目甚効
夜明砂 青葙粉 穀精草各一兩
右爲末每服二十錢以猪肝批開攤藥在內麻纏
定米泔水半碗煮肝熟取出湯傾糂內薰眼候
湯温分肝三服嚼喫就用肝湯下一日二十服

龍膽飲子治疳眼流膿生翳此濕熱爲病
青葙粉半兩炒 黃芩二錢 羌活 草龍膽各二錢
駝皸一五分 麻黃二錢 五分 穀精草五分
右爲末每服二錢茶清調下
東垣人參補胃湯治勞役飲食不節內障眼痛神効
黃芪根 人參各一兩 炙甘草八錢 蔓荊子一錢
白芍藥炒 黃柏各三錢 酒拌炒四次
右每服二十二錢水煎稍熱服臨卧二十五服

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

千金治雀盲

地膚子 五兩　決明子一升

右爲末以米飲和丸每服二十丸

世傳治雀目

蒼朮 四兩米泔浸切片四兩焙

右爲末猪肝二十兩批開摻藥在內用麻繫定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟薰眼候温臨卧每服三錢大効

聖惠治雀目不計時月用蒼朮一兩爲末每服一錢

本事治小兒赤熱腫眼

大黄　白礬　各等分

右爲末冷水調作餅子貼眼立効

東垣廣大重明湯治兩臉或兩眥赤爛熟腫痛疼及眼胞痒極抓之至破爛赤腫眼楞生瘡亦目多眵淚隱澁難開

草龍膽　防風

細辛苗葉各一錢　生甘草根

右水一碗半煎龍膽至七分入餘藥再煎至半碗熱洗日五七次洗畢合眼須臾瘥

東垣助陽和血補氣湯治發後熟瞼白睛紅多眵淚隱澁此過服涼藥而眞氣不能通九竅也

防風七分　黃芪一錢　蔓荊子二分　白芷二分
升麻七分　甘草炙　當歸身酒洗　柴胡各五分

潔古治眼赤暴發腫

防風　羌活　黃芩炒　黃連炒各等分

右每服一錢水煎服如大便秘加大黃二十分痛甚加川歸地黃各一十分煩躁不得卧加梔子仁二十分

保命點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸　黃連各二錢　防風一錢五分　細辛五分
甘草一錢

右水一大碗文武火熬滴水中不散爲度入熟蜜少許點用

千金補肝散治目失明

青羊肝一具去膜薄切以新瓦炙乾　決明子

藿香一合煞令香

右爲末每服方寸匕日二十服久而有驗

本事治太陽寒水陷翳瞼膜遮睛

白蒺藜　防風各一兩　羌活一兩半　甘菊三兩

右爲末每服二十錢入塩少許百沸湯點服

保命羚羊角散治氷翳久不去

羚羊角　升麻

細辛各等分　甘草減半

右爲末一半蜜丸桐子大每服五七十丸一半

湯水煎吞送丸子煎發陷翳亦羚羊角散之類

用之在人消息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

東垣補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見於太背乃足太陽少陰經中鬱遏厥陰肝經之陽氣不得上通於目故青翳內阻也當於太陽少陰經中是九泉之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陰標中瀉足厥陰之火下伏於陽中內經曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰每日空心服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

升陽湯臨卧服瀉陰丸須預期調養體氣和平天氣晴明服之補其陽使上升通於肝經之末利竅於目矣

羌活　獨活　茯苓　當歸身酒洗焙乾　熟地黃　人參　黃芪　白朮各一兩　澤瀉　橘紅各半　生地黃炒　白茯苓　知母炒黃色各二錢　柴胡二兩　肉桂一錢　防風　白芍藥各半兩

右每服半兩水煎至八分服候藥力行盡方可飲食

東垣羌活退翳湯

柴胡　升麻　當歸各二錢　黃連　羌活　黃芪各三錢　防風一錢五分　五味子　黃芩　黃柏酒浸　芍藥　草龍膽酒洗各五錢　石膏二錢五分

右分之一服水煎入酒少許臨卧熱服忌言語謙南五秀重明丸治眼翳膜遮睛隱澁昏花常服令清利頭目

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

茸菊花五百箇　木賊去節五百根
荆芥五百穗　楮實五百枝

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸白湯化下冲和養胃湯治內障初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色次則視岐視則成二神水變淡白色久則不視神水變純白

柴胡七錢　人參　當歸　炙草
乾生薑　升麻　葛根　白朮
羌活各一兩　防風五錢　黃耆一兩半　白茯苓三錢

白芍藥六錢五味子

右每服二錢水煎大漸散昏如霧露中行漸滋陰腎氣丸治神水寬大視空中有黑花視物二十體久則光不收及內障神水淡白色者

熟地黃三兩　歸尾　牡丹皮　五味子
乾山藥　柴胡各五錢　茯苓　澤瀉各二錢
生地酒炒四兩

右爲末蜜丸桐子大辰砂爲衣每服十丸空心

淩湯化下
渴熱黃連湯治內障有睛淚眵瞷上
黃芩　生地黃　黃連並酒洗　柴胡各一兩
升麻五錢　龍膽草三錢
右每服一錢水煎午後服
柴胡復生湯治紅赤羞明淚多睛少腦漬沉重睛
珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉久視則酸疼
翳陷下者
蒙本　蔓荊子　川芎　羌活

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

獨活　白芷各二分半　白芍藥炒　炙草
薄荷　桔梗各四分　蒼术　茯苓
黃芩各五分炒　柴胡六分　五味子十二粒杵
石每服一錢水煎食後服
黃連羊肝丸治目中赤脉洪甚睛多
黃連爲末　白羯羊肝一具
先以羊肝竹刀刮下如糊除去筋膜再擂細入
黃連丸桐子大每服十丸茶清化下
茯苓燥濕湯治小兒易饑而渴腹脹生瘡目痛生

翳不開睛淚如膿俗謂脾毒眼

白朮　人參　茯苓　甘草炒　蔓荊子　枳殼麩炒
前胡　獨活各三分　柴胡四分　澤瀉一分半　川芎　蒺藜各二分半

右每服二十錢水煎

局方菊睛丸治腑腎不足眼花昏暗

甘菊花四兩　枸杞子　旋覆酒浸炒　巴戟去心各一兩

右爲末蜜丸梧子大每服十丸空心白湯化下

抑青丸　方見驚啼
加味逍遥散　方見肉鈎
大蕪荑湯　方見痔症
九味蘆薈丸　方見諸症
異功散　方見肉鈎
小柴胡湯　方見痙症
柴胡梔子散　方見發熱
驗鈐丸　方見諸痔

耳症

耳者心腎之竅肝膽之經也心腎主內症精血不足肝膽主外症風熱有餘或虛鳴或聾聵或虛也或脹痛或膿痒者邪氣客也稟賦不足宜用六味地黃丸肝經風熱宜用柴胡清肝散若因血燥用梔子清肝散未應佐以六味丸間服九味蘆薈丸若因腎肝俱熱朝用六味丸夕用蘆薈丸若因食積內熱用四味肥兒丸若因乳母膏粱積熱而致者宜加味清胃散脾經鬱結而致者加味歸脾湯肝經怒火而致者加味逍遥散皆令乳母服之兼與其兒少許不可專於治外不惟閉塞耳竅抑亦變生他症延留日久遂成終身之聵矣慎之

治驗

一小兒耳內出膿穢不可近連年不愈口渴足熱或面色微黑余謂腎疳症也用六味地黃丸令母服加味逍遥散而愈後因別服伐肝之藥耳症復作寒熱而青小便頻數此肝火血燥也用柴胡梔子散以清肝六味地黃丸以滋腎遂痊

一小兒耳內出膿久不愈視其母兩臉青黃屬

乳母鬱怒致之也遂朝用加味歸脾湯夕用加味逍遥散母子皆愈

一小兒十二歲素虛羸耳出膿水或痒或痛至十四稍加用心即發熱倦怠總兩腿乏力八年矣用補中益氣湯及六味地黄丸稍愈畢姻後朝寒暮熱形氣倦怠總兩足心熱氣喘嗽痰仍用前二藥佐以六君子湯而愈因後不守禁忌惡寒發熱頭運嗽痰余謂腎虛不能攝水而似痰清氣不能上升而頭運陽氣不能護守肌膚而寒

熱遂用補中益氣湯加蔓荆附子一錢四劑不應遂用人參一兩附子一錢二劑而應乃用十全大補湯百餘劑而痊又因大勞入房喉痺痰湧兩腿不遂用地黄飲子頓愈仍用十全大補湯而安後又起居失宜朝寒暮熱四肢逆冷氣短痰盛兩寸脉短用十全大補湯加附子一錢數劑而愈乃去附子用人參三錢常服始安

一小兒耳中流膿項中結核眼目或劄或赤痛小便或痒或赤澁皆肝膽經風熱之症也用四

味肥兒尤悉愈

一小兒因乳母恚怒兼經行之後多食煎煿兒遂耳內作痛出膿余先用加味小柴胡湯次用加味逍遥散令其母服之子母並愈

一小兒耳出穢水屬肝腎不足先用九味蘆薈丸而痊畢姻後面黃發熱多病又用黃柏知母等藥更胸膈痞滿飲食少思痰涎上壅又利氣化痰加噫氣下氣余用六君子補中益氣一湯乾薑木香等味治之尋愈

田氏紅玉散治小兒聤耳

枯礬　麝香

右爲末研勻先以綿杖子撚膿淨糝入少許

湯氏龍黃散治如前

枯礬　龍骨

黃丹各半兩　麝香一錢

右製法同前

愚按前一方可以治聤症之輕者若係肝經風熱血燥等症必依前方論內服合宜之藥外用此以收膿濕亦無不可若專泥外攻而失內治

謬矣

六味地黃丸 方見腎臟

柴胡清肝散 方見熱症

梔子清肝散 方見熱症

九味蘆薈丸 方見諸症

四味肥兒丸 方見嘔吐

加味清胃散 方見內鈎

加味歸脾湯 方見內鈎

加味逍遥湯 方見內鈎

柴胡梔子散 方見發熱

加味小柴胡湯 方見肝臟

六君子湯 方見內鈎

四君子湯 方見內鈎

地黃丸 方見腎臟

七味白术散 方見積滯

補中益氣湯 方見虛贏

二陳湯 方見寒吐

鼻塞鼻衄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

巢氏云鼻乃肺之竅皮毛腠理乃肺所主此因風邪客於肺而鼻塞不利者宜用消風散或用葱白七莖入油膩粉少許搗攤絹帛上掌中護温貼之隨門因驚仆氣散血無所羈而鼻衄者用異功散加柴胡山梔左臉青而兼赤者先用柴胡清肝散後用地黄丸右臉赤乃肺大腸實熱也用瀉白散鼻色赤乃脾胃實熱也用瀉黄散微赤乃脾經虚熱也用異功散加升麻柴胡色深黄用濟生犀角地黄湯後用楊氏地黄丸淡白色用六君子湯頰間色赤用四物湯加山梔赤甚用五淋散亦便赤色用六味丸補中益氣湯唇色白用六君子湯久不愈用麥門冬飲子若初病元氣未虧乳食如常發熱壯熱二十便秘結作渴飲冰卧不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢體畏寒卧而露睛者悉屬形病俱虚當補正氣爲要

治驗

一小兒咳嗽惡心鼻塞流涕右腮青白此乃脾

肺氣虛而外邪所乘也先用惺惺散咳嗽頓愈但飲食不思手足指冷用六君子少加升麻二劑而痊

一小兒潮熱鼻衂煩渴便秘氣促咳嗽右腮色赤此肺與大腸有熱也用柴胡飲子一服諸症頓退後因驚復作微搐頓悶此肝脾氣血虛也用四君子加芎歸鉤藤鉤而愈

一小兒遍身生瘡空鼻出血因肝脾有熱用四味肥兒丸而愈後食炙煿鼻血復出瘡瘡復發先用清胃散一劑次用四味肥兒丸月餘而痊

一小兒鼻衂滯願作渴時汗乃胃經實熱也先用瀉黃散一服而滯願止又用四味肥兒丸數服而鼻血愈後鼻不時作痒發渴便血用聖濟犀角地黃湯四劑毋子並服別令兒更服四味肥兒丸月餘而愈

一小兒鼻衂發熱作渴右腮色青余謂肝火乘脾先用加味逍遥散毋子並服熱渴漸止另用五味異功散少加柴胡升麻與子服之而愈

一小兒鼻衄服止血之劑反見便血右腮色黃或赤此脾氣虛熱不能統血也用補中益氣湯又用五味異功散加柴胡升麻而愈

一小兒鼻衄久不愈四肢倦怠飲食少思惡風寒此脾肺虛也先用五味異功散而鼻血止又用補中益氣湯而不畏風寒繼用四君少加柴胡升麻而全愈

一小兒鼻衄兩頰赤余謂稟賦腎氣不足虛火上炎也不信別服清熱涼血之藥病益甚余用地黃丸果效嬾翻後虛症悉至用八珍湯地黃丸料壽愈

一小兒鼻衄作渴喘嗽面赤此心火刑肺金也用人參平肺散及地黃丸料加五味子麥門冬煎服而瘥

楊氏地黃散治榮中有熱肺壅鼻衄

生地黃　赤芍藥　當歸身　川芎　各等分

右每服二三錢水煎熟入蒲黃少許春夏衄入地黃汁蒲黃各少許秋冬衄用車前草汁少許

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

麥門冬飲子治吐血久不愈者
五味子十粒麥門冬去心黃芪各一錢　當歸身
人參　生地黃各五分
右水煎服

補中益氣湯方見虛勞

人參平肺散方見咳嗽

柴胡清肝散方見熱症

清胃散

異功散二方見內鈎即五味異功散

瀉白散方見肺臟

瀉黃散方見脾臟

犀角地黃湯即聖濟犀角地黃湯方見便血臟血

五淋散方見五淋

四君子湯方見內鈎

八珍湯即四君四物二湯合服也四君見天鈎四物見急驚

四物湯方見急驚

惺惺散方見熱症

柴胡飲子方見熱症

四味肥兒丸　方見嘔吐
加味逍遥散　方見內鈎
六味地黃丸　方見腎臟

龜胸龜背

仲陽云龜胸者肺熱脹滿攻於胸膈或乳母多食五辛及見食宿乳而成當用龜胸丸或松蘿丹百合丹之類治之龜背者令兒早坐因客風吹着入於骨髓所致以龜尿點背間骨節（取龜尿之法當侯龜眼四顧急用鏡照之其尿自出）又法當灸肺俞穴（在第三推骨下兩傍各開一寸五分）腦俞穴（在第七推骨下兩傍各開一寸五分）用艾如小荳大灸三五壯此多因小兒元氣未充腠理不密風邪所乘或痰飲蘊結風熱交攻而致法當調補脾肺為主而以清熱消痰佐之若因乳母膏粱厚味者當以清胃散治其母子亦服少許

龜胸丸

大黃一錢煨　天門冬去心焙　百合
杏仁麩炒　木通
枳殼麩炒　桑白皮蜜炙

甜葶藶 炒 朴硝 各半兩

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丁丸温水食後化下

枳殼防風丸

枳殼 麪炒 防風

前胡 當歸酒洗 麻黃去節 各一錢

右爲末煉蜜丸黍米大每服十丸食後米湯下

松蓋丹治龜背

花松 枳殼

防風 獨活 各一兩

獨活 大黃 煨

麻黃 大黃

右爲末蜜丸黍米大每服數丸粥飲下量見加減新增

百合丹治龜胸背

百合一兩 木通

杏仁去皮尖炒雙仁不用 大黃煨

右爲末煉蜜丸菉荳大每服十丸食前温酒化服

前胡 桂心 各半兩

朴硝 桑白皮蜜炙

天門冬 各半兩

保嬰撮要卷之四終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.



保嬰撮要卷之五

古吳薛鎧編集

男薛已治驗

後學宋璞校閱

鶴膝行遲

錢仲陽云鶴膝者乃禀受腎虛血氣不充致肌肉瘦薄骨節昜露如鶴之膝也行遲者亦因禀受肝腎氣虛肝主筋腎主骨肝藏血腎藏精血不足則筋不榮精不足則骨不立故不能行也鶴膝用六

味地黃丸加鹿茸以補其血氣血氣既充則其肌肉自生行遲用地黃丸加牛膝五加皮鹿茸以補其精血精血既足則其筋骨自堅凡此皆肝腎之虛也虛而熱者用六味地黃丸虛而寒者用八味丸若手拳攣者用薏苡仁丸足拳攣者用海桐皮散脾胃虧損腎臟虛弱寒邪所乘而膝漸腫者佐以補中益氣湯及大防風湯

治驗

一小兒體瘦腿細不能行齒不堅髮不茂屬足三陰經虛也用六味丸補中益氣湯服餘諸症悉愈形體亦充實

一小兒六歲面色皎白眼白睛多久患下痢忽聲音不亮腿足無力先用四神丸止其痢後用地黃丸加牛膝五加皮鹿茸補其腎兩月餘漸能行步載後其聲響亮後停食另用消食丸連瀉五七次去後益頻五更侵晨爲甚聲音復瘖步履復難而腿足作痛仍服前丸兼補中益氣湯而愈

一小兒七歲左腿自膝下至脛細小行步無力

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用地黃丸加鹿茸五味子牛膝爲主佐以補中益氣湯半載腿膝漸强而能步畢姻後其腿內熱足心如炙唾痰口渴余謂當補脾腎不信另用滋陰丸痰熱益甚服四物黃柏知母之類飲食日少服二陳青皮枳殼之類胸滿吐血服犀角地黃湯嗽血不時大便頻數復請視仍泥實火余離不能治恪服犀角地黃湯而唾血益甚不時發熱後復懇治余曰兩足心熱唾痰口乾腎虛水泛也飲食少思胸膈痞滿唾血不止脾虛失攝也晝發夜伏夜作晝止不時而熱無根虛火也遂用四君子及八珍湯地黃丸間服而愈

四神丸治脾虛胃弱大便不實飲食不思或泄利腹痛等症 方見驚瀉

薏苡仁丸治濕氣怯弱致兩膝攣縮兩手伸展無力

當歸焙　秦艽　薏苡仁　酸棗仁
防己　羌活　各一兩

右爲末煉蜜丸鷄豆大每服一丁丸麝香荆芥湯下又

海桐皮散治禀受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮不能伸展

海桐皮　牡丹皮　當歸酒浸　熟地黃
牛膝酒浸各一兩　山茱萸　補骨脂各五錢

右爲末每服一錢葱白煎湯食前服

五加皮散治四五歲不能行

眞五加皮　川牛膝酒浸二日　木瓜乾各等分

右爲末每服一錢空心米湯調下一日二服

後再用好酒牛蓋與兒飲之仍量兒大小

益氣養榮湯治氣血損傷四肢頸項等處患腫不問輭硬赤白痛否日晡發熱或潰而不斂者並宜服之

人參　茯苓　陳皮　貝母
香附　當歸酒拌　川芎　黃芪鹽水拌炒
熟地黃酒拌炒　芍藥炒各五分　甘草炙　桔梗炒
柴胡各三分　白朮炒一錢

右姜水煎服大人倍用

八珍湯 即四君四物二湯四物見急驚四君見內鈎

四神丸 方見驚瀉

六味丸

八味丸 即六味丸加肉桂附子二方見腎臟

消食丸 方見嘔吐乳

補中益氣湯 方見虛羸

大防風湯 方見鶴膝瘻

四君子湯 方見內鈎

齒遲

經云齒者腎之標骨之餘也小兒稟受腎氣不足腎主骨髓虛則髓脉不充腎氣不能上營故齒遲也用地黃丸主之

治驗

一小兒三歲言步未能齒髮尤少體瘦羸立發熱作渴服肥兒丸不應余曰此腎虛疳症也蓋肥兒丸脾胃經之藥久服則腎益虛其疳益甚不信牙髮漸落余用地黃丸加鹿茸五味子半

載而元氣壯健
一小兒體瘦腿細行步艱辛齒不堅固髮稀短
少用六味地黃丸補中益氣湯年餘諸症悉愈
形體壯實

芎藭散治齒生遲或齒齶物少力

芎藭　生地黃　山藥　當
芍藥 炒　甘草 各等分

右各另爲末每服二錢白湯調
地黃丸 方見腎臟

補中益氣湯 方見虛脫

咬牙

夫齒屬足少陰腎經牙牀屬手足陽明經小兒窘
窘不時咬牙其所致之經不同或本於心經之熱
或本於肝經之熱或本於脾肺腎經之熱若發熱
飲冰叫哭而搐者心經實熱也睡困驚悸合面而
臥者心經虛熱也面青目劄呵欠項强煩悶者肝
經實熱也手尋衣領及亂捻物者肝經虛熱也發
搐目青面赤肝經風熱也煩悶喘促見於申酉時

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

者肺經熱也胸滿氣急喘嗽上氣肺感風寒也見於亥子丑時者腎經熱也眼自畏明及無睛光或解顱下黨胎禀腎虛也飲水口中氣熱胃經實熱也飲湯口中氣冷胃經虛熱也發搐呵欠面黃脾虛發驚也心經實熱用瀉心湯虛熱用導赤散肝經實熱先用柴胡清肝散治肝火後用六味丸肺經肝血肝經風熱亦用前藥虛熱則用六味丸肺經實熱用瀉白散虛熱用保肺湯腎經實熱用六味丸減茱萸二兩以生地易熟地虛用地黃丸胃經實熱用瀉黃散虛用異功散脾虛發驚用五味異功散若乳母多食膏粱厚味致兒咬牙者用清胃散

治驗

一小兒七歲素喜食甘味兩手發熱夜睡咬牙用瀉黃散而愈後不守戒仍作用大黃等藥前症益甚更滯顧弄舌手足冷余謂此脾胃復傷而虛甚也用六君子加柴胡升麻治之漸愈又用五味異功散加柴胡升麻而痊

一小兒面黃瘦黃或時變青飲食過多睡而咬牙服耗伐之劑口舌生瘡大便泄青發搐瘛盛唇青手冷用六君加木香柴胡升麻數劑而安但飲食後腹膨作嘔用四君子湯爲細末不時煨薑湯調服少許月餘而痊

一小兒十五歲盜汗面赤睡中咬牙自服清胃散前症益甚更遺精脯熱口乾倦怠余用六味地黃丸補中益氣湯而痊

一小兒十四歲素食膏粱炙煿睡中咬牙此脾胃積熱先用清胃散及二陳黃連山查犀角各數劑間服補中益氣湯而愈

一女子十四歲發熱作渴月經先期睡中咬牙此肝脾二經虛熱也用加味逍遥散而安後因怒前症俱作用柴胡梔子散而痊

一小兒夜間咬牙或盜汗或便血審其母懷抱鬱結又兼便血用加味歸脾湯加味逍遥散與母兼服其亦愈

一小兒因母食膏粱醇酒睡中咬牙或時鼻衄

右腮鼻準色赤先用加味清胃散加味逍遥散與母服兒亦愈

一小兒病後不語睡中咬牙驚悸飲水困倦少食用化痰鎮驚等藥益甚余謂屬心脾腎陰虛用六味地黄丸爲主佐以五味異功散秘旨安神丸諸症頓愈

一小兒感冒風邪咳嗽喘逆不時咬牙右顴色赤此肺經客熱用潔古黄芪湯一劑而痊後因停食腹脹咳嗽鼻塞咬牙用六君子湯加桔梗桑皮杏仁一劑而愈

一小兒咬牙審知因母大怒先用小柴胡湯加山梔牡丹皮治之母子並愈

潔古黄芪湯

人參　黄芪　茯苓　白朮

芍藥各一錢　乾薑　陳皮　藿香各五分

保肺湯 方見傷風咳嗽

柴胡梔子散

柴胡清肝散二方見發熱

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

補中益氣湯 方見虛羸
小柴胡湯 方見瘧症
二陳湯 方見寒吐
瀉黃散 方見脾臟
瀉心湯
導赤散
秘旨安神丸 三方見心臟
瀉白散 方見肺臟
地黃丸 方見腎臟

六君子湯
歸脾湯
四君子湯
加味逍遙散
清胃散
異功散 六方見內鈎

語遲

錢氏云心之聲爲言小兒四五歲不能言者由於母卒有驚動邪乘兒心致心氣不足故不能言也

有熏灼腎氣不足而言遲者有乳母五火遺熱閉塞氣道者有病後津液內亡會厭乾涸者亦有脾胃虛弱清氣不升而言遲者心氣不足用菖蒲丸腎氣不足用羚羊角丸閉塞氣道用加味逍遙散津液內亡用七味白朮散脾胃虛弱用補中益氣湯

治驗

一小兒言遲泄瀉聲音不亮雜用分利清熱等劑喉音如痘飲食少思朝用地黃丸加五味子夕用補中益氣湯其瀉漸止遂專服前丸兩月喉音漸響

一小兒白晴多瀉後喉痺口渴兼吐大便不實朝夕服地黃丸而痊後患瀉喉復痺仍服前丸而愈此皆熏賦腎氣不足故用是藥

一小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形色悉屬肺腎不足遂用六味地黃丸加五味子鹿茸及補中益氣湯加五味子兩月餘形氣漸健將半載能發一二言至年許始音聲如常

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

菖蒲丸治心虛語遲

石菖蒲　丹參各一錢　赤石脂三錢人參半兩
天門冬去心焙一錢

右爲末煉蜜丸麻子大食後溫水服二十三十丸

羚羊角丸治行遲

羚羊角鎊生地黃焙酸棗仁　虎脛骨酯炙黃
白茯苓各五錢
當歸　黃芪各二錢五分
肉桂　防風

右爲末煉蜜成劑每服一皂子大白湯化下

七味白术散方見腹痛

補中益氣湯方見虛羸

六味地黃丸方見腎臟

加味逍遙散方見內鈎

痖

經云舌者音聲之機也喉者音聲之關也小兒率然無音者乃寒氣客于會厭則厭不能發發不能下致其門闔不啓故無音也若咽喉音聲如故而舌不能轉運言語則爲舌痖此乃風冷之邪客於

脾之絡或中於舌下廉泉穴所致也蓋舌乃心之苗心發聲爲言風邪阻塞其經絡故舌不能轉運也若舌本不能轉運言語而喉中聲嘶者則爲喉痺此亦爲風冷所客使氣道不通故聲不得發而喉無音也然或風痰阻塞或因心經氣虛或因脾之脉絡受風或因風痰滯於脾之絡或因脾氣不足或胃中清氣不升皆足以致瘖大抵此症亦有稟賦腎氣不足不能言者有乳母五志之火遺兒或兒病津液耗損會厭乾涸不能言者或腎氣不充虛火上炎傷肺不能言者有驚風中風不能言者若遺熱與津液耗者用七味白朮散清氣不升者用補中益氣湯稟腎不足與虛火傷肺者用六味地黃丸若仰首咳嗽肢體羸瘦目白睛多或兼解顱囟門欠咬牙等症悉屬腎虛非地黃丸不能救也

治驗

一小兒面色目睛多白兩足脛常熱所患之症悉屬腎虛畢姻後唾痰口乾頭運久瀉忽然失

音先君云此亦腎虛也用補中益氣湯八味四
神二十九補之尋愈
一小兒亦面色目睛多白大便頻泄侵晨作瀉
肌體骨立食少唾痰先君謂腎氣不足之故不
信後加頭運聲痺足膕逆冷復請治仍欲吐痰
又云頭運聲痺中氣不能上升也足膕逆冷陽
氣不能充達也遂用補中益氣湯及四神八味
二十九以補命門之火而愈
一小兒患泄瀉聲音不亮雜用清熱等劑聲音
如瘂飲食少思去後多在侵晨朝用地黃丸加
五味子夕用補中益氣湯其泄頓止却專服前
丸不兩月聲亮而愈
一小兒目睛白多黑少吐瀉後喉痺口渴大便
不實朝夕悉服地黃丸而痊後患瀉其喉復痺
仍服前丸遂愈
一小兒十二歲形羸骨立面皎口乾白睛多而
黑睛少不能頓言用六味地黃丸補中益氣湯
其形漸充年餘而能言

一小兒解顱不言其形屬腎虛而兼疳症先用六味地黃丸以補腎水又用補中益氣湯以補肺金半載漸愈年餘疳病痊而能言一小兒喉音不亮至十九歲咽仍不響面色赤白睛多畏明畢姻後頭覺脹視物皆大作渴飲冷亦用前一藥喜其遠幃幙戒厚味二十年諸症悉愈其聲響亮

世傳通關散治驚風食後聲啞不能言者以大南星一箇炮爲末每服二分猪膽汁調下便能言

語

治要茯苓補心湯治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五心煩熱或咽喉痛舌本作強

茯苓 四錢　桂心　甘草 炒各三分　紫石英 煅
人參 各一錢　大棗二枚　麥門冬 去心一錢

右水煎服

導痰湯

半夏　南星
枳實 炒　甘草 炒
茯苓　陳皮 炒

右薑水煎服

防風散治脾臟中風多汗惡風身體怠惰四肢不能動色微黃不嗜食舌強語澁口眼喎斜或肌膚不仁腹膨心煩翕翕發熱神思如醉其脉浮緩胸滿痰涎志意昏濁

獨活一錢五分　防風　茯神去木　人參
附子炮去皮臍前胡　沙參　半夏湯洗七次
黃芪炒　旋覆花　羚羊角鎊　甘草

右水煎服

半夏湯

甘草　半夏

右水煎細細呷之

鷄頭丸治小兒諸病後不能語

雄鷄頭一個炙　鳴蟬三箇炙焦　大黃錦紋者濕紙裹煨
甘草炙一兩　木通　人參各半兩　當歸
黃芪　川芎　遠志去心姜汁製暑炒
麥門冬去心焙各三分

右爲末煉蜜丸小豆大平旦米飲下五九日三十

服兒大者加之久服取效

射干湯治夏秋暴寒喘咳喉啞失聲喉中如梗

半夏 五錢 湯泡　生薑 四錢 湯泡　杏仁 三錢 去雙仁皮尖

射干　甘草 炙　紫菀　肉桂

枳實 炒　當歸　橘皮　獨活

麻黃 去節泡 各二錢

右每二十二錢水煎服

菖蒲丸 方見諸遲

錢氏全蝎散 方見偏風噤

地黃丸 方見腎臟

七味白术散 方見積痛

補中益氣湯 方見虛癆

二陳湯 方見吐噦

滯腑

小兒滯頤者涎流出而漬於頤間也脾之液爲涎由脾胃虛寒不能收攝耳治用六君子湯加木香凡作渴飲冷者屬實熱宜瀉胃火作渴飲湯者屬虛熱宜補中氣若脾經實熱而廉泉不能約制者

用牛黃清心丸脾經虛熱而廉泉不能統攝者用六君子加木香胃經實熱而蟲動津液流出者用瀉黃散虛熱用五味異功散大便秘結用清涼飲中氣下陷用補中益氣湯食積內熱用大安丸仍參口瘡顋腫條互覽之

治驗

一小兒滯頤面色痿黃余謂當調補中氣不信用清熱之劑更加弄舌乃用五味異功散漸愈後因停乳吐瀉復作先用大安丸消其宿乳次用五味異功散加乾葛神麯麥芽母子並服而愈

一小兒滯頤面色赤手指熱用瀉黃散一服而愈後因乳母飲酒其子復患前症用東垣清胃散加乾葛神麯麥芽母子並服而愈

一小兒停食腹痛用疎導之藥痛止左項筋動口角涎流面色痿黃肢體微腫先用六君柴胡升麻山梔四劑次用異功散加升麻而痊

一小兒停食腹痛服峻利之藥吐瀉自汗厥冷滯頤用六君升麻柴胡而愈

一小兒十二歲滯頗兼嘔氣下氣時常停食服清熱之劑大便不實小腹重墜此脾氣下陷也用六君升麻柴胡飲食漸進大便漸實又用四神丸而愈

一小兒滯頗面色白或黧腹痛手足時冷脉微細此肺腎虛寒也宜先培其脾土用溫胃散二十服腹痛頓止用六君子湯諸症垂愈後停食挾驚吐瀉發搐滯頗腹痛復作用六君加柴胡釣藤鉤四劑而痊

一小兒吐舌流涎余謂心脾有熱用導赤瀉黃一二散而愈後自服清熱化痰等藥更加弄舌余用異功散加釣藤鉤而安又用六君子湯而愈

一小兒滯頗面色白或赤目劄咬牙此稟肝腎氣不足內熱而生虛風也用地黃丸以滋腎水異功散以補脾土而安

一小兒滯頗面青手按其腹則叫痛此夾食與驚也用異功散加枳實升麻二劑而愈後又停食吐瀉滯頗發搐面色青黃此脾虛而肝木乘

之也用異功散加升麻柴胡釣藤鈎而愈

溫胃散治脾冷涎多流滯於膈

丁香一兩　人參　半夏　肉荳蔻　白术　乾薑　甘草各半兩

右爲末每服一錢薑水煎

愚按此方治脾胃虛寒涎流不止或嘔吐腹痛之良劑也脾氣稍温但服五味異功散

六君子湯

錢氏異功散

四君子湯

清胃散　四方見內鈎

四順清凉飲方見熱症

補中益氣湯　方見虛癆

大安丸　保和丸加白术方見虛癆

瀉黃散　方見脾臟

牛黃清心丸　方見急驚

四神丸　方見驚瀉

導赤散　方見心臟

腹痛

小兒腹痛口中氣冷不思飲食脾土虛寒也用調中九主之口中氣温大便酸臭積痛也用下積丸治之面黃微熱或手足並温虛熱也用異功散補之面赤壯熱或手足並熱實熱也用瀉黃散瀉之若作渴飲湯胃氣虛熱也用白术散若痛連兩脇肝木乘脾也用四君子湯加柴胡芍藥若腹痛重墜脾氣下陷也用補中益氣湯加升麻若手足指冷或吃逆泄瀉寒水侮土也用六君炮薑肉桂不效急加附子若服慰滯之藥致腹作痛按之不痛脾氣復傷也用五味異功散中脘痛者屬脾少腹痛者屬腎按之痛者爲積滯不痛者爲裏虛積滯者消之裏虛者補之

治驗

一小兒停食腹痛發熱面赤或用養胃湯枳殼黃連山查友加腹脹午後發熱按其腹不痛此脾虛而慰伐傷之也用六君子湯數劑而瘥

一小兒七歲發熱驚悸用化痰藥反抽搐惡寒

吐痰喘嗽腹痛少食用抱龍丸大便似痢寒熱往來殊類風症余以爲脾氣復損用四君子湯少加升麻柴胡治之月餘而愈

一小兒肚腹膨痛食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理中丸後用六君子湯而愈

一小兒九歲常患腹痛至冬月因食生冷之物其腹仍痛服理中丸之類輒効至十一六歲秋初畢姻後腹痛又作唇面黯爪甲青余先君用八味丸補火隨愈服四兩許痛不再作至二十十歲外痛復作服前丸不應乃服附子理中湯而止仍用八味丸而安

一小兒腹痛吐舌流涎作渴飲冷便秘用清涼飲下之頓安余謂小兒元氣易虛易實病勢稍安不必再藥不信自用三黃丸一服果吐瀉發搐余用白朮散加釣藤鉤補脾平肝而愈

四七氣湯治七氣所傷痰涎結聚心腹作痛不能飲食

半夏製焙 五兩 人參 辣桂去皮各 一兩 甘草半 兩

右每服二三錢薑棗水煎ス
指迷七氣湯治ス七情相干陰陽不升降氣道壅滯
攻衝作ス痛
青皮　陳皮　桔梗　蓬朮
辣桂　益智仁　各一兩　香附子一兩
甘草炙三分　半夏製三分　五錢
右每服三錢薑棗水煎ス
異功散治ス小兒諸般鈎症角弓反張胸高臍凸ル
透明沒藥爲末姜湯調下ス方見內鈎卽
錢氏異功散

枯梗枳殼湯治ス氣壅結腹脇疼痛
枳殼　炒　桔梗各二兩　甘草炙半兩
右每服一二錢薑水煎ス
七味白朮散治ス積痛和胃氣生津液方見積痛
愚按前方若脾胃氣虛作渴飲湯或因吐瀉津液虧損煩渴引飲或脾胃虛弱腹脹瀉渴舌流涎手足指冷並宜服之以溫補脾氣化生津液方見積滯
六君子湯治ス脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺

金虛痰嗽喘促惡寒或肝虛驚搐眩連自汗諸症並宜服此以滋化源方見內鈎

瀉黃散 方見脾臟

四君子湯 方見內鈎

補中益氣湯 方見虛贏

八味丸 方見腎臟

附子理中湯

人參理中丸 二方見冷瀉即理中湯

益黃散 方見脾臟

調中丸 方見脾胃虛冷

腹脹

東垣云寒脹多熱脹少皆主於脾胃虛者宜用六君子湯若喘而氣短者脾肺氣虛也用異功散補之若服蔍伐之類而喘脹益甚者脾肺之氣復傷也用前湯加半夏升麻若既下而不喘則邪氣去而肺氣寧也不必用藥或病久小便不利或四肢浮腫者脾肺之氣虛不能通調水道也用金匱加減腎氣丸主之或手足逆冷睡而露睛脾胃虛寒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

也用二六君子加炮薑手足不冷睡而露睛脾胃虛弱也用二六君子湯若面色青木尅土也用二六君木香柴胡更當調治乳母節其飲食恐藥簡過劑復傷胃氣故也

治驗

一小兒腹脹面赤痰喘大便秘壯熱飲冷此形病俱實用紫霜丸一服諸症益甚面色頓白飲湯不絕余以爲邪氣退而眞氣復傷故面白而喜湯用白朮散大劑煎湯令恣飲良久而睡翌日頓安

一小兒傷食腹脹胸滿有痰余治以異功散而痊後復傷食腹脹兼痛或用藥下之痛脹益甚而加氣喘此脾胃傷而致肺虛也用六君子加桔梗調補而痊

一小兒腹脹惡食發熱惡心症類疳感余曰此飲食停滯也用保和丸一服諸症頓退惟腹脹用異功散而痊

一小兒傷食腹脹服尅伐之劑小便澁滯又服

五苓散之類飲食漸減小便不通四肢頓腫余朝用金匱腎氣丸去附子夕用補中益氣湯而安

一小兒傷風咳嗽痰湧用六君桔梗桑皮杏仁而愈復飲食停滯作瀉腹脹仍用六君山查厚朴而安後停食作嘔或用藥下之更加咳嗽余謂此屬脾肺俱虛欲行調補彼以爲緩乃發表疏滯前症益甚更加搖頭余用天麻散倍加鉤藤鉤及異功散壽終愈

一小兒五歲食粽後咬牙欲吐頃間腹脹昏憒鼻青黃赤此脾土傷而食厥也令用鷄翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

一小兒胸腹脹發熱頓悶以手按腹即哭此飲食停滯也先用保和丸一服前症即愈更加煩渴按其腹不哭此宿食去而脾胃復傷也用五味異功散加柴胡治之頓瘳

一小兒腹脹大便青白腹左一塊面色痿黃齒齦赤爛食少滯願余用異功散調補中氣爲主

佐以大燕荑湯清疳熱月餘諸症稍愈仍服異功散及蚵蟆丸外貼阿魏膏兩月塊消左脇微痛用四君子湯九味蘆薈丸而愈

褐子丸治疳腫脹

蘿蔔子一兩微炒　檳榔　五靈脂　黑牽牛頭末各半炒　陳皮　青皮炒　蓬术煨　赤茯苓　木香二錢五分

右爲末麵糊丸綠豆大每服十五丸紫蘇湯下

金匱加減腎氣丸

熟地黃入兩乾山藥四兩山茱萸四兩白茯苓牡丹皮　澤瀉各二兩　車前子炒牛膝酒微炒各一兩　肉桂　附子炮

右各另爲末米糊丸小豆大每服三四十丸空心食前白湯下

柴霜丸方見嗽風

六柴胡湯方見瘧症

五苓散方見五淋

保和丸方見虛羸

天府散 方見百咳內傷

大蕪荑湯

蚵蝓丸

九味蘆薈丸 三方見疳症

癖塊痞結

錢仲陽云癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用尅伐痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣爲主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土矣凡脾土虧損變症百出矣當參各類及隨見症而主治之

治驗

一小兒患痞癖服積榔蓬术枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可尅伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸症漸愈乃朝用異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸芍藥而愈

一小兒素嗜肉食腹痛大便不調半載後右脇結一塊二十月後左脇又結二塊腹脹食少作渴小便赤澁大便色穢又半載後頷下亦結二核妄服消塊行滯等藥而元氣益虛用四味肥兒九五味異功散之類熱渴漸止腹脹漸可佐以九味蘆薈丸結核漸消後用四君子爲主佐以四味肥兒丸之類三十月餘而瘥

一小兒停食吐瀉後飲食不節作瀉腹痛臍脹腹中結塊作渴發熱齦爛口臭服消導劑滯之藥而前症益甚形體益瘦視其面色黃中隱青乃脾土虧損而肝木所侮也法當調補中氣兼平肝木遂用沖和湯及大蕪荑湯之類半載而愈

一小兒患痞結服耗滯之藥余謂屬形病俱虛當補中氣彼不信仍行耗伐遂致虛火上炎齒齦蝕爛頷下結核余用大蕪荑湯及異功散加減用之而安

一小兒患痞結久而四肢消瘦肚腹漸大寒熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

嗜卧作渴引飲用白术散爲主佐以四味肥兒丸月餘諸症漸愈又以異功散加當歸并六味地黃丸又月餘而愈

一小兒患痞結身熱如火病狀多端不可盡述朝用五味異功散夕用四味肥兒丸月餘諸症稍愈佐以地黃丸自能行立遂朝用地黃丸夕用異功散及蝦蟇丸數服而愈

挨痞丸治乳癖穀癥腹中堰痛

代赭石 火煅醋淬研細 青皮 生地黃 木香 蓬术 煨各一錢 三稜 巴豆 去油淨六錢

右爲末醋糊丸麻子大每服二十九食後姜湯下

甘遂破結散

甘遂二錢五分 煨黃 青皮 焙 黃芩 炒 大黃 炒各半兩

右爲末每服一錢水煎服仍量兒加減利後以粥補之

進食丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸鳴泄瀉或食癥乳癖痃氣痞結並皆治之

巴豆霜　當歸米泔浸炒　朱砂　代赭石醋煅淬七次
枳殼炒　木香各五錢　麝香一分

右爲末糊丸麻子大每服一二十丸温米飲下更量兒加減

枳术丸

白术四兩　枳實二兩

右爲末荷葉包煨爛飯爲丸桐子大每服四五十丸空心白滾湯下

阿魏膏治一切癖塊痞結更服胡連丸

羌活　獨活
赤芍藥　川山甲
大黃　白芷
紅花四錢　木鼈十枚去殼麤髮如鷄子大一團
天麻各五錢　槐柳枝各三錢
玄參　官桂
生地黃　雨頭尖

右用香油一斤四兩前煎黑去渣入髮煎化仍去髮徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合香油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用眞正者效凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙覆上用

熱尉冬手尉炙良久加硝耗再加尉炙之二十時許方貼
膏藥若是疳積加蘆薈末同尉炙
六味地黃丸 方見腎臟
四君子湯
異功散
六君子湯 三方見內劒
四味肥兒丸 方見嘔吐
大蕉黃湯 一名冲和丸
蝦蟆丸

九味蘆薈丸 三方見疳症
白朮散 方見積扁

積滯

經曰五臟之積曰積六腑之積曰聚凡小兒積滯或作痛皆由乳哺不節過餐生冷脾胃不能尅化停滯中脘久而成積或因飽食即臥脾失運化留而成積其症面目黃腫腹痛膨脹肚熱足冷嗜臥不思乳食大便酸臭或悶溢小便如油若吐乳瀉乳所出酸臭者為乳積腹脹作瀉嘔吐噦氣者為

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

食積初患元氣未損之時或腹脹作痛大小便不利者先用白餅子或木香檳榔丸下之下後以白术散或五味異功散和之渴加乾葛吐加半夏下而熱不退或作嘔作瀉飲食不思此脾胃俱傷也用六君子湯手足指冷喜飲熱湯此脾胃虛寒也前方加炮薑木香面色黃白日無精光脾肺俱虛也用四君子加柴胡升麻腹痛泄利下重或小便不利者用四逆散發熱脯熟或瀉未已脾氣下陷也潮熱口渴大便不調欲變疳症也並用補中益氣湯佐以肥兒丸經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實必以調脾爲主而以消導佐之古人所謂養正積自除正此意也

治驗

一小兒每停食身發赤暈用清中解鬱湯而愈後患挫頭咬牙瘡盛發痛吐出酸腐待其吐盡畧自先與七味白术散次與參苓白术散遂不復作若吐後兒安更不必服藥也

一小兒飲食積滯患嘔吐發熱服消導等劑飲

食已消而熱未退余以脈浮胃經虛熱用六君升麻柴胡各一二分四劑而愈

一小兒七歲停食後腹痛服芎伐之劑而益加一小兒七歲停食後腹痛也用六君子湯而愈後按之不痛此脾氣復傷也用六君子湯而愈後復傷食服保和丸及三稜檳榔之類而更腹痛服瀉黃散體重善噫此脾氣虛而下陷也仍用六君升麻柴胡木香五味而愈

一小兒數歲間每停食輒服峻利之藥後肚腹膨脹嘔吐泄瀉先用六君子湯諸症漸愈又用

補中益氣湯而安

一小兒腹脹飲食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理中丸後用六君子湯而愈

一小兒腹痛以手按之痛益甚此乳食停滯也用保和丸末一錢檳榔末二分下之酸臭糞而安後患腹痛別服峻利之劑其痛益甚手按則已面色黃白此因飲食失宜脾氣不調土虛不能生金也用六君子湯而愈

一小兒久患腹痛診其母右關脈弦緩乃木尅

壬也用六君子湯加木香柴胡母子並服而愈

一小兒停食腹痛面色白黑睛少手足常冷大便不實口鼻吸氣腹中陰冷此禀命門火衰不能温蒸中州之氣故脾胃虛寒也用八味丸補中益氣湯而愈

一小兒患前症服驅逐之劑更惡寒發熱余朝用補中益氣湯夕用五味異功散尋愈後飲食停滯腹痛便秘別用疎導之劑朝寒暮熱太便頻數余用五味異功散月餘飲食漸進乃佐以八珍湯内芍藥炒焦川芎些少又兩月寒熱漸愈後又傷風服參蘇飲汗出喘嗽發熱服清熱化痰之劑更煩熱不寐尋衣撮空先用六味地黄丸料水煎服諸症頓退再劑而安却用五味異功散八珍湯而痊後因傷食吐瀉大便欲去而不去欲了而不了先用補中益氣湯數劑不應改用人參五錢白术三錢陳皮甘草各七分升麻四分乾葛五分三十劑又手足並冷急用人參一兩附子五分薑棗水煎一日服一劑手足

始溫又一十劑諸症漸退仍用前人參五錢之方治之而愈

七味白术散治吐瀉作渴

人參二錢五分　白茯苓　白术　藿香葉各半兩
木香二錢　甘草一錢　乾葛半兩加一兩

右每服一二十錢水煎熱熱瀉甚去木香肚痛加芍藥

四逆散治少陰病或腹中痛泄痢下重

枳實炒黃　甘草炒　柴胡　芍藥

右爲細末每服一錢空心米飲調下

白餅子方見發搐

木香檳榔丸方見積滯

五味異功散

六君子湯二方見內鈎

補中益氣湯方見虛羸

保嬰撮要卷之五終

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之六

古吳薛鎧編集
男薛已治驗
後學宋璞校閱

發熱症

小兒之熱有心肝脾肺腎五藏之不同虛實温壯四者之不一及表裏血氣陰陽浮沉與夫風濕痰食各當詳之心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而嘔或壯熱飲水巳午時益甚肝熱者左頰先赤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

便難轉筋尋衣捻物多怒多驚四肢困倦寅卯時
益甚脾熱者鼻上先赤急惰嗜卧身熱飲水遇夜
益甚肺熱者右頰先赤手捻眉目喘咳寒熱飲水
日西熱甚腎熱者頦下先赤兩足熱甚骨蘇蘇如
虫蝕熱甚不能起於牀夜間益甚仍當辨其虛實
實則面赤氣粗口燥唇腫作渴飲冷太小便難或
掀衣露體煩啼暴叫伸體而卧睡不露睛手足指
熱宜用表下虛則面色青白恍惚神緩口中虛冷
噓氣軟弱喜熱惡寒泄瀉多尿或乍涼乍温佛鬱

驚惕上盛下泄夜則虛汗屈體而卧睡而露睛手
足指冷宜用調補壯熱者肢體大熱熱不已則發
驚瘛温熱者肢體微熱熱不已則發驚搐陰虛則
內熱陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱
此皮毛血脉之熱熱在表也重按之筋骨之分則
熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在表裏之間也以虛實
按之而熱此肌肉之熱熱在裏也不輕不重分屬表裏而言之壯熱惡風寒為元氣不充表之
虛熱也壯熱不惡風寒為外邪所客表之實熱也

壯熱飲湯爲津液短少裏之虛熱也壯熱飲水爲內火銷燥裏之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴口乾煩燥腹滿四肢熱逢風寒如炙於火能冬不能夏是皆陽盛陰虛也脈尺寸俱滿爲重實尺寸俱弱爲重虛脈洪大或緩而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形症似寒實非寒也熱而脈數按之不鼓此寒盛格陽雖形症似熱實非熱也發熱惡熱太渴不止煩燥肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力或兼目痛鼻乾者此血虛發躁也當補其血如不

能食而熱自汗者氣虛也當補其氣仲景論內外不足發熱誤發其汗則表必虛也身熱而汗出者風病發熱誤發其汗則表必虛也身熱而汗出者風也發熱身疼而身重黃者濕也增寒發熱惡風自汗脈微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脈弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陰陽不歸其分則寒熱交爭也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷人陰中也晝則發熱煩躁夜則安靜是重陽無

陰也當吐瀉其陽峻補其陰至若身熱脉弦數戰慄而不惡寒者癉瘧也發熱惡寒脉浮數者溫病也若四肢發熱口舌咽乾是火熱乘土位濕熱相合故煩躁悶亂也若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱鬱而不得伸也心熱則用瀉心湯導赤散安神丸肝熱則用瀉青丸柴胡飲子脾熱則用瀉黃散肺熱輕則用涼膈散及地骨皮散腎熱則用滋腎丸實熱則宜疎下虛熱則宜調補壯熱者導赤散溫熱者瀉黃散若肢體熱輕則用惺惺散重則用羌活散之類大便秘者二

黃犀角散餘熱不退者地骨皮散骨節疼痛者梔子仁湯宿滯內作者紫霜丸肝火內熱者龍膽草湯陰盛隔陽而熱者人參理中湯肝經血虛生風而搐者用四物天麻釣藤釣若熱蘊便秘者四順清涼飲熱而二便調和風邪蘊結於表而發者用惺惺散加麻黃汗之汗後血虛而熱益甚者六神散加粳米汗後氣虛而惡寒發熱者補中益氣湯汗後陰虛陽無所附而熱者用四物湯加參耆汗

後陽虛陰無所附而熱者用四君湯加芎歸嬰兒諸熱其因別症而作者當從所重而治之或乳母七情厚味飲食停積遺熱於兒或兒嗜食甘肥衣衾過煖或頻浴熱湯積熱於內為患者各當詳之益小兒臟腑脆弱元氣易虛補泄宜用輕和之劑庶無變症若乳下嬰兒當兼治其母仍參諸熱症治之

治驗

一小兒夜間發熱天明如故或小腹作痛飲食少思面色痿黃熱時面赤不時飲湯此食積所致用下積丸治之而消又用白术散調理而安

一小兒飲食停滯腹痛作嘔用大安丸而愈飲食雖進其腹仍痛用六君山查神麴痛少止余以為脾氣傷而飲食難化乃去前二味服六君子四劑而愈後又傷食仍服前藥痛止而至暮發熱用六君柴胡升麻而痊此由脾虛下陷不能升發故至暮發熱也

一小兒發熱飲食少思大便不實常服麗參等

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

九視其鼻赤此寒涼之劑復傷脾土而虛熱也用五味異功散數劑而愈

一小兒十三歲內熱晡熱形體倦怠食少作渴此稟賦怯弱之虛熱也用地黃丸異功散補之不越月而瘥

一小兒十四歲而近女色發熱吐痰至有窒礙目羞明頭覺脹大用地黃丸料加五味子當歸黃芪煎服及補中益氣湯得愼疾而瘥

一小兒十四歲肢體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝面目赤色身不欲衣此稟腎不足而虛熱也用補中益氣湯六味丸而愈

一小兒五歲發熱作渴布顆鼻準微赤或與冷水涼藥即時嘔吐余曰布顆微赤肺經虛熱也鼻準微赤胃經虛熱也先用四君升麻二劑吐止又用白朮散二劑而不渴更用四君子湯四劑而安

一小兒九歲發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎彼欲瀉火余曰鼻準青白脾胃虛寒肝

木所侮也口角流涎脾氣不能攝也大便重墜胃氣不能升也不信竟服涼藥眉唇微動四肢微搐復求治余曰此虛極而變慢脾風矣用六君炮姜當歸木香鉤藤鉤二十劑益甚欲求更劑余曰藥力未及耳又加炮附子一片即安後去附子二十劑而愈

一小兒四歲停滯腹痛發熱用大安丸而飲食進又用六君山查神麴四劑而痛止後傷食至暮復熱用六君柴胡山梔升麻而痊此脾虛兼肝火之治法也

一小兒發熱體瘦夜間遺尿日間頻數此腎脾腎不足用補中益氣湯加補骨脂及地黃丸加鹿茸治之而痊婢媚後小便頻數作渴發熱服補陰丸等藥發熱尤甚小便如淋用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一小兒體瘦腹大發熱嗜卧作渴引飲先用白术散為王佐以四味肥兒丸諸症漸愈又用異功散六味丸而愈

一小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用四君升麻柴胡而愈

一小兒傷風咳嗽服參蘇飲加痰盛喘急腹脹不食此脾肺虛而復傷也用六君柴胡桔梗一劑諸症頓愈用六君子湯而痊

一女子十四歲發熱至夜益甚久不愈左關脈弦數右關脈微按之亦弦此肝火血熱脾胃虛弱先用四物二連湯加柴胡山梔牡丹皮二劑熱稍退又二劑熱頓退再用加味逍遥散白术加二錢數劑而痊

嘉靖癸丑閏二十月渠下第北歸犬子麟孫方病瀉不食遍體如焚胸滿腹冷痛日夜不成寐或投以山查枳殼中氣愈弱瀉愈甚不食至累月且進米飲一半嘔或糕餌棗栗少許稍過節度則肢體熱益壯腹痛不解奄奄喘息日暮不保矣立齋先生枉視之則曰此胃虛不能納脾濕

不能運病在戊巳深且久兼沐氣所乘脫服攻治之藥則殆矣亟用補中益氣湯數劑熱稍退瀉不食如初先生復曰此勿亟惟胃氣漸復濕漸除當自得効耳改用六君兼補中湯仍服八味丸生脾土如是三十月諸症悉退納穀倍常自惟稍遇形役或訑誦心勞則潮熱遄發先生復授以歸脾方加梔柴二種熱尋止形氣日充甲寅七月偶觸暑飲冷前症復作間發瘧疾熟晝夜不止先生曰此虛寒偏陽法當

舍時從症用補中湯多加炮姜益以生姜一二兩及口而瘧止面色青黃相錯更患痢或謂參芪炮姜不宜先生哂之且曰此固虛弱自利耳往嘗謂戊巳受病木氣乘之此青黃二色非正形耶仍用補中益氣多加柴胡參朮數日而痢止餘症亦漸解脫惟吾兒襁褓失母渠每姑息之故其惟外溫而中易怒渠少孤遭家多難藜藿恒不充兒幼多病失調養故形怯而胃弱致疾之原其所由來者漸矣先生洞微燭幽知其病

深且久而堅持獨見以祛攻治之惑吾兒再造之慈何幸得此於先生哉先生之曽太父與先廷評公爲中表兄弟先君與先生同宦游京師末年尤敦篤石之雅先生盛德及於太子能使先人後嗣永存區區志感誠不能盡萬分之一也是歲冬十月望眷晚生張慕渠頓首頓首

嘉靖甲寅敬臣之女年十五一患脾胃素弱自夏入秋時瀉時止小腹微痛至八九月間遂成痞積之症發熱凡二十餘日不止汗泄熱解汗已復熱自中脘至小腹膨脹堅直大便溏氣喘咳噦作嘔俱畫輕夜重徹夜煩躁不聽鼻塞眼暗讝語其母以爲必死矣立齋先生診之曰脉浮大而無根此本虛證也非獨參湯不可乃用參一兩加熟附二錢分煨生姜三片日進一劑仍併積其氣甚腥腹漸寬熱漸減查前服之大下痞積脉漸斂然手猶寻捡不已鼻孔出血先生曰此肝證也煎六味丸料與二服如脫乃畫服獨參姜附湯夜服六味丸料脉漸有根諸證漸退先

疋手定恒熱至是乃始覺寒先生喜曰此病邪盡退而眞氣見矣然猶飲食不進乃單用六君子湯加炮姜遂能食咳嗽獨甚與補中益氣湯嗽遂止夜始有睡凡弱女之得生皆先生力也向非先生卓有定見專治其本而其末自愈則奄奄一息之軀豈堪雜劑之攻擊哉其爲丘中之骨葢必然矣敬臣感激之餘無由以報敬書施療之顛末以附醫錄庶不泯先生之功且以告同患此者幸無所惑亦推廣先生一念之仁於萬一云爾孟冬望日眷晚生王敬臣頓首拜書

敗毒散治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢作痛增寒壯熱項强睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡　前胡　川芎　枳殼炒
羌活　獨活　茯苓　桔梗
人參各一兩　甘草半兩

右每服一錢生薑薄荷水煎

滋腎丸治腎熱

黃柏 酒拌炒 知母 二錢 肉桂 五分

右為末熟水丸桐子大每服二十丸至三十丸食前百沸湯下

四順清凉飲治小兒血脈壅實臟腑蓄熱煩赤作渴五心煩熱臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調大小便澁欲發驚癎或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯挾熱泄瀉不止加木香煨

大黃

赤芍藥 當歸 甘草 大黃 各等分

右每服一錢水煎作兩服

消風散治小兒解脫致令風邪客於皮毛入於臟腑則令惡風發熱胸膈痰涎目澁多睡方見驚癎胎症

小柴胡湯治傷寒溫熱身熱惡風頭痛項強四肢煩疼往來寒熱脇痛耳聾嘔噦痰實中暑瘧疾並服之方見天鈞

愚按前方若肝膽經風熱肝火瘰癧寒熱往來日晡發熱潮熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳

嗽或脇痛胠滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐動唇目抽掣及乳母有前症致兒爲患者並宜服之

抑肝散治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡臥不安方見肝臟

梔子清肝散一名柴胡梔子散治三焦及足少陽經風熱發熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛寒熱往來

柴胡 梔子炒 牡丹皮各一錢 茯苓 川芎 甘草三分 芍藥 當歸 牛旁子炒各七分

右水煎服

柴胡清肝散治肝膽三焦風熱怒火或作寒作熱往來寒熱發熱或頭發瘡毒等症

柴胡一錢五分 黃芩炒 人參 川芎各一錢 山梔炒一錢半 連翹 甘草各五分 桔梗八分

右水煎服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

柴胡飲子解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈洪實弦數大便堅實

黃芩七分　甘草四分　大黃八分　芍藥七分
柴胡　人參各五分　當歸一錢

右每服一錢薑水煎服白虎湯必死宜此主之

當歸補血湯治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若

黃芪　當歸各等分

右水煎服

三黃丸治二焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩躁不美飲食大小便秘澁五臟實熱或下鮮血瘡癤熱症

黃連　黃芩　大黃各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸白滾湯下

白虎湯治傷寒或吐或下後七八日邪毒不解熱量大小加減服

結在裡表裡俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而

煩欲飲數升者宜服之又治夏月中暑汗出惡風寒身熱而渴

知母三兩　甘草一兩炙　石膏八兩　別研糯米三合

右每服二十錢水煎至米熟為度

瀉黃散 方見脾臟

瀉心湯 方見心臟

地黃散 方見腎臟

清涼飲

柴苓散

二黃犀角散

牛黃散

黃龍湯

牛黃膏

梔子仁湯

六物黃芩湯

五物人參飲

地骨皮散十方見潮熱

惺惺散

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

理中湯 二方見咳嗽加人參即人參理中湯
龍膽湯
紫霜丸 二方見噤風撮口
四物湯 方見急驚
六神散 方見夜啼
白朮散 方見積痛
羌活散 方見驚風
下積丸 方見積滯
補中益氣湯

大安丸 即保和丸加白朮 二方見虛羸
六君子湯
四君子湯
加味逍遥散
異功散 四方見內鈎
瀉白散 方見肺臟
瀉青丸 方見肝臟
凉膈散 方見瘡瘍
八珍湯 方見寒熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

潮熱

錢仲陽曰潮熱者時間發熱過時即退來日依時而至有風寒痰積食癖之分陰陽虛實五藏之異如汗出身熱呵欠面赤者風熱也傷寒時疫陰陽相勝外感熱也肌瘦口乾骨蒸盜汗疳熱也大小便閉澀汗下不解積熱也腹背先熱夜發旦止食熱也遲嗽飲冰乳食不消癖熱也又有煩熱者氣盛喘促心躁不安頰赤口瘡兼發癇症蒼疹熱者耳鼻尖冷血熱者巳午間發至夜則凉虛熱者困倦少力發於病後陽邪于心則來去不定陰陽相勝則寒熱如瘧前症在小兒有因乳母或姙娠七情厚味遺熱或飲食停積衣衾過煖及頻浴熱湯而爲患若寅卯辰時熱而力盛飲冰者肝經實熱也用柴胡清肝散熱而力怯飲湯者肝經虛熱也用六味地黃丸巳午時熱心經也實用導赤散虛用秘旨安神丸申酉戌時熱肺經也實用瀉白散虛用秘旨保脾湯亥子丑時熱腎經也用地黃丸大凡壯熱飲冰大便秘結屬實熱用犀角散

下之熱渴飲湯太便如常屬血虛用四物湯補之
若下後陰虛陽無所附而仍熱用四物參芪汗出
陽虛陰無所生而仍熱用四君芎歸若汗下後煩
渴面赤血虛發躁也當歸補血湯若見驚搐等症
肝血虛而內生風也用四物天麻鈎藤鈎頰赤口
乾小便赤澁大便焦黃表裏俱實熱也用清涼飲
子如大便已利或熱未止表邪未解也柴葛解肌湯
應加麻黃微汗之既汗而仍熱此表裏俱虛氣不
歸源陽浮於外而虛熱也六神散加粳米陽氣下

陷於陰中而發熱者用補中益氣湯若乳下嬰兒
當兼治其母
一小兒潮熱煩渴大便乾實氣促咳嗽右顴色
赤此肺與大腸有熱用柴胡飲子二服頓愈後
因微驚發搐咬牙頓悶此肝脾氣血虛也用四
君芎歸鈎藤鈎而愈
一小兒潮熱發躁左腮青赤此心肝血虛用秘
旨安神丸及四物防風酸棗仁漸愈又用六味
地黃丸調補肝腎而痊

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左顴至申酉時青中隱白手足時搐此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾土虛弱而手足冷也用補中益氣湯調補脾肺用六味地黃丸滋補肝腎而愈益病氣有餘當認爲元氣不足若用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣

一小兒寅卯時發熱或兼搐有痰服抱龍瀉青二十丸而愈後復患服前藥兼咳嗽氣喘不時發搐面赤色或青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐肝木乘脾也面青黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛也用益智丸以養心血補中益氣湯以補脾氣而愈

一小兒腹痛作嘔飲食少思至暮腹脹發熱此脾虛下陷朝用補中益氣湯夕用六君柴胡升麻而愈後因勞不時寒熱夜間盜汗用十全大補湯而愈

一小兒夜間發熱腹脹余謂脾虛肝盛朝用五味異功散夕用四味肥兒丸熱止乃朝用六味

地黃丸夕用異功散而痊

一小兒巳午時發熱驚悸發時形氣倦怠面黃懶食流涎飲湯余謂心氣不足所致不信反服涼心之藥更加吐瀉睡而露睛手足並冷幾至慢脾風先用六君姜桂佐以地黃丸而愈

一小兒亥子時患前症用益黃散而愈後復發服前藥及清熱之劑病發不時嗜卧露睛作瀉少食大便頻黃予謂脾虛而肝木勝之兼元氣下陷也用補中益氣湯佐以地黃丸而愈

一小兒先停食服發散之藥致面色痰黃體倦少食申酉時潮熱或用清熱消導之劑更加泄瀉予先用六君子湯數劑後用補中益氣湯漸愈

一小兒申酉時發熱面赤腹中作痛或用峻利之劑下之致發搐吐痰作渴腹痛按之即止此脾胃傷而變症也用七味白术散補中益氣湯頓安

柴苓散治壯熱來去

柴胡　麥門冬去心焙　人參
赤茯苓　甘草各半兩　黃芩一兩

右爲末每服一錢入小麥二十七粒青竹葉二十片水煎服

一黃犀角散治溫壯心熱神不安太膿秘結

犀角屑　大黃酒浸蒸　鈎藤鈎　梔子仁
甘草　黃芩各半兩

右爲末每服五分熱湯調下量兒加減

牛黃散治溫壯常熱或寒熱往來

牛黃研　甘草各半兩　柴胡　梔子酒炒
龍膽草酒炒　黃芩炒各二錢五分

右爲末每服五分以金銀薄荷湯調下

黃龍湯治發熱不退或寒熱往來

柴胡五錢　黃芩炒　甘草炙各一錢　赤芍藥二錢

右每服一錢姜棗水煎

牛黃膏治壯熱咽喉淫響或不省人事或左右手偏搐或唇口眼鼻顫動此熱淫內蓄風邪外感也宜急服之

蝎尾 四十九枚 巴豆肉去油膜一錢五分 梅花腦半匙
辰砂 研二錢 牛黃少許 麝香一匙 鬱金三錢皁角水煮

右爲末每服一匙蜜水調下量兒虛實用之

梔子仁湯治陽毒壯熱百節疼痛下後熱不退者

梔子仁 酒炒 赤芍藥 大青
升麻 黃芩 酒炒 知母 各一兩
甘草 五錢 杏仁 二兩 麩炒微黃 石膏 各二兩 柴胡 一兩五錢

右每服三錢生姜三片水煎服

六物黃芩湯治壯熱腹大短氣往來寒熱飲食不

化

黃芩 酒炒 大青
石膏 各半兩 桂 三錢

右每服一錢水煎服

五物人參飲治壯熱咳嗽心腹脹滿

人參 甘草 各半兩 麥門冬 去心 生地黃 各一兩半
茅根 半握

右每服二三錢水煎服

益智九治脾腎虛熱心氣不足

益智仁　茯苓　茯神各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心白滾湯下亦治白濁

四物二連湯治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則發熱脇肋并一身盡熱日晡肌熱多

當歸　生地黃　白芍藥　川芎

黃連　胡黃連各等分

右水煎服

地骨皮散治虛熱壯熱

知母　柴胡

地骨皮　茯苓

甘草　人參

半夏各等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

抱龍丸　方見傷寒

六味丸　方見腎臟

七味白朮散　方見積痛

導赤散

秘旨安神丸　二方見心臟

瀉白散　方見肺臟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

惺惺散
保肺湯 二方見咳嗽
四物湯 方見急驚
當歸補血湯
柴胡清肝散
清涼飲子 三方見發熱
六神散 方見夜啼
補中益氣湯 方見虛羸
四君子湯
六君子湯 二方見內鈎
益黃散 方見脾臟
瀉青丸 方見肝臟

寒熱

經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱寸口脉微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則

先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍熱也少陽膽者肝之府界乎大陽陽明之間半表半裏之分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經症以小柴胡湯加減調之若祇見寒熱起居如常久而不愈及大病後元氣未復惡屬陰虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補之甚者十全大補湯有食積爲病亦令寒熱用保和丸消之若兼嘔吐泄瀉用六君子湯厥冷飲熱人參理中丸作湯不止七味白术散食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮所不勝也用異功散加柴胡山梔其瘧症寒熱詳見瘧門

治驗

一小兒十四歲朝寒暮熱或時發寒熱則倦怠殊甚飲食不思手足指冷朝用補中益氣湯夕用六君子湯各二十餘劑漸愈後因用功勞役前症復作更加頭痛脈虛兩寸尤弱朝用補中

益氣湯蔓荊子夕用十全大補湯兩月餘而痊
但勞役仍復寒熱服前二湯稍愈脾姻後又用
劾過度朝寒遍體如冰暮熱身如炙朝用補中
中益氣湯加姜桂夕用八味丸加五味子各五
十餘劑而愈

一小兒十三歲壯熱便秘服清凉飲愈而復作
服地骨皮散更潮熱又服芩連四物不時寒熱
體倦少食而熱或晝見夜伏夜見晝伏三謂肝
脾虛熱夕用地黃丸加五味子朝用補中益氣
湯加山藥山茱而痊

一小兒寒熱不愈診其乳毋左關脉弦數左脇
作痛遇勞則遍身瘡痒遇怒則小便不利此因
肝經血虛鬱火所致也先用小柴胡湯加山梔
牡丹皮諸症頓退又用加味逍遥散毋子並痊

一小兒發熱咬牙作寒作熱耳內痛痒緣乳毋
有肝火所致用柴胡清肝梔子清肝二散毋子
並服而愈

一小兒十四歲每日午時分發熱遍身如炙午

未時則寒足骨如冰至膝至子時分熱仍作此內真寒而外假熱也朝用補中益氣湯加參芪各二錢附子三分夕用大劑四君子湯加當歸一錢附子五分各二十餘劑漸安又用參朮各五錢歸芪各二錢陳皮甘草各一錢姜桂五分各數劑乃朝用十全大補湯夕用六君子湯漸愈又用五味異功散而壽終

一女子十五歲寒熱月經先期兩月脈弦出魚際此肝經血盛之症用小柴胡湯加生地黃烏梅治之而愈後寒熱消瘦月經過期乃肝脾二經血氣虛弱也朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸而愈

羌活冲和湯治太陽無汗發熱頭痛惡寒脊強脈浮緊又治非時暴寒人中之頭痛惡寒發熱宜此湯治之以代麻黃湯用太陽經之神藥也

羌活　防風　蒼朮各一錢半　川芎
甘草　細辛　白芷　生地黃
黃芩各一錢

右水煎服

八珍湯 四物四君合用四物見急驚四君見內鈎

十全大補湯 方見自汗

六君子湯

加味逍遙散

異功散 三方見內鈎

人參理中丸 方見冷瀉

保和丸

補中益氣湯 二方見虛煩

地骨皮散 方見潮熱

芩連四物湯 即四物二連湯加黃芩方見潮熱

地黃丸

八味丸 即地黃丸加五味子肉桂二方見腎臟

小柴胡湯 方見痙症

柴胡清肝散

梔子清肝散 二方見發熱

傷寒夾驚夾食

錢仲陽云小兒正傷寒者謂感冒寒邪壯熱頭痛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鼻塞流涕畏寒拘急是也或驚者因驚而又感寒邪或因傷寒熱極生風是熱乘於心心神易動故發搐也用薄荷散人參羌活散之類解之甚者抱龍丸夾食者或先傷於風寒後復停滯飲食或先停滯飲食而後傷於風寒以致發熱氣粗噯氣壯熱頭疼腹脹作痛大便酸臭先用解散次與消導不解者大柴胡湯週歲已前傷寒熱輕者用惺惺散週歲已後須解表微汗若五六日不除邪入於經絡傳變多端不可枚舉若夫榮衛俱傷者羌活

冲和湯主之過此則少陽陽明二經在于半表半裏肌肉之間脉不浮洪而長以葛根解肌升麻等湯治之在少陽則耳聾脉弦數小柴胡湯加減和之若少陽陽明俱病小柴胡加葛根芍藥傳入陽明爲裏脉沉實譫妄惡熱六七日不大便口燥咽乾而渴用大柴胡湯重則三一承氣湯若兼三焦俱病則痞滿燥實宜大承氣湯三陽之邪在裏爲患不頭痛惡寒而反渴此爲温病當遵仲景法治之其餘正

傷寒症治自有專方不復贅論其兼驚兼食者各從本症治之

治驗 散見各症

抱龍丸治傷風瘟疫身熱氣粗痰實壅嗽常服安神鎮驚亦治痘疹壯熱

牛膽南星一兩　天竺黃　雄黃
辰砂二錢　麝香 少許

右爲末煮甘草汁丸櫻桃大陰乾每服一丸薄荷湯下氣喘有痰加枯礬

恩按前方若風熱痰嗽或急驚發搐昏聾咬牙形病俱實宜用此方若初見風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作先用十味參蘇飲客邪既解而腹脹吐瀉發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛用五味異功散切忌祛痰表散若過服耗伐之劑以致前症者尤宜溫補脾肺

紅綿散治傷風咳嗽鼻塞或流清涕

全蝎五箇　麻黃去節　僵蠶　白芷
川芎　桔梗　天麻各二錢　甘草

蘇木
右爲末每服一錢加紅綿少許水煎有熱加荊芥
葛根解肌湯治發熱惡寒頭痛項强傷寒温病
葛根四分　桂一分　黃芩　甘草
白芍藥各三分　麻黃
右薑棗水煎服
三乙承氣湯治臟腑積熱痞滿燥實堅脹
甘草　枳實炙　厚朴姜製　大黃
芒硝各等分
右薑水煎服
升麻湯治小兒中風頭痛增寒壯熱肢體疼痛鼻乾不得眠兼治瘡痘已發未發皆可服
甘草　白芍藥　升麻　乾葛各等分
右爲末每服一錢水煎服
小柴胡湯
大承氣湯
大柴胡湯三方見痙症

惺惺散 方見咳嗽

葛根解肌湯

抱龍丸二方見傷寒

薄荷湯 方見瘧癇

人參羌活散 方見驚風

咳嗽

錢仲陽云嗽者肺感微寒八九月間肺氣正旺若面赤身熱其病爲實當用葶藶丸下之冬嗽者不宜下若在冬月乃傷風嗽當用麻黃湯汗之面赤飲水咳嗽嘔膿痰咽喉不利者以甘桔湯清之先咳後喘面腫身熱肺氣盛也以瀉白散平之嗽而嘔痰涎乳者以白餅子下之潔古云嗽而兩脇痛者屬肝經用小柴胡湯咳而嘔苦水者屬膽經用黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗者屬心經用甘桔湯咳而失氣者屬小腸用芍藥甘草湯咳而右脇痛者屬脾經用升麻湯咳而嘔長蟲者屬胃經用烏梅丸咳而喘息吐血不屬肺經用麻黃湯咳而遺尿者屬大腸用赤石脂湯咳而腰背痛甚則

咳逆者屬腎經用麻黃附子細辛湯咳而遺尿者屬膀胱用茯苓甘草湯咳而腹滿不欲食面腫氣逆者屬三焦用異功散若咳嗽流涕外邪傷肺也先用參蘇飲喘嗽面赤心火刑肺也用人參平肺散及六味地黃丸嗽而吐青綠水肝木乘脾也用異功散加柴胡桔梗嗽而吐痰乳脾肺氣傷也用六君子加桔梗若嗽唾膿痰者熱蘊於肺而成肺癰也用桔梗湯凡風邪外傷法當表散而實腠理其用下藥非邪傳於內及胃有實熱者不宜輕用

面色白脈短澁者肺之本症也易治面色赤脈洪數者火刑金也難治

治驗

一小兒潮熱煩渴大便乾實氣促咳嗽右顴色赤此肺與大腸有熱用柴胡飲子一服諸症頓退後又發搐咬牙頓悶此肝脾氣血虛也用四君芎歸鉤藤鉤而愈

一小兒咳嗽惡心鼻塞流涕右顴青白此脾肺氣虛而外邪所乘也先用惺惺散咳嗽頓愈但

飲食不思手足指冷此外邪雖去而元氣尚虛也當調補脾土而生肺金遂用六君升麻治之而愈大凡外邪所侵而痰涎壅塞者宜表散之外邪既去而喘嗽未愈或更氣促肺氣虛也屬形病俱虛須用六君子之類調補脾土以生肺金爲善設逕補肺氣則反益其邪況肺乃脆嫩之藏而司腠理以脾爲母若腠理不密風邪外侵蘊結於肺而變咳嗽諸症乃形氣不足病氣有餘也最難調理設或嘔吐傷其胃氣汗下損其津液必變肺痿肺癰

吳江史萬言子六歲感冒咳嗽發散過度喘促不食痰中有血用桔梗湯而愈後因元氣未復清氣不升大便似痢或用五淋散黃連枳實之類痰喘目劄四肢抽搐變慢脾風而殁

一小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用補中益氣湯加五味子補之不信乃自服一陳桑皮枳殼而發搐痰湧余仍用前藥加釣藤鈎而痊

一小兒有哮病其母遇勞即發兒飲其乳亦嗽用六君桔梗桑皮杏仁治之母子並愈

一小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺氣虛有熱用六君炒黑黃連山梔而愈

一小兒咳嗽因乳母素食膏粱炙煿所致用清胃散而愈後其母因怒咳嗽脇痛其子亦然母服小柴胡湯子亦隨愈

吳江史萬洲子傷風咳嗽或用散表化痰之藥反加痰盛腹脹面色皖白予謂脾肺氣虛也用六君桔梗二劑頓愈三日後仍嗽鼻流清涕此復感於風寒也仍用前藥加桑皮杏仁而愈

一小兒發熱咳嗽右頤赤色此肺金有熱用瀉白散而愈次日重感風邪前症復作聲重流涕用參蘇飲加杏仁桑皮而愈但右頤與額微赤此心火乘肺也用人參平肺散一劑遂痊

一小兒咳嗽發熱右臉赤色作渴煩悶倦怠少食肚腹作脹此風邪傷肺飲食傷脾先用六君桔梗杏仁柴胡一劑諸症少愈後去杏仁柴胡

又一劑而安

一小兒發熱右臉赤咳嗽痰盛余謂風邪蘊結於肺而痰作也用二陳加桑皮杏仁桔梗治之將愈自用發散降火之劑風痰不退發熱益甚余曰此脾肺俱虛也用五味異功散加桔梗四劑漸愈又用六君子湯而愈

一小兒三歲痰涎上湧氣喘胸滿大便不實睡而露睛手足指冷此屬形病俱虛也用六君桔梗一劑諸症稍緩至四劑將愈復傷風寒前症仍作又以前藥加紫蘇杏仁桑皮而安

一小兒傷風咳嗽痰盛雜用化痰等藥寒熱益甚面色或青或赤此風熱相搏也用牛黃清心丸一服又六君桔梗二服而痊

麥煎散治夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語自汗及治瘧疹搔痒往來潮熱或時行痧痘餘毒未盡痰涎咳嗽或變驚風手足搐掷眼目上視或傷風頭疼並宜服之

滑石　地骨皮
白茯苓　杏仁
甘草　葶藶子炒各半兩　人參　知母
小麥五六十粒　麻黃去節一兩五錢

右爲末每服一錢麥子煎湯調下若久嗽傳於五臟或嘔痰涎或厥冷驚悸甚則目睛腫黑白睛色赤用生地黃黑豆濕研成膏掩目睛上服麥煎散久嗽成癇服散癇之藥

小青龍湯治傷寒表不解惡寒體熱心下停水乾嘔咳嗽喘急或肺脹胸滿鼻塞清涕噎逆氣喘仲景所謂表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或噎或小便不利或小腹脹滿此湯主之

麻黃去節　赤芍藥　半夏湯泡各七錢　細辛
乾薑炮　甘草炙　桂枝各三錢　五味子半兩
杵

右每服一十錢水煎

理中湯治脾胃虛寒胸膈痞滿或心腹疼痛痰逆嘔吐飲食減少氣短羸困或霍亂吐利手足厥冷不喜飲水者

人參 白朮 乾薑炮各甘草炙各
右每服三錢水煎熱服或研末白湯調下半
惺惺散治外感風寒鼻塞痰嗽發熱
桔梗 細辛 瓜蔞根
甘草
右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎服
參蘇飲治感冒發熱頭疼傷風咳嗽傷寒嘔吐胸
膈不快痰飲凝結
紫蘇 前胡 陳皮 半夏炮次 白茯苓 人參 白朮
乾葛 茯苓 枳殼炙 桔梗各三錢
甘草一錢 人參三錢 姜棗水煎服
右爲末每服一二錢姜棗水煎服
保肺湯治肺胃受風熱痰盛欬嗽喘吐不止及治
冬嗽不愈
山藥 白茯苓 紫蘇葉各一錢 藿香五分

白僵蠶去絲嘴炒二錢 百部六分 黃芩 百合五分
防風 杏仁去皮尖麩炒各一錢
五味子一錢 桔梗一錢
右水煎食後服
天麻防風丸治驚風咳嗽身體壯熱多睡驚悸手
足抽掣精神昏憒痰涎不利及風邪温熱
天麻 防風 人參 辰砂
雄黃 麝香 甘草炙各二錢五分 全蠍炒
僵蠶各半兩炒 牛黃一方有膽南星無麝香

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十丸薄荷湯下
麻黃湯治太陽症頭疼發熱身頭惡風無汗喘滿
脉浮緊八九日不解當發汗汗已煩悶瞑目者
必衄衄乃解所以然者陽氣重故也

甘草半兩　麻黃去節二兩半　桂枝一兩　杏仁去皮三十五箇

右每服三錢水煎
柴胡石膏湯治時行瘟疫壯熱惡風頭疼體疼鼻
塞心胸煩滿寒熱往來咳嗽涕唾稠粘

桑白皮　黃芩各三錢半　升麻二錢五分　石膏

前胡　赤芍藥　乾葛　柴胡各五錢

荊芥穗三錢

右爲末每服一二錢薑二片淡豉十粒水煎
葶藶丸治脾熱薑肺或傷風咳嗽面赤痰盛身熱
喘促

葶藶子隔紙炒　防己　黑牽牛炒

杏仁去皮尖雙仁麩炒搗膏一兩

右爲末研入杏膏拌勻取蒸棗肉搗和丸麻子
大每服五七丸淡薑湯下量兒加減

黃芩半夏生薑湯治膽腑欬嘔苦水若膽汁

黃芩　生薑各一錢　大棗二箇　半夏一錢五分　甘草炙　芍藥各六分

右水煎服

甘桔湯治心臟咳咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺

粉草一錢　苦梗一錢

右水煎食後服

芍藥甘草湯治小腸腑欬欬而失氣

芍藥　甘草炙各一錢

右水煎服

升麻湯治脾臟咳咳而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動動則欬甚方見傷寒

烏梅丸治胃腑咳咳而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅三十箇　細辛　人參　黃柏各六錢　當歸　蜀椒各四兩　乾薑一兩　黃連一兩　附子製　桂枝

右爲末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗

和丸桐子大每服十丸白湯下
赤石脂禹餘粮湯治大腸咳咳而遺屎
赤石脂　禹餘粮　各二兩　並打碎
右每服二錢水煎
麻黃附子細辛湯治腎臟咳咳則腰背相引而痛
甚則咳涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之
緩則不救
麻黃　細辛　各一錢　附子一錢
右每服一錢水煎

茯苓甘草湯治膀胱咳咳而遺溺
茯苓二錢　桂枝二錢五分　生薑五大片
右每服二錢水煎
牛黃清心丸方見急驚
瀉白散方見肺臟
二陳湯方見吐噦
補中益氣湯方見虛贏
小柴胡湯方見痙症
桔梗湯方見肺癰

四君子湯
六君子湯
清胃散
異功散 四方並見內鈎
地黃丸 方見腎臟
五苓散 方見五淋
人參平肺散 方見夜啼
白餅子 方見發搐
百晬內嗽

百晬內嗽者名乳嗽甚難調理當審其虛實若氣粗痰盛口瘡眼熱先用比金丸嘔吐驚悸困倦自汗用補肺散驚嗽用琥珀散乳嗽用天麻丸若脾胃內熱者用抱龍丸風邪外感者用惺惺散痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾肺氣虛也用異功散加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用三黃丸大便不實者用白术散若嘔吐不乳困倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四君子加芎歸酸棗

仁或因乳母食五辛厚味致兒爲患者仍叅喘嗽
諸症

治驗

一小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進

一小兒咳嗽服抱龍丸反吐瀉不乳腹脹發熱用六君子湯母子並服而瘥後因母飲酒仍嗽用清胃散加麴蘗母服而子亦愈

一小兒患嗽或用清痰等藥反吐乳發熱搐搦腹脹此脾胃復傷而內虛熱也用異功散加鉤藤鉤漸愈又用前藥加當歸而安

一小兒患咳嗽服牛黃清心丸加喘促腹脹此脾肺氣虛也用六君子湯頓愈

補肺散一名阿膠散治肺虛惡心喘急久患咳嗽有痰

阿膠一兩炒 鼠粘子炒 馬兜鈴各半兩 杏仁七粒

糯米一兩 甘草三分

右每服一錢水煎服

天麻丸治ㇾ未ㇾ滿ㇾ百晬咳嗽不ㇾ止

天麻　蟬蛻　白殭蠶炒　人參
川芎　甘草　辰砂　天竺黃各二錢
牛膝南星　砒　白附子　雄黃各一錢
金箔五片　鵬砂五分

右爲ㇾ末蜜ㇾ丸芡實大金箔爲ㇾ衣每服一丸用ㇾ薄荷湯下ㇾ

愚按前方乃金石大毒之劑不ㇾ可ㇾ輕用況一日晬小兒多是乳母飲食厚味或母有ㇾ肺病傳ㇾ兒昔一婦人服ㇾ截瘧丹內有ㇾ砒者兒飲ㇾ其乳良久子母昏憒遍身發ㇾ赤君ㇾ亦罹ㇾ斯ㇾ藥其子吐瀉大作ㇾ太人尚不ㇾ能ㇾ勝況小兒乎凡服ㇾ砒石之藥中ㇾ毒遍身發ㇾ赤昏瞶或吐瀉者急灌ㇾ醋碗許即甦小兒數滴足矣

琥珀散治ㇾ急慢驚風涎潮昏冒目瞪驚搐內釣腹痛或驚癇時ㇾ發

辰砂一錢五分　琥珀　牛黃　牛膽南星
僵蠶炒去ㇾ絲嘴全蝎　白附子　代赭石

天麻　乳香　蟬殼各一錢

右爲末每服一二十分白湯調下

黃芩清肺飲治肺燥而小便不通

黃芩一錢　梔子一箇打破

右水煎服不利加鹽豉二十粒

異功散

四君子湯

六君子湯

清胃散四方見內鈎

白朮散方見積痛

比金丸方見驚癇

三黃丸方見疝症

惺惺散方見咳嗽

抱龍丸方見傷寒

牛黃清心丸方見急驚

作喘

喘急之症有因暴驚觸心者有因寒邪壅盛者有因風邪外客者有因食鹹酸痰滯者有因膏粱積

熟薑煎清道者然喘與氣急有輕重之別喘則欲言不能臨於胸臆氣急但息短心神迷悶耳治法因驚者用雄朱化痰定喘丸佐以天麻定喘飲寒傷肺氣者用小青龍湯風邪傷肺者用三拗湯加減之食鹹酸傷肺者暗以生豆腐熟傷肺氣者當涼肺定喘哮喘嗽聲如鋸者梅花飲兼用半夏丸前症多因脾肺氣虛腠理不密外邪所乘真氣虛而邪氣實者爲多若已發則散邪爲主未發則補脾爲主設藥攻其邪則損真氣逕補其肺則益其

邪此喘嗽之症若小便不利則必生脹脹則必生喘要分標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾蓋肺金司降外主皮毛肺朝百脉通調水道下輸膀胱肺既受邪則失降下之令故小便漸短致水溢皮膚而生脹滿此則喘爲本而脹爲標也治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕而主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸潰肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標也治當

實脾行水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金燥而喘愈甚脾病而用清金之藥則脾寒而脹益增觀其症若中氣虛弱者用六君子湯中氣虛寒者前方加炮薑參結氣滯者用歸脾湯加柴胡山梔肝木尅脾土者用六君柴胡山梔肺氣壅滯者用紫蘇飲加白朮食鬱雍滯者用養胃湯加木香肺中伏熱水不能生而喘者用黃芩清肺飲及五淋散脾肺虛弱不能通調水道者用補中益氣湯及六味丸膏粱厚味脾肺積熱而喘者用清胃散及滋腎丸心火刑金不能生水者用人參平肺散亦用滋腎丸腎水虧虛火鑠金小便不利者用六味丸及補中益氣湯肝木乘脾不能相制而喘者用六君柴胡升麻脾胃虛寒臍凸腹脹者用八味地黃丸脾腎虛寒不能攝水如蠱脹者用加減腎氣丸久虧損足三陰而致喘脹或一便不調及牽引作痛者俱用五味八味加山茱腎氣等丸治之仍參傷風咳嗽症

治驗

一小兒嘔吐發熱胸痞脇痛作喘發搐因乳母恚怒毋服加味逍遥散子服異功散加釣藤鈎山梔並愈

一小兒痰喘鼻塞用惺惺散而愈後因傷乳服消導之劑痰喘腹脹益甚余謂脾虛不能生肺而痰喘脾氣不能運化而腹脹用異功散而痊一小兒患喘服發汗之劑汗不出而喘益甚用異功散頓愈又用六君子湯而全愈後復痰喘服下痰丸前症愈甚更腹脹作嘔此脾肺復傷也再用異功散而漸愈半載後患喘嗽面赤此心火尅肺金用人參平肺散及六味地黄丸而痊

一小兒傷風喘急不能卧服參蘇飲之類不痊余用小青龍湯一劑而愈後復感寒嗽喘益甚服發表之藥手足並冷腹脹少食余謂脾肺俱虛也用六君子加桔梗杏仁而愈

一小兒患喘面赤服半黄清心丸面色皖白手足不熟余謂脾胃復傷用六君子湯不半杯而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

愈又傷風寒而喘面色仍白用五味異功散加桔梗生薑治之頓安

一小兒七歲患前症久不愈或用下痰等藥連瀉數次飲食不入手足並冷喘急不得臥先用人參五錢附子一錢二十劑少緩又一十劑十減二十四乃用獨參湯愈却用四君子湯而瘥

雄朱化痰定喘尤治因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困

雄黃　硃砂各一錢研　蟬蛻　全蝎

白僵蠶　天南星　白附子炮各二錢　輕粉五分

右爲末糊丸麻子大每服數丸茶清送下

梅花飲治五臟積熱胸中有痰面色赤白鼻流清涕氣逆喘急目赤咳嗽或因驚夜啼

硼砂　馬牙硝　片腦　人參各一兩

甘草五錢　芒硝　麝香各一錢　辰砂

右各另爲末磁器收貯每服半匙麥門冬湯調服氣急喘嗽桑白皮湯下常服薄荷湯下

天麻定喘飲治ス喘嗽驚風

天麻　防風　羌活　甘草炒
人參　桔梗　白朮　川芎
半夏麴各等分

右每服二錢水煎服ス

三拗湯治ス感冒風邪鼻塞聲重語音不レ出或傷レ風寒頭疼目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用各等分

右每服二三錢薑水煎服ス

半夏丸治ス肺氣不調咳嗽喘滿及風痰嘔吐惡心逆唾稠粘

白礬一兩　半夏三兩湯泡七次薑汁製一宿

右爲末生薑自然汁丸赤豆大每服十丸薑湯下ス

紫蘇飲子治ス肺受レ風寒咳嗽喘熱痰嗽

紫蘇葉　桑白皮　青皮　五味子
杏仁　麻黃　甘草炙　陳皮各二分
人參　半夏各三分

右薑三片水煎溫服
小青龍湯
惺惺散二方見咳嗽
異功散
清胃散
六君子湯
加味逍遥散
歸脾湯五方見心病
人參平肺散方見夜啼

平胃散方見胃氣虛冷
八味丸即六味丸加肉桂
五味子方見腎臟
牛黄清心丸方見急驚
養胃湯方見瘧症
黄芩清肺散方見百咳內嗽

五淋散方見五淋
滋腎丸方見發熱
補中益氣湯方見虛羸
六味丸方見腎臟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保則腹脹

金匱加減腎氣丸 方見腹脹

黃疸

經曰中央黃色入通於脾故黃疸者脾之色也夫人身之神貴於藏而默用見於外則內虛矣其症皆因脾氣有虧運化失職濕熱留於肌膚發而爲疸錢仲陽所謂身痛腰疆一便澁滯遍身面目爪甲皆黃是也小便褐色者難治療法宜固脾爲先如專用尅伐寬中滲泄利水之藥則鮮有不至危者矣若初生及百日半年之間不因病而身黃者

胃熱胎黃也腹大食土爲脾疳兼作渴飲冷者用瀉黃散小便不利者茵陳湯病後發黃肢體浮腫者用白术散清便自調肢冷嘴卧者益黃散身濶黃白者調中丸及補中益氣湯加茵陳身熱膈滿肌膚面目皆黃者加減瀉黃散辨其所以若閉目壯熱多哭不已大小便赤澁口中熱氣者遍體脹厚味胎毒之候也母子並服生地黃湯仍忌酒麪五辛熱物設不自慎悞傷脾土急則變爲驚風吐瀉緩則肢體浮腫小便不利眼目瞼閉多成疳疾

矣又有脾虛發黃者當於脾胃中求之

治驗

一小兒旬日內先兩目發黃漸及遍身用瀉黃散一服而瘥

一小兒生旬日面目青黃此胃熱胎黃也用瀉黃散乳調服少許即愈後復身黃吐舌仍用前藥而安

一小兒因乳母食鹹而致飽脹嚥酸遍身皆黃余以越鞠丸治其母瀉黃散治其子並愈

一小兒患前症服五苓散消食丸之類其黃不退作渴飲湯腹膨少食余謂胃氣虛津液少故喜飲湯脾氣虛故腹脹少食也先用白术散漸愈又用補中益氣湯而瘥

一小兒飲食不調腹脹身黃小便金色雜用治疸之劑作渴飲冰余謂胃氣實熱先用瀉黃散一二劑作渴頓止用梔子柏皮湯其黃亦退用白术散而飲食進

茵陳湯治陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

黃也但頭汗出至頸而還小便不利渴飲水漿此瘀熱在裡而發黃也或傷寒七八日小便不通腹微滿身黃如橘色者

茵陳蒿嫩者 一兩 大黃三錢 五分 梔子大者三枚

右每服一錢水煎服

犀角散治黃疸一身盡黃

犀角一兩 茵陳 葛根 升麻

龍膽草酒炒 甘草各半兩 生地黃一錢 寒水石二錢

右每服三錢水煎服一方瓜蔞根汁和蜜服

小半夏湯治黃疸小便色不變自利腹滿而喘者不可除熱熱去必噦

半夏湯洗七次

右每服二三十錢薑二十片水煎服

消食丸治胸膈氣痞乳食不消身後黃者方見嘔吐乳

茵陳五苓散即五苓散加茵陳每服一錢溫水調下日三服

導赤散二方見五淋

越鞠丸方見天釣

承氣湯

小柴胡湯二方見瘧症

調中丸即理中丸方見冷瀉

平胃散方見脾胃虛冷

史君子丸方見蚘虫

益黃散方見脾臟

地黃湯即濟生地黃湯

白朮散方見積痛

四味肥兒丸方見嘔吐

瀉黃散方見脾臟

嘔吐乳

嘔吐皆主脾胃古人謂脾虛則嘔胃虛則吐是也嘔者有聲無物吐者有物無聲也蓋乳哺過飽則胃不能受而溢出喫乳多食睡則脾不能運而作瀉脾胃漸傷疾病纏綿甚至慢驚之患矣若手足指熱喜飲熱湯或睡而露睛皆胃氣虛弱也用異功散若手足指熱飲冷或睡不露睛屬胃經實熱也用瀉黃散若作渴少食或小便色赤胃經虛熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

得嘔瀉或
也用七味白术散大次先嬰兒在乳母尤當節飲食
若乳母停食亦能致兒吐瀉故不可不愼也

治驗

一小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑
飲食已消熱亦未退余以爲胃經虛熱用三六君
升麻柴胡四劑而痊
一小兒傷食嘔吐服芎伐之藥嘔中見血用清
熱凉血反大便下血唇色白而或青余謂脾土
虧損肝木所乘令空心服補中益氣湯食遠服

異功散使涎血各歸其源果愈
一小兒吐酸乳食用四君吳萸黃連木香補脾
平肝而愈後口中有酸水仍用前藥隨愈後吐
苦水而口亦苦用龍膽湯以清肝火四君子湯
以補脾土而痊
一小兒吐黃水所食之物悉皆甘味用瀉黃散
清其胃火而愈後因停食服芎伐之藥口甘不
食形氣殊弱用補中益氣湯養其中氣而痊
一小兒傷食嘈腐用平胃散一服宿滯頓化余

云不必多藥但節其飲食自愈不信別用耐滯之藥更加吐瀉以致不救

一小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘痰涎飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分二劑頓愈

消乳丸治嘔吐消乳食脉沉者傷食不化也

香附子炒　宿砂仁　陳皮去白　甘草炙　神麴炒　麥芽炒　等分

右爲末米大每服二十丸薑湯下

又方治百瘁內嘔吐乳妳或大便青色用火婦乳汁一盞入丁香十粒陳皮一錢磁器內煮數沸稍熱空心以綿裹吮服

楊氏消食丸治乳食過多胃氣不能消化

宿砂　摘皮　三稜　莪朮　神麴炒　麥芽炒各半兩　香附子炒一兩

右爲末麴糊丸麻子大白湯送下量兒加減

局方觀音散治外感風寒內傷脾胃嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參一兩 神麴炒 茯苓 甘草炒
木香 綿黃芪 白扁豆 白朮各一錢
石蓮肉去心二錢五分

右爲末每服一錢入藿香二葉棗水煎服

香朴散治積冷嘔吐

藿香葉 陳皮 厚朴姜汁製各七錢
半夏一兩炮七次 甘草炙一錢

右每服三錢薑棗水煎瀉甚加木香肉豆蔻

香薷散治寒溫不適飲食失調或外因風寒暑邪致吐利心腹疼痛霍亂氣逆發熱頭痛或轉筋拘急或疼痛嘔噦四肢逆冷

香薷一兩 茯苓 白扁豆炒 厚朴姜汁製各五錢

右每服二十二十錢水煎加酒半杯冷服立效

竹茹湯治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根七錢五分 半夏炮半兩 甘草炙三錢

右每服二十三十錢入竹茹棗許大薑水煎取清汁微冷細細服加茯苓三十錢尤妙

蘇合香丸治傳屍骨蒸癆瘵肺痿症件鬼氣辛心

痛霍亂吐痢驚癇客忤等症

蘇合香油（入安息香膏內）　木香　白朮
朱砂（研飛）　水沉香　畢撥　安息膏（另爲末用無灰酒杵膏）　薰陸香（另研）　龍腦（研）
訶黎勒（煨取皮各二兩）　白檀香　丁香　香附子（炒）　烏犀屑

右爲末研勻用安息香膏并蜜和丸桐子大井花水空心化服一二十丸温酒亦得更用臙紙裹彈子大一丸緋絹袋盛當心帶之辟忤一切邪及治胸膈噎塞腸中虛鳴宿食不消

青州白丸子治驚風吐乳

天南星（三兩）　白附子（一兩）　半夏（浸洗七兩）　川烏頭（去皮臍半兩）

右用井花水浸晒過次日夏三日秋七日冬十日晒乾爲末以糯米粉煎粥清爲丸菉豆大薄荷湯調下

瀉黃散（方見脾臟）

白朮散（方見積痛）

異功散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六君子湯

四君子湯三方見內鈎

龍膽湯 方見嗓風

平胃散 方見脾胃虛冷

補中益氣湯 方見虛痨

吐舌弄舌

舌屬心脾二經小兒舌微露而即收者名弄舌此屬心脾虛損用温胃散補之舌舒長而良久不收者名吐舌乃心脾積熱用瀉黃散主之或兼口舌生瘡作渴飲冷屬胃經實熱亦用前散作渴飲熱屬胃經虛熱用四君子湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用七味白术散口角流涎或腮頰患腫胃虛風熱也先用人參安胃散次用七味白术散若午後甚者脾血虛也四物加參术茯苓未應用補中益氣湯及審五臟相勝若因疳瘦所致當參諸疳門

治驗

一小兒弄舌發搐手指不冷余謂肝脾虛熱用

異功散加升麻柴胡而愈後傷乳腹脹服藿滯作瀉舌手指發熱審乳母肝火與小柴胡湯加升麻白术治之母子並愈

一小兒乳食過多患吐瀉用大劑異功散加柴胡升麻母子服之而愈後因驚服至寶丹之類發搐弄舌幾至慢驚余用六君子湯加白附子服而愈

一小兒吐舌發熱飲冷額鼻黃赤吐舌流涎余謂心脾實熱用導赤瀉黃二散而愈後復作別服清熱等藥更弄舌余用異功散加鉤藤鉤而安又用六君子湯全愈

一小兒七歲食生冷之物腹痛便秘服峻利之劑連瀉五次噫氣腹痛余謂心脾虛寒用異功散加薑桂木香治之不從反治胃火更加吃逆余仍以前藥加附子一片一服諸症頓退乃去附子又三劑而愈其時同患者殺而手足俱黮是症用清胃化痰

四物湯 方見急驚

補中益氣湯 方見虛贏
小柴胡湯 方見痙症
導赤散 方見心臟
瀉黃散
人參安胃散 二方見脾臟
七味白朮散 方見積痛
異功散
六君子湯
四君子湯 三方見天鈞

五苓散 方見五淋

保嬰撮要卷之六 終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之七

古吳薛　鎔編集
男薛　已治驗
後學朱　璞校閱

熱吐

經云胃傷則吐小兒熱吐者因多食甘甜炙煿之物或乳母膏粱厚味胃經積熱或夏間暑氣內伏於胃所致若肌肉瞤動煩熱作渴者暑傷胃氣也先用香薷飲次用竹茹湯若吐乳色黃不能受納

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

者胃經有熱也先用瀉黃散次用人參安胃散若吐出酸穢者乳食內停也用保和丸吐乳不消者胃氣弱也用異功散吐而少食腹痛欲按者脾氣虛也用六君子加木香几諸症當驗其手指熱則胃熱冷則胃寒熱用瀉黃散寒用理中湯不熱不寒異功散調之

治驗

一小兒夏月吐乳手指發熱作渴飲冷口吐涎水余謂胃氣熱藤泉開而涎出也用瀉黃散而愈後復嘔吐另用剉滯之劑口渴飲湯流涎不已余謂胃氣虛寒不能攝涎也用理中丸而愈

一小兒七歲嘔吐不食面白指冷此胃氣虛寒也用理中湯嘔吐頓愈又用六君子湯而痊後傷食腹痛發熱嘔吐流涎先用保和丸一服而痛嘔愈再用四君山梔而涎止

一小兒食涼粉而嘔吐酸物頭痛發熱此內傷兼外感也用人參養胃湯末二錢薑湯調服諸症皆愈惟吐酸涎用大安丸一服而止

一小兒傷食發熱嘔吐酸物手指常冷此胃氣虛寒陰盛隔陽於外虛熱所致也用保和丸末二十錢濃薑湯調服而吐止再用六君子湯加山梔而安

一小兒嘔吐作瀉暑月或用玉露飲子之類而愈又傷食吐酸余先用保和丸一服吐止次用五味異功散飲食漸進又用四君子湯而痊

一小兒暑月患吐瀉服香薷飲五苓散之類而止但手足並冷睡而露睛飲食不入腸鳴作嘔

欲用清涼之劑余曰此始爲熱終爲寒也當捨時從症用人參理中丸以薑湯化二服病勢始定次用助胃膏漸安又用六君子湯調理而愈

一小兒飲食多即吐余用五味異功散愈之又腹痛嘔吐先服大安丸仍用異功散而愈後症復作另投祛逐之劑吐瀉不食腹中痛甚以手按之則止此脾氣復傷也先用補中益氣湯加茯苓半夏二劑又用六君升麻柴胡二劑飲食頓進後食生冷挾驚吐瀉手足並冷唇口搐動

用六君鉤藤鉤柴胡而愈

一小兒吐酸作渴飲冷腹痛發熱用人參養胃湯加黃連二十劑吐熱稍定又用保和丸一服腹痛頓止後傷食復吐腹脹大便不通用紫霜丸下之痢愈又感冒咳嗽腹脹另服下藥發熱作吐腹脹手足並冷睡而露睛發搐用六君鉤藤鉤而安又用四君加當歸川芎而愈後患吐瀉手足並冷用助胃膏頓痊

一小兒嘔吐發熱用瀉黃散而愈後因乳母飲酒腹脹吐泄用葛花解醒湯子母服之漸愈大便日去五七次用五味異功散加升麻一劑日去二次乃用四君山查神麴而安後因飲食過多嘔吐復作另用下積丸更加作瀉腹脹手足發搐余以爲肝木侮脾用五味異功散加柴胡鉤藤鉤而搐止又用六君子湯飲食漸進而痊

一小兒夏間嘔吐腹痛大便不通服大黃藥而

愈又傷食患吐發熱服瀉黃散等藥嘔吐腹痛按之即止面色青黃手足並冷此脾胃復傷而虛寒也用異功散加木香愈之後又傷食腹脹作痛或用消食丸吐瀉並作小腹重墜午後益甚余朝用補中益氣湯夕用六君子加木香而愈

一小兒嘔吐發熱腹痛面赤手熱口乾飲湯按其腹不痛此脾胃氣虛也用異功散加木香乾薑二劑而愈復傷食吐而噦酸腹中作痛按之益甚此飲食內停也用保和丸二十服而瘥葛花解醒湯治乳母酒醉後乳兒遺熟爲患

白荳蔻　砂仁
陳皮　人參
青皮三分　乾生薑
神麯炒黃各二錢　白朮
葛花各五錢　白茯苓
豬苓　木香各五分
澤瀉

右爲末每服二十錢白湯調服

愚按前湯先指不得已而用之蓋醉酒耗氣又服辛散重損眞陰折人長命可不愼哉

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

助胃膏治脾胃虛寒吐瀉等症

人參　白朮　白茯苓　甘草炙　丁香各五錢　砂仁四十箇　木香三錢　白豆蔻十四箇　乾山藥一兩肉豆蔻四箇煨

右爲末蜜丸芡實大每服十丸米飲化下

香薷散方見熱吐

竹茹湯

五苓散二方並見五淋

玉露散

補中益氣湯

大安丸

保和丸四方見虛羸

六君子湯

四君子湯二方見天鈞

瀉黃散

人參安胃散二方見脾臟

理中丸方見冷瀉

人參養胃湯方見瘧症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

寒吐噦逆

錢仲陽曰寒吐者由乳母當風取涼或風寒客于乳房其症面目脹額汗出脉沉遲微寒氣停於胃故胃不納而吐出也噦逆者由胃氣虛甚過服尅伐使清氣不升濁氣不降以致氣不宣通而作也風寒在胃者用理中九胃氣虛者六君干湯風涼所致者宜揑去敗乳急服理中九次服釀乳法若嘔吐清涎夾乳小便清利用大安九若因乳母食厚味用東垣清胃散若乳母飲醇酒用葛花解醒湯飲燒酒服冷米醋二十五杯乳母食生冷而致者用五味異功散乳母勞役者子母俱服補中益氣湯乳母怒動肝火者用加味逍遙散乳母鬱怒傷脾者用歸脾湯乳母脾虛血弱者用六君芎歸其子亦服二十五滴氣血虛而乳熱者子母皆服八珍散仍參熟吐霍亂治之

治驗

一小兒因停食腹痛服疎導之藥而愈後復停

食又甩前藥寒熱不食腹脹後重大便頻而少
此脾氣復傷而下陷也先用異功散加升麻數
劑後重漸愈再加當歸全愈後因乳母恚怒致
兒寒熱發搐作嘔用六君柴胡山梔以治其母
兼灌其兒並愈

一小兒因乳母感冒風寒發熱兒患嘔吐身發
赤暈用柴胡人參安胃散而愈又咬牙發搐嘔
吐酸腐待其吐止自安

一小兒肺吐乳食診其母有鬱怒之症用加味
歸脾湯加味逍遙散治之而愈

一小兒七歲身羸兼吐少食發熱面黃余謂脾
臟受傷用六君煨薑一劑而愈

一小兒吐乳大便臭穢目睛緩視因乳母交感
後飲乳所致用六君木香藿香治之而安

一小兒吐乳不食手足搐搦痰涎上湧手足指
冷額黑唇青此腎水勝心火也用五味異功散
加木香炮薑頓愈去薑又數服而愈

一小兒不時乾嘔不乳腹脹此脾胃虛而將成痃也用四味肥兒丸以治痃四君子湯以健中而痊後傷食吐瀉完穀形氣困憊四肢微搐余曰且勿藥次日吐止但搐而瀉青黃此脾土虛而肝木勝也用六君釣藤鉤而痊

釀乳法治嬰兒有胎熱症令乳母服之不可遽用冷藥恐損脾胃若加嘔吐必成大患

澤瀉二兩 猪苓去黑皮 赤茯苓 天花粉 各一兩半
五錢
生地黃二兩 山茵陳去梗 甘草 各一兩

右每服五錢水煎食後搉去舊乳服

茯苓半夏湯治嘔噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸

半夏五錢 白茯苓二兩

石每服三錢薑水煎服

二陳湯治痰飲嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或因食冷物胃氣不和

半夏 橘紅各一錢五分 白茯苓三錢 甘草一錢五分炙

右每服二三錢烏梅一箇薑棗水煎服

四味肥兒丸治嘔吐不食腹脹成痞或作瀉不止
或食積脾疼目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱瘦怯遍身生瘡又治小便澄白腹大青筋一切疳症

黃連炒　蕪荑　神麴　麥芽炒各等分

右爲末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滾湯送下

東垣人參安胃散治服峻劑脾胃虛損或成慢驚泄瀉嘔吐腸胃有熱以致前症　方見脾臟

東垣清胃散　方見內鈎
理中丸　方見咳嗽
葛花解醒湯　方見熱
大安丸　卽保和丸加白朮
保和丸
補中益氣湯　三方見虛羸
加味逍遙散
加味歸脾湯　二方見內鈎
清胃散

六君子湯
異功散
四君子湯 四方見內鈎
八珍湯 方見寒熱
人參養胃湯 方見瘧症

霍亂吐瀉

錢仲陽云吐瀉壯熱不食或乳不消是傷乳也宜白餅子下之後用益黃散和胃若吐瀉身温不乳也不便青白此上實下虛也用益黃散加減治之大凡吐瀉身温乍凉乍熱氣粗大便黃白吐乳不消此傷風熱也先服大青膏發散後服益黃散和胃若吐瀉身熱多睡能乳吐痰大便黃水胃虛也先用白术散生津止渴後用大青膏飴藤飲發散風邪若夏至後吐瀉身熱或吐乳瀉黃此傷熱乳也用玉露散之類凡瀉乳腹痛按之而哭者食積痛也用白餅子下之按之不哭者脾胃氣虛也用五味異功散補之手足指冷者脾氣虛寒也用異功散加木香傷風吐瀉者風木尅脾土也亦用前藥

若飲熟乳而瀉黃者濕熱壅滯也用四苓散如不痛或反甚者元氣復傷也用白朮散瀉而腹中重墜者脾氣下陷也用補中益氣湯若服剋滯之劑而腹中窄狹者脾氣虛痞也用六君子湯若面黃瀉青脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香若多噫瀉黃心脾氣虛也用六君炮薑升麻生下半月旬日內吐者止宜調治其毋恐嬰兒臟腑脆弱不勝藥餌故也

治驗

一小兒盛暑吐瀉米穀不化或用黃連香薷飲之類腹脹作痛手足指冷此脾氣虛而伏陰在內也用五味異功散加木香治之而愈先君嘗云凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲冷者屬陽症宜清涼之劑手足指冷作渴飲熱者屬陰症宜溫補之劑故凡病屬陰症誤用寒涼之藥死後手足青黯甚則遍身皆然於此可驗

一小兒吐瀉乳食色白不化露睛氣喘此脾肺不足形病俱虛也先用異功散加柴胡桔梗頓

愈再用補中益氣湯而安

一小兒吐瀉驚悸困倦腹脹此心火虛而脾土怯也用六君茯神酸棗仁而愈又用秘旨保脾湯乃瘥

一小兒吐瀉驚搐項强乃脾傷而肝侮形氣虛而病氣實也用異功散加釣藤鈎補脾平肝而愈

一小兒吐瀉呵欠頓悶不語畏明屬脾肺不能生肝腎也用異功散補脾肺地黃丸補肝腎遂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

瘥

一小兒吐瀉腹脹不乳此脾胃傷也先用香砂助胃膏而飲食進後用六君子湯而脾胃健

一小兒寒熱作嘔飲食不入按其腹則哭此飲食停滯也先用大安丸遂安但唇白抽動大便稀黃此病邪去而脾氣虛弱也用六君子湯以補脾土釣藤鈎以平肝木愚愈

一小兒白睛多唇色白停食吐瀉困睡驚悸久治不愈余曰驚悸爲心血虛怯困睡爲脾氣虛

弱皆禀脾腎不足所致也用補中益氣湯及六味丸加鹿茸而愈

一小兒未週歲氣短喘急乳食少進時或吐乳乃脾傷而食積也先用六君山查枳實漸愈後吐瀉作渴用胃苓膏以治吐瀉白朮散以生胃氣而安

一小兒四歲每飲食失節或外驚所忤即吐瀉發搐服鎮驚化痰等藥後患益甚飲食不入藥食到口即嘔余用白朮一味和土炒黃用米泔水濃煎不時灌半盞尚嘔次日微嘔又一日不嘔漸加至半杯月餘而愈

一小兒停食吐瀉身熱作渴瀉下紅白或青黃色服香連丸而愈甚兼手足指冷余謂始為實終為虛也用補中益氣湯加木香肉果而愈

一小兒傷食吐瀉大便溏泄或青綠色睡而露睛手足指冷額黑唇青此中氣虛弱寒水侮土也用五味異功散加升麻柴胡木香附子二劑而愈後患吐瀉不已先用胃苓散後用異功散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

而安

一小兒寒熱嘔吐或瀉青色余謂脾虛肝木所乘也用六君柴胡升麻治之而愈後因驚寒熱寅卯時益甚小便頻數久而不愈此肝火血虛先以小柴胡湯加白术茯苓當歸二劑頓止又用地黃丸而愈

車前子散治暑月霍亂吐瀉煩悶引飲不止小便不利

白茯苓　猪苓　香薷　車前子炒

人參各等分　右爲末燈心湯調下不換金正氣散治脾胃不和寒熱往來臟腑虛熱霍亂吐瀉

厚朴薑製　藿香　蒼术米泔浸　甘草炙各等分　陳皮半夏　右每服二三錢薑棗水煎服

二順散治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澁便血肚疼

豬苓　澤瀉　茯苓　杏仁去皮尖雙仁炒
芦草炙　白术
右爲末每服半錢不拘時水調下或水煎服
又釀乳法治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭嘔乳額上
汗流驚啼面黃令兒饑飲
人參　木香　藿香　沉香
陳皮　神麴　麥芽各等分　丁香減半
右每服匙錢薑十片紫蘇十葉棗二枚水煎每
服半盞令乳母食後揑去舊乳方服臥少時却
與兒乳

胃苓湯又名胃苓散爲末蜜丸名胃苓膏治腸胃
受濕嘔吐泄瀉
白术　茯苓　澤瀉　厚朴
豬苓　陳皮　芦草炒各等分　桂少許
右爲末每服二錢薑水燈心陳皮煎湯調下若
停食吐瀉小便短少腹脹作痛用此以分利之
更用六君子湯以調補脾胃
益黃散方見脾臟

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

理中湯方見咳嗽
助胃膏方見熱吐 一云名香砂助胃
白餅子方見發搪
白朮散方見積痛
鈎藤散方見慢驚
玉露散方見熱瀉
五苓散方見立消
香薷飲方見嘔吐
定命飲子方見

異功散
六君子湯二方並見內鈎
大青膏方見肝臟
補中益氣湯
大安丸二方見虛靡鈎
保和丸加白朮
香連丸方見諸痢
小柴胡湯方見痙症
四苓散方見五淋五 苓散去桂
四君子湯方見內鈎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

驚病

巢氏云小兒驚病者婦人懷妊時有鬼神觸胎所致其狀微利寒熱往來毛髮髣髴情思不悅安服龍膽湯又小兒未斷乳母復有胎遂斷其乳羸瘦骨立髮黃壯熱大便不調名驚病又名癇病也用紫霜丸下之益黃散補之令兒斷乳但服消乳丸異功散有雖而抱他兒亦致此症海藏云驚病者因母有雖兒飲其乳致病如瘧痢腹大或瘥或發他人相近亦能致之北人有取伯勞鳥羽帶之云可愈者竊謂前症因邪氣所觸而患故用紫霜丸下之若元氣被傷吐瀉諸症者當隨各症治之

益黃散方見脾臟

消乳丸方見調護法

異功散

六君子湯二方見內鈎

紫霜丸

龍膽湯二方見噤風撮口

補中益氣湯方見虛勞

冷瀉

湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄錢仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無陽也當用益黃散加減治之大便清白口不煩渴冷積瀉也理中湯主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷之食而作者先用理中湯後用異功散命門火衰不能溫蒸中州之氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味丸脾胃虛弱者五味異功散脾氣下陷者補中益氣湯脾氣虛寒者人參理中湯寒水傷土者益黃散肝木乘脾者四君柴胡散手足並冷者加木香乾薑治者審之

治驗

一小兒瀉利青白手冷面青或眩吃逆余用人參理中湯更加腹痛仍以前湯加木香乾薑二劑稍緩又以五味異功散加木香漸愈又用五味異功散加升麻調理而痊

一小兒腹痛作瀉飲食不化小腹重墜用補中益氣湯加乾薑爲末每服錢許米飲調日二三

服旬餘稍愈又以五味異功散爲末米飲調服旬餘漸愈又以四君子湯而痊

一小兒泄瀉腹痛手足並冷唇青額黑余謂寒水侮土用益黃散痛止再用六君乾薑漏蘆子母服之頓止又用人參理中湯而痊

一小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母並愈

一小兒患瀉乳食不化手足指冷服消乳丸食乳即瀉余用五味異功散加木香母子服之而愈後時搐唇口抽動用異功散加木香釣藤鉤補脾平肝而痊

一小兒泄瀉手足發搐痰涎上湧手足指冷額黑唇青用五味異功散加木香炮薑補心火救脾土而愈

一小兒年十四患泄瀉小腹重墜飲食甚少先用六君子湯送四神丸數劑瀉漸止飲食稍進

又用補中益氣湯數劑下墜漸愈後因勞發熱自腐而起饑則熱甚用六君炮薑治之稍安又用加味歸脾補中益氣湯而痊

人參理中湯

人參　白朮炒　乾薑炮　甘草炙各等分

右每服一二錢水煎蜜丸即人參理中丸加附子即附子理中湯

益黃散方見脾臟

理中湯方見咳嗽

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

四君子湯

六君子湯

五味異功散三方見大便泄瀉

補中益氣湯方見虛羸

八味丸方見腎藏即六味丸加肉桂五味子

四神丸方見驚瀉

熱瀉

湯氏云小兒熱瀉者大便黃赤有沫乃臟中有積或蘊熱所致若小便赤少口乾煩躁當用四苓散

熱甚者四逆散右腮色赤飲冷胃經實熱也用瀉黃丸惡冷喜熱胃經虛熱也用白朮散右腮及額間俱赤心脾翕熱也用瀉黃散加炒黑黃連若左頰右腮俱赤肝火乘脾土也用四君子湯加柴胡元氣虛寒當參前症治之

若兒暴傷乳食用保和丸乳母尤當忌厚味節飲食若乳母停食所傷致兒吐瀉等病當治其母大抵始病而熱者邪氣勝則實也終變爲寒者眞氣奪則虛也久病而熱者內眞寒而外假熱也久瀉

治驗

一小兒夏間食寒復傷胃吐而腹痛余用保和去彼以爲緩另用重劑吐瀉並作腹痛益甚按其腹却不痛余曰此食已消而脾胃虛也當溫補之仍行消導昏憒發搐余用異功散加木香治之漸愈後復傷食另用去積丸吐瀉不食手足並冷睡而露睛變爲瘨疾余用六君木香炮薑治之而愈

一小兒瀉而大便熱赤小便澁少此熱蘊於內

也先用四苓散加炒黃連一劑其熱頓退又用白术散去木香二劑熱瀉頓止以四君升麻調理而痊

一小兒食炙煿甘甜之物常作瀉大便熱痛小便赤澁此膏粱積熱所致用四苓散清胃散各四服諸症稍退乃用四味肥兒丸而痊

一小兒九歲食炙煿之物作瀉飲冷諸藥不應肌體消瘦飲食少思余用黃連一兩酒拌炒焦爲末入參末四兩粥丸小豆大每服四五十丸不拘時白湯下又服加升麻服月餘而痊後不戒厚味患痢積消瘦少食發熱作渴用九味蘆薈丸爲主以四味肥兒丸爲佐痢症漸退却以四味肥兒丸爲主以五味異功散爲佐而痊後又不禁厚味作瀉飲冷仍服肥兒丸異功散而愈

一小兒侵晨泄瀉服消痢清熱之劑不應余謂脾腎虛用二神丸治之不信仍服前藥形體骨立復求治用四神六味二丸治之數愈倍藥數

日飲食漸減泄瀉仍作至十七歲舞姐瀉渴頓作用前藥治之無効乃用補中益氣湯八味丸而始應

一小兒因母怒氣停食患泄瀉服消導之劑更加吐乳先用養胃湯加炒黑黃連一錢炎柴莧二十分木香四分治其母子亦灌二十匙悉愈後母傷食患血痢腹痛其子亦然治以四君子加前二味母子俱服因感於人言但令母服子另服治痢之藥加作嘔不乳手足並冷余用五味異功散加木香炮薑漏蘆母子並服而愈

一小兒患瀉身熱作渴瀉下穢氣此爲內熱而瀉也用香連丸一服而愈後患瀉服黃連香薷飲益甚余用六君木香肉果而愈

一小兒患瀉作渴飲冷手足並熱睡不露睛此爲熱瀉用黃芩湯一劑而愈又用白术散二服而安

一小兒患瀉面赤飲冷小便赤色先用四苓散香連丸各一服而便利勢減又用異功散加木

香黃連各二分吳茱萸一分二服而瘥
一小兒瀉而腹痛按之不痛用異功散加升麻
而愈後復瀉服消乳丸益加腹痛余謂脾氣傷
也復用異功散加木香而痊
一小兒吐瀉腹痛睡而露睛小腹重墜手足並
冷先用六君升麻木香而悉愈後又傷食腹痛別服
功散加升麻木香而悉愈又用異
祛逐之劑虛症悉具余用理中九六君子湯而
痊愈但噫氣下氣口角流涎此脾胃虛寒也復
用理中六君子二湯而愈
黃芩湯治下痢頭痛胸滿口乾或寒熱脇痛不
嘔吐其脉浮大而弦
黃芩一兩 芍藥 甘草炒各一兩
五錢
右每服二十二錢薑水煎嘔加半夏一錢
玉露散治吐瀉黃色
寒水石 石膏各半兩 甘草一錢
右爲末每服半錢白滾湯調服
四味肥兒丸方見嘔吐

異功散方見內鈎
二神丸
四神丸二方見驚瀉
八味丸即六味丸加肉桂
五味方見腎藏
調中湯即理中湯
方見咳嗽
白朮散方見積痛
四苓散即五苓散去
桂方見五淋
四逆散方見積滯
胃苓湯方見吐瀉

養胃湯方見癉症
清胃散
四君子湯
六君子湯三方見內鈎
保和丸方見虛羸
香連丸方見諸痢

食瀉

東垣云傷食則惡食小兒食瀉者因飲食傷脾脾氣不能健運故乳食不化而出若嗳臭吞酸胃脘

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

脹滿腹痛按之益痛者雖作瀉而所停滯之物尚未消也用保和丸腹痛按之不痛者乳食已消也用異功散脾氣傷而未復不思飲食者用六君子湯所傷生冷之物及喜熱者並加木香乾薑乳食已消腹痛已止瀉尚未止者脾失清升之氣也用補中益氣湯餘有別症當參各門

治驗

一小兒泄瀉不食嘔腐酸氣用平胃散一服而瀉止又用五味異功散而飲食增後復吐瀉喘嗽手足指冷面色黃白余謂脾虛不能生肺也用六君升麻桔梗五味子而愈

一小兒傷食作瀉發熱服寒涼藥熱甚作嘔此胃經虛熱也先用四君升麻而嘔止又用白术散而安

一小兒乳哺失節泄瀉腹痛自用藥下之反加痰搐又服化痰止搐之藥而痰搐益甚睡而露睛手足微冷余以為脾胃已虛而重傷之也用異功散加木香釣藤鉤母子並服三日而痰搐

止五日而瀉痛除
一小兒傷食瀉青發搐余謂肝木勝脾也用六
君木香釣藤釣而愈後傷食腹痛別用消食丸
唇額頓黑瀉益甚此脾氣虧損寒水反來侮土
也用六君木香乾薑而痊
一小兒面色痿黃傷食作瀉面色頓白氣喘痰
湧余謂脾肺氣虛下陷法當升補彼不信別服
清氣化痰之藥虛症蜂起余先用補中益氣湯
一劑諸症頓退又用五味異功散而痊

一小兒泄瀉兩寸脈或短或伏用補中益氣治
之頓愈余見患前症不服此藥而危者多矣惜
哉
一小兒飲食後即瀉先用六君升麻神麴山查
而止又用五味異功散加升麻而痊後傷食吐
瀉腹痛用保和丸二服又用異功散調補脾氣
而安
一小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先
用五苓散加木香枳殼餘諸症漸退又用五味異

功散爲主佐以加減腎氣先又旬日一便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而愈

一小兒十二歲傷食作瀉服藿香正氣散加減數劑瀉止而腹脹手足並冷余謂當調補中氣不信後見睡而露睛唇白搐動乃用六君木香鉤藤鉤至四劑搐動頓止又一劑飲食加進以五味異功散加升麻柴胡兩劑瀉止平而愈

調中湯治傷乳食瀉後脾胃虛弱嘔吐瀉

人參　茯苓　白朮　木香　乾薑　甘草炙　丁香各等分　藿香　香附炒去毛　縮砂仁

右水煎食前服

香橘餅治傷冷積瀉

木香　青皮各一錢　陳皮一錢半　厚朴五分

神麴　麥芽炒各半兩

右爲末蜜丸爲餅每服一枚米飲調下

保安丸治傷食瀉

白殭蠶　青皮去穰　陳皮去白　三稜炮

蓬术炮　茸草炒各五錢　砂仁　香附各一兩

右爲末用麥芽米糊丸菉豆大每服二三十丸白湯下

四君子湯

六君子湯

異功散三方並見內鈎

白术散方見積痛

平胃散方見胃氣虛冷

白餅子方見發搐

消食丸方見嘔吐乳

補中益氣湯

保和丸加白术名保和湯二方見虛羸

胃苓散即五苓散平胃散合用薑棗煎服又名二胃苓湯

金匱加減腎氣丸方見腹脹

驚瀉

小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳剋於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之症也亦有因乳

母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及餐泄注當平肝補脾慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中州虧損之變症也凡見驚症即宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必不至瀉搐而自安矣今已見瀉吐驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

治驗

一小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服而愈

一小兒泄瀉驚搐其母面青脈弦先用小柴胡湯加木香漏蘆二劑次用四君木香鉤藤鉤山梔母子同服而愈

一小兒因其母被驚患瀉服藥傷胃反致吐乳余用五味異功散炒黑黃連木香治其母時灌于三二匙俱愈後母因驚怒停食下痢嘔吐腹

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

痛其子昏憒不食以六君子湯加車前子黃連木香母子俱服而安

一小兒久瀉青色腸鳴厥冷余曰此驚泄也脾土既虧則肝木來侮須温脾乎肝然後可愈彼以爲迂自用治驚等藥腹脹重墜小便不利四肢浮腫始信前言重復請治余先用五味異功散加升麻柴胡數劑諸症稍可又以補中益氣湯數劑飲食必加又因傷食夾驚吐瀉發搐復用異功散加柴胡鈎藤鈎四劑諸症稍退又傷風咳嗽腹脹作瀉或用發散解利之劑手足逆冷睡中發搐余謂此脾土虛而肺金受症重傷真氣故也用異功散加紫蘇一劑以散表邪次以補中益氣湯加茯苓半夏調補真氣而痊

一小兒因驚吐瀉腹脹先用六君木香柴胡治之稍可又以五味異功散而愈後因驚搐痰甚或用鎮驚化痰之藥倦怠不食而泄益甚先用異功散加木香鈎藤鈎四劑而愈

四神丸治脾虛胃弱大便不實飲食不思或泄瀉

腹痛

肉豆蔻二兩補骨脂四兩五味子二兩吳茱萸一兩
右爲細末用紅棗六十五枚生薑六兩用水二鍾煮乾取棗肉和丸如桐子大每服五六十丸白湯送下或化服

二神丸

補骨脂四兩肉荳蔻二兩生用
右爲末用紅棗四十九枚生薑四兩用水一鍾煮乾取棗肉和丸桐子大每服二十三十丸白湯送下或化服

朱君散治吐瀉後有此症并糞青色者宜服之即四君子湯加辰砂麝香燈心鉤藤鉤爲末每服一錢白湯調下方見內傷門

太乙丹常服安神鎮驚止夜啼

桔梗炒一兩　藿香葉　白蒺藜炒各半兩
白芷　川芎各二錢五分
右爲末蜜丸茯實大辰砂爲衣每服一丸薄荷湯磨下蕎青者棗湯下夜啼燈心鉤藤湯下加

白朮茯苓白芍藥陳皮炙甘草薑棗煎名異功散加半夏名六君子湯
補中益氣湯方見虛癆門
六君子湯
五味異功散二方並見痙症
小柴胡湯
至聖保命丹二方並見內鈎
八味丸即六味丸加五味肉桂方見腎臟

諸痢

錢仲陽云瀉痢黃赤黑皆熱也瀉痢青白米穀不化皆冷也東垣云白者濕熱瀉於氣分赤者濕熱傷於血分赤白相雜氣血俱傷也海藏用四君芍藥歸治虛弱之痢四君加乾薑治虛寒之痢愚嘗治手足指冷飲熱者爲虛寒用異功散送香連丸若兼體重肢痛濕熱傷脾也用升陽益胃湯小便不利陰陽不分也用五苓散若濕熱退而久痢不愈者脾氣下陷也用補中益氣湯倍加升麻柴胡瀉痢兼嘔或腹中作痛者脾胃虛寒也用異功散加炮薑木香或變

而爲瘧者肝尅脾也用六君升麻柴胡鉤藤鈎若積滯已去痢仍不止者脾氣虛也用四君子送下香連丸若因乳母膏粱厚味六淫七情致兒爲患者當各推其因仍兼治其母并參冷熱瀉及積滯腹痛等症覽之

治驗

一小兒下痢赤白裏急後重腹時痛用香連丸而痊後傷食復變痢欲嘔少食用五味異功散加木香二十分黃連二十分吳茱萸一十分數劑而愈

一小兒患痢口乾發熱用白术散煎與恣飲時以白术散送香連丸而安

一小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷此胃氣虛寒下陷也用補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡而愈

一小兒久痢作渴發熱飲湯用白术散爲主佐以人參一二兩炒黑爲丸時服數粒盡劑而痊

一小兒作瀉不乳服剋伐之劑變痢腹痛後重

余用補中益氣湯送香連丸又用香砂胃苓
六君子湯而愈

一小兒傷乳食不時嘔吐雜用消導之藥變痢
不止先用六君木香漸愈後用七味白朮散而
痊

一小兒傷乳食吐瀉變赤痢後重腹痛先用保和丸一服
連丸而愈又乳食過多腹痛先用保和丸一服
痛止又用五味異功散加木香二劑而愈

一小兒下痢腹痛陰冷小便短少用五味異功

散加肉豆蔻頓愈復作嘔吐噦酸或用巴豆之
藥遺瀉五次飲食頓減手足並冷余用五味異
功散加木香乾薑飲食少進倍用乾薑又四劑
手足温而痢亦痊

一小兒痢後腹脹作嘔大便不實小便不利諸
藥不應余先用五味異功散加木香肉果數服
一大便少調又數劑諸症少愈用八味丸補命門
之火腹脹漸消用金匱加減腎氣丸諸症頓退
又用四君升麻柴胡而全安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一小兒患痢喘嗽不已此肺氣虛也用六君子加木香爲末每服錢許以人參陳米薑湯調服即瞧乳食少進又二十服而喘嗽頻安乃用四君子湯而痊

石蓮散治小兒噤口痢嘔逆不食

蓮肉

右爲末每服一錢米飲調下

胃風湯治風冷客於腸胃乳食不化泄瀉腸鳴腹滿而痛或下如豆汁或瘀血日夜無度

白芍藥　白朮

當歸　川芎

右爲末每服一錢入粟米水煎空心熱服

香連丸

黃連十兩用吳茱萸五兩水拌濕入磁器頓飯湯中半日炒焦黑

木香二兩

右爲末丸如赤豆大每服二十三十九白湯下

地榆飲治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

地榆三分　甘草
右水煎服
黃連解毒湯治時疾二十日汗已解若煩悶乾嘔口
燥呻吟發熱不臥
黃連炒三錢　黃柏炒半兩　梔子炒四枚　黃芩炒二錢
右每服二錢水煎未效再服亦治熱痢
湯氏異功散止渴消暑生津
澤瀉　豬苓去皮二錢　陳皮半　白朮
茯苓　人參各五錢　甘草五分　赤芍藥炒枳殼各二分

右爲末蜜丸灰實大每服一丸燈心竹葉湯化下
升陽益胃湯
人參　黃芪二錢　半夏　白芍藥　羌活各五錢　防風
獨活　陳皮　茯苓　柴胡　澤瀉各三分　白朮　黃連炒各一錢
右水二鍾薑三片棗二枚煎四分食遠服
五苓散方見五淋

愚按前症若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺虛而不能生水也宜用補中益氣湯加門冬五味虛火上炎而小便赤少者此肺氣受傷不能生水也用六味料加門冬五味不可與以小便不利而用滲泄之劑也

四君子湯

六君子湯

五味異功散三方並見內鈎

補中益氣湯

保和丸二方見虛羸

香砂勻胃膏方見熟生

白术散方見積痞

八味丸方見腎臟

金匱加減腎氣丸方見腹脹

瘧

經曰夏傷於暑秋必痎瘧其症先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

如破渴欲飲冷益邪氣并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱陰陽上下交爭虛實更作故寒熱間發也有一日一發二十日一發三十日一發有間二日連二日發有日與夜各發有上半日發下半日發及發於夜者有有汗有無汗此其畧也以詳言之當分六經五臟及痰食勞暑鬼癘之不同邪中三陰之各異如足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇燔燔嗌燥煩

反寒多不甚熱肝癉者令人色蒼蒼然太息其狀若死者脾癉者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出腎癉者令人洒淅然腰脊痛宛轉大便難月胸胸然手足寒胃癉者令人在病先善饑而不能食食而支滿腹大此五臟癉也痰癉者胸脇先有停痰因而成癉令人心下脹滿氣逆煩嘔是也食癉者是飲食傷脾其人噫氣吞酸胸脇不和是也勞癉者久而不癒表裏俱虛客邪未散眞氣不復故疾雖閒遇勞即發是也暑癉者其人面垢口渴

雖熱已退亦常有汗是也鬼癉者進退無時是也癉癉者感山嵐瘴氣其狀寒熱休作有時是也作於子午卯酉日爲少陰癉作於辰戌丑未日爲太陰癉此所謂三陰各異也久而不愈名曰痎癉痎癉老癉也老癉不愈結癖於兩脇之間名曰癉母此先失於解散或復外感風寒內傷飲食故纏綿不已也治法風暑之邪從外而入宜解散之解表後即宜扶持胃氣故丹溪曰無汗要有汗要無汗固正

氣爲主蠚發之瘧宜解表久發之瘧宜補脾寒瘧宜温温瘧宜和癉瘧宜清挾痰則行痰兼食則消食勞瘧宜安安暑瘧宜解鬼瘧宜祛癘瘧宜散此亦其畧也更以詳言之則熱多寒少者小柴胡湯寒多熱少者清脾飲子無汗者桂枝麻黄各半湯有汗者柴胡桂枝湯渴而小便不利者五苓散熱多汗出腹滿便閉者大柴胡湯痰瘧者二陳湯加柴胡黄芩甚者加枳實食瘧者先用大安丸次用異功散勞瘧痰瘧並用補中益氣湯暑瘧者十味香

薷飲鬼瘧者鬼哭散瘧癘瘧者四獸飲瘧母者鼈甲飲凡脾胃虚而患瘧者不拘有汗無汗三陰六經悉以六君子湯爲主熟多加柴胡山梔寒多加乾薑肉桂有汗加黄耆浮麥無汗加蒼术葛根元氣下陷及肝木乘脾並加升麻柴胡爲善若用青皮草果常山等藥以爲攻截良法正氣益虚邪氣益勞熱者有矣若乳母七情深是多延綿不止而爲六欲飲食不調或寒熱似瘧肝火熾盛致兒爲患者又當治其乳母斯無誤矣

治驗

一小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後患瘧日晡而作余以爲元氣下陷欲治以補中益氣湯不信泛行清熱消導前症益甚食少作瀉余朝用前湯夕用異功散加當歸月餘而愈

一小兒每午前先寒後熱久不愈用六君子加炮薑九次實大每服一九旬餘而愈

一小兒患瘧兼便血盜汗年餘矣審乳母素有鬱怒寒熱便血朝用加味歸脾湯夕用加味逍遙散兒以異功散加酒炒芍藥爲末每服二三分米飲下月餘母子並痊

一小兒瘧發熱服消導之劑腹脹作嘔四肢浮腫先用五味異功散加木香諸症頓退飲食頓進後因飲食過多作瀉用補中益氣湯加木香又用五味異功散而痊

一小兒瘧後腹脹咳嗽倦怠屬脾肺氣虛用補中益氣湯治之夏尋愈後傷食發熱如瘧服寒涼之劑更加便血用四君升麻柴胡便血頓

止又用補中益氣湯而愈

一小兒瘧將愈飲食過多腹脹發熱小便不通用消積丸保和丸異功散尋愈後飲食不節寒熱吐瀉用異功散柴胡升麻愈

一小兒瘧後少思飲食便血發熱腹脹屬脾虛不能統血先用異功散加升麻柴胡而血止又補中益氣湯飲食頓進仍用異功散而痊

一小兒瘧後腹脹用五味異功散四味肥兒丸而漸愈用補中益氣湯而愈後傷食腹脹大便不實小便不利用五味異功散金匱加減腎氣丸而愈

一小兒愈後便瀉用補中益氣湯加山梔而小便通因勞發熱不食小便不利用補中益氣五味異功散加升麻柴胡而痊後每勞心寒熱如瘧用補中益氣湯飲食失節如瘧用五味異功散隨愈

一小兒十四歲瘧後肚腹膨脹小便不利屬脾腎虛寒朝用補中益氣湯夕用金匱加減腎氣

丸而痊畢（）姻後朝寒暮熱肌體消瘦服（）滋陰之劑更（）痰甚（）發熱腹（）中作（）脹小（）便不（）利（）余朝（）用（）補中益氣湯夕（）用（）金匱加減腎氣丸而愈

一小兒癆疾將（）愈（）飲食過多腹脹發熱大（）便不（）通（）用（）消積丸保和丸異功散調理脾胃而愈後飲食不節寒熱吐瀉先用（）胃苓散吐瀉止又用（）異功散柴胡升麻寒熱愈（）

一小兒十五歲癆後發熱吐痰余謂脾氣所（）變不信（）反服（）黃柏知母之類諸症悉（）具謂（）余曰胃

火盛而滋（）水其症益（）甚何也余曰症在（）脾陰土（）喜（）溫和而惡（）寒濕前（）所（）用藥悉屬（）沉陰復傷（）其生氣故（）病愈甚也先用（）六君柴胡升麻木香四劑諸症頓（）愈乃佐（）以（）異功散加（）柴胡升麻元氣漸（）克又朝（）用（）補中益氣湯夕（）用（）異功散而愈畢（）姻後發熱如（）癆用（）補中益氣湯寒熱益甚（）手足並（）冷（）另（）用（）清熱等藥大（）便去（）則小（）便牽痛（）小便去（）則大便先出余謂此陰精已（）耗而復傷耳乃腎氣虛寒之危症也用（）大劑補中益氣湯八味

地黃九喜其遠幃幙而生
柴胡桂枝湯治瘧身熱多汗
柴胡八錢　黃芩三錢　半夏二錢半藥
甘草　桂枝各三錢
右每服二十二錢薑棗水煎服
鬼哭散治瘧久不止
常山　大腹皮
甘草炙各六錢　白茯苓　鼈甲醋炙
右入桃柳枝各七寸水煎服

清脾飲子治瘅瘧脈弦數但熱不寒或熱多寒少
膈滿不食口苦舌乾煩渴小便黃赤大腸不利
青皮炒　厚朴薑製　白朮　草果
柴胡　茯苓　半夏泡七次　黃芩
甘草炙各等分
右每服一十二錢薑水煎服
四獸飲治陰陽相勝結聚涎飲爲瘧兼治瘅瘧神效
半夏　茯苓　人參　白朮
草果　橘紅各等分　甘草減半

右用烏梅薑棗濕紙裹煨香熟焙乾入藥每服二錢水煎服

驚甲飲子治瘧久不愈脇下痞滿形容羸瘦腹中結塊時發寒熱名曰瘧母

驚甲醋炙　白朮　白芍藥　川芎　茸草　黃耆　人參養胃湯治外感風寒肉傷生冷寒熱如瘧或嘔逆惡心寒瘧加桂枝

人參　厚朴　蒼木　半夏泡　藿香　草菓仁　茯苓各五錢　茸草炙　橘紅一錢半

右每服二十錢薑七片烏梅一箇水煎熱服桂枝麻黃各半湯治發熱自汗或無汗

桂枝　白芍藥　麻黃各一錢　生薑　茸草炙　杏仁十箇泡去皮尖

右水一鍾大棗二枚煎四分食遠服

五苓散方見五淋

小柴胡湯

大柴胡湯 二方見痙症
二陳湯 方見寒吐
大安丸 即保和丸加白朮
補中益氣湯 方見虛亂
十味香薷飲 方見嘔吐乳
六君子湯
加味歸脾湯
加味逍遙散
異功散 四方見內鈎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



脫肛

古吳薛　鎧編集
男薛　已治驗
後學宋　璞校閱

夫肺與大腸相爲表裏肛者大腸之鬼門是也巢氏云實熱則大便秘結虛寒則肛門脫出此多因吐瀉脾氣虛肺無所養故大腸之氣虛脫而下陷也用補中益氣或四君子爲主若脫出緋赤或作

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

痛者血虛而有熱也用補中益氣湯佐以四物牡丹皮微者或作痛者氣虛而有熱也佐以四君牡丹皮大九手足指熱者屬胃氣熱手足指寒者屬胃氣寒

治驗

一小兒痢後脫肛飲食少思面色青黃余謂脾土虧損肝木所勝也不信另服消導劑滯之劑腹痛膨脹倦怠作嘔余曰脾氣虛甚矣又不信恪服前藥腹益脹重墜四肢浮腫復請治之仍欲耑滯余曰腹脹重墜脾氣下陷也先用五味異功散加木香四劑更手足冷又加乾薑四劑而腹脹諸症漸愈後因飲食過多作瀉脫肛用補中益氣湯加木香及五味異功散而愈

一小兒脫肛半載侵晨便泄兩目白多用升補脾氣之劑不應余曰腎開竅於二陰此屬腎虛也用四神地黃二十九及補中益氣湯月餘而愈

一小兒痢久脫肛目睛多白面色漸黃余用補中益氣湯六味地黃丸調補脾腎而痊

一小兒小便先頻數澁滯次下痢脫肛久而不愈余以爲亶示父腎虛用六味地黃丸兼愈後患泄瀉咳嗽聲瘖亦用前丸而瘥

一小兒脫肛用寒涼之藥肢體倦怠飲食少思肛門重墜此脾氣虛而中氣下陷也用補中益氣湯加酒炒芍藥白朮茯苓而瘥

一小兒肛門腫痛出血水年餘未愈忽吐血便血皆成紫塊此腸胃積熱用聖濟犀角地黃湯頓止更用金銀花甘草爲末白湯調服半錢而

瘥

一小兒脫肛雜用除濕祛風收澁等藥面黃體倦少食便血余欲升補脾氣以攝其血反服四物槐花之類而血益甚更加作嘔余先用四君木香治之形氣漸克便血頓止又用補中益氣湯更以蔴麻仁塗頂心而愈

一小兒因咳嗽服化痰等藥或作或徹服蔍痰丸更吐瀉手足指冷眉目發搐肛門脫而不赤余朝用補中益氣湯夕用六君子湯治之諸症

漸愈但脫肛未入恪服補中益氣湯而愈

一小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯送香連丸而愈後傷食作瀉肛復脫不入仍用前湯更以蓮蘇仁研塗頂門而愈

薤腸散治小兒久痢腸頭脫出

訶子炮　赤石脂　龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上綿帛揉入四神丸方見驚瀉

地黃丸方見腎臟

補中益氣湯方見虛癆

聖濟犀角地黃湯方見便血尿血卽濟生犀角地黃湯

四君子湯方見內鈎

龍膽瀉肝湯方見痘氣

肛門作痒

小兒肛痒或嗜茸肥大腸濕熱壅滯或濕毒生蟲而蝕肛門若因濕熱壅滯用四味肥兒丸大便秘結者用清涼飲蟲食肛門先用化蟲丸後用四味肥兒丸外以雄黃散納肛內若因病不食蟲無所

養而食臟食肛者其齒齦無色舌上盡白四肢倦怠其上唇內有瘡唾血如粟心內懊憹此蟲在上食臟若下唇內有瘡此蟲在下蝕肛門若蝕肛透內者不治諸蟲惟上半月頭向上可用藥追之後頭向下令患者聞喜食香味蟲頭即向上矣後用藥追之

治驗

一小兒嗜膏粱甘味患疥瘡余謂當禁其厚味急用滿胃之藥以治其積熱不從乃用數藥以治其外更肛門作痒發熱瘡益甚肌體骨立飲食少思遂用九味蘆薈丸五味異功散加柴胡升麻尋愈

一小兒肛門作痒耳前後結小核如貫珠隱於肌肉之間小便不調面色青此稟母之肝火為患用九味蘆薈丸為主佐以五味異功散加山梔柴胡又以加味逍遙散加漏蘆與母服之而愈

一小兒十二歲肛門作痒或脫出或大便血遍

身生瘡發熱作渴腹大青筋用大蘆薈丸五味異功散其瘡漸愈佐以補中益氣湯熱渴漸止肛門悉愈又用異功散爲主佐以補中益氣湯加吳茱萸所製黃連治之而血愈

一小兒十五歲兩目白翳遍身似疥非疥肛門作痒晡熱口渴形體骨立余以爲肝痨之症也用六味地黃丸而痊後陰莖作痒小便澄白服蟠葱散肛門腫痛服大黃等藥肛門脫出作痒不可忍雜用降火之藥不應下唇內生小白瘡余以爲蟲蝕肛門用九味蘆薈丸而愈

一小兒肛門作痒懊以爲痔服槐角丸等藥肢體消瘦鼻下濕爛下唇內生瘡此蟲食下部也先用化蟲丸二十服乃用五味異功散四劑却用大蕪荑湯四味肥兒丸而痊

一小兒七歲飲食過多即作瀉面色青黃服峻利劑余謂當節飲食健脾胃爲善不信後牙齦赤爛肛門作痒服清熱之劑腹痛膨脹復請欲用前劑余曰此元氣虧損虛火上炎也仍不

信後腮間黑腐余曰此脾氣大虛肉死而不知痛也明矣後雖信余已不救矣若初用五味異功散健脾胃爲主佐以大蘆薈丸四味肥兒丸清脾濕熱豈有不治之理哉後之患者審之

一小兒肛門連陰囊痒出水滴淋屬肝經濕熱也用龍澹瀉肝湯九味蘆薈丸治之並愈

一小兒嗜甘肥肛門作痒發熱作渴雜用清熱之藥腹脹少食鼻下生瘡余謂脾胃濕熱生蟲也不信後下唇內生瘡先用四味肥兒丸諸症漸愈又用大蕪荑湯治之而痊

便血尿血

經云肺朝百脉之氣肝統諸經之血又云氣主呴之血主濡之蓋榮血爲水穀之精氣灌溉五臟六腑四肢百骸若脾胃有傷榮衛虛弱行失常道故上爲衄血吐血下爲尿血便血矣若外感風邪則血鮮爲腸風內傷則血濁爲臟毒又熱入大腸則

大便下血熱入小腸則小便出血然小兒多因胎中受熱或乳母六淫七情厚味積熱或兒自食甘肥積熱或六淫外侵而成若因母食厚味者加味清胃散怒動肝火者加味小柴胡湯憂思鬱怒者加味歸脾湯禀父腎燥者六味地黃丸兒有積熱小便出血者實熱用清心蓮子飲虛熱用六味地黃丸大便出血者犀角地黃湯風邪外侵者倉廩散病後元氣下陷者補中益氣湯糞前見血者四君加黃連製吳茱萸糞後見血者四君加吳茱萸

黃連若嬰兒以治母為主餘當臨症制宜

治驗

一小兒七歲食菱芡過多腹脹發熱大便不通小便下血先用消積丸大便即通小便血止又用保和丸及異功散而愈

一小兒因乳母飲酒小便出血用八正散去大黃加乾葛山梔漏蘆母子服之並愈

一小兒小便見血或咳血衄血此脾肺虛熱食後用聖濟犀角地黃湯食前用六味地黃丸頓

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

愈後因食厚味復作用加味清胃散及六味丸而愈

一小兒稟父氣不足不時便血用六味地黃丸補中益氣湯而愈後因母飲酒炙煿復致前患母服加味清胃散子服地黃丸而愈

一小兒便血兩足發熱齒齦潰臭朝用六味地黃丸夕用異功散加蕪荑月餘漸愈乃佐以補中益氣湯而愈

一小兒稟父腎虛便血作渴足熱形瘦用六味

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丸尋愈後出痘第四日兩足發熱作渴飲冷以前丸料煎與恣飲三劑後足涼渴止其痘安然而靨

一小兒便血面青脇痛小便頻數此肝木侮脾土而不能統攝也用異功散加柴胡炒黑龍膽草二劑肝症頓退仍用異功散而血止

一小兒便血發熱作渴飲冷用黃連解毒湯一劑熟服諸症頓愈後因飲食過傷下血甚多發熱倦怠飲食少思先用補中益氣湯元氣復而

飲食增又用四君加升麻而愈

一小兒便血作渴少食先用七味白术散渴止食進又用補中益氣湯而瘥後食生冷腹脹便秘用保和丸二十便下血或時發搐此脾氣傷而肝火動也用異功散加釣藤鉤柴胡而搐止又加升麻木香而血止

一小兒食生冷果品腹脹作痛發熱作渴大便不利小便尿血用柴苓散加黃連二劑大便通而尿血愈

一小兒尿血兩足發熱用六味地黃丸而愈後患痢久不愈復尿血作渴飲冷以前丸料煎服兼用補中益氣湯而愈

一小兒尿血面青脇痛小便頻數用五味異功散加柴胡炒黑龍膽草次用地黃丸而愈

一小兒久患便血屬脾胃虛熱也諸藥不應用人參二兩炒黑黃連吳茱萸各半兩爲末米糊作丸先佐以補中益氣湯頓瘥

一小兒便血面黃腹脹用四味肥兒丸及補中

益氣湯加吳茱萸製黃連木香蕪荑三十餘劑而愈至夏間患血痢發熱脯熟手足浮腫仍用前藥而痊

一小兒八歲腹脹膞凸大便下血如痢小便色赤似血面目皆黃兩腮色赤此食積所傷而肝侮之也益脾病則肺虛不能生腎故有是症當先消導積滯遂用越鞠丸加三稜蓬朮薑湯下四服二便通利又用大安丸二服下血亦止後復傷食發熱腹脹小便下血服保和丸四服而

愈

一小兒年十二歲因勞發熱尿血小便不利先用清心蓮子飲二劑後用補中益氣湯加山梔而痊

一小兒便血服寒藥過多腹脹小便不利其血益甚余朝用補中益氣湯夕用金匱加減腎氣丸而痊

耳露飲治小兒胃中客熱齒齦潰爛時出膿血及目赤腫痛口瘡喉腫或身面皆黃大便不調小

便黃澁

熟地黃　枳殼炒　茵陳　麥門冬去心焙

甘草炙　枇杷葉　石斛　黃芩炒

生地黃　天門冬去心炒　各等分

右爲末每服二錢水煎服

聚金丸治大便下血發熱煩躁腹中熱痛作渴妄言舌澁目昏其脉弦數

黃連一兩水浸晒乾一兩炒　防風各一兩

右爲末每服二錢水煎服

愚按前方若肝脾積熱吐血衄血便血發熱作渴大便秘小便赤者宜用之若熱既退而作渴下血未止或日晡益甚者陰血虛也用四物參朮主之若熱既退飲食少思肢體倦怠脾氣虛也用四君當歸主之若緊用前方則誤多矣

濟生犀角地黃湯治傷寒溫病失於表汗致內有瘀血吐血面色黃大便黑及瘡疽出多以此解之

牡丹皮　犀角各一兩　生地黃八錢　赤芍藥七錢

右每服二錢水煎服

千金地黃丸治小腸積熱臟毒去血

黃連四兩　生地黃半斤搗取汁連

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十丸食後麥門冬湯下量兒加減

製黃連吳茱萸法

右以黃連吳茱萸各等分熟水拌濕入磁器內頓湯中良久候氣味相和取出晒乾炒黃各揀出聽用

清心蓮子飲方見白濁

小柴胡湯方見痙症

加味歸脾湯

越鞠丸

四君子湯

清胃散

異功散五方見內劒

補中益氣湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

保和丸

大安丸三方見虛羸即保和丸加白术

加減腎氣丸方見腹脹

八正散方見小便不通

六味丸方見腎臟

茯苓散方見尿白

下積丸

白术散二方見積痛

四味肥兒丸方見寒吐

大便不通

嬰童百問云小兒大便不通乃肺與大腸有熱以致秘結不通用清涼飲之類若飲食夾驚及積滯而不通者用大連翹飲之類驚風積熱而不通者用掩臍法此皆治實熱之例也余嘗治之因乳母或兒膏粱積熱及六淫七情鬱火傳兒爲患者用清邪解鬱之劑稟賦怯弱早近色慾大便難而小便牽痛者用滋補肺腎之劑豬氏遺書云男子精未滿而御女以通其精則四體有不滿之處異白

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗精已耗而復竭之則大小便牽痛如淋今童子即有此患益見今人所稟與古人大徑庭矣人之氣血厚薄既殊而醫之用藥療法又豈可泥執古方而無加減之變乎

治驗

一小兒食膏粱之味大便不通飲冷發熱用清涼飲加大黃而通後飲食停滯腹痛大便不通用保和丸而痛止再煎柴梹湯送保和丸一服而便通

一小兒食糉停滯大便不通痛不可忍手足發搐用大柴胡湯調酒麴末一錢下滯穢甚多作嘔不食用五味異功散加升麻柴胡而愈

一小兒大便不通審乳母飲食厚味所致用清胃散以治母熱兒間飲以二十匙而愈後乳母感寒腹痛食薑酒之物兒大便秘結兼便血仍用清胃散每日數匙而愈

一小兒因乳母暴怒大便不通兒亦患之兼用

加味小柴胡湯見先用祝和丸一服後用五味異功散加升麻柴胡見虛症

大柴胡湯方見痙症

神芎丸方見驚風

六味丸方見腎臟

清胃散方見內鈎

小便不通

東垣云小便不利有在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱之所主長生於申申者金也金能生水

肺中伏熱水不能生是絕其化源也治法用清燥金之正化氣薄之藥伏苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前瞿麥萹蓄之類皆爲淡滲能泄肺中之熱而滋水之化源也若不渴熱在下焦是熱滯其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之症一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳竊謂前症若津液偏滲於腸胃大便瀉利而小便澁少者宜分利若熱蘊於下焦津液燥而

小便不行者宜滲泄若脾胃氣滯不能通調水道者宜順氣若乳母肝心二經有熱者用梔子清肝散肝經怒火者用柴胡梔子散若因父母曾服燥劑而致者用四物麥門冬草數而黃者用四物加山藥黃芩黃柏知母五味麥門肺虛而短少者用補中益氣加山藥麥門陰挺瘡瘍而頻數者用地黃丸熟結膀胱而不利者用五淋散脾肺燥不能化生者用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無以生而淋瀝者用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝者用六味丸若因乳母厚味酒麵積熱者用清胃散五淋散仍參諸淋覽之

治驗

一小兒十四歲肢體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝或面目赤色身不欲衣此稟賦腎虛陰燥也用補中益氣湯加減八味丸而愈

一小兒五歲小便不利用五苓散分利澹泄之藥益加不通小便陰囊漸腫先兄謂前藥復損

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

真陰也用六味丸料加牛膝肉桂車前子佐以補中益氣湯而痊

一小兒八歲先小便澁滯服五苓散益甚加木通車前之類腹脹吐痰加枳殼海金砂而胸滿陰腫遍身發浮余用六味丸煎送滋腎丸而痊此皆稟父氣所致其作濕熱痰氣治之而發者多矣

一小兒八歲先因小便黃赤服五苓導赤等散後患便血余以爲稟賦虛熱也用六味丸及補中益氣湯而痊

一小兒小便不通少腹作痛木通散治小便不通散

木通　滑石各兩　牽牛半兩炒　木通

右爲末燈心葱白水煎空心服

八正散治膿熱咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼或咽舌生瘡小便赤閉及熱淋血淋

車前子　瞿麥炒　大黃麵裹煨　山梔

滑石　木通　甘草炙各一兩

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右爲末每服一二錢入燈心水煎食前服

梔子仁散治小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁五枚　茸草炙二錢　茅根　冬葵子各半兩

右爲末每服一錢水煎空心服

梔子清肝散

柴胡梔子散二方見發熱即柴胡清肝散

補中益氣湯方見虛羸

黃芩清脾飲方見百證內嗽

加減滋腎丸方見腹脹

清胃散方見內鈎

四物湯方見急驚

五苓散方見五淋

六味地黃丸方見腎臟

諸淋

夫小兒諸淋者腎與膀胱熱也一經相爲表裏俱主水道水入小腸下行於胞則爲溺若膀胱熱則津液內涸水道不通腎氣熱則小便淋瀝或少腹引臍而痛夫淋有五石淋者腎熱化石內塞水道

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

痛引膀胱氣淋者肺氣壅塞小腹脹滿小便澁滯熱淋者三焦有熱傳入腎膀胱流入于胞小便赤澁血淋者心熱血散失其常經溢滲入胞寒淋者膀胱氣冷與正氣交爭寒戰氣解是也亦有因母肝熱及乳母憲怒者當分五臟蓄熱治之若心臟有熱者導赤散加黃連肝臟有熱者柴胡梔子散大便不通瀉青丸脾臟有熱者瀉黃散脾氣不足異功散脾氣下陷補中益氣湯肺臟有熱者瀉白散肺氣虛熱異功散加炒黑山梔腎臟有熱者

地黃丸或因乳母肝經熱者用梔子清肝散憲怒者用柴胡清肝散乳母厚味者用加味清胃散心小腸熱者用清心蓮子飲或兒早近色慾小便澁滯或作痛及更衣後大小便牽痛者皆屬肝腎不足也用六味地黃丸補中益氣湯加牛膝車前肉桂未應當參五臟所勝不可輕用滲泄寒涼之藥大損胃氣仍參前小便不通症覽之

治驗

一小兒小便不通服五苓之類不應頃間及左

腮色赤乃肝腎虛熱也用四物山梔及地黃丸而愈後因感冒誤汗小便仍不利余用補中益氣湯加麥門五味而安

一小兒小便不利莖中澁痛或尿血此熏艾腎熱爲患也先用五淋散以疎導又用滋腎丸地黃丸補肝腎漸愈後出痘色紫小便短赤頗閒右腮或赤或白用補中益氣湯六味地黃丸前症並愈

一小兒小便不利鮮血鼻色赤屬脾肺有熱也用濟生犀角地黃湯而愈後頗閒常赤作渴有痰此稟賦腎氣不足用地黃丸而諸症瘥

一小兒十五歲所賦虛怯且近女色小便滴瀝誤服五苓散之類大小便牽痛幾至不起用六味丸而愈

金砂散治小便淋瀝不通

鬱金　海金砂　滑石　甘草各等分

右爲末每服一錢煎地膚子湯調下燈心木通亦可

又方冬瓜最治實熱小便不通內熱口渴立効散治小兒諸淋不通莖中作痛

木通　甘草
滑石　梹榔

右每服一錢水煎

五淋散治膀胱有熱水道不通或小腹腫脹

山梔炒　當歸各二分
赤芍藥各五分
甘草三分　赤茯苓

右用燈心十根水煎

木通散方見小便不通

導赤散方見心臟

瀉青丸方見肝臟

瀉黃散方見脾臟

四物湯方見急驚

清胃散

異功散二方見內鉤

補中益氣湯方見虛羸

瀉白散方見肺臟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

地黃丸方見腎臟
柴胡清肝散
梔子清肝散二方見發熱即柴胡梔子散
滋腎丸方見腹脹
清心蓮子飲
茯苓散二方見白濁
五苓散方見五淋
聖濟犀角地黃湯方見尿血便血
遺尿

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

巢氏云腎主水與足太陽相爲表裏經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣蓋膀胱不約氣虛寒不能約制故睡中遺出內經謂膀胱不約爲遺是也用破故紙散益智散鷄腸散之類主之亦有熟寐於腎干於足厥陰之經挾孔竅結而氣血不能宣通則痿痺而無所用故液滲入膀胱而漩溜遺失者用六味地黃丸虛熱亦用前丸脾肺氣虛者用補中益氣湯加補骨脂山茱萸

治驗

一小兒脬微脹欬嗽惡心小便淋白余謂脾疳食積也用五味異功散佐以四味肥兒丸而愈後不節飲食視物不明余曰目爲五臟之精脾胃復傷須補養爲主不信乃服峻厲之劑後變慢脾風竟爲不起

一小兒三歲素遺尿余視其兩頰微赤此稟父腎與膀胱二經陰虛也與六味丸服之赤色漸退而遺尿亦愈

一小兒四歲飲食少思便泄腹痛素遺尿兩頰青黑雖盛暑而惡風寒余謂經云熱之不無火也用八味丸治之諸症悉愈

破故紙散治膀胱虛冷夜間遺尿或小便不禁

破故紙

右爲末每服一錢熱湯調下

湯氏雞腸散治小便不禁臞中遺出

雞腸草二兩　牡蠣粉三錢　龍骨煅　麥門冬去心

白茯苓　桑螵蛸各半兩炙

右爲散每服一錢棗水煎

又方五倍子炒焦爲末每服半錢白湯調下或糊丸米湯送下

益智散方見潮熱即益智九

補中益氣湯方見虛羸

異功散方見內鈎

四味肥兒丸方見寒熱

六味地黃丸

加減八味丸二方見腎臟即六味丸加五味子肉桂

白濁

仁齋曰小兒尿白久則成痢此因心腹伏熱或乳哺失節傷脾使清濁不分故也全嬰方云小便初溺微赤良久白濁者乃熱痢之症也初溺黃白良久白濁者冷痢之症也冷熱相兼者蘆薈丸純下白濁者君朮丸諸失津液欲成痢而小便白者茯苓散小便如泔或良久變白亦有脾虛食積濕熱下注者先用茯苓散五七服次用四味肥兒丸若乳食少思或腹脹大小便頻數此脾虛元氣下陷也朝用五味異功散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

夕用四味肥兒丸若肥體色黃小便不調髮黃脫落鼻下瘡潰嗜土少食大便青褐者用梔子茯苓湯仍審其乳母飲食七情治之

治驗

一小兒發熱懶食小便良久變白余用四味肥兒丸即愈或誤以爲積熱用清凉祛逐之劑形體頓弱虛症悉至小便如泔用補中益氣湯及四味肥兒丸而愈

一小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思小便澄白大便不實此脾疳之症也用四君子加山梔蕪荑兼用四味肥兒丸而愈

一女子小便或黃或白後前陰疼出水此肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯一劑又以加味逍遙散加龍膽草而愈

一小兒兩耳後腦下各結一核小便白濁面色痿黃體倦口乾大便不調用蘆薈丸而愈後鼻外生瘡作痒小便仍白視物不明用四味肥兒丸而愈

一小兒白濁兩耳內耳外生瘡膿水淋漓用大蘆薈丸而愈後遍身如疥肌體消瘦發熱作渴大便酸臭小便白濁用九味蘆薈丸五味異功散而愈

一小兒白濁形氣甚虛發熱作渴余謂肝腎虛羸也用大蘆薈丸地黃丸而愈畢姻後小便仍白嗽痰發熱形氣益虛用大劑益氣湯六味丸各五十餘劑而愈

一小兒白濁發熱口乾體瘦骨立余謂腎經虛羸朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸而愈後兩目或生白翳面黃浮腫小便仍白此變肝脾疳症用四味肥兒丸月餘漸瘥

君朴丸治小兒小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子 煨 厚朴 製 黃連 各一兩 木香三錢

右爲末蒸餅糊丸梧子大每服二十丸米湯下

茯苓散治乳食傷脾或心經伏熱小便白濁

三稜 煨 蓬朮 煨 赤茯苓 各半兩 砂仁

青皮　陳皮　滑石　甘草各一錢五分

右爲末每服一錢燈心湯調下

三稜散治小兒尿白久則成痃宜補脾消食化積

三稜　蓬朮各一兩炒　益智仁　甘草

神麯炒　麥芽

右爲末每服一錢白湯點下

分清飲治小便餘瀝并赤白濁

益智仁　川萆薢　石菖蒲鹽炒　烏藥

茯苓　白芍藥各三分

右入燈心水煎

清心蓮子飲治發熱口乾小便白濁夜則安睡晝

則發熱多

黃芩　麥門冬　地骨皮　車前子

甘草各三錢半　石蓮肉　狀苓　黃芪

柴胡　人參各二錢五分

右每服一錢水煎服

茯苓茯苓湯　即大蕪荑湯方　見諸痃症

大安丸　即保和丸加白朮

補中益氣湯二方並見虛羸
龍膽瀉肝湯方見痲氣
加味逍遙散
異功散
四君子湯三方並見脾臟
益黃散方見脾臟
牛黃丸方見驚癎
蘆薈丸方見疳症

疳症

錢仲陽云小兒諸疳皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食內丛津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒爲患五臟之疳不同當各分辨肝疳者一名風疳其症白膜遮睛或瀉血羸瘦心疳者其症面黃頰赤身體壯熱脾疳者一名肥疳其症肢體黃瘦皮膚乾澁多生蟲蚘腹大食土肺疳者一名氣疳其症喘嗽不已口鼻生瘡腎疳者一名骨疳其症肢體削瘦遍身瘡疥喜臥濕地楊氏云又有疳傷者五臟蟲疳也其名

甚冬姑舉其要蟲疳者其蟲如絲出於頭項腹背之間黃白赤者可治青黑者難療蜘疳者皺眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚脹青筋唇白紫黑頭髮齒疼春疳者身熱羸黃煩渴下利背有聲春宵

如鋸齒二十指皆痛頻齧爪甲腦疳頭皮光急滿頭併痛腦熱如灰髮結如穗溫身多汗顋腫顱高疳渴者日則煩渴飲水不食夜則渴止疳瀉者毛焦屑白額上青紋肚脹腸鳴瀉下糟粕疳病者停積宿滯水穀不聚瀉下惡物疳腫者虛中有積肚腹緊脹脾復受濕則頭面手足虛浮疳勞者潮熱往來五心煩熱盜汗骨蒸嗽喘枯悴渴瀉飲水肚硬如石面色如銀無華疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼其內有蟲不速針出則內食臟腑肢體癯瘡疳便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高相傳兒衣夜露爲鴟鳥羽所污亦致此症若手足極細項小骨高尻削體瘦腹大膚突號哭胸陷名丁奚若虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴喔噦名曰浦露若牙齒蝕爛名走馬疳蛊齒屬腎腎虛受熱

痺火上炎致口臭齒黑盛則齦爛牙宣大抵其症雖多要不出於五臟治法肝痺用地黃丸以生腎心痺用安神丸以治心異功散以補脾脾痺用四味肥兒丸以治脾五味異功散以生土肺痺用清肺飲以治肺益氣湯以生金腎痺亦用地黃丸無辜痺用大蕪荑湯蟾蜍丸下癸嘯露用肥兒丸大蘆薈丸走馬痺敷雄黃散服蟾蜍丸皆作涓瀉痢腫脹勞瘵等類當詳參方論而治之蓋痺者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒爲五痺在大人爲五勞總以調補胃氣爲主

治驗

陳臧方孫三十歲面頰患瘡治愈兩目肛大青筋小便澄白此肝痺之症也用大蕪荑湯一劑而愈

陳司廳子遍身生瘡面色痿黃腹脹內熱大便不調飲食少思倦怠口乾爲肝脾痺症用大蘆薈丸不月而痊

陳工部長孫腹內一塊小便不調或用行氣破

血等藥發熱口乾體瘦懶食面黃兼青幾成疳症以補中益氣湯前送大蘆薈丸四服又用前湯加車前子煎送六味丸四服又用清肝生血之藥而痊

一女子十二歲目生白翳面黃浮腫口乾作瀉用四味肥兒丸而痊

一小兒頭搔目劄口渴下血此肝經血虛風熱也用地黃丸而痊若肝經實熱兼用瀉青丸蓋虛則補其母實則瀉其子也

一小兒十二歲兩耳後腦下各結一核色不變不痛而面色痿黃體倦口乾去後不調用蘆薈丸治之諸症頓愈

一小兒鼻外生瘡不時搔擾延及兩耳又一小兒鼻外生瘡膿水淋漓經歲不愈余謂肝火上炎用大蘆薈丸而愈

一小兒遍身如疥或痒或痛肌體消瘦日夜發

熱口乾作渴大便不調年餘不愈用丸味蘆薈丸而愈

一小兒數歲腦後並結核痛用大蘆薈丸以清肝脾佐以地黃丸補腎水形體健而核自消

一小兒腹內結塊小便不調此肝經內疳也用龍膽瀉肝湯及九味蘆薈丸而痊

一小兒自生後兩目赤腫或作痒或生翳此胎禀肝火用蘆薈丸六味地黃丸而痊

一小兒患瘰癧小便頻數兩目連劄作嘔少食泄瀉後重用補中益氣湯六味地黃丸漸愈佐以蘆薈丸而痊

一小兒食泥土困睡泄瀉遍身如疥此脾經內外疳也用六君子湯肥兒丸而愈

一小兒面黃頰赤發熱作渴睡中驚悸此心經內外疳也用秘旨安神丸而痊

一小兒患前症兼掌心發熱遍身如疥用安神肥兒二十丸而愈

一小兒咳嗽寒熱咽喉不利鼻上有瘡久不結痂此肺經痒症也用地黃清肺飲而痊

一小兒下疳潰痛爪黑面黧遍身生疥此肝經內外疳也用地黃蘆薈二十九而痊

一小兒項後結核不時仰吐或以爲熱瘡內潰用針決之服消毒之藥後曲腰啼哭余謂此名無辜疳仰身而哭外癇症也腰曲而啼內癇症也元氣敗矣果歿

一小兒四肢消瘦肚腹漸大寒熱嗜臥作渴引飲此肝脾疳症名丁奚囿露用白朮散爲主佐以十全丹月餘諸症漸愈乃以異功散加當歸及六味丸而痊

一小兒患疳虛症悉具熱如火炙病狀不能盡述朝用異功散夕用四味肥兒丸月餘諸症稍愈佐以九味地黃丸自能行立遂朝以六味地黃丸夕以異功散及蚵蠃丸而痊

一小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能作渴發熱去後臭穢以十全丹數服諸症漸愈又用異

功散肥兒丸調理漸愈

大蘆薈丸治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連　黃連　白蕪荑去扇蘆薈

鶴虱微炒　木香　白雷丸破開赤者不用

青皮各半兩　麝香二錢別研

右爲末粟米飯丸菉豆大每服一二十丸米飲下

愚按前方肝脾疳積食積發熱目生雲翳或疳熱頸項結核或耳內生瘡肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹膨脹或牙齦蝕落頰顋腐爛或陰囊玉莖生瘡或胸脇小腹作痛並效內青皮以龍膽草代之麝香不用尤效

六味肥兒丸消疳化蟲退熱

黃連　陳皮　神麯炒　川楝子去核炒

麥蘗炒各一兩　白蕪荑生

右爲末糊丸麻子大每服一二十丸空心米飲吞下

愚按前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大

頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴精神倦怠
大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡肚見青筋齒
齒下痢便白五脾用此丸加乾蟾一兩蕪荑五
錢尤妙

蚵蟆丸治無辜疳症二服虛熱退二服煩渴止三
服瀉痢任

蟾蜍一枚夏月溝渠中腹大
不跳不鳴身多癩癘者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不
令蟲走出却將蟾蜍撲死投蛆中食一晝夜以
布袋盛置浸急水中二宿取出去上焙爲末入
麝香一字粳米飯搥丸麻子大每服二十丸米
飲下

愚按前方又治無辜疳症面黃壯熱不食舌下
有蟲或腦後有核軟而不痛中有粉蟲隨氣流
散侵蝕臟腑便滑膿血日漸黃瘦頭大髮竪手
足細軟變生天癇猢猻鵝口木舌懸癰重腭口
噤臍風撮口重舌龜背龜胸二十二種敗症急
用蟾蜍丸大蕪荑湯治之多有生者

生熟地黃湯治痙眼閉合不開

川芎　赤茯苓　枳殼製　杏仁去皮
川黃連　半夏麴　天麻　地骨皮各二錢半
甘草炙二錢半　生地黃　熟地黃各半兩

右每服一十錢黑豆十五粒薑水煎服

噦痙散治痙

蘆薈　黃連各一錢　麝香少許　瓜蒂
蝦蟆灰　猪牙皂角各五分

右爲末吹入鼻噦則可療

脂連丸治五痙潮熱腹脹髮焦

胡黃連半兩　五靈脂一兩

右爲末猪猪膽汁丸麻子大米飲下

茯苓丸治心痙驚痙

茯神　蘆薈

赤茯苓三錢　釣藤皮
石菖蒲一錢　麝香少許

右爲末粟米丸麻子大薄荷湯下

神效換肌丸治脾痙肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭

琥珀　川黃連淨各三錢　蝦蟆灰各三錢

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

大腹急

川黃連 炒 鱉甲 酒製 肉豆蔻 煨 史君子 麵裹煨 各一錢 神麯 炒 麥芽 炒 各半兩 麝香五分

右爲末糊丸芥子大米湯下

天麻丸治肝痃風痃痰眼

青黛 川黃連 天麻 五靈脂 夜明沙 微炒 川芎 蘆薈 各二錢 蟬退去足 龍膽草 防風 各一錢半 全蝎二枚 焙 乾蟾頭炙焦 三錢 麝香少許

右爲末猪膽汁浸糕丸麻子大每服十丸薄荷湯下

化蠱丸治諸痃生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛唇口紫黑腸頭濕蟲上

蕪荑 蘆薈

白芷稍 胡黃連 川黃連 蝦蟇灰 各等分

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服一十丸食後臨臥杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

萱瓜蒂地榆黃連蘆薈雄黃爲末入大臭瘡數
靈脂丸治脾疳食疳
白萱蔻　麥芽炒　五靈脂　宿砂
蓬朮煨　青皮　橘紅　史君子焙各
蝦蟇炙焦
三錢
右爲末米糊丸麻子大每服十丗米湯下
下蟲丸治疳蛔諸蟲
新白苦楝根皮酒浸焙　木香　綠包貫衆
桃仁浸去皮焙各　蕪荑焙各二錢　鶴虱炒一錢　雞心檳榔二錢

輕粉王分　史君子五十取肉煨　乾蝦蟇炙焦三錢
右爲末麵糊丸麻子大每服一二十丸天明清
肉汁下內加當歸川連各二錢五分
龍膽丸治腦疳腦熱疳
龍膽草　升麻　赤茯苓　苦楝根皮焙
防風　蘆薈　油髮灰各二錢
青黛乾　黃連淨各三錢
右爲末仍以豬膽汁浸糕糊丸麻子大薄荷湯下
仍以蘆薈末入鼻

黃連丸治泄痢勞

黃連半兩淨猪膽汁浸晒　石蓮　瓜蔞根

杏仁浸去皮焙烏梅肉各二錢

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅薑湯下三十丸

香蔻丸治泄痢瀉

黃連二錢炒　肉豆蔻　木香

砂仁　茯苓各一錢

右爲末飯丸麻子大米飲下三十丸

木香丸治泄痢痢

黃連淨三錢　木香

夜明沙隔紙炒各二錢

右爲末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

十全丹治一切奚哺露

青皮　陳皮各去白　川芎　白豆蔻仁

五靈脂　雞心檳榔　蘆薈各五錢

木香　史君子焙　蝦蟇灰各三錢

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服一二十

紫厚朴製

訶子肉炒一錢

丸米飲下有熱薄荷湯下
湯氏十全丹治前症
檳榔　青皮　陳皮去白　枳殼湯浸去穰炒　木香各二錢　丁香五分炮　香附子一兩炒
右爲末神麯糊丸黍米大每服三十丸空心食前米飲下
愚按前症因乳哺不調傷損脾胃不思飲食氣血日損四肢日瘦肚腹漸大是名丁奚呼吸少氣汲汲若熱謂之哺露屬形病俱虛雖用前藥

宜佐以異功散壯脾胃以行藥勢
鱉血煎治疳勞
蕪荑　柴胡　川芎各一錢　人參半兩　史君子二十箇　胡黃連　宣黃連
右用鱉血一盞炙乾共爲末每服一錢米飲調下
次早炒乾去茱萸并血用一連入餘藥末棗粉糊丸麻子大食前熱水下
地黃清肺飲治肺熱疳侵蝕穿孔或生瘡肉或鼻外生瘡

柴蘇　前胡
黃芩　當歸
桔梗　生地黃
右每服二錢水煎服次用花露丸

九味地黃丸治腎脾
史君子肉　赤茯苓
當歸　川芎
熟地黃四錢五分
右爲丸蜜丸桐子大每服八十丸空心溫酒下

防風　赤茯苓
連翹　天門冬去心
甘草炙各二錢　桑白皮炒半兩
川練子　山茱萸肉
牡丹皮　山藥各一錢

東垣大蕪荑湯一名梔子茯苓湯治黃疸土色爲濕爲熱
當利小便今反利知黃色中爲燥胃經熱也髮黃脫落知勝脫腎
俱受土邪乃大濕熱之症鼻下斷作瘡上逆行營氣伏火也能乳胃中有熱
食不入則寒足也面黑色爲寒爲痺大便清寒也禍
色熟蓋土有熱胃腸也間黃色治當滋榮潤燥外致津液

甘草炙
羌活各二分　柴胡三分
防風一分　白朮
山梔仁三分　麻黃根
右水煎服

黃連各一分　當歸四分
茯苓　大蕪荑各五分

硃砂安神丸治心神怔忡心中痞悶
硃砂四錢　生地黃　黃連各半兩　生甘草二錢半
銅青　輕粉各五分　蘭香葉二錢燒灰
右爲末乾敷上
白粉散治濕瘡
海螵蛸三分　白芨二分　輕粉一分
右爲末先用漿水洗拭乾傳之
六君子湯
異功散二方見內傷
六味丸方見腎臟
四味肥兒丸方見寒吐
瀉青丸方見肝臟
龍膽瀉肝湯方見痎氣
補中益氣湯方見虛癆
白朮散方見積滯

二十便色白

秘旨云小兒便如米泔或溺停少頃變作泔濁者此脾胃濕熱也若大便泔白色或如魚凍或帶紅

黃黒者此濕熱積滯也宜理脾清滯去濕熱節飲食若忽然變青此是變蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝若心腹伏熱則成痃矣大抵多因乳哺失節脾氣有傷元氣下陷或乳母飲食七情所致小便如泔或大便泔白者用四味肥兒丸積滯黃黒者用四君子湯加黃連木香色青日久不復或兼泄瀉或腹痛者用六君子湯加木香芍藥若小便不利大便褐色髮黃脫落鼻下瘡爛用梔子茯苓湯乳食少思腑腹膨脹大便頻數用四味肥兒丸仍審乳母飲食七情主治

治驗

一小兒每食停滯大便色白而頻先用大安丸異功散少加炒黒黃連一二服後小水澄久如泔發熱體倦用四味肥兒丸而愈

一小兒患前症停食發熱先用大安丸而愈後患腹脹午後發熱用五味異功散而瘥

一小兒患前症兼自痢用異功散加升麻柴胡而愈但日晡微熱倦怠用補中益氣湯四味肥

兒丸而愈

一小兒患前症服驅逐之劑手足並冷作渴火食此脾氣復傷也用六君升麻柴胡而瀉止又四味肥兒丸而愈

四君子湯

六君子湯

加味逍遙散

五味異功散 四方見內傷門

龍膽瀉肝湯 方見疝氣

補中益氣湯

大安丸 保和丸加白朮二方見虛羸

四味肥兒丸 方見寒吐

梔子茯苓湯 卽大薊蒻湯方見瘧症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛鎧編集
男薛已治驗
後學宋璞校閱

吐血

經曰清者爲榮濁者爲衛榮行脈中衛行脈外蓋榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六府故能入於脈夫榮者陰血也所主在心統化在脾藏內在肝宣布在肺輸泄在腎灌溉一身滋養百脈

國立國會圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

諸經由此而生毓焉然血之所統者氣也故曰氣
主呴之血主濡之是以氣行則血行氣止則血止
陽生陰長夫倡婦隨之道也若氣一傷則變症百
出故妄行則吐衄衰涸則虛勞降下則便紅熱悶
則溺赤滌於腸胃則爲腸風陰虛陽搏則爲崩漏
此皆氣有殄戾之乖而血乃生滌溢之患也然養
陰者可不先知養陽之道乎小兒患之多因稟賦
積熱或食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致治法
若氣虛血弱當以人參補之陽旺則陰生血也若
四物湯者獨能主血分受傷爲氣不虛也若左寸
關脉數而無力血虛也四物湯加參朮浮而無力
氣虛也補中益氣湯尺脉數或無力腎虛也六味
地黃丸右寸關脉數而有力者肺胃熱也犀角地
黃湯後用四物湯加參苓白朮尺脉數而無力陰
虛也用六味地黃丸若面黃目澁眵多手麻者脾
肺虛也用黃芪芍藥湯

治驗

一小兒年十餘歲鼻衄肝脉弦數肝藏血此肝

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

火血熟而妄行用小柴胡加山梔龍膽草四劑而血止又用四物芩連蘆薈山梔甘草作丸服又以地黃丸滋腎水生肝血而愈

一小兒久鼻衄右顴鼻準微赤此脾胃傳熱於肺而不能統也先用六君桔梗當歸山梔而血止次用人參黃芪散以補脾肺而愈

一小兒壯熱吐血或衄血右顴鼻準赤色乃肺胃積熱用濟生犀角地黃四劑而血並止後因母飲酒復作用清胃散母子服之而愈

一小兒吐血不止鼻準赤色審其乳母有鬱熱用加味歸脾湯加味逍遙散母子並服各數劑血少止又用八珍湯加柴胡牡丹皮而愈

一小兒因母屢慮怒發熱吐血或咳衄用加味小柴胡湯之類治其母並愈後其母因勞役兼怒氣致兒患驚搐或用抱龍丸又加吐血亦以加味逍遙散母子並愈厥後乳母仍勞役發熱此兒即驚搐或吐血或衄血母用補中益氣湯子用犀角地黃湯頓愈

一小兒十歲因傷厚味吐血用濟生犀角地黃湯解食毒清胃熱又用四君牡丹皮升麻調補脾胃而愈惟肢體倦怠兩手作麻用黃芪芍藥湯數劑而安

一小兒吐血因乳母火鬱發熱兩脇作痛後吐血以加味歸脾湯加吳茱萸製黃連治母兒不時飲數匙月餘並愈後母因怒吐血寒熱兒亦吐血先用加味小柴胡湯二劑後用加味逍遙散治其母悉愈

一女子年十四歲因驚寒熱發搐服鎮驚之藥更吐血尋衣撮空身如炙煩躁不眠飲食不入脉洪大而無倫次按之豁然而空用加減八味丸料二劑諸症悉退脉息按之如絲無氣以動用人參一兩煎服不應仍用人參一兩附子五分二劑元氣頓復

一女子十三歲因怒吐血咬牙發搐用加味逍遙散加釣藤鈎而愈次年懷抱鬱結胸滿食少吐血面赤此因肝火動而血熱脾氣虛而不能

攝血也用六味丸及歸脾湯加山梔貝母而愈
一小兒十四歲發熱吐血屬足三陰虛余謂宜
補中益氣以滋化源不信仍用寒涼降火前症
愈甚或謂曰小兒未有室何腎虛之有參芪補
氣奚爲用之余述丹溪先生云腎主閉藏肝主
疎泄二藏俱有相火而其系上屬於心心爲君
火爲物所感則相火翕然而起雖不交會而其
精亦暗耗矣又褚氏云男子精未滿而御女以
通其精則五藏有不滿之處異日有難狀之疾
正此謂也遂用補中益氣湯及六味地黃丸而
痊

黃芪芍藥湯治衄多歲面黃眼澁多睡手麻

黃芪三兩　甘草炙黃各一兩　芍藥炒　升麻　葛根　羌活半兩

右每三錢水煎服

愚按此手足太陰陽明藥也然血虛久則陽亦
虛矣故血不足則麻木陰虛火動變症百出實
非風也此出升陽滋陰例

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

人參黃芪散治虛勞客熱消瘦倦怠口燥咽乾口
哺潮熱五心煩熱盜汗胸滿食少作渴咳唾時
有膿血

天門冬去心 三兩 半夏 知母炒黃 桑白皮 赤芍藥炒黃芪炒 紫菀
甘草炙各半兩 白茯苓 柴胡 秦艽
生地黃 熟地黃 地骨皮各二兩
人參 桔梗各一兩 鼈甲酷炙五錢

右剉散每服二錢水煎服大人亦得小兒一方有生薑

四物湯 方見急驚
加味小柴胡湯
小柴胡湯 方見瘧症
清胃散
加味歸脾湯
加味逍遙散
四君子湯
六君子湯 五方見內鈎
濟生犀角地黃湯 方見便血

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補中益氣湯 方見虛羸
八珍湯 即四君四物二湯合用也
六味丸 方見腎臟

虛羸

仲陽云小兒虛羸因脾胃不和不能乳食使肌體瘦弱或大病後脾氣尚弱不能傳化穀氣所致若冷者時時下利屎白清白熱者身温壯熱肌體微黃更當審其形色察其見証如面赤多啼心之虛羸也面青目劄肝之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而藥之又寒熱一症不可不辨若腹痛瀉利清白不渴喜熱此屬寒症雖在夏月宜木香丸身熱煩躁瀉利焦黃作渴喜冷此屬熱症雖在冬月宜胡黃連丸皆捨時從症之治法也

治驗

一小兒十三歲面赤驚悸發熱形體羸瘦不時

面白噯氣下氣時常停食服保和丸及清熱等藥余曰面赤驚悸心神怯也面白噯氣心火虛也大便下氣脾氣虛也此皆禀心火虛不能生脾土之危症前藥在所當禁者不信又服枳朮丸鎮驚等藥而諸症益甚大便頻數小腹重墜脫肚痰涎飲食日少余先用六君子湯爲主佐以補心丸月餘飲食少進痰涎少止又用補中益氣湯送四神丸而愈異姻後病復作（重陰）時至仲冬面白或黧色手足冷喜食胡椒薑物腹中不

熱脉浮按之微細兩尺微甚乃用八味丸元氣復而形氣漸充年至二十苦畏風寒面目赤色發熱吐痰唇舌赤裂食椒薑之物口即破痰熱愈甚腹中却不熱診其脉或如無或欲絕此寒氣逼陽於外內眞寒而外假熱也仍用八味丸而諸症頓愈

一小兒八歲面常青色或時色赤日間目劄夜睡咬牙二年餘矣服清肝降火之藥益甚形氣日羸余考績到京求治於余曰肝主五色入心

則赤自入則青益肝屬木而生風故肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水此稟肝腎精血不足虛火內動陰血益虛虛而生風風自火出故變面赤劑等症耳非外風也遂用地黃丸以滋腎水生肝木兩月目劑咬牙悉止又三月許諸症尋愈而元氣亦充矣凡肝經之症若肝木實熱生風而自病或肺金實熱而尅木者宜用清肝降火之劑以瀉其邪氣若肝經風熱而目直等症用柴胡疎子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸症用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水則愈

一小兒脾氣虛弱飲食停滯發熱作渴服瀉黃散不時下痢余先用保和丸二服而愈但不食惡心面青手冷又用六君柴胡升麻四劑面色痿黃食進手温惟形體羸甚倦怠發熱小腹重墜肛門脫出用補中益氣湯加半夏肉豆蔻二劑而安凡脾胃之症若發熱作渴飲食喜冷或泄瀉色黃睡不露睛者屬形病俱實宜用瀉黃

散疎導之若發熱口乾惡冷或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯寒水侮土者益黃散肝木尅脾者六君加柴胡若目睛微動潮熱抽搐吐瀉不食宜用秘旨保脾湯凡小兒諸病先當調補脾胃使根本堅固則諸病自退非藥所能盡祛也

一小兒五歲形氣虛羸睡中咬牙夜間遺尿日間頻數余以爲禀腎氣不足用補中益氣湯加補骨脂地黃丸加鹿茸以補脾腎而痊畢姻後小使頻數作渴發熱日晡益甚恪服黃柏知母等藥以滋陰降火後患腎痿卧床年許余因考績北上仍用前藥喜其愼疾半載而痊

一小兒年十二歲面白或赤足軟不能久行用地黃丸加鹿茸年許而痊畢姻後兩目羞明兩足仍軟用前丸及補中益氣湯而痊後病復發增口渴足熱頭顱覺開視物覺大此腎虛瞳人散大而然也服前藥遠房事則愈因不自保終

患腎瘧而發仲陽先生云此症屬腦髓不足不能榮養宜用地黃丸補之有至七八歲或十四五歲氣血既盛而自汗若縱恣色慾戕賊眞陰亦不能盡其壽矣

一小兒體素虛弱患咳嗽痰涎服化痰藥而痰益甚余以爲脾虛食積先用六君神麴山查漸愈後傷風咳嗽腹脹不食泄瀉酸臭此食滯傷脾而肺氣虛也用六君桔梗而愈又飲食停滯嘔吐痰涎喘嗽面白余謂脾虛不能消化飲食而爲痰肺虛不能攝氣歸源而作喘仍用六君子湯而愈大凡腠理不密外邪所感而肺病者因脾胃氣虛不能相生必用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若心火炎爍肺金而喘嗽者用地黃丸

一小兒形瘦不時咳嗽自用參蘇飲一劑更加喘急驚搐面白或黃余謂此稟脾肺不足而形氣虛羸因前劑峻利外邪雖去而肺氣益虛肺虛則宜補脾先用異功散加桔梗鈎藤鈎二劑

痰喘頓定乃去桔梗加半夏當歸再劑驚搐亦去又加酸棗仁治之而安年十五歲發熱痰盛作渴面赤形體羸瘦用地黃丸加五味子及補中益氣湯各百餘劑而形氣漸壯若認爲陰火用黃柏知母等藥復傷生化之源其亦不治者矣

一小兒五歲尚飲乳耳前後頸間至缺盆以手推尋其筋結小核如黃珠隱於肌肉之間小便不調面色青黃形氣羸瘦此稟母之肝火爲患用九味蘆薈丸五味異功散加山梔柴胡與兒飲之又以加味逍遥散與母服之尋愈

一小兒患虛羸耳出穢水左手尺關洪數而無力余爲清肝補腎耳中雖愈脈未全斂畢姻後患瘵症誤服黃柏知母之類復傷元氣不勝寒暑勞役無日不病幾至危殆余大補脾腎滋養元氣而愈

一小兒患症如前肢體消瘦面色萎黃大便酸臭此脾虛食積用四味肥兒丸五味異功散治

之而愈

一小兒體瘦腹大寒熱嗜臥作渴引飲以白术散爲主佐以四味肥兒丸諸症漸愈乃以異功散六味丸月餘而安

一小兒患前症身熱如炙此肝疳之症也朝用異功散夕用四味肥兒丸諸症稍愈佐以蚵蟆丸數服而痊

一小兒停食發熱服芩連三稜等劑飲食日少胸腹膨脹肢體羸瘦余謂脾虛飲食停滯元氣復傷先用補中益氣湯加木香鈎藤鈎數劑漸效又用六君炮薑調理而安

一小兒虛羸昏倦咳嗽驚悸自用參蘇散一劑更加喘急此脾肺氣虛而妄發表也用惺惺散微解外邪調和胃氣諸症頓愈但手足逆冷又用六君子湯調補元氣而安

一小兒九歲吞酸惡食肌體消瘦腹中作痛余謂食積虛羸也用保和丸而愈後腹中數痛皆服保和丸余曰此因脾胃虛而飲食所傷也當

調補脾土以杜後患不信後腹痛喜按余用五味異功散一十劑因未應自用平胃散等藥腹脹作痛余仍以異功散加木香四劑而愈若屢用攻伐之劑陰損元氣多致虛羸深可慎也

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食少思中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉

白扁豆 二兩半薑汁浸去皮微炒 人參 白茯苓
白朮 甘草 炒 山藥 各三兩半 蓮肉
桔梗 炒黃色 薏苡仁 宿砂仁 各二兩

右爲末每服一錢棗湯調下

地黃丸 加肉桂一兩名治小兒肝經虛熱血燥或加減八味丸

風客淫氣而患瘰癧瘡結核或四肢發瘡眼目抽動痰涎上湧又治腎疳腦熱消瘦手足如冷寒熱往來潰瀉肚脹口臭乾渴齒齦潰爛爪黑面黧遍身兩耳生瘡或兩耳出水或發熱自汗盜汗便血諸血失瘡等症其功不可盡述 即六味地黃丸方見腎臟

補中益氣湯治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴

等症

人參 黃芪各八分 白朮 甘草 陳皮各五分 升麻 柴胡各二分 當歸一錢

右薑棗水煎空心午前服

愚按前方若因藥尅伐元氣虛損惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右寸關獨甚者宜用之凡久病或過服尅伐之劑虧損元氣而虛症悉具者最宜前湯若毋有脾胃不足之症或陰虛內熱致現為患者尤宜用之

錢氏異功散治脾胃飲食少思吐瀉不食凡虛冷症先與數服以正脾胃氣即五味異功散見內鈎

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若毋脾胃虛兒患此症亦當服之

四君子湯治脾氣虛損吐瀉少食肌肉羸瘦方見內鈎

保和丸治飲食停滯胸膈痞滿噯氣吞酸或吐瀉

腹痛加白朮一兩即大安丸

神麴炒　山查　半夏　茯苓各一兩　陳皮　連翹　蘿蔔子炒五錢

右爲末粥丸桐子大每服三十丸白湯送下

愚按前方行氣散滯之劑若元氣無虧暴停乳食而致斯症者宜用此消導之若元氣虛弱不調乳食所傷者必調補胃氣爲主而佐以消導若乳食已消而作嘔者乃胃氣被傷當用異功散補之不宜仍用前藥重損胃氣治者審之

肥兒丸治肝脾食積肢體消瘦二十便不調

黃連　神麴　檳榔二十箇　木香各二兩　肉荳蔻二個煨　五錢　史君子酒浸去皮　麥芽各四兩

右爲末神麴糊丸麻子大每服二十丸米飲下

愚按前方若食積五脾發熱口乾大便不調小便不清或頸項結核髮稀成穗寒熱作渴宜用之若脾胃稍虛者用五味異功散兼服虛甚者次前藥

枳术丸 方見癖塊
六君子湯 方見内鈎
四神丸 方見脫肛
八味丸 方見腎臟
柴胡梔子散 方見急驚
四物湯 方見急驚
九味蘆薈丸 方見疳症
加味逍遥散 方見内鈎
白术散 方見積滯

蛔蛲丸 方見疳症

胃氣虛寒

經曰胃爲水穀之海六腑之大源也人身氣血臟腑俱由胃氣而生故東垣之法以脾胃爲主所謂補腎不若補脾正此意也在小兒雖能得乳食水穀之氣未全危伏胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故丹溪謂小兒多肝脾之疾也若面色㿠白目無睛光口中氣冷不食吐水肌瘦腹痛此胃氣虛寒之症用五味異功散或六君子湯主之若太

便不實兼脾虛也加乾薑温之中滿不利脾不運也加木香開之喜冷便秘胃實熱也用瀉黄散涼之命門火衰不能生土者用八味丸補之禀賦胃氣不足亦用此丸蓋下焦眞陽充盛則上生脾元自能温蒸水穀矣

治驗

一小兒傷食吐瀉不已後便泄青色睡而露睛手足指冷額黑唇青余謂大便青色木勝土也或時溏泄脾氣不足也額黑唇青寒水侮土也悉屬中氣虛寒用五味異功散加升麻柴胡木香附子二劑而愈

一小兒盛暑嘔吐殘泄服黄連香薷飲益甚用白虎石膏湯而腹脹作痛手足並冷余謂脾氣虛寒且夏月伏陰在內也用五味異功散加木香而愈

一小兒因傷乳食雜用消導之藥遂變痢久而不愈先用六君加木香而漸瘥後用五味異功散而全愈

一小兒手足常冷腹中作痛飲食難化余謂胃氣虛寒也先用益黃散二十服痛止次用六君子湯數劑即愈

一小兒九歲素惡風寒飲食少思至秋冬口鼻吸氣陰冷至腹手足如冰飲薑湯及燒酒方快其脉細微兩尺如無余謂此稟命門火衰也用還少丹不應改用八味丸旬餘諸症即愈

平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦嘔氣惡心嘈氣吞酸面黃體瘦嗜卧體痛霍亂吐瀉等症

厚朴薑汁製 陳皮 甘草炙各一兩 蒼术米泔浸焙八兩

右爲末每服二十錢薑棗水煎沸湯點服亦得常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣愚按前症若乳食停滯嘈腐吞酸嘔噦惡心者宜服是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜四君子湯

調中九治脾胃虛寒

白术 人參 甘草炙各五分

入味地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子各一兩治下漂賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思及食而不化腹膨疼痛夜多漩溜等症內經謂益火之源以消陰翳正此藥也

錢氏益黃散 一名補脾胃虛冷吐瀉方見脾臟

愚按前方若脾土虛寒或寒氷侵淫土而嘔吐泄瀉手足並冷或痰涎上湧睡而露睛不思乳食者宜用此方若脾上虛弱吐瀉者用六君柴胡如不應或手足俱冷者屬虛寒加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮亦治以前藥若乳母憂怒致兒患前症者其母兼服加味歸脾湯

瀉黃散 方見脾臟

觀音散 方見嘔吐

銀白散 方見慢驚

歸脾湯

異功散

六君子湯 三方見內鈎

食積寒熱

小兒食積者因脾胃虛寒乳食不化久而成積其症至夜發熱天明復涼腹痛膨脹嘔吐吞酸足冷肚熱喜睡神昏大便酸臭是也有前症而兼寒熱者名曰食積寒熱若食在胃之上口者吐之胃之下口者消之腹痛痞脹按之益痛者下之下後仍痛按之則止者補之夾食傷寒者先散之用參蘇飲熱甚便秘者先利之用大柴胡湯加無外感但只傷食不至於甚保和丸調之益脾爲至陰之藏也故凡脾病者至夜必熱熱而兼寒則又見所勝者侮所不勝矣食未消者消之既消者補之則寒熱自止食既中州虛寒也宜溫之大便欲去不去脾氣下陷也宜升之若夜間或侵晨泄瀉者脾腎俱虛也用四神丸手足並熱作渴飲水者脾胃實熱也用瀉黃散大便秘結用大柴胡湯手足雖熱口不作渴大便不實者用白术散仍參腹痛腹脹積痛滯治之

治驗

一小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾氣傷而及於肺也用六君加桔梗調補而痊

一小兒腹脹惡食寒熱惡心症類外感余曰氣口脉大於人迎此飲食停滯也用保和丸一服諸症頓退但腹脹未已用異功散而痊

一小兒傷風咳嗽痰湧用六君桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯腹瀉脹痛又用六君加山查厚朴而安復停食作嘔或用藥下之更加咳嗽余謂此脾肺益虛欲行調補彼以爲緩乃服發表攻滯之藥前症益甚更加搔頭余用天麻散倍加鈎藤鈎及異功散而愈

一小兒胸腹脹痛寒熱頓悶以手按腹即哭此飲食停滯也先用保和丸一服前症即愈更加煩渴按其腹不哭此宿食去而脾氣未復也用五味異功散加柴胡治之而瘳

一小兒飲食停滯服消導之劑飲食既消熱尚

未退此胃經虛熱也用六君子加升麻柴胡四劑而愈

一小兒先因飲食停滯服尅伐之劑更加腹痛按之則止余用六君子湯而愈後復傷食服保和丸及三稜檳榔之類更加腹重善噫此脾氣虛而下陷也仍用前湯加升麻柴胡木香而愈

一小兒面色青白飲食難化大便頻泄或用消積化痰等藥久不愈余謂脾胃虛弱也用六君子湯漸愈或以爲食積宜驅遂之遂反作瀉痰

喘發揣余謂脾氣復傷不能生肺肺虛不能平肝而作是症先用六君加釣藤鈎飲食少進又用五味異功散加升麻而愈

一小兒患前症腹痛服攻下之劑發熱不已大便不化按其腹不痛與冷水不飲此食積去而脾氣虛也用五味異功散加當歸升麻而愈

三黃枳朮丸治傷肉濕麪辛辣味厚之物致塡塞悶亂不快

枳實麩炒五錢 黃連酒浸炒 大黃濕紙裹煨 白朮各一兩

黃芩 五錢

右爲末湯浸麭餅爲丸如菉豆大每服五十丸白湯下臨時量所傷多少加減服之

大柴胡湯 方見驚瀉

四神丸 方見驚瀉

六君子湯

五味異功散 二方見內鈎

瀉黃散 方見脾臟

白朮散 方見積滯

保和丸 方見虛贏

加減腎氣丸 方見腹脹

天麻散 方見百脉內教卽天麻丸

腫脹

經曰至陰者腎水也少陰者冬脉也其本在腎其末在肺皆積水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故腫腹大上爲喘呼不得臥者標本俱病也丹溪云惟腎虛不能行水脾虛不能制水胃與脾合又胃爲水穀

之海因虛而不能傳化腎水泛濫反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫也其狀目胞上下微起肢體重着喘咳怔忡股間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也古方有十種論症以短氣不得臥爲心水兩脇緊痛爲肝水大便鶩溏爲肺水四肢苦重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲膽水下虛上實爲大腸水腹急肢瘦爲膀胱水小便閉泄爲胃水小腸水又有濕氣毒氣傷寒後瀉痢後氣血虛者之五腫及卅氣藏積鎖肚腸作膨脖氣虛冷積者之七脹亦當詳之其受濕氣者由脾胃之氣敦阜四肢頭面皆腫也食毒者脾傷積毒停留於胃也傷寒下早者邪氣乘虛而入也瀉痢後者脾氣虛也皆宜先調胃氣次可治腫其患七脹皆由血氣不足臟腑怯弱表裏俱虛邪正相亂以致四肢浮腫腹肚膨滿亦當先調榮衛分別陰陽治法宜補中行濕利小便凡有熱者水氣在表也可汗之身無熱者水氣在裏也宜下

之腰已上腫宜利小便腰已下腫宜發汗此仲景之法也若遍身腫煩渴小便赤澁大便秘結此屬陽水遍身腫不渴大便溏泄小便清利此屬陰水陽水兼陽證者脈必浮數陰水兼陰證者脈必沉遲氣若陷下宜用二陳加升提之藥如腹脹小加木香調之若朝寬暮急屬陰虛朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸朝急暮寬屬陽虛朝用六君子湯夕用加減腎氣丸朝暮皆急陰陽俱虛也用八珍湯主之眞陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉呼吸氣冷者此眞陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不治惟調補脾土多有生者

治驗

一小兒傷食腹脹服尅伐之劑小便澁滯改服五苓散小便益閉四肢頓腫余謂脾胃虛寒不能通調水道下輸膀胱故也朝用加減金匱腎氣丸夕用補中益氣湯而愈

一小兒患前症小便赤頻盜汗發熱朝間用補中益氣湯午間用五味異功散晚間用六味地黃丸而愈後作勞課太勞盜汗發熱用八珍湯六味丸而痊

一小兒患前症飲食少思大便不實先用補中益氣湯又用五味異功散而愈畢姻後復發更手足並冷飲食難化或吞酸噯腐用六君子炮薑而痊後又發用八味地黃丸補中益氣湯而痊

一小兒小腹脹墜小便澁滯午前爲甚以補中益氣湯加木香與之朝服以五味異功散加升麻柴胡與之夕服兩月餘而愈後飲食失節腹脹嘔酸用五味異功散四味柴黃丸而痊畢姻後復患如前更惡寒腹冷小便清頻大便不實手足並冷用補中益氣湯八味地黃丸而尋愈

二陳湯方見寒吐

五苓散方見五淋

八珍湯卽十全大補湯去黃芪肉桂方見自汗

六君子湯 方見內劑
加減腎氣丸 方見腹脹
八味地黃丸 方見腎臟六味丸加肉桂附子
補中益氣湯 方見虛羸

蛟蟲

巢氏云蛟蟲者九蟲之一也長尺許或五六寸者因藏腑虛弱及食甘肥而動其動則腹中攻痛或作或輟口吐涎水貫心則死用史君子丸之類下之錢仲陽云吐冰不心痛者胃冷也吐涎心痛者

蟲痛

蟲痛也與癇相似但目不斜手不搐耳安蟲散主之田氏云蟲痛者啼哭俛仰坐卧不安自按心腹時時大叫面色青黃唇色兼白目無精光口吐涎沫也若因胃冷即吐用理中湯加炒川椒五粒檳榔五分煎下烏梅丸古云虫蝕上部則上唇有白點虫蝕下部則下唇有白點腹中諸虫皆宜前其頭向上望後其虫向下如欲用藥先以豬肝油炙香令兒聞其香味使虫頭向上則藥易伏若中氣虛而虫不安者但調補脾胃自安丹溪先生云冬月

吐虫多是胃氣虛寒用錢氏白朮散加丁香二三粒主之

治驗

一小兒患虫動心痛先服大蕪荑湯下瘀穢反作嘔少食右顧鼻準白中兼黃此脾肺氣虛也用異功散二服稍應更加炮薑一劑而安

一小兒吐瀉將愈心痛吐水手足並冷忽自手按心腹此胃氣虛寒類乎虫痛也用益黃散而愈

一小兒病後吐水心間作痛余謂胃氣虛寒用五味異功散而愈後每吐先患病飲食不進手足並冷即吐水心痛余用前散加升麻柴胡即愈或用逐虫之劑前症益甚更加腹痛重墜余用補中益氣湯加炮薑治之而愈

史君子丸治五疳脾胃不和心腹膨脹時復作痛不食漸瘦並宜服之

史君子肉一兩　厚朴製　橘紅

白芍藥　甘草炒　川芎各一錢

右爲末蜜丸如皁角子大每服一丸陳米飲化下

安蟲散治蛔痛

胡粉炒　鶴虱炒　川練子　檳榔各二錢　白礬枯二錢半

右爲末每服三五分米飲調下

烏梅丸治蚘厥當吐蚘今反靜而復煩此爲臟寒蚘上入其膈故須臾復止得食而嘔又煩蚘鬧臭當自吐及治久痢方見傷風咳嗽

理中湯　方見冷痛

大蘇羌散　方見舟症

異功散　方見內鈎

白朮散　方見積痛

異黃散　方見脾臟

疝氣

小兒陰腫疝氣者多屬肝腎氣虛及坐卧寒濕之地或風邪所傷血氣相搏或啼叫氣逆水道不行或嘗欠肝經虛熱或嬉嬉肝氣鬱結或乳母怒動

肝火而致者若兒肝經熱用梔子清肝散兒啼躁怒用芎藭氣散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火氣逆用加味逍遥散小腹作痛小便澁滯用龍膽瀉肝湯久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔車前子不時寒熱者加味小柴胡湯經云肝氣熱則莖痿宗筋弛縱腎囊腫脹或出白液痒痛或裹急筋縮挺縱不收或精隨便下者此名筋疝俱屬肝火不係於腎宜詳治之

治驗

一小兒陰囊赤腫余作胎毒治痊後發熱瘡盛等症診其母素有鬱熱用加味歸脾逍遥二藥于母俱服而愈後吐瀉小便赤澁兩目瞤動視其寅卯二關脉赤此屬肝經風熱也用柴胡清肝散加釣藤鈎木賊草而愈

一小兒陰莖作痒小便頻數此屬肝火之症反服五苓散頸間結核余用柴胡梔子散四味肥兒丸諸症稍愈又用蝦蟆丸而痊

一小兒莖痿濕痒後陰囊瘃腫莖中作痛時出

白津余診之肝火也用龍膽瀉肝湯六味地黃丸而愈

一小兒睾丸作痛小便赤澁寒熱作嘔乃肝脾之病用小柴胡湯加山梔車前子茯苓而愈

一小兒睾丸腫韌小便黃澁用小柴胡湯加車前子山梔并蘆薈膏丸而消

一小兒莖中作痒一小兒下疳潰爛作痛發熱小便秘濇日晡尤盛一小兒莖中潰痛小便赤出水連劄項間結核陰囊搔痒俱屬肝火

之症俱用九味蘆薈丸而愈

一小兒小便澁滯陰囊腫痛寒熱此肝經濕熱也用龍膽瀉肝湯而消但內熱倦怠此兼脾氣虛也用四君柴胡山梔芎歸而愈

一小兒陰囊赤腫因乳母怒氣及飲酒而發余審之因於怒則用加味逍遙散因於酒則用加味清胃散並加蒲蘆乾葛神麯與母子服之隨愈

一小兒陰囊腫痛小便赤澁用加味小柴胡湯

加蒲蘆毋子並服而愈

一小兒禀肝腎虛弱罹疹後常腫用六味地黃丸料加柴胡毋子並服兩月餘而痊

劉武庫子華先作痛小便赤澁寒熱作嘔用小柴胡湯加山梔車前子茯苓而愈

一小兒腹內一塊攻痛小便不調用龍膽瀉肝湯蘆薈丸而愈後形氣消爍發熱作瀉此肝木制脾土也用補中益氣湯及蘆薈丸而愈

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中作痛或小便澁滯等症

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉各二分　車前子炒

木通　生地黃酒拌　當歸酒拌

山梔炒　黃芩炒　甘草各二分

右水煎服

四君子湯

加味逍遙散

加味清胃散

加味歸脾湯 四方見內劍

五苓散 方見五淋

九味蘆薈丸 方見疳症

補中益氣湯 方見虛羸

加味小柴胡湯 方見痙症

六味地黃丸 方見腎臟

梔子清肝散

柴胡清肝散 二方見發熱

四味肥兒丸 方見寒吐

四苓散 即五苓散去肉桂

渴症

百問云小兒唇紅如丹即發渴紅甚焦黑則危篤若三焦虛煩作渴者用三黃湯傷寒後唇口焦者用白虎湯竹葉湯瀉痢作渴者用四苓散之類治暑積心脾煩渴引飲者用白虎湯下利脾虛作渴者用七味白术散熱結膀胱小便秘渴者用五苓散上焦虛熱者用四君子湯膏粱積熱者用清胃散脾胃積熱者用瀉黃散中氣虛熱者用異功散腎水虛熱者用六味丸其餘疳症發熱各詳本

症胎禀所致者當各審其因若誤用寒涼降火脾胃復傷則腹脹而爲敗症矣

治驗

一小兒發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎仍欲瀉火余曰鼻準青白多而黃色少屬脾胃虛寒肝木所侮益口角流涎胃氣不能統攝也大便重墜脾氣不能上升也不信兄用涼劑果胃虛微搐余曰此虛極而變慢脾風矣用六君當歸木香炮薑釣藤鈎二十劑益甚意欲更劑余曰此藥力未及也仍以前藥加附子一片服之即安去附子又二十劑而愈

一小兒吐瀉後患瀉症飲食少思肌體消瘦用七味白术散瀉漸止五味異功散加升麻飲食漸進又用補中益氣湯肌肉頓生

一小兒嗜膏粱甘味發熱作渴小便白濁用四味肥兒丸佐以瀉黃散稍愈復傷食吐瀉服消食丸胃氣復傷飲食少思肢體倦怠而瀉先用七味白术散而渴止次用五味異功散而痊

一小兒面白色白患瀉症嘔痰發熱服清熱化痰之藥大便洞瀉小便頻數此脾腎虛而復傷也朝用補中益氣湯夕用四神丸諸症漸愈又佐以六味地黃丸而愈

一小兒十五歲用心太過兩足發熱日晡益甚人參固本丸之類熱益甚痰涎上湧體倦更嘔痰服化痰滋陰之劑痰熱益甚頭自眩運體倦少食請余治仍欲清熱化痰滋陰余曰兩足發熱腎經陰虛也痰涎上湧腎不能攝也頭目眩運胃氣不能上升也此稟賦不足勞役過度而然耳遂朝用補中益氣湯夕用加減八味丸元氣漸復諸症漸愈但用心於功課即頭運發熱用前藥倍愈畢姻後諸症復作服前藥半載而痊後再發更大小便牽痛用補中益氣湯八味地黃丸獨參湯而得生

竹葉石膏湯

石膏一錢　半夏三分　麥門冬十粒　竹葉一撮　甘草　人參各一分

右生薑汁一匙水煎服
三黃湯
黃芩　黃連
右水煎服
白虎湯 方見發熱
五苓散 方見五淋
七味白朮散 方見積滯
四君子湯
六君子湯

清胃散
異功散 四方見內鈎
六味丸 方見腎臟
四苓散 即五苓散去桂
補中益氣湯 方見虛癆
四味肥兒丸 方見寒吐
消食丸 方見嘔吐乳
四神丸 方見驚瀉
煩躁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

仲景云火入於肺則煩入於腎則躁夫心者君火也火旺則金燔水虧而火獨存故肺腎合而爲躁也活人云但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒鼻不疼故知非傷寒也頭不痛脉不緊故知非裏寒也不可發汗攻下當與竹葉湯兼服若虛則先煩而後渴翕翕發熱其脉浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾爲內熱故屬陽躁者肢體躁動或裸身欲入井中爲外熱故屬陰外熱者無根之火也是以爲虛在小兒當辨

其嗌煎不安是煩嗌唯不定是躁嗌煎者心經有熱精神恍惚煩滿生驚嗌唯者心經有風煩躁驚掣也統其大者黃連解毒湯輕者導赤散風熱者至寶丹脉數而實便閉有熱者神芎丸此皆實熱之治法也若煩而頭痛短氣口乾咽燥不渴者虛也用四君加芎歸因藥攻伐而作渴者用竹茹湯煩而不得眠者酸棗仁湯心神顛倒煩熱欲吐者朱砂安神丸面戴陽目內赤六脉洪大按之全無者血虛發躁用當歸補血湯若躁而裸體欲入井中

脉沉細或浮大按之如無者此皆陰盛發躁也宜用參附湯有同生之功

治驗

一小兒煩躁驚悸熱渴飲冷額間色赤此心經實熱所致先用瀉心湯一服稍緩又用柴胡梔子散而瘥

一小兒痢後發熱煩躁用四君當歸升麻柴胡頓安又用補中益氣湯而愈又傷食作瀉前症復作吞酸先用異功散加吳茱萸木香爲末二十服吞酸悉止乃去茱萸木香治之而安

一小兒潰瘍煩躁驚擡撮空用六味地黃丸將煎服以滋腎肝用五味異功散以補脾肺漸愈又用八珍湯而瘥

一小兒患癍疹服發汗之藥煩躁作渴先用當歸補血湯及東垣聖愈湯諸症漸安又用八珍湯加麥門冬五味子而愈

一小兒痢後煩躁作渴面赤脉大按之如無此血脫煩躁也先用當歸補血湯又用五味異功

散加升麻當歸而安又傷食作瀉不已復煩躁用異功散爲主佐以八珍湯而安

一小兒患瘰癧服下毒之藥發熱煩躁口渴作嘔此元氣復傷用八珍湯倍加參芪歸水治之漸安又用四君當歸升麻而安

清熱解毒丸治五臟積熱毒氣上攻胸膈煩悶咽喉腫痛赤眼壅腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱心煩躁而渴飲食不下

寒水石　石膏各八兩　青黛四兩

右研末入青黛和勻蒸餅七箇水調爲丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下如中諸毒並宜服之及驚風潮熱痰涎壅塞心胸煩躁煩赤多渴坐卧不穩每服半粒量大小加減

橘皮湯

橘皮一兩　甘草炙半兩　人參二錢五分　竹茹半兩

右每服五錢薑水煎食前服

東垣聖愈湯治諸瘡出血多而煩躁不得眠

熟地黃　生地黃　當歸身　黃芪各一錢　人參各五分　川芎

右水煎服

瀉心湯治心經實熱口舌生瘡煩躁發渴

宜黃連　犀角各等分

右水煎服

黃連解毒湯方見諸痛

竹茹湯方見嘔吐乳

酸棗仁湯方見驚癎

朱砂安神丸方見疳症

神芎丸

至寶丹二方見驚風

導赤散方見心臟

異功散

四君子湯二方見內鈎

泄瀉

脾爲太陰位屬坤土喜燥而惡濕故凡脾胃之氣

不足者遇長夏潤濕之令則不能升舉清陽健運
中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰
不收兩脚痿弱嗜卧發熱精神不足飲食少思口
中無味呼吸短乏氣促目中視物朦朧小便赤數
大便不調名曰注夏此皆稟賦陰虛元氣不足之
症丹溪補陰論言乏嗣矣育予者其可不知冬月
養陽之道乎治法用補中益氣湯去升麻柴胡加
炒黑黃柏主之若因勞役發熱血虛脉大者用當
歸補血湯氣血兩虛者八珍湯肝腎陰虛者地黃
九大便作瀉者人參理中湯若乳母肝火乘脾寒
熱少食者柴胡梔子散胃火作瀉者竹葉石膏湯
小兒多因乳母之氣不調而致當戒怒氣調飲食
適寒溫則可以遠病矣又如今人夏月皆以香薷
湯浸冷代茶飲之殊不知香薷利水大損元陽厚
朴散伐大瀉眞氣況脾性喜溫而惡寒夏月陰盛
於內冷藥傷脾若胃强有火濕熱爲病之人固無
大害其脾胃虛弱中氣不足者必爲腹痛少食泄
瀉寒中之疾矣此大人亦所當戒者況小兒乎愼

之慎之

治驗

一小兒每春夏口乾發熱煩悶嗜臥勞則頭痛服清涼化痰之藥喘瀉煩躁不安服香薷飲脈大神思昏憒余用補中益氣湯去升麻柴胡加五味麥門炮薑二劑未愈又加肉桂五分即甦更用六味丸而愈

一小兒稟脾腎虛弱汪夏發熱二十便不調朝用補中益氣湯夕用地黃丸而愈後因乳母怒氣致兒發熱驚搐用柴胡梔子散母子並服而瘥

一小兒素有食積汪夏發熱倦怠少食大便不實朝用五味異功散少加升麻柴胡夕用四肥兒丸而尋愈

一小兒稟賦腎虛患汪夏之症因乳母大勞則發熱益甚用補中益氣湯令母子並服而愈後因乳母多食膏粱又患瘡疾頻躁作瀉先用竹葉石膏湯及補中益氣湯瘥母着怒氣大熱發搐用柴胡梔子散加味逍遥散而瘥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一小兒注夏食生冷之物腹中作痛之甚則發搐厥冷用八參理中丸而愈

一女子年十四患注夏經行之後發熱晡熱頗躁作渴面赤脈洪大按之如無此血脫發躁先用當歸補血湯四劑又用八珍湯而安

八珍湯 方見自汗

地黃丸 方見腎臟

八參理中湯 方見冷瀉

柴胡梔子散 方見急驚

竹葉石膏湯 方見泄瀉

五味異功散 方見內鈎

四味肥兒丸 方見寒吐

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛鎧編集

男薛已治驗

後學宋璞校閱

自汗

自汗者汗無時而自出也經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞作汗出於脾又曰陰虛而陽必鞕則發熱而自汗陽虛而陰必乘則發厥而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

自汗東垣云表虛自汗秋冬用桂春夏用黃芪丹溪云汗者心之液也自汗之症未有不由心腎俱虛而得之者巢氏云虛勞病若陽氣偏虛則津液發泄而爲汗夫自心爲王陽之藏火也陽王氣不身津液隨其陽氣所在之處而生亦隨其火所襲之處而泄則爲自汗矣治法當用參芪甘溫益氣之藥使陽氣外固而津液內藏則汗止矣若元氣虛者夏月用六君子湯加山藥山茱萸冬月用加減八味丸十全大補湯血虛者四物加參芪有熱者當歸六黃湯氣血俱虛者十全大補湯心腎虛熱者六味丸虛寒者八味丸心經血虛者團參湯胃經氣虛者六君子湯飲食勞倦者補中益氣湯嗜卧倦怠者升陽益胃湯熱傷元氣者清燥湯暑干心胞絡者清暑益氣湯外傷風邪者惺惺散虛勞羸瘦者人參養榮湯思慮傷脾者歸脾湯怒動肝火者小柴胡湯肝經虛熱者加味逍遥散肝經濕熱者龍膽瀉肝湯泄瀉脉微者人參理中湯手足汗者補中益氣湯胃腹汗者四君子湯當心一

片有汗者茯苓補心湯黃汗者茵陳五苓散血汗者餘散敷之此皆二云汗之大法也仍推五臟相勝主之若汗出如油喘而不休此爲命絕柔汗發黃此爲脾絕汗出不流如貫珠者爲繻汗數者並不治若六陽虛則汗出上至頭下至項亦難治

治驗

一小兒四歲因驚自汗左關無脈以此爲憂余曰肝主驚此稟肝氣不足因驚則氣散脈必在臂腕於尺部盡處候之果得用補中益氣湯六

味地黃丸半載脈復本位其脈在合谷之間者皆自幼被驚而然也

一小兒五歲因驚自汗發熱虛症悉具右寸脈短此胃氣復傷也用獨參湯月餘又用補中益氣湯仍佐以六君子及加味地黃湯半載而愈

一小兒自汗目直項強頓悶余謂肝經實熱先用柴胡梔子散隨用六味地黃丸而愈後因驚自汗咬牙呵欠屬肝經虛熱生風用六味地黃丸補中益氣湯而痊後又驚自汗怔忡面赤發

熱悉屬肝經虛熱用六味丸而愈

一小兒自汗面青善怒小便頻數睡間驚悸或發搐目直此肝火血燥生風也先用加味四物湯加味逍遥散各四劑與間服諸症漸愈又用四君山梔而愈

一小兒自汗盜汗頸間結核兩目連瞤此兼肝脾疳症也用四味肥兒丸及大蕪荑湯而痊後每傷食發熱便血自汗用五味異功散加升麻柴胡漸愈又用六味地黃丸而痊

一女子十四歲自汗寒熱月經先期余謂肝火血熱用加味逍遥散地黃丸而痊後因怒經行不止自汗盜汗先用加味小柴胡湯次用加味逍遥散而愈

一小兒自汗吐哭發熱作渴飲水抽搐仰睡乃心經實熱也用導赤散治之而愈後又自汗發熱飲湯抽搐無力驚窜咬牙覆睡面赤心經虛熱也用茯苓補心湯而愈

一小兒自汗惡風用補中益氣湯加炒浮麥而

止因飲食停滯患吐瀉用六君子湯而愈又用四君當歸浮麥而汗止出痘時自汗盜汗用十全大補湯而痘愈後因傷風咳嗽自汗腹脹余謂脾肺俱虛宜用六君桔梗因感於人言先服發表之劑更加氣喘盜汗余用四君五味子炮薑四劑不應每劑又加人參五錢炮薑一錢稍止又三劑而痊

十全大補湯治諸虛不足自汗不食時發潮熱等症

白茯苓　人參　當歸　白朮
黃芪炒　川芎　肉桂　白芍藥炒
熟地黃　甘草炙　等分

右㕮咀每服二十五錢薑棗水煎服

八珍湯前方去肉桂黃芪治驗見各門

人參養榮湯治病後時自汗或發潮熱口乾食少心虛驚悸欬而下利前方去川芎加陳皮五味子遠志

百解散治感冒風邪發熱自汗者

荊芥　白芷　麻黃去節　陳皮　蒼术　甘草炒各三分

右薑三片葱白三莖水煎服

清暑益氣湯治暑邪干衛身熱自汗

黃芪一錢　蒼术泔浸去皮一錢　升麻七分　人參　白术　陳皮炒　神麴炒　澤瀉各五分　甘草炙　黃蘗酒浸炒　當歸身　麥門冬去心　青皮炒　葛根各三分　五味子九粒杵

右水煎服

茵陳五苓散治伏暑發黃煩渴小便不利

赤茯苓　猪苓　茵陳各三分　澤瀉　白术

右水煎服

血餘散治汗不止

用男子亂髮一握煅存性爲細末以絹袋盛置乾濕之

清燥湯治小兒自汗或因熱傷元氣大小便秘澁

黃芪炒　蒼术各五分　白术　陳皮

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

澤瀉　人參　白茯苓　升麻，
麥門冬　當歸身　生地黃　神麴　炒
猪苓　黃柏　酒拌炒　五味子　五粒
黃連　炒　甘草　炙各二分
右薑一片水一鍾煎服
升陽益胃湯　方見諸痢
六君子湯
加味歸脾湯
四君子湯
加味逍遥散
五味異功散　五方見內
柴胡梔子散　方見發熱
小柴胡湯　方見肝臟
補中益氣湯　方見虛羸
龍膽瀉肝湯
人參理中湯
茯苓補心湯　三方見悸
團參湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

當歸六黃湯 二方見盜汗

惺惺散

四物湯 二方見急驚

六味丸

加味八味丸 即六味丸加肉桂五味子方見腎臟

四味肥兒丸 方見寒吐

大蕪荑湯 方見疳症

導赤散 方見心臟

盜汗

盜汗者睡則汗出寤則汗收也自汗屬陽虛盜汗屬陰虛蓋陽爲衛氣陰爲榮血血之所主心也所藏肝也熱搏於心故液不能內斂而外泄於皮膚人臥則靜而爲陰覺則動而爲陽故曰自汗屬陽盜汗屬陰也多因心腎不交水火不能既濟腎虛則閉藏之令失守故有是症宜用六味丸十全大補湯血虛內熱者當歸六黃湯心經有熱者導赤散肝經虛熱者六味地黃丸血脫盜汗者當歸補血湯肝膽風熱者柴胡清肝散食積內熱者二陳枳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

實山梔胃氣虛熱者六君子湯及浮麥散血氣俱虛者人參養榮湯餘症見自汗當參覽之

治驗

一小兒十六歲面色青白或惡寒發熱鼻閒薰白盜汗自汗胸膈不利飲食少思常懷畏懼用二陳黃連酸棗茯神之類不應余以爲脾肺俱虛不信自用朱砂安神丸更寒熱往來泄瀉不食余用六君當歸黃芪而愈

一小兒五歲腹中作痛大便不實患盜汗鼻閒左腮皆白此脾肺氣虛而食積所致也用六君山查神麴四劑腹痛頓止去查麴又四劑大便調和乃用四君歸芪而汗止

一小兒十二歲患盜汗形氣瘦弱面色或赤或白右顴白兩頰赤鼻閒微青此稟足三陰經虛也朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸而愈

一小兒久患盜汗夜熱晝涼飲食少思太便酸臭此食積內作也先用三稜散消導積滯又用五味異功散補脾進食而瘥

一女子十四歲自汗寒熱肝脉弦洪此肺火所致用加味逍遥散而愈後飲食停滯吐痰眩運頭面不時汗出兩寸脉不及本位用補中益氣湯加半夏蔓荆子而痊

一小兒三歲盜汗不食聞藥即嘔此胃氣傷也用浮麥炒爲末以乳調服錢許旬餘嘔止食進佐以六君子湯而愈

一小兒發熱呵欠頻悶咬牙至夜盜汗屬肝膽火症用小柴胡湯加山梔二劑又用地黄丸料

煎服而愈

一小兒盜汗甚多久不愈寸口脉沉伏飲食少思稍多食則腹痛汗不止余謂脾虚食積用六君升麻柴胡月餘脾氣漸健飲食漸加汗亦少止乃佐以異功散乃痊

一小兒苦盜汗肢體消瘦因功課勞役更加自汗余用補中益氣十全大補二湯而愈次年因勞心前症復作更加夢遺仍用前二湯各五十餘劑而愈畢姻後前症俱作手足並冷前藥又

各加薑桂一錢數劑少應至六十餘劑而愈因太勞盜汗如雨手足如氷再以前二藥加桂附各一錢數劑方愈

當歸六黃湯治血虛盜汗內熱脩熱者

當歸 熟地 各五分 黃連 炒黑 三分 生地黃 炒黑 各三錢 黃柏 炒黑 黃芩 炒 三分 黃芪 炒 五分

右水煎服

團參湯治虛汗盜汗

新羅人參 三兩 當歸 三錢

右爲末用雄猪心一箇切二片每服以猪心一片煎湯調服一錢

白朮散治自汗盜汗

白朮 三兩 小麥 炒 一合

右用氷一鍾半煮乾去麥爲末以炒黃芪煎湯量兒大小調服忌蘿蔔辛辣炙煿之類乳母尤忌

六味地黃丸 方見腎臟

人參養榮湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

十全大補湯 二方見自汗
導赤散 方見心臟
柴胡清肝散
當歸補血湯 二方見發熱
二陳湯 方見寒吐
六君子湯
四君子湯
五味異功散
加味逍遥散 四方見內鈎

小柴胡湯 方見肝症
三稜散 方見白濁
補中益氣湯 方見虛贏

噫氣

經曰脾病則面黃善噫噫者寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃而爲噫又善思善味其症當膈有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜卧四肢不收經曰脾主四肢有是者脾也又曰二陽一陰發病主驚駭背痛善噫何謂也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

竊謂上焦受氣於中焦中焦氣未和不能消穀故爲噫耳中焦亦脾胃之分也脾土虛寒由命門火衰不能温蒸水穀古人有服兎絲子旬日間飲食加味湯沃雪亦此義也補脾宜人參理中湯補右腎宜用八味丸胃氣虛不能運化水穀者六君子加木香鬱結傷脾者加味歸脾湯木尅土者四君柴胡升麻兼漕穢者加吳茱萸半夏治者審之

治驗 仍參虛羸症

一小兒稟賦虛羸時常作痢年十二歲泄瀉不食手足並冷諸藥不應余謂命門火衰六君子湯八味丸治之尋愈畢姻後勞心過甚飲食頓少發熱下氣先用參朮各五錢薑棗煎服諸症稍愈又用六君子湯加炮薑肉桂參朮各一兩一劑諸症頓愈又因勞心發熱煩渴用補中益氣湯加附子一錢渴止用參芪各一兩歸朮各五錢附子一錢三劑全瘥

一小兒十五歲喜噫面黃腹脹飲食難化用六君子湯加炮薑肉桂參朮各一兩一劑諸症頓愈又因勞心發熱煩渴用補中益氣湯加附子一錢渴止用參芪各一兩歸朮各五錢附子一錢三劑全瘥

一小兒十五歲喜噫面黃腹脹飲食難化用六君君益智木香漸愈後因怒兼脇痛少食下氣噫

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

氣用補中益氣湯加附子益智漸愈後飲食過
多腹脹吞酸服保和丸熱渴痰甚用二陳黃連
石膏之劑大便不止吃逆不食手足並冷余用
六君附子四劑稍愈又以補中益氣湯加附子
及八味丸而遂安

一女子十九歲患前症用六君子湯送四味茱
萸丸而愈但怒即發服此藥亦即愈後因怒氣
勞役前症復作血崩不止先用柴胡梔子散一
劑隨用補中益氣湯加山梔而痊仍參虛羸治

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

驗

本事枳殼散治心下痞悶或作痛多噫

枳殼　白术　各半兩　檳榔三錢　香附子炒一兩

右爲末每服一錢空心米飲調下

四味茱連丸治腹脹噫氣吞酸食不能化

吳茱萸炒　黃連炒　神麴　荷葉　各等分

右爲末水煮神麴糊丸桐子大每服二十丸白
湯下黃連當量病微甚或炒黑炒黃用之

八味丸即六味丸加五味子肉桂方見腎臟

四君子湯

六君子湯

加味歸脾湯 三方見內傷

補中益氣湯 方見虛羸

下氣

劉河間云腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故喜噫下氣也若癲癇勞瘵氣下泄而不止者必卦乃眞氣竭絕腠理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出糞全善云下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下氣爲泄者是也經又云飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行此平人也若七情內傷六淫外侵飲食不節房勞過度致脾土之陰受傷轉運之官失職不能輸化故下氣也又曰陰精所奉其人天陰精者乃五穀之精上榮心肺以降腎肝故曰其人壽陽精者乃胃中之清氣陷入腎肝不能升浮上輸心肺故曰其人夭若飲食過多腸胃

鬱結用平胃散癲癎勞瘵者用補心丸及人參理中湯若下泄不已者不治

治驗

一小兒飲食素所不節又食藏氣之物腸胃秘結小便不利而患此以平胃散後用理中湯而愈

一小兒年十五歲勞心大過飲食頓減發熱下氣先用參朮各五錢薑棗煎服諸症稍愈

一女子素禀虛弱後又勞心女工發熱煩渴下

氣余用補中益氣湯加附子又用參朮各一兩歸朮各五錢附子一錢二劑全痊

一小兒十四歲因怒脇痛少食患此用補中益氣湯加附子一錢益志一錢而漸愈後因飲食過多腹脹吞酸噫氣以保和丸服之熱渴痰甚又以二陳湯加黃連石膏之劑大便不止嘔逆不食手足並冷余用六君子湯加附子一錢四劑稍愈又以補中益氣湯加附子一錢兼服八味丸而遂安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一女子患前症余用六君子湯送四味茱萸丸而愈但因怒氣相觸前症即發即服前二湯丸其病尋愈後因甚怒兼勞役大過前症復作更又血崩不止余先用柴胡梔子散一劑隨用補中益氣湯加山梔而痊

一小兒脾土虛寒患此余以人參理中湯加兎絲子一錢以補脾氣四劑又以六君湯而安後因勞心功課發熱煩渴前症益甚又用柴胡梔子散兼以補中益氣湯而愈

一女子年十六患此先用參朮之藥不應用六君子湯送四味茱萸丸而愈後又因怒氣勞役前症益甚更兼發熱用柴胡梔子散二劑隨以補中益氣湯而痊

平胃散 方見虛寒

補心湯 方見瘡

補心丸 即茯神散爲丸方見驚悸

補中益氣湯 方見虛贏

人參理中湯 方見驚瀉

越鞠丸

六君子湯

加味歸脾湯

加味逍遙散 四方見內鈐

本事枳殼散 方見前症

柴胡梔子散 方見發熱

四味茱連丸 方見噫氣

八味地黃丸 方見腎臟六味丸加肉桂附子

不寐

經曰陽明胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥又曰胃不和則臥不安夫人身之衛氣晝則行於陽夜則行於陰陽主動陰主靜寤則魂魄志意散於府藏發於耳目動於肢體而爲人身指使之用寐則神氣各歸五宮而爲默運之妙矣若脾胃氣盛則腑臟調和水穀之精各各融化以爲平和之氣若胃氣一逆則氣血不得其宜腑臟不得其所不寐之症由此生焉當用四君遠志酸棗仁肝腎虛熟者六味丸心

血不足者眞珠母丸思慮過度者歸脾湯精神短
乏者人參養榮湯病後餘熱者酸棗仁湯膽虛不
得眠者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯
振悸不得眠者四君生薑酸棗仁夜啼驚哭不寐
各詳別症當參求之

治驗

一小兒患瘡潰後飲食少思倦怠不寐先用四
君茯神當歸陳皮飲及飲食頓加乃佐以八珍散爲
末時服錢許漸得寐又因驚汗出發熱不寐用
異功散加柴胡山梔汗熱頓止仍服四君八珍
之藥得寐又飲食倍滯腹痛吐痰不寐汗出用
六君柴胡升麻山查而安

一小兒十四歲勤於功課徹夜不寐飲食無味
早間用補中益氣湯午後用異功散飲食漸有
味夜稍得寐仍用補中益氣湯八珍湯而愈畢
姻後不寐兼遺精盜汗用補中益氣湯六味地
黃丸而愈

一小兒痢後不食少寐或兼盜汗先用異功散

加升麻當歸飲食漸進佐以補中益氣湯稍得寐四年後因用心記誦患目汗不寐飲食甚少用補中益氣湯加味異功散而愈

一女子十七歲喪母過哀不寐發熱或寒熱此脾血虛而火動也用加味逍遥散加味歸脾湯治之尋愈後因飲食怒氣不寐腹痛先用六君柴胡升麻而痛止仍用前二藥而得寐

仲景酸棗湯治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁炒一錢　甘草　知母炒　茯苓　芎藭　生薑各五分

右水煎服

本事鱉甲丸治膽虛不得眠四肢無力

鱉甲　酸棗仁炒　牛膝酒炒　人參各一兩　黃芪炒　茯苓各一錢　五味子

右水煎服

秘旨安神丸治心血虛而不寐或睡中驚悸或受驚嚇而作

人參　半夏湯泡　酸棗仁炒　茯神各一錢

當歸（酒洗） 橘紅 赤芍藥（炒）各七分 甘草（炙）三分 五味子（杵）五粒

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

人參養榮湯治脾肺俱虛發熱惡寒肢體痠倦食少口乾欬而瀉痢驚悸自汗不寐等症

白芍藥（錢半） 人參 桂心 當歸 熟地黃（七分） 遠志（五分）

右每服二十二錢薑棗水煎

陳皮 黃芪（蜜炙）各一錢 白朮 甘草（炙）各一錢

四君子湯方見內鈎

六味丸方見腎臟

歸脾湯方見內鈎

人參竹葉湯

加味小柴胡湯二方見肝症

八珍散

異功散

六君子湯

補中益氣湯四方見虛證

加味逍遥散

加味異功散

八珍湯 三方見內鈎

驚悸

驚悸者心神恐懼邪氣乘心也目睛不轉口不能言診其脉動而弱者動則爲驚弱則爲悸哭而不啼多泪是也宜急調治否則他症隨之用四物安神之類丹溪謂亦有屬痰者宜用温膽湯加辰砂遠志之類若思慮便動虚也用養心湯時作時止

痰也用茯苓丸觸事易驚心膽虚怯也用温膽湯臥驚多魘血不歸源也用眞珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定志丸恐畏不能獨處膽氣虚冷也用茯神湯聽臥煩躁膽氣實熱也用酸棗仁丸眩運驚悸風痰內作也用本事辰砂遠志丸思慮鬱結脾虚氣滯用歸脾湯前症雖曰屬心與肝而血之所統實主於脾脾之志曰思思慮多則血耗損而不能滋養於肝心者脾使之也思慮內動未嘗有不役其心者夫心爲君火之藏十二官之主也

夫君之德不怒而威無爲而治故宜鎮之以靜謐戒之以安動動則相火翕合煽燥陰精精血既虧則火空獨發是以驚悸怔忡之所由生五志之火所不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者不可不知鎮靜而寡慾然人孰無思也思之正則無妄動之慾矣朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉此善養於心者也

治驗

一女子素血虛驚悸出嫁後更怔忡晡熱月經過期用八珍湯加遠志酸棗仁二十餘劑漸愈佐以歸脾湯全愈後因勞怒適經行不止前症復作先用加味逍遥散熱退經止又用養心湯而痊

一小兒十五歲徹夜用功記誦去後少寐仍不戒勞患怔忡發熱不止用歸脾湯爲主佐以八珍湯諸症漸愈後復作服歸脾定志二藥即愈

一小兒十五歲因用心太過少寐驚悸怔忡惡寒先用補中益氣湯茯苓酸棗仁遠志惡寒漸

止又用加味歸脾湯驚悸稍安又用養心湯而
痊

一小兒驚悸睡卧不安發熱飲冷用治要茯苓
散而愈又因勞役恚怒發熱吐痰自汗用溫膽
湯二劑而安又用歸脾湯寧志丸而愈

一小兒十三歲善思多憂體倦發熱心懷畏懼
必多人相伴乃止用茯神湯佐以歸脾湯兩月
餘漸愈畢姻後前症復作加寒熱頭運先用前
二湯而驚悸愈後用十全大補湯補中益氣湯
諸症漸愈後因科舉入場勞役朝寒暮熱自服
前二湯各三十餘劑不應時仲秋脈虛大按之
微細面白腹痛亦用前方倍加肉桂乾薑四劑
亦不應遂以八味丸料煎服四劑稍緩又四劑
漸愈乃用八味丸十全大補湯而安

一女子十五歲性沉靜被盜所恐遂驚悸腹脇
脹痛寒熱往來不食無寐善思恐懼用酸棗仁
丸歸脾湯加味逍遙散而尋愈出嫁後因喪子
兼大勞驚悸無寐吐痰發熱飲食少思胸腹脹

脹服化痰藥日吐痰四五碗時考瘕至京請治
余謂脾肺虛寒不能攝涎化食而爲痰也用六
君乾薑六劑其痰益甚手足並冷用前藥每加
附子一錢仍不應乃用人參一兩附子二錢四
劑始稍緩又二劑仍用六君加薑附各五分數
劑後易桂治之而愈
溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致
心驚膽怯氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或短
氣悸乏或復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲

作矣
半夏洗湯 竹茹
甘草炙一兩 白茯苓一兩五錢
枳實麩炒 橘皮各二兩去白
右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分
食前服

寧志丸治心虛多驚若有痰宜吐之
人參 白茯苓
琥珀 當歸
遠志炒各半兩 酸棗仁溫酒浸半日去殼
朱砂 石菖蒲各三錢

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸食後棗湯下
茯神散治五臟氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神
定志

茯神去木　人參　龍齒另研　遠志去心
桂心　防風　獨活　酸棗仁
細辛　白朮炒各三錢　乾薑炮三兩

右爲末每服四五錢水煎服蜜丸亦可
治要茯苓補心湯治心氣不足喜悲愁怒衄血面
黃五心煩熱或咽喉間痛舌本作強方見瘡

茯神湯治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨
處胸中煩悶

茯神去木　酸棗仁炒黃　芎藭炒　梔子仁炒
白芍藥炒　五味子炒　杵　桂心
人參各一兩　甘草五錢炒　熟地自製

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸治膽氣實熱不得睡臥神志不安驚悸
怔忡

茯神去木　酸棗仁炒　遠志去心　栢子仁炒

防風各一兩　枳殼炒五錢　青竹茹錢半　生地黃杵膏五錢

右爲末蜜丸梧子大每服七八十丸滾湯下

定志丸治心神虛怯所憑同前或語言鬼怪喜笑驚悸

人參　茯苓各一兩半　菖蒲遠志去心各一兩

右爲末蜜丸如前服

治要茯苓散治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心神恍惚

茯神兩半　麥門冬兩半通草　升麻各一兩二錢半

紫菀七錢五分　桂心七錢五分　知母一兩　大棗十二枚

淡竹茹五錢　赤石脂一兩七錢五分

右每服一兩水煎

朱雀丸治心病怔忡不止

白茯苓二兩　泥香半兩

右爲末蜜丸小豆大每服三十丸人參煎湯下

世傳蜜陀僧散治驚氣入心絡不能語者昔有人爲狼及犬蛇所驚皆以此而安

蜜陀僧研極細末如粉

右茶清調二一錢七
丹溪硃砂丸治勞役心跳
硃砂　當歸身　白芍藥　側栢葉各二錢
川芎　陳皮　甘草　黃連炒各一錢五分
右用猪心血爲丸粟米大每服百丸龍眼湯下
本事辰砂遠志丸消風化痰鎮心安神
人參　石菖蒲去毛　遠志去心　茯神各一兩
川芎　山藥　白附子　麥門冬
細辛　鐵粉　辰砂各五錢
右爲末用生薑汁入水糊丸菉豆大以朱砂爲衣每服二十丸臨臥生薑湯下
歸脾湯
六君子湯
加味逍遥散三方見內鈎
補中益氣湯方見虛羸
眞珠母丸方見不寐
十全大補湯
八珍湯二方見自汗

養心湯 方見驚痫

吞酸

吞酸之症有二一熱與寒也經曰諸嘔吐酸皆屬於熱東垣曰病機作熱攻之誤矣濁氣不降寒藥豈能治之二說侶乎予謂熱者所以指其末也東垣言寒者所以指其本也丹溪用吳茱萸之法亦嘗謂之寒矣然亦當分其虛實而治之若煩熱作渴好食啖物飲食易化是爲實火內熾而胃經熱也宜用清涼飲之類若不渴喜食熱物飲食難化是爲虛火所致而胃經寒也宜用香砂六君子湯之類故東垣云邪熱不殺穀苟誤認爲實熱藥用寒涼之劑而變爲中滿嘔吐反胃之症者皆未傳寒中之敗症也可不愼歟

治驗

一小兒吞酸用六君子湯而愈後傷食復作兼瀉先用五味異功散加升麻乾薑瀉頓止又以六君子煎送四味茱萸丸而愈

一小兒吞酸噯腐發熱口渴先用保和丸二服

以消宿滯又用六君木香乾薑以温養中氣而愈後傷冷粉腹脹痛余用異功散加乾薑諸症漸愈用補中益氣湯加木香漱愈又傷食吞酸腹痛用六君木香二十劑痛止又四劑而愈

一小兒吞酸嗳噦腹脹面白兼青余謂脾肺之氣虛先用補中益氣湯加茯苓半夏二十劑嗳脹悉愈又用六君子湯及五味異功散而愈

一小兒十三歲吞酸每食碗許稍多則瀉或腹脹面色黃或青白此脾肺虛肝木所勝用六君乾薑柴胡升麻間佐以補中益氣湯而痊異姻後兼勤於功課仍吞酸嗳痰服清熱藥大便不實嗜卧少食而似肉痿用前藥各百餘劑而痊

一女子吞酸嗳痰恪用清氣化痰之藥余謂屬中氣虛不信後覺肚腹腫脹大小便淋瀝而歿

六君子湯　加木香砂仁名香砂六君子湯　見內鈎

異功散　二方見內鈎

補中益氣湯

保和丸　二方見虛羸

四味茱連丸 方見噫氣

脾弱多困

丹溪云脾具坤靜之德而有乾健之運夫胃陽也主氣脾陰也主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣清氣上升糟粕下降納五穀化津液其清者爲榮濁者爲衛陰陽得此謂之橐籥故東垣以脾胃爲五臟之根本也脾氣既弱則健運之令不行化生之功已失飢而嗜卧多困所由生焉法當温補其脾脾氣既旺則臟腑清陽之氣升舉易於運行又何困倦之有海藏用四君子加木香半夏白朮倍之薑棗煎服誠良法也若脾虚好睡多驚則是心血虚而火動之宜安神養血若因心脾氣虚有痰者宜用人參五味子茯苓以補心氣當歸芎藭酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若因脾肺氣虚胸膈有痰用補中益氣湯以健脾胃膽星天竺九以化痰薤若因飲食停滯而作用四君子湯以益脾土山查神麯以消飲食若因脾虚而好睡用五味異功散以補脾氣當歸芎藭以生脾

血芍藥須用酒拌炒黃不則酸寒傷脾此假熱以對假寒也若乳母飲酒致兒昏醉好睡者以乾薑陳皮煎湯解之不應用異功散加乾葛即愈矣

治驗

楊永興子年七歲嗜卧兼驚久不愈余曰好睡是脾氣虛困也善驚是心血虛怯也此心火不能生脾土子母俱病用補中益氣湯及六味地黃丸加鹿茸而愈

一小兒因母醉後飲乳困睡不醒遍身如丹瘤先君謂酒毒爲患用葛花解醒湯令子母俱服之而愈

一小兒病後嗜卧飲食少思面色痿黃中隱青色用五味異功散加柴胡升麻爲末每服錢許日二十三次月餘稍愈又飲食過多更患嘔吐手足並冷飲食頓減先用六君子湯加升麻柴胡木香乾薑二劑諸症漸愈又用補中益氣湯爲末日服二十三次月餘而安

一小兒九歲患痢後嗜卧唾痰服化痰藥生痰

益甚而臥床三年矣面色痿黃兼白或時青赤
右關脉微細左關脉弦數余謂肝火乘脾用六
君升麻柴胡三十餘劑而稍健乃以補中益氣
湯間服又各三十餘劑而少愈又五十餘劑而
痊

一女子十二歲患痢後嘈卧唾痰飲食難化胸
腹膨脹服化痰利氣之劑益甚余謂悉屬脾胃
氣虛而飲食化痰痰也朝用補中益氣湯夕用五
味異功散兩月而愈又傷食吐瀉用六君子湯
月餘不應乃以人參五錢乾薑五分薑棗煎服
百餘劑始應仍用補中益氣湯異功散而痊

膽星天竺九治小兒痰涎上壅喘嗽不休

牛膽南星一兩半 夏 湯泡去皮臍姜汁製 天竺黃三錢 天麻
右爲末甘草湯爲丸芡實大每服一丸空心薄
荷淡薑湯化下

五味異功散

六君子湯

四君子湯 三方見內鈎
補中益氣湯 方見虛贏
六味地黃丸 方見腎臟
葛花解醒湯 方見熱吐

尋衣撮空

尋衣撮空許叔微謂之肝熱夫肝主筋筋脉血枯而風引之故手指爲之撮斂也宜確服六味地黃丸間有回生之功錢仲陽用瀉青丸此治肝經實熱蓋尋衣撮空皆病後之敗症耳求其實熱則百無一二矣治者審之王海藏治血脫尋衣撮空摸床手揚搖頭錯語失神脉弦浮而虛血脫內躁熱之極也氣粗鼻乾此爲難治用生地黃連湯主之

治驗

王少參孫女年十二歲脾胃素弱後成疳症發熱小腹膨脹堅直大便溏瀉氣喘咳嗽徹夜煩躁不睡鼻塞眼暗譫語其脉大而無根用人參一兩附子三分腹脹漸減脉漸斂然猶尋衣撮空鼻孔出血用六味地黃丸料一服如脫乃晝

服獨參薑附湯及服地黃丸料脉漸有根諸症漸愈又用六君子補中益氣湯而痊詳見發熱

一小兒停食夜驚腹痛服消食丸瀉數次尋衣撮空面青黃或色白此脾土受傷肺金休囚肝火旺而然耳先用異功散加升麻以補脾土用六味地黃丸料以滋肝血稍定各二十劑漸愈却用補中益氣湯六味地黃丸間以異功散而痊

一小兒受驚駭恪服鎮驚化痰等藥忽患前症眼窩面瘦黃或兼青赤此肝經陰血虛陽氣旺而生風耳當滋肝腎益脾肺遂用異功散而痊

一小兒面瘦黃患瘧癘忽發驚面色青赤此脾氣虛木火相搏而爲患也用補中益氣湯佐以柴胡山梔散二十服加味逍遥散三十服諸症漸退又以地黃丸而遂痊

一小兒流注出膿甚多患前症此元氣虛弱內熱而變耳用八珍湯異功散各數劑方稍緩又數劑而安又補中益氣湯而愈

一小兒膝癰誤觸其膝出血甚多患前症惡寒

面白此陽隨陰散而虛寒用十全大補湯加附子三十分四劑未應用人參一兩附子五分薑棗煎服稍退又二十劑頓退乃朝用異功散夕用八珍湯而安

一小兒傷風表汗後患前症惡風面白手足冷用補中益氣湯加五味子汗頓止而諸症漸退又用四劑而安乃十全大補湯而愈

生地黃連湯治血脫尋衣撮空捉頭妄語

川芎　生地　當歸各七錢　赤芍藥

梔子　黃芩

右每服三錢水煎服

加味逍遥散

異功散

六君子湯三方見內鈎

地黃丸方見腎臟

補中益氣湯方見虛羸

柴胡梔子散方見發熱

瀉青丸方見肝臟

黃連各三錢　防風一錢五分

八珍湯 四物 四君二湯合用
十全大補湯 方見自汗

喜笑不休

經曰心藏神有餘則笑不休又曰在藏爲心在聲爲笑在志爲喜又火大過曰赫曦赫曦之紀其病笑謔狂妄又云少陰所至爲喜笑又云精氣并於心則喜此數者皆言屬心火也若笑不休呻而爲腹痛此水乘於火陰擊於陽陽伏熱生狂妄譫語不可聞心之損矣扁鵲云其人唇口赤色者可治

青黑者死若腎水虧涸不勝心火而喜笑不休者用六味地黃丸肝火熾盛能生心火而喜笑不休者用柴胡清肝散餘兼別症各從其症而參治之

治驗

一小兒喜笑常作不安面赤飲冷手足並熱先用黃連瀉心湯末二服稍定又用六味地黃丸料煎服頓愈常服此丸則安月許不服仍前復作又服愈矣

一小兒患前症面青赤此肝心二經風熱所致

也用柴胡梔子散六味地黃丸漸愈又因乳母大怒發熱先用加味柴胡湯又用加味逍遙散毋子服之並愈

一小兒患前症因乳母大怒患血崩寒熱先用加味逍遙散一劑用當歸補血湯三劑如此治之各數劑毋子並愈

一小兒年十四歲用心過度飲食失節患喜笑不休脉洪大而虛面色赤而或白余用補中益氣湯而愈次秋科舉飲食勞倦前症復作或兼譫語脉洪大按之微細如無用人參一兩薑棗煎服稍定又三劑而愈又勞役用心自汗作渴煩躁似癇症先用當歸補血湯二劑頓安又十全大補湯而尋愈

一女子十六歲面色痿黃素沉靜喜笑不休月經先期用柴胡梔子散加味逍遙散而愈次年出嫁不時復作但作時面赤勇力發後面黃體倦朝用補中益氣湯夕用加味逍遙散而愈後每發悉用前藥即愈

當歸補血湯

柴胡梔子散

柴胡清肝散 三方見發熱

黃連瀉心湯 方見煩躁

地黃丸 方見腎臟

保嬰撮要卷之十終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之十一　續集

古吳薛鎧草創
男薛已編集
後學宋璞校閱

腫瘍

腫瘍者以瘡瘍未潰而言也經云形傷痛氣傷腫又云榮氣不從逆於肉裡乃生癰腫皆因禀受胎毒或乳母膏粱厚味七情陰火或兒食炙煿甘美積毒氣血不和所致當分其經絡所屬五臟相勝

與元氣虧損預爲審用攻補調和之劑速令散潰
尤當審其勢之腫漫色之赤白與痛有微甚毒有
表裏若腫高熾痛便利調和邪在表也宜表散之
腫硬痛深大便秘澁邪在內也宜下之外無拘急
內則便利調和者邪在經絡也宜調榮衛腫熾大
痛或麻木不痛邪氣凝滯也用隔蒜灸及活命飲
若煩躁飲冷赤痛發熱二便不通者火熱內熾也
用清涼飲活命飲加大黃尤善若微腫微痛或不
痛陽氣虛弱也用參芪托裡散微黯微赤或不赤
陽氣虛寒也用加味托裡散若惡寒而不作膿或
膿熟而不潰者陽氣虛也用加味托裡散如此則
未成者自能消散已成者自能潰腐尤當別其屬
陰屬陽或半陰半陽而治之若泥於腫瘍禁用辛
熱之說不分受症之因兼症之經緊行敗毒泛攄
諸經誅伐無過以致不能起發或不能腐潰收斂
變症莫能枚舉癰疽論云腫瘍內外皆壅宜以托
裡表散爲主但見腫痛參之脈症虛弱便與滋補
氣血無虧可保終吉嬰兒有疾兼調其母若腫瘍

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之際治失其法必致潰瘍之變症此推內經之微旨而生平之徵驗者尤當觸類而長愚奚庸贅

潰瘍

潰瘍者以瘡瘍膿潰而言也膿潰而腫消痛止者爲順若膿潰腫痛或發寒熱者氣血虛也用十全大補湯膿潰欲嘔少食脾胃虛弱也用六君炮薑手足並冷者脾氣虛寒也用六君薑桂如不應急加附子膿潰而仍痛或二便秘澁者熱毒未解也用清熱消毒散熱退而渴不退津液不足也用八珍加黃芪麥門山茱萸熱止而小便頻數腎虛也用加減八味丸料若熱不止或腫痛反甚虛熱內作也用人參黃芪湯或熱退而肌肉不生者氣血俱虛也用十全大補湯瘡色天白或陷下不斂寒氣所襲也用五味異功散佐以豆豉餅膿血過多煩躁不安乃亡陽也急用獨參湯尤當審其腫之軟硬飲食冷熱與膿之稀稠多少肉之赤色微甚青黯及瘡口之收斂遲速而投托裡消毒調補之劑庶無變症癰疽論云潰瘍內外皆虛宜以托裡

補接爲主蓋潰瘍之變症因由於腫瘍之際治失其宜虧損元氣之所致治者可不愼哉

胎毒發丹

胎毒發丹者因胎毒內伏或頻浴熱湯或著熱衣或乳母飲食七情內熱助邪爲患發於頭面四肢延及胸腹色赤遊走不定古人云從四肢起入腹囊者皆不治當急令人隨患處遍吮毒血各聚一處砭出之急服活命飲惟百日內忌砭以其肌肉難任也若發散過劑表虛熱而赤不退者用補中益氣湯加防風白芷寒涼過劑胃氣受傷而熱赤不退者用異功散加柴胡升麻或兼發搐等症用四君升麻當歸釣藤鉤若復行攻毒必致不起頭額間患者當臥鍼砭之

史少參孫二歲丙申正月陰囊赤腫余作胎毒治之痊後患發熱瘀盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉兩眼瞤動或投參朮之類不應以爲慢驚欲用附子藥請余議視其寅卯關脈赤此屬風熱傷脾用柴

胡清肝散加釣藤鉤木賊草二劑即愈丁酉正月初旬頸患熱毒膿出貼藥忽暴風啓戸即時發熱翌日頭面黯腫如斗兩耳厚寸許此風邪上攻血得熱而沸騰也急砭兩額出黑血三盞許隨用清熱化毒湯黯腫十退七八翌日復砭則血不甚黑矣仍以前藥去牛蒡子加熟地黃而愈此症若不行砭法或作破傷風治必死

一小兒四肢患之外勢雖輕內則大便秘結此患在臟也服大連翹飲數劑神效散而瘥

一小兒患之赤暈走徹遍身難以悉砭令人吮四肢胸背數處使毒血各凝聚而砭之先用活命飲末酒調二服又以金銀花甘草節爲末用人乳汁調服漸愈月餘後兩足皆腫仍砭之服前藥而瘥數日後兩足復赤或用犀角解毒丸之類致乳食不進肚腹膨脹此復傷脾胃而然也敷神功散服補中益氣湯加茯苓而瘥

一小兒腿如覆片遊走不定先以麻油塗患處砭出惡血其毒即散用九味解毒散而安

一小兒臂患之砭出毒血而愈惑於人言服護心散以杜後患服之吐瀉腹脹患處復赤手足並冷余謂此脾胃虛弱前藥復傷用六君子湯一劑頓愈又以異功散加升麻柴胡而痊

一小兒患此砭之而愈但作嘔不食流涎面黃余謂此脾氣虛弱用異功散加升麻治之吐止食進又用補中益氣湯涎收而安

一小兒患此砭之而愈翌日發搐作嘔手足並冷此胃氣虛而肝木侮之用異功散加藿香木香諸症頓止又用異功散加升麻柴胡而痊

一小兒患此砭之而愈但面赤作嘔飲冷余謂胃經熱毒未解先用仙方活命飲又用清熱消毒散各一劑而愈

一小兒腿上患之神思如故乳食如常余謂毒發於肌表令急砭出毒血自愈不信外敷寒涼內服峻劑腹脹不乳而死一小兒遍身皆赤砭之投以解毒藥而愈

一小兒患此一便不利陰囊肚腹俱脹急用砭法

隨以活命飲加溫蘆木溫大黃爲末時用熱酒調服至兩許一便俱通諸症頓退却去三味仍前時服而愈

一小兒患此一便不利腹脹咳嗽用活命飲加溫蘆木通麻黃爲末時時熱酒調服一便隨通遍身出汗諸症頓退鼻息似絕無氣以動時或似躁此邪氣去而元氣虛也急用當歸補血湯而愈

砭法治丹毒赤色遊走不定令口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取有鋒芒者以筯頭劈開次之用線縛定兩指輕撮筯頭稍令磁芒對聚血處再用筯一根頻擊刺出毒血輕者止用口吮出毒用藥敷之如患在頭者不用砭法止宜用針卧倒挑患處以出毒血遲則毒血入腹而難起矣

神功散治丹毒最効若砭後毒甚者宜用如毒輕者砭後不可用恐砭處皮膚既破草烏能作痛也

仙方活命飲 方見熱毒瘡瘍

清熱化毒湯

清熱消毒散 方見熱毒口瘡
柴胡清肝散 方見脇瘡
補中益氣湯 方見肌肉不生
小柴胡湯 方見脇瘡
大連翹飲
柴芍參苓飲 方見熱毒瘰癧
九味解毒散 方見黃水瘡

傷食發丹

傷食發丹者因脾胃之氣未充乳食過多不能運化蘊熱於內而達於肌表也若因乳食停滯者先用保和丸消之大便秘結量加大黃通之乳食既消而丹尚作者用清中解鬱湯治之丹邪既去而乳食不思者用五味異功散補之發熱作渴或飲食少思者用七味白术散補之大凡飲食厚味所致者赤暈或行而緩慢若飲燒酒或誤吞信石所致者遍身赤暈其行甚速又有瘡瘍發炎周圍有赤暈甚熱消散或膿出自退凡此俱忌砭法皆宜安裡爲主不可攻伐若自吐瀉亦不可止之吐瀉

中有發散之意因飲燒酒者飲冷米醋一二杯解之此神妙之法也因母多食炙煿膏粱或飲燒酒或服辛熱燥藥或鬱怒傷肝脾致兒爲患者當參胎熱毒瘡瘍治之

一小兒面色皎白手足常冷傷食患丹余謂此因脾胃虛弱不信另用劑伐之劑更吐瀉腹痛吐涎不乳口舌生瘡此脾胃復傷而虛寒格陽在外非實熱也先用六君乾薑又用五味異功散而愈

一小兒每停食發赤暈此脾虛食鬱用清中解鬱湯而愈越月忽搥頭咬牙瘛甚發搐嘔吐酸腐此食鬱傷脾也待其吐盡翌日少與白术散而愈又服前散月餘遂不復患

一小兒停食便秘四肢赤色此飲食蘊毒於內用枳實黃連厚朴山查神麴而便通赤解更頭暈咳嗽此脾氣虛而不能生肺金也用六君桔梗以補脾肺山查神麴以消飲食而痊

一小兒患此服發表之劑手足抽搐服驚風之藥目瞤痰甚余謂脾胃虛損肝木所勝之虛象無風

可在無痰可逐用六君子湯一劑而安再劑而瘥
一小兒停食服通利之劑患丹作嘔腹脹此脾氣
復傷也用補中益氣湯五味異功散而愈
一小兒因母食炙煿酒麵兩臂前膊各漫腫一塊
有根四畔赤暈相圍余謂患處屬胃經因胃經積
熱而為患也用清胃瀉黃二散治之而消設謂丹
毒輒用砭法及敗毒之藥反促其危矣
一小兒停食身發赤暈用清中解鬱湯而愈越月
忽搖頭咬牙痰盛發搐吐出酸腐待其吐盡並白
少以七味白木散次日又以參苓白朮散調理脾
胃遂不復患大抵吐後兒安不必服藥也
一小兒停食大便不通四肢赤暈余用枳實厚朴
山查神麴大便遂通赤色亦止更又眩暈呕噦此
乃脾氣虛而不能生肺金也用六君子湯而愈
一小兒停食面赤用清熱發散之藥遂腹脹痰喘
倦怠惡寒此亦脾胃傷而肺金不能生仍用六君
加桔梗以補脾肺又以山查神麴以消餘食頓愈
一小兒患此服發表之劑手足抽搐服抱龍丸日

膈氣喘痰甚此脾胃虧損而成慢驚也無風可祛無痰可逐此虛象也用六君加附子二劑而安再服全愈

一小兒停食患前症服辛熱之藥腹脹加蠱脉洪而數內作膿也不信果便膿而死

保和丸 方見虛羸

五味異功散 方見敗毒之藥

清中解鬱湯

七味白术散

六君子湯

清胃散 四方見腹癰

補中益氣湯 方見肌肉不生

瀉黃散 方見頭面瘡

胎毒瘡瘍

胎毒瘡瘍皆稟於父母胎熟或乳母飲食之毒七情慾火所致不可專治小兒亦須兼治乳母小兒即安瘡瘍當服和解不宜服峻劑

一小兒患於左耳邊漸延頭上作痒此稟肝膽經

脉數此稟生母肝火所致乳母有肝火而益甚也又數日作瘍不安手足時搐此因作膿瘍痛而然又三日早間以指微按瘡頭腫隨指復起其膿已成也至午後瘡頂起薄皮膿已熟也點代針膏將腕出膿兒頓安腫赤頓消此瘡家最善症也貼太乙膏以護風寒乳母服逍遥散而愈

一小兒生下臂外腰腫一塊寸許月餘忽赤腫二寸許外赤暈勢欲走散此膿毒內煞針之隨出膿赤暈退兒即安診乳母肝膽脉弦數按之有力先用加味逍遥散與乳母服兒尋愈

一小兒生下太腿腫寸許一塊面目色白將養數藥而潰膿水清稀二養而未愈後呵欠咬牙此稟腎虛朝用補中益氣湯夕用地黃丸料與母子同服半杯年餘而愈

一小兒生下左脇間一塊漫腫無頭肉色不變數鍼箍散潰而膿清欲嘔余謂稟肝經氣滯而脾氣虛不能愈也先用異功散加柴胡升麻以補脾胃

又以托裡散加柴胡山梔以托裡清肝其子亦飲數匙三五月而愈

一小兒生下小腹患腫一塊年餘不潰寒熱往來此稟肝火而然也其母果經事不調內熱體倦用地黃丸八珍湯與母服子日服半杯尋愈

一小兒生下胸脇間腫赤年餘不消余謂稟肝血熱但治其母不信另用鐵箍散犀角丸作嘔不乳此胃氣虛而復傷余用五味異功散救子乞之胃氣用加味逍遙散治母乞之肝火頓愈

一小兒生下遍身無皮色赤原母素食膏粱之物以寒水石一兩炒焦黃栢二兩淨黃土四兩俱爲細末時敷遍身母服清胃散加漏蘆五日赤少淡却用黃土五兩炒焦黃栢一兩敷之母服加味逍遙散又三日赤頓淡水頓少又三日但敷黃土一味母服八珍湯加牡丹皮柴胡而愈

一小兒生下有疥窗其母素鬱怒用消毒散以當歸膏調敷母服加味逍遙散加漏蘆及加味歸脾湯而愈後復發爲母食膏粱用清胃散及敷前藥

而愈

一小兒生下有痔瘡二十歲後作痛服化毒丹犀角丸以治大腸之火更腹痛作瀉咳牙呵欠仍欲治火余曰呵欠咳牙屬肝經之症內經云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔此言兒服地黃丸毋服逍遥散加蒲黃而愈

一小兒陰囊赤痒或時如無皮狀兩目常閉服化毒丹益甚余曰化毒丹犀角丸治脾胃實火之劑前症乃禀肝腎經陰虛也不信仍服之幾危余用六味地黃丸四味肥兒丸毋服加味逍遥散而痊

一小兒生下陰囊赤腫余謂禀腎肝陰虛不信另用化毒丹之類前症益甚更嘔吐不乳手足並冷此脾胃被傷先用五味異功散毋用大劑地黃丸料加炒黑黃柏及蒲黃與數劑而消其時患是症服化毒丹敷涼藥者俱不救

一小兒生下臀尖微腫寸許一塊敷鐵箍散服化毒丹越月腫起色赤啼聲不絕以手拔之隨手復起此膿內熟而痛也遂針之出稠膿啼聲即止余

謂血氣無虧不必用藥彼欲速效服犀角丸致吐瀉發搐欲投驚藥余曰此因脾胃虧損而內生風耳急以人參一兩細切和壯婦乳一鍾置粥釜中煮良久取出紋乳汁以綿作乳頭樣者蘸乳頻與兒吮之一日吮盡却服乳化地黃丸母日服八珍湯加浦薑不月而愈

一小兒生卞髀內腫二寸許一塊有膿內潰遂針之出膿甚多隨服閉咳牙余謂眼開脾氣虛不能開也發搐咬牙乃脾氣虛而肝火動也以人參加前漬乳兒吮母服八珍湯加浦薑月餘而瘡愈

一小兒生旬餘頭患毒高寸許有赤暈勢危急臥鎌砭出黑血兒即安翌日眉間有患亦有赤暈余意宜即砭之衆議第二日砭之果血凝不出腹脹而殁

敷藥鐵箍散治一切瘡癰癩疽

芙蓉葉　黃栢

白芨

大黃　五倍子

右爲末用水調搽四圍
按前方乃寒涼解熱收斂之劑或有用白蘞商陸根者有用寒水石天花粉者有用蒼耳金銀花者有用芭蕉赤小荳者有用草烏白芷之類者皆不分寒熱温涼之雜餌內經云先腫而後痛者形傷氣也又云五臟不和九竅不通六腑不和癰結爲癰外科精義云凡瘡腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋脉肉色不變發於骨髓益必有諸中

而後形諸外故受症之經與所患之位各有不同豈宜一槩外敷涼藥惟脾胃無虧血氣不和者庶幾有効若服化毒之類脾胃復傷運氣凝滯亦不能消矣至如疔瘡之類正欲宣拔其毒若復用前藥肌肉受寒血氣凝滯必致毒氣入內而不救治法必察其腫之高漫色之赤白痛之微甚作膿之難易出膿之稠薄生肌之遲速以別其屬陰屬陽或半陰半陽或純陰純陽而用相宜之藥以涼之熱之和之又當審受症之

傳變五臟之相勝而以調補脾胃爲主庶不致變惡症也

五福化毒丹治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃杵膏 熟地黃自制杵膏 麥門冬去心杵膏 天門冬去心杵膏 玄參 各三兩 甘草 甜硝各二兩 青黛一兩五錢

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸白滾湯化下甜硝即朴硝以滾湯製過者便是按前症服此而發搐痰喘者皆中氣受傷而變虛熱也急服五味異功散若手足並冷者中氣虛寒也前湯加薑桂多有生者及痘疹後餘毒生瘡犀角消毒丸治積熱及痘疹後餘毒生瘡

生地黃 防風 當歸各一兩 牛蒡子炒杵 赤芍藥 連翹 桔梗各七錢 薄荷

黃芩 甘草各五錢

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

按前二方善損中氣傷陰血若大人形病俱實

脾胃健旺者庶可用之勝此經云氣主噓之血主濡之氣者胃中沖和之元氣若胃氣一傷不能腐潰膿已潰者不能噓濡消散膿已成者甚致不起不可不愼也

八味茯苓補心湯治心氣不足血氣不和而患瘡症愚製

茯苓　酸棗仁炒各二錢　五味子炒　當歸各一錢　人參一錢　白朮炒一錢　菖蒲五分　遠志去心六分　甘草炒五分　右作一二服水煎

柴胡梔子散方見脇痛

托裡散方見熱毒

熱毒瘡瘍

熱毒瘡瘍因食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致若腫甚作痛氣血凝滯也用仙方活命飲口渴便秘熱毒內蘊也用四順清凉飲佐以如聖餅腫硬色赤熱毒凝聚也用活命飲佐以隔蒜灸腫潰不

消欲作膿也用托裏消毒散不成膿或成膿不潰氣血虛也用八珍湯潰而肉赤不斂脾血虛也用四物參朮肉白而不斂脾氣弱也用四君芎歸食少體倦而不斂脾氣虛也用六君當歸升麻凡藥對症無有不愈設或安行攻毒元氣虧損則變惡症而難治矣大抵瘡瘍屬腑者易治元氣無虧者不治自愈屬臟者難治元氣虧損者則變爲惡症誤行耗伐元氣虧損尤難療理故切不可用峻厲之劑觀東垣丹溪云但見腫痛紫之脈症虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用驅逐敗毒不免有虛虛之禍矣

一小兒患之腫熾敷服敗毒之藥腫益甚更作嘔視其寅關脈青赤此肝經風熱之毒中氣復傷而然也用五味異功散加柴胡升麻再用補中益氣湯加白芷桔梗而愈

一女子十歲餘耳下連項赤腫寒熱頭痛恪敷鐵箍散此少陽膽經火症內作非鐵箍散所能愈余用梔子清肝散而愈

一小兒所患同前右關脉數按之則弦作嘔懨食此肝木尅脾土所致用小柴胡湯去黃芩加茯苓芍藥而愈

一小兒患之余謂禀肝脾氣滯不信用鐵箍散犀角丸而嘔吐少食手足並冷此脾胃復傷也子用五味異功散加木香毋用加味逍遥散加味歸脾湯而消

一小兒缺盆患之內外數服敗毒之藥發熱腫痛按之則軟此膿內潰也喜其右腮白左腮黃乃脾胂相生其病易愈遂針出膿用托裏散而愈

一小兒頭面患之服清胃之藥腫痛益甚余謂毒氣熾盛而瘀血不散也用仙方活命飲二十劑而愈後因傷食朝寒暮熱頭面仍患之服降火之劑口舌赤腫手足並冷余謂胃氣復傷而虛寒也用五味異功散而愈

一小兒頭患癤甚多寒熱作痛時季夏乃形病俱實先用人參敗毒散加黃連香薷二劑其痛頓止次用仙方活命飲末三十服大者出膿小者自消後

食厚味復發用清胃散活命飲各一服而愈
一小兒素食炙煿不時患之此膏粱積熱所致用
清胃瀉黃一散將愈又停食服巴豆之藥口吉赤
爛頭面生瘡此胃氣復傷而內熱也用人參安胃
散而愈
一小兒不時患之兼頰側結核此肝疳之症先用
龍膽瀉肝湯二劑以治肝火又用四味肥兒丸五
味異功散加升麻柴胡消疳健脾而愈
一小兒素有肝脾之症患瘡甚多用仙方活命飲

二劑腫痛頓退又用四味肥兒丸五味異功散加
柴胡升麻而愈其時同患此症用犀角丸化毒丹
傷其脾胃者俱致不起
一小兒頭面患之腫痛煩作屬胃經熱毒先用仙
方活命飲未次用清胃散而痊後口舌生瘡別搽
末藥腹痛重墜作嘔不食手足指冷余謂脾胃虛
寒用異功散加升麻而痊
一小兒十二歲胸前患此腫煩作痛外敷鐵箍散
內服犀角丸腹中寒痛驗之膿已成先用五味異

功散再用托裏消毒散膿自出却用托裏散而愈

一小兒臂患毒漫腫微痛敷鐵箍散時欲嘔吐胸腹痞滿手足並冷此脾氣虛寒也症屬半陰半陽鐵箍散乃純陽之藥非其所宜遂敷沖和膏服六君乾薑而消蓋小兒元氣易實易虛用寒藥敷貼過毒入臟而不能救者多矣

仙方活命飲

金銀花　陳皮　各二錢　皁角刺炒　二錢　穿山甲蛤粉同炒

乳香　沒藥　白芷　防風

當歸　貝母　天花粉　甘草節　各一錢

右每服五錢酒煎服嬰兒每服一二錢水煎服

爲末酒調服亦可毒在表者加麻黃散下毒在內者加大黃下之當臨時制宜此解毒回生起死之良劑

托裏消毒散治胃經虛弱或因尅伐致瘡不能潰散瘡未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

人參　黃芪　當歸酒拌　川芎　芍藥炒　白朮炒　茯苓　各一錢　金銀花

白芷　甘草　炙　連翹　各五分

右作一劑水煎徐徐服

托裏散治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱宜用此補托之

人參　氣虛倍用　黃芪　炒　當歸　血虛倍用　白朮　倍用　茯苓　各五分　芍藥　酒炒　五分　熟地黃　一錢生者自製

右作二三劑水煎服

替針丸治瘡疽膿已成不潰者

陳壞米　一錢　礞砂　五錢　雄雀糞　四十九粒　直細者是也

右爲末米粥丸麥粒大每用一粒粘瘡頭上以膏藥貼之半晌其膿自出若瘡頭透而膿不出或出而愈痛或發熱血氣虛也用托裏散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

五福化毒丹治熱毒蘊積赤咽乾口舌生瘡或頭面瘡癤諸證不寧方見胎毒瘡瘍

按前方生血凉血解毒寒中之劑形病俱實者殊有良驗但一二十九即止不可過多則反傷元氣變症不可勝言也

天烏散

天南星　赤小豆　草烏　黃蘗各等分

右爲末薑汁米醋調貼患處

四物湯治發熱煩燥或月水不調或月水過多或血崩或產後血暈或血者則用六君子湯之類忌用前藥方見胨瘡

四君子湯治腸胃虛熱唇口生瘡或瘡不消不潰不斂或食少作嘔大便不實若因肝木乘脾土而致者宜加軟柴胡炒黃芩藥方見胨瘡

六君子湯治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體浮腫面色痿黃即四君子加陳皮半夏

八珍湯治氣血俱虛成者不能潰潰者不能斂或惡寒發熱或晡熱作渴飲食少思者即四君子四物二湯合用

如聖餅治氣虛瘡瘍硬腫不能消散若大人發背等症肉死不知痛加蟾酥方見流注

四順清凉飲

四君子湯二方見胨瘡

加味歸脾湯

小柴胡湯

梔子清肝散 三方見胁痛

托裏沖和湯 方見敷藥

五味異功散 方見敗毒之藥

加味逍遙散 方見發熱不止

人參敗毒散 方見發癍

四味肥兒丸 方見貼骨瘡

隔蒜灸法 方見流注

清胃散 方見熱毒口瘡

補中益氣湯 方見肌肉不生

胎毒瘰癧

胎毒瘰癧者乃稟肝膽二經鬱火氣滯所致蓋肝膽經行人身之側若因肝火動而受患故發於肝膽二經部分當審其因而藥之或因乳母恚怒或血虛內熱者當審其所因而調其母不可用峻厲之藥恐傷元氣也

一小兒落草頸間有癧五枚審其母素多怒時常寒熱或乳間作痛或脇肋微腫悉屬肝膽經症先

用小柴胡湯加當歸芍藥寒熱頓退又用加味逍遥散母服兩月餘其兒亦愈

一小兒因乳母肝經有熱耳前後患之用加味逍遥散治其母其兒自愈

一小兒頸間耳下各結核三十歲久服消毒之劑患處益甚元氣益虛診乳母素鬱怒致肝脾血虛而有熱用加味歸脾湯爲主佐以加味逍遥散母熱漸退却與兒日各數貼是兩月餘而愈

一小兒自落草時頸間患有四枚至五歲耳前後如貫珠元氣虛甚寒熱往來飲乳不徹此稟肝膽經氣滯之症用八珍逍遥散加味逍遥二十散與壯年婦人服之兒飲其乳半載之後兒體漸充其核漸消又服地黄丸逍遥散而全愈

一小兒頸間結核或發寒熱左頰青額間赤此稟肝心二經之症用加味逍遥散加蒲蘆與母服兒日服半蛤許兩月餘核漸消後因母怒發熱兒病仍作先用加味小柴胡湯加蒲蘆又用加味逍遥散加蒲蘆與母服兩月餘母子俱安

一小兒頸間前後各有二十核色如故至週歲母有怒氣各核變赤用加味逍遥散加減蘆五分十餘劑將愈後因母大怒寒熱往來四肢瘦瘥其子亦然又用加味逍遥散加減蘆鈎藤鈎母子並服而安

一小兒生下頸間瘰癧三十枚將期敷藥延及耳前余謂此稟肝膽二十經所致診其母肝膽脉尚洪數余謂母子一體治其母兒自愈不信另用必效散一服吐瀉並至一夕而發

小柴胡湯

加味歸脾湯二方見脇痛瘧

加味逍遥散方見發熱不止

六味地黃丸方見作渴不止

熱毒瘰癧

熱毒瘰癧乃手足少陽足厥陰三經風熱之症或肝脾食積所致其症發於項腋或耳前後或如貫珠當分表裡虛實若燉赤腫者肝經熱毒也用人參敗毒散作痛寒熱者肝火內作也用加味小柴

胡湯不痛而小便黃肝血虛也用六味地黃丸隱於肉裏而色不變者肝肺內作也用九味蘆薈丸膿成而不潰或潰而不斂者脾氣虛弱也用益氣養榮湯凡此腫瘍疼痛寒熱作渴者屬病氣有餘形氣不足治宜清肝火生肝血腫硬不潰潰而不斂者屬病氣形氣俱虛治宜補腎水實脾土若因乳母恚怒肝火遺患者又當隨所因而治之

一小兒膿水淋漓其核未消發熱憎寒此肝經氣血虛而有熱也用補陰八珍湯爲主間以清肝益榮湯而愈後復結核小便赤澁晡熱作渴用參术柴苓湯爲主佐以六味地黃丸判加柴胡山梔及四味肥兒丸而斂

一小兒十五歲患此發熱作渴日晡頰赤脉數無力屬陰虛而有熱用補陰八珍湯五十劑加參芪又二十劑而潰但膿水清稀肌肉不生此脾氣虛弱也以參芪歸朮爲主佐以芍藥熟地麥門五味氣血乃復遂進必効散一服毒下而痊

一小兒十三歲久不愈寒熱兼作飲食少思此肝

火熾而脾胃虛也用益脾清肝散佐以九味蘆薈丸而愈至十六歲陰莖忽痿服溫補之藥莖竅出臭津舊痕腫痛予用清肝火之藥而愈

一小兒十五歲患此恪用攻痰前症益甚虛症悉至仍議前法余曰小便頻數肝經陰虛也兩目連劄肝經風熱也作嘔懶食胃氣虛弱也泄瀉後重脾氣虛陷也遂用補中益氣湯六味地黃丸漸愈又用九味蘆薈丸而消

一小兒項間及四肢結核久潰不斂形體骨立大便不調小便頻數此肝脾疳症九味蘆薈丸補中益氣湯而愈

一小兒十四歲患此膿水清稀肌體骨立晡熱盜汗口乾欬痰此腎水不能生肝木也用六味地黃丸補中益氣湯三月餘元氣漸復佐以四味肥兒丸而愈畢姻後嗆痰體倦發熱作渴此脾肺虛不能生腎水水泛而爲痰用地黃丸補中益氣湯而痊

一小兒患此服剋治之藥致寒熱腹膨此肝脾疳

症先用五味異功散加柴胡升麻佐以九味蘆薈丸漸退又用四味肥兒丸五味異功散而消

一小兒患此服化痰散堅之藥面色青白火陽三十焦部分見青筋又目劄出淚此肝膽風熱所致脾土虛而肝木所侮也先用補中益氣湯柴胡清肝散加蕪荑核漸消又佐以五味異功散加蕪荑而愈

一小兒九歲患此面色常青腫硬不潰肉色不變乃伐肝化痰余曰當調補肝脾不信果虛症蜂起復請治仍欲伐肝余曰面帶青色肝虛而本色見也面色變白肺虛而本色見也痰涎上湧脾虛而不能攝也兩目連劄肝血虛而生風也經云胃爲五臟之本當先救胃氣遂用五味異功散加升麻柴胡元氣稍復乃朝用補中益氣湯夕用五味異功散佐以九味蘆薈丸面色始黃而核漸消又以四味肥兒丸間服地黃丸而愈

一小兒五歲患此小便白色此肝脾痢症用九味蘆薈丸四味肥兒丸而消因食橙橘二便俱白拘

間結核亦用前丸而愈後目連劄頸間耳後結核用柴胡清肝散蘆薈丸而愈

張閣老姪孫患此久服化痰削堅之劑夜熱吐痰時季夏脉大按之而滴余曰夏月肝症而見肺脉至金旺之時其病必進矣至八月疾甚果不治

一女子十四歲耳下患此服化痰泄氣藥前症益甚諸症並臻余曰此肝膽經虛火之症也前藥乃泛擾諸經無臟不傷者不悟仍服之更四肢發搐目閉口噤余曰此肺經虛肝木動而脾土復傷也當補脾土滋肺金養腎水亦不信後果殁

一小兒四歲患此泛服軟堅伐肝之劑益甚余曰此禀肝經之虛羸兼乳母鬱怒所致當調補乳母肝脾滋子之腎水不悟仍用前藥以致不起

四味肥兒丸治食積脾疳面耳口舌生瘡目障雲翳牙齒腐爛等症方見貼骨瘡

柴芩參苓飲治肝火血熱遍身瘙痒或起赤暈或筋攣結核

柴胡　芩藥　人參　白朮

茯苓　陳皮　當歸各五分　山梔炒　甘草炒各三分　牡丹皮

右薑棗水煎服

神功散治瘡瘍初起腫熾者用之可消加血竭更好丹毒未破者亦可用之

黃栢炒　草烏生用

右各另爲末等分用漱口水調敷常漱口水潤之

清肝益榮湯治肝膽經風熱血燥筋攣結核或作瘧子

柴胡　山梔炒各五分　龍膽草酒拌炒黑五分　當歸　川芎　芍藥各一錢　熟地黃自製　白朮炒　木瓜不犯鐵器　茯苓　薏苡仁各五分　甘草三分

右水煎服

加味小柴胡湯山梔牡丹皮治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核燃痛或寒熱晡熱口苦耳聾等症前方去山梔丹皮即小柴胡湯

柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏各七分　甘草炙五分　山梔　牡丹皮各一錢

右薑水煎徐徐服

九味蘆薈丸治肝脾疳熱患瘰癧結硬或三焦目生雲翳耳內生瘡或肢體消瘦熱渴少食或肚腹不調牙齦蝕爛腐爛下部生瘡等症方見上喉痺

必效散治瘰癧元氣無虧者宜用此方若元氣怯弱者宜先補而後服之癧毒已下便與滋補庶無他患若孕婦及虛勞氣鬱所致者尤不可服

世以此方爲截劑故併註之

南鵬砂二錢五分　輕粉一錢　巴豆五粒去皮心膜　麝香五分　白檳榔一箇班猫四十箇去頭足趁用糯米炒

右爲末取鷄子一箇去黃用清調藥入瓷內以濕紙數重糊口甑蒸熟取出曝乾研細每服五分用炒生薑酒五更調服如毒出小便澁痛用益元散一服其毒出而不痛益氣養榮湯方見鶴膝風

梔子清肝散方見脇癤

補陰八珍湯 即八珍湯加黃柏知母益脾清肝散 方見黃水瘡

驚風結核

驚風結核屬肝膽二經風木相火用事木旺生風熱同化其病抽掣擾動此乃風熱血燥而然耳益風動則肝火盛火盛則肝血內消血不能養筋故筋攣結核如貫珠然頸項兩側正屬肝膽經部分治宜滋腎水清肝火養陰血壯脾土益腎水旺則肝火自清肝火清則陰血自生陰血生則相火自寧火既寧則無熱傷元氣火乘土位之疾矣

一小兒因驚項間結核日劇唇動搖頭抽搐此風木凌於脾土也用阜角子丸補中益氣湯漸愈又用九味蘆薈丸而痊

一小兒甫周歲項間結核兩臂及張索敗毒散之藥余意此屬肝經血燥詢之果前患驚風曾服硃砂等藥遂與六味地黃丸滋其肝血數服而愈

一小兒項側結核痰盛發搐服金石香燥之劑手足筋攣此肝血復傷即急驚也遂用加味小柴胡

湯加釣藤鈎山梔芍歸六味尤料加五味麥門而
痊
一小兒每受驚項間結核發熱減食聽間四肢微
抽此肝木侮脾土也用五味異功散加柴胡升麻
鈎藤鈎隨愈畢姻後腿臂腨結核誤服行氣破
血藥腿臂筋攣肌體消瘦加蔘症余考績到京
用地黃丸生肝腎之血佐以補中益氣湯補脾肺
之氣而愈
一小兒耳前後結核遇驚即痰盛咬牙抽搐搖頭
恰服養燥之藥以致慢驚而卒
阜角子尤治肝膽經風熱項脇兩側結核

阜角子 仁炒 二兩
柴胡 片藥炒
桔梗 炒
右爲末米糊丸菜豆大量兒大小滾湯下

連翹 入錢
當歸
山梔 炒
川芎 各一兩
甘草 炒 各四錢

人參敗毒散治小兒風熱瘙痒頑核毒瘡或解脫
太甯風邪所傷惡風發熱胸膈生涎頭目不清

九味柴胡湯治肝經熱毒下注患便毒腫痛或小腹脇悶結核凡肝膽經部分一切瘡瘍或風毒惡核瘰癧

柴胡五分　黃芩炒五分　人參　山梔炒
半夏　龍膽草炒　當歸　芍藥炒各三分
甘草二分

右水煎服若腫痛色赤元氣無虧者宜用潰後腫消痛止者不宜用大凡腫硬不潰或潰後不愈因元氣虛也午前宜用四君歸芪升麻午後宜用四君歸芪升麻為主佐以九味蘆薈丸若飲食少思者宜用五味異功散專補胃氣若膿水清稀而見一切諸症皆因血氣內虛但温補脾胃飲食加進血氣化生諸症自退設治瘡乖是虛其虛也禍不旋踵矣

琥珀膏治瘰癧不潰或潰而不愈變成漏症

琥珀　木通　桂心　當歸
白芷　防風　松香　硃砂
丁香　木香　木鱉子各二兩

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香爲末其餘咬咀以麻油二斤六兩慢火煎至白芷焦黑濾去查徐下黃丹一斤以柳枝不住手攪至黑色滴水捻軟硬得中却入琥珀等末攪勻於磁器盛之用時取少許攤貼

益脾清肝散治肝火偏脾飲食少思發熱或寒熱往來瘡不能消散方見黃水瘡

補陰八珍湯治元氣虛弱不能潰斂或內熱晡熱肌體消瘦即八珍湯加酒炒黑黃柏知母

五味異功散 方見敗毒之藥

胎毒瘡疥

胎毒瘡疥因稟胎熱或娠母飲食之毒七情之火初如乾癬後則膿水淋漓或結靨成片如發于兩耳眉或耳前後髮際之間屬手少陽經若發于四肢屬脾胃經發於兩脇屬肝經發于額屬心經發于腦屬膀胱經發于頰頰屬腎經當隨各經所主五臟勝負及乳母食啖厚味鬱怒所傳致而調治之不可輒用化毒犀角等先設元氣復傷傳變他

疽尤爲難療

一小兒遍身患之服牛黃解毒丸皆愈惟頭結痂作痒出水此熏腎經虛熱用地黃丸解毒散而愈

一小兒患於髮際之間作痒診其母有肝火用加味逍遥散加漏蘆用牛黃解毒丸解毒散而愈（解毒散下各入托毒散）

一小兒患於左耳髮際漸延上頭作痒此熏肝膽二經熱毒用柴胡清肝散母子並服而愈後不戒膏粱復發膿水淋漓右頰赤色此胃經有熱先用清胃散仍用柴胡清肝散治肝火母子俱服又用立効散牛黃解毒丸而愈

一小兒兩眉患之延及遍身四肢爲患膿水淋漓寒熱往來屬肝脾積熱用清胃散小柴胡湯立効散而愈後眉間復患兩目連劄小便白濁用四味肥兒丸九味蘆薈丸而愈

一小兒因乳母不戒七情厚味患此久不愈母用清胃逍遥散一帖子用牛黃解毒丸愈後兒食甘味眉間生瘡痛痒目劄用四味肥兒丸爲主佐以加

味逍遥散清胃散而愈
一小兒遍身患之兩脇爲甚予用四味肥兒丸立
効散毋用柴胡梔子散加味逍遥散而愈
牛黄解毒丸治胎毒瘡癤及一切瘡瘍

牛黄三錢　甘草　金銀花一兩　草紫河車五錢

右爲末煉蜜丸量兒服之

立効散治髪瘡耳瘡及一切瘡疥

定粉末　松香末　黄柏末　黄連末　枯礬末各一兩

右各另爲末用清燈油調搽

敷藥解毒散治一切毒瘡風疹痒痛

大黄　黄柏　山梔　寒水石各等分

右爲末水調搽若破而膿水淋漓用當歸膏或
清燈油調尤善

柴胡梔子散　即梔子清肝散方見脇癰

四味肥兒丸　方見熱毒瘰癧

九味蘆薈丸　方見諸瘡口瘡

金黄散　方見天泡瘡

熱毒瘡疥

熱毒瘡疥因乳哺過早或嗜甘肥臟腑積熱或母食膏粱厚味或七情內火所致當分臟腑所屬之因病之虛實調其血氣平其所勝如肝經實熱用柴胡清肝散虛熱用六味地黃丸心經實熱用導赤散虛熱用補心湯脾經實熱用瀉黃散虛熱用補中湯肺經實熱用瀉白散虛熱用五味異功散腎經熱用六味地黃丸大凡手足冷者屬虛寒手足熱者屬實熱脉沉數有力作瀉飲冷大便乾實此邪在裏宜內疏若脉浮數有力作瀉飲冷此邪在表宜發散若脉浮大按舉無力或作瀉飲湯乳食少思此眞氣虛而發熱也調理脾胃其病自愈切不可用寒涼之劑復損眞氣嬰兒宜調治乳母爲主

一小兒脇間患此寒熱如瘧小便頻數此禀肝火所致先用柴胡清肝散又用加味逍遙散而愈後因乳母肝火動而復發用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮山梔母子服之並愈

一小兒腹間患此發熱便血面黃少食或作嘔或作瀉手足時冷右關脉弦數此脾土虛弱肝火爲患先用五味異功散加升麻柴胡山梔益脾氣清肝火後用地黃丸滋腎水生肝血而愈

一小兒腿內股患此色赤不愈發熱面色或赤或青此禀腎陰不足而木火熾盛先用柴胡梔子散以清肝心後用地黃丸以補肝腎而愈

一小兒肘間患此作瀉飲冷右寸關脉數而無力此胃經積熱傳於肺經也先用瀉黃瀉白二散漸

飲後用五味異功散四味肥兒丸而愈

一小兒嗜膏粱甘味先患背癤後沿遍身淋漓此飲食之熱而傷脾血也先用清胃瀉黃二散而愈

但形氣怯弱用五味異功散而元氣復

柴胡清肝散 方見脇癰

五味異功散 方見用敗毒之藥

導赤散

瀉白散 二方見臀癰

瀉黃散 方見頭面瘡

諸疳瘡疥

諸疳瘡疥因脾胃虧損內亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒爲患當分其因審其經而平之如面青寒熱或白翳遮睛肝經之症也面赤身熱或作渴驚悸心經之症也面黃體瘦或作渴泄瀉脾經之症也面白咳嗽或鼻間生瘡肺金之症也面黧體瘦或喜卧濕地腎經之症也嬰兒宜調治乳母若不審五臟勝負形病虛實妄行敗毒多致不救

一小兒患此小便頻數左頰青色或時目劄此肝脾之症也先用五味異功散加當歸升麻柴胡調補脾氣又用九味蘆薈丸清理肝火末用地黃丸滋腎水生肝水而疥愈後復發不經意兼兩目生翳小便頻數大便泄瀉此肝邪侮脾而作也用四味肥兒丸五味異功散加蕪荑脾氣健而肝病愈一小兒患此面黃作渴大便酸臭腹脹青筋此肝脾之症用五味異功散爲主佐以四味肥兒丸而愈

一小兒患此面赤作渴心脉洪大此心經之症內用柴胡梔子散外用六仙散而愈後驚悸發熱疥瘡作痛先用導赤散二服又用柴胡梔子散與子服毋服逍遥散而愈

一小兒患此大便酸臭肚腹膨脹手足時冷此脾經之症用五味異功散四味肥兒丸漸愈後因毋食炙煿仍發毋服清胃散黃連瀉心湯子服一味甘草而愈

一小兒嗜甘肥之物患之或痒或痛咳嗽飲冷此脾胃積熱傳于肺經先用清胃散以治胃熱沙用瀉白散以清肺火漸愈出痘後仍患之口乾飲湯用五味異功散兼大楓膏而愈

一小兒年十五遍身患此腹定為甚發熱飲冷兩尺脉數洪按之無力此禀腎虛所致用六味地黃丸而愈後用心力學復發尤甚兼盜汗遺精用地黃丸為主佐以補中益氣湯八珍湯而愈

一小兒患此發熱飲冷痰涎上湧此禀腎虛用地黃丸料煎服月餘漸愈又佐以八珍湯而愈次年

畢姻後發熱嗽痰盜汗咳血仍用前藥而愈

敷藥大楓子膏治瘡瘡疥

大楓子肉二兩研膏眞輕粉一兩　黃連二兩
枯礬一兩　蛇床子二兩　相油六兩

石各另入大楓膏和勻更入相油杵百餘即成膏矣每用少許塗患處

敷藥六仙散治諸般瘡瘡疥

苦參　獨活　大楓子去殼油　蛇床子各一兩　柏礬五錢

右爲細末相油調敷

五味異功散　方見用敗毒之藥

清胃散　方見熱毒口瘡

諸般口瘡

諸般口瘡因乳哺失節或母食膏粱積熱或乳母七情鬱火所致其症口舌齒齦如生瘡狀若發熱作渴飲冷額間赤色左寸脈洪數者此屬心經先用導赤散清心火次用地黃丸滋腎水若寒熱作渴左頰青赤左關脈弦洪者屬肝經先用柴胡梔

子散清肝火次用六味地黃丸生肝血若兩腮黃赤牙齦腐爛大便酸臭右關脉洪數按之則緩者屬脾經用四味肥兒丸治脾火以五味異功散補脾氣若發熱咳嗽右腮色赤右寸脉洪數按之牆者屬肺經先用清肺飲治肺火用五味異功散補脾胃若發熱作渴兩頰黧色左尺脉數者屬腎經不足先用六味地黃丸以生腎水次用補中益氣湯以生肺氣又有走馬疳者因病後脾胃氣血傷損虛火上炎或疳蟲餘毒上攻其患甚速急用錫

礞散大蕪荑湯輕則牙齦腐爛蝕露頰腮透爛若飲食不入喘促痰甚此脾胃虛而肺氣敗也頰腮赤腐不知痛者此胃氣虛甚而肉先也並不治

一小兒口瘡喉血便血兩腮微腫唇白面青此脾土虧損木所乘也朝用補中益氣湯食遠用異功散而愈

一小兒右腮鼻準微赤此肺脾二經虛熱用四君升麻及白朮散而愈

一小兒口瘡久不愈診其母右關脉弦緩乃木尅土之症先用六君柴胡又用加味逍遥散治其母子自愈

一小兒齒齦蝕爛年餘不愈用大蕪荑湯治其疳邪五味異功散健其脾氣尋愈後復作兼項間結核另服敗毒藥口舌生瘡余用四味肥兒丸而愈

一小兒患口瘡寒熱嗜卧作瀉引飲此脾疳氣虛發熱而津液不足也先用白木散以生胃氣再用四味肥兒以治疳症兩月餘又用異功散而安

一小兒口瘡身熱如炙肚腹脹大此脾疳內作朝用五味異功散夕用四味肥兒丸稍愈又以地黃蝦蟆一丸兼服而愈

一小兒齒齦腐爛頭面生瘡體瘦發熱此脾疳所致先用大蘆薈丸又用四味肥兒丸大楓膏而愈

東垣大蕪荑湯（一名梔子茯苓湯）治黃疳土色爲濕爲熱當利小便今反利（知黃色中爲濕爲熱俱受土邪乃太濕熱之症）鼻下齦作瘡（上逆行陽氣伏火也）能乳食不入（胃不足也）面黑色（爲寒爲痛大便清也）得

色（熟蒸下血中）間黃色（腸胃有熱治當滋榮潤燥外致津液）山梔仁三分黃栢 黃連 麻黃根 防風各一分 羌活二分 柴胡三分 白术 甘草炙各二分大棗肥五枚 茯苓各五分 當歸四分 右水煎服

葛花解醒湯治乳母酒醉後乳兒遺熟爲患 白荳蔻 砂仁 白术 神麯炒黃 澤瀉各二錢 白茯苓 陳皮 人參 猪苓各五分 木香各五分 葛花各五錢 乾生薑 右爲末每服一錢白湯調服

愚按前湯先哲不得已而用之益醉酒耗氣又服辛散重損真陰折人長命可不慎哉

大藍會元治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 木香 青皮 鶴虱微炒各半兩 麝香二錢另研 右爲末粟米飯丸菉豆大每服二十丸米飲

青皮三分

白蕪荑去扇 蘆薈 白雷丸破開赤者不用

下ス

蚵蟆丸治無辜疳症二十服虛熱退一十服煩渴止三十
服瀉痢任

蟾蜍一枚夏月溝渠中腹大
不跳不鳴身多瀨瘰者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之掃上要乾不
令蟲走出却將蟾蜍撲死投蛆中食一晝夜以
布袋盛置浸急水中二宿取出先上焙爲末入
麝一字粳米飯搜丸麻子大每服一十丸米飲
下ス

六味肥兒丸消疳化蟲退熱若脾疳飲食少思肌
肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作
渴精神怠倦大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡
肚腹青筋齒下痢便白宜用此丸即四味肥兒
丸加乾蟾一兩蕪荑五錢

地黃丸 方見作渴不止

熱毒口瘡

經云手少陰之經通于舌足太陰之經通于口因

心脾二經有熱則口舌生瘡也當察面圖部位分經絡虛實而藥之若元氣無虧暴病口生白屑或重舌者用亂髮纏指蘸井花水捋之或刺出毒血敷以柳花散傳之上以腫脹或有泡者並令刺破敷前散或以青黛揉之刺後又生又刺若唇吻熱烈者用當歸膏調柳花散敷之若元氣虧損或服寒涼之藥或兼作嘔少食者此虛熱也用五味異功散加升麻柴胡若泄瀉作渴者脾胃虛弱也用七味白朮散若腹痛惡寒者脾胃虛寒也用六君

姜桂若因母食酒麵煎煿者用清胃散若因母飲食勞役者用補中益氣湯肝腎血虛者用加味逍遥散鬱怒內熱者用加味歸脾湯母子並服若泥用降火必變慢脾風矣仍兼吐舌弄舌治之凡針重舌以線針直刺不可橫挑恐傷舌絡致言語不清也

一小兒口舌生瘡手熱飲冷屬胃經實熱用柳花散加味解毒散而愈後因傷食吐血不時弄舌屬脾經虛熱用四君子湯而痊

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一小兒口舌生瘡延及頭面胸背膿水淋漓此胎毒也內用牛黃解毒丸外以當歸膏調黃柏末塗之而愈

一小兒發熱飲冷口患瘡額鼻黃赤吐舌流涎余用導赤瀉黃二散而愈後復作自服清熱化毒之藥益甚更加弄舌余用五味異功散加釣藤鉤及六君子湯而愈蓋吐舌爲脾之實熱也弄舌爲脾之虛熱也治者審之

一小兒患前症久不愈恪服清涼之劑瘡瘡不已口開流涎手足並冷又欲治瘡余謂經云脾主涎肺主氣此因脾土虛寒不能生肺金而然非瘡火爲患也先用溫中丸二服瘡瘡頓止又用五味異功散而痊

一小兒口內生瘡用寒涼之劑更發熱飲湯不絕此中氣虛寒隔陽於外非實熱也用補中益氣湯加炮薑二劑而愈

陳湖陸欽若子患前症數服寒劑手足並冷口唇時動余曰此中氣虛寒而變慢脾風也後果殁

東垣清胃散治胃經有熱齒牙痛或飲冷作瀉口舌生瘡或唇口腫痛煩熱連頭面或重舌馬牙吐舌流涎若因服尅伐之劑脾胃虛熱口舌生瘡或弄舌流涎或嘔吐困睡大便不實者用五味異功散

升麻五分　生地黃四分　黃連　牡丹皮各三分　當歸稍四分

右水煎服嬰兒母亦服

清熱消毒散治實熱口舌生瘡及一切瘡瘍腫痛形病俱實者

黃連炒　山梔炒　連翹　當歸各五分

川芎　芍藥炒　生地黃各六分

金銀花一錢　甘草二分

右水煎服嬰兒母同服

四君子湯治脾氣虛熱口舌生瘡或但胃氣復傷飲食少思或食而難化若作嘔泄瀉尤宜用之如兼痰嗽氣逆肢體倦怠面目浮腫宜用六君子湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六君子湯治脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺虛痰嗽喘促惡寒或驚搐口直口噤諸症二方見腹癰

五味異功散治脾胃虛熱口舌生瘡或因誤服苦伐之劑脾胃復傷而口舌生瘡或弄舌流涎吐瀉不止飲食少思或驚搐瘀嗽睡而露睛手足並冷若毋有病致兒患者予毋並服方見用敗毒之劑

人參理中湯

人參 白朮炒 乾薑炮 甘草炙 各等分

右每服一二錢水煎密丸即人參理中丸加附子即附子理中湯

四物湯治瘡瘍血虛發熱煩躁或脯熱作渴頭目不清若因脾虛不能生血者用四君子湯方見腋癰柳葉散治熱毒口瘡

黃柏炒 蒲黃

右爲末敷之

加味解毒散

牛黃解毒丸二方見胎毒瘡疥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保閒齋撮要卷之十二

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之十二 續集

古吳薛鎧草創

男薛已編集

後學宋璞校閱

疔瘡

諸瘡惟疔毒爲甚而殺人亦速古云疔有十二種種各不同內二十六疔滿其數即不可救亦有不滿其數而死者乃毒氣走散故也若痘毒染人發於頭面或遍身者又非此類在小兒多因乳母食

有毒之物或兒卒中飲食之毒或感四時不正之氣皆能致之其瘡多生頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡或痛或痒或麻木不仁外症寒熱嘔吐惡心肢體拘急大要當分邪之在表在裡急用隔蒜灸法并解毒之劑若不省人事牙關緊閉急以奪命丹爲末熟酒調灌如食生冷之物或用凉水淋洗則輕者難愈重者不治其生於兩足者多有紅絲至心生於唇口之內者多有紅絲入喉急用針挑出惡血以泄其毒可保無虞其在偏僻之處藥難導達者惟灸法有回生之功若投峻厲之劑是促其危矣小兒肌肉脆嫩且不能言痛不灸法須將艾切薄片置著肉上一面畧剜小空灼艾燃蒜先置大人臂上試其冷熱得宜然後移著瘡上又別灼蒜如前法試之以得相易勿令間斷

毗陵金文治子將週歲唇上患疔余用活命飲每子並服更敷隔蒜灸彼不從見腫勢益盛勉灸數壯余誡以多灸爲佳又爲人所阻而止頭面益腫

乃復灸五十餘壯腫勢漸消時與乳母服活命飲瘡出黃水翌日潰而得生

一小兒三十歲手患瘭疔二顆寒熱作痛用仙方活命飲半盃而愈數日後手臂俱腫乃用隔蒜灸服前藥而愈

一小兒足患之嘔吐腹脹一日不食欲用護心散診氣口脉大審其大便所出皆酸穢余曰此飲食停滯耳非瘡毒內攻也若用護心等劑則誤矣急投保和丸二服及隔蒜灸而愈其時同患是症用護心敗毒之劑者俱致不救

一小兒面上患之寒熱發瘡此熱極而肝火動也用荊防敗毒散及隔蒜灸瘡止熱退更服異功散加升麻柴胡桔梗而愈

一小兒患於胃外敷寒涼內服敗毒更欲嘔不食面色痿黃右關脉浮數按之微細此脾胃復傷所致也急用隔蒜灸服異功散倍加白朮半夏翌日又服活命飲而愈

一小兒患前症服敗毒之藥作嘔不食余謂胃氣

復傷不信另服護心散嘔甚神思沉困手足並冷脉微細如無急用五味異功散加乾薑二十服嘔止食進去薑又四服而愈夫護心散皆寒涼之藥乃宋人爲服丹砂蓄熱發疽者而設胃氣有傷即當温補多因此藥停於胸膈惟覺陰冷作嘔沉困者世人皆謂毒氣攻心而斃用之鮮不敗事者矣

一小兒手背患此數服皆寒涼之劑腹脹痰喘瀉糞穢臭余謂脾胃復傷而飲食停滯也不信仍服治瘡之藥而殁

一小兒臂患之色赤腫起恪用化毒丹鐵箍散腫處頓平肉色白陷再白色黯痰喘氣促余謂瘡毒反入於內也辭不治果殁

飛龍奪命丹治瘡毒發背腦疽等症

真蟾酥乾者酒化　輕粉　枯白礬

寒水石　銅綠　乳香　沒藥

麝香　朱砂各六錢　蜗牛四十箇另研如無亦可

右各爲末入蟾酥蜗牛或加酒少許糊丸菉豆大每服一二九温酒或葱湯下重者外用隔蒜

灸法

荊防敗毒散即人參敗毒散加荊芥防風方見流注

仙方活命飲方見熱毒瘡瘍

保和丸方見發熱不止

五味異功散方見敗毒之藥

時毒 頭面赤腫

小兒時毒因感四時不正之氣致鼻面耳項或咽喉赤腫寒熱頭痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞狀如傷寒五七日間亦能殺人脉浮數者邪在表脉沉

滴者邪在裡在表用葛根牛蒡子湯在裡用梔子仁湯表裏俱病者犀角升麻湯甚則宜砭及用通氣散宣泄其毒旬日自消若不消而欲作膿者用托裏消毒散欲收斂者用托裡散若咽腫不能言頭腫不能食者必死

一小兒患此二十日二便調和用葛根牛蒡子湯漫腫悉退惟頰間赤腫欲作膿用活命飲二服外用代針膏而膿出再用托裏消毒散而愈

一小兒腫赤煩痛此欲作膿也用托裏消毒散二

劑膿成針之腫痛頓減又二十劑漸愈却以柴胡梔子散加白芷升麻與母服之愈

一小兒腫瘍作痛藥不能下咽先用通氣散連作嚏却用犀角升麻湯乳食稍進腫痛漸消仍服數劑而膿血漸少母服加味逍遥散而愈

一小兒患之咽喉作痛二便自調用葛根牛蒡子湯三劑甘桔湯四劑腫痛漸愈診乳母左關脉弦數用加味逍遥散母子並服而消

一小兒患之赤腫作渴外敷內服皆寒涼之藥余欲洗去敷藥急用發散表邪開通腠理之劑不信仍用前藥遂至不救

通氣散治時毒瘍痛咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索　猪牙皁角　川芎　各一錢

藜蘆五分　羊躑躅花三分

右爲細末用紙撚蘸少許紲鼻內取嚏爲効

犀角升麻湯治風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角鎊錢二 升麻 防風 羌活
川芎 白芷各五錢 黃芩 甘草各一錢
白附子四分
右每服三錢

梔子仁湯治時毒腫痛大便秘結
鬱金 枳殼麩炒 升麻 山梔仁
牛蒡子研碎炒 大黃炒各等分
右爲細末每服二錢蜜水調服
葛根牛蒡子湯治時毒腫痛消毒解熱

葛根 江西豆豉 管仲 甘草
牛蒡子牛生半炒研碎各等分
右每服三錢水煎

柴胡梔子散方見脇離
托裏消毒散

代針膏

托裏散

仙方活命飲四方並見熱毒瘡瘍
加味逍遥散方見發熱不止

流注

小兒流注乃氣流而注血滯而凝元氣不足之症也或因肝火氣逆或因六淫內侵或因脾虛食積或因禀賦所致結於四肢節間患法須固元氣爲主閉跌者和血定痛丸肝火者尤味蘆薈丸食積者四味肥兒丸藥能對症未成自消已成自潰若膿成不潰者元氣虛也先補而針之度使毒氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出而反痛者氣血虛也用八珍湯作嘔少食者胃氣虛也用四君子湯欲嘔不食或腹作脹者脾氣虛也用六君子湯口噤搐搦者氣血虛極而變症也十全大補湯內熱脯熱陰血虛也四物參芪白朮表熱惡寒陽氣虛也十全大補湯熱來復去或晝見夜伏晝伏夜發者虛熱也當大補元氣若色赤腫起而膿稠者尚可治不赤硬而膿清或脉洪大寒熱發渴及不受補者皆不可治

楊鴻臚子年十二左脇下患此服流氣飲十宣散

之類元氣益虛年餘不斂左尺脉數而無力左關脉弦而短此肝經之症因禀腎水不足不能滋養肝木血燥火熾而然耳用六味地黃丸以滋腎水九味蘆薈丸以清肝火而愈

一小兒九歲患此久不收斂或咳嗽或寒熱皆服清氣化痰之藥前症益甚至夜作喘口開徹夜不寐手足並冷藥餌到口即嘔余謂悉因脾氣虛甚所致先以人參白术各五錢炮薑五分以米湯煎之時灌數匙次日能服二盃次日又服一劑諸症漸愈至十餘劑後朝用補中益氣湯夕用異功散而愈

李通府子十六歲腰患之三年不愈色黯下陷余曰此腎經症也宜用六味丸滋化源以生腎水更用加聖餅外散寒邪以接陽氣不信別用雜藥元氣益虛七惡蜂起始信余言仍用前藥而愈

陳州守子閃右臂腕腫痛用流氣等藥發熱惡寒飲食少思口舌乾燥腫痛愈熾形氣益疲余以助胃壯氣爲主佐以外治之法而愈

黃地官子腿患之腫痛發熱以濕毒治之虛症悉至余謂此元氣虛弱外邪乘之也用十全大補湯加聖餅而愈

一小兒臂肘腫硬用流氣飲肉色不變飲食少思余曰此肝脾虛症也用六君桔梗薄桂茯苓半夏及加聖餅而消

一小兒腿腕間患此已半載腫硬色白形氣俱虛余先用五味異功散加當歸二十餘劑却佐以八珍湯二十餘劑更用蔥慰法腫勢漸消中間一塊仍腫此欲作膿也當補其血氣遂用托裡散爲主異功散爲佐仍用蔥慰法月許針出稠膿仍用前二十藥及豆豉餅二十月餘而愈

一小兒腿患之腫硬色白惡寒懶食此脾胃陽氣虛而不能成膿也非敷貼敗毒所能療遂用托裡散及蔥慰法月餘患處脹痛發熱膿成針之膿出而安仍用托裡散肢體漸健因飲食肉傷泄瀉忽口噤目閉自汗手冷此脾胃虛寒之惡症也以異功散內用人參一兩乾薑一錢半灌之盡劑而甦

又以托裡散內用人參五錢數劑始能動履却用托裡散大補湯蔻慰法豆豉倂半載而愈

一小兒十五歲早喪天眞日晡發熱遍身作痛或四肢酸軟嗜痰頭運服祛濕化痰之藥腿之內外肉色腫硬而不變因服攻毒之藥虛症蜂起按豬氏云男子精未滿而御女以通其精五臟有不滿之處異日有難狀之疾正合此論遂用補中益氣湯及地黃丸半年而愈此等症候誤認爲實熱而用敗毒之藥者必致不救

賈閣老子年十六患此二載矣脈洪大而數膿清熱渴食少體倦夜間盜汗午前畏寒余曰此眞氣不足邪氣有餘之症治之無功矣彼懇求治午前勉用四君芎歸炙草午後四君麥門五味逾月諸症漸減有用滲利之劑保其必全者彼信服之形體骨立未幾而歿

一小兒右腿脫壅腫形體怯弱余欲以補氣血爲主佐以行散之劑彼不信反內服流氣飲外敷寒涼藥加發熱惡寒形體愈瘠始求治於余余曰惡

寒發熱脉至洪大乃氣血虛敗之惡症也不可治矣後潰而不斂瀝盡氣血而亡

掌教顧東帆子十餘歲秋間腰腿隱隱牽痛面色青中兼黑余曰青是肝虛黑是腎虛當急調補脾腎否則春間必患流注矣不信另用行氣破血之藥至夏腰臀間漫腫五寸許復來請治脉數而滑按之如無此元氣虛極而膿內潰不能起也辭不治後果歿

健脾滲濕飲治瘡瘍初起欲腫作痛或濕毒下注或瘰跳穴痛

人參　白朮　蒼朮　防己　酒拌
黃柏　炒　川芎　各五分　木瓜　不犯鉄器　柴胡稍　甘草　各三分
茯苓　陳皮　當歸

右薑水煎服如二十五劑不退加桂少許酒煎亦可小便澁加牛膝身痛加羌活

節腫痛服之自消若潰而發熱與補藥兼服自和血定痛丸　一名黑丸子　治流注膝風或閃跌瘀血肢

百草霜 五兩 赤小荳 八兩 川烏炮一兩半 白蘞 八兩
白芨 南星炮各二兩 芍藥 當歸
牛膝 各五兩 骨碎補 四兩

右爲末酒糊丸桐子大每服二十三十丸白湯下神効葱熨法治流注結核或骨癰鶴膝等症先用隔蒜灸若餘腫尚存用此慰之以助氣行血散其壅滯功効甚速又治跌撲損傷止痛散血消腫之良法也其法用葱細切搗爛炒熱頻慰患處冷則易之如鶴膝風兼服大防風湯而愈

隔蒜灸法治流注及癰疽鶴膝風等症每日灸一二三十壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法有回生之功其法用大蒜去皮切二文錢厚安患處用艾壯於蒜上灸之二壯換蒜復灸未成即消已成者亦殺其毒如疳大用蒜杵爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再易如不痛或作膿或不起發及瘡屬陰症者尤當多灸凡瘡不痛不作膿不發起者皆氣血虛也多灸不治惟患在頭

面者不宜灸論中嬰兒灸法見疔瘡
如聖餅治流注及一切瘡瘍不能消散或潰而不斂

乳香　沒藥　當歸各等分　麝香減半

右爲末用酒糊和餅二箇乘熱熨之毒瘡加蟾酥

六味丸一名地黃丸此壯水之劑也夫人之生以腎爲主凡病皆由腎虛而致其流注瘰癧屬肝腎二經發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛嗽血吐血頭目眩運小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰膝痿軟五臟虛損尤宜用之乃水沃爲疾之聖藥血虛發熱之神劑也方見發熱不止

當歸補血湯治流注及潰瘍肌熱面赤煩渴脉洪大而虛重按全無此血虛症也誤服白虎湯必死方見發熱不止

益氣養榮湯治流注氣血虛弱不消散或四肢頸

項患腫不問堅軟赤白或痛或不痛日晡發熱或潰而不斂方見鶴膝風

十全大補湯治諸瘡血氣虛弱不能消散潰腐收斂或寒熱汗出口眼歪斜肌瘦少食或日晡發熱自汗盜汗或朝寒暮熱瘡口不斂等症方見便癰

天蛇毒

手指頭生瘡俗名天蛇毒然五指各有經絡拇指屬手太陰肺經食指屬手陽明大腸經中指屬手厥陰心包絡經無名指屬手少陽三焦經小指屬手少陰心經亦有患於足者足厥屬肝膽胃三經太指屬肝脾二經次指屬膽經小指屬膀胱經各當隨經而治其致患之由或因胃中積熱所發或因乳母膏粱厚味所致或因濕熱下流或因風毒外中大率多由所稟足三陰之經虛故邪得以入之也其初患腫痛者先用仙方活命飲次用托裡消毒散元氣下陷重墜作痛久而不潰者用補中益氣湯若服敗毒散及敷寒涼之劑則瘡口變黑或努肉突出或指皆黑大抵手足為氣血難到之

處手屬於胃足屬於脾不可損其眞氣丹溪以麝居僻位尚言氣血罕到況肢末乎故寒凉克伐之藥所宜深戒者也

一小兒十四歲手大指患之色赤腫痛用奪命丹二粒活命飲一劑將愈因飲酒沐浴而瘡復作發熱咳嗽余謂此毒原屬肺經今肺爲濕熱所攻瘡毒乘勢妄行故復作耳先用瀉白散二劑而痰嗽除又用托裡消毒散而瘡愈

一小兒食指患之並出血水瘡口凸腫上連手背

久而不愈余曰此元氣虛弱風邪襲於患處血氣不能運及而然用托裡散及葱熨之法諸症悉退又用黃芪餅異功散加升麻柴胡而愈

一小兒患之作痛發熱內外皆用寒凉之藥手背出膿三月不愈面色痿黃此脾氣復傷也先用異功散加升麻柴胡桔梗漸愈又佐以托裡散豆豉餅而痊

一小兒十二歲素食膏粱足大指患之腫連脚面喜飲冷水右關脉洪大此脾氣復傷而積熱下注

也先用清胃散四劑次用活命飲二劑腫痛漸消又用托裡消毒散數劑膿潰而愈

一小兒足大指漫腫上連趺陽色赤腫甚右關脉數而有力此胃經濕熱下注也用活命飲一劑大指本節後始發瘡頭痛亦稍止再劑而漫腫悉退又用消毒散出膿托裡散收斂而愈

一小兒足次指患之色赤腫痛上連於腿外拳寒涼之藥反致麻木重指方知此氣血難到之所又因寒涼遏絕而然急以活命飲加黃芪五錢煎服外以薑葱湯洗去敷藥用隔蒜灸法半晌知痛其腫頓退再用托裡散加人參三錢數劑膿潰而愈

一小兒足大指患之內服外敷皆寒藥也腹痛惡心手指並冷此脾胃之氣復傷而作非瘡毒也先用異功散加柴胡升麻白芷及仙活命飲各一劑諸症頓退又用托裡消毒散膿潰而愈

一小兒足大指患之變膿窠之狀良久乾硬痛甚小便頻數此禀父腎經虛熱所致用六味地黃丸

一小兒足中指患之耳中腫痛小便頻數此稟受肝腎虛熱為患用六味地黃丸為主佐以柴胡梔子散而愈

一小兒不時生瘡皆在手足之表年餘不愈審其乳母善怒用加味逍遙散毋于服而愈

一小兒足大指患之腫痛連脚用活命飲及隔蒜灸其痛不止着肉艾灸數壯方止用活命飲及托裡消毒散而愈

一女子十五歲足拇指瘁痛數敗毒之藥勢益甚而色黯余謂脾經鬱結所致彼人畧不經意後朝寒暮熱飲食頓減患處微腫足脛漸細而效

錢氏瀉白散 方見臂癰

奪命丹 方見疔瘡

消毒散 方見胎毒發丹

蒸慰法

托裏散二方見流注

仙方活命飲

托裡消毒散二方見熱毒瘡瘍

東垣清胃散 方見腹癰

五味異攻散 方見敗毒之藥

補中益氣湯 方見肌肉不生

天泡瘡

天泡瘡狀如水泡屬肺胃二經風熱若發熱嗽痛邪在表也用人參敗毒散發熱咳嗽邪在肺也用加味瀉白散熱渴便秘邪在內也用加味清凉飲此肌膚之症當去毒水以金黃散或黃栢蚯蚓敷之當歸膏亦善既安不必服藥若因攻伐過度元氣虛而變生別症者當參各門治之

一小兒患此嗽赤惡寒發熱太小便赤澁此邪在表裡之間遂外敷金黃散內服大連翹飲子諸症少愈更加味解毒散而痊

一小兒患之嗽痛發熱太小便如常此邪在表也挑去毒水敷金黃散用荆防敗毒散治其表柴芩參苓散安其裏而愈

一小兒患此服敗毒之劑喘嗽屑白此脾肺之氣復傷也先用補中益氣湯一劑諸症悉退後加桔

梗白芷二錢而愈
一小兒患此服敗毒散傳寒涼藥嘔吐泄瀉猶索
敗毒散余佯諾之却以五味異功散加柴胡升麻
而吐瀉愈又用柴芩參苓散而瘡痊
一小兒患此服敗毒之藥腹痛泄瀉余意脾氣復
傷宜用五味異功散不信仍服敗毒之藥後果不
食作嘔流涎泄瀉後重余先用補中益氣湯次用
五味異功散而愈
一小兒患此服敗毒散作渴飲湯余與七味白朮
散治之不信自服敗毒之藥前症益甚更加嘔吐
不食來請治余曰嘔吐不食手足並冷痰喘氣促
唇色皎白始見虛寒即當温補反服攻伐元氣之
藥虛而又虛今脾肺敗症已見莫能爲矣辭之果
不治
柴芩參苓散治肝膽經分患天泡等瘡或熱毒瘰
癧之類
柴胡　芍藥　人參　白朮
茯苓　陳皮　當歸各五分　牡丹皮

山梔炒　甘草各二分

右每服一二錢水煎服

加味解毒散治天泡瘡發熱作痛即加味消毒散

加金銀花漏蘆

玄參　連翹

當歸　羌活

黃芩　甘草各一錢

金銀花　漏蘆各二錢

右每服一二錢水煎服或用蜜丸

金黃散治天泡瘡消毒止痛

升麻　芍藥

生地黃　牛蒡子炒各三錢

滑石　甘草

右各另爲末和勻傅患處如泡挑去水傅之加

黃柏尤好

補中益氣湯　方見肌肉不生

五味異功散　方見敗毒之藥

加味瀉白散　即瀉白散加山梔杏仁

楊梅瘡

楊梅瘡乃天行時毒亦有傳染而患之或稟賦所得者受症在肝故多起於下部治失其宜多致蝕

傷眼目腐敗腎莖拳攣肢節初起之時上體多者
先用荊防敗毒散下體多者先用龍膽瀉肝湯大
便秘者用大連翹飲後用換肌消毒散若蝕傷眼
目兼用九味蘆薈丸六味地黃丸骨節拳攣兼用
蠲痺解毒湯若因脾胃虧損而不能愈者先用異
功散後用換肌消毒散若用輕粉之藥多致敗症
也

一小兒週歲傳染此瘡誤薰銀硃之藥昏憒不乳
遍身無皮用菉荳黃柏遍摻膿上令兒聽臥更用

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

金銀花生甘草爲末白湯調服漸愈若瘡乾燥更
用當歸膏誤用輕粉者亦以前藥解之

一小兒患此年餘不愈形體消瘦日晡尤甚朝用
八珍湯夕用換肌散并太乙膏三月餘而愈

一小兒原有肝疳後染前症膿水淋漓腹脹嘔吐
小腹重墜余欲用補中益氣湯升補中氣不信仍
服胃苓之劑更喘嗽流涎余謂脾氣虛而肺氣弱
也仍補中益氣湯夕用五味異功散元氣漸復
乃佐以換肌消毒散尋愈

一小兒因母曾患此症生下即有用換肌散母服五十餘劑子用當歸膏調金黃散隨患處傅之尋愈

一小兒十四歲患此用薰法肢體面首悉皆浮腫數月間遍身皮膚皆潰如無皮狀膿水淋漓先用金銀花甘草煎湯與之恣飲又爲末摻遍身及鋪桃葉令兒臥之半月許皮膚稍愈却依換肌散而愈又一小兒二歲用薰法吐痰喘躁不及治而死

換肌消毒散 一名萆薢散

治楊梅瘡不拘初患日久並效

土茯苓 即萆薢 當歸 白芷 甘草 皁角刺 薏苡仁 白蘚皮 木瓜 不犯鐵器

右水煎食前并空心服

又方 治大人之劑如用前方未應或兒長大宜用此方

土茯苓 五錢 當歸 皁角刺 炒 薏苡仁 白芷 各一錢 白蘚皮 木瓜 不犯鐵器 金銀花

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

木通各七分　甘草
茯苓一錢　黃芪炒二錢
生地黃八分
右作二劑水煎出勿者作一劑煎分兩二次服

蠲痺解毒湯

薑黃　羌活
當歸各四分　白朮五分
皁角子炒各三分
白鮮皮　赤芍藥
茯苓　白芷
防風各五分
連翹　川芎各八分

右水煎服

九味蘆薈丸　方見喉痺

當歸膏方見湯火傷

太乙膏　方見跌撲外傷

金黃散　方見泡癍

赤白遊風

赤白遊風屬風熱血熱蓋血得熱而遊走耳白屬氣分赤屬血分或因腠理不密風熱相搏怫鬱而成或因乳母食膏粱厚味所致若風熱者用小柴

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

胡湯加防風連翹血熱熱者用四物湯加柴胡山梔
牡丹皮風熱相搏者用人參敗毒散內熱外寒者
用加味羌活散胃氣虛弱者用補中益氣湯加羌
活防風或消風散血虛者用加味逍遙散如未應
用逍遙散六味丸若嬰兒患此當審其受症之因
而調治其母
一小兒患此其色或赤或白或痛或痒詢之因母
食膏粱厚味所致余用東垣清胃散治其母牛黃
散治其兒而愈

一小兒患此因母鬱怒所致母用加味小柴胡湯
及加味逍遙散兒熱止又以加味歸脾湯而愈
一小兒患此嗜膏粱甜味齒齦浮腫漸至蝕爛先
用清胃散後以四味肥兒丸間服而愈
一小兒患此色赤作痒脈浮數此肺胃二經風熱
也用人參消風散而愈又因停食復發色赤作痛
先用保和丸後用異功散而消
一小兒患此作痒搔破膿水淋漓寒熱往來此肝
經血燥而生風先用加味逍遙散肝症頓退倦怠

少食用異功散三黃散而愈
一女子十五歲患此色赤作痒寒熱脇痛面青或赤此肝火動而血熱也先用加味逍遥散加膽草四劑諸症頓退但體倦少食惡寒欲嘔此脾爲肝木所侮而肺氣虛也用五味異功散及加味逍遥散而愈
一女子患此寒熱作嘔先用加味小柴胡湯二劑而安再用人參消風散而愈後因怒發熱經行如崩遍身赤色四肢抽搐難以診脉視其面色如漆此肝心二經木火相搏而血妄行耳先用柴胡梔子散再加味逍遥散諸症頓退又用八珍湯而痊
一小兒因母感寒腹痛飲燒酒兒遍身皆赤遊走不定昏憒發熱令乳母時飲冷米醋一二杯亦以一二三滴塗兒口內週日而痊
歸脾湯治小兒因乳母憂思腸脾血虛發熱患前症久不愈食少體倦或便血下血怔忡不寧驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗等症方見脇癰
人參消風散治赤白遊風或風熱隱疹搔痒或寒

熱作痛

人參三錢　荊芥穗　甘草炙　陳皮各五錢
白殭蠶　茯苓　防風　青蒡
藿香　蟬蛻各二錢　厚朴三錢　姜製羌活二錢

右每服一二錢水煎

加味逍遥散 方見發熱不止

三黃散 方見黃水瘡

柴胡梔子散 方見胸癱

小柴胡湯 方見腋癱

加味小柴胡湯 方見熱毒瘰癧

牛黃解毒散 方見頭面瘡

發瘢

潔古云瘢瘡之病瘍腫於外者屬少陽相火也謂之瘢小紅腐隱於皮膚之中者屬少陰君火也謂之疹瘢疹並出則小兒難禁然首尾俱不可下大抵表裏之藥多發表之藥少小便秘則微疎之身温者順身凉者逆大忌外敷寒凉內用疎導無此二者可保無虞

一小兒患痲發熱體倦少食此脾肺氣虛外邪相搏也先用消風散二劑隨用補中益氣湯加茯苓藥而愈

一小兒患痲作痛熱渴服發表之劑益甚形氣倦怠脉浮而數此真氣復損而然耳遂用人參安胃散補中益氣湯而愈

一小兒患痲發熱用犀角消毒散一劑吐瀉頓作余曰此邪氣上下俱出矣勿藥自愈未幾果安

一小兒素面白患疹作痒鼻塞流涕咳嗽不止用敗毒散膿水淋漓惡寒喘急朝寒暮熱余謂脾肺之氣復傷耳用補中益氣湯稍愈佐以五味異功散而愈

一小兒患疹寒熱搔痒先用消風散治其兒次用加味逍遥散治其母兩月而愈

一小兒患痲作渴發熱咳嗽此邪在表宜汗之先用葛根橘皮湯一劑次用玄參橘皮湯而安癸丑歲患此症者余先用葛根橘皮湯後仍用玄參橘皮湯而全愈

一小兒患疹先用抱龍丸解之彼之父母另用以他藥下之其疹稠密余曰凡瘡疹始出未有他症但須用平和之藥以解之如三二日不出或出而不快宜微發之更又不出當再發之出而不多脉和平者無他症也若瘡疹本稀少者不可更發若瘡疹起發而能飲食者以大黃丸下之一次若初起就用下行之劑則裡虛而瘡疹不能盡發出而稠密難治至三二日其瘡疹黑陷所喜特不寒戰余遂用百祥丸及牛李膏各一服其瘡疹復紅活而愈

一男兒因戲鞦韆絕繩而墜遂患急驚發搐或用以表散之藥不愈余曰此乃急驚當先退其熱遂用以大黃丸玉露散及惺惺丸又加以牛黃龍麝解之至三二日肌膚尚熱余曰再二日不愈必發痲瘡也已而果然用服必勝散七日而愈此乃初因誤散其表則內熱不止而痲疹必自生也若幼小之兒猶宜謹慎

百祥丸治痘瘡及痲疹黑陷欲吐青綠水

紅牙大戟（陰乾漿水煮軟去骨復入原汁中煮）

右痦乾爲末水丸粟米大每服十丸赤脂麻湯下服後須急以四君子加丁香陳皮木香厚朴炮薑以温補脾胃若身熱飲水黑睛復起十中可救十二

牛李膏治痘瘡瘢疹黑睛多

牛李子

右杵汁石器內熬膏每服皂子大煎杏膠湯化下

玉露散治傷熟吐瀉黃色後藥爲末每服五分白滾湯調下

石膏煅　寒水石各五錢　甘草二錢五分

人參安胃散治癍疹及服峻劑以致虧損脾胃虛熱泄瀉嘔吐飲食少思等症方見喉痺

犀角消毒散治瘡疹毒發熱煩躁及瘡疹等症

牛蒡子　甘草　荆芥　防風各五分

犀角銼二分　金銀花三分

右水煎熟入犀角頓出服

補中益氣湯　方見肌肉不生

五味異功散 方見敗毒之藥
加味逍遥散 方見發熱不上

黃水粘瘡

小兒黃水粘瘡屬肝脾二經風熱積熱所致邪在表而痒痛者輕則犀角消毒散重則連翹防風湯邪在內而大便秘者輕則九味解毒散重則大連翹飲若頭自不清憎寒壯熱作渴便秘者表裏俱有邪也加味清涼飲若誤服尅伐之藥而致發熱惡寒者肺氣傷也用四君桔梗柴胡發熱喘吐胃氣傷也用異功散發熱作渴脾氣虛也用六君子湯並加柴胡升麻餘當隨症裁之

一小兒患此膿水淋漓寒熱作痛服抱龍丸敗毒散更加氣喘等症益氣喘發搐乃肝火乘脾咬牙流涎乃脾氣虛寒遂朝用補中益氣湯夕用五味異功散外敷立效散而愈

一小兒患此發熱驚悸倦怠面黃懶食流涎服清涼之藥更加吐瀉睡而露睛余謂心脾虛熱用六君乾薑一劑頓愈又用異功散立効散而愈

一小兒患此或痒或痛膿水瀝淋服表散之劑更惡寒發熱嘔吐不食手足並冷此病氣實而元氣虛也先用異功散加桔梗藿香而嘔吐止又用異功散而寒熱除用人參消風散而瘡愈

一小兒所患同前服荆防敗毒散加喘嗽腹脹四肢發搐此脾肺氣虛而肝木乘之用異功散加柴胡升麻桔梗二劑諸症頓退又服異功散二劑而愈

一小兒患此服抱龍丸之類汗出喘嗽此肺氣虛而爲外邪所乘也用異功散加桔梗二劑又復風發熱咳嗽其瘡復甚用惺惺散一服外邪頓退又用異功散而痊

毛通府子患此卯關脉青兩目時翻形體困倦此土虛木旺當用和肝補脾湯反服敗毒散前症益甚更加吐瀉不食遍身發泡余用前湯刺泡出水用蓂豆甘草末頻鋪席上任兒睡卧後用神效當歸膏而愈

沈尚寶子患此咳嗽惡寒用大連翹飲腹脹少食

此表症瀉裏致元氣復損非其治也用補中益氣湯而愈

一小兒患此作痒發熱膿水淋漓面青惡寒此肝火血熱用加味逍遙散稍愈又用和肝補脾湯而痊

一女十四歲遍身疙瘩搔破膿水淋漓發熱頗躁日晡益甚此血氣虛而有熱也用加味逍遙散而愈

大連翹飲治風毒熱毒發熱作痛一便不利表裏俱實方見臂癰

柴胡梔子散治肝膽風熱生瘡作痛發熱或瘡破而膿水淋漓或發寒熱晡熱即柴胡梔子散方見脇癰

犀角消毒散治熱毒積毒發于肌表而頭面生瘡或痛或痒者方見發痲

九味解毒散治熱毒胎毒而發瘡瘍之類未潰作痛者

黃連炒 三分 金銀花 連翹 蒲黃 各五分

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

山梔四分　白芷六分　當歸八分　防風三分
甘草三分
右水煎服

黃連消毒散治腦疽腫瘍疼痛或痲木者
黃連製　羌活各一分　黃芩　黃栢各五分
生地黃　知母製　獨活　防風
當歸尾　連翹各四分　藁本　防巳
桔梗各五分　黃芪
澤瀉各二分　人參　蘇木　陳皮
甘草各三分

右水煎服

人參消風散治小兒瘡瘍膿水淋漓誤服表散之劑更兼惡寒發熱嘔吐不時不思飲食或痒或痛手足並冷元氣甚虛頭目拘急肢體煩疼肌肉顫動耳若蟬鳴鼻塞多嚏皮膚頑痲瘙痒癮疹目瀝昏困方見赤白遊風

連翹防風湯治小兒肝脾風熱時毒頭面生瘡
連翹研碎　防風　黃連　陳皮
芍藥　當歸　獨活　白蒺藜炒去刺

荆芥　茯苓
牛蒡子炒研等分
右每服二錢水煎服
惺惺散治風寒瘡疹痰嗽發熱
桔梗　細辛
甘草　瓜蔞根
右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎服
和肝補脾湯治風熱瘡疹脾土不及肝木太過
人參　陳皮　黄芩　甘草
川芎各五分　白朮　白茯苓

茯苓　芍藥各七分
山梔炒各四分　柴胡　甘草各灸三分
右作一劑水煎服
益脾清肝散治肝脾風熱瘡寒熱體痛脾胃虛弱
人參　白朮　茯苓　甘草
川芎　當歸　黄芪各三分　柴胡
右水煎服
三黄散治風熱疳熱生瘡水浸淫膿流處便濕爛

松香　五倍子　黃連　黃丹　海螵蛸各一錢　輕粉　雄黃各少許

右各爲細末用猪腦油調塗瘡上如瘡瘍有膿水者更須以細末乾摻瘡上先拭洗膿水而敷之

荆防敗毒散治瘡瘍瘍或發寒熱或頭目拘急脹痛邪在表者及膿水淋漓或痒或痛者

人參　羌活　柴胡　獨活　前胡　桔梗　枳殼　茯苓

川芎　甘草　荆芥　防風各等分

右水煎服

立效散治眉瘡耳瘡及一切瘡瘍疥

定粉　松香　枯礬二錢

右爲末清燈油調搽

頭面瘡

頭額瘡發者皆屬心經耳瘡少陽經發兩鬢者皆屬膽經發於頰前鼻孔及人中左右者皆屬大腸

經發於鼻之挾孔下唇口及承漿頤後頰車耳前髮際額顱者皆屬胃經發於目內眥上額尖至後腦項者皆屬膀胱經既察其經即當分治若禀腎火者用六味地黃丸胎毒者犀角消毒丸食積痞者四味肥兒丸乳母膏粱者東垣清胃散至於諸腑受病必兼諸臟故患於額間屬心經發熱飲冷者爲實熱用導赤散發熱飲湯者屬虛熱用養心湯左腮屬肝經或頸項勁強者爲實熱用柴胡清肝散或咬牙頓悶者虛熱用六味地黃丸右腮屬肺經咳嗽飲冷者爲實熱用小青龍湯加減發熱咳嗽者爲火刑金用人參平肺散鼻間屬胃經發熱飲冷大便黃硬者爲實熱用瀉黃散發熱飲湯大便青白者爲虛熱用異功散患於頰及耳輪者屬膀胱經腎無實症惟用地黃丸若瘡已潰久而不愈則當審其藏氣之相勝病邪之傳變而以調補脾胃爲主若因乳母遺熱爲患者當先治其母則兒病自愈也

一小兒鬢患一瘡腫赤作痛余謂屬手足少陽經

風熱用柴胡梔子散不應膏其母左寸關脉弦洪而數即以前藥令母服之兒遂愈

一小兒十三歲右頰患腫作痛飲冷脉沉實重按則數此積熱在臟也當疎通其內不信乃泛服雜藥兼敷寒涼腫硬下頸內潰復來請治脉已無勞矣先用托裡散二十劑針之又二十劑而膿始出惡穢少頃煩躁發熱作渴痰喘此潰後變症因氣血虛故也先用當歸補血湯二劑證頓止又用異功散加山梔胃氣亦健未用托裡消毒散瘡斂而愈

一小兒右腮赤腫余謂胃經有熱先用瀉黃散一二服又用清胃散而愈後復患之敷石灰等藥致傷其血瘡不能潰余先用活命飲次用托裡消毒散而愈

一小兒耳後結數核作痛左腮青赤此肝疳積熱所致用四味肥兒丸柴胡清肝散及五味異功散加柴胡升麻而消

一小兒耳赤腫痛寒熱往來此肝經熱毒也用加味小柴胡湯寒熱未退又用柴胡清肝散而赤腫

頓消

一小兒頰間赤色作渴目睛白多面常生瘡睡而露睛先君謂眞陰虛用地黃丸補中益氣湯而愈後出痘亦無虞設不預爲調補腎氣則出痘之危其可保耶

一小兒四歲太陽連眉不時作痒或生小瘡此屬膽經風熱也先用地黃丸次用柴胡梔子散後專服地黃丸而愈

一小兒面常生瘡左頰赤腫或睡中發搐審其母素有鬱怒用加味逍遙散加味歸脾湯母子俱服而愈

一小兒面白時或變赤生小瘡兩足發熱先君以爲壹臟足三陰虛熱不信專服清凉之藥後出痘果黑陷而歿

一小兒久患前症耳下結核余曰此肝脾疳毒也久而不愈則先用五味異功散加柴胡梔子散清其肝火後用四味肥兒丸治其疳而愈

一小兒患前症耳後結核太便酸臭飲食減少余

謂此脾疳所致先用五味異功散爲主異功散爲佐而愈

一小兒患前症頭皮光急發熱作渴小便頻數余謂此腎肝之疳也用地黃丸爲主朝用補中益氣湯夕用五味異功散而愈

一小兒患左腮腫赤覺以鍼箍散週圍塗之遂致腫甚變成爲瘡出膿月餘不愈腫赤不消頸項勁强余謂此乃肝經實熱所致也用柴胡清肝散數劑而腫赤漸消外以當歸膏敷而愈

一小兒患前症咬牙頻聞此乃肝經虛熱之所致也外以當歸膏敷患處服以六味丸料漸瘥

一小兒患右腮腫痛初畏客微細紅色後遂日漸紅赤腫亦日增更又發熱喜飲涼冷嗆急咳嗽余謂此乃肺經之實熱所致也用瀉白散而愈

一女子年十一歲忽患右腮腫痛漸而日甚成瘡腫赤不減先用仙方活命飲四劑潰膿但發熱咳嗽不減此肺火刑金用人參平肺散數劑而愈

一小兒年十一歲常患鼻間及鼻孔中生瘡常發

常愈亦不以爲意忽又於鼻孔中頓發一瘡月餘不愈漸生於外遂覺疼痛身體疲倦更加發熱飲食不思日加其痛晝夜咳嗽欲飲涼冷大便實結糞色黃硬余謂此乃胃經之火實熱所致也遂用瀉黃散數劑而漸色或青或白此乃胃經之虛熱也用異功散而瘥

一小兒患髮際生瘡被風入瘡口腫痛極甚服藥合身體發熱服寒涼之藥致飲食頓減患處不潰余用托裡養血之劑數服而飲食稍進腫亦漸消而瘡亦膿潰後因勞每日晡發熱此陰虛而內熱也以四物湯軟柴胡地骨皮又用養血之藥而瘡愈

一小兒先患眉煉延及遍身如癩久而不愈手足並熱面色常赤此稟母胃火所致予服瀉黃散母服竹葉石膏湯加味逍遙散予又用牛黃散扳毒散母子並愈

一小兒頭患瘡如癩或作痒結痂或膿水淋漓二十年矣作渴飲冷發熱面赤此稟心與小腸表裡俱

有熱也先用導赤散二十服却用活命飲痰毒散漸愈子又服牛黃散毋服逍遙散而愈後因毋食膏粱復發用清胃散毋子服之子又服活命飲而愈一小兒面生瘡作渴飲湯服敗毒之藥致吐瀉不食手足並冷余謂脾胃氣虛復傷而變症虛寒也先用益黃散而諸症退用異功散而瘡症愈

錢氏瀉黃散治瘡瘍作渴飲冷臥不露睛手足並熱屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯臥露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用五味異功散若誤服攻毒之劑吐瀉不食手足指冷脾腎虛寒也宜用益黃散若病後津涸不足口乾作渴胃氣虛也宜用七味白术散

藿香葉　甘草　各七錢　山梔仁一兩
石膏煅五錢　防風二兩

右用蜜酒微炒爲末每服一二十錢水煎

益黃散治瘡瘍屬脾胃虛寒吐瀉不止手足並冷者

陳皮一兩　丁香二錢　訶子炮去皮

青皮去白　甘草炙各半兩

右爲末每服一錢水煎養心湯治心氣不足虛熱上攻而患瘡瘍者

黃芪炒　白茯苓　半夏麴　當歸

川芎　辣桂　栢子仁　酸棗仁炒

五味子炒　人參各三錢　甘草炒四錢

右每服一二錢薑棗水煎爲末服亦可

牛黃解毒散治胎毒頭面生癩或延及遍身瘙痛不安浸淫不愈及眉煉瘡

生甘草一兩　牛黃五錢　膏粱之子必用之　金銀花一兩

右各爲末每服二三分乳汁調服或用甘草煎膏爲丸如芡實大每服一丸白湯化下外傳滴金散亦可

拔毒散治症同前及疥癩瘡癬

黃芩　黃連　銅綠二錢研細加之

右各另爲末乾摻患處或用油調摻疥瘡宜加

白礬三味俱生用　雄黃各五錢　松香

枯礬三錢

梔子清肝散 即柴胡梔子散治三焦及足少陽經風熱耳
內作痒生瘡出水或脇肋乳間作痛往來寒熱
方見
脇癰

仙方活命飲治一切瘡毒腫痛或作痒寒熱或紅
絲走徹惡心嘔吐幸症方見熱
毒瘡瘍

治疔瘡等症用金銀花杵爛絞汁一杯許入熱酒半
杯徐徐服之用藤葉亦効無鮮者用枯者煮飲
亦可

導赤散 方見臂癰

六味丸 即地黃丸加五味子四兩
肉桂一兩名加減八味丸
竹葉石膏湯 二方見作渴不止

清胃散 方見腹癰

人參平肺散 方見肺癰

當歸補血湯 方見發熱
五味異功散 方見敗毒之藥

托裡消毒散

托裡散 二方見熱毒瘡瘍
加味歸脾湯 方見脇癰

柴胡梔子散 即梔子清肝散
小柴胡湯 二方見脇癰
人參消風散 方見赤白遊風
瀉白散 方見臂癰
大楓膏 方見瘡疥
加味逍遙散 方見發熱不止
補中益氣湯 方見肌肉不生
四味肥兒丸 方見貼骨瘡
眉煉 附癩頭瘡

眉煉者謂小兒兩眉間生瘡如癬當求其因而藥之益眉屬膽經若原稟肝膽經熱或乳母肝膽經有熱者用柴胡梔子散或乳母食厚味醇酒者用加味清胃散或乳母有鬱怒者用加味逍遙散俱與乳母服子亦飲少許仍參前症主之

一小兒患前症用柴胡清肝散母子服之而愈後因母不戒膏粱厚味復發延及遍體膿水淋漓先用清胃散次用柴胡梔子散與母服子用清金散牛黃解毒丸而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒嗜膏粱甘味患之漸及肢體兩眉爲甚膿水淋漓寒熱往來內用清胃散加味小柴胡湯外傳立効散而愈後眉間復發兩目連瞤小便白濁將成肝痺用四味肥兒丸九味蘆薈丸而愈

一小兒因乳母不戒七情厚味患此延及遍身久而不愈母先用清胃散次用加味逍遥散予用牛黄散解毒丸立効散而愈後兒食厚味眉間作痒搔破成瘡或痒或痛兩目連瞤用四味肥兒丸佐以加味清胃散而愈

一小兒眉間作痒破而成瘡延及遍身兩脇爲甚用四味肥兒丸立効散母服柴胡梔子散加味逍遥散而愈

一小兒患此服化毒丹乳食不納手足俱冷此藥傷胃氣用五味異功散與母服兒亦時服二十五滴母又服加味逍遥散加龍膽草漏蘆兒症漸愈

一小兒患此先延兩脇後及遍身此肝火乘脾也診乳母亦有肝火先用加味逍遥散加炒黄連數劑却去黄連又二十餘劑而痊

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒患之乳母惱怒其瘡益甚眉稜抽動不經意延及遍身乳母甚怒兒面色赤驚悸咬牙兼之發搐此心肝二經風熱所致也用加味小柴胡湯加味逍遥散而愈

青金散治小兒疥癬眉煉或延及遍身瘡痒或膿水淋漓經年不愈

松香二兩　眞蛤粉五錢　青黛二錢五分

右爲末用燭油調搽或乾摻之或加輕粉枯礬各二錢以治前症及胎毒疥癩尤效

立効散　方見黃水瘡

加味逍遥散　方見發熱不止

牛黃解毒丸　方見頭面瘡

四味肥兒丸　方見貼骨癬

九味蘆薈丸　方見喉痺

加味清胃散

清胃散二方見腹癬

小柴胡湯　方見脇癬

加味小柴胡湯　方見熱毒瘰癧

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

導赤散 方見臂癰

活命飲 方見熱毒瘡瘍

牛黃解毒散

拔毒散二方見頭面瘡

保嬰撮要卷之十二終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之十三 續集

古吳薛鎧草創

男薛已編集

後學宋璞校閱

喉痺附五臟虛厥傳變 喉間內潰或鼻外患瘡

喉痺因膏粱積熱或禀賦有熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裡與症之輕重經之所主而治之若左腮色青赤者肝膽經風熱也用柴胡梔子散若腮色赤者肺經有熱也用瀉

白散額間色赤者心與小腸經熱也用導赤散若
兼青色風熱相搏也用加味逍遥散鼻間色黄脾
胃經有熱也用瀉黄散若兼青色木乘土位也用
加味逍遥散兼赤色心傳土位也用柴胡梔子散
頰間色赤腎經有熱也用地黄丸凡此積熱内蘊
二便不通者當疎利之風邪外客而發寒熱者當
發散之外感風邪大便閉結煩渴痰盛者當内疎
外解若因乳母膏粱積熱者母服凉坦清胃散若
因乳母恚怒肝火者母服加味逍遥散凉膈除煩
者兒服地黄丸大槩當用輕和之劑以治其本切
不可用峻利之藥以傷眞氣也

一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之藥益
甚仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虚症也益胃
爲五藏之本先用五味異功散以補胃加桔梗甘
草以消毒諸症頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈

一小兒喉間腫痛左腮色青赤此心肝二經之熱
也用柴胡清肝散而愈後因驚服至寶丹毒發
搐手足指冷此肝木虚而肺金乘之用補中益氣

湯以補脾肺六味地黃丸以滋肝腎而痊

一小兒發熱飲冷大便黃色手足並熱不能吮乳視口內無患揑其喉間則哭此喉內作痛乃脾胃實熱也用瀉黃清胃一散各一劑母子並服而愈

一小兒喉間腫痛口角流涎手足並熱用瀉黃清胃一散母子服之而愈後因母大怒兒憎寒發熱仍復流涎用柴胡清肝散加漏蘆母子服之而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肺與大腸有熱也先用牛蒡子湯加硝黃一服大便隨通乃去硝黃再劑頓愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散母子並服而痊

一小兒喈膏粱之味喉間腫痛痰涎壅盛服巴豆九前症益甚口鼻出血唇舌生瘡大便不實余用犀角地黃湯解膏粱之熱用東垣安胃散解巴豆之毒又用甘桔湯而愈

一小兒喉腫作渴大便乾實右腮赤色此肺與大

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

腸經實熱也用柴胡飲子一服而愈後因飲食停滯服峻厲之藥喉間仍腫腹中脹痛此脾氣復傷也用異功散加升麻當歸而痊

一小兒因母忿怒患前症兼咬牙呵欠余謂肝經虛熱之症子用芎桔湯加柴胡山梔牛蒡子母服加味逍遙散而愈

一小兒肌體瘦弱嗜土炭煤灰後鼻間不利恪服清熱之劑肌體愈瘦食少熱甚善驚善怒小便良久變白鼻中出息肉二寸許耳下頸間結小核隱於筋肉之間余謂肝脾虛羸之變症不信乃內清肺火外用腐蝕喉間亦腐余先用五味異功散加升麻柴胡蕪荑爲主更用四味肥兒丸爲佐脾氣漸健久用九味蘆薈丸爲主以五味異功散爲佐而愈

一女子六歲喉間腫痛鼻中息肉寒熱往來小便頻數良久變白此肝脾之症先用加味逍遙散加炒黑焦龍膽草熱痒漸退乃去龍膽草佐以四味肥兒丸而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一女子七歲鼻生息肉搽攻毒之藥成瘡腫痛外以黃連甘草黃柏末付之以解藥毒更以加味逍遥散清肝火佐以四味肥兒丸而愈

一女子鼻中及下部常出息肉屢用毒藥蝕之各挺出一條三寸許先與龍膽草湯爲主以加味逍遥散爲佐而愈

一小兒額間赤足心熱喉中常痛服清胃敗毒之藥余謂稟腎水不足而心火熾甚也當用地黃丸壯水之主以制陽光不悟口舌赤烈小便如淋而殁

一女子十四歲患前症雜用清熱敗毒等藥前症益更患陰挺詳見下卷

牛蒡子湯　治風熱上壅咽喉腫痛或生乳蛾

牛蒡子炒杵　玄參　升麻　桔梗炒
犀角鎊　黃芩　木通　甘草各等分

右每服二錢水煎服

拔萃桔梗湯　治熱腫喉痺

桔梗炒　甘草炒　連翹　梔子炒

薄荷　黃芩　各等分

右爲末每服一二十錢水煎服

柴胡飲　解肌熱積熱或汗後餘熱脈洪實弦數大便堅實者

黃芩七分　甘草四分　大黃八分　芍藥炒七分

柴胡　人參各五分　當歸一錢

右每服一錢薑水煎

東垣人參安胃散　治脾胃虛熱口舌生瘡或傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參一錢　黃芪炒二錢　生甘草　炙甘草各五分

白茯苓四分　陳皮二分　黃連炒二分　白芍藥酒炒七分

右爲末每服二錢水煎

三因王鑰匙治風熱喉閉及纏喉風

焰硝一兩半　鵬砂半兩　片腦一字　白殭蠶一錢

右研勻用五分吹入喉中立愈

九味蘆薈丸　治肝經積熱咽喉口舌生瘡或牙齦腫爛兩目生翳耳中出水或肝積瘰癧下疳陰

便不調肢體消瘦等症

胡黃連　宣黃連　蘆薈　木香
白蕪荑炒　青皮　白雷丸　鶴虱草各一兩
麝香三錢

右各另爲末米糊丸麻子大每服五分空心米湯下仍量兒大小用

芣桔湯治風熱上攻咽喉疼痛及喉痺妨悶

苦梗一兩　芣草炒二兩

右每服二錢水煎

濟生犀角地黃湯治膏粱積毒脾胃有熱喉咽腫痛或口舌生瘡

犀角　牡丹皮各一兩　生地黃八錢
赤芍藥七錢

右每服一二錢水煎

玉味異功散方見敗毒之藥

六味地黃丸方見作渴不止

柴胡清肝散方見脇癰門
補中益氣湯方見肌肉不生

瀉黃散 方見頭面瘡

腮癰 附耳症

腮屬足陽明胃經其生癰者多因兒食甜厚味乳母鬱怒兒受其患者若因
脾胃積熱所致亦有烈
熱積於內二便不通者用涼膈散風邪相搏二便
如常者用漏蘆湯胃經風熱或兼咽喉腫痛用升
麻防風湯若稟賦陰虛火動頰間或兩耳內生癢
或出膿不止者宜用地黃丸若因乳母肝火乘脾
用加味逍遙散脾經鬱熱用加味歸脾湯膏粱積

熱用東垣清胃散脾胃風熱用清咽利膈湯仍參
口瘡治之

一小兒腮腫肉色不變大便不實屬胃經虛熱用
五味異功散加升麻柴胡而愈又乳母飲酒兼怒
兩腮赤腫憎寒發熱用加味清胃散一劑加味逍
遙散一劑治其母兒亦飲數滴而愈

一小兒嗜炙煿腮腫發熱作渴飲冷用加味清胃
散而消後仍不戒厚味腮腫赤痛連舌本先用
瀉黃散而退次用加味清胃散而消

一小兒腮患瘡作渴飲湯飲食少思服敗毒散益甚余謂此胃經虛熱先用七味白朮散次用五味異功散而渴止後因母怒兩腮赤腫作渴發熱用加味逍遥散治其母兒患亦愈

一小兒十六歲腮患此三年不愈色黯下陷此胃經症也宜滋化源以生堅水外散寒邪以接陽氣不信妄用雜方元氣益虛七惡蜂起始信余言後用前藥果驗

一小兒頰腫敷寒涼之藥色白腫硬久而不愈此胃氣虛而寒邪凝滯也用葱發法以散寒邪異功散以助元氣遂愈若用攻毒之劑則誤矣

一小兒酷嗜甘味藥餌惟甘者乃服後患腮腫余知其胃症也經曰酸能勝甘當用酸味之藥遂以烏梅肉作丸甘草末爲衣服至二兩許始愈甘味腮腫漸消

一小兒腮腫痛外敷鐵箍散內服寒涼藥日久堅硬其色不變大藥之寒涼者外敷則氣色凝滯內服則脾胃有傷故氣血有虧而肉不潰色不赤也

用四君子加柴胡升麻白芷當歸外散寒邪內補脾氣更用葱熨法不數日膿潰而愈

一小兒頤頰常燉腫服清熱敗毒之藥更口渴足熱面色微黑余謂腎痿症用六味地黃丸與之服加味逍遙散而愈後因別服伐肝之藥前症復作寒熱面青小便頻數此肝火血燥耳用柴胡梔子散以清肝六味地黃丸以滋腎遂痊

一小兒頤頰腫痛後耳內出膿久而不愈視其耳內兩臉青黃屬鬱怒所致朝用加味歸脾湯夕用加味逍遙散皆愈

一小兒頤間發熱手足並熱用清胃瀉黃一散而愈後頰間腫痛燉連耳內余謂此腎經所屬也地不信雜用降火之藥耳出膿水或痒或痛稍加用心即發熱倦怠兩腿乏力用補中益氣湯及六味地黃丸稍愈畢姻後朝寒暮熱形氣倦怠足心發熱氣喘嘔痰仍用前一十藥佐以六君子湯而愈後不守禁忌寒發熱頭運嘔痰余謂腎虛不能攝水而爲痰清氣不能上升而頭運陽氣不能護守肌

膚而寒熱遂用補中益氣湯各加蔓荊子附子各一錢不應乃用人參一兩附子二錢一劑而應乃用十全大補湯百餘劑而痊

一小兒先頰間膿痛用敗毒之藥耳中流膿項間結核兩旬或連劑或赤痛小便或作痒或赤澁皆肝膽二經風熱用四味肥兒丸悉愈

一小兒腮頰腫痛服敗毒藥後耳出穢水余謂肝腎之症先用九味蘆薈丸而痊異姻後面黃發熱用黃柏知母等藥更胸膈痞滿食少痰壅乃利氣化痰加噴氣下氣用六君子補中益氣一湯加乾薑木香壽愈

一小兒腮腫捺石灰末久而不散余用四君子加升麻白芷及葱熨之法漸消又用仙方活命一劑而痊夫石灰乃辛熱燥血之藥小兒氣血虛者捺之反致難治慎之

一小兒腮間腫痛用鐵箍散敗毒散之類出膿久不愈面色黧足心熱口舌乾余謂此真腎水不足之虛症當補肺金滋腎水爲主不信仍服前劑膿

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

土益虛絕生氣而殺
升麻防風湯治胃經實熱咽痛口燥腮癰等症
升麻　防風　芍藥炒　陳皮各五分　連翹　當歸各七分
右每服二錢水煎仍量大小用之
清咽利膈湯治心脾蘊熱或咽喉腮舌腫痛
玄參　升麻　柴苓　防風　牛蒡子炒　芍藥炒各等分　桔梗炒　甘草炒　黃芩炒　黃連炒
右每服一二錢水煎
東垣清胃散方見腹癰
異功散方見用敗毒之藥
地黃丸方見作渴不止
即効葱熨法方見流注
仙方活命飲方見瘡瘍熱毒

臂癰之症當分經絡所屬受症之因而治之上廉屬手陽明經下廉屬手太陽經外廉屬手少陽經

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

肉廉屬手厥陰經內之上廉屬手少陰經或經絡熱鬱風邪外干氣血有乖即生癰毒若因心經有熱者導赤散加黃連心胞絡有熱者柴胡梔子散肺經有熱者瀉白散大腸經有熱者大連翹飲煩腫作痛者氣血凝結也用仙方活命飲腫痛不消者欲作膿也用托裡消毒散膿出反痛者氣血虛甚也用托裡消毒散膿熟不出者氣血虛也用五味異功散不可外傅生肌散恐反助其邪而肌肉難長也

一小兒臂上生癰腫連肘間此屬手少陰三焦二經先用仙方活命飲殺其大勢次用柴胡清肝散以清心肝之熱諸症頓退又用托裡消毒散出膿而愈

一小兒臂外側患毒此屬肺經部分先用神效解毒散加桔梗一劑腫痛頓減次用托裡消毒散而膿潰將愈因母食炙煿之味患處復腫兼發熱咳嗽子服瀉白散母服清胃散而痊

一小兒臂腕漫腫敷寒涼藥又常以冷水潤之腫熱徹上至肩兩月餘而潰四月餘不斂膿出清稀面色痿黃余曰此氣血虛不能充榮於肌肉也先用異功散加升麻柴胡脾胃漸健又用托裡散而愈

一小兒臂患癰久不愈手足時冷用異功散加木香佐以八珍湯手足溫和乃用托裡散將斂因飲食停滯傷脾患處腫硬用六君木香及托裡散而愈

一小兒臂癰久不愈潰出碎骨飲食少思不時寒熱膿水清稀此氣血俱虛也用八珍散加肉桂及豆豉而斂

一小兒臂膊赤腫發熱作渴飲冷症屬胃火先用加味清胃散而愈後因母食厚味復腫痛先用瀉黃散一服再用清胃散母子服之並愈

一女子臂瘡腫潰作痛用仙方活命飲痛止成膿用加味八珍湯而膿潰漸斂用加味逍遙散與母服而痊

一小兒因母食膏粱膏瘡潰而作痛脉洪數有力用清胃散與母服子服瀉黃散漸愈又用加味逍遥散母子俱服而愈

一小兒臂瘡服敗毒散嘔吐腹脹作痛手足並冷用六君薑桂諸症漸退飲食漸進次用五味異功散而愈

一小兒臂癰腫硬色白寒熱倦怠此血氣虛弱而不能潰散先用五味異功散加乾薑其腫漸退飲食漸進又用托裡散如聖餅膿潰而愈

一小兒臂癰腫硬不消食少自汗此脾肺氣虛而不能潰先用六君子湯而汗止乃佐以葱熨法而膿成又用八珍湯而膿潰用托裡散而瘡斂

一小兒臂患瘡敷寒涼之藥腫硬不消用補中益氣湯加木香薄桂及如聖餅助其陽氣而消

一小兒臂患瘡腫硬作嘔面色萎黃飲食少思此脾氣虛也用六君子湯嘔止食進又用五味異功散如聖餅而消

一小兒臂瘡作痛不止肌肉不生先用托裡消毒

散而痛止用五味異功散托裡散而肉生
一小兒臂患瘡久而不斂肌肉消瘦日晡體熱此
脾氣虛而不能生肌肉也朝用補中益氣湯夕用
五味異功散諸症漸愈又用托裡散如聖餅而愈
一小兒臂瘡腫痛燄右頤赤色傳服皆敗毒之
藥余謂此肺胃二經之症也當用瀉黃瀉白二散
主之不信恪用前藥致擾諸經虛症蜂起而歿
神効解毒散治一切瘡瘍初起腫者即消已潰仍
腫者即散已潰毒不解者即愈

金銀花一兩　甘草節半兩　黃芪　皂角刺炒
當歸各三錢　乳香　沒藥各二錢

右爲散每服二錢酒煎溫酒調服亦可嬰兒病
乳母亦服如瘡已潰腫痛已止者去乳沒金銀
花倍加黃芪甘草

白芷升麻湯治手明陽經分臂上生瘡

白芷　升麻　桔梗各一錢　黃芩炒
黃芪二錢炒各生黃芩五分　紅花　甘草炙各五分

右水酒半鍾煎食後溫服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

瀉白散治肺經有熱生瘡又化痰止渴治氣逆食
地骨皮　桑白皮炒各一兩　甘草炙半兩
右爲末每服一二錢入粳米百粒水煎
瀉心散治心經實熱生瘡作渴發熱飲冷手足並
熱者詳見心臟瀉心湯
導赤散治小腸實熱生瘡作渴發熱小便秘赤
生地黃　木通　甘草等分
右爲末每服一錢入淡竹葉水煎
大連翹飲即大連翹湯治肺熱生瘡
連翹　瞿麥　荊芥　木通
赤芍藥　當歸　防風　柴胡
滑石　蟬殼　甘草炒　山梔子
黃芩各等分
右爲末每服二錢加紫草水煎服之大便不通
量加大黃
補中益氣湯方見肌肉不生
加味逍遙散
六味地黃丸二方見發渴不止

十全大補湯 方見便癰
四味肥兒丸 方見貼骨癰
九味蘆薈丸 方見喉痺
柴胡梔子散 方見腹癰
東垣清胃散 方見腹癰
五味異功散 方見用敗毒之藥
托裡消毒散
托裡散 二方見熟毒毒瘡之前膚之
腋癰 謂癰生於腋之傍白者五十皆是也
腋癰屬足少陽手少陰手厥陰三經小兒患之多
稟賦肝火所致初起先用活命飲次用柴胡梔子
散五七日間作膿熾腫作痛者亦用活命飲殺其
大勢雖潰亦輕而易斂若膿已成用托裡消毒散
已出用托裡散如有變症當隨症治之
一小兒患前症腫痛用仙方活命飲而痛止用托
裡消毒散而潰因母飲酒復加腫痛母服清胃散
兒服活命飲托裡散而愈
一小兒患之因乳母恚怒所致子用仙方活命飲

母用柴胡梔子散加味逍遥散並愈後復患令母仍服前藥子服托裡消毒散而膿潰用托裡散而斂

一小兒腋下常患一枚此稟肝膽怒火也用牛蒡解毒丸母服柴胡梔子散逍遥散而愈後每發即服前藥而愈或用荆防敗毒散外敷鐵箍散以杜後患幾至不救

一小兒十四歲患之內外皆用寒涼敗毒之藥腫硬作痛上連肩髃膿成不潰或用針之膿仍不出余曰此氣血虛甚當峻補之不信半載後肩骨潰解惟皮相連瀝盡氣血而歿

一小兒患之恪服敗毒之藥久不潰色不變腫硬如石余用葱熨之法及托裡散二十餘劑患處微赤作痛又數劑腫起針出穢膿氣息奄奄用人參一兩乾薑一錢棗子十枚四劑仍用前散尋愈

一小兒患之膿內貴欠不出色不變亦不痛余謂氣血虛甚當先大補而用火針不信或用冷針膿果不出更氣喘自汗余用獨參湯一劑喘汗少止

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

膿仍未出又一劑膿出甚多喘汗大作又用前湯四劑諸症悉退乃用八珍湯漸愈後因傷風咳嗽誤用表散之藥煩躁自汗面赤色脉洪大無倫按之如無此血脫發躁也先用當歸補血湯諸症頓愈再用八珍湯而安又飲食過多發厥手足並冷用五味異功散加升麻柴胡生薑二劑而愈

一小兒患之色黯不欲二年不愈用十全大補湯及豆豉餅三月餘將愈後勞倦怒氣腋下腫痛以加味逍遥散十全大補湯相間服之月餘而愈

豆豉餅治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡用江西豆豉爲末唾津和成餅大如銅錢厚如二百錢置患處以艾壯於餅上炙之炙乾則再易如瘡大作大餅覆患處以艾鋪餅上炙之未成者即消已成者祛毒閒有不効者乃氣血虛敗之症也參苓類參法用之方見四物湯治瘡瘍血虛發熱日晡益甚或煩躁不寐

當歸二錢　熟地黃二錢　芍藥炒　川芎各一錢

右水煎服

參朮柴苓湯治瘧瘍脾氣虛弱肝氣內動肢體抽動者

人參　白朮　茯苓　陳皮　各一錢
山梔炒　鈎藤鈎子　各七分　甘草炒五分
柴胡　升麻　各二分

每服一二錢薑棗水煎嬰兒用大劑與每服子少服之

黃連安神丸治心經血熱發熱驚悸不安

黃連五分　生甘草二錢五分　生地黃半兩
當歸　硃砂　二錢

右爲末飯糊丸小豆大每服十五丸滾湯下如二三服不應當服歸脾湯嬰兒乳母並服

柴胡梔子散方見脇癰　一名柴胡清肝散

托裡消毒散

托裡散二方見熱毒瘡瘍

清胃散方見腹癰

加味逍遙散方見發熱不止

牛黃解毒丸方見胎毒瘡疥

十全大補湯 方見便癰

脇癰

脇肋者足厥陰少陽之經相火之司也乃木之土肝膽之氣不平則風火内搏榮逆血鬱熱聚爲膿而癰腫之所由生也亦有直賦毋氣肝膽之熱恚怒之火而致然初患漐腫作痛者宜用柴胡梔子散未消者用仙方活命飲其熱既殺而腫不消者則必成膿也乃用托裡消毒散其膿既成以代針膏決之仍用托裡散自愈若膿出而痛止腫消則不必用藥也

一小兒四歲脇間漫腫一塊甚痛色如故服流氣敗毒等藥加寒熱作嘔食少作瀉此稟肝脾氣滯之症元氣復傷而甚耳乃擇乳母氣血壯盛者與加味歸脾湯加味逍遥散服之兒飲其乳半載而消

一小兒左脇生瘡寒熱作嘔右關脉弦數此肝症傳於脾也先用柴胡清肝散次用五味異功散又用托裡散斂瘡而愈其時同患是症專用敗毒者

俱致不起

一小兒左脇下生瘡漫腫色赤此肝膽經形傷氣也先用托裏散消毒散加味小柴胡湯間服腫痛漸減又用托裏消毒散加味小柴胡湯瘡潰而愈

一小兒四歲患脇癰色赤此肝膽經血虛有熱先用加味逍遥散數劑大勢已消中間成膿又用托裏消毒散加柴胡山梔膿潰而斂

一小兒肩患癰痛甚腫至背乃膀胱經部分血瘀滯也先用仙方活命飲毒解痛止又用加味小柴胡湯加連翹山梔金銀花其勢漸退乃用加味逍遥散加金銀花黃芪漫腫悉消但中間不退此欲作膿也用托裏消毒散膿成而潰又用托裏散地黃丸補血氣滋腎水而愈

一小兒患之久不愈左關脉弦數右尺脉按之而弱此稟腎虛而然也用地黃丸爲主佐以八珍湯托裏散而愈

一小兒未春脇間赤腫此稟肝火所致用加味逍

遥散數劑與每服子日服數是漫腫悉退佐以托裏消毒散加山梔柴胡瘡潰而愈後因毋恚怒勞役子脇復腫赤用加味逍遥散加味歸脾湯毋子服之並愈

一小兒脇癰服伐脾之藥膿清不斂呵欠咬牙飲食少思仍欲伐脾余曰此脾虚之症也胃爲五臟之主當補脾胃則肝不侮而肌肉自生矣不信仍伐肝木遂致不救

加味歸脾湯治小兒因乳母憂思鬱怒胸脇作痛或肝脾經分患瘡瘍之症或寒熱驚悸無寐或便血盜汗瘡口不斂等症

人參 茯苓去木 黄芪炒各一兩 甘草炒 白朮炒一錢 木香五分 遠志去心 酸棗仁 龍眼肉 當歸 牡丹皮 山梔炒各一錢

右水煎乳母服兒亦服之

小柴胡湯治肝膽經分一切瘡瘍發熱潮熱或飲食少思加山梔牡丹皮名加味小柴胡湯

柴胡一錢五分 人參 黄芩七分 半夏五分

甘草　炒二分
作二十一服薑棗水煎
柴胡清肝散治肝經風熱或乳母怒火患一切瘡瘍
柴胡　黃芩炒　人參　川芎　各一錢
山梔炒一錢半　連翹　甘草各五分　桔梗炒入分
右水煎母子服之
梔子清肝散一名梔子柴胡散治二焦及足少陽經風熱生瘡或發熱耳內生瘡作痒或出水疼痛

柴胡　梔子炒　牡丹皮　茯苓
川芎　芍藥炒　當歸　牛蒡子炒各七分
甘草三分
右水煎母子並服
龍膽瀉肝湯治肝膽經有熱小腹脇間患瘡瘍或玉莖便毒懸癰囊癰腫痛或潰爛作痛小便澁滯或畢丸懸掛方見下卷陰瘡
加味逍遥散治小兒肝脾血虛內熱脇腹作痛頭目昏黑怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少

不寐或口吉生痰胸乳膨脹小便不利或女子患前症經候不調發熱咳嗽寒熱往來等症方見發熱不止

六味地黃丸治肝經血虛發熱或風客淫氣瘰癧結核或四肢發瘡眼目抽動痰涎上湧或傷損出血發熱抽搐等症方見作渴不止

仙方活命飲

托裡消毒散

托裏散三方見熱毒瘡瘍

八珍湯方見發熱不止

腹癰

腹癰者患於臍下或傍二寸許屬脾經近脇屬膽經蓋因脾經陰虛氣滯血凝或因脾虛飲食積熱所患若欲腫作痛者瀉黃散堅硬腫痛者清胃散腫痛便秘者清涼飲加此而仍痛者瘀血凝滯也活命飲既用此藥而不消則內欲作膿也用托裡消毒散若膿出而痛不減者毒未解也亦用前藥若膿出而反加痛及膿水清稀者氣血虛也用參

甚托裏散若食少體倦者脾氣虛也用五味異功散加當歸柴胡升麻補熱內熱者脾血虛也用四君當歸丹皮如有他症當隨症治之

一小兒患此漫腫微痛肉色不變面色萎黃飲食少思此脾氣虛而食積內熱也用五味異功散加升麻當歸及如聖餅其腫漸消又用托裡散而愈

一小兒患此腫痛寒熱活命飲一服腫痛頓止用托裡散如聖餅而腫漸消又用神効散及托裡消毒散數劑而痊

一小兒患之內潰作渴飲食少思屬元氣虛弱先用托裏消毒散四劑膿潰而發熱惡寒肢體倦怠此邪氣去而真氣虛也用八珍升麻補之稍愈又用托裡散異功散間服而痊

一小兒腹痛大便秘結發熱飲冷此熱蓄於裏也用內疎黃連湯一劑大便通而痛止又用清熱消毒散內熱退而痛愈

一小兒腹患敷寒涼之藥其腫益甚腹中陰痛手足並冷此陽氣虛寒之症也余用回陽湯抑陰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

散而腫漸消毒漸散又用托裡散而斂

一小兒患此膿成不潰面色黃白惡心少食發熱惡寒大便不實此脾胃虛弱也先用六君升麻柴胡諸症漸退飲食漸進又朝用益氣湯夕用異功散而潰又用八珍湯而愈

一小兒腹中作痛肉色不變二十月矣脉滑數而有力此腹癰內潰也用托裏散大便出膿甚多乃用薏苡仁湯及托裏散而愈

一小兒小腹赤腫服流氣敗毒等藥肉色如故食少體倦余謂此肝脾氣血虛而藥傷之也用六君肉桂及葱熨之法飲食漸進其腫漸消又佐以八珍湯而愈

一小兒患此而潰腫不消服敗毒之藥飲食少思膿清發熱余謂脾胃之氣復傷不信仍行氣清熱腫痛益甚服消導化痰之藥腹脹作瀉余先用異功散加升麻柴胡木香佐以二神丸二十餘劑諸症漸愈乃用異功散加當歸黃芪元氣漸復却用八珍湯內芍藥炒黃數劑改用托裡散而愈次

年因勞心發熱作渴用當歸補血湯而安畢姻後寒熱往來患處作痒用十全大補湯六味地黃丸而愈

四君子湯加陳皮半夏即六君子湯治脾胃虛弱或因寒涼傷胃致腫不能消或潰而不能斂者俱以此藥溫補脾胃諸症自退如誤用攻伐則七惡隨至矣若脾胃氣虛瘡口出血或吐血便血則加當歸脾胃充健則血自歸經若脾虛血弱不生肌或補熱內熱者更加熟地黃不可投四物沉陰之劑能傷脾胃也若胃氣虛弱飢伐傷脾飲思少思或食難化若作嘔作泄者尤宜用之如兼痰嗽氣逆肢體倦怠面目浮腫者亦因脾虛不能生肺而然也最宜用之

人參　白朮炒　茯苓　甘草　各等分

右每服一大錢薑棗水煎

清胃散　治脾胃有熱生瘡或胃火牙痛或連頭面

升麻五分　生地黃　牡丹皮　黃連炒

當歸各三分

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散

六君子湯治瘡瘍脾胃虛弱腫痛不消或不潰斂宜用此藥以壯營氣諸症自愈即四君加半夏陳皮

清涼飲　治瘡瘍脾胃實熱煩躁飲食燥糞大便秘結小便赤澁

赤芍藥　當歸

右每服一錢水煎

甘草　大黃各等分

當歸補血湯治瘡瘍肌熱面赤煩渴脈洪大而虛重按全無此血虛脈也誤服白虎湯必死方見發熱不止

六氣養榮湯治氣血損傷四肢頸項等處患腫不問堅軟赤白扁杏日晡發熱或潰而不斂者方見鶴膝風

十全大補湯治諸瘡血氣虛不能潰腐收斂或膿出發熱惡寒汗出煩躁口眼歪斜或肌瘦少食發熱口乾等症須多服爲善方見便癰

參芪托裏散 方見瘡瘤門
補中益氣湯 方見肌肉不生
托裏消毒散
托裏散二方見熱毒瘡瘤
五味異功散 方見用敗毒之藥
如聖餅方見流注
神功散 方見胎毒發丹
八珍湯 方見發熱不止

腎癰

腎癰屬膀胱經濕熱或稟賦陰虛若腫硬作痛用內托羌活湯微腫微痛用托裏消毒散若初起太痛或五日之間似消不消似潰不潰者先用仙方活命飲後用托裡消毒散若已潰食少體倦瘡不生肌脾胃虛弱者用五味異功散加柴胡升麻稟賦陰虛小便數而不斂者加減八味丸氣虛欠不生肌收口用豆豉餅及補中益氣湯培養元氣若用鮮熟攻毒及敷圍寒涼之劑則氣血受傷必成敗症矣

一小兒患此腫硬不赤旬餘矣面色瘦黃飲食少進此脾氣虛弱也先用異功散飲食漸進漫腫漸消乃用托裏散少加肉桂而潰又用八珍湯而歛

一小兒患此久不收歛四圍微黯瘡口黑色膿水清稀寒熱晡熱脉浮而數兩寸按之如無此陽氣虛而陰血弱也朝用補中益氣湯夕用異功散間服百劑而愈

一小兒臀瘡潰而不歛面色時赤此稟肝腎陰虛也朝用八珍湯加五味子夕用加減八味丸諸症漸退又用托裏散間服而愈

一小兒臀瘡久不收歛肢體倦怠晡熱作渴此稟足三陰虛也用五味異功散加減八味丸漸愈又用托裏散而歛

一小兒臀癰久不生肌面色瘦黃仍欲敗毒以收歛余曰脾主肌肉脾健則肉生遂朝用補中益氣湯夕用五味異功散及葱熨法脾氣壯肌肉生而愈

一小兒腫硬不消肉色不變此脾胃之氣虛怯不

能運及患處耳朝用補中益氣湯夕用五味異功散以接虛怯之氣月餘而消其時同患是症外敷寒涼之藥內服犀角丸者無不受害

一小兒十五歲久不愈發熱體瘦面白曖氣恪服消食清熱等藥余謂心火虛而脾氣弱也先用八味丸爲主佐以六君子湯補中益氣湯尋愈異姻後臀間患疽漫腫堅硬肉色不變手足時冷脉浮大按之微細兩寸爲甚先用八味丸析四劑又用十全大補湯患處色正而消

內托羌活湯治尻臀生癰堅硬腫痛

黃芪酒製　羌活　各一錢　防風　當歸尾

糜本各五分　肉桂　連翹　甘草各

蒼术　陳皮各二分　黃芩八分

右作一劑冰一鍾入酒一杯煎空心服

仙方活命飲

托裡消毒散

托裏散三方熱毒瘡瘍

神効解毒散方見臂瘡

加味八味丸 方見作渴
八珍湯 方見發熱不止
葱熨法 方見流注

腿癰

腿癰之症所生之經不同而所治之法亦異發於內側者屬肝脾二經發於外側者屬膽胃二經漫腫堅硬者元氣虛弱也用內補黃芪湯腫勢高漸者元氣未虛也用內托柴胡黃芪湯外並用隔蒜熨法若瘀血凝結而不消或不作膿者用活命飲

血氣虛弱而不能潰及不生肌者用托裏散此其梗槩云爾

一小兒內臁腫痛惡寒發熱此屬肝膽經分乃用神効解毒散加柴胡白芷二十劑漫腫頓消惟中央一塊尚腫又二十劑而成膿以托裏消毒散膿潰而愈

一小兒腿內側前臁患毒潰後腫硬色黯膿清不斂面色青黃此脾虛肝旺兼寒邪襲於患處也當壯元氣爲主先用異功散加柴胡升麻及葱熨法

脾氣漸復患處漸愈佐以八珍湯豆豉餅而愈

一小兒腿內瘍赤大腫發熱此血熱內鬱而欲爲膿耳當先殺其大勢用隔蒜炙法灼艾試蒜熱移患處二十餘壯痛始減再二十餘壯腫漸消又用仙方活命飲瘡頭出水而愈

一小兒腿內側患此膿內潰惡心倦怠面色痿黃右關脈弦大按之微細此脾胃虛弱肝木所乘也先用六君升麻柴胡四劑元氣漸復乃佐以托裏散而愈

一小兒腿外側腫痛肉色如故用托裏消毒散一劑而腫始赤又四劑而腫赤亦退又六劑潰而膿出清稀食少體倦用異功散加芎歸仍用托裡散補其元氣而愈

一小兒漫腫堅硬肉色不變此陽氣虛而不能成膿也用托裏散如聖餅腫起色赤用托裏消毒散而膿成針之用八珍湯加肉桂漸愈因傷食吐瀉患處大白飲食少思先用六君乾薑次用八珍湯及葱熨法而愈

一小兒患此久不愈膿水清稀面色痿黃腹大青筋此脾氣虛而肝所侮也朝用補中益氣湯夕用五味異功散元氣稍復乃佐以四味肥兒丸及蒸熨之法兩月餘而愈

一小兒腿外臁腫一塊服消毒之藥其腫益甚肢體羸瘦飲食少思更加作痛余曰先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也當補接陽氣不信仍投疎泄之藥後果殺機要云榮衛之氣充滿抑遏不能行故閉塞氣血腐而爲癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食疎精神衰氣血弱肌肉消薄故榮衛之氣短促而濇滯故寒搏腠理閉鬱而爲癰者當補之以接虛怯之氣信矣

四味肥兒丸治肝脾不和患瘡瘍久不愈或兼遊症腹脹作瀉或食積脾疳發熱瘦怯遍身生瘡

黃連 炒　蕪荑　神麴　麥芽 炒 各等分

右爲末水糊丸桐子大每服二十九空心白滾湯送下

附子餅治潰瘍氣虛不能收斂或風邪所襲氣血

不能運於瘡口以致不能收斂者用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘡口上將艾壯於餅上灸之每日灸數壯仍令微熱勿至熱痛如灸乾用唾津再和灸之以瘡口活潤爲度

六君子湯治瘡瘍因脾氣虛弱不能生肌以致瘡口不斂若脾氣既充而瘡口不生肌肉者此寒邪所襲也更用互砭餅或附子餅熨之

仙方活命飲

托裡消毒散二方見熱毒瘡瘍

葱熨法

如聖餅二方見流注

內托羌活湯方見發癤癰

五味異功散方見用敗毒之藥

附子餅方見腹癰

十全大補湯方見便癰

補中益氣湯方見肌肉不生

八珍湯即四君四物方見發熱不止

豆豉餅方見腋癰

鶴膝風

鶴膝風者其膕漸細其膝愈麄狀如鶴膝是以名之此因禀腎經不足外邪所乘而患之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難若一二月間煩腫色赤而作膿者難治初起者用大防風湯爲主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯爲主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不潰不斂或發熱等症者須調補脾胃爲善否則必變敗症矣

一小兒九歲患此作痛用葱熨法及大防風湯腫起色赤用仙方活命飲補中益氣湯間服腫漸消又以獨活寄生湯與補中益氣湯間服二十日用葱熨二次至兩月餘而消

一小兒患此大潰不斂體倦食少日乾發熱日晡尤甚此脾氣虛甚也用補中益氣湯五劑以補元氣乃用大防風湯一劑以治其瘡如是月餘諸症悉退遂用十全大補湯佐以大防風湯而斂

一小兒患此潰而不斂不時寒熱小便赤澁此血

氣虛也用十全大補湯加麥門冬五味諸症頓退乃去桂令常服佐以和血定痛丸而愈

一女子左腿作痛服流氣飲之類左膝腫硬頭運吐痰余謂此鶴膝風也其脉弦數而無力乃禀賦脾肝腎三經之症此形氣病氣俱虛者當先調補脾胃爲主不信仍攻邪氣諸症蜂起余先用五味異功散加升麻乾薑肉桂脾氣稍健又用異功散八珍湯而潰却間服大防風湯地黃丸而痊

一小兒兩膝漸腫傳服皆消毒之藥足脛赤腫此禀父腎氣不足用地黃丸八珍湯而消若用流氣敗毒等藥必致不起

大防風湯治鶴膝風腫痛不消或潰而不歛

牛膝酒炒　附子炮各一錢　白朮　羌活

人參　防風各二錢　杜仲去皮薑製川芎

肉桂去皮　黃芪炒　熟地黃酒製芍藥炒各一錢五分

甘草一錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

益氣養榮湯治氣血虛弱四肢頸項等處患腫不

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

間腫潰日久不斂宜服之

人參　茯苓
香附炒　當歸酒洗　川芎　貝母
熟地黃酒製　芍藥炒各一錢　陳皮　黃芪炒
白朮炒一錢　柴胡六分　甘草炙　桔梗各五分

右每服二十錢薑水煎

獨活寄生湯

獨活　桑寄生　杜仲炒　細辛
牛膝酒洗去土　秦艽　茯苓　白芍藥炒

桂心　川芎　防風　甘草
人參　熟地黃　當歸各等分

右每服一十二錢水煎空心乳母同服

八珍湯 方見發熱不止

十全大補湯 方見便瘡

補中益氣湯 方見肌肉不生

和血定痛丸

葱熨法 一方見流注

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



古吳薛鎧草創
男薛已編集
後學宋璞校閱

肺癰肺瘡

齊氏云肺癰肺瘡因脾肺氣虛腠理不密外邪所乘或母食辛辣厚味遺熱於兒或兒有病過於汗下內亾津液虛火爍肺或服劫伐之藥虧損脾胃不能生肺金其症惡風咳嗽鼻塞項強呼吸不利

甚則四肢微腫咳嗽膿血若吐臭穢胸中隱痛脉數而實者爲肺癰咳嗽涎沫脉數而虛者爲肺痿惡寒喘嗽者寒邪內蘊也小青龍湯咳嗽膿穢者肺癰內潰也桔梗湯窮謂前症若喘咳短氣者肺氣虛也五味異功散咳嗽膿痰左尺脉數而無力者腎氣虛也六味地黃丸咳嗽膿痰右關脉數而無力者脾氣虛也七味白术散若發熱喘嗽嗌膿不食者脾肺虛甚也難治太要補脾肺滋腎水爲善仍審五臟相勝乳母之情後症倣此

一小兒感胃停食吐瀉用疎利之劑咳嗽膿血此中氣復傷而變肺癰也用桔梗湯而愈後咳嗽吐血仍用前藥佐以異功散而痊

一小兒停食服瀉藥而變肺癰余先用異功散以救脾肺次用桔梗湯以治肺癰而瘥

一小兒停食服尅伐之藥嗌痰腥氣面赤氣喘此元氣復傷而成肺癰也用桔梗湯膿痰頓止翌日喘甚此脾氣虛而不能生肺也用異功散加杏仁百合而愈後小便澁滯服八正散小便愈澁咳嗽

吐痰而赤盜汗余謂肺氣虛熱前藥虧損眞陰虛火爍肺金而然用異功散以補脾土地黃丸以滋腎水遂愈

一小兒癰愈後咳嗽而色白或瘦黃手足冷小便頻此因脾虛不能生金也服參蘇飲之類自汗盜汗昏憒發搐遺尿下氣手足如冰而色青白此陽氣脫而虛寒也用人參一兩乾薑二錢大棗五枚水泔煎沸先灌一盃將熟又灌二盃連用二劑而甦更朝用補中益氣湯夕用異功散而愈

一小兒十五歲因勞傷元氣而咳嗽誤用表散之劑復傷肺氣成癰咳嗽膿血用桔梗湯爲主佐以異功散膿漸少專用異功散膿止而愈後因書課過勞自汗時嗽服外感藥咳嗽益甚胸膈痞滿呼吸不利余謂脾肺之氣虛甚而然用參芪補脾湯而痊

一小兒咳嗽服參蘇飲而益甚右寸關之脈浮散余謂此風傷皮毛熱傷血脈血氣稽留蘊結於肺而成癰也不信仍復表散嗽咳膿血余曰此因肺

虛不能攝氣脾虛不能攝涎耳當補脾土以生肺
金又不信果及
一小兒感胃咳嗽發散過度喘促不食痰中有血
余用桔梗湯而愈後元氣未復大便似痢或用苓
連枳實之類變慢脾風而卒
小青龍湯治傷風胃寒咳嗽喘急肺脹胸滿鼻塞
流涕或乾嘔熱咳或作渴或作噎或小便不利
或小腹脹滿此仲景之法審有是症用之及時殊有良驗
麻黃去節　赤芍藥　半夏各七錢　細辛
乾薑炮　甘草各二錢　桂枝各三錢　五味子半兩
附子一錢脉浮不用　杵用
右每服二錢水煎
桔梗湯治咳嗽膿血腥穢已成癰症
桔梗炒　貝母去心炒　知母炒　桑白皮炒
枳殼各一錢　地骨皮　瓜蔞仁　薏苡仁
黃芪炒各一錢　五味子杵炒五分
杏仁五分炒　當歸　百合炒各一錢五分
防己一錢　甜葶藶炒五分
右每服二三錢水煎

升麻湯治肺癰膿血穢臭胸乳皆痛

升麻　桔梗炒　薏苡仁　地榆
條芩炒　牡丹皮　芍藥炒　甘草各等分

右每服二三錢水煎

排膿散治肺癰此方排膿補肺

黃芪鹽水拌炒　白芷
人參　五味炒研碎各等分

右爲末每服一二錢蜜湯調下

射干湯治胃脘癰吐膿血

射干去毛　栀子仁　赤茯苓　升麻
赤芍藥一兩二錢　白朮半兩

右每服三五錢水煎入地黃汁少許再煎服

人參平肺散治心火刻肺金傳爲肺癰咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參　陳皮　甘草　地骨皮
茯苓各一錢　知母炒七分　五味子炒　青皮
天門冬去心四分　桑白皮炒一錢

右每服二三錢

參芪補脾湯治肺癰脾氣虧損咳詐膿涎或中滿

不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治
人參 白朮各二錢 黃芪炒一錢半 茯苓
陳皮 當歸各一錢 升麻三錢 麥門冬七分
五味子 杵四分 桔梗炒六分 甘草炙三分
右作二服薑棗水煎

人參補肺湯治肺虛咳喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白朮 茯苓
陳皮 牡丹皮 當歸各一錢 山茱萸去核
山藥各二錢 五味子杵 麥門冬 甘草炙各七分
熟地黃自製一錢五分
右薑水煎服

七味白朮散治中氣虧損津液短少口舌乾渴生瘡不喜飲冷或吐瀉後口乾或咳嗆膿痰右關脉數無力者脾氣虛也最宜服之

人參 白朮 木香 白茯苓
甘草 藿香各五分 乾葛一錢
右水煎服

五味異功散方見用敗毒之藥
六味地黃丸方見作渴不止
參蘇飲方見咳嗽
獨參湯方見腹脹
補中益氣湯方見肌肉不生

腸癰

孫眞人云腸癰爲病小腹重強按之則痛小便如淋時時出汗惡寒身皮甲錯肚皮急癰甚者肚腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡或膿從臍出或膿大便而下益因飲食不節所致治法當診脈遲緊者未有膿也用大黃湯下之脈洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之小腹疼痛小便不利膿壅滯也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治內經云腸癰爲病不可驚驚則腸斷而死故患是者其坐卧轉側理宜徐緩勿少飲薄粥及八珍湯固其元氣庶或可生

一小兒患腸癰先用太乙膏後服牡丹皮散下膿而愈後因跌腹內作痛遍身皆赤良久身黯而死

蓋腸斷故也

大黃湯治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如常或燬赤微腫小便頻數汗出憎寒脉遲緊膿未成也急服之

大黃炒　朴硝各二錢　牡丹皮　瓜蔞仁　桃仁去皮尖各二錢

右每服二三錢水煎

薏苡仁湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澁滯

薏苡仁　牡丹皮　桃仁各三兩　瓜蔞仁四兩

右每服四錢水煎

桃仁湯治腸癰腹中痛煩躁不安蓬痛大便閉澁亦有繞臍生瘡者但用此藥無妨

桃仁　大黃炒　牡丹皮　芒硝

犀角銼末冬瓜仁研各二錢

右水煎入犀角末服

牡丹皮散治腸癰腹濡而痛時下膿汁或下血

牡丹皮　人參

天麻　白茯苓

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃芪炒　薏苡仁　桃仁　白芷炒
當歸　川芎　官桂　甘草各五分
木香二分
右每服二十五錢
仙方活命飲　方見熱毒瘡瘍
太乙膏　方見跌撲外傷
八珍湯　方見發熱不止

痔瘡

痔瘡之症或因稟受胎毒或膏粱食積或毋食濕

煙厚味所致腫痛者湯
盛膿潰者血熱濕熱加味槐花散風熱秦艽荊芥木
湯便秘清燥湯膿潰黃芪散薰洗則葱湯槐角丸
倍子等藥或眞補黃以豬脂調傅如有蝕變之症
參各門治之

一小兒患痔赤腫作痛用黃連解毒湯而痛止又
用托裡清肝散及加味槐角丸而瘥愈

一小兒因飲食停滯發熱患痔大便不利腫痛寒
熱不時發搐此脾氣傷而肝乘之也先用保和丸

末二錢以柴胡山梔煎湯調服食消擡止又用四味肥兒丸數服而愈

一小兒十十歲不戒厚味醇酒不時作痛或大便秘結小便滯澁用龍膽瀉肝湯治之而安後飲燒酒前症復發遍身色赤煩躁飲冷醋半鍾赤熱悉退腫痛頓減

一小兒因乳母食炙煿之物肛門腫痛用清胃散母子並服子又服四味肥兒丸而愈後因乳母恚怒腑脇作痛頻飲糖酒兒病復作發擣母先服加味小柴胡湯二劑次服加味逍遙散兒服四味肥兒丸而愈

一小兒肛門腫痛大便不通服大黃之藥腫痛益甚虛症並作仍欲攻瘡余曰此因脾氣復傷而然也用異功散加升麻柴胡爲主佐以加味槐角丸腫痛漸退又用黃連解毒湯而出膿用蔘朮膏湯而瘥愈

一小兒肛門腫痛發熱飲水口鼻氣熱此脾肺經實熱先用瀉黃散二服而熱退又用枳殼散而痛

止用金銀花散而腫痛消後毋食膏粱兒患復作毋用清胃散而腫痛消

一小兒誤吞信石遍身發赤嘔吐煩渴肝門腫痛便秘飲冷服冷米醋一鍾赤暈立消腫痛頓止又

以黃連解毒湯金銀花散而痊

一小兒痔瘡不時腫痛服加味槐角丸而愈至十四而復作發熱體倦肛門堅腫用地黃丸八珍湯堅腫漸消血氣漸愈或間止藥餌勞役不節諸症仍作用前藥隨愈畢姻後肛門腫潰而患膿用補中湯地黃丸膿間漸愈或用追蝕等藥堅核雖消痛傷元氣瘡口不合余用八珍湯地黃丸兩月而斂後不守禁忌又且攻毒以至屢發元氣日虛而殁古人云善服藥不若善保養信夫

若參散治痔瘡腫痛發熱

枳殼 麩炒　黃連　大黃　甘草

荊芥　苦參　赤芍藥　黃芩

右水煎薰洗

加味槐花散治腸風下血痔痛腫痛發熱便秘

槐花　熟地黃　白朮　青皮
荆芥穗　川芎　各二分　當歸身　升麻　各四分
枳殼　麩炒　五分
右水煎服
秦艽蒼朮湯治腸癖大便堅硬小便頻數內熱作渴
秦艽　蒼朮　各五分　澤瀉　皂角子仁　炒
防風　桃仁　當歸尾　黃柏
山梔　炒　各三分

右作一劑水煎服
清燥湯治大腸風熱血燥秘結不通痔癖等症
生地黃五分　山梔　五分　澤瀉二分　麻子仁　研　五分
川芎　羌活
郁李仁　芍藥　當歸尾　黃柏
右水煎服
黃芪散治痔癖并一切潰瘍虛弱發熱
茯苓　黃芪　炒　當歸　川芎
白芍藥　各五分　升麻　山梔　炒　各二分

右水煎服

枳殼散治痔瘡腫痛或下血

枳殼去穰麩炒 槐花 荊芥 皂角子仁炒
酮皮炙各等分

右爲末每服一錢滾湯下作丸亦可

加味槐角丸治症同前

槐角炒 枳殼麩炒 當歸 黃芩
皂角仁炒 酮皮 秦艽 白芷各等分

右爲末每服二錢水煎服或蜜丸彈兒大小

服

又方治痔痛不可忍者

羊膽一箇 氷片五分

右以氷片爲末羊膽塗之

丹石散治痔瘡熱痛如神

黃丹 滑石各等分

右爲末新汲水調塗日三五次

勝雪膏治痔瘡熱痛不可忍

片腦 鉛白霜各三分

右爲末好酒研成膏塗之隨手愈

又方用生括蔞根研如泥猪油調塗

黃連解毒湯 方見作痛不止

托裡清肝散 方見癰癤

四味肥兒丸 方見贅骨癰

加味小柴胡湯 方見熱毒瘰癧

加味逍遥散 方見發熱不止

龍膽瀉肝湯 方見下疳陰瘡

下疳陰瘡

下疳陰瘡皆屬肝火濕熱或禀賦肝經陰虛腫痛發熱者肝火濕熱也先用加味小柴胡湯再用龍膽瀉肝湯腫痛便赤者肝火陰虛也用加味逍遥散加龍膽草生地黃潰而腫痛不消者小柴胡湯加芎歸黃芪潰而腫痛已消用四物湯加牡丹皮柴胡益肝屬木得雨露則森茂遇酷日則萎軟若誤謂虛寒投以熱劑輕則囊蓬生瘡重則腐而難斂皆宜滋腎水生肝木清肝火故云肝氣熱則瘡瘍宋筋弛縱陰蝕腫脹或出白液或痒痛裏急筋

縮挺縱不收或精出便下此名筋疝俱肝火也
黃宗伯季子初生時母棄於水逾日不死復收之
遂成喘嗽頷腋臂股各結塊核潰而色紫悞鐲之
痛徹於心服辛溫化毒等劑不應時已弱冠予曰
初生喘嗽者形寒傷肺也既長而喘嗽者肝火刑
肺也故結核俱在肝膽部分始用補中益氣湯後
用九味蘆薈丸不月諸症悉愈此稟母之肝火而
患也
一小兒下疳潰爛發熱作渴日晡尤甚此肝疳而
脾氣虛也用補中益氣湯後用九味蘆薈丸諸症
悉愈
一小兒二歲莖痿濕痒時出白津余以爲肝火不
信或與溫補腎經後陰囊漸腫莖中作痛余用龍
膽瀉肝湯六味地黃丸而痊
一小兒睾丸作痛小便赤澁寒熱作嘔此肝火濕
熱不利用小柴胡湯加山梔車前子茯苓而愈睾
丸陰子也
一小兒睾丸腫痛小便黃澁寒熱作渴此肝火所

致用小柴胡湯加山梔車前子并九味蘆薈丸間
服而消
一小兒陰莖腫痛腹內一塊或作痛或上攻小便
不調此稟肝火爲患用龍膽瀉肝湯九味蘆薈丸
愈後形氣消爍發熱作渴此肝火制脾土而然也
用益氣湯蘆薈丸異功散而安
一小兒陰莖作痒搔破出水小便赤澁此稟肝腎
陰虛火動用龍膽瀉肝湯清肝經濕熱佐以地黃
丸補腎肝陰虛而愈後乳母惱怒小便澁滯兩肋
腫痛兒陰復痒驚搐困倦用異功散以補脾土用
地黃丸以滋腎肝而愈
一小兒十五歲患下疳痒久不愈形氣骨立不時寒
熱小便不調飲食少思此稟肝痒虛羸也朝用益
氣湯以培胃氣夕用地黃丸以滋腎水爲主佐以
九味蘆薈丸治疳而瘥
一女子十五歲面青善怒體瘦作渴天癸未至不
時寒熱口舌生瘡後患陰瘡濕痒無蘇善驚此稟
肝脾虛羸之變症也當先救脾氣遂朝用補中益

氣湯夕用加味歸脾湯諸症漸愈却佐以九味蘆薈丸而痊

一女子十四歲稟肝經濕熱肌體消瘦寒熱如瘧下部患瘡先用加味小柴胡湯寒熱頓退但脯熱少食用加味逍遥散爲主以九味蘆薈丸爲佐而愈出嫁後前症仍作另用雜藥潘口翻出如菌余用龍膽瀉肝湯加味逍遥散九味蘆薈丸而愈

一小兒十五歲患下疳書課過勞即寒熱頭痛形氣殊倦腿足疲軟左關脉洪數左尺脉洪數而無力余謂此稟肝腎陰虛兼飲食勞役之症也宜先調補胃氣以滋化源不信或以爲陰虛濕熱下流恪服四苓四物之類諸症益甚余曰陰虛謂脾經虛也脾爲至陰以丁火爲母虛則宜補下火以生已土腎屬水以辛金爲母腎虛則宜補辛金生癸水也今因脾經陽弱而陰虛反用沉寒之劑復傷陽氣以絕化生之源欲保其不危難矣果歿

龍膽瀉肝湯治肝經濕熱不利下部生瘡兩拘攣痛或腹中作痛小便澁滯等症

龍膽草 酒拌炒黃 車前子 炒 澤瀉
木通 生地黃酒拌 當歸酒拌 山梔
黃芩 炒 甘草 各二分
右水煎食前服

茄味小柴胡湯 即小柴胡加治肝膽經有熱下部濕癢寒熱補熱潮熱等症 方見熱毒瘰癧

六味丸 治肝腎陰虛下部生瘡或發熱作渴小便頻數或腎水不足而不能生肝木致血燥筋攣頸項肢節等處結核或潰而不能收斂或肝腎虛弱發熱盜汗肢體消瘦小便赤澁尿血下血或大小便牽痛氣短痰嗽吐血眩運耳聾口燥齒痛失音腰腿疲軟此皆禀賦不足也 方見作渴不止

敷藥必効散 治下疳腐潰作痛

輕粉 五分 黃連
黃柏 龍膽草 各二錢

右爲末油調搽入片腦更効若用當歸膏調傳尤佳

加聖散 治下疳久不愈

五倍子二錢 片腦一錢 黃連半兩 蘆甘石煅三錢

右各爲末乾敷毒未盡者加黃連末二錢

九味蘆薈丸 方見喉痺

加味清胃散 方見熱毒口瘡

聖愈湯 方見出血不止

補中益氣湯 方見肌肉不生

八珍湯 方見發熱不止

加味歸脾湯 方見脇癰

四君子湯 方見腹癰

仙方活命飲

托裡消毒散二方見熱毒發瘍

便癰附兩拘謂小腹兩邊拘中患之

便癰因肝火肝鬱或禀肝經熱毒若初起腫硬作痛者先用龍膽瀉肝湯一二劑腫痛不減用仙方活命飲一二劑五七日不減腫尚硬亦用前一藥各一劑如不消或更痛欲成膿也用活命飲一劑却用托裡消毒散加柴胡山梔一二劑若膿已成而不潰者血氣虛也用托裡消毒一二劑膿已潰而痛不止者毒氣不解也用活命飲一劑若膿已出

而反痛者血氣虛也用內補黃芪湯膿已潰而發熱煩躁者氣虛血脫也用當歸補血湯膿已潰而惡寒發熱者血氣俱虛也用十全大補湯膿已潰而惡寒者元氣虛也用補中益氣湯膿已潰而不生肌者脾氣虛也用六君子湯若稟賦怯弱或因飲食勞倦而爲患者但用補中益氣湯加附子干姜消設使不分經絡不別虛實緊行攻伐虧損氣血則輕者難治重者必變瘡症甚至不起

一小兒腫痛色赤寒熱似瘧小便不通此肝經濕熱用龍膽瀉肝湯一劑小便清利寒熱頓除又用加味逍遥散加龍膽草二劑腫痛悉退而愈

一小兒患此腫硬作痛小便澁滯先用龍膽瀉肝湯小便頓利又用活命飲一劑而消後復腫赤作痛此欲作膿也先用活命飲二劑殺其大勢却用托裡消毒散加柴胡山梔三劑以指按之腫隨指復起此膿已成也用托裡散一劑翌日針之膿出腫消再用托裡散而愈

一小兒患此服大黃等藥瀉而腸鳴腹腫硬痛少

食此脾胃復傷而變症也用五味異功散加升麻
柴胡木香飲食漸進乃去木香加黃芪當歸數劑
而膿成又用托裡散加皂角刺而膿潰乃去皂角
刺倍用參芪而愈
一小兒瘡勢已成用消毒之藥其腫散漫自汗發
熱惡寒少食此氣血虛甚也用大補湯四劑針之
膿出腫消却用托裡散八珍湯間服而愈
一小兒膿成不潰誤用大黃之類以下膿泄瀉不
止腫硬色白腹痛欲嘔手足並冷此脾氣虛而復
傷也用異功散加升麻葛桂四劑乃去葛桂加歸
芪十餘劑膿潰而愈
一小兒潰後咬牙呵欠寒衣捻物此肝經氣血虛
也先用八珍湯加鉤藤鉤五味子諸症頓愈又用
托裡散及八珍湯而痊
一小兒潰後驚悸發搐呵欠咬牙此心肝二經氣
血俱虛也先用補心湯安神丸虛症尋愈再用八
珍湯托裡散肌肉漸生却用地黃丸而瘡口斂
一小兒患此久不愈頭重胸滿飲食少思此稟脾

胃虛弱也先用補中益氣湯加蔓荊子諸症尋愈次用八珍湯佐以五味異功散月餘瘵卩漸斂仍用十全大補湯而痊

一小兒十五歲禀賦虛弱因勞役過度患此寒熱加瘧用補中益氣湯將愈感於人言誤服大黃之藥吐瀉大作手足厥冷寒熱尤甚余用六君子加薑桂諸症稍愈但赤腫不消此欲作膿也又數劑後朝用益氣湯夕用大補湯五十餘劑而痊

一小兒潰後腫硬肌肉不生瘵卩不斂余欲滋其化源以生肝血不從仍伐肝清熱以致元氣日虛惡症蜂起而歿夫肺者腎之母脾者肺之母今既不滋肺腎以生肝木又傷脾土以絕肺腎之化源其不死者鮮矣

一小兒十四歲每飲食勞倦則惡寒發熱兩拘患發擯口噤手足並冷良久少甦余用大料益氣湯數劑而安又二十餘劑而愈

腫余用益氣湯而愈彼惑於人言乃服大黃之類

一小兒兩拘患腫小便澄白肢體消瘦發熱眼劄

此亷肝火之症用龍膽瀉肝湯爲主四味肥兒丸爲佐各數服腫熱漸退改用四味肥兒丸爲主龍膽瀉肝湯爲佐又各數服將愈及用地黃丸而痊

一小兒兩拘腫痛小便不利或赤白濁此係肝火熾而脾氣傷也朝用補中益氣湯夕用地黃丸各數劑而愈後因過勞盜汗發熱兩拘仍腫用前藥佐以地黃丸而愈

一小兒每勞則兩拘腫痛小便白濁夜間發熱此亷肝火脾虛而元氣下陷也用補中益氣湯清心蓮子飲後患下痢用四味肥兒丸加味逍遥散而愈

一小兒兩拘腫痛小便赤澁或兼滓白此肝脾病症先用九味蘆薈丸數服諸症漸退次用四味肥兒丸二十餘服而愈

一女子兩拘腫痛小腹作痒小便赤澁發熱晡熱月經不調先用加味小柴胡湯四劑腫漸消次用加味逍遥散諸症漸愈佐以四味肥兒丸而痊

一小兒十四歲每飲食勞倦隨患寒熱兩拘腫痛

服大黃之類發搐口噤手足並冷良久少甦余用大劑補中益氣湯數劑而安又一十餘劑而腫痛愈

仙方活命飲治一切瘡瘍癰毒未成即消已成即潰潰後腫痛不止元氣虛也當補之

川山甲　白芷　甘草　赤芍藥　防風　沒藥
天花粉　貝母各一錢　當歸尾　乳香
皂角刺二錢　金銀花　陳皮各二錢

右每服一二錢酒水各一半煎服

清心蓮子飲治兩拘腫痛小便白濁夜間發熱日間安靜發熱口渴此肝火脾虛而元氣下陷也

黃芩一錢　麥門冬　地骨皮　車前子炒
甘草各一錢半　石蓮肉　茯苓　黃芪炒
柴胡　人參各一錢

右水煎服

當歸補血湯治癰毒已潰而發熱煩燥者此脾胃損傷或服峻劑致氣虛血脫肌熱大渴引飲目

赤白紅日夜不息其脈洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯者必死

當歸三錢　黃芪炙一錢

右水煎服

六一湯治同前

黃芪炙六錢　甘草炙一錢

右水煎服

秘旨安神丸治心血虛而靡中驚悸或便癰潰後發搐阿欠咬牙此心肝二經氣血俱虛也

人參　半夏湯泡　酸棗仁炒　茯神各一錢

當歸酒洗　橘紅

五味子五粒杵

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸薑湯下

赤芍藥炒　甘草炙各七分

補中益氣湯治稟元氣虛弱因勞而拘中作痛或患便癰寒熱口乾作渴宜此湯加射干主之如寒熱已退而腫不消此欲作膿也宜用十全大補湯方見肌肉不生

十全大補湯治稟元氣虛弱因勞患便癰或拘中

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

作瘺服補中益氣湯寒熱退而腫不消蓄此血氣虛而不能成膿也宜服此湯已成而不能潰或已潰而不能生肌或寒熱不止自汗益汁膿清不斂者但服此藥則元氣自復諸症自愈

白茯苓　人參　當歸　白朮 炒
黃芪 炒　川芎　肉桂 去皮　白芍藥 炒
熟地黃 酒製　甘草 炙　各等分

右每服二三五錢薑棗水煎服

內補黃芪湯方見發熱不止

龍膽瀉肝湯方見下疳瘡

九味蘆薈丸方見喉痺

四味肥兒丸方見貼骨癰

補心湯方見胎毒瘡瘍

六味地黃丸方見作渴不止

加味小柴胡湯方見熱毒瘰癧

囊癰 謂陰囊患癰

囊癰屬肝經濕熱或禀胎肝熱所致初起腫痛小便赤澁者濕熱壅滯也先用龍膽瀉肝湯如不消

用仙方活命飲若腫痛數日不止欲作膿也用托裡消毒散若腫未潰而小便不利者毒氣壅滯也當分利之膿已成而小便不利者毒氣未解也當針泄之膿出而反痛者氣血虛也當補益之若元氣無虧雖陰囊悉潰睾丸懸露亦不爲害若乳母恚怒令兒患此者加味逍遥散肝經氣血虛者八珍散加味小柴胡湯俱加漏蘆子母並服

一小兒小便澁滯腫痛寒熱此肝經濕熱也用龍膽瀉肝湯而消但內熱倦怠此兼脾氣虛弱也用四君子加柴胡山梔芎歸而愈

一小兒腫痛寒熱服剋伐之藥不能成膿用托裡清肝散而膿潰用托裡散而瘡斂後寒熱如瘧小便閉塞用小柴胡湯加山梔龍膽草車前子而愈

一小兒患此大潰痛甚煩躁飲冷此餘毒尚在與活命飲一劑腫痛頓退又用四君柴胡山梔四劑諸症悉退及托裡散而瘡

一小兒陰囊赤腫作痛針而膿出頓安忽發熱作渴此邪氣去而真氣虛也用聖愈湯及八珍柴胡

山梔將愈因乳母恚怒復作用加味逍遥散加漏蘆母服其兒頓愈

一小兒陰囊每患赤腫必因其母恚怒及飲酒而發余審其因怒用加味逍遥散加漏蘆飲酒用加味清胃散加乾葛神麯與母服之其兒隨愈

一小兒陰腫小便赤澁此稟肝經有熱也用加味小柴胡加漏蘆與母服子日飲數滴四劑而愈

一小兒患此腫硬不消發熱作痛大便不實飲食無味此消導過多而脾胃傷也先用異功散數劑元氣漸復又用托裡散加柴胡山梔而膿成針之膿出發熱惡寒此血氣俱虛也用大補湯加柴胡山梔寒熱頓止又數劑而漸愈後因勞發熱腫痛用益氣湯托裡散瘡口漸斂而愈

一小兒十五六歲患此膿清稠熱遺精盜汗此稟元氣虛甚也用大補湯加地黃丸料各二十餘劑元氣稍復又各三十餘劑汗止熱退犯房事患處頓黯昏憒吃逆手足並冷此脾氣虛寒之惡症用獨參湯四劑而甦用大補湯加乾薑四分陽氣漸復乃

去乾薑又二十餘劑而痊

一小兒患此潰而腫硬不消服敗毒散傅寒涼藥肌肉不生瘡口開張膿清色黯自汗余謂非補脾則肌肉不生彼欲速効乃外用生肌散反助其邪致生瘀肉填塞瘡口半載不愈余用異功散加當歸黃芪二十餘劑又用托裡散隔蒜灸而愈

一小兒囊癰出血久不愈左頰色青赤此心肝二經風熱而血不歸經也先用加味逍遥散六味地黃丸清肝熟滋腎水而血止用托裡散而瘡愈

一小兒患前症膿清發熱久而不歇左頰青兩顴赤余謂稟肝腎陰虛而兩位青赤脾胃氣虛而膿清不歇當補足三陰爲善不悟泛用雜藥後果歿

一小兒患前症久不愈面赤皎白左頰爲甚余謂前症屬肝木尅白屬肺金左頰屬肝經乃金來尅木爲賊邪況小便如淋乃腎二經氣絶也醫不治後果歿於金旺之日蓋肝爲腎之子腎爲肝之母設預爲調補腎水必不致於危也

托裡清肝散

人參　黃芪炒　當歸　川芎
芍藥炒　白朮　茯苓　金銀花
白芷炒　甘草炒　連翹　柴胡各七分
山梔四分

右每服一二十錢水煎入
錢氏瓜蒌散治腎子腫硬先用葱椒湯煎洗次以
乾瓜蒌剉散津唾調敷須避風冷濕地
世傳治小兒陰囊腫大用甘草煎濃汁調瓜剉散
塗之立效

山藥膏治兩拘及小腹腫痛或痒用山藥研爛頻
傳患處乾則易之
補中益氣湯方見肌肉不生
異功散方見用敗毒之藥
八珍湯
加味逍遥散一方見發熱不止
活命飲
托裡散一方見熱毒搶瘡湯
加味小柴胡湯方見熱毒瘡

聖愈湯方見出血不止

如味清胃散

四若子湯二方見腹癰

地黃丸方見作渴不止

足指凍瘡附耳凍瘡

足指凍瘡因受寒凜虛佐故寒邪易乘氣血凝滯久而不愈則潰爛成瘡治法須壯脾胃温氣血則疾毒延脚面而疡蓋肢末之處氣血難到又爲外邪肉自潰良肉自生若骨脫筋連者宜急剪去否則

渴絶則氣血不能運行若用湯溫火焚其肉即死而不仁至春必潰腐脫落元氣無虧雖患無害如外敷寒藥內服消毒之劑則元氣受傷必成敗症凡初凍時熱手頻熨之爲妙北方凍耳若誤以手觸之其耳即落太寒能裂膚墮指信然矣

一女子數歲值嚴寒北土因失所恃而足受冷侍婢用熱湯泡之至春月房中穢氣其父覺之脫襪方見十指俱爛但未墮耳予用托裏之劑助其陽氣潰脫以保其生

一小兒仲冬嚴寒兩耳受凍不知痛痒令人以熱手徐徐頻熨內用温補脾氣之劑及敷白斂散而愈

一小兒七歲冬間足指凍痛用熱湯浸洗至春潰脫瘡口不斂足跌腫痛余謂此元氣虛弱須補胃氣以生肌肉不信乃用寒涼消毒之劑腫消黑色自以爲愈余曰此脾胃虛極元氣不能運及患處也後兩腿羸細而歿

一小兒撲傷足跌少許速成凍瘡作痛不止用火炙之肉死至春足脫膿水淋漓不能收斂而歿此症若能調養脾胃使元氣不傷則肌肉自生豈至於死哉

白斂散

白斂一兩 黃柏炒黑五錢

右爲末乾搽患處

湯火瘡

湯火之症若發熱作渴小便赤澁者內熱也用四物加山梔連翹甘草若肉未死而作痛者熱毒也

用四君加芎歸山梔連翹若肉已灰而不潰者氣血虛也用四君加當歸黃芪外傳當歸膏或柏葉末噀洞調搽至旬色其肉自生若因煙薰將灰者以生蘿蔔汁灌之即甦若飲食後被湯火所傷發熱腹脹惡食發搐變症者當參食積驚搐門治之

一小兒火傷兩臂瘡痛大便不利小便赤澁此火毒蓄於下焦也用生地黃當歸芍藥木通山梔赤茯苓生甘草二十劑一使調和而痛止更以四物加山梔參芪白芷甘草而瘡肉腐又數劑而新肉生

一小兒火傷足脛專用敗毒之劑膿水淋漓日晡腫脹此脾虛下陷也用補中益氣湯及八珍湯而愈

一女子沸湯傷腑兩月不斂脉洪大而虛發熱作渴此陰虛火毒所乘用四物加柴胡丹皮熟渴頓止用加味逍遙散腐肉去而新肉生

一女子被烟薰漿氣上壅不省人事用蘿蔔汁灌之而甦但體倦欲睡仍令嚼蘿蔔汁乃服六君子湯加桔梗山梔而安傷輕者以蘿蔔搗汁飲之亦

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

可方

一小兒火傷醫間誤用生肌散陰囊潰脫久而不愈此助其藥毒而然也余用當歸膏及四君子加芎歸旬餘肉生而痊

一小兒火傷其足用冷水浸之腫痛益甚服敗毒藥久肉不潰此脾胃氣傷而血滯也用六君子加芎歸而愈後因勞役寒熱以八珍散加升麻柴胡白芷而痊

一小兒火傷腿用寒涼之藥久不愈腿細攣食少哺熱此因生肌藥助其邪寒涼損其胃也用益氣湯當歸膏不月而愈

一小兒熱湯傷足久不愈膿水清稀口乾足熱患處腫黯哺熱盜汗肢體骨立此禀腎氣虛弱寒藥傷脾而然用益氣湯地黃丸三月餘佐以托裡散如聖餅而愈

一小兒沸湯傷腿搽藥結痂難於屈伸痛不可忍用四物加白朮茯苓及當歸膏而愈

一小兒沸湯所傷胸腹皆潰久而不愈喜脉弱按

之而有力益脾主肌肉當調補脾胃爲主外敷之藥當緩不信恪用敷貼之藥而殺一小兒湯傷脛潰而色赤如豬日哺熟甚右關脉浮而數按之則弦此肝木乘脾土血虛而然耳乃外傅內服皆攻毒後果殺

神効當歸膏治湯火等瘡不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已灰者用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速益當歸生地黃麻油二味皆主生肌止痛補血續筋

當歸　生地黃各一兩　黃蠟一兩如白者止用半兩　麻油四兩

右先將當歸地黃入油煎枯去渣將蠟熔化候冷攪勻即成膏矣用塗患處將細紙蓋之發背癰疽杖瘡潰爛用之尤効凡灰肉潰爛將脫未有些須相連者宜用利刀剪去蓋灰肉有毒去遲則傷新肉矣灰肉去盡尤宜速貼蓋新肉最畏風寒不可忽也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乳香定痛散治傷損及一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各五錢　滑石一兩　氷片一錢

右爲細末揉患處痛即止甚効

豬蹄湯治一切癰疽杖瘡潰爛消腫毒去惡肉潤

瘡口

白芷　黃芩　當歸　羌活

赤芍藥　蜂房多酥炙爲佳　生甘草各半兩

右用豬蹄一隻水四五碗煮熟去油查取清湯

入前藥煎數沸去查溫洗隨用膏藥貼之

四物湯 方見胸癰

六君子湯 方見腹癰

如聖餅 方見流注

翻花瘡

翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡口窮肉突出如菌大小不同或出如乾頭長短不一治法當滋肝補氣外塗藥麩膏窮肉自入須候元氣漸復膿毒將盡塗之有効不然雖入而復潰若誤用刀針蝕藥灸矣其勢益甚或出血不止必

致寒熱嘔吐等症須大補脾胃爲善

治驗

一女子臂癰潰後瘡口突肉如菌用毒藥蝕之突肉益甚面青寒熱經候不調此肝經血燥而生風脾氣虛而不能生肌耳先用加味逍遥散五味異功散兩月餘却用地黄丸托裡散而愈

一小兒患前症用藥腐去瘡口不斂朝惡寒暮發熱余謂因氣血俱虛而然也法當調補脾胃則氣血自生瘡口自斂不悟仍攻其瘡而歿

一女子十五歲患前症腐去而復生面色青而或赤余謂此肝膽二經風火妄動蓋肝血爲陰爲水肝氣爲陽爲火宜生腎水滋肝血使火自息而風自滅不信乃用祛風之劑致血燥妄行瘡口出血不止而死

藜蘆膏治瘡口瘜凸起或出三寸肉者

藜蘆不拘多少

右爲末以生豬脂擂和搽凸瘜肉上

八珍湯

加味逍遥散二方見發熱不止
補中益氣湯方見肌肉不生
托裡散方見熱毒瘡瘍
十全大補湯方見便癰
五味異功散方見敗毒之藥
葱熨法二方見流注

多骨疽

多骨疽由瘡瘍久潰脾胃虛損氣血不能營於患處邪氣陷襲久則筋爛骨腐故骨脫出非真胎所有也當補脾胃壯元氣內用大補湯地黃丸外以附子餅葱熨法祛散寒邪補接元氣則骨自脫瘡自斂若用刮伐之劑復傷真氣鮮有不危嬰兒患之當調補乳母外用葱熨以歲月除之尤不可用追蝕之藥

一小兒足內患之日流清膿惡寒發熱大便去而不了皆元氣虛而下陷也先用補中益氣湯加乾

蕾肉桂諸症漸復乃用十全大補湯及如聖餅出碎骨而愈

一小兒臂患之時出清膿惡寒發熱此元氣虛也朝用補中益氣湯夕用四君歸芪半載常出細骨一塊又用六味丸而愈

一小兒患之日晴白多飲食難化手足並冷此禀命門火衰而脾胃虛寒也先用八味丸異功散如聖餅出碎骨乃用十全大補湯而愈若攻毒邪不固元氣必不活矣

一小兒十四歲閃足脫間服敗毒之劑腫硬色黑余謂此元氣虛而外寒凝滯也用回陽膏六君肉桂十餘劑腫黯漸消又用沖和膏托裡散餘腫漸軟又佐以大補湯針之出清膿甚多即惡寒發熱此陽隨陰散而氣虛也用六君加肉桂參芪各二錢寒熱頓止却用八珍湯托裡散豆豉餅而愈

一小兒足跗腫硬肉色不變形氣倦怠外傅內服皆敗毒耗氣之藥余謂經云形傷痛氣傷腫乃禀賦足二陰虛羸之症也當滋補元氣若行攻伐虛

虛之禍不免矣彼以爲汪仍用前藥足跗變黯腫至脚腕余用大補湯異功散各五十劑以調補脾胃及葱熨患處祛散寒邪補接陽氣漫腫漸消瘡轉赤色旬日而潰此元氣漸復之善症也然固元氣充實瘡肉可生又感於速効之說傳追蝕生肌之藥患處復黯七惡並臻而歿

十全大補湯　方見腹癰

補中益氣湯　方見肌肉不生

八珍湯　方見發熱不止

托裡散　方見熱毒瘡瘍

如聖餅

葱熨法

豆豉餅　二方見流注

冲和膏　一名陰陽散方見寒涼之藥

八味丸　即六味地黃丸加肉桂附子各一兩方見作渴

漏瘡

漏瘡之症因稟氣血不足或久病血氣虛弱或兒肝脾食積內熱不能生肌或乳母七情不和脾氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不能收斂當審其所因調補元氣佐以如聖餅慈
熨之類爲善若用流氣破血追餘等藥反爲敗症
矣餘當參各門主之

一小兒患在臂間腫硬不消面色萎黃膿水清稀
此元氣虧損之症用八珍湯爲主六君子湯爲佐
漸愈因飲食失節惡寒發熱用六君子加升麻柴
胡而安用益氣湯異功散而斂

一小兒腿內側患之寒熱發渴此肝脾二經氣血
虛症也蓋胃爲五臟之本先用五味異功散加方
麻柴胡月餘胃氣始復乃用地黃丸補腎水以生
肝血而愈

一小兒臂間漫腫按之至骨方痛肉色不變形體
消瘦而自多汗余謂此稟腎經虛症當補脾肺以
滋化源反用寒涼尅伐之藥脾氣大虛患處肉死
又用追餘之藥死肉雖去瘡口不斂而歿

一小兒四歲尚解顱余用地黃丸而顱闔至十六
顧間腫硬發熱嗽痰余謂屬腎經氣不足水泛而
爲痰氣傷而爲腫不信反用冰針敗毒破而出水

余曰腎主骨骨而爲癰元氣虧敗余何能爲後果致惜哉

一小兒患在臂外側瘡口開張腫硬色黯發熱惡寒手足時冷此少陽經陽氣虛寒不能生肌收斂也當助胃氣不信仍行攻瘡而死

一小兒十五歲足跟患之二年不愈日出清膿數滴余謂禀腎氣虛弱也不信畢姻後腫硬寒熱仍用攻伐之藥而死

如聖餅

葱熨法二方見流注

八珍湯方見發熱不止

六君子湯方見腸癰

補中益氣湯方見肌肉不生

六味地黃丸方見作渴不止

五瘤

經云肝主筋心主血脾主肉肺主氣腎主骨故云肝爲筋瘤心爲血瘤脾爲肉瘤肺爲氣瘤腎爲骨瘤小兒患之多因禀賦不足乳母七情起居飲食

失調致兒五臟不和內火沸騰血凝氣滯也夫瘤者留也隨氣凝滯臟腑受傷氣血不和所致五瘤之外更有脂瘤粉瘤風瘤蟲瘤髮瘤之類若行氣破血或傳寒涼追飲之藥或用蛛絲纏芫花線等法以治其外則悞矣

一小兒因乳母鬱怒臂前膝腫硬皮色如常日出膿水乃脾經之虛症也用加味歸脾湯如聖餅三十月餘腫漸消後因母怒發熱兒患處復腫用加味逍遙散母服二十餘劑兒日服杯許赤腫漸退仍以前藥又服而愈

一小兒頭後患之又不欲自晴多自此禀腎虛之症母子並服六味丸補中湯外以六味丸料加鹿茸作餅熱熨患處每月一次而歛

一女子腿外廉一瘤寸許色赤破而血逆溏甚多發熱作渴先用當歸補血湯渴漸愈又用加味逍遙散瘡口尋愈

一小兒落草大腿外股如指尖一塊肉色如常按之不痛至數月誤觸破出如粉漿內股煩痛寒熱

如瘧手足抽搐如急驚狀此膿水出多氣血虛而內生風也先用異功散加鉤藤鉤一劑又用八珍湯加鉤藤鉤而安用托裡散而痊

一小兒二歲項間自分娩有一核余謂但調治乳毋其兒自愈彼欲速効外塗壯礪硝黃之類內服海藻蓬朮之類脾胃復傷而歿

一小兒九歲項間患之余謂禀腎肝血燥所致當滋水生木不信另用藥破之膿水淋漓仍服散堅之藥而歿

一女子腿前腫一小瘤作痒搔破出蟲如豉而飛去寒熱如瘧乃肝經之症即虱瘤之類用加味逍遙散而愈又有一種髮瘤破開有髮屬腎經之症也

加味歸脾湯方見腸癰

加味逍遙散

地黃丸　方見作渴不止

八珍湯二方見發熱不止

托裡散方見熱毒瘡瘍

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN NO.

補中益氣湯方見肌肉不生
五味異功散方見敗毒之藥
如聖餅方見流注

保嬰撮要卷之十四終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛 鎧草創
男薛 已編集
後學宋 璞校閱

作痛不止

瘡瘍作痛當審邪之所在症之所因如寒熱而痛邪在表也用人參敗毒散便秘而痛邪在裏也用內疎黃連湯腫煞而痛血凝滯也用仙方活命飲作膿而痛者用托裡消毒散排之膿脹而痛者針

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之膿潰而痛者補之氣虛而痛則用四物參芪大抵形傷痛氣傷腫不知此數者徒以乳香沒藥爲止痛之方則非所以爲法矣仍審五臟相勝相兼之症而治之後倣此

一小兒腿癰潰而作痛服敗毒之藥腫勢益甚更嘔腹痛余謂膿出而反痛攻毒而反嘔其屬胃氣虛弱明矣急宜補之或謂痛無補法仍用前藥諸症蜂起余用六君乾薑木香胃氣漸復再用益氣湯托裡散而愈東垣丹溪云膿出而反痛此爲虛也宜補之穢氣所觸和解之風冷所逼者温養之信矣

一小兒臂瘡潰而作痛脉洪數而有力緣乳母食厚味胃經積熱所致母服清胃散子服瀉黄散痛止又母子服加味逍遥散而愈

一小兒項患瘡腫作痛左頰色赤此膽經熱毒母用仙方活命飲未一服痛止再服而潰又用加味小柴胡湯加味逍遥散母子俱服而斂

一小兒左脇腫痛赤色而硬此稟膽經熱毒所致

也子服活命飲母服加味小柴胡湯而軟又子服三味解毒散母服加味逍遥散而潰復惡寒不食腹脹吐酸此脾氣弱而飲食停滯也用六君子湯脾氣漸健用托裡散肌肉漸生又嘔吐寒熱而色青白此脾氣虛而肝邪所侮也用異功散加柴胡升麻而安又用異功散加當歸黃芪而愈

一小兒臂患瘡赤腫作痛服大黃藥敷鐵箍散腫痛頓消余曰此脾氣虛瘡內陷不知痛耳非毒退而內消也遂朝用益氣湯夕用異功散各數劑色微赤微腫又用葱熨法及托裡散而瘡消設或再用前藥則患處得寒而愈滯胃氣得寒而不生多致不起矣

一小兒臂瘡潰而作痛瘡口色白而赤飲湯此稟腎脇胱陰虛也朝用八珍湯夕用加減八味丸諸症漸退面色頓白此熱退而真虛之色見也用托裡散異功散而愈

一小兒胸患瘡作痛發熱大小便秘此邪在裡也先用大連翹飲一服熱痛頓止更以五味異功散

加升麻白芷而愈

一小兒面患瘡瘍痛發熱惡寒此邪在表也先用荊防敗毒散解其表邪次用七味白朮散固其胃氣而愈

一小兒背患瘡瘍腫大痛發熱飲冷服敗毒之藥其痛益甚此膈胱經熱毒熾盛也用活命飲加麻黃羌活一劑諸症頓退乃去麻黃羌活又二劑而膿潰再用清熱消毒飲而瘡痊次年腹患癰瘍腫作痛大便不通其勢雖劇悉屬形病俱實用活命飲加硝黃二劑大便即通腫痛頓止又用清熱消毒散而痊

一小兒腿癰潰而膿清脈弱面色痿黃自汗有痰余謂當補脾肺彼以為緩遂降火敗毒嘔吐喘嗽余曰脾肺氣絕也不信後果歿

一小兒臂癰潰而面黃痰喘余謂稟脾腎氣虛不信乃服四物黃柏知母而歿余治此症用地黃丸補中湯滋其化源多有生者若用四物黃柏之類益傷脾肺乃速其危矣

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

神効解毒散治一切瘡瘍作痛不止凡初起腫者服之即消已潰仍腫者服之即愈嬰兒母亦服之自製

金銀花一錢　甘草節五分　黃芪炒　皂角刺炒
當歸各三錢　乳香　沒藥各二錢

右爲末每服三錢酒煎爲末温酒調服亦可如瘡已潰腫痛已止者去乳沒金銀花倍加黃芪

黃連解毒湯治瘡瘍煩躁飲冷脉洪數或發狂言

黃連俱炒　山梔各一錢五分　黃柏

右每用一二錢水煎熱服

內疎黃連湯治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脉洪而實

黃連炒　芍藥炒　當歸各一錢　檳榔
木香各五分　黃芩炒　梔子炒　薄荷
桔梗炒　甘草　連翹　大黃炒各一錢

每服一二錢薑水煎

乳香定痛散治瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各五錢　滑石　寒水石煅各一兩

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

氷片一錢

右爲細末乾敷患處

小柴胡湯 加山梔牡丹皮即加味小柴胡湯 治肝膽經部分瘡瘍作痛或身熱惡寒頸項強直胸脇作痛方見瘍癰

三味解毒湯 方見出血不止

加減八味丸 方見作渴不止

五味異功散 方見敗毒之藥

清胃散

四物湯

四君子湯 三方見腹癰

大連翹飲 方見臀癰

荆防敗毒散 即人參敗毒散加荆芥防風方見發班

葱熨法 方見流注

清熱消毒散 方見熱毒口瘡

仙方活命飲

托裡消毒散

托裡散三方見熱毒瘡瘍

七味白朮散

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

八珍湯

加味逍遥散 三方見發熱不止

瀉黃散 方見頭面瘡

作嘔不止

丹溪先生云腫瘍時嘔當作毒氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之此論其常耳竊謂前症如腫赤燉痛而嘔者熱毒甚也用仙方活命飲作膿而嘔者胃氣虛也用五味異功散膿脹而嘔者血氣虛也用六君子加蘆薈便秘而嘔者熱在藏也用內疎黃連湯寒藥服多而嘔者胃氣傷也用枳朮健中湯食少胃寒而嘔者托裡温中湯肝氣乘脾而嘔者托裡抑青湯胃虛停痰而嘔者托裡清中湯胃虛自病而嘔者托裡益黃湯鬱結傷脾而嘔者托裡越鞠湯徐院令云治癰疽不可一日無托裡藥確哉是言也蓋毒氣者熱有餘也陰虛者脾不足也皆因脾氣虛弱以致之但宜調補中氣則正氣復而邪氣自去矣嬰童當兼治其母

傷寒撮要 卷之十五 七

一小兒臂患瘡服消毒之劑作嘔少食腫硬不消面色瘁黃此脾胃氣虛而藥復傷也用六君木香乾薑更增腹痛此虛甚也以前藥入附子一片諸症頓退後飲食停滯作嘔不食先用保和丸一服次用異功散而愈

一小兒腿癰膿清作嘔瘡口不斂肝腎二脈洪數此因禀腎水不足而肝火爲患用六味地黃丸以補腎九味蘆薈丸以清肝而愈

一小兒手患瘡作嘔流涎面色瘁黃余謂脾氣虛寒遂用六君乾薑木香而嘔止又用補中益氣湯而涎止不數劑而瘡愈

一小兒瘡痛作嘔手足並冷此因痛而胃氣復傷也用六君乾薑藿香痛嘔頓止又用異功散加升麻柴胡而瘡亦消

一小兒面患瘡作嘔手足並冷面赤作痛此胃經熱毒所致先用仙方活命飲而痛止又用清熱消毒散而瘡愈

一小兒腹患瘡作嘔便秘發熱飲冷畜熱也用內

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

傷斃搐頭

疎黃連湯而便通嘔止又用清熱消毒散而瘡内消

一小兒腿患瘡用護心散嘔吐不食手足並冷余曰此非毒氣内攻乃胃虚耳宜用異功散補之彼反見疑仍索前藥余以異功散爲末作護心散與服嘔止食進又用托裡散膿潰而愈後語其故猶不信其效至此也

一小兒臂患瘡服護心散嘔吐腹脹余曰此脾胃復傷耳不信仍復攻每益加泄瀉余先用托裡温中湯一劑次用六君薑桂又用五味異功散而愈

一小兒項患瘡作嘔吐黃發熱飲湯余謂胃氣虚熱不信反清熱敗毒更加吐瀉而殁

一小兒面患瘡作嘔發熱作渴飲湯余謂胃氣虚而作嘔不能化生津液而作渴不信另用藥攻毒致吐瀉吃逆而殁

托裡益黃湯治瘡瘍因脾胃虚弱寒水反侮土飲食少思嘔吐泄瀉等症自製

人參　白术炒各七分　陳皮　茯苓

半夏　炮薑　丁香　炙甘草各二分
右薑水煎服
托裡越鞠散治乳母鬱怒肝脾內熱致兒患瘡
母子並服自製
陳皮四分　川芎
半夏　山梔炒　蒼朮各三分　炙甘草二分
右薑棗水煎嬰兒乳母並服
托裡健中湯治瘡瘍陽氣虛寒腸鳴切痛大便溏
泄嘔逆昏憒此寒變而內陷也急用此藥緩則
不救潰瘍誤服寒劑多患之自製
羌活三分　木香
丁香　沉香各三分
炙甘草五分
右薑水煎徐徐服之
托裡清中湯治瘡瘍脾胃虛弱痰氣不清飲食少
思等症自製
人參　白朮炒　陳皮
半夏三分　桔梗二分　甘草炒　柴胡各二分

右薑棗水煎服

托裡温中湯治瘡瘍元氣虛弱或因涼藥所傷飲食少思嘔吐泄瀉等症自製

人參　白朮　炮薑各四分　甘草炒　茯苓各一錢半　夏　肉桂　黃芪炒各一錢五分

右每服二十五錢薑棗水煎

托裡益中湯治瘡瘍中氣虛弱飲食少思或潰而不斂或腫而不消自製

人參　白朮炒　陳皮炒　茯苓　半夏　炮薑各五分　木香　甘草炒各三分

右薑棗水煎

托裡益青湯治瘡瘍脾土虛弱肝木所侮以致飲食少思或胸膈不利自製

人參　白朮炒各五分　陳皮炒　茯苓　半夏各三分　芍藥炒一錢　柴胡一錢

右薑棗水煎服

保和丸

六味丸二方見發熱不止

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

九味蘆薈丸 方見腫癰

六君子湯 方見腹癰

補中益氣湯 方見肌肉不止

五味異功散 方見用敗毒之藥

清熱消毒散 方見熱毒瘡瘍

仙方治命飲

托裡消毒散

托裡散三方見熱毒瘡瘍

內疎黃連湯 方見作痛不止

出血不止

瘡口出血有因五臟相勝陰陽不調而血不止者有因乳母六淫七情之氣不平而血妄行者若因肝火內動用四物山梔牡丹皮肝經血虛用六味地黃丸心虛不能統血用四物參朮丹皮酸棗仁脾虛不能統血用四君山梔牡丹皮脾氣鬱滯用歸脾湯脾肺氣虛用補中益氣湯氣血俱虛用十全大補湯腎陰不足而肝火內動用六味地黃丸柴胡梔子散加五味子大凡失血過多而見煩熱

發渴等症勿論其脉不問其症急用獨參湯以補其氣經云血生於氣苟非參芪歸朮甘溫之藥決不能愈若發熱脉大者多不治

一小兒十二歲眉間一核似赤小豆許出血如注發熱倦怠食少體倦此肝經血熱脾經氣虛也用柴芩參苓散九味蘆薈丸而痊

一小兒流注出血吃逆腹痛手足並冷用六君子及獨參湯而益甚此陽氣虛寒之甚藥力未能驟及也遂連服數劑諸症漸退用月許將愈因飲食失宜寒熱發搐血出此脾氣虛肝火所乘也用異功散加升麻柴胡而安又用八珍四君而愈後因勞心發熱頭痛另服清熱之劑汗出口噤良久又省服大補湯數劑而安又用八珍湯而愈

一女子臂患瘡出血余謂血虛用聖愈湯而愈後因怒復作如前先用聖愈湯又用加味逍遥散將愈因惑於人言別服降火之劑吐瀉腹痛余用異功散聖愈湯而愈

一小兒頭瘡出血睡中發搐審其母素有鬱怒發

熱用加味逍遥散加味歸脾湯母服之而子自愈
一小兒頭面生瘡出血右頤赤色口乾飲冷此胃經有熱先用清胃散漸愈又用三味解毒散而愈
一小兒臂瘡出血脉浮大按之無力右寸關爲甚此脾肺氣虛不能攝血歸源先用補中益氣湯而血止又用托裡散而瘡愈
一小兒頭面生瘡出血作痛發熱飲冷此胃經熱甚而血妄行也先用仙方活命飲諸症頓愈又用清熱消毒散瘡口漸斂

一女子十四歲患瘡瘍不時出血面青善怒余謂肝膽經氣虛而血不能歸經也欲滋腎水以生肝木不信反清熱敗毒血不止而歿
一小兒患骨疽內潰膿出甚多後瘡口出血惡寒體倦脉之如無余謂陽隨陰散而氣脫用獨參湯補之不信而歿
東垣聖愈湯治諸瘡膿血出多心煩不安不得眠

驀

當歸　川芎　三分　熟地黃　生地黃　各二分

黃芪炒五分　人參三分

右水煎服

歸脾湯治瘡瘍脾氣虛不能攝血歸經而瘡口出血或乳母脾經鬱熱致兒患瘡發熱出血或瘡口不斂者方見脇癰

獨參湯治瘡瘍潰後氣血俱虛瘡口出血或發熱惡寒作渴煩躁宜用此藥以補氣則血自生而歸經此陽生陰長之理用人參一兩薑十片棗十枚水煎服

三味解毒散治瘡瘍熱毒出血或稟熱毒金石毒者尤宜用之自製

金銀花一兩　甘草五錢　牛黃一錢量人用之

右爲末每服五分白湯調下

四物湯方見腋癰

柴芩參蘇飲方見熱毒瘡癤

柴胡梔子散方見脇癰即梔子清肝散

六味地黃丸方見作渴不止

加味逍遥散

當歸補血湯二方見發熱不止
補中益氣湯方見肌肉不生
十全大補湯方見便癰
九味蘆薈丸方見喉痺
四君子湯
清胃散
六君子湯三方見瘡癰
異功散方見用敗毒之藥
托裡散
仙方活命飲二方見熱毒毒口瘡
清熱消毒散方見熱毒瘡瘍

肌肉不生

肌肉乃脾胃所生收斂皆氣血所主二者相濟以成者也若肌肉不生而色赤者血熱也用四物山梔牡丹皮補熱肉熱者血虛也用四君歸地牡丹皮膿水清稀者氣血俱虛也用十全大補湯食少體倦者脾氣虛也用補中益氣湯煩熱作渴起居如常者胃熱也用竹葉黃芪湯煩熱作渴小便頻

數者腎虛也用六味地黃丸肉腐而不潰者用烏金膏若肉潰而不斂者用六君子湯穢臭脉洪大而作渴乃眞氣虛而邪氣實也此爲難治大凡瘡久而不愈者皆元氣不足或因邪氣凝滯於患處苟能調補脾胃則元氣自足元氣既足則邪氣自消朽肉自生新肉自生而瘡自斂矣使不保其本而槩敷生肌之劑是反助其邪後更潰爛耳

一小兒臂癰久不斂日晡倦怠敷追蝕之藥腐壞而不斂余謂因脾氣虛而不能生長肌肉朝用益氣湯夕用異功散月餘而痊

一小兒腿癰色赤久不生肌日晡發熱此脾經血虛也用四君歸芎柴胡牡丹皮熱漸止而肌漸生後因停食吐瀉瘡色變此脾氣虛弱用益氣湯異功散而痊

一小兒臀瘡久不生肌余曰臀屬膀胱乃氣血難到之所此禀腎虛而患者當調補脾氣滋養陰血遂用五味異功散地黃丸而痊

一小兒臀癰潰而不斂發熱作渴小便頻數仍欲

降火余謂此禀啓經陰虛而火動耳用補中益氣湯加減八味丸而愈畢姻後臀復患癰欲速効服敗毒散潰而發熱脉洪數而無力腎部爲甚仍用益氣湯八味丸爲主佐以八珍湯異功散而愈

一小兒腿瘡久不生肌腫痛色赤此脾胃虛而濕熱也用益氣湯加黃栢防已漸愈又用四君柴胡升麻而痊

一小兒臀瘡腐而作痛不止肌肉不生口乾作渴右關脉洪數此胃經火盛之惡症先用竹葉黃芪湯二十劑而痛止又以四君加升麻白芷而愈

一小兒臀間腫硬色不變面皆皎白余謂禀腎不足反行敗毒日出清膿而殁

一小兒頸間腫硬余謂禀肝腎不足不信乃用藥後順間胸脇膝骨皆腫各用火針出水瘡口開張而殁

補中益氣湯治小兒禀賦不足榮衛之氣短促寒薄腠理閉鬱而爲瘡瘍或因瘡瘍服尅伐之劑氣血虛損而不能消散或已潰氣血虛損而不

能生肌或惡寒發熱煩躁倦怠飲食少思等症

人參　黃芪炒　白朮炒　甘草炒
當歸　陳皮各五分　柴胡　升麻各三分
右薑棗水煎服

神効烏金膏治瘡瘍肉灰不腐塗之即腐未灰塗之即生若初起腫痛捺點數處其毒頓消若患頑瘡元氣無虧久不收斂內有毒根者以紙撚蘸紙之即斂其方用巴豆仁一味炒黑研如膏點於患處臨用修合庶不乾耳此法雖不出于方書余製而用之良有奇驗故並籍焉

五味異功散方見用敗毒之藥
四君子湯方見腹癰
加減八味丸即六味丸加五味子四錢肉桂一錢
四物湯方見腋癰
十全大補湯方見便癰
竹葉黃芪湯
六味地黃丸二方見作渴不止
保和丸方見發熱不止

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

發熱不止

瘡瘍發熱初患乃毒氣所炊已成乃內炊作膿已潰乃血氣虧損不可槩行敗毒以傷元氣蓋未成者當分邪之在表在裡將成者當分邪之可攻可補已成者當分膿之作與未作膿已成者當分膿之淺深高漫膿已潰者當分痛之止與不止若作痛而發熱者用仙方活命飲作膿而發熱者用托裡消毒散膿脹而發熱者用加味托裡散膿出而發熱者用八珍黃芪午前發熱者陽氣虛也用補中益氣湯午後發熱作渴小便頻數者腎氣虛弱也加減八味丸膿血多而熱者陽無所附也十全大補湯日將晡而熱者氣血虛也八珍湯若無寐而熱者內補黃芪湯煩躁者血脫也當歸補血湯自汗而熱者胃氣虛也四君子湯惡寒發熱者肺氣虛也補中益氣湯或四君黃芪當歸主之亦有五臟相勝夾食夾驚或乳母六淫七情所致者不能備述治

者臨症詳之

一小兒腿癱發熱腫痛肉色不赤此形氣虛而病氣實也先用活命飲二十劑隨用益氣湯二十劑外用葱熨法而愈

一小兒十五歲眉患癱傅服皆敗毒之藥腹痛腫硬此脾胃復傷而然也朝用異功散夕用大補湯兩月餘而愈

一小兒十十歲腿內側患癱漫腫堅硬肉色不變自汗盜汗此稟肝脾虛羸也用大補湯異功散元氣漸復膿潰針之仍服前藥而愈

一小兒腿內股患瘡發熱不愈診乳母肝脾血虛有熱用逍遙散加柴胡升麻及加味逍遙散與乳母服兒日服數貼兩月餘而愈

一小兒臂癱腫扁色白余用托裡之劑不從反內外用敗毒之劑發熱不食手足並冷仍復敗毒余曰此脾胃復傷而變症耳若再行攻毒則胃氣益損五臟皆虛諸症蜂起矣乃用益氣湯佐以異功散而漸安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

一小兒潰後發熱飲乳不歇面目或赤此胃氣虛熱津液不足而作渴也用白朮散末以乳調服而愈後發熱作嘔吐酸腹膨此乳食停滯先用保和丸異功散各末一服又用托裡散入珍湯而瘥飲

一小兒潰後發熱懶食日補益甚此脾氣虛弱也先用四君升麻歸芪飲食漸進次用八珍牡丹皮發熱漸止後用托裡散而痊

一小兒腹癰潰後發熱作渴手足並冷余謂脾胃陽虛用六君薑桂治之不信反清熱敗毒果吃逆腹痛而殁

一小兒臀癰潰而發熱面色青白服敗毒藥益甚余謂脾氣虛寒而隔陽於外非熱也用人參理中湯不信後吐瀉手足並冷而殁

加味托裡消毒散治潰瘍餘毒發熱作痛

人參一錢　黃芪炒一錢　當歸酒拌一錢　川芎　芍藥炒　白芷　甘草　連翹　茯苓各五分　金銀花　乳香　沒藥各三分

右作二劑水煎服

八珍湯治潰瘍氣血俱虛者用此方主之若因脾氣虛弱而不能生血者宜用異功散

當歸一錢　川芎五分　芍藥炒七分　熟地黃酒拌
人參　白朮炒　茯苓各一錢　甘草炙五分

右每服二十五錢薑棗水煎

加味逍遥散治因乳母肝脾血虛發熱致兒患瘡或兒肝脾有熱致瘡不愈

當歸　甘草炙　芍藥酒拌　茯苓
白朮炒各一錢　柴胡　牡丹皮　山梔炒各七分

右作四劑水煎服若乳母肝脾血虛內熱或寒熱遍身搔痒等症尤宜用之

十味白朮散治胃氣虛弱或因吐瀉口渴作渴飲食少思作渴飲冷者亦宜用

藿香　白朮
甘草炒　人參
木香　白茯苓
乾葛各等分

右每二十錢水煎服

保和丸治飲食停滯發熱者不可多服

神麴炒　山查
半夏　茯苓

陳皮 各一錢　連翹 蘿蔔子 各半兩

右爲末糊丸小桐子大每服二十三十丸白湯送下化服亦可加白朮名大安丸

當歸補血湯治瘡瘍血氣虧損或妄服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴喜飲日赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無其症似宜服白虎湯但脉不長實爲可驗耳若服白虎湯必死

黃芪炙一兩

當歸二錢

右水煎徐徐服

內補黃芪湯治潰瘍膿水出多或過服敗毒之劑致氣虛血弱發熱無寐或兼盜汗肉熟或不生肌自製

黃芪炒二錢　人參　白朮炒　茯苓

陳皮　當歸各一錢半　五味子炒　甘草炒各五分

酸棗仁炒一錢

右水煎徐徐服

十全大補湯方見便癰

葱熨法方見流注

補中益氣湯 方見肌肉不生

四君子湯

六君子湯 二方見腹癰

仙方活命飲

五味異功散

托裡散

托裡消毒散 四方見熱毒瘡瘍

加減八味丸 方見作渴不止

大便不通

瘡瘍大便不通初起則審所致之因所見之症而行內疎外表之法已潰則分血氣虛實傳變之症而用托裡滋補之法不可泛用苦寒疎導之劑恐復傷眞氣則腫者不能消散成膿潰者不能生肌收斂故卅溪先生云腫瘍內外皆壅宜托裡表散爲主潰瘍內外皆虛宜托裡補接爲主治者審之

一小兒胸患癰腫痛熱渴大便不通脉沉數而有力此形病俱實而邪在內也用涼膈散大便隨通而痛頓減又用活命飲腫隨散聚頭出膿又用

托裡消毒散而愈

一小兒腹癰腫痛大便不通脉洪數而有力兩寸關爲甚此表裡俱有邪也用大連翹飲去大黃二錢劑大便頓通再用活命飲一劑諸症頓退又用清熱消毒散而消

一小兒臂癰腫痛大便乾澁用瀉黃散但面色赭黃此脾經氣血虛也先用補中益氣湯加熟地黃兩月餘大便漸利惡寒發熱此邪氣去而眞氣虛也用托裡散八珍湯而痊

一小兒臂癰潰而作渴煩熱大便不通脉洪大而虛用當歸補血湯及四物加黃芪各一劑而便通又用八珍湯托裡散而痊

一女子患流注大便不通乾澁色赤或黃頭運惡寒此脾腎氣虛而血弱也用補中益氣湯加桃仁杏仁麻子仁而大便潤去三仁加蔓荊子而頭運愈又用托裡散而痊

一女子患瘰癧便結而赤口乾脯熟此肝腎陰虛而內熱也先用加減八味丸八珍湯兩月餘大便

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

漸通又用加味逍遥散佐以五味異功散而大便通用九味蘆薈丸而瘥愈

一小兒十五歲瘰癧二年矣余謂稟腎肝陰虛燥熱用地黃丸之類而愈後大便結燥用通幽湯爲主佐以八珍湯之類兩月餘而漸愈彼欲速效另服神記黑丸子通而不止虛症並臻余仍用前法半載而瘥

一小兒流注愈而大便秘結發熱作渴兩顴赤色余謂腎肝陰虛用地黃丸通幽湯而愈次年畢姻後大便仍秘用潤腸丸余曰東垣云少陰不得大便以辛潤之以苦泄之不信仍用前藥後果殁

一小兒腹癰潰而大便滑滯面赤作渴余謂腎開竅於二陰乃稟腎陰不足不信反用疎導之藥泄瀉不止而殁

一小兒臂癰潰而大便不利或利而後重或虛坐努力余謂脾氣虧損用補中益氣湯不悟仍用下利之藥吃逆腹脹而殁

涼膈散治實熱大便不通或咽腫作痛口舌生瘡

或便溏赤澁發熱譫語聽卧不安

大黃　朴硝　山梔　黃芩　茵蔯　蘆薈　薄荷葉各等分

右爲末每服少許蜜湯調服

大連翹飲方見瘡癰

清熱消毒飲方見熱毒口瘡

加味逍遥散

當歸補血湯二方見發熱不止

補中益氣湯方見肌肉不生

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

活命飲

托裡散二方見熱毒瘡瘍

九味蘆薈丸方見喉痺

大便不止

瘡瘍泄瀉不止或因膿血出多脾氣有傷或命門火衰不能生土或脾氣虛寒不能司攝或禀腎虛不能禁固或乳母脾胃虧損元氣下陷致兒爲患若瀉而煩熱無寐脾氣虛也用東垣聖愈湯瀉而口乾飲湯胃氣虛也用錢氏白术散瀉而煩渴飲

氷胃經有熱也用東垣瀉黃散瀉而色黃飲食不化或腹中作痛脾氣虛弱也用六君加木香瀉而色黃小腹重墜或大便去而不了脾氣下陷也用補中益氣湯瀉而色青飲食少思腹中作痛肝木侮土也用六君木香升麻柴胡東垣先生云診右關脉洪熱邪傷脾也用芍藥甘草湯之類右關脉弦風邪傷脾也用芍藥甘草湯之類右關脉緩本經濕邪傷脾也用平胃散之類右關脉滑燥邪傷脾也用異功散加當歸或四君子湯加熟地黃之類右關脉沉細寒邪傷脾也用益黃散理中丸之類寒甚加附子大凡飲沸湯而不知熱者陽氣虛寒之症也急用四君桂附飲冰水而不知寒者陽氣亢熱之症也急用清涼飲之類又法以手定並冷者為虛寒用五味異功散加薑桂不應急加附子手足不熱者為虛熱用五味異功散加薑桂不應急加附子手足並熱者為實熱用瀉黃散多有更生者

一小兒臂癰火潰飲食後即泄瀉小腹重墜面色或痰黃或皎白兩寸脉短不及本位按之若無此

脾氣虛寒下陷不能升化而然用八味丸補命門火佐以益氣湯以培胃氣月餘漸愈更佐以十神丸兩月餘而瘡愈

一小兒腿癰潰後泄瀉飲食少思手足時冷多在侵晨夜間此變脾腎虛寒也用四神丸六君薑桂漸愈以益氣湯間服而愈

一小兒便癰久不愈泄瀉面黃手足時冷小便重墜此脾氣虛弱下陷之惡症也朝用益氣湯內人參五錢白朮一錢夕用異功散內人參三錢白朮一錢更以人參一兩煎湯代茶兩月餘而愈至三十七歲畢姻後患便癰泄瀉手足並冷幾危余謂命門火衰用八味丸益氣湯而愈

一小兒流注潰後作瀉飲食難化余謂脾氣虛弱用六君子湯而愈後因停食泄瀉手足並冷用六君薑桂不應用人參一兩附子一錢數劑諸症始退却用獨參湯月許而愈

一小兒瘰癧泄瀉面青腹脹奮乳母乳頭乳房作痛蓋乳房屬胃經乳頭屬肝經乃肝木勝脾土而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

然耳兒病正屬是經乃母子同病也朝用益氣湯
夕用六君升麻柴胡爲主佐以四味肥兒丸母子
同服並愈

一小兒瘰癧泄瀉服分利之劑小便不利面黃少
食余謂因脾肺氣虛不能分布諸臟朝用益氣湯
夕用異功散諸症悉愈

一小兒瘰癧作瀉面青腹脹此脾虛而肝侮也用
異功散爲主以四味肥兒丸爲佐諸症漸愈却用
肥兒丸爲主異功散爲佐而愈

一小兒臀癰久不愈大便泄瀉小便不調發熱作
渴余謂腎開竅於二陰故一便不調此禀腎氣虛
熱而然也用地黃丸益氣湯之類諸症漸退肌肉
漸生瘡口自愈

一小兒瘰癧兼瀉形氣骨立此肝脾疳症用異功
散三劑却用蚵蠣丸一服月餘而愈

一小兒十五歲已近女色患此服十宣散久不愈
余謂當大補元氣不信致惡寒發熱或作渴嗽痰
或頭目眩運或手足發熱去後大小便牽扁形體

骨立余謂此精血未滿而虧損所致用補中益氣湯加減八味丸日以人參一二兩煎湯代茶二十月餘而愈

一小兒十五歲腿癱將愈而作瀉余用補中益氣湯及六君子湯而愈後因功課勞神飲食失節或時復瀉余謂胃氣未復仍用前藥不信另服消導之藥泄瀉不止而歿夫胃氣平和飲食入胃精氣則輸於脾上歸於肺行於百脉而成榮衛若飲食一傷起居不時損其胃氣則上升精華之氣反下降而殘泄非升陽補氣決不能愈

八味地黃丸治諸瘡因命門火衰不能生脾土致血氣虛弱不能生肌而瘡口不合或變諸敗症又諸瘡愈後小便頻數大便作泄飲食不入作渴發熱肌肉不生之聖藥但世人未經試驗而不信用惜哉

熟地黃用生地黃酒浸透砂罐內九蒸九晒仍晒乾八兩　牡丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩　山茱萸酒拌取肉　山藥各四兩　炮附子一兩　肉桂用厚者刮去外皮淨一兩

右以地黃酒拌濕杵膏各味爲末和均再入酒糊丸少許量大小白湯送下

四神丸治瘡瘍脾虛胃弱大便不實飲食少思或泄瀉腹痛又治腎虛五更初瀉

肉荳寇二兩 補骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸一兩

右爲細末用紅棗六十五枚生薑六兩水二鍾煮乾取棗肉丸桐子大每服二十三十丸白湯送下或化服

二神丸治瘡瘍因脾腎陰虛泄瀉

補骨脂四兩 肉荳寇二兩生用

右爲末用紅棗四十九枚生薑四兩水一鍾煮乾取棗肉丸桐子大每服二十三十丸白滾湯下

補中益氣湯方見肌肉不生

五味異功散方見用敗毒之藥

六味地黃丸方見作渴不止

六君子湯方見腹癰

獨參湯方見出血不止

四味肥兒丸方見鼻骨癰

蚵蟇丸 方見諸痺門 痺即癃驗九

小便不通

瘡瘍小便不通者其因不一當分經絡虛實而藥之若心小腸熱而不通者用黃連導赤散心經氣虛用養心湯肝經實熱用龍膽瀉肝湯肝經虛熱用瀉黃散脾經虛熱用四君子湯肺經實熱用黃芩清肺飲肺經虛弱用補中益氣湯腎經燥熱用滋腎丸腎經虛熱用地黃丸設若潰而惡寒發熱氣血虛也用八珍湯手足並冷陽氣虛寒也用四君子湯加乾薑升麻手足不冷乃脾氣虛弱也用四君柴胡升麻半夏寒熱往來氣血虛也用十全大補湯大便了而不了脾氣虛而下陷也用補中益氣湯切不可輕用疎導之劑復傷元氣致腫者不能起發腐潰潰者不能生肌收斂須臨症制宜而治庶無悞矣

一小兒頭患瘡小便不利胸滿少食此脾肺氣虛也先用益氣湯飲食頓進又用八珍湯加五味子小便頓利末用托裡散而痊

一小兒患腹癰小便不利大便乾實此形病俱實先用八正散一劑二便隨通又用加味清胃散一劑再用仙方活命飲一劑而痊

一小兒兩脇胸間或兩腿內側患瘡瘍小便不利或作或輟診乳母肝脾脉洪數母服加味逍遥散子服梔子仁散加柴胡而痊

一小兒臂瘡服敗毒之藥小便不利腹脹作嘔此胃氣復傷陽氣虛弱而然耳先用六君薑桂一劑嘔脹頓止再用異功散小便如常後用托裡散而

疝愈

一小兒患流注小便不利面白口乾手足時冷悉因脾肺氣虛之所致也用益氣湯加山藥五味子諸症漸愈又用托裡散而瘥愈

一女子臂瘡飲食少思小便不利余謂脾肺氣虛不能化生先用四君黃芪當歸小便尋利又用五味異功散托裡散而瘥愈

一小兒患便癰誤服敗毒之劑脾損元氣不能成膿余用托裡之藥潰之而愈後小便不利面色痿

黃四肢時冷余謂脾肺氣虛不能下輸膀胱用補中益氣湯不信另服滲利之藥嘔吐腹痛手足並冷余先用四君薑桂再用補中益氣湯之類元氣漸復小便漸利

一小兒患腹癰潰而膿清不斂面色青黃余謂肝木侮脾土用六君柴胡升麻及補中益氣湯之類而愈後小便頻數而少服木通車前之類乃純陰滲滲之味善傷陽氣經曰無陽則陰無以生無陰則陽無以化非純陽補氣之藥不救不信後果殁

一小兒腹癰潰而膿水清稀煩躁時嗽小便如淋仍欲分利余曰此脾肺氣虛之惡症分利道損真陰之所致也急補脾肺脾肺氣旺則小便自調諸症自愈奈何不悟余言仍服前藥以致不起惜哉

梔子仁散治小便不通或兼見血或膀胱脹悶煩躁不安

冬葵子　茅根　各二分　甘草二分　梔子仁炒五分

右水煎或爲末服亦可

八正散治瘡瘍內蘊熱毒大小便不利

大黃 炒 三分　山梔 炒　扁蓄　車前子 炒 二分
瞿麥　滑石
右水煎服
海金沙散治下焦濕熱不施化而小便不利
海金沙　鼠粘子 炒　金
右各爲末每服四五分白湯調下
清心蓮子飲治發熱口乾小便不利或兼白濁夜則安靜晝則發熱
黃芩 炒　麥門冬　地骨皮　車前子 炒
茸草 各三錢半　石蓮肉 搗碎　茯苓　黃芪 炒
柴胡　人參 各二錢　甘草 炙 一錢
右每服二十錢水煎
黃芩清肺散治肺燥而小便不調
黃芩 炒 一錢　山梔 一箇 擘
右水煎服
滋腎丸治腎熱而小便不調
黃柏 酒拌炒黑 三兩　知母 炒 三兩　肉桂 二錢
右爲末水糊丸麻子大每服三十五十九白湯下

水調服亦可
導赤散 方見臂癰
內疎黃連湯 方見作痛不止
八珍湯 方見發熱不止
補中益氣湯 方見肌肉不生
活命飲
托裡散二方見熱毒瘡瘍
六君子湯 方見腹癰
小便不止

瘡瘍小便不止有膀胱虛氣虛而不能禁止者有膀胱虛熱而自遺者有有肺經傳熱遺於膀胱而然者有肺虛不能生腎而然者有稟腎虛早近女色而小便不止或然者治法膀胱氣虛用六味丸六一散膀胱有熱用六味丸滋腎丸肺經遺熱用清肺散六味丸肺氣虛用益氣湯六味丸早近女色而小便不止或太小便牽痛者乃腎肝虧損所致作渴飲冷屬虛熱用六味丸補中益氣湯作渴飲熱屬虛寒用八味丸補中湯精血篇云男子精未滿而御女色以

通其精五臟有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澁痛加淋愈痛則愈便愈便則愈痛若不條分縷析而泛投襍藥則悞矣

一小兒項腋結核潰而體瘦發熱小便不止此熏肝膽之經血氣虛熱而然也先用加味逍遥散五味異功散爲主以地黄丸爲佐月餘以地黄丸爲主五味異功散加當歸柴胡爲佐諸症漸愈又以四味肥兒丸間服而愈

一小兒陰囊時腫余謂胎熏肝火不信後患便癰潰後小便淋瀝或時澄白此肝火爲患潰久肝氣虛弱而小便如斯也蓋虛則補其母腎爲肝之母用地黄丸滋腎水以補肝漸愈因功課勞心兼怒不時寒熱小便如淋用加味逍遥散而寒熱止却用地黄丸爲主佐以四味肥兒丸而愈

一小兒流注久潰面白時咳膿水清稀小便短少或如淋不止余謂脾肺氣虛不能生肝腎而然用補中益氣湯六味地黄丸爲主佐以托裡散而漸

愈又間用豆豉餅而飲
一小兒鶴膝風久潰小便頻數後淋瀝不止面色
黑或皎白飲食少思四肢倦怠此腎之脾胃虛也
朝用補中益氣湯夕用五味異功散飲食漸加肢
體漸健却用地黃丸而愈
一小兒早近女色患脇癰潰而小便如淋服分利
之劑更加腹脹小便不止莖中作痛大便自遺余
謂漂腎陰虛也當急補脾肺以滋化源不信仍服
分利之藥而歿

黃芩清肺飲
滋腎丸二方見小便不通
加味逍遙散方見發熱不止
四味肥兒丸方見貼骨癰
豆豉餅方見流注
八味丸方見大便不止
五味異功散方見用敗毒之藥

作渴不止

瘡瘍作渴當分經絡所屬及血氣虛實而治若歛

痛發熱便利調和者邪在膚也用清熱消毒散腫痛發熱大便秘澁者邪在臟也先用瀉黃散如未應用涼膈散煩痛熾盛邪在經絡也用仙方活命飲右關脉洪數有力者胃火消爍津液也用竹葉石膏湯右關脉數無力者胃虛津液短少也用補中益氣湯飲食失度胃氣內傷而亾津液者用錢氏白朮散膿血出多而氣血虛弱者用八珍湯加五味子漂腎不足而津液短少者用加減八味丸其餘當臨症制宜

一小兒右頰患瘡作渴飲冷目黃唇烈此脾胃實熱也用瀉黃散而愈後傷食作渴遍身皆黃少用瀉黃散黃退而渴益甚此熱退而真氣虛也用白朮散而痊

一女子臂癰口乾飲湯小便頻數此脾肺氣虛用四君黃芪乾薑及芫氣湯而愈

一小兒腹癰潰後作渴飲湯此脾胃氣虛用六君黃芪當歸而渴止用異功散而瘥斂

一女子面瘡作渴飲湯面赤此脾氣虛熱也先用

異功散又用益氣湯而愈

一小兒素食膏粱甘吉生瘡作渴飲冷手足常熱此胃經積熱先用竹葉石膏湯二劑又用竹葉黃芪湯二劑漸愈再用白术散去木香而愈又一小兒所患同前先用清胃散再用涼膈散而愈

一小兒患瘰癧面赤作渴余謂肝腎虛熱用加減八味丸補中益氣湯六味地黃丸月餘諸症頓愈

佐以九味蘆薈丸而愈

一小兒口乾作渴發熱泄瀉諸藥不効皆謂不起

右鬪脈弦數按之沉伏尋摘腹中懸伏一塊鷄卵大此肝脾疳也用蟾酥丸二十月而消兼服地黃丸三十月諸症漸退却以白术散而愈

清燥湯治一切瘡瘍癰疽潰後氣血虛怯濕熱乘之遍身酸軟或秋夏濕熱肺金受傷絶寒水生化之源腎無所養小便不調腰腿痠軟口乾作渴體重疼木頭自眩暈飲食少思自汗體倦胸滿氣促氣高而喘身熱而煩

黃芪一錢五分　蒼术一錢　白术　陳皮

瀉瀉各五分　五味子九粒　人參
升麻各五分　麥門冬　當歸身　生地黃
神麴炒　豬苓　酒桂各五分　柴胡
黃連　甘草炙各三分

右姜水煎服濕痰壅盛參芪歸地之類可暫減之

生脉散治金虛等症發熱體倦氣短或汗多作渴或睡卧不寧陽氣下陷發熱煩燥或六七月間濕熱大行火土合病令人脾胃虛弱身重氣短或金爲火制絶寒水化源肢體痿軟脚欹眼昏宜服之

人參五錢　五味子一錢　麥門冬
右水煎服

竹葉黃芪湯治氣血虛胃火盛而作渴者

淡竹葉二錢　黃芪
當歸　川芎
芍藥　人參
右水煎服

生地黃　麥門冬
甘草　黃芩炒
石膏煅各一錢

竹葉石膏湯治胃火盛而作渴者

淡竹葉　石膏 炙　桔梗　木通
薄荷　芔草 各一錢

右薑水煎服

瀉黃散治胃經實熱口瘡口渴飲冷

藿香葉七葉　石膏 煅 五錢　芔草 二錢　防風
山梔仁 炒 各一兩

右爲末每服二錢水煎入蜜少許與兒乳母服之

東垣聖愈湯方見出血不止

五味異功散方見用數毒之藥

補中益氣湯方見肌肉不生

七味白朮散方見發熱不止

清熱消毒散方見熱毒口瘡

仙方活命飲方見熱毒瘡瘍

清胃散方見腹癰

敷寒涼藥

蘆湯敷藥當分陰陽虛實而用內治之法不可與

敷寒涼之藥若腫痛熱渴脉滑數而有力者其症爲純陽宜服濟陰湯外敷抑陽散則熱毒自消瘀滯自散若似腫非腫似痛非痛似寒非寒似潰非潰脉洪數而無力者其症屬半陰半陽宜內服沖和散外敷陰陽散則榮逆自從血鬱自散若微腫微痛色黯堅硬肉色如故又而不潰脉按之沉細舉指虛浮者其症屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散則寒氣自解陽氣自復元陽氣虛寒不能消散腐潰或潰而腫不消口不斂者必內外溫補庶可保全若陰寒之症而用寒涼之藥則腠理迷塞氣血凝滯毒氣益深良肉反死瘡口不斂惡症蜂起不可復救矣蓋胃氣得寒則不能運行瘀血得寒則不能消散死肉得寒則不能腐潰新肉得寒則不能化生治者不可不察也

一小兒兩瘡敷寒涼之藥患處堅實頭面俱腫此脾胃受寒血氣凝滯而不能行耳先用沖和湯陰陽散患處和軟次用托裡散瘡潰而愈

一小兒腹癰敷寒涼之藥腹脹吃逆手足並冷此脾胃復傷而虛寒也用回陽湯抑陰散諸症漸退用托裡散而潰入珍湯而愈

一小兒潰瘍敷寒涼之藥肌肉不生膿水不止余謂脾氣虧損而然用異功散加升麻白芷漸愈又用托裡散而痊

一小兒臂癰敷服皆寒涼之藥更加腫硬余謂當助脾胃以解疑寒乃用益氣湯加茯苓半夏薄桂及如聖餅熨之而愈大凡瘡瘍久而不愈不問已潰未潰皆因陽氣虛不能運行耳用如聖餅或葱熨法爲善

一小兒兩足脛內外赤腫煩連膝上因痘愈之後或謂痘毒欲用寒劑或謂毋毒欲出血余曰非也此足三陽經熟毒壅腫耳況痘愈之後元氣未復設若復刺出血則患處愈傷敷貼涼藥則榮氣愈滯服敗毒之藥則元氣愈虛瘀血愈凝不信竟用前法果兩脛潰而色黯瘡口不斂大便去後如前欲用治痢之藥余曰此因誤用前法元氣復傷而

下陷也非痢非毒遂用補中益氣湯之類而愈
一小兒大腿漫腫不赤服敗毒之藥手足並冷吐瀉不食余曰元氣虛而半陰半陽之症也用陰陽散冲和湯腫起色赤此變純陽之吉症也仍用前藥佐以活命飲而消
一小兒臂瘰而色瘀黃飲食少思脈洪數按之軟弱余謂眞氣虛而邪氣凝滯也用白芷升麻湯以清胃經熱毒用五味異功散以補胃經元氣不信反用寒涼之劑外敷內服腫硬至手肉色如故腹中作痛脈浮大按之沉細此脾胃之氣復傷而變虛寒之症也當祛散寒邪温補脾氣仍不信又與敗毒吃逆不食手足並冷此寒氣逼陽於外無根之火泛行耳果然手足俱青患處皆黑
一小兒足脛腫硬一塊年餘而潰時出清膿其腫益堅肉色青黯發熱煩躁余謂眞氣虛而邪氣實當先調脾胃或以爲熱毒凝滯數寒涼之藥腫硬至膝肉潰腹脹吐瀉而死
托裡冲和湯治瘡瘍屬半陰半陽似潰非潰似腫

非腫因元氣虛弱失於補托所致自製
人參二錢　黃芪二錢　白朮炒　陳皮
當歸各一錢　甘草炒五分
右水煎徐徐服手足冷者加薑桂其熱已退而未消潰用仙方活命飲可內消者再用托裡消毒散可作膿者再用托裡散
陰陽散即太和膏治瘡瘍元氣虛弱似腫非腫似痛不痛似熱不熱屬半陰半陽之症用此以和陰陽內服冲和湯或托裡散以助元氣

赤芍藥炒　白芷　石菖蒲各一兩
獨活炒三兩　紫荊皮炒五分
右爲末用葱酒調服
托裡回陽湯治瘡瘍屬純陰不腫痛不熱赤不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐逆冷陽氣既陷急用之多有生者自製

乾薑　附子重一兩四錢者當歸
陳皮　白朮　黃芪　人參
甘草炒各二錢　柴胡　升麻各三分

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右水煎徐徐服之如不應倍加薑附外傅抑陰
散方名同陽玉龍膏
抑陰散治瘡瘍元氣虛寒不能消散或腹痛泄瀉
嘔止不食手足或冷或不潰斂筋攣骨痛或跌
撲所傷爲敷涼藥及癰腫堅硬肉色不變久而
不潰潰而不斂一切冷症並効
草烏二錢南星一兩煨 肉桂五錢 赤芍藥一兩炒
軍薑一兩炒 白芷一兩
右爲末葱湯調塗或熱酒調塗

七味白朮散方見發熱不止
清熱消毒散方見熱毒口瘡
清胃散方見頭痛
東垣聖愈湯方見出血不止
陰陽散即沖和膏
抑陽散
沖和散
白芷升麻湯
益氣湯五方見肌肉不生

異功散方見敗毒之藥
五味異功散方見敗毒之藥
仙方活命飲
托裡消毒散
托裡散二方見熱毒瘡瘍
補中益氣湯方見肌肉不生
八珍湯方見發熱不止
如聖餅
葱熨法二方見流注

服敗毒藥

小兒瘡瘍多由胎禀遺熱或乳哺積熱或乳母七情致熱經云五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰又云氣主噓之血主濡之治者當察其經絡所因表裡虛實而調和以固其本假如腫痛執渴大便秘結者邪在內也宜疎通之腫痛作痛寒熱頭疼者邪在表也宜發散之腫痛甚者邪在經絡也宜和解之漫腫微痛而不潰者血氣虛弱也宜補托之色黯微痛而不潰或潰而不斂者陽氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

虛寒也宜溫補之即是則五臟自和六腑自調氣血自生瘡毒自解此即敗毒之法也若槩用寒涼之劑復損脾胃則腫者不能消散潰者不能收斂七惡蜂起多致不救矣

一小兒臂癰腫硬色白寒熱倦怠此因血氣虛耳先用五味異功散加木香乾薑諸症漸減去一味又佐以托裡散如聖餅膿潰而愈

一小兒臂癰服敗毒藥腫硬不消汗出不止此脾肺氣虛也用異功散加五味子而汗止佐以葱熨法而膿成用托裡散而癒愈

一小兒腿癰膿水清稀手足時冷余謂脾胃虛寒先用益氣湯加乾薑而手足溫用異功散葱熨法而膿稠用八珍湯附子餅而癒愈

一小兒面生瘡寒熱頭痛服大黃等藥連瀉數度手足並冷瘡黯吃逆余曰此邪在表誤攻其裡下多而亡陰也後果歿

一小兒腿癰服麻黃等藥汗出喘急手足並冷余謂此陰虛誤汗而亡陽也後果歿

五味異功散治漂賦元氣虛弱肌肉消薄榮衛短促而患瘡瘍不能消散或脾肺氣虛不能生肌收口大凡諸症因脾氣虛而不能愈者皆宜服之調補元氣則自愈矣

人參　茯苓
陳皮各等分
右爲末每服二三錢薑棗水煎

托裡散方見熱毒瘡瘍

蔥熨法

如聖餅一方見流注

八珍湯方見發熱不止

十全大補湯方見便癰

補中益氣湯方見肌肉不生

附子餅方見貼骨癰

用刀針法

小兒瘡瘍用針法比之大人尤宜慎重當審經絡表裡之虛實部分肌肉之厚薄而施之夫腫高而軟者發於血脈也腫硬而堅者發於肌肉也肉色

不變者發於骨也瘡未成者解散以消其毒已成者托裡以速其膿膿已成者當驗其生熟淺深而後針之以指輕按便痛者膿淺也重按方痛者膿深也按之不起者膿未成也按之即起者膿已成也若膿初生而即針則泄其氣血而膿反難成若膿已熟而不針則腐潰益深而不能收斂若瘡深而針淺則肉潰不出外血反傷若瘡淺而針深則其膿雖出良肉亦傷蓋瘡瘍之症氣血已傷肌肉已壞當隨決其毒不可拘泥人神部分其膿一名出

諸症自退若膿出反痛或煩躁嘔逆者皆由胃氣虛損急宜托裡調補凡膿已成者宜急刺去以紙撚蘸油紝瘡內以膏藥貼之兒安不必服藥如瘡反覆未痊多是乳母食厚味或七情火動而然當審所因而調治其毋但藥中加漏蘆令母服之乳中藥過兒瘡自愈

一小兒患瘡腫硬或用針出血寒熱嘔吐乃胃氣虛而復傷也用異功散而嘔止用八珍湯而血止用托裡散而瘡愈

一小兒項間患毒膿成未潰欲急刺之不從至膿痛始針出膿用托裡散而安若及時用針不用藥亦可也

一小兒項間患毒膿內潰膿痛此脾肺氣虛而不能外潰也用大補湯四劑針之清膿滴瀝發熱惡寒用獨參湯四劑膿湯泄乃用大補湯托裡散而愈東垣先生云氣血壯實膿自溃出信矣

一小兒臂癰用針過深出血不止惡寒口噤脉微細尚可救乃用獨參湯灌之良久嚥下半晌而甦再劑而能言四劑而膿出又用托裡散異功散而愈

一小兒項瘡膿成不出兩腮皆白余曰此肝膽經之症腮白乃肺經之色金能剋木脾氣不信竟歿

五味異功散方見用敗毒散不止

八珍湯方見發熱不止

托裡散方見瘡瘍熱毒

十全大補湯方見便癰

五善七惡

瘡瘍之症齊氏陳氏有五善七惡之論又云五善見二則瘥七惡見四則危編謂前症各有所屬之經各有所主之方蓋五善屬六腑氣血無虧人能調攝不治自愈七惡乃五臟虧損失於滋補所致非瘡瘍自有也調治失宜必致不起如動息自宰飲食知味乃胃氣平和一善也便利調勻乃腸胃調和二善也膿潰腫消水鮮不臭乃邪氣去而胃氣平復三善也神彩精明語言清亮乃心肺氣血無虧四善也體氣平和脾胃無虧五善也作渴發熱或泄瀉淋閉者屬胃火肉滿一惡也竹葉黃芪湯氣血俱虛八珍加黃芪麥門冬山茱萸末應佐以加減八味丸料潰而腫痛尤甚膿色臭敗者屬胃虛火熾二惡也人參黃芪湯未應十全大補湯加麥門冬五味子目視不正黑睛緊小白睛青赤睛子上視者屬肝腎虛火三惡也六味丸料加山梔麥門冬五味子未應八珍湯加山梔麥門五味喘急氣短恍惚嗜卧者屬脾肺虛火四惡也六君

子加黃芪未應用補中益氣湯加麥門五味若心火刑肺人參平肺散陰火傷肺六味丸料加五味子煎服潰後肩背不便四肢沉重者屬脾胃虧損五惡也補中益氣湯加山茱萸山藥五味子如不應用十全大補湯加山茱萸山藥五味子食不下咽服藥而嘔食不知味者屬胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁未應加附子聲嘶色敗唇鼻青赤面肉浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加黃芪未應加附子若腹痛泄瀉咳逆昏憒者陽氣虛寒之惡症也用托裡溫中湯次以六君子湯加附子黃芪桂若潰後發熱惡寒作渴怔忡驚悸寤寐不寧牙關緊急或頭痛目赤自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脉洪大按之微細厚衣仍寒此氣血虛極傳變之惡症也若手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸鳴飲食不入吃逆嘔吐者此陽氣虛寒之惡症也若無汗惡寒口噤足冷腰背反張頸項強直此血氣虛極傳變之惡症也急用參芪歸朮附子救之夫小兒患之因胃氣虛弱或膿血出多虛邪內

作或乳母朱調血氣不和致見爲患能審其所致之因而主之亦有復生者若更與攻毒乃促其亾也

一小兒臂膊肉腐色紫漸痛作渴右關脉洪數此胃火熾盛之惡症用竹葉黃芪湯而痛止用四君升麻連翹白芷金銀花而愈

一小兒流注吐瀉吃逆腹痛手足並冷余謂陽氣虛寒之惡症用六君子獨參湯益甚遂以人參五錢附子五分連服數劑諸症漸退復用獨參湯日許稍愈後飲食失宜寒熱發搐用五味異功散加升麻柴胡而安又因勞發熱脉大而虛面赤作渴用當歸補血湯十全大補湯而安用八珍湯附子餅而愈

一小兒腹癰潰而腫痛益甚飲食少思此脾胃復傷之惡症先用五味異功散加木香諸症漸愈乃用異功散加當歸黃芪元氣漸復又用八珍湯托裡散而愈次年畢姻後寒熱往來患處作痒用大補湯地黃丸而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒脇腫一塊數寒涼之藥益加腫硬腹中陰冷余謂肌肉受寒而患處腫硬脾氣受寒而腹中陰冷當急温補脾氣不信仍服前藥加腹痛泄瀉手足並冷余曰變陽氣虛寒之惡症用五味異功散加薑桂一劑諸症漸愈乃去三十味服之外用葱熨之法患處微腫色赤此陰氣散而陽氣至遂朝用補中益氣湯夕用異功散而消

一女子股間結一核不作痛不變色服散堅之劑患處腫硬更頭遠吐痰其脉弦數而無力心脾俱虛不信仍用攻伐果吐瀉腹痛發搐吃逆余謂寒脾土虛寒之惡症也先用五味異功散加乾薑肉桂脾氣稍復乃用異功散八珍湯而愈

一小兒腿癱潰後作渴飲湯瀉利無度此脾胃氣虛之惡症也用益氣湯八珍湯而愈後功課用心口乾作渴小便頻數用益氣湯加五味又黃芪六一湯各五十餘劑而痊

一小兒腿癱內潰泄瀉自汗腹痛氣喘余謂脾胃俱虛之惡症用獨參湯喘汗漸止用大補湯諸症

悉退後傷食吐瀉用五味異功散加乾薑而愈次
年畢姻後患腹癰膿清不斂朝寒暮熱用益氣湯
八珍湯各百餘劑而愈
一小兒患瘰癧服追毒之藥更惡寒發熱手足並
冷右寸脉浮按之而虛用益氣湯百餘劑而稍愈
彼欲速効另服石膏之類泄瀉昏憒脉浮大按之
微細乃變陽氣虛冀之惡症也用人參二錢二劑而甦數劑而安更以五味異功散月餘
而愈

一女子十五歲瘰癧發熱脯熱左腮赤甚余謂肝
火血虛用加味逍遥散五味異功散九味蘆薈丸
而痊後服斑猫等藥惡症蜂起手足並冷用參附
湯二劑六君薑附四劑乃朝用益氣湯夕用異功
散而愈
一女子患臁瘡腫痛發熱脉洪大而虛此血虛之
惡症也用當歸補血湯煩熱悉止用補中益氣湯
佐以加味逍遥散及葱熨法而痊
一女子脇間患癰色白漫腫寒熱不潰余謂稟肝

脾虛羸之惡症用補托之藥而愈後因經事過期誤服行血之劑發熱煩躁先用當歸補血湯次用逍遥散八珍湯而愈

一小兒十五歲脇癰膿清晡熱盜汗遺精此元氣虛甚之惡症也用大補湯地黃丸料元氣漸復因犯色慾患處色黯昏憒吃逆手足並冷用獨參湯四劑而甦用大補湯加乾薑六劑陽氣漸復乃去薑又二十餘劑而痊

一小兒十四歲面白多足跟腫硬寸許肉色如常遇勞腫硬宛若一粟口乾而赤余謂稟足二陰經虛症不信外敷內服皆敗毒之劑翻加熟楡煩躁時嗽腹痛渴瀉小便如淋余曰此脾肺氣虛之惡症也不信仍復敗毒更黑睛緊小白睛青赤瞳子上看此肝腎虧損之惡症併矣余欲救其胃氣以滋五臟又爲人所阻用千金消毒散更加喘短氣恍惚余曰惡症並臻其何能爲或問惡症既甚無乃攻毒之晚耶余曰邪正不並立一勝一負理之自然胃氣虛則邪氣實也其失在於不預補正

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

氣邪氣勝則惡症集耳東垣先生云但見腫痛紊之脉症虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉信斯言也

一小兒臀間腫硬肉色如故小便短赤而頻服分利之劑膝脛骨腫余曰腎主骨此熏腎虛所致前藥導損腎陰而骨腫耳當調補脾肺以生腎水其骨自消不信仍用前藥而歿

一小兒腹癰久不斂余欲滋其化源反清熱敗毒惡症蜂起而歿夫肺者腎之母脾者肺之母前症既不滋肺腎以生肝木又用寒涼之藥復傷胃氣以絕肺腎之化源不死鮮矣

一小兒貼骨癰作瀉余欲施調補不信反復分利兩手撮空肝氣敗也泄瀉無度腎氣敗也痰涎上湧脾氣敗也喘嗽不止肺氣敗也額間汗出心氣敗也離不治果歿

一小兒腿癰腫痛自汗盜汗體倦食少余用托裡之藥而膿成欲針之或用大黃之類令膿從大便出致大瀉腹痛余謂脾胃虛脫之惡症急服大補

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之劑不信又服前藥而廢
一女子十五歲外股腫硬連及內股內色不變右
關脉緩弱按之弦數此脾虛而肝乘之氣血虛而
色不變也當補脾土爲主不信另用流氣飲永黃
散泄瀉腹痛瘡口開張而歿
參附湯
人參一兩 附子製 錢一
右薑棗水煎不拘時服
餘方見各症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛　鎧草創
男薛　已編集
後學宋　璞校閱

跌仆外傷

傷損之症若色赤腫痛而血出不止者肝心內熱也用柴胡梔子散色白不痛而血出不止者脾肺氣虛也用補中益氣湯漫腫不消者元氣虛弱也用五味異功散黯腫不散者瘀血凝滯也用加味

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

逍遥散肌肉作痛出血多而煩熱者血脫發躁也用獨參湯因以血而煩躁不安者營衛俱傷也用八珍湯加柴胡牡丹皮又痛不止者欲作膿也用托裡散以指按腫而復起者膿已成也宜刺洩之膿出而反痛者氣血內虛也用十全大補湯若骨骾接而復脫者肝腎虛弱也用地黃丸如兼餘症當參各門治之

一小兒傷臂出血作痛面色青赤此因驚而致肝經火動脾經血傷也用加味逍遥散一劑血止又用異功散加柴胡升麻而愈後因父母責之腹痛作瀉面色純青此因忿怒所致乃肝木乘脾也又用六君加柴胡升麻而愈

一小兒登樓失足墮梯致傷其脇肋外畧青腫內不重傷旬餘其父母始覺恐爲瘀血積內誤用桃仁紅花大黃諸藥而下之去血升餘又於腫處敷貼膏藥以致膏藥貼破皮膚遂成深眼月餘不愈余以爲去血太多大傷元氣用八珍湯四劑而愈處漸愈朝用補中益氣湯夕用五味異功散服及

月餘而始全痊

一女子亦如前症之誤患處日流膿水惟未膏敷貼兩月餘不瘥余先用獨參湯一劑又用補中益氣湯併服異功散而更又以托裡散及間服八珍湯而垂愈後因飲食失宜發熱患處大潰出膿日噤振顫或瘈瘲流涎余謂胃氣虛肝火內動先用獨參湯四劑仍如前朝服補中益氣湯夕服五味異功散加柴胡升麻元氣漸復佐以托裡散而瘡斂

一小兒傷指敷涼藥腫至手背膿出清稀飲食少思此血氣虛弱故也朝用異功散夕用托裡散膿水漸稠患處紅活又用八珍湯而愈

一小兒傷臁青腫不消而色痿黃仍欲行氣破血余謂此因脾氣復傷血滯而不行也不信乃服破血之劑飲食不進寒熱如瘧余朝用補中益氣湯夕用八珍湯及葱熨法而愈

一小兒臂傷潰而寒熱用八珍湯漸愈後因飲食所傷吐瀉不止搖頭咬牙此脾氣虛而肝邪內侮

也用六君升麻柴胡而安又用十全大補湯而愈

一小兒跌傷腹痛作渴偶食生冷腹痛益甚大便不通血將逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此元氣不足瘀血得寒而凝聚也

一小兒墜樓腹停瘀血用大黃等藥其血不下反加脹痛喘急氣短余用肉桂木香末各一錢熱酒調服下黑血及前服之藥而痊

一小兒跌撲傷腿青腫作痛余謂宜速砭去滯血急補元氣不信遂外敷大黃等藥內服流氣飲後湧出穢膿數碗其膿不止復求余治見其腿瘦而脉大作渴發熱辭不治後果歿

一小兒跌撲損傷患處出血不止惟用敷貼不服飲劑飲食少進身體消瘦發熱煩躁余用五味異功散加柴胡升麻當歸而安後手足微搐眉唇微動此血虛而肝火內動也用四君芎歸鈎藤鈎柴胡漸愈却用托裡散八珍湯而全愈血脫發躁若用四物之類復傷脾氣多致不救設誤白虎湯其危尤速

一小兒跌傷臂骨出臼翌日接入腫痛發熱不食用葱熨法其痛即止又用六君黃芪柴胡桔梗湯斷骨碎補而食進腫消又用補中益氣湯加麥門五味數劑熱退而愈

一小兒十五歲傷腿內潰針出穢膿虛症悉具用大補之劑漸愈後因勞動手撒眼閉汗出如雨急炒熱艾頻熨臍腹及氣海穴更用人參四兩炮附子五錢作一劑水煎徐徐灌服良久臂能少動再劑眼開而能言惟氣不接續乃用參芪歸朮四味共八兩附子二錢水煎連進一服氣少復乃滅附子又二劑元氣漸復後用獨參湯多服而痊

一女子閃右臂寅卯時發熱作痛余決其膽經血虛而火盛先以四物合小柴胡湯四劑而熱退更以四物湯加香附陳皮白朮茯苓各一錢山梔五分芩連甘草各二分十餘劑腫消而愈

一小兒閃臂腫痛發熱惡寒飲食少思余謂脾胃氣虛而壅腫也朝用補中益氣湯夕用五味異功散間服八珍湯三五月形氣漸充而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒因跌傷脛漫腫作痛肉色如故服破血流氣之藥反增腹痛以手按之則痛少止余謂此因脾胃虛弱誤服破血流氣之劑而然非瘀血也未幾患處腫消色黯飲食不入腹痛尤甚手足厥冷余用人參一兩附子一錢數劑脾胃漸復飲食漸進患處腫痛肉色變赤蓋始因元氣不足不能運及故腫消而色黯服藥之後元氣漸充故脛腫而色赤也次用大補湯托裡散三月餘而愈

一小兒閃臂腫痛百方不效服流氣飲之類益加腫痛余曰此病俱虛之症也前藥所當深戒者彼謂腫痛爲氣滯不能消散壅遏余言聾牙而前症益甚發熱煩燥始請余治余曰元氣虛憊七惡蜂生雖盧扁亦不能起矣遂歿

一小兒傷臂腫痛內服外敷皆寒涼止痛之藥半載後潰而腫痛余謂此非托裡溫中不能生也不悟確守前藥以致血氣澼盡而亡

一小兒跌腿青腫所服皆行氣破血之藥後骨髓

內潰青腫益深朝冀暮熟余戒之曰此氣血俱虛甚矣非調補脾胃不可不信果殁

一小兒閃腰作痛服流氣等藥外腫不赤余曰此兒雖經閃肭然亦稟賦腎氣不足而使之者延久益虛恐爲不治彼以迂緩視之後果不起

消腫定痛散治跌撲腫痛

無名異炒 大黃炒各五分

右爲末蜜水調塗腫處內有瘀血者砭去數之患處潰者用當歸膏敷之尤効

經驗方治跌撲瘀血不散腫痛不止或筋骨傷損疼痛

黃栢一兩半夏五錢

右各另爲末用薑汁調塗患處以紙貼之如乾再用薑汁潤之日易新藥

神効太乙膏治一切瘡疽潰爛

玄參 白芷 當歸 肉桂

生地黃各一兩

右㕮咀用麻油四十兩入銅鍋內煎至藥黑濾

去查徐入淨黃丹一勺再煎滴水中捻軟硬得
中即成膏矣

廻陽玉龍膏又名抑陰散治跌撲損傷因敷涼藥
或人元氣虛寒腫堅不散潰腐不斂及癰腫肉
色不變或腫而不潰潰而不斂筋攣骨痛一切
冷症方見數寒涼之藥

乳香定痛散治杖瘡金瘡一切瘡瘍潰爛瘀痛方見
作痛不止

猪蹄湯治一切癰疽杖瘡潰爛消腫毒去惡肉潤

瘡口
白芷　黃芩
赤芍藥　露蜂房乳多者佳　生甘草各五錢
當歸　羌活

右用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油查取清湯
入前藥煎數沸溫洗隨用膏藥貼之

跌仆內傷

傷損之症若腹中作痛按之痛甚者瘀血在內也
用加味承氣湯下之下後按之仍痛者瘀血未盡
也用加味四物湯調之按之不痛者血氣傷也用

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

四物加參芪白朮下後發熱胸脇作痛者肝血傷也用四君加川芎當歸下後惡寒者陽氣虛也用四君加炮乾薑下後發熱者陰血傷也用四物加參朮牡丹皮下後寒熱間作者氣血俱傷也用八珍湯加柴胡嗽嘔作痛者胃氣傷也用六君加當歸半夏有因乘怒跳躍而胸腹痛悶喜手按摸者肝火傷脾也用四君加柴胡山梔枳手按摸者肝血內滯也用四物加桃仁紅花胸脇作痛飲食少思者肝脾氣傷也用四君加柴胡丹皮若胸腹脹滿飲食不思者脾肝氣滯也用六君加柴胡枳殼咬牙發搐者肝盛脾虛也用異功散加川芎山梔釣藤鉤天麻若用風藥則陰血益傷肝火益盛或飲糖酒則腎水益虛肝火愈熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血壯實者或成痼疾虛弱者多致不起凡傷損之症有瘀血停滯於內者雖裸體亦以手護腹脇羞畏物觸之而痛也世俗藥以內傷陰虛腹痛不辨虛實專用破血之劑以速其危其得不死者亦幸矣

一小兒跌仆腹痛作嘔惡心氣口脉大此飲食停滯也用保和丸二服吐出酸食惡寒發熱倦怠不食此脾胃傷也先用六君子湯次補中益氣湯間服而愈

一小兒墜樓良久方甦呻吟不絶自以手護其腹此肉傷瘀血停滯也用當歸導赤散一錢熟酒調下而呻吟頓止次用四物加柴胡牡丹皮而安

一小兒跌仆瘀血腹痛用導滯散下之瘀血甚多隨作煩躁面赤作渴欲飲此血脫也用獨參湯而安又用四君當歸黃芪及五味異功散而愈

一小兒因怒跳躍胸脇作痛或以爲肉傷瘀血服大黃之藥純下鮮血其痛益甚按之則痛止此肝脾氣血俱傷也用四君加芎歸四劑而痛止又以異功散加升麻柴胡五劑而飲食進元氣漸復病亦隨愈

一女子因怒搥胸腹痛經行如崩作嘔不食面色青亦兩關脉大而虛此肝經火動脾經血傷也用加味逍遥散二劑血止次用異功散加柴胡升麻

而愈後因復怒腹痛作瀉而青此肝木乘脾也用六君柴胡升麻而痊

一小兒因跌傷臂出血腹痛惡食嘔吐發搐咬牙此因驚駭停食肝火內動而侮於脾也先用保和九二服嘔吐腹痛悉止又用異功散加柴胡山梔發搐咬牙亦愈却用托裡散患處潰而悉痊

一小兒跌仆發搐吞酸腹痛惡心寸口脈大余謂此飲食內傷也不信服當歸導滯散連瀉五次目直咬牙手足厥冷此脾胃之氣復傷而木火內動也用五味異功散加乾薑一劑稍緩又一劑漸愈乃去乾薑加柴胡再服而全愈

一小兒跌仆因服大黃之藥下血發熱腹痛嘔吐按其腹却不痛用五味異功散加當歸升麻一劑腹痛頓止又二劑而血止又二劑而熱止又一劑而元氣復

沒藥丸治打撲傷損作痛等症筋骨疼痛或氣逆血滯肚腹胸脇脹悶

沒藥　乳香

川芎　川椒

芍藥　當歸　紅花　桃仁
血竭各一兩　自然銅四錢火煅醋淬七次
右爲末用黃蠟四兩鎔化入前藥急攪勻丸彈
子大每服一丸酒一鍾煎化服
復原通氣散治打撲傷損作痛及乳癰便毒初起
或氣滯作痛尤効
木香　茴香炒　青皮　川山甲酥炙
陳皮　白芷　甘草　漏蘆
貝母各等分

右爲細末每服一二錢温酒調徐徐服
加味芎藭湯治打撲仆墜筋骨疼痛血瘀皮膚不
破入胃作嘔或爲嘔血
芎藭　當歸
荆芥蕙各二錢
右作一二劑酒水煎服
當歸導滯散治跌撲瘀血在胸腹脹滿或大便
不通作嘔吐血
大黃　當歸各等分
百合水浸半日　白芍藥炒

右爲末每服一二錢温酒調徐徐服

黑丸子 一名和血治跌撲仆墜筋骨疼痛瘀血不定痛丸

散壅腫作痛或風寒所傷肢體疼痛若流注鶴膝風初起服之自消如潰而膿清發熱者與補氣血之藥自斂方見流注

舌斷唇傷

凡舌斷者須乘熱接上急用雞子輕擊周圍去硬殼取膜套舌上以洪寶丹敷膜上自然接續若良久舌已冷不必用接但以洪寶丹敷之其舌自生所斷唇舌雞子膜舍護恐風寒傷之外症若寒熱作痛用四物加柴胡惡寒少食用托裡散加參芪若煩渴發熱用當歸補血湯加不作痛但用四君之類以健脾則肌肉自生旬餘可愈不宜用辛熱之劑恐助火而益其痛也

一小兒舌斷半寸許敷洪寶丹服四物加柴胡痛定血止次服四君加柴胡山梔月餘而舌自完

一小兒十四歲疫病愈後嚙舌出血先君謂腎虛

則嚙舌用地黃丸而愈後吐血咳血發熱痰盛仍用前丸而瘥

一小兒唇傷出血不止以藥止之唇面腫大揭去其藥出血甚多腫亦頓消用托裡之劑及當歸膏患處潰而愈

一小兒唇傷腫痛發熱服清熱止痛之劑連瀉二十次眉目搐動服祛風等藥手指俱冷手足搐動余謂脾土被肝木所侮用異功散加升麻柴胡半夏手温而搐止仍用前藥佐以托裡散而愈

一小兒跌傷唇口發搐咬牙驚哭腹痛此出血過多用火內動所致也用四物加柴胡山梔而安但煩痛至面此患處欲作膿耳用托裡散四劑頭目腫痛其脉滑數此膿已成氣虛而不能潰出也又用托裡散二劑膿出腫消若初傷時不遽用收斂瘡口之藥則無此患也

一小兒傷唇出血發搐目直用柴胡梔子散一劑其搐稍定但傷處煩痛外傅洪寶丹內服逍遥散而愈

一小兒跌傷面腫連唇頰出血煩痛發熱以花蕊石散敷之血止痛定次用當歸補血湯而發熱頓止又用加味逍遥散入珍湯而潰托裡散而斂洪寶丹 一名濟陰丹 治傷損煩痛并接斷

天花粉三兩 薑黃 白芷 赤石脂各兩

右爲末茶湯調搽患處

一方用亂髮燒灰敷舌上接之又治撲落耳鼻乘熱蘸塗之接上即愈亦須口含以防其冷

當歸補血湯治杖瘡全瘡血氣損傷或妄服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無經曰脉虛血虛脉實血實蓋血虛發熱是也証似白虎湯惟脉不長實爲辨耳若誤服白虎湯必死此病多得於饑飽勞役者方見發熱不止

四物湯治一切血虛發熱或因失血太多或刼伐太過或潰後發熱煩躁不安並宜服之方見腋癰

柴胡梔子散方見胸癰

花蕊石散方見後

八珍湯

加味逍遥散 二方見發熱不止

托裏散 方見熱毒瘡瘍

腦骨傷損

腦骨傷損者用輕手摶令端正剪去其髮若皮不破敷黑龍散或葱熨法皮破則塡乳石散以絹帛包之不可見風着水更用葱杵爛炒熱頻罨患處爲佳

一小兒傷腦出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕殊類風症欲作風治余曰無風可祛無汗可發法當峻補其血遂用聖愈湯一劑而安又用養血之劑而愈

一小兒傷腦腫痛出血外敷花蘤石散內服八珍湯而安後揭瘡痂出血碗許手足發搐寒熱痰盛此血虛兼驚肝火內動而生風也令服地黃丸及加味逍遥散而愈

一小兒傷脛骨出血腫痛惡寒少食睡中發搐先用異功散飲食漸進又用逍遥散發搐頓止再用

歸脾湯母子並服而愈

一小兒被傷手足發搐頓悶咬牙飲食不思此肝經血虛火動生風脾土受侮而然耳用地黃丸異功散諸症漸退用八珍湯托裏散瘡漸愈

一小兒被傷面青懶食時作腹痛以手按腹却不痛余以爲脾氣內傷而然不信妄服攻血之藥果吐瀉作嘔手足並冷余先用六君加柴胡升麻生薑又用托裡散異功散而愈

一小兒腦側近耳被傷寒熱作痛潰後不欽恪服止痛清熱之劑余曰寒熱作痛因肝經氣血虛也潰而不生肌肉脾經氣血虛遂用地黃丸異功散加歸芪諸症漸愈又用托裡散而愈

謙甫花蕊石散治一切金刃箭鏃打撲傷損或跌者急搽傷處其血如入臟一便不通用童便和末煎入酒少許調服立効若腹破腸出急宜內入以桑白皮爲線縫合摻圓瘡上如瘡乾以津潤之

硫黃 明淨者四兩 花蕊石一斛

右爲末拌勻入瓦罐內用紙筋和泥固濟候泥乾漸添火煅至通紅經宿取出細研滋器盛用

加味逍遥散治傷損血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利方見發熱不止

聖愈湯治杖瘡金瘡癰疽出血多熱躁不安或晡熱作渴等症方見出血不止

十全大補湯治杖瘡瘡已出氣血俱虛腫痛不消或腐而不潰潰而不斂或惡寒發熱自汗盜汗飲食少思肢體倦怠若怯弱之人患處青腫肌肉不壞者服之自愈若有瘀血砭刺去者服之自消或潰而膿水清稀肌肉不生或口乾作渴而欲飲湯或砭後發熱惡寒頭痛目暈口乾作渴有似中風之症皆屬氣血虛也並宜服之

即四君四物
加肉桂黃芪

八珍湯一名八物湯治傷損等症失血過多或誤服尅伐之劑血氣耗損惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍

因氣虛腫痛不消不能潰斂或潰瘍惡寒發熱膿水清稀久而不愈 即四君四物

黑龍散治跌撲傷損筋骨碎斷先端正其骨以紙薄貼若骨折更以薄木片疎排夾貼却將小繩緊縛三日再用前法勿去夾板恐搖動患處至骨緊牢方不用板若被刀箭蟲傷成瘡並用薑汁和木調貼如口破以玉珍散填塗

川山甲 六兩炒黃 或煉存性
枇杷葉 去毛入半兩一云山枇杷根

右爲末薑汁水調或研地黃汁調亦好

地黃丸 方見作渴不止

腹破腸出

腹破腸出者急復納入以麻縷縫合外敷花蘸石散如脂已出急以手取去而縫之如已出而復推入則內潰害命矣若腸出乾燥者煮大麥粥取汁洗濕推入不時少以米粥研爛飲之二十日外始可薄粥百日後乃瘥切勿令驚驚則殺人矣 用桑皮線

一小兒持碗跌仆腹破腸出即納入以麻線縫完

敷花蓝石散而愈
一小兒持刀而戲仆地刀入腹腸屎並出不救（因破故不救也）
一小兒傷腹發熱作嘔煩痛外敷內服皆止痛清熱之劑日晡益甚余謂脾經氣血益虛朝用補中益氣湯夕用四物參芪歸朮諸症漸愈乃用托裏散瘡口自飲
一小兒脇傷成瘡膿清不飲寒熱發渴余朝用補中益氣湯培益脾氣夕用六味地黃丸滋補肝血漸愈却用托裡散異功散而肌肉自生
一小兒傷腹血出發熱煩燥先用當歸補血湯而安却用聖愈湯思慮頓愈又用托裡散八珍湯而全愈
花蓝石散方見前
益氣湯方見肌肉不生
托裏散方見熱毒瘡瘍
地黃丸方見作渴不止
當歸補血湯方見發熱不止

聖愈湯 方見出血不止

陰囊被傷

陰囊皮破出血作痛者敷當歸膏初傷出血不可驟止之血瘀於內則作膿或傷白原小血出不盡而內潰甚至睾丸露出或陰囊盡潰者內服托裏之劑外敷當歸膏則囊自生其外傷腐潰及內傷瘀血作膿者皆同囊癰治之惟睾丸碎者不治

一小兒傷陰莖出血作痛寒熱發搐咬牙頓悶唇口牽動手足時冷欲用破傷風藥余謂出血諸症

用經主之唇動諸症肝木侮脾土也遂用異功散加升麻柴胡天麻治之頓愈

一小兒陰囊被傷腫痛不愈朝寒暮熱飲食少思余謂脾胃復傷之症當用參朮歸芪等藥治之不信別用清熱之藥果作瀉欲嘔手足並冷余先用六君加柴胡升麻而漸愈又用異功散加柴胡升麻而全愈

一小兒持碗仆地誤傷陰囊睾丸露出血出不止寒熱時搐此肝經血虛而火動耳隨敷當歸膏服

柴胡清肝散加熟地黃芪及六味丸而愈

一小兒被竹篾傷破陰囊出血甚多腹痛發搐咬牙流涎七日矣氣口脈大於人迎二十倍此因驚停食也切忌風藥余用五味異功散加柴胡鉤藤鉤而安凡傷損之症小兒患之多有夾驚夾食者夾食則氣口脈大於人迎或作嘔吐吞酸腹痛瀉賤等症夾驚則左關弦洪而軟或作頓悶咬牙目直項急等症日久不治若成破傷風疾則禍在反掌之間矣

一小兒陰莖被傷斷而皮相連寒熱作痛血出不止余謂急當縫剪去調補肝腎一經則熱自安痛自止矣遂用補中益氣湯加麥門五味子而愈

一小兒因跌小腹皮破服破血之劑陰囊脹腫作痛發熱按其腹却不痛余謂當用補血之藥不信遂致不起

補中益氣湯　治跌撲等症傷損元氣或過用耗伐惡寒發熱肢體倦怠或潰後血氣虛弱不能生肌收斂或兼飲食勞役頭痛身熱煩躁作渴

脉洪大弦虛或微細濡弱自汗飲食少思尤瘧
瘍虛損之聖藥也方見肌肉不生
柴胡清肝散方見脇癰
地黃丸方見作渴不止

金木所傷

傷損之症皆肝經主之若青腫不痛或腫不消者
氣血虛弱也用十全大補湯血出腫痛或作寒熱
者血傷而肝火內動也用四物柴胡山梔血出不
止或發寒熱者氣虛而肝火內動也用四君芎歸

柴胡寒熱而內痛益甚者此欲潰膿也用參芪內
補散若膿出而反痛者氣血虛也用八珍湯瘡口
赤而肉突者血虛而肝火生風也用柴胡梔子散
若膿出不止瘡口白而肉突者氣虛而寒邪外凝
也用補中益氣湯若膿潰而仍痛或潰而不斂皆
脾胃虛弱也用六君子湯若不固元氣或敷服寒
涼則肉黯不潰或潰而不斂多成敗症矣可不戒
哉

一小兒傷手腫不消日出膿水少許飲食不思發

熱惡寒面色痿黃此脾胃氣虛也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加升麻月餘漸愈因飲食停滯服尅伐之劑患處漫腫更作嘔惡寒余謂脾胃復傷用六君子湯加升麻柴胡治之而愈

一女子因怒仆復傷患處出血經行不止臂亦青赤右關脈弦數此肝脾二經火動不能統攝其血也先用小柴胡湯二劑又用加味逍遥散一劑血止而安

一小兒傷肉腠成瘡色黯久而不愈此肝脾氣血虛也先用補中益氣湯後用入珍湯加柴胡升麻漸愈再用地黃丸而全愈

一小兒傷臂成瘡久而不愈寒熱作渴瘡口青白不合膿水時流先用參芪歸朮寒熱漸愈又用托裏散患處色和再用十全大補湯而愈

一小兒傷足成瘡外傳寒涼藥內服敗毒散久不潰腐余謂至陰之處血氣罕到又服尅伐之劑所以難腐也雖腐而不能斂也遂用托裏散加肉桂數劑稍知痛而色漸赤減桂又數劑而潰因飲食

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

過多連瀉一十日乃用五味異功散加升麻柴胡而瀉止仍用托裏散而愈

一女子十五歲傷手成瘡日出清膿少許日晡發熱此元氣虛也先用五味異功散加當歸升麻月餘元氣漸復乃用加味逍遙散及八珍湯異功散而愈

一女子十四歲修指甲誤傷膿痛妳傅寒涼及服敗毒之藥遂腫至手背肉色不變余先用內消托裏散手背漸消次以托裏散為主八珍湯為佐服

兩月餘而愈其時有同患誤傷成瘡不固元氣專攻其傷者俱至不起

沒藥降聖丹治傷損筋骨疼痛或不能屈伸及外邪內傷筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急身體倦怠四肢無力

沒藥另研　當歸酒洗炒　白芍藥　骨碎補搽去毛　生地黃　川烏去皮臍　川芎各半兩　自然銅火煅醋淬十二次研末水飛淨一兩

右為細末以生薑自然汁與煉蜜和丸每一一兩

作十丸每服一丸搥碎用水酒各半鍾入蘇木
少許煎至八分去蘇木空心服
萬金膏治傷損筋骨疼痛

龍骨　鰲甲　炙　苦參　烏賊魚骨
黃柏　黃芩　黃連　猪牙皂角
白芨　白斂　厚朴　木鱉子仁
草烏　川芎　白芷　沒藥　另研
乳香　另研　當歸各半　清油四斤　槐枝
柳枝　各四寸長二十一條　黃丹一斤半炒過淨

右除乳沒黃丹外將諸藥於油內慢火煎黑色
去查每油一斤入丹半斤不住手攪令黑色滴
水中不粘手乃下乳沒再攪如硬入油些少以
不粘手爲度
接骨散治骨折碎或骨出皮肉先整端正却服此藥
飛禽六畜所傷亦能治之

當歸各一錢　鵬砂一錢五分　水粉

右爲末每服一錢前蘇木湯調服後但飲蘇木
湯立効

又方皮破筋斷以膠香塗之或以金沸草汁頻塗自然相續

生葱切斷一方生薑 荆芥 土當歸

右煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

潔古沒藥散止血住痛

定粉一兩 風化灰一兩 枯白礬三錢 另研

乳香五分 另研 沒藥一字 另研

右爲末揉之

塞上治撲損瘀血在內煩悶以熟酒調服蒲黃二

錢

勝金丹治肌膚傷損青腫用茄子通黃極大者切

如指厚新瓦上焙乾爲末臨臥酒調服二錢二

夜消盡無痕跡也

肘後治骨節傷損瘀血不出生鐵一斤酒三升煎

取二升飲之若肝經實熱血瘀則肝木自甚或

兼口眼牽掣手足抽搐者宜用生鐵落其金氣

制之若血虛肝燥生風宜用四物柴胡鉤藤鉤

補而清之若肝氣木虛金來尅木宜用瀉白散

以清肺六味丸以補肝若腎虛不能生肝亦用六味丸以滋腎水生肝木不可槩用

本事內消散治打撲傷損及一切癰腫未破

生地黃研如泥

右以地黃膏隨腫大小攤紙上摻木香一層又依前攤地黃貼腫上二十五度即愈

治金瘡出血不止以五倍子爲末乾貼即止神効

又方用石灰韭菜石榴寄奴五倍之類乃澁滯收斂止血之劑氣血未耗內無火者用亦有効若血虛內熱宜犀角地黃湯之類凡金瘡出血不止素怯弱者當補氣素有熱者當清血有怒氣者當平肝煩熱作渴昏憒不忘等者當補脾氣筋攣搐搦者當養肝血不應用地黃丸以滋腎水自愈

治針入肉不出用臘蠟酤搥爛塗上或硫黃爲末以紙覆之覺痒時其針即出用雙杏仁搗爛以車脂調敷以紙貼之二十五枚炙焦爲末醋調塗之或用白梅入水研

爛調象牙末傅之或以象牙和數之其針皆即出

治魚刺入肉曬誤茱萸封之自爛出

卅溪治破傷風血凝心針入肉游走二十症用生寒水石爲末調塗之其瘡立止

補中益氣湯治跌撲等症損傷元氣或過用尅伐惡寒發熱肢體倦怠或潰後血氣虛弱不能生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細濡弱自汗飲食少思瘡瘍氣血損之聖藥也方見肌肉不生

神應葱熨法治跌撲傷損腫痛用葱頭細切杵爛炒熱敷患處如冷易之再熨腫痛即止其効如神

二味參蘇飲治出血過多瘀血入肺面黑喘促

人參一兩 蘇木二兩

右每服五錢水煎服

桃仁承氣湯加當歸即承氣湯治傷損血滯作痛或發熱發狂等症

桃仁 研 苡硝

右作二劑水煎更量虛實用之

復元活血湯治從高墜下惡血流於脇肋疼痛不可

柴胡五錢當歸三錢甘草二錢川山甲

大黃酒浸一兩桃仁去皮尖五十箇研爛 紅花一錢

瓜蔞仁二錢

右每服二三錢水酒煎五分熱服以利爲度利後痛或不止服乳香神應散

消毒定痛散治跌撲腫痛

無名異炒 木耳炒 大黃炒各五分

右爲末蜜水調塗如肉有瘀血砭去敷之膿處更用當歸膏敷之尤好

藥蛆方治傷損成瘡潰爛生蛆用皂礬煆過爲末乾摻其內蛆即死

參芪內補散

人參 黃芪 當歸 白朮各一錢

白芷 防風各四分 川芎六分 肉桂

甘草炒各五分

右水煎作二三服

八珍湯 方見發熱不止

十全大補湯 方見便癰

葱熨法 方見流注

四物湯 方見腋癰

六君子湯

四君子湯 二方見腹癰

柴胡梔子散

小柴胡湯 二方見脇癰

逍遥散 方見發熱不止

地黄丸 方見作渴不止

托裏散 方見熱毒瘡瘍

五味異功散 方見用敗毒之藥

漆瘡

夫漆屬木木生火而能尅土惟脾虛之人多染之若遍身浮腫或嘔吐者用小柴胡湯加白术陳皮茯苓若遍身或面目作痒者用前胡湯加連翹山

梔若膿水淋漓或痒或痛者用柴胡山梔散若嘔吐不食或泄瀉腹滿者用四君升麻其外治之法當用鐵秀末調搽或蟹黃塗之或用蔴油或浸芒硝淋瘍患處或礬石末紫蘇末擦之或人乳汁潤之或無名異末水調敷或用好花椒煎湯洗之或生薑汁敷之或乾荷葉濃煎湯洗之並效

風犬傷 附蛇蟲痛傷

卉溪衍義云犬屬陽其性熱大抵熱極生風風熱相搏則爲顛狂驚駭之狀此物理之自然者今人治風犬咬傷反以巴豆斑猫等燥熱之劑瀉毒從小便出如犬之形狀殊不知以熱濟熱血被傷而然非犬之毒也切宜慎之余見吳中凡被犬傷或出血發熱者輒服斑猫巴豆等藥或至發搐咬牙即以爲毒甚服之益堅遂致殞喪殊不知凡被傷受驚爲之症皆肝經所主肝屬木木生火火生風故發搐咬牙之疾被犬驚傷所致爲多不必風犬爲然也若爲風邪所襲牙關緊急腰背反張宜用定風散童便調服更以漱口水洗淨傷處搽之若出

血不止用燈草貼之其有他症從破傷風法治毋
溪之戒不可不知若貞爲猘犬所傷則斑猫巴豆並
之藥亦當暫用蓋以毒攻毒理勢自然毒既內中
非此不去但病去即止便與調補可保無虞不宜
確服耳大凡猘犬之狀必吐舌流涎尾垂眼赤誠
爲易辨其被傷病甚之時必作太吠亦自不同不
可一槩施治也

一小兒犬咬出血抽搐痙瘛盛敷玉珍散服抱龍丸
而愈

一小兒素性弱犬咬出血惡寒發熱過服斑猫之
藥殊類被傷風與玉珍散敷之服半全大補湯倍
加鉤藤鉤而愈

一小兒被犬傷面青發搐咬牙此因驚所致或謂
風犬致傷用斑猫等藥而殺

一小兒犬傷不關緊急兼熱發搐余以爲急驚風
不信乃服斑猫等藥而殺

一方治風犬咬用斑猫七箇去頭翅足將糯米一
撮同炒米黃色爲度爲末空心用水調服

又法用朱砂雄黃各五錢爲末空心香菜油調下玉珍散一名奪命散治傷損傷風頭疼角弓反張天南星炮　防風去蘆梗各等分

右爲末凡破傷風病用藥傅貼瘡口即以溫酒調下一錢服之如牙關緊急童便調服一二錢吞咽不得用生薑自然汁灌之或用大蒜切片置瘡處以艾壯灸之毒氣頓解痛即止

又方用白礬於燈上燒汁滴於瘡處或用貝母末酒調服之神效或用南星末醋調上搽之或黃蠟燒滴患處亦妙

治蛇入人竅用艾灸蛇尾即出又法以刀破蛇尾少許入花椒自出即用雄黃朱砂爲末煎人參湯調灌之內毒即解用白芷末或貝母末酒服尤効

治蛇纏人身不解以熱湯淋之或就以身臥倒滾轉亦可解

治蛇骨刺入毒氣作痛燒鼠屎爲末敷之或食熱

酒大蒜亦効

治蜈蚣入咽中被咬未死殺鷄血灌之更灌以香油採吐血蟲並出

治誤吞水蛭用田中乾泥一塊小死魚三十四箇去頭骨和巴豆十粒去殼研爛入泥爲丸菜豆大用田中冷水吞下十丸小兒三五丸須臾瀉出

邪以四物湯加黃芪煎服以生血氣自愈

治蠷螋尿蛞人生瘡如粟粒四圍赤中有白汁令人惡寒壯熱匝身即磨屋角汁塗之或燕窠中土猪脂苦酒數合和之立効鹽湯浸洗亦可

治蜘蛛咬一身生瀕羊乳一味飲之

治蚯蚓咬人甚者如大風狀眉髮脫落夜聞蚯蚓之聲鳴於身濃煎鹽湯浸洗即安

治螻蛄咬用石灰醋和塗之

治毒蟻螫人用雄黃一錢麝香五分研細生麻油調塗之

治蚖蟲刺人用豬牙中垢塗痛處

治蝎蜥蠍入用青麻心以手按解取汁塗之
治諸蟲入耳用猪肉多次香置耳邊蟲聞香即出如
蟲从在耳中用細蘆筒或鵝翎管令人吸出之

瘡瘍發瘧

瘡瘍發瘧因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其症牙關緊急四肢勁強腰背反張肢體抽搐有汗不惡寒者名曰柔痙風傷衛故有汗也無汗而惡寒者名曰剛痙寒傷榮故無汗也皆因亡血過多筋無所養傷寒汗下過多及潰瘍產後者多患之此乃敗症也若大補氣血多有復生如作風治速其危矣況在嬰兒難元調理宜察其稟賦及乳母所致者而治之

一小兒瘡潰後患此形氣殊倦用十全大補湯二劑稍緩佐以補中益氣湯數劑而痊

一小兒患瘧癘變痙面青或赤此脾經血虛而有熱也用八珍湯加柴胡牡丹皮煎汗漸止又用十全大補湯寒熱漸止又用托裏散附子餅而愈後傷食服藥仍發痙手足如氷余用人參理中

九五味異功散而愈

一小兒感胃發散變痙汗出不止手足並冷用補中益氣湯加肉桂四劑而愈

一小兒金瘡腳向出血過多口噤目直此出血過多肝火內動而變症用四物參朮鈎藤鈎四劑其勢稍定又用五味異功散加當歸柴胡變症悉愈又用托裡散八珍湯患處潰而痊

一小兒傷手出血煩躁口噤昏憒氣息奄奄先用東垣聖愈湯而安又用托裡散而潰佐以八珍湯而斂

一女子十五歲傷手指出血口噤如痙脉浮數肝脾爲甚先用加味歸脾湯四劑稍緩又數劑漸甦却佐以加味逍遥散月餘而甦却用歸脾湯爲主八珍湯爲佐而愈此等症候用祛風化痰之藥而致者不可枚舉

十全大補湯方見便癰

補中益氣湯方見肌肉不生

人參理中湯

五味異功散 方見用敗毒之藥
附子餅 方見貼骨癰
托裡散 方見熱毒瘡癰
歸脾湯 方見腸癰
八珍湯
加味逍遥散二方見發熱不止

破傷風

潔古云風症者善行而數變入臟甚速然生反掌之間耳急宜分表裡虛實而治之邪在表者宜羌活防風湯半表半裡者頭有汗而身無汗宜羌活防風湯傳入者甚則舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎湧盛胸腹滿悶或便溺赤閉時或汗出其脉洪數而弦者宜大芎黃湯然其汗初出者由風熱鬱甚於裡故表熱稍解腠理疎而汗出也宜除熱散結若熱已退臟腑已和而汗仍出者表虛也以白術防風湯實其表平關緊急者須撬開口灌之更不時灌以粥飲然小兒患之多因夾驚肝火內熱生風所致夫肝主五色屬木生風察其面色入肝

爲青入心爲赤入脾爲黃入肺爲白入腎爲黑肝經者用柴胡清肝散心經者用梔子清肝散加黃連腎經者用地黃丸加柴胡脾經者用六君加柴胡山梔爲主而佐以引之補脾胃之藥爲善

一小兒十四歲患瘰癧因勞心功課頭痛發熱自以爲傷風用薑葱發汗忽腰背反張口噤不語脈浮大按之如無此氣血虛極而變痙非破傷風也灌十全大補湯一劑頁久方甦又數劑而愈後又勞復厥冷汗出如注頁久不省用前湯加附子五分一劑而甦乃去附子服至三十餘劑而愈

一小兒患流注肉色痿黃忽舌強口噤脉洪大而虛按之如無此脾肺氣虛而變症也先用補中益氣湯四劑稍緩又用十全大補湯數劑而痊

一小兒聲癉久不收斂因驚發搐口噤用托裡散內參木各用二十錢柴胡五分鈎藤鈎一錢五分四劑而安後停食驚駭目直發搐口噤流涎手指遍冷用五味異功散此肝木旺脾土受侮飲食內作而然用五味異功散加鈎藤鈎木香乾葛而甦

一小兒潰瘍變痙如前而色青赤此心肝二十經血虛而有熱也先用八珍湯加柴胡牡丹皮稍定又用加味逍遥散加五味子漸愈又用八珍湯而安

一小兒潰瘍忽汗出不止手足並冷先用補中益氣湯加肉桂五味子數劑諸症漸愈又因飲食過多口噤作嘔用異功散加升麻四劑而安

一小兒十六歲癱瘓久不飲因過勞口噤目直脉洪數左關脉弦而無力余謂肝經氣血虛而火內動也用地黃丸料四劑而安却用補中益氣湯以補脾肺用地黃丸以補腎并爲主佐以九味檀香丸以治肝痃而癱瘓愈

一小兒十六歲流注久不愈因勞兼怒忽仆地昏憒殊類破傷風而色皎白無氣以動用補中益氣湯內用人參五錢加肉桂一錢不應加乾薑一錢又不應此陽氣虛甚藥力不能勝之也急加附子一錢稍定乃去附子服十餘劑而元氣漸復却佐以八珍湯豆豉餅半載而痊異姻後因入試場勞傷元氣前症復發亦類破傷風脉浮大按之如無

用參附湯四劑而甦八珍湯地黃丸料各百餘劑而痊

羌活防風湯治被傷風初病邪在表者急服此藥以解之

羌活　防風　蔓本　當歸　細辛各二兩　芎藭　甘草各一兩　川芎　芍藥各四兩　地榆

右每服五錢水煎熱服

防風湯治被傷風表症未傳入裏急服此

防風　羌活　獨活　川芎各等分

右每服五錢水煎調下

醁蚘散

蝡蚘一對　鱔三錢

右爲末用防風湯調下

羌活湯治被傷風半表半裡者急宜服此

羌活　菊花　麻黃　川芎　石膏煅　防風　前胡　黃芩　細辛　甘草　枳殼　白茯苓

蔓荊子 各一兩　薄荷　白芷 各五分

右每服五錢生薑水煎日二十三服

地榆防風散治被傷風在半表半裡頭微汗身無汗不可發汗表裡兼治

地榆　防風

右爲末每服二錢溫米湯調服

大芍黃湯治被傷風在內急宜服此湯疎導之

川芎　羌活　地丁草　馬齒莧 各等分

右每服五錢水煎溫服以臟腑通和爲度

黃芩　大黃 各一兩

白朮防風湯治表藥過多有自汗者

白朮　黃芪 各一兩　防風一兩

右每服五七錢水煎溫服無時臟腑和而自汗者可服此藥若臟腑秘小便赤自汗者宜速下之用大芍黃湯

白朮湯治被傷風汗不止筋攣搐搦

白朮　葛根 各一兩　芍藥　甘草二錢五分　升麻　黃芩

右每服五錢水煎服無時

玉真散治破傷風方見風犬傷

白丸子治一切風痰壅盛手足頑麻或牙關緊急口眼歪斜半身不遂等症

半夏七兩生用　川烏去皮臍生用兩

右爲末用生薑汁調糊丸桐子大每服一二十丸用淡薑湯下

柴胡清肝散治肝膽三焦風熱怒火以致項胸作痛頭目不清或耳前後腫痛寒熱體疼

柴胡　黃芩炒五分　人參　山梔炒　川芎各一錢　連翹　桔梗各八分　甘草五分

右水煎服

蔥子清肝散治三焦及肝膽經風熱耳內作痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡　山梔炒　牡丹皮各一錢　茯苓　川芎　當歸　芍藥　甘草　白朮各五分

右水煎服

地黃丸方見作渴不止

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六君子湯
除熱散
十全大補湯三方見便癢
補中益氣湯
托裡散
五味異功散三方見敗毒之藥
八珍湯
加味逍遥散二方見發熱不正

瘈瘲

瘈者筋脉急而縮也瘲者筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與發搐相似者此症多屬風蓋風主搖動心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相煽則爲瘈瘲也

一女子停食服消導之劑傷脾而患此告於余余曰經云脾之榮在唇口又云脾主四肢又云脾主五日經云脾之榮在唇口又云脾主四肢又云脾主五涎此因前藥妄下胃氣復傷肝木侮土以致前症也當先救胃氣以養五臟因衆議不一尚未用藥翌早果咬牙呵欠困卧驚悸硬氣短氣面色晄白

始信余言遂先用五味異功散次用補中益氣湯而愈

一女子瘰癧將愈因勤於女工忽作瘓瘫此胃氣未實而勞傷筋脉耳用補中益氣湯及五味異功散俱加釣藤鈎而愈後勞役怒氣經行顫振用加味逍遥散及補中益氣湯俱加釣藤鈎而愈

一小兒仆傷潰後患前症面青或赤服風痰之藥咬牙目直仍欲治風余曰凡傷損之症皆肝主之故面色青而瘛瘲咬牙目直皆屬肝經血氣虧損風木翕合火動而生風也無風可祛無痰可逐遂用地黄丸及補中益氣湯服大黄等藥愚前症或時一小兒跌傷膝出血誤服煩躁自汗手欲撮空此因肝經血虚肝火熾盛耳用地黄丸補中益氣湯而愈方見前各症

顫振

顫振與瘓瘫相類瘓瘫則手足内引或伸或屈顫振則但顫動而不伸屈也内經云因胃氣不實諸脉空虚行陰用不復因其所在補内外間然小兒

瘡瘍潰腐或損傷膿血出多屬脾胃氣虛血弱用
補中益氣湯五味異功散加白术當歸升麻主之
肝經虛熱用六味丸脾血虛弱用四君子加芎歸
胃氣虛弱用補中益氣湯

一小兒腰癰內潰出膿碗許即時顫振面白汗出
此陽氣虛脫非大補不可也遂用人參黃芪當歸
白术四劑而盜汗顫振漸止又以十全大補湯數
劑而癒亦全愈

一小兒患流注嗽痰氣促其父自恃知醫而作治

理氣等劑半載而潰用托裡散等劑膿水淋漓腫
痛不消寒熱往來飲食少思肌肉消瘦大便不實
手足時冷而顫振兩脉浮大按之微細余曰此屬
命門火衰當用八味地黃丸不信乃服參芪歸朮
之類更加痰喘泄瀉余以八味丸補中益氣湯二十
方間服年餘而痊

一小兒年十二歲患寒癰腫硬不潰脉弱時欲作嘔
有欲飲服敗毒等藥余謂腫硬不潰乃陽氣虛弱
嘔吐而不思飲食患此者乃因胃氣虛寒以致若

此法當温補脾胃大抵腫赤痛甚煩燥脉實作嘔爲有餘當下之腫硬不潰脉弱作嘔爲不足法當補之若痛傷胃氣或感寒邪穢氣而作嘔者雖腫瘍猶當助胃壯氣彼不信余之言仍服攻伐之劑後而果歿

一小兒御女甚蚤素有陰虛背忽患疽用參芪大補而不斂内熱發熱舌燥唇裂小便頻數口乾飲湯嘔吐瀉利耳閉目盲仰首眩暈顫振脉浮大而數余曰瘡口不斂脾土敗也舌燥唇裂腎水枯也小便頻數飲湯嘔吐瀉利真火衰敗也耳閉目盲肝木枯也仰首眩暈顫振腎氣已絶也余辭不治後果歿

一女子患瘰癧素性縱食生冷之物者且善怒經水非過期則不及而至肢體發熱倦怠飲食少思而顫振不時余以爲脾氣不足肝經血少之故火盛而致此也余遂用以補中益氣湯加鈎藤鈎炒山梔又用加味逍遥散加鈎藤鈎而愈又因飲食

停滯吐瀉酸臭更加發搐用五味異功散加鉤藤鉤而愈

一女子患流注發熱而顴此肝脾氣血不足經水過期虛火生風之症也先用補中益氣湯加鉤藤鉤漸愈又用加味地黃丸而全愈

一女子不得繼母之心久而鬱怒遂患顴赤發熱先用加味小柴胡湯次用加味歸脾湯及加味逍遥散前後間服而寒熱尋愈但面色時青又用地黃丸逍遥散而安

一女子腹癱患此手足或急或縱先用四物加柴胡山梔丹皮鉤藤鉤以養血清肝火又用地黃丸以滋腎生肝血而愈方見前各症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古吳薛 鎧草創
男薛 已編集
後學宋 璞校閱

痘疹受病之由

痘疹之由因兒在胎食母五臟血穢伏於命門或至天行時氣或驚駭跌撲或飲食所傷因而發之狀類傷寒其症面燥腮赤目胞亦赤呵欠頻悶乍涼乍熱咳嗽嗌噴足稍冷耳冷尻冷多睡睡驚耳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

後有紅絲赤脉此其候也五臟各具三一証肝藏水疱肺藏膿疱心藏斑胜藏疹歸腎變黑蓋以太陽起於有腎之下前發左腎足太陽膀胱寒水夾春上流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是諸症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也凡瘡疹初起一發便出盡者必重瘡夾疹者半輕半重稀少者輕裏外徹紅者輕外黑裏赤者徹重外白裏黑者太重瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷聤皆汗出不止煩躁熱渴腹脹啼喘太小便不通者困也

痘疹正狀

痘瘡正病蒸熱一日稍涼現瘡一日至三十日足心齊漸大如珠結成膿窠飽滿漸至蒼螺色自初紅瘢爲始計七日當成靨結痂此則言其大畧也人有虛實之不同病有淺深之各異脾胃充實血氣調和皆依期而愈若調治失宜虧損脾胃或寒暄失度必致遷延大抵形勢既正而無他症不必用藥此先哲之格言也鄭氏云凡瘡痘欲出先發熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

輕者三十日次五日遠者不過七日此約法也一日太陽傳陽胞二十日陽明傳胃二十日少陽傳膽四日太陰傳脾五日少陰傳腎六日厥陰傳肝七日還經五藏六腑傳遍故七日而止也又有因傷寒至七日以後或已汗或未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而未發熱毒入胃發於皮膚成斑者狀如蚊蟲所嚙赤者十生一二死黑者十死一二生及有胃熱發黃者狀如橘色下利者死又有成隱疹者或白泡者此皆傷寒熱毒不除多變此疾故發斑不可用表汗藥也

痘疹輕重

輕者作二三次出大小不等頭面稀少胸前眼中皆無根窠紅活肥潤光澤形似水珠不渴瀉不煩躁○重者一二齊出密如聲蟲種頂陷如茱萸樣或乎頭灰白色混瀉煩躁頭温足冷身熱不除治之如法十二全八九

輕變重所犯者七

不忌口味不慎飲食致傷脾胃○先曾泄瀉裏虛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毒氣不能發出○冒風寒所謂春夏之氣爲順秋冬之氣爲逆大忌感冒風寒損表○犯房室○餌涼藥宜用滋補血氣壯脾之藥不宜清涼宜利之劑裏寒則毒氣不能攻出○穢氣相觸血氣聞香則順聞臭則逆順則易出易屬逆則難愈○生人輒至恐外人由生產房室或臨喪而來或帶醉或食腥氣因此穢惡之觸皆爲害也

重變輕所慎者五

謹避風寒及房內有風亦宜避之惟夏不忌如遇狂風輒寒亦宜避之○常和煖寒則添衣熱則減去務得中和毋令太過不及○節飲食忌柿橘西瓜菱角水蜜等冷物恐中傷胃氣尤忌肥肉油膩恐泄瀉忌醋物恐作渴忌酒葱蒜魚羊等腥物恐致瘡痒務使脾胃充實其瘡易出易靨也○大便調飲食調和不致泄瀉二十二次爲利二十四日不行爲秘○依方調理避風寒節飲食詳症用藥庶不致輕變爲重矣

不治五症

咳嗽聲啞飲食挫喉○腹脹氣促悶亂不寧○渴瀉不止咬牙寒戰○瘡嫩易破潰塌不止○紫黑灰色頂陷喘渴

紅癍標現之圖

一日

二日

一日先退熱放標者必輕又放標後一日身涼稀密已定仍熱煩躁尚未盡有兩三次出熱方定紅現者吉或隱或現者凶

二十日如粟米大稀而紅滿者吉二十日頂陷灰白色者次之

瘡綻灌膿之圖

初發如珠根活

三日

二十日尖滿如珠者吉灰白色者次之

三十日必出定已後身反發熱悶亂煩渴者凶

有兩三次出大小不一等先出者先灌漿後出者後灌漿如水珠光澤根窠紅活者吉不渴瀉悶煩者不必服藥微渴微痒不瀉者不妨亦不須服藥若一齊並出稠密灰白色頂陷煩躁渴瀉者急宜治之

收靨之圖



瘡已飽滿如膿窠將收漸至蒼瓤色有等無膿有黃白色自放標一日爲始至七日收靨至十日收完此爲正病有遷延八九日方靨至十四五日方完亦有之但不瀉渴悶亂其瘡飽滿無陌手按之堅硬皆好將收時漸退紅腫或瘡中收靨覺有黃蠟色或外面先靨根下皺皮男從尚收至頭背女從胸腹收後離肉不粘易脫俱好有微渴痒痛有身收完足收遲亦不妨身微熱不能食者亦有之只怕瘡燉易破悶亂痒塌者凶

靨瘡疹收靨之後預宜調理就有出外不避風寒不節飲食偏無病者莫非胃實體壯亦宜後仔細病初痊臟腑初安脾胃尚弱動止飲食餘過度復病喘咳腹脹必凶又血氣尚弱動止太早病復皆凶況肌肉嬌嫩冒風易得感寒症頭痛身熱則難治矣

一腹脹氣促根窠不赤之症

陳文宿先生云痘瘡已出未愈之間或瀉渴腹脹氣促其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也先與十一味木香散以和五臟之氣後與十二味異功散送七味肉豆蔻丸以助臟腑之氣竊謂痘瘡既出不光澤不起發不紅活或泄瀉作渴或肚腹作脹或氣促作喘寒戰咬牙或手足指冷肢體攣縮作渴飲湯陽氣虧虛損內虛寒而外假熱也用十二味異功散若作渴飲湯手足不冷者脾胃虛弱也用五味異功散凡痘瘡先出不加式後出而紅活或成片色赤而穢氣者俱無妨

一小兒痘四日腹脹瀉渴脾胃虛寒也用十二味異功散一劑又用參苓內托散貫膿膚而忽寒熱咬牙此膿貫而陽氣虧損也用參附湯獨參湯而愈

一小兒痘四日腹脹瀉渴氣促體倦此脾氣虛也用人參白朮散加木香煎送四神丸二服諸症頓止但膿遲作渴此表裡血氣俱虛用參苓四聖散

大補湯而愈

一小兒痘瘡作渴腹脹小便不利此邪氣壅滯也用木通芍藥湯一劑諸症稍愈用參芪四聖散其漿漸貫用參芪內托散結靨而愈

一小兒痘瘡將愈腹脹手足或冷或熱此陽氣虛寒也先用十二味異功散手足不冷此陽氣漸復也乃用五味異功散加木香而愈

一小兒痘瘡大便利而小便秘腹脹作喘手足並冷此脾氣虛也先用萇蔔木香散一劑又用五味異功散加木香二劑而愈後腹脹不食口角流涎仍用五味異功散而痊

一小兒痘瘡將愈忽腹脹泄瀉侵晨爲甚飲食不化余謂脾腎虛弱朝用人參白朮散夕用一神丸而瀉止又用參芪內托散兼托裡散而靨

一小兒痘瘡腹脹泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用人參白朮散豆蔻丸而愈

參芪內托散治脾虛發瘡痒瘡不潰倒靨

人參　黃芪炒　當歸　川芎

厚朴 薑製 防風 各五分 桔梗 白芷
官桂 各三分 紫草 五分 木香 甘草 各三分
右入糯米一撮水煎量服之 寒戰咬牙飲水瀉渴亦宜服之
參芪四聖散治瘡癤已出六七日不能長不生膿或痊塌
當歸 芍藥 炒 黃芪
白朮 茯苓 木通
防風 各三分 糯米 一百粒
右水煎母同服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

葶藶木香散治大便自利小便澁滯喘嗽腹脹不能食多服爲妙
豬苓 澤瀉 茯苓 白朮
官桂 各五分 滑石 二錢半 木通
木香 甘草 各五分
右水煎量大小服之
木通芍藥湯治瘡癤作渴腹脹小便不利
木通 芍藥 白朮 各五分
陳皮 乾葛 各三分 甘草 二分

右水煎服

十全大補湯

當歸　川芎

人參　白朮

白芍藥炒熟地黃

白茯苓　甘草炒

黃芪炒　官桂各等分

右水煎量兒大小服

參附湯治痘疹陽氣虛寒吹牙寒戰手足並冷或吐瀉不食飲沸湯不知熟用獨參湯加好真附炮如法者每劑先加一錢未應多加之更不應加至四五錢或等分亦無妨但用之以運其陽氣如已脫者不治

獨參湯治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不乾或時作痒或畏風寒用好人參一兩生薑五片大棗五枚水一鍾煎八分徐徐温服

胡荽酒

用胡荽一把以好酒一鍾煎一兩沸令乳母含嬰兒乳母亦服

噴兒遍身頭面并房中須燒胡荽香能辟除穢氣使痘疹出快多若痘疹已出而飲食少思宜用棗子燃炙兒聞棗香尤能開胃進飲食解毒氣若因飲食停滯未及消導者不宜用

托裏消毒散

托裏散二方見痘癮

七味白术散 即人參白术散方見痘瘡屬陰屬陽

十一味木香散

十二味異功散二方見痘灰白色

五味異功散方見痘寒戰咬牙

肉豆蔻丸

二神丸

四神丸三方見瀉渴咬牙

發熱口渴煩躁不止之症

陳文宿先生云瘡疹始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實其瘡必光澤起發必肥滿必易靨而不致損傷也又云痘瘡發熱口渴煩躁不止者切不可與冷水蜂蜜柿子西瓜等生物及

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

清涼飲消毒散等藥恐内損脾胃以致腹脹喘滿寒戰咬牙則難治籍謂前症若一痊自調飲食温和口渴飲湯手足不熱是爲虚熱不可食生冷之物若一痊秘結飲食喜冷口渴飲水手足並熱是爲實熱可與冷水飲之凡痘出而熱未止者既出盡則熱自止

一小兒腹脹發熱容而根顆不明色不紅活漿不滿先君謂脾氣虚而毒未盡也用參苓四味散痘果復出熱止紅活分明又用參苓内托散而靨

一小兒腹脹作渴發熱成片先君謂脾氣虚弱痘毒未盡用參苓四聖散二劑先出者貫漿後出者穢氣而愈

一小兒痘腹脹一痊自利手足並冷先君云脾胃虚寒用十二味異功散一服又用五味異功散加木香二劑却去木香又一服而痊

一小兒痘瘡發熱作渴此痘出未盡脾胃虚而熱也用人參麥門冬散一劑痘復出而熱渴止用人參白术散而飲食進用參苓四聖散而漿潰用托

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

裡散而瘡靨

一小兒痘腹脹足冷內熱作渴此胃氣虛而津液不足也余先用五味異功散一劑又用參芪四聖散膿貫用人參白朮散而靨

一產婦出痘寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱此脾胃內虛寒而外假熱先用十全大補湯加桂附四劑乃去附易乾薑又四劑却用參芪四聖散五味異功散加歸芪而靨

一旌婦出痘發熱足冷腹脹此脾氣虛弱而毒未發也用紫草木香散及用八珍散而貫膿倍加參芪又數劑而愈

人參麥門冬散 治痘瘡發渴

麥門冬一兩 人參 白朮 厚朴 黃芩 甘草 陳皮 茸製各半兩

右每服二錢水煎量兒大小加減

按前方若因熱毒作渴宜用之若因中氣虛弱作渴當用人參白朮散

紫草木香散 治痘瘡裏虛痒塌黑陷發熱

紫草　茯苓　芦草　白术
木香　人參各等分　糯米

右每服三十錢水煎
清涼飲方見大便不通
人參白术散方見發熱屬陰虛陽
托裏散方見瘡癰
十全大補湯方見腹脹氣促
十一味木香散
十二味異功散二方見瘡疡有色

參芪四聖散方見腹脹氣促
八珍湯方見頭暗灰白色

瘡瘍出遲屬各經所主

陳文宿先生云瘡瘍出不快誤言毒氣壅盛用藥宣利解散致臟腑受冷榮衛澁滯則氣血不能充貫其瘡不起發不光澤不充滿不結實不能成痂多致痒塌煩躁喘渴而死竊謂海藏云瘡瘍出不快如身後出不快者足大陽經也用荆芥草防風湯身前出不快者足陽明經也用升麻葛根湯

身側出不快者足少陽經也用防風芍藥甘草湯若便利調和而出不快者熱在表也宜葛根湯微發之又有上中下三部先上部次中部又次下部纔出齊而自愈又有作二三次而出者錢氏云二三日不快不出用消毒之藥仍不出脉平靜者本稀也不必服藥大凡五六日間當解毒補托以盡發於表七八日間毒氣不能盡出而反入於內必用升麻葛根驅出之瘡疹方云瘡出遲而小便澁滯吐嘔有用仙聖散出而不長隱於肌膚用人參透肌散色赤而出不快用紫草透肌散出而不勻用升均湯出而不長不貫用參芪四聖散出而色不紅活用紫草快斑湯出而小便赤澁用紫草木通湯出而漿不回用參芪內托散若色赤而兼痒者屬血虛有熱用四物牡丹皮色白而兼痒者屬氣虛有熱用五味異功散加當歸木香若發熱大便秘者用犀角消毒散發熱大便調和者用人參麥門冬飲寒戰渴瀉飲沸湯飲不知熱用十二味異功散作渴飲冰雪飲不知寒用四順飲地黃丸手足不冷

飲湯温和者用五味異功散或托裏散

一小兒發熱痘出身涼根顆紅活余謂表裡血氣皆實而不用藥後果然凡二十四日前先發熱而痘出或熱一次涼一次而痘出者毒勢輕也皆不必用藥其血氣實而托裡血氣虛而宣毒者多致有誤

一小兒痘出不快色次紅活此血氣虛弱用參芪四聖散出而色赤再劑色紅活起發又用透肌散而靨

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一小兒第九日痘漿厭而熱不止脉滑而數皆爲不治先君謂痘未盡耳非敗症也遂用快癍湯一劑果出一番至十七日而痂落

一男子發熱咳嗽嗌喘噴面燥腮頰目胞皆赤遍身赤瘾余謂此心臟痘疹之狀也彼因疑惑而未用藥尋旬餘赤瘾皆爲膿疱且紅活起發余謂痘疹明矣既紅活發起不必服藥至十七日大便下膿血瘡瘢而痊

紫草透肌散治痘瘡色赤不快或痒塌

紫草　蟬蛻
芒草炙各等分
右每服三錢水煎
人參透肌散治瘡瘡虛而有熱雖能出快而不
整隱於肌膚間者
人參　紫草　如無紅花代之白朮
茯苓　當歸　木通
蟬腿　芒草
右每服三錢水一盞半煎半盞徐徐服
糯米各等分　芍藥

木通　芍藥

紫草木通湯治瘡瘡出不快小便赤澁
紫草　木通　人參
糯米各等分　芒草減半　茯苓
右每服二錢水煎
防風芍藥芒草湯
防風　芍藥　芒草
右每服一二錢水煎
荊芥芒草防風湯
荊芥　芒草
防風各等分

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右每服一錢水煎
升均湯治瘄瘡已出不均或吐瀉熱渴
升麻　乾葛　芍藥　人參
白朮　茯苓　甘草　紫草茸 如無紅花代之

右每服三十五錢薑水煎量服之
四物湯治瘄瘡血虛發熱或煩躁不寐作痒色赤
芍藥炒　川芎各一錢　當歸　熟地黃各二錢

右水煎服

仙聖散治瘄出不快小便赤澁咳嗽有痰
紫草　枳殼　木通各等分

右每服二錢水煎

十二味異功散方見頂瘡門
葛根湯

參苓內托散二方見腹脹氣促
升麻葛根湯方見木疹麻疹
紫草快癍湯方見大便不通

四物湯 方見瘡瘡出證

人參麥門冬散 方見前

參苓四聖散 方見腹脹氣促

五味異功散 方見寒戰咬牙

犀角消毒散 方見瘡疥

清涼飲 方見大便不通

地黃丸 方見瘡瘡發熱屬陰屬陽

泄瀉咬牙作渴之症

陳文宿先生云瘡瘡瀉水穀或白色或淡黃者宜服十一味木香散送肉荳蔻丸若瀉多津液內耗血氣不榮其瘡雖潰發亦不能結靨如身溫腹脹咬牙喘渴者難治緣津液枯耗而飲水不止蕩散真氣故多死也速與十一味木香散救之如不愈急用十二味異功散竊謂荳蔻丸治陽氣虛寒滑瀉之證若因腎氣不固而致前症者宜用十一味木香散或六君子湯送四神丸若欲瀉不瀉脾氣虛而下陷也用補中益氣湯加肉荳蔻飲食不化手足並冷脾氣虛寒也用四君子

湯加附子

一小兒出痘泄瀉腹脹煩渴飲沸湯而不知熱先君謂陽氣虛寒用十一味木香散二十劑泄瀉頓止飲湯婿熱此陽氣復也乃用六君乾薑木香歸芪而靨

一小兒痘瘡愈後泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用六君補骨脂肉荳蔻瀉止用參芪四聖散接補元氣而痊

一小兒發熱飲冷唇皺烈瀉糞穢臭先君以爲肉蘊用前胡枳殼散一劑稍愈又用竹葉石膏湯加蘆薈乳母服之其兒頓安

一小兒痘後作瀉久不愈而肌體骨立此脾腎虛弱也用二神丸五味異功散漸愈因停食吞酸作瀉脘腹重墜此脾氣下陷也先用補中益氣湯爲主佐以五味異功散漸愈又用參芪四聖散治其瘡而痊

一小兒出痘發熱燥渴色黯出血足熱腰痛此脾腎虛熱用聖濟犀角地黃湯一劑却用地黃丸料

數劑而貫又用參芪肉托散而痊

一小兒瘧瘧將愈復泄瀉飲食不化余以爲腎瀉朝用補中益氣湯夕用一神丸而愈

四神丸治脾腎虛弱大便不化飲食不思或泄瀉腹疼等症

肉荳蔻二兩 補骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸湯炒一兩

右爲末用水一鍾生薑八兩紅棗一百枚煮熟去五味子吳茱萸名一神丸取棗肉丸小豆大每服二十三十丸食前白湯下

二神丸治瀉瘍因脾腎陰虛泄瀉

補骨脂四兩 肉豆蔻二兩生用

右爲末用紅棗四十九枚生薑四兩水一鍾煮乾取棗肉丸桐子大每服二十三十丸白滾湯下

肉荳蔻丸治瀉水穀或白或淡黃不能止者

白龍骨煅 訶子肉半兩 木香 縮砂仁各二錢 肉荳蔻生半兩 赤石脂七錢半 粘白蠟七錢半

右爲末糊丸黍米大二十周歲每服二三十五十丸二三歲兒服百丸米飲下瀉甚者煎木香散或異功

散送下

竹葉石膏湯治痘瘡胸中煩熱小便赤澁口乾作渴兼有赤斑者亦宜服犀角散 方見頭陷心煩

七味白朮散 即人參白朮散 方見後

六君子湯

四君子湯

十一味木香散

十二味異功散 四方見痘灰白色

托裡散 方見痘癍

五味異功散 方見寒戰咬牙

前胡枳殼散 方見潮熱痙癇

痘瘡發熱屬陰屬陽之異

陳文甫先生云痘瘡之症有陽盛陰虛有陰盛陽虛陽盛者飲冰雪而不知寒陰盛者飲沸湯而不知熱陽盛則補陰用木香散加丁香官桂陰盛則補陽用異功散加木香當歸芎藭謂經云大寒而甚熱之不熱是無火也當瀉火之源以消陰翳大熱而甚寒之不寒是無水也當壯水之主以鎮陽光

若前症發熱作渴手足並冷大便自利喜飲熱湯此陰盛也宜用十二味異功散入味丸若發熱作渴大便秘結手足並熱喜飲冷水此陽盛也宜用四順散六味丸若煩熱作渴面赤睛白此為腎經虛熱宜用地黃丸之類治之及時亦有生者京師小兒出痘或作渴喜飲冷水者恣與飲之再不服藥如期而愈亦無痘毒之患蓋北方人卧火坑飲燒酒有熱與氷相搆而然也小兒面色目睛多白者乃禀腎氣虛也出痘必作渴用地黃丸煎與恣飲多有生者

一小兒痘寒戰咬牙瀉渴腹脹手足並冷時當仲夏飲沸湯而不知熱此脾胃虛寒之極也先用十二味異功散一劑頓安又用六君附子一劑後用五味異功散而愈

一男子出痘色紫作渴飲氷腰痛足熱耳聾此禀腎氣不足用加減八味丸料煎與恣飲熱渴頓止佐以補中益氣湯加五味子麥門冬滋其化源而愈

一小兒十四歲出痘色黯兩足及腰熱痛便秘咽乾口渴引飲先君謂稟腎不足用加減八味丸料作大劑煎與恣飲至二鍾諸症悉退又佐以益氣湯及八珍湯各十餘劑而痊

一小兒痘瘡發熱作渴腹脹寒戰咬牙飲水雪而不知寒悉似火症但兩足並冷此陽氣虛寒也先用十二味異功散一劑隨用五味異功散加薑桂漸愈乃去桂又二劑而痊

六味地黃丸治腎虛痘瘡發熱作渴等症

熟地黃八兩杵膏　乾山藥　山茱萸肉　各四兩

澤瀉　白茯苓　牡丹皮　各三兩

右爲末入地黃膏量加米糊丸如小豆大煎服尤好

七味白术散一名人參白术散治胃氣虛弱或因脫伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思加飲冷者去木香

藿香　白术　木香　白茯苓

甘草炒　人參　乾葛

右每服五錢水煎徐徐服

八珍湯

十一味木香散

十二味異功散三方見瘡屬白色

補中益氣湯

五味異功散二方見寒戰嘔牙

加減八味丸 即六味地黃丸加五味子附桂

清涼飲方見大便不通

瘡瘡大便不通之症

陳文宿先生云瘡瘡四五日不大便以脫猪膽汁

水煮熟切豆大五七塊與食之滋潤藏腑瘡瘍易落切不可妄投宣利之藥恐真氣內虛瘡毒入裡如六七日身壯熱不大便其脈緊盛與二味消毒飲微利之竊謂前症若毒在肌肉而未能盡發脈浮而緊者最宜此藥疎解其毒若脈沉而緊者宜用前胡枳殼散疎通毒氣以絕其源若口舌咽喉腫痛瘡毒甚也用射干鼠粘子湯若大便既通作渴飲湯脾胃氣虛也用人參白朮散凡燥糞在直腸不能下者宜用猪膽汁導之忌用疎利之劑恐

保嬰撮要　卷之十七

復傷胃氣則瘡未出者不能發出已出者不能貫膿大抵分辨虛實當以手足冷熱或飲水飲湯驗之

一小兒大便不通痘赤作痛發熱口渴手足並熱此餘毒內作用前胡枳殼散一劑大便隨通諸症頓退又與六味活血散而愈

一小兒痘瘡發熱赤脹痛大便秘結此熱毒在內先用清涼飲一劑諸症稍退又用鼠粘子湯一劑諸症全退再用紫草快癍湯而貫膿更用消毒飲而痘靨

一小兒痘赤狂喘大便不利此胃經有熱先君治以犀角地黃湯芹菜汁而痊

四順清涼飲治積熱頰赤作渴四肢驚掣大便秘澁

赤芍藥　當歸　芐草　大黃各等分

右每服一錢水煎

按清涼飲乃苦芐疎瀉內熱之劑若熱毒在內大便不通表無他症宜用之連翹飲乃苦寒發

表內踈之劑若表裡實熱煩渴飲冷大便不通小便秘結者宜用之不可過劑恐妄發則成癖爛妄下則成虛脫也

消毒飲

荊芥二錢 甘草一錢 防風 牛蒡子 各一錢半

石水煎量服之

射干鼠粘子湯 方見瘡咽痛

三味消毒散

人參白朮散二方 見厲發熱

前胡枳殼散 方見涕唾稠粘

六味活血散 方見瘡癤

紫草快癍湯

清涼飲

消毒飲三方見大便不通

犀角地黃湯 方見項陷心煩

欲厲不厲欲落不落之症

陳文宿先生云痘瘡自始出至十二日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡或狐臭之氣觸之父母仍忌

房事若痘欲靨不靨其痂欲落不落若腹脹煩渴忌食冰蜜生冷之物若食之轉渴而死急與木香散救之如身熱煩渴者宜服人參麥門冬散身熱大渴人參白术散如不愈仍服木香散竊謂前症乃脾胃氣虛津液不足所致非實熱爲患也如身熱煩躁手足發熱脾胃有熱也用人參麥門冬散身熱作渴手足微冷者脾胃氣虛也用人參白术散腹脹泄瀉或寒戰咬牙脾胃虛寒也用十一味木香散泄瀉氣促手足並冷脾氣脫陷也用十二味異功散凡瘡結痂作靨皆由元氣充實而內融也若審見虛弱便與滋補血氣無虞可保終吉若見不靨而投補劑恐不及而誤矣

一小兒十二歲出痘不靨腹脹泄瀉不食手足並冷先君謂脾氣虛寒用十一味木香散一劑諸症頓愈再劑不時索食但惡寒此脾氣猶虛也用五味異功散加木香及六君子湯而諸症愈又用參芪內托散而痂脫

一男子三十歲遍身發熟作痛有赤顆旬餘始知

爲瘡用參芪四聖散托裡散各四劑欲膿不膿用十全大補湯數劑而痂脫一婦婦出瘡月餘欲膿不膿面赤脯熱此肝脾血虛而有熱也先用加味逍遙散熱退又用八珍壯肉皮而熱止但氣血皆虛用十全大補湯而痂脫一小兒出瘡貫膿不膿症如實熱余謂血氣虛甚之假熱也用十全大補湯數劑漸愈忽又惡寒余又曰此邪氣退而真氣遂見虛象也仍用前藥內參芪各五錢數劑而愈

十全大補湯治禀賦不足寒熱自汗食少體瘦發熱作渴頭痛眩暈方見氣促

逍遙散 即加味逍遙散去牡丹皮山梔治乳母肝脾有熱致瘡瘡欲膿不膿欲落不落

當歸　芎藭　炙甘草　白朮炒　柴胡各一錢　芍藥酒炒　茯苓

右水煎母子同服

十一味木香散

十二味異功散 二方見瘡灰白色

六君子湯方見痘灰白色
五味異功散方見寒戰牙
人參麥門冬散
人參白朮散方見層發熱
參芪托裡散
托裡散二方見痘癍
溏嘔稠粘大便堅實之症
陳文宿先生云瘡痘溏嘔稠粘身熱鼻乾大便如
常小便黃赤用人參清膈散如痰實壯熱胸中煩
悶大便堅實臥則喘急用前胡枳殼散竊謂前症
若肺胃實熱氣鬱痰滯或大便秘結小便赤澁煩
渴飲冷宜用人參清膈散表散外邪疎通內熱使
邪不壅滯若毒蘊臟腑大便秘結用前胡枳殼散
疎導其裡調和榮衛使邪自解散若痰嗽溏嘔鼻
塞不利宜用惺惺散或參蘇飲發散外邪庶元氣
不傷痘瘡輕而易愈
一小兒痘瘡溏嘔稠粘鼻塞不利此風邪所傷肺
用參蘇飲一劑稍愈又用惺惺散而痊

一小兒痘赤壯熱痰甚煩躁飲冷此脾肺實熱用人參清膈散頓退又用芹菜汁而靨

一小兒痘瘡作渴飲冷痰凝不利此上焦熱毒所致先君用人參清膈散犀角地黃湯各一劑熱退痰清又用四聖散而痘起漿貫用參芪四聖散漿固痂脫

一小兒涕唾稠粘大便黑屎此胃經熱毒先君用聖濟犀角地黃湯芹菜汁而痊

一小兒痘愈後涕唾口乾飲湯腹脹此胃氣虛熱而津液不足也先用人參白朮散一劑後用五味異功散而愈又用參芪四聖散參芪內托散而痊

一小兒涕唾稠粘痰喘而作渴大便不利此熱毒蘊於內用前胡枳殼散一劑諸症頓退又用濟生犀角地黃湯一劑而愈

前胡枳殼散治涕唾稠涎痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急

前胡　枳殼麩炒　赤茯苓　大黃炒

甘草炙各等分

右每服三錢水煎如身温脉微并瀉者不可服按前方若肺實胃熱氣鬱痰滯大便秘結小便赤澁煩渴飲冷脉數宜用此方以表散外邪疎通内臟使邪氣不壅滯且痘瘡輕而易愈

紫草四聖散治痘瘡出遲倒靨或小便赤澁發熱

紫草　木通　甘草炒　黄芪炒各等分

右每服二三錢水煎服加麥冬花椵梗等分名參蘇飲治時氣傷風發熱惡寒咳嗽未明痘症疑

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

似之間此藥甚爲穩當

前胡　人參　紫蘇葉　乾葛

半夏　茯苓各二分　枳殼　陳皮

甘草炙　桔梗各一分

右水煎服

人參白朮散治胃氣虛弱涕唾稠涎或因剋伐吐瀉口乾作渴飲食少思方見屬陰屬陽即七味白朮散

五味異功散方見寒戰咬牙

人參清膈散即十六味清膈散

犀角地黃湯二方見頂陷不起
四聖散方見發熱屬陰陽
參芪四聖散
參芪內托散二方見瘡瘍症
惺惺散方見癡症

頂陷灰白瀉渴之症

陳文甫先生云痘疹出一二十日始出如粟米狀或
慕豆大似水珠光澤明淨根窠紅者不須服藥若
四五日大小不等根窠光澤明淨者亦不須服藥
如頂陷灰白瀉渴者服木香散毋滾先生云痘疹
灰白色靜者怯者作寒看燥者勇者熱發者作熱
看若初出之時色白者便須大補氣血參芪苓歸
朮芍芎草升麻木香丁香瀉者加訶子肉苁蓉若
白色將靨如豆殼者蓋因初起飲水過多其靨不
齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑自愈如毒鬱於
裏大小便秘者隨通利之竊謂前症不起發不紅
活者此因脾肺氣虛用參芪四聖散頂陷灰白瀉
渴者脾肺虛寒用木香散異功散若灰白色或黑

而膿不貫用紫草四君木香色赤或痒而膿不貫用紫草木通湯貫而膿清稀用參芪內托散不應加附子緩則不救上危症如出贅症多有生者一小兒色淡白痒塌此脾肺氣虛血弱也用紫草快班湯參朮各二錢一劑稍應又一劑紅活起發又用托裡散參朮各三錢貫膿而愈一小兒九歲症色白手足冷此脾胃虛弱用六君子湯加木香當歸紫草四劑又用參芪四聖散加參芪各三錢而靨至十七日發熱煩渴脈洪大而虛用八珍湯而愈

一小兒十六歲症色白脈虛浮按之甚微而短形氣俱怠飲食少思此血氣虛弱用紫草木香散內人參五錢十劑色微赤又用獨參湯而貫乃用十全大補湯補中益氣湯其用參二十斤餘而靨隨入科舉畢發熟痕痒淡赤昏倦不食急灌以獨參湯而甦又用斤餘却用十全大補湯補中益氣湯而安

一小兒症癍七日變灰白色手足並冷腹痛瀉渴

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

先君謂陽氣虛寒用二一味異功散不信已而飲
沸湯不知熱始投前藥二劑陽氣頓復却用獨參
湯參芪四聖散而愈

一小兒十五歲因科舉勞傷元氣出疸色白貫膿
不厭眼閉昏憒飲食與之則食手指輕揑不冷重
按良久則冷其脉輕診而浮重按如無不及兩寸
此陽氣虛弱而無邪耳用人參一兩乾薑一錢棗
五枚一十日進四劑結厭眼開又二劑其眼常開呻
吟不絕再劑却佐以補中益氣湯二十一日始言

但氣短云遍身痛如雖索食月餘而厭始末悉用
前一湯更無他餌

一孕婦發熱嘿嘿胎昏憒遍身見疸灰白色飲食藥
餌到口即作嘔惟灌熱湯則飲之乃撲壯年婦乳
灌之不輟日灌數碗旬餘省索食云胸腹脹滿此
脾氣虛而乳食壅滯令細嚼濃茶半鍾胸滿即覓
四十餘日而厭後因勞心發熱如炙用四君參芪
炮薑而痊

一男子年三十發熱頭痛四肢拘急服解表之藥

熱盛甚遍身紅點漸成膿窠已灰白此痘落因氣虛耳用參芪四聖散托裡散色赤膿貫而靨一小兒第十日不紅活漿不滿先君謂氣血虛弱用參芪托裡散數劑出膿痘紅活起發又用十全大補湯而愈

十一味木香散

木香　大腹皮　人參　桂心
赤茯苓　青皮　前胡　訶黎勒　去核
半夏　丁香　甘草　炙各三錢

右每服二錢生薑二片水煎量大小服

十二味異功散

木香　官桂　各三錢　去粗皮　當歸　乾三錢半
人參　茯苓　陳皮　厚朴
白朮　各三錢　半夏
附子　炮去皮一錢　丁香　肉豆蔻二枚半

右每服二十五錢薑五片棗二枚水煎量大小服

此藥家傳五世累經効驗

愚嘗治癍疽凡襍症陽氣脫陷與寒氣逼

陽於外者發熱煩躁口乾作渴投以薑桂附子之類津液頓生煩熱頓退其應如響人但不習而察之耳

八珍湯治症瘡氣血俱虛虛弱而不能生血者宜用異功散

當歸一錢 川芎五分 芍藥炒七分 熟地黃酒拌 人參 白朮炒 茯苓各一錢 甘草炙五分

右每服二三錢薑棗水煎

豆蔻丸方見咬牙

內托散即托裡散方見痘瘢

紫草快斑湯方見大便不通

四君子湯

六君子湯二方見不嗜

參芪內托散方見腹脹氣促

紫草木香散方見大便不通

補中益氣湯方見寒戰咬牙

四聖散方見涕唾稠粘

參芪四聖散

十全大補湯

獨參湯 二方見腹脹氣促

紫草木通湯 方見痘出遲

寒戰咬牙飲冰瀉渴之症

陳文宿先生云痘瘡六日至七日肥滿紅活光澤八日至九日肥滿蒼蠟色者皆不須服藥如身温氣促口乾肚脹足冷寒戰咬牙飲冰瀉渴者急用木香散加官桂丁香服之如不愈服異功散蓋咬牙者齒稿也竊謂前症若手足並冷渴飲熱湯大便泄瀉者陽氣虛寒也宜熱補之手足不冷大便不利渴飲温湯者脾氣虛熱也宜調補之手足不熱大便不利渴飲熱湯者脾胃虛弱也宜温補之治者審焉

一小兒出痘寒戰咬牙四肢倦縮大便自利手足並冷喜飲熱湯此陽氣虛寒也用十二味異功散末二錢諸症頓退又用人參白朮散參芪四聖散而靨

一小兒十四歲面色忽赤忽黑出痘寒戰咬牙作

渴煩熱喜飲熱湯此陽氣虛寒也用十全大補湯
散煩渴頓止乃以八珍倍加參芪至膿貫又作渴
而赤此膿成而血氣虛也用當歸補血湯八珍湯
而靨至月餘而赤煩渴或時昏憒痘痕如豬或時
作痒脉洪大按之如無此血脫也用大劑當歸補
血湯而安

一小兒痘瘡寒戰咬牙內熱作渴形氣倦怠雖起
發而欠紅活此陽氣虛弱也用參芪四聖散而結
痂忽作瀉發熱此脾氣虛也用人參白朮散參芪

內托散而靨

一小兒痘瘡咬牙面黃飲湯此陽氣虛弱也用五
味異功散加木香而愈後仍咬牙面赤作渴至夜
爲甚此脾腎陰虛也用地黃丸大補湯而愈

一小兒膿不貫兼寒戰咬牙腹脹屬脾胃虛弱用
四君肉桂歸芪肉豆蔻又用參芪四聖散而痊後
用托裡散四君子湯而靨

一小兒痒塌寒戰咬牙喜飲溫湯手足不熱屬陽
氣虛弱也用參芪四聖散諸症已退用參芪托裡

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

散其漿漸貫用十全大補湯其痂頓厭
一小兒十四歲痘將愈忽寒戰手足並冷脈微細而不及兩寸乃脾氣虛熟用五味異功散獨參湯十全大補湯而愈
一婦人愈後寒戰脈浮大按之微細此血氣虛也用十全大補湯三千餘劑而愈後因勞寒熱往來寒時手足如冰熱時手足如炙脈浮大重按則細此陽氣虛甚也朝用補中益氣湯加桂附各一錢夕用八味丸料倍加桂附各五十餘劑而安
一小兒咬牙作渴而色忽白忽赤脈洪數按之無力左關尺爲甚此屬腎虛也用地黃丸補中益氣湯尋愈後因驚而青目赤呵欠咬牙手尋衣領此肝經虛熟用加減八味丸料煎與恣飲頓安又用補中益氣湯而痊
一小兒咬牙作渴飲冷大便微秘寒戰痘赤多在身側此屬膽經虛熟也用小柴胡湯柴胡麥門冬各一劑又用加味四物湯而痊
當歸補血湯治痘瘡血氣虧損或妄服峻劑致血

氣俱虛脫熱大渴喜飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無其症似宜服白虎湯但脉不長實爲可驗耳若服白虎湯必死

黃芪炙一兩　當歸二錢

右水煎徐徐服

補中益氣湯

人參　黃芪炒　白朮　甘草

當歸　陳皮各一錢　柴胡　升麻各二分

右薑棗水煎徐徐服

五味異功散

人參　茯苓

陳皮　白朮炒　甘草

右每服二三錢薑棗水煎爲末調服亦可

加減八味丸　即六味丸加五味子四兩肉桂一兩治腎經陰虛虛火上炎作渴咬牙或口舌生瘡或瘀凝湧盛

六味地黃丸　加肉桂附子各一兩名八味丸二方見發熱屬陰屬陽

獨參湯　方見腹脹氣促

小柴胡湯　方見癍症

十一味木香散

十二味異功散二方見痘灰白色

十全大補湯方見腹脹氣促

八珍湯

柴胡麥門冬散二方見頂陷灰白

參芪四聖散方見頂陷心煩

七味白术散方見痘發熱即

人參白术散

保嬰撮要卷之十七終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之十八 續集

古吳薛 鎧草創
男薛 已編集
後學宋 璞校閱

不靨悶亂哽氣腹脹之症

陳文宿先生云痘瘡十二日至十二日當靨不靨身熱悶亂不寧卧則硬氣腹脹泄瀉寒戰咬牙急用異功散加木香當歸以救陰陽表裏助其收靨

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

異功散手足微冷屬脾胃虛弱宜用五味異功散
加木香若手足熱大便秘屬脾胃實熱宜用清涼
飲救其陰以抑其陽

一小兒痘寒戰咬牙瀉渴腹脹手足冷時仲夏飲
沸湯口不知熱先君謂脾氣虛寒用十二味異功
散一劑頓安又用五味異功散調補而愈再用參
芪四聖散而愈

一小兒痘不結痂發熱飲湯哽氣腹脹此脾氣虛
弱用五味異功散參芪四聖散而愈後噫氣下氣
欲服枳殼之類余謂噫氣屬心火虛下氣屬脾氣
虛朝用六君子湯加薑桂夕用補中益氣湯而愈

一小兒哽氣喘咳腹脹下氣手足不冷不熱此脾
虛不能攝氣而腹脹下氣肺虛不能攝氣而哽氣
喘咳用五味異功散加升麻而愈

一小兒痘將愈足冷哽氣腹痛手冷至臂唇青面
白屬脾胃虛寒也用五味異功散加附子二劑足
稍温又用六君薑桂二劑諸症漸退乃去薑桂服
之而痊

一小兒痘不結痂作渴飲冷大便秘結此腸胃有熱也先用清涼飲末一錢大便和而頓靨又用人參麥門冬散八珍湯而痊

一小兒痘不結痂用補中益氣湯地黃丸料煎服而愈次年畢姻後寒熱作渴頭運脈洪數按之微細此脾腎虛火上炎也以前藥各加肉桂五分引火歸經而愈

一小兒痘不靨發熱因乳母有肝火用加味逍遙散人參白朮散母子俱服而熱止又用柴胡麥門冬散而痊

一小兒十五歲久而結痂寒熱往來脈洪數按之無力用十全大補湯而痊後因勞寒熱復發用補中益氣湯而安

六君子湯治脾氣虛弱或因尅伐之劑虧損中氣飲食少思或痘瘡不起發灌漿結痂

人參　白朮炒　茯苓　陳皮炒
半夏湯洗　甘草炒　各等分

右二十五錢薑棗水煎徐徐服

四君子湯 即六君子湯去陳皮半夏
四順清涼飲 王海藏先生云痘疹膿貫而不焦者由治失清涼之法內外熱毒無以收斂辟如五穀得陽氣而成熟得陰氣而成實用清涼飲子下之方見大便不通
十二味異功散 方見頂陷灰白
人參麥門冬散 方見發熱口渴
柴胡麥門冬散 方見作痒搔破
加味逍遥散 方見欲瀉不瀉

補中益氣湯
五味異功散 二方見寒戰咬牙
參苓四聖散
十全大補湯 二方見腹脹氣促
人參白朮散 即七味白朮散
地黃丸 二方見發熱屬陰陽

兩目生翳痕黯凹凸之症

陳文宿先生云痘瘡十二十日至二十二十日瘡痂漸落其瘢猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡洗并忌五

辛煎燻之物恐熱毒上薰肝腑眼生瘴翳或有是患用穀精草散治之竊謂前症目爲肝之竅或肝經風熱或肝經血虛或肝經熱毒或肝經風熱相搏或肝痺內熱或乳母肝經有熱或食膏粱厚味故多犯其目若失於早治多成廢疾

一小兒出痘兩眼不開先君謂肝經有熱用消毒化斑湯母子服之而愈

一小兒兩目不開先君謂肝經熱毒先用柴胡麥門冬散又用四物湯加山梔而愈

一小兒痘癒目赤腫痛此肝火爲患用柴胡麥門冬散穀精散而愈

一小兒痘將靨目不開脉浮而無力右關按之緩弱此脾氣虛耳用補中益氣湯加蔓荆子二劑去蔓荆子又數劑而愈後每勞役日中作脹不能開合朝用補中益氣湯夕用五味異功散而愈

一小兒眼痛不開屬肝經風熱用柴胡麥門冬散犀角地黃湯加柴胡各一劑開而見赤翳迷漫仍用前藥加穀精草而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒出痘目閉二十餘日用清肝解熱之藥兩目雖開其睛已傷此失於早治也

一小兒目中出痘作痛肝脉弦洪有力先用小柴胡加龍膽草生地黃二劑而痛稍止乃用四物柴胡山梔一劑痛全止再用加味逍遥散蟬菊散而愈

一小兒目中出痘肝脉弦數此木火相搏用四物山梔牡丹皮柴胡二劑再用加味逍遥散二劑肝脉平和又用四物牡丹皮而靨但目有青翳用蛇蜕散三味穀精草散而痊

一小兒素食膏粱目中出痘作痛口渴大便堅實左右關洪數有力弦長此形病脉俱實先用柴胡梔子散瀉黃散各一服又用柴胡梔子散柴胡麥門冬散而痊

一痘兒眼不開肝脉數按之有力用柴胡梔子散子母服之眼漸開又因母勞怒仍閉用加味逍遥散而愈後復閉用柴胡麥門冬散而痊

一小兒目中生翳診其肝腎瘥症用九味蘆薈丸

六味地黃丸及粉丹散翳漸退又用柴胡麥門冬散而痊

羊肝散治痘毒入眼或無葦痂入目

密蒙花　青箱子　決明子　車前子

右爲末用密蒙花末三錢餘藥各一錢以羊肝一葉薄批摻上濕用紙裹煨熟空心食之

蛇蜕散治痘毒目翳

蛇蜕二錢爲末　瓜蔞仁五錢研爛

右爲末用羊肝一片批開入末一錢用線紮緊米泔煮熟頻與兒食外用粉丹散三味穀精草散治痘疹翳膜遮睛癰障瞳子

穀精草一兩酚粉　黑豆各二兩

右爲末用雄猪肝一葉竹刀批開摻藥在內以麻線縛定砂礶內水煮熟令兒食之

蟬菊散治斑痘入眼或病後生翳障

蟬蜕洗　白菊花各等分

右每服一錢水煎入蜜少許量兒服

二味穀精草散治痘瘡已靨目翳膜障瞳神隱澁

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

淚出久而不退

穀精草一兩 生蛤粉二兩

右爲末用猪肝一葉竹刀批开入藥在內以綿扎入砂鍋內水煮令熟食之

粉丹散 即吹耳丹 治眼生翳膜

輕粉 黃丹

右爲末竹筒吹耳內左眼有翳吹右耳右患吹左耳即退

通神散 治斑瘡入目內生翳障

白菊花 菜荳末 生用 穀精草 各等分

右爲末每服一錢乾柿一箇米泔水一盞煮乾去柿餅五七次至七日可見効

黃栢膏 治痘瘡初出就塗眉則痘瘡不生於面目用之若遲雖出亦稀

黃栢一兩 菜豆 甘草 各四兩 生用

右爲細末清油調如膏從耳前眼唇間並塗之

日三五度

羊肝丸 治痘瘡入目不能開

羚羊肝 一具生用 黃連炒爲末

右先將羊肝去筋膜於石器內搗爛入黃連末
九如桐子大每服二十三十九食後茶清送下

蟬蛻散治班疹入肝牛年已過者二月取效

蟬蛻一兩 猪懸蹄甲二兩瓦鑵內用鹽泥封燒存性

右二味爲末入羚羊角末五錢每服五分白湯調下

九味蘆薈丸治肝經積熱面生翳耳中出水大便不調肢體消瘦等症方見疳症

小柴胡湯方見班症

柴胡麥門冬散方見痘瘡出遲

四物湯方見痘瘡出遲

六味地黃丸方見痘瘡發熱屬陰屬陽

瀉黃散方見麻後發熱咽痛

消毒化斑湯即消毒救苦湯方見夾疹痘

加味逍遙散方見欲麻不麻

柴胡梔子散即柴胡清肝散方見作痒搔破

補中益氣湯

五味異功散二方見寒戰咬牙
一名小異功散

靨後發熱咽痛不利之症

陳文宿先生云痘瘡收靨之後渾身壯熱經旬不除別無他症用柴胡麥門冬散加減如不退服人參白术散若風熱咳嗽咽喉不利用桔梗甘草防風湯

窠謂前症有因熱毒未解者有因胃氣虛熱者有因胃氣實熱者其因不能枚舉當臨症制宜而藥之

一小兒咽痛壯熱痘痕色赤手微熱此餘毒未解

用柴胡麥門冬散而安七日之後復熱手指初捏似熱久捏則冷此脾氣虛也用五味異功散而痊

一小兒痘咽痛大便不實口渴飲湯手足不熱此脾胃虛弱也用人參白术散而大便實但不時寒熱用加味逍遥散而愈

一小兒痘咽痛發熱作渴而赤飲冷此胃經實熱也用射干鼠粘子湯而愈因食厚味復發手足並熱用瀉黃散一劑而痊

一小兒痘咽痛發熱飲冷大便黃色手足指熱此

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

脾胃實熱也用瀉黃清胃二十散各一二劑而愈後因乳母食厚味兒口角流涎不能吮乳仍用前藥治母而愈

一小兒痘咽痛足熱余謂此禀足三陰虛而無根之火上炎也古人有云痘歸腎經必不可救嘗用壯水之劑亦有生者杢彼不悟翌日果腰痛咽啞始信余言乃用大劑地黃丸料加五味子并補中益氣湯而愈

一男子出痘上體甚熱兩足俱冷喉痛作渴瘡亦不起發此禀腎經虛熱也以六味地黃丸料煎與恣飲漸愈又用八珍湯五劑而痊

一小兒面色素白出痘咽痛發熱面赤作渴飲湯手足指冷此禀足三陰虛也用大劑加減八味丸料煎與恣飲又以益氣湯助其脾肺以滋化源痛止熱退而愈

射干鼠粘子湯治痘疹咽喉作痛及痘疹後癰疽

瘡毒

鼠粘子 即牛蒡子 甘草 升麻

射干各二錢

右水煎量兒大小服之

瀉黃散治脾胃實熱患瘡口渴飲冷

藿香葉七葉 石膏煅 五錢 甘草三錢 防風
山梔仁炒各一錢 粳米一撮

右爲末每一二錢水煎入蜜少許與兒乳母服之

六味地黃丸方見痘瘡發熱屬陰屬陽

清胃散方見痘不結痂

八珍湯方見頂陷灰白

人參白朮散即七味白朮散
方見痘瘡發熱屬陰屬陽

柴胡麥門冬散方見作痒抓破

加減八味丸即六味丸加
五味子肉桂

加味逍遥散方見欲厭不厭

五味異功散

補中益氣湯二方見寒戰咬牙

頂陷心煩狂躁氣喘之症

陳文箔先生云痘紫色頂陷心煩狂躁氣喘妄語或如見鬼神內熱便秘者宜用龍腦膏子豬尾膏

如無內熱大便不實不可輕服竊謂前症多因初起熱盛之時失於解利所致亦有因痘毒未盡有因胃經有熱有因肺胃有熱有因心脾有熱煩躁痘裂出血便血衄血尿黑痕赤詳見各症大凡作渴發熱手足指冷或大便秘結者內有熱也切不可禁其飲水觀張子和迎水中兒事良可驗矣蓋熱極故得冰而生也

一小兒痘疹狂喘熱渴飲冷痰涎不利先君用十六味清膈飲犀角地黃湯而痊

一小兒痘紫發熱小便不利手足發熱此肺經有熱用人參清肺飲小便隨利又用犀角地黃湯而靨

一小兒痘紫作渴手足並熱余謂胃經有熱用竹葉石膏湯一劑諸症頓退而愈用人參白朮散而痊

一小兒痘紫作痛其頂欲陷發熱飲冷作渴痰喘小便秘結此肺胃有熱用十六味清膈散一劑諸症頓減又用葛根麥門冬散一劑而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒出痘發狂作渴飲冷此上焦熱熾也用黃連解毒湯芹菜汁而止又用紫草快斑湯將息調因間藥餌二十日色黑倒靨用紫草散渴止又用人參白术散而痊

一小兒出痘喘咳面赤其脉洪數右寸脉尤甚此心火剋肺金用人參平肺散以清心肺再用地黃丸以壯腎水喘嗽頓止

一小兒痘將愈喘躁作渴面赤此稟足三陰虛也用地黃丸料數劑諸症稍可又佐以芪氣湯諸症

漸愈後因沐浴出汗仍喘咳煩躁面赤脉洪大按之如無此汗多从陽也用當歸補血湯而愈畢痂後喘咳音啞用地黃丸芪氣湯各百餘劑得遂幡幙而生

一小兒痘愈後時發狂兼喘發過面色黃白手足並冷此脾胃虛弱也余用補中八珍二湯各三十餘劑或云當先降火邪而後補元氣乃服苓連朴硝之類汗吐不止而歿

十六味清膈散治涕唾稠粘喘嗽痰盛身熱鼻乾

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

大便如常小便黃赤
人參　柴胡　當歸　芍藥
知母　桑白皮　白朮　黃芪
紫菀　地骨皮　茯苓　甘草
桔梗　黃芩 炒半兩　石膏煅　滑石
右每服二錢薑水煎量服之
葛根麥門冬湯治痘疹胃經熱甚頭疼悶煩或痘
後餘毒
麥門冬　乾葛
人參　赤芍藥

升麻　茯苓 各二分　石膏末五分　甘草一分
右水煎服
犀角地黃湯治鬱熱不解氣血湧爲衄血或流入
胃腑而吐血或餘血停滯而色赤黃大便色黑
犀角　生地黃　白芍藥　牡丹皮 各一錢
右水煎乳母同服
人參平肺散治心火乘肺金傳爲癰瘡咳嗽喘嗌
痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利
人參　陳皮　甘草　地骨皮

茯苓各一錢　知母　青皮四分　五味子炒一錢
天門冬去心四分　桑白皮
右水煎徐徐服

竹葉石膏湯治痘瘡胸中煩悶小便赤澁口乾作渴兼有赤斑又宜服犀角散方見泄瀉吐牙

龍腦膏子治時氣疱痘及赤疹子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏宜速治否則毒入臟必死

生龍腦

右研細滴雄猪心血九菜豆大每服一九心煩狂躁紫草湯下瘡陷伏温酒化下一方加辰砂五分尤妙服後少時心神清爽得睡瘡疹發透猪尾膏治痘瘡黑陷倒靨

用小猪尾尖刺血兩三點入腦子少許辰砂末一錢同研膏以木香湯化下

紫草快斑湯治痘疹下血不止不能發出血氣不足色不紅活等症即紫草湯

紫草　人參　白朮　茯苓

當歸　川芎　芍藥　木通
甘草　糯米
右每服二錢水煎
人參清肺散 方見頂陷灰白瀉滑
八珍湯 方見瘡症
黃連解毒湯 方見瘡症
地黃丸 即六味地黃丸
人參白朮散 即七味白朮散
二方見發熱屬陰陽
補中益氣湯

當歸補血湯 一方見寒戰咬牙
作痒抓破膿水淋漓之症
陳文甫先生云疮瘡作痒抓破成瘡膿水淋漓者由血氣衰肌肉虛也宜用木香散加丁香肉桂及敗草散切忌用牛糞灰竊謂前症皆因氣血虛弱所致預爲調護使氣血和平庶無此患又必察其外症色白者用四君之類色赤者用四物之類若因鹹味宜用蟬蜕散之類
一小兒口乾作渴脉浮而數此血氣虛而有熱也

用參芪四聖散加蟬蛻而痒止用托裡散加蟬蛻而膿貫又用托裡散將歷層忽發熱作渴而痒此血虛也用八珍湯當歸補血湯而愈

一小兒痘赤作痒脉弦按之則數此乃肝火血燥生風先用柴胡麥門冬散加蟬蛻而痒止又用托裡散而痂脫後仍痒痕白用八珍湯倍加參芪而愈

一小兒痘瘡作痒色赤心肝二脉數而弦此風熱相搏而血熱也用四物黃連柴胡丹皮而痒止用八珍湯當歸補血湯參芪四聖散而愈

一小兒痘後作痒夜甚不寐此脾經氣血俱虛用四君歸芪數劑而止後復傷食作瀉復痒不寐仍用前藥及五味異功散而愈

一小兒痘瘡愈後身痒膿水淋漓內熱口乾用四君歸芪及補中益氣湯并六味地黃丸而愈

一小兒痘痕作痒服祛風藥遍身皆痒膿水淋漓日噤發搐面色胶白此氣血俱虛余用大補湯參芪四聖散而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一小兒痘瘡已愈而犯油氣息淹淹脉洪數無力左尺爲甚先用大補湯內用人參五錢數劑形氣稍復佐以大劑加料八味丸料又五十餘劑而痊

一小兒痘將靨身痒脉浮數按之無力此眞氣不能榮於膚理用補中益氣湯漸愈因功課勞心自汗用六一湯而愈後煩躁面赤自汗如甫用當歸補血十全大補二湯而愈

一小兒汗出如甫手足發熱作渴飲冷右關洪數有力此胃經實熱也用清胃散一劑頓退因食冒梁復痒發熱飲冷用瀉黃散末一錢渴止又用白木散去木香而痊

一女子厥後身痒脉浮大此脾肺氣虛也朝用補中益氣湯夕用黃芪六一湯而愈經行復痒發熱用加味逍遥八珍湯而痊

一男子痘愈而入房身痒昏憒脉大而無倫次按之如無用獨參湯十五劑而甦又大補湯二十餘劑脉斂又二十餘劑脉微細而畏寒此火歸經又

五十餘劑而痊

一婦人瘡方愈因勞發瘥舂服消風散口噤流涎余謂曰此因元氣復傷不信仍服前藥更四肢發搐余用十全大補加昧逍遥而愈

一小兒瘡膿未滿而赤作瘥余謂氣血虛而有熱欲行溫補不信乃服清熱之藥而歿

柴胡麥門冬散治肝膽經有熱膚後不解

柴胡　麥門冬　各一錢　人參

玄參　龍膽草　各五分　甘草炒

右水煎量兒大小服

參苓四聖散治瘡瘡不能長滿生膿或色白作瘥

方見腹脹氣促

五味異功散治禀賦元氣虛弱肌肉消薄榮衛短促而愚瘡瘍不能消散或脾肺氣虛不能生肌收口大凡諸症因脾氣虛而不能愈者皆宜服之調補元氣則自愈矣　方見寒戰咬牙

黃芪六一湯治瘡瘍後氣虛作渴愈後復渴尤宜服之

黃芪炙六錢

右水煎服

柴胡栀子散治肝膽經有熱瘡毒不愈或發熱不止

柴胡　牡丹皮　山梔各一錢　川芎

芍藥　茯苓各七分　白朮炒　甘草各五分

當歸　牛蒡子炒各七分

甘草炙一錢

右水煎母子同服

十全大補湯

獨參湯

參芪四聖散治寒瘡不起不能長滿生膿或作痒

三方見腹脹氣促

補中益氣湯治瘡中氣虛弱或因耐伐以致身疼惡寒發熱煩渴體倦飲食少思或不能結痂作痒者

當歸補血湯二方見寒戰咬牙

加味逍遥散 方見欲屬不屬

四君子湯 方見不屬悶亂

六味地黃丸 方見痘瘡發熱屬陰陽

四物湯 方見痘疹出遲

托裡散 方見痘癰

八珍湯 即四君四物二方相合

瀉黃散 方見屬後發熱煩悶煽

加減八味丸 即六味加用五味子肉桂

清胃散 方見痘瘡

風邪搏於肌肉患進蝕之症

陳文宿先生云痘疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未定忽被風邪搏於肌肉膚腠之間則津液澁滯故成疳蝕瘡也宜用雄黃散綿薤散治之久而不愈則潰蝕筋骨以致殺人竊謂雄黃散清肝殺虫解毒綿薤散治膿水淋漓皆治外之良方內無餘毒者宜用此法若因肝脾有火上炎或食甘肥而胃火內動或手足陽明經蘊熱或腎經虛熱各有不同皆元氣不足病氣有餘乘虛而

發也煩痛作腫用仙方活命飲大蕪荑湯痊熱爲
患用大蕪荑湯四味肥兒丸腎經虛熱用地黃丸
當臨症制宜分五藏相勝審乳母之氣何如扶助
胃氣爲善

一女子患痘症因浴熱湯發熱如炙體強如痙此
勝理間泄邪熱乘虛而內作用十全大補湯一劑
頓安同時亦有患此症不用補劑者甚至不救

一小兒痘後遍身津液作痒此兼因痒爲患用大
蕪荑湯及蠐螬丸而愈後作渴口中作漏用蠐螬

丸人中白散而安

一小兒痘後毒餘腫余謂肝脾有熱助痒而患也
用大蕪荑湯大蘆薈丸爲主以五味異功散爲佐
月餘漸愈却以五味異功散佐以大蕪荑湯而痊

一小兒臀間痘毒餘爛恪敷雄黃散益甚余謂兼
肝脾痒也先用大蕪荑湯活命飲各一劑又用九
味蘆薈丸爲主以五味異功散爲佐月餘諸症漸
愈

一小兒患前症發熱作渴兩足腫熱余謂稟腎經

陰虛不信恪服清熱敗毒而愈
一小兒痘出甚密先四肢患毒膿潰而愈後口患
瘡涎蝕牙齦余先用大蕪荑湯活命飲各一劑又
用蟾蜍丸人中白散而安
一小兒痘毒蝕陷敷雄黃散服加味解毒散而愈
一小兒臉患之作瘡用仙方活命飲又敷雄黃散
大蕪荑湯而愈
韶粉散治痘瘡毒氣未散瘡痂雖落其瘢猶黯或
凹或凸此藥塗之

韶粉一兩 輕粉一兩
右煉猪脂油拌勻如膏塗之如痘痒搔成瘡及瘡痂
當用後方
羊髑骨髓
右入輕粉研成膏塗之如痘痒搔成瘡及瘡痂
欲落不落用上等白蜜塗之其痂自落亦無瘢
痕神効
雄黃散治痘毒牙齦生瘡蝕瘡
雄黃一錢 銅綠二錢

右研細量瘡大小乾摻之綿繭散治寒毒蝕瘡膿水不絕

出蛾綿繭 不拘多少

右用生蠶末碎貫繭內以炭灰燒蠶汁乾取出爲末乾貼之

九味蘆薈丸治寒毒成痈齒齦爛龈或透頰頤或肝脾痈熱結核耳內生瘡兩目生翳耳中出水或小便出津拘中結核或大便不調肢體消瘦等症

胡黃連 宣黃連炒 蘆薈 木香

白蕪黃炒 青皮 白雷丸 鶴虱草各一兩

麝香三錢

右各另爲末糊丸麻子大每服五分空心米湯下仍量兒用之

大蕪荑湯一云名梔子茯苓湯治寒毒上攻口齒成痈發熱作渴大便不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡乳食嘔吐等症

山梔仁二分 黃柏 芎草各二分 大蕪荑五分

黃連　麻黃根　各一分　羌活　二分　柴胡　三分
防風　一分　白朮
右水煎服

導赤散

生地黃　木通　甘草　各等分
右爲末每服一錢淡竹葉水煎

敗草散治疳瘡擩成瘡膿血淋漓用屋爛草或
蓋墻爛茅年遠者佳如無曠野生者尤佳爲末
搽之如遍身患者須多摻鋪蓆上令兒坐臥其

瘡即愈

冊粉散治疳毒膿水淋漓

輕粉　黃冊　各一錢

右研勻搽患處

立効散治一切胎毒瘡疥及風疹痛

大黃　黃栢　山梔　寒水石　煅各等分

右爲末用清熗油調搽若破而膿水淋漓用當

黃連　大楓子肉研膏各二兩　眞輕粉
枯礬　蛇床子各一兩　相油六兩

右各另爲末十八大楓膏和勻更入相油杵百餘
即成膏矣每用少許塗患處

加味小柴胡湯方見班瘡
加味逍遥散方見欲靨不靨
人參平肺散
犀角地黃湯二方見頂陷心煩
柴胡梔子散方見作痒抓破

二黃散方見班爛
八珍散方見頂陷灰白
地黃丸方見發熱屬陰
十全大補湯方見腹脹氣促
補中益氣湯
當歸補血湯
五味異功散
竹葉石膏湯四方見泄瀉吐牙
四味肥兒丸

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

加味解毒散

人中白散

東垣消毒救苦湯四方見夾疹痘

蟾蜍丸

清胃散

仙方活命飲三方見瘡癤

癍症

陳文宿先生云癍疹之症俗言疹子是肺胃有熱或時氣所作發於皮膚遍體狀如蚊蚤所咬斑色赤者十生一死色黑者十無一生錢氏云癍症初發類似傷寒發熱五六日或七八日而出或乍涼乍熱或咳嗽泄瀉不食面赤眼光如水生駁或噴嚏痰涎或熱渴乾嘔或大便急而小便澁余竊謂前症若身熱煩渴者用升麻湯白汁煩渴者化癍湯煩渴熱瀉白虎參术湯熱盛譫語導赤散咳嗽不已生地黃散吐血衄血或大小便血犀角湯喉間作痛茸桔防風湯咽喉腫痛玄參升麻湯乍涼乍熱小柴胡湯喘嗽不已柴胡五味子湯小便不

利柴芩湯熱盛乾嘔解毒湯停食嘔吐或腹脹作瀉平胃散大便不通加枳實飲食已消或仍作嘔四君子湯大便秘或喘滿者先用前胡枳殼湯下之乃用春澤湯瘥後熱毒不除葛根黃連湯餘毒成瘡射干鼠粘子湯消毒飲又有夾寒而出者其勢最速乃血乘其勢而爲患也如大便硬用清涼飲少許下之瘥退四君歸芪固其元氣肢體疼痛仍用托裡散治之用活命飲一服殺其毒氣發熱呌其內陷此表邪未解用葛根麥門冬湯一劑頓解再劑而痊

一小兒惡寒發熱頭痛拘急先用人參羌活散一劑外邪頓散又用五味異功散而安

一小兒月餘不消增寒壯熱頭痛拘急此表邪未解也用人參敗毒散一劑而表邪退再用惺惺散而痊

一儒者年踰一旬患前症煩渴飲冷用竹葉石膏湯化斑湯各一劑熱渴頓愈用快斑湯寒頓起用八珍湯而痊

一產婦患此乃風熱所致用惺惺散而風熱散用六味活血湯而瘡起發用八珍湯而痊

一小兒患此鼻塞聲重發熱身痒用人參消風散而表症愈後發熱搔破膿水淋漓脉浮大按之無力此脾胃氣虛不能榮於膚理朝用補中益氣湯夕用黃芪六一湯而愈後因感胃服表散之劑煩躁發熱面目俱赤脉大而虛用當歸補血湯而痊

一小兒發熱作渴二十餘便秘澁用大連翹飲一十便隨通但嘔吐痰涎腹痛不食此邪氣去而真氣復傷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

也用五味異功散而痊

惺惺散治風熱時氣痰壅痰頭疼壯熱目澁多睡咳嗽喘麁

桔梗　眞細辛　人參　甘草

白茯苓　川芎　白术各五分　薄荷

右水一盞薑二片煎服

黃連解毒湯治疹毒吐血乾嘔

黃連　黃柏　黃芩　梔子各三錢二字

右水煎量大小服

柴胡五味子湯治瘧疹喘嗽即小柴胡湯內加五味子

小柴胡湯治瘧疹乍涼乍熱似瘧喘嗽

柴胡三錢　人參　茸草一錢　黃芩各二錢　半夏二十粒

右生薑三片水一盞煎至六分溫服

柴苓湯治瘧疹小便不利

柴胡　黃芩　豬苓　澤瀉　茯苓　白朮各一錢五分

右薑水煎量大小服

人參消風散治瘧疹壯熱頭痛

人參三錢　荊芥穗　茸草炙　陳皮各五錢　白殭蠶　茯苓　防風　芍藥　藿香　蟬蛻各二錢　厚朴薑製二錢　羌活一錢

右每服一錢水煎服

人參敗毒散治瘧疹發熱惡寒咳嗽等症

人參　茯苓　川芎　羌活　獨活　前胡　柴胡　枳殼麩炒　桔梗　茸草炒各等分

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

右每服二十二錢水煎服忌酒醋鹽酸之物

生地黃散治痘疹煩熱咳嗽

杏仁　陳皮各一錢　生地黃　麥門冬各一錢半
甘草五分

右水煎服忌酒醋鹽酸之物

白虎蒼术散治痘疹痂痒

玄參升麻湯

化斑湯三方見水痘麻痘

升麻葛根湯方見後

乾葛麥門冬湯

犀角湯二方見頂陷心痒

快斑湯十二見頂陷心煩

六味活血散

活命飲二方見痘瘡

大連翹飲

春澤湯

人參羌活散

葛根黃連湯四方見夾麥疹痘

五味異功散

當歸補血湯

補中益氣湯三方見寒戰咬牙

黃芪六一湯方見作痒抓破

竹葉石膏湯方見泄瀉咬牙

射干鼠粘子湯方見屬後發熱

桔梗防風湯方見痘寒戰

前胡枳殼湯方見痘涕唾稠粘

四君子湯方見不醫閃亂

四順清涼飲方見大便不通

水痘麻痘

陳文宿先生云水痘之症身熱一二日而止或咳嗽面赤眼光如水或噴嚏該嗇稠粘與痘不同易出易靨不能爲害湯氏堅先生云麻痘乃天行時氣熱積於胃胃主肌肉故發於遍身狀如豉子所嗇色赤者十生一死色黑者十死一生此症亦與痲症不同其痲症如錦紋而但空缺處如雲路之狀痲症乃遍身而無空處但以疎密之不同耳麻

痘漸出咳嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽喉口舌生瘡用黃連杏仁湯若催出而成斑爛如錦紋或膿水腥臭心胸咳悶嘔吐清水不時身熱用黃芩知母湯初起發熱疑似之間可服升麻湯然麻痘始終宜用麻黃湯表之痘痘表與下皆不可大抵發熱煩渴用升麻葛根湯發熱咳嗽人參麥門冬湯發熱煩躁小便不通大連翹飲冬寒勝理閉塞葛根（梔同）皮湯

一小兒患之發熱作渴遍身作痛大小便乾澁此熱毒鬱滯於內用葛根麥門冬湯一劑頓安又用解毒散而愈

一小兒患此身痛發熱煩躁此風邪搏於表也用玄參升麻湯諸症頓解但倦怠發搐此脾虛爲肝所侮也用和肝補脾湯而安

一小兒患此腹痛煩渴面赤咳嗽痰涎用升麻湯一劑遍身如錦用化斑湯一劑而安又用人參麥門冬散而愈

一小兒痘隱於肉裡而不現煩渴躁熱鮮血吐血

或便血用解毒湯犀角湯各一劑而血止又用導赤散而愈

一小兒患此寒熱乾嘔先用小柴胡湯加生地黃而寒熱止用解毒湯而發用生料四物湯而全愈

一小兒患此五日不消發熱煩躁右關脉洪數而有力此胃經實熱先用化斑湯一劑又用參滑散而愈

一三豆飲治天行痘瘡始覺即服之多者必少少者不出

小赤豆　黑豆　菉豆各一百粒　甘草節五錢

右水煮熟任意食之七日自不發

參滑散治水痘

地骨皮　麻黃去節　人參　滑石

大黃煨一分　知母　羌活　甜葶藶炒一分

甘草炙半分

右爲末每服五分水一小盞小麥七粒煎數沸

每服三五匙不可多服

按前方發表散邪疎通內熱之峻劑若遍身作

痛壯熱煩躁作渴飲冷大便秘結小便澁澼喘嗽等症宜用此方然水瘡多屬表邪或發熱引飲小便赤澀者當用升麻葛根湯加無他症不必用藥

瀉肝補脾湯治風熱蒼疹脾土不及肝木太過

人參　陳皮　川芎　各五分　白朮　茯苓　芍藥　各七分　柴胡　甘草　各三分　山梔炒四分

右作一劑水煎服

白虎蒼朮湯

石膏四錢　蒼朮一錢五分　知母一錢　甘草五分　粳米一撮

右水煎服

黃連杏仁湯治麻疹漸出咳嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽喉口舌生瘡作瀉

黃連一兩　陳皮　杏仁去皮尖麩炒　麻黃去節　枳殼炒　葛根各五錢

右每服二錢作瀉者加厚朴甘草

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃芩　知母湯治麻疹斑爛隱疹如錦紋或膿胜臭心胸閉悶嘔吐清水溫壯不時

葛根　知母　洗　黃芩　麻黃　去節

陳皮　杏仁　去皮尖　甘草　各等分

右每服一十錢若不嘔逆去陳皮加芍藥如吐則用之

升麻葛乾湯治發疹初起發熱咳嗽似傷寒未辨麻疹

白芍藥　川升麻　甘草　乾葛　各等分

右水煎每服二錢

化斑湯治斑疹渴熱最良

人參　知母　各一錢　甘草五分　石膏末四錢

右加粳米一撮水煎量服之

葛根橋皮湯治發斑煩悶嘔吐清汁兼治麻疹等症

葛根　陳皮　知母　炒　甘草

杏仁　去皮尖　麻黃　去節　黃芩　各半兩

右每服一十二錢水煎

玄參升麻湯治瘢疹已發未發或身如錦紋甚則語言煩躁喉閉腫痛

玄參　升麻　各等分　甘草炙各等分

右每一二十錢水煎服

烏梅丸

烏梅三十箇酒浸肉研爛　細辛　附子炮　乾薑各一兩　黃連一兩　當歸　蜀椒各四兩

右爲末烏梅肉與米飯和丸桐子大每服數丸白湯下

羌活散卽人參敗毒散加天麻地骨皮

葛根麥門冬湯方見頂陷心狂

解毒散

小柴胡湯二方見瘢疹

四物湯方見斑疹出遲

犀角湯方見頂陷心狂

升麻葛根湯方見痘寒戰

人參麥門冬湯一名麥門冬散方見發熱口渴

大連翹飲方見夾疹痘

導赤散方見痲餘之症

瘡瘍生癰毒治之

陳文箔先生云瘡瘍首尾不宜與冰噢若悞與之
致難愈蓋脾胃外主肌肉飲水過多濕損脾胃搏
於肌膚則津液衰少氣血不能周流凝結不散故
瘡痂遲落而身生癰腫也張潔古先生云癰腫發
於身前手陽明經也丹溪
先生云瘡癰多是餘毒血熱所致當分上下用藥

而以涼血爲主大便燥實加大黃如不應當分經
絡所屬血氣虛實其膿成否窮謂前症初起未成
膿者用活命飲隔蒜灸治而消之欲成膿者用四
君子湯加當歸黃芪以補托元氣大凡瘡瘍始末
皆係脾腎之氣所主若飲食藥餌一有失宜必致
多變他症凡於飲食少思肉熟脯熟者皆屬脾腎
氣虛血弱之故也宜佐以四君子加川芎當歸黃
芪升麻或飲食如常有發熱作痛亦屬氣血虛弱
餘毒爲患亦宜佐以射干鼠粘子湯若飲食如常

發熱作痛大便秘結者係屬熱毒內蘊宜用大連翹飲如或不應仍用仙方活命飲若根赤而作癢者是血虛也宜用四物湯加以牡丹皮色白而作癢者亦血虛也宜以四君子加當歸芍藥若色赤而作痛者是血熱也宜以四物湯加連翹與金銀花若腫而不潰者乃氣血兩虛之故也須用托裡消毒散若潰而不愈者皆因脾氣虛弱也宜用六君子湯以滋補之

一小兒痘毒餘焰雖

愈

一小兒痘瘡已愈兩目昏閉余用鼠粘湯加山梔龍膽犀角目開而有赤白翳佐以蛇蜕散外用一粉散而愈

一小兒痘毒潰而腫不消煩躁作渴小便如淋手數寸空此肝脾虛熱也用八珍湯加減八味左料各一劑而安又用大補湯而愈

一小兒痘毒腿膝腫此脾腎虛而毒流注也用如聖餅及活命飲四劑腫痛頓減再用益氣湯地黃丸而瘥

一小兒腿膝腫潰膿水不止脯熱體倦先君謂元氣復傷陰虛所致用補陰八珍湯地黃丸而愈

一小兒痘毒敷寒涼藥內潰不愈清膿甚多此元氣虛也朝用益氣湯夕用八珍湯各五十餘劑佐以豆豉餅而愈

一小兒腿患毒用活命飲腫痛已退肢體甚倦此邪氣去而元氣虛也用聖愈湯元氣少復用托裡散而瘥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒左耳下連項赤腫作痛此少陽膽經火症用梔子清肝湯治其母用活命飲治其子而癒後復作誤服敗毒散潰而不斂瘡口色白余用托裡散而癒

一小兒出痘七日寒熱作渴兩脇及臂外患痘行此屬膽經也挑出黑血以小柴胡湯加生地黃一劑熟渴頓止又用活命飲而癒

一小兒患此面腫肉色加故脉浮而大按之微細余謂此元氣虛而邪從之也當補元氣爲善不信反服犀角丸化毒丸而殁

神効隔蒜灸法治瘡癰大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火散用大蒜頭切二三分厚安上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸痛不止尤宜多灸小兒須將蒜切片着肉一面畧剜小空灼艾燃蒜先置大人臂上試其冷熱得宜然後着瘡上又別灼如前法試之以待相易勿令歇

仙方活命飲治瘡疔瘡毒及一切瘡毒未成即消

已成即潰此消毒敗膿止痛之聖藥

金銀花　陳皮各三錢　皂角刺炒　川山甲蛤粉炒用

乳香　沒藥各一錢　當歸　貝母

右每服五錢酒煎嬰兒毋同服爲末酒調服亦可若勢甚而邪在表者加麻黃散之而毒在內者加大黃下之當臨症制宜此解固生起死之劑但元氣脫者不治

六味活血散治癰疽瘡痛初起紅腫不散

當歸　川芎　紅花　蘇木各等分　赤芍藥　生地黃

右水煎量服之

托裡散治寒毒元氣虛弱不能潰散未成用之自消已成用之自潰

人參　黃芪炒各二錢當歸酒洗　白朮

陳皮　熟地黃　茯苓　芍藥炒各一錢五分

甘草炙五分

右三十五錢水煎服

托裡消毒散治痘毒氣血虛弱不起發腐潰收歛或蒸蒸熱肌肉不生

人參　黃芪　當歸酒洗　川芎
芍藥炒　白朮　陳皮　茯苓各一錢
金銀花　連翹　白芷各七分　甘草五分

右每服二十五錢水煎

東垣聖愈湯治膿潰心煩無寐體倦少食

熟地黃自製者佳　生地黃各一分
川芎　人參各二分　當歸　黃芪各五分

右水煎服

濟生歸脾湯治脾血虛損健忘驚悸或心氣虛不能攝血歸源以致發行或吐血下血或因乳母心脾二經有熱瘡不結痂或瘡痕赤色加柴胡山梔即加味歸脾湯

人參　白朮　黃芪　白茯苓
龍眼肉　當歸　遠志　酸棗仁炒各二錢
木香一錢　甘草五分　當歸身一錢

右薑棗水煎冊子同服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

東垣清胃散治胃經有熱齒牙作痛或飲冷作渴口舌生瘡或唇口腫痛煩連頭面或重舌馬牙吐舌流涎若因服尅伐之劑脾胃虛熱口舌生瘡或弄舌流涎或嘔吐困睡大便不實者用五味異功散

升麻五分　生地黃四分　牡丹皮各三分
當歸稍四分　黃連

右水煎服嬰兒母亦服

替針丸治寒癰膿已成不潰

陳壞米一錢　硼砂五錢　雄雀糞四十九粒
眞雄雀糞直者是也

右爲末米粥丸如麥粒大每用一粒粘瘡頭上以膏藥貼之半晌其膿自出若瘡頭透而膿不出或出而愈痛或發熱血氣虛也用托裡散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

神効太乙膏治一切瘡疽潰爛

玄參　白芷　當歸　肉桂
赤芍藥　大黃　生地黃各一兩

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右收咀用麻油四十兩入銅鍋內煎至藥黑撈去渣徐入淨黃丹一斤再煎滴水成珠捻軟硬得中即成膏矣

神効當歸膏治瘍毒津溢或湯火等症及瘡腐不能生肌收歛者

當歸　生地黃　黃蠟各一兩　麻油六兩

先將當歸地黃入油煎去渣入蠟溶化候溫攪勻即成膏矣

豆豉餅治瘡瘍腫痛或硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡毒癤用江西豆豉爲末嚥津和成餅大如銅錢厚如二十四錢置患處以艾鋪餅上灸之未成者即消已成者祛逐餘毒間有不効者乃氣血虛敗之症參朮療瘡論灸法用之

神功散治瘡瘍初起腫痛者用之可消加血竭更効

黃柏　炒爲末二錢　草烏　生爲末二兩

右用漱口水調敷常以漱口水潤之

飛龍奪命丹治瘄痘疔瘡毒痘癍或麻木嘔吐重者

昏憒咬牙
眞蟾酥乾者酒化 輕粉各一錢 枯白礬
寒水石 銅碌 乳香 沒藥
麝香各二錢 朱砂六錢 蝎牛四十二箇另研如無亦可
右各爲末入蟾酥蝎牛或加酒少許糊丸綠豆大每服一丸溫酒或葱湯送下重者外用隔蒜法灸甚者多灸或着肉灸
五福化毒丹治瘟毒實熱腫痛
生地黃 熟地黃 天門冬去心 麥門冬去心
玄參各二兩 甘草 甜硝各三兩 青黛一兩五錢
右爲末蜜丸芡實大每服一丸白湯化下
犀角消毒丸治瘟疹餘毒一切瘡毒
生地黃 荆芥 當歸 犀角屑
防風 牛蒡子炒 赤芍藥 連翹
桔梗各七錢 薄荷 黃芩 甘草
右爲末蜜丸芡實大每服一丸白湯化下
按化毒丹降火涼血解毒寒中之劑消毒丸清熱解毒破血之劑蓋小兒臟腑脆嫩元氣易傷

況痘後氣血皆虛豈能勝當此劑若胃氣一傷則未成者不能消散已成者不能腐潰已潰者不能生肌殊不知痘瘡乃臟腑所發遍身之血皆化爲膿況此方愈而患此乃脾胃虛弱肌肉消弱榮衛短濇所致治者審之

蟾蜍丸

蟾蜍一枚夏月溝渠中腹大不跳不鳴身多癩癘者

右取糞蛆一杓置捕中以尿浸之桶上要乾不令蟲走出却將蟾蜍撲死投蛆中食一晝夜以布袋盛置浸急流水中二宿取出焙爲末入麝一字粳米飯丸麻子大每服二十丸米飲下

八珍湯 方見頂陷灰白

小柴胡湯 方見瘢症加生地黃山梔

梔子清肝散 即加味小柴胡湯

十全大補湯 即柴胡梔子散 方見作痒搔破

當歸補血湯 方見腹脹氣喘

補中益氣湯 二方見寒戰咬牙

六味地黃丸 加五味子肉桂名加減八味丸
四君子湯 方見痘不厭悶亂
加味逍遥散 方見欲厭不厭
加味歸脾湯 方見痘痒
加味清胃飲 方見痘不結痂
大蘆薈丸 方見風邪搏於肌膚
人中白散
如聖餅
補陰八珍湯 三方見夾疹痘

痘疔

痘疔又謂之賊痘或二五枚或五七枚間雜于諸痘之間其色紫黯作痛不寧以致諸症蜂起不能貫膿甚至不救乃熱毒勢甚併結也用仙方活命飲如一便秘濕量加大黃遍身拘急加麻黃外必用線針挑破出黑血或吮出毒血以泄其毒餘痘纔得貫膿否則其毒無從而解必致不起如未應急用隔蒜灸若毒氣盛者或不知痛者不用蒜隔就着肉灼艾灸之若灸後瘡頭紅腫發燉用針挑

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

破出毒血灼艾尤好雖此法未出方書予屢用屢驗者世多用至實卅之類亦不可恃

一小兒有疔一枚諸症燃赤作痒而不貫先君以針挑破隔蒜炙至五十餘壯而貫又十餘壯而痛止用活命飲末二錢熱酒調服出紫血又一服疔毒悉退症漿悉貫更用犀角消毒散而愈

一小兒患症疔挑出毒血服活命飲而症愈但疔處或痒或痛用活命飲隔蒜炙而愈用參芪四聖散而愈

一小兒症內有疔數枚雖挑出毒血餘毒不解先君用仙方活命飲一劑徐徐灌之毒解漿貫而愈

一小兒患症疔遍身燃如卅毒內紫色者二枚用活命飲隔蒜炙其勢漸退又用活命飲末二錢漿漸貫更用四聖散犀角消毒散而愈

一小兒出症第七日寒熱作渴兩脇及臂外側膽經各患症疔先用針挑出黑血乃用小柴胡湯加生地黃二劑熱渴頓止又用活命飲一劑而痊

一小兒出症稠密痛甚色赤翌日變黑索水飲之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

神思稍清先用活命飲末冷酒調服二錢痛雖稍緩其痘如指色赤腫高又用奪命丹一粒腫痛十減六七又用活命飲末一服温酒調又得減二四再服而漿貫却用四聖散而痊

犀角消毒散治癍疹丹毒發熱痛痒及瘡疹等症

牛蒡子 甘草 荆芥 防風 各五分
犀角鎊二分 金銀花二分
右水煎熱入犀角傾出服

仙方活命飲

飛龍奪命丹

隔蒜炙法 三方見痘癍

四聖散 方見腹脹氣促

小柴胡湯 方見癍症

夾疹痘

夫疹乃風邪外患痘爲胎毒内發二症並作臟腑俱病也二者相襍赤暈發煩痘癍愈盛誤謂痘出太密多不可救此然乃疹夾痘也當治以人參羌活散疹毒即解痘勢亦退其元氣虧損不能結痂

當補脾胃爲急也

人參羌活散治時氣痘疹兼於發表

人參　羌活　獨活　柴胡
前胡　桔梗　茯苓　枳殼
川芎　天麻　甘草　地骨皮各二分
右入薄荷五葉薑水煎服

東垣消毒救苦湯治瘡疹悉自消化使令不出已出稀者再不生瘡十一月立此方隨四時加減通造化明藥性者能之

麻黃根　羌活　防風　升麻各五分
柴胡　川芎　藁本　葛根各二分
酒黃芩二分　生地黃二分　細辛　生黃芩各一分
黃連　酒黃栢　紅花少許　蘇木
當歸身　吳茱萸五分　白朮　蒼朮二分
生甘草一分　橘皮　連翹半分初出減出太盛者加之
右每五錢水煎熱服

人中白散

人中白煅一兩
黃栢炒黑二錢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右爲末搽口內
如聖餅治一切瘡瘍硬腫不能消散或毒不能解
散

乳香　沒藥　木香　血竭
當歸等分　麝香少許

右各另爲末酒糊和爲餅炙熱頻熨患處惡瘡
加蟾酥等分

四味肥兒丸一名小肥兒丸治食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱瘦怯遍身生瘡等症或虛

後患也
黃連炒　蕪荑炒　神麯炒　麥芽炒等分

右爲末水糊丸桐子大每服二十丸空心白湯下

加味解毒散治瘴瘧寒熱瘡疹瘡毒發熱咽痛

犀角鎊五錢　連翹炒二錢　牛蒡子炒三錢
薄荷一錢　甘草五分

右爲末每服二錢滾湯調下

補陰八珍湯 即八珍湯加黃柏知母炒黑
葛根黃連湯治珍後身熱不除
葛根 五錢 黃連 二錢 黃芩 二錢 茸草 一錢半
右水煎服
獨參湯 人參一兩 薑棗同煎
春澤湯
人參 白朮
猪苓 茯苓 澤瀉
右水煎服

大連翹飲
連翹 黃芩 瞿麥 木通
滑石 柴胡 防風 荊芥
赤芍藥 茸草 蟬蛻 山梔
右每服二錢水煎服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之十九續集

古吳薛鎧草創

男薛已編集

後學宋璞校閱

痘稠密

張潔古先生云一發稠密如針頭者形勢重也輕其表而涼其內連翹升麻湯主之然稠密之處各有經絡部分所屬額主心面主胃腹與四肢主脾胸主肝兩腋主肺下部主腎肩背主膀胱當隨見

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

症治之若面色黃大便黑煩躁喘渴或腹脹者瘀血在內也用犀角地黃湯或抱龍丸生犀角汁但根窠分明肥滿者無妨竊謂前症若屬心經用導赤散之類胃經用犀角散之類肝經用柴胡湯之類大丸稠密者熱毒熾盛也若密而不痛用東垣消毒散若密而作痛用仙方活命飲若密而小便不通用八正散若密而大便不通用承氣湯若密而惡寒發熱用麻黃甘草湯

一小兒十二歲瘡瘡稠密而痛脉洪數而有力先君用仙方活命飲一劑先出者痛頓止後出者隱於肉裏用東垣消毒散二劑隱者悉消又用活命飲一劑脉靜身安而痊

一小兒痘稠密身側尤甚煩赤呻吟飲乳不徹先君謂肝膽之火助邪為患故身側尤多乃乳母肝火傳變也用柴胡梔子散治其母子飲數滴而靨

一小兒痘瘡甚密身側尤甚貫膿不滿不紅活或少云當發於十二日余以為氣血虛弱用八珍湯加糯米百粒數劑至十五日而愈

一小兒痘密而灰白色始末悉用補托之藥安後飲食過多嘔吐面青白唇白牽動先君以爲慢脾風症之漸不信豈日手足時搐用五味異功散加木香乾薑而愈

一小兒痘稠密色赤先君以爲熱毒用東垣消毒散一劑初出者頓起後出者悉沒再劑如斯而靨一小兒稠密色黑煩躁喜冷手足並熱先君謂火極似水令恣飲芹汁煩熱頓止先用犀角地黃湯次用地黃丸料服之而愈

一小兒稠密出遲用四聖散而起發用參芪內托散而靨後發熱惡寒用八珍湯而愈

一小兒痘密而痛用東垣救苦湯一劑痛頓止用紫草木通湯而愈

一小兒痘密身痛如刺用活命飲一劑其痛即止又用犀角消毒散而愈

一小兒痘初出密痛用東垣救苦湯痛頓止又用四聖散而發用犀角消毒散而愈

麻黃甘草湯治表實痘毒燃盛稠密

麻黃　生甘草
右水煎服
柴胡梔子散 方見作痒抓破
甘桔防風湯 方見瘡咳嗽
紫草甘草枳殼湯 方見瘡端
東垣消毒散 一名救苦湯 方見瘡身痛
紫草木通湯 方見小便不利
仙方活命飲 方見瘡癰
六味地黃丸 方見瘡瘡發熱屬陰陽

小柴胡湯 方見瘧症
四聖散 方見瘡腹脹氣促
紫草散 方見頂陷心煩
抱龍丸 方見瘡癇搐
犀角消毒散 方見瘡疔
柴胡清肝散 即柴胡梔子散一方見瘡潮熱

瘡吐瀉

瘡疹方云瘡疹吐瀉蓋因脾胃不和飲食不調煩渴嘔吐泄瀉並用白术散然疹皆賴脾土脾土

實則易出易靨萬物得土氣溫煖而生吐瀉則傷脾土遂有更變之症夏月中暑煩渴瀉或腹痛或欠筋用五苓散加藿香傷食吐瀉用小異功散手足並冷者用益黃散苣蔻九頂陷灰白用木香散瘡正出而吐瀉者或見血者俱爲逆症難治竊謂前症雖因脾胃不和然邪實上焦則宜吐邪實下焦則宜瀉如吐瀉噯腐吞酸皆宜發但微甚不同耳張翼之云若痘疹吐瀉少食爲裏虛陷伏倒靨灰白爲表虛二者俱見爲表裏俱虛合用十二味異功散救之甚至囊附霊砂亦可用若止裏虛去官桂止表虛減肉苣蔻若能食便秘倒靨爲裏實而補當用錢氏及丹溪法下之皆爲能食爲裏實裏實而補則結癰毒紅活綻凸爲表實表實而補則潰爛不結痂凡痘見癍便忌葛根湯恐發表虛也如有更變當隨症治之

一小兒痘初出忽吐瀉飲乳不歌屬脾胃虛弱用人參白朮散作大劑母子並服又用五味異功散爲末時以乳調服吐瀉止而靨

一小兒出痘作瀉手足並冷用十二味異功散稍愈又用五味異功散加薑桂一劑而止又去薑加木香一劑再用參芪四聖散而靨

一小兒痘瘡愈而作瀉不食此脾氣內虛先用五味異功散而瀉止食進後又傷食吐瀉發搐仍以五味異功散加天麻柴胡而愈

一小兒痘後作瀉腹中疼痛手足並冷此脾氣虛也用五味異功散加乾薑二劑乃去薑又數劑而痛止又用六君子湯加柴胡而瀉止

益黃散治瘡疹因煩渴飲水過多而傷脾胃吐瀉

丁香　訶子　煨　青皮　陳皮
木香　各等分

右爲末每服一錢水煎

橘皮湯治嘔吐不止飲食不入

陳皮　生薑　各一錢　人參五分

右水煎作二次服之

生氣散治脾胃氣虛吐瀉肚腹膨脹飲食不化或腹痛不止

丁香　甘草各五分　白朮　青皮
木香　人參各七分

右水煎徐徐服

五苓散 方見小便不利

五味異功散 方見寒戰咬牙

對金飲治傷食吐瀉 方見不靨悶亂

豆蔻丸 方見泄瀉咬牙

十一味木香散

十二味異功散 方見發熱屬陰陽

參蘇四聖散 方見腹脹氣促

六君子湯 方見不靨悶亂

自汗

痘疹方云初起時自汗不妨蓋濕熱蒸而然也

竊謂前症因邪在經絡自能發散使邪氣外泄若見此症不當用蘇桂之屬以實腠理且自汗則痘熱已輕升麻葛根之類在所當禁恐發泄太甚則津液內耗陰隨陽散難以收靨靨後最宜審治若血虛者用當歸補血湯氣虛者用四君子加黃芪

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

氣血不足者十全大補湯若飲食自汗者異功散
楊氏云痘瘡一見紅點升麻葛根便不可用此語
甚是但此爲表虛及無表症者而論若或邪在表
痘赤綻燃者又當用麻黃甘草湯汗之腫燃作痛
者用活命飲加麻黃散之益自汗盜汗爲病不同
自汗者汗無時而自出也屬陽虛盜汗者睡則汗
出寤則干收也屬陰虛汗者血之所化陰氣不能
閉藏所以睡則汗出也痘家當以補血爲主若當
歸補血湯六味地黃丸八珍湯人參養榮湯之類
皆可因証施治又有胃虛者宜用四君及浮麥散
食積內熱者宜用四君麴蘗未屬之際恐致氣血
虛而不能結痂既靨之後尤防血脫陰虛陽無所
附矣

一小兒痘將出自汗作渴發搐此心肝二經熱甚
用柴胡麥門冬散而結靨熱症退用紫草快痘湯痘悉
見又用四聖散而結靨

一小兒痘出自汗發搐流涎此木火侮土先用五
味異功散加鉤藤鉤諸症頓減次以五味異功散

加柴胡而安

一女子出痘色赤自汗發搐作嘔此肝火侮土先用五味異功散加柴胡釣藤鉤熱搐悉愈又用托裏散漿貫而愈

一小兒痘出自汗面赤作渴手足並熱大便乾黃此腸胃皆熱用瀉黃散末一服諸症頓退又用五味異功散加山梔麥門冬而痊

人參養榮湯治氣血俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉或久病虛損口乾欬而下痢驚熱自汗

盜汗

人參　陳皮
當歸　白朮 炒
遠志 五分　熟地黃 自製
右每服二錢薑棗水煎

麻黃苦草湯

麻黃　苦草 等分

右每服一錢水煎

浮麥湯

黃芪 炒　桂心
苦草 灸 各一錢　白芍藥 炒 錢半
五味子 杵 炒 各七分

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

浮麥不拘多少 炒香

右每服三十五錢水煎

當歸六黃湯治血氣不足虛火內動煩躁自汗盜汗不止方見煩躁

痒瘍

陳文宿先生云痘瘡痒瘍若臟腑調和血氣充實外常溫煖內無冷氣必無此症設服宜利之藥所致宜用異功散治之丹溪云痘疹痒瘍者於形色脈上分之實則脈有力氣壯虛則脈無力氣怯虛痒則實之更加涼血藥實痒則大便秘結以涼藥下之竊謂前症若色赤而兼痒者屬氣虛有熱用四君四物牡丹皮色白而兼痒者屬血虛有熱用加芎歸若發熱大便秘結者用犀角消毒散發熱大便調和者用麥門冬飲寒戰渴瀉喘嗽聲啞氣急先用十一味木香散加未應用十二味異功散外用敗草散敷之若寒戰咬牙煩熱喘渴足冷厥白內陷腹脹渴瀉者皆不治

一小兒出痘六日痒瘍寒戰錢密庵謂血氣虛寒

用十一味木香散二十劑而漿貫用參芪托裏散而
靨脫後痕作痒用大補湯而痊
一小兒第七日痒塌少食手足俱冷發熱惡寒先
君謂陽氣虛寒用十二味異功散一劑而痒止又
用托裏散加肉桂四劑而漿貫用十全大補湯而
結靨後痕赤作痒此血氣虛熱用八珍湯二十餘
劑而愈
一婦人出痘熱數日而發見用紫草快癍湯雖紅
活而痒塌詢其素勤勞元氣頗不充實用八珍湯
煩熱漸止又用托裏散而靨
一小兒十六歲第九日痘塌口乾發痒手冷腹脹
先君謂脾胃血氣虛弱用五味異功散加歸芪薑
桂四劑痒漸止又用十全大補湯六劑漿貫用八
珍湯數劑而靨後遍身不時作痒或痘痕色赤用
補中益氣湯而痊
一小兒痘漿不滿面赤作痒余謂血氣虛而有熱
欲與溫補不信服清熱之藥至十二日瘡痕色赤
煩渴腹脹不食手足逆冷而歿

五味異功散治瘡瘡潰脾胃氣虛潰塌方見寒戰咬牙紫草快癍湯方見頂陷心煩四物湯方見瘡瘡出遲托裏散

犀角消毒散二方見瘡瘡

十全大補湯方見腹脹

八珍湯

十一味木香散

十二味異功散三方見頂陷灰白倒靨

丹溪先生云瘡疹倒陷因眞氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參紫草漉製治之若將成就之際却淡色者屬血虛用當歸川芎之類或加紅花紫草屬熱毒者用升麻芩連梗翹之類甚者用犀角屑大解瘡毒竊謂前症若熱毒方出忽被風寒閉塞肌竅血脉不行身體作痛或四肢微厥癍點不長或變青紫黑色者此爲倒靨若胃氣虛弱不能

補接榮衛出而復沒者謂之陷伏誤用解毒之藥必致陷塌若喜熱飲食手足並冷者乃脾胃虧損陽氣虛寒之症宜用辛熱之劑補之喜冷飲食手足並熱乃陽氣實熱之症宜用苦寒之劑瀉之外感風寒者温散之毒入腹者分利之陽氣虛者温補之外寒觸犯者薰解之陳宿灼先生用十二味異功散以頓保脾土於未敗之先實發前人之未發開萬世之矇矓也

一小兒痘將愈忽黑陷余謂氣血虛用紫草散加人參當歸又用參芪托裏散而愈

一小兒將愈而倒靨咬牙寒戰手足並冷飲沸湯而不知熱用十二味異功散一劑諸症頓退却用五味異功散倍用參朮數劑而愈

一小兒痘飲食多而作吐服朮朮九色黑將陷用五味異功散加乾薑二劑貫漿而靨

一男子發熱昏憒數日發紅點用快癍湯托裏散貫漿將靨忽發熱惡寒瘡黑倒靨手足並冷口渴飲湯此陽氣虛寒也用獨參湯四劑諸症漸愈而

癇

一小兒兼喑手足並冷余謂脾氣虛寒欲用十二味異功散不信另用雜藥而發

成都方士禹太和治痘瘡黑陷垂死者用壁間喜蛛如黃豆大者一枚擂爛一歲兒用雄黃一分二歲二分十歲者用二錢入蜘蛛內研勻用好燒酒調服愚意此即木香散異功散之類也若因陽氣虛寒不能榮運遍身以致四肢逆冷腹脹唇青黑指者宜用燒酒若因元氣虛弱色白隱於肌膚而不能起發者宜用陳酒亦不可拘泥於燒酒也若小兒未及週歲或兒大者宜酌量與之不可拘於杯許也又有一等症氣血俱虛者或色淡紅不光澤不起發或驚悸咬牙者加紫草紅花以用之

七味白朮散方見發熱屬陰陽

十一味木香散

十二味異功散二方見痘灰白色

癇爛

聞人氏云痘癇爛之症因當發散而不發散則毒

氣閉塞以致喘促悶亂不當發散而誤發散則毒隨陽氣暴出於外遍身皮膚潰爛治宜調脾胃進飲食大便調和榮衛健旺毒氣自解而無目赤咽痛口瘡吐衄等症竊謂前症若發表過甚大便自利急用理中丸以救其裏亦有寢疹如蚊所螫而色黑乃危症也若大小便秘結煩躁用山梔子湯猶猪尾血調腦子治之自利不食者不可用蓋毒發於表而妄汗之則腠理開泄榮衛益虛轉增瘡爛由是風邪乘虛變者症有之若毒根於裏而妄下之則內氣愈虛毒不能出而反入焉由是土不勝水變黑歸腎身體振寒兩耳尻冷腹合肚脹其瘡黑陷十無一生治者審之

一小兒患此發熱作渴手足並冷此脾經熱毒先用瀉黃散五分又用七味白术散而愈

一小兒患此但惡寒發熱體倦頭痛人迎脈大於寸口二三倍此風邪外傷用補中益氣湯加川芎蔓荊子愈而自厭

一小兒患此口舌生瘡手足並冷余謂此中氣虛

而內熱耳用五味異功散議論不一猶豫未服甚日腹痛口噤余用前藥更加乾薑一丁劑諸症稍緩再劑而愈

一小兒患此或痒或痛發熱口渴先用白术散次用補中湯而愈後因作課勞心發熱頭痛痘瘡燃赤用補中湯加蔓荊子及八珍湯而愈

一小兒患此作痛喜飲熱湯發熱惡寒手足並冷余謂此中氣虛而外假熱也用補中湯加參芪各三錢四劑而愈

一小兒患之多在兩脇時發寒熱此肝經之症用加味逍遙散而寒熱退又一劑而脇痛止及立效散而痊

一小兒患之作渴發熱額間爲甚此心經有熱先用導赤散毋服漸愈又用柴胡梔子散傳三黃散而痊

一小兒患之發熱作渴面白多尿脉數而無力此稟足三陰虛也用地黃丸補中湯尋愈畢姻後患瘵症服黃柏知母等藥幾危余仍用前藥而痊

一小兒患此體倦惡寒此脾胃氣虛也用補中益氣湯數劑而愈後因飲食停滯發熱而痘痕復赤先用參朮陳皮神麯山查消食仍用補中益氣湯調補脾胃而愈若誤用敗毒之劑決不起矣

一小兒痘愈後因勞痘痕作癢搔破膿水淋漓面色皎白脉浮大按之如無余用補中益氣湯漸愈或云先攻其邪其後補之乃用消風散變症汗出口噤而死惜哉

山梔子湯治痘瘡及癍毒狀如蚊蚤嚙毒盛黑色者

梔子仁一兩　白蘚皮　赤芍藥　升麻各一兩　寒水石　牛蒡子各五錢　甘草炙五錢

右爲末每服一錢水八分入紫蘇三葉煎熟生磨膿水浸淫膿流處便濕爛

黃散治痘熱生瘡膿水浸淫

松香　五倍子　黃連　海螵蛸　黃丹各一錢　輕粉　雄黃

右爲末用瑩肌散煎洗滲之乾者香油傅之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

五味異功散

補中益氣湯二方見寒戰咬牙

柴胡梔子散即柴胡清肝散

加味逍遙散方見欲醫不醫

地黃丸即六味地黃丸

七味白朮散二方見發熱屬陰陽

瀉黃散方見醫後發咽痛

導赤散

立効散二方見風邪搏於肺膚

瘡癤瘡

錢氏云瘡疹癤瘡由內相勝也惟心痒脾疹能作瘡蓋疹爲脾所主脾虛而不勝土風熱相搏而動於心神心喜熱神氣不安因瘡成癤瘡爲心所生心主熱熱生風風屬於肝二藏相搏風火相爭故發瘡當瀉心肝若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸海藏云諸痛痒瘡瘍皆屬心火無論虛實皆從心火上說脾虛則肝氣乘之與心火相合耳若脾土實心火旺而逆乘以致癤者此實邪也便結者瀉

青丸便軟者瀉心湯潔古云未出而發搐者是外感風邪之寒內發心火之熱所作也當用解毒丸犀角地黃丸主之世傳云瘡疹欲出身熱煩躁忽發驚搐宜用驅風膏小丸如聖飲小便不通八正散痰涎壅盛利驚丸抱龍丸冊溪云欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜用發散之藥竊謂前症瘡疹未見而先發搐者乃毒氣自心經出也若病勢輕緩或形氣虛弱者不宜用峻厲之劑恐元氣內損則毒氣內陷而瘡不能起發也或外感風寒之邪內因瘡疹之熱而相搏或肝血虛火動而內生風當補元氣為主佐以見症之劑然前方多峻厲之劑審有是症方可用須察其色赤白而以脾胃為主虛則用温補實則用解毒若先發搐而後發瘡多有生意瘡已瘡而發搐或吐瀉者難治

一小兒痘痂脫盡因其穢氣用葱椒煎湯浴之發搐痰喘用八珍加白殭蠶蟬蛻一劑痰喘頓止又用四君芎歸釣藤鈎而搐止

一小兒痘瘡色赤四肢發搐眉唇牽動此心肝二

經熱甚乘脾所致也用四君防風鉤藤鉤而痊

一小兒痘後四肢發搐眉稜尤動小便頻數臉目青赤此肝經風熱用四物柴胡山梔少愈但四肢倦怠飲食少思大便不實此脾氣受傷而未復也用四君升麻當歸而痊

一小兒痘後寅卯申酉時熱甚或兼搐余謂寅卯時發熱此肝火本症申酉時發搐乃肝木侮金先以四物白朮茯苓鉤藤鉤煎送柴胡二連丸而愈又用地黃丸朝用四君山梔柴胡及四君子加歸而痊

一小兒痘瘡色赤發搐痰盛服抱龍丸而頓愈又因母大怒兒仍搐母服柴胡梔子散加味逍遙散母子並愈

一小兒痘愈後發搐左額青赤唇白牽動余謂肝心二經風熱所致先用柴胡梔子散加鉤藤鉤後用加味逍遙散而搐止再用五味異功散而痘愈

一小兒痘將愈發搐痰湧頭目不清脾氣虛弱厨未侮之先用五味異功散加柴胡鉤藤鉤搐愈而

癘

柴胡二連丸治肝經實火

柴胡　宣黃連　胡黃連

各末糊丸桐子大每服二三十丸白湯下

補中益氣湯二方見寒戰發牙

六君子湯方見不癘悶亂

四神丸方見泄瀉咬牙

十一味木香散方見頂陷灰白

痘風

丹溪先生曰痘風分氣血虛實虛則黃芪生血之劑主之佐以風藥實則白芍黃芩爲君連翹白芷斷續之類爲佐竊謂前症更當分痘落已出未出兒癘未癘外邪所傷內虛火動若未出而搐搦熱毒內蘊也紫草快癍湯加鉤藤鉤已出紅綻而搐搦熱毒作痛也東垣消毒散加鉤藤鉤貫膿而搐搦血氣虛也參芪四聖散加鉤藤鉤若癘後而搐搦血氣尤虛也八珍湯加鉤藤鉤或目瞤或直視者風火相搏也柴胡梔子散或六味地黃丸加柴

胡山梔或口角流涎者木乘土也五味異功散加升麻柴胡鈎藤鈎或目赤眵淚者肝血虛而生風也四物湯加柴胡鈎藤鈎或角弓反張者水不生木也六味地黃丸加柴胡當歸隨用補中益氣湯加天麻鈎藤鈎不可直用治風之藥益風藥能燥血散氣必驗其手足冷熱溫和三症而用補瀉調理之法庶無誤矣如嬰兒當審乳毋而治之

一小兒痘瘡將愈發搐服牛黃清心丸更口噤流涎此脾胃復傷肝木所侮而涎不能歸經耳先用五味異功散加鈎藤鈎諸症頓減次以五味異功散加柴胡而安

一婦人出痘因怒發搐痘痕赤色發躁作渴面目皆赤此汗多亡陽血脫而然也先用當歸補血湯一半劑躁渴頓止又用八珍柴胡牡丹皮鈎藤鈎熟搐悉愈又用八珍湯而痊

一婦人痘瘡將愈因怒發搐口噤頭痛如裂痘痕皎白用補中益氣湯加蔓荊子鈎藤鈎頓愈又因怒發搐頭連不食先用補中益氣湯加天麻又六

君柴胡而安

當歸補血湯治瘡瘡血氣虧損發搐熱渴喜飲脉洪大而虛重按如無者方見寒戰咬牙抱龍丸治瘡瘡風熱發搐或痰甚者

膽星四兩　天竺黃一兩　雄黃　硃砂各五錢　麝香少許

右爲細末用甘草一錢煎膏爲丸每二十丸用薄荷或燈心湯化下

按前方肝經清熱豁痰利氣祛風之藥過劑則

脾肺復傷而反甚或更加脹腹作脹食少作嘔者宜用人參白朮散倍補中氣

造牛膽南星法蜡月南星中大者爲末用黃牛膽汁拌勻仍入膽殼內以線扎口懸掛當風處陰乾臘年方可用重製二十二次者尤妙

小柴胡湯方見瘧症

柴胡二錢湯方見前

六味地黃丸方見發熱屬陰

四物湯方見瘡瘡出運

十全大補湯方見腹脹氣促

瘧潮熱

張潔古先生云瘧疹未有不因潮熱而出者觀其熱之時知自何藏發出寅卯辰時屬肝出水泡巳午未時屬心出瘡瘡申酉戌時屬肺爲膿泡亥子丑時屬脾出疹子惟腎獨居腑下不受穢濁故無症耳竊謂前症當察其虛實若壯熱飲水便秘屬實熱也少用清涼飲下之發熱飲冷大便不秘屬虛熱也宜人參白朮散補之若下而發熱愈甚此陰虛而陽無所附也用四物參苓之類補之若下而潮熱面赤者血氣發躁也用當歸補血湯補之若見驚搐等症乃肝虛而內生風也用四物天麻鉤藤鉤補之用發散之劑而熱愈甚此表虛而外熱也用四君當歸黃芪補之

一小兒先潮熱午前甚面青瘧未出而熱不止或時發搐手足不熱不冷此陽明胃經症爲肝木所侮先用補中益氣湯加鉤藤鉤四劑而熱止瘧色紅活乃去鉤藤鉤又四劑而貫漿用八珍湯而痊

一小兒痘紅活寅卯時潮熱作渴此肝經風熱症用柴胡梔子散末三服熱止漿貫又用八珍湯山梔丹皮而靨

一小兒靨後潮熱手足微冷余謂胃氣虛弱用五味異功散佐以補中益氣湯而愈因飲食過度前症復作更腹脹大便不實小腹重墜此脾虛也用補中益氣湯而痊

一小兒痘後不時寒熱噫氣飲食吞酸服二陳枳實黃連更寒熱如瘧腹墜下氣此中氣復傷而下陷也朝用補中益氣湯夕用五味異功散各加乾薑木香而愈

一儒者先潮熱出痘面青脇痛此肝經之症用四君柴胡當歸山梔二劑脇痛稍緩又佐以加味逍遙散而痛止却用托裏散漿貫而靨後又潮熱用地黃丸而愈

一婦人患此誤服寒涼之劑頗躁作渴飲沸湯而不知熱脈洪數按之微細此血氣俱虛用大劑十全大補湯加薑桂四劑更惡寒咬牙此虛極而藥

力未能及也於前藥內更加附子一片二十劑諸症頓退乃去附子又二十劑將安去薑桂常服而痊

一小兒痘愈後潮熱飲食少思面色萎黃久治不愈熱後面與手足如糸余謂脾氣虛寒當用六君

薑桂不信而死手足皆黑惜哉

柴胡梔子散治痘瘡肝經有熱寅卯時發熱或寒

熱往來或發熱驚搐或咬牙不止四肢勁強方見濃水淋漓

加味逍遙散即逍遙散加牡丹皮山梔治因乳母肝脾血虛發

熱致兒發潮熱瘡不能愈者方見欲靨不靨

人參白木散

六味地黃丸二方見發熱屬陰虛

八珍湯方見頂陷陷死白

清涼飲方見大便不通

托裏散方見痘癰

十全大補湯方見腹脹氣促

四君子湯方見不靨悶亂

當歸補血湯

補中益氣湯

五味異功散 三方見寒戰咬牙

四物湯 方見痘出遲

痘吐逆

世傳方云痘瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳湯或橘皮湯半夏湯不止加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異功散吐而身熱煩渴腹滿氣促大小便澁而赤者當利小便竊謂前症若手足並冷渴飲熱湯或腹作痛中氣虛寒也宜用益黃散手足不冷吐逆痰凝中氣虛弱也宜用橘皮半夏湯手足並熱熱毒壅滯也宜用導赤散口乾飲乳不徹胃經氣熱也宜用竹葉湯吐逆不乳或吐乳酸穢此脾氣虛而乳食停滯也宜用和术丸一小兒痘不紅活手足微冷此陽氣虛弱也先君用五味異功散加乾薑肉桂二劑乃去薑桂加木香又二劑而愈

一小兒十二歲出痘第九日吐逆不食手足並冷此陽氣虛寒之極也用十二味異功散一劑頓愈

用五味異功散而安用參芪四聖散而靨
一小兒吐逆作渴手指並熱此胃經有熱也用竹
茹湯而熱稍止用人參胃愛湯而吐亦止用化毒
湯而貫膿四聖散而結靨
一小兒吐逆作瀉腹脹煩渴痘出不快手指微冷
用十味白术散而諸症退用四聖散而諸痘出用
人參蟬蜕散而諸痘靨
一小兒吐逆腹脹發熱作渴大便乾臭此因腸胃
實熱用竹茹湯加黃連枳殼諸症稍退用紫草快
斑湯瘡勢頓發如期而靨
一小兒痘出甚密悪逆飲冷手足並熱此胃經熱
甚先用葛根麥門冬散一劑熱症頓退又用瀉黃
散末一錢用米飲調服而安用白术散而痊
人參胃愛散治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲
食或吐逆等症

人參　藿香　紫蘇　甘草炒
丁香　茯苓　木瓜各等分　糯米

右每服三十錢薑棗水煎

葛根麥門冬散治熱毒斑疹頭疼壯熱必神煩悶亂逆嘔者方見頂陷心煩按此陽明胃經之藥也外除表邪內清胃火兼補元氣若非發熱作渴表裏俱虛而發熱作渴宜用人參麥門冬散

七味竹茹湯

橘紅　半夏　各等分　白茯苓　二分　甘草　竹茹　黃連薑炒　葛根　各二分

右薑水煎服

人參蟬蛻散治小便不利痘瘡不發煩躁作渴咳牙喘滿

人參　蟬蛻　赤茯苓　甘草　白芍藥　木通　紫草茸

右每服二十四錢水煎

橘皮半夏湯

橘皮　半夏　等分

右每服二十錢薑水煎

化痘湯方見水痘麻痘

紫草快癍湯方見痘陷心煩
六君子湯方見痘腹脹
導赤散方見風邪搏於肌肉
十一味木香散
十二味異功散二方見痘灰白色
六味地黃丸
七味白朮散二方見發熱屬陰湯
四聖散方見涕唾稠粘
五味異功散方見寒戰咬牙

痘疹方云痘瘡未出之先咳嗽升麻湯頭疼身熱
嗽或屬後餘毒咳嗽惺惺散瘡不起發升麻湯感
寒頭痛悶亂咳嗽木香散發熱嗽甚別無他症生
地黃散風熱咳嗽五味子湯咽喉不利芎桔防風
湯竊詳痘疹未出欲出之際乃熱毒上薰清道肺
氣不寧宜用惺惺散若已出之後則屬元氣虛弱
不能固衛腠理風邪乘虛而襲宜用五味異功散

加桔梗五味子以補脾肺

一男子咳嗽嘔噴腮頰赤目胞皆赤遍身赤瘡余謂此心臟痘疹彼疑惑而未用藥旬餘皆紅活起發余謂既紅活起發不必服藥至十七日大便下血膿瘡痂而痊

一小兒痘赤壯熱咳嗽痰甚煩熱作渴用人參清膈散一劑諸症頓退日用芹菜汁旬餘而膈

一小兒痘漸愈咳嗽肺脈大而無力用參蘇飲咳嗽漸愈因母飲酒又復咳用五味異功散加桑白

皮杏仁山梔母子並服而愈

一小兒痘瘡十二日患咳嗽嘔痰胷中隱痛肺脈數滑余曰此兼患肺癰也當用桔梗湯不信翌日果吐膿血用桔梗湯而愈

一小兒十四歲痘愈後咳嗽脈數而無力朝用補中益氣湯夕用六味丸料各數劑漸愈畢姻後咳嗽發熱仍用前藥及八珍等藥而痊

一小兒痘將愈咳嗽面色黃白嗽甚則赤用五味

生地黃散治小兒斑疹身熱口乾咳嗽心煩等症

生地黃半兩　杏仁　甘草炙二錢半　麥門冬去心七分

右每服二十五錢水煎徐徐服兒大加之若痰氣痘熱內作宜用桔梗甘草防風湯若痰上壅者佐以抱龍丸

桔梗湯治久嗽肺氣傷而吐痰有血痰或腥穢或咳吐膿血肺癰等症

桔梗炒　貝母去心　知母　桑白皮

枳殼各一錢　地骨皮　瓜蔞仁　薏苡仁　杏仁各五分　黃芪微炒　當歸各一錢　五味子一錢半　百合炒五分　防巳炒一錢　甘草炙五分

右每服三十五錢水煎服

甘桔防風湯治痘症餘毒瘡毒咽痛

桔梗　甘草　防風

右水煎服

六味地黃丸

七味白朮散二方見發熱屬陽

五味異功散
補中益氣湯
當歸補血湯 三方見寒戰咬牙
十六味清膈散 即人參清膈散
方見頂陷心煩
惺惺散 方見癍症
五味子湯 即小柴胡湯加五味子
參蘇飲 方見涕唾稠粘

喘症

症形方云若症癒已出未醫之間喘渴白朮散甚

者木香散收盡後腹脹喘渴大便利小便澀葶藶
木香散喘嗽五味子湯喘渴屬後餘毒不除大便
堅實前胡枳殼散頭疼身熱惡寒微喘是有表邪
也用參蘇飲竊謂前症若因脾肺虛弱宜用白朮
散脾肺虛寒宜用木香散熱毒內蘊紫草甘草枳
殼湯風邪外感用參蘇飲內外壅滯人參清膈散
大便自利小便澀滯葶藶木香散大便堅實前胡
枳殼散
一小兒痰喘症赤作痛熱渴喜飲冷水大便不利

此胃經實熱先用前胡枳殼散諸症漸退又用犀角地黃湯而醫

一小兒面赤有痰口乾作渴右寸口脉洪數此心火刑肺金用人參平肺散一劑又用地黃丸料四劑而痊

一小兒痘赤而痛喘嗽作渴脉洪數左尺右寸爲甚此腎火上炎乘肺爲患用地黃丸料煎與恣飲如期而醫

一小兒十四歲痘方愈而喘促咳嗽余謂脾肺氣虛用五味異功散而安用補中益氣湯而痊

一男子出痘愈而喘嗽面赤服參蘇飲面色痘痕皆白此脾肺氣虛而復傷也用補中益氣五味異功散而痊

一小兒喘渴面白手足時冷此脾肺氣虛用人參白朮散五味異功散而愈

一小兒痘將愈喘渴腹脹大便不結小便澁此脾肺氣虛而然也先用葶藶木香散又用人參白朮

散而愈

一小兒痘出氣喘大便秘結手足並熱作渴飲冷用前胡枳殼散而安但飲食少面白此邪氣去而真氣虛也用補中益氣湯五味異功散而愈

一小兒十四歲痘方愈而喘手足不熱余謂脾肺氣虛用補中益氣湯而愈後停食發熱手足不冷余謂脾胃虛熱而喘嗽用五味異功散二劑而熱退又用補中益氣湯而愈

一小兒痘瘡狂喘躁熱作渴飲冷痰涎不利先吉

謂熱毒壅滯用人參清膈散犀角地黃湯各一劑頓愈又用當歸補血湯而愈

一男子痘愈而喘嗽面赤服發表之劑喘嗽益甚面色痘痕皆白手足並冷余謂脾肺之氣復傷而虛寒也用補中益氣湯加乾薑二劑元氣漸復却佐以八珍湯而痊

一男子痘愈而患喘發熱惡寒余用十全大補湯不信反服清熱之劑汗出如雨身熱如炙面目痘痕如赤余曰汗多亡陽而虛熱也不信後果發

六味凉血消毒散

牡丹皮　當歸

犀角 如無用升麻

右每慶三錢五錢水煎ス

紫草茸草枳殼湯

紫草　茸草

右每服一二錢水煎ス

枳殼 各等分

五味子湯

參蘇飲

生地黃　赤芍藥

生甘草 等分

前胡枳殼散 三方見涕痰咳嗽粘

六味地黃丸

八參白木散 一名七味白术散 二方見發熱屬陰陽

聖濟犀角地黃湯

人參清膈散 即十味清膈散 二方見頂陽心煩

十一味木香散 方見痘灰白色

葶藶木香散 方見脹脹氣促

保嬰撮要卷之十九 終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

保嬰撮要卷之二十 續集

古吳薛鎧草創

男薛已編集

後學宋璞校閱

小便不利

痘疹方云痘疹未出之先熱盛恐欲赴驚小便不利遵赤散微解之熱入膀胱如有血淋犀角湯初出不快小便赤色生聖散已出未愈之間白木散或五苓散加木通收靨之後小便不利煩熱而渴

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

猪苓湯(一)(二)(三)謂前症當分(四)所因若小腸熱結(五)用導赤散肺經熱(六)用柴胡麥門冬湯脾經熱(七)用犀角湯肺經熱(八)用生地黃湯腎經熱(九)地黃丸屬後氣血虛弱(十)用五味異功散

一小兒小便不利口舌生瘡乾渴(一)用導赤散加味四物湯而膿貫(二)又用白术散去木香治之而愈

一小兒小便不通口舌如靡作(三)渴面赤左尺脉數此膀胱熱結先用五淋散而小便利(四)又用地黃清肺飲參苓四聖散而愈

一小兒小便數(一)而欠利面赤口渴雨足發熱此亷陰虛(二)也地黃滋腎二十九煎服(三)用四劑而愈又用地黃丸料加黃芪當歸而全愈

一小兒痘將愈小便不利服五苓散之頻小便愈少喘咳嗽痰此脾肺復傷(一)也先用補中益氣湯二十劑送滋腎丸却用(二)補中異功二藥而痊

八正散治下焦積熱大小便不通(一)或小便淋澁脈症俱實(一)者

大黃酒炒　車前子炒　瞿麥　甘草

山梔炒　木通各一錢　滑石煅二錢　甘草一錢

右每服二錢水煎

滋腎丸

黃柏炒黑　知母炒黑各二兩　肉桂二錢

右爲末水糊丸

益元散治澁滯初起煩躁作渴小便不通

滑石六錢　甘草一錢

每服五六分白湯調下

導赤散治小腸實熱生瘡作渴發熱小便秘赤或小便不利者方見作搽破

柴苓湯治疹瀉小便不利方見斑症

五苓散

茯苓　猪苓　白朮　澤瀉各等分

肉桂減半

右爲末每服四分白湯下

黃芩清肺飲

黃芩炒　山梔炒等分

右每服二錢水煎

生地黃湯

生地黃五錢 麥門冬七錢 杏仁去皮尖二錢
款冬花 陳皮各三錢 甘草二錢五分

右每服二十三錢水煎入紫草木通湯治之瘄疹出不快小便不利

紫草 人參 糯米各等分 甘草減半 木通 茯苓

柴胡麥門冬散方見作痒抓破

犀角湯方見頂陷心煩

生犀散方見瘄出遲

加味四物湯方見痘入目

白术散即七味白术散

六味地黃丸二方見發熱屬陰陽

瘄便血或黑糞

聞人氏云瘄瘡大便下血或黑糞若膿而不膿是爲惡候乃內熱盛也用犀角地黃湯抱龍丸小柴胡湯加生地黃主之竊謂前症若寒熱作渴小柴胡加生地黃發熱體倦用五味異功散加當歸乾作渴用人參白术散大凡作渴引飲發熱者屬

實熱作渴飲湯手足不熱者屬虛熱手足逆冷者屬虛寒治者審之

一小兒出痘便血痘赤痛如錐或瘡內出血余謂肝火熾盛用小柴胡湯加生地黃一劑隨用犀角地黃湯一劑而痊

一小兒痘瘡下血且不起發先君謂氣血不足用紫草快癍湯加參芪歸朮一劑頓止瘡頓起用八珍湯而愈

一小兒痘瘡下血小便赤色瘡色如豬發熱飲冷二便不利先君謂心小腸實熱用八正散後用解毒防風湯及飲芹菜汁而痊

一小兒痘疹便血倦怠作渴飲湯余謂倦怠便血脾虛下陷也少食作渴津液枯涸也用五味異功散加紫草而愈

一小兒便血腹脹困倦身熱口乾飲湯四肢逆冷先君謂脾氣虛寒不能攝血用五味異功散加丁香炮薑二劑血止痘貫而厭厭

一小兒痘將愈而便血面白惡寒大便欲去而不

去余謂此元氣虛而下陷也用益氣湯不信服涼血之劑致吐瀉腹痛而殁

一小兒痘將愈患便血面白惡寒手足並冷脉細如無余謂陽氣虛寒欲用人參薑桂不從翌日而死手足青黑惜哉

解毒防風湯治痘瘡毒氣熾盛便血

防風　地骨皮　荆芥　牛蒡子　各等分　黄芪　白芍藥炒

右每服四錢水煎或爲末白湯調下

紫草快癍湯治痘疹下血不能起發出不快色不紅活等症即紫草湯方見頂陷心煩

聖濟犀角地黄湯治熱毒內蘊煩躁作渴面色赤大便黑屎或神昏便血方見頂陷心煩

小柴胡湯治肝經有熱不能藏血而便血多方見痘身疼

五味異功散治脾胃氣虛不能統血而大便下血多方見寒戰咬牙

八珍湯治氣血不能攝血而便血多方見頂陷灰白

八正散治心小腸有熱小便赤澁大便下血多方見痘小

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

便不利

七味白术散 即人參白术散方見痘發熱痘瘡燉裂出血

聞人氏云痘瘡大便不通小便如血或結癰毒身痘破裂乃肉火熾盛失於解利急用犀角地黃湯小柴胡湯加生地黃四順飲之類治之竊謂前症若心脾熱盛用犀角地黃湯心肝熱盛用小柴胡湯加生地黃四順飲次用犀角湯加生地黃若大便不通先用四順飲次用犀角湯若色赤燉痛二便不通急用活命飲加硝黃若因乳母怒火用加味逍遙散加味小柴胡湯二劑諸症漸退又用加味逍遙散一小兒痘根赤色寒熱作痛此肝經有熱也先用一劑而貫膿末用八珍湯而靨一男子痘根赤痛發熱作渴服紫草飲痘裂出血余謂心肝二經風火相搏先用小柴胡湯加生地黃犀角二劑用聖濟犀角地黃湯而愈一小兒患前症大便不利小便赤澁作渴飲冷先

君謂脾胃實熱先用涼膈散一劑漸愈又用犀角地黃湯芹菜汁而痊

一小兒患此診乳母有鬱火用加味逍遙散加味歸脾湯而痊同時患是症而用雜藥者俱致不救涼膈散治上焦實熱煩渴面赤咽燥喉痛便溺赤澁狂言譫語睡臥不安

大黃　朴硝　甘草　連翹

山梔　黃芩　薄荷葉　各等分

右爲細末每服少許煎竹葉蜜湯調乳母同服

加味清胃散方見痘癮

加味逍遙散方見痘潮熱

犀角地黃湯方見頂陷心煩

加味小柴胡湯即小柴胡湯加山梔生地黃方見痘身疼

八珍湯方見頂陷灰白

聖濟歸脾湯方見痘癮

痘衄血吐血

痘疹方云若痘發之際正宜微見與發汗同體然血與汗雖殊其源則一蓋痘疹乃穢血所發邪結

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小兒出痘三十四日大便下血日有數滴至二十八日不能止瘡不能起御醫錢春林謂其脾氣虛寒用木香散二劑加丁香十一粒人參五錢次日痘起有膿血是血止二十餘日而愈

一小兒痘瘡紅活但不時作痒口渴便血面赤先君謂腸胃有熱用聖濟犀角地黃湯加柴胡二劑諸症漸退用四君加當歸紅花而愈

一小兒痘瘡赤痛煩熱作渴或便血衄血先君用犀角地黃湯而血止又用紫草快斑湯而痛愈後

肺胃毒氣自然上越也若見此症不可妄投以藥恐治失其宜療黃者不出而已出者復傷反生變症也若作渴飲冷手足並熱此毒氣熾盛而血上溢也宜用聖濟犀角地黃湯若肺經熱毒而鼻衄用地黃清肺飲胃經熱毒而吐血亦用聖濟犀角地黃湯若腸胃熱毒而便血亦用之作渴飲湯手足不熱者脾肺氣虛不能攝血而妄行也宜用五味異功散若出血作渴煩躁面赤色者血脫也宜用當歸補血湯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

瘡痕色白用四君黃芪當歸而痊

一小兒衄血右寸脉數此肺金有火也用瀉白散而血止但四肢倦怠用益氣湯而愈

一小兒痘痛赤色吐血發熱此胃經熱毒也先用聖濟犀角地黃湯諸症漸愈又用五味異功散而痊

一小兒痘後衄吐面色黃白因脾肺氣虛弱用麥門冬散而愈後因勞衄血發熱痘痕赤色用四君歸芪而衄血止用五味異功散而熱退

一小兒痘後衄血發熱則痕赤熱止則痕白此脾胃氣虛也朝用補中益氣湯加乾葛夕用五味異功散加當歸而愈

一小兒痘後衄血頭連唇白惡心此中氣虛而清陽不能上升也用補中益氣湯加蔓荊子稍愈去蔓荊子又數劑而痊

一小兒痘後非衄血即便血痘痕赤白靡定手指冷熱無常余謂此元氣虛而無根之火倏往倏來也朝用補中益氣湯夕用五味異功散各二十餘

劑而愈後因勞心復發仍用前二藥爲主佐以十全大補湯而愈

瀉白散

桑白皮炒　甘草　地骨皮

右每服一二錢水煎

人參竹葉湯治虛煩不得寐或兼自汗

人參　竹葉　甘草各一錢　半夏二錢五分

小麥　麥門冬各一錢半

右每服一二錢薑一片粳米一撮水煎服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

八珍湯

十一味木香散二方見頂腰膏灰白

五味異功散

當歸補血湯二方見寒戰咬牙

紫草快癍湯方見便血屎黑

四君子湯即六君子湯去陳皮半夏

十全大補湯方見腹脹氣促

痰煩躁

東垣云火入於心則煩入於腎則躁皆心火爲之

盞火旺則金爍水虧故心腎合而爲躁也宜用梔子豆豉湯凡瘡瘡盛作之時必令心火有所導引苟或毒氣出而未盡遂生煩躁以生黑豆煎湯或生犀磨汁飲之亦可若津液不足虛煩不得臥者活人酸棗仁湯此症多因脾胃氣虛或服劑伐之劑所致但當調補中氣爲善

一小兒患此飲冷不止或作脹痛余謂胃火所致用犀角地黃湯片萊汁而頓愈

一小兒煩躁作渴飲冷不止先君謂脾胃熱毒用犀角地黃湯而愈後復作喜飲熱湯面白赤色用當歸補血湯而痊惟倦怠少食用白朮散而愈

一小兒貫膿之際煩躁不寧肝脾脈數用聖濟犀角地黃湯一劑稍止用八珍湯加牡丹皮而止又二劑漿漸貫却用內托散倍用參芪歸朮而靨

一小兒痘將貫膿煩躁面赤脈數大而虛此氣血虛也先用參芪四聖散又用當歸補血湯而愈

一小兒出痘煩躁作渴面赤口乾脈洪而大按之無力兩尺爲甚此稟腎不足陰虛而火動也用大

劑地黃丸料加五味子煎與恣飲諸症頓減乃佐以補中益氣湯一劑痘齊乃用參芪四聖散而靨

一小兒出痘煩躁作渴飲湯面肖赤色脉數無力兩尺爲甚此禀足三陰虛也用益氣湯及地黃丸料加五味子大劑始末服而靨

一男子出痘煩躁作渴虛症不能悉舉先君用益氣湯地黃丸料加五味子各三十餘劑更用人參五觔煎湯代茶飲兩月餘而靨又用歸芪參朮各數斤半載始能步履得元氣充實且慎調攝而痊

一小兒十五歲痘將愈忽而煩躁脉數而無力勞則益甚且無寐或驚悸余用歸脾補中一湯漸愈後因勞仍作或用四物化痰之劑前症益甚更發熱惡寒頭運而殺

一小兒痘愈後煩躁面赤脉洪大按之如無余謂血虛朝用補中湯夕用歸脾湯將愈因飲食過多功課勞心吐瀉腹痛頭運惡寒反服藿香正氣散發熱如炙汗出如雨手足並冷而殺

一活人酸棗仁湯治痘痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁炒 茸草炙
麥門冬去心 川芎
右水煎服見大便倍之

梔子豆豉湯

山梔四箇 豆豉半兩
右水二十盞先煮梔子二十盞內豆豉煎至七分去滓溫服得快吐即止後服

當歸六黃湯治血氣不足虛火內動或煩躁盜汗不止

知母炒 白茯苓
乾薑炒各三分

當歸 熟地黃
黃芩 黃連
右每服二五錢水煎

八珍湯治氣血俱虛或用剋伐之劑脾胃虛損肌肉消瘦發熱惡寒飲食少思等症方見頂陌白

黃芪炙 黃柏炒黑
生地黃

補中益氣湯

當歸補血湯二方見寒戰咬牙

六味地黃丸方見瘧發熱屬陰陽

聖濟犀角地黃湯方見頂陌心煩

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

內托散 即托裏散
方見痘癮

七味白术散方見痘發熱屬陰陽

痘腹痛

婁全善先生云痘腹痛多是熱毒爲患當臨痘消息之又云痘出腹痛或身痛脉洪數者用解毒凉藥加芍藥甘草草竊謂前痘若痘未出而發熱煩躁或作渴飲冷大便堅實此熱毒壅滯也用疎利之藥若痘已出而不熱躁不飲冷大便不實此元氣虛弱也用白术散之類補之若噯腐吞酸大便穢臭乳食停滯也用保和丸消之凡腹痛作渴飲冷手足並熱者屬實熱作渴飲湯手足並冷者屬虛寒虛寒者當温補脾胃虛弱者當調補脾胃

一小兒善食作渴腹痛便秘痘痕赤色先用加味四物湯而愈後仍痛惡食此脾胃受傷用白术散而痊

一小兒痘將靨腹脹發熱面赤午後益甚按其腹不痛余謂脾虛用五味異功散而痊

一小兒出痘腹痛大便似痢寒熱往來余以爲脾

氣虛用白术散而痊

一小兒出痘腹痛作渴飲食如常光澤紅活此胃經實熱先用瀉黃散一劑頓安又用白术散而痊

一小兒痘後腹痛作渴飲冷便秘用清凉飲末五分頓安後腹痛吐瀉發搐用白术散加鉤藤鉤而愈

一小兒出痘腹痛嘔吐腐吞酸此飲食停滯先用保和丸一服續用五味異功散而痛止又用托裏散而靨

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

人參理中湯治脾胃虛寒胸膈痞滿或心腹疼痛痰逆嘔吐少氣或霍亂吐利手足厥冷不喜飲水加附子名附子理中湯

人參　白术　乾薑炮各等分　甘草炒減半

右每服三錢水煎或研末白湯調下

一味異功散治小兒諸般鈎症角弓反張胸膈臍凸以透明沒藥爲末薑湯調下

桔梗枳殼湯治氣壅痞結腹脇疼痛

桔梗　枳殼炒各一兩　甘草炙

右每服一二錢薑水煎

七味白朮散治脾腹作痛和胃氣生津液若脾胃氣虛作渴飲湯或因吐瀉津液虧損煩渴引飲或脾胃氣虛腹脹瀉渴弄舌流涎手足指冷並宜服之以温補脾氣化生津液方見發熱屬陰陽

保和丸治飲食停滯腹痛或惡寒發熱不可多服

神麯炒　山查　半夏　茯苓
陳皮各一錢　連翹　蘿蔔子各五錢

右爲末粥飯丸小豆大每服一二十丸白湯送下化服亦可加白朮名大安丸

六君子湯治脾胃氣虛肚腹作痛或吐瀉不食或咳虛痰喘氣促惡寒或肝虛驚搐眩暈自汗諸症並宜服卽四君子湯加陳皮半夏方見不屬悶亂

瀉黃散方見痘瀉渴

五味異功散方見寒戰咬牙

聖濟犀角地黃湯方見頂陷心煩

托裏散方見痘癰

四物湯方見痘瘡出遲

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

清涼飲方見瘡大便不通

瘡腰痛

經曰腰者腎之腑若瘡落而見前症者皆因腎經虛怯相火內燥眞陰不能勝邪故腰作痛也急服地黃丸以防變黑歸腎乃克有濟大抵此瘡因眞賦腎家精氣不足故目睛多白俗謂之拆腰瘡是也若平素面白眼白睛多行遲語遲者出瘡必歸腎經預爲調補腎氣庶免此患

一小兒十三歲眼睛多白或時面赤常患頭痛尺脉洪數先君謂稟腎氣虛用地黃丸料煎服而愈至十五歲出瘡先君云須多服前藥仍用地黃丸益氣湯更作倦怠乃以地黃丸大劑煎與恣飲又用大劑八珍湯瘡漸出如式恪服前藥至暮歲二十藥計十七斤餘而愈先君每見嬰兒白睛多面色白或色赤令其預補脾腎以防出瘡但信者少耳

一小兒出瘡腰痛足熱發渴此稟腎虛火動也先君用大劑加減八柴九料煎與恣飲諸症漸退佐以大劑八珍加紫草糯米數劑膿漸貫仍用前藥

而結痂用八珍湯而靣

一小兒出痘將愈因停食泄瀉作渴腰痛此脾腎虛弱也先君用加減八味丸料及五味異功散渴瀉頓止又與六味丸料及八珍湯而靣

一小兒出痘愈後腰足作痛此禀足二陰虛也用六味丸料煎服及補中益氣湯而愈後又傷食作瀉腰痛用四神丸六味丸而愈

一小兒面色常白目睛多白時常腰痛雨足時熱冬不衣綿年九歲先君謂禀腎虛令每日服地黃丸至十歲出痘腰痛發渴面赤飲冷用地黃丸每劑加肉桂半錢煎與恣飲數劑之後熱渴頓止腰痛頓愈却去肉桂仍與服之至五十餘劑而靣

一小兒痘愈後腰痛口渴雨足生瘡飲水不絕此禀足三陰虛先君用地黃丸益氣湯至畢姻後不愼起居復患瘡癤以致不起

一小兒面素白發熱作渴或面生瘡先君謂腎虛用加味地黃丸補中益氣湯而愈後出痘腰痛仍用前藥而痊次年畢姻患腎瘍而卒

加味地黃丸

熟地黃酒浸蒸九晒乾　山茱萸肉
熟地黃酒浸蒸九晒乾　澤瀉
乾山藥　五味子炒各四兩
白茯苓　牡丹皮　鹿茸炙各三兩
肉桂厚者去皮取肉一兩發熱者以此加之引虛火歸腎經而熱自止也

右各另爲末入地黃和勻量入米糊丸服煎服更好

六味地黃丸方見發熱屬陰陽

五味異功散

補中益氣湯二方見寒戰咬牙

八珍湯方見頂陷灰白

八味丸即六味丸加附子肉桂各一兩

二神丸

四神丸二方見痘作瀉

痘面青

聞人氏云痘疹屬火痘其面色赤者爲順甚者爲熟若肝木尅制脾土致面色青者是爲逆也急用四君升麻柴胡調補脾胃色正纔治竊謂前症若

傷食而嘔吐搐搦脾氣受傷而瀉利搐搦或厥逆皆慢脾風之漸也用人參理中湯加柴胡鉤藤鈎治之或有少誤多致不起若有疳毒內外欝蒸發出遇風寒相搏凝滯於肌肉遍身皮膚青色者用透肌散胃傷則生風嘔吐脾傷則生風厥逆用五味異功散加天麻若瘡密熱盛便秘飲冷面赤者用犀角解毒散貫衆煎之後發熱煩躁作渴面赤者用當歸補血湯足熱腰疼目睛赤者地黃丸皆要法也

一小兒疳瘡紅活起發因飲食過多吐瀉腰痛唇面青色手足並冷此脾胃虛寒而受鬼也先君用六君薑桂一劑前病不退疳色欠赤再劑加附子二分諸症頓退豈日用參芪四聖散一劑將愈更用八珍湯內參芪各五錢四劑而靨

一小兒出疳飲冷過多腹痛面青手足並冷此寒邪傷脾而虛寒也用附子理中湯一劑而痛止用人參一兩薑一錢二十劑而膿貫又用人參煎湯代茶與飲月餘而靨

一小兒出痘面青腹痛手足並冷此脾氣虛寒也先用五味異功散加木香肉桂又用內托散參芪四聖散實膿痂靨

一小兒出痘面青腹痛手足並冷此脾土虛寒也先服益黃散末三錢再以六君木香而安又傷食作瀉面青用五味異功散而痊

一小兒出痘面色青手足冷此寒水侮土非六十二味異功散不能救不信乃服疎通之藥殺而泻身皆青悔無及矣

六君子湯

四君子湯二方見不靨周亂

人參理中湯加附子名附子理中湯方見痘腹痛

五味異功散

當歸補血湯二方見寒戰咬牙

內托散即托裏散方見痘癰

十二味異功散方見頂陷灰白

參芪四聖散方見腹脹氣促

六味地黃丸方見發熱屬陰陽

犀角地黃湯方見頂陷心煩

瘡瘢赤

瘡瘢赤白各有所因治法亦異凡瘢赤而作痒血虛而有熱也用四味牡丹皮赤而作痛餘熱也用四君連翹金銀花若發熱而大便調和者脾胃虛熱也用五味異功散若發熱而大便秘結者腸胃內熱也用聖濟犀角地黃湯若母有厥火用加味逍遙散若母有鬱怒用加味歸脾湯佐以加味逍遙散治之瘢白者多屬氣虛而血衰也宜固元氣爲本痒而作渴者氣血俱虛也十全大補湯之類乳食減少四肢倦怠者中氣虛也五味異功散之類氣虛發熱者補中益氣湯之類血虛發熱者當歸補血湯之類須參兼變之証治之此症若服藥而漸紅活者可治色不轉者不治雖經年後多患瀉痢而死若妄投攻伐禍在反掌

一小兒瘡瘡如期而愈瘢赤如赭余謂此乳母有熱也診之果有肝脾鬱火先用加味逍遙散四劑與母服之子各飲少許而並愈

一小兒痘瘢色赤作痛熱渴喜冷大便不利先用前胡枳殼散便利渴止再用聖濟犀角地黃湯而安又用芹菜汁而靨

一小兒痘瘢色赤大便不利小便赤澁作渴飲冷此上焦實熱也先君用瀉黃散一劑頓愈又用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊

一小兒痘愈而瘢赤作痛內熱作渴一便不利先君謂胃經熱毒用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊

一小兒痘瘢色白時痛痒作渴飲湯大便稀溏此脾胃虛熱也用五味異功散加當歸黃芪而痊

一小兒十六歲痘瘢白用獨參湯數斤色漸如舊又用地黃丸大補湯而安

一小兒痘後因母怒瘢赤時或作痛先用加味小柴胡湯加味逍遙散治其母而愈

一小兒因乳母食膏粱之味痘瘢色赤用清胃散治其母而兒自愈

一小兒痘瘢色白作痒發熱大便不實諸藥不應

余用五味異功散每劑用人參一兩四劑之後其熱稍退仍用前藥兼服四神丸而愈

一小兒痘瘢白色時或作痒先君謂氣血俱虛不信反服解毒之藥後變慢脾風而歿

一男子患此色白作痒搔破膿水淋漓惡寒體倦余謂脾肺氣虛不祛風敗毒果發搐而死

一小兒患此惡寒發熱或痒或痛或白或赤余謂氣血俱虛不悟反降火祛風發痙而死

一小兒痘瘢色白服补伐之劑致瀉不止余謂此脾氣下陷也不信果歿遍身如白傅粉信氣虛矣

葛花解醒湯治乳母酒醉後乳兒遺熱爲患

白豆蔻 砂仁 葛花各五錢 乾生薑 白术炒 神麯炒黃 澤瀉各二分 白茯苓 陳皮 人參 猪苓 木香各五分 青皮二分

右爲末每一錢白湯調服

四順清凉飲治血脉壅實臟腑蓄熱頰赤作渴五心煩熱睡臥不安四肢驚掣或頭面生瘡目赤

咽痛痘疹餘毒方見大便不通
四君子湯方見不屬閉亂
加味逍遙散方見痘潮熱
獨參湯
十全大補湯二方見腹脹氣促
四物湯方見痘出遲
犀角地黃湯即聖濟犀角地黃湯
方見頂陷心煩
前胡枳殼湯方見痘淋哯
瀉黃湯方見痘渴瀉
六味地黃丸方見發熱屬陰陽
五味異功散方見寒戰咬牙
聖濟歸脾湯
清胃散二方見痘癍
痘瘡
王海藏先生云痘疹初出後聲音洪亮形病而氣不病也痘疹未發聲音不出形不病而氣病也若珍既發聲音不出形氣俱病也宜用八風湯或涼膈散去硝黃主之竊謂形前症若心火上炎刑藥

金者宜用人參平肺散若津液不足虛火薰蒸者宜用六味地黃丸凡小兒面素白善哭足熱腰痛或解顱面白黑睛淡者出腎虛疸面青善怒或兩顴赤者出肝腑虛也益邪之所湊其氣必虛當頂為調補若在乳下尤當補其母及慎飲食起居為善此余之親驗者也

一小兒仲冬出疸呻吟煩躁煩痛作渴音啞而實先君謂心肺實熱之症令急與水飲之遂瀉啜如定大便稍和更食梨子數枚得生夫梨者利也能令人作瀉令食之而安乃內有實熱而應用也

一小兒疸愈而聲瘖面赤足心發熱小便赤少先君謂腎經虛熱用地黃丸益氣湯而愈其時患是症者用清熱解毒之藥俱致不起

一小兒疸愈而聲瘖面白兩睛多白兩足發熱作渴飲湯脉浮數左尺更數而無力余謂稟腎經陰虛朝用益氣湯夕用地黃丸加五味子兩月餘聲漸出又服兩月餘而愈

一小兒出疸聲瘖脉息如前余用前藥治之聲漸

復清又飲食過多泄瀉復瘧朝用益氣湯夕用異功散地黃丸聲始如舊

一小兒瘧後聲瘖半載以爲廢人余詢之但云頭運其聲即瘖脈浮而緩按之不及兩寸此中氣虛不能上接清陽之氣耳用補中益氣湯地黃丸俱加五味子不半載聲音漸復

一男子瘧後患瘖惡寒體倦勞則頭運余謂元氣虛而不能上升不信乃服清痰降火之藥而歿

一小兒十四歲瘧後勞而喉瘖頭運脈洪數而無力惡寒發熱大便欲去而不去余謂元氣下陷也宜用益氣湯不悟乃雜用疎導之藥泄瀉不止而歿

八風散 即八風湯

藿香	半兩去土	白芷	一兩
甘草	炙二兩	人參	二兩
羌活	三兩	防風	三兩

右爲末每服入薄荷少許煎湯調服

涼膈散 方見瘧瘧燥裂

人參平肺散 治心火剋肺金而聲瘖 方見頂留心

六味地黃丸治腎虛聲瘖方見發熱屬陰虛門
補中益氣湯治中氣不足不能上接清陽之氣而
瘖
五味異功散二方見寒戰咬牙

瘖瘡痛

王海藏先生云瘖瘡出而煩痛用木香五物主之
更用芒硝爲末以猪膽汁調敷之若身後痛屬膀
胱經也用羌活荆芥甘草湯身前痛屬陽明經也用
升麻葛根紫草湯身側痛屬膽經也用連翹防風
湯四肢痛屬胃經也用防風芍藥甘草湯以急止
之蓋恐呼號傷氣恐痛傷血而變症也若熱毒盛
者用東垣消毒散或仙方活命飲食鷄魚蒲萄酒
物者用東垣清胃散生犀汁若發熱飲冷大便調
和用四物連翹牡丹皮若發熱飲冷大便秘結脾
胃實熱也用清凉飲若發熱作渴飲湯者脾胃虛
熱也用七味白术散大凡瘖切不可食毒物恐作
痛致傷元氣輕者反重重者難治大人亦然
一小兒瘖瘡作痛色赤飲冷此熱毒熾盛也用活

命飲末一服痛止用東垣消毒散一服諸症悉退而瘥若非此藥必作疔毒之類

一小兒痘燃痛出血診其毋有肝火用小柴胡湯加山梔生地毋子服之頓愈又用加味逍遙散而瘥

一小兒痘痛不止色淡欲陷此痛傷元氣也先用仙方活命飲一劑而痛止用八珍湯而靨

一婦人時疫將愈出痘發熱體倦痛甚昏憒飲湯脉洪數按之如絲用十全大補湯調硃砂末一錢

一劑其痛頓止食進體健仍用前湯十餘劑而愈

一男子痘瘡痛甚先用仙方活命飲一劑其痛頓止又用東垣消毒散一劑精神如常而靨

一小兒痘瘡痛甚脉有力此邪氣實也用活命飲末二錢痛止起發又用東垣消毒散而靨

一小兒痘赤痛用活命飲末二錢痛止用當歸黃芪金銀花將愈用四君當歸芍藥而靨

一小兒痘赤痛發熱飲冷大便不通脉洪數而有力用活命飲加大黃二服痛赤頓減更用東垣消

毒散一服如期而愈

一小兒痘瘡紅活燃痛作渴飲冷手足並熱余謂此痘屬形病俱實非清熱解毒不能殺其勢當用活命飲化癍湯不信另服鼠粘子湯痘燃脹大其色如豬先用前藥二劑腫痛悉止乃用鼠粘子湯而愈

一小兒痘瘡燃痛服鼠粘子湯之類患痘疔三十枚甚苦用隔蒜灸服活命飲痛止貫膿又用東垣消毒散而靨

一小兒遍身發熱兩足猶甚作渴飲湯脉洪數而無力此稟腎經虛熱也用地黃丸料加當歸黃芪大劑煎與恣飲二十日服數劑熱渴全止又數劑而愈

一小兒痘瘡熱痛服敗毒藥四肢患痘癍寒熱發渴余謂當補元氣不信果殁

木香五物湯治出痘煩痛

青木香 四兩　丁香 一兩　薰陸香 白礬各一兩

麝香一錢

右每服五錢水煎熱盛加犀角一兩施銀臺常用此方其効如神

鼠粘子湯治瘡瘡欲出未透皮膚發熱服赤心煩咽痛不利等症喊地骨防風名消毒散

鼠粘子 炒杵 四錢
防風 五分
地骨皮 一錢
荊芥 二錢
甘草

右爲末每服一二錢白湯調下

仙方活命飲治瘡瘡煩痛

清凉飲

消毒散二方見大便不通

四聖散方見涕唾稠粘

犀角消毒散

隔蒜灸法二方見痘疔

痘身疼

經云痒則爲虛痛則爲實內快外痛爲外實內虛外快內痛爲內實外虛今痘瘡身痛者是膚厚理密或外寒相搏或熱毒內作或血虛不能榮養若熱毒而血瘀者先用活命飲次用東垣消毒散血虛而瘀者用四物湯之類遍身鬱而色黑者毒氣壅滯而血凝也乃是危症若二便秘結喘急煩躁用桃仁湯或猪尾膏血調片腦冷灸之自利不食者不治

一小兒痘未發遍身作痛余謂鄭毒勢盛先用仙方活命飲一劑痛緩痘出用東垣消毒散一劑未用四聖散而靨

一小兒痘未出透遍身作痛此熱毒鬱滯而未盡

發於外也先用活命飲一劑而痛愈用參芪四聖
散而結靨
一小兒痘癍遍身作痛用東垣消毒散而痛愈用
紫草快癍湯而膿貫用托裏散而愈
一小兒痘癥肢體作痛發熱惡寒此氣虛而寒邪
客于表也用人參羌活散而表解用參芪四聖散
而起發用參芪內托散而濃潰
一婦婦發熱作渴遍身疼痛用活命飲一劑諸症
稍愈形氣甚倦用紫草木香散痘出少許用白术

散貫膿而愈
一男子出痘根窠赤痛發熱作渴痘裂出血肝火
熾也用小柴胡湯加生地犀角諸症頓減又用聖
濟犀角地黃湯而結痂
黃芪六一錢 升麻 多一錢 右水煎服
參芪四聖散

參芪內托散治瘡瘍痛或重虛發痒或不潰膿
或爲衝靨等症　二方見寒戰咬牙
小柴胡湯加牡丹皮生地黃治發熱惡風身痛或
即加味小柴胡湯　方見斑痘
四肢勁強寒熱往來　方見斑痘
柴草快斑湯　方見便出血或黑屎
七味白朮散　方見發熱屬陰陽
四物湯　方見痘出遲
八珍湯
聖濟犀角地黃湯　二方見頂陷心痛

仙方活命飲
托裏散
東垣消毒散　三方見痘離
五苓散　方見小便不利
制附子法
將附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭圓底平者
先備童便五六碗將附子放在灶上熟處或炭
火烘炙乘熱投童便中浸五七日候潤透捎去
皮切四塊用粗紙濕裹數層埋灰火中煨候熟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

取出切片如有白星先上灸至無星爲度如急用切太片用熟艾灸熟艾亦可

保嬰撮要卷之二十終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

孝應三年甲午曆二月日