







Table with columns for location names (e.g., 濱松市, 伊東市, 熱海市) and numerical data points. The table is organized into columns corresponding to different geographical areas.











### 第六、經常收支

〔備考〕 支出ニハ水道事務費、水源水路費、諸池費、唧筒運轉費、鐵管維持費等水道經營ニ要スル經常費ノミヲ掲ケ各戸給水ニ要スル給水工事費及之ニ關聯スル事務費等ヲ除外シ雜支出中ニハ休退職並死亡給與金水質試驗費等ノ雜費ヲ計上ス

#### (其二) 支 出

〔備考〕 單位未満ハ四捨五入トス

昭和三年度

水道名	事務費		水源水路費		淨水場費		水管維持費		雜支出		合計		備考
	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	
東京市	九四三、八七九	八四九、三三三	一、八〇、九六九	一、四一九、九〇〇	二、六六〇、〇〇〇	三、五〇〇、〇〇〇	三、三三三、〇〇〇	三、三三三、〇〇〇	一、八〇、九六九	一、八〇、九六九	一、八〇、九六九	一、八〇、九六九	〔備考〕 豫算ハ當初豫算ヲ掲ケ
京都市	一、五二一、二二二	一、六〇、〇〇〇	一、六〇、〇〇〇	七、三三三、三三三	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	
大阪市	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	三、三三三、三三三	
横濱市	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	
神戸市	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	
名古屋市	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	二、〇〇〇、〇〇〇	
函館市	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	
小樽市	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	六〇〇、〇〇〇	
室蘭市	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	二〇〇、〇〇〇	
釧路市	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	



水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雑支出		合計		備考
	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	
松本市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
上田市	9,500	9,000	4,000	3,800	1,000	900	1,200	1,100	100	80	13,800	13,500	
上諏訪町	2,500	2,300	1,000	900	700	600	300	200	100	80	4,800	4,600	
仙臺市	5,500	5,200	1,000	900	600	500	1,000	900	100	80	8,100	7,800	
鹽釜町	3,500	3,300	2,000	1,900	1,500	1,400	800	700	100	80	5,600	5,400	
石巻町	7,000	6,800	1,000	900	1,000	900	1,500	1,400	100	80	11,200	11,000	
福島市	7,000	6,800	1,000	900	1,000	900	1,500	1,400	100	80	11,200	11,000	
若松市	3,500	3,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	6,200	6,000	
郡山市	3,500	3,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	6,200	6,000	
平町	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	
青森市	3,500	3,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	6,200	6,000	
五所川原	6,800	6,500	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	10,300	10,000	
山形市	2,000	1,900	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,800	5,600	
秋田市	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	
福井市	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	
金澤市	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	
高岡市	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	
鳥取市	2,500	2,300	1,000	900	1,000	900	800	700	100	80	5,300	5,100	

事務費ハ一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ

水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雑支出		合計		備考
	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	
米子市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
松江市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
岡山市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
倉敷市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
広島市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
尾道市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
福山市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
下関市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
宇部市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
和歌山市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
徳島市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
高松市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
丸亀市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
松山市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
宇和島市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
高知市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
福岡市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
久留米市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	
門司市	2,500	2,400	3,500	3,400	1,000	900	600	500	100	80	5,600	5,500	

第六 經常收支 (其二) 支出

水源水路費ハ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ  
一般事務費ハ一  
分ハ分シテ

水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雜支出		合計	備考
	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算		
小倉市	4,574	3,700	1,500	1,400	4,781	4,781	1,100	1,100	5,881	5,881	10,762	
若松市	2,453	2,184	1,835	1,588	3,100	2,277	1,064	836	4,937	3,714	8,651	
大牟田市	2,770	2,355	4,935	3,499	2,925	2,444	1,400	1,170	2,825	2,444	5,269	
八幡市												
戸畑市												
飯塚町	9,488	7,576	1,779	9,661							11,447	
大分市	1,878	1,338	6,005	1,298	1,298	1,298	1,500	1,500	2,798	2,798	4,596	
別府市	3,749	2,953	3,000	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	5,206	
中津市												
佐賀市	2,635	2,168			2,575	2,575	1,000	1,000	3,575	3,575	3,575	
熊本市												
鹿兒島市	2,664	2,333										
那覇市												
京城府	8,488	8,171	1,713	1,713	2,447	2,447	1,189	1,189	3,636	3,636	7,813	
仁川府	1,700	1,510			2,666	2,666	2,666	2,666	5,332	5,332	5,332	
群山市	876	1,000	1,170	1,170	3,436	3,436	2,633	2,633	6,072	6,072	6,072	
木浦府	1,800	1,433	100	100	1,800	1,800	1,800	1,800	3,600	3,600	3,600	
大邱府	2,334	1,073	780	100	2,000	2,000	500	500	2,500	2,500	2,500	

水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雜支出		合計	備考
	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算	本年度 豫算	前年度 決算		
釜山府	2,644	2,644			2,644	2,644					5,288	
平壤府	2,951	2,951			2,951	2,951					5,902	
鎮南浦府	6,551	5,758			9,309	9,309					15,068	
新義州府	6,700	6,700			6,700	6,700					13,400	
元山府	2,370	2,370			2,370	2,370					4,740	
咸興面	7,331	6,938			10,269	10,269					17,208	
豊原町	1,684	2,168			3,852	3,852					7,716	
大泊町	3,281	2,871			6,152	6,152					12,304	
新州府												
公州	4,381	4,381			4,381	4,381					8,762	
江景州	4,926	4,926			4,926	4,926					9,852	
全州	4,776	4,776			4,776	4,776					9,552	
光州	9,084	8,177			17,261	17,261					34,522	
高興	1,331	1,331			1,331	1,331					2,662	
浦項	3,463	3,463			3,463	3,463					6,926	
金泉	4,459	4,459			4,459	4,459					8,918	
晋州	2,224	2,224			2,224	2,224					4,448	
鎮海	974	974			974	974					1,948	
海州	6,251	4,622			10,873	10,873					21,746	
義州	1,103	1,103			1,103	1,103					2,206	
合計	64,800	57,500	1,800	1,800	100,000	100,000	1,800	1,800	120,000	120,000	240,000	

其間一二六、四  
九九九、四、三  
四七、四

浄水場費  
水管維持費  
雑支出  
其他

二年度工事  
費ノミ  
計上ス

水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雑支出		合計		備考
	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	
春川	3,550	4,470	7,500	11,300	3,300	4,570	1,800	1,100	3,200	1,500	9,500	15,500	
平康	1,550	1,800											
清津	2,650	2,200	2,300	2,950	2,500	2,300	4,400	2,250	5,000	1,500	4,900	8,800	
羅南	2,100	2,100					2,100	2,250			4,350	4,350	
城津	2,100	2,100											
會寧	2,100	2,100											
臺北	2,100	2,100											
基隆	2,100	2,100											
淡水	2,100	2,100											
臺中	2,100	2,100											
彰化	2,100	2,100											
臺南	2,100	2,100											
嘉義	2,100	2,100											
高雄	2,100	2,100											
屏東	2,100	2,100											
花蓮港	2,100	2,100											
花蓮	2,100	2,100											
大連	2,100	2,100											
旅順	2,100	2,100											
旅順	2,100	2,100											

水道名	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	備考
金州	3,750	3,000	6,000	5,600	2,600	3,750	6,000	5,600	2,600	3,750	6,000	5,600	
瓦房店	2,100	2,100											
熊岳城	2,100	2,100											
蓋平	2,100	2,100											
大石橋	2,100	2,100											
海城	2,100	2,100											
鞍山	2,100	2,100											
遼陽	2,100	2,100											
蘇家屯	2,100	2,100											
奉天	2,100	2,100											
鐵嶺	2,100	2,100											
開原	2,100	2,100											
昌圖	2,100	2,100											
双廟子	2,100	2,100											
四平街	2,100	2,100											
公主嶺	2,100	2,100											

水道名	事務費		水源水路費		浄水場費		水管維持費		雜支出		合計		備考
	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	本年度 決算	前年度 決算	
郭家店	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
范家屯	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
長春	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
木溪湖	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
橋頭	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
連山關	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
鶴冠山	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
安東	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
煙臺	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
撫順	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
玉川水運株式會社	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
湖南水運株式會社	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
福相堂山運株式會社	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

第七、配水實費

昭和三年度中

水道名	經常費決算				配水總量 カガ米	方配水一立 スル實費ニ對	方配水一立 スル對送水 唧筒費	備考
	事務費	水路費	浄水場費	維持管 雜支出				
東京市	8,839,953	1,571,033	3,333,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	<p>（配水池へ送水スルノミニ唧筒ヲ使用 本市水道ニ日本製鋼所配水池ヨリ分 水ヲ受クルヲ以テ水路費ヲ要セズ分 ニ分水路三錢五厘ツ、ヲ會社支 拂金額ヲ水路費トセリ</p>
京都市	1,893,533	1,133,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
大阪市	3,686,655	7,111,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
神戸市	1,782,823	3,301,000	2,300,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
横濱市	2,333,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
名古屋	1,782,823	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
函館市	8,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
小樽市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
室蘭市	1,782,823	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
釧路市	1,782,823	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
八王子市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
目黒町	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
澁谷町	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
淀橋町	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
青梅町	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
峰山町	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
堺市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
横須賀市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
川崎市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
姫路市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
尼崎市	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	

第七 配水實費

水道名	經常費決算				配水總量 立方米	配水一立方 米對立 方米對 水立 方米對	備考
	事務費	水路費	淨水場費	維持費			
明石市	17,008	9,953	3,000	1,100	1,479,497	113	100
西宮市							
高砂町							
豐岡町							
長崎市	85,031		10,610	14,100	10,396,353	26	
佐世保市	43,490		7,635	7,869	2,538,037	22	
新潟市	3,350		2,706	3,366	2,685,247	39	
長岡市	15,932		8,977	3,321	7,532,627	36	
高田市	10,938	6,681		93	5,950,866	59	
新發田町	37,822			93	4,792,924	78	
前橋市	19,364						
高崎市	8,998						
沼田町							
水戸市	3,933	3,690	58	1,810	3,010,898	74	
宇都宮市							
奈良市							
津市							
桑名町							
豐橋市							
靜岡市							
濱松市							

水道名	經常費決算				配水總量 立方米	配水一立方 米對立 方米對 水立 方米對	備考
	事務費	水路費	淨水場費	維持費			
伊東町							
熱海市	39,007	94	850	477	2,833,644	27	
甲府市	5,405	33	585	326	101	69	
谷村町							
大津市							
長野市							
松本市	3,699	609	1,338	37	2,633,703	69	
上田市	8,300	3,333	3,000	38	2,338,175	23	
上諏訪町	2,337	498	848	29	1,001,000	22	
仙臺市	45,755	1,135	5,782	93	5,555,380	108	
鹽釜町	11,826	83	733		9,101,640	33	
石巻町							
福島市	6,059		16,322	4,788	1,664,510	21	
若松市							
郡山市	30,167	4,732	6,514	102	2,569,637	26	
平山町	3,355	338	2,942	59	7,000,566	60	
青森市	4,854	97	1,184	1,172	2,999,633	26	
五所川原町	6,593	309	991	595	1,740,277	52	
山形市	20,644	303	2,681	3,958	1,666,333	45	
秋田市							
福井市	26,148		29,579	7,444	2,733,301	20	
高岡市							
金澤市							
鳥取市	14,328	1,733	2,740	43	1,770,673	23	

量水器ナシ

水道名	經常費決算				配水總量 立升米	配水一立方 米對立 方米對 方米對 方米對	備考
	事務費	水路費	淨水場費	維持費			
米子市	二一,九三二	三,一九六	四,〇二二	二八	五三,三〇九	三三	水管維持費ニハ送水線路費及配水線路費ヲ合記ス 雜支出中ニハ水源淨水池間ノ電話機費ヲ含ム 唧筒廢止ス
松江市	九八	一一	四,〇二二	三二	一,七六,一八九	三〇	
岡山市	五八,三六八	一一	七,三六六	三三	八,一八,七〇七	二〇	
倉敷市	一,四四四	一,一六〇	一,一三三	二九	七三,四,八二八	一五	
廣島市	一〇,〇三三	一,一六〇	一,一三三	二九	一一,八九,七三七	一八	
尾道市	一八,六三三	一,一六〇	一,一三三	二九	六三,九〇〇	一八	
福山市	一八,〇九四	一,一六〇	一,一三三	二九	六三,九〇〇	一八	
下關市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
宇部市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
和歌山市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
徳島市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
高松市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
丸亀市	一〇,七七一	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
宇和島市	一,〇八〇	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
高知市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
福岡市	四九,八〇三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
久留米市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
門司市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	
小倉市	三六,五三三	一,一六〇	一,一三三	二九	三,八七,〇〇八	一八	

水道名	經常費決算				配水總量 立升米	配水一立方 米對立 方米對 方米對	備考
	事務費	水路費	淨水場費	維持費			
若松市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	量水器破損不明
大牟田市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
八幡市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
戸畑市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
飯塚市	七,九〇六	九,三六一	二,一八五	二,〇三三	三,〇〇,四三〇	六九	
大分市	一四,九〇九	七,三六二	二,〇〇〇	九,九七九	九,九七九	二八一	
別府市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
中津市	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
佐賀市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
熊本市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
鹿兒島市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
那覇市	三三,六二七	三,〇九〇	二,九〇〇	一〇,二八五	三,三三,八九九	一七	
京城市	八三,一六一	一七,八三三	二,五五五	六六,四四四	七,三六,七一九	四三	
仁川府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
群山市	七,九〇六	九,三六一	二,一八五	二,〇三三	三,〇〇,四三〇	六九	
木浦府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
大邱府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
釜山府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
平壤府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
鎮南浦府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
新義州府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
元山府	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
咸興面	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	
豐原町	一五,〇九三	一,一七二	一,一三三	一,一三三	一,三三,一九七	一〇	



第七 配水費

水道名	事務費	水路費	淨水場費	維持費	雜支出	配水總量	方米ニ對スル配水一立ノ實費	方米ニ對スル配水一立ノ送水ノ筒費	備考
淡中水	七七七	三三五	一、四三三	三、二〇六	三、三〇〇	一、八六〇、〇九〇	一、一〇	九〇	量水器設備ナキ爲水量不明
臺化	六、九一九	一、四六六	四、五七五	一、三二	二、九〇〇	四、三六、四〇〇	二、三	一八八	
彰南	九、七五二	八、八八八	六、〇〇〇	一、六一六	一、六〇〇	四、三六、四〇〇	二、三	一八八	
臺義	一八、八一一	八、〇〇〇	二、三三三	六、九七七	三、〇〇〇	二、〇〇、四〇〇	二、六	一四四	
高雄	一〇、一九二	七、〇六六	二、三三三	九、三三三	三、三三三	三、三三、三三三	三、八	一四四	
嘉東	二、〇九九	一、三三八	一、〇〇〇	一、三三八	二、〇〇〇	六、四一、一五五	三、九	一七四	
屏連	六、五九五	一、三三八	三、〇〇〇	一、六二六	二、〇〇〇	七、四一、四八八	四、七	二七四	
大順	七、三三〇	一、三三八	一、八一九	一、五九九	七、五五五	七、四一、四八八	四、七	二七四	
旅順	二、四六〇	一、三三八	二、〇八〇	一、五九九	二、一四九	九、二一、五〇〇	四、九	三三八	
金州	四、〇〇〇	一、三三八	三、二二二	一、四六六	三、三三三	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
荒州	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
江村	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
江村	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
沙河口	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
瓦房店	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
熊岳城	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
蓋平	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
大石橋	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
海城	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
鞍山	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
遼陽	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
蘇家屯	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	
奉天	二、〇〇〇	一、三三八	一、二二二	一、五九九	一、四六六	一、七九、九八〇	七、二	一八二	

十月一日ヨリ給水開始ニ付確數不詳

〔高雄水道ヨリ送水ヲ受ケ居ルニ付不明、高雄水道へ配水料金二三、三一六圓支拂(三年度)〕

水道名	事務費	水路費	淨水場費	維持費	雜支出	配水總量	方米ニ對スル配水一立ノ實費	方米ニ對スル配水一立ノ送水ノ筒費	備考
大泊町	二、八五〇	一、六三三	一、〇〇一	二、四六六	三、三〇〇	一、三三、五三三	五、七	五七四	
公州	二、五三三	一、四六六	一、七三三	三、三三三	七、八九九	一、八二、七三〇	七、三	七三九	
江州	四、五三三	一、〇〇〇	三、三三三	二、八八八	一、七、四八八	一、二二、三六六	一、八	一、八七七	
全州	四、四四四	一、〇〇〇	三、三三三	二、八八八	一、七、四八八	一、二二、三六六	一、八	一、八七七	
光州	九、四四四	一、〇〇〇	三、三三三	二、八八八	一、七、四八八	一、二二、三六六	一、八	一、八七七	
高州	三、四四四	一、六六六	一、六六六	三、〇〇〇	三、五九九	一、三三、九九九	二、六	二八六	量水器故障ニ付不明
浦項	四、〇〇〇	一、六六六	一、六六六	三、〇〇〇	三、五九九	一、三三、九九九	二、六	二八六	
金州	三、〇〇〇	一、六六六	一、六六六	三、〇〇〇	三、五九九	一、三三、九九九	二、六	二八六	
鎮海	四、六六六	一、六六六	一、六六六	三、〇〇〇	三、五九九	一、三三、九九九	二、六	二八六	
海州	一、三三三	一、八八八	三、〇〇〇	二、七二二	一、九八八	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
義州	一、三三三	一、八八八	三、〇〇〇	二、七二二	一、九八八	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
春州	二、八八八	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
平康	一、〇〇〇	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
清津	一、三三三	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
羅州	二、五五五	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
咸興	二、五五五	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
會同	二、五五五	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
臺南	二、五五五	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	
基隆	二、四四四	一、三三三	一、三三三	二、二二二	一、六六六	一、二二、三六六	一、九	一、九三三	唧筒ハ使用セス

〔本表經費ハ鎮海要港部ニ於テ支出セルモノナルニ付不明ナリ依テ省略ス〕

水道名	經常部決算				配水總量 立方米	配水一立方 米ニ對スル 實費 圓筒費	配水一立 方米ニ對 スル送水 費	備考
	事務費 円	水路費 円	淨水場費 円	維持費 円				
鐵嶺	1,921		800	664	1,400	1,070		
開原	1,921		800	664	1,400	1,070		
昌圖								
雙廟子								
四平街								
公主嶺								
郭家店								
范家屯								
長春								
本溪湖								
橋頭								
連山關								
雞冠山								
安東								
撫順								
玉川								
株式會社								
株式會社								
株式會社								
株式會社								

第八、水道ト河井トノ使用比較

昭和三年度末現在

水道名	給水区域内總戸口數				水道使用戸口數				掘井又ハ 河水等使 用戸數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水ノ 水質概況	備考
	戸數	人口	戸數	人口								
東京市	1,497,000	7,651,155	1,131,833	6,311,643	3,111	13,977	細菌聚落數七九六	本市ニ河水使用者ナシ 計ナリ 昭和三年十月一日現在推 計ナリ 二、水道使用人口ハ昭和 三年十二月末現在數ナリ 三、掘井使用戸數ハ昭和 三年五月調ヲ掲ケ 四、細菌聚落數ハ昭和二年 四月調ヲ掲ケ 四、掘井平均數ナリ				
京都市	1,267,747	5,651,308	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良	本市ハ戸數本位ニ付水道使 用戸口數中人口ハ一戸當 分三四九戸一七四五人ヲ 含ム 給水区域内總戸數ノ内市外 分三四九戸一七四五人ヲ 含ム △印ハ株式會社日本製鋼所 戸數人口ニシテ會社専用 道ヲ使用ス				
大阪市	1,131,833	5,651,308	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良	區域内戸數ハ三年末現在 給水区域内總戸數總人口ハ 昭和三年末現在推定掘井使 用戸數ハ調査セサル爲不明				
神戸市	1,011,648	4,557,810	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
名古屋市	931,234	4,191,151	1,191,721	6,451,555	12,753	不詳	一概ニ不良					
函館市	811,648	3,551,308	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
小樽市	711,648	3,111,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
室蘭市	611,648	2,671,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
釧路市	511,648	2,231,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
八王子市	411,648	1,791,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
目黒市	311,648	1,351,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
澁谷町	211,648	911,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
淀橋町	111,648	471,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					
青梅町	11,648	47,648	1,011,648	4,557,810	16,933	不詳	一概ニ不良					

第八 水道ト河井トノ使用比較

第八 水道ト河井トノ使用比較

水道名	給水区域内總戸口數	水道使用戸口數	掘井又ハ河水等ニ使用戸數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水質	備考
前橋市	11,834	8,166	3,668	3,100	不良	一、給水区域内總戸口數ハ昭和三年十二月現在トス
高崎町	11,914	10,906	9,311	3	概シテ良好	二、昭和三十二年現在人口ハ給水人員ノ算入セズ
沼田町	3,211	1,006	3,100	3	過半数不良	三、掘井數ノ調査ハ最近決
水戸市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	四、給水区域内戸口ハ戸籍上ノ
宇都宮市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	五、本年四月一日現在ニ於ケル
津島市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	六、本調査ノ戸數割賦課戸
奈良市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
桑名市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
豊橋市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
静岡市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
濱松市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
伊東市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
熱海市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
甲府市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
谷津市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
大津市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
長野市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
松本市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
上田市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
上諏訪町	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
仙臺市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
鹽釜町	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
石巻町	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	
福島市	16,455	7,125	4,568	2,335	概シテ良好	

水道名	給水区域内總戸口數	水道使用戸口數	掘井又ハ河水等ニ使用戸數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水質	備考
峰山町	9,491	4,333	2,146	2,191	概シテ可良	掘井數ニ對シ井水使用戸數ノ多キハ山腹ニ水源ヲ設ケテ竹管ニヨリ引水シ一井ヲ以テ數戸ガ之ヲ飲用セルニヨ
堺市	26,133	22,183	19,379	3,703	掘井ハ概シテ含有ス	
横須賀市	24,015	22,637	15,886	5,751	不良	
川崎市	110,550	92,330	73,356	2,536	不良	
姫路市	10,100	9,440	6,666	2,874	不良	
明石市	8,584	3,961	3,060	3,110	概シテ不良	
西宮市	8,584	3,961	3,060	3,110	概シテ不良	
高砂町	2,511	1,368	671	1,691	概シテ不良	
豊岡町	3,510	2,807	1,646	1,779	概シテ不良	
長崎市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	
佐世保市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	
新潟市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	
長岡市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	
高田市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	
新發田市	3,316	1,836	993	2,168	概シテ不良	

水道名	給水区域内總戸口數		水道使用戸口數		掘井又ハ河水等ニ使用戸數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水質概況	備考
	戸數	人口	戸數	人口				
若松市	九,〇五五	四八,三七九	六,三三三	三三,〇三三	二,七九九	不詳	概シテ不良	適八、不道一七四 官公署合有セズ總戸數ノ内ニハ 口ハ三月三十一日現在不明 クハ三月三十一日現在不明 月水道使用戸數ハ三月十二 末ヨリ減少セリ
郡山市	四,六六八	二六,二八九	三,九七七	三三,六六六	六九一	未調査	井水ハ外觀概シテ濁濁シ クロール多量濾過及煮沸 セザレバ使用サレズ	
平町	一六,三三九	八四,四六二	一三,六九八	六二,九〇八	一,三三三	九六六	良好ナラズ	
青森市	一,五三〇	七,三三三	七〇	三,九九八	八〇〇	一八三	不良	
五所川原町	一,六七四	六,三三四	五,六三三	四七,〇七一	六,〇四二	六四	概シテ良好	
山形市	八,三五六	五二,五八一	七,八七四	四七,〇七一	五七七	不詳	概シテ不良	
秋田市	一四,二一一	六〇,七三四	一〇,一四四	五五,七九一	四,〇七二	不詳	概シテ不良	
福島市	七,四四〇	三九,〇三八	六,七六六	三三,三七七	一,四八八	一,三六〇	掘井又ハ河水共概シテ不 良ニシテ雑用カ撒水等ニ 使用シ山麓ニ多少ノ汚水 井アリ	
高岡市	七,二一九	三二,八九七	三,三三四	一四,一〇一	四,〇〇三	一,一〇三	如シテ不良ニシテ内譯左ノ 要濾過二四〇 不濾過八〇一	
米子市	三,一八七	一四,一〇一	一,四一四	三,三〇五	三,〇〇五	九七七	概シテ不良	
松江市	九,九二六	四四,七三三	八,二八三	三六,四六一	三,〇〇五	九七七	不詳	
岡山市	三,〇〇〇	一三,九七一	二,四三九	一三,〇四六	二,一八三	九七七	概シテ不良	
倉敷市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	概シテ不良	
広島市	一八,〇三九	八七,〇七五	九,六四四	六二,三三三	九,三九〇	九七七	概シテ不良	
徳島市	一六,七五九	七七,四七八	六,三三三	三三,〇一一	一,四七一	九七七	概シテ不良	
高松市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	概シテ不良	
宇和島市	九,〇三七	四一,七〇七	三,三三三	一七,〇七三	五,四三三	未調査	不詳	
宇部市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	不詳	
下關市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	不詳	
和歌山市	二六,一三四	一〇七,九〇〇	九,五七三	四一,五三一	一,六五一	二七,三三七	不詳	
徳島市	一八,〇三九	八七,〇七五	九,六四四	六二,三三三	九,三九〇	九七七	不詳	
高松市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	不詳	
宇和島市	九,〇三七	四一,七〇七	三,三三三	一七,〇七三	五,四三三	未調査	不詳	
松山市	九,〇三七	四一,七〇七	三,三三三	一七,〇七三	五,四三三	未調査	不詳	
九龍市	一六,七五九	七七,四七八	六,三三三	三三,〇一一	一,四七一	九七七	不詳	
高松市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	不詳	
宇和島市	九,〇三七	四一,七〇七	三,三三三	一七,〇七三	五,四三三	未調査	不詳	
久留米市	四一,九〇九	一七九,六八〇	一七,九〇九	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	不詳	掘井概シテ不良 井水概シテ「クロール」 多量ニシテ飲料ニ適スル モノ少シ	
福岡市	四一,九〇九	一七九,六八〇	一七,九〇九	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	不詳	不詳	
門司市	二二,一六三	一〇四,八四七	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	概シテ不良	
小倉市	一七,七六六	八二,三三三	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	概シテ不良	
若松市	一一,七〇七	六二,九九九	七,七〇七	四一,一四一	三,七八四	不明	概シテ不良	
大牟田市	二二,一六三	一〇四,八四七	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	他ハ飲料不適	
八幡市	二二,一六三	一〇四,八四七	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	飲料水井一三〇	
戸畑市	二二,一六三	一〇四,八四七	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	飲料水井一三〇	
飯塚市	二二,一六三	一〇四,八四七	一四,八四七	七〇,七〇〇	一〇,七〇〇	六,二二三	飲料水井一三〇	
大分市	一〇,四七七	四四,九八八	六,八七三	三三,二二二	一,三三三	九七七	概シテ不良	
別府市	八,三三三	三六,三三三	六,三三三	二六,三三三	二,〇三三	不明	概シテ不良	
中津市	五,六三三	二〇,七三三	四,六三三	一四,九三三	一,四三三	未調査	約六割不良	
佐賀市	八,四三三	三二,五三三	六,四三三	二四,五三三	二,一三三	未調査	約六割不良	

掘井數調査シタルモノナシ  
本市ニ河水ナシ

給水区域内戸數並人口ハ昭  
和三年末現在ニ依ル  
一、給水戸數ハ昭和三年末  
一、現在ヲ示ス  
一、掘井數及同使用戸數ハ  
昭和三年ノ分不詳

戸數人口ハ昭和三年末ニ依  
ル給水戸數ハ本市及三川町一  
部ヲ含ム

第八 水道ト河井トノ使用比較

水道名	給水區域内總戶口數		水道使用戶口數		掘井又ハ河水等使用戶數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水質	備考
	戶數	人口	戶數	人口				
熊本市	25,889	100,999	12,133	94,071	13,766	1	飲料ニ不適ナルニ非ラザルモ佳良ノモノト稱シ難シ	
鹿兒島市								
那覇市								
京城府	71,011	311,848	36,160	157,561	35,041	2,199	井水ハ概ネ水質不良ニシテ河水冬期結氷期間ノミテ飲料ニ適スルモノアリ	
仁川府	13,543	57,668	5,826	24,861	7,707	3	固形物酸性アンモニア等ヲ含ム	
群山府	5,819	24,888	2,737	13,655	3,093	3	概シテ不良	
木浦府	6,198	29,894	3,603	19,265	2,596	3	概シテ不良	
大邱府	21,277	91,333	4,713	20,568	16,434	4,608	概シテ不良	
釜山府	35,543	126,307	10,764	53,590	14,778	72	河水使用者ナク全部掘井及湧水ノ使用者ニシテ水質概シテ不良ナリ	掘井數ハ昭和元年度調査ヲ揭ク
平壤府	21,219	105,311	18,658	78,030	2,761	36	概シテ不良	飲料不適 試験未済 二〇七
鎮南浦府	7,635	33,001	4,337	18,627	3,498	38	概シテ不良	
新義州府	6,243	26,341	1,795	10,354	4,447	10	不良	
元山府	9,379	41,548	3,234	15,804	627	9	概シテ不良	
咸興面	6,756	33,093	2,253	11,280	4,504	37	一般ニ硬ナリ	
豐原町	4,463	22,988	2,328	10,108	2,333	107		
大泊町								
朝鮮總督府	2,850	12,614	804	3,994	8,610	8,610	概シテ不良	

水道名	給水區域内總戶口數	水道使用戶口數	掘井又ハ河水等使用戶數	掘井數	掘井又ハ河水等ノ水質	備考
公州	2,373	10,406	3,400	1,489		
江景州	2,595	11,147	5,487	1,478		
全州	6,291	28,644	1,077	5,194		
光州	4,983	23,215	4,998	4,014		
高興	654	3,290	649	5		
浦項	2,262	10,131	1,324	1,001		
金泉	3,110	13,763	568	2,971		
晉州	4,422	19,559	857	4,310		
鎮海	3,493	15,662	1,384	5,536		
海州	4,556	19,933	1,366	5,969		
義州	1,853	9,260	1,377	3,190		
春川	1,388	7,835	423	1,311		
平康	1,335	5,684	67	2,219		
清津	6,366	33,407	4,483	1,884		
羅南	2,914	13,555	1,029	4,733		
城津	2,104	10,153	460	2,339		
會寧	3,341	14,980	1,489	5,433		
臺灣總督府	37,197	233,797	22,866	135,793		

水道名	給水区域内總戸口數	水道使用戸口數	掘井又ハ河水等使用戸數	掘井數	備考
蓋石橋	六九	六九	—	三	良
大石橋	八三	八三	—	三	良
海城	三二	三二	—	一	良
鞍山	二二	二二	—	一	良
遼陽	二二	二二	—	一	良
蘇家屯	二二	二二	—	一	良
奉天	二二	二二	—	一	良
鐵嶺	二二	二二	—	一	良
開原	二二	二二	—	一	良
昌圖	二二	二二	—	一	良
雙廟子	二二	二二	—	一	良
四平街	二二	二二	—	一	良
公主嶺	二二	二二	—	一	良
郭家店	二二	二二	—	一	良
范家屯	二二	二二	—	一	良
長春	二二	二二	—	一	良
本湖	二二	二二	—	一	良
橋頭	二二	二二	—	一	良
連山	二二	二二	—	一	良
安東	二二	二二	—	一	良
撫順	二二	二二	—	一	良
川水	二二	二二	—	一	良
湖南	二二	二二	—	一	良
株式會社	二二	二二	—	一	良
株式會社	二二	二二	—	一	良
箱根會社	二二	二二	—	一	良
道根會社	二二	二二	—	一	良

總戸口及給水戸口中ニハ附屬地外四洗鐵路局戸數四四四戸人口一、二二一人ヲ含ム

不適井水ハ雜用ニ使用

水道名	給水区域内總戸口數	水道使用戸口數	掘井又ハ河水等使用戸數	掘井數	備考
基隆	一四、七六三	七、〇四三	七、七一九	八	不良
淡水	一、八九五	一、三六五	五、九九	二	水質不良
彰化	九、〇〇四	三、六一九	五、三六五	二	飲料ニ適スルモノ九二
臺南	四、七六八	一、〇七〇	三、七一九	五〇	概シテ水質不良
嘉義	二、〇八二	五、四六一	—	—	—
高雄	二、五八六	四、〇〇四	七、五五	二八四	硬度高ク「クロール」多シ
屏東	一〇、一六六	四、四一三	一、六一〇	五四	硬度高ク鹽分及アンモニ
花蓮	七、三一一	一、九九五	五、〇六	二六八	硬度高クアンモニアヲ含
大連	四、五八八	三、九一六	二、九〇〇	一七三	掘井ハ水質不良ニシテ飲
旅順	五、五八七	三、一九一	二、三九六	二七	井水ハ概シテ飲用ニ適セス
金州	三、〇〇〇	六、三三	二、八八七	二八	表面水ナシ
荒川	一、六一、五八一	六、九六	一、五三、九九一	—	井水ハ硬度五〇六度ニシ
江村	一、五七、〇四六	九、六一、一八	三、七六、八五八	—	鹽及アンモニアヲ含ム
沙河口	一、三三三	一、三三〇	三、三三七	—	—
瓦房店	一、三三三	一、三三〇	三、三三七	—	—
熊岳城	一、三三三	一、三三〇	三、三三七	—	—

給水区域内戸口數ハ正確ニ區分シ難キニヨリ掘井又ハ河水等使用戸數ヨリ水道使用戸數ハ減シタルモノナリ

掘井及河水使用戸數ハ飲料ノ以外雜用水トシテ併用ノモノヲ掲ケタリ

硬度高ク「クロール」多シ

硬度高ク鹽分及アンモニ

硬度高クアンモニアヲ含

掘井ハ水質不良ニシテ飲料ニ不適

井水ハ一般ニ「クロール」多硬度高シ

井水ハ概シテ飲用ニ適セス

表面水ナシ

井水ハ硬度五〇六度ニシテ鹽及アンモニアヲ含ム

掘井數ハ昭和三年末現在ニ依ル

給水区域内總戸口數ハ昭和三年十二月末現在トス

那人ナリ

井水ヲ使用シアルハ殆ト支

水質試験及水ニ關スル三病比較表

用器例 一、臭味欄 Nトアルハ異臭味ヲキマ、ANトアルハ異臭味アルヲ示ス 二、(一)トアルハ不検出ヲ示ス

第九 水質試験成績 (其一) 濾過水質試験成績

Table with columns: 水道名, 昭和三年, 一月, 二月, 三月, 四月, 五月, 六月, 七月, 八月, 九月, 十月, 十一月, 十二月, 平均, 備考. Rows include 試験回数, 水温, 色度, 濁度, 臭味, 反カクロー, 硫酸アモニウム.

Table with columns: 市(甲表), 試験回数, 水温, 色度, 濁度, 臭味, 反カクロー, 硫酸アモニウム. Rows include 硝基アモニウム, 硬度, 固形物量, 細菌叢数, 細落.

濾過水質試験成績





水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
京都市(松ヶ崎上水道)	試験回数(標氏) 3.5 色度(最低平均) 0 濁度(最低平均) 0 臭味(平均) 0 反作用(最低平均) 0 クロール(最低平均) 6.03 硫酸鹽(最低平均) 6.03 硬物量(最低平均) 47.0	24 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	24 5.3 8.9 14.1 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	27 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	21 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	9 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	8 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	15 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	27 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	17 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	18 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	18 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	14 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	4.11 1.42 2.67	本成親ハ於テ島六洲ノ貯水池ニ付キタル平均成績ナリ

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
大坂市	試験回数(標氏) 21 色度(最低平均) 0 濁度(最低平均) 0 臭味(最低平均) N 反作用(最低平均) 弱カリ性 クロール(最低平均) 6.500 硫酸鹽(最低平均) 6.176 硬物量(最低平均) 6.500	21 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	24 5.3 8.9 14.1 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	27 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	21 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	9 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	8 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	15 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	27 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	17 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	18 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	18 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	14 4.9 5.3 8.9 21 20.5 23.3 27.0 26.7 27.1 20.0 15.0 8.9 16.8	4.11 1.42 2.67	本成親ハ於テ島六洲ノ貯水池ニ付キタル平均成績ナリ

濃縮水質試験成績表

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
大阪市	硬度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	固形物量	高低均	55,000	55,000	52,000	55,000	55,000	52,000	53,000	51,000	55,000	55,000	57,000	54,417	1,033
横濱市	水温	回数	4.3	4.2	7.1	11.0	14.8	17.3	19.5	18.4	18.9	14.7	11.2	6.6	12.3
	色濁	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市	細菌数	高低均	2,370	2,844	2,814	3,002	3,002	2,975	2,970	3,002	3,160	3,002	3,002	3,002	2,931
	臭	味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
横濱市	試水	回数	49	75	73	67	76	63	66	101	80	91	83	66	74
	色濁	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
大阪市	硬度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	固形物量	高低均	44,000	50,000	47,000	47,000	45,000	47,000	47,000	49,000	48,000	49,000	46,000	46,917	1,033
横濱市	水温	回数	4.3	4.2	7.1	11.0	14.8	17.3	19.5	18.4	18.9	14.7	11.2	6.6	12.3
	色濁	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市	細菌数	高低均	2,370	2,844	2,814	3,002	3,002	2,975	2,970	3,002	3,160	3,002	3,002	3,002	2,931
	臭	味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
横濱市	試水	回数	49	75	73	67	76	63	66	101	80	91	83	66	74
	色濁	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

大阪市(奥平野浄水場)

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
神戶市 (奥平野浄水橋場)	反	弱アリ性 6.336	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱アリ性 6.110	ハ各月平均値ヲ和除シテモノナリ
	クロール	5.975 6.003	6.150 5.931	5.975 5.799	6.336 5.799	5.914 5.566	5.914 5.392	5.914 4.871	5.914 4.871	5.219 4.523	5.566 5.219	5.566 4.871	5.914 5.680	6.610 6.001	5.658
神戶市 (奥平野浄水橋場)	硫酸	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
	硬度	83.200	87.200	74.400	78.400	60.800	84.800	76.000	64.000	80.000	80.000	80.000	70.400	83.200	76.867
神戶市 (奥平野浄水橋場)	固形物量	3.032 2.370 2.627	3.368 2.266 2.732	2.579 1.953 2.258	2.095 1.612 1.808	3.372 1.773 2.546	3.192 2.190 2.525	5.110 2.872 3.528	3.192 2.392 2.819	3.062 1.808 2.312	3.207 1.924 2.343	2.604 1.953 2.177	2.767 2.095 2.384	2.505	
	試験回数	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	本表ノ濾過水ト原浄水橋場ニ對シテモノナリ
神戶市 (上ノ原浄水橋場)	濁度	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	ハ平均ハ各月各試驗成績ノ和ヲ以テ平均値トシテ算出ス
	臭味	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	各月各試驗成績ノ和ヲ以テ平均値トシテ算出ス
神戶市 (上ノ原浄水橋場)	反	弱カリ性 6.326	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱カリ性 6.502	
	クロール	5.975 6.151	6.326 6.370	5.975 5.697	6.326 6.116	5.975 5.566	5.740 5.566	5.740 4.871	5.566 4.871	5.219 4.871	5.566 4.871	5.566 4.871	5.914 5.010	6.958 5.697	5.615
神戶市 (上ノ原浄水橋場)	硫酸	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
	硬度	53.600	55.200	58.400	44.800	46.400	49.600	52.000	54.400	57.600	52.800	43.200	53.600	51.800	
神戶市 (上ノ原浄水橋場)	固形物量	1.773 1.977 1.432	1.604 1.138 1.406	1.627 1.289 1.533	1.612 0.967 1.195	2.752 1.450 1.957	2.234 1.738 2.098	3.716 2.632 3.050	2.552 1.915 2.302	2.552 1.643 2.068	2.887 1.773 2.182	1.896 1.302 1.569	2.116 1.934 1.980	1.898	
	試験回数	16 10 13	11 10 11	14 12 13	13 10 12	13 10 12	13 10 11	12 10 11	11 10 11	12 10 11	11 10 11	11 9 10	11 10 10	11	

本表ノ濾過水ト原浄水橋場ニ對シテモノナリ

ハ平均ハ各月各試驗成績ノ和ヲ以テ平均値トシテ算出ス

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
神戶市 (北野浄水橋場)	回数	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	本表濾過水北野第一浄水橋場ヨリ採り各月平均二ヶ月各回ヲ以テ平均年平均數ヲ算出ス	
	色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	反作用	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	
	クロール	4.920 4.745 4.789	5.272 4.569 5.008	4.920 4.745 4.789	4.920 4.569 4.745	4.920 4.569 4.745	4.745 4.349 4.590	4.523 4.175 4.436	4.871 4.175 4.454	4.349 4.175 4.306	4.523 4.175 4.306	4.523 4.175 4.453	4.793 4.523 4.591	5.392 4.523 4.914	4.615	濾過水ノ平均年平均數ハ各月平均數ヲ以テ算出ス
	硬度	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	
	硫酸	40.800	53.600	35.400	40.800	43.200	45.000	44.000	40.000	49.600	52.000	65.000	52.800	48.617	硫酸	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	硝酸
	鉄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	鉄
	錳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	錳
	銅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	銅
	亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	亜鉛
	マンガン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	マンガン

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
古市屋	回数	25	25	30	24	36	31	38	41	24	48	42	25	389	本表濾過水各井及配水ノ平均年平均數ハ各月平均數ヲ以テ算出ス	
	色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	反作用	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	
	クロール	2.837 2.269 2.452	2.837 2.553 2.702	2.695 2.138 2.519	2.188 1.844 2.602	2.411 1.986 2.198	2.695 2.138 2.340	2.837 1.986 2.491	2.695 2.128 2.585	2.553 2.128 2.553	2.411 1.985 2.240	2.695 1.844 2.133	2.128 1.986 1.997	2.837 1.834 2.351	2.351	濾過水ノ平均年平均數ハ各月平均數ヲ以テ算出ス
	硬度	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鉄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	錳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	銅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンガン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
名古屋市	固形物量 (最低平均)	56,800	46,400	50,400	48,800	51,200	68,000	60,000	64,800	53,600	60,800	52,000	44,800	68,000	
	細菌數 (最低平均)	36,800	32,800	31,200	29,600	36,000	48,200	40,000	31,000	31,000	36,000	35,200	32,000	32,800	
函	水温 (最低平均)	2,538	2,528	2,845	2,528	2,528	2,538	3,161	2,845	2,528	2,528	2,528	2,538	3,161	
	色度 (最低平均)	2,212	1,580	2,212	2,212	2,212	1,896	1,580	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,580	
反	臭味 (最低平均)	2,250	2,031	2,569	2,370	2,379	2,340	2,697	2,187	2,212	2,102	2,332	2,271	2,271	
	濁度 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	酸性 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	弱酸性 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	中和 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	弱碱性 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	硫酸 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	硝酸 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	微量 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	痕跡 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

反應數字ハ試驗回数ヲ示ス

市	試回數	水温 (攝氏)	色度 (最低平均)	濁度 (最低平均)	月												平均	備考
					一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
市	固形物量 (最低平均)	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0			
	細菌數 (最低平均)	2,212	2,377	2,948	2,646	2,917	4,160	2,663	3,055	2,800	3,528	1,475	1,079	2,923				
市	水温 (攝氏)	11.0	11.5	10.7	10.5	9.5	8.75	8.75	8.65	7.85	8.2	8.4	7.35	9.25				
	色度 (最低平均)	5.0	7.5	6.5	7.25	7.25	7.0	7.45	4.25	5.00	5.75	6.85	6.05	6.30				
市	濁度 (最低平均)	8.4	8.4	8.0	8.2	8.1	8.1	8.3	7.25	6.3	7.1	7.4	6.74	7.69				
	微量 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市	痕跡 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	弱酸性 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市	中和 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	弱碱性 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市	硫酸 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	硝酸 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市	微量 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	痕跡 (最低平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

藥水質試驗成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
臭味	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロー	高低均	—	—	10.18	11.638	—	—	—	—	10.99	—	—	—	—	—
硫酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	高低均	—	—	0.9	0.9	—	—	—	—	0.95	—	—	—	—	—
固形物量	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
懸濁物質	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細葉	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
臭味	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロー	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
懸濁物質	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細葉	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
宝雨市	細菌落数 { 最高 最低均 }	65.0	68.0	70.0	80.0	82.0	88.0	89.0	90.0	88.0	80.0	79.0	82.0	80.0	昭和三年九月 一日新水開始 分ナリ、遊有 所ノ依 ハ、衛生 検査所 ニ依 テ、試験 成績ニ 依 ル	
王子	試験回数 (攝氏) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	水温 (攝氏) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	色度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	濁度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	臭味 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	反作用 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	クローロホルム (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	因形物量 (mg/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	細菌落数 (個/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	細落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	色度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	濁度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	臭味 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	反作用 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	クローロホルム (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
黒田	試験回数 (攝氏) { 最高 最低均 }	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	
	水温 (攝氏) { 最高 最低均 }	5.0	3.5	5.0	9.5	14.0	19.0	21.0	19.0	22.5	19.0	16.5	12.5	13.8	
	色度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭味 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	反作用 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クローロホルム (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	因形物量 (mg/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落数 (個/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭味 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	反作用 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クローロホルム (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	因形物量 (mg/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落数 (個/L) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硬度 (度) { 最高 最低均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
黒目町	硫酸ア	痕跡(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡(-)	
	硝子	1.978	1.978	2.004	1.978	2.004	2.056	2.004	2.246	2.030	2.030	2.083	1.978	2.030	
	硬度	1.978	1.978	2.004	1.978	2.004	2.056	2.004	2.246	2.030	2.030	2.083	1.978	2.030	
	固形物量	69.000	58.000	58.000	59.000	64.000	56.000	58.000	65.000	62.000	55.000	65.000	50.500	60.708	
黒目町	細菌叢数	0.869	0.771	0.771	0.632	0.869	0.632	0.730	1.659	0.711	1.027	0.948	0.632	0.850	
	試験回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	水温(攝氏)	11.0	10.5	5.0	12.0	15.5	19.0	21.0	19.0	23.0	17.5	16.5	12.0	15.2	
	水色濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水道名	谷町	臭味	反カ	クロ	硝子	硬度	固形物量	細菌叢数	試験回数	水温(攝氏)	水色濁度	N		備考		
												カ	性			
峰山町	谷町	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	1	1	1	4.801	4.801			
															カ	性
															痕跡(-)	痕跡(-)
															3.546	3.546
															4.255	4.255
															4.609	4.609
															4.255	4.255
															4.255	4.255
															4.255	4.255
															4.609	4.609
															4.255	4.255
															4.255	4.255
2.010	2.010															
1.978	1.978															
64.500	64.500															
0.832	0.832															
0.948	0.948															
68.000	68.000															
67.000	67.000															
1.343	1.343															
0.790	0.790															
57.000	57.000															
0.711	0.711															
58.000	58.000															
0.632	0.632															
1	1															
0.711	0.711															
57.000	57.000															
2.056	2.056															
5.319	5.319															
2.056	2.056															
0.948	0.948															
88.000	88.000															
0.948	0.948															
61.000	61.000															
2.004	2.004															
1.978	1.978															
65.000	65.000															
0.869	0.869															
8	8															
1	1															
0	0															
11	11															
18	18															

標準水質試験成績



水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反クロー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反クロー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濁度水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
堺市	細菌落数 { 最 低 均	28 22 30	20 18 19	24 16 17	66 52 67	104 26 59	132 96 106	94 82 88	91 79 83	82 75 79	76 60 68	68 64 66	40 28 32	— 59	
	回数 (氏)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
川	水温 (氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	濁度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭味 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	反クロール { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硫酸耐性 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	硬度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	固形物 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	細菌落数 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
堺市	細菌落数 { 最 低 均	28 22 30	20 18 19	24 16 17	66 52 67	104 26 59	132 96 106	94 82 88	91 79 83	82 75 79	76 60 68	68 64 66	40 28 32	— 59	
	回数 (氏)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
川	水温 (氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	濁度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭味 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	反クロール { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硫酸耐性 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	硬度 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	固形物 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市	細菌落数 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落 { 最 低 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
尼崎市	硫酸アモニア 硬度 固形物量 細菌落数	(-) 5.963	6.815	6.135	4.130	4.130	2.065	2.552	2.751	2.654	2.165	2.165	2.165	2.165	(-)	
		2.731	3.250	3.179	2.030	2.030	1.999	2.190	2.084	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	3.050	
		4.347	3.408	4.052	3.110	3.110	2.032	2.371	2.364	2.364	2.165	2.165	2.165	2.165		
		最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
		最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	
西市	試験回数 水温 色濁度	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
		最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
宮崎市	臭味 反力 トル 硬度 固形物量 細菌落数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		0.75	0.55	0.65	0.87	0.70	0.6	0.650	0.650	0.635	0.625	0.625	0.625	0.625	0.84
		0.675	0.65	0.65	0.746	0.061	0.6	0.650	0.650	0.635	0.625	0.625	0.625	0.625	0.84
		最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均
		最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均
長崎市	試験回数 水温 色濁度	10	9	10	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均
		最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均

標準水質検査記録

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	施行中各月各回試験ノ平均値ヲ以テ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スルモ各種檢査ノ法ニ依リテ決定スル
臭味	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	常ニ各月各回試験ノ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
反ク	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	各月各回試験ノ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
クロ	7.277 6.312 7.064	6.330 6.330 6.330	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.632 7.100 7.206	7.100 7.100 7.100	6.330 6.035 6.330	7.277 5.680 6.304	7.277 6.035 6.905	7.277 7.100 7.171	7.277 7.100 7.144	7.277 7.100 7.233	7.277 7.100 7.233	7.632 6.630 6.954
硫酸	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.692	0.667	0.466	0.466	0.755	0.888	0.888	0.932	0.932	各種檢査ノ法ニ依リテ決定スル
硬度	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.692	0.667	0.466	0.466	0.755	0.888	0.888	0.932	0.932	各種檢査ノ法ニ依リテ決定スル
固形物	76,000 64,000 68,800	76,000 68,000 72,000	68,000 64,000 65,200	64,000 60,000 63,500	64,000 60,000 64,400	68,000 60,000 64,000	68,000 60,000 64,000	72,000 60,000 66,000	72,000 60,000 61,333	72,000 64,000 66,400	68,000 64,000 66,800	72,000 64,000 69,000	72,000 64,000 68,000	76,000 60,000 66,536	平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
濁度	5.528 1.896 2.054	2.528 2.212 2.217	2.212 1.896 2.024	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 2.022	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 1.896	1.896 1.896 1.896	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 1.896	2.212 1.896 2.149	2.212 1.896 2.054	2.212 1.896 1.975	2.528 1.896 2.006	本表第二欄ニ依リテ決定スル

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	施行中各月各回試験ノ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
臭味	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	最低均 高低均	常ニ各月各回試験ノ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
反ク	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	各月各回試験ノ平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
クロ	7.277 6.312 7.064	6.330 6.330 6.330	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.632 7.100 7.206	7.100 7.100 7.100	6.330 6.035 6.330	7.277 5.680 6.304	7.277 6.035 6.905	7.277 7.100 7.171	7.277 7.100 7.144	7.277 7.100 7.233	7.277 7.100 7.233	7.632 6.630 6.957
硫酸	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.692	0.667	0.466	0.466	0.755	0.888	0.888	0.932	0.932	各種檢査ノ法ニ依リテ決定スル
硬度	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.692	0.667	0.466	0.466	0.755	0.888	0.888	0.932	0.932	各種檢査ノ法ニ依リテ決定スル
固形物	72,000 64,000 68,000	72,000 64,000 72,000	68,000 64,000 64,000	64,000 60,000 64,000	64,000 60,000 64,000	68,000 60,000 64,000	68,000 60,000 64,000	72,000 60,000 66,400	72,000 60,000 64,000	72,000 64,000 66,400	68,000 64,000 66,400	72,000 68,000 70,000	72,000 68,000 68,000	72,000 64,000 66,556	平均値ノ和ヲ十二ノ月平均値ニシテ算定スル
濁度	2.528 1.896 2.086	2.528 2.212 2.275	2.212 1.896 2.022	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 2.022	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 1.896	1.896 1.896 1.896	1.896 1.896 1.896	2.212 1.896 1.896	2.212 1.896 2.149	2.212 1.896 2.054	2.212 1.896 1.975	2.528 1.896 2.011	本表第二欄ニ依リテ決定スル

標準水質試験成績

水道名	昭和三年	年												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
長崎(本河内市) 細落	試驗回数 最低均 最高均	63 17 34	70 30 49	33 19 32	62 35 50	62 34 44	97 35 65	60 28 48	71 32 44	81 32 63	82 55 73	74 45 55	52 18 40	97 17 50	本表第一欄内各月平均試驗回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試驗回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試驗ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		5	5	5	7	5	6	10	5	8	9	5	7	7	
長崎(本河内市) 坂ノ下	試験回数 最低均 最高均	7.277 7.377 7.277	6.475 6.475 6.475	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	6.212 5.857 6.035	7.277 7.277 7.277	6.745 6.745 6.745	7.277 7.100 7.198	7.277 7.277 7.277	7.632 7.277 7.348	7.632 5.857 6.993	本表第一欄内各月平均試驗回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試驗回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試驗ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

水道名	昭和三年	年												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
長崎 武島	試験回数 最低均 最高均	10	10	12	10	10	12	10	10	12	12	8	8	1	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		10	10	12	10	10	12	10	10	12	12	8	8	1	
長崎 色度	試験回数 最低均 最高均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長崎 濁度	試験回数 最低均 最高均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長崎 臭味	試験回数 最低均 最高均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
長崎 反クル	試験回数 最低均 最高均	7.810 5.325 6.958	6.390 5.857 6.070	7.632 6.390 6.552	7.100 6.390 6.674	7.632 7.100 7.296	7.277 6.745 7.064	5.680 5.615 5.325	5.680 4.615 5.130	7.810 4.970 6.568	7.632 4.970 7.153	7.810 7.632 7.721	8.165 7.632 7.810	8.165 4.615 6.720	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		7.810 5.325 6.958	6.390 5.857 6.070	7.632 6.390 6.552	7.100 6.390 6.674	7.632 7.100 7.296	7.277 6.745 7.064	5.680 5.615 5.325	5.680 4.615 5.130	7.810 4.970 6.568	7.632 4.970 7.153	7.810 7.632 7.721	8.165 7.632 7.810	8.165 4.615 6.720	
長崎 濁落	試験回数 最低均 最高均	67 10 38	39 28 31	36 15 27	57 39 46	39 21 28	58 24 40	86 39 57	50 38 44	48 29 33	99 42 55	45 32 40	42 32 36	69 10 40	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		67 10 38	39 28 31	36 15 27	57 39 46	39 21 28	58 24 40	86 39 57	50 38 44	48 29 33	99 42 55	45 32 40	42 32 36	69 10 40	
共三	試験回数 最低均 最高均	0.966 0.566 0.966	0.733 0.733 0.733	0.733 0.733 0.733	0.733 0.733 0.733	0.633 0.633 0.633	0.733 0.733 0.733	0.566 0.566 0.566	0.566 0.566 0.566	0.888 0.888 0.888	0.978 0.978 0.978	0.888 0.888 0.888	0.888 0.888 0.888	0.978 0.566 0.775	本表第一欄内各月平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 各月ノ平均試験回数ノ和ヲ平均シテ 平均ニシテ施行シタル試験ハ各種検査ノ協定ニ 依ルベシ
		0.966 0.566 0.966	0.733 0.733 0.733	0.733 0.733 0.733	0.733 0.733 0.733	0.633 0.633 0.633	0.733 0.733 0.733	0.566 0.566 0.566	0.566 0.566 0.566	0.888 0.888 0.888	0.978 0.978 0.978	0.888 0.888 0.888	0.888 0.888 0.888	0.888 0.888 0.888	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
長崎市 (西山高部 其二)	硫酸ア 酸度 { 最低 平均 } 痕跡 (-)	1,000	0.966	1,000	1,000	1,000	0.833	0.699	0.699	1.015	1.199	1.031	1.110	1.199	本表第二通入 水ト稱スルヲ採 リテセルモリナ リ 各月ノ平均ハ 施行中ニテ各 月ノ各回ノ試 験回數ヲ以テ 除ク全年平均 數
		92,000	80,000	88,000	84,000	84,000	88,000	80,000	88,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
		84,000	80,000	80,000	80,000	80,000	84,000	80,000	80,000	80,000	84,000	80,000	80,000	80,000	
		86,000	82,300	84,000	82,800	82,800	84,800	84,800	81,800	81,800	85,200	82,000	83,000	83,000	
		2,844	2,528	2,528	2,528	2,528	3,792	2,528	2,442	2,528	2,844	2,528	2,212	2,212	
		2,528	2,528	2,212	2,433	2,528	2,338	2,844	2,528	2,528	2,465	2,212	2,212	2,212	
		89	75	57	78	59	79	11	89	100	122	22	42	46	
		19	12	9	24	11	20	42	45	32	53	17	7	7	
		46	42	27	46	36	45	75	61	64	53	31	22	22	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長	試 驗 回 數 (攝氏) 水 温 { 最低 平均 } 色 濁	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	4	4	ノ和ヲ十二 以テ除シテ 各種検査ノ方 法ニ據テ協定 上ニ據ル
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
長崎市 (西山高部 其二)	臭 味 { 最低 平均 } 反 酸 { 最低 平均 } ク ロ ー { 最低 平均 } 硫酸ア 酸度 { 最低 平均 } 痕跡 (-)	7.810	6.390	7.100	7.100	7.632	7.277	5.680	5.502	7.100	7.632	7.810	8.165	7.632	7.810	ノ和ヲ十二 以テ除シテ 各種検査ノ方 法ニ據テ協定 上ニ據ル
		5.325	5.857	6.390	6.390	7.100	6.745	4.615	4.615	5.325	5.325	7.277	7.632	7.632		
		6.958	6.070	6.352	6.674	7.206	7.029	5.325	5.112	6.603	7.366	7.721	7.810	7.810		
		1,000	0.966	1,000	1,000	0.999	0.866	0.766	0.766	1.015	1.199	1.021	1.110	1.110		
		88,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	88,000	88,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000		
		84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000		
		85,600	85,000	84,000	84,000	84,000	84,000	86,667	85,600	84,400	84,000	84,000	83,000	83,000		
		2,844	2,528	2,528	2,528	2,528	3,476	2,844	2,844	2,844	2,528	2,212	2,212	2,212		
		2,528	2,528	2,212	2,402	2,528	2,338	2,844	2,528	2,465	2,212	2,212	2,212	2,212		
		78	64	32	78	64	73	92	82	86	72	46	31	31		
21	34	20	23	23	35	45	49	40	30	22	13	13				
52	31	27	56	41	61	75	71	60	52	34	21	21				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長崎市 (西山高部 其二)	試 驗 回 數 (攝氏) 水 温 { 最低 平均 } 色 濁	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ノ和ヲ十二 以テ除シテ 各種検査ノ方 法ニ據テ協定 上ニ據ル	
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		

水道名	昭和三年												平均	備考							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月									
市 (西山高部 其三)	濁度	最低平均	7.277	6.390	6.390	7.100	6.390	7.100	7.100	6.390	6.390	4.615	5.502	7.100	7.277	7.810	7.632	8.165	8.165	0	本表第三濾過水内給水検モリノ採得セルリ
	臭度	最低平均	N N N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	反力	最低平均	0.399	1.000	1.000	0.966	0.966	1.000	0.833	0.833	0.833	0.766	0.766	0.766	1.015	0.976	0.976	1.021	1.110	1.110	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	硬度	最低平均	88.090	84.000	84.000	85.600	84.000	88.000	80.000	84.000	84.000	88.000	80.000	83.200	84.800	84.800	84.800	82.400	80.000	82.400	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	同形物量	最低平均	2.528	2.814	2.528	2.591	2.528	2.528	2.212	2.212	2.212	2.844	2.844	2.528	2.212	2.844	2.844	2.312	2.312	2.370	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	7.810	7.180	7.100	7.433	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.307	7.100	7.187	7.171	7.632	7.366	7.614	7.632	7.290	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	0.332	0.932	0.799	0.850	0.866	0.766	0.766	0.833	0.833	0.766	0.599	0.599	1.021	1.021	1.021	0.976	1.056	0.976	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	88.000	84.000	76.000	72.000	84.000	84.000	81.200	84.000	84.000	64.000	64.000	64.000	66.600	68.000	68.000	68.200	84.000	72.500	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	2.844	2.528	2.212	2.054	2.528	2.212	2.212	2.528	1.896	1.896	1.896	2.022	2.528	1.896	2.022	2.844	2.528	2.173	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル

水道名	昭和三年												平均	備考							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月									
市 (西山低部 其二)	濁度	最低平均	7.810	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	本表第一濾過水内給水検モリノ採得セルリ
	臭度	最低平均	N N N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	反力	最低平均	0.332	0.932	0.799	0.850	0.866	0.766	0.766	0.833	0.833	0.766	0.599	0.599	1.021	1.021	1.021	0.976	1.056	0.976	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	硬度	最低平均	88.000	84.000	76.000	72.000	84.000	84.000	81.200	84.000	84.000	64.000	64.000	64.000	66.600	68.000	68.000	68.200	84.000	72.500	各月中等ノ和ヲ以テ平均ニ施行シテ成績回數ノ和ヲ以テ平均ニ除クニノ各月ヲ以テノ除キタルモ
	同形物量	最低平均	2.844	2.528	2.212	2.054	2.528	2.212	2.212	2.528	1.896	1.896	1.896	2.022	2.528	1.896	2.022	2.844	2.528	2.173	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	7.810	7.180	7.100	7.433	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.307	7.100	7.187	7.171	7.632	7.366	7.614	7.632	7.290	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	0.332	0.932	0.799	0.850	0.866	0.766	0.766	0.833	0.833	0.766	0.599	0.599	1.021	1.021	1.021	0.976	1.056	0.976	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	88.000	84.000	76.000	72.000	84.000	84.000	81.200	84.000	84.000	64.000	64.000	64.000	66.600	68.000	68.000	68.200	84.000	72.500	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	2.844	2.528	2.212	2.054	2.528	2.212	2.212	2.528	1.896	1.896	1.896	2.022	2.528	1.896	2.022	2.844	2.528	2.173	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル
	硫酸アンモニウム	最高最低平均	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	2.528	2.212	同形物量ニ依テ各種檢査ノ協定ニ依ル

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
長崎市(西山低部) 昭和三三年	44 8 25	62 9 32	61 15 30	65 14 34	62 16 36	79 10 44	58 24 39	58 18 33	67 27 44	41 14 33	41 14 28	85 13 36	85 8 35	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ	
試験回数	4	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	4	4	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
臭味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
反カ	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
クロロ ン	7.632 7.100 7.411	7.100 7.100 7.100	7.277 7.100 7.135	7.100 7.100 7.100	7.632 7.100 7.277	6.390 6.390 7.135	6.390 5.857 6.124	7.435 7.100 7.236	7.277 7.100 7.171	7.632 7.277 7.384	7.987 7.277 7.608	7.810 7.455 7.677	7.987 5.857 7.282	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ

長崎市(西山低部) 昭和三三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
試験回数	5	10	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
臭味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
反カ	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	弱カ リ性	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
クロロ ン	7.277 7.277 7.277	7.277 7.100 7.189	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100 7.100 7.100	7.100	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	過二濾過ハ採 入ルモリ 浄水セリ 本表稱ス 本表稱ス 浄水セリ

濾過水質試験成績



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
長崎市 (西山低部 共三)	除跡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	痕跡 (-)	52	68	39	58	58	68	61	46	47	57	61	40	40	68	
	酸度	0.833	0.833	0.799	0.833	0.833	0.766	0.896	0.566	0.566	1.021	0.976	1.065	1.065	1.065	
	硬度	76.000	80.000	76.000	72.000	81.000	84.000	68.000	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000	72.000	71.433	
	固形物量	72.000	72.000	72.000	68.000	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	60.000	
	濁度	74.403	70.000	73.600	68.800	82.400	82.400	67.200	68.000	66.400	66.400	66.400	65.600	68.000	71.433	
	水温 (攝氏)	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	
	試水	8	6	10	10	8	8	8	8	12	10	8	8	10	10	
	色	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備考	本表第一濾過水ト稱スルニ探リ各月平均ハ當月ニ施行モ績回數ヲ以テ平均數ノ和														

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
長崎市 (出雲町浄水池 共一)	除跡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	痕跡 (-)	19	45	30	19	168	51	45	68	102	78	56	83	108		
	酸度	0.833	0.990	1.000	0.833	0.799	0.799	0.599	0.533	0.888	0.976	0.976	1.056	0.466		
	硬度	68.000	64.000	68.000	64.000	61.000	68.000	64.000	64.000	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	固形物量	64.000	64.000	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	濁度	66.500	61.400	61.400	61.000	63.000	64.500	62.667	63.600	63.600	63.500	63.500	63.500	64.830		
	水温 (攝氏)	2.528	1.896	1.580	1.896	1.896	2.212	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	2.212		
	試水	4	3	5	5	4	4	4	6	5	4	4	4	5		
	色	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	備考	本表第一濾過水ト稱スルニ探リ各月平均ハ當月ニ施行モ績回數ヲ以テ平均數ノ和														

11圖次

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
市 (出雲町浄水池 其二)	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	臭味	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	反クロー	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	硬度	0.833	0.900	1.000	0.899	0.799	0.799	0.533	0.499	0.888	0.976	0.976	0.976	0.976	0.910	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	固形物量	68,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	68,000	64,000	64,000	64,000	64,000	61,000	64,000	69,000	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	總酸	68,000	61,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	63,333	64,000	64,000	64,000	61,000	64,000	64,278	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
市 (出雲浄水池 其三)	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル	
	臭味	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	反クロー	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	0	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	硬度	0.932	0.932	0.899	1.000	0.899	0.799	0.733	0.533	0.533	0.888	0.888	0.888	0.932	0.833	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	固形物量	68,000	64,000	64,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	61,000	64,000	64,000	65,000	64,000	68,000	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	總酸	68,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	62,400	64,000	64,000	62,800	64,000	64,167	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル
	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	管内各回試驗成績ノ平均ヲ除キテ全年平均ノ和ヲ除シテ各種繪査ノ協定ニ據ル

11圖次

11圖次



水道名	昭和三年												平均	備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月				
新 潟 市	硫酸型ノ	1.017	1.003	1.018	1.013	1.186	1.393	1.386	1.330	1.336	1.818	1.714	1.100	1.818	痕跡 (-)	104.000 31.500 69.399
	硬度	0.304	0.948	0.881	0.700	0.821	0.853	0.923	1.013	1.213	1.233	1.514	1.373	0.700		
	固形物量	83.400	70.500	79.700	71.400	57.500	69.500	100.000	91.000	91.000	97.500	85.500	88.500	65.000		
	細菌落	58.380	61.500	55.300	28.610	40.000	31.500	48.500	66.500	74.000	68.500	56.500	76.000	65.000		
長 崎 市	硫酸型ノ	1.311	1.301	1.433	1.943	1.630	1.485	1.580	1.516	2.450	2.686	1.806	1.911	2.686	痕跡 (-)	5.6月ノ試験 回数少キハ 水質試験場移 轉ノダス
	硬度	1.301	1.078	1.045	0.557	0.632	0.474	0.979	0.916	1.580	1.050	0.820	1.042	0.474		
	固形物量	15.957	15.602	17.198	17.020	15.975	16.311	17.375	15.602	15.602	15.602	15.427	15.957	16.309		
	細菌落	15.508	15.881	16.187	16.236	15.247	15.957	14.893	14.184	14.184	13.474	13.825	14.715	14.819		

水道名	昭和三年												平均	備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月				
高 田 市	硫酸型ノ	2.03	1.95	1.82	1.85	1.67	1.62	1.87	1.90	1.80	1.90	1.90	1.95	1.856	痕跡 (-)	36 4 15
	硬度	1.99	1.72	1.77	1.72	1.60	1.60	1.62	1.64	1.67	1.85	1.82	1.85	1.748		
	固形物量	153.	131.	113.	119.	118.	120.	121.	118.	99.5	129.	132.	118.1	122.6		
	細菌落	28.44	0.948	1.564	1.264	0.948	1.806	2.212	2.085	1.806	2.528	1.390	2.212	1.856		
網 市	硫酸型ノ	1.99	1.72	1.77	1.72	1.60	1.60	1.62	1.64	1.67	1.85	1.82	1.85	1.748	痕跡 (-)	36 4 15
	硬度	1.99	1.72	1.77	1.72	1.60	1.60	1.62	1.64	1.67	1.85	1.82	1.85	1.748		
	固形物量	153.	131.	113.	119.	118.	120.	121.	118.	99.5	129.	132.	118.1	122.6		
	細菌落	28.44	0.948	1.564	1.264	0.948	1.806	2.212	2.085	1.806	2.528	1.390	2.212	1.856		

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	高低均	0.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.00	
臭味	高低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
反カ	高低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
クロム	高低均	7.407	6.66	7.407	7.408	7.407	7.407	8.889	9.629	8.960	8.888	8.146	8.146	8.0205	
硫酸	高低均	7.407	6.66	7.407	7.408	7.407	7.407	8.889	9.629	8.960	8.888	8.146	8.146	8.0829	
硝酸	高低均	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8.0862	
硬度	高低均	1.40	1.65	1.40	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.6081	
固形物	高低均	0.113	0.197	0.115	0.152	0.152	0.134	0.152	0.134	0.162	0.152	0.167	0.150	0.1475	
総量	高低均	0.113	0.197	0.115	0.152	0.152	0.134	0.152	0.134	0.162	0.152	0.145	0.150	0.1370	
細菌	高低均	3.11	3.888	3.111	2.815	3.111	2.975	3.427	3.760	3.427	2.427	2.427	2.427	3.075	
菌叢	高低均	3.11	3.888	3.111	2.779	3.111	2.775	3.427	3.760	3.427	2.184	2.427	2.427	29.926	
細落	高低均	15.0	6.0	42.0	10.1	15.1	15.2	0.0	30.0	35.2	10.2	10.5	15.0	17.75	
酸度	高低均	7.5	0.3	21	5.5	8	8.5	5	15	18.5	6	5	7.5	0.66	
弱了ルカ	弱了ルカ	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9.25	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	高低均	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	
臭味	高低均	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	
反カ	高低均	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	
クロム	高低均	5.330	6.254	5.830	6.382	7.150	7.346	8.865	8.865	8.865	9.574	9.219	7.831	8.092	
硫酸	高低均	5.330	5.291	5.773	6.116	7.150	8.675	8.865	8.865	8.865	9.574	9.219	7.831	5.655	
硝酸	高低均	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6.873	
硬度	高低均	2.19	2.18	2.16	2.16	2.03	2.16	2.03	2.03	2.03	2.42	2.16	2.16	2.25	
固形物	高低均	74	147	135	135	131	117	131	90	80	86	123	111	107	
総量	高低均	74	90	80	80	97	97	84	76	59	75	83	90	81	
細菌	高低均	1.314	1.645	1.019	1.426	1.449	2.115	2.212	1.246	0.671	0.774	1.072	1.132	1.357	
菌叢	高低均	1.314	0.816	1.523	1.019	1.090	0.382	1.521	0.290	0.442	0.509	0.414	0.831	0.685	
酸度	高低均	1.314	1.523	1.523	1.279	1.279	1.349	1.867	0.788	0.557	0.642	0.743	0.976	1.021	
弱了ルカ	弱了ルカ	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-)	
微痕跡	微痕跡	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-)	

濾過水質試験成績

水運名	昭和三年												平均	備考					
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月							
新發田町	細落菌数 最低平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試温回数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前モ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前モ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

市	昭和三年												平均	備考					
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月							
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細落菌数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試温回数	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
水温(攝氏)	4.5	4.5	5.8	10.5	16	17	19.5	21.5	23	16	10.5	8	13.1	—	—	—	—	—	—
色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前モ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前モ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

標準水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
高崎市	硫酸性	極少痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.8239	
	硬度	0.7500	0.7750	0.7750	0.8250	0.8500	0.8750	0.8750	0.8750	0.8250	0.8250	0.7750	0.8500	0.7679	
沼澤	硫酸性	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.7966	
	硬度	0.6906	0.7437	0.7750	0.8000	0.8312	0.8539	0.8750	0.8594	0.8142	0.8125	0.7343	0.7750	0.7966	
高崎市	固形物量	82.0000	80.4000	84.4000	83.4000	81.5000	83.0000	84.0000	84.0000	87.0000	81.0000	81.0000	88.0000	87.6300	
	濁度	51.0000	66.0000	60.4000	74.8000	76.0000	78.4000	78.0000	76.0000	76.0000	80.0000	82.1500	81.0000	76.5300	
沼澤	固形物量	87.0500	83.0500	72.5800	77.2000	79.5800	83.1150	88.9750	89.2500	79.6000	82.1500	81.7000	82.0000	82.5800	
	濁度	0.6320	0.6320	0.6330	0.6320	0.7110	0.6320	0.6616	0.7110	0.6320	0.6616	0.9183	1.0467	0.8014	
高崎市	試水温度	13°	13°	17°	18°	14°	16°	20°	16°	14°	11°	55°	6°	10°	
	回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
沼澤	試水温度	3°	3°	7°	8°	14°	16°	20°	16°	14°	11°	55°	6°	10°	
	回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

町	臭味 最低均 最高均	N 弱アルカリ性 痕跡 (-)	反クロール 最低均 最高均	硫酸性 最低均 最高均	硬度 最低均 最高均	固形物量 最低均 最高均	細落菌数	試水温度 最低均 最高均	回数 最低均 最高均	備考																	
											最低均	最高均	最低均	最高均	最低均	最高均	最低均	最高均									
宇都宮市	5.75	7	5.80	3	8.00	3	13.43	8	14.26	8	16.00	2	17.33	8	22.00	3	17.03	8	14.81	7	10.00	4	9.63	7	5.66	12.83	記載セル数字ハ以下ノ小數ハ切捨テ出サレ
田町	2.12	12	3.131	1	3.16	11	2.681	6	2.605	14	3.91	6	3.358	9	4.898	19	4.96	53	3.255	13	2.844	11	2.582	6	3.29	13.4	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	最高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭味	最高	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	最低	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
反クロム	最高	3.700	3.500	3.633	4.100	3.800	3.900	3.800	3.800	3.900	3.700	3.900	3.800	3.900	3.900
	最低	3.500	3.600	3.600	3.800	3.866	3.800	3.816	3.800	3.866	3.050	3.600	3.833	3.800	3.800
硫酸	最高	0.632	0.316	0.948	0.474	0.316	0.790	0.632	0.896	1.264	0.474	0.948	0.632	0.948	0.802
	最低	0.447	0.316	0.316	0.395	0.553	0.948	0.710	0.896	1.189	0.842	0.711	0.812	0.688	0.493
硬度	最高	1.338	1.238	1.300	1.263	1.250	1.250	1.255	1.225	1.225	1.175	1.225	1.200	1.208	1.329
	最低	1.330	1.238	1.300	1.261	1.249	1.250	1.241	1.225	1.189	1.191	1.237	1.208	1.242	1.228
固形物	最高	88,500	85,200	83,300	96,000	88,800	83,000	83,000	85,000	79,600	85,500	84,900	87,000	88,387	88,462
	最低	82,000	82,000	82,000	88,800	78,000	80,000	83,000	85,000	77,733	70,645	83,100	77,600	82,272	82,272
硫酸	最高	0.632	0.316	0.948	0.474	0.316	0.790	0.632	0.896	1.264	0.474	0.948	0.632	0.948	0.802
	最低	0.447	0.316	0.316	0.395	0.553	0.948	0.710	0.896	1.189	0.842	0.711	0.812	0.688	0.493
濁度	最高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	最高	22	34	27	29	35	29	24	35	31	33	32	29	30	12.38
	最低	22	34	27	29	35	29	24	35	31	33	32	29	30	12.38
臭味	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反クロム	最高	1.9508	2.1276	2.1276	1.5957	1.5957	1.5957	1.4184	1.5957	1.5957	1.4184	1.4184	1.4184	1.6546	
	最低	1.9503	2.0346	1.9831	1.5957	1.5957	1.5957	1.3445	1.5284	1.5557	1.2787	1.3962	1.4184	1.6295	
硫酸	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硬度	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	最低	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
固形物	最高	43	44	44	44	44	44	42	46	44	44	43	44	43.833	
	最低	40	40	40	40	40	40	40	39	40	40	39	40	39.833	
濁度	最高	2.686	2.844	3.002	3.792	2.844	3.792	4.740	3.960	3.634	4.108	3.476	2.528	3.451	
	最低	2.686	2.370	2.528	2.528	2.844	2.528	3.476	2.528	2.212	2.528	2.054	2.054	2.528	
硫酸	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	最高	22	34	27	29	35	29	24	35	31	33	32	29	30	
	最低	22	34	27	29	35	29	24	35	31	33	32	29	30	

濁水質試験成績



水道名	昭和三年		一月		二月		三月		四月		五月		六月		七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		平均	備考
	甲府市	細路	30	18	21	15	21	16	24	15	24	17	19	15	29	18	186	16	21	15	28	16	27	16	24	38.083		
試験回数	水温 (攝氏)	色度	濁度	臭味	反	クロー	硫酸	亜	酸	腐	カ	弱	カ	性	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	11	
															22.636	17.029	18.880	18.969	19.400	16.586	20.417	36.543	17.355	20.485	18.688	18.310	19.608	
高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	16.000	
最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	19.608	
低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	16.000		
均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	19.608		

水道名	昭和三年		一月		二月		三月		四月		五月		六月		七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		平均	備考
	甲府市	細路	30	18	21	15	21	16	24	15	24	17	19	15	29	18	186	16	21	15	28	16	27	16	24	38.083		
試験回数	水温 (攝氏)	色度	濁度	臭味	反	クロー	硫酸	亜	酸	腐	カ	弱	カ	性	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	11	
															22.636	17.029	18.880	18.969	19.400	16.586	20.417	36.543	17.355	20.485	18.688	18.310	19.608	
高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	16.000	
最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最	19.608	
低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低	16.000	
均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	均	19.608	

藤澤水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
上田市	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仙居市	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	1, 2位下四席 五八七														

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
仙居市	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福島市	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	1, 2位下四席 五八七														

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
福島市	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭度	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	反味	弱カリ性	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	クロール	6.702	6.702	6.026	6.702	6.204	9.575	5.581	6.668	6.736	5.928	6.062	6.653	6.4028	
	硝酸	6.381	6.702	5.849	6.313	5.318	9.572	5.581	6.206	6.213	5.759	6.062	6.4028		
	硫酸	6.519	6.702	5.899	6.515	5.681	9.574	6.978	6.536	6.363	5.890	6.062	6.5250		
	硬度	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	固形物	84.000	64.000	68.800	64.000	75.200	69.600	68.800	74.000	111.000	80.400	66.000	76.966		
	総量	63.600	64.000	69.400	54.000	66.400	80.000	61.600	58.000	64.600	63.300	54.800	62.983		
	平均	70.142	64.000	65.875	58.857	68.916	91.771	67.400	65.280	68.714	80.155	69.288	69.073		
最低	1.960	1.960	1.304	2.380	3.270	2.528	2.860	1.578	2.730	4.516	3.130	2.872			
最高	1.422	1.960	1.334	1.914	2.430	1.738	2.860	1.515	2.340	1.955	2.730	2.012			
平均	1.736	1.960	1.605	2.246	3.024	2.0991	2.860	2.5528	2.4857	2.770	2.886	2.344			

水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
山形市	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭度	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	反味	弱カリ性	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	クロール	4.963	4.963	4.254	4.963	4.254	3.191	2.836	3.191	3.191	4.254	4.254	3.899	
	硝酸	4.254	4.963	4.254	4.254	4.254	2.836	2.836	2.836	3.191	3.191	4.254	3.899	
	硫酸	4.387	4.963	4.254	4.609	4.254	3.015	3.014	3.191	3.191	3.723	4.254	3.899	
	硬度	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	固形物	83.500	80.000	96.500	50.000	61.000	64.000	75.000	53.500	56.000	58.000	61.500	59.700	
	総量	60.000	64.000	71.500	40.000	42.000	45.000	74.000	51.500	51.000	48.500	52.500	52.500	
	平均	71.100	73.500	84.500	45.000	49.000	51.000	74.500	52.500	52.800	51.700	57.800	57.800	
最低	0.886	0.917	0.917	0.601	0.911	0.949	0.854	0.918	0.602	0.881	0.886	0.602		
最高	0.285	0.285	0.601	0.310	0.304	0.918	0.854	0.854	0.602	0.743	0.301	0.602		
平均	0.443	0.584	0.809	0.456	0.819	0.934	0.854	0.886	0.602	0.743	0.714	0.692		



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
青森市	硫酸型ノ硝酸	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
	硫酸型ノ硝酸	7.0	.90	.90	.90	.90	.80	.80	.80	.75	.70	.70	.75	.85	.85
青森市	硬度	.65	.90	.70	.80	.86	.78	.70	.75	1.2	.90	.85	.75	.81	.83
	硬度	.68	.90	.80	.88	.88	.75	.70	.75	1.2	.90	.83	.75	.83	.83
青森市	固形物量	52,600	50,800	60,200	48,050	48,200	95,000	76,050	74,025	132,050	86,250	78,255	60,160	72,560	
	固形物量	32,060	42,500	50,000	67,520	36,810	36,852	57,250	48,520	48,250	59,380	52,850	38,500	47,541	
青森市	濁度	42.330	51.150	55.100	57.785	42.550	65.926	66.650	61.273	90.150	72.815	65.553	49.330	60,051	
	濁度	3.450	3.160	3.850	2.528	2.054	3.792	1.836	2.028	3.160	4.740	3.838	4.058	3.214	
青森市	水温	0.950	1.896	0.948	1.896	1.896	2.212	1.035	0.925	0.948	3.760	1.896	2.850	1.701	
	水温	2.200	2.528	2.399	2.212	1.975	3.002	1.466	1.477	2.054	3.950	2.877	3.454	2.458	
青森市	試験回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	試験回数	0.85	0.75	3.00	7.50	14.80	17.25	24.60	24.00	20.50	14.25	5.50	.60	11.11	
青森市	色度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	色度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
青森市	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

所	臭	味	色	濁度	試験回数	色度	濁度
川原町	臭	最高最低均	最高最低均	最高最低均	最高最低均	最高最低均	最高最低均
	臭	24.745	26.586	28.280	24.920	23.397	26.904
川原町	味	21.360	24.750	27.631	22.179	21.270	23.042
	味	23.053	25.068	27.906	23.550	22.334	24.973
川原町	色	1.20	1.00	1.40	0.76	1.00	0.80
	色	1.10	1.00	1.30	0.70	0.90	0.80
川原町	濁度	1.15	1.00	1.30	0.70	0.90	0.80
	濁度	1.20	1.00	1.40	0.76	1.00	0.80
山形市	試験回数	1	1	1	1	1	1
	試験回数	7.2	7.	6.5	8.5	11.	13.5
山形市	色度	-	-	-	-	-	-
	色度	-	-	-	-	-	-
山形市	濁度	-	-	-	-	-	-
	濁度	-	-	-	-	-	-

標準水質試験成績

水質名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	高低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地下水ナルヲ以テ浄水池ノ分ヲ記入セリ
臭味	最高最低均	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	最高最低均	中性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロム	最高最低均	4.94	4.86	5.67	6.38	5.67	5.67	6.02	6.38	5.70	5.32	5.32	5.32	5.64	
硫酸	最高最低均	微量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硬度	最高最低均	0.575	0.600	0.575	0.575	0.500	0.525	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.57	0.567	
固形物	最高最低均	70.0	70.0	60.0	60.0	57.5	55.0	67.5	67.5	60.0	75.0	75.0	75.0	65.0	
細落	最高最低均	1.261	.316	.574	.574	.316	.316	.316	.316	.316	.316	.316	.316	.438	

水質名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
試験回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
温度	最高最低均	0.9	0.75	2.5	7.5	11.75	16.5	17.5	23.5	22.0	14.5	8.25	1.75	1.516	
色度	最高最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁度	最高最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最高最低均	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反	最高最低均	微量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロー	最高最低均	15	15	16	16	13	14	13	13	13	13	14	13	13	
硫酸	最高最低均	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	0.5	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	
硬度	最高最低均	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.	0.8	
固形物	最高最低均	65	63	63	54	58	65	57	59	70	70	81	66	64	
細落	最高最低均	1.106	1.048	1.074	0.948	1.290	1.227	1.388	1.674	1.204	1.403	1.557	2.527	1.516	
固形物	最高最低均	1.074	1.048	1.074	0.948	1.290	1.227	1.388	1.674	1.204	1.403	1.557	2.527	1.516	
細落	最高最低均	1.030	1.061	1.162	1.024	2.071	1.610	0.919	1.396	1.139	1.317	1.404	1.802	1.338	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
秋田市	26 8 17	16 8 12	12 8 10	20 10 15	25 9 17	15 11 13	12 6 9	30 10 20	67 24 45	38 20 20	51 10 30	12 12 12	29 11 19		
細菌数 (最 最 均)															
試験回数	1	—	1	1	—	2	—	1	1	1	—	1	—		
水温(攝氏)	6.7	—	6.6	12.5	—	22.9	—	26.0	26.5	18.0	—	11.5	—	16.4	
色	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反	N	—	N	N	—	—	—	N	N	N	—	N	—	N	
クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	11.390	—	13.502	12.353	—	11.558	—	12.338	11.861	11.532	—	13.000	—	12.269	
高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最高均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鳥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
松江市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
試験回数	2	5	4	2	3	5	4	5	4	4	5	2	—		
水温(攝氏)	1.0	1.0	9.2	12.4	17.2	20.8	23.9	27.4	24.4	20.4	15.0	10	—	15.5	
色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	14.184	12.766	12.408	10.638	12.408	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	10.638	—	12.275	
高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最高均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松江市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年												平均	備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月				
松江市	硫酸	痕跡	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡	
	砒素	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-)	
	硬度	0.65	0.725	0.725	0.525	0.70	0.725	0.625	0.725	0.725	0.775	0.775	0.750	0.750	0.702	
	四形物量	59.0	61.0	45.0	33.0	54.2	93.6	58.4	70.4	54.8	60.0	76.0	58.0	42.5	60.2	
江門市	細菌叢数	2,212	3,792	3,160	1,580	4,108	3,476	4,108	4,421	5,372	3,792	5,056	1,580	3,555	3,555	
	細菌叢数	1,896	2,212	1,896	1,580	3,792	1,580	1,264	2,212	1,896	3,160	2,212	1,580	2,106	2,106	
	硬度	0.65	0.400	0.525	0.500	0.57	0.400	0.480	0.600	0.660	0.700	0.665	0.700	0.620	0.620	
	四形物量	59.0	31.6	35.6	22.6	47.0	35.6	40.0	35.2	44.4	44.1	55.8	50.2	48.4	48.4	
岡崎市	硫酸	6.0	5.8	5.5	6.2	7.8	5.7	7.4	6.4	6.2	7.5	5.8	5.6	6.3	6.3	
	砒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	硬度	0.65	0.400	0.525	0.500	0.57	0.400	0.480	0.600	0.660	0.700	0.665	0.700	0.620	0.620	
	四形物量	59.0	31.6	35.6	22.6	47.0	35.6	40.0	35.2	44.4	44.1	55.8	50.2	48.4	48.4	

水道名	昭和三年												平均	備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月				
廣島市	硫酸	7.8	8.0	8.6	7.8	9.0	8.6	8.4	9.0	8.0	8.8	7.6	7.8	82.8		
	砒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.4		
	硬度	0.65	0.400	0.525	0.500	0.57	0.400	0.480	0.600	0.660	0.700	0.665	0.700	0.620	0.620	
	四形物量	59.0	31.6	35.6	22.6	47.0	35.6	40.0	35.2	44.4	44.1	55.8	50.2	48.4	48.4	
山形市	細菌叢数	43	76	44	40	43	80	42	37	160	67	46	92	65		
	細菌叢数	1,067	1,343	0,632	0,632	0,869	0,474	1,462	0,672	0,632	0,711	0,553	0,474	0,793		
	硬度	1.375	1.393	0.963	0.800	1.138	1.012	1.019	1.012	0.975	0.904	0.850	1.125	1.083		
	四形物量	42,500	43,173	48,150	38,625	25,750	72,500	61,500	55,000	43,000	30,625	47,875	47,875	46,700		
山形市	硫酸	7.8	8.0	8.6	7.8	9.0	8.6	8.4	9.0	8.0	8.8	7.6	7.8	82.8		
	砒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.4		
	硬度	0.65	0.400	0.525	0.500	0.57	0.400	0.480	0.600	0.660	0.700	0.665	0.700	0.620	0.620	
	四形物量	59.0	31.6	35.6	22.6	47.0	35.6	40.0	35.2	44.4	44.1	55.8	50.2	48.4	48.4	

瀧池水質試験成績



水道名	昭和三年	月												平均	備考	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
廣島市	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	味度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	反作用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クロロホルム	6.853	5.584	5.837	5.076	4.988	8.250	8.750	7.178	3.960	4.302	6.250	6.500	6.375	6.250	5.721
	硫酸型	0.334	0.279	0.313	0.378	0.500	0.716	0.749	0.631	0.587	0.376	0.382	0.368	0.368	0.472	0.472
	硬度	1.190	1.203	1.300	1.200	1.192	1.198	1.381	1.230	1.220	1.180	1.180	1.180	1.180	1.140	1.163
	固形物量	47.000	47.000	54.000	59.000	61.000	70.000	63.000	77.000	56.000	68.000	77.000	46.000	55.000	30.000	48.618
	細落	1.601	1.604	1.747	1.896	2.212	3.160	2.844	2.478	3.160	2.054	2.201	1.764	1.764	1.497	1.497
	平均	1.185	1.296	1.326	1.370	1.456	1.594	1.938	1.638	2.033	1.525	1.215	1.364	1.364	1.133	1.133

水道名	昭和三年	月												平均	備考	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
奥州市	水温	6.4°	5.3°	8.9°	12.8°	17.2°	21.7°	25°	27.7°	23.8°	18.3°	12.8°	10.6°	15.9°	15.9°	15.9°
	色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	味度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	反作用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クロロホルム	5.332	4.886	5.456	5.580	5.481	5.173	6.370	6.174	6.370	5.880	5.880	6.174	6.174	5.441	5.441
	硫酸型	0.334	0.279	0.313	0.378	0.500	0.716	0.749	0.631	0.587	0.376	0.382	0.368	0.368	0.472	0.472
	硬度	1.150	2.200	2.160	2.000	1.850	1.650	1.630	1.754	1.500	2.056	2.056	2.050	2.050	2.041	2.041
	固形物量	89.000	83.000	87.000	83.000	83.000	79.000	78.000	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000	88.000	82.000	80.627
平均	1.219	1.245	1.340	1.384	1.431	1.650	1.553	1.496	1.976	1.319	1.257	1.257	1.257	1.204	1.204	

奥州市



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
福山市	硫酸ア	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	高尾池ノ配水井水ヲ謂フ
	硬度	0.7750	0.8813	0.7730	0.8000	0.8125	0.8375	0.9575	0.9750	0.7250	0.6475	0.6350	0.7000	0.7334	
	固形物量	69.333	71.500	74.322	77.000	74.000	76.000	69.000	68.000	68.000	65.000	61.000	62.000	75.9213	
	濁度	6.0	5.5	8.9	12.3	16.7	20.3	20.0	24.4	24.6	20.0	14.9	10.0	15.3	
山手市	硫酸ア	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	高尾池ノ配水井水ヲ謂フ
	硬度	0.7667	0.8406	0.7750	0.8000	0.8000	0.8000	0.8250	0.6500	0.6125	0.6350	0.6350	0.6638	0.7316	
	固形物量	65.111	68.571	70.750	72.000	73.000	70.000	67.000	62.000	58.000	59.000	60.000	58.000	65.2877	
	濁度	6.0	5.5	8.9	12.3	16.7	20.3	20.0	24.4	24.6	20.0	14.9	10.0	15.3	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
關門市	硫酸ア	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	高尾池ノ配水井水ヲ謂フ
	硬度	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	
	固形物量	54.400	60.000	60.000	60.000	70.000	60.000	66.667	60.000	66.667	66.667	50.000	56.000	65.033	
	濁度	4.2	2.0	3.0	8.0	5.1	5.0	2.2	10.2	5.3	5.1	2.6	2.2	5.6	
下市	硫酸ア	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	高尾池ノ配水井水ヲ謂フ
	硬度	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	0.9332	
	固形物量	40.000	33.333	46.000	30.000	40.000	40.000	66.667	46.667	40.000	40.000	30.000	43.000	41.306	
	濁度	2.8	1.0	1.1	3.1	2.1	2.5	2.2	5.3	3.0	3.0	2.6	4.5	2.9	

濾過水質試験成績

水遊名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
濁度 { 最低平均 最高平均 }	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
臭度 { 最低平均 最高平均 }	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
反クロール { 最低平均 最高平均 }	11.344	10.980	10.812	10.720	11.344	13.120	11.34	11.15	10.810	9.31	11.120	10.63	11.066	10.63	11.066
	10.380	10.280	10.580	10.630	10.630	11.440	10.34	10.63	10.590	9.26	10.160	10.25	10.388	10.25	10.388
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	10.812	10.630	10.546	10.675	11.078	12.280	10.84	10.79	10.665	9.26	10.640	10.44	10.721	10.44	10.721
	10.812	10.630	10.546	10.675	11.078	12.280	10.84	10.79	10.665	9.26	10.640	10.44	10.721	10.44	10.721
硫酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	2.68	2.49	2.42	2.16	2.32	2.75	2.42	2.81	2.72	2.70	2.72	2.82	2.60	2.60	2.60
	2.22	2.40	2.20	2.13	2.22	2.42	2.20	2.50	2.25	2.630	2.25	2.53	2.328	2.328	2.328
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	2.45	2.445	2.31	2.146	2.370	2.585	2.310	2.555	2.485	2.660	2.485	2.62	2.457	2.457	2.457
	2.45	2.445	2.31	2.146	2.370	2.585	2.310	2.555	2.485	2.660	2.485	2.62	2.457	2.457	2.457
固形物量 { 最低平均 最高平均 }	3.16	3.79	3.160	3.790	3.210	4.1	3.790	3.53	3.790	3.260	3.790	3.476	3.570	3.570	3.570
	2.312	3.12	2.21	2.800	2.538	2.68	3.160	3.40	3.160	3.160	3.160	2.900	2.874	2.874	2.874
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	2.086	3.455	2.686	3.295	3.869	3.39	3.475	3.465	3.475	3.210	3.475	3.188	3.222	3.222	3.222
	2.086	3.455	2.686	3.295	3.869	3.39	3.475	3.465	3.475	3.210	3.475	3.188	3.222	3.222	3.222
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	14	10	11	23	23	58	87	54	30	32	67	18	35.583	35.583	35.583
	9	6	5	15	17	13	56	16	19	13	24	11	17.000	17.000	17.000
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	11.5	8	8	19	20	35.5	71.5	35	24.5	22.5	45.5	14.5	26.291	26.291	26.291
	11.5	8	8	19	20	35.5	71.5	35	24.5	22.5	45.5	14.5	26.291	26.291	26.291

水遊名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
試験回数 (攝氏) { 最低平均 最高平均 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7.5	8	14	14.5	20	20	23	26.5	24.5	17.5	15.5	11.5	11.5	11.5	11.5
色度 { 最低平均 最高平均 }	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
濁度 { 最低平均 最高平均 }	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
臭度 { 最低平均 最高平均 }	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
反クロール { 最低平均 最高平均 }	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10
硫酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
硝酸アモニア { 最低平均 最高平均 }	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
固形物量 { 最低平均 最高平均 }	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年												備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		平均
和歌山市	6 2 4	40 12 26	7 4 6	4 3 4	10 8 9	4 3 4	12 9 11	10 6 8	14 7 11	7 5 6	8 3 6	7 5 6	11 6 8	
試験回数	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	
水温(攝氏)	10.0	10.0	9	9	9.0	10.0	9.0	10.0	10.0	8.0	7.5	7.0	8.7	
色	3-3	4-4	4-4	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	
濁度	3-3	4-4	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	
臭味	N-N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
反クロール	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	7.0	8.7	
硫酸	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	7.0	8.7	
硝酸	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	7.0	8.7	
平均	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	7.0	8.7	

市	昭和三年												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
丸龜市	0.4	0.3	0.3	0.15	0.3	1.46	0.4	0.4	0.4	0.4	0.15	2.83	
硬度	0.4	0.3	0.3	0.15	0.3	1.46	0.4	0.4	0.4	0.4	0.15	2.83	
固形物	1.9	103	102	98.0	98.0	105	102	100	102	100	98.0	91.5	
濁度	1.9	103	102	98.0	98.0	105	102	100	102	100	98.0	91.5	
臭味	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
反クロール	1.9	10	9	0	11	17	14	8	14	8	3	9	
試験回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水温(攝氏)	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	8.7	
色	3-3	4-4	4-4	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	
濁度	3-3	4-4	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	
臭味	N-N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
反クロール	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	8.7	
硫酸	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	8.7	
硝酸	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	8.7	
平均	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	8.7	

瀧過水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
丸龜市	酸度 高低均 最低平均 最高平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌聚數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試水温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
數	3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	細菌検査 八月 二回施行
酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌聚數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試水温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
數	3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	細菌検査 八月 二回施行

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
和島市	酸度 高低均 最低平均 最高平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌聚數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試水温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
數	5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—
酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌聚數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試水温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
數	5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—

瀧過水質試驗成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
高知市	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭度	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	反味	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	
	クロール	5.6026	5.9218	6.0636	6.0282	6.4537	7.0210	7.1274	7.0764	6.9855	5.9218	6.3501	5.9572	6.4241	
	硝酸	5.4963	5.4608	5.7190	5.3190	5.6736	5.4153	5.7899	5.6736	5.4153	5.9218	6.6301	5.0709	5.6331	
	硫酸	5.5580	5.7207	5.0484	5.7133	6.0654	6.2239	6.6617	6.4810	6.5012	5.9218	6.8225	5.3338	6.0045	
	硬度	1.0075	0.9625	0.9625	0.9875	0.9025	1.1075	1.0775	1.0025	0.9925	0.9967	1.0025	0.9571	0.9529	
	固形物量	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	82.0000	
	細菌落	1.4040	1.4040	1.3104	1.7472	2.4024	2.4336	2.7768	3.7440	2.4960	1.3416	1.4040	1.2480	1.9780	
	痕跡	1.2480	1.1232	1.1856	1.1856	1.2480	1.2480	1.0425	1.3416	1.3416	1.3416	1.3416	1.0608	1.22567	
弱カリ性	1.3416	1.2345	1.2385	1.3717	1.5004	1.6678	1.7760	1.6718	1.6762	1.3416	1.3728	1.1219	1.4421		

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
福門市	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	反味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	クロール	7.284	7.128	5.67	6.756	6.503	6.334	6.487	5.428	5.663	5.280	5.747	5.915	6.125	7.284
	硝酸	7.284	7.128	5.67	6.756	6.503	6.334	6.487	5.428	5.663	5.280	5.747	5.915	6.125	7.284
	硫酸	7.284	7.128	5.67	6.756	6.503	6.334	6.487	5.428	5.663	5.280	5.747	5.915	6.125	7.284
	硬度	0.750	0.650	0.650	0.700	0.835	0.850	0.775	0.700	0.950	0.900	0.817	0.825	0.825	0.950
	固形物量	63.200	62.800	60.000	60.000	64.000	66.400	53.800	60.800	58.400	66.800	63.600	60.800	66.800	66.800
	細菌落	1.945	2.058	2.336	3.796	1.500	2.533	2.682	2.065	2.384	2.400	2.348	2.384	2.384	3.796
	痕跡	1.460	1.911	1.752	2.190	1.350	1.645	2.384	1.022	1.764	1.500	1.639	1.475	1.475	1.022
弱カリ性	1.812	2.022	2.044	3.176	1.463	2.194	2.533	1.599	2.110	2.038	1.978	1.947	1.947	2.076	

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
福岡市	細菌叢数	14 3 10	13 4 10	18 1 9	4 2 3	4 1 2	3 1 2	3 2 3	20 2 8	5 1 3	11 1 4	5 1 2	11 2 7	20 1 1	
	高低均														
門司	試験回数	113	117	126	126	126	118	126	138	117	116	126	113	121	
	温度(攝氏)	6.0	6.2	8.1	12.8	16.0	18.3	21.1	22.3	22.1	19.4	14.8	9.9	14.6	
	色	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	反味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	クロール	6.383	6.028	6.383	6.383	6.028	6.383	6.028	6.383	6.737	6.028	6.305	6.305	6.216	
	硫酸	5.850	6.028	6.028	6.028	6.028	6.205	6.205	6.205	5.050	5.850	5.850	5.850	6.216	
	硫酸	6.105	6.238	6.238	6.238	6.261	6.528	6.520	6.546	6.238	5.905	6.02	6.018	6.216	
	硫酸	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
小倉市	試験回数	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	
	温度(攝氏)	6	8	12	13	15	18	22	23	23	21	18	15	10	
	色	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臭	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	反味	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	クロール	6.170	6.515	6.175	6.300	6.305	7.265	5.875	6.325	6.725	6.500	6.500	6.840	6.457	
	硫酸	5.975	6.340	5.880	6.255	6.135	5.375	5.200	6.180	6.235	6.175	6.100	6.375	6.035	
	硫酸	6.000	6.413	6.000	6.275	6.230	6.461	5.691	6.233	6.440	7.450	6.280	6.558	6.335	
	硫酸	弱カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	
	硫酸	弱カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	カ	

濾過水質試験成績



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
小倉市	硫酸アノ 硝毛 度 固形物 量 總 平均	1.000 0.970 1.000	1.050 1.000 0.970	1.050 1.000 0.970	1.050 1.000 0.970	1.070 1.000 0.970	1.050 1.000 0.970	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	1.050 1.000 0.970	1.050 1.000 0.970	1.500 1.000 0.970	1.500 1.000 0.970	1.037 0.999 0.977	痕跡 (-) (-)
倉敷市	硫酸アノ 硝毛 度 固形物 量 總 平均	3.100 1.724 2.331	2.070 1.440 1.830	2.240 1.726 1.937	2.940 1.488 1.971	1.940 1.725 1.836	2.400 1.876 1.915	2.175 1.816 1.906	2.146 1.644 1.490	2.100 1.764 1.908	2.240 1.840 1.963	2.240 1.840 1.963	2.148 1.850 1.942	2.253 1.730 1.922	痕跡 (-) (-)
備前市	試験温度 回数 平均	7 5 6.3	18 5 11	14 9 7	11 7 8	13 4 8	28 4 15	22 8 15	9 3 6	15 8 11	15 6 9	9 5 7	15 9 12	N	クロール硬酸 硝毛ノ脱色 カカリノ量 細菌数 上牧山遺過 シテ下加各 部ハニ過 水チリ

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
豊後市	硫酸アノ 硝毛 度 固形物 量 總 平均	13.452 14.2 12.846	13.329 14.251 12.852	14.18 15.932 12.852	14.18 15.932 12.852	13.166 15.000 13.100	18.077 15.1 13.766	12.407 13.471 9.571	11.698 12.762 10.635	12.507 14.889 10.28	11.314 13.116 11.344	13.471 13.471 10.571	12.23 14.002 9.926	13.315 14.197 11.640	痕跡 (-) (-)
若松市	硫酸アノ 硝毛 度 固形物 量 總 平均	3.41 1.19 3.32	3.33 1.16 2.68	3.33 1.25 2.42	3.33 2.00 3.27	3.72 2.01 3.14	3.98 1.54 3.4	3.46 1.02 1.9	3.72 1.15 2.81	3.98 1.15 3.5	5.72 1.16 3.46	3.044 1.225 2.342	3.304 1.5 2.472	3.527 1.363 2.868	痕跡 (-) (-)
反谷市	硫酸アノ 硝毛 度 固形物 量 總 平均	1.177 3.347 1.512	1.443 3.1 1.958	1.187 2.705 1.732	1.90 3.83 1.059	1.765 3.365 1.512	1.432 3.58 2.037	0.976 2.68 2.707	0.995 3.30 2.301	1.05 3.72 2.787	1.115 3.59 0.79	1.114 2.715 2.477	1.936 1.802 2.184	1.26 3.136 1.937	痕跡 (-) (-)

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
回数 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
数 (攝氏)	10.2	14	16	17.5	23	14.3	15.8							41.3	
最低均	3.1905	4.254	4.963	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1630	
最高均	3.1905	4.254	4.963	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.0472	
最低均	3.1905	4.254	4.6085	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1070	
最高均	3.1905	4.254	4.6085	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1070	
酸度	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	
硫酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硝酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硬度	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	138.0800	
固形物量	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	99.3530	
最低均	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	117.7100	
最高均	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	117.7100	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
回数 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
数 (攝氏)	10.2	14	16	17.5	23	14.3	15.8							41.3	
最低均	3.1905	4.254	4.963	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1630	
最高均	3.1905	4.254	4.963	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.0472	
最低均	3.1905	4.254	4.6085	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1070	
最高均	3.1905	4.254	4.6085	4.0768	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.1070	
酸度	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	
硫酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硝酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硬度	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	138.0800	
固形物量	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	99.3530	
最低均	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	117.7100	
最高均	107.500	139.310	174.500	135.000	135.000	118.000	118.000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	117.7100	

濃過水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
別府市	細菌落	14,422	—	2,814	1,853	2,528	—	1,300	—	—	—	1,064	—	1,819	
	細菌落	1,422	—	2,814	1,567	2,054	—	1,300	—	—	1,064	—	1,379		
	細菌落	15.5	—	2,052	1,560	2,201	—	1,308	72	—	—	40	—	1,598	
中市	硬度	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色度	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
津市	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
佐賀市	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
津市	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
別府市	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	月												平均	備考			
		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二					
佐賀市	硫酸アモニウム	(-) (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-) (-)	
	硬度	1.50	1.50	1.6	1.65	1.6	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.63	
	固形物量	172.8	155.5	152.8	185.2	163.8	156.0	161.5	155.0	171.2	135.0	151.0	102.0	155.23				
	細菌落数	0.0	2.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	3.0	2.33				
京都市	試験回数	2	2	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4				
	水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水道名	昭和三年	月												平均	備考			
		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二					
仁川府	硫酸アモニウム	(-) (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-) (-)	
	硬度	1.930	1.850	1.900	2.000	1.950	2.025	2.250	1.975	1.775	1.825	1.425	1.400	1.810				
	固形物量	65,000	70,000	68,000	60,000	60,000	65,000	95,310	78,120	79,500	59,100	59,000	60,000	69,253				
	細菌落数	1.936	1.896	2.054	1.675	1.679	1.837	1.305	1.660	2.015	1.770	1.382	1.477	1.724				
京城	試験回数	4	8	4	5	6	5	5	4	4	5	4	4	5				
	水温(攝氏)	5.0	8.0	9.0	13.0	16.0	22.0	23.0	25.0	24.0	18.0	10.0	6.0	15.9				
	色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
仁川府	濁度	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	臭度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	反味	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	クロール	6.735	7.090	6.735	8.155	7.444	7.090	6.381	6.381	6.381	6.026	6.735	6.735	7.000	弱アルカリ性
	硫酸	6.026	6.026	6.381	6.735	6.026	5.672	5.672	5.317	5.317	5.317	6.026	6.026	6.026	
	硝酸	6.383	6.558	6.558	7.445	6.735	6.381	6.381	5.819	5.819	5.672	6.026	6.380	6.913	
	硫酸	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少
	硫酸	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡
	硫酸	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	硬度	2,000	1,875	1,450	1,896	1,825	1,900	1,800	1,800	1,825	1,850	1,800	1,770	1,875	1,851
固形物	70,000	65,000	45,000	60,000	70,000	84,000	55,000	50,000	50,000	50,000	52,000	54,000	60,000	60,000	
濁度	1,900	1,450	1,663	1,750	1,750	1,750	1,550	1,725	1,725	1,750	1,725	1,725	1,725	1,710	
固形物	63,000	55,000	60,000	60,000	62,000	68,000	48,000	49,000	49,000	47,500	49,000	52,000	66,000	54,800	
濁度	1,975	1,975	1,975	1,975	2,054	2,024	1,817	1,738	1,817	1,896	1,738	1,679	1,738	1,870	
固形物	55,000	45,000	55,000	60,000	54,000	52,000	40,000	48,000	48,000	45,000	46,000	50,000	52,000	49,500	
濁度	1,836	1,735	1,855	1,659	1,735	1,422	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,550	1,422	1,625	
固形物	63,000	55,000	60,000	60,000	62,000	68,000	48,000	49,000	49,000	47,500	49,000	52,000	66,000	54,800	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
山群府	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	臭度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	反味	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	クロール	17.600	15.600	18.000	14.090	14.090	15.600	15.600	15.600	14.820	14.820	14.820	14.090	13.260	微量
	硫酸	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	硝酸	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	硫酸	0.864	0.900	0.900	0.553	0.752	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	1.000	1.000	
	硬度	88,000	87,200	86,000	85,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	83,000	70,000	70,000	
	固形物	88,000	87,200	86,000	85,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	83,000	70,000	70,000	
	濁度	2.561	3.338	3.436	2.340	2.340	3.338	3.330	3.330	3.330	4.400	3.338	3.530	1.847	

濁水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
郡山府	最低均	80	85	90	95	85	85	90	90	90	30	25	76.350		
細落	最高均														
試験回数	(攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.62		
水温	最低均	7.5	4.3	6.2	10.05	18.25	24.0	24.5	23.6	23.15	17.9	9.75	6.25	14.62	
色度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最低均	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
反作用	最低均	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	
クロール	最低均	10.105	9.813	10.125	12.108	10.472	10.304	10.834	10.493	10.200	10.372	10.500	10.297	10.59	
硫酸重	最低均	(-)	(-)	(-)	5.153	9.579	9.692	10.428	10.912	9.514	9.413	9.514	9.755	9.71	
硝酸	最低均	(-)	(-)	(-)	10.630	10.020	9.696	10.630	10.700	9.860	9.890	9.850	10.020	10.11	

府	試験回数	(攝氏)	月												平均	備考
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大府	最低均	4°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.°5	(1) 水質試験之 毎月一回最高 ヲ行フ區分シ テ(2) 本表ノ濃 過辨室内ノ成 績ヲ掲ケ	
色度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
濁度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
臭味	最低均	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
反作用	最低均	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性	弱カリ性		
クロール	最低均	4,000	4,000	4,500	4,500	6,500	5,500	6,000	6,000	5,000	5,000	4,500	4,500	5,250		
硬度	最高均	0.39	0.47	0.48	0.43	0.42	0.43	0.41	0.39	0.40	0.38	0.40	0.37	0.40		
固形物	最高均	40.0	43.0	42.0	33.0	32.0	35.0	31.0	34.0	31.0	32.0	31.0	32.0	32.2		
總量	最高均	2.03	1.37	1.70	2.03	1.97	2.01	1.85	1.92	2.12	1.92	2.12	1.98	1.99		
懸濁	最高均	1.37	1.70	1.70	1.37	1.34	1.28	1.31	1.46	1.68	1.31	1.68	1.56	1.43		
量	最高均	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.65	1.58	1.69	1.90	1.55	1.90	1.77	1.71		
細落	最高均	48.0	34.0	41.0	24.0	27.0	27.0	71.0	67.0	61.0	47.0	50.0	63.0	51.41		
數	最高均	34.0	18.0	21.0	23.0	23.0	25.0	61.0	64.0	45.0	40.5	30.0	63.5	41.65		
均	最高均	41.0	21.0	25.0	66.0	40.5	43.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	43.72	43.72		

濃過水質試験成績

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
大邱府	硫酸ア	(-) (一) (一)	痕跡	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡	本表ノ濾過水ノ淨水池及市内各ノ採取
	硬度	0.740	0.690	0.775	0.690	0.690	0.690	1.100	0.690	1.050	0.690	0.690	0.690	0.895	
大邱府	固形物量	45.000	45.800	44.800	45.000	44.500	44.500	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	47.250		
	細菌聚数	0.927	0.948	0.948	0.948	1.545	1.264	3.010	1.264	1.264	1.530	0.916	1.563		
釜山府	試験回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	水温 (攝氏)	7.0	5.0	6.0	16.0	19.0	22.0	24.0	25.0	20.0	17.0	11.0	7.0	14.9	
釜山府	色濁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最低平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
山府 (高遠見水源)	臭味	高低均	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N N N	本表ノ濾過水ノ淨水池及市内各ノ採取
	硫酸ア	高低均	9.0673	8.5104	8.8650	8.5104	8.5104	8.5104	8.1558	8.8650	7.0920	6.7774	7.4466	7.0920	
山府 (高遠見水源)	硬度	高低均	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.65	0.90	1.15	1.23
	固形物量	高低均	56	56	60	56	60	56	60	68	62	72	72	56	60
釜山府 (聖地谷水)	試験回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	水温 (攝氏)	9.0	5.0	7.0	16.0	19.0	21.0	23.0	25.0	23.0	18.0	10.0	7.0	15.10	
釜山府 (聖地谷水)	色濁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最低平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	0 0 0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
臭味	N N N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	N N N	
色度	7.0920 6.7374 6.9147	6.3328 6.1168	8.8650 6.3838 7.0033	8.5104 6.3848 6.9147	8.5104 4.9614 6.0282	8.1538 4.9644 6.0282	6.0282 4.9644 5.4076	6.0282 5.1417	7.0030 5.6028 5.4076	8.5101 4.6028 5.7625	4.6380 3.9006 4.3734	6.6028 3.9006 4.5552	7.5069 5.2252 5.9461	〃
反ロウ	弱カ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	弱カ	
硫酸	(-) (-) (-)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	(-) (-) (-)	
硬度	1.40 1.40 1.40	1.40 1.40 1.40	1.40 1.40 1.40	1.40 1.40 1.40	1.40 1.40 1.40	1.40 1.40 1.40	1.15 0.90 0.96	1.40 1.15 1.21	1.15 1.15 1.15	1.27 1.15 1.21	1.15 0.65 0.90	1.15 0.90 0.98	1.30 1.19 1.23	
固形物	60.0 52.0 56.0	64.0 60.0 61.0	60.0 52.0 56.0	56.0 52.0 54.0	76.0 56.0 61.0	76.0 60.0 73.0	73.0 60.0 67.0	60.0 52.0 57.0	60.0 52.0 56.0	56.0 52.0 54.0	60.0 56.0 60.0	61.0 56.0 60.0	63.0 55.0 59.0	
總量	6.657 4.657 5.333	4.324 3.989 4.082	3.326 3.326 3.326	4.996 4.657 4.741	5.152 3.778 4.465	5.152 4.808 4.894	4.465 2.633 4.007	3.291 2.304 2.936	4.563 3.638 4.039	4.417 4.077 4.162	4.706 3.696 4.145	5.042 4.370 4.706	4.674 3.820 4.236	

試験項目	回数	最低	最高	平均	備考
温度 (攝氏)	2	0	0	0	〃
色度	0	0	〃	〃	〃
濁度	0	〃	〃	〃	〃
臭味	N N N	〃	〃	〃	〃
反	弱カ	〃	〃	〃	〃
クロール	2.304 2.269 2.286	2.694 2.553 2.623	2.411 2.411 2.411	2.411 2.304 2.357	〃
硫酸	痕跡 (-)	〃	〃	〃	〃
硬度	3.148 3.148 3.148	3.200 3.174 3.187	3.122 3.122 3.122	3.122 3.070 3.096	〃
固形物	84.100 83.700 83.900	94.000 94.000 94.000	91.000 90.500 90.750	82.000 70.000 76.000	〃
平均	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	〃

山口府 至昭和三年十一月

山口



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
平壤府	細菌叢数 { 最高平均 最低平均	7 4 5.5	3 2 2.5	3 2 2.5	4 3 3.5	2 2 2	2 1 1.2	3 1 2	12 3 6	8 1 3	10 2 6	4 1 2	4 2 3	3.2	
平壤府	試験回数 (攝氏)	2	2	2	2	1	4	4	4	4	2	4	2		
平壤府	水温 (攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	色度 { 最高平均 最低平均	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
平壤府	濁度 { 最高平均 最低平均	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
平壤府	臭味 { 最高平均 最低平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	反作用	弱アルカリ性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	クロール	2.304 2.260 2.286	2.411 2.411 2.411	2.411 2.411 2.411	2.411 2.269 2.340	2.411 2.411 2.411	2.553 2.482 2.535	2.553 2.446	2.411 2.269 2.275	2.694 2.269 2.482	2.411 2.411 2.411	2.411 2.411 2.411	2.411 2.411 2.411	—	—
平壤府	硫酸	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡		
平壤府	硝酸	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡		
平壤府	亜硫酸	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡		

平壤府	硬度 { 最高平均 最低平均	3.148 3.148 3.148	3.172 3.122 3.147	3.070 2.966 3.018	3.018 2.852 2.940	3.018 3.018 3.018	3.226 3.096 3.148	3.330 3.122 3.290	3.382 3.278 3.317	3.122 3.018 3.070	3.200 3.148 3.172	3.174 3.070 3.136	3.044 3.044 3.044	3.113	
平壤府	固形物量 { 最高平均 最低平均	84,000 83,000 83,500	91,000 90,000 90,500	89,300 89,000 89,150	87,000 71,000 79,000	73,000 73,000 73,000	98,000 66,000 83,000	93,000 87,000 90,750	89,000 87,000 88,000	89,000 55,000 74,750	90,000 85,000 87,500	91,000 88,000 87,750	89,000 88,000 88,500	84,616	
平壤府	透明度 { 最高平均 最低平均	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	1.264 0.948 1.106	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	1.896 0.948 1.185	0.948 0.948 0.949	0.948 0.948 0.948	0.948 0.948 0.948	0.9809	
平壤府	細菌叢数 { 最高平均 最低平均	4 3 3.5	7 5 6	7 2 4.5	6 5 5.5	6 6 6	6 1 3	10 4 6	16 6 10	11 4 7	6 5 5.5	7 2 3	4 2 3	5.2	
平壤府	試験回数 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
平壤府	水温 (攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	色度 { 最高平均 最低平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	濁度 { 最高平均 最低平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	臭味 { 最高平均 最低平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	反作用	N N N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
平壤府	クロール	7.500 7.500 7.500	7.500 7.500 7.500	7.500 7.500 7.500	7.500 7.500 7.500	15.000 15.000 15.000	15.250 15.250 15.250	15.000 15.000 15.000	15.000 15.000 15.000	7.250 7.250 7.250	7.500 7.500 7.500	7.500 7.500 7.500	7.500 7.500 7.500	1.000 1.000 1.000	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
鎮南浦	硫酸アモニウム	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
	硬度 (最標準)	0.575	0.575	0.575	0.600	2.030	2.108	1.926	1.900	0.475	0.500	0.525	0.525	1.026	
	固形物量 (最標準)	48,000	44,000	42,000	42,000	90,000	88,000	86,000	86,000	38,800	42,800	48,000	48,000	58,561	
	濁度 (最標準)	41.290	38,000	38,000	40,000	89,200	86,000	84,400	85,200	36,000	38,000	38,000	44,800	55,130	
新	試験回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	水温 (攝氏)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	色度 (最標準)	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
	濁度 (最標準)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水道名	昭和三年												平均	備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
義州府	臭味 (最標準)	中	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
	クロール (最標準)	4.3540	4.9630	5.3170	4.9630	5.3175	4.9630	5.3135	6.3810	6.3810	6.3810	6.0260	6.0260	5.5327	
	硫酸アモニウム (最標準)	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-)	
	硬度 (最標準)	0.425	0.525	0.575	0.575	0.450	0.725	0.540	0.525	0.525	0.475	0.500	0.500	0.528	
元山府	固形物量 (最標準)	82,400	74,100	75,600	89,000	71,500	85,100	85,000	82,200	71,970	61,100	70,900	62,400	76,772	
	濁度 (最標準)	4.108	3.792	5.372	4.740	4.740	4.740	5.778	4.740	4.740	4.124	4.424	4.424	4.639	
	試験回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	水温 (攝氏)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

標準水質試験成績



水道名	昭和三年												備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		平均	
成興面	高低均	1170	1160	1170	1180	1100	1119	1130	1107	1195	1190	1145	1121	1182	
	最低														
	最高														
	試温回数	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
	水温(摂氏)														
	色度														
	濁度														
	臭味														
	反作用					N								N	
	クロール					弱アルカリ性								弱アルカリ性	
	硫酸					5.319	6.205	7.092	697	7.560				6.6392	
	硝酸					微弱(-)								微弱(-)	

町	昭和三年												備考		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		平均	
豊原	高低最	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1127	
	最低														
	最高														
	試温回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	水温(摂氏)														
	色度														
	濁度														
	臭味														
	反作用					N								N	
	クロール					弱アルカリ性								弱アルカリ性	
	硫酸					9.700	8.920	9.700	9.400	9.460				9.436	
	硝酸														

川長

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
清川	硫酸ア	(-) (-) (-)	" "	" "	" "	(-) (-) (-)	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	(-) (-) (-)	
	硬度	1.03	1.00	1.00	" "	1.15	0.90	1.05	1.4	1.4	1.4	1.4	1.15	1.23	
	固形物量	50	50	80	" "	50	50	55	55	56	60	50	50	55	
	色度	0	" "	" "	" "	0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	細菌落	1300	800	400	" "	6000	300	600	600	600	500	600	1000	600	
公	硫酸ア	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	硬度	1.264	0.948	0.948	" "	1.264	0.948	0.948	0.948	1.896	0.632	0.948	0.632	1.034	
	固形物量	50	50	50	" "	50	50	55	55	56	60	50	50	55	
	色度	0	" "	" "	" "	0	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	細菌落	1300	800	400	" "	6000	300	600	600	600	500	600	1000	600	微濁濁

水道名	昭和三年	州												平均	備考	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
江景	味	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	臭	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	反	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	ク	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	ル	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	硬	高低均	1.30	1.40	1.32	1.39	1.39	1.44	1.57	1.35	1.35	1.37	1.28	1.57	1.38	
	固	高低均	41.9	44.5	43.3	42.0	52.7	54.8	67.2	60.6	59.5	53.9	47.9	67.2	41.9	
	形	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	物	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
	量	高低均	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
色	高低均	3.907	3.964	3.682	3.834	4.470	4.480	4.850	4.504	4.353	4.118	3.655	4.166	3.065		
細菌落	高低均	42	42	44	36	63	62	123	55	41	37	31	48	73		
試験回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
水温	4.5	4.5	8		17	22	24	26		16	20	17				
色度	0	0			0					0						

瀬源水真試験成績

水地名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭味	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反カ	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロム	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
懸濁	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均															

江景

水	試	驗	回	數	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	平均	備考
水	試	驗	回	數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭味	味	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
反カ	カ	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロム	ロ	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸	酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸	酸	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硬度	度	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物	物	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
懸濁	濁	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌	菌	高低均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均																		

瀧邊水質試驗成績

水道名	昭和三年												備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		平均
全州	20 12 16	22 10 16	32 14 23	20 16 11	20 10 15	20 16 18	30 86 88	20 12 16	20 10 15	20 10 15	30 18 24	20 8 14	27.833 18.500 23.166	
試驗回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反作用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クローリ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐強	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐弱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	1.4	1.4	1.4	1.065	1.065	3.5	3.5	1.75	1.75	1.773	1.77	1.77	1.845	

州	昭和三年												備考	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		平均
硬度	0.65	0.65	0.65	1.15	0.65	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	0.25	0.25	0.5	
固形物量	1.5	1.5	1.5	2.0	2.2	1.8	1.8	1.2	1.0	0.9	0.85	1.0	1.336	
濁度	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.066	
細落	15	15	15	20	25	55	55	34	19	19	19	10	23.08	
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反作用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クローリ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐強	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐弱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
耐性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	10.000	10.500	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500	10.667	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
浦	硫酸	少	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	少	
	硝酸	(-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(-)	
	硬度	2.430	2.430	2.264	2.550	2.630	2.8000	2.430	2.430	2.784	1.900	1.660	2.030	2.160	2.3107
	固形物量	195	189	168	195.5	187.3	186	216	246	250	260	156	153	190	197.5
項	細菌數	1.216	1.535	0.614	3.090	1.3360	1.505	0.912	0.912	0.948	1.264	1.264	1.336	2.160	1.4150
	濁度	0.698	0.921	0.614	1.854	0.9270	1.204	0.912	0.912	0.948	0.948	1.264	0.927	0.912	1.0033
	色度	0.912	1.228	0.614	2.472	1.0815	1.355	0.912	0.912	0.948	1.106	1.264	10.815	1.536	1.2691
	最低均	14	10	37	23	24	11	43	2	26	23	25	62	10	25.50
金	試水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	溫度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

泉	奥味	反	クロー	硫酸	硬度	固形物量	細菌數	試水	溫度	色度	N	
											高低均	弱了ルカ
普州	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	1	4.5	1.5	—	—
	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	1	7.5	1.5	—	—
	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	1	9.5	1.0	—	—
	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	1	15.0	1.0	—	—
	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	1	18.0	1.0	—	—
	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	1	22.5	1.0	—	—
	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	1	27.5	1.0	—	—
	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	1	35.0	1.0	—	—
	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	1	40.0	1.0	—	—
	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	1	45.0	1.0	—	—
	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	最高均	1	50.0	1.0	—	—
	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	最低均	1	55.0	1.0	—	—



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
晋州	濁度	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	2.0	2.0	2.0	7.0	4.0	13.0	14.0	2.0	17.0	3.0	2.0	5.80		
	臭度	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	1.5	1.5	1.5	4.5	3.0	1.0	1.0	1.5	3.0	1.0	1.5	1.70		
	反味	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	1.5	1.5	1.5	4.5	3.0	1.0	1.0	1.5	3.0	1.0	1.5	3.52		
	クロール	最高平均 8.8625 最低平均 7.0990 7.5025	9.5715	8.5080	7.0900	7.4445	9.2170	10.2805	9.0280	7.0900	7.4445	8.1535	9.2170	8.56700		
	硫酸	最高平均 8.8625 最低平均 7.0990 7.5025	7.4445	7.0900	6.0265	6.3810	7.4445	8.1535	8.1535	5.3175	6.0265	7.7350	7.0900	7.00100		
	硬度	最高平均 1.300 最低平均 0.850 1.025	1.225	1.000	1.000	0.820	0.965	0.775	1.430	1.000	1.10	0.5500	0.6500	1.050	1.073	
	固形物	最高平均 569 最低平均 319 444	544	310	319	483	599	837	925	374	1152	115	318	362	604	
	總量	最高平均 2,528 最低平均 1,264 1,776	2,844	1,264	1,264	5,056	3,160	8,848	15,168	2,844	10,112	2,212	1,896	1,580	4,924	
	細菌	最高平均 403.6 最低平均 89.0 241.5	276	60	83	40	240	530	830	330	1040	64	560	410	424	
	細菌	最高平均 403.6 最低平均 89.0 241.5	168	158	158	150	140	295	431	175	562	154	169	235	51	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
海鏡	濁度	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	6.5	6.5	6.5	6.5	7.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.42	
	臭度	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	5.88	
	反味	最高平均 1.01 最低平均 0.50 0.75	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.15	
	クロール	最高平均 8.8625 最低平均 7.0990 7.5025	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	硫酸	最高平均 8.8625 最低平均 7.0990 7.5025	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	硬度	最高平均 1.300 最低平均 0.850 1.025	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	固形物	最高平均 569 最低平均 319 444	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	總量	最高平均 2,528 最低平均 1,264 1,776	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	細菌	最高平均 403.6 最低平均 89.0 241.5	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	
	細菌	最高平均 403.6 最低平均 89.0 241.5	6.25	6.25	6.25	6.25	6.0	5.5	5.75	6.0	6.0	6.25	6.25	6.15	

濾過水質試驗成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
鎮海	細菌落數 { 最平均 最低均 最高均 }	13 10 11.5	13 10 11.5	9 5 7.0	14 8 11.0	— — —	8 5 6.5	36 15 25.5	27 18 22.5	64 18 41	28 20 24	30 24 27.0	30 25 27.5	2173 1645 2059	
試 驗 回 數	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水 溫 (攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色 度 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁 度 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭 味 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反 應	中性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロール	3.920 3.920 3.920	3.920 3.920 3.920	5.000 4.000 4.500	—	5.600 5.200 5.400	4.000 4.000 4.000	—	5.600 5.200 5.400	—	5.400 5.400 5.400	4.400 4.400 4.400	4.400 4.400 4.400	4.400 4.400 4.400	4.664 4.484 4.574	
硝酸鹽	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	
硝酸	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	
硝酸	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
義州	細菌落數 { 最平均 最低均 最高均 }	10 2 16	36 9 19	24 2 13	—	16 2 9	16 3 9.5	—	14 2 8	15 1 8	23 1 12	14 2 8	20 2 11	20.8 1.9 10.15	
硬 度 { 最平均 最低均 最高均 }	0.475 0.075 0.275	0.475 0.075 0.275	0.525 0.050 0.288	—	0.450 0.075 0.362	1.050 0.025 0.537	—	0.475 0.075 0.275	0.240 0.056 0.145	0.400 0.015 0.207	0.450 0.015 0.23	0.350 0.025 0.187	0.488 0.048 0.264		
固形物量 { 最平均 最低均 最高均 }	28.00 20.00 24.00	25.00 22.00 24.00	22.00 18.00 20.00	—	28.00 22.00 25.00	30.00 22.00 26.00	—	24.00 22.00 23.00	24.00 18.00 21.00	28.00 16.00 22.00	24.00 16.00 20.00	20.00 16.00 20.00	22.8 20.4 22.5		
色 度 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁 度 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭 味 { 最平均 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
反 應	中性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロール	2.500 — —	2.000 — —	2.800 — —	2.500 — —	2.600 — —	2.700 — —	2.600 — —	2.300 — —	2.600 — —	2.500 — —	2.500 — —	2.500 — —	2.500 — —	2.555	

瀧水質試驗成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
義州	硫酸	(一)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(一)	
	硝子	(一)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(一)	
	度	2.425	2.450	2.425	2.425	2.425	2.350	2.425	2.202	2.425	2.682	2.425	2.507		
	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均		
州	固形物	70.000	75.000	85.000	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	80.000	85.000	85.000	82.000	81.833	
	量	量	量	量	量	量	量	量	量	量	量	量	量		
	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平	最平		
	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均		
高	試水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均		

水道名	昭和三年	月												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
興	臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ク	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硫酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
春	試水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	色濁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均	高低均		

濾過水質試驗成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
濁度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
反クロー	最低均	中性	"	弱了ルカカ男性	"	中性	弱了ルカカ男性	"	"	"	"	"	"	弱了ルカカ男性	
硬度	最低均	3.8995	3.3618	3.1915	3.1905	3.3677	3.545	3.8995	3.8995	3.3677	3.1905	3.8995	3.8995	3.7263	
硫酸	最低均	(-)	痕跡	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	微痕跡	
固形物	最低均	45.1	36	32	28	32	30.5	234.52	40.65	40.25	35.50	35.50	35.14	35.43	
細菌	最低均	2.132	1.6300	1.976	2.212	1.422	1.896	2.528	1.5800	1.896	2.054	2.376	2.054	1.3775	
細落	最低均	34	9	7	10	14	4	7	5	6	8	22	14	1.1083	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
水温	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
色度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
反クロー	最低均	中性	"	"	"	"	"	"	中性	"	"	"	"	中性	
硫酸	最低均	1.923	1.902	1.930	1.926	1.926	2.735	2.717	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.087	
硬度	最低均	1.902	1.902	1.930	1.926	1.926	2.735	2.717	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.087	
固形物	最低均	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
細菌	最低均	2.201	2.246	2.369	2.120	2.628	2.716	4.547	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.560	

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	月												平均	備考		
		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二				
羅南	試驗回数 數 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		細菌數 { 最低 最高 }	5	4	4	4	2	3	14	11	25	11	11	11	11	7	
		水色 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			濁度 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			臭味 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			反 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			クロール { 最低 最高 }	9.87	8.760	8.671	11.380	9.585	11.360	13.135	12.785	11.830	10.150	10.222	9.929	10.697	
			硫酸 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			酸性	中													
			試驗回数 數 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			水色 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
濁度 { 最低 最高 }	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
臭味 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
反 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
クロール { 最低 最高 }	1.75	1.65	2.31	2.59	2.52	2.30	2.28	2.30	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	5.55			

津	硬度 { 最低 最高 }	固形物 量 { 最低 最高 }	總 鐵 量 { 最低 最高 }	細菌 數 { 最低 最高 }	回												平均	備考
					一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二		
會	試驗回数 數 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		水色 { 最低 最高 }	4.36	4.0	1.2	-98	-91	-90	-93	-91	16.0	16.0	6.00	4.9	2.01	1		
		濁度 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		臭味 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		反 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		クロール { 最低 最高 }	1.75	1.65	2.31	2.59	2.52	2.30	2.28	2.30	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	5.55		
		試驗回数 數 (攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		水色 { 最低 最高 }	4.36	4.0	1.2	-98	-91	-90	-93	-91	16.0	16.0	6.00	4.9	2.01	1		
		濁度 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		臭味 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		反 { 最低 最高 }	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
クロール { 最低 最高 }	1.75	1.65	2.31	2.59	2.52	2.30	2.28	2.30	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	5.55				

測定表

水道名	昭和三年	月												平均	備考			
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月					
會亭	硫酸	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	本表ノ濃中ノ平均濃度ノ平均濃度ハ各成分ノ平均濃度ノ平均濃度ニシテ全年平均濃度ノ平均濃度ニシテ各月更ニモ
	硬度	1.95	1.98	1.87	1.69	1.77	1.85	1.78	1.70	1.90	1.93	1.93	1.92	1.86				
	固形物量	47.26	49.49	42.87	—	31.21	—	—	—	—	—	54.00	53.40	54.00	27.46			
	細菌落	2.28	3.23	2.27	2.78	2.10	2.30	3.40	3.41	3.03	3.97	3.94	3.97	3.20				
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
水	試驗	6	6	8	7	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	51.3	水中ノ濃中ノ平均濃度ノ平均濃度ハ各成分ノ平均濃度ノ平均濃度ニシテ全年平均濃度ノ平均濃度ニシテ各月更ニモ
	溫度	14.8	18.2	22.0	17.5	27.0	23.0	29.5	26.5	25.5	21.5	17.2	16.7	—				
	色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	試水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

水道名	昭和三年	月												平均	備考			
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月					
北	臭味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	臭味ノ濃中ノ平均濃度ノ平均濃度ハ各成分ノ平均濃度ノ平均濃度ニシテ全年平均濃度ノ平均濃度ニシテ各月更ニモ
	反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	クロー	4.255	3.546	3.900	4.147	3.900	3.546	3.191	3.191	3.191	2.836	3.191	3.900	3.900	3.546	3.507		
	硫酸	4.255	3.546	3.900	4.147	3.900	3.546	3.191	3.191	3.191	2.836	3.191	3.900	3.900	3.546	3.507		
	硬度	1.925	1.175	1.400	1.075	1.325	1.190	1.200	1.325	1.400	1.250	1.400	1.000	1.025	1.115			
北	固形物	81,000	81,600	52,060	70,800	93,600	88,600	12,400	86,200	79,600	88,800	82,800	78,600	78,600	—			
	總量	68,000	64,800	77,600	57,600	81,100	79,800	84,400	67,600	62,400	81,600	78,800	66,000	73,111	78,914			
	細菌落	79,333	72,800	81,025	64,343	87,200	83,950	96,114	77,000	70,550	85,250	79,886	73,111	—				
	濁度	0.632	0.948	0.632	0.730	0.730	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.730	0.632	0.632	0.632			
	試水	15.0	14.4	16.0	21.8	20.0	21.8	22.6	26.4	24.0	21.4	20.0	18.4	20.2				

濃中ノ平均濃度

三三三

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
基 隆	濁度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭味	最低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N
	反クロール	最低均	弱アルカリ性	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱アルカリ性
	硝酸ア	最低均	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)
	硬度	最低均	0.800	0.900	0.950	0.910	0.295	0.900	0.600	0.700	0.650	0.650	0.400	0.400	0.621
	固形物量	最低均	61.000	63.400	65.600	47.300	60.800	59.300	52.000	61.000	56.300	50.400	60.800	55.200	58.000
	細菌落	最低均	1,504	0.632	0.948	0.948	0.790	0.790	1.422	0.632	0.948	0.948	0.948	0.730	0.833
	濁度	最高均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭味	最高均	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	反クロール	最高均	8.470	8.155	8.470	8.155	7.801	7.447	7.092	6.737	6.737	7.092	8.510	8.156	7.735
	硝酸ア	最高均	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	硬度	最高均	8.470	8.155	8.470	8.155	7.801	7.447	7.092	6.737	6.737	7.092	8.510	8.156	7.735
	固形物量	最高均	61.000	63.400	65.600	47.300	60.800	59.300	52.000	61.000	56.300	50.400	60.800	55.200	58.000
細菌落	最高均	1,504	0.632	0.948	0.948	0.790	0.790	1.422	0.632	0.948	0.948	0.948	0.730	0.833	
濁度	平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	平均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
反クロール	平均	弱アルカリ性	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱アルカリ性	
硝酸ア	平均	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
硬度	平均	0.800	0.900	0.950	0.910	0.295	0.900	0.600	0.700	0.650	0.650	0.400	0.400	0.621	
固形物量	平均	61.000	63.400	65.600	47.300	60.800	59.300	52.000	61.000	56.300	50.400	60.800	55.200	58.000	
細菌落	平均	1,504	0.632	0.948	0.948	0.790	0.790	1.422	0.632	0.948	0.948	0.948	0.730	0.833	
濁度	備考														
臭味	備考														
反クロール	備考														
硝酸ア	備考														
硬度	備考														
固形物量	備考														
細菌落	備考														

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
水 波 街	濁度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臭味	最低均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N
	反クロール	最低均	弱アルカリ性	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱アルカリ性
	硝酸ア	最低均	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)
	硬度	最低均	2.056	2.430	2.576	2.290	2.290	2.638	2.420	2.108	1.978	1.875	1.978	2.056	2.222
	固形物量	最低均	18.800	20.400	20.100	19.500	18.600	18.800	18.600	18.400	18.400	18.400	18.800	18.800	19.6.625
	細菌落	最低均	2.017	2.355	2.563	2.355	2.355	2.534	2.394	2.069	1.926	1.812	1.889	2.017	2.157
	濁度	最高均	2.056	2.430	2.576	2.290	2.290	2.638	2.420	2.108	1.978	1.875	1.978	2.056	2.222
	臭味	最高均	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	反クロール	最高均	11.702	11.702	12.056	12.056	12.056	12.417	12.411	12.056	12.055	12.055	12.055	11.702	12.025
	硝酸ア	最高均	11.347	11.347	12.056	12.056	12.056	12.056	12.056	12.056	11.702	11.702	11.902	11.347	11.790
	硬度	最高均	11.534	11.524	12.056	12.056	12.056	12.233	12.233	12.056	11.878	11.878	11.878	11.524	11.908
	固形物量	最高均	18.800	20.400	20.100	19.500	18.600	18.800	18.600	18.400	18.400	18.400	18.800	18.800	19.6.625
細菌落	最高均	2.017	2.355	2.563	2.355	2.355	2.534	2.394	2.069	1.926	1.812	1.889	2.017	2.157	
濁度	平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	平均	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
反クロール	平均	弱アルカリ性	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	弱アルカリ性	
硝酸ア	平均	痕跡 (-)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡 (-)	
硬度	平均	2.056	2.430	2.576	2.290	2.290	2.638	2.420	2.108	1.978	1.875	1.978	2.056	2.222	
固形物量	平均	18.800	20.400	20.100	19.500	18.600	18.800	18.600	18.400	18.400	18.400	18.800	18.800	19.6.625	
細菌落	平均	2.017	2.355	2.563	2.355	2.355	2.534	2.394	2.069	1.926	1.812	1.889	2.017	2.157	
濁度	備考														
臭味	備考														
反クロール	備考														
硝酸ア	備考														
硬度	備考														
固形物量	備考														
細菌落	備考														

濾過水質試験成績

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
淡水街	細菌乘數 最低均	20 6 13	11 7 9	15 3	8 2 5	8 2 5	12 4 8	17 2 9.5	12 5 8.5	24 7 15.5	15 6 10.5	39 6 22.5	7 1 4	14.5 4.4 9.4	
武 驗 回 數	(攝氏)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3.9	
水 温	(攝氏)	22	21	21	23	24	26	25.5	25.5	25.5	25	25	24.5	23.9	
色 度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁 度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭 味	最低均	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反 應	應	弱アルカリ性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロール	最低均	3.254 3.015 3.175	3.790 3.460 3.655	3.167 3.012 3.125	3.010 2.800 2.967	3.367 2.915 3.188	3.407 3.011 3.225	3.015 2.918 2.978	3.119 3.054 3.098	3.225 3.012 3.177	3.012 2.805 2.956	2.985 2.822 2.878	2.976 2.915 2.914	3.106 2.928 3.111	極少量跡 (-)
硬 度	最低均	5.565 5.340 5.370	6.185 5.800 5.950	5.470 5.250 5.310	5.650 5.300 5.430	6.250 5.950 6.150	6.050 5.750 5.950	5.800 5.300 5.630	5.756 5.400 5.550	5.900 5.050 5.150	5.630 5.300 5.450	4.906 4.750 4.850	5.100 4.850 4.950	5.631 5.334 5.479	
固形物量	最低均	185 162 172	189 181 185	189 152 168	179 162 171	192 170 181	186 163 178	212 180 193	190 175 180	188 172 177	176 163 171	179 169 173	190 172 173	187 168 177	
細落	最低均	2,050 1,520 1,720	2,030 1,625 1,730	1,985 1,402 1,608	1,625 1,324 1,430	1,605 1,313 1,438	1,514 1,387 1,347	1,405 1,087 1,258	1,288 1,142 1,213	1,854 1,412 1,508	1,639 1,108 1,278	2,230 1,544 1,632	2,055 1,459 1,638	1,773 1,352 1,482	
試驗回数	(攝氏)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
水 温	最低均	21.0	21.5	22.5	21.0	23.5	24.5	23.5	25.0	25.0	26.5	26.5	26.5	24.65	
色 度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁 度	最低均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭 味	最低均	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
反 應	應	弱アルカリ性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロール	最低均	9.926 9.748 10.635	11.7	11.7	11.7	11.0	11.0	8.508 9.926	4.514	4.514	4.963 1.5708	8.35216			

濾過水質試驗成績



水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
彰	硫酸	少量	"	"	"	"	痕跡	"	"	痕跡	"	痕跡	"	痕跡	
	硬度	6.72	6.58	6.70	6.70	6.86	6.92	6.14	5.64	5.64	0.6181	9.9824	7.27008		
	固形物量	220.0	174.8	272.0	218.0	150.0	174.0	204.0	185.0	154.9	338.0	496.7	242.25		
	細落	7.268	2.212	0.474	0.600	1.300	1.150	1.896	1.549	3.5708	5.1185	2.51383	38.5		
化	硫酸	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	硬度	222	202	232	242	252	29	29	262	272	262	26	242	27	
	固形物量	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	細落	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
塞	試水	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	溫度	19.113	22.245	24.281	16.997	7.284	5.795	7.498	8.081	5.112	6.512	10.879	13.716	12.293	
	色度	17.039	18.072	16.288	15.054	3.400	5.740	4.431	3.748	3.402	6.120	10.298	12.431	9.668	
	濁度	18.073	30.159	30.285	16.025	5.342	5.767	5.965	5.915	4.261	6.316	10.589	13.074	10.980	

水道名	昭和三	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考
南	臭味	高低均	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	反	N	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	N	
	ク	高低均	19.113	22.245	24.281	16.997	7.284	5.795	7.498	8.081	5.112	6.512	10.879	13.716	12.293
	ル	最低均	17.039	18.072	16.288	15.054	3.400	5.740	4.431	3.748	3.402	6.120	10.298	12.431	9.668
南	硫酸	痕跡	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	痕跡	
	硬度	41.313	36.285	41.110	57.675	32.124	48.069	49.488	60.719	56.095	22.560	38.084	39.390	43.589	
	固形物量	27.600	32.000	31.800	32.000	32.000	31.600	28.400	27.000	23.400	22.130	22.000	23.000	23.000	26.494
	細落	27.000	22.000	23.000	22.400	12.400	23.600	23.400	23.800	21.200	21.200	21.500	23.500	23.500	24.219
南	試水	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	溫度	19	18.5	20.5	22.5	24.7	25	25.5	25	25.5	24	23	21	22.9	
	色度	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.5	
	濁度	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	

昭和三

昭和三



川型型

水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
細菌落	26 10 19	50 4 22	35 4 14	26 6 17	30 10 17	32 6 22	30 10 19	30 14 20	24 16 19	32 10 20	24 14 19	25 18 20	22 16 18	
回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水温 (攝氏)	19.8	18.8	22.0	23.5	24.5	27.0	28.5	26.0	24.5	23.7	21.0	20.5	22.3	
色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
反	N	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	N	
クロール	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
硝酸	1.8434	1.0635	1.0635	1.995	21.270	2.0315	2.0157	1.3107	1.0280	1.0280	1.1995	1.19835	1.45263	
硫酸	微量	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	

水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
細菌落	26 10 19	50 4 22	35 4 14	26 6 17	30 10 17	32 6 22	30 10 19	30 14 20	24 16 19	32 10 20	24 14 19	25 18 20	22 16 18	
回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水温 (攝氏)	19.9	19.3	17.2	15.5	13.1	17.1	17.1	17.1	13.1	17.1	13.1	13.1	17.1	
色度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臭味	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
反	N	N	N	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	N	
クロール	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
硝酸	3.102	3.614	3.059	3.989	2.482	3.121	4.964	3.368	4.683	4.875	3.811	4.313	4.255	
硫酸	3.102	3.614	3.059	3.989	2.482	3.121	4.964	3.368	4.683	4.875	3.811	4.313	4.255	
硬度	4.00	4.26	4.50	4.00	4.00	4.70	4.50	4.13	4.00	4.00	3.80	4.00	4.10	
固形物	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	
總量	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	98,000	98,000	103,000	102,000	
カルシウム	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	最高平均	
濃度	3.003	2.582	2.212	3.160	2.212	3.950	2.582	2.582	2.212	2.058	2.058	2.552	2.000	
細菌落	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	最低平均	
細菌	13	2	5	7	6	4	6	3	2	1	1	2	4	

東京府荒玉水道町村組合

豊瀬水質試験成績

水邊名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
東京府荒玉水道町村組合	硫酸ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	固形物量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細菌叢数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	細落	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	温度	12	12	13	15	9	12	15	12	12	15	12	12	9	—	
	色濁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	備考	本表ニ於ケル金町池ノ水邊ニ於テ平均温度ハ各月平均シテ示ス平均温度ハ各月平均シテ示ス														

府江戸川上水町村組合	大	選
臭味	高低均	—
反カ	高低均	—
ク	高低均	—
硫酸ア	高低均	—
硝子	高低均	—
硬度	高低均	—
固形物量	高低均	—
細菌叢数	高低均	—
細落	高低均	—
温度	—	—
色濁	—	—
備考	本表ニ於ケル河口浄水場機械濾過水ナリ	



水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
旅順	濁落	4	2	4	7	4	6	6	5	5	6	4	4.9	
	細菌數	1.5	1.5	3.5	5.6	3.5	3.5	2.4	3.4	3.5	1.5	2.5	2.2	
沙	試水	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1.6	
	温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
河	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家	臭度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	味度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
口	クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
壺	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
旅順	濁落	4	2	4	7	4	6	6	5	5	6	4	4.9	
	細菌數	1.5	1.5	3.5	5.6	3.5	3.5	2.4	3.4	3.5	1.5	2.5	2.2	
沙	試水	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1.6	
	温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
口	クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
壺	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年												平均	備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
旅順	濁落	4	2	4	7	4	6	6	5	5	6	4	4.9	
	細菌數	1.5	1.5	3.5	5.6	3.5	3.5	2.4	3.4	3.5	1.5	2.5	2.2	
沙	試水	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1.6	
	温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
口	クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
壺	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
旅順	濁落	4	2	4	7	4	6	6	5	5	6	4	4.9	
	細菌數	1.5	1.5	3.5	5.6	3.5	3.5	2.4	3.4	3.5	1.5	2.5	2.2	
沙	試水	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1.6	
	温度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家	色度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	濁度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
口	クロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
壺	硬度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	酸度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	家也												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
蘇也	硬度 { 最低均 最高均 }	3.46	3.46	3.325	3.45	3.30	3.3825	3.59	3.395	3.46	3.66	3.46	3.515	3.433	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蘇也	固形物量 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
蘇也	濁度 { 最低均 最高均 }	2.5	5	3.5	1.9	21.5	14.5	15.5	18	6.5	5.5	3.5	4	8.5	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蘇也	細菌叢数 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	回数 (氏)	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	水温 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	色度 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	臭 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公	平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

主	橋	家也												平均	備考
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
クロー	硬度 { 最低均 最高均 }	38.000	60.000	68.000	36.000	52.000	51.000	50.000	68.000	62.000	55.000	38.000	55.000	54.160	
		25.000	28.000	20.000	15.500	22.000	22.000	17.000	17.000	34.000	33.500	20.000	19.000	19.900	
硫酸	硬度 { 最低均 最高均 }	41.500	44.000	44.000	25.750	37.000	30.000	31.500	34.000	33.500	44.000	40.500	36.000	33.230	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硬	固形物量 { 最低均 最高均 }	8.12	8.12	7.83	7.83	8.410	8.41	8.99	8.99	7.83	7.83	7.83	7.83	8.17	
		5.60	5.60	6.43	6.43	5.600	6.43	5.33	5.87	4.24	5.06	5.60	5.55	5.60	
硫酸	濁度 { 最低均 最高均 }	6.86	6.86	7.13	7.13	7.005	7.42	7.96	7.43	6.135	6.445	6.715	6.69	6.89	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸	臭 { 最低均 最高均 }	0.633	0.632	0.632	0.948	0.948	0.948	0.632	0.632	1.580	0.632	0.632	0.632	0.7636	
		0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	0.316	
硫酸	反	12.00	32.00	38.00	38.00	24.00	13.00	72.00	42.00	42.00	15.00	22.00	21.00	37.336	
		7.00	1.00	4.00	4.00	4.00	16.00	13.00	2.00	2.00	3.00	8.00	5.000	5.000	
橋	水温 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
橋	色度 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
橋	臭 { 最低均 最高均 }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
橋	反	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
橋	平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
橋頭	高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	8.875 踪跡 (一)	"	7.10	"	7.5 10 <sup>25</sup> 以下 15.15以下 (一)	8 " 15以下	6 " 50以下 " 15以下	8 " 50以下 " 15以下	"	10	11.5	10	"	"	
		5.64	"	5.19	"	5.65	5.355	5.054	4.79	5.28	5.05	5.32	5.05	"	"	"
		12.400	12.400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
山	高低均 應高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	8.875 踪跡 (一)	"	7.100	"	7.5 10 <sup>25</sup> 以下 15.15以下 (一)	8 " 30 " 30 " 15 " 15 " 15	6 " 35 " 35 " 15 " 15	8 " 35 " 35 " 15 " 15	"	10	11.5	10	"	"	
		5.64	"	5.12	"	5.65	5.355	5.054	4.79	5.28	5.05	5.32	5.05	"	"	"
		12.400	12.400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
撫順	高低均 應高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	0.632	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

水道名	昭和三年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	備考	
橋頭	高低均 應高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	8.875 踪跡 (一)	"	7.10	"	7.5 10 <sup>25</sup> 以下 15.15以下 (一)	8 " 15以下	6 " 50以下 " 15以下	8 " 50以下 " 15以下	"	10	11.5	10	"	"	
		5.64	"	5.19	"	5.65	5.355	5.054	4.79	5.28	5.05	5.32	5.05	"	"	"
		12.400	12.400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
山	高低均 應高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	0.632	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
撫順	高低均 應高低均 硫酸了 最低平均 最低平均 最高平均 最高平均 同(攝氏) 高低均 驗温 度 試水 色濁	0.632	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

濾過水質試驗成績





各種水質試驗成績

水道名	京都市 (蹴上ヶ上水道)				京都市 (松ヶ崎上水道)			
	源水	沈澄池	濾過池	市内栓	源水	沈澄池	濾過池	市内栓
試験回数	54	108	216	216	39	47	167	—
水温 (攝氏)	15.3	15.3	15.3	16.2	16.5	—	16.5	—
色度	最高	10.0	8.8	0	0	8.8	—	0
	最低平均	2.0	1.0	0	0	0.0	—	0
濁度	最高	2.4	2.0	0	0	4.2	—	0
	最低平均	1.0	0.8	0	0	0.8	—	0
臭味	最高	2.4	2.0	0	0	4.2	—	0
	最低平均	1.0	0.8	0	0	0.8	—	0
反酸	最高	2.4	2.0	0	0	4.2	—	0
	最低平均	1.0	0.8	0	0	0.8	—	0
格魯兒	最高	5.32	5.32	5.32	5.32	6.38	—	6.38
	最低平均	4.97	4.97	4.97	4.97	4.61	—	4.61
硫酸	最高	4.99	4.99	4.98	4.98	5.34	—	5.32
	最低平均	4.99	4.99	4.98	4.98	5.34	—	5.32
硝酸	最高	—	—	—	—	—	—	—
	最低平均	—	—	—	—	—	—	—
硬度	最高	1.23	1.20	1.18	1.18	1.23	—	1.23
	最低平均	1.23	1.20	1.18	1.18	1.15	—	1.15
固形物	最高	1.23	1.20	1.18	1.18	1.21	—	1.19
	最低平均	1.23	1.20	1.18	1.18	1.21	—	1.19
過飽和	最高	68.0	64.0	57.0	52.0	64.0	—	58.0
	最低平均	49.0	47.0	36.0	36.0	43.0	—	39.0
過飽和	最高	58.3	55.7	46.0	42.6	53.6	—	45.8
	最低平均	58.3	55.7	46.0	42.6	53.6	—	45.8
細菌	最高	4.80	5.06	4.11	4.11	9.49	—	4.11
	最低平均	3.16	2.84	0.63	0.63	2.80	—	1.42
細菌	最高	3.67	3.29	1.89	1.56	4.05	—	2.67
	最低平均	3.67	3.29	1.89	1.56	4.05	—	2.67
細菌	最高	464	180	63	144	982	—	65
	最低平均	10	0	0	0	12	—	0
細菌	最高	89	19	5	11	121	—	10
	最低平均	89	19	5	11	121	—	10
備考								

三五九

源水	東 京 市 (乙表)			東 京 市 (甲表)			
	沈澄池	濾過池	市内栓	源水	沈澄池	濾過池	市内栓
36/36	26/51	26/612	26/51	26/51	104/200	81/1286	792/1557
14.0	13.8	14.3	14.3	14.8	14.5	13.8	14.2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
25.0	25.0	0	0	30.0	15.0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.0	3.5	0	0	3.9	2.2	0	0
N	"	"	"	N	"	"	"
弱アルカリ性	"	"	"	弱アルカリ性	"	"	"
1.978	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
1.026	1.026	1.026	1.062	1.026	1.026	1.026	1.026
1.430	1.389	1.329	1.375	1.361	1.357	1.327	1.399
痕跡	"	"	"	痕跡	"	"	"
痕跡	"	"	"	痕跡	"	"	"
(-)	"	"	"	(-)	"	"	"
(-)	"	"	"	(-)	"	"	"
2.150	1.978	1.950	1.978	2.030	2.030	1.978	1.978
1.850	1.190	1.105	1.195	1.780	1.798	1.815	1.195
1.928	1.888	1.845	1.843	1.914	1.908	1.888	1.894
125.000	81.000	72.000	70.000	125.000	95.000	72.000	82.000
58.000	58.000	56.000	56.000	58.000	54.000	49.000	49.000
73.056	68.538	62.962	61.115	71.538	66.106	59.951	60.472
5.530	3.150	2.540	1.950	3.555	4.187	2.448	2.448
1.106	1.264	0.948	0.790	1.185	1.056	0.790	1.164
2.744	2.099	1.501	1.242	2.286	2.076	1.184	1.164
7,888	5,244	74	68	4,375	3,920	82	86
104	507	1	2	375	317	1	1
893	1,266	10	11	1,245	1,027	9	16
記載例ハ第九(其一)甲表=同シ				記載例ハ第九(其一)甲表=同シ			

(其二) 各種水質試驗成績

第九 水質試驗表

(昭和三年中)

三五八

Table with columns for water types (神戶市, 神戸市, etc.) and various water quality tests (水温, 色度, 濁度, etc.).

Table with columns for water types (横浜市, 大阪市, etc.) and various water quality tests (水温, 色度, 濁度, etc.).

各種水質試驗成績

水道名 檢水種類	八王子市				室蘭市			
	源水	沈澄池	濾過池	市内栓	源水	沈澄池	濾過池	市内栓
回数	1	—	—	—	—	—	12	12
水温(攝氏)	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	—	—	—	—	—	0	0
濁度	—	—	—	—	—	—	0	0
臭味	—	—	—	—	—	—	N	〃
反酸	弱アルカリ性	—	—	—	—	—	中性	〃
格魯兒	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸亞	—	—	—	—	—	—	(-)	〃
硝酸	—	—	—	—	—	—	(-)	〃
硬	—	—	—	—	—	—	—	—
固形物	—	—	—	—	—	—	—	—
過満飽和	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	昭和三年九月一日給水開始 水質試驗設備ナシ 源水ノ成績ハ内務省東京衛生 試験所ノ試験ニ依ル(昭和三年九月)				日本製鋼所ヨリ分水ヲ受クル ヲ以テ源水池沈澄池濾過地ナ シ 水温ハ一ヶ年ノ平均温度ニシ テ五度九分			

小樽市	函館市				名古屋市			
	源水	沈澄池	濾過池	市内栓	源水	沈澄池	濾過池	市内栓
—	—	—	—	—	292	3	292	4
—	—	—	—	—	8.5	11.9	9.4	15.3
—	—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	—	0	0	0	0
—	—	—	—	—	15.0	4.0	0	0
—	0	微混濁	—	—	2.16	1.3	0	0
—	—	—	—	—	N	〃	〃	〃
N	—	N	—	—	N	〃	〃	〃
弱アルカリ性	—	弱アルカリ性	—	—	弱アルカリ性	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	7.85	11.5	1.05
—	—	—	—	—	4.75	6.05	5.85	4.05
11.698	—	10.99	—	—	6.92	7.00	7.69	6.74
痕跡	—	痕跡	—	—	少量	〃	少量	痕跡
(-)	—	(-)	—	—	微量	〃	〃	痕跡
(-)	—	(-)	—	—	(-)	〃	〃	(-)
—	—	—	—	—	1.55	0.7	2.9776	0.6375
—	—	—	—	—	0.275	0.3375	0.22	0.300
0.9	—	0.95	—	—	0.4538	0.4875	0.4747	0.485
—	—	—	—	—	87.0	82.0	81.0	110.5
—	—	—	—	—	60.0	64.8	56.8	60.0
—	—	—	—	—	80.0	72.266	65.56	72.2
—	—	—	—	—	7.584	4.3255	3.8635	1.161
—	—	—	—	—	0.664	1.7244	0.1896	0.5479
1.534	—	0.89	—	—	2.267	3.3711	1.6514	0.6960
—	—	—	—	—	1115.0	327.0	22	15.0
—	—	—	—	—	12.0	5.0	0	1.0
78	—	156	—	—	134.0	172.0	8.4	9.33
備考					春夏ノ候ニハ中性秋冬ノ候ニハ微弱アルカリ性ヲ呈スルヲ普通トスルモ確ナル原因ハ未ダ不明ナルモ水温ト遊離炭酸ノ影響ナリト思惟ス			
備考					本表記載例ハ(九其一)濾過水質試験成績ニ同シ源水ハ濾過池構内分水井ヨリ採取セル定期試験成績ナリ			