

R 26

2-2

御纂醫宗金鑑卷八

編輯外科心法要訣目錄

肩部

扁中疽

乾疽

過肩疽

醪疽

肩風毒

樂疽

臑部

臑癰附藕包毒

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰

附疽

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨蠍疽

蠍蛇串

手部

手發背

掌心毒

虎口疽

附合谷疔

病鯁

手子發

調疽

蛇頭疔

天蛇毒

蛇眼疔

蛇皆疔

蛇節疔

蛇腹疔

泥鰌疽

蟻螂蛀

代指

癟瘡

鵝掌風

狐尿刺

御纂醫宗金鑑卷八

編輯外科心法要訣

肩中疽圖




肩中疽生肩正中左右皆同

乾疽圖



過肩疽圖



過肩疽在肩后廉至右臂同

肩部

肩中疽 乾疽 過肩疽

肩疽癰發正肩中疽硬黑陷癰腫紅乾疽肩前過肩後風濕積熱血瘀凝

註此疽生於肩中廉屬三焦膽二經紅活高腫一名疽癰堅硬平塲爲肩中疽肩之前廉屬大腸經名乾疽一名疔疽肩之後廉屬小腸經名過肩疽瘡勢無論大小惟在發源之處命名總由濕熱風邪鬱成亦有負重瘀血凝結而成高腫紅活焮熱速潰者順若平塲堅硬無紅無熱潰遲者險甚則腫痛連及臂胛口禁寒戰大痛不食或兼綿潰便

瀉者逆治法初起有表證者俱宜荆防敗毒散汗之有裏證者內疏黃連湯下之汗下之後腫痛不退膿勢將成宜用托裏透膿湯膿熟開之至於引經之藥惟在臨證時因經加之潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門

荆防敗毒散

見項部
脳疽

內疏黃連湯

見脣瘍門

托裏透膿湯

見頭部
脳疽

膠疽

疽

圖



膠疽在肩之章腋之后外層咬骨縫間左右同

肩風毒圖



肩風毒生在肩稍骨
経中左右皆同

骻疽 肩風毒

骻疽肩後腋外生小腸肩貞風火凝肩風毒生臑端上大腸肩
骻風濕成

註 骻疽生於肩之後下腋之後外微上岐骨縫之間經屬小
腸堅貞穴由風火凝結而成初起如粟堅硬腫痛肩臑拘
急不能舉揚初服荆防敗毒散便燥實者服雙解貴金丸
雙解之肩風毒生於肩稍臑上骨尖處經屬大腸肩骻穴
由邪風深侵骨縫與濕稽培化熱而成初起宜腫色赤大
者如桃小者如杏痛連肩臑更兼拘急初服蠲痛無憂散
汗之卽消若腫痛日深不能盡消者膿勢將成也宜服托

裏透膿湯一證潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門

蠲痛無憂散

番木鱉

香汕蝶浮當歸酒洗

甘草

各二兩生

麻黃

三兩

穿山甲

陳土炒

川烏

黑豆酒煮去皮火

草烏

薑汁煮

蒼术

米泔水浸炒

半夏

各二兩製

威靈仙

一兩

風痛

方蠲痛無憂肩風毒風襲骨縫與濕凝番鱉歸草麻黃甲川
歌蠲痛無憂肩風毒風襲骨縫與濕凝番鱉歸草麻黃甲川

芎烏蒼半威靈

荆防敗毒散

見功部
腦疽

雙解貴金丸

見種瘍門

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

樂

疽

圖



一樂疽生在眉前下脣前之上脣絡腮合口全陷史有高

樂疽

樂疽肩前腋上生骨縫開合凹陷中堅如鵝卵痛入骨包絡血
熱氣鬱成

註此證生於肩前腋之上骨縫開合空凹陷中初起如椒子

漸腫堅硬大如鵝卵按之疼痛入骨屬包絡經血熱氣鬱

而成證證屆期潰破出稠膿腫消者順月餘不潰既潰出

清水腫硬不退者逆初宜服神授衛生湯若惡風太過倍

加葱白汗之次服托裏透膿湯潰遲者十全大補湯潰後

內外治法俱按癰疽潰瘍門

神授衛生湯

見腫瘍門

托裏透膜湯

見頭部
侵腦疽

十全大補湯

見潰瘍門

御纂醫宗金鑑 卷八

臍

癰

圖

臍癰傷寒示時至退



藥包毒圖



藥包毒左右驕節透

臑部

自肩至付曰臑

膿癰

附耦包毒

膿癰肩肘週匝腫色赤焮疼粟瘡殼包裹毒狀鴨鵝卵膿內三

陰外三陽

註

此證由風瘡或風火凝結而成生於肩下肘上週面漫腫
色赤焮痛初起狀如粟米一撥亦有起一粒殼疣者潮
次焮腫紅熱舉膿痛甚紅腫之外無量者順有二量者陰
三四量者逆腫發膿內或膿外結腫一枚如桃如鴨鵝卵
者名耦包毒毒者癰之輕證也膿癰耦包內外治法俱按
癰疽腫癰潰瘍門此癰毒發齒之處若在嘴內者屬手三

陰經在膚外者屬手三陽經隨證用引經之藥必然獲效

魚

肚

發

圖



魚肚發在臍部之后，青處焮腫赤色。

魚肚發

魚肚發如魚肚形青靈穴生心火凝暴腫紅活焮熱痛癰疽治法卽成功

註此證生於膍之後垂肉處屬心經青靈穴由火毒凝結而成暴腫色赤焮熱疼痛形如魚肚腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其引經之藥惟在臨證加之

石榴疽圖



石榴疽

石榴疽起肘尖上，粟炮根開堅腫疼破翻如榴，寒熱甚。三焦相火與濕凝。

註

此證生於肘尖上寸餘，屬三焦經。天井穴初起黃粟小炮根脚便覺開大色紅，焮腫堅硬疼痛，腫如覆盤，破翻如榴。寒熱如瘡，由三焦相火與外濕相搏而成。初起宜蟾酥丸汗之外，以艾灸九壯貼蟾酥餅用萬應膏蓋之，焮腫處敷冲和膏，服菊花清燥湯，煩躁熱甚者服護心散。九日後作稠膿，痛減，喜食，表裏證俱退者順反此者逆。破後用菊花蕘煎湯洗之，次以菊花燒灰存性，加輕粉少許，兌勻敷之。

神效至透膿脫腐生肌時內外治法俱按癰疽潰瘍門

菊花清燥湯

甘菊花二不

當歸

生地

白芍酒炒

川芎

知母

貝母去心研

地骨皮

麥冬各一不
去心

柴胡

黃芩

升麻

犀角鏡

甘草

生各五分

竹葉二十片燈心二十寸水二鍾煎八分食後溫服

方
款菊花清燥石榴疽腫硬癥紅痛可醫四物柴芩知貝草升

麻地骨麥冬犀

蟾酥丸

蟾酥餅

卽蟾酥丸
成餅見疔瘡門

料皇

冲和膏

護心散

併見疔瘡門

肘

癰

圖



肘癰生在肘之圓處于膝左右用同

肘癰

肘癰發於肘圍遠高腫焮熱赤紅疼心肺稽留風邪火勢小爲癰大爲瘤

註此註升於肘之圍遠暴發高腫焮熱色紅疼痛由心肺風火之邪稽留凝滯而成形勢小者爲痛毒形勢大者爲癰初服荆防敗毒散汗之次服白芷升麻湯清托之外敷三味拔毒散將潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

白芷升麻湯

芩

二錢半生半酒炒

連翹

二錢去心

黃耆

三錢各五分

芷

八分

升麻

桔梗

各五分

紅花酒洗

甘草各三分
炙

酒水各一錘煎八分食遠熱服

白芷升麻醫腫痛解熱除煩托肘癰荅翹桔梗紅花草
者酒水各一錘

荆防敗毒散見項部腦疽

二味拔毒散見瘡瘍門

臂

壅

圖



臂壅赤腫臂疽堅硬不何臂之裏外廉臂以差左右臂相同

卷之二
臂部 自時至晚 日臂

臂癰附疽

臂癰圖疽遠臂生平紫硬道紅腫癰榮衛風邪逆內理甚則拳縮散骨疼

註

此證註臂外側屬三陽經臂裏側屬三陰經高腫紅狂熾

痛潰速者爲癰平陷紫暗堅硬木痛潰遲者爲疽俱由榮

衛不週感受風邪逆於肉理而成初起形如粟粒憎寒壯

熱宜服荆防敗毒散汗之燙痛煩熱宜服白芷分麻湯清

之膿勢將成宜服托裏透膿湯膿熟鍼之若疽證木痛無

紅無熱此屬氣血兩虛無論已潰木潰宜服十全大補湯

托之潰後內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若拳縮筋不能舒疼痛徹骨者係潰深傷脈也屬逆

荆防敗毒散

見項部腦疽

白芷升麻湯

見臍部肘癰

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

十全大補湯

見潰瘍門

腕癰圖



腕癰生在腕背而高腫色紅左右相同

腕癰

腕癰三陽風火凝手腕背面結癰形高腫速潰順易治腐爛露骨逆難功

註此證生於手腕背面屬手三陽經由風火凝結而成高腫

紅活在十四日潰破膿出痛減者順而易治手腕乃皮肉澆薄之處若遷延日久不潰或漫腫平塌既潰腐爛露骨者逆難於收功初服荆防敗毒散汗之外用太乙紫金錠敷之膿成將潰卽按癰疽腫瘍潰瘍門治法

荆防敗毒散

見項部脾發疽

太乙紫金錠

見胸部脾發疽

兌

疽

圖



兌疽在手腕裏面橫紋前稍動城之間左右同

兌疽

兌疽生腕動脈間堅硬漫腫兌骨邊痛徹手膊爲險證本屬肺經穴太淵

註此證生于手腕裏面權紋前稍動脈之間兌骨裏側屬肺經大淵穴由憂思氣滯風火結成堅硬漫腫疼痛徹骨手膊不能轉動此動脈處乃肺經門戶若發此疽或潰深大淺肺氣最爲險候內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

穿

骨

疽

圖



「穿骨疽生在掌后橫紋上三寸至右近同」

穿骨疽

穿骨疽生間使穴掌後三寸包絡經堅硬漫腫因蘊熱毒盛潰深穿骨疼

註

此證生於間使穴處在掌後橫紋上三寸兩筋陷中屬包絡經蘊熱凝結而成初起如粟漸增堅硬漫腫微紅響熱疼痛應期速潰者順若潰破遲緩膿毒潰穿骨縫從臂外側出膿者險內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

骨 瘡 疮 圖



骨 瘡 疮 生 在 脖 外 爵 黃 色 鼻 孔 左 右 同

骨蠶疽

骨蠶疽生臂外廉經屬陽明憂怒纏瘡疼根束多善順紫暈腐
肉七惡難

註此證生於臂外側前廉人骨之後屬手陽明大腸由憂鬱
暴怒凝結而成初如粟豆旬日大如桃李腫硬疼痛瘡根
收束多見五善之證者順若紫暈開大腐爛斑點串通肌
肉抽搐拘急多見七惡之證者逆始終內外治法俱按癰
疽腫瘍潰瘍門

謫

站

串

圖



謫串在掌后橫紋上守左右相同

蠻貼串

蠻貼串生臂內中思傷脾氣包絡凝筋骨如中流矢痛內潰串孔似漏形

註此證生於臂內中廉屬包絡經由思慮傷脾脾傷則運化遲故生濁液流於肌肉脾氣滯鬱不舒凝結而成此患初起筋骨如中流矢疼痛漸增漫腫堅硬不紅不熱連腫數塊臂膊不能轉動日久其腫塊漸次潰破孔孔時流白漿內潰串通諸孔外勢腫硬不消膿水淋瀝如漏虛證悉添如面黃食少削瘦甚則午後寒熱交作而成敗證也初起宜服逍遙散外敷太乙紫金錠次服人參養榮湯調和氣

血扶助脾胃十中可保二三潰按癰疽潰瘍治法若投藥

不效者屬逆

逍遙散

見背部上墨手

太乙紫金錠

見胸部脾發疽

人參養榮湯

見潰瘍門

手發背圖



手發背兩手皆同

手部

手發背

手發背初芒刺形三陽風火與濕凝堅硬潰傷筋骨險高腫速潰易收功

註此證生於手背屬於手三陽經由風火與濕凝滯而成初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活焮熱潰速爲癰若漫腫堅硬無紅無熱潰遲爲疽其證無論形勢大小但潰深露筋骨者難痊初俱宜服羌活散汙之次服內疎黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

羌活散

羌活

當歸名二錢

獨活

烏藥

威靈仙各錢

五分

升麻

前胡

荆芥

桔梗各一錢

甘草

五分生

肉桂

三分

酒水各一鍾煎一鍾食遠服

方歌

羌活散醫手發背除濕發汗把風追升麻前獨荆歸草烏

藥威靈桔桂隨

內疎黃連湯

見腫瘍門

掌心毒圖



掌心毒

掌心毒生赤腫疼經屬包絡積熱成偏於掌邊名穿掌初宜發汗次宜清

註此證生於手掌心赤腫疼屬包絡經勞宮穴積熱而成若偏於掌邊名穿掌毒一名穿掌毒又名鵝癰初起治同手發背其餘治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

虎口疽圖

虎口疽惡半皆可



虎口疽

附合谷疔

虎口疽生合谷穴經屬大腸熱濕凝根深爲疔大爲疽堅硬木痛汗鍼明

註

此證生於合谷穴在手大指次指歧骨間屬大腸經濕熱凝結而成一名疔又毒一名華壘毒初起如豆漫大色青

木痛堅硬名虎口疽若初起黃粟小炮癰熱歟痛根深有

紅線上攻腋內卽名合谷疔無論疔疽初俱宜羌活散汗

之內疎黃連湯清之疽證膿法鍼之餘治法按癰疽腫瘍

潰瘍門疔證於初起將疔根挑去有紅絲者當紅絲盡處

用鍼砭斷其餘治法俱按疔門

名醫金匱
卷之二
羌活散 見手發背

內疎黃連湯 見腫瘍門

病

鯰

圖

病鯰生手皆赤腫高塊形勢如鯰兩手皆同



病鰐

病鰐每在手背生形勢如鰐赤腫疼內宜消毒外湯洗手三陽
經熱毒成

註此證生於手背屬手三陽經積熱毒盛而成形勢如鰐高
埂赤腫疼痛初宜服黃連消毒飲外用食鹽酒糟香油同
炒令香淬以滾湯淋洗患處卽消如高埂不消再用蟾酥
餅貼之外用巴膏蓋之以腐盡便了次敷生肌散仍用膏

蓋收斂

黃連消毒飲

見頭部
百會疽

蟾酥餅

即蟾酥丸作
餅見疔瘡門

巴膏

生肌散 俱見潰瘍門

手

發

圖



手發在手骨絕間除大指人暴尖患生手者皆同此名

手少發

手少發生手指岐濕火凝結本於脾初粟漸豆熾熱痛內外治

法按疔醫

註此證生於手少岐骨縫間除大指合谷穴其餘指少生患

卽名手少發本於脾經濕火凝結而成初起如粟色紅漸
大如豆熾熱疼痛潰後疼痛不止者俟膿塞脫出其痛方
止內外治法俱按疔證門

調

疽

圖



調疽在手大指形如李甚色毒黑兩手指

調疽

調疽大指肺熱生如粟如李青紫疼六日刺出膿血吉黑腐延

蔓斷指凶

註此證生於手大指由肺經積熱而成初如粟豆漸腫如李

青紫麻木癢痛徹心六日刺破出稠膿鮮血者吉出黑血

者險初服麥靈丹汙之次服仙方活命飲外敷白錠子其

餘內外治法俱同癰疽腫瘍潰瘍門若黑腐延蔓不痛者

名斷指屬逆治法與足部脫疽同

麥靈丹

仙方 活命飲

白錠子 俱見腫瘍門

蛇

頭

疔

圖

蛇頭疔生手指保墮硬有頭指同



天

蛇

毒

圖



天蛇毒隼指恩鵠腫無頭下指同

蛇頭疔 天蛇毒

蛇頭疔炮紫硬疼天蛇毒疼悶腫紅二證俱兼脾經火看生何指辨專經

註此二證俱生於手指頂尖夫手指雖各有專經然俱兼脾經火毒而成蛇頭疔自筋骨發出根深毒重初起小炮色紫疼痛堅硬如釭初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃散天蛇青自膚肉發出其毒稍輕初起悶腫無頭色紅痛如火燎初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃牡蠣散二證膿勢將成俱服仙方活命飲膿熟開之外貼琥珀膏煨膿生肌治之虛不能斂者補之但手指係皮肉澆薄之處不宜灸法亦不

宜開早若誤炙開早以致皮裂努肉翻出疾痛倍增者不能速愈慎之手指經絡圖歌俱見首卷

雄黃散

明雄黃二錢

輕粉五分

蟾酥二分

冰片一分

共研細末新汲水調濃重湯炖溫敷於患指用薄紙蓋之

日換三四次

方 歌 雄黃散治蛇頭疔柴痛根堅火毒攻冰片蟾酥輕粉末汲

水調塗用紙封

雄黃牡蠣散

牡蠣

四錢
服

明雄黃

二錢

另研細共和一處再研加密水調濃重陽炖重塗於患指能止疼痛日用五六次

方歌雄黃牡蠣天蛇毒指頭燉紅悶腫疼一味細研加密水調

敷止痛效又靈

蟾酥丸

見疔瘡門

仙方活命飲

見腫瘍門

琥珀膏

見頭部
髮際瘡

蛇眼疗圖



蛇眼疗生指甲旁尖角間十指皆同

蛇背疔圖



蛇背疔在手指甲後兩手皆同

蛇

節

疔

圖

蛇節疔在手指骨節兩手皆同



蛇腹疔圖



「蛇腹疔在十指舉面形如魚腹」

泥

鯀

疽

圖



泥鯀疽隼指 指通腫十指同

蛇眼疔 蛇背疔 蛙節疔 蛇腹疔 泥鰍疽

蛇眼疔在田旁生甲後名爲蛇背疔蛙節疔生中節骨蛇腹指內魚肚形泥鰍疽生偏指腫牽引肘臂熱焮疼看生何指分經絡總由臟腑火毒成

註

此證有五如蛇眼疔生於指甲兩旁形如豆粒色紫半含半露硬似鐵釘蛇背疔生於指甲根後形如牛棗色赤胖腫蚌節疔又名蛇節疔生於中節遠指俱腫其色或黃或紫蛇腹疔又名魚肚疔生於指中節前面腫如魚肚色小疼痛泥鰍疽一指通腫色紫形如泥鰍焮熱痛連肘臂外起俱宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃散次服仙方活命飲膿

熟開之貼琥珀膏煨臘生肌虛不能斂者補之但此五證
總不外乎火毒凝結而成至於屬何經臟臨證看生何指
以辨之手指經絡各詳註首卷

蟾酥丸

見疔瘡門

雄黃散

見蛇頭疔

仙方活命飲

見腫瘍門

琥珀膏

見頭部
髮際瘡

代

指

圖



代指生指甲身之内三四日後甲面上透正黃色深膿已成

代指

代指每生指甲身先腫焮熱痛應心輕潰微膿重脫甲經衄血
熱是其因

此證生於手指甲身內由經衄血熱凝結而成初起先腫
焮熱疼痛應心宜用甘草朴消各五錢熬水浸洗卽瘥痛
仍不止三四日後指甲背面上微透一點黃白色此係內
膿已成但無門潰出急用線鍼在指甲身就膿近處撲一
小孔膿方得出隨手搃盡餘膿用黃連膏貼之易愈或失
治或過敷涼藥以致肌肉寒凝膿毒浸淫好肉爪甲潰空
必然脫落用琥珀膏貼之一兩月卽愈

黃連膏見鼻部鼻瘡

琥珀膏見頭部

髮際瘡

長其因

半夏白朮散治癰瘍

半夏白朮散治癰瘍

蟻

螂

蛀

圖

蟻螂蛀在手指骨節粒大硬腫



名醫全錄卷八
三
蟻螂蛀

蟻螂蛀由痰氣凝指節堅腫蟬肚形初起不疼久方痛潰久膿清癆病成

汪此證多生於體虛人手指骨節由濕痰寒氣凝滯而成初

起不紅不熱不痛漸次腫堅形如蟬肚屈伸艱難日久方

知木痛初腫時宜先服六君子湯益氣除濕化痰外以離

宮錠薑汁磨敷或兼陽燧錠於堅痛處灸之自消若失於

調治腫處漸漸腐爛膿如清水淋瀝不已腫仍不消然在

骨節之處潰久大泄氣血每成瘡瘍之證宜豫服人參養

榮湯補之外貼蟾酥餅子陀僧膏之遇肚年人如法治

之可愈若年老及虛羸之人不能收功

六君子湯

即香砂六君子湯減去
宋香砂仁見腫瘍門

離宮錠

見種瘍門

陽燧錠

見首卷烙法

人參養榮湯

陀僧膏

具見潰瘍門

蟾酥餅

見痔瘍門

瘡瘍圖

瘡瘍兩手及指掌中形如菜莢兩手相對而生



病瘡

瘡瘡每發指掌中兩手對生菜萸形風濕癢痛津汁水時好時發久生蟲

註此證生於指掌之男形如茱萸兩手相對而生亦有成摺者

者起黃白膿炮癢痛無時破津黃汁水時好時發極其疲
頑由風濕客於膚腠而成以潤肌膏擦之若日久不愈其
癢倍增內必生蟲治以殺蟲爲主用藜蘆膏擦之甚效忌
動風雞鵝魚腥等物

藜蘆膏

苦參各一兩

豬脂油八兩將二味燥枯瀝去渣入松香一兩溶化開離

火再加枯礬末雄黃末各一兩攪勻候溫塗之以痊爲度

方歌藜蘆膏用苦參良脂油燥瀝入松香再加枯礬雄黃攪殺

蟲止癢抹瘡瘍

潤肌膏

見頭部
自屑風

狐

尿

刺

圖



「腋尿刺在兩手及臂脣腫大起紅紫斑延鵝蕪」

於狐尿刺

狐尿刺生手足間悶腫焮痛紅紫斑螳螂精尿流積毒誤觸肌膚痛不眠

註

此證大成書名狐狸刺外臺總錄二書名狐尿刺由螳螂

盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人手足誤觸之則成

此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫焮痛不眠十日後腐

開瘡口曰寬內宣服黃連解毒湯外以蒲公英連根濃煎

溫洗若得鮮蒲公英搗汁塗患處更佳蓋螳螂又名野狐

鼻涕此證取名蓋本於此將潰治法按癰疽腫瘍門

黃連解毒湯

見耳部黑疔

鵝掌風圖



鵝掌風生兩手掌

鵝掌風

鵝掌風生掌心間皮膚燥裂紫白斑 楊梅餘毒血燥熱兼受風
毒凝滯源

詳此證生於掌心由生楊梅餘毒未盡又兼血燥復受風毒
凝滯而成初起紫白斑點疊起白皮堅硬且厚乾枯燥裂
延及偏手外用二礬散洗之三油膏擦之內用祛風地黃
丸料加土茯苓白鮮皮當歸爲佐作丸服之甚效若年久
成癬難愈又有不因楊梅後無故掌心燥癢起皮甚則枯
裂微痛者名掌心風由脾胃有熱血燥生風血不能榮養
皮盧而成宜服祛風地黃丸外用潤肌膏久久擦之卽愈

祛風地黃丸

生地

熟地各四兩

白蒺藜

川牛膝

各三兩
酒洗

知母

黃蘖

枸杞子

各二兩

菟絲子

酒製

獨活各一兩

淡鹽湯送下

共研末煉蜜和丸如梧桐子大每服三錢黃酒送下夏月

方
歌祛風地黃除血熱鵝掌風生服卽瘥知癰瘍藜牛膝菟獨

杞同研煉蜜和

二礬散

白礬

皂礬各四兩

兒茶五錢

側柏葉

八兩

水十盞煎數滾聽用先以桐油搽患處再用紙撲桐油浸透火點向患處薰片時次用前湯乘熱貯淨木桶內手架桶上以布將手連桶口蓋嚴湯氣薰寧勿令泄氣待微熱將湯傾入盆內蘸洗良久一次卽愈七目切不可見水

方歌二礬掌起紫白斑礬與兒茶柏葉煎先以桐油搽患處

撲燃薰後洗痊

三油膏

牛油

柏油

香油

銀朱各一兩

官粉

麝香研細各一錢

將三油共合火化入黃蠅一兩溶化盡離火再入朱麝官

粉等未攪勻成膏搽患處火烘之以油乾滋潤爲度

方歌

三油膏潤鵝掌風初斑漸裂燥癢攻牛柏香油朱粉麝蠅

熬擦患火上烘

潤肌膏

見頭部
自屑風