


科證
準繩
五之二



漢書門類			
一	三〇	二	〇
〇	三	三	函
冊	架	函	號

內閣文庫			
漢	書	類	號
〇	三	三	函
冊	架	函	號

內閣文庫			
番號	漢	13010	
冊數	120 (69)		
函號	301	64	



脇脹痛

因產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡

露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹

滿氣與水相激故令痛也薛前證若肝經血瘀用

玄胡索散若肝經氣滯用四君青皮柴胡若肝經血

虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水

不足不能生肝用六味丸若肺金勢盛尅制肝木用

瀉白散仍參前各論主之一產婦因怒兩脇脹痛

吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用

八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯

產後脇脹痛

女科十五

五十一



而寒熱漸退此證苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥
勢不惟無以施其功而反助其脹耳
經効療產後血氣脇肋脹痛

當歸壹拾貳分

芍藥

苦梗

檳榔

枳殼各捌分

桂心

青木香

柴胡各陸分

右咬咀以水貳升煎取捌合去滓空心分溫貳服
療產後惡露不下血氣壅痞脇脹痛不下食

蘇木

紫葛各拾貳分

芍藥

當歸各捌分

桂心

蒲黃各陸分

生地黄汁叁合

右咬咀以水貳升煎取柒合下蒲黃分兩服

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸

乾薑等分

右為末每服叁錢水壹盞煎捌分入鹽醋少許食

前熱服選奇方用酒煎

經効理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥捌分

蒲黃

延胡索各肆分

當歸陸分

荷葉蒂炙叁枚

右水貳升煎取柒合後入蒲黃空心分作兩服

產後脇脹痛

女科

五十一

廣濟療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

茯苓

人參

當歸

甘草 各陸分

生薑

陳皮 各肆分

厚朴 捌分

右咬咀以水貳升煎取捌合去滓分温服

抵聖湯 治產後腹脇悶滿或嘔吐者

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參

甘草 等分

右咬咀每肆錢薑伍片煎温服

腰痛

大腎主腰脚產後腰痛者為女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也薛前證真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補為主佐以寄生湯如不應十全大補加附子產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔余以為脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲匙許四劑後漸安百餘劑而愈

產後腰痛

卷十五

五十二

療產後風冷腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難

獨活心黃芩川芎水浸芍藥炒黃

桂心細切續斷有餘生薑

桑寄生各陸分當歸八分防風各捌分

右咬咀以水參升煮取壹升去滓空心分二服

千金大豆酒療產後中風腰背強痛中風煩熱苦

渴頭身皆重此因風冷及傷寒所致

用大豆伍升炒以酒壹升投之密蓋令温去豆服

壹升日夜數服卧取微汗避風亦有加羌活

生料五積散加桃仁煎亦妙

汚血

保命治血癖腹乃刺刺腰痛用四物湯細末參兩加

酒煮玄胡索末貳兩每服參錢酒下

廣濟療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬各捌分當歸各捌分川芎

桂心各陸分芍藥各陸分

右咬咀水貳升煮取捌合分温二服忌葱

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胸滿

氣急兩脇痛方

生薑壹斤淡竹葉壹升切

右二味以水貳升煮取壹升去滓分温貳服

生地黄湯濟廣療產後二百患腰疼腹中餘血未盡

并手脚疼不下食

生地黄汁壹升芍藥

丹參肆兩蜜壹合

右以水參升煮取壹升去滓內地黃汁蜜薑汁微

火煎一兩沸一服參合日一夜三利一兩行中間

進食與藥更進服

如神湯方見

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛下注

兩股痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即

通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預服
五香連翹湯

桃仁湯方

桃仁去皮

蜜虫去足

右為粗末每服參錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

無時惡露下即住服

五香連翹湯方

木香

乳香

蘇木

水蛭炒各參

一方有大黃壹兩

沉香

麝香

升麻

丁香

產後腰痛

女科五

五十四

獨活

桑寄生

連翹

木通

各貳兩共
為粗末

每服伍錢水貳盞煎壹盞去滓入竹瀝少許溫服
紫金丸治產後惡露不快腰痛小腹如刺寒熱腹痛
久有瘀血月水不調亦可治心痛左見前

虛

當歸黃耆湯

治產後腰痛不可轉側自汗壯熱身

體強氣短

黃耆

芍藥

各貳兩

當歸

叁兩

右剉每服肆錢薑肆片水煎溫服

頭痛

天夫人頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧

弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊于

頭陽實陰虛則令頭痛也 又有產後敗血頭痛不

可不知黑龍丹言之甚詳 薛前證若中氣虛用補

中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱

虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣

稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子壹錢數

劑不發 一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物

產後頭痛

六十五

五十一

等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而痊

行氣 川芎散 治產後頭痛

真天台烏藥皮 大川芎 等分

行血 一奇散 治同前

右為細末每服參錢燒紅秤錘淬酒調服
取當歸川芎為細末每服貳錢水壹盞煎柒分溫服

芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者
大附子壹枚醎醋壹椀用火四畔炙透蘸醋令盡

去皮臍加川芎壹兩並為末每服壹錢又作貳錢茶清調下

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剗取之如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服下瞑目寢如平時至清晨下一行約三升許如蝗虫子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣黑龍丹見前產後通用方

產後頭痛

丹一婦年三十餘產後身熱頭痛肚痛

陳皮 白朮 白芍藥各貳錢

黃芩貳錢半 川芎壹錢 乾薑

牡丹皮 甘艸各壹錢半 荆芥半錢

右分四貼水煎服

加減四物湯命保 治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令

頭痛

蒼朮壹兩陸錢

羌活 川芎

防風

香附炒

白芷各壹兩

石膏貳兩半

細辛壹兩半

甘草各半兩

右麤末每用壹兩水煎不拘時服 如有汗者知

氣弱頭痛也方中加芍藥參兩桂壹兩半生薑煎

如痰癖頭痛加半夏參兩茯苓壹兩生薑煎

如熱痰頭痛加白芷參兩石膏參兩知母壹兩

如寒厥頭痛加天麻參兩附子壹兩半生薑參片

煎服

產後頭痛

不計五

五二

煎洲
吹寒濕因氣味天利參兩翅于壹兩半主身寒
吹寒濕因氣味白主冬兩百清參兩味氣
吹寒濕因氣味半夏參兩并本壹兩半主身寒
吹寒濕因氣味大中吹寒濕因氣味參兩并本壹兩半主身寒
吹寒濕因氣味木中吹寒濕因氣味參兩并本壹兩半主身寒

脚氣

大全產後熱悶氣上轉為脚氣者何荅曰產卧血虛
生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以
着為脚氣其狀熱悶掣痠驚悸心煩嘔吐氣上皆其
候也可服小續命湯方見雜病中風兩劑必愈若醫者誤
以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣 陳無擇評
曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往讀千金
見產婦多有此疾之語便出是證文辭害意盖可見
矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽
經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經

產後脚氣 卷十五 五

絡調之此涉專門未易輕論既非產後要病更不致
 引陳無擇雖有此論然小續命湯加減與之用無
 不効故百問云寒中三陽所患必冷小續命湯主之
加生薑暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減太
汁更快煩躁者紫雪最良庶使後人均得治瘧如無紫雪用
 真薄荷煎冷水嚙下物湯各半服之薛前證當
 補氣血為主佐以小續命湯寄生湯如不應用法防
 風湯一產婦患前證或用獨活寄生湯而痊後復
 作服前湯其汗如水更加口噤吐痰余用十全大補
 湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧

此命門火衰脾土虛寒用八味丸及加味歸脾湯諸
 證漸退肌肉漸生

獨活寄生湯 治肝腎虛弱或久履濕冷之地或洗

足當風濕毒內攻兩脛緩縱攣痛痺弱或皮肉紫

破足膝攣重又專治產後脚氣

川獨活參兩

桑寄生如無以杜仲炒

牛膝去蘆酒浸

細辛不見

白茯苓

防風

當歸

人參

芍藥

秦艽各貳兩

甘草炙壹兩

熟地黄酒洗

川芎

右為吹咀每服肆錢薑伍片水煎溫服

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

遍身疼痛

天產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以為傷寒治之則汗出而脉動惕手足厥冷變生他病但服趁痛散除之
薛前證若以手按而痛甚是血滯也用四物炮薑紅花桃仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮薑人參白朮補而養之
一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服解散祛血之藥不效

產後遍身疼痛

五

昏憤六脉洪大如無用補中益氣加炮薑半夏一劑
頓退二三又劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大
補湯調理而安一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急
脉浮緊此風寒之證也用五積散一劑汗出而愈但
倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而
痊一婦六月產後多汗人倦不敢袒被故汗生被
裡冷則浸漬得風濕疼痛遂以羌活續斷湯數服而
愈

赴痛散雲岐

治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭

疼ラ

牛膝

當歸

桂心

白朮

黃芪

獨活

生薑

甘草

薤白

各貳錢半

右咬咀每服半兩水參盞煎至壹盞半去渣食前

服陳無擇評曰赴痛散不特治產後氣弱血滯

兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若其

感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况有葶

勞諸證尤甚赴痛散皆不能療不若五積散入醋

煎用却不妨

五積散加酒煎治感寒頭痛身疼方見傷寒門恐

產後遍身疼痛

女科五

六十一

四物各半服之穩當加桃仁煎治腰痛逐敗血去風濕

大治產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝

大麥蘗各等分

右為細末以新瓦罐子中填一重麥蘗一重牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煨過赤放冷研為膏但

活血丹

蒼朮四物各半湯

並見雜病身痛

烏金散治產後骨節四肢疼痛

見後在言諸語

中風

大夫產後中風者由產時傷動血氣勞損藏府未嘗平復起早勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故中風風邪冷氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣大凡筋脉挾寒則攣急啞僻挾溫則縱緩虛弱在內諸藏恍惚驚悸隨其所傷府藏經絡而生病焉 郭稽中論曰產後中風者何荅曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或懷憂怒擾盪沖和或因食生硬傷動藏府得病之初眼澁口噤肌肉羸擗漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風

所得也。薛前證果外邪所屬形氣不足病氣有餘。當補元氣為主稍佐以治病之藥若強力不休月內入房屬形氣俱不足當純補元氣多有復甦者若誤投風藥乃促其危也。

丹產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰當以左右手脉分其氣血多少以治切不可作人治。

用小續命湯及發表治風之藥。

防風湯 治產後中風背項強急胸滿短氣。

防風

獨活

葛根

當歸

人參

白芍藥

甘草

右為咬咀每服捌錢水壹盞半棗子貳枚擘破同煎至壹盞去滓温服不拘時。

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束。

川芎

羌活

酸棗仁

羚羊角屑

芍藥

桑白皮

防風

為咬咀每服壹兩水貳大盞煎至壹盞半去滓不拘時服日進三服。

經効茯苓湯 治產後風虛頭痛語言謇澁。

茯苓 去皮

防風 去蘆

乾葛 各捌錢

麥門冬 去心 壹兩

芍藥

黃芩 各陸錢

犀角屑 肆錢

甘草 炙貳兩

右咬咀每服壹兩水壹大盞半煎至壹盞去滓温服不拘時

鹿肉湯 治產後中風頭痛壯熱言語蹇澀

鹿肉 叁斤

阿膠 炒脹

黃芩

茯苓 去木

黃芪 蜜炙

甘草 炙

白芍藥

人參

獨活 各去蘆

佳心

乾地黄

川芎 各貳兩

半夏 湯洗壹兩

右為咬咀每服伍錢水肆盞鹿肉伍錢薑伍片同煎至貳盞去鹿肉再煎至壹盞半入阿膠消化去粗温服不拘時日進貳服

雲岐治產後中風半身手足不遂言語蹇澀恍惚多忘精神不定

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

天麻 各伍錢

桂心 叁錢

右咬咀以水捌升煮取貳升半分為叁服覺効更

作一劑又作丸每服貳拾丸如有熱加葛根五錢
有冷加白朮五錢若有氣證加生薑壹兩半若
手足不遂加牛膝壹錢半草薢叁錢黃芪肆錢
若腹痛加當歸芍藥各米錢半若不食加人參
伍錢玄參壹兩若寒中三陰所患必冷小續命
湯加生薑煎若暑中三陽所患必熱小續命湯
去附子減桂心一半加薄荷煎
保命血氣湯治產後諸風痠攣無力

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

白朮

茯苓

熟地黄各等分

右為末一半蜜丸一半散酒調下伍米拾丸妙

治產後風虛五緩六急手足頑痺氣血不調大豆壹
升炒令熟熱投參升酒中密封飲之

小品治產後中風語澁四肢拘急羌活參兩為末每
服伍錢水酒各半盞煎去滓溫服

華陀愈風散治婦人產後中風口噤手足痲痺如
角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒

築吐瀉欲死用荆芥穗微焙每服叁錢豆淋酒

產後中風

六十一

六十一

調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中其効如神大抵產後大眩則汗出而滕理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散二藥下可立待應効陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金玉祝指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇効神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂

氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴氏證治要訣名獨行散賈似道悅生隨抄呼爲再生丹右產後中風用續命湯及羌活等發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服之可也

虛極生風天產後下血過多虛極生風者何荅曰婦人以榮血爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾者此但虛極生風也如此則急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣醒前證若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子鈞

藤鈞若肝經血虛用逍遙散加鈞藤鈞經云脾之榮
在唇心之液為汗若心脾一藏虛極急用參附湯救
之一婦人患前證或用諸補劑四肢逆冷自汗泄
瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子薑附各加至
五錢不應以參附各壹兩始應良久不服仍腸鳴腹
痛復灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方効
濟危上丹

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石同研極細

阿膠炒脹

卷柏生用

桑寄生

陳皮去白各等分

右將上四味同研停於銀石器內微少炒勿焦了
再研極細復入餘藥為末拌勻生地黄汁和丸如
梧子大每服貳拾丸溫酒或當歸酒送下食前

當歸建中湯見產後腹痛

口噤 天夫產後中風口噤者是血氣虛而風入於頷
頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損肺
臟傷於筋脉風若乘之其三陽之筋脉則偏持之筋
得風冷則急故令口噤也

葛根湯 治產後中風口噤任地頭自眩暈痰盛氣
急及治產後諸疾

葛根

生薑各陸兩

獨活肆兩

當歸參兩各去蘆

甘草炙

桂心

白茯苓去皮

石膏

人參去蘆

白朮

防風各去蘆

川芎各貳兩

右為呖咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞半去滓溫

服無時日進二服

乾葛湯深

療產後中風口噤不能言

獨活去蘆

乾葛壹兩

甘草炙

生薑壹兩貳錢半

右為呖咀每服壹兩水貳大盞煎至壹大盞去滓

溫服無時

天麻散

治產後中風口噤

天麻柴錢半

白附子炮

天南星炮

半夏湯洗米遍去滑薑製

乾蠍炒各半兩

右為細末每服壹錢生薑薄荷酒調下幹開口灌

之不拘時

當歸散

治婦人產後中風牙關緊急不省人事口

吐涎沫手足痲痺

當歸去蘆

荆芥穗各等分

右為細末每服貳錢水壹盞酒半盞煎至壹盞

乏如牙關緊急，斡開微微灌之，但下咽即生，屢用救入，大有神効。

伏龍肝散 治產後中風口噤不能語言，腰背疼痛。

伏龍肝壹兩 乾薑半兩

為細末，每服貳錢，溫酒調下，不拘時日，進二服。

交加散 治產前後百病，兼治婦人榮衛不通，經脈

不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚為瘕，產後中風並

宜服之。

天生地黃壹升研取自然汁

右先將地黃汁炒生薑滓，生薑汁炒地黃滓，各稍

生薑拾貳兩研取自然汁

乾焙為細末，每服叁錢，溫酒調下，尋常腹痛亦宜服，產後尤不可離。

角弓反張 大夫產後角弓反張者，是體虛受風，風入

諸陽之經也。人陰陽經絡周環於身，風邪乘虛入於

諸陽之經，則腰背反折，攣急如角弓之狀也。薛前

證因氣血耗損，腠理不密，汗出過多而患之者，乃虛

象也。宜固氣血為主，佐以本方。丹溪云：產後當大補

氣血為先，雖有他證，以末治之。如惡寒發熱等證，乃

氣血虛甚之極也。宜太劑參芪歸朮肉桂以培養之。

如不應，急用炮附子，再不應用人參壹兩，炮附子貳

參錢名參附湯借猶未應乃藥力未能及也宜多用

愈風散 當歸湯 羌活酒並見前

羚羊角散 治產後中風身體反張

羚羊角屑 當歸各半 獨活 防風各去蘆 麻黃去節各壹兩 人參去蘆

赤芍藥 細辛去苗 桂心各半兩

右為咬咀每服捌錢水壹大盞半生薑伍片煎至壹大盞去滓溫服不拘時

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯

主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之

川獨活參兩細切

右水參升煮取壹升分服柰酒者亦可酒水煮

一物白鮮湯 用白鮮皮亦依獨活法

產後中風瘖口噤面青手足急強者

以竹瀝貳升分為五服溫溫頻服大効

治產後中風角弓反張口噤不語方

川烏伍兩剉如豆大

右取黑豆半升同炒半黑以酒參升傾於鐺內急

攪以絹濾取酒微溫服壹小盞取汗若口不開者

輪開口灌之未効加烏雞糞壹合炒熟入酒中服之以瘥為度

千金雞矢醴 療產後中風及男子諸風并產後百

疾神効方又治產後中風口噤拘困篤腰背強直

時時反折

烏雞屎叁升 大豆貳升

右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒壹升先淋

雞屎取汁淋大豆每服壹升重者凡四五服極妙

張文仲療產後中風風痙徧身冷直口噤不識人方

白朮肆兩以酒叁升煮取壹升頓服効

汗而變痙

大產後血虛腠理不密故多汗因遇

風邪搏之則變痙痙者口噤不開背強而直如發癩

狀搖頭馬鳴身反折須臾拾發氣息如絕宜速斡口

灌小續命湯稍緩即汗止如兩手摸控者不可治也

薛產後發痙因去血過多元氣虧極或外邪相搏

以致牙關緊急四肢痙強或腰背反張肢體抽搐若

存汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒曰剛痙然

產後患之實由亡血過多筋無所養而致故傷寒汗

下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也若大補血

氣多保無虞若攻風邪死無疑矣 一產婦牙關緊

急腰背反張四肢抽搐兩目連劄余以為去血過多
元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦
又數劑而安 余在吳江史萬湖第入更時聞喧嚷
云某家人婦忽仆牙關緊急已死矣詢云是新產婦
出直厨余意其勞傷血氣而發瘧也急用十全大補
加附子煎滾令人推正其身一人以手夾止其面却
穴開其口將藥灌之不嚥藥已冷令側其面出之仍
正其面復灌以熱藥又冷又灌如此五次方嚥下隨
灌以熟藥遂甦 夷堅志云杜主治郝質子婦產四
日瘵瘵戴眼弓背反張壬以為瘵病與大豆紫湯獨

活湯而愈政和間余妻方分娩猶在蓐中忽作此證
頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拗之不
直適記所云而藥草有獨活乃急為之召醫未至連
進三劑遂能直醫至即愈矣更不須用大豆紫湯古
人處方神驗屢矣

小續命湯 治產後中風及剛瘳柔瘳

陳臨川云雖然陳無擇評曰產後汗出多變瘳亦
令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官
桂防已黃芩輩不若大豆紫湯為佳局方大聖散
亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二瘳小續命湯

並可加減與之若柔瘳自汗者去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痲瘳背強口噤直視煩熱脉緊大者不治小品左主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身重痺發嘔吐直視並宜服之

川獨活 去蘆壹兩半 大豆 半升 酒 叁升

右先用酒浸獨活煎一兩沸別炒大豆極焦烟出

急投酒中密封候冷去荳每服壹貳合許得少汗則愈日進十服此藥能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得瘳

陳臨川云凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰瘳又名曰瘳古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之

大豆湯 治產後中風發則仆地不省人事及妊娠挾風兼治葶草之間諸般病證

大豆

伍升炒黃

獨活

去蘆

葛根

各捌兩

防已

去皮陸兩

右咬咀每服伍錢酒貳盞煎至壹盞半去粗温服不拘時日三服

麝羊角飲子

治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲飲米欲成剛產中風之疾

麝羊角

半兩鎊

防風

羌活

桔梗

並去蘆

敗醬

各捌錢

桂心

柴胡

去蘆

大黃

浸過煨各壹兩貳錢

為咬咀每服五錢水壹大盞半同煎至壹盞去粗

温服不拘時候更服地黃酒用地黃切壹升炒令黑甕瓶中下熱酒叁升密封口煮令減半任意服之

防風當歸散

防風

當歸

川芎

地黃

各壹兩

右剉每服壹兩水叁盞煎至貳盞温服

婁氏云續命湯大豆紫湯舉鄉古拜散太陽厥陰藥也邪實脉浮弦有力者固宜但產後血氣太虛之人不宜輕發其表但用防風當歸散治之為妙

產後中風

女科五

七五

瘈瘲

瘈瘲者筋脉拘急也瘲者筋脉張縱也經云肝主筋而藏血蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前證因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用八珍加丹皮鈞藤以生陰血則陽火自退諸證自愈如不應當用四君芎歸丹皮鈞藤以補脾土蓋血生於至陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患之乃虛象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加薑桂陽氣虛敗者用十

聖後 瘈瘲

六十五

三五

人不宜... 風... 瘈瘲... 補中益氣... 丹皮... 鈞藤... 四君... 芎歸... 薑桂... 陽氣... 虛敗... 用十

全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體惡寒
脉微細者此為真狀若脉浮大發熱煩渴此為假象
惟當固本為善若無乃抽搐戴眼反折汗出如珠流
者皆不治。一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸
肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香耗散真氣腠理
虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實
腠理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸
愈用逍遙散大補湯調理而痊。一產婦先胸脇乳
內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三
部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先

用加味道逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸
諸證悉愈。一婦人發瘕遺尿自汗面赤或時面青
飲食如故肝脉弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘕也
肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂
用加味道逍遙散不數劑諸證悉退而安。一婦人產
後血風患此以小續命湯數服而安。一婦人產
後因虛傷風瘕瘕同傷寒表證未傳入裏宜服防
風湯。一婦人產後因虛傷風瘕瘕同傷寒表證未傳入裏宜服防
風湯。治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂
言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚効此藥

温和不虛入

秦艽 去苗土

半夏 湯洗米次切片

防已

芍藥 白者

當歸 去蘆

獨活 去蘆

防風 去蘆各貳兩

白朮

黃芩

遠志 去骨

麻黃 去節

升麻

石膏 煨

甘草

人參 去蘆各壹兩

右為籠末入半夏片令勻每服肆錢水貳中盞生薑柒捌片煎至壹盞去滓取清汁陸分入麝香末少許食後臨臥帶熱服

海藏愈風湯 即華佗愈風散

交加散 即當歸散並見產後中風

增損柴胡湯

治產後感異證手足牽搐涎潮昏悶

柴胡 叁錢

甘草 炙

石膏 貳錢

黃芩 壹錢貳分

半夏 各壹錢半

黃芪 貳錢半

人參

知母 壹錢

右咬咀分二服水貳盞薑叁片棗貳枚煎捌分不拘時服

秦艽湯 前證已去次服此藥去其風邪

秦艽

甘艸 炙壹錢叁分

人參

芍藥

黃芩

半夏 各壹錢

柴胡 各壹錢柒分

防風 各壹錢貳分

產後 疾疫

女科 五

三二

右為吹咀分二貼每貼水貳盞薑參片煎捌分食

遠服

本共

蘇合香丸 治心胃氣痛 治一切風濕 治一切瘧疾 治一切霍亂 治一切痧脹 治一切嘔吐 治一切泄瀉 治一切痢疾 治一切疔瘡 治一切癰疽 治一切疔毒 治一切瘡毒 治一切疥癩 治一切濕疹 治一切皮膚病 治一切眼疾 治一切耳疾 治一切鼻疾 治一切咽喉痛 治一切牙痛 治一切頭痛 治一切腰痛 治一切背痛 治一切手足麻痺 治一切筋骨疼痛 治一切跌打損傷 治一切刀傷出血 治一切火傷燙傷 治一切蟲咬傷 治一切蛇咬傷 治一切毒蜂咬傷 治一切毒蚊咬傷 治一切毒蠍咬傷 治一切毒蜘蛛咬傷 治一切毒蜈蚣咬傷 治一切毒蠍咬傷 治一切毒蜈蚣咬傷 治一切毒蜘蛛咬傷 治一切毒蜈蚣咬傷

蘇合香丸

治心胃氣痛 治一切風濕 治一切瘧疾 治一切霍亂 治一切痧脹 治一切嘔吐 治一切泄瀉 治一切痢疾 治一切疔瘡 治一切癰疽 治一切疔毒 治一切瘡毒 治一切疥癩 治一切濕疹 治一切皮膚病 治一切眼疾 治一切耳疾 治一切鼻疾 治一切咽喉痛 治一切牙痛 治一切頭痛 治一切腰痛 治一切背痛 治一切手足麻痺 治一切筋骨疼痛 治一切跌打損傷 治一切刀傷出血 治一切火傷燙傷 治一切蟲咬傷 治一切蛇咬傷 治一切毒蜂咬傷 治一切毒蚊咬傷 治一切毒蠍咬傷 治一切毒蜘蛛咬傷 治一切毒蜈蚣咬傷

甘草

柴胡

人參

拘攣

大產後中風筋脉四肢攣急者是氣血不足臟腑俱虛月內未滿起早勞役動傷臟腑虛損未復為風所乘風邪冷氣初客於皮膚經絡則令人頑痺不仁羸之少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也 薛肝屬木而主筋前證若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味地黄丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之 一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安 一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻

產後拘攣

女科五

三

神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑
漸愈去薑又數劑及逍遙散而痊
芎藭散 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強
急

芎藭

羌活

當歸 各去蘆

酸棗仁 炒

羚羊角屑

錢半 防風 去蘆

牛蒡子 各壹兩 炒

桂心

赤芍藥 各半兩

右為咬咀每服捌錢水壹大盞半煎至壹大盞去
粗濕服不拘時

薛前方如未應當用八珍湯更不應用十全大補

湯

防已膏 治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並
宜用之

漢防已

去皮 半斤

茵芋

伍兩

右為咬咀用酒五升浸藥壹宿取豬肪脂壹斤文
武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處
以熱手不往摩膏上

以藥去之不可用膏土
左... 三... 右... 中... 下... 上...
藥... 山...
宜... 中... 風... 四... 初... 後... 復... 歸... 散...
心... 氣... 通... 於... 舌... 心... 氣... 閉... 塞... 則... 舌...
亦... 強... 矣... 故... 令... 不... 語... 但... 服... 七... 珍... 散... 薛... 經... 云... 大... 腸... 之... 脉...
散... 舌... 下... 又... 云... 脾... 之... 脉... 是... 動... 則... 病... 舌... 本... 強... 不... 能... 言... 又... 云...
腎... 之... 別... 脉... 上... 入... 于... 心... 繫... 舌... 本... 虛... 則... 不... 能... 言... 竊... 謂... 前... 證...
若... 心... 腎... 氣... 虛... 用... 七... 珍... 散... 腎... 虛... 風... 熱... 地... 黃... 飲... 大... 腸... 風... 熱...
加... 味... 道... 遙... 散... 加... 防... 風... 白... 芷... 脾... 經... 風... 熱... 秦... 羌... 升... 麻... 湯... 肝...
經... 風... 熱... 柴... 胡... 清... 肝... 散... 加... 防... 風... 白... 芷... 脾... 氣... 鬱... 結... 加... 味... 歸...
脾... 湯... 加... 升... 麻... 肝... 木... 太... 過... 小... 柴... 胡... 加... 鈞... 藤... 鈞... 脾... 受... 土... 侮...
產... 後... 不... 語... 女... 科... 五... 八... 十...

不語

因人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於
心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌
亦強矣故令不語但服七珍散薛經云大腸之脉
散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云
腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前證
若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱
加味道遙散加防風白芷脾經風熱秦羌升麻湯肝
經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸
脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鈞藤鈞脾受土侮

產後不語 女科五

八十

六君加升麻白芷釣藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣
虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應獨參湯更
不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤
矣一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱瞞
熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯為主佐以七
珍散而愈後因怒不語口噤腰背反張手足發搐或
小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面青肝之
本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加
釣藤鈎茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊
七珍散

人參

石菖蒲

生地黄

川芎

細辛

防風

辰砂

別研各半兩

右為極細末每服壹錢薄荷湯調下無時

胡氏孤鳳散

治產後閉目不語用生白礬末每服

壹錢熱水調下

治產後不語

人參

石蓮肉

不去心

石菖蒲

各等分

右每服伍錢水煎

逐血補心湯

治產後失音不語

紅花

赤芍藥

生地黄

桔梗

蘇葉

前胡

茯苓

防風

牛膽南星

黃連

粉葛 各貳錢

當歸 叁錢

薄荷

人參

升麻 各壹錢 伍分

半夏

貳錢伍分

甘草

壹錢

右剉爲散分作二服每服水壹鍾半薑叁片煎至
柒分空心服滓再煎服

狂言謔語

〔大夫產後語言顛倒或狂言謔語如見鬼神者其源
不一須子細辨證用藥治療產後驚風言語亂道如
見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹方見
三九作一服兼琥珀地黄丸服之方見一則因產後心
虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在乍見鬼
神條求之方見二則產後臟虛心神驚悸志意不安言
語錯亂不自覺知神思不安者當在驚悸條求之方見
三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔
笑言語亂道當作風痙治療當在心驚中風條求之方見

產後 卷五
四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在中
風恍惚條求之 五則產後多因敗血迷亂心經而
顛狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷血暈類中
求之 六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒
發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入
血室治之宜琥珀地黄丸及四物湯只用生乾地黄
加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾
地黄如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證太抵胎前
產後自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐
散生新然後子細詳辨疾證不可妄立名色自生新

意加減方藥大宜對證依古法施治未有不安者也

薛前證當固胃氣為主而佐以見證之藥若一於

攻痰則誤矣 一產婦形體甚倦時發譫語用栝子

散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛

小便下血用加味道遙散以清肝火養肝血頓瘥又

佐以加味歸脾湯而安

雲岐奪命散 血暈

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉

生乾地黄

牡丹皮

等分

右三味濃煎湯調生蒲黃末貳錢匕一服即定

局方妙香散治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神
用生乾地黄當歸二味煎湯調服立効
烏金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語
且見神鬼等證

- 當歸
- 遠志肉
- 川芎
- 酸棗仁
- 白朮
- 赤芍藥
- 香附子
- 辰砂 另研入
- 熟地黄
- 羌活
- 防風 各貳錢
- 茯神 貳錢
- 半夏 叁錢
- 全蠍
- 麥門冬
- 人參
- 牛膝
- 天麻 各壹錢

甘草 玖分 陳皮 白芷 各壹錢 伍分
右剉散作一服水壹鍾半薑叁片葱三枚入金銀
同煎壹碗不拘時溫服

四物補心湯 治產後言語恍惚顛倒錯亂
當歸 伍錢 川芎 生地黃
白芍藥 茯苓 半夏
桔梗 白朮 各肆錢 陳皮 叁錢
甘草 壹錢

右剉為散分作六服每服用水壹鍾薑叁片煎至
柒分空心溫服滓再煎服 有熱加酒炒黃連貳

產後 狂言 譫語 女 詩 五

錢無熱不用

本經云：錢無熱不用。此言錢性平，不寒不熱，故曰無熱不用。

甘草

白芍藥

白朮

當歸

白朮

芍藥

當歸

白朮

芍藥

當歸

此方治產後血暈，心昏，發狂，如見鬼神，宜用此方。此方治產後血暈，心昏，發狂，如見鬼神，宜用此方。

顛狂

大療產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用

局方大聖澤蘭散

宜自合者方有效

服加壹字許煎酸棗仁湯調下一服可安

薛前證

乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各門互

用一產婦患前證或用大澤蘭湯而愈後又怔忡

妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍

散加遠志茯神養其氣血而瘥一產婦亦患此證

用化痰安神等藥病益甚神思消燼余以為心脾血

氣不足用大劑參朮芎歸茯神酸棗仁四斤餘而安

產後顛狂

卷十五

八十五

乃以歸脾湯五十餘劑而愈
 大聖澤蘭散治婦人血海虛冷久無子息及產後
 敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾
 生下便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產
 胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血藏
 有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍
 身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣
 胎藏虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經
 脈不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退
 風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虛損等病

女科五
 八十五

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 澤蘭葉 | 石膏 | 卷栢 |
| <small>研各貳兩</small> | <small>去蘆</small> | <small>去根</small> |
| 白茯苓 | 防風 | 厚朴 |
| <small>去皮</small> | <small>去蘆</small> | <small>去麤皮</small> |
| 細辛 | 栢子仁 | 桔梗 |
| <small>去苗</small> | <small>微炒</small> | |
| 吳茱萸 | 五昧子 | 五味子 |
| <small>湯洗米次焙炒各壹兩</small> | <small>揀淨</small> | |
| 人參 | 藁本 | 乾薑 |
| | <small>去苗</small> | <small>炮</small> |
| 川椒 | 白芷 | 白朮 |
| <small>去目閉口微炒出汗</small> | | |
| 黃芪 | 川烏頭 | 丹參 |
| <small>去苗</small> | <small>炮去皮臍</small> | <small>各柒錢半</small> |
| 蕪荑 | 甘草 | 川芎 |
| <small>微炒赤</small> | <small>炙</small> | |
| 芍藥 | 當歸 | 白薇 |
| | <small>各壹兩柒錢半</small> | |
| 阿膠 | 肉桂 | 生乾地黄 |
| <small>碎炒燥各半兩</small> | <small>壹兩貳錢半</small> | <small>壹兩半</small> |

八十六

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾不拘時日三服

何氏方治產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂大辰砂壹貳錢重研令極細人乳三四茶脚許調仍掘紫項活地龍一條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳却入無灰酒與前乳汁相和七八分盞重湯溫遇疾作分三三服

乍見鬼神

天_レ心_レ主_レ身_レ之_レ血_レ脉_レ因_レ產_レ傷_レ耗_レ血_レ脉_レ心_レ氣_レ虛_レ則_レ敗_レ血_レ停_レ積_レ上_レ于_レ於_レ心_レ心_レ不_レ受_レ觸_レ遂_レ致_レ心_レ中_レ煩_レ躁_レ卧_レ起_レ不_レ安_レ乍_レ見_レ鬼_レ神_レ言_レ語_レ顛_レ錯_レ醫_レ人_レ不_レ識_レ呼_レ為_レ風_レ邪_レ如_レ此_レ治_レ必_レ不_レ得_レ愈_レ但_レ服_レ調_レ經_レ散_レ每_レ服_レ加_レ龍_レ腦_レ壹_レ捻_レ得_レ睡_レ即_レ安_レ薛_レ前_レ證_レ若_レ敗_レ血_レ停_レ滯_レ用_レ調_レ經_レ散_レ若_レ血_レ虛_レ發_レ熱_レ用_レ八_レ珍_レ加_レ炮_レ薑_レ若_レ心_レ血_レ虛_レ損_レ用_レ栝_レ子_レ仁_レ散_レ太_レ抵_レ此_レ證_レ皆_レ心_レ脾_レ血_レ少_レ所_レ致_レ但_レ調_レ補_レ胃_レ氣_レ則_レ痰_レ清_レ而_レ神_レ自_レ安_レ矣_レ若_レ果_レ係_レ鬼_レ祟_レ所_レ附_レ即_レ灸_レ鬼_レ穴_レ可_レ愈_レ其_レ或_レ不_レ起_レ者_レ多_レ因_レ豁_レ痰_レ降_レ火_レ攻_レ伐_レ之_レ過_レ也_レ一_レ產_レ婦_レ患_レ前_レ證_レ或_レ用_レ調_レ經_レ散_レ愈_レ而

產後乍見鬼神

女科五

七

挾熱

復作仍服前藥益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈
雲岐治產後發熱狂言奔走脉虛大者四物湯加柴胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可
廣濟治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

見血暈

挾寒

調經散

- 沒藥
- 琥珀並細研
- 桂心各壹錢
- 芍藥
- 當歸各貳錢半
- 麝香研
- 細辛各半錢

右為末每服半錢生薑汁温酒各少許調服
茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安

- 茯神壹兩去皮木
- 人參
- 龍齒研
- 琥珀研
- 赤芍藥
- 黃芪
- 牛膝各柒錢半
- 生地黄壹兩半
- 桂心半兩

治方產一日言語顛倒用蘇合香丸壹錢以童便調服即甦

產後見鬼神

虛

栢子仁散 治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪

氣攻心

栢子仁

遠志 去心

人參

桑寄生

防風

琥珀 別研

當歸 焙

生地黄 焙

甘草 各等分

右為粗末先用白羊心壹箇切片以水壹大盞半先煮至致分去羊心入藥末伍錢煎至陸分去滓無時服

與前顛狂譫語門參看

驚悸

天產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪邪搏於心則驚不自安若驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能動診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣 薛按人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補氣血為主一產婦患前證二度服琥珀地黄丸局方妙香散隨効再患服之其症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛用十全大補加味歸脾二湯各

產後驚悸

女科五

八十九

百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安
大產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀
如癰疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心
氣虛弱發成風痙薛按仲景先生云有汗為柔痙
用桂枝湯無汗為剛痙用麻黃湯然產後得此血氣
俱乏之敗證也不可與傷寒例看丹溪先生云產後
當大補氣血為主可用十全大補湯以補元氣如不
應急加附子更不應是藥力弗逮也仍用參附湯多
服余常治太虛之證參芪數斤附子數枚方愈一
產婦患此不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形氣

倦怠脉虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯二
十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一錢
服數劑諸證減一二又二十餘劑十退三四乃去附
子五分數劑諸證頓退而安又發仍服前藥加附子
三五分而愈

白茯苓散 治產後心神驚悸言語失常心神昏憤

- 白茯苓 去皮 熟地黄 人參 去蘆 各壹兩 各
- 遠志 去心 白芍藥 黃芪 去蘆 各
- 桂心 當歸 炒去蘆 甘草 炙
- 麥門冬 各壹兩 石菖蒲 桑寄生 各柒錢半

產後驚悸 女斗五

右為咬咀每服捌錢水壹大盞半生薑伍片棗叁
枚竹葉叁朶片煎至壹大盞去滓温服無時
熟乾地黄散 治產後心虛驚悸神思不安

熟乾地黄

貳兩

黃芪

去蘆

白薇

龍齒

另研
各壹兩

人參

去蘆

茯神

去木

羌活

遠志肉

各柒
錢半

桂心

防風

去蘆

甘草

炙各
半兩

右為咬咀每服五錢水壹大盞半生薑五片棗叁
枚煎至壹大盞去滓温服不拘時二方無黃
者有荆芥
產乳七寶散 初產後服之調和血氣補虛安心神

鎮驚悸

朱砂

水飛

桂心

當歸

去蘆

川芎

人參

去蘆

白茯苓

去皮

羚羊角

燒存性
各貳錢

乾薑

壹錢

為細末每服壹錢用羌活豆淋酒調下將護產
婦用之不
飲酒用清米飲調下 如覺心煩熱悶以麥門冬
去心煎湯調下若心下煩悶而痛用童便調下若
覺心胸煩熱即減薑桂覺寒却加之腹痛加當歸
心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不思飲食或惡
心加人參虛煩加茯苓以意斟酌日三夜一服之

產後驚悸

女科五

九十一

海藏大効牡丹散 治血臟虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利太腸不調陰陽相干心驚怯悸或時旋暈

牡丹皮

川芎

枳殼

陳皮

玄胡索

甘草

羌活

半夏

木香

訶子肉

芍藥

三稜

乾薑

桂心

當歸

白朮

右為細末每服貳錢水壹盞半煎五七沸食前温

服益血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣
攻刺及氣虛惡寒潮熱證至妙
遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹
中急痛或時怕怖夜卧不安

遠志

麥門冬

黃芪

當歸

人參

白朮

獨活

白茯苓

桂心

栝子仁

石菖蒲

熟乾地黄

山茱萸

鍾乳粉

阿膠

右為細末煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每

服參拾丸温酒送下不拘時候日進二服

白茯苓丸 治產後心虚驚悸神志不安

白茯苓 去皮各壹兩 熟乾地黄各壹兩 人參去蘆

桂心 遠志去心 石菖蒲

栝子仁 琥珀各半兩 另研細

右為細末煉蜜和搗三百下丸如梧子大每服

參拾丸不拘時粥飲送下

右方俱用桂中無熱而脉遲且微者宜之

人參散 治產後臟腑虚心怔驚悸言語錯亂

人參去蘆 麥門冬去心 各捌錢 牛黃研

白薇各貳錢 茯神去木 獨活

防風各去蘆 遠志去心 生地黄

朱砂水飛 天竺黃另研 甘草炙

龍齒研各肆錢 龍腦另研 麝香細研 各壹錢

右為細末每服貳錢薄荷酒調下不拘時

琥珀地黄散 治血虚多驚及產後敗血諸疾

辰砂 琥珀 沒藥並細研

當歸各等分

右為細末每服貳錢空心白湯調下日三服

茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虚

風邪所致

茯苓一方用

生地黄各參兩

遠志

白薇

龍齒各貳兩

防風

人參

獨活各貳兩以

右以銀壹太斤水壹斗五升者取柴升下諸藥煮

取叁升温分三服忌菘菜豬肉生冷一方治產後

神恍惚志意不定加荆芥

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故也

若中風語謬昏悶不知人者宜服此

人參

茯苓

羌活

大棗

遠志各貳兩

竹瀝壹升

右用水陸升煮取叁升下竹瀝更煎取貳升半分

三服

抱膽丸 治產後血虛驚氣入心及顛瀾風狂或室

女經脉通行驚邪蘊結

水銀貳兩

黑鉛壹兩半

朱砂壹兩另

乳香壹兩另

右將黑鉛入銚子內鎔化下水銀結成砂子次下

朱砂滴乳末乘熟用柳木搥研勻丸如芡實大每

服壹丸空心金銀薄荷湯化下得睡切莫驚動覺

來即安 妙香散亦善

恍惚

大產後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛臟腑
遍循經絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為
風邪所乘則令心神恍惚不定也 薛前證當大補
血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛極之假象也
固其本源諸病自退若專治風則速其危矣 一產
婦患前證盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷
此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸
脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽
動小便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加釣藤山

梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈
千金療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心
虛所致

茯苓 參兩

芍藥 貳兩

甘草

桂心

當歸 各壹兩

生薑 壹兩半

麥門冬 去心壹升

大棗 參拾枚

右為散水參升煎取壹升去滓分作兩服
經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯神

當歸

黃芩

麥門冬 去心

甘草

人參

芍藥

酸棗仁

白鮮皮 各參兩

大棗 柒枚

右為粗末水貳升煮取柒合去滓溫服

琥珀散 治產後中風恍惚語澁心神煩悶四肢不
隨

琥珀 另研

茯神 去木各壹兩

遠志 去心

石菖蒲

黃芪

防風

獨活

人參 各去蘆

麥門冬 去心

芎藭

桑寄生

赤芍藥

羚羊角屑 各半兩

甘草 貳錢半炙

右為_レ嘔吐每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓温服不拘時

遠志散 治產後中風心神恍惚言語錯亂煩悶睡卧不安

遠志 去心

防風 去蘆各壹兩

麥門冬 去心

酸棗仁 炒

桑寄生

獨活 去蘆

桂心

當歸 去蘆炒

茯神 去木

羚羊角屑 各柴錢半 甘草 炙半兩

右為_レ嘔吐每服伍錢煎服法同前

天麻丸 療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻

硃砂 水飛

防風 去蘆

羌活 去蘆各壹兩

僵蠶 炒柴錢半

乾蝎 炒

白附子 炮

五靈脂 炒各半兩

雄雀糞 炒

牛黃 另研各貳錢半

右為_レ細末糯米飯為丸如梧子大每服貳叁拾丸

薄荷酒送下日進二服

辰砂遠志丸 主產後中風消風化痰安神鎮心

石菖蒲

遠志肉 甘草煮

人參

茯神 去木

辰砂 各伍錢

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬 去心

細辛

天麻

半夏湯泡

南星

白附子各壹兩

右為末薑汁煮糊丸如菉豆大別以朱砂為衣每服參拾丸夜卧生薑湯吞下

虚煩

餘血
奔心

薛論見發執條

四物湯加茯神遠志治產後虚煩

十全大補湯尤効

大餘血奔心盖是分解了不便與童子小便并拚心下及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎

生乾地黄

枳殼

芍藥各等分

右酒服方寸匕日二服

集驗療產後血氣煩方

千金同

生地黄汁

清酒

各壹升

右相和煎壹沸分為兩服

廣濟療血氣煩悶方

生藕汁飲貳升効竹瀝亦得

療產後七日内宿血不散時時衝心迷悶

荷葉

壹兩米

延胡索

貳兩

地黄汁

貳合

右水貳升煮一味取捌合下延胡索分三服空心

忌肉食

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

羊血壹盞頓服若不定更服立効

經効療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹

滿

當歸

桂心

川芎

吳茱萸

橘皮

生薑

各壹兩

芍藥

貳兩

右以咀以水參升煮取壹升去滓空心服

治產後餘血奔心

用陳白梅搥碎渴煎湯飲

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索

蒲黃

各半兩

桂心

貳錢半

右為細末烏梅煎湯冷調下貳錢

沒藥丸 治產後心胸煩躁惡血不快

產後 女科 五

沒藥研 續薑 延胡索

乾漆炒 當歸 桂心

牛膝 牡丹皮 乾薑各等分

右為細末醋煮麵糊丸如梧桐子大煎麩湯下拾
丸至拾伍丸

補遺治產後餘血衝心煩悶腹痛用蒲黃多不以隔

紙炒每壹錢東流水煎湯調下又失笑散亦佳

短氣治產後短氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉切細 麥門冬 小麥各壹升

甘州壹兩 生薑貳兩 大棗拾貳枚

右切以水壹斗煮竹葉小麥至捌升去滓納餘藥
煮取叁升去滓温服虚悸加人參貳兩少氣力加
糯米伍合

甘竹茹湯 治產後内虚煩熱短氣方

甘竹茹壹升 人參 茯苓

甘草各壹兩 黄芩叁兩

右吹咀以水陸升煮取貳升去滓分三服日三
人參當歸湯 治產後去血過多血虚則陰虚陰虚
生内熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄 人參去蘆 當歸身去蘆

產後 虛煩 女科 五

產後

肉桂 去粗皮去心各 麥門冬貳錢 白芍藥炒

血熱甚者加生地黃貳錢

水貳鍾粳米壹合竹葉拾片煎至壹鍾食遠服

氣薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草

人參 各壹兩 栝蒌根 貳兩 麥門冬 半升

右以水壹斗參升煮取肆升去滓分伍服日

三夜二熱甚加知母壹兩

雲岐治產後虛煩不得眠芍藥梔鼓湯

芍藥 當歸 梔子各伍錢 香鼓 半合

不得

中風 四肢 煩熱

右如梔子鼓湯修服產後傷寒便同下後變證方此

雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當矣

仲景二物黃芩湯 婦人在草褥自發露得風四肢

苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯

主之小柴胡湯見傷寒少陽病

黃芩 壹兩 苦參 貳兩 乾地黄 肆兩

右三味以水捌升煮取貳升溫服壹升多吐下虫

婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

生竹茹 石膏 各貳分 桂枝

白薇 各壹分 甘草 柒分

產後

右五味末之棗肉和丸彈子大每以飲服壹丸日
三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加栝實壹分

陳尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯温膽湯殊不
知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必

死

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

經驗方治產後煩躁禹餘糧壹枚狀如酸飴者入

地理一半四面築緊用炭壹秤發頂火壹斤煨去

火三分耗二為度用濕沙土罨一宿方取出打去

外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯

乾再研數千遍用甘草煎湯調貳錢匕一服立効

