



## 經穴學孔穴學合編序

經穴之名。由來舊矣。孔穴之名。則肇自日本文部省之經穴審定委員會。遠古之世。人民不知所謂科學。其所謂學說者。理想而已矣。神話而已矣。然其理想神話。未嘗不寓乎哲理。故其治療法。往往與今日所謂科學的治療法。若合符節。然以今日學術大同時代。而猶持其五千年前之學說。嘵嘵號於世曰。吾哲學。吾哲學。人不將笑其愚騷。則將目爲癩癩矣。况吾國醫學。習於纒緯。謬誤甚多。方待改正。顧可墨守陳法。不知所整理耶。日本以臺灣三島地。自明治維新以來。科學進步。一日千里。而醫學之改進。尤足稱雄世界。二十年來。對於藥物療法。既已邁進無已。近因美邦海氏神經過敏帶。暨各種脊椎療法。其治療點頗與我國針灸經穴之部位相吻合。因復有提倡針灸術之舉。本科學之原理。謀澈底之改良。所選孔穴百二十有一個。審慎考查。歷時至五年之久。始克告成。頒布於世。一時醫博專家。翕然從之。以視吾國西醫家略識皮毛。對於吾國醫學。抵瑕蹈隙。惟恐其不速亡者。其度量相去爲何如也。倭義西醫家也。學殖淺薄。

不足以備師資。然十餘年來。提倡物理療法之微志。自問未嘗少懈。人謂作繭自縛。吾則茹蓼自甘。區區之心。或爲同志所許可耶。本書博采旁搜。悉本科學。首述位置。明經穴部位之所在也。次解剖的部位。記主穴與神經血管之關係也。次療法。述刺針之深淺。暨灸炷之多寡也。次主治。說明局部症狀之治法。俾讀者得自由取穴。不爲整個的症候所束縛也。次孔穴學。取穴百二十有一個。則用日本文部省所訂定之同指寸法。未附海氏帶說明。以與經穴學孔穴學相互對照。自得相映成趣之樂。全書十五萬言。比針灸學灸治學講義。紙數且倍其半。而校訂考覈。費時至三閱月之久。雖不敢謂爲經穴學絕後之紀錄。而在我國。謂爲空前之創作。或可無忤也。是爲序。

中華民國二十年十二月四日張世鑣俊義序

# 凡例

一、本書以日本東京鍼灸醫學研究所講義錄爲藍本。旁參諸家學說。斟酌取舍。敘費經營。讀者宜勤加記誦。熟爛胸中。庶免臨症檢覓之煩。

二、經穴圖六幅。用八十磅道林紙精印。讀者宜與經穴學及孔穴學相互對照。不但事半功倍。且部位亦易正確。

三、骨度法係依照同心寸骨度法分寸。與所列經穴圖尺寸悉相吻合。讀者宜依此爲準。

四、所記經穴。係依照解剖學分類。俾初學者易於檢査。但舊針灸醫師。習於十四經經穴。本社已着手編譯皇漢經穴醫典人體經穴寫真圖。暨十四經經穴掛圖。俾便對照。而資參考。

五、經穴記載順序。首位置。定部位之所在也。次解剖的部位。明其部位與血管神經之關係也。次療法。知宜針宜灸。暨刺針之分寸。灸炷之多寡也。次主治。適應之疾

病附焉。條分縷晰。尙稱簡明。讀者熟誦於胸。於經穴治病之原理解。思過半焉。六、經穴爲治病最要之關鍵。故本書搜羅各家學說。參互考訂。不厭其詳。間有出入。

由編者附加案語。旁註出處。俾讀者斟酌施用。無模稜不明之弊。

七、主治或記病名。或記症狀。悉照原書譯述。讀者對於病名。或有症狀不明之處。俟病理學中詳述之。病理學卷帙繁富。非數言所能盡答。學者暫可不必函問。全書出版。自能貫通。

八、孔穴學記穴名百二十有一。係本日本文部省審定之孔穴編訂。取寸法以術者之指（小兒以被術者之指）爲標準。簡明確當。尤便實用。

九、海氏帶於診斷上有重大之價值。編者譯其大要。附於卷末。並附插圖四個。俾便參照。

十、校對之難。如掃落葉。本書遺訛之字。雖經校勘訂正。附載卷末。誠恐仍有遺漏之處。幸祈讀者賜以校正。惠函指示。俾再版時得以改正。

413.91  
922  
: 4



3 0466 6021 7

# 高等針灸學講義目次

## 經穴學及孔穴學

### 甲 經穴學

第一章 骨度法.....三

第一節 頭蓋部.....九

○沿眉間中央。自前頭髮際。走頭部正中線。至後頭髮際。凡十六.....一〇

(一) 神庭 (二) 上星 (三) 顛會

(四) 前頂 (五) 百會 (六) 後頂

(七) 強間 (八) 腦戶 (九) 風府

(十) 瘡門

○沿眼之內眥。自前頭髮際。離頭部正中綫外側一寸五分。並行於正中綫至

項部線。凡七穴……………一五

(一一)曲差 (一二)五處 (一三)承光

(一四)通天 (一五)絡却 (一六)玉枕

(一七)天柱

◎沿眼之瞳孔。自前頭髮際。離頭部正中線外側三寸。至項部線。凡六穴……………一九

(一八)臨泣 (一九)目窗 (二〇)正營

(二一)承靈 (二二)腦空 (二三)風池

◎額部凡二穴……………二三

(二四)攢竹 (二五)陽白

◎顯顯部凡六穴……………二四

(二六)絲竹空 (二七)本神 (二八)頭維

(二九)額厭 (三〇)懸顛 (三一)懸釐

④自耳之上部向後方凡六穴……………二七

(三二)率谷 (三三)天衝 (三四)浮白

(三五)竅陰 (三六)完骨 (三七)天牖

⑤耳之周圍凡十穴……………三〇

(三八)聽會 (三九)聽宮 (四〇)耳門

(四一)和髎 (四二)曲髎 (四三)角孫

(四四)顛息 (四五)瘰脈 (四六)翳風

(四七)天容

第二節 顏面部

①沿顏面之正中。自鼻尖至下方線。凡五穴……………三五

(四八)素髎 (四九)水溝 (五〇)兌端

(五一)顴交 (五二)承漿

㊸沿眼之內眥方向。至下方線。凡三穴……………三八

(五三)睛 明 (五四)迎 香 (五五)禾 膠

㊹沿眼之瞳孔方向。至下方線。凡四穴……………三九

(五六)承 泣 (五七)四 白 (五八)巨 膠

(五九)地 倉

㊺沿目外眥之方向。至下方線。凡二穴……………四二

(六〇)瞳子 髎 (六一)顴 髎

㊻自耳前。當下頰隅。凡四穴……………四三

(六二)上 關 (六三)下 關 (六四)大 迎

(六五)頰 車

第三節 頸 部

㊼當前頸部之正中。凡二穴……………四六

(六六)廉 泉 (六七)天 突

○前頸部胸鎖乳嘴筋之前後。凡七穴……………四七

(六八)人 迎 (六九)水 突 (七〇)氣 合

(七一)扶 突 (七二)天 鼎 (七三)天 窗

(七四)缺 盆

第四節 胸部

○沿胸部正中線。當胸部。凡六穴……………五一

(七五)璇 璣 (七六)華 蓋 (七七)紫 宮

(七八)玉 堂 (七九)臈 中 (八〇)中 庭

○離胸部正中綫之外側二寸。當副骨綫。凡六穴……………五三

(八一)俞 府 (八二)或 中 (八三)神 藏

(八四)靈 墟 (八五)神 封 (八六)步 廊

③ 離胸部前胸骨線之外側二寸。當乳縷部。凡六穴……………五七

(八七)氣戶 (八八)庫房 (八九)屋翳

(九〇)膺窗 (九一)乳中 (九二)乳根

④ 離胸部乳縷之外側二寸。前腋窩線部。凡六穴……………六〇

(九三)雲門 (九四)中府 (九五)周營

(九六)胸鄉 (九七)天谿 (九八)食竇

⑤ 胸部之外側。凡二穴……………六三

(九九)天池 (一〇〇)輓筋

第五節 腹部

① 沿腹部正中線。自胸骨劍狀突起至恥骨線際。凡十五穴……………六四

(一〇一)鳩尾 (一〇二)巨闕 (一〇三)上臑

(一〇四)中臑 (一〇五)建里 (一〇六)下臑

(一〇七)水分 (一〇八)神闕 (一〇九)陰交

(一一〇)氣海 (一一一)石門 (一二二)關元

(一二三)中極 (一二四)曲骨 (一二五)會陰

◎離腹部正中線之外側五分。在第一側綫。凡十一穴……………七三

(一一六)幽門 (一一七)通谷 (一一八)陰都

(一一九)石關 (一二〇)商曲 (一二一)盲俞

(一二二)中注 (一二三)四滿 (一二四)氣穴

(一二五)大赫 (一二六)橫骨

◎離腹部第一側綫之外側。當第二側綫。凡十三穴……………七八

(一二七)不容 (一二八)承滿 (一二九)梁門

(一三〇)關門 (一三一)大乙 (一三二)滑肉門

(一三三)天樞 (一三四)外陵 (一三五)大巨

(一三六)水道 (一三七)歸來 (一三八)氣衝

(一三九)急脈

④離腹部第二側線之外側一寸五分。在第三側線。凡七穴……………八五

(一四〇)期門 (一四一)日月 (一四二)腹哀

(一四三)大橫 (一四四)腹結 (一四五)府舍

(一四六)衝門

第六節 側胸部

①側胸部腋窩綫。凡二穴……………八九

(一四七)淵腋 (一四八)大包

第七節 側腹部

①側腹部凡六穴……………九〇

(一四九)章門 (一五〇)京門 (一五一)帶脈

第八節 背部

(一五二)五 樞

(一五三)維 道

(一五四)居 髻

○沿背部正中線。自第一胸椎棘狀突起。至第十二胸椎棘狀突起之線。凡九

穴

九三

(一五五)大 椎

(一五六)陶 道

(一五七)身 柱

(一五八)神 道

(一五九)靈 臺

(一六〇)至 陽

(一六一)筋 縮

(一六二)中 樞

(一六三)脊 中

○離背部正中線之外側一寸五分。在第一側線。凡十六穴……………九七

(一六四)大 杼

(一六五)風 門

(一六六)肺 俞

(一六七)厥陰俞

(一六八)心 俞

(一六九)膈 俞

(一七〇)肝 俞

(一七一)膽 俞

(一七二)脾 俞

(一七三)胃 俞

⑤ 離背部第一側線之外側一寸五分。在第二側線。凡十穴……………一〇四

(一七四)附分 (一七五)魄戶 (一七六)膏肓

(一七七)神堂 (一七八)臆臆 (一七九)隔關

(一八〇)魂門 (一八一)陽綱 (一八二)意舍

(一八三)胃倉

第九節 腰部

① 沿腰部正中線。自第一腰椎棘上突起。至尾閭骨尖端之線。凡五穴……………一〇九

(一八四)懸樞 (一八五)命門 (一八六)陽關

(一八七)腰俞 (一八八)長強

② 離腰部正中線之外側。在第一側線。凡七穴……………一一一

(一八九)三焦俞 (一九〇)腎俞 (一九一)大腸俞

(一九二)小腸俞 (一九三)膀胱俞 (一九四)中膂內俞

(一九五)白環俞

⑤離腰部第一側線之外側一寸五分。在第二側線。凡四穴……………一一六

(一九六)盲門 (一九七)志室 (一九八)胞盲

(一九九)秩邊

⑥後薦骨孔及尾閭骨之外側。凡五穴……………一一八

(二〇〇)上髎 (二〇一)次髎 (二〇二)中髎

(二〇三)下髎 (二〇四)會陽

⑦肩胛部凡十三穴……………一二二

(二〇五)肩中俞 (二〇六)肩外俞 (二〇七)肩井

(二〇八)天髎 (二〇九)秉風 (二一〇)曲垣

(二一一)巨骨 (二一二)天宗 (二一三)臑俞

(二一四)肩髃 (二一五)肩髃 (二一六)臑會

(二二七)肩 貞

第十節 上肢

◎自上膊之前外側。經肘窩至拇指橈側爪端之線。凡九穴……………一二八

(二二八)天 府 (二一九)俠 白 (二二〇)尺 澤

(二二一)孔 最 (二二二)列 缺 (二二三)經 渠

(二二四)太 淵 (二二五)魚 際 (二二六)少 商

◎上膊前面之正中。肘窩之內側。經中指橈側爪端之線。凡八穴……………一三三

(二二七)天 泉 (二二八)曲 澤 (二二九)郄 門

(二三〇)間 使 (三三一)內 關 (三三二)大 陵

(三三三)勞 宮 (三三四)中 衝

◎自上膊之前內側。腋窩之前壁。經上膊內上髁之前側。至小指橈側爪端

之線。凡九穴……………一三七

(二三五)極泉 (二三六)青靈 (二三七)少海

(二三八)靈道 (二三九)通里 (二四〇)陰郛

(二四二)神門 (二四二)少府 (二四三)少衝

④自膊之外側三角筋停止部。經上膊骨外上髁之前側。至示指之橈側爪

端之綫。凡十四穴……………一四二

(二四四)臂臑 (二四五)五里 (二四六)肘髎

(二四七)曲池 (二四八)三里 (二四九)上廉

(二五〇)下廉 (二五一)溫溜 (二五二)偏歷

(二五三)陽谿 (二五四)合谷 (二五五)三間

(二五六)二間 (二五七)商陽

⑤自膊後側之中部。經尺骨鶯嘴突起。至無名指之尺側指端之綫。凡十

二穴……………一五〇

(二五八)消滌 (二五九)清冷淵 (二六〇)天井

(二六一)四瀆 (二六二)三陽絡 (二六三)支溝

(二六四)會宗 (二六五)外關 (二六六)陽池

(二六七)中渚 (二六八)液門 (二六九)關衝

⊕於上膊後側之下部。自上膊骨內上髁。與尺骨鶯嘴突起之間。至小指尺

側爪端之線。凡八穴……………一五七

(二七〇)小海 (二七一)支正 (二七二)養老

(二七三)陽谷 (二七四)腕骨 (二七五)後谿

(二七六)前谷 (二七七)小澤

第十一節 下肢

⊙自鼠蹊窩之中部。經大腓骨內上髁。勿過內踝之前側。至跗趾外側(小

趾側)爪端之線。凡十一穴……………一六一

(二七八)陰 廉 (二七九)五 里 (二八〇)陰 包

(二八一)曲 泉 (二八二)膝 關 (二八三)中 都

(二八四)蠡 溝 (二八五)中 封 (二八六)太 衡

(二八七)行 間 (二八八)大 敦

⊙自大腿前內側之中部。經膝蓋骨之內側。勿過內髌之中部。至跣趾之內

側爪端之綫。凡十一穴……………一六七

(二八九)箕 門 (二九〇)血 海 (二九一)陰 陵 泉

(二九二)地 機 (二九三)漏 谷 (二九四)三 陰 交

(二九五)商 丘 (二九六)公 孫 (二九七)大 白

(二九八)大 都 (二九九)隱 白

⊙於膝關節之內側。自大腿骨內上髌之後側。勿過內髌之後側。至足之內

緣。更至足趾之中部綫。凡十穴……………一七四

(三〇〇)陰谷 (三〇一)築賓 (三〇二)復溜

(三〇三)交信 (三〇四)水泉 (三〇五)照海

(三〇六)太鐘 (三〇七)大谿 (三〇八)然谷

(三〇九)湧泉

④自大轉子之前側。經腓骨小頭。勿過外踝之中部。至第四腓側爪端之綾

。凡十四穴.....一八〇

(三一〇)環跳 (三一一)中瀆 (三一二)陽關

(三一三)陽陵泉 (三一四)陽交 (三一五)外丘

(三一六)光明 (三一七)陽輔 (三一八)懸鐘

(三一九)丘墟 (三二〇)臨泣 (三二一)地五會

(三二二)俠谿 (三二三)竅陰

⑤自大腿前側之上部。經膝蓋骨之外側。勿過外踝之前側。至第二趾外爪

側端之線。凡十五穴……………一八八

(三二四) 髀關 (三二五) 伏兔 (三二六) 陰市

(三二七) 梁丘 (三二八) 犢鼻 (三二九) 三里

(三三〇) 巨虛上廉 (三三一) 條口 (三三二) 巨虛下廉

(三三三) 豐隆 (三三四) 解谿 (三三五) 衝陽

(三三六) 陷谷 (三三七) 內庭 (三三八) 厲兌

⊙自大轉子與坐骨結節之間。經膝膕窩之中部。勿過外踝之後側。至小趾

之外側爪端之線。凡十八穴……………一九六

(三三九) 承扶 (三四〇) 殷門 (三四一) 浮郤

(三四二) 委陽 (三四三) 委中 (三四四) 合陽

(三四五) 承筋 (三四六) 承山 (三四七) 飛陽

(三四八) 附陽 (三四九) 崑崙 (三五〇) 僕參

(三五二) 申脈	(三五二) 金門	(三五三) 京骨
(三五四) 束骨	(三五五) 通谷	(三五六) 至陰

## 乙 孔穴學

第一章 穴名及部位	二
第一節 頭部 顏面部 頸部	二
(一) 頭部正中線凡六穴	三
(二) 頭部第一側線凡四穴	三
(三) 頭部第二側線凡五穴	四
(四) 額部凡二穴	五
(五) 顙顙部凡三穴	五
(六) 顛頂部凡二穴	六

(七) 耳前部凡二穴·····	六
(八) 耳下部凡一穴·····	六
(九) 顏面部凡九穴·····	七
(十) 頸部凡二穴·····	八
第二節 胸部 腹部·····	八
(一) 胸部副胸骨凡六穴·····	八
(二) 胸部乳線凡五穴·····	九
(三) 胸部前腋窩線凡一穴·····	一〇
(四) 腹部正中線凡七穴·····	一〇
(五) 腹部第一側線凡八穴·····	一一
(六) 腹部第二側線凡八穴·····	一二
第三節 側腹部·····	一三

(一)側腹部凡六穴.....	一三
第四節 背部.....	一四
(一)背部正中線凡四穴.....	一四
(二)背部側綫凡十三穴.....	一五
第五節 肩胛部 上肢部.....	一六
(一)肩胛部凡二穴.....	一七
(二)上肢部凡十三穴.....	一七
第六節 下肢部.....	一八
(一)下肢部凡十一穴.....	一九

## 海氏帶與針灸術

海氏帶模型圖.....	一
-------------	---

海氏帶之檢出法.....	三
海氏帶之應用.....	四
海氏帶與經穴之位置關係.....	四
海氏帶第一圖.....	六
海氏帶第二圖.....	七
海氏帶第三圖.....	八
海氏帶第四圖.....	八

# 針治寶笈

四明張俊義譯

本書亦爲日本延命山氏家傳秘本。原本以實驗古法。用最新的方法編製。全書分十大編。曰消化器病。曰呼吸器病。曰泌尿生殖器病。曰腦及脊髓病。曰神經痛、神經麻痺及痙攣。曰血行器病。曰耳鼻疾患。曰眼疾患。曰小兒病。曰腫物雜病。子目二百十四條。每一子目。更以甲乙等干支分列細目。如慢性胃炎。分噯氣。吞酸。胃及手足厥冷。吃逆。食欲欠缺。頭痛。胃部膨滿。嘔吐。煩悶。忽寒忽熱等。每一症狀。芟其理論。詳其治法。不支不蔓。無泛濫無歸之弊。誠灸治家不可不備之書也。書已着手譯述。出版再行通告。

# 高等針灸學講義

日本東京鍼灸醫學研究所所長瀨

中國東方鍼灸術研究社社長張俊義譯述

中國東方鍼灸術研究社理事長魏其光校勘



## 經穴學及孔穴學

### 甲 經穴學

經穴學。在鍼灸醫術。爲最重要且不可或缺之必修學科也。依古人之所述。人體有手足三陰三陽之十二經。通氣血之道。所謂十二經者。即手太陰肺經。手少陰心經。手厥陰心包經。手陽明大腸經。手太陰小腸經。手小陽三焦經。足太陰脾經。足小陰腎經。足陽明胃經。足太陽膀胱經。足小陽膽經是也。其位皆在左右。又別之爲奇經八脈。曰督脈。曰任脈。曰陽蹻脈。曰陰蹻脈。曰陽維脈。曰陰維脈。曰衝脈。曰帶脈。

• 其中督脈走體後之正中。任脈走體前之正中。以此二脈。合前述之十二經。是謂十四經。即宜於施行鍼灸之徑路也。故曰經穴。

穴之數。據十四經發揮所載。(按十四經發揮。爲我國元代滑伯仁著。)其總數爲六百五十七穴。正中五十一穴。左右各三百有三穴。合之爲六百六穴。以十四經分配之如次。手太陰左右各十一穴。手少陰左右各九穴。手厥陰左右各九穴。手陽明左右各二十穴。手太陽左右各十九穴。手少陽左右各二十三穴。足太陰左右各二十一穴。足少陰左右各二十七穴。足厥陰左右各十三穴。足陽明左右各四十五穴。足太陽左右各六十三穴。足少陽左右各四十三穴。督脈正中二十七穴。任脈正中二十四穴。

尚有阿是穴。一名天應穴。本編從略。

以上所述。譯自日本奧村三策氏之按摩針灸學。俾讀者得明經穴學十四經之名稱及其部位。茲爲便於初學者之研究。仍準據豬又啟巖氏之經穴學及孔穴學譯述。該氏原本。係依據解剖學的骨學分類。自頭部順次記述。據該氏原本言。身體片側。其數合計有三百

五十六穴。其中五十二穴。在身體之正中。（按奧氏本身體正中爲五十一穴。）三百四穴。各在其左右。（按奧氏本。身體左右。各爲三百三穴。）合計之。其總數爲六百六十穴云。是與奧氏本又少有出入矣。因就奧氏本之說有疑義者而並存之。旁參吾國之甲乙經。俾便讀者之參證。

### 第一章 骨度法

凡定穴而用尺度。隨身體之大小肥瘦而異。故不能用真之尺度。古人所定之骨度法。或從某處與某處之間。假定幾寸。用造尺度。以爲測度。此即折量分寸之法。名曰同心寸。又有合患者之拇指與中指之端。造成環狀。（男左、女右、）於中指第二節之繞側至橫皺之間。定爲一寸之法。名曰同指寸。此法因身體之肥瘦。指之長短。難得正穴。故不甚用。今舉同心寸骨度法之分寸如左。

術者勿論對於各人之肥瘦長短。小兒婦人。汲養育不全者。不可不斟酌其尺度。

一 人之身長七尺五寸。

二 頭之大骨周圍二尺六寸。

(案：頭之大骨。頭蓋骨也。)

三 自前髮際至後髮際。一尺二寸。

(案：前髮際在眉上三寸之處。後髮際在第七頸椎上三寸之處。)

四 自前髮際至頤一尺。

五 自額角至天柱骨一尺。

(案：額角。在額之兩側。天柱骨。在鎖骨之外端。與肩峯突起相連之處。)

六 兩頰骨之間相去七寸。

註：甲乙經九寸半

(案：此言頰骨結節)

七 耳之前。當耳門。廣一尺三寸。

(案：耳門在耳角(耳翼之前隆起)之上。其廣自右耳門至左耳門間。)

八 耳之後。當完骨。廣九寸。

（案：完骨。乳嘴突起也。廣與前同。自右至左間。）

九 自後髮際至背骨二寸。

註：與氏本二寸五分。甲乙經三寸五分。

（案：背骨爲第七頸椎棘狀突起。）

十 自結喉至缺盆之中四寸。

（案：結喉爲喉頭之隆起。（即甲狀軟骨。）缺盆。鎖骨也。故爲缺盆之中。與兩鎖骨之間。不可誤缺盆之穴。）

十一 胸之周圍。四尺五寸。

（案：宜以乳頭之高處測之。）

十二 兩乳之間。九寸五分。

十三 自缺盆至臑肝九寸。

(案：缺盆爲胸骨上窩。謁軒爲胸骨劍狀突起。)

十四 腋中不見之處四寸。

(案：此言自肩峯鎖骨關節至腋窩之長度。)

十五 自腋至季脇。一尺二寸。

(案：腋爲腋窩。季脇爲第十一肋骨之前端。)

十六 自季脇至脾樞六寸。

(案：脾樞。大轉子也。)

十七 腰之周圍。四尺二寸。

(案：以臍之高處測之。)

十八 自謁軒至天樞八寸。

(案：天樞言臍。不可誤天樞之穴。)

十九 自天樞至橫骨。六寸五分。

(案：橫骨爲恥骨軟骨接合之處。)

二十 自脊骨至尾骶。二十一節。長三尺。

(案：脊骨爲第一胸椎棘狀突起。尾骶爲尾間骨。)

二二 自肩至肘。一尺七寸。

(案：肩爲肩峯突起。肘爲鷹嘴突起。)

二三 自肘至腕中橫紋。一尺二寸。

註：輿氏本甲乙經。皆一尺二寸五分。

(案：腕中橫紋。在腕關橫紋處。)

二四 自腕中橫紋至中指本節四寸。

二五 自中指本節至其端四寸五分。

二六 自橫骨上廉至內輔上廉。一尺八寸。

(案：橫骨者。恥骨軟骨接合處也。上廉者。上緣也。內輔者。爲膝內側之骨。而

大腿骨之內關節隙與脛骨之內關節隙相合處也。）

二六 自內輔之上廉至下廉。三寸五分。

（案：上廉者。上緣也。下廉者。下緣也。）

二七 自髀樞至膝。一尺九寸。

（案：髀樞者。大轉子也。）

二八 自內輔之下廉至內髁。一尺三寸。

二九 自外輔之下廉至外髁。一尺四寸。

三十 自膝膕至跗屬。一尺六寸。

（案：跗屬。當跟骨之外側。）

三一 自內髁至地三寸。

（案：地者。地面也。即足着地之處。）

三二 自外髁至京骨三寸。

(案：京骨爲第五蹠骨後端外側突出之處。所謂第五蹠骨結節者是。)

三三 自京骨至地一寸。

註：與氏本自京骨至地三寸。甲乙經京骨以下至地長一寸。

三四 自跗屬至地三寸。

三五 足之長一尺二寸。

(案：足長。爲自踵至趾處。)

三六 足之廣四寸五分。

(案：以足趾之最廣處計之。)

## 第二章 穴名及部位

註：穴名之上。記有○之符號者。爲禁鍼穴。▲之符號者爲禁灸尺。□之符號者爲禁鍼灸穴。以下準之。

### 第一節 頭蓋部 (參照第一圖)

(一)沿眉間中央。自前頭之髮際。走頭部正中線。至後頭髮際。凡十六。

【二】○神庭 (禁鍼)

位置 鼻上。入前髮際五分。

解剖的部位 在前頭骨部。有前頭筋。循鼻前頭動脈。分布前頭神經。

療法 灸五壯。

主治 前額神經痛。眩暈。急性鼻加答兒。淚腺加答兒。嘔吐。

【三】上星

位置 鼻上中央。入前髮際一寸。

解剖的部位 在前頭骨部。有前頭筋。循鼻前頭動脈。分布前頭神經。

療法 鍼二分。灸五壯。

主治 顏面充血。前額神經痛。鼻茸。鼻孔閉塞。衄血。角膜白翳。眼球充血。間歇

熱。

【三】○顛會（禁針）

位置 在上星之後一寸。陷中。（按：與氏本言。當大顛門以下二穴前頭部。）

解剖的部位 在前頭骨上緣。顛頂骨縫合部。帽狀腱膜中。循淺顛顛動脈。分布前頭神經。

療法 針一分。灸三壯。

（注意） 小兒滿七歲以下。顛門尚未縫合。鍼灸皆爲禁穴。

主治 腦脊血性頭痛。眩暈。顏面蒼血。衄血。顏面充血。多眠症。

按：是穴參查日本諸書。或言禁針。或言針灸良。但於療法。則皆言針一分。灸三壯。而甲乙經獨言刺入四分。灸五壯。應以日書爲準。此係險穴。初學以不針爲宜。

【四】前頂

位置 顛會之後一寸五分。

解剖的部位 在頭蓋之正中綫。左右顴頂骨之縫合部。帽狀腱膜中。循顳類動脈之前枝。及顏面靜脈之分枝。分布前額神經。

療法 針二分。灸三壯乃至七壯。

主治 腦充血。腦貧血。顏面充血。水腫病。小兒搐搦。鼻茸等。

【五】百會

位置 前頂之後一寸五分。在頂之中央旋毛之中。

解剖的部位 在顳頂部帽狀腱膜中。循淺顳類動脈。及後頭動脈之各終枝分布大後頭神經。

療法 針三分。灸七壯。

主治 頭痛。眩暈。中風。腦神經衰弱。腦貧血。癩癧。鼻茸。脫肛。痔疾。

【六】後頂

位置 百會之後一寸五分。

解剖的部位 在顛頂骨矢狀縫合之後端部。有帽狀腱膜。循後頭動脈。分布大後頭神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 腦充血。眩暈。神經性偏頭痛。項頂部痙攣。癩癧。

【七】 強 間

位 置 後頂之後一寸五分。

解剖的部位 在矢狀縫合之後端。後頭骨與顛頂骨之間。即三角縫合部。帽狀腱膜中。

循後頭動脈。分布大後頭神經。

療法 針二分。灸五壯。

主治 頭痛。眩暈。嘔吐。涎沫。歇斯的中。

【八】 ○ 腦 戶 (禁針)

位 置 強間之後一寸五分。枕骨之上。

(案：枕骨。一名外後頭結節。)

解剖的部位 在帽狀腱膜中。循後頭動脈。分布大後頭神經。

說明禁針禁灸。療法主治從略。

按：是穴日本諸書。列於禁針。而未嘗言及禁灸。但皆無療法主治。玉森氏經穴醫典獨言。此爲禁針禁灸穴。療法主治從略。是當爲禁針禁灸無疑。考諸甲乙經。言此別腦之會。不可灸。令人瘖。素問刺禁論云。刺頭中腦戶。入腦立死。獨王冰註云。灸五壯。又骨空論云。不可妄灸。銅人經云。禁不可灸。灸之令人瘖。其實腦爲貴重之器。入腦立死之說。確可深信。灸則立暈。所謂瘖者瘖者。殆亦經驗有得而言。宜列禁鍼禁灸穴。庶讀者不至冒險嘗試。

【九】▲風府 (禁灸)

位置 項之上。入髮際一寸。在大筋之中。

註：入項之髮際一寸。故在後頸部。

解剖的部位 在後頭骨後部。與第二頸椎之間陷凹部。僧帽筋間。循後頭動脈。分布大後頭神經。其深部有延髓。

療法 鍼三分。

主治 頭痛。頭項神經痛。衄血。咽喉加答兒。精神病。中風。黃疸。

【十】 ▲瘧門 (禁灸)

位置 項之上。入後髮際。仰頭取之。

解剖的部位 在第一頸椎與第二頸椎之間。僧帽筋起始部。循後頭動脈之分歧。分布頸

椎神經之後枝。其深部有延髓。

療法 針三分 禁深刺。

主治 舌骨筋麻痺。舌下軟瘤(即重舌)。咽喉炎。腦充血。腦膜炎。衄血。脊髓炎。

(一)沿眼之內眥。自前頭髮際。離頭部正中綫外側一寸五分。並行於正中綫至頂部綫。凡七穴。

【一一】 曲 差

位 置 神庭之旁。一寸五分入髮際。

解剖的部位 在前頭骨部前頭筋。循鼻前頭動脈。分布前頭神經。

療 法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主 治 頭痛。顏面神經痛及麻痺。顱頂部之撞衝。心臟肥大。視力缺乏。鼻孔閉塞。

衄血。鼻茸。鼻瘡。

【一二】 五 處

位 置 曲差之旁一寸。上星之旁一寸五分。

解剖的部位 在前頭骨部。前頭筋中。循鼻前頭動脈分布前頭神經。

療 法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主 治 癩痢。頭痛。發熱。眩暈。視力缺乏。背脊神經痛。

【一三】 ▲ 承 光 (禁灸)

位置 五處之後一寸五分。

解剖的部位 在前頭骨與顛頂骨之縫合部。有帽狀腱膜。循淺顛顛動脈。分布顏面神經之顛顛枝。

療法 針三分。

主治 頭痛。眩暈。鼻茸。鼻孔閉塞。角膜白翳。

#### 【一四】 通天

位置 承光之後一寸五分。

解剖的部位 在顛頂骨部。當顛頂結節之後內方。循顛顛動脈後枝。分布顏面神經之顛顛枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 鼻加答兒。鼻腔閉塞。衄血。鼻瘡。口部諸筋收縮。顛頂部痙攣。慢性氣管支炎。三叉神經痛。

【一五】○絡却 (禁針)

位置 通天之後一寸五分。

解剖的部位 在顛頂骨與後頭骨聯接處。即後頭筋停止部也。循後頭動脈分布大後頭神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

按：是穴日本諸書。列入禁針。而療法仍言針三分。甲丁經未列禁針。亦言刺入三分。

主治 後頭筋及僧帽筋痙攣。綠内障。耳鳴。精神病。

【一六】○玉枕 (禁針)

位置 絡却之後一寸五分。

解剖的部位 在後頭骨部。有後頭筋。循後頭動脈。分布大頭後神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

案：是穴日本諸書。列入禁針。而療法仍言針三分。甲乙經不列禁針。亦言刺入三分。

主治 眼珠神經痛。顏面神經痛。眩暈。頭痛。近視眼。嗅能減退。多汗症。

【一七】 ▲ 天柱 (禁灸)

位置 頸大筋外廉。項旁。

解剖的部位 在後頭骨之上。項線之下。當僧帽筋停止部之外側。循後頭動脈。分布大

後頭神經。

療法 針三分乃至五分。

主治 頭痛。頸後部痙攣。咽喉加答兒。鼻塞閉塞。嗅能減退。衄血。

(三) 沿眼之瞳孔。自前頭髮際。離頭部正中線外側三寸。至項部綫。凡六穴。

【一八】 ▲ 臨泣 (禁灸)

位置 目瞳之上。入髮際五分。

解齒的部位 在前頭骨部。前頭筋中。循上眼窩動脈。分布上眼窩神經。及顏面神經之  
額顳枝。

療法 針三分。灸五壯乃至十壯。

案：原本列入禁灸。而其他各書暨甲乙經。皆未列禁灸。

主治 角膜白翳。淚液過多。外眥充血。癩痢。蓄膿症。腦溢血。中風。

### 【一九】 目窗

位置 臨泣之後一寸。

解剖的部位 在顳頂部帽狀腱膜中。循淺額顳動脈之分枝。分布上眼窩神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 眼球充血。眩暈。視力缺乏。顏面浮腫。頭痛。蓄膿症。惡寒發熱。

### 【二十】 正營

位置 目窗之後一寸。

解剖的部位 在顛頂骨部。帽狀腱膜中。循後頭動脈之分枝。分布上眼窩神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 眩暈。頭痛。齒痛。

【三】○承靈（禁針）

位置 正營之後一寸五分。

解剖的部位 在顛頂骨結節之後方。有帽狀腱膜。循淺顛顛動脈之分枝。分布大後頭神經。

療法 針三分。灸五壯。

案：是穴日本諸書。列入禁針。而療法仍言針三分。甲乙經未列禁針。亦言刺入三分。

主治 衄血。喘息。頭痛。發熱惡寒。

【三】腦空

位置 承靈之後一寸五分。

解剖的部位 在後頭結節之外側。後頭筋部。循後頭動脈。分布大後頭神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺結核。僧帽筋痙攣。頸項部痙攣。心悸亢進。

### 【三三】 風池

位置 腦空直下。後頭骨之下。髮際。陷中。

解剖的部位 在後頭骨下緣。當耳後乳嘴突起尖端。與項部正中之中間。僧帽筋與胸鎖

乳嘴筋之間之夾板筋中。循後頭動靜脈。分布小後頭神經。及頸椎神經之後枝

療法 針六分。灸七壯乃至十壯。

主治 間歇熱。頭痛。眩暈。衄血。欠伸。淚液過多。眼球充血。視力缺乏或頸項部

諸筋痙攣。咽喉加答兒。半身不隨。(中風)腦神經衰弱。迷走神經痛。副神經

麻痺。

(四)額部凡二穴

【二四】攢竹

位置 眉頭之陷中。

解剖的部位 在前頭骨之下際。眉弓之內端部。有皺眉筋。循鼻前頭動脈。分布前頭神經。上眼窩神經。

療法 針二分。灸五壯。

主治 角膜白翳。夜盲。視力缺乏。淚液過多。眩暈。前額神經痛。

【二五】陽白

位置 眉上一寸。直瞳子。

解剖的部位 在前頭骨部。前頭筋中。循上眼窩動脈。分布上眼窩神經。

療法 針二分。灸三壯。

主治 眼球疼痛。夜盲。三叉神經痛。顏面麻痺及癱瘓。

(五) 顳顬部凡六穴

【二六】 ▲ 絲竹空 (禁灸)

位置 眉後之陷中。

解剖的部位 在前頭骨眉弓突起部。前頭筋起始部。循淺顳顬動脈。分布顏面神經之顳顬枝。

療法 針三分。

主治 眼球充血。角膜白翳。頭痛。眩暈。倒毛內刺。顏面神經麻痺。小兒搐搦。

【二七】 本神

位置 目外眥之上髮際。

解剖的部位 在前頭部。有前頭筋。循顳顬動脈之前枝。及上眼窩動脈。分布三叉神經之分支。

療法 針三分。灸七壯。

主治 癩癩。腦充血。眩暈。頸項部痙攣。

【二八】 ▲ 頭維 (禁灸)

位置 本神之旁一寸五分。額角之髮際。

解剖的部位 在前頭骨與顛頂骨縫合部。有前頭筋。循顛顛動脈之前枝。分布顏面神經之顛顛枝。

療法 鍼三分。

主治 腦充血。前額神經痛。膿漏性結膜炎。(風眼)視力缺乏。淚液過多。顏面神經麻痺。

【二九】 頤 厭

位置 額角之下。顛顛上廉。

解剖的部位 在前頭骨與顛頂骨縫合部。顛顛筋中。循淺顛顛動脈。分布顏面神經之顛

顳枝。

療法 針二分。灸三壯。

主治 頭痛。眩暈。耳鳴。上肢關節炎。小兒搖擻。

【三十】 懸顳

位置 額角之下。額顳之中。

解剖的部位 在前頭骨顳頂骨之縫合部。額顳筋中。循淺顳顳動脈。分布顏面神經之分支。

療法 針二分。灸三壯。

主治 腦神經痛。顏面充血。偏頭痛。外眥攣痛。齒痛。

【三一】 懸厘

位置 額角之下。額顳之下廉。

解剖的部位 在前頭骨與顳頂骨縫合下部。額顳筋中。循淺顳顳動脈。分布顏面神經之

顳顬枝。

療法 針二分。灸三壯。

主治 腦神經痛。顏面充血。偏頭痛。齒痛。

(六)自耳之上部向後方凡六穴

【三三】 率 谷

位置 耳上。入髮際一寸五分。

解剖的部位 在顳頂骨下端。顳顬筋中。循耳後動脈。分布顏面神經顳顬之枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 顳頂部疼痛。後頭部及頸部痙攣。

【三三】 天 衝

位置 耳後。入髮際二寸。

解剖的部位 在上耳翼根之後上部。顳顬筋之上際。即蝴蝶骨乳嵴縫合之前際。有耳上

筋。循耳後動脈。分布顏面神經之顏顳枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 癩癧。頭痛。齒齦炎。強直癱瘓。

【三四】 浮白

位置 耳後。入髮際一寸。

解剖的部位 在耳後。乳嚙突起根之上。一寸。顏顳筋中。有耳上筋。循耳後動脈。分布

顏面神經之顏顳枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 耳鳴。耳聾。齒痛。咳逆。呼吸困難。四肢麻痺。頸項部痙攣。扁桃腺炎。

【三五】 竅陰

位置 完骨之上。枕骨之下。

(完骨爲乳嚙突起。枕骨即着枕之所)。

解剖的部位 在乳嘴突起之後上部。即竊鬪骨顛頂骨後頭骨三縫合部也。有耳後筋。循

耳後動脈。分布耳後神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 腦膜炎。腦充血。三叉神經痛。四肢痙攣。喉逆。耳鳴。耳聾。癰疽。

### 【三六】 完骨

位置 耳後。入髮際四分。

解剖的部位 在乳嘴突起之下端。胸鎖乳嘴筋附着部之上際。循耳後動脈。分布耳後神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 顏面浮腫。口裂筋萎縮。言語不正。齒齦炎。中風。

### 【三七】 △ 天牖 (禁灸)

位置 頸大筋之外。缺盆之上。天容之後之髮際。

(頸大筋。胸鎖乳嘴筋也)。

解剖的部位 在頸顛骨乳嘴突起之後下部。胸鎖乳嘴筋停止部之後緣。循後頭動脈之分

枝。分布小後頭神經及頸椎神經。

療法 針五分。

主治 頸項部痙攣。咽喉加答兒。耳鳴。耳聾。眼球充血。顏面浮腫。

(七)耳之周圍凡十穴

### 【三八】 聽會

位置 耳前陷中。張口得之。

解剖的部位 在下顎骨顆狀突起與顛顛骨之間。循耳前動脈及內顎動脈。分布顏面神經

主治 耳道加答兒。耳鳴。耳聾。顏面神經麻痺。下顎脫臼。

### 【三九】 聽宮

位置 耳前小尖瓣下角面之中央。

解剖的部位 在咬筋附着部之後緣，循耳前動脈。分布顏面神經及三叉神經。

療法 針二分乃至三分。灸三壯乃至五壯。

主治 耳鳴。耳聾。耳道加答兒。嘶嘎失聲。

#### 【四十七】 耳門

位置 耳前小尖瓣之前。稍陷處。

解剖的部位 在顳顬筋部。循動顳顬脈。分布淺顳顬神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 耳鳴。耳聾。耳瀝。耳疔。耳道加答兒。上齒痛。唇吻強硬。

#### 【四十八】 和齶

位置 耳之前。銳髮之下。橫動脈。

解剖的部位 在顳顬骨下端。與顳骨之關節部。耳前筋起始部也。循淺顳顬動脈。分布

顏面神經之顳顬枝。

療法 針三分乃至七分。灸三壯乃至五壯。

主治 頭痛。顏面神經癱瘓及麻痺。頸領部組織炎。鼻加答兒。鼻茸。

【四二】 曲髮

位置 耳上之髮際。

解剖的部位 在顳顬骨與顛頂骨之關節部。顳顬筋中。循淺顳顬動脈。分布顏面神經之顳顬枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 由酒精中毒。而來顳頂部頸部及顳顬部之神經痛。又頷頰神經痛。

【四三】 角孫 (禁針)

位置 耳廓中間之上。

解剖的部位 在耳翼上角之上際。顳顬筋中。循顳顬動脈。耳前動脈。分布淺顳顬神經

療法 灸三壯乃至七壯。

主治 角膜白翳。齒齦炎。唇吻強硬。口內炎。突目。

【四四】○ 顛息 (禁針)

位置 耳翼之後上部。青絡脈中。

(青絡脈。皮下靜脈也。)

解剖的部位 顯顛骨部。有顯顛筋。耳後筋。循耳後動脈。分布淺顯顛神經。及耳後神經。

療法 灸三壯乃至七壯。

主治 耳鳴。頭痛。癩癩。

【四五】 瘖脈

位置 耳後之鷄足。青絡脈中。

解剖的部位 在顳顬骨部。有顳顬筋。耳後筋。循耳後動脈。分布淺顳顬神經。及耳後神經。

療法 針一分灸三壯。

主治 頭痛。耳鳴。瞳孔不全症。下痢。小兒搖擲。嘔吐。

【四六】 翳風

位置 耳後陷中。按之通耳中。

解剖的部位 在耳下腺部之微上。乳嘴突起。與下顎枝之中間。咬筋部陷凹中。循顳顬動脈。分布大耳神經。淺顳顬神經之小枝。當顏面神經之耳下腺叢。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 耳鳴。耳聾。顏面神經麻痺。頰領炎。笑筋萎縮。

【四七】 天容 (禁針)

位置 耳下曲頰之後。

解剖的部位 在胸鎖乳嚙筋部。耳下腺存在處。循後頭動脈。內頸靜脈。分布大耳神經。  
及副神經。

療法 灸三壯乃至五壯。

主治 胸膜炎。呼吸困難。頸項部神經痛。耳鳴。耳聾。舌下軟瘤(重舌)。齒齦炎。  
胸背神經痙攣。癭瘤。頸項部發生腫物。回顧不能。

#### 第二節 顏面部(參照第一圖)

(一)沿顏面之正中。自鼻尖至下方線。凡五穴。

#### 【四八】▲素膠 (禁灸)

位置 鼻柱之尖端。

解剖的部位 在鼻軟骨尖端部。鼻壓縮筋中。循外鼻動脈。分布外鼻神經。淚管神經。

療法 針一分。

(案：甲乙經刺入三分。)

主治 鼻茸。鼻瘡。淚液過多。鼻孔閉塞。衄血。

【四九】 水溝

位置 鼻下。陷中。

解剖的部位 在鼻柱根。與口唇之中央。口輪匠筋中。循上唇動脈。及外頸動脈之分枝

。分布顏面神經之頰枝。及下眼窩神經。

療法 針二分。灸三壯。

主治 糖尿病。水腫病。癩癩。腦充血。口眼諸筋收縮及痙攣。

【五十】 兌端

位置 上唇端之中央。

解剖的部位 在口輪匠筋部。上唇之粘膜。人中之外皮。循外頸動脈之分枝。及上唇冠

狀動脈。分布顏面神經之頰枝。及下眼窩神經。

療法 針二分。灸三壯。

主治 癩癩。尿黃色。舌乾。唇強。

【五】 顴 交

位置 唇內。上齒縫目之中。

解剖的部位 在上唇裡面之黏液膜部。口輪匠筋中。循口冠狀動脈。分布前上齒槽神經。

療法 針二分。灸三壯。

主治 鼻茸。鼻塞。頸項神經痛。淚液過多。內眥充血或搔癢。角膜白翳。

【五】 承 漿

位置 頤之前。下唇之下中央。陷中。

解剖的部位 在下顎骨頤關節之上部。左右方形。頤筋之中間。循下唇動脈。及頤動脈

。分布顏面神經之枝別。下顎皮下神經。

療法 針二分。灸三壯乃至七壯。

主治 中風。顏面神經麻痺。顏面浮腫。糖尿病。齒神經痛。癩痢。

(一)沿眼之內眥方向。至下方纒。凡三穴。

【五三】 ▲ 睛明 (禁灸)

位置 目內眥之外一分。

解剖的部位 在眼輪匝筋中。有內眼險韌帶。循內眥動脈。分布三叉神經第一枝之滑車

上神經。

療法 針二分。

主治 角膜炎。白翳。網膜炎。眼球充血或搔癢。夜盲。小兒結膜炎。

【五四】 ▲ 迎香 (禁灸)

位置 睛明之下。鼻孔之旁。

解剖的部位 在上顎骨犬齒窩之上方。鼻翼下掣筋中。循下眼窩動脈。分布顏面神經及

三叉神經之枝別。下眼窩神經。

療法 針三分。

主治 急性鼻加答兒。鼻孔閉塞。嗅能減退。衄血。鼻茸。鼻瘡。顏面神經麻痺。顏面組織炎。

【五五】 ▲ 禾 膠 (禁灸)

位置 鼻孔之下。水溝之旁

解剖的部位 在上顎骨犬齒窩部。鼻翼下梨筋起始部。方形上唇筋中。循下眼窩動脈後顏面靜脈。分布三叉神經之二枝。下眼窩神經等。

療法 針三分。灸三壯。

(案：原本灸三壯。玉森氏與氏本暨甲乙經皆列禁灸。)

主治 急性鼻加答兒。鼻腔閉塞。嗅能減退。衄血。鼻茸。鼻瘡。咬筋痙攣。耳下腺炎。

(三)沿眼之瞳孔方向。至下方線。凡四穴。

【五六】 承泣 (禁針)

位置 目下七分。

解剖的部位 在下眼窩之下緣。眼輪匝筋中。循下眼窩動脈。分布顏面神經並三叉神經之第二枝。即下眼窩神經。

說明 禁針。禁灸。療法主治。從略。

(案：原本禁針。延命山氏玉森氏本禁針禁灸。奧氏本甲乙經刺三分。不可灸。宜列禁針禁灸穴。)

【五七】 四白

位置 目下一寸。瞳孔正直。

解剖的部位 在下眼窩之直下。當上顎之上緣。方形上唇筋中。循下眼窩動脈。分布顏面神經及三叉神經。即下眼窩神經。出下眼窩孔之邊相當之處。

療法 針三分。灸三壯。

(案：奧氏本刺三分。灸七壯。)

主治 眼球神經痛。腫子搔癢。角膜白翳。頭痛眩暈。蓄膿症。顏面神經癱瘓。

【五八】 巨 髎

位置 鼻孔之旁八分。瞳孔正直。

解剖的部位 在上顎與頰骨之中間。方形上唇筋中。當齒齦部。循下眼窩動脈。分布頰

面神經三叉神經之枝別。

療法 針三分。灸五壯。

主治 顏面神經痛及麻痺。角膜炎。眼球青色。綠障眼(青盲)。近視。急性及慢性加

答兒。蓄膿症。齒神經痛。唇頰部之爛衝。

【五九】 地 倉

位置 口吻之旁四分。

解剖的部位 在口輪匠筋部。循外顎動脈之枝別。上下唇動脈。分布顏面神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 顏面神經痛及麻痺。不能遠視。由口眼關係之諸筋痙攣或收縮。言語不能。

(四)沿目外眥之方向。至下方綫。凡二穴。

【六十七】 腫子膠

位置 目外眥之旁五分。

解剖的部位 在顳顬部前頭骨之額骨突起。與額骨之前頭突起關節部之後際。眼輪匠筋

中。循額骨眼窩動脈。分布顏面神經之額骨枝。及顳額枝。

療法 針五分。灸五壯。

主治 耳道加答兒。耳鳴。耳聾。顏面神經麻痺。下顎脫臼。

【六十八】 ▲ 額膠 (禁灸)

位置 面顴骨之下廉。陷中。

(面顴骨。額骨關節也。)

解剖的部位 在顳骨筋之起始部。有笑筋。循橫顏面動脈。分布下眼窩神經。咬筋神經。及顏面神經之頰枝。

療法 針三分。

主治 顏面神經麻痺或癱瘓。上齒神經痛。

(五)自耳前。當下顳隔。凡四穴。

### 〔六〕 上關

位置 耳前起骨之上廉。

(起骨。顳骨弓也)

解剖的部位 在顳顳骨與顳骨及蝴蝶骨之三骨關節部。有顳顳筋。循內顳動脈。分布顏

面神經之顳顳枝。

療法 灸三壯乃至五壯。

主治 偏頭痛。眩暈。耳鳴。耳聾。口眼喎斜。中風。綠障眼(青盲)。齒神經痛。口

角諸筋癱瘓。

【六三】 ▲ 下 關 (禁灸)

位 置 耳前骨下。陷中。

(骨下者。顴骨弓下部也。)

解剖的部位 在下顎骨體上突起之前方。顴骨弓下端。有顯顴筋及咀嚼筋。循橫顏面動

脈。分布顏面神經之顴骨枝。及三叉神經。

療 法 針三分。

主 治 下顎脫臼。齒神經痛。顏面神經麻痺。欠伸。眩暈。耳鳴。耳聾。

【六四】 大 迎

位 置 曲頰前一寸三分。

(曲頰。下顎隅也。)

解剖的部位 在第二大臼齒之下部。三角頤筋咬肌存在處。當外頤動脈之通路。分布

顏面神經之下行枝。及下顎神經。

療法 針五分。灸三壯乃至五壯。

主治 顏面痙攣。唇吻痙攣。口噤不開。下齒神經痛。頸部神經痙攣。耳下腺炎。眼球痙攣。

### 【六五】 頰 車

位置 曲頰之端。陷中。

(曲頰。下顎隅也。)

解剖的部位 在下顎骨隅角之前上方。咬筋存在。循外顎動脈及咬筋動脈。分布顏面神經之分支。下顎皮下神經及咬筋神經。

療法 針三分。灸七壯。

主治 顏面神經痛及麻痺。嘶嘎失聲。頰頰炎。頸部諸筋神經痛。或收縮。回顧不能。半身或全身不遂。頰頰部阻嚼不能。

第三節 頸部

(一)當前頸部之正中。凡二穴。

【六六】 廉泉

位置 頷之下。結喉之上。中央陷中。

解剖的部位 在喉頭結節之上方。舌骨之上部。當左右胸骨。舌骨筋停止部之中間。循

上甲狀腺動脈。分布顏面神經之分枝。上頸皮下神經。

療法 鍼三分。灸三壯乃至七壯。

主治 氣管枝加答兒。喘息。咽喉加答兒。嘔吐。舌下腫。舌根部諸筋萎縮。流涎。

口瘡。

【六七】 天突

位置 結喉下二寸。陷中。

解剖的部位 在胸骨頸截痕上際之中央。當左右胸鎖乳疇筋之中間。有胸骨舌骨筋。甲

狀舌骨筋。循上甲狀腺動脈。及下甲狀腺靜脈。分布下頸皮下神經。深部有氣。

療法 鍼三分。灸三壯乃至七壯。

說明 刺針之際。針尖向下方刺入。

主治 顏面充血。喘息。聲門筋痙攣。咽喉加答兒。扁桃腺炎。急性舌骨筋麻痺。言語不能。嘔吐。良性腫瘤。腸寄生蟲。(喘息應用灸治。)

(二)前頸部胸鎖乳嘴筋之前後。凡七穴。

【六八】 ▲ 人迎 (禁灸)

位置 在結喉之旁一寸五分。

解剖的部位 在胸鎖乳嘴筋之前緣深部。有咽喉及喉頭。循外頸動脈。深部通內頸動脈。

。分布舌下神經下行枝。及上頸皮下神經。當迷走神經經路之附近。

說明 禁針禁灸穴。療法主治從略。

〔案：是穴原書汲玉森氏本。皆言禁針禁灸。與氏本甲乙經載刺入四分。不可灸。甲乙經更言。刺入過深。不幸殺人。〕

【六九】 水突

位 置 頸大筋之上。人迎之下。氣舍之上。

（大筋。胸鎖乳嘴筋也。）

解剖的部位 在甲狀軟骨下緣之外方。胸鎖乳嘴筋之前緣。循外頸動脈深部。通內頸動脈。分布舌下神經下行枝。及上頭皮神經。當迷走神經經路之附近。

療法 針三分。灸三壯。

主治 扁桃腺炎。氣管枝炎。喘息。咽喉炎。百日咳。

【七十】 氣舍

位 置 人迎之下。天突之旁。陷中。

解剖的部位 喉頭環狀軟骨正中之兩旁一寸五分。胸鎖乳嘴筋之兩頭間。即自鎖骨與胸

骨起之兩頭間。循深部總頸動脈。分布下頸皮下神經及副神經。

療法 鍼三分。灸三壯。

主治 扁桃腺炎。氣管枝炎。喘息。咽喉炎。百日咳。

### 【七一】 扶突

解剖的部位 在甲狀軟骨之外後部。胸鎖乳疇筋之中。循橫頸動脈。分布下頸皮下神經。  
。大耳神經。及迷走神經之經路。

療法 針四分。灸三壯。

主治 咳嗽。氣喘。唾液分泌過多。急性舌骨諸筋麻痺。

### 【七二】 天鼎

位置 扶突之下。與氣舍相隔一筋。

解剖的部位 在胸鎖乳疇筋之後緣闊頸筋中。循橫頸動脈及外頸靜脈。分布下頸皮下神經。並鎖骨上神經。筋下有迷走神經幹。下行胸腔內。

療法 鍼四分。灸三壯乃至七壯。

主治 扁桃腺炎。咽喉炎。舌骨筋麻痺。

【七三】 天窗

位置 天窗之下。扶突之後。

解剖的部位 在胸鎖乳嘴筋之前方。循外頸動脈及內頸動脈。分布鎖骨上神經。及下頸

皮下神經。

療法 鍼三分。灸三壯。

主治 半身不遂。(中風)頰頰炎。頸部及肩胛部痙攣。耳聾。耳鳴。

【七四】 缺盆 (禁針)

位置 氣舍之後。橫骨之上。陷中。

解剖的部位 在大胸筋及闊頸筋。循鎖骨下動靜脈。分布下頸皮下神經。及鎖骨上神經。

**療法** 針四分。灸三壯。

**主治** 喘息。胸膜炎。頸部及肩胛部諸筋癱瘓。神經痛。扁桃腺炎。瘰癧。

#### 第四節 胸部 (參照第二圖)

(一)沿胸部正中綫。當胸骨部。凡六穴。

#### 【七五】 璇璣

**位置** 天突之下一寸。

**解剖的部位** 在胸骨體部。當左右第六肋間之中央。循內乳動脈分枝。分布肋間神經。

**療法** 針三分。灸五壯。

**主治** 胸膜神經痛及麻痺。肺充血。扁桃腺炎。喘息。食道狹窄。胃痙攣。

#### 【七六】 華蓋

**位置** 璇璣之下一寸。

**解剖的部位** 在胸骨把柄與胸骨體之界。循內乳動脈分枝。分布肋間神經之前穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 喘息。氣管枝加答兒。胸膜炎。肺充血。扁桃腺炎。咽喉加答兒。聲門筋痙攣。

【七七】 紫宮

位置 華蓋之下 一寸六分。陷中。

(案：古書一寸六分。原書以古今人身長不同。假定一寸。今照古書尺寸改正)。

解剖的部位 在胸骨體部。循內乳動脈分枝。分布肋間神經前穿行枝。

療法 鍼三分。灸五壯。

主治 胸膜炎。食道狹窄。肺充血。肺結核。氣管枝加答兒。胃出血。

【七八】 玉堂

位置 紫宮之下 一寸六分。(依古書)

解剖的部位 在胸骨體部。循內乳動脈分枝。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 胸膜炎。喘息。嘔吐。

【七九】○ 膈 中 (禁針)

位置 玉堂之下一寸六分。(依古書)

解剖的部位 在胸骨體部。循內乳動脈分枝。分布肋間神經前穿行枝。

療法 灸三壯。

主治 胸膜神經痛。食道狹窄。食道癌。氣管枝炎。乳閉。小兒吐乳。

【八七】 中 庭

位置 臆中之下一寸六分。(依古書)

解剖的部位 在胸骨體部。當左右第六肋間之中央。循內乳動脈分枝。分布肋間神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。喘息。扁桃腺炎。食道狹窄。嘔吐。小兒吐乳。

(二)離胸部正中綫之外側二寸。當副骨緣。凡六穴。

【八一】 俞府

位置 巨骨之下。璇璣之旁二寸。

(巨骨。鎖骨也。)

解剖的部位 在大胸筋中。循鎖骨下動靜脈。及內乳動脈。分布前胸廓神經。鎖骨下神

經。及肋間神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。氣管枝炎。胸膜神經痛。肋膜炎。咳逆。嘔吐。流涎。食慾減退。

【八二】 或中

位置 俞府之下一寸六分。(依古書)。華蓋之旁二寸。

解剖的部位 在第一第二肋骨間。有大胸筋。循肋間動脈。內乳動脈。分布肋間神經。

及前胸廓神經。內容肺臟。

療法 鍼三分。灸五壯。

主治 肺充血。氣管枝炎。胸膜神經痛。肋膜炎。咳逆。嘔吐。食慾減退。

【八三】 神藏

位置 或中之下一寸六分。(依古書)。紫宮之旁二寸。

解剖的部位 在第二第三肋骨間。有大胸筋。循肋間動脈。內乳動脈。分布肋間神經。

及前胸廓神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。氣管枝炎。胸膜神經痛。肋膜炎。咳逆。嘔吐。食慾減退。

【八四】 靈墟

位置 神藏之下一寸六分。(依古書)。玉堂之旁二寸。

解剖的部位 在第三第四肋骨間。有大胸筋。循肋間動脈。內乳動脈。分布肋間神經。

及前胸廓神經。內容肺臟。

主治 胸膈神經痛。肋膜炎。氣管枝加答兒。鼻孔閉塞。嗅能減退。嘔吐。食慾減退。

。直腹筋痙攣。

【八五】 神封

位置 靈墟之下一寸六分。(依古書)。臆中之旁二寸。

解剖的部位 在第四第五肋骨間。循肋間動脈。內乳動脈。分布肋間神經及前胸廓神經

。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 胸脇神經痛。肋膜炎。氣管枝加答兒。鼻孔閉塞。嗅能減退。嘔吐。食慾減退。  
。直腹筋痙攣。

【八六】 步廊

位置 神封之下一寸六分。(依古書)。中庭之旁二寸。

解剖的部位 在第五第六肋骨間。有大胸筋。循肋間動脈。內乳動脈。分布肋間神經及

前胸廓神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 胸脇神經痛。肋膜炎。氣管枝加答兒。鼻孔閉塞。嗅能減退。嘔吐。食慾減退。  
。直腹筋痙攣。

(三) 離胸部副胸骨線之外側二寸。當乳綫部。凡六穴。

【八七】 氣戶

位置 巨骨之下。俞府之旁二寸。

(巨骨者。鎖骨也。)

解剖的部位 在第一肋軟骨附着部。有大胸筋、小胸筋、及內外肋間筋。循鎖骨下動脈

。第一肋間動脈。分布前胸廓神經。及鎖骨下神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肋膜炎。慢性氣管枝炎。橫隔膜痙攣。百日咳。咳逆。呼吸困難。胸背部痙攣。

【八八】 庫房

位置 氣戶之下一寸六分。(依古書。)或中之旁二寸。

解剖的部位 在第一肋骨與第二肋骨之間。有大胸筋、小胸筋、汲內外肋間筋。循肋間動脈。分布前胸廓神經。及肋間神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。氣管枝炎。肋膜炎。呼吸困難。

【八九】 屋 翳

位置 庫房之下一寸六分。(依古書)。神藏之旁二寸。

解剖的部位 在第二肋骨與第三肋骨間。有大胸筋、小胸筋、汲內外肋間筋。循前肋間動脈。分布前胸廓神經。及肋間神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 咳嗽。唾血。胸膜炎。全身浮腫。全身麻痺。

【九十】 膺窗

位置 屋翳之下一寸六分。(依古書。)靈墟之旁二寸。

解剖的部位 在第三肋骨與第四肋骨之間。有大胸筋、小胸筋、內外肋間筋。循前肋間

動脈。分布前胸神經。及肋間神經。內容肺臟。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。肺實脅肥大。肋膜炎。腸雷鳴。泄瀉。乳癰。

【九一】 ▲ 乳中 (禁灸)

位置 當乳頭之正中。

解剖的部位 在第四肋骨與第五肋骨間。有大胸筋、小胸筋、及內外肋間筋。循前肋間

動脈。分布前胸廓神經。及肋間神經。內容肺臟。

說明 禁針禁灸。療法從略。

(案：原書禁灸。延命山及玉森氏本禁針禁灸。奧氏本禁針。甲乙經不記部位。但

言不可刺灸。刺之不幸。生蝕瘡。瘡中有膿血清汗者可治。瘡中有息肉。者蝕瘡者死。資生經。十四經釋掉。記當乳處。）

【九二】 乳根

位 置 乳中之下一寸六分。（依古書。）步廊之旁二寸。

解剖的部位 在第五與第六肋骨間。循前肋間動脈。分布前胸廓神經。及肋間神經。

注意 此處爲心尖搏動部。須注意。手術未熟練者。不宜施術。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 乳腺炎。咳嗽。肋膜炎。肋間神經痛及麻痺。肋膜炎。手臂神經癱瘓。

（四）雌胸部乳腺之外側二寸。前腋窩綫部。凡六穴。

【九三】 雲門

位 置 巨骨之下。氣戶之旁二寸。

解剖的部位 在鎖骨外端之下際。大胸筋之上部。通過頭靜脈。胸肩峯動脈。分布側胸

廓神經。肋間神經。及鎖骨下神經等。

療法 針三分。灸五壯。

主治 咳逆。肩背神經痛。脇背痙攣。心臟病等。

【九四】 中府

位置 雲門之下一寸。庫房之旁二寸。

解剖的部位 在前胸壁之外上端。大胸筋之上部。即第一肋間。適腋窩動脈。分布肋間神經。及側胸廓神經等。

療法 針六分。灸五壯。

主治 喘息。氣管枝炎。顏面及四肢浮腫。

【九五】 周營

位置 中府之下一寸六分。屋翳之旁二寸。

解剖的部位 在第二肋骨與第三肋骨間。有大胸筋。前大鋸筋。內外肋間筋。循長胸動

脈。分布前胸廓神經。及肋間神經之側穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。背部痙攣。食道狹窄。吃逆。

【九六】 胸鄉

位置 周營之下一寸六分。膺窗之旁二寸。

解剖的部位 在第三肋骨與第四肋骨間。有前大鋸筋、大胸筋、內外肋間筋。循長胸動

脈。分布前胸廓神經。及肋間神經之側穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。胸脊痙攣。咽下困難。唾液過多。吃逆等。

【九七】 天谿

位置 胸鄉之下一寸六分。乳中之旁二寸。

解剖的部位 在第四肋骨與第五肋骨間。有前大鋸筋、大胸筋、內外肋間筋。循長胸動

脈。分布前胸廓神經。及肋間神經之側穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。加答兒性肺炎。氣管枝加答兒。肋間神經痛。

【九八】 食 寶

位置 天谿之下一寸六分。乳根之旁二寸。

解剖的部位 在第五肋骨與第六肋骨間。有內外肋間筋。及大胸筋。循長胸動脈。分布

側胸廓神經。及肋間神經之側穿行枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 肺充血。加答兒性肺炎。肋間神經痛。

(五)胸部之外側。凡二穴。

【九九】 天 池

位置 乳後一寸。腋下三寸。

解剖的部位 在第四肋間。有大胸筋。及加大鋸筋。循長胸動脈。分布側胸廓神經。及肋間神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 心臟外膜炎。腦充血。腋下腺炎。

### 【100】 輻筋

位置 腋下三寸。淵腋之前半寸。

解剖的部位 在第四肋間。有前大鋸筋及肋間筋。循肋間動脈。分布肋間神經之側支行。

枝。內容肺臟。

療法 針五分。灸五壯。

主治 嘔吐。吞酸。神經衰弱。唾液過多。言語不正。下腹部激衝。四肢痙攣。

### 第五節 腹部 (參照第二圖)

(一)沿腹部正中線。自胸骨劍狀突起至恥骨縫際。凡十五穴。

【101】 鳩尾

位置 在蔽骨之下五分。

(蔽骨者。胸骨劍狀突起也。)

解剖的部位 在上腹部之上方白條線起始部。循上腹壁動靜脈。分布肋間神經之前穿行枝。

療法 針三分乃至五分。灸三壯乃至五壯。

主治 心臟炎。急性胃加答兒。腦神經衰弱。精神病。喘息。咽喉炎。肺氣腫。

【102】 巨關

位置 鳩尾之下一寸。臍上六寸。

解剖的部位 在上腹部白條線中。循上腹壁動脈。分布肋間神經而穿行枝。

療法 針六分。灸七壯乃至十五壯。

主治 心臟外膜炎。氣管枝加答兒。橫膈膜痙攣。胃痙攣。直腹筋痙攣。吐瀉。嘔吐。

。食慾減退。腹部膨脹。咳嗽。胃癢。

【1011】 上腕

位置 巨關之下一寸。臍上五寸。

解剖的部位 在上腹部白條線中。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。當胃之賁門

療法 針五分乃至八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 慢性胃加答兒。慢性腸加答兒。腹膜炎。腸疝痛。氣管枝加答兒。腸間膜炎。  
心悸亢進。小兒脾癩。

【1014】 中腕

位置 上腕之下一寸。臍上四寸。

解剖的部位 在上腹部白條線中。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。內通腹膜。

容胃。

療法 針五分乃至八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 慢性胃加答兒。胃擴張。胃痙攣。胃出血。腸神經痛。胃瘧。腹膜炎。腎臟炎。  
。食慾不進。消化不良。泄瀉。寄生蟲。

### 【一〇五】 建里

位置 中脘下一寸。臍上三寸。

解剖的部位 在上腹部白條線中。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。內容胃臟。

療法 針五分乃至八分。灸五壯乃至十五壯。

### 【一〇六】 下脘

位置 建里之下一寸。臍上二寸。

解剖的部位 在上腹部白條線中。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。內容胃臟。

主治 胃擴張。胃痙攣。消化不良。慢性胃加答兒。腸加答兒。嘔吐。尿血。

【一〇七】 水分

位置 下脘之下一寸。臍上一寸。

解剖的部位 在上腹部白條綫中。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。內容橫行結腸。

療法 針五分。灸七壯乃至十五壯。

主治 水腫病。腹部鼓脹。腹神經痙攣。局發痙攣。腸雷鳴。慢性腸加答兒。胃弱。食慾減退。腰背痙攣。小兒顛陷。

【一〇八】 神闕

位置 臍中。

解剖的部位 腹部中央。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。深部容小腸。

療法 撒布食鹽其上。灸三壯乃至三十壯。

主治 腦溢血。慢性腸加答兒。下痢。水腫病。腹部鼓脹。腸鶩鳴。婦人脫肛。急性諸病。

【一〇九】 陰交

位置 臍下一寸。曲骨之上四寸。

解剖的部位 在下腹部白條線中。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針八分。灸七壯。

主治 精神病。陰汗濕癢。腰部膝部之痙攣。婦人尿道加答兒。子宮內膜炎。月經不順。產後血暈。惡露不止。小兒顫陷。

【一一〇】 氣海

位置 臍下一寸五分。陰交之下五分。

解剖的部位 在下腹部白條線中。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。深部容小腸。

療法 鍼八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 精神病。盲腸炎。腹部冷却。腸神經病。腸加答兒。腸出血。子宮出血。膀胱

加答兒。月經不順。小兒遺尿。膀胱括約筋麻痺。

### 【III】 石門

位置 臍下二寸。氣海之下五分。

解剖的部位 在下腹部白條線中。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。深部容小腸

療法 針五分乃至八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 慢性腸加答兒。消化不良。子宮神經痙攣。水腫病。吐血。盲腸炎。腸間膜炎

。小兒脾疳。淋疾。

### 【IIID】 關元

位置 臍下三寸。石門之下一寸。

解剖的部位 循下腹壁動靜脈。分布第十二肋間神經前穿行枝。深部容小腸。在女子則容子宮底。

療法 針一寸乃至一寸五分。灸七壯乃至十五壯；

主治 消化不良。慢性腸加答兒。腸出血。下腹部痙攣。水腫病。腎臟炎。睪丸炎。

慢性子宮病。攝護腺炎。蛋白尿。淋疾。尿閉。

(注意)孕婦禁針禁灸。凡孕婦臍部以下之腹部諸穴。皆不可針灸。

### 【二】 中 極

位 置 臍下四寸。關元之下一寸。

解剖的部位 在恥骨軟骨接合上際之上部白條綫中。循下腹壁動脈。分布下腹神經。以

下下腹部及上腹部。有腹膜。即下腹部通腹膜。容小腸。上腹部同。亦通腹膜

。容胃。

療法 鍼八分。灸五壯乃至十五壯。

主治 失精。水腫病。尿瀝類數。膀胱括約筋麻痺。不妊症。

【二四】 曲骨

位置 臍下五寸。中極之下一寸。

解剖的部位 在恥骨軟骨接合上際白條綫中。左右直腹筋停止部之中間。循下腹壁動脈

。外陰部動脈。分布腸骨下腹神經。及腸骨鼠蹊神經。以下臍部。自臍之中心

至曲骨五寸。

療法 鍼五分。灸七壯。

主治 內臟虛弱。失精。下腹痙攣。膀胱加答兒。淋疾。尿閉。子宮內膜炎。子宮潰

瘍。子宮出血。產後惡露不止。

【二五】 會陰

位置 大便之前。小便之後。兩便之間。

解剖的部位 在球海綿體筋之中央。循外痔動脈。內陰部動脈等。分布會陰神經。

療法 灸三壯乃至五壯。

主治 陰汗。陰門疼痛。尿閉。便秘。月經不通。慢性痔疾。

(二) 離腹正中線之外側五分。在第一側線。凡十一穴。

### 【二一六】 幽 門

位 置 巨闕之旁五分。

解剖的部位 在上腹部直腹筋內緣。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針五分。灸七壯乃至十壯。

主治 上腹部膨脹。吞酸。流涎。嘔吐。胸膜神經癱瘓。眼球充血。氣管枝加答兒。

症瘧嘔吐。

### 【二一七】 通 谷

位 置 幽門之下一寸。上脘之旁五分。

解剖的部位 在上腹部直腹筋內緣。循上腹壁動脈。分布肋間前穿行枝。

療法 針五分。灸七壯乃至十壯。

案：原本鍼七分乃至一寸。灸之壯數同。玉森氏本。針七分。灸之壯數亦同。奧氏本甲乙經刺五分。灸五壯。

主治 嘔吐。消化不良。胃擴張。慢性胃加答兒。急性舌骨筋麻痺。欠伸。笑筋萎縮。眼球充血。

【二一八】 陰都

位置 通谷之下一寸。中脘之旁五分。

解剖的部位 在上腹部有直腹筋。橫腹筋。內外科腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針七分乃至一寸。灸七壯乃至十壯。

主治 肺氣腫。胸膜不全症。喘息。腸雷鳴。黃疸。眼球充血。角膜白翳。

【二一九】 石關

位置 陰都之下一寸。建里之旁五分。

解剖的部位 在直腹筋部。有橫腹筋。內外斜腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿  
行枝。

療法 鍼七分乃至一寸。灸七壯。

主治 胃痙攣。吃逆。唾液分泌過多。便秘。淋病。眼球充血。

### 【1110】 商 曲

位置 石關之下一寸。下脘之旁五分。

解剖的部位 在直腹筋部。有橫腹筋。內外斜腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿  
行枝。

療法 針七分乃至一寸。灸七壯。

主治 胃痙攣。腹膜神經痙攣。食慾減退。黃疸。眼球充血。角膜炎。

### 【1111】 盲 俞

位置 商曲之下二寸。平臍。

解剖的部位 在臍之兩旁。直腹筋部。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針一寸。灸七壯。

主治 胃痿瘳。常習便秘。下痢。胃部冷却。腹膜神經痙攣。腹痛。腸加答兒。黃疸。

【二三〇】 中注

位置 盲俞之下一寸。陰交之旁五分。

解剖的部位 在恥骨之上方。直腹筋部。循下腹壁動脈。分布腸骨鼠蹊神經。

療法 針七分乃至一寸。灸五壯乃至十五壯。

主治 便秘。腸加答兒。眼球充血。角膜炎。月經不順。卵巢炎。卵巢腫脹。不妊症。

位置 中注之下一寸。石門之旁五分。

解剖的部位 在恥骨之上方。直腹筋部。循下復壁動脈。分布腸骨下腹神經。

療法 針七分乃至一寸。灸五壯乃至三十壯。

主治 腸加答兒。腸痙痛。角膜白翳。月經痛。子宮痙攣。月經不調。不妊症。

### 【二四】 氣 穴

位置 四滿之下一寸。關元之旁五分。

解剖的部位 在恥骨之上方。直腹筋部。循下腹壁動脈。分布腸骨鼠蹊神經。

療法 針七分乃至一寸。灸五壯乃至十壯。

主治 腎臟炎。腰背痙攣。膀胱麻痺。眼球充血。角膜炎。月經不調。

### 【二五】 大 赫

位置 氣穴之下一寸。中極之旁五分。

解剖的部位 在恥骨之上部。直腹筋部。循下腹壁動脈。分布腸骨鼠蹊神經。

療法 針八分乃至一寸。灸五壯乃至十壯。

主治 陰囊收縮。陰萎。陰莖痛。精液缺乏。遺精早洩。虛癆。眼球充血。角膜炎。  
慢性膝關節。

【二二六】○橫骨（禁針）

位置 大赫之下一寸。曲骨之旁五分。

解剖的部位 在恥骨之上部。當直腹筋部。循下腹壁動脈。分布腸骨鼠蹊神經。

療法 灸五壯乃至十五壯。

案：原書及玉森氏本不載灸壯。奧氏本甲乙經刺入一寸。灸五壯。

（三）離腹部第一側線之外側。當第二側線。凡十三穴。

【二二七】不容

位置 幽門之旁一寸五分。去巨闕二寸。

解剖的部位 當第八肋軟骨之下緣。有外斜腹筋。直腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神

經穿行枝。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 肩膈部諸筋痙攣及收縮。喘息。咳嗽。嘔吐。胃癢。唾血。寄生蟲。

【二二八】 承滿

位置 不容之下一寸。去上脘二寸。

解剖的部位 當第八肋軟骨附着部之下部。有內外斜腹筋。汲直腹筋。循上腹壁動脈。

分布肋間神經前穿行枝。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 咳嗽。唾血。咽下困難。食慾減退。腹部膨滿或冷却。下痢。腸雷鳴。腹膜炎。  
黃疸。

【二二九】 梁門

位置 承滿之下一寸。去中脘二寸。

解剖的部位 在第八肋軟骨之下部。有外斜腹筋。及直腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經側穿行枝。內容胃臟。

療法 針七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 急性胃加答兒。食慾減退。消化不良。腸加答兒。胃瀰擊等。

### 【110】 關門

位置 梁門之下一寸。去建里二寸。

解剖的部位 在第八肋軟骨下部。有外斜腹筋及直腸筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。內部爲橫行結腸。

療法 針八分。灸五壯乃至十五壯。

主治 胃瀰擊。胃阿篤尼症。食慾減退。消化不良。腸加答兒。腸疝痛。大便秘結。遺尿。水腫病。

### 【111】 大乙

位 置 關門之下一寸。去下脘二寸。

解剖的部位 在小腸之上部。有外斜腹筋及直腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針八分。灸五壯乃至十五壯。

主治 胃神經痛。舌肥大。心外膜肥大。癲狂病。脚氣。

### 【III】 滑肉門

位 置 大乙之下一寸。去水分二寸。

解剖的部位 在小腸部。有外斜腹筋及直腹筋。循上腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。

療法 針八分。灸五壯乃至十五壯。

主治 癲癩。精神病。嘔吐。胃出血。胃痙攣。舌炎。舌下腺炎。舌疔腫等。

### 【IV】 天樞

位置 滑肉門之下一寸。去神闕二寸。平臍。

解剖的部位 上層有外斜腹筋及直腹筋外緣。循下腹壁動脈。分布肋間神經側穿行枝。

療法 針五分。灸五壯乃至二十壯。

主治 慢性胃腸病。腸加答兒。下痢黏液。寄生蟲。水腫病。間歇熱。腎臟炎。子宮冷却症。子宮出血。子宮內膜炎。月經不順。

#### 【三四】 外陵

位置 天樞之下一寸。去陰交二寸。

解剖的部位 在小腸部。有內外斜腹筋及直腹筋。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。腸骨下腹神經。

療法 針八分乃至一寸。灸五壯。

主治 直腹筋痙攣。下腹神經痛。

#### 【三五】 大巨

位置 外陵之下一寸。去石門二寸。

解剖的部位 上層有外斜腹筋。當直腹筋外緣。循下腹壁動脈。分布腸骨下腹神經。及腸骨鼠蹊神經。

療法 針八分乃至一寸。灸五壯乃至十壯。

主治 不眠症。四肢倦怠。尿閉。

### 【三六】 水道

位置 大巨之下一寸。去關元二寸。

解剖的部位 在小腸部。有內外斜腹筋及直腹筋。循下腹壁動脈。分布肋間神經前穿行枝。腸骨下腹神經。

療法 針八分。灸五壯乃至十壯。

主治 膀胱加答兒。尿閉。等丸炎。脊髓炎。脫腸。子宮及臍口冷却。月經困難。

### 【三七】 歸來

位置 水道之下一寸。去中極二寸。

解剖的部位 內部容腸。與膀胱接近。循下腹壁動脈。分布腸骨下腹神經。

療法 針五分。灸五壯乃至十壯。

主治 睪丸炎。陰莖神經痛。子宮冷却症。卵巢炎。月經閉止。臍內炎。不妊症。臍神經痛。生殖器病。

【三三八】 氣衝

位置 歸來之下一寸。去曲骨二寸。

解剖的部位 在鼠蹊窩普派爾篤氏韌帶之中央下部。即直腸筋停止部。循淺廻旋腸骨動

脈及下腹壁動脈。分布腸骨下腹神經。及腸骨鼠蹊神經。

療法 針三分。灸七壯。

主治 睪丸炎。子宮冷却。不妊症。卵巢炎。月經閉止。陰莖痛。

【三三九】 急脈

位置 歸來之下一寸。陰莖之旁。陰毛之中。

解剖的部位 在風際窩。普派爾篤氏韌帶之下部。即直腹筋停止部。循淺廻旋腸骨動脈及下腹壁動脈。分布腸骨下腹神經。及腸骨鼠蹊神經。

說明 甲乙經及其他各書。不載此穴。原書僅載位置及解剖的部位。不載療法主治。

(四) 離腹部第二側線之外側一寸五分。在第三側綫。凡七穴。

### 【140】 期門

位置 上腕之旁三寸五分。上直兩乳。

(上直兩乳。左右乳綫部之一直線也)。

解剖的部位 在第九肋軟骨附着部之尖端。當第八肋間乳腺部。循上腹壁動脈。分布肋間神經側穿行枝。

療法 針四分。灸五壯乃至七壯。

主治 肋膜炎。腎臟炎。喘息。食後吐水。泄瀉。腹膜炎。

【四一】 日月

位置 期門之下五分。

解剖的部位 在上腹部外斜腹筋中。循上腹壁動脈及長胸動脈。分布長胸神經之末端。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 腎臟炎。歇斯的里。胃擴張。

【四二】 腹哀

位置 日月之下一寸五分。

解剖的部位 在內外斜腹筋部。循上腹壁動脈。分布肋間神經穿行枝。內部左容胃臟。

右與肝臟下緣接近。

療法 針七分。灸五壯乃至十壯。

主治 胃痙攣。胃部冷却。消化不良。腸出血。潰瘍。便血。

【四三】 大橫

位置 腹部之下三寸。平臍。

解剖的部位 在內外科腹筋部。循淺腹壁動脈之分枝。分布腸骨下腹神經。

療法 針一寸。灸五壯乃至十五壯。

主治 流行性感冒。四肢痙攣。寄生蟲。多汗症。慢性下痢。

#### 【四四】 腹結

位置 大橫之下二寸三分。

解剖的部位 在內外科腹筋部。循淺腹壁動脈之分枝。分布腸骨下腹神經。及腸骨鼠蹊

神經之分枝。內容小腸。

療法 針七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 咳嗽。腹膜炎。腸神經痛。腹中冷却。下痢。

#### 【四五】 府舍

位置 腹結之下三寸。

**解剖的部位** 在恥骨軟骨接合部與腸骨前上棘中間稍上方。即衝門之上七分之所。右方當盲腸之下部。在內外斜腹筋中。循淺腹壁動脈分枝。分佈腸骨下腹神經。右當盲腸部之下部。左當S字狀部之下部。

**療法** 針七分。灸五壯乃至十壯。

**主治** 脾臟炎。鉛毒症。潰疳。便秘。盲腸炎。

### 【四六】 衝門

**位置** 府舍之下七分。

**解剖的部位** 在腸骨前上棘之內下方。即腸骨窩。當鼠蹊皺溝之中外端相近之所。內外

斜腹之下部。有腸腰筋膜。循下腹壁動脈之分枝。分佈腸骨鼠蹊神經。

**療法** 鍼七分。灸五壯。

**主治** 上腹部厥冷。膨脹。胃痙攣。乳腺炎。

### 第六節 側胸部 (參照第三圖)

(一) 側胸部腋窩綫。凡二穴。

### 【二四七】 淵腋

位 置 腋下三寸。平乳。

解剖的部位 在側胸部第四肋間。前大鋸筋及肋間筋中。循肋間動脈。分布肋間神經側穿行枝。及側胸廓神經。內容肺臟。

療法 針四分。

主治 肋膜炎。肋間神經痛及痙攣。惡寒。發熱。

### 【二四八】 大包

位 置 淵腋之下三寸。

解剖的部位 在側胸部第六肋骨與第七肋骨間。前大鋸筋中。循長胸動脈。分布肋間神經之側穿行枝。內容肺臟。但右側與肝臟接近。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 肺內膜炎。喘息。肋膜炎。肋間神經痛等。

第七節 側腹部 (參照第三圖)

(一) 側腹部。凡六穴。

【二四九】 章門

位置 季肋之端。太乙之旁。

解剖的部位 在側腹部第十一肋軟骨前端。內外科腹筋中。循橫隔動脈。分布肋間神經

側穿行枝。

療法 針六分乃至八分。灸七壯乃至二十壯。

主治 腸雷鳴。消化不良。胸腸筋痙攣。腹膜炎。喘息。嘔吐。寄生蟲。腰椎神經痛。  
。背脊神經痙攣。肋膜炎。黃疸。

【二五〇】 京門

位置 章門之後一寸八分。

解剖的部位 在側腹部第十二肋軟骨之前端。有外斜腹筋及闊背筋。循上腹壁動脈之分支。分布長胸神經及肋間神經側穿行枝。

療法 針七分。灸七壯乃至二十左。

主治 腎臟炎。腸神經痛。腸雷鳴。肩胛神經痛。

【一五二】 帶脈

位置 章門之下一寸八分。平臍。

解剖的部位 在第十一肋軟骨之遊離端直下。及內外斜腹筋中。右爲上行結腸部。左爲

下行結腸部。循上腹動脈。分布肋間神經側穿行枝。

療法 鍼八分。灸五壯乃至十五壯。

主治 月經不調。子宮痙攣。子宮內膜炎。

【一五三】 五樞

位置 章門之下四寸八分。帶脈之下三寸。

解剖的部位 在腸骨前上棘之前上部。內外斜腹筋之下緣。循迴腸骨動脈。分布腸骨下腹神經。

療法 針七分。灸三壯乃至十壯。

主治 肩胛部及背部腰部神經痛。零丸炎。子宮神經痙攣。子宮內膜炎。

### 【M10】 維道

位置 章門之下五寸三分。

解剖的部位 在腸骨前上棘之前上部。內外斜腹筋中。循迴腸骨動脈。分布長胸神經及肋間神經分枝。

療法 鍼八分。灸五壯乃至七壯。

主治 盲腸炎。嘔吐。食慾減退。水腫病。

### 【M11】 居髎

位置 章門之下六寸三分。五樞之下一寸五分。

解剖的部位 在大臀筋停止部之前緣大腸部。有內外斜腹筋。循迴旋腸骨動脈。分布長胸神經及肋間神經分枝。

療法 針八分。灸五壯乃至七壯。

主治 腰部及下腹部之痙攣。盲腸炎。肩胛部、胸部、及上肢神經痙攣。

第八節 背部 (參照第四圖)

(一)沿背部正中線。自第一胸椎棘上突起。至第十二胸椎棘狀突起之線。凡九穴。

### 【九五】 大椎

位置 第一椎之上。陷中。

解剖的部位 在第七頸椎與第一胸椎之間。棘間韌帶及僧帽筋起始部。循橫頸動脈之分

枝。分布副神經。背椎神經。

療法 針四分。灸五壯乃至十五壯。

主治 間歇熱。肺氣腫。衄血。嘔吐。黃疸。歇斯的里。頸項部痙攣。齒齦炎。

【一五六】 陶道

位置 第一椎之下。垂頸取之。

解剖的部位 在第一第二胸椎之間。僧帽筋之起始部。循橫頸動脈之分枝。分布副神經及背椎神經。

療法 鍼四分。灸五壯。

主治 頸項部及肩胛部諸筋痙攣。間歇熱等。

【一五七】 身柱

位置 第三椎之下。

解剖的部位 在第三第四胸椎之間。僧帽筋起始部。循橫頸動脈下行枝。汲肋間動脈之背枝。分布胸椎神經之後枝。

療法 針四分。灸五壯乃至三十壯。

主治 喘息。癩癧。小兒搖擲。腦神經衰弱。氣管枝炎。衄血等。

【一五八】 神道

位置 第五椎之下。

解剖的部位 在第五第六胸椎之間。僧帽筋起始部。循胸背動脈。分布肩胛下神經。

療法 灸三壯。

主治 心臟諸病。頭痛。腦神經衰弱。頰頰炎。頰車脫臼。小兒搐搦。

【一五九】 口靈臺 (禁針禁灸)

位置 第六椎之下。

解剖的部位 在第六第七胸椎間。菱形筋起始部。循後肋間動脈分枝。分布背椎神經後枝。

說明 禁針禁灸。療法主治從畧。

【一六〇】 至陽

位置 第七椎之下。陷中。

解剖的部位 在第七第八胸椎之間。有薦骨脊柱筋。循後肋間動脈分枝。分布背椎神經後枝。

療法 針五分。灸七壯。

主治 腰背神經痛。胃部厥冷症。黃疸。食慾減退。腸雷鳴。

### 【二六二】 筋縮

位置 第九椎之下。

解剖的部位 在第九第十胸椎之間。僧帽筋起始部。循後肋間動脈。分布背椎神經後枝。

療法 鍼四分。灸三壯。

主治 癩癩 背脊神經痛。轉目上視。

### 【二六三】 中樞

位置 第十椎之下。陷中。

解剖的部位 在第十及第十一胸椎之間。當腰背筋膜之起始部。循後肋間動脈。分布背  
椎神經後枝。

案：原書不載療法主治。其他各書。不載此穴。

【一六三】 脊 中

位 置 第十一椎之下。

解剖的部位 在第十一胸椎棘狀突起之下及第十二胸椎之間。當腰背筋膜之起始部。循  
後肋間動脈。分布背椎神經後枝。

療 法 針四分。

主 治 癩痢。黃疸。腹部膨脹。食慾減退。腸出血。小兒脫肛。痔疾。

(二) 離背部正中線之外側一寸五分。在第一側綫。凡十穴。

【一六四】 大 杼

位 置 第一椎之下。相去一寸五分。陶道之旁。

**解剖的部位** 在第一胸椎棘上突起之兩旁。上層爲僧帽筋。下層爲菱形筋。及後上鋸筋。循橫頸動脈下行枝。分布脊椎神經之後枝。及胸廓神經。肋間神經。與僧帽筋副神經。

**療法** 針三分。灸七壯。

**主治** 氣管支加答兒。頭痛。眩暈。胸膜炎。癩癩。項筋收縮。腰背筋痙攣。膝關節炎。

### 【二六五】 風門

**位置** 第二椎之下。相去一寸五分。

**解剖的部位** 在第二及第三胸椎橫突起間之外側。有菱形筋。及後上鋸筋。循肩胛背動脈。分布脊椎神經之後枝。

**療法** 針五分。灸五壯乃至十壯。

**主治** 胸膜炎。顛頂部及頸項部癱瘓。氣管枝炎。百日咳。嗜眠。嘔吐。胸背部諸筋

瘰癧。癰疽。

### 【一六六】 肺 俞

位 置 第三椎之下。相去一寸五分。身柱之旁。

解剖的部位 在第三及第四胸椎橫突起間之外側。當僧帽筋及菱形筋與後上鋸筋中。循

上肋間動脈。及橫頸動脈下行枝。分布副神經。及後胸廓神經。與背椎神經後枝。肋間神經等。

療 法 針三分。灸七壯乃至二十壯。

主 治 肺結核。肺炎。肺出血。氣管枝炎。心內外膜炎。心臟麻痺。黃疸。贅瘤。骨膜炎。皮膚癬癩。口內炎。食後吐水。嘔吐。腰背神經痛。小兒佝僂病。龜背等。

### 【一六七】 厥 陰 俞

位 置 第四椎之下。相去一寸五分。

位置 第四椎之下。相去一寸五分。

解剖的部位 在第四及第五胸椎橫突起間之外側。有僧帽筋。菱形筋。後上鋸筋。薦骨

脊中筋。循肩胛背動脈。分布背椎神經之後枝。

療法 鍼三分。灸七壯。

主治 心臟肥大。心外膜炎。贅瘤。欬逆。嘔吐。齒神經痛。

【一六八】▲ 心 俞 (禁灸)

位置 第五椎之下。相去一寸五分。神道之旁。

解剖的部位 在第五及第六胸椎橫突起間之外側。有僧帽筋、菱形筋。薦骨脊中筋。循

後肋間動脈之背枝。及橫頸動脈之下行枝。分布背椎神經後枝。及肋間神經。

療法 鍼三分。

主治 心內膜炎。胃出血。嘔吐。癰癩。痞瘕。食道狹窄。癰疽。

【一六九】 膈 俞

位置 第七椎之下。相去一寸五分。至陽之旁。

解剖的部位 在第七及第八胸椎橫突起間之外側。有僧帽筋與薦骨脊柱筋。循後肋間動脈。分布背椎神經之後枝。

療法 針四分。灸七壯乃至二十壯。

主治 心臟內外膜炎。心臟肥大。心臟麻痺。胸膜炎。喘息。氣管枝炎。胃加答兒。胃癌。嘔吐。食道狹窄。食慾減退。腸加答兒。腸出血。骨膜炎。惡疽。四肢倦怠。自汗。盜汗等。

## 【170】 肝 俞

位置 第九椎之下。相去一寸五分。筋縮之旁。

解剖的部位 在第九及第十胸椎橫突起間之外側。有僧帽筋。背長筋。闊背筋。肋骨舉筋。薦骨脊柱筋。循後肋間動脈。分布背椎神經之後枝。右方深部容肝臟。

療法 針三分。灸七壯乃至二十壯。

主治 黃疸。熱病後眩暈。淚液過多。歇斯的里。慢性胃加答兒。胃擴張。胃痙攣。  
胃出血。氣管枝炎。肋間神經痛。胸骨部痙攣。腸出血。十二指腸蟲。

【一九一】 膽 俞

位置 第十椎之下。相去一寸五分。中樞之旁。

解剖的部位 在第十及第十一胸椎橫突起間之外側。上層有僧帽筋。下層有闊背筋。循後肋間動脈之背枝。分布副神經及背椎神經後枝。與肋間神經。

療法 針三分。灸三壯乃至十五壯。

主治 發熱。惡寒。頭痛。膽囊疾病。黃疸。嘔吐。食道狹窄。咽喉加答兒。腋下腺炎。肋膜炎。

【一九二】 脾 俞

位置 第十一椎之下。相去一寸五分。脊中之旁。

解剖的部位 在第十一及第十二胸椎橫突起間之外側。有僧帽筋及薦骨脊柱筋。循後肋

間動脈。分布背椎神經之後枝。

療法 針七分。灸七壯乃至二十壯。

主治 胃痙攣。胃弱。胃出血。腸加答兒。嘔吐。胆汁下痢。黃疸。喘息。食道狹窄。

。水腫病。

### 【〇七三】 胃 愈

位置 第十二椎之下。相去一寸五分。

解剖的部位 在第十二胸椎及第一腰椎橫突起端之中間。上層有闊背筋。下層有薦骨脊

柱筋。循後肋間動脈之背枝。分布背椎神經之後枝。汲肋間神經。內容腎臟。

療法 針七分。灸七壯乃至二十壯。

主治 胃痙。胃加答兒。胃痙攣。胃擴張。消化不良。腸加答兒。嘔吐。腹部膨脹。

腸雷鳴。肝臟肥大。視力缺乏。小兒夜盲。吐乳。青便。羸瘦。惡疽。十二指腸蟲。

(三) 離背部第一側線之外側一寸五分。在第二側線。凡十穴。

【二七四】 附分

位置 第二椎之下。相去三寸。風門之下。

解剖的部位 在第二胸椎棘狀突起下方兩旁三寸。第二肋骨之上緣。上層有僧帽筋。下

層有菱形筋。循橫頸動脈及上肋間動脈。分布脊神經。及肋間神經。與後胸

廓神經。副神經等。

療法 針三分。灸七壯。

主治 肩背神經痛及癱瘓。頸部痙攣。回顧不能。

【二七五】 魄戶

位置 第三椎之下。相去三寸。肺俞之旁。

解剖的部位 在第三及第四胸椎橫突起間之外方。有僧帽筋。菱形筋。循橫頸動脈。分

布背椎神經後枝。

療法 針五分。灸七壯乃至十五壯。

主治 肺萎縮。氣管枝炎。喘息。嘔吐。上膊部及肩背部之神經。聾。

【二十七】 膏盲

位置 第四椎之下相去三寸。厥陰俞之旁。

解剖的部位 在第四及第五胸椎橫突起間之外方。有僧帽筋。及菱形筋。循橫頸動脈下

行枝。分布背椎神經後枝。

療法 針三分。灸七壯乃至五十壯。

主治 肺結核。氣管枝加答兒。胃出血。神經衰弱。夢遺。失精。健忘。嘔吐。

【二十七】 神堂

位置 第五椎之下。相去三寸。心俞之旁。

解剖的部位 在第五及第六胸椎橫突起間之外方。有僧帽筋。及菱形筋。循橫頸動脈下

行枝。分布肩胛背神經及肋間神經。

療法 鍼三分。灸五壯。

主治 心臟病。氣管枝炎。喘息。背長筋痙攣。肩膊疼痛。

【一七八】 譙 譙

位置 第六椎之下。相去三寸。

解剖的部位 在第六及第七胸椎橫突起間之外方。有僧帽筋及菱形筋。循橫頸動脈下行

枝。分布肩胛背神經。及肋間神經。

療法 鍼三分。灸五壯乃至十五壯。

主治 心臟外膜炎。膈神經痛。腰背部痙攣。嘔吐。眩暈。盜汗。間歇熱。

【一七九】 膈 關

位置 第七椎之下。相去三寸。膈俞之旁。

解剖的部位 在第七及第八胸椎橫突起間之外方。有僧帽筋及背腸筋。循橫頸動脈。

分布肩胛背神經。及肋間神經。

療法 針五分。灸三壯乃至十五壯。

主治 背部痙攣。食道狹窄。嘔吐。吃逆。流涎。腸加答兒。

【一八〇】 魂門

位置 第九椎之下。相去三寸。肝俞之旁。

解剖的部位 在第九及第十胸椎橫突起間之外方。有闊背筋。循後肋間動脈背枝。分布

背椎神經。及肋間神經。

療法 鍼五分。灸三壯乃至十五壯。

主治 肝臟病。肋膜炎。心內膜炎。胃痙攣。腸雷鳴。食道狹窄。食慾減退。消化不

良。筋肉痿麻質斯。

【一八一】 陽綱

位置 第十椎之下。相去三寸。膽俞之旁。

解剖的部位 在第十及第十一胸椎橫突起間之外方。有闊背筋。循後肋間動脈。分布肩

胛下神經。及肋間神經。

療法 鍼五分。灸七壯。

主治 消化不良。胃痙攣。腹鳴。食慾減退。肝臟病。肋膜炎。心內膜炎。肌肉痿麻  
質斯。

【一八二】 意舍

位置 第十一椎之下。相去三寸。脾俞之旁。

解剖的部位 在第十一及十二胸椎橫突間之外方。有關背筋。循後肋間動脈。分布肩  
胛下神經。及肋間神經。

療法 針七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 消化不良。嘔吐。胃弱。直腹筋痙攣。腹鳴。食慾減退。肝臟病。肋膜炎。

【一八三】 胃倉

位置 第十二椎之下。相去三寸。胃俞之旁。

**解剖的部位** 在第十二胸椎及第一腰椎橫突起間之外方。循後肋間動脈。分布肩胛下神

經。及肋間神經。

**療法** 針七分。灸五壯乃至十壯。

**主治** 嘔吐。腹部膨脹。便秘。背椎神經痛。水腫病。

第九節 腰部 (參照第四圖)

(一)沿腰部正中線。自第一腰椎棘上突起。至尾閭骨尖端之線。凡五穴。

### 【一八四】 髂 樞

**位置** 第十三椎之下。

**解剖的部位** 在第一及第二腰椎棘上突起間。有薦骨脊柱筋。循後肋間動脈。分布腰椎

神經之後枝。

**療法** 針三分。灸七壯乃至十五壯。

**主治** 腰椎神經痙攣。急性腸加答兒。胃腸神經痛。

【一八五】 命門

位置 第十四椎之下。

解剖的部位 在第二、三、四、五腰椎棘上突起間。有薦骨脊柱筋。循後肋間動脈。分布腰椎神經之後枝。

療法 針三分。灸七壯乃至十五壯。

主治 頭痛。小兒腦膜炎。腸疝痛。腰神經痛。痔疾等。

【一八六】 陽關

位置 第十六椎之下。

解剖的部位 在腰椎之棘上突起間。有薦骨脊柱筋。循腰動脈。分布腰椎神經之後枝。

療法 針五分。灸五壯乃至十五壯。

主治 膝關節炎。腰椎神經痛。下腹膨脹。下痢。腸加答兒。

【一八七】 腰俞

位置 第三十一椎之下。伏取之。

解剖的部位 在薦骨管裂孔。腰骨筋膜中。循下腎動脈。分布薦骨神經後枝。

療法 針三分。灸五壯乃至十五壯。

主治 腰背神經痛。小兒夜尿症。月經閉止等。

### 【一八八】 長強

位置 脊骶之端。

解剖的部位 在尾閭骨之下部。薦骨韌帶之下端。即大臀筋與外肛門括約筋中。循下腎

動脈。及內陰部動脈。下痔動脈等。分布尾閭骨神經。及外痔神經。

療法 針三分。灸五壯乃至二十壯。

主治 慢性痔疾。腸出血。膽汗下痢。嘔吐。慢性搖擲等。

(二) 離腰部正中綫之外側。在第一側綫。凡七穴。

### 【一八九】 三焦俞

位置 第十三椎之下。相去一寸五分。髻樞之旁。

解剖的部位 在第一及第二腰椎棘狀突起間之外側。上層爲闊背筋。下層爲薦骨脊柱筋

。及方形腰筋。循腰動脈之背枝。分布背椎神經之後枝。

療法 針七分。灸七壯乃至二十壯。

主治 胃蹙攣。食慾減退。消化不良。嘔吐。腸加答兒。腸雷鳴。腎臟炎。腰椎神經痛。頭痛。眩暈。腦貧血。小兒腸加答兒。

### 【一九〇】 腎 俞

位置 第十四椎之下。相去一寸五分。命門之旁。

解剖的部位 在第二及第三腰椎橫突起間之外側。上層有腰背筋膜。下層有薦骨脊柱筋

。及方形腰筋。循腰動脈之背枝。分布腰椎神經之後枝。

療法 針五分乃至八分。灸三壯乃至十五壯。

主治 腎臟炎。肝臟肥大。膀胱麻痺及癱攣。痔疾。淋疾。糖尿病。尿血。腰椎神經

痛。精液缺乏。夢遺。失精。身體羸瘦。月經不順。胃出血。腸出血。肋間神經痛。

### 【一九一】 大腸俞

位置 第十六椎之下。相去一寸五分。腸關之旁。

解剖的部位 在第四及第五腰椎橫突起間之外側。有闊背筋。薦骨脊柱筋。大腰筋。循

腰動脈背枝。分布腰椎神經之後枝。

療法 針八分乃至一寸。灸七壯乃至二十壯。

主治 脊柱筋痙攣。腰椎神經痛。腹部膨脹。腸加答兒。腸雷鳴。腸出血。下痢。盲

腸炎。淋疾。遺尿。腎臟炎。

### 【一九二】 小腸俞

位置 第十八椎之下。相去一寸五分。上髻之旁。

解剖的部位 在第一及第二薦骨假棘狀突起間之外側。第五腰椎橫突起薦骨翼之間。有

腰背筋膜。薦骨脊柱筋。及方形腰筋。循腰動脈之背枝。分布薦骨神經。

療法 針八分乃至一寸。灸七壯乃至二十壯。

主治 腸加答兒。腸痙痛。下痢。便秘。淋疾。痔疾。背椎及腰椎薦骨部之神經痛。  
子宮內膜炎。

【一九三】 膀胱 俞

位置 第十九椎之下。相去一寸五分。次髻之旁。

解剖的部位 在第二及第三薦骨假棘狀突起間之外側。上層爲腰背筋膜。下層爲薦骨柱筋之起始部。循側薦骨動脈。分布腰椎神經之後枝。

療法 針八分乃至一寸。灸七壯乃至十五壯。

主治 膀胱加答兒。遺尿。便秘。下痢。腰椎神經痛。下腹神經痛。薦骨神經痛。子宮內膜炎。

【一九四】 中膞內俞

位置 第二十椎之下。相去一寸五分。中髑之旁。

解剖的部位 在第三及第四薦骨假棘狀突起間之外側。有腰背筋膜。中臀筋。循上臀動脈。分布薦骨神經之後枝。

療法 針六分乃至八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 糖尿病。腹膜炎。腸加答兒。腸神經痛。腰神經痛。

【一九五】 ▲ 白環俞 (禁灸)

位置 第二十一椎之下。相去一寸五分。下髑之旁。

解剖的部位 在薦骨裂孔之兩側。有大臀筋。及梨子狀筋。循下臀動脈。分布下臀神經。與薦骨神經之後枝。

療法 針七分。

案：原本不記禁灸。而無灸壯。甲乙經刺入八分。亦無灸壯。水穴註云。刺入五分。不宜灸。奧氏本刺八分。灸三壯。玉森氏本。禁灸。應列禁灸。

主治 薦骨神經痛及癱瘓。肛門諸筋癱瘓。坐骨神經痛。便秘。尿閉。子宮內膜炎。  
四肢麻痺。

(三)離腰部第一側線之外側一寸五分。在第二側綫。凡四穴。

【一九六】 盲門

位置 第十三椎之下。相去三寸。三焦俞之旁。

解剖的部位 在第一及第二腰椎橫突起間之外側。有方形腰筋。闊背筋。及薦骨脊柱筋。  
。循腰動脈之背枝。分布腰椎神經後枝。

療法 針七分。灸七壯乃至十五壯。

主治 胃癱瘓。常習便秘。乳腺炎。

【一九七】 志室

位置 第十四椎之下。相去三寸。腎俞之旁。

解剖的部位 在第一及第三腰椎橫突起間之外方。有方形腰筋。及闊背筋。循腰動脈背

枝。分布腰椎神經後枝。

療法 針七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 夢遺。失精。陰具神經痛。陰門膿腫。陰部諸瘡。腎臟炎。淋疾。消化不良。嘔吐。吐瀉。

### 【一九八】 胞 盲

位置 第十九椎之下。相去三寸。膀胱俞之旁。

解剖的部位 在第二及第三薦骨椎。假橫突起間之外方。有大臀筋小臀筋及梨子狀筋。

循上臀動脈。分布卜臀神經下臀神經。及坐骨神經之後枝。

療法 針七分。灸五壯乃至十壯。

主治 腸加答兒。腸雷鳴。便秘。尿閉。淋疾。睪丸炎。直腹筋痙攣。腰背部疼痛。

### 【一九九】 秩 邊

位置 一椎之下。相去三寸。白環俞之旁。

解剖的部位 在第三及第四薦骨椎假橋突起間之外方。有小臀筋。及梨子狀筋。循上臀動脈。分布上臀神經。下臀神經。及薦骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 加答兒性膀胱炎。腰相神經痛。坐骨神經痛。痔疾等。

(四)後薦骨孔及尾閭骨之外側。凡五穴。

### 【1100】 上 膠

位置 腰髀之下一寸。第十八椎之下。相去八分之第一空。

(腰髀。腸骨後上棘。第一空。第一後薦骨孔也。)

解剖的部位 在第一後薦骨孔部。有腰背筋膜。薦骨脊柱筋。循側薦骨動脈。分布薦骨神經之後枝。

療法 針八分乃至一寸五分。灸七壯乃至十五壯。

主治 便秘。尿閉。嘔吐。衄血。腰痛。坐骨神經痛。膝蓋部厥冷。子宮內膜炎。子

宮脫出。不妊症。月經不順。

### 【1017】 次 膠

位 置 第十九椎之下。相去五分之第四空。

解剖的部位 在第二後薦骨孔部。有腰背筋膜。薦骨脊柱筋。循側薦骨動脈。分布薦骨神經之後枝。

療法 針八分乃至一寸。灸七壯乃至十五壯。

主治 便秘。尿閉。嘔吐。衄血。腰痛。坐骨神經痛。膝蓋部厥冷。子宮內膜炎。子宮脫出。不妊症。月經不順。淋疾。翠丸炎。

### 【1018】 中 膠

位 置 第十九椎之下。相去七分之第三空。

解剖的部位 在第三後薦骨孔部。有腰背筋膜。薦骨脊柱筋。循側薦骨動脈。分布薦骨神經之後枝。

療法 針八分乃至一寸。灸七壯乃至十五壯。

主治 便秘。尿閉。嘔吐。腰痛。坐骨神經痛。子宮內膜炎。月經不順。腎丸炎。

【二〇三】 下髎

位置 第二十一椎之下。相去六分之第四空。

解剖的部位 在第四後薦骨孔部。有腰背筋膜。薦骨脊柱筋。循側薦骨動脈。分布薦骨

神經之後枝。

療法 針六分乃至八分。灸七壯乃至十五壯。

主治 便閉。尿閉。腰痛。子宮內膜炎。月經不順。腸出血。

【二〇四】 會陽

位置 陰尾骨之下。相去五分。

解剖的部位 在尾閭骨下端之兩側。大臀筋之起始部。有肛門舉筋。肛門括約筋。循下

痔動脈。分布會陰神經。

**療法** 針四分。灸五壯。

**主治** 腸加答兒。腸出血。慢性痔疾。陰部汗濕。

(五) 肩胛部。凡十三穴。

### 【1105】 肩 中 俞

**位置** 肩胛之內廉。去大椎之旁二寸。

**解剖的部位** 在第一胸椎棘上突起之兩側。有僧帽筋。菱形筋。循上肋間動脈。及肩胛

動脈之分歧。分布肋間神經分枝。肩胛背神經。及背椎神經之後枝。

**療法** 針三分乃至六分。灸五壯乃至十壯。

**主治** 氣管枝炎。喘息。頸項部痙攣。唾血。視力缺乏。

### 【1106】 肩 外 俞

**位置** 肩胛之上廉。去脊三寸。

**解剖的部位** 在第二肋骨後端之上緣。有僧帽筋。項長肋筋。後上鋸筋。及菱形筋。循

橫頸動脈。分布背椎神經。副神經。後胸廓神經。

療法 針六分。灸三壯乃至十壯。

主治 肩胛部神經痙攣。上膊部麻痺及厥冷。

【二〇七】 肩井

位置 肩之上。陷中。

解剖的部位 在肩胛舉筋與棘上筋之間。有僧帽筋。循橫肩胛動脈。分布肩胛上神經。

及副神經。

療法 針四分乃至六分。灸七壯乃至十五壯。

主治 腰痛。頸項部痙攣。前膊疼痛。衝心性脚氣。半身不隨。中風。腦神經衰弱。

產後子宮出血。眩暈。早產後下肢厥冷。

【二〇八】 天髻

位置 肩井之後一寸。

解剖的部位 在肩胛骨之上部。有僧帽筋及棘上筋。循橫肩胛動脈。分布肩胛上神經。

及副神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 頸項部痙攣。頸項部厥冷。

### 【二〇九】 秉 風

位置 挾天髻。在外肩之上。

解剖的部位 在肩胛棘起始部之上際。即僧帽筋部。下層爲棘上筋之集合部。循橫肩胛

動脈。分布肩胛下神經及副神經。

療法 鍼五分。灸七壯。

主治 肩胛部痙攣及麻痺。上膊部疼痛。

### 【一一〇】 曲 垣

位置 肩之中央。陷中。

解剖的部位 在肩胛棘隅之上際。有僧帽筋及肩胛舉筋。循橫肩胛動脈。分布肩胛上神經及副神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 肩胛部痙攣。上膊部疼痛。

### 【二二二】 巨骨

位置 肩端之上。兩叉骨之間。陷中。

(兩叉骨之間。鎖骨與肩胛相聯之間也。)

解剖的部位 在肩骨棘與鎖骨外端之間。上層為三角筋。下層為棘上筋之集合部。循肩

胛動脈分枝及腋窩靜脈 分布腋窩神經及肩胛上神經。前胸廓神經。

療法 針六分。灸五壯乃至七壯。

主治 小兒搖擺。下齒神經痛。胃出血。上膊部麻痺疼痛。肩臂屈伸不能。

### 【二二三】 天宗

位置 乘風之後。大骨之下。陷中。

(大骨。肩胛棘也。)

解剖的部位 在肩胛骨之棘下筋部。淺層有僧帽筋。循橫肩胛動脈。分布肩胛上神經及

副神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 肩項痠痛及麻痺。上膊部疼痛。上肢上舉不能。

### 【二二三】 臑 愈

位置 肩髃之後。大骨之下。

解剖的部位 在肩胛骨關節窩之後方。三角筋中。循橫肩胛動脈。分布腋窩神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 肩胛部及上膊部疼痛。頸領部腫痛。

### 【二二四】 肩 髃

位置 肩之端。臑之上。

解剖的部位 在肩峯突起與上膊骨大結節及鎖骨之關節部。三角筋上緣之中央。循後廻旋上膊動脈及腋窩靜脈。分布腋窩神經。鎖骨上神經。及肩胛上神經。

### 【二二五】 肩髃

位置 肩之端。兩骨之間。

(兩骨。肩峯突起與上膊頭也。)

解剖的部位 在肩胛骨肩峰突起之下際。即上膊骨與鎖骨之關節部。上層爲三角筋。下層爲棘下筋集合部。循前廻旋上膊動脈。及腋下靜脈。分布腋窩神經。及肩胛上神經。

療法 針七分。灸五壯乃至七壯。

主治 肩胛部及上肢癱瘓。

### 【二二六】 臑會

位置 去肩三寸。

解剖的部位 在上膊後面之上部。即三角筋停止部之外緣。下層有三頭膊筋。循後迴旋

上膊動脈及中頭動脈。分布後膊皮下神經。

療法 鍼五分乃至七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 前膊諸筋痙攣及麻痺。肩胛部癩瘡。頸項部血瘤。脂肪瘤。

### 【二七】 ▲ 肩 貞 (禁灸)

位置 曲胛之下。肩髃之後。

解剖的部位 在肩峯突起後下方一寸之所。即肩峯突起與上膊骨之關節部。上層爲三角

筋移緣。下層有棘下筋。循後迴旋上膊動脈。分布肩胛上神經及腋下神經。

療法 針五分乃至七分。

主治 耳鳴。耳聾。肩胛部疼痛。關節炎。四肢麻痺。

### 第十節 上肢 (參照第五圖)

(一) 自上膊之前外側。經肘窩至拇指撓側爪端之線。凡九穴。

【二一八】 ▲ 天府 (禁灸)

位置 腋下三寸。臑之內廉。

解剖的部位 在上膊骨之內側上部。即二頭膊筋部。循腋窩動靜脈。及上膊動脈之分枝

• 分布撓骨神經。正中神經。內外中膊皮下神經。

療法 鍼四分。

(案：原本及他書皆禁灸。王森氏本灸七壯。)

主治 氣管枝炎。眩暈。精神病。慢性關節炎。上膊神經痛。瓦斯中毒。間歇熱。近

視眼。衄血。

【二一九】 俠白

位置 天府之下一寸。

解剖的部位 在上膊骨之內側中央部。即二頭膊筋。與內膊筋之間。循上膊動脈及頭靜

脈。分布內外腓皮下神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 心臟病。胸部神經痛。心悸亢進。乾嘔。

【三二〇】▲尺澤 (禁灸)

位置 肘之中。約文之上。

(約文。肘窩之橫皺也。)

解剖的部位 在橈骨與上膊之關節部。當二頭膊筋腱之外緣。膊橈骨筋起始部之內緣。

循尺骨及橈骨動脈。分布橈骨神經。正中神經。

療法 針三分。

主治 肺結核。咯血。氣管枝炎。肋膜炎。喘息。四肢運動麻痺。膀胱麻痺。精神病

。前膊部痙攣。小兒疳積。

【三二一】孔最

針灸學講義 經穴學

位置 腕上七寸。

解剖的部位 在迴前筋之停止部。上層爲膊頭骨筋之內緣。下層爲長屈拇筋之外緣。循

橈骨動脈。通頭靜脈。分布外膊皮下神經及橈骨神經。

療法 針五分。灸五壯。

主治 肺出血。咳嗽。嘶啞失聲。咽喉加答兒。

### 【三三三】 列缺

位置 腕上一寸五分。

解剖的部位 在內橈骨筋腱之外側。長屈拇筋之外緣。迴前方筋中。循橈骨動脈之分枝

。通頭靜脈。分布外膊皮下神經及橈骨神經。

療法 針二分。灸七壯。

主治 顏面痛及麻痺。橈骨部諸筋組織炎。

### 【三三三】 ▲ 經渠 (禁灸)

**位 置** 腕上一寸。寸口脈中。

**解剖的部位** 在內橈骨筋腱之外部。迴前方筋中。循橈骨動靜脈之通路。及頭骨動脈。

分布外膊皮下神經及橈骨神經。

**療法** 針二分。

**主治** 扁桃腺炎。喘息。食道痙攣。嘔吐。吃逆。欠伸等。

### 【三三四】 太淵

**位 置** 掌後。陷中。

**解剖的部位** 在內橈骨筋腱之外側。迴前方筋之下緣。舟狀骨結節之外上部。循橈骨動

脈及頭靜脈。分布外膊皮下神經及橈骨神經。

**療法** 針二分。灸三壯。

**主治** 肺臟肥大。肺及氣管枝出血。咳嗽。胸部神經痛。前膊神經痛。

### 【三三五】 ▲ 魚際 (禁灸)

位置 大指本節後之內側。

解剖的部位 在第一掌骨之後側與舟狀骨之關節部。即短外轉拇筋之停止部。循橈骨動

脈。分布正中神經。

療法 針三分。

主治 頭痛。眩暈。胃出血。舌上黃色。

【三三六】 ▲ 少商 (禁灸)

位置 大指之內側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在拇指第二節之前外側。爪甲之發生根部。有拇指內轉筋。循橈骨動脈之

終枝。分布橈骨神經之前枝。

療法 針一分。灸一壯乃至三壯。

主治 腦充血。頰頰組織炎。食道狹窄。黃疸。吃逆。口內出血。舌下軟瘤。重舌。

唇焦。手指痙攣。小兒慢性腸加答兒。小兒乳蛾。

(二)上膊前面之正中。肘窩之內側。經中指攙側爪端之綾。凡八穴。

### 【三三七】 天泉

位置 曲腋之下二寸。舉肘取之。

解剖的部位 在上膊骨前內側。三頭膊筋部。循上膊動脈。分布內膊皮下神經筋枝。

療法 針四分。灸三壯。

主治 心內膜炎。上腹部膨脹。吃逆。視力缺乏。

### 【三三八】 曲澤

位置 肘之內廉。約文之上。曲肘取之。

解剖的部位 在肘窩之正中上膊骨與前膊骨之關節部。二頭膊筋腱間。循上膊動脈及貴

要靜脈。分布中膊皮下神經。及正中神經。

療法 鍼三分。灸五壯。

主治 心臟炎。氣管枝加答兒。臂肘神經痛。嘔吐。惡疽。

【三九】 郄門

位置 掌後五寸。

解剖的部位 在橈骨與尺骨之中間。長屈拇筋與淺屈指筋之間。循尺骨動脈之枝別。前骨間動脈。分布正中神經。

療法 鍼四分。灸五壯。

主治 胃出血。衄血。咳逆。歇私的里。

【四〇】 間使

位置 郄門之下二寸。兩筋之間。掌後三寸。

(兩筋之間。長屈拇筋之腱與淺屈指筋之腱之間也。)

解剖的部位 在橈骨與尺骨之中間。長屈拇筋與淺屈指筋之間。循前骨間動脈。分布正中神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 心臟炎。咽喉加答兒。胃加答兒。中風。憂鬱症。月經不調。子宮充血。小兒抽搐及夜啼。

【III】 內關

位置 間使之下一寸。兩筋之間。掌後二寸。

解剖的部位 在橈骨與尺骨之中間。長屈拇筋與淺屈指筋之間。循前骨間動脈。分布正

中神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 心臟炎。心外膜炎。黃疸。眼球出血。肘臂神經痛。產後血暈。

【III】 大凌

位置 掌後兩筋之間。

解剖的部位 在腕關節之前面橫紋正中之陷凹部。迴前方筋之下緣。有橫腕韌帶。循尺

骨動脈。橈骨動脈。分布正中神經。

療法 針三分。灸五壯乃至七壯。

主治 心臟炎。心外膜炎。胸膈神經痛。腋下腺炎。尿色赤黃。扁桃腺炎。頭痛發熱。

。疥癬。急心胃加答兒。胃出血。

【三三三】 A 勞宮 (禁灸)

位置 掌之中央。

解剖的部位 在第二掌骨與第三掌骨之間。手掌腱膜中。循手掌動脈。分布正中神經。

療法 針二分乃至三分。

(案：原本灸七壯乃至十壯。甲乙經灸三壯。玉森氏本禁灸。)

主治 血壓亢進。血管硬化。鵝口瘡。黃疸。衄血。小兒衄爛。

【三三四】 中衝

位置 中指之內側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在中指第三節爪根之發生根部外側。即總指伸筋腱之附着部。循指掌動脈。

。分布橈骨神經手背枝。

療法 針一分。灸三壯。

主治 心臟炎。心內外膜炎。小兒夜啼。

(三) 自上膊之前內側。腋窩之前壁。經上膊內上髁之前側。至小指橈側爪端之線。凡九穴。

【三三五】 極泉

位置 腋下毛中。近胸筋之間。

解剖的部位 在大胸筋停止部之外側。與肩胛下筋之間。循腋窩動脈及肩胛動脈。分布內膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯。

主治 心臟炎。肋間神經痛。胸脇神經痙攣。歇斯的里。臂肘厥冷。

【三三六】 青靈 (禁針)

針灸學講義 經穴學

位 置 肘上三寸。

解剖的部位 在上膊骨之前內側。上層爲二頭膊筋內緣。下層爲內膊筋之接際部陷中。

循上膊動脈。腋窩動脈之分枝。及貴要靜脈。分布內膊皮下神經。

療法 灸五壯。

主治 眼珠黃色。前額神經痛。肋間神經痛。肩胛及上膊痙攣。間歇熱。惡寒。

### 【三七】 少海

位 置 肘大骨之內廉。

(大骨。上膊骨內上髁也。)

解剖的部位 在鶯嘴突起之內側。二頭膊筋腱之旁。內膊筋停止部之內緣。循返廻尺骨

動脈。分布尺骨神經之通路。正中神經。及中膊皮下經。

療法 針二分乃至三分。灸三壯乃至五壯。

主治 腺病毒。手指厥冷。精神病。齒痛。肋間神經痛。顏面神經痛。項筋收縮。回

顧不能。

【三三八】 靈道

位置 掌後一寸五分。

解剖的部位 在尺骨下部之前內緣。內尺骨筋腱之橈骨側。迴前方筋中。循尺骨動脈。

分布尺骨神經之通路。中膊皮下神經。

療法 鍼三分。灸三壯乃至五壯。

主治 心內膜炎。歇斯的里。急性舌骨筋麻痺。乾嘔。臂肘部疼痛。

【三三九】 通里

位置 掌後一寸。

解剖的部位 在內尺骨筋與淺屈指筋之間。循尺骨動脈。分布尺骨神經之通路。中膊皮下神經。

下神經。

療法 鍼三分。灸三壯乃至五壯。

**主治** 頭痛。眩暈。神經性心悸亢進。扁桃腺炎。急性舌骨筋麻痺。眼球充血。上肢痙攣。歇斯的里。月經過多。子宮出血。遺尿。

【二四〇】 陰郄

**位置** 掌後五分。

**解剖的部位** 在內尺骨筋腱與淺屈指筋之間。循尺骨動脈。分布尺骨神經之通路。中膊皮下神經。

**療法** 鍼三分。灸三壯乃至七壯。

**主治** 頭痛。衄血。眩暈。神經性心悸亢進。扁桃腺炎。急性舌骨筋麻痺。胃出血。

惡寒發熱。逆上。子宮內膜炎。

【二四一】 神門

**位置** 掌後銳骨之端。

(銳骨。豆骨也。)

解剖的部位 在豆骨與尺骨之關節部。即內尺骨筋之停止部。循深掌側動脈。分布尺骨

神經。

療法 針三分。灸五壯乃至七壯。

主治 心臟肥大。胃出血。衄血。鼻腔閉塞。尿道麻痺。食慾減退。子宮內膜炎。產

後血暈。癩瘰。神經性心悸亢進。扁桃腺炎。

### 【四四二】 少府

位置 手小指本節之後。直勞宮。

解剖的部位 在第四掌骨與第五掌骨之間。即小指屈筋之停止部。循指掌動脈。分布尺

骨神經之指掌枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 肋間神經痛。尿閉。子宮脫出。陰門癢癢。臆內神經痛。

### 【四四三】

位置 小指之內側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在小指第三節之外側。爪廓之發生根部。循指掌動脈。分布尺骨神經之指

掌枝。

療法 針一分。灸三壯乃至五壯。

主治 瘰癧後衰弱。膈膜炎。肋間神經痛。神經性心悸亢進。上肢神經癱瘓。喉頭加

答兒。

(四) 自上膊之外側三角筋停止部。經上膊骨外上髁之前側。至示指之橈側爪端之線。

凡十四穴。

### 【二四四】 臂 臑

位置 肘之上七寸。肩髃之下三寸。

解剖的部位 在上膊骨之外側。三角筋停止部。循後迴旋上膊動脈及頭靜脈。分布腋窩

神經。及後膊皮下神經。

療法 針三分乃至五分。灸七壯乃至十五壯。

主治 上膊神經痛。顛頂部諸筋痙攣。瘰癧。

【二四五】 ○ 五里 (禁針)

位置 肘上三寸。臂臑之下三寸。

解剖的部位 在上膊骨之外側。三頭膊筋外緣。深部爲螺旋狀溝之下部。循橈骨側副動

脈。分佈後膊皮下神經。及橈骨神經。

療法 灸七壯。

主治 肺炎。腹膜炎。咳嗽。癱瘓質斯。腺病。前膊神經痛。四肢麻痺。嗜眠。瘰癧。

【二四六】 肘髎

位置 肘之大骨外廉。

(大骨。上膊骨外上髁也。)

解剖的部位 在膊橈骨筋之起始部。三頭膊筋外緣。循返廻橈骨動脈。及中頭靜脈。分布膊皮下神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 上膊神經痛。肩膊部之關節痿麻質斯。上肢麻痺。肩胛部及臂部麻痺。

【四十七】 曲池

位置 肘外之輔骨。

(肘外之輔骨。上膊骨下端之小頭。與橈骨上端小頭之關節部也。)

解剖的部位 在上膊骨之外上髁。與橈骨之關節部。深部有膊橈骨筋。循返廻橈骨動脈

。分布橈骨神經之分岐部。外膊皮下神經。

療法 針五分乃至八分。灸五壯乃至十壯。

主治 扁桃腺炎。上膊神經痛。肩胛神經痛。臂肘神經痛。半身不隨。中風。胸膜炎等。

【二四八】 三里

位置 曲池之下二寸。

解剖的部位 在橈骨上緣之外部。腓橈骨筋與長外橈骨筋之間。下層有廻後筋。循橈骨

動脈之分枝。及頭靜脈。分布橈骨神經之後枝。外膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯乃至十壯。

主治 齒神經痛。頰頰組織炎。瘰癧。肘臂神經麻痺。半身不隨。中風。顏面神經麻

痺。乳癰。

【二四九】 上廉

位置 三里之下一寸。

解剖的部位 在橈骨小頭前下部。腓橈骨筋與長外橈骨筋之間。循尺骨動脈之分枝。分

布尺骨神經。及外膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯乃至十壯。

主治 勝脫括約筋麻痺。淋疾。半身不隨。中風。喘息。腸雷鳴。

【四五〇】 下廉

位置 上廉之一寸。曲池之下四寸。

解剖的部位 在橈骨小頭前下部。膊橈骨筋與長外橈骨筋之間。循橈骨動脈之分枝。分

布橈骨神經。及外膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯。

主治 勝脫麻痺。尿黃色。便血。下腹部痙攣。腸雷鳴。心胸神經痛。喘息。乳癰。

【四五一】 溫溜

位置 下廉之一寸。曲池之下五寸。

解剖的部位 在膊橈骨筋與長外橈骨筋之間。循橈骨動脈之分枝。分布橈骨神經。及外

膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯乃至三十壯。

主治 腸雷鳴。下腹癱攣。舌炎。舌肥大。加答兒性口內炎。癰疔。

### 【二五〇】 信歷

位置 腕後三寸。

解剖的部位 在總指伸筋腱與拇指伸筋腱之間。循橈骨動脈。分布橈骨神經之後枝。汲外膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 衄血。耳鳴。耳聾。齒神經痛。肩胛肘腕部神經癱攣。癩癩。咽喉乾燥。扁桃腺炎。

### 【二五三】 陽谿

位置 置腕中之上側。兩筋之間。

解剖的部位 在舟狀骨橈骨之間。橈腕關節外面之陷中。當短伸拇筋與長伸拇筋之間。循橈骨動脈。汲頭靜脈。分布橈骨神經。汲外膊皮下神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 頭痛。耳鳴。耳聾。扁桃腺炎。齒神經痛。半身麻痺。

【二五四】 合谷

位置 手之大指次指。岐骨之間。

解剖的部位 在第一掌骨與第二掌骨之骨間中央部。長伸拇筋與總指伸筋之腱膜間。循

橈骨動脈。分布橈骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 頭痛。肩胛神經痛。角膜白翳。視力缺乏。耳聾。耳鳴。衄血。下齒神經痛。

扁桃腺炎。

【二五五】 三間

位置 手之大指次指。內側本節之後。

解剖的部位 在固有示指伸筋腱之外緣。循指掌動脈及頭靜脈。分布橈骨神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 扁桃腺炎。呼吸困難。肩背神經痛。上膊神經痛。下齒痛。舌肥大。口腔乾燥。  
。唇焦。腸雷鳴。下痢。眼臉癢痛等。

### 【五六】 二間

位置 大指次指之內側。本節之前。

解剖的部位 在總指伸筋腱之附着部。循指背動脈。及頭靜脈。分布橈骨神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 喉頭加答兒。扁桃腺炎。食道狹窄。急性口輪諸筋萎縮。頷膊組織炎。肩背上膊神經痛。齒神經痛。

### 【五七】 商陽

位置 大指次指之內側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在總指伸筋末端附着部。循指背動脈。及頭靜脈。分布橈骨神經之指背枝。

療法 鍼一分。灸三壯。

主治 胸膜膨大症。喘息。間歇熱。發汗。腦充血。顏面組織炎。扁桃腺炎。頤頷炎。  
。口部諸筋萎縮。口內炎。喉頭加答兒。下齒神經痛。耳聾。耳鳴等。

(五) 自上膊後側之中部。經尺骨鷹嘴突起。至無名指之尺側指端之線。凡十二穴。

【二五八】 消 瘰

位置 肩之下。臑之外。

解剖的部位 在上膊骨結節之後下方。螺旋狀溝部。有三頭膊筋。循橈骨動靜脈。中頭

靜脈。分布後膊皮下神經。及橈骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 頭痛。頸項部組織炎及痙攣。麻痺。肩胛部諸筋痙攣。癩癧。關節僵麻質斯

【三五九】 清冷淵

位置 肘上二寸。

解剖的部位 在上膊之後側。鶯嘴突起之尖端上方。三頭膊筋內緣。循下尺側副動靜脈

。分布內膊皮下神經。及尺骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 肩胛部痙攣。上肢痙攣及麻痺。

【三六〇】 天井

位置 肘外。大骨之上一寸。

解剖的部位 在上膊之後面。鶯嘴突起之上方。三頭膊筋腱之內緣。循肘關節動靜脈網

。分布內膊皮下神經。及尺骨神經。

療法 針三分乃至五分。灸三壯乃至五壯。

主治 氣管枝炎。咽喉加答兒。癆瘵症。耳聾。眼臉緣炎。頸項神經痛。腰椎神經痛

。中風。

### 【KIRI】 四瀆

位 置 肘前五寸。

解剖的部位 在橈骨與尺骨之間。總指仙筋與外尺骨筋之間。循骨間動脈。分布橈骨神

經之後枝。及下膊皮下神經。

療法 針六分。灸三壯乃至七壯。

主治 咽喉加答兒。腎臟炎。前膊痙攣及麻痺。耳聾。下齒痛。

【KIRI】 ○ 三陽絡 (禁鍼)

位 置 腕後四寸。

解剖的部位 在橈骨與尺骨之間。總指伸筋與小指伸筋之陷中。下層有長屈拇筋短屈拇

筋。循骨間動脈。分布橈骨神經之後枝。及下膊皮下神經。

療法 灸七壯。

主治 耳聾。下齒神經痛。寄生蟲。眼疾。

【二六三】 支溝

位置 腕後三寸。兩骨之間。

(兩骨。即橈骨與尺骨也。)

解剖的部位 在橈骨與尺骨之間。總指伸筋與外尺骨筋之間。循骨間動脈。穿布後下膊

皮下神經。及正中神經。

療法 針五分。灸五壯。

主治 限局性攣攣。肋膜炎。惡寒發熱。上膊神經痛。急性舌骨筋癱瘓。嘔吐。常習便秘。產後血暈。

【二六四】 會宗

位置 腕後三寸。支溝之旁。

解剖的部位 在尺骨筋固有小指伸筋之間。有總指伸筋。循後骨間動脈。分布橈骨神經

之分枝。沿後下膊皮下神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 舞蹈病。聽覺器麻痺。皮膚疼痛。

【二六五】 外關

位置 腕後二寸。

解剖的部位 在總指伸筋與固有小指伸筋之間。循後骨間動脈。分布後下膊皮下神經。

沿橈骨神經之後枝。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 耳聾。臂肘神經痛。上肢關節炎。

【二六六】 ▲ 陽池 (禁灸)

位置 手之表。腕之上。陷中。

(手之表。即手背之側也。)

解剖的部位 在尺骨與腕骨之關節部。有總指伸筋。循腕骨背側動脈。分布後下膊皮下神經。尺骨神經。及橈骨神經後枝。

療法 針三分。

主治 間歇熱。糖尿病。腕關節炎。

### 【二六七】 中渚

位置 手之小指次指。本節之後。

解剖的部位 在第四掌骨之前下方。小指側之骨間陷中。循第四骨間指動脈。分布尺骨

神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 眩暈。頭痛。耳聾。咽喉腫痛。角膜白翳。臂肘神經痛。關節炎。手之五指屈伸不能。

### 【二六八】 液門

針灸學講義 經穴學

位置 手之小指次指。本節之前。

解剖的部位 在環指第一節與第二節之中間。小指之側。總指伸筋腱中。循第四骨間指背動脈。分布尺骨神經。

療法 針一分。灸三壯。

主治 頭痛。耳聾。齒齦炎。角膜白翳。肘臂部痙攣。

### 【二六九】 關衝

位置 小指次指之外側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第四指骨第三節之內側。爪甲之發生根部。即總指伸筋之附着部。有固有小指筋。循手背動脈。分布尺骨神經之手骨枝。

療法 針一分。灸三壯。

主治 乾嘔。頭痛。食慾減退。臂肘神經痛。角膜白翳等。

(六)於上膊後側之下部。自上膊骨內上髁。與尺骨鷹嘴突起之間。至小指尺側之爪端

之線。凡八穴。

【二七〇】 小海

位置 肘之大骨外廉。去肘之端五分。

解剖的部位 在上膊骨與尺骨之中間。鶯嘴突起之後側。尺骨筋起始部。循下尺骨副動脈。分布尺骨神經之主幹。

療法 針二分。灸五壯。

主治 頸骨部組織炎。肩膊肘臂諸筋神經痛及痙攣。眼球黃色。聽覺器麻痺。齒齦炎。舞蹈病。下腹神經痛。

【二七一】 支正

位置 腕後五寸。

解剖的部位 在尺骨後面之中央。外尺骨筋中。循骨間動脈。分布尺骨神經及中膊皮下神經。後下膊皮下神經。

療法 鍼六分。灸三壯乃至七壯。

主治 精神病。腦神經衰弱。眩暈。頭痛。顏面充血。上膊神經痛。臂肘痙攣。手指疼痛。握手不能。眼瞼麥粒腫。

【二七二】 養老

位置 手之髌骨上一空。腕上一寸。

(髌骨。尺骨莖狀突起一空。與莖狀突起之上際凹陷部也。)

解剖的部位 在尺骨莖狀突起之正中。外尺骨筋腱側。循腕骨背側動脈。分布尺骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 肩臂運動神經痙攣及麻痺。眼球充血。視力減退。

【二七三】 陽谷

位置 手之外側。腕中銳骨之下。陷中。

(腕中銳骨・尺骨莖狀突起也。)

解剖的部位 在尺骨莖狀突起之下際。固有小指筋之內部。循腕骨背側動脈。分布尺骨

神經之手背枝。

療法 鍼三分。灸三壯乃至五壯。

主治 眩暈。耳鳴。耳聾。癩癩。口內炎。齒齦炎。頰頰組織炎。肋間神經痛。尺骨

神經痛。小兒搖擺。乳食不能。

#### 【一七四】 腕骨

位置 手之外側。腕之前。

(外側。小指側也。)

解剖的部位 在第五掌骨腕骨之間。外尺骨筋之停止部。於外轉小指伸筋中。有豆骨掌

骨韌帶。循腕骨背側動脈。分布尺骨神經之分歧。

#### 【一七五】 後 谿

位置 手之小指外側。本節之後。陷中。

解剖的部位 在第五掌骨內側部之前下方。短小指屈筋之旁。有外轉小指筋。循指背動脈。分布尺骨神經之分歧。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 胸膜不全症。頸項痙攣。回顧不能。肘臂痙攣。癩痢。衄血。耳聾。角膜炎。白膜翳。疥瘡。

### 【二七六】 前谷

位置 手小指本節之前。外側。陷中。

解剖的部位 在第五指骨第一節基底。第五掌骨之關節部前內側。短小指屈筋之旁。有外轉小指筋。循指背動脈。分布尺骨神經之分歧。

療法 針二分。灸三壯。

主治 癩痢。咳嗽。吐血。扁桃腺炎。頰部爛衝。耳鳴。鼻孔閉塞。前膊神經痛。產

後乳閉。

### 【二十七】 小澤

位置 小指之外側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第五指骨第三節內側爪甲之發生根部。總指伸筋腱之停止部。有外轉小指筋。循尺骨動脈之指背枝。分布尺骨神經之指背枝。

療法 鍼一分。灸三壯乃至五壯。

主治 咳嗽。頭痛。扁桃腺炎。心臟肥大。前膊神經痛。頸項神經痙攣。白膜翳。產後乳閉。

### 第十一節 下肢 (參照第六圖)

(一) 自鼠蹊窩之中部。經大腿骨內上髁。勿過內踝之前側。跗趾外側(小趾側)爪端之  
緣。凡十二穴。

### 【二十八】 陰廉

位置 羊矢之下。去氣衝二寸。陰股皺襞之中。

(羊矢。鼠蹊部之淋巴腺也。)

解剖的部位 在恥骨突起之下端。內轉筋之內緣。循外陰部動脈。分布股神經及腰鼠蹊

神經。

療法 鍼三分。灸三壯。

主治 不妊症。子宮後屈症。

### 【二十七九】 五里

位置 陰廉之下一寸。

解剖的部位 在恥骨突起下端。長內轉股筋之內緣。復外陰部動脈。分布股神經及閉鎖

神經。

療法 針五分。灸五壯。

主治 胸膜炎。慢性感冒後衰弱。

【二八〇】 陰包

位 置 膝上四寸。股之內廉。兩筋之間。

(兩筋。大腿前側之筋與內側之筋也。)

解剖的部位 在大腿內側上四上方。四頭股筋之內緣。循股動脈及上外膝關節動脈。分

布內股皮下神經。

療法 針五分。灸三壯。

主治 腰臀部痙攣。下肢疔攣。尿閉。月經不順。

【二八一】 曲泉

位 置 膝內輔骨之下。橫紋頭。曲膝取之。

解剖的部位 在脛骨內關節隙下際。半腱及半膜樣筋之停止部。循膝關節動脈。分布脛

骨神經。及窩微神經。

療法 針六分。灸三壯乃至七壯。

主治 腸神經痛。陰股神經痛及癱瘓。胸腹部癱瘓。四肢神經痛。尿閉。陰門瘡癤。  
陰門腫痛。子宮脫出。

【二八二】 膝關

位置 犢鼻之下二寸旁。陷中。

解剖的部位 在脛骨內側之上部。有腓腸筋。循膝關節動脈及脛骨動脈。分布脛骨神經。  
。及蓋薇神經。

療法 針四分。灸五壯。

主治 關節癱瘓質斯。膝關節內側疼痛。

【二八三】 中都

位置 內踝之上七寸。胛骨之中。

(胛骨。脛骨體之後緣也。)

解剖的部位 在脛骨部。有脛骨筋。循脛骨動脈分枝。分布脛骨神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 膝關節炎。咽喉加答兒。

【二八四】 蠡溝

位置 內踝之上五寸。

解剖的部位 在脛骨之內面。有脛骨筋及比目魚筋。循後脛骨動脈。分布脛骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 腸神經痛。下腹痙攣。神經性心悸亢進症。脊髓炎。下肢麻痺。尿閉。子宮內

膜炎。月經不順。

【二八五】 中封

位置 內踝之前一寸。

解剖的部位 在第一楔狀骨內側、舟狀骨節之上部。前脛骨筋腱之外側。循前內踝動脈

。汲前脛骨動脈之枝別。內跗骨動脈。分布大盞薇神經。汲深腓骨神經。

療法 鍼四分。灸三壯乃至五壯。

主治 膀胱加答兒。淋疾。黃疸。食慾減退。全身麻痺。下肢冷却。

### 【二八六】 太衝

位置 足之大趾本節之後二寸。

解剖的部位 在第一第二蹠骨與第一楔狀骨關節之前部。長伸跖筋與短伸跖筋之間。循趾背動脈。分布淺在腓骨神經。及內足蹠神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 胸膈神經痛。腰神經痛。下腹痙攣。淋疾。子宮出血。

### 【二八七】 行間

位置 大趾與次趾之間。本節之後。

解剖的部位 在第一及第二蹠骨間腔。內轉跖筋之附着部。循趾背動脈。分布淺在腓骨神經。及內足蹠神經。

療法 針三分。灸五壯乃至七壯。

主治 腦貧血。腹膜炎。神經性心悸亢進。腸神經痛。便秘。遺尿。陰莖痛。糖尿病。月經過多。小兒急性搐搦。

### 【二八八】 大敦

位置 大趾之外側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第一跖骨第二節之外側爪甲之發生根部。即短伸跖筋腱中。循趾背動脈。  
• 分布趾骨神經之終枝。

療法 針三分。灸五壯乃至七壯。

主治 上腹部及臍部膨脹又冷却。腸疝痛。腰神經痛。便秘。遺尿。陰莖痛。淋疾。糖尿病。月經過多。子宮脫出。

(二)自大腿前內側之中部。經膝蓋骨之內側。勿過內踝之中部。至跖趾之內側爪端之綫。凡十一穴。

【二八九】○箕門（禁針）

位置 股之內廉。魚腸之上。兩筋之間。血海之上六寸。動脈應手。

（魚腸。股之內側軟所也。兩筋。大腿內側之筋與前側之筋也。動脈。股動脈也。）

解剖的部位 在大腿骨內部。有縫匠筋、薄股筋、汲內大股筋。循股動脈。分布皮下神

經。閉鎖神經。股神經。

療法 鍼五分。灸三壯。

按 原本禁針。甲乙經刺入三分。延命山玉森氏本針五分。

主治 淋疾。尿閉。遺尿。風蹠腺炎。

【二九〇】血海

位置 膝膑之上。內廉。白肉之際二寸中。

（膝膑。膝蓋骨也。白肉。大腿前側之筋也。）

解剖的部位 在大腿骨前下部。有內大股筋。循膝關節動脈。分布內股皮下神經。及

投神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 腹膜炎。月經不順。子宮出血。子宮內膜炎。

【二九二】 ▲ 陰 陵 泉 (禁灸)

位置 膝內輔骨之下。陷中。

(內輔骨。大腿骨下端之內關節髌。與脛骨下端之內關節髌合。)

解剖的部位 在下腿內側之上位。脛骨頭之關節窩。比目魚筋與腓腸筋三角腔。二頭股

筋之附着部。循後脛動脈。分布薔薇神經。脛骨神經。

療法 針五分乃至八分。

主治 上腹部厥冷。胸膜炎。消化不良。限局性痙攣。吐瀉。腸神經痛。遺尿。尿閉

。隱內炎。

【二九三】 地 機

位置 膝下五寸。內髁之上八寸。

解剖的部位 在脛骨後內緣。有比目魚筋。循後頸骨動脈之分枝。分布頸骨神經。蓋微神經。

療法 鍼四分。灸三壯乃至七壯。

主治 腰痛。食慾減退。胃癱攣。尿閉。精液缺乏。月經痛。

【一九三】 漏谷

位置 內髌之上六寸。地機之下二寸。

解剖的部位 在下腿中央之內側。比目魚筋部。循後脛骨動脈之分枝。分布蓋微神經。

脛骨神經。

療法 鍼四分。灸三壯乃至七壯。

主治 腹鳴。腹部膨脹。消化不良。肩胛部疼痛。脚氣。歇斯的里。

【一九四】 三陰交

位置 內髌之上三寸。骨下陷中。

(骨下。伸下腿於前取之。)

解剖的部位 在脛骨後內側。後脛骨筋與長總趾屈筋之間。循後脛骨動脈。分布蓋薇神經。脛骨神經。

療法 針四分。灸三壯乃至十壯。

主治 胃阿篤尼症。食慾減退。消化不良。腹部膨脹。腸疝痛。腹鳴。下痢。四肢厥冷及倦怠。下肢疼痛及麻痺。尿閉。痔疾。小兒遺尿。陰莖疼痛。遺精。早漏。月經過多。子宮出血。產後腦貧血。婦人生殖器病。腳氣。動脈硬化。血壓亢進。

### 【二九五】 商丘

位置 內髁之下少前。陷中。

解剖的部位 在內髁前下部之陷凹中。十字韌帶之下側。前脛骨筋與長伸姆筋之縫間。

循內趾骨動脈。分布脛骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 腹部膨脹。腹鳴。嘔吐。便秘。痔疾。消化不良。黃疸。歇斯的里。百日咳。

【二九六】 公孫

位置 足之大趾本節之後一寸。

解剖的部位 在第一蹠骨與第一楔狀骨之關節內側。有外轉跖筋及長伸跖筋。循足背動

脈。分布著微神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 心臟炎。肋膜炎。胃痛。嘔吐。食慾減退。下腹痙攣。腸出血。頭部及顏面浮

腫。癩癩。

【二九七】 大白

位置 足大趾本節之後。

解剖的部位 在第一蹠骨末端之內側。楔狀骨結節之下陷凹中。有外轉跖筋。循足背動

脈。分布脛骨神經之足躡枝。

療法 針三分。針三壯乃至五壯。

主治 胃癆瘵。嘔吐。消化不良。便秘。腸疝痛。腸出血。腰痛。下肢疼痛及麻痺。

【二九八】 太都

位置 足大趾本節之前。

解剖的部位 在跖指第一節之前。外轉跖筋停止部。循足背動脈。分布脛骨神經之足躡枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 全身倦怠。心內膜炎。胃癆瘵。直腹筋癆瘵。腰痛。惡疽。小兒瘧瘵。

【二九九】 ▲ 隱白 (禁灸)

位置 足大趾之端。去內側爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第一趾第二節之末端內緣。爪甲之發生根部。外轉跖筋之腱膜中。循趾

背動脈。分布淺腓骨神經。及內足蹠神經。

療法 針一分。灸三壯乃至五壯。

案：原本禁灸。甲乙經灸三壯。延命山玉森氏本灸三壯乃至五壯。

主治 腹膜炎。急性腸加答兒。下肢厥冷。月經過多。小兒痙攣。

(三)於膝關節之內側。自大腿骨內上髁之後側。勿過內髁之後側至足之內緣。更至足蹠之中部線。凡十穴。

【三〇〇】 陰谷

位置 膝之內輔骨之後。大筋之間。

(內輔骨。大髌骨下端之內關節髌。與脛骨上端之內關節髌合。大筋。半腱樣筋及半膜樣筋之腱。與腓腸筋內頭也。)

解剖的部位 在脛骨內關節髌之內緣後部。有半腱樣筋及半膜樣筋。循膝關節脈分枝。

分布膝關節神經。股神經。及脛骨神經。

療法 針四分。灸三壯。

主治 大腿內側部疼痛。膝關節炎。下腹膨脹。淋疾。陰萎。陰莖痛。膿內炎。大陰唇炎。陰門瘙癢。子宮出血。

### 【MOL】 築 寶

位置 內踝之上五寸。脛分之中。

(脛分。腓腸也。)

解剖的部位 在比目魚筋與腓腸筋下垂部之境。循脛骨動脈。分布脛骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 精神病。鉛毒症。胎毒。比目魚筋痙攣。

### 【MOID】 復 溜

位置 築寶之下三寸。內踝之上二寸。

解剖的部位 在脛骨後部。有後脛骨筋。汲長總趾伸筋。循後脛骨動脈。分布淺在腓骨

神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 脊髓炎。腹膜炎。淋疾。睪丸炎。腹鳴。水腫病。下肢麻痺。盜汗過多。腰部痠痛。齶齒痛。

### 【三〇三】 交信

位置 內踝之上二寸。復溜之前。三陰交之後下方一寸。

解剖的部位 在脛骨後部。有後脛骨筋。及長總趾伸筋。循後脛骨動脈。分布淺在腓骨神經。

療法 針四分。灸三壯乃至七壯。

主治 淋疾。尿閉。便秘。腸加答兒。下腹偏痛。水腫病。內股神經痛。月經不調。子宮出血。子宮脫。

### 【三〇四】 水泉

位置 大絡之下一寸。

解剖的部位 在跟骨結節之內側前上四陷部。有長伸跗筋。及外轉跗筋。循後脛骨動脈。分布脛骨神經。

療法 鍼四分。灸五壯。

主治 月經不通。月經減少。近視眼。

【三〇五】 照海

位置 內踝之下一寸。陷中。

解剖的部位 在跟骨與舟狀骨之間。陷中。外轉跗筋中。循後脛骨動脈。分布脛骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 咽喉乾燥。四肢倦怠。歇斯的里。扁桃腺炎。腹疝痛。陰莖膨起過多。淋疾。

子宮脫出。月經不調。

【三〇六】 太鐘

位置 足跟之上。大谿之下。水泉之上。橫紋之中。

解剖的部位 在阿喜利氏腱（即腓腸筋及比目魚筋之下端。附着跟骨強大之腱。）之內側

。陷中。有長腓骨筋。循後脛骨動脈。分布脛骨神經之分歧。

療法 鍼三分。灸三壯乃至七壯。

主治 神經性心悸亢進。歇斯的里。口內炎。嘔吐。食道狹窄。便秘。淋疾。子宮癰  
瘰。

### 【三〇七】 大谿

位置 內踝之後。跟骨之上。動脈。

（動脈。後脛骨動脈也。）

解剖的部位 在內踝與跟骨之間。陷中。循後脛骨動脈。分布脛骨神經之分歧。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 熱病後四肢厥冷。心內膜炎。肋膜炎。橫膈膜痙攣。咽喉加答兒。口內炎。臨

息。咳嗽。吃逆。嘔吐。便秘。子宮痙攣。

【三〇八】 然谷

位置 內踝之前。起骨之下。

解剖的部位 在舟狀骨與楔狀骨之關節部。外轉跗筋與長屈跗筋附着部之間。循後脛骨動脈。分布脛骨神經。及內足蹠神經。

療法 針五分。灸三壯乃至五壯。

主治 咽喉炎。心臟炎。扁桃腺炎。流涎。嘔吐。盜汗。膀胱加答兒。尿道加答兒。睪丸炎。精液缺乏。遺尿。糖尿病。不妊症。月經不調。子宮充血。子宮脫出。陰唇充血。陰門瘻。瘡毒症。小兒強直癱瘓。

【三〇九】 湧泉

位置 足心陷中。曲足卷趾取之。

解剖的部位 在跗趾根膨隆部之後外側。長屈跗筋之外側。短總趾屈筋之內側。循後脛

骨動脈之末枝。內足蹠動脈。分布頸骨神經之末枝。內足蹠神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 舌骨筋麻痺。嘎嘶失聲。咳嗽。急性扁桃腺炎。心臟炎。心悸亢進。黃疸。眩暈。子宮下垂。不妊症。

(四)自大轉子之前側。經腓骨小頭。勿過外踝之中部。至第四腓側爪端之線。凡十四穴。

### IIIIOI 環跳

位置 髀樞之中。

(髀樞。大轉子也。)

解剖的部位 在大腿骨大轉子與髀臼關節上緣中間之後部。上層有大臀筋。下層有中臀

筋。循上臀動脈。分布薦骨神經之後枝。

療法 針一寸。灸七壯乃至二十壯。

主治 血管硬化。腰部大腿部及膝部組織炎。坐骨神經痛。

【三二一】 中瀆

位置 髌骨之外。膝上五寸。肌肉之間。陷中。

(髌骨。外股也。)

解剖的部位 在大腿之外側。股鞘與外大股筋之間。循外迴旋股動脈。分布外股皮下神經。上臀神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 下肢麻痺及痙攣。脚氣。

【三二二】 ▲ 陽關 (禁灸)

位置 外輔骨之上。膝之旁。陽陵泉之上三寸。

解剖的部位 在大腿骨外上髁之上際。四頭股筋停止部之外側。二頭股筋髓之前方。循

上外膝關節動脈。分布股神經之分歧。

療法 針五分。

主治 膝關節炎。大腿部麻痺。

【三三三】 陽 陵 泉

位置 膝之下。筋之外廉。

解剖的部位 在腓骨小頭之前下部。長腓骨筋與長總趾伸筋之間。循前脛骨動脈之分枝

。及後返廻脛骨動脈。分布腓骨神經。

療法 針六分。灸七壯乃至十壯。

主治 膝關節炎。血管硬化。顏面浮腫。常習便秘。脚氣。下肢痙攣。舞蹈病。坐骨

神經痛。

【三三四】 陽 交

位置 外踝之上七寸。

解剖的部位 在腓骨部。有長總趾伸筋及長腓骨筋。循前腓骨動脈之分枝。分布深腓骨

神經之分枝。

療法 針六分。灸三壯乃至十壯。

主治 喘息。肋膜炎。歇斯的里。坐骨神經痛。

【三二五】 外丘

位置 外踝之上七寸。陽交稍後。

解剖的部位 在腓骨與脛骨之間。長總趾伸筋與長腓骨筋之間。循前脛骨動脈。分布淺

腓骨神經。

療法 針四分。灸三壯。

主治 肋膜炎。頸項部疼痛。惡寒發熱。小兒狗僕病。癩癩。

【三二六】 光明

位置 外踝之上五寸。

解剖的部位 在腓骨之前緣。長總趾伸筋與長腓骨筋之間。後部有比目魚筋與腓腸筋。

循前脛骨動脈。分布淺腓骨神經。

療法 鍼六分。灸七壯。

主治 脛腓部疼痛。精神痛。

【三一七】 陽輔

位置 外踝之上四寸。

解剖的部位 在腓骨與脛骨之間。有長總趾伸筋與長腓筋。循前腓骨動脈。分布深腓骨

神經。

療法 針六分。灸五壯乃至十五壯。

主治 腰痛。膝關節炎。全身疼痛。腰部冷却。內外皆疼痛。扁桃腺炎。腋下腺炎。

瘰癧。

【三一八】 懸鐘

位置 外踝之上三寸。

解剖的部位 在腓骨之前緣。長總趾伸筋與長腓筋之中央。循前腓骨動脈。分布淺腓骨神經。

療法 針六分。灸五壯乃至十五壯。

主治 肋膜炎。胃擴張。腳氣。扁桃腺炎。腎臟炎。衄血。鼻孔乾燥。頸項部疼痛。下肢疼痛。中風。血管硬化症。

### 【三一九】 丘墟

位置 外踝之下如前。陷中。

解剖的部位 在腰腓關節下端與跗骨之關節部。長總趾伸筋腱中。循前外踝動脈。及腓骨動脈穿行枝。分布淺腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 肺充血。肋膜炎。呼吸困難。腸疝痛。腋下腫痛。角膜炎。白膜翳。腓腸筋瀝。攣。

【三三〇】 臨泣

位置 足小趾次趾本節後之間。陷中。去俠谿一寸五分。

解剖的部位 在第四蹠骨之後外側與第五蹠骨之後內側之間。長及短總趾伸筋腱中。循外跗骨動筋。分布脛骨神經交通枝。

療法 針三分。灸五壯。

主治 間歇熱。全身麻痺及疼痛。心內膜炎。眩暈。呼吸困難。月經不順。乳房炎。

【三三一】 ▲ 地五會 (禁灸)

位置 足小趾次趾本節之後。陷中。

解剖的部位 在第四蹠骨與第五蹠骨間腔之中央前端部。循外跗骨動脈。分布脛骨神經交通枝。

療法 針二分。

主治 腋下疼痛。乳房炎。

## 【第三】 俠絡

位置 足小趾次趾本節之前。

解剖的部位 在第四趾骨與第五趾骨第一節之前。歧骨之間。長及短總趾伸筋腱附着部。  
。循趾背動脈。分布趾背神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 肋間神經痛。耳聾。眩暈。外眥炎。頰頰炎。下肢麻痺。

## 【第三】 竅陰

位置 足小趾次趾之端。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第四趾骨第三節之外側。爪甲之發生根部。長及短總趾伸筋附着部之外側。循趾背動脈。分布趾背神經。

療法 針一分。灸三壯乃至五壯。

主治 肋膜炎。心臟肥大。噎逆。頭痛。口內乾燥。耳聾。眼球疼痛。乳癰。

(五)自大腿前側之上部。經膝蓋骨之外側。勿過外踝之前側。至第二趾外爪側端之綫。凡十五穴。

【三三四】 髀關

位置 膝上一尺二寸。

解剖的部位 在腸骨前下棘之外下側。內有大腿骨。循大髀筋部之上髀動脈。分布外股

皮下神經。閉塞神經。腰鼠蹊神經。

療法 針六分。灸三壯乃至七壯。

主治 腰痛。內外股筋痙攣。膝蓋部厥冷。下肢麻痺。閉塞神經痛。

【三三五】 伏兔

位置 膝上六寸。起肉之間。

(起肉之間。大腿前側之筋與內側筋之間也。)

解剖的部位。在大腿骨之前外側。直股筋之外端。循外迴旋股動脈之分枝。分布外股皮

下神經。及股神經筋枝。

療法 針六分。灸三壯乃至七壯。

主治 膝蓋部厥冷。下肢痙攣及冷却。癩疹。頭痛。脚氣。

【三二六】 ▲ 陰 市 (禁灸)

位置 膝上三寸。伏兔之下。

解剖的部位 在子腿骨之前外側。有外大股筋。循外迴旋股動脈下行枝。分布外股皮下

神經。及股神經筋枝。

療法 鍼四分。灸三壯乃至五壯。

案：原本禁灸。延命山、玉森氏本灸三壯乃至五壯。甲乙經灸三壯。

主治 腰部大腿部膝蓋部冷却及麻痺。脚氣。腹水。子宮痙攣。糖尿病。

【三二七】 梁 丘

位置 膝上二寸。

解剖的部位 在大腿骨之前外側。有外大股筋。循外廻旋股動脈下行枝。分布外股皮下神經。及股神經分枝。

療法 針四分。灸五壯。

主治 腰痛。膝蓋部疼痛及麻痺。乳房炎。乳頭痛。

【三二八】 犢鼻

位置 膝下。胫骨上大筋之中。

(筋骨。脛骨結節也。大筋。膝蓋鞞帶也。)

解剖的部位 在脛骨上端之外側。即膝蓋鞞帶之外下側。循膝關節動脈網。分布股神經

。脛骨及腓骨神經之關節枝。

療法 針三分灸三壯。

主治 膝關節炎。膝蓋部疼痛及麻痺。脚氣。

【三二九】 三里

位置 膝下三寸。去胫骨之外一寸。

〔胫骨。脛骨體前緣也。〕

解剖的部位 在脛骨上端與腓骨小頭關節部之下方。有前脛骨筋。與長總趾伸筋。循前

脛骨動脈。及返迴脛骨動脈。分布深腓骨神經。及脛骨神經。

療法 針五分乃至八分。灸七壯乃至二十壯。

注意 未滿七歲之小兒。不可灸。

主治 消化不良。胃痙攣。食慾減退。羸瘦。口腔疾患。腹膜炎。腹鳴。便秘。動脈

硬化。血壓亢進。四肢倦怠及麻痺。腳氣。頭痛。眩暈。逆上。眼疾。神經系

諸疾患。

### 【三三〇】 巨虛上廉

位置 三里之下三寸。

解剖的部位 在脛骨與腓骨之間。即前脛骨筋與長總趾伸筋之間。循前脛骨動脈。分布

深腓骨動脈。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 腸加答兒。腸疝痛。腹鳴。大腸冷却。消化不良。脚氣。四肢麻痺。

【三三二】 條口

位置 上廉之下二寸。

解剖的部位 在脛腓兩骨之間。有長總趾伸筋。循前脛骨動脈。分布深腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 下肢麻痺。膝關節炎。脚氣。

【三三三】 巨虛下廉

位置 條口之下一寸。

解剖的部位 在脛腓兩骨之間。有長總趾伸筋。循前脛骨動脈。分布深腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 肋間神經痛。下腹部痙攣。扁桃腺炎。腦貧血。流涎。食慾減退。脚氣。

【三三三】 豐隆

位置 外踝之上八寸。

解剖的部位 在脛腓兩骨之間。有長總趾伸筋。循前脛骨動脈。分布深腓骨神經。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 肋膜炎。肝臟炎。下肢痙攣及麻痺。精神病。頭痛。便秘。尿閉。歇斯的里。

【三三四】 解谿

位置 外踝之前。衝陽之後一寸五分。足腕之上。陷中。

解剖的部位 在前脛骨筋之腱與長總趾伸筋之間。當環狀韌帶部。循前脛骨動脈。分

布深腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 顏面浮腫。眩暈。頭痛。癩癩。歇斯的里。下腹膨脹。便秘。

【三三五】 街 陽

位置 內庭之上五寸。骨間動脈。

(骨間動脈。足背動脈也。)

解剖的部位 在足背之最高所。第二第三楔狀骨與第二第三蹠骨之關節部。當長伸拇筋

與短伸拇筋之間。循背骨間動脈。分布淺腓骨神經。

療法 鍼三分。灸三壯乃至五壯

主治 顏面麻痺。齒痛。齒齦炎。癩癩。嘔吐。腹部膨脹。食慾減退。下肢麻痺。

【三三六】 陷 谷

位置 內庭之上二寸。

解剖的部位 在第二第三蹠骨間之中央前端部。有短總趾伸筋腱。循前脛骨動脈之總枝

。分布淺腓骨神經。及深腓骨神經。

療法 針三分。灸三壯。

主治 顏面浮腫。眼球充血。欠伸。腹鳴。腸疝痛。間歇熱。

【第七】 內庭

位置 足大趾與次趾之外間。陷中。

解剖的部位 在第二趾骨第一節之前外部。長及短總趾伸筋腱中。循第一骨間足背動脈

。分布深腓骨神經。及淺腓骨神經。

療法 針三分。灸五壯。

主治 間歇熱及發汗。顏面神經麻痺。上齒齦炎。衄血。欠伸。咽喉癢等。

【第八】 厲兌

位置 足大趾次趾之外間。陷中。

解剖的部位 在第二趾骨第三節之背面外側。爪甲之發生根部。常長總趾伸筋附着部。

循前脛骨動脈之終枝。分布淺及深腓骨神經之末枝。

療法 針一分。灸三壯。

主治 肝臟炎。消化不良。腦貧血。精神病。扁桃腺炎。齒齦炎。鼠蹊神經痛。腹水。  
• 水腫病。口輪笑筋萎縮。急性鼻加答兒。

(六)自大轉子與坐骨結節之間。徑膝阻窩之中部。勿過外踝之後側。至小趾之外側爪端之線。凡十八穴。

【三三九】 ▲ 承扶 (禁灸)

位置 尻臀之下。陰股之上。約文之中。

(尻臀。爲臀肉。陰股與內股也。約文。臀皺襞也。)

解剖的部位 在臀下皺襞橫紋之中央。即大臀筋之下際。有大內轉股筋。循下臀動脈。

分布下臀神經後枝。及坐骨神經。

療法 鍼八分。

主治 腰背神經痛及痙攣。痔疾。便秘。尿閉。臀部癩瘡。坐骨神經痛。

【三四〇】 ▲ 殷門 (禁灸)

位置 承扶之下六寸。

解剖的部位 在大腿後面之中央部。即二頭股筋與半模樣筋之間。循股動脈。分布坐骨神經。

療法 針七分。

主治 腰背部疼痛。大腿部痠衝及痙攣。坐骨神經痛。

#### 【三四一】 浮郤

位置 委陽之上一寸。曲膝取之。

解剖的部位 在大腿後下部外側。二頭股筋內側。循膝膕動脈之分枝。分布膝膕神經。腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 吐瀉。限局性疝氣。便秘。尿閉。下肢外側麻痺。

#### 【三四二】 委陽

位 置 膈中外廉。兩筋之間。曲膝取之。

(膈中。爲膝膈窩。兩筋。二頭股筋之腱與股鞘也。)

解剖的部位 在二頭股筋之內側。循膝膈動脈。分布膝膈神經。腓骨神經。

療法 針七分。灸三壯乃至五壯。

主治 腰背部痙攣。膝膈窩神經痛。腓腸筋痙攣。下腹痙攣。癩癩。

【三四三】 ▲ 委 中 (禁灸)

位 置 膈之中央。約文中之動脈。

(動脈。膝膈動脈也。)

解剖的部位 在大腿骨與下脛骨之關節部。腓腸筋之二頭間，循膝膈動脈。分布脛骨神

經。

療法 針五分。灸三壯乃至五壯。

主治 下腹膨脹。膝關節炎。大腿關節炎。中風。

【三四四】合陽

位置 腓中約文之下二寸。委中之下二寸。

解剖的部位 在腓腸筋部。循後脛骨動脈。分布後脛骨神經。膝關神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 腰背疼痛。下腹痙攣。膝關部組織炎。腸出血。睪丸炎。子宮出血。子宮內膜炎。

【三四五】承筋（禁針）

位置 腓腸之中央。

（腓腸。腓腸部也。）

解剖的部位 在腓腸筋部。循後脛骨動脈。分布後脛骨神經。

療法 灸三壯乃至七壯。

主治 限局性痙攣。吐瀉。便秘。痔疾。腰背部痙攣。腓腸部痙攣及麻痺。

【三四六】 承山

位置 腓腸之下。分肉之間。陷中。

解剖的部位 在腓腸筋部。循後脛骨動脈。分布後脛骨神經。

療法 針七分。灸五壯乃至十五壯。

主治 限局性痙攣。吐瀉。便秘。淋疾。脚氣。小兒痙攣。

【三四七】 飛陽

位置 外踝之上七寸。骨之後。

(骨之後。腓骨後側也。)

解剖的部位 腓骨之外側部。當腓腸筋之外緣。循腓骨動脈。分布腓骨神經。

療法 針五分。灸三壯乃至七壯。

主治 痺疾。關節痿麻質斯。脚氣。眩暈。癰瘤。

【三四八】 附陽

位置 外踝之上三寸。

解剖的部位 在腓骨之外側部。有腓腸筋。循前腓骨動脈。分布深腓骨神經。

療法 針五分。灸五壯乃至七壯。

主治 限局性痙攣。吐瀉。腰痛。顏面神經痛。大腿部神經痛。四肢麻痺。

### 【三〇九】 崑崙

位置 外踝之後。跟骨之上。陷中。

解剖的部位 在外髁阿斯利氏腔之中央陷凹中。循後外髁動脈。分布淺腓骨神經。及脛

骨神經。

療法 鍼三分乃至五分。灸三壯乃至七壯。

主治 頭痛。眩暈。衄血。肩背部痙攣。腰痛。坐骨神經痛。跟蹠關節炎。脚氣。腺

病。佝僂病。陰門腫痛。

### 【三〇〇】 僕參

針灸學講義 經穴學

位置 跟骨之下。陷中。

解剖的部位 在跟骨結節後下部之稍。偏於外側之所。即阿斯利氏腕停止部之外側。循

腓骨動脈之枝別。分布淺腓骨神經。及脛骨神經交通枝。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

主治 脚氣。淋疾。膝關節炎。腓腸筋及足蹠筋麻痺。限局性痙攣。癩癩。

【三五】 ▲ 申脈 (禁灸)

位置 外側之下。陷中。入爪。

解剖的部位 在外髁之微下。外轉小趾筋之上端。循腓骨動脈穿行枝。分布脛骨神經交

通枝。

療法 針三分。灸三壯乃至七壯。

案：原本禁灸。其他各書。不列禁灸。

主治 頭痛。眩暈。腰部及下肢疼痛。脛骨部麻痺。動脈硬化症。子宮痙攣。

## 【三五〇】 金門

位置 外踝之下一寸。

解剖的部位 在外踝之前下方五分。跟骨與骰子骨間之陷凹部。短總趾伸筋中。循腓骨

動脈穿行枝。分布脛骨神經交通枝。

療法 鍼五分。灸三壯乃至七壯。

主治 前頭痛。下腹痙攣。腹膜炎。膝蓋部麻痺。嘔吐。限局性痙攣。癩癩。小兒搐搦。

## 【三五二】 京骨

位置 足之外側。大骨之下。

(大骨。骰子骨也。)

解剖的部位 在足背與足趾之境界部。骰子骨與第五趾骨關節部之陷中。有外轉小趾筋。循足背動脈之分枝。分布外足趾神經之深枝。

療法 針三分乃至五分。灸三壯乃至七壯。

主治 心臟病。腦膜炎。腦充血。腰痛。間歇熱。佝僂病。

【三五四】 束骨

位置 足小趾之外側本節之後。

解剖的部位 在第五跖骨之側前部。長總趾伸筋腱中。循足背動脈之分歧。分布外足蹠

神經之深枝。

療法 針三分。灸三壯乃至五壯。

主治 頭痛。眩暈。耳聾。淚管狹窄。內眦炎。眼球黃色。顛頂部疼痛。項筋收縮。

回顧不能。腰背神經痛。腓腸筋痙攣。癱、疽、疔瘡等惡腫物。

【三五五】 通谷

位置 足小趾外側本節之前。

解剖的部位 在第五趾第一節之前外側。長總趾伸筋腱中。循趾骨動脈。分布趾背神經

療法 針二分。灸三壯乃至五壯。

主治 頭痛。眩暈。嘔血。頸項部疼痛。慢性胃加答兒。

### 【第五六】 至陰

位置 足小趾外側。去爪甲。如韭葉。

解剖的部位 在第五趾與三節之外側。爪甲之發生根部。長總趾伸筋附着部之外緣。循

趾背動脈。分布趾背神經。

療法 針二分。灸三壯。

主治 頭痛。鼻孔閉塞。眼球充血。白膜翳。尿閉。失精。

## 經穴學終

杉山  
眞傳  
百法鍼術

(綾裝仿古一全册)

本書爲日本管針鼻祖杉山和一翁授徒之本。外間向少流傳。日本針灸醫師欲得是書者。往往以重金向其門人。私抄孤本。奉爲枕秘。輕易不肯示人。其名貴可想。本社以是書對於鍼術手技。頗關重要。爰轉輾託東京延命山鍼灸學院上谷講師覓得藏本。倩本社撰譯員常熟繆召予先生譯述印行。全書述針術手技百有十二法。名目繁多。不及細述。學者依書練習。自有得心應手之樂。書已付印。出版後再行通告。

# 高等針灸學講義

## 乙 孔穴學

孔穴學者。爲日本文部省經穴調查會審定之經穴也。以我國衛生署。尙無經穴調查會之設立。爰依照日本文部省審定之穴。以爲根據。並介紹其歷史及其審定之理由如下。

大正二年。文部省經穴調查會既成立。爰命醫學博士三宅秀。醫學博士理學博士大澤岳太郎。醫學博士文學博士富士川游。富岡兵吉。町田則文。吉田弘道諸氏爲經穴調查會委員。以專其責。閱時六載。始克完成。其審查之結果。於經穴六百六十穴之中。除刪去身體局部無關重要之穴外。得下記之一百二十穴。

諸穴之中。除頭部正中線。腹部正中線。及背部正中線外。於身體左右所存在之孔穴合算之。得一百二十一穴。比古經穴幾少去三分之一。

從來取穴。雖有折量分寸法。而其說未能劃一。故用解剖學上之位置。俾讀者得知孔穴

準確之部位。

本編所示橫徑。在成人以術者之指爲標準。在小兒則以被術者（即小兒自身）之指爲標準。孔穴學之名稱。以歷史上關係。經富士川氏涉獵古針灸科諸書而定。其部位經大澤氏由於解剖學的觀察。而慎加訂定。復經吉田富岡二氏針灸屍體。指示其部位而加確定。以爲標準。

### 第一章 穴名及部位

#### 第一節 頭部 顏面部 頸部 （參照第一圖）

#### 【一】頭部正中線

自眉間中央後方起點向後方。走正中至頂部之線。凡六穴。

神庭 眉間上方四指橫徑。

（此穴在眉間正中之上。相當於髮際部。）

顛會 大顛門部。

(此穴在前頭骨與左右顛頂骨前上隅之縫合部。即前頭顛門。)

百會 旋毛之中陷。連於左右顛頂結節綫之中央部。

(此穴自頭蓋正中綫與左右顛頂結節。引橫線。而相當於十字紋之部。)

後頂 自百會後方約一指半橫徑。自外後頭結節約三指橫徑部。

(此穴在顛頂骨後上隅之縫合部。即後頭顛門。)

腦戶 外後頭結節之直上部。

(此穴相當於外後頭結節之直上部。)

瘡門 自外後頭結節下方二指橫徑部。

(此穴相當於項部之正中髮際。)

【一】 頭部第一側線

自上眼窠孔起點。離正中綫之外方二指橫徑。於正中綫並行。至後方之線。凡四穴。

曲差 神庭之外方二指橫徑部。

(此穴當眼之瞳孔上方。相當於髮際。)

承光 曲差之後方二指半橫徑部。

(此穴相當於冠處縫合部。前頭顱門之外側。)

通天 承光之後方二指橫徑部。

(此穴相當於百會之外側二指橫徑。)

天柱 當瘳門之外方二指橫徑部。僧帽筋腱之外側。

(此穴相當於後頸部之髮際。僧帽筋腱之外側。)

### 【三】 頭部第二側線

自顳顬線之起始部起點。離正中線之外方四指橫徑。於第一側線並行。至後方之線。

凡五穴。

臨泣 神庭外方四指橫徑部。

(此穴相當於顛頂結節部。)

腦空 承靈之後方二指橫徑部。

(此穴當乳嘴突起之上方。相當於顛頂結節與外後頭結節之中間。)

風池 腦空之後方髮際。陷中。相當於僧帽筋與胸鎖乳嘴筋之間。

【四】額部

額部凡二穴。

攢竹 眉毛內端之下方。正中線之外方一指橫徑部。

陽白 眉毛中央之上方一指橫徑部。

【五】顛顛部

顛顛部凡三穴。

頭維 顛顛窩之前上部。神庭之外方約四指半橫徑部。

(此穴爲顛顛窩之前上部。相當於髮際。)

曲髮 額骨弓上方約一指橫徑之凹陷部。

(此穴爲額骨弓之上方。相當於髮際。)

紫竹空 眉毛外端凹陷部。

【六】 顛頂部

顛頂部凡二穴。

率谷 顛頂結節下方一指橫徑部。

竅陰 乳嘴突起基底之後方部。

【七】 耳前部

耳前部凡二穴。

上關 額骨弓之上際部。

聽會 耳珠下。少前方之凹陷部。

【八】 耳下部

耳下部凡一穴。

翳風 耳垂與乳嘴突起間之凹陷部。

【九】 顏面部

顏面部凡九穴。

迎香 鼻翼之旁凹陷部。

(此穴爲鼻唇溝之上部。)

四白 下眼窩緣之下方一指橫徑部。

巨髎 鼻孔之外方約一指橫徑部。

(此穴當第一小白齒齦部)。

地倉 口角之外方半指橫徑部。

下關 顴骨弓之下方。下顎關節前方之凹陷部。

頰車 下顎骨隅之後端部。

大迎 下顎骨隅之前方約一指半橫徑部。

頰髎 頰骨之下緣部。

(此穴相當於頰骨結節之下緣。)

水溝 鼻柱之下部。人中。

【十】 頸部

頸部凡二穴。

天鼎 前頸部。喉頭結節外方。至胸鎖乳嘴筋前緣部。

(此穴爲上頸三角部。相當於胸鎖乳嘴筋前緣之中部。)

天突 胸骨頸狀截痕直上部。

(此穴相當於胸骨上窩之中央部。)

第二節 胸部 腹部 (參照第二圖)

【一】 胸部副胸骨線

離胸部正中線當副骨線。凡六穴。

俞府 第一肋間。胸骨外方部。

或中 第二肋間。胸骨外方部。

神藏 第三肋間。胸骨外方部。

靈墟 第四肋間。胸骨外方部。

神封 第五肋間。胸骨外方部。

步廊 第六肋間。胸骨外方部。

## 【二】胸部乳線

胸部乳線凡五穴。

氣戶 第一肋間。乳線部。

庫房 第二肋間。乳線部。

屋翳 第三肋間。乳線部。

針灸學講義 孔穴學

膺窗 第四肋間。乳線部。

乳根 第六肋間。乳線部。

〔五〕 胸部前腋窩線。

中府 庫房之外方二指橫徑部。

（此穴爲前腋窩線之上部。相當於第二肋間。）

〔四〕 腹部正中綫

自鳩尾起點。下行正中。至恥骨縫際部之線。凡七穴。

鳩尾 胸骨下端下方一指橫徑部。

（此穴相當於心窩之中央部。）

巨闕 鳩尾之下方約一指橫徑部。

上脘 巨闕之下方約一指橫徑部。

中脘 上脘之下方約一指橫徑部。

臄里 中脘之下方約一指橫徑部。

下脘 臄里之下方約一指橫徑部。

關元 臄之下方約三指橫徑部。

【五】腹部第一側綫

離鳩尾之外方半指橫徑。於正中綫並行。至下方之綫。凡八穴。

幽門 巨關下方半指橫徑部。

通谷 幽門下方一指橫徑部。

陰郤 通谷下方一指橫徑部。

右關 陰郤下方一指橫徑部。

商曲 右關下方一指橫徑部。

盲俞 商曲下方二指橫徑部。

四滿 盲俞下方二指橫徑部。

大赫 四滿下方二指橫徑部。

【六】腹部第二側綫

離第一側之外方二指橫徑。於肋骨下緣起點於第一側線並行下方之綫。凡八穴。

不容 幽門外方二指橫徑部。

(此穴相當於第八肋軟骨附着部之下方。)

承滿 不容下方一指橫徑部。

梁門 承滿下方一指橫徑部。

關門 梁門下方一指橫徑部。

大乙 關門下方一指橫徑部。

天樞 大乙下方二指橫徑部。

(此穴與臍並行。)

外陵 天樞下方一指橫徑部。

水道 外陵下方三指橫徑部。

第三節 側腹部 (參照第三圖)

【一】 側腹部

側腹部凡六穴。

腹哀 季肋部。相當於乳綫部。

(此穴在乳綫。當第九肋軟骨附着部之下方。於正中綫之鳩尾與臍之中間並行。)

大橫 腹哀下方三指橫徑。臍之外方。

(此穴當第九肋軟筋之下方。與臍並行。)

腹結 大橫下方約二指橫徑部。

(此穴當第九肋軟骨附着部之下方。與腸骨節並行。)

衝門 腸骨前上棘之內下方五指橫徑部。

(此穴當第九肋軟骨之下方。相當於腸骨前上棘之內下方。陰股皺襞之外端。)

膈膠 第十一肋骨端之下方部。

五樞 膈膠下方約五指橫徑部。

(此穴當第十一肋骨前端之下方。相當於腸骨前上棘之上部。)

第四節 背部 (參照第四圖)

【一】 背部正中線

自第七頸椎棘狀突起起點。下行至尾閭骨尖端之線。凡四穴。

大椎 第七頸椎棘狀突起部。

(此穴相當於第七頸椎棘狀突起與第一胸椎狀棘突起之間。)

身柱 第三胸椎棘狀突起之下方部。

(此穴相當於第三與第四胸椎棘狀突起之間。)

命門 第二腰椎棘狀突起之下方部。

(此穴相當於第二與第三腰椎棘狀突起之間。)

長強 尾閭骨尖端部。

【二】背部側線

離正中線之外方二指橫徑。於正中線並行至下方之線。凡十三穴。

大杼 第一胸椎棘狀突起與第二胸椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

肺俞 第三胸椎棘狀突起與第四胸椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

心俞 第五胸椎棘狀突起與第六胸椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

膈俞 第七胸椎棘狀突起與第八胸椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

肝俞 第九胸椎棘狀突起與第十胸椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

胃俞 第十二胸椎棘狀突起與第一腰椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

腎俞 第二腰椎棘狀突起與第三腰椎棘狀突起之間外方。約二指橫徑部。

大腸俞 第五腰椎棘狀突起下外方約二指橫徑部。

白環俞 尾閭骨之側方部。

上髎 腸骨後上棘之下方部。

(此穴相當於第一後薦骨孔。)

中髎 上髎之下方一指橫徑部。

(此穴相當於第二後薦骨孔。)

次髎 中髎下方一指橫徑部。

(此穴相當於第三後薦骨孔。)

下髎 次髎下方一指橫徑部。

(此穴相當於第四後薦骨孔。)

第五節 肩胛部 上肢部 (參照第五圖)

【一】 肩胛部

肩胛部凡二穴。

曲垣 肩胛骨棘狀突起根之上部中央。

肩外 肩胛骨內側。第一胸椎與第二胸椎間之外方部。

(此穴接近於肩胛骨上內隅。)

## 【二】 上部部

上部部凡十三穴。

消滯 在上膊外面之中央。三角筋停止部少後下方。

清冷淵 肘之上方二指橫徑部。

(此穴爲上膊之後側。相當於尺骨鷹嘴突起上方二指橫徑部。)

四瀆 肘之下方五指橫徑。尺骨外側部。

(此穴爲前膊之後側。鷹嘴突起之下方二指橫徑。相當於尺骨外側。)

天井 尺骨上端之上方一指橫徑部。

(此穴爲上膊之後側。相當於鷹嘴突起之上方一指橫徑部。)

俠白 上膊內面。尺澤之上方五指橫徑部。

(此穴相當於上膊前面之中央。)

尺澤 肘關節前面。肘窩內側部。

曲池 上膊骨外上髁之直前部。

(此穴曲肘。相當於肘窩橫皺之外端。)

三里 曲池之下方二指橫徑部。

(此穴爲前膊骨側之上部。自肘窩橫皺相當於下方二指橫徑。)

肩髃 肩峯突起之時外方部。上膊上凹陷之所。

(此穴爲上膊外側之上部。相當於肩峯突起之下端。)

肩貞 肩峯突起之後外下方部。

(此穴爲上膊後側之上部。相當於肩峯突起之後外方二指橫徑。)

支溝 腕關節之背側。上方三指橫徑部。

合谷 第一掌骨與第二掌骨間之部。

(此穴相當於手背之第一與第二掌骨之間。)

陽池 腕關節背面部。

(此穴相當於腕關節背面之中央部。)

### 第六節 下肢部 (參照第六圖)

下肢部凡十一穴。

陰廉 鼠蹊溝之中央部。

環跳 大轉子之前方。

承扶 臀部下溝之中央部。(臀皺裂)。

中瀆 大腿骨外上髁上方五指橫徑部。

陽陵泉 膝之下方一指橫徑部。

(此穴爲下腿外側之上部。當膝蓋骨之下方。相當於腓骨小頭之前際。)

三里 膝之下方三指橫徑部。

（此穴爲下腿內側之上部。相當於膝蓋骨之下方。脛骨結節之外部。）

陰陵泉 脛骨關節髁後緣之直下部。

（此穴爲下腿內側之上部。相當於脛骨內關節後緣之直下部。）

飛陽 足之外髁上方七指橫徑部。腓骨之後側。


三陰交 足之內髁上方三指橫徑部。

懸鐘 足之外踝上方三指橫徑部。

水泉 足之內踝後下方一指橫徑部。

# 海氏帶與鍼灸術

海氏帶者。言其人體內之疾病。關聯身體某部分。而來神經過敏之現象。因感其部之疼痛。而起痙攣等而作也。於內臟疾病起時。其臟器於相當一定之皮膚面。而生知覺過敏。此說依古時「奇迪那姆」隆蓋洛斯「學者之說而知之。其後依「海資篤」「孟蓋奇」兩氏之研究。而證明此過敏帶。係一種反射作用。因此證明。遂有「海資篤」氏之名。而以冠海



賽篤氏之名稱。用爲臨床上之應用。因海賽篤氏發現此過敏帶。係因一種特異之反射徑路也。今由右之模型說明之。

發自內臟(甲)之疾病。刺戟其中心部之所。例如腦傳於脊髓(丙)。在途中(乙)。鄰接傳於神經(丁)。從丁之中心而達(戊)。在(戊)刺戟之途中即(丁)。從他之神經感傳而來。故在自己之末梢之皮膚(己)。刺戟以感之。斯之謂一種特異之反射徑路。故因內臟(甲)之疾病。宜刺戟於(己)處。

又孟善奇氏就盲腸竊究所發表者。與海賽篤氏之假定說一致。即因盲腸之炎症。不絕的病的刺戟。介於交感神經而傳達於脊髓。當脊髓達刺戟時。即鄰接於脊髓而傳細胞。例如傳近接於甲乙丙之細胞是。今假定甲爲知覺神經，乙爲運動神經，丙爲他之臟器。即聯繼於膀胱之不論何種細胞。連於知覺神經之甲細胞。於其末梢皮膚。生知覺過敏帶。繼於運動神經之乙細胞。來直腸筋及橫腹筋之痙攣。而至膀胱丙細胞。呈尿意頻數。或利尿困難等是也。

此等假定說。亦有幾多學者唱爲反對說。謂內臟疾病起於一定地位之皮膚知覺過敏。即海資篤氏帶於事實不能實現云。

### 回海氏帶之檢出法

海資篤氏帶檢出者。先以術者之拇指與食指。按患者之皮膚上。調其最強痛之部位。但此際祇能按皮膚。不能加壓迫於內部之臟器。不如此則有內部感覺之誤。若皮下結締組織或筋肉少之部位。其皮膚接着筋肉或骨上。而生檢出困難時。可以五六號毫針或三稜針之類。輕輕刺衝。以檢出其強痛覺過敏之處。但小兒或知覺之遲鈍者。往往難得正確檢出。於此情形之下。應用後藤道雄博士感電氣。頗能得良好成績。此法在弱之皮膚上。貼感電氣。漸次加強感電。至一定強度。即起電氣固有之感電。以此方法。隨處試驗。容易得其強度之差異。而知覺過敏帶與健康部亦易鑑別矣。

海資篤氏帶。概有帶狀發現。但往往並無帶狀。只有一點現出。又帶之中。時有一點着知覺過敏帶之事。總之無論何處海資篤氏有「高頂點」或「最高頂點」之名。此高頂點於內

臟疾病回復之期。常常存在。

### 回海氏帶之應用

海資篤氏帶者。各疾病不發現於一定之皮膚上。以之檢出之者也。其檢出法。不需何等特別之裝置。手續簡單。應用之而能補助診斷。不能應用於治療的方面。唯僅在海資篤氏知覺過敏帶。塗敷「可開因」軟膏。貼用芥子泥。未聞收何種效果。後藤道雄氏云。古來醫家。多行濕布水囊。例如患腦膜炎者。冷卻頭部。患心臟病者。冷卻胸部。或行鎮痛法之溫罨法。或行鍼灸。由經穴施行海資篤氏帶之治療的應用。在理論上容易明瞭。依多年之經驗所得。尤於經穴依海資篤氏帶而易得。針灸術宜依各病而異經穴。且須期位置之正確。除對於循環系之作用滿足。不必選經穴於身體表面何部位施帶。同其效果外。不可不選正當之經穴。海資篤氏帶之作用。能正確之。

### 回海氏帶與經穴之位置關係

全身之經穴。是否全部與海資篤氏帶一致。尚須研究。雖心臟疾患患者加以冷卻身體之表

面。外表之血管收縮。血液內部輻蟻。却生亢進心悸之害。故對於心臟疾患。行海資篤氏帶之相當部。能收沉降心悸之良果。此徵之事實而得者也。經穴必相當於海資篤氏帶。今舉左之各疾病。顯海資篤氏帶之高頂點。與經穴之位置關係。以資參考。海資篤氏帶分全軀幹爲頸部(C)。胸部(D)。腰部(I)。薦骨部(S)四部。列如左表。

心臟疾患 C3 D1-4

{ 氣舍 小海 靈門 屋翳 膺窗  
風池 大杼 肺俞 膏肓 心俞

肺臟疾患 D1-7

{ 小海 靈門 屋翳 膺窗 步廊 食竇 幽門  
大杼 肺俞 膏肓 心俞 隔俞 陽綱 肝俞


食道 D5-6 D8

{ 步廊 食竇 章門  
食竇 章門 京門

乳 腺 D4-5

{ 膺窗 步廊  
心俞 隔俞



圖 一 第




海氏與針灸術

圖 二 第


海氏帶與針灸術



第三圖



第四圖



胃 D6 D8-9

{ 食竇 章門 京門  
肝俞 痞根 盲門

腸 D10 D-12

{ 帶脈 五樞 衝門 痞根  
盲門 志室 小腸俞 胞盲

肝臟 D7-10

{ 幽門 章門 京門 帶脈  
陽綱 痞根 盲門 志室

腎臟及輸尿管 D10-11 L1

帶脈 五樞 氣衝

膀胱 S2-4

贛鼻 殷門 會陽

睪丸及卵巢 D10

帶脈 志室

子宮口 S1-4

大白 贛鼻 殷門 會陽

子宮 D10-12 L1

{ 帶脈 五樞 衝門 氣衝  
志室 小腸俞 胞盲

眼鼻上門齒

遠視

耳及心臟

緣內障

中耳疾患

耳及胃

後部咽喉及腹部臟器之一部

虹彩膜炎及玻璃體

上白齒

鼻及齒髓

舌背及智齒

門齒及犬齒

鼻前額帶

中部眼窠帶

顯顯前額帶

顯顯帶

頂天帶

顯頂帶

後頭帶

上頸帶

下頸帶

鼻唇帶

上部咽喉帶

頤帶

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

攢竹

曲差

紫竹空

客主人

承光

通天

玉枕

耳門

頰車

禾髻

人迎

大迎

扁桃腺舌下側白齒

舌骨帶 (13)

翳風

咽頭

下部咽頭帶 (14)

水突

但肋膜疾患。海養篤氏帶不現。

### ■ 孔穴學補遺

頭部第二側線臨泣下遺刊二穴。

正營 臨泣後方一指半橫徑部。

(此穴相當於冠處縫合之外部。)

承靈 正營後方二指橫徑部。

(此穴相當於顛頂結節部。)

### 海氏帶與針灸術終

# 經穴學勘誤表

第頁	第行	第字	原字	校字
一	九	二七	小	少
七	八	八	關橫……	關節橫……
一一	二	一七	當大顛門以下……	當大顛門。以下……
一四	一二	二二	頸	頭
一七	二	二五	顛	顛顛動脈
二〇	一二	一	置	位置
二五	一二	三四	顛	顛
二六	一〇	二	厘	釐
三〇	九	三三	顏	顏
三一	七	一二	動顛顛脈	顛顛動脈

一四一	一三八	一二四	一二〇	一〇五	一〇三	九三	九一	九一	八八	六四	四九	四八
一一	一〇	七	八	二	五	六	三	二	二	一〇	一	七
一六	一九	九	二	二	一	一四	一三	一一	一〇	二四	一	一四
癩	皮下經	肩胛相聯	腹	神經	○	上	左	神側	斜筋中	四肢癱	骨起	皮神經
癩	皮下神經	肩胛骨相聯	膜	神經癱瘓	一	狀	壯	神經側	斜腹筋中	四肢癱瘓	骨突起	皮下神經

# 孔穴學勘誤表

第頁	第行	第字	原字	校字
一四一	一二	穴名	無字	少衝
一四七	二	三	〇	二
一六一	一〇	二三	。躡指	。至拇指
一六一	二	四	二	一
一六二	九	二二	復	循
一八四	三	一〇	痛	病

第頁	第行	第字	誤刊	校正
一〇	三	一	(五)	(三)
一二	三	四	側外方	側緣外方
一四	八	一九	狀棘	棘狀

遺刊正營承靈二穴 補刊海氏帶篇一一頁



中華民國廿四年拾月廿壹日收到

中華民國二十年十二月出版

版權所  
有抄襲  
翻印一  
律嚴究

非賣品

編譯者 鄞縣張俊義

出版者 東方針灸術研究社

印刷者 寧波鈞和印刷公司

通訊處

寧波江東洪聖廟弄四號  
東方針灸術研究社

