

玉機微義序

都察院副都御史姑蘇陳公有戒
奉

命填撫陝西仰體

皇仁躬勤蚤莫蘇息彫弊民用嚮安
遂飭邊疆亦既完固時有餘暇其
卹人之念未始或忘苟可利之為

之恐緩間遇醫家玉機微義一編
謂可以濟人捐俸僦工刻以廣布
於是布政郝公珩王公敏合其同
官志在施濟者效協助焉既成郝
公以求予序此編輯於會稽徐彥
純吳陵劉宗厚續有增益皆明於
醫者凡五十卷門分類集於論病

因證治條理粲然既詳備矣夫醫
家神農軒岐伊尹及秦越人張仲
景之書萬世所宗不可易也歷晉
唐宋代有明者近代張元素起北
方蓋得神授深造闡奧再傳李明
之三傳王好古南方朱彥脩得私
淑焉遂為醫家之正派彥純宗厚

又私淑彥脩者也論者謂元素醫家之王道蓋王道以養民為本元素之法厚脾土為要此知本之務也是編主素難金匱及元素一派之旨若諸家治法不倍此者亦旁采而附益之雖中醫執此施治可以成功如病者有能知之亦必不

為庸醫所誤其所濟利豈小補哉醫者聖人仁民之術也有戒諸公於此編協志以廣其傳蓋其不忍人之心所不能已也將其不忍人之政詎可涯歟

正統己未正月癸卯光祿大夫少師兵部尚書兼

華蓋殿大學士廬陵楊士奇序

瓜紅印

廬陵楊士奇

楊士奇

下機微義

門類目錄

中風

痿

傷風

痰飲

滯下

泄瀉

瘡已徐用誠先生醫學折衷

欬嗽

熱

火

暑

濕

燥

寒

瘡湯

氣

血

內傷

虛損

積聚

消渴

水氣

腳氣

諸疝

反胃

脹滿

喉痺

淋瀝

眼目

牙齒

腰痛

腹痛

心痛已上並續漆

頭痛

頭眩

欬逆

痞滿

吐酸

瘕

癘風

風癘

破傷風

損傷已上並徐用誠醫學折衷

癩疹

黃疸

霍亂

厥

痺

婦人

小兒

已上並續漆

卷之一

中風門

中風敘論之始

脈法

中風不治證

風分在臟在腑在經之異

治風不可下論

治風不可利小便

濕病似中風論

中風先調氣說

氣中論

四肢不舉有虛有實

論風非外來乃本氣病

風本於熱論

治風用汗吐下三法

論中風不當與痿證同治

內因似中風論 續漆

發表之劑

金匱小續命湯 千金大續命湯 局方小續命湯

排風湯 寶鑑秦艽升麻湯

不換金丹

攻裏之劑

機要三化湯 子和搜風丸

發表攻裏之劑

宣明防風通聖散 川芎石膏湯

調血養血之劑

機要大秦苧湯 羌活愈風湯

天麻丸

理氣之劑

局方烏藥順氣散 巖氏八味順氣散

理血之劑

良方六合湯 愈風湯

通關透肌骨之劑

局方至寶丹 牛黃清心丸

治痰通經諸方

局方青州白丸子 三生飲 省風湯

濟生導痰湯 千金地黃煎 竹瀝湯

荆瀝湯 三因小竹瀝湯

吐劑見疫飲門

雜方

衍義方

易簡稀涎散

寶鑑分涎散

千金禁耳散

濟生稀涎丸

聖惠方

宣明防風天麻散

如聖散

灸法

卷之二

痿證門

諸痿因肺熱相傳

痿因內臟不足所致

痿因血少

治痿與治痺不同

治痿大法

雜方

痿證有五

論痰清濁

飲當去水溫補轉劑論

論局方用熱藥治諸氣痰飲嘔吐膈噎之誤

論痰證有似邪祟

解表之劑

仲景大青龍湯

小青龍湯

三因參蘇飲

金沸草散

攻下之劑

金匱十棗湯

三因控涎丹

宣明三花神佑丸

厚朴大黃湯

王隱君袞痰丸

東垣蠲痰積實丸

神仙墜痰丸

大刺鴈丸

滌痰丸

透羅丹

三因破飲丸

局方妙香丸

錢氏白餅子

吐劑

瓜蒂散

子和二聖散

稀涎散

元戎勝金丸

分利之劑

五苓散

治濕和中之劑

金匱苓桂朮甘湯

茯苓湯

枳朮湯

東垣清燥湯

健步丸

三因加味四斤丸

卷之三

傷風門

敘風之為病

脈法

論傷風與傷寒六經傳變相同

辛溫解表之劑

仲景桂枝湯

局方神朮散

辛平解表之劑

消風百解散

川芎茶調散

消風散

金沸草散

立涼解表之劑

柴胡升麻湯

辛涼解表攻裏之劑

錢氏大青膏

防風通聖散

攻裏之劑

大黃丸

卷之四

痰飲門

痰飲脉法

仲景四飲

痰分三因

論治痰理氣之說

痰為諸病

論飲專主於濕

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

橘皮半夏湯

二陳湯

桔梗半夏湯

嚴氏導痰湯

註學士神木丸

仁齋加味二陳湯

芎夏湯

風痰之劑

青州白丸子

局方玉壺丸

辰砂化痰丸

易老水煮金花丸

良方天南星丸

熱痰之劑

小陷胷湯

嚴氏半夏丸

機要小黃丸

宣明茯苓半夏湯

人參半夏丸

寒痰之劑

深師消飲丸

寶鑑溫胃化痰丸

局方溫中化痰丸

丁香五套丸

發明半夏溫肺湯

丁香半夏丸

機要姜桂丸

理氣之劑

局方四七湯

選方三仙丸

指迷茯苓丸

降氣墜痰溫補之劑

俞山人降氣湯

黑錫丹

蘇子降氣湯

靈砂丹

金匱腎氣丸

卷之五

滯下門

腸澼生死脈法

仲景治痢大法

東垣治痢法

太陰受濕傳腎為膿血痢

論風寒著濕皆能作痢

論滯下分三因

論時疫作痢

論食毒作痢

論裏急後重

論泄痢而嘔

論泄痢腹痛

論禁口痢

下痢吃逆

辨痢色分五臟

辨赤白分冷熱之誤

論熱藥治痢之誤

治痢通因通用之法

論局方用熱藥瀉藥之非

滯下亦有挾虛挾寒

治熱之劑

仲景白頭翁湯

機要黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃芩湯

錢氏芍藥栢皮丸

守真芍藥栢皮丸

局方黃連阿膠丸

治寒之劑

局方桃花丸

嚴氏當歸丸

局方阿黎勒散

冷熱之劑

古方駐車丸

局方香連丸

戊己丸

治風之劑

機要防風芍藥湯

蒼朮防風湯

良方神效散

澹寮倉廩湯

治濕之劑

機要白朮芍藥湯

五苓散

益元散

治暑之劑

黃連香薷飲

宣明桂苓甘露飲

子和桂苓甘露飲

攻下之劑

大承氣湯

宣明玄青丸

機要厚朴枳實湯

局方蘇感丸

本事靈砂丹

消積之劑

脾胃論聖餅子

元戎聖功丸

止瀉之劑

仲景桃花湯

嚴氏禹餘糧丸

真人養臟湯

水養木香丸

秘藏訶子散

宣明香連丸

機要訶子散

訶黎勒丸

宣明三聖散

收斂之劑

嚴氏烏梅丸

元戎烏梅散

血劑

胃風湯

加味四物湯

宣明白朮湯

補劑

十全大補湯

當歸補血湯

雜方

敗毒散

嚴氏茵陳丸

百一選方

澹寮方

導氣湯

卷之六

泄瀉門

瀉痢生死脉法

仲景治痢大法

東垣治痢大法

瀉分寒熱

論瀉痢有濕有熱有風有寒

論暴注屬火

論胃氣下降為飧泄

論春傷於風夏必飧泄

論飧泄屬風宜汗

瀉分三因

治瀉痢用吐下汗三法論局方用熱藥瀉藥治痢之誤

治濕之劑

機要白朮芍藥湯 茯苓湯 蒼朮芍藥湯

胃苓湯 五苓散 益元散

治風之劑

機要防風芍藥湯 蒼朮防風湯 神朮散

胃風湯

治熱之劑

局方戊己丸

治暑之劑

局方來復丹 香薷飲 宣明桂苓甘露飲

治寒之劑

機要將水水散 白朮湯 理中湯

治風寒濕之劑

本事麴芩丸

止瀉之劑 並見滯下門

去積之劑

本事溫脾湯

升發之劑

東垣升陽除濕湯 升陽除濕防風湯

調補脾胃之劑

錢氏白朮散 易簡白朮湯

秘藏黃芪補胃湯

補腎之劑

機要肉豆蔻丸

本事五味子散

局方金鎖正元丹

卷之七

瘡門

內經敘瘡

瘡脉

瘡備三因

論瘡致瘡

瘡分三陽三陰淺深之異

瘡非脾寒及鬼食辨

漆論斷

瘡瘡

解表之劑

白虎加桂枝湯

紫胡桂姜湯

機要桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

白芷湯

桂枝芍藥湯

桂枝黃芩湯

麻黃黃芩湯

桂枝石膏湯

濕熱燥脾之劑

寶鑑交解飲子

局方常山飲

易簡七寶飲

人參養胃湯

嚴氏清脾湯

三因四獸飲

七棗湯

消瘡之劑

仲景鱉甲煎丸

嚴氏鱉甲飲子

消食之劑

三因紅丸子

吐瘡之劑

子和常山散

機要梨盧散

雄黃散

截瘡之劑

寶鑑溫脾散

一剪金

辰砂丹

辟邪丹

三因紅散子

卷之八

欬嗽門

內經敘欬

脈法

欬證死脈

論欬與嗽本一證

論嗽分六氣母拘於寒

欬分三因

論濕痰主欬

論痰飲致欬

論嗽發早晚病本不同

論乾欬嗽治法

論欬為肺痿

治風之劑

局方消風百解散

金沸草散

敗毒散

子和搜風丸

治寒之劑

小青龍湯

簡易九寶湯

人參杏子湯

半夏溫肺湯

局方華蓋散

金匱射干麻黃湯

治暑之劑

人參白虎湯

東垣清暑益氣湯

局方黃連香薷飲

治濕之劑

五苓散

十棗湯

白朮湯

白朮木香散

機要欬氣丸

治燥之劑

千金五味子湯

子和神功丸

治火之劑

黃連解毒湯

梔子仁湯

麥門冬湯

治熱之劑

金匱澤漆湯

加減小柴胡湯

地骨皮散

海藏紫苑散

人參蛤蚧散

宣明知母茯苓湯

東垣加減瀉白散

局方欬冬花散

寶鑑加減瀉白散

理氣之劑

三因參蘇飲

局方四七湯

二陳湯

蘇子降氣湯

東垣加減三奇湯

濟生橘蘇飲

寶鑑人參欬花膏

收散之劑

局方人參清肺湯

人參定喘湯

宣明寧神散

滋陰之劑

金匱腎氣丸

良方補肺湯

治邪注之劑

深師四滿丸

治痰諸方

青州白丸子

水養金花丸

姜桂丸

王隱君袞痰丸

機要小黃丸

局方溫中丸

白朮丸

玉粉丸

千縉湯

瑞竹堂化痰丸

丹溪小胃丹

導痰湯

臟腑湯液諸方

小柴胡湯

黃苓加半夏生姜湯

桔梗湯

芍藥甘草湯

升麻湯

烏梅丸

麻黃湯

異攻散

赤石脂禹餘糧湯

麻黃附子細辛湯

茯苓甘草湯

熏法

灸法

卷之九

熱門發熱附

內經敘熱為諸證

敘陰陽虛盛為熱

脈法

論熱在氣在血之分

論五臟有邪身熱各異

論表裏熱

論雜病陰陽虛實寒熱與傷寒不同

論雜證發熱惡寒與傷寒不同

惡寒非寒惡熱非熱論

虛中有熱宜灸論 論虛熱發汗之誤

論骨蒸勞熱用吐下法

論陰盛格陽身熱治例

論諸發熱病本不同

發表之劑

易簡參蘇飲

人參敗毒散

葛根解肌湯

局方柴胡升麻湯

知母蒼根湯

紹珠六神通解散

易老九味羌活湯

攻裏之劑

宣明三乙承氣湯

當歸承氣湯

發表攻裏之劑

宣明雙解散

大柴胡湯

清氣之劑

局方人參白虎湯

清心蓮子飲

宣明柴胡飲子

涼血之劑

清涼飲子

元戎四物二連湯

清氣涼血之劑

局方洗心散

甘露飲

龍腦雞蘇丸

安神清鎮諸方

局方至寶丹

錢氏安神丸

東垣朱砂安神丸 機要牛黃膏

瀉諸經實熱方

上焦涼膈散 中焦調胃承氣湯

下焦八正散 瀉青丸 瀉心湯

瀉黃散 瀉白散 滋腎丸

半夏湯 導赤散 前胡散

瀉白湯 赤茯苓湯

治虛熱升陽之劑

仲景小柴胡湯 東垣升陽益胃湯

補中益氣湯

治虛熱滋陰之劑

楊氏秦艽扶羸湯 局方當歸補血湯

本聖方人參散 元戎五蒸湯

升陽滋陰之劑

局方十全大補湯 人參養榮湯 黃芪鱉甲散

風熱之劑

宣明川芎石膏湯 仙木芎散

寒熱之劑

柴胡姜桂湯 桂枝麻黃各半湯

陽旦湯

暑熱之劑

局方黃連香薷飲 東垣清暑益氣湯

濕熱之劑

益元散

東垣清燥湯

火熱之劑

黃連解毒湯

當歸龍膽散

風濕熱之劑

東垣羌活湯

食熱之劑

千金紫丸

枝萃妙香丸

丹溪越鞠丸

卷之十

火門

內經敘火為諸證

論相火連為諸證

論火豈君相五志俱有

氣屬陽連作火論

論陰虛火動

論積溫畜熱成火宜汗吐下法

吐劑

瓜蒂散

三聖散

元戎勝金丸

升散之劑

東垣瀉陰火升陽湯

升陽散火散

千金麥門冬湯

地骨皮散

拖子仁湯

陽毒升麻湯

葛根橘皮湯

折劑之劑

局方涼膈散

調胃承氣湯

當歸承氣湯

麥門冬散

黃連解毒湯

珍珠散

宣明大金花丸

當歸龍膽丸

神芎丸

升散折制之劑

防風通聖散

川芎石膏湯

局方紅雪通中散

紫雪

千金黑奴丸

滋陰壯水之劑

金匱六味地黃丸

丹溪大補丸

補陰丸

局方玄參湯

從治之劑

丹溪左金丸

局方溫膽湯

治要茯苓散

茱萸散

瀉熱湯

桂苓甘露飲

橘皮湯

生姜瀉腸湯

滋腎丸

五苓散

卷之十一

暑門

諸經敘暑熱脉證

論中暑中熱受病不同

論暑傷五臟為證不同

論暑熱傷氣為痿厥諸證

論暑為瘧痢

論暑為吐瀉霍亂

論中暑宜補真氣

治暑大法

清暑之劑

局方香薷飲

黃連香薷飲

益氣之劑

人參白朮湯

竹葉石膏湯

東垣人參益氣湯

清暑益氣之劑

宣明益元散

選方十味香薷散

東垣清暑益氣湯

溫散之劑

五苓散

桂苓丸

縮脾飲

消暑十全飲

消暑丸

大順散

來復丹

冷香飲子

治濕熱之劑

于和桂苓甘露飲

宣明桂苓甘露飲

局方辰砂五苓散

治火之劑

黃連解毒湯

大金花丸

神芩丸

卷之十二

濕門

內經敘濕為諸證

脈法

論中濕為脾虛所致

論濕生痰飲

論濕為瀉痢瘧疾等證

濕病似中風論

論濕為脚氣

論濕證為痿為痺為痛為腫所挾寒熱不同

論治濕大法

解表之劑

金匱防己黃芪湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

麻黃加朮湯

元戎五苓散

局方五積散

東垣羌活湯

溫散之劑

真武湯

附子湯

局方滲濕湯

治熱散鬱之劑

局方茵陳五苓散

宣明桂苓甘露飲

大橘皮湯

葶藶末香散

東垣清燥湯

當歸拈痛湯

宣劑瓜蒂散

攻下之劑

宣明三花神佑丸

舟車丸

瀋川散

導水丸

禹功散

除濕丹

東垣海金沙散

聖靈丹

續隨子丸

升散溼利之劑

機要白朮芍藥湯

白朮湯

茯苓湯

東垣升陽除濕湯

升陽除濕防風湯

導滯通經湯

五苓散

平胃散

對金飲子

丹溪越鞠丸

燥門

內經論燥為諸證

燥本風熱論

論燥熱勝陰

論結燥病本不一

治風之劑

機要大秦元湯

麻仁丸

東垣潤腸丸

治熱之劑

宣明當歸龍膽丸

清涼飲子

和血潤下之劑

東垣導滯通幽湯

元戎四物湯

子和脾約丸

潤體丸

神功丸

滋陰之劑

六味地黃丸

丹溪大補丸

卷之十四

寒門

內經敘寒氣為痛為積為嘔為泄

敘寒氣為癥瘕堅否厥逆諸證

論寒氣為滯下泄瀉欬等證

脉法

論傷寒中寒受病不同

論陰陽虛實惡寒與傷寒不同

論陰毒

論諸證寒熱似傷寒

論傷寒傳變

論傷寒只傳足經不傳手經

論傷寒傳手經

論寒傷陰分發熱為反用溫汗法

論傷寒兩感

論傷寒合病併病

傷寒變溫熱病論

論傷寒雜病分二科

發表之劑

仲景麻黃湯

葛根湯

柴胡桂枝湯

桂枝湯

麻黃附子細辛湯

當歸四逆湯

桂枝麻黃各半湯

易簡參蘇飲

局方十神湯

藿香正氣散

溫中之劑

真武湯

附子湯

理中湯

韓氏溫中湯

海藏黃芪湯

寶鑑鉄刷湯

附子理中丸

元戎苦梗丸

發表溫中之劑

小青龍湯

海藏肉桂散

天雄散

發表攻下之劑

桂枝加大黃湯

和解之劑

柴胡姜桂湯

黃連湯

小柴胡湯

解兩感之劑

海藏大羌活湯

外按法

迴生神膏

代灸塗臍膏

熨灸法

灸法論

附虛寒溫經諸方

補肝散

扶神湯

補心丸

椒附丸

檳榔散

進食散

白石英湯

訶黎勒丸

十補丸

韭子丸

卷之十五

瘡瘍

內經論瘡瘍之因

河間原瘡瘍之病

瘡瘍脈證

丹溪論相火能動為諸證瘡瘍亦然

癰疽當分經絡論

治瘡大要三法

局方人參白虎湯

東垣蘭香飲子

滋陰之劑

丹溪補陰丸

局方加減八味丸

簡易地黃飲子

硃砂黃連丸

清氣滋陰之劑

局方黃芪六一湯

東垣生津甘露飲子

宣明麥門冬飲子

雜方

寶鑑麥門冬湯

酒蒸黃連丸

仁齋加味白朮散

宣明大黃甘草飲子

三因石子薺菴湯

秘方

丹溪方

機要黃連膏

卷之二十二

水氣門

諸經敘水氣為病所因

脉經敘諸水脉證

論水氣生死脉法

論水氣主於濕熱

論諸證似水氣

論濕證似水氣

論水氣繆刺法

論水氣證治大法

發表之劑

金匱越脾湯

防己茯苓湯

越脾加朮湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

辛平攻裏之劑

郭氏瑞効丸

萬靈奪命丹

辛熱發表攻裏之劑

飛龍奪命丹

辛平發表攻裏之劑

五香連翹湯

辛涼發表攻裏之劑

千金漏蘆湯

防風通聖散

內托之劑

機要內托復煎散

五香湯

聖濟托裏湯

郭氏定疼托裏散

乳香止痛散

黃芪人參湯

聖濟竹葉黃芪湯

托裏黃芪湯

東垣聖愈湯

內補黃芪湯

聖濟透膿散

外治之劑

郭氏青金錠子

翠霞錠子

信効錠子

寸金錠子

紅玉錠子

提丁錠子

翠青錠子

搜膿錠子

守効散

時効針頭散

神聖換肌散

雄黃散

水澄膏

金黃散

乳香散

輕粉散

奇功散

立應散

祛風散

聖濟六

走馬散

乳香善應膏

至寶玉連膏

收斂之劑

生肌散

紅玉散

完肌散

雜方

脂調散

羌活散

雄黃散

楓實膏

一上散

烏蛇丸

宣風換肌散

內托升麻湯

連翹飲子

消毒飲

疔瘡洗藥

靈雞彈

妙靈散

內消連翹丸

琥珀散

聖濟漆瘡方

卷之十六

氣證門

內經敘諸氣動為病 脉法

論九氣動為諸證 氣中似風證論

理氣宜導痰論 氣屬陽動作火論

論局方用熱藥治諸氣之誤

論氣無補法之誤

升散之劑

局方七香湯

益煎散

木香流氣飲

秘傳降氣湯

易簡參蘇飲

東垣升陽順氣湯

攻下之劑

戴人木香檳榔丸

局方神保丸

導氣丸

御藥院木香順氣丸

調理之劑

局方沉香降氣湯

分心氣飲

大七氣湯

紫沉通氣湯

東垣木香順氣湯

補養之劑

東垣補中益氣湯

調中益氣湯

清暑益氣湯

局方養氣丹

養正丹

消導之劑

局方異香散

御院方助氣丸

分氣丸

治痰之劑

一陳湯

桔梗半夏湯

四七湯

蘇子降氣湯

理血之劑

本事方槐角散

濟生歸脾湯

扶萃門冬飲子

宣劑

稀涎散

元戎勝金丸

通關竅之劑

局方蘇合香丸

雜方嚴氏四磨湯

紺珠正氣天香湯

卷之十七

血證門

諸經敘血證所因

脉法

論血證分三因

論下血為內傷絡脉所致

論嘔唾血溢為氣逆所致

論衄吐血泄為火熱所致

論衄血下血為傷寒所致

論結陰便血

血屬陰難成易虧論

論治血證大法

治風之劑

局方敗毒散

本事方槐花散

扶萃方結陰丹

濟生加減四物湯

東垣黃芩藥湯

治寒之劑

東垣麻黃桂枝湯

濟生鮮紅丸

寶鑑平胃地榆湯

治暑之劑

局方黃連香薷飲 枇杷葉散

治濕之劑

胃風湯

扶萃升陽和血湯

當歸和血散

治熱之劑

局方龍腦雞蘇丸

甘露飲

簡易選奇黃芪散

濟生犀角地黄湯

良方四生丸

生地黄散

局方槐角丸

秘方枳殼丸

治火之劑

黃連解毒湯

大金花丸

理氣之劑

三因茯苓補心湯

本事槐角散

補劑

濟生雞蘇散

歸脾湯

金匱赤豆當歸散

東垣麥門冬飲子

三因伏龍肝湯

髮灰散

玉屑膏

止瀉之劑

三因龍骨散

御院方麝香散

濟生烏梅丸

雜方

灸法

通利之劑

拔萃犀 用地黃湯

桃仁承氣湯

抵當湯

當歸導氣湯

解鬱之劑

丹溪越鞠丸

卷之十八

內傷門

辨脉法

辨內傷諸證與外感不同

論飲食勞倦為胃氣不足所致

論勞役傷與內傷外感不同

論飲食自倍腸胃乃傷分而治之

論酒飲傷

論傷食宜吐

論內傷飲食用藥所宜所禁

消導之劑

潔古枳朮丸

丁香爛飯丸

東垣橘皮枳朮丸

麩蘗枳朮丸

木香枳朮丸

半夏枳實丸

木香化滯湯

草豆蔻丸

除濕益氣丸

二黃丸

白朮丸

葛花解醒湯

除濕散

五苓散

推逐之劑

三黃枳朮丸

枳實導滯丸

枳實梔子大黃湯

木香見睨丸

三稜消積丸

備急大黃丸

海藏神應丸

吐劑

瓜蒂散

補益之劑

補中益氣湯

升陽散火湯

當歸補血湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

參朮調中湯

升陽益胃湯

雙和散

調中益氣湯

白朮和胃丸

寬中進食丸

厚朴溫中湯

益胃散

沉香溫胃丸

神聖復氣湯

益田湯

強胃湯

雜方

檳榔丸

千金紫丸

丹溪越鞠丸

卷之十九

虛損門

脉法

虛損脉證

論虛為陰氣不足

論虛為勞倦所傷

論虛證為痿

虛證發熱

虛證惡寒

論虛為瀉痢

論虛證似中風

論虛為頭痛頭眩

論虛證夾痰有似邪祟

論原氣陷下因虛所致

論精氣奪則虛

論形氣有餘不足用補瀉法

論無病好補之誤

論局方用諸熱藥補虛之失

調理之劑

金匱桂枝加龍骨牡蠣湯

小建中湯

黃芪建中湯

炙甘草湯

局方人參養榮湯

十味人參散

人參黃芪散

東垣補中益氣湯

益味升陽湯

補氣之劑

嚴氏芪附湯

嚴氏參附湯

四君子湯

濟生茯神湯

瑞竹堂補氣湯

補血之劑

四物湯

當歸補血湯

丹溪大補丸

補陰丸

補氣血之劑

局方十全大補湯

十四味建中湯

養氣丹

金匱腎氣丸

扶萃三才封髓丹

機要八物湯

補虛損壯筋骨之劑

崔氏八味丸

石刻安腎丸

無比山藥丸

楊氏還少丹

機要牛膝丸

地黃丸

卷之二上

積聚門

諸經敘積之始

脉法

諸積聚癥瘕不同

論積聚分三因

論婦人腸胃石瘕之積

論五積六聚治同鬱斷

論痰積飲積主於濕 論治積大法

論養正積自除

五臟積方

東垣肥氣丸

伏梁丸

痞氣丸

息賁丸

奔豚丸

吐劑

瓜蒂散

倒倉法

消道之劑

御院方助氣丸

三因散聚湯

濟生大七氣湯

東垣草豆蔻丸

廣木清堅湯

寶鑑香殼丸

丹溪阿魏丸

保和丸

宣明三稜湯

消堅之劑

楊氏木香檳榔煎丸

局方丁香脾積丸

鄧山房感應丸

宣明積氣丹

本事礪砂丸

破積瀉飲丸

三因破飲丸

晞露丸

寶鑑見睨丹

溫白丸

塌腫神應丸

聖散子

消渴門

諸經論消渴脉證所因

論三消之疾燥熱勝陰

論治消渴大法

論消渴為三焦受病

論消中三證之異

治熱之劑

局方清心蓮子飲

調胃承氣湯

三因真珠丸

治燥之劑

東垣當歸潤燥湯

清涼飲子

清氣之劑

瘡宜發汗論

辨瘡五善七惡

定癰疽死之地分

論瘡瘍攻補法

論瘡瘍宜灸

瘡分三因

論陰滯陽則生癰陽滯陰則生疽

明瘡瘍之本末

論腸癰

辛涼發散之劑

東垣黃連消毒飲

內托羌活湯

白芷升麻湯

內托黃芪紫胡湯

黃芪酒煎湯

當歸拈痛湯

內托升麻湯

散腫潰堅湯

連翹散堅湯

升麻調經湯

消腫湯

紫胡通經湯

郭氏升麻牛蒡子散

中和湯

辛平發散之劑

局方升麻和氣飲

聖濟金鍼散

辛溫發散之劑

局方托裏十補散

郭氏神效烏金散

蟾酥丸

東垣托裏榮衛湯

辛熱發散之劑

寶鑑托裏溫中湯

辛涼攻裏之劑

機要內疎黃連湯

托裏散

破棺丹

瀉心湯

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

攻裏之劑

十棗湯

三花神佑丸

局方神助散

宣明瀉水丸

濬川散

大戟散

葶蘆丸

雄黃神金散

東垣續隨子丸

三因消腫丸

滲洩之劑

五苓散

宣明葶蘆木香散

大橘皮湯

瀉寮五皮散

拔萃楮實子丸

機要茯苓湯

燥濕之劑

局方平胃散

胃苓湯

濟生實脾散

三因復元丹

消導之劑

金匱枳朮湯

楊氏消腫丸

東垣中滿分消丸

溫白丸

調理之劑

三因當歸散

濟生加味腎氣丸

塗臍膏

卷之二十三

脚氣門

辨南方脚氣所得之由

辨北方脚氣所得之由

言脚氣脉證

論脚氣主於水濕

論江東嶺南瘴毒為脚氣

論脚氣似傷寒

論南方脚氣病禁

論脚氣踈下

論脚氣洗滌

論脚氣宜砭刺

發表之劑

三因麻黃左經湯

半夏左經湯

六物附子湯

局方換腿丸

五積散

東垣當歸拈痛湯

攻裏之劑

宣明導水丸

除濕丹

發表攻裏之劑

三因大黃左經湯

加味敗毒散

東垣羌活導滯湯

理氣之劑

濟生檳榔湯

大腹皮散

澹寮方

理血之劑

金匱八味丸

三因神應養真丹

加味四斤丸

理氣血之劑

三因紫蘇子湯

通關透肌膚之劑

三因勝駿湯

疎風養血之劑

獨活寄生湯

消導之劑

東垣開結導引丸

雜方

洗藥導氣除濕湯

敷藥

卷之二十四

諸疝門 小腸氣附

諸經紋疝脉證

諸經紋小腸氣

論疝氣屬寒

論疝氣屬濕熱

論疝證有寒有熱

論疝分三因

論疝氣不宜預補

論疝本肝經宜通勿塞

七疝名狀

治寒之劑

金匱烏頭桂枝湯

三因大烏頭桂枝湯

補腎湯

局方奪命丹

茱萸內消丸

選方十補丸

胡蘆巴丸

寶鑑沉香桂附丸

治濕之劑

元戎加味五苓散

攻下之劑

局方三白散

復元通氣散

戴人禹功散

寶鑑控引羣丸

茴香練實丸

天台烏藥散

濕熱之劑

濟生葵子湯

子和導水丸

冷熱之劑

寶鑑葵藜湯

丹溪方

理氣之劑

局方瞿麥散

鹽煎散

寶鑑川苦練散

理血之劑

金匱當歸生姜羊肉湯

蜘蛛散

三因失笑散

理氣血之劑

本事方三効散

二因葱白散

東垣丁香練實丸

疔法

卷之二十五

反胃門 噎膈同附

反胃脈法

敘吐脈法

論膈噎致病之因

論五噎五膈

論三陽結為膈病

論噎為諸氣所致

論噎塞由陰中伏陽所致

治吐分三焦法

論治噎之江并治驗

和中利痰散氣之劑

金匱大半夏湯

茯苓澤瀉湯

病機和中桔梗湯

治風木之劑

病機青鎮丸

金花丸

治熱疎下之劑

金匱大黃甘草湯

病機荆黃湯

發明人參利膈丸

治寒之劑

病機紫沉丸

厚朴丸

理氣之劑

嚴氏五噎散

五膈散

局方五膈寬中散

卷之二十六

脹滿門

諸經敘脹所因

脈法

論脹分三因

論腹脹屬濕

論腹脹有熱有寒屬外感

論腹脹屬內傷所致

論鼓脹屬濕熱

論脹為諸氣所致

論脹為諸積所致

論滿氣壅則生膜脹

論下之則脹已

調理之劑

局方紫沉通氣湯

濟生紫蘇子湯

三因六半夏湯

禹餘糧丸

東垣木香順氣湯

木香塌氣丸

中滿分消湯

廣茂瀆堅湯

中滿分消丸

攻下之劑

三因七物厚朴湯

簡易是齋推氣丸

楊氏消脹丸

宣明肉豆蔻丸

雞屎醴散

東垣沉香海金沙丸

海金沙散

沉香交泰丸

三花神佑丸

治積聚之劑

澹寮三稜煎丸

導氣丸

塌腫神應丸

卷之二十七

喉痺門

論喉痺為火熱所致

論喉痺為傷寒所致

論喉痺為痰飲所致

論喉痺為氣逆所致

論喉閉為風燥所因

吹點藥

濟生二聖散

白礬散

楊氏一字散

三因玉鑰匙

宣劑

三因解毒雄黃丸

丹溪方

治熱之劑

局方龍腦雞蘇丸

澹寮牛蒡子散

扶萃桔梗湯

選方

治火之劑

局方碧雪絳雪膏

涼膈散

御院麝香朱砂丸

龍腦聚聖丹

治風之劑

局方如聖勝金錠子

本事方利膈湯

治寒之劑

仲景半夏湯

三因蜜附子

治痰之劑

王隱君礞石袞痰丸

桔梗半夏湯

三因玉粉丸

卷之二十八

淋閼門

小便不禁附

胞痺附

淋閼脉證

論淋閼主熱

論淋澁主寒

論淋閼分三因

論小便不利氣病血病之異

論小便不禁或癢為下焦虛實不同

治淋澁之劑

金匱腎氣丸

錢氏導赤散

局方五淋散

本事火府丹

濟生小蘗飲子

琥珀散

八正散

清心蓮子飲

立効散

濟生地膚子散

海金沙散

寶鑑夜冬琥珀湯

局方石菴散

三因生附散

治癰閉之劑

東垣滋腎丸

白花丸

清肺散

紅秫散

黃芩清肺飲

滋陰化氣湯

治胞痺之劑

千金茯苓丸

巴戟丸

腎瀝湯

宣明腎著湯

治淋瀝不禁之劑

局方二氣丹

姜附赤石脂砂丹

御院秘元丹

濟生兔絲子丸 三因家韭子丸

後苓丸

雜方

澹寮桑螵蛸散

五子丸

通氣法

灸法

卷之二十九

眼目門

論目為血脉之宗

論目昏赤腫翳膜皆屬於熱

論目疾宜出血最急

論內障外障

論眼證分表裏治

論瞳子散大

論倒睫赤爛

論目不能遠視為陰氣不足

論目疾分三因

論偷鍼眼

治風之劑

局方蜜蒙花散

三因羌活散

東垣明目細辛湯

防風飲子

機要四物龍膽湯

治熱之劑

局方洗心散

濟生羊肝丸

東垣瀉熱黃連湯

治風熱之劑

局方明目流氣飲 洗肝散

錢氏瀉青丸

東垣連翹飲子

治濕熱之劑

神考丸

東垣龍膽飲子

理血之劑

局方明目地黃丸

簡易加減駐景丸

地芝丸

理氣之劑

局方定志丸

濟生桑白皮散

養陽之劑

東垣神效黃芪湯

益氣聰明湯

人參補胃湯

滋陰之劑

東垣連栢益陰丸

滋陰腎氣丸

養陽滋陰之劑

局方菊睛丸

東垣滋陰地黃丸

補陽湯

沖和養胃湯

治障翳諸方

龍木論還睛丸

局方蟬花無比散

蟬花散

本事方羊肝丸

秘方撥雲退翳丸

點洗諸方

局方湯泡散

三因立勝散

金露膏

寶鑑春雪膏

扶羣方嗜藥

蟾光膏

灸雀目瘡眼法

卷之三十一

牙齒門

論牙齒諸痛所因

論牙痛分三因

論齒痛為風熱濕熱所致

治風之劑

局方細辛散

三因玉池散

選方

御院獨活散

元戎立効散

東垣羌活散

治寒之劑

御院丁香散

草薢散

東垣白芷散

治風熱之劑

元戎梧桐淚散

犀角升麻湯

治寒熱之劑

東垣當歸龍膽散

益智木律散

麝香散

治熱攻下之劑

元戎調胃丸

升麻丸

清胃涼血之劑

東垣清胃散

神功丸

治虫之劑

瑞竹堂方

補劑

金匱八味丸

二因安腎丸

取牙藥

本寧方

聖牙諸方

聖濟方

食療方

西嶽華峯方

元戎麝香間玉散

瑞竹堂方

東垣白牙散

嚴氏香益散

卷之三十一

腰痛門

內經敘諸經腰痛

脈法

論腰痛為虛宜補

論腰痛宜刺

論腰痛宜下

論腰痛分三因

治風之劑

小續命湯

三因獨活寄生湯

牛膝酒

治寒濕之劑

濟生術附湯

三因腎著湯

治風寒濕之劑

局方五積散

東垣川芎肉桂湯

麻黃蒼朮湯

治濕熱之劑

東垣獨活湯

蒼朮湯

健步丸

攻下之劑

三因熟大黃湯

子和益腎散

理氣之劑

局方小七香丸

易簡枳殼湯

理血之劑

元戎加味四物湯

東垣地龍散

通關節之劑

濟生養簡丸

東垣趁痛丸

補劑

局方青娥丸

黃芪建中湯

三因安腎丸

選方補髓丹

摩腰膏

卷之三十二

腹痛明

內經敘腹痛所因

脉法

論傷寒腹痛

論腹痛為陰毒所致

論腹痛屬熱

論腹痛屬血

論腹痛為疝所致

論腹痛為瀉痢

論腹痛為積聚所致

論腹痛為腸癰所致

論治腹痛大法

溫散之劑

桂枝加芍藥湯

理中丸

小建中湯

當歸四逆湯

真武湯

四逆湯

霹靂散

桃花湯

疎下之劑

仲景桂枝加大黃湯

大陷胃湯

大承氣湯

和解之劑

黃連湯

芍藥甘草湯

加減小柴胡湯

四逆散

黃芩芍藥湯

雜方

元戎四物苦練湯

酒煮當歸丸

增損當歸丸

苦練丸

熨法

卷之三十三

心痛門

胃脘痛附

諸經敘心痛所因

脈法

論心痛有熱厥寒厥不同

論心痛分三因

治寒之劑

金匱赤石脂丸

九痛丸

三因倉卒散

元戎赤附湯

機要藁本湯

宣明辰砂一粒丹

東垣麻黃豆蔻丸

治熱之劑

大陷胃湯

機要金鈴子散

瑞竹堂應痛丸

調血之劑

元戎四神湯

濟生愈痛散

錢觀文方

丹溪方

理氣之劑

局方蘇合香丸

元戎立應散

濟生加味七氣湯

理氣調血之劑

楊氏卻痛散

選方手拈散

宣明浸藥散

消導之劑

元戎厚朴丸

選方姜橘丸

易簡感應丸

丹溪方

治虫之劑

三因集効丸

雜方

衍義方

集録方

失笑散

卷之三十四

頭痛門

論厥頭痛真頭痛

脉法

傷寒頭痛

諸經內外頭痛用藥法

東垣頭痛論

論三陽受病頭痛

論頭痛屬火熱之病

治風之劑

局方川芎茶調散

秘方澈清膏

元戎方

治風寒之劑

仲景麻黃湯

桂枝湯

局方如聖餅子

秘藏羌活附子湯

寶鑑川芎神功散

三因芎辛湯

嚴氏小芎辛湯

局方加減三五七散

治風熱之劑

秘藏清空膏

川芎散

細辛散

寶鑑石膏散

治濕之劑

三因芎朮湯

痰厥頭痛之劑

秘藏半夏白朮天麻湯

家藏水煮金花丸

嚴氏三生丸

寶鑑茯苓半夏湯

補氣之劑

寶鑑順氣和中湯

補血之劑

機要四物湯

元戎古方

嗜藥

本事方

秘方

三因方

秘藏鬱金散

太陽建藥

元戎瓜蒂散

貼藥

雜方

嚴氏慈附丸

玉真丸

卷之三十五

頭眩門

論頭眩屬肝虛

論眩暈屬肝木風火之證

論傷寒頭眩屬虛

論眩暈分內外所因等證

論頭風眩暈有飲宜吐

治風之劑

本事川芎散

治風寒之劑

嚴氏三五七散

治濕之劑

嚴氏芎不湯

治熱之劑

子和芎黃湯

治痰之劑

嚴氏玉液湯

直指二陳湯

治血虛頭眩之劑

嚴氏芎窮湯

良方六合湯

治氣虛頭眩之劑

直指香橘飲

治下虛頭眩之劑

局方黑錫丹

養正丹

順氣散

嚴氏沉香磁石丸

雜方

本事鈎藤散

卷之三十一

效逆門

敘效逆為病

論傷寒效逆有寒有熱

效逆分陰陽證

辨效逆與噦不同

效逆噦分手足經標本辨

論雜病效逆皆由病後胃虛所生

論效逆病由陰虛火上亦有暴病屬實者附

治熱之劑

活人橘皮竹茹湯

小柴胡湯

難知太氣湯

瀉心湯

治寒之劑

半夏生姜湯

橘皮乾姜湯

三因丁香散

嚴氏柿蒂湯

活人羌活附子散

本事方

補虛之劑

寶鑑炙甘草湯

灸法

卷之三十七

心下痞滿門

論痞為濕土之病

論傷寒心下痞

論痞為痰飲及諸氣所致

論傷寒雜病痞皆血證

論諸瀉心湯用藥寒熱不同

論痞為熱證

治熱之劑

仲景大黃黃連瀉心湯

散寒泄熱之劑

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

秘藏大消痞丸

枳實消痞丸

溫中散飲之劑

寶鑑枳實理中丸

深師消飲丸

理氣之劑

活人桔梗枳殼湯

宣明檳榔散

寶鑑三脘痞氣丸

秘藏木香消痞丸

補虛之劑

加味補中益氣湯

卷之三十八

吐酸門 吞酸附

論吐酸屬熱

論雜病吐酸與病機外邪不同

辨素問東垣論酸不同

治寒溫胃之劑

發明藿香安胃散

加減二陳湯

三因麴朮丸

卷之三十九

瘧門

論瘧病屬濕強直屬風

論傷寒剛柔二瘧

論致瘧病因

瘧病脉法

論陰陽瘧

論風搐反張有風火之證

論瘧證屬內虛所致

論產後發瘧

解散之劑

金匱桂枝湯

葛根湯

海藏神木湯

白朮湯

活人舉敗散

攻下之劑

金匱大承氣湯

去風養血之劑

難知防風當歸散

卷之四十

癘風門

敘癘風為病

癘風治法

論癘風屬肺生虫屬木皆血熱之病

論癘風宜汗宜下宜出血

論癘風所因

論大風有上下之分

驅風之劑

局方樺皮散

家珍凌霄散

元戎方

子和方

寶鑑換肌散

去風養血之劑

易老祛風丸

東坡四神丹

破血瀉熱補氣之劑

補氣瀉滯榮湯

取涎之劑

寶鑑醉仙散

攻下之劑

病機二聖散

三因通天再造散

雜方

元戎生眉散

滌洗藥

本事方

卷之四十一

風癇門

敘癇病之始

論癇病所因

論三癇

論五癇

論癇有陰陽

論癇證由熱

治癇用吐下之法

癇分脉藥寒溫不同

清心安神之劑

寶鑑龍腦安神丸

神應丹

墜痰清神之劑

錢氏五色丸

三因六珍丹

礬丹

元戎二百丸

子和滾涎散

寶鑑琥珀壽星丸

治痰溫熱之劑

李和南五生丸

元戎小靈寶丹

吐劑

局方碧霞丹

子和三聖散

治痰攻下之劑

嚴氏控涎丸

三因控涎丹

錢氏白餅子

千金紫丸

拔萃妙香丸

平肝瀉火之劑

宣明當歸龍膽丸

千金龍膽湯

錢氏瀉青丸

通解風熱之劑

防風通聖散

救壞證之劑

寶鑑沉香天麻湯

卷之四十二

破傷風門

論破傷風表裏中治法

論破傷風所因不同

治表之劑

病機羌活防風湯

防風湯

蜈蚣散

蜈蚣散

雄黃散

天麻雄黃散

三因防風散

香膠散

元戎方

治半表裏之劑

病機羌活湯

地榆防風散

治裏之劑

病機大芎黃湯

江蘇丸

治汗之劑

病機白朮防風湯

白朮湯

理血之劑

養血當歸地黃散

雜方

如聖散

卷之四十三

損傷門

敘隋陸為病

傷損脈法

傷損宜下論

攻下瘀血之劑

金匱方

發明復元活血湯

當歸導氣湯

三因雞鳴散

破血止痛行經之劑

秘藏破血散

地龍散

發明乳香神應散

聖靈丹

三因加味芎藭湯

元戎加味四物湯

尚方花毒石散

補損當歸散

接骨之劑

發明紫金丹

元戎接骨丹

經驗方

雜方

機要刀箭藥

本事地黃散

經驗方

卷之四十四

癰疹門

論癰疹證治

論傷寒發癰有陰陽不同

論中寒發癰

論傷寒治誤發癰

論癰疹

升散之劑

元戎葛根摘皮湯

陽毒升麻湯

玄參升麻湯

陽毒梔子湯

消毒犀角飲子

解毒防風湯

升麻葛根湯

陰毒升麻蠶甲湯

三因加味羌活散

調中湯

和解之劑

化癰湯

下劑

當歸丸

涼血之劑

黑膏

大青四物湯

卷之四十五

黃疸門

諸經敘黃疸脉證

論五疸

論傷寒陽證發黃

論陰證發黃

內傷發黃

發黃治例

機要刀箭藥

本事地黄散

經驗方

卷之四十四

癰疹門

論癰疹證治

論傷寒發癰有陰陽不同

論中寒發癰

論傷寒治誤發癰

論癰疹

升散之劑

元戎葛根摘皮湯

陽毒升麻湯

玄參升麻湯

陽毒梔子湯

消毒犀角飲子

解毒防風湯

升麻葛根湯

陰毒升麻蠶甲湯

三因加味羌活散

調中湯

和解之劑

化癰湯

下劑

當歸丸

涼血之劑

黑膏

大青四物湯

卷之四十五

黃疸門

諸經敘黃疸脉證

論五疸

論傷寒陽證發黃

論陰證發黃

內傷發黃

發黃治例

升散之劑

金匱桂枝加黃芪湯

麻黃連翹赤小豆湯

局方茵陽五苓散 韓氏茵陳茯苓湯

攻下之劑

金匱梔子大黃湯 大黃消石湯 消石礬石散

半夏湯 茵陳蒿湯

難知茵陳大黃湯 抵當湯

和解之劑

小柴胡加梔子湯

治熱和中之劑

梔子柏皮湯 寶鑑茯苓滲濕湯

溫中之劑

金匱小半夏湯 韓氏茵陳橘皮湯

小茵陳湯 茵陳四逆湯 茵陳附子湯

茵陳茱萸湯

吐下之劑

三因苦參散

調理之劑

當歸白朮湯 小建中湯 養榮湯

消食之劑

三因紅丸子 寶鑑棗礬丸

取黃水法

瓜蒂散

三因如神散

卷之四十六

霍亂門

內經敘霍亂所因

論霍亂脉證

論霍亂分三因

論霍亂轉筋

論乾霍亂

論霍亂煩渴

霍亂治例

和中之劑

四君子湯

平胃散

建中湯

治寒之劑

機要漿水散

姜附湯

通脉四逆湯

理中湯

治濕之劑

三因茯苓瀉瀉湯

治暑之劑

局方五苓散

嚴氏水浸丹

香薷飲

冷香飲子

溫經之劑

三因木瓜湯

墜痰溫補之劑

三因胃氣丸

理氣溫中之劑

三因七氣湯

訶子散

消食之劑

三因紅丸子

雜方

卷之四十七

厥明

內經敘厥證所因

卒厥脉法

厥證寒熱不同

厥宜吐下

通關藪之劑

蘇合香丸

吐劑

瓜蒂散

和發之劑

三因追魂湯

治寒之劑

四逆湯

治熱之劑

白虎湯

卷之四十八

痺證門

內經敘痺

脉法

論痺證所因不同

論痺因虛所致

溫經勝濕之劑

三因附子湯

疎風養血之劑

三因黃芪五物湯

嚴氏蠲痺湯

黃芪酒

防風湯

獨活寄生湯

治痰飲之劑

茯苓湯

卷之四十九

婦人門

論經閉不行

論經水不調或紫或黑

論經漏不止

脉法

論赤白帶下

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論胎產諸證

胎自墮論

難產論

論局方胎產用藥之誤

論婦人服熱劑求子之誤

調經之劑

局方四物湯

逍遙散

膠艾散

良方温經湯

姜黃散

加減四物湯

鹿茸丸

元戎加味四物湯

丹溪加味四物湯

簡易當歸散

寶鑑生地黃丸

理氣之劑

澹寮煮附丸

嚴氏抑氣散

東垣益胃升陽湯

補中益氣湯

紺珠正氣天香散

通經之劑

良方通經丸

加味四物湯

紅花當歸散

桂枝桃仁湯

地黃通經丸

嚴氏琥珀散

戴人玉燭散

治崩漏之劑

生地黃散

簡易黃芩湯

伏龍肝散

備金散

澹寮茯苓補心湯

良方縮砂散

五靈脂散

荊芥散

瑞竹堂蒲黃散

東垣升麻除濕湯

涼血地黃湯

當歸芍藥湯

治帶下之劑

千金方

元戎六合湯

宣明瀉水丸

嚴氏當歸煎丸

良方白芷散

伏龍肝散

益母草散

東垣固真丸

桂附湯

補經固真湯

衛生湯

苦練丸

酒煮當歸丸

升陽燥濕湯

坐藥勝陰丹

灸法

安胎之劑

金匱當歸散

千金茯苓半夏湯

局方參朮散

良方膠艾湯

阿膠散

佛手散

安胎散

簡易知母散

竹葉湯

拔萃枳殼湯

二黃散

地黃當歸湯

全生方白朮散

李氏天仙藤散

嚴氏紫蘇飲

安榮散

羚羊角散

八味丸

丹溪參朮飲

東胎丸

蓮生散

滑胎易產藥

枳殼散

張氏方

良方神寢丸

保氣散

益元散

產間藥

施氏催生如意散

佛手散

嚴氏無憂散

簡易黑散子

局方催生丹

良方催生乳香膏

益母丸

獨勝散

小品方

機要半夏湯

良方下死胎法

鹿角散

當歸湯

香桂散

必効方

宣明硃砂散

局方至寶丹

花藥石散

黑龍丹

產後雜方

局方芎歸湯

黑神散

人參當歸散

當歸黃芪湯

失笑散

嚴氏清魂散

抵聖湯

當歸羊肉湯

機要增損批胡湯

血風湯

良方茯苓散

愈風散

獨行散

當歸散

黃芪湯

加減四物湯

瑞竹堂方

丹溪參朮膏

嚴氏起痛散

卷之五十

小兒門

論色脉法

論五臟形證虛實所主

論五臟相勝虛實之邪

論外感風寒

論諸熱證病本不同

論變蒸身熱

論傷寒瘡疹同異

論急慢驚風

論發搐有風有熱有痰有食補瀉不同

論咳嗽

論吐瀉有傷乳食有風有熱有寒有虛

論疳證虛實

論腹痛所因

論癖積

論豆瘡輕重

論豆瘡用熱藥之誤

治風之劑

小續命湯

錢氏大青膏

天麻防風丸

驅風膏

浴體法

塗額法

局方敗毒散

拔萃防風蒼朮湯

升麻黃芩湯

大羌活湯

錢氏塌氣丸

羌活膏

全嬰加減惺惺散

殭蚕散

挂菖散

治寒之劑

仲景桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

小青龍湯

理中湯

葛根升麻湯

麻黃黃芩湯

惺惺散

東垣麻黃升麻湯

治熱之劑

錢氏瀉青丸

瀉心湯

瀉黃散

瀉白散

導赤散

安神丸

地黃丸

白虎湯

地骨皮散

生犀散

驚風散

鎮心丸

化毒丹

甘露飲子

大黃丸

絳雪丹

易老羌活黃芩蒼朮甘草湯

陳氏人參清膈散

治濕熱攻下之劑

錢氏牛黃奪命散

通膈丸

治驚之劑

錢氏涼驚丸

局方天麻防風丸

三因陽癇方

全嬰方睡紅散

東垣硃砂安神丸

謝氏奪命丹

比金丸

利驚丸

錢氏溫驚丸

羌活膏

三因陰癇方

經驗保生錠子

金匱方麝香餅

全蝎散

奪命丹

鈎藤飲子

寧心膏

寶鑑天麻散

經驗開關散

全嬰探生散

吐風散

碧雲散

天霜散

錢氏利驚丸

全嬰驅風膏

玃珠丸

通關散

灸驚風法 附躡風撮口法

治痰涎之劑

青州白丸子

抱龍丸

宣風散

桶銀丸

治內傷及癖積之劑

錢氏白餅子

消積丸

消堅丸

寶鑑三稜煎丸

驚甲猪肚丸

廣示化癖丸

灸癖積法

治瀉痢之劑

錢氏白木散

異攻散

益黃散

沒石子丸

五苓散

羌活膏

溫白丸

迴生散

金液丹

玉露散

豆蔻香連丸

二聖丸

羌活黃芩蒼朮甘草湯

茯苓半夏湯

東垣升陽益胃湯

湯氏助胃膏

局方小液丹

小香連丸

胃風湯

全嬰訶梅散

桃花丸

澁腸丸

東垣厚腸丸

治效嗽之劑

麻黃湯

敗毒散

紫苑散

百部飲

紫蘇子散

葶藶丸

全嬰雄硃丸

潤肺散

人參丸

參杏膏

補肺散

瀉肺散

治嘔吐之劑

茯苓半夏湯

迴生散

異攻散

藿香散

全嬰消食丸

拔萃定吐紫金核 謝氏燒針丸

治疔之劑

錢氏木香丸

六味地黃丸

全嬰養心膏丸

蒸雞丸

肥兒丸

五疔消食丸

治瘡疹之劑

升麻湯

錢氏四聖散

調肝散

化毒湯

鼠粘子湯

活血散

犀角地黃散

葛根麥門冬散

連翹散

如聖飲子

解毒防風湯

真牙湯

御院無價散

當歸丸

棗變百祥丸

陳氏異攻散

局方涼膈散

目錄終

玉機微義卷之一

中風門

中風敘論之始

內經曰風之傷人也或為寒熱或為寒中或為熱中或為偏枯風善行而數變至其變化乃為他病歷陳五臟與胃之傷及風病名皆多汗而惡風詳見本文

按風論發明風邪係外感之病有內外臟腑虛實寒熱之不
同別無癱瘓痿弱卒中不省僵仆喎邪攣縮眩運語瀯不語
之文後世始與痿證混殺矣

要畧云風之為病當半身不遂經絡空虛賊邪不瀉或左或右
邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁

在經即重不勝邪入腑則不識人入臟即難言口吐涎
千金云岐伯中風大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痺於
身無痛四肢不收三曰風懿奄忽不知人四曰風痺諸痺類風
狀

按後世編集中風方治皆祖要畧巢氏千金之論但不當以
外中風邪之名而與內臟痿證袞同出治此千古之弊也

中風脉法

要畧云脉微而數中風使然又云頭痛脉滑者中風風脉虛弱
也又云口脉浮而緊寸口脉緩而遲皆曰中風也

脉經云浮而大者風又浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉又滑而
浮散者癰疽風又診人被風不仁痿躄其脉虛者生堅急疾者死

中風不治證

髮直吐沫搖頭上竄直視口開手撒眼合遺尿不知人或面赤
如粧或頭面青黑汗綴如珠聲如鼾睡皆不可治

風分在臟在腑之異

病機機要云風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血也
治瀕少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮宜治在經
雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多著四支有表證
而脉浮惡風寒拘急不仁中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻
塞目瞽大便結秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜
治之在經當以大藥養之

發明云中血脉則口眼喎斜中腑則支節廢中臟則性命危三

治各不同中血脉外有六經之形證則從小續命加減中腑內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芩湯羌活愈風湯主之

按此分在表在裏在經之三證立汗下調養之三法可謂開後世之盲聾但所用諸方學者宜詳審之

治風不可下論

發明云治風當通因通用惟宜宣發以散之不可便以苦寒之藥妄下龍麝硃砂牛黃諸鎮墜之藥瀉之

按此言風本外邪惟宜宣散此風在表之時也如傷寒中風傳入於胃亦未嘗不可下論中便字妄字可見其忌便者有早與急之義妄者謂有不當下之義

治風不可利小便

如小便少不可以藥利之既以自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈其當俟熱退汗止小便自行也無此證乃陽明經大忌利小便

濕病似中風論

元戎云酒濕之為病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂渾似中風舌強不正當瀉濕毒不可作風病治之而汗也衍義論其當易簡所言與此相同

按此則知口眼喎邪半身不遂之病豈止風之一端而已况六氣皆能中人其證亦有緩急搐搦不知人等證不可不以脉證分別

中風先調氣說

嚴用和云人之元氣強壯榮衛和平腠理緻密外邪焉能為害或因七情飲食勞役致真氣先虛榮衛空踈邪氣乘虛而入故致此疾若內因七情而得者法當調氣不當治風外因六淫而得者亦當先調氣後依所感六氣治之此良法也宜八味順氣散按此說真氣先虛榮衛空踈邪氣乘虛而入擴前人所未發但既曰虛矣邪又入矣補虛散邪理所當然而止曰調者意其謂因病而氣壅不通調其通暢條達則真氣自復邪氣自行之義惜乎不能詳也况中風治法豈止一端而已

氣中論

許學士云世言氣中者雖不見於方書然暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得此疾使覺涎潮昏塞牙關緊急若便作中風用藥多致殺人惟宜蘇合香丸灌之便醒然後隨寒熱虛實而調之無不愈者經云無故而瘖脉不至不治自己謂氣暴逆也氣復則已審如是雖不服藥自可

按氣中之說即七情內火之動氣厥逆由其本虛故也用蘇合香丸通行經絡其決烈之性如摧枯拉朽恐氣血虛者非所宜也後云不治自復之意蓋倣用藥之失實勝誤于庸醫之手也

四肢不舉有虛有實

病機云四肢不舉俗曰癱瘓經謂土太過則令人四肢不舉此真膏梁之疾非肝腎經虛其治瀉令氣弱陽虛土平而愈三化

湯調胃承氣湯選而用之若脾虛亦令人四肢不舉其治可補十全散加減四物去邪留正

按四肢不舉世俗皆以為中風病此云脾土太過不及皆能致之其可一槩用藥乎

論風非外來乃本氣病

發明曰經云陽之氣以天地之疾風名之此中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此治法當和臟腑通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治法輕重有三見前分在經在腑在臟之異

按此云本氣自病乃與劉河間論內熱所生相合但彼云熱

而此云虛虛之與熱並行而不相悖也

風本於熱論

河間曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風有癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中於風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無知也多因喜怒悲憂恐五志過極而卒中者皆為熱甚故也若微則但僵仆氣血流通筋脉不攣緩者發過如故或熱氣太甚鬱滯不通陰氣暴絕陽氣後竭而死痰涎者由熱甚則水化制火而生偏枯者由經絡一側得通否者痺而癱瘓也口噤筋急者由風熱太甚以勝水濕又津液滿于胸膈以為痰涎則筋太燥然燥金主

于收斂勁切故也 或筋反緩者乃燥之甚血液衰少也諸筋
攣易愈諸筋痿難復以見燥之微甚也

治風用汗吐下三法

子和云諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩運目囑筋急手搐瘈瘲皆
厥陰肝木之用也經云風淫所勝平以辛涼世何以熱藥治風
邪予治驚風癩病屢用汗吐下三法隨治愈未鬱達之者吐之
令其條達也汗者風隨汗出也下者推陳致新也失音悶亂口
眼喎斜可用三聖散吐之如牙關緊急鼻內灌之吐出涎口自
開也次用通聖散涼膈散大人參半夏丸甘露飲除熱養液之
寒藥排而用之

按此法的係邪氣卒中痰涎壅盛實熱者可用否則不敢輕

易也

論中風不當與痿證同治

丹溪曰今世所謂風病大率與諸痿證交同論治良由局方多
以治風之藥通治痿也古聖論風痿各有條目源流不同治法
亦異夫風病外感善行數變其病多實發表行滯有何不可局
方治風之外又歷述神魂恍惚起便瀆人手足不隨神志昏憤
癱瘓痺曳手足筋衰眩暈倒仆半身不遂脚膝軟弱四肢無力
顫掉拘攣不語語澁諸痿等證悉皆治之不思諸痿皆起於肺
熱傳入五臟散為諸證其昏惑瘈瘲瞶瞶昏昧暴病鬱冒蒙昧
暴瘖瘖昧皆屬於火曰四肢不舉舌本強足痿不收痰涎有聲
皆屬於土悉是濕熱之病當作諸痿論治若以外感風邪治之

寧克虛虛實實之禍乎若夫岐伯仲景孫思邈之言風大意似指外之感劉河間之言風明指內傷熱證實與痿證所言諸痿生於熱相合外感之邪有寒熱虛實而挾寒者多內熱之傷皆
是虛證無寒可散無熱當作實可瀉

謹按中風之病古方冠諸方首以其為人之大病也夫風乃六淫中之天之邪氣自外而入者也古人用藥皆是發散表邪通行經絡之劑以其自表而入亦當自表而出也至於東垣分在經在腑在臟而有汗下調養之法可謂詳備精密則又通表裏中三法而治矣若劉河間以為熱甚制金不能平木或濕土過甚反蕪木化皆非外中於風乃因內熱而生迥出前古之論我先師丹溪先生謂數千年得經意者河間一人耳

由是觀之若病從外邪而得元氣壯實者當從古方發散之例但用藥不宜小續命湯須分所挾有寒熱溫涼之異又邪有臟腑經絡之殊若病因內熱而生者當從劉河間之論但有用藥不宜如子和專以吐汗下為法蓋病邪有虛有實難一槩論又况痿病實與內熱所生相同醫者須宜識此或問外邪之感與內熱之傷何者為多也丹溪曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣溫而地多濕有風病者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風也經曰亢則害承廸制是也治痿之法詳見痿條此不贅及

內因似中風論續添

盧砥鏡曰經云神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷

於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於盛怒則腰脊難以
伸仰也何侍郎有文適夫夫早世女患十指拳攣掌垂臍膚
體廢湯栗栗然湯劑雜進飲食頓減幾於半載適與診之則非
風也正乃憂愁悲哀所致爾病屬內因於是料內因藥仍以鹿
角膠輩多用麝香麝膏貼痿垂處漸得掌能舉指能伸病漸近
安

謹按經云風之傷人也為病善行而數變變至他證之類故
為治不得其病情者往往或以風為他證或以他證為風皆
不免乎得失之謂惟近代河間東垣丹溪諸先生者出始論
他證之非中風治法當異此又盧氏治例可謂深達病情之
幾者即河間所論五志過極為病之例非真中風也而王安
道人又曰人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或
死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之因嘗攷
諸內經論風為諸證其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無
所論止有偏枯一語而已及觀千金方則皆岐伯之旨金
匱要畧具脉證邪在絡在經入腑入臟之異由是觀之則卒
暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固為因風而致者矣乃
用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代河
間東垣丹溪三子者出所論始與昔人有異河間主于火東
垣主于氣丹溪主于濕反以風為虛象而大異於昔人矣吁
昔人之與三子之果孰是與果孰非與若以三子為是則三
子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人為是則三子

已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往不得其真以余觀之昔人與三子之論皆不可偏廢但三子以類乎中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因于風者真中風也因火因氣因于濕者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因濕而為暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必因於風而後能也夫風火氣濕之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火氣濕則從三子以治如此庶乎折理明而用法善矣惟其以因火因氣因濕之證強引風而合論之所以真偽不分名實相紊若以因火因氣因濕證分而出之則真中風病豈矣所謂西北有中風東南無中風者其然與否與斯辨諸子所論名實相紊而不明真中風之異可謂精切又何疑乎溪東南無中風之語哉夫風者天地之大氣也五運之造化四時之正令耳上下八方無所不至者且人在氣中形虛者即感之傷之中之有輕重不同實八風虛實之異耳矧有痿濕火熱痰氣虛諸證而似中風故古今治例不一是以徐先生折衷諸經之旨辨已上諸證不得與中風同治又豈惟三子所論哉然王氏以擴充其例因有是辨亦不害其為叮嚀也余嘗居涼州即漢之武威郡也其地高阜四時多風少雨上藝粟麥引泉灌溉天氣常寒人之氣實腠密每見中風或暴死者有之蓋折風燥烈之甚也時洪武乙亥秋八月大風

起自西北時甘州城外路死者數人余亦始悟經謂西北之折風傷人至病暴死之旨不誣丹溪之言有所本也人蓋不經其所雖審經意故莫不有疑者也吁醫之不明運氣造化地理病機之微而欲行通變之法者難矣哉

風門

發表之劑

金匱續命湯千金名西州續命

治中風痲身不收口不能言冒昧

不知痛處拘急不能轉側

麻黃三兩五分桂枝一兩麥

當歸

人參

石膏碎綿裹乾薑

炙甘草各二兩川芎一兩

杏仁去皮尖十四枚

右咀水煎

按心肺脾胃肝之藥也又太陽經血氣藥也

千金大續命湯比前方無人參有黃芩荆瀝元戎作竹瀝

局方小續命湯出千金治卒暴中風不省人事半身不遂口眼喎

斜手足戰掉語言蹇澹神清氣亂及治諸風 云云

防己 肉桂去粗皮 杏仁去皮尖 黃芩

白芍 甘草燉 川芎 麻黃去節

人參去芦各兩 防風兩半 附子炮黃臍半兩

右為粗末每三錢薑五片棗一枚煎

按心肺脾胃肝三焦命門藥也

古今錄驗有白朮無杏仁 救急無芎藭杏仁只七味

延年無防風 機要春夏加石膏知母秋冬加桂附芎藥

易老六經加減法 詳見本方

麻黃續命湯 桂枝續命湯 白虎續命湯

葛根續命湯 附子續命湯

羌活連翹續命湯

按續命湯治太陽外感風邪之藥然外感挾寒者多故用桂枝等輩千金等方所收此類之藥甚多無分經絡不辨虛實寒熱所謂雖多亦奚以為易老分六經庶乎活法也

丹溪曰局方比要略少當歸石膏多防風附子防己果與仲景意合否也仲景謂汗出則止藥局方則曰久服差又曰治諸風似皆非仲景意然麻黃防己可久服乎諸風可通治乎局方排風湯治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風發等證詳見本方

白蘇皮 當歸 酒浸 肉桂 白芍

杏仁 甘草炒 防風 芎藭

白朮各兩 獨活 麻黃去根節 茯苓 各三兩

右粗末每服三錢薑四片水煎

丹溪曰此云治邪氣入臟而又曰風發又似有內出之意夫病既在五臟道遠而所感深用麻黃以發其表寧不犯誅伐無過之戒乎

按此與小續命相類而無所發明因世俗用之故收入其餘雷同發散風寒者並畧去

寶鑑秦升麻湯治風寒客手足陽明經口眼喎斜惡風寒四肢拘急脉浮緊

升麻 乾葛 甘草 芍藥
人參 各半兩 秦升 白芷 防風

桂枝 各三錢

右咀每一兩連鬚葱白二根同煎

按此治風寒外入陽明經即小續命之變法也古人續命雖有加減之不同大抵多因太陽一經之藥今特留此方以見風邪所傷有六經之異也

寶鑑不換金丹退風散熱

荆芥穗 僵蚕 天麻 炙甘草 各一兩

羌活 川芎 白附子 烏頭

獨活 藿香葉 各半兩 薄荷 三兩 防風 一兩

右為末煉蜜丸彈子大每一丸細嚼茶酒任下塗囑慶亦可按古方治風解表多兼用熱劑至守真開發涼劑始行然此

等方極多姑存此以見意若防風通聖散治風熱雖佳則又
未裏之劑也

攻裏之劑

機要三化湯中風外有六經之形證先以加減續命湯治之內
有便溺之阻隔者此方主之

厚朴

大黃

枳實

羌活各八分

右剉每服一兩水煎

此治風邪入裏之下藥也即傷寒用承氣之意非內實者不

可

子和搜風丸治風熱上攻眼昏耳鳴鼻塞頭痛眩暈痰涎
心腹痞痛大小便結滯

人參

茯苓

天南星

薄荷各半兩

乾生薑

寒水石

生白礬各兩

蛤粉

黃芩

大黃各兩

滑石

牽牛各四兩

藿香一兩

半夏一兩

右為末水充小豆大生薑湯下日三

按此方名為搜風其實乃下實熱痰之藥
發表攻裏之劑

宣明防風通聖散治一切風熱

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃各半兩

石膏

桔梗

黃芩各兩

甘草二兩 滑石三兩 白朮 山梔

荆芥穗各半兩 一方去芒硝加牛膝人參半夏

右咀末生薑煎

按此乃肺脾膀胱胃肝心經之藥也又表裏血氣之藥也海
藏云防風麻黃汗劑也大黃芒硝下劑也梔子滑石利小便
也發表攻裏合而並進故治雜病則佳治傷寒傷風有失仲
景云發表攻裏本自不同在大定間此藥盛行於世而多效
何哉當時雖市井之徒口腹倍衣者全但志樂而形不苦然
是涼亦多效而少失變亂之際藥益雜難有所不克加以天
地肅殺之運敢用涼藥如平泰之世耶故多失而少效有如
仲景用桂枝當漢之末也韓祗和戒桂枝當宋之隆時時世

之異不可不知

川芎石膏湯治風熱

防風通車散去朴硝麻黃 加人參寒水石甘藷砂仁

右為末水煎

按此乃通聖散加減藥法也劉張此等方極多茲不詳錄
調血養血諸劑

機要大秦元湯治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知
是血弱不能養於筋手足不能運口強不能語宜養血而
筋自榮也

秦元 石膏各兩 甘草 川芎

當歸 芍藥 羌活 獨活

防風

黃芩

白芷

生地黄

熟地黄

白朮

白茯苓 各二兩

細辛 半兩

春夏加知母一兩

右剉每服一兩水煎天陰雨加生薑七片

羌活愈風濕療腎肝虛筋骨弱語言難精神昏憤此藥安心養神調陰陽無偏勝治中風內外無邪服此藥以行中道

羌活

甘草 六

防風

蔓荊子

川芎

熟地黄

細辛

枳殼

人參

麻黃

甘菊

薄荷

枸杞

當歸

知母

地骨皮

黃芪

獨活

白芷

杜仲

秦艽

柴胡

半夏

前胡

厚朴

防己 各二兩

白茯苓

黃芩

芍藥 各三兩

石膏

蒼朮

生地黄 各四兩

桂 二兩

天陰雨加生薑

右每服一兩水煎如微汗加麻黃如通利加大黃更有四時

加減法

就以此湯嚥下四白丹清肺養魄二丹元安袖定志和血是動以安神靜以清肺

天麻丸治風因熱而生熱勝則動宜以靜勝其燥是養血也

此藥行榮衛壯筋骨

天麻

牛膝 各六兩同酒浸三日焙乾

草薺 另研細

玄參 各二兩

杜仲 七兩

附子 二兩炮

羌活 十四兩或十五兩

當歸 十兩

生地黃 一斤

一方有獨活五兩去腎間風

右為細末蜜丸桐子大常服五七十九病大至百九空心食前溫酒或白湯下良久則食服藥半月後覺壅塞以七宣丸疎之

按已上三方東垣云調經養血安神之劑然風而挾虛理宜補養仲景治風虛脚氣用八味丸畧露端緒而世人莫能擴充之也局方骨碎補丸治肝腎風虛換腿丸治是三陰經虛專用疎通燥疾之藥既失之矣此三方較之局方雖優亦所得不償所失也何以為然秦艽湯愈風湯雖皆有補血之藥而行經散風之劑居其大半將何以養血而益筋骨也天麻丸養血壯筋骨庶幾近理

理氣之劑

局方烏藥順氣散治風氣攻注四支骨節疼痛遍身頑麻及癱瘓語言蹇澁脚氣步履艱難脚膝痿弱

麻黃

陳皮

烏藥 去木各三兩

白殭蚕 去絲質炒

乾姜 炮半兩

川芎

枳殼 麩炒

甘草 炒

白芷

桔梗 各二兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎服

按嚴氏調氣之說或出於此也太陰陽明氣藥也藥性主治恐未必然

嚴氏八味順氣散

白朮

白茯苓

青皮

香白芷

陳皮

烏藥

人參 各二兩

甘草 炙半兩

右為末每服三錢水煎

按嚴氏謂真氣虛而得此疾法當調氣故用此藥補虛行氣
雖此論迥出前人其用藥則未也何者四君子補脾胃中氣
藥也更用白芷去手陽明經風烏藥通腎胃間氣陳皮理肺
氣青皮泄肝氣若風果在手陽明經而肝肺腎胃之氣實者
可用但人身經有十二皆能中邪五臟之氣互有勝負此方
安能盡其變乎又况真氣先虛之人亦難用此也

理血之劑

良方治風六合湯治風虛眩運

機要同四物四兩

秦艽一作防風

羌活

右粗末水煎服

愈風湯療產後中風口噤手足瘳癢如角弓狀亦治血暈四支
強直

荆芥等分為末

右每服三錢豆淋酒調下用童便亦可其效如神

治婦人產後中風口吐涎手足瘳癢

當歸

荆芥等分

右為細末每服二分水一盞酒少許煎七分灌下之咽即醒
按風本陽邪故內經曰陽受風氣又曰賊風虛邪者陽受之
所以諸方皆用氣分之藥多血分之藥少惟此二方以產後

得疾多因血虛故專用行血之藥

通關透肌骨之劑

局方至寶丹療卒中急風不語中惡氣絕又療心肺積熱及小兒諸癇急驚心熱詳見本方

安息香一兩半為末以無灰酒攪澄飛過濾去砂石約取

淨數一兩慢火熬成膏子

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀

硃砂

雄黃各兩

龍腦一分

麝一分

牛黃半兩

銀箔

金箔各五十片一半為衣

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮凝成後入諸藥和搜成劑入不津器中盛並旋丸如桐大

牛黃清心丸治諸風癱瘓不隨語言寒澁心怔健忘恍惚去來

頭目眩胃胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤

牛黃二兩錢

麝香

龍腦

羚羊角末各二兩

當歸

防風

黃芩

白朮

麥門冬

白芍各兩半

柴胡

桔槔

白茯苓

杏仁

芍藥各兩二錢半肉桂

大豆卷

阿膠

蒲黃

人參

神麩各二兩

雄黃八錢

甘草五兩

白欬七錢半

乾姜七錢半

犀角末二兩

乾山藥七兩

金箔一千二百片內四百片為衣

大棗二百枚蒸熟去皮核研爛或膏

右為細末煉蜜與棗膏丸每兩作一十九丸用金箔為衣每服

一丸温水化下食遠服 詳見本方

發明云凡用丹劑者為風入骨髓不能得出故用龍麝牛雄犀珀珠金皆入骨髓透肌膚之劑使風邪得以外出也若中血脉中腑之病初不宜用龍麝牛黃恐引風入骨髓如油入甕莫之能出若中臟痰涎昏冒煩熱者宜用之下痰鎮墜清神

治痰通經諸方

局方青州白丸子治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足頑麻

半夏七兩水洗川烏頭兩度煎生用南星三兩生用

白附子二兩生用

右制衣度丸法見局方

三生飲治卒中感不知入口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥

南星兩生用川烏去皮生用附子去皮生用各半兩木香二錢生

右每服五錢水二盞薑十片煎八分服

按中風之病多因痰得已上二方乃行經治寒痰之藥也相類之方極多茲不再錄

局方省風湯治中風口喎口眼喎斜筋脈掣急抽掣疼痛風盛痰實

防風 南星一兩各四兩半夏水浸洗生用黃芩

甘草生用各二兩

右生薑煎湯每半兩

按此治風痰挾熱之藥也

濟生導痰湯治痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞方見痰門

按此治痰世痞之藥世俗用之者衆姑存之

千金地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食

生地黃汁 枸杞子汁并生薑汁 酥各三升

荆瀝并 天門冬 人參各半斤 茯苓六兩

大黃 梔子各四兩 竹瀝五升

右十一味以五物為細末先煎地黃等汁成煎內藥末調服

方寸日再漸加至三以利為度

竹瀝湯治四支不收心神恍惚不知人不能言

竹瀝二升 生薑汁并 生薑汁三合

右三味相和溫煖分三服

荆瀝湯凡患風人多熱常宜服此

荆瀝 竹瀝 生薑汁各五合

右三味相和溫煖為一服

三因小竹瀝湯治中風涎潮譫語昏塞四支維緩

秦艽去苗 防風去芦 附子炮去心 獨活各錢

右咀以水四盞煎至二盞入生地黃汁淡竹瀝各半煎再煎

去滓分四服無時

丹溪曰竹瀝本草言大寒其意以與石膏連同類而諸方

治產後胎前諸病及金瘡口噤與血虛自汗消渴尿多皆是

陰虛之病無不用之何世俗因其大寒二字棄而不用內經

云陰虛則發熱夫寒而能補正與病對竹瀝味甘性緩能除

陰虛之有大熱者大寒言其功也非以氣言也又况假火而成何寒之有

按竹瀝等方兼大黃附子者分寒熱之異用兼荊瀝者視痰氣之虛實薑汁秦艽獨活地黃門冬等又隨經而用也不可不知

雜方

衍義治風涎潮塞氣不通

皂角二兩

白礬生薑

輕粉半錢

右木水調一二錢灌之須臾吐涎用礬者分高下涎也

易簡稀涎散治中風四支不收涎潮高塞氣閉不通

晉礬二兩

猪牙皂角

右為細末每服一錢至二錢溫水調下

寶鑑分涎散治中風涎潮作聲不得口噤手足搐搦

藿香

乾竭

白附

南星

硃砂

膩粉

粉霜各二兩

右研和勻每服一錢至二錢薄荷湯調下未吐利再服

千金菴耳散治諸風

右以菴耳葉曝燥為末酒調服方寸匕日三若吐逆者蜜和

為丸服十九准前汁一方寸匕日三

濟生稀菴丸

右以稀菴草五月五日六月六日採葉九蒸九曝凡蒸用酒

蜜洒晒乾為末蜜丸桐子大空心酒下百丸

聖惠方治中風口喎

巴豆七箇去皮爛研如左喎塗右手心右塗左仍以煖水一
觥安向手心須臾便正洗去藥頻抽掣手中指

宣明防風天麻散治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖
不語內外風熱壅滯解昏眩西北方人多用之與後方同

防風

川芎

天麻

白芷

小草烏

白附子

荊芥穗

當歸

甘草

羌活各半兩

滑石二兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻
為度或蜜丸彈大熱酒化下一丸或半丸白湯化下亦得
經驗如聖散治山風身體麻木走痛眩運頭疼牙關緊急手足

搐搦涎潮悶亂及破傷風一切證

蒼朮一斤

川芎八兩

細辛四兩

防風

白芷各兩

草烏四兩

川烏五兩

天麻二兩

右為末每服半錢或一錢溫酒調下茶清亦得如風狗蛇蝎
等所傷先用漿水口含洗淨用此貼上仍服之至效金瘡血
出不止貼上立定

灸法

風中脉則口眼喎斜 中腑則支體廢 中臟則性命危

凡治莫如已上發表調氣血治痰諸法然此可扶持痰病若
要收全功火艾為良也

灸風中脉口眼喎斜

聽會二穴在耳前陷者中張口得之有穴動脈應手
頰車二穴在耳下二韭葉陷者宛宛中開口得之

地倉二穴在橫口吻傍四分外近下有脈微動者是
凡喎向右者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎陷中二七壯
喎向左者為右邊脈中風而緩也宜灸右喎陷中二七壯

灸風中臍手足不遂等疾

百會一穴在頂中央旋毛中

肩髃二穴在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之

曲池二穴在肘外輔骨屈肘曲骨中以手拱骨取之紋頭陷
中是

風市二穴在膝外兩筋間平立舒下兩手着腿當中指頭着

宛宛中

足三里二穴在膝下三寸脛骨外大筋內筋骨之間陷者宛
宛中舉足取之

絕骨二穴在足外踝上三寸動脈中

凡覺手足痺或不仁或痛良久乃已此將中腑之候宜灸此
七穴病在左則灸右在右則灸左

灸風中臍氣塞涎上不語昏危者下火立效

百會一穴如前

風池二穴在顛顛後髮際陷中

大椎一穴在項後第一頸上陷者中

肩井二穴在肩上陷罅缺盆上大骨前一寸半以三指按之

當其中指下陷者中舉臂取之

曲池二穴如前

間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中

足三里二穴如前

凡覺心中憤亂神思不怡或手足麻痺此將中臟之候不問是風與氣可速灸此七穴但依次第灸之各五七壯日別灸之隨年壯止如素有風人尤須留意此灸法可保無虞此法能灸猝死經云凡人風發強忍怕痛不肯灸忽然猝死謂是何病風入臟故也

吐劑

方見痰飲門

卷之一

玉機微義卷之二

痿證門

諸痿因肺熱相傳

內經曰肺熱葉焦五臟因而受之發為痿歷心氣熱生脉痿故
脛縱不任地肝氣熱為筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痺
而不任腎氣熱生骨痿故足不任身然治痿獨取陽明陽者
五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也云云故陽
明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也詳見本文

痿因內臟不足所致

陳無擇云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形內則有
肝心脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致內臟精血虛耗

使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所因痿則內臟不足之所致也

痿因血少

原病式曰病痿皆屬肺金大抵肺主氣病則其氣積鬱至於手足痿弱不能收持由肺金本燥燥則血液衰少不能營養百骸故也

治痿與治痺不同

張子和曰痿因肺熱相傳四臟其脉多浮而大今人便作寒濕脚氣治之驟用燥藥針灸湯蒸痿弱轉甚此證與治痺頗異風寒濕痺猶可蒸湯熯灸惟痿因熱而成若作寒治是殺之也

治痿大法

丹溪曰內經痿論肺熱葉焦五臟因而受之發為痿躄又曰諸痿皆屬於土指病之本在肺也又曰昏惑又曰瘖瘖曰瞽悶曰瞽昧曰暴病皆屬於火又曰四支不舉曰舌本強曰足痿不收曰痰涎有聲皆屬於土又禮記注曰魚肉天產也以養陽作陽德以為倦怠悉是濕熱之病當作諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居八九不思諸痿皆起於肺熱傳入五臟散為諸證大抵只宜補養若以外感風邪治之寧免實實虛虛之禍乎或曰諸風掉眩皆屬於肝諸暴強直皆屬於風至於振掉不能又立善暴僵仆皆以下病風者木之氣何為昏屬於火曰舌本強痰涎有聲何為皆屬於土痿論未嘗言及而吾子合火土二家之病而又與倦怠並言總作諸痿治之何也予曰按原病式

曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風而有
癱瘓諸證者熱甚故也又病源曰脾之脉連舌本散舌下今脾
濕受邪故舌強又河間曰胃膈熱甚火氣炎上故津液湧而為
痰涎潮上因甚稠粘難出故作聲也一以屬脾一以屬胃熱謂
之屬火與土不亦宜乎或曰內經治痿之法獨取陽明何也曰
諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經曰東方實西方虛
瀉南方補北方此固是就生尅言補瀉而大經大法不外於此
五行之中惟火有二腎雖有兩水雖其一陽常有餘陰常不足
故經曰一水不能勝二火理之必然金體燥而居上主氣畏火
者也土性濕而居中主四支畏木者也火性炎上若嗜欲無節
則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急
肺受邪熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得水邪而傷矣
肺熱則不能管攝一身脾傷則四支不能為用而諸痿之病作
瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降
而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機
關矣治痿之法無出於此賤龍言亦曰風火相熾當滋腎水東
垣先生取黃柏為君黃耆等補藥為輔佐而無一定之方有蒸
痿積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾寒者臨病製
方其善於治痿乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜即醫不治也
但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

謹按五痿等證內經特立篇曰所論至詳後代諸方獨於此
證藥多缺畧致其由皆因混入中風條內致也丹溪先生痛

千古之弊憫世之罹此疾者多誤于庸醫之事故叮嚀告戒
極其明白有志之士必當於此究心焉若夫陳無擇謂痿因
內臟不足所致誠得之矣然痿之所不足者乃陰也血也而
諸方悉是補陽補氣之劑能免實者虛者之患乎且無擇以
二因立方可謂諸方之冠其餘此證猶且未明究求之於他
者乎

痿門

雜方

東垣清燥湯治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化
之源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動

黃芪一錢半

蒼朮一錢

白朮

橘皮

澤瀉各半錢

五味子九箇

人參

白茯苓

升麻各三分

麥門冬

當歸身

生地黃

麩末

猪苓

酒黃柏各一分
批胡

黃連

甘草各一分

石胆每半兩水煎空心熱服

健步丸治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

羌活

柴胡

炒滑石

甘草炙

瓜蒌根酒洗各半錢

防風

澤瀉各三錢

酒防己一兩

川烏

酒善參各錢肉桂半錢

右為細末酒糊為丸桐子大七十九空心煎愈風湯送下

按此方專泄濕熱在下焦之劑

三因加味四斤丸治腎臟肝虛熱滯于內致筋骨痠弱不能勝

持

茯苓酒浸

牛膝酒浸

天麻

乾木瓜

鹿茸煨去毛切酥炙

熟地黃

兔絲子酒浸各五錢

五味子酒浸各一分

右為末蜜丸桐子大五十九溫酒米飲下食前

按此方云熱滯于內而用溫補何也然陰血衰弱血不養筋

筋緩不能自勝持陽燥熱滯于內故用此養陽滋陰陰實則

水升火降矣

玉機微義卷之三

傷風門

敘風之為病

內經曰風為百病之長又曰風勝則動又曰賊虛邪者陽受之
又曰傷於風者上先受之

按風本陽邪故善動善變其傷於陽者所以各從其類也

傷風脈法

脈經云脈浮而大者風

傷寒論云太陽病脈浮而緩者名曰中風又云太陽中風陽浮
而陰弱

論傷風與傷寒六經傳變相同

陳無擇云經曰春傷於風乃四時之序也或表中風在經絡中循經流注以日傳變與傷寒無異但寒泣血故無汗惡寒風散氣故有汗惡風為不同仲景太陽經分傷寒傷風不同而後人纂集者不分門類但以傷寒暑濕時氣疫疹凡太陽病皆謂之傷寒今別立傷風一門且依先哲以太陽經為始分注六經學者當自知

按此分傷風六經用藥可謂發諸家之未備在是太陽膀胱經用桂枝湯是陽明胃經用杏子湯是少陽膽經用柴胡加桂湯是太陰脾經用桂枝芍藥湯是少陰腎經用桂附湯是厥陰肝經用八物湯其方以桂枝湯三味加以各經之藥皆是辛溫解散之劑然既云與傷寒傳變相似此六方亦可以

盡其變也學者當求仲景之法以調治之可也今不載其方
詳見本文

謹按傷風一證仲景與傷寒同論其藥雖有麻黃桂枝之分至於傳變之後亦未嘗悉分之也諸家之論皆與感冒四氣并中風條內表同出治唯陳無擇別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽為始分注六經可謂詳密但以風本外邪諸方例用解表發表而治然受病之源亦有不同者且風為天地浩蕩之氣四時八風之變未嘗無也然人亦未嘗悉傷之也間有受傷者皆因不能法道清淨腠理不密表上陽虛之所致也內經曰清淨則內腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害是也又有挾痰熱其氣拂鬱風邪易於外束者若表虛

受風專用發表之藥必致汗多亡陽之證若內挾痰熱而受風者亦宜內外交治不可專於解表也或曰此云表虛與成無已注傷寒中風表虛同與予曰不同也彼以太陽中風而於有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表也此云表虛者當固守衛氣而散風者也

傷風門

辛溫解表之劑

仲景桂枝湯治太陽經傷風自汗

桂枝

芍藥各三兩

甘草一兩

右咀生薑三片棗一枚煎

按此發散是太陽經風邪之藥也

局方神木散治傷風頭痛鼻塞聲重

蒼朮

五兩

蒿本

白芷

細辛

羌活

川芎

甘草各二兩

右末三錢水一觥姜三片葱三寸煎傷風鼻塞葱茶調下

按此是太陽少陰手陽明經藥也

辛平解表之劑

消風百解散治頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重

荆芥

白芷

陳皮

麻黃

蒼朮

甘草

右咀姜三片葱白三根煎
按此手太陰陽明經藥也

川芎茶調散治諸風上攻頭目昏疼鼻塞聲重

薄荷八兩

荆芥

川芎各四兩

羌活

白芷

甘草各二兩

細辛一兩

防風一兩半

右為末每服二錢食後茶調下

按此足太陽少陰手太陰陽明厥陰經藥

消風散治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重及皮膚頑

麻癢痒癩疹婦人血風

荆穗

甘草炙

陳皮去白

厚朴各半兩

白殭蚕

人參

茯苓

防風

芎藭

藿葉

蟬蛻去炒

羌活各兩

右為末每服二錢荆芥茶清調下瘡癬温酒調下

金沸草散治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重涕唾稠粘

荆芥穗四兩

前胡

麻黃

旋覆花各三兩

甘草炙

赤芍

半夏各兩

右咀姜三片棗一枚煎服活人書減麻黃赤芍加細辛赤芍

苓

按此手足太陰經藥出陽明旋覆代赭石例解利痰飲之藥

也

辛涼解表之劑

柴胡升麻湯治頭痛壯熱惡風體疼鼻塞咽乾痰盛欬嗽涕唾

稠粘

紫胡

前胡

黃芩各兩半

荆芥七兩半

赤芍

石膏各十兩

升麻五兩

桑白皮

乾葛

右咀姜三片豉十粒水煎

按此是少陽陽明經藥也

辛涼解表攻裏之劑

錢氏大青膏發散風邪

天麻一錢

白附子末

生用一錢半

蝎尾

去毒生半錢

麝一字七

朱砂研字

青黛研一錢

天竺黃一字七

烏梢蛇肉半錢

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中

兒粳米大人彈子大同牛黃膏溫薄荷水化下一處服之

宣明防風通聖散

方見中風門

謹按傷風諸方俱是解表之劑蓋以風從外入之邪也其所

挾有寒熱溫涼之不同故此分辛溫辛平辛涼之異然風雖

外邪傳變入裏亦宜隨證施治錢仲陽論傷風當發散者用

大青膏解不散有下證者用大黃丸可謂得仲景之奧矣諸

方於此俱未曾論及也又前論表虛受風與內挾痰熱之方

亦未詳備學者當自求之所謂大黃丸亦附于後

大黃

黃芩

二味各等分水丸

卷之三

王機微義卷之四

痰飲門

痰飲脉法

要略云脉雙弦者寒也皆大下後善虛脉偏弦者飲也

肺飲不弦但善喘短氣 又云脉浮而細滑者傷飲

脉弦數有寒飲冬夏難治 脉沉而弦者懸飲內痛

其人短氣四支歷節痛脉沉者有留飲

陳無擇云飲脉皆弦微沉滑 或云左右關脉大者鬲上有痰

也可吐之

病人百藥不效關上脉伏而大者痰也眼皮及眼下如灰烟黑

者痰也

仲景四飲

要略云四飲者懸飲留飲支飲痰飲是也其人素盛今瘦水乏腸間漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在脇下效唾引痛謂之懸飲飲水流於四支當汗出而不汗身體重痛謂之溢飲效逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲又有留飲者背寒如手大或短氣而渴四支歷節疼脇下痛引缺盆咳嗽則轉甚又有伏飲者鬲滿嘔吐喘咳發則寒熱腰背痛目泪出其人振振惡寒身潤惕病溢飲者當發其汗懸飲者法當下之痰飲者當以溫藥和之

按古方謂四飲生六證者即四飲加伏飲留飲也或云五飲者即留飲伏飲合為一證也三因為痰飲用溫藥從小便去之支飲則隨證汗下以補四飲之治法愚嘗觀仲景治飲諸方之意在表者汗之在裏者下之挾濕則分利之寒熱溫涼隨其所屬以治之何必拘此四證

痰分三因

陳無擇云人之有痰飲者由榮衛不清氣血濁敗凝結而成也內則七情汨亂臟氣不行鬱而生涎涎結為飲為內所因外則六淫侵冒玄府不通當汗不泄蓄而為飲為外所因或飲食過傷色慾無度運動失宜津液不行聚為痰飲屬不內外因其為病也為喘為咳為嘔為泄為眩暈嘈煩忪悸愞寒熱疼痛腫滿

按此分三因為病之狀至為切當而其論中所引三因之藥

有外因而用裏藥者有內因而用表藥者其意詳見方後

論中

論治痰理氣之說

嚴氏云人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰飲之患古方治飲用汗下溫利之法愚見不若以順氣為先分道次之氣順則津液流通痰飲運下自小便中出矣

按嚴氏謂氣順則痰自下之說蓋以人之七情鬱結氣滯生涎聚為痰飲治者能使氣道通利則痰自降下也然有病人元有痰積其氣因痰而結滯者豈但理氣而痰能自行耶必先逐去痰結則滯氣自行豈可專主一說又云人身無倒上之痰天下無逆流之水此乃齊東之語夫水性潤下搏而躍

之則可使過類痰性順下被火泛上亦可至巔今庸醫莫察其義又每口誦以語人良可悲夫

論痰為諸病

王隱君論云痰證古今未詳方書雖有五飲痰諸飲之異而莫知其為病之源或頭風眩目運耳鳴或口眼蠕動眉稜耳輪俱痒或痛或四支游風腫硬而似疼非疼或為齒頰痒痛牙齒浮而痛痒不一或噫氣吞酸心下嘈雜或痛或噦或咽嗑不利咯之不出嚥之不下其痰似墨有如破絮桃膠蜆肉之狀或心下如停水鐵心氣冷痛或夢寐竒怪之狀或足腕酸軟腰腎骨節卒痛或四支筋骨疼痛難名並無常所乃至手麻臂疼狀若風濕或脊上每日一條如線之寒起者或渾身習習如卧芒刺者

或眼粘濕瘁口糜舌爛喉痺等證或遠項結核狀若瘰癧或胸
腹間如有二氣交紐疝寒煩悶有如火火上衝頭面烘熱或為
失志顛狂或中風癱瘓或勞瘵荏苒之疾或風毒脚氣或心下
怔忡如畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑汁甚為肺癰腸
毒便膿攣跛蓋內外為病百般皆痰所致其狀不同難以盡述
蓋津液既凝為痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘面如枯
骨毛髮焦槁婦人則因此月水不通若能逐去敗痰自然服餌
有效余嘗用一藥即袞痰丸以愈諸疾不可勝數矣今特相傳
於世云

脉經云病人一臂不遂時復移在一臂其脉沉細非風也必有
飲在上焦

活人書云中脘有痰亦令人憎寒發熱惡風自汗胸膈痞滿有
類傷寒但頭不痛項不強為異

按所敘病證患者十居八九足見痰之為病誠多也何則人
血氣流行無一息間斷纔有壅滯津液凝閉鬱而成熱痰遂
生焉人於六淫七情飲食起居之際豈能一一中節而無所
壅滯乎故余特敘脉經活人二條以證隱君之說有所本也
但所製袞痰丸一方難以通治諸疾

論飲專主於濕

原病式云積飲留飲積蓄而不散也水得於燥則消散得濕則
不消以為積飲土濕主痞故也

論痰證有五

子和云凡人病痰者有五一日風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰蓋風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金濕痰者停飲不散酒痰食痰者飲食過傷所致

按痰乃積飲所化故原病式列於太陰濕土之條又子和有五痰之說蓋其則一出於濕而所挾所因有五者之異故王隱君之方書論痰有五曰風痰寒痰熱痰氣痰味痰夫味痰者因飲食酒醪厚味而然也氣痰者因事逆意而然也熱痰者因飲食辛辣炙煨重裊厚服而然也寒痰者因胃寒涼而然也風痰者因感風而發或風熱拂鬱而然也此皆素抱痰氣因風寒氣熱味而作非別有此五種之痰也愚謂治法當以痰為本以所挾之氣為標也

論痰清濁

王隱君云論痰清白者為寒黃而濁者為熱殊不知始則清白久則黃濁清白稀薄清於上黃濁稠粘凝於下嗽而易出者清而白也欬而不能出則黃濁結滯者也若咯唾日久濕熱所鬱上下凝結皆無清白者也甚至帶血血敗則黑痰為關格異病人所不識又清白者氣味淡日久者漸成惡味酸辣腥臊焦苦不一

按此以痰之新久分清濁可謂得病機之情矣

飲當去水溫補轉劇論

子和云留飲一證也古人有四飲五飲之分皆觀病之形狀而定名也予論飲之所得其來有五有憤鬱而得之者有困乏而

得之者有思慮而得之者有痛飲而得之者有熱而傷冷得之者飲證雖多其因無出於此夫水陰物也但積水則生濕停酒則發燥久則成痰在左脇者同肥氣在右脇者同息音入肺則多嗽入大腸則為瀉入腎則為湧水在太陽則為支飲皆由氣逆而得之故在上則面浮在下則附腫在中者支滿痞滿痰逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者例以飲為寒積皆用溫熱之劑以補之燥之水濕未除反增心火况留飲無補法氣方補則轉增豈知內經所謂留者攻之也且白朮參苓服之尚加閉塞况燔針艾火其痞可知前人處五飲丸用礬石巴豆烏附雖是下攻終同燥熱今劉河間以十棗湯加大黃牽牛製三花神佑丸新得之疾服之氣流飲去而愈昔有病數年不愈予診之左手皆微小右手皆滑而大微小為寒滑大為燥以瓜蒂散湧其寒痰數升汗出如沃次以導水丸禹功散去腸中燥垢亦數升其人半愈然後以淡劑流濕降火開其胃口不踰月而差

按此論飲乃水濕所為發為諸證不宜溫補可謂詳明但專以三花神佑丸為說則失之太峻也詳見總論中論局方用熱藥治諸氣痰飲嘔吐噦噎之誤

丹溪曰夫氣之初病也其端甚微或因飲食不謹或外觸風雨寒暑或內感七情或食味過厚偏助陽氣蘊為膈熱或實稟充實表裏無汗津液不行清濁相干氣為之病或痞或痛或不思食或噯腐氣或吞酸或嘈雜或臌滿不求病原便認為寒遂以

辛香燥熱之劑投之數貼時暫得快以為神方厚味仍前不節
七情又復相仍舊病被劫暫開濁液易於積聚或半月或一月
前證復作如此延曼自氣成積自積成痼此為痰為飲為吞酸
之由也良工未遇誤藥又行痰挾痰血遂成窠囊此為痞為痛
為嘔以為噎膈反胃之次第也飲食湯液滯泥不行淡道塞滯
大便或秘或溇下失傳化中焦愈停醫者不察猶執為冷翻思
前藥隨手得失至此賓主皆恨藥火燥熱顯俟久服可以溫脾
壯胃消積行氣以真一旦豁然之效不思胃為水穀之海多血
多氣脾為消化之器氣清和則健而運行不息今久得香熱之
味偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚其久也脾氣耗散傳化漸
遲醫者又曰虛而積寒非尋常草木可療徑以烏附助佐丹劑

專意脹之積而久也血液俱耗胃脘乾槁遂成噎膈亦曰反胃
仲景論飲有六分別五臟諸證可表者汗之可下者利之滯者
瀉之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏熱偏寒者反佐而行之
挾濕者淡以滲之挾虛者補而養之治法至矣第恨醫者不善
處治病者不守禁忌遂使藥助病邪展轉深痼去生漸遠深可
哀憫

按此論嘔吐痞滿噎膈吞酸噎膈反胃致病之由皆以氣之
初病誤服燥熱結為痰飲所致故列於痰飲門中而於彼諸
證內不詳載宜於此通考焉

謹按痰之為病仲景論四飲六證無擇敘內外三因俱為切
當蓋四飲則敘因痰而顯諸證者三因則論其因有所傷而

生痰者也唯王隱君論人之諸疾者悉出於痰此發前人所
未論可謂深識痰之情狀而得其奧者矣製袞痰丸一方總
治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外而分汗下溫
利之法則踈闊矣况又有虛實寒熱之不同者哉夫痰病之
原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而
得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒飲而得者有因食
積而得者有脾虛不能運化而生者若熱痰則多煩熱風痰
多成癰瘻奇證冷痰多成骨痺濕痰多倦怠軟弱驚痰多成
心痛癩疾飲痰多成脇痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿其為
病狀種種難名王隱君論中頗為詳盡學者但察其病形脉
證則知所挾之邪隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂
飲無補法必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱
藥治痰之誤固為精切亦有挾寒挾虛之證不可不論夫久
痰凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格之患
况有風寒外束痰氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱行滯也
又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四支百骸
為諸病理宜導去痰滯必當補接燕行又難拘於子和之三
法也大凡病久淹延卒不便死者多因食積痰飲所致何以
然蓋胃氣亦賴痰積所養飲食雖少胃氣卒不便虛故也亦
有治痰用峻利過多則脾氣愈虛津液不運痰反亦生而愈
盛法當補脾胃清中氣則痰自然運下此乃治本之法世謂
醫中之王道者正此類也

論痰證有似邪祟 詳見補虛門

痰飲

解表之劑

仲景大青龍湯

小青龍湯並治溢飲者當發其汗 二方並見傷寒門

按二方太陽經發散風寒之藥辛溫之劑也小青龍用乾姜細辛半夏以治水氣蓋傷寒表未解心下有水飲水寒相搏

乃為喘咳諸證故用此發汗散水金匱要略借為治飲之方也

也

三因參蘇飲治痰積停積胸膈中脘閉嘔逆痰涎眩暈嘈煩或頭痛發熱狀如傷寒方見局方

按此出少陽柴胡例藥治感冒異氣挾痰飲之病本方云前胡葛根但能解肌枳殼橘紅輩白能寬中快膈母以性涼為疑愚觀藥性非涼亦是辛平之劑

局方金沸草散治風化痰除頭項強寒熱咳嗽

旋覆花

荊芥

前胡

麻黃去節各二兩

甘草炙

赤芍

半夏製各三錢

右咀姜棗煎活人金沸草散去麻黃赤芍加茯苓細辛

按此出陽明旋覆花代赭石例解利治痰之藥也局方氣味辛平活人則辛溫

攻下之劑

金匱十棗湯治懸飲內痛

芫花 熬

甘遂

大戟 各等分

右搗篩以水一升半煮大棗十枚至八合去粗內藥末強人一錢匕羸人半錢平旦服之不下更加半錢快下後以糜粥自養

按此出少陰水氣例藥芫花之辛以散飲二物之苦以泄水甘遂直達水氣所結之處乃泄水之聖藥性有毒不可輕用下同

三曰控涎丹凡人忽患胸背手足頸項腰膀隱痛不忍筋骨牽引釣補時時走易不定乃是痰涎在心膈上下變為此疾或手足冷痺氣脉不通誤認癱瘓非也

甘遂 去心

紫大戟 去皮 真白芥子 各等分

右為末糊丸桐子大曬乾食後臨卧淡姜湯或熱水下五七丸至十九丸痰猛加丸數

一方妙應丸亦只上三味

驚痰加硃砂

痛者加全蝎

酒痰加雄黃金蝎

驚氣成塊者加穿山甲鱉甲玄胡索蓬朮

臂痺加木鱉子去油殼

熱痰加盆硝

寒痰加丁香胡椒桂

宣明三花神佑丸

十棗湯加牽牛大黃輕粉 詳見下劑

按已上二方仍十棗湯加減法也並出少陰水氣例前方去
羌花加白芥子本草主上氣發汗胸膈痰冷蓋胸有痰非此不
達此方加牽牛大黃大瀉血氣之燥熱而輕粉又去涎積也
虛家不可輕用

金匱厚朴大黃湯治支飲脇滿者

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

口水五升煮二升溫服

按此即小承氣湯陽明可下例藥也

三隱君袞痰丸

括曰甌裏翻身甲掛金于頭戴草堂深相逢二八求斤正
硝煨青礞倍若沉十七兩中零半兩水九桐子意常斟千般
怪證如神効水瀉雙身却不任

按此以大黃黃芩為君大瀉陽明濕熱之藥礞石以隊痰沉
香則引諸氣上而至天下而及泉為使也以上一方有實熱
者可用

脾胃論蠲飲枳實丸逐飲消痰導滯清膈

枳實 半夏 陳皮 去皮各兩 黑牽牛 七斤取末二兩

右末水煮麩糊丸桐子大每五十九丸姜湯下

瑞竹堂方神仙墜痰丸

皂角不蛀者 去皮弦斷多黃色去子淨一兩六錢

生白礬一兩錢黑牽牛一斤取頭末四兩

右為細末清水丸桐子大每五十九空心溫酒下

寶鑑天利膈丸風痰實滿喘嗽風氣上攻

牽牛四兩青膏半夏皂角青皮各二兩

槐角一兩炒木香半兩加檳榔大黃各五錢

右為細末姜汁糊丸桐子大食後姜湯下五十九

滌痰丸治三焦氣塞下痰飲酒食

木香檳榔青皮陳皮

三稜大黃煨枳殼半夏各二兩

黑牽牛二兩炒取末

右末糊丸桐子大每服五十九食後姜湯下

按已上四方所用牽牛皂角木香檳榔者並出厥陰例藥也

牽牛以大黃引之則入血以諸氣藥引之則入氣本瀉氣中濕

熱之藥大能脫人元氣用者戒之

透羅丹治痰實咳嗽胸膈不利

皂角酥炙去皮弦二兩黑牽牛微炒兩

半夏二兩巴豆去毒另研杏仁炒黃去皮尖一錢

大黃一兩紙裹水浸慢火焙乾

右為細末生薑自然汁為丸桐子大食後姜湯下三十九

按此仲景備急丸加減法也破堅積結聚寒熱兼用之藥也

三因破飲丸治五飲停蓄結為癥癖支滿胸膈搶心疼痛

畢撥丁香胡椒砂仁

青皮

烏梅肉

巴豆去皮

木香

錫梢 各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒楮皮焦去巴豆將所浸水澆烏梅肉炊一熟飯細研為膏如粟豆大每服五七丸臨卧姜湯下津咽亦得

按此破堅積寒癖大熱之藥也

局方妙香丸治一切久遠沉積

巴豆

膩粉

硃砂

硃砂

牛黃

水銀

腦

麝

右分兩脩製見本方

按此用巴豆硃砂削堅破癖加以腦麝等辛香飛戾通達五

臟入骨透肌之藥也

錢氏白餅子

巴豆二十四箇

去皮膜水一斗煮水盡為度

半夏湯浸七次焙為末

輕粉

滑石

天南星各一錢

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小豆大捻作餅子煎

葱白湯下

按此錢氏用治小兒風痰驚涎癩癩驚搐下痰之藥也以上

所用巴豆等方蓋以痰飲癖積結聚堅固非此不能除故易

老號斬關奪門之將然大宜詳審不可輕用

古方巴豆加減寒熱溫涼五色佐使之藥甚多用之各隨其

宜並見元戎

吐劑

仲景瓜蒂散

子和三聖散 並見吐劑

稀涎散

猪牙皂角 碌礬

晋礬 藜蘆

元戎勝金丸

薄荷 瓜蒂 藜蘆 硃砂

猪牙皂角

按已上用瓜蒂藥並出三陽可吐藥例古今吐法以病在頭或在胸中但在上焦者皆可用也在經絡者亦可用吐法中

就有發散之義焉諸亡血虛家不可用此

分利之劑

仲景五苓散治瘦人臍下悸吐涎沫而癰眩者水也 方見瀉

治濕和中之劑

金匱苓桂朮甘湯治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓四兩 桂枝 白朮各二兩 甘草二兩

右水六升煮取三升三服小便即利

按此太陽經藥也

茯苓湯治胸中有痰飲自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮各二兩 枳實二兩

橘皮二兩半 生姜四兩

右水六升煮取一升八合分溫三服

按此是太陰陽明經藥也

枳朮湯治心中堅大如盤水飲所作 方見水藥門

按此是太陰陽明經藥也

澤瀉湯治心下有支飲其人苦眩冒

澤瀉三兩 白朮二兩

右以水二斗煮取一升分溫再服

按此是太陰陽明太陽少陰經藥也

小半夏湯治心下水支飲嘔吐不渴

半夏一升 生姜半斤

右以水七升煮取一升半分溫再服

按此是太陰陽明經藥也

小半夏加茯苓湯治卒嘔吐心下痞隔間有水眩悸者三因名

半夏湯

半夏一升 生姜半斤 茯苓三兩

右同煎服如前

按此是太陰陽明太陽手太陰經藥也

按已上諸方並出太陰痰飲例藥也白朮除濕益燥和中益

氣半夏治寒痰和胃勝濕茯苓澤瀉逐水利小便上下分消

其濕也

局方橘皮半夏方 方見本方

局方二陳湯治痰飲為患嘔吐惡心頭眩心悸等證方見本方
桔槩半夏湯治胸痞痰涎不利氣逆嘔噦

桔槩 半夏 陳皮

右等分細末生姜水煎姜糊丸亦可加枳實減半夏名桔槩湯

嚴氏導痰湯治一切痰飲頭目眩暈或痰飲留積不散方見本方

右劉姜煎

按已上所用橘半等乃是太陰陽明經藥也出太陰嘔噦例

許學士神木丸治痰飲

茅山蒼朮 一斤米泔浸二宿去皮切片焙乾為末

生油麻 半兩水盪研細取漿 大棗 十五箇煮取肉研碎入麻漿拌和藥

右末為丸桐子大日曬乾每服五七十九溫酒空心下

按此是陽明太陰經藥治濕散之藥也

仁齋加味二陳湯治痰攻眼腫痛并酒家手臂痛重成麻痺

二陳湯中加蒼朮片子姜黃製枳殼各少許

芎夏湯逐水利飲

二陳湯加川芎白朮青皮枳殼

右劉姜五片煎蓋川芎半夏能逐水也

按此二方乃二陳湯加蒼朮川芎等藥是亦治濕帶表之藥

也

治風痰之劑

局方青州白丸子 方見小兒門

按此是太陰經藥出厥陰例治風痰行經通痺之熱藥也

局方玉壺丸

南星

半夏

天麻

白麩

辰砂化痰丸

南星

半夏

辰砂

白礬

右主治修製並見本方

易老水煮金花丸治風痰脉弦咳嗽

南星

半夏各兩生用寒水石二兩燒存性

天麻五錢

白麩三兩

雄黃一錢

石為細末滴水為丸小豆大每服五七十九至百丸煎漿水

沸下藥煮浮為度漉出淡漿水浸另用生姜湯下或通聖加

半夏局方川芎丸防風丸皆可用也

按已上三方並出太陰嘔噦例治痰挾風之涼藥也

良方天南星丸治婦人風疾

天南星

白附子並炮

皂莢仁炒黃

半夏麩各兩晉礬半兩枯

按此是太陰厥陰經藥也

熱痰之劑

仲景小陷胷湯

半夏

黃連

枳實

右先以水二觔煎枳實至一觔半下諸藥煎八分溫服示

利再服

嚴氏半夏丸治肺熱痰嗽

瓜蒌仁 另研 半夏 湯洗焙各二兩

右件和勻姜汁打糊丸

按此小陷胃加減法也

機要小黃丸治熱痰

人參 黃芩

生薑

南星

半夏

右姜汁糊為丸 一方南星半夏黃芩只三味

宣明茯苓半夏湯治風熱痰涎

二陳湯中加黃芩

按此亦是太陰經藥也

人參半夏丸化痰治涎止咳受嗽諸痰不可盡述

人參

茯苓

南星

薄荷葉各半兩

半夏

乾生薑

生白礬

寒水石各一兩

蛤粉 二兩

藿香葉 一分

一法加黃連 半兩

黃栢 二兩

右為末麩糊丸如小豆姜湯下二三十丸食後

治寒痰之劑

深師消飲丸治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白朮 二兩

茯苓 半兩

枳實 炒

乾姜 各一錢

右細末蜜丸桐子大溫水下三十丸

寶鑑溫胃化痰丸治膈内有寒脾胃傷飲胸膈不快痰涎不已

半夏膏 陳皮 乾姜 白朮各一兩

右為末姜汁糊丸桐子大姜湯下二十九

白方溫中化痰丸治停痰留飲

青皮 良姜 乾姜 陳皮

右主治修合見本方

局方丁香五套丸治脾胃虛弱不能宣行水穀故為痰飲結聚

胸膈嘔吐不食 方見本方

按已上諸方乃溫胃燥濕治寒痰溫裏之藥也若久痰凝滯

內蘊濕熱候服燥熱多成吞酸膈噎等病用者審之

發明半夏溫肺湯治中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜多唾清水

腸脹不食此胃虛冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花 細辛 桂心 人參

甘草 陳皮 桔梗 芍藥

半夏各半兩 赤茯苓三分

右咀四錢姜七片煎

丁香半夏丸治心下停飲冷痰

檳榔三分 丁香 半夏各兩 細辛

乾姜 人參各半兩

右細末姜汁糊為丸每服二十九姜湯下

機要姜桂丸治寒痰

南星 半夏 官桂各兩

右細末糊丸桐子大五七十九姜湯下

按已上三方治寒燥痰温中散表寒之藥也
理氣之劑

烏方四七湯治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽
喉之間咯不出咽不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

紫蘇葉 二兩 厚朴 三兩 茯苓 四兩 半夏 五兩

右列生姜棗煎服

百一選方三仙丸治中脘氣滯痰涎不利

南星 半夏 各五兩用姜汁作麩 香附 五兩

右末糊丸桐子大每服四十九丸姜湯下

機要香附加橘皮名玉粉丸治氣痰

指迷茯苓丸治中脘留伏痰飲臂痛難舉

半夏 二兩 茯苓 一兩 枳殼 炒半兩 風化硝 二錢半

右末姜汁糊丸姜湯下三十九

按已上三方用南星半夏所以勝痰而兼用諸氣藥即嚴氏

順氣則痰自下之意然紫蘇枳殼肺氣藥也厚朴脾胃氣藥

也香附肝氣藥也隨臟氣而用不可不分

降氣降痰温補之劑

局方蘇子降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

俞山人降氣湯治證同前

黑錫丹治痰氣壅盛上盛下虛心火炎熾腎水枯竭

靈砂丹治上盛下虛痰涎壅盛此藥最能鎮降升降陰陽

四方並見本方

按已上諸方並係類聚溫熱之藥而出證皆云治上盛下虛
氣不升降夫所謂盛者即心火之炎虛者即腎水之弱火炎
水弱則有升無降故津液湧而為痰涎於上今以金石丹藥
濕熱香燥之藥而欲補下焦之虛如抱薪救火爾若以為下
焦陽虛而議治者亦非也夫陽火之虛則陰水必盛痰涎津
液自然隨氣而降又何必用此藥也

金匱腎氣丸治短氣有微飲當從小便去之

方見補虛門

按仲景以腎虛有飲故用此補腎逐水以其中有澤瀉茯苓
故也而嚴氏以此方治腎虛寒而不能攝養腎水使邪水溢
上多吐痰唾夫腎既虛寒則陽火必盛未審所錄攝養腎水
者何物耶夫腎水乃天一所生人之根蒂痰涎乃津液敗濁

而成豈可直指腎水不攝而邪水溢上耶若云腎水虛弱陰
虧難降使津液敗濁而為痰水故用此藥於義則明白矣

謹按痰病多生於濕故古方多用南星半夏之類然亦有所
挾之邪故藥有風寒暑濕之異又入身體段有上下表裏故
在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者分利之治飲
之法可謂詳矣或曰陳無擇以大小青龍五苓承氣為外因
參苓八味參蘇為內因十棗葶藶大小半夏控涎破飲為不
內外因今吾子所編諸方意不作此何也予曰大小青龍外
因之表藥五苓承氣外因之裏藥也參苓八味內因之裏藥
參蘇飲內因之表藥也十棗葶藶控涎破飲不內外因之下
藥也大小半夏不內外因和中藥也彼以三因立論故敘藥

止以所因為主而不分其表裏內外之異今子以表裏內外
分類諸方則難拘其所因也

卷之四

玉機微義卷之五

滯下門

腸澼生死脉法

內經曰腸澼便血身熱則死寒則生腸澼下白沫脉沉則生浮
則死腸澼之屬身不熱脉不懸絕滑大者生懸濡者死以臍期之
又曰陰陽虛腸澼死又曰泄而脫血脉實皆曰難治

按此云生死亦是大槩言之必須更兼證以詳審之下同
脉經云腸澼下膿血脉沉小流連者生數疾且大有熱者死又
腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

嚴氏云凡下利之脉微小者生浮洪者難治腸澼下膿血者脉
宜滑大若弦急者死

仲景治痢大法

下痢脉沉弦者下重脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死下痢手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘者死 下痢有微熱而渴脉弱者令自愈下痢脉數有微熱汗出令自愈設脉緊為未解 下痢脉數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也 下痢反弦發熱身汗者自愈 下痢氣者當利其小便 下痢腹脹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表温裏宜四物攻表宜桂枝湯 下痢脉滑而數者有宿食也當下之 下痢脉遲而滑者實也痢為未止急下之下痢脉反滑當有所去下之安 下痢不欲食有宿食者當下之 下痢腹滿痛為寒實當下之 下痢腹堅者當下之 下痢譫

語有燥屎當下之下痢三部脉皆平按之心下堅急下之 下痢已差至其時復發者此為下未盡更下之安 下痢脉大浮弦下之當自愈 風寒下痢者不可下下後心下堅痛脉遲此為寒宜温之 下痢脉浮大此為虛強下之故也設脉浮韋者因而腸鳴當温之 下痢脉遲緊痛未欲止當温之 下痢心痛急當救裏可與理中四逆附子輩 下痢大孔痛宜温之 按丹溪曰仲景治痢可下者十法可温者五法或解表或利小便或待其自已區別易治難治不治之證至為詳密但與泄痢衮同立論而未分今載于滯下門內故於瀉痢條內不載宜於此通考焉

東垣治痢法

病機機要云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉弦則去風膿血稠粘以重劑竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之驚澹為利當溫之又云在外者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便瀦分利之又曰盛者和之去者送之至者止之兵法曰避其銳氣擊其墮歸此之謂也

秘藏云假令傷寒飲食腹脹滿而傳殮泄者宜溫熱之劑以消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之風邪下陷者升舉濕氣內勝者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脉弦細而弱者溫之收之膿血稠粘至圓而不能便其脉洪大而有力者寒之下之

按此分風寒濕熱表裏溫補寒下等治至為切當學者尤宜熟玩但其裏急後重腹痛之義未詳今別論于左

太陰受濕傳腎為膿血痢

機要云有太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不和穀味久則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈者若先利而後滑謂之微邪故易痊此皆脾土受濕之所為也

再有風寒二證在泄痢條下

論風寒暑濕皆能作痢

陳無擇云滯下之證內經所載血溢血泄血便注下古方則有清膿血近世呼為痢疾其實一也多由脾胃不和飲食過度停積於腸胃不能剋化又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱

則赤傷冷則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱交併
赤白兼下治法當先用通利之藥疎滌臟腑

嚴氏云以巴豆等劑推其積熱後辨以冷熱風濕之證用藥調
治熱赤者清之冷白者溫之傷風而下清血者則祛逐之傷濕
而下豆汁者分利之冷熱相併溫涼以調之仍須先調胃氣切
不可驟用墮粟訶子之藥止之澁之使停滯不泄多致危殆

按赤白分冷熱之說河間論之甚詳其云風下清血濕下豆
羹汁者蓋謂風喜傷肝肝主血故下清血者為風也濕喜傷
脾胃胃為五穀之海無物不受常兼四臟蓋豆汁之色如五
色之相雜故下豆羹汁者為濕也又云治法當先通利此迎
而奪之之義若有虛者亦宜審之使果有積滯在腸胃者方

不當通利然嚴氏謂巴豆等藥使用之於傷冷物則可若用
之於熱者為害非輕又云風則祛逐所謂祛逐者果何法何
藥與若以邪氣當祛逐則豈獨於風而寒濕熱為不可耶此
又失於明白

論滯下分三因

陳無擇云古方風停膚腠下瘀血或下鮮血濕毒下如豆羹汁
皆外所因之明文也古方有五洩因臟氣鬱結隨其所發使利
膿血作青黃赤白黑色一一不同即內所因也又飲食冷熱酒
醴醢醢縱情恣慾房室致傷精血腸胃粘溢久積冷熱遂成毒
刑皆不內外因治之先推其歲運以平其外察其鬱結以調其
內審其所傷以治不內外條然明白不致妄投也

按此所分三因治法其理甚當但外因六淫所傷者古方用藥則多有之內因臟氣鬱結與夫飲食房勞而得者諸方則未之見也凡三因所傷皆能干犯腸胃而為痢今陳無擇立論有三因之分而用藥無三因之別此又所當分而治者失於開示焉

時疫作痢

大全良方云有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖當察運氣之相勝亦不可狎泥當先察其虛實冷熱首用敗毒散如人參甘草陳皮隨證用之

按時疫作痢歲常有之其謂當察其運氣之相勝與病冷熱虛實之不同誠為確論蓋欲學者知五運六氣有太過不及勝負之不同以分風寒暑濕燥火為病而平治之也然首專用敗毒散之義何其自狎泥也

論食毒作痢

陳無擇云飲服冷熱酒醴醢醢腸胃粘溢之積冷熱遂成毒痢嚴用和云或有飲服冷酒寒物房室勞傷精血而成久毒痢則宜化毒以保衛之

按人之飲食過傷恣食辛熱寒冷之物皆能致傷腸胃腸胃一傷不能運化傳送遂蓄積停滯而為痢經日飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟膜滿閉塞下為飧泄久為腸澼是也治法當先消化食毒或可攻伐然後隨寒熱溫涼以調之此二論本諸內經而世所未言者也

論裏急後重

病機云裏急後重脉大而洪實為裏熱甚而閉是有物結墜也若脉浮大甚不宜下雖裏急後重而脉沉細弱者謂寒在內而氣散也可溫養自愈裏急後重閉者大腸經氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣原病式云下迫後重裏急窘迫急痛也火性急速而能燥物故也

按裏急者窘迫急痛是也後重者大腸墜重而下也夫裏急後重其證不一有因火熱者所謂火性急速而能燥物是也有因氣滯此大腸經氣壅而不宣通也有因積滯壅盛者是也有物結墜也有氣虛者此大腸氣降而不能升也有血虛者所謂虛坐努責是也治法火熱者寒之清之氣滯者調之積滯者去之氣虛而降者升之舉之血虛者補之各察其所因也切觀前論未為詳盡

論泄痢而嘔

病機云如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生薑橘皮中焦不和治以芍藥當歸桂茯苓下焦不和而寒治以輕熱甚以重熱藥

按此云泄痢而嘔謂胃氣不和所致蓋亦有胃中火逆衝上而嘔者有胃虛而嘔者有積滯毒氣上攻而嘔者有陰虛而嘔者豈可一於胃氣之不和而不它及耶

論泄痢腹痛

機要云腹痛者和之如發熱惡寒腹不痛藥加黃芩為主腹痛

其者加當歸倍為藥

按泄痢腹痛其證甚多皆因內氣鬱結不行所致理宜行氣散鬱為先然亦有挾寒有挾火熱者有因積滯者有血虛者又宜隨證處治為當也今機要云和之一字總言之耳蓋加當歸倍為藥之法惟血虛可用

論禁口痢

百一選方云禁口痢是毒氣上衝心肺所致用石蓮肉以通心氣

按痢而能食知胃未病也若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成禁口之證理宜除胃口之邪熱而此云毒氣上衝心肺其毒不知指何者之邪然亦有脾胃虛而得者亦有誤服利劑藥毒犯胃者又有服瀉熱之劑太早而邪氣閉遏於胃口者必當求責

論下痢吃逆

丹溪曰吃病氣自下衝上屬火之象古方悉以胃弱言之殊不知胃弱者陰弱也虛之甚也滯下之久多見此證乃因久下而陰虛也詳見吃逆本兩

辨痢色分五臟

原病或曰瀉白為寒青黑紅赤黑皆為熱也蓋瀉白者肺之色也由寒水制火不能平金則金肺自甚故色白也痢色青者肝木之氣由火甚制金不能平木故色青也或言痢色青為寒者誤也仲景少陰病下痢清水色純青熱在裏也大承氣湯下之

及小兒熱甚急驚痢色多青為熱明矣痢色黃者由火甚則水必衰而脾土自旺故色黃也痢色紅為熱心火之色也或赤熱深甚也至若痢色黑亦言熱者由火熱亢甚則反兼水化制之故色黑也故傷寒陽明病云云法當大承氣下之大便不黑者難恐作易治諸痢同法

按世人多以瀉痢之青白黑三色為寒黃赤二色為熱今觀河間分五臟之論煥然耳目而知世人之非也或曰內經視絡脉之色曰寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤又曰黃赤則熱多白則寒世俗之論豈非本於此與愚曰內經論經脉之常色心赤肺白肝青脾黃腎黑也陰絡之色應其經但陽絡之色隨四時而行應無常色遇天氣之寒則經絡凝泣故其色多青黑遇天氣之熱則經絡淖澤故其色多黃赤此蓋因外氣之寒熱而浮絡相應而然凡人之在冬月炎天與夫久坐遠行其面色相應亦皆然非如痢色之出於臟腑隨內氣所感而生也况滯下之證多因濕熱所致內經曰肺熱者色白而毛敗心熱者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒槁此雖論痿亦可見五臟之內熱皆能顯此五色今滯下之論五色意實相同然此不可與浮絡之因外氣相應者同語也辨赤白分冷熱之誤

原病式曰或言下痢白為寒者誤也若果為寒則不能消穀何由反化為膿也所謂下痢穀反為膿血如世之穀肉果菜濕熱

甚則自化腐爛潰發化為膿血也其熱為赤熱屬心火故也其濕為黃濕屬脾土故也燥鬱為白屬肺金也經曰諸氣憤鬱皆屬于肺謂燥金之化也然諸瀉痢皆兼於濕今反言氣燥者謂濕熱甚於腸胃之內而腸胃拂鬱結而又濕至于否以致氣液不得宣通因以成腸胃之燥使煩渴不止也假如下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤誤豈知水火陰陽寒熱者猶權衡也一高則必一下一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃而同為痢乎如熱瘡瘍而出白膿者豈可以白為寒與其在皮膚之分屬金故色白也次在血脉之分屬心火故為血也在肌肉屬脾土故作黃膿在筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故紫黑血出也各隨五臟之部而見五色是其標也本則一出於熱但分淺深而已大法下一窘痛後重裏急小便赤澀皆屬燥熱而下痢白者必多有之然則為熱明矣

按河間謂赤白不當分冷熱乃屬肺金心火之化又謂五色各屬五臟本則一出於熱其論至當但世患此疾者赤白居多今既以不當分冷熱為治若專以辛苦寒退熱此則治本之法所謂心火肺金之化者抑有別與蓋心主血肺主氣白屬肺金此氣受病也赤屬心火此血受病也赤白相雜血氣俱受病也知此則肝青脾黃腎黑之說亦可得而互明矣

論熱藥治痢之誤

原病或云或曰白痢既為熱病何故服辛熱之藥亦有愈者耶蓋辛熱之藥能開發腸胃鬱結使氣液宣通流濕潤燥氣和而

已蓋病微者可愈甚者鬱結不開其病轉加而死矣凡治熱甚吐瀉亦然夫治諸痢者莫若以辛苦寒藥治之或微加辛熱佐之則可蓋辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已如錢氏香連丸之類是也故治諸痢者黃連黃柏為君以其至苦大寒正主濕熱之病乃若世傳辛熱金石毒藥治諸吐瀉下痢或有愈者以其善開鬱結故也然雖亦有驗者或不中效反更加害

按治痢用辛苦寒之劑開鬱燥濕勝熱三法俱備世之用辛苦熱金石毒藥者誠非也然亦有久痢腸胃虛滑者亦當求責治痢通用之法

子知云夫下痢膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加薑棗蔥更下或用凡瀉訖以五苓散元調下又一男子瀉痢不止如傾不敢冷坐諸醫皆以為寒治延二十載兩手寸脉皆滑余不以為寒所以寒者水也以茶調散湧寒水五七升又以無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以淡劑利水道

按此用吐下以治痢本內經通因通用之說使腸胃虛滑者其可下乎中氣虛弱者其可吐乎今云可下者謂有積滯在腸胃壅不通者也可吐者謂有痰飲在膈上氣不能降以致大腸不能收斂者也

丹溪曰積濕成痰在肺中宜大腸之不固也清其源則流自清矣正是此意
論局方用熱藥澁藥之非

丹溪曰洩痢一證局方用鍾乳健脾丸朝真丹訶藜勒丸大溫
解毒等藥皆用熱藥為主治澁藥為佐使當為腸虛感寒而成
滑者設也彼瀉痢者將無熱證耶將無積滯耶內經曰痢有膿
血多屬滯下夫瀉痢證其類尤多先賢曰濕多成泄此雖論也
然有挾風者固不可得而同矣况風與濕之外又有雜合受邪
似難例用澁熱之藥局方出證有兼治裏急者有兼治後重者
有無治裏急後重者此豈非滯下病乎今瀉痢與滯下表同論
治實實虛虛之患可不俟終日矣經曰暴注下迫皆屬於熱又
曰暴注皆屬火又曰下痢清白屬於寒屬火熱者二屬水寒者
一瀉痢一證似乎屬熱者多屬寒者少局方專以澁熱為尾若
用之於下痢清白為寒者或可笑所謂下迫者即裏急後重之
謂也其病屬火相火所為其毒甚於熱矣殺以澁藥非殺而何
滯下亦有挾虛挾寒

丹溪曰或問河間之言滯下似無挾虛挾寒者乎予曰洩
痢之病水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯下則不然
或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相混雖有痛
不痛大痛之異然皆裏急後重逼迫惱人似乎皆熱證實證也
予近年涉歷亦有大虛大寒者不可不知敢筆其畧以備采覽
予從叔年踰五十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重頗併
穀食大減時有微熱察其脉皆弦而澁似數而稍長却喜不甚
浮大兩手相等視其神氣大減予曰此滯下憂慮所致心血虧
脾氣弱耳遂與參朮為君當歸陳皮為臣川芎炒芍藥茯苓為

佐使時暄熱甚加少黃連兩月而安婁長官年三十余奉養厚者夏秋間患滯下腹大痛有人教服單煮乾姜與一貼則痛定少頃又作又與之定由是服乾姜至三斤八日視之左脉弦而稍大似數右脉弦而大稍減亦似數重取之似緊予曰此必醉飽後吃寒涼太過而當作虛寒治之因其多服乾姜遂教用四物湯去地黃加人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎入生姜汁飲之至一月而安金氏婦年近四十秋初旬患滯下腹但隱痛夜重於晝全不得睡食亦稍減口乾不飲已得治痢靈砂二貼矣予觀之兩手脉皆澁且不勻神思倦甚飲食全減因與四物湯倍加白朮以陳皮佐之與十數貼而安此三病者若因其逼迫而用峻劑豈不悞人

按滯下之證古人多與泄瀉同論至三因方始能以五條目蓋實有不同夫病有從外感而得者須分六氣之異外既受傷腸胃鬱結遂成赤白等證當隨其寒熱溫涼以調之有因臟氣發動干犯腸胃而得者須察其何臟相乘以平治之又

有因飲食失節而得者則又審其何物所傷以消尅之世之感此疾者其因誠不越夫是三者但其受病之後腸胃拂鬱膿血稠粘裏急後重諸方雖有寒熱虛實之論劉河間則以為一出於熱然考之內經似亦熱多而寒少也我丹溪先生則以為亦有挾虛挾寒之證深戒學者須宜識此世之局方不辨三因專用遊熱之藥其失甚矣至河間立說專用苦寒疎下之藥則亦未甚為當何則蓋病有虛實治有先後若病

氣暴至元氣壯實積滯膠固須宜下之病久氣脫腸胃虛滑
不禁者亦宜溫之澁之大抵治痢當從仲景河間之法可溫
則溫可下則下或解表或利小便或待其自已劉河間分別
在表在裏挾風挾熱挾寒等證後之作者無越於斯但氣血
一條未嘗表出立論其於芍藥湯下有曰行血則便自愈調
氣則後重除蓋謂澁便膿血血之滯也故曰行血自愈奔迫
後重氣之實也故曰調氣自除誠哉是言但膿血赤白亦有
氣病血病之分後重裏急亦有氣實血虛之異學者又不可
不察詳見前論

滯下門

治熱之劑

仲景白頭翁湯治熱痢重下者

白頭翁 二兩

黃連

黃柏

秦皮 各三兩

右四味以水七升煮取二升去粗服一升不愈再服

按此治痢在下焦腎虛有熱也經云腎欲堅故用純苦之劑
以堅之出太陰例藥也以其下痢屬太陰故也

機要黃芩芍藥湯治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾及
下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥 各二兩 甘草 五錢

右咀每服半兩水一觥半煎一觥溫服

按此手足太陰經之藥也仲景用芍藥甘草湯以復其陰酸以收之甘以緩之酸甘相合以補陰血也芍藥白者補赤者瀉出太陽芍藥甘草例

大黃湯治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

大黃一兩

右細剉好酒二大觥同浸半日許再同煎至一觥半去大黃將酒分為二服頓服之痢止一服如未止再服取利為度後服芍藥湯以和之利止再服黃芩芍藥湯徹其毒也

按此乃陽明調蕩滌邪熱之藥用酒煎者欲其上至頂顛外徹皮毛也

芍藥湯下血調氣經曰澁而便膿血知氣行而血止也行血則

便自愈調氣後重除

芍藥一兩

當歸

黃連

各半兩

檳榔

木香各錢

桂二錢半

大黃三錢

黃芩半兩

甘草二錢炙

右咀每服半兩水煎食後溫服清如利不減加大黃

按此行血調氣不熱之藥也大凡用藥之雜與品味之多者難以細分經絡當觀其大體如何此則太陽桂枝例藥也

白朮黃芩湯服前藥雖除更宜此調和

白朮一兩

黃芩七錢

甘草三錢

右咀勻作三服水煎服清

按此去濕熱和中活血之藥也

錢氏芍藥藥皮丸

芍藥

黃柏各等分

右為末水丸

守真芍藥藥皮丸治一切濕熱惡痢

芍藥

黃柏各兩

黃連

當歸各等兩

右為末水丸如小豆大

按此二方補陰降火下焦之藥也出太陽例

局方黃連阿膠丸治冷熱不調赤白下痢

阿膠炒二兩

黃連三兩

茯苓二兩

石水熬阿膠膏澁和二末為丸米飲服

按此補虛退熱除濕之藥也出太陽例海藏云已上苦寒之

劑元病不經內傷冷物者宜察亦當服人之虛實及以脈別之

治寒之劑

局方桃花丸治冷痢腹痛下如魚腦白物

赤石脂煨

乾姜炮各等分

右為末蒸餅糊丸米飲下三四十丸日三服

按此出陽明例藥方

丹溪曰桃花丸即要略桃花湯也仲景以治便膿血用赤石

脂丸者乾姜粳米同煮作湯一飲病安便止後藥意謂病下

焦血虛且寒非乾姜之溫石脂之澁且重不能止血粳米味

甘引入腸胃不使重澁之體少有凝滯藥行易散餘毒亦無

局方不知深意改為丸藥劑以麪糊日與三服果能與仲景之意合否也

嚴氏當歸丸治冷留腸胃下痢純白腹痛

當歸酒洗 芍藥 附子炮去皮臍 白朮

乾姜炮 厚朴 阿膠 烏梅肉二兩

蛤粉炒各二兩

右為細末醋糊丸桐子大每服五十九丸米飲送下

局方訶藜勒散治腸胃虛弱泄利水穀漸成痢疾

青皮去穢 肉豆蔻選星煨 肉桂五錢 附子炮去皮臍二兩

訶子仁各四兩

右為末每服三錢姜三片煎服

按局方以白痢為寒多用辛熱燥毒之藥若用之於下痢清穀腸虛感寒者或可笑若膿血稠粘厲火之證用之非殺而何但感寒之證吾恐什百而一二也
冷熱之劑

古方駐車丸治冷熱下痢腸滑赤白

黃連六兩 乾姜 當歸各二兩 阿膠

右先以醋煮膠令消入前三藥和勻衆手丸桐子大米飲下

局方香連丸治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連去芦二兩用吳茱萸上兩同炒令赤色去茱萸不用

木香四兩八錢不見火

右為細末醋糊丸桐子大每服二十九空心米飲下

按此出太陰例藥也

戊己丸治胃經受熱泄痢不止

黃連

吳茱萸去穢炒 白芍各五兩

右為細末麩糊丸桐子大每服三十丸茶飲下

按此出厥陰已寒例已上三方出證治冷熱下痢蓋冷熱異氣水火相反豈能同在腸胃為病耶論中辨之詳矣但其製方亦有暗合妙理惜乎世人莫知其深意也三方皆以黃連苦寒之藥為君正治濕熱之氣佐以辛苦溫藥所以開鬱行滯氣血宣通病亦自已乾姜木香茱萸三者各隨經合宜而用要在學者臨機應變又不可拘執於此也

治風之劑

機要防風芍藥湯治泄痢殮泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛而微汗

蒼朮防風湯治泄痢脉弦頭痛

良方神木散治春傷於風夏必殮泄 已上三方並見泄瀉門

澹寮方倉廩湯治下痢頭疼心煩不食

局方敗毒散四錢加陳倉米百粒姜棗煎服

按此乃發散風寒之劑出太陽例藥也

治濕之劑

機要白朮芍藥湯治脾經受濕水泄注下蒼朮芍藥湯同

仲景五苓散

宣明益元散

已上四方並見泄瀉門

治暑之劑

白方黃連香薷飲治感暑下痢鮮血方見暑門

按此解散暑熱心肺藥也出太陰厚朴例

宣明桂苓甘露飲

子和桂苓甘露飲

方並見暑劑

按此三方解表利小便大瀉濕熱氣分藥也太陽經藥也

攻下之劑

仲景大承氣湯

方見下劑

按此泄熱蕩滌腸胃之劑痞滿燥實四證者可用出陽明例藥也

宣明玄青丸治下痢勢惡頻併窘迫或久不愈諸藥不能止須

可下之以開除濕熱痞悶積滯

黃連

黃柏

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

食兩

牽牛

四兩取末二兩

輕粉

二錢

青黛

一兩

右為末勻水丸小豆大初服十九每服加十九日三以快利

為度

機要厚朴枳實湯治虛滑久不愈多傳變為痢先以此湯防其

傳變

厚朴

枳實

訶子皮

一兩半生熟

木香

黃連

大黃

甘草

右為末每服三五錢水煎服

按已上三方逐積去熱之藥也。大黃瀉血也。牽牛瀉氣也。甘遂大戟芫花泄水也。厚朴枳殼泄痞滿也。各隨其病所宜選而用之。

局方蘇感丸去臟腑有積下痢。

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻。如粟米大。每服五丸。淡姜湯空心下。

按局方之學多以此治痢去積。故錄於此。然二藥之類聚溫熱。用於傷寒傷冷之物者。則可。然有熱之人積滯。雖去熱毒。必行其害。何可勝言哉。

本事方靈砂丹治一切積痢。

硃砂

硃砂 並研細各二錢半

右用黃蠟半兩。巴豆三七粒。去殼皮膜。同於銀石器內。重湯煮一伏時。候巴豆紫色為度。去二七粒。止將一七粒與前藥同研極勻。溶蠟和藥。旋丸。粟豆大。每服三丸。至五丸。水瀉生薑湯下。白痢艾湯下。赤白痢烏梅湯下。空心服。

丹溪曰。仲景治痢之法。下者。專用承氣。加減何嘗以砒。巴豆善行滯氣。緩以甘草之甘。飲以湯液。灌漉腸胃。滋潤輕快。無所醫滯積。行即止。此砒丹。巴硃熱毒類聚成丸。其氣凶暴。其體重燥積垢。雖行毒氣未歇。借使有愈。疾之功。其腸胃清淳之氣。能免旁損暗傷之患乎。

消積之劑

脾胃論聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈

黃丹二錢 定粉三錢 蜜陀僧二錢

舶上硫黃二錢 輕粉少許

右為細末入白麩四錢滴水和如指尖大捻作餅子陰乾食前暖水磨化服之大便黑色為妙

元戎聖功丸專治血痢

膩粉三錢七 定粉二錢七 一法加蛤粉

右研勻水浸蒸餅丸菜豆大艾湯下

止澁之劑

仲景桃花湯治下痢便膿血

赤石脂三兩剉半末 乾姜二兩 粳米五升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內赤石脂末方可七日三服若一服愈勿再服

按此方出手陽明例藥也但赤治丙而白治庚也

嚴氏禹餘糧丸治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石煨 赤石脂煨 龍骨 畢撥

乾姜炮 訶子麩裹煨 肉豆蔻麩裹煨 附子炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸桐子大每服七十九空心米飲下

局方真人養臟湯治冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛脫肛

罌粟殼去蒂蓋蜜炙二兩六錢 人參 當歸各六錢

肉桂八錢 訶子皮二兩錢 木香二兩錢 肉豆蔻麩裹煨半兩

白朮六錢 白芍二兩六錢 生甘草二兩六錢

右咀每服四錢水煎服臍寒加附子

水煎木香丸治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

醫粟殼去穢二兩八錢 青皮去白二兩四錢

甘草二兩四錢 當歸洗去土 訶子炮去核八兩 木香不見火

右為末蜜丸如彈子大每服一九水八分盞煎化溫服

秘藏訶子散治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作膿血日夜無度

御米殼去蒂盞蜜炒半兩 訶子煨去核七分 乾姜炮六分

橘皮半錢

右為細末分作二服水煎和滓熱服空心下

一劑云澁可以去脫以米殼之酸微澁上收固氣去脫王用

為君以訶子皮之微酸上收固血治其形脫橘皮微苦溫盞

真氣升陽為之使以乾姜大辛熱除寒為臣亦為主治也

按已上諸方皆行溫熱之藥固氣止血緊澁腸胃當為腸虛

感寒而成滑者設也且滯下之證多屬於熱兼有積滯局方

一門專主澁熱似難例用

宣明香蓮丸

木香 訶子肉炮 黃連炒各兩 龍骨錢

右為細末飲丸黍米大每服二十九米飲湯下

機要訶子散治泄痢腹痛漸以泄下微少宜此止之法云大勢

已云而宜止之

訶子皮一兩半 牽牛

木香兩

黃連三錢

甘草 炙 錢

仁為細末每服二錢以白木芍藥湯下如止之不已宜歸而
送之加厚朴一兩竭其邪氣也

胆田月論訶黎勒丸治休息痢日夜無度腥臭不可近臍腹搦痛

椿根白皮 訶子肉半兩 母丁香 三十箇

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五十九丸溫米飲下

按已上諸方用溫涼之藥以止痢較之局方重用瀉熱則變
法矣夫脫則用瀉理所當然脫而挾寒溫之熱之可也脫而
挾熱涼而瀉之可也寒熱各隨所宜而用似難偏執一說

宣明三聖散治產後下血痢不止

烏魚骨炒 七錢 綿灰 血餘灰汁脂者各等分

右細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

按此專止血之劑

收斂之劑

嚴氏烏梅丸治熱留腸胃下痢純血臍腹痛

烏梅肉 二兩 黃連 二兩 當歸 枳殼 各兩

右為細末醋糊丸桐子大每服七十九丸食前米飲下

元戎烏梅散治下痢津少大渴引飲不休

烏梅 焙乾 兩 茯苓 木瓜 各二兩 一錢如桂 三錢半

右咀每服五錢生姜三片煎

按仲景烏梅丸治傷寒吐衄後人用治下痢此皆酸收之義
出太陽桂枝例藥也

血劑

局方胃風湯治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒如下豆汁或下瘀血日夜無度

人參

白茯苓

芎藭

桂

當歸

白芍

白朮 各等分

右粗散每服二錢入粟米數粒同煎食前

按此方名為治風而實非治風乃補血和血益胃氣之藥下血痢而挾虛者實可倚仗出太陽桂苓例藥也

良方加味四物湯治血痢

四物加阿膠 艾葉

保命集一方四物內加槐花黃連御米殼等分

按此補血溫血之藥出厥陰例藥也

宣明白朮湯治孕婦痢膿血

白朮

黃芩

當歸 各等分

右為末每服三二錢水煎食前服

補劑

良方十全大補湯治一切婦人病痢四十日諸藥不愈六脉沉

弱大凡痢脉宜沉宜弱但服此藥而愈 方見補劑

右姜棗煎成加白蜜半匙再煎數沸服

良方治妊娠下痢腹痛小便澀

糯米一合

當歸炒

黃芩 各二兩

右細切和勻水煎服

按此二方不分經絡補血之劑今人治痢而用此者蓋鮮矣
殊不知血氣虛脫之人與夫胎前產後之證此法不可無也
故特立條目以表章之

雜方

良方治疫毒痢敗毒散多加人參甘草陳皮姜棗煎服

按此方詳見論中

嚴氏益根丸治一切毒痢及蠱注利血下如雞肝心煩腹痛

益根洗

川升麻

犀角

地榆

當歸

黃連

枳殼

白芍

右等分為末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心米
飲下

按此方消化死血解飲食毒之藥

百一選方治禁口痢

石蓮去殼留心并肉碾為細末每二錢陳皮飲調下此是

毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

潘察方治禁口痢毒氣上衝心肺者

敗毒散

陳倉米一百粒

姜三片棗一枚煎

右方治脾胃虛弱禁口痢用山藥一味剉如小豆大一半銀

器內炒熟一半生用同為末米飲調下

按禁口痢古人論之者少故留此三方以備急然石蓮之通

心氣敗毒散散表邪山藥之補脾胃果能開胃口而進食矣

血氣湧治下痢膿血裏急後重腹疼作渴日夜無度

黃連

黃芩

大黃

白芍

當歸

木香

檳榔

右咬咀水煎

此方即前考藥湯加減桂甘草二味今人多如此用故收入

卷之五

王機微義卷之六

泄瀉門

此門宜與滯下者

瀉痢生死脉法

內經云脉細皮寒少氣泄痢前後飲食不入是謂五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經云洩注脉緩時小結者生浮大數者死又洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死

脉訣云下痢微小即為生脉大浮洪無差百

仲景治痢大法

東垣治痢大法

按此並見滯下門

瀉分寒熱

病機機要云臟腑瀉痢其證多種大抵從風濕熱論是知寒少
熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰大便完穀下有
寒有熱熱者脉疾身多動者聲響亮暴注下迫此陽也寒者脉
沉而細身不動作目睛不了了飲食不下鼻准氣息者姜附湯
主之若身重四肢不舉木附湯主之

按此以瀉之久暴分陰陽正如傷寒之病始為寒而終則傳
變而為熱也然亦必以脉證參訂焉

原病式曰瀉白為寒青黃紅赤黑皆以為熱也大抵瀉痢小便
青白不澁為寒赤澁者為熱又完穀不化而色不變吐利腥穢
澄澈清冷小便清白不澁身涼不渴脉遲細而微者寒也穀雖
不化而色變非白煩渴小便赤澁者熱證也凡穀消化無問色
及他證便為熱也寒泄而穀消化者未之有也或火性急速傳
化失常穀雖不化而飧泄者亦有之矣仲景云邪熱不殺穀然
熱得濕則飧泄也

論瀉痢有濕有熱有風有寒

機要云有太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不知穀味久
則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈若先利而後滑
謂之微邪故易痊此皆脾土受濕之所為也

有厥陰經下痢不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此難治
宜麻黃湯小續命汗之此有表邪縮於內當瀉表邪而愈

有暴下無聲身冷自汗小便自利大便不禁氣難布息脉微嘔
吐急以重藥溫之漿水散是也

論暴注屬火

二和云夫暴注瀉水不已內經曰注下也注下水利也暴速甚者屬火宜用水調桂苓甘露飲五苓散或以長流水煎放冷服涼膈通聖亦能治之慎不可驟用罌粟殼乾姜豆蔻之類縱瀉止亦轉生他疾止可分陰陽利水道而已

按已上論所辨寒熱風濕火等證所以明六淫之邪皆能為瀉為注者亦當各隨所淫之邪分而治之可也

論胃氣下降為飧泄

機要云夫脾胃同濕土之化主腐熟水穀胃氣和平飲食入胃精氣則輸於脾土歸於肺行於百脉而成榮衛若飲食一傷起居不時損其胃氣則上升精華之氣反下降是為飧泄又謂大陰轉心陰而為腸澼

論春傷於風夏必飧泄

機要云春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風內臟夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧泄脉泄穀不化重則下痢膿血稠粘良方云經云春傷於風夏必飧泄蓋風喜傷肝春時木旺不受邪反移氣尅於脾土脾既受尅不能運化因成積滯夏秋之間再感暑濕風冷之氣發動而成痢也

論飧泄屬風宜汗

子和云飧泄不止先穀不化發汗可也桂枝麻黃湯主之此證以風為根蓋風隨汗出也

按發泄證機要謂胃氣下流及春行秋令良方謂春木旺移氣尅脾二論雖殊要之皆因風木傳變而脾土受邪爾子和謂風隨汗解此論固是然亦須隨其傳變而治不可執此一法也

瀉分三因

三因嚴氏云泄瀉一證經中所謂洞泄飧泄溇泄溢泄濡泄米穀注下是也所因有內外不內外差殊耳經云春傷於風夏必飧泄又云濕勝則濡泄寒甚則為泄暑熱盛之亦為泄至於七情感動臟氣不平亦致溇泄其如飲食不節過食生冷而成泄瀉者乃胃脾有傷也但停滯泄瀉一證直須積滯已消然後用以斷下藥今人往往便固止之多成痢疾者矣治法先理中焦

次分利水穀治中不效然後斷下

按此三因所分甚詳但外所濇者既六而立方止有其二內之七情為證而又不詳及於治法

治瀉痢用吐下汗三法

子和云一僧臟腑不調三年不效此洞泄也以謀慮不決而成肝主謀慮甚則乘脾脾濕不流乃上湧痰半益又以舟車丸瀦川散下數行仍使燥浴出汗日爾日勝一日常以胃風湯白朮散調養之

按子和為治大率多用此三法洞泄一證縱其果有積滯鬱結之甚元氣壯實者亦不宜驟用此三法况有積滯雖甚而元氣充虛者哉設使果當用此三法者亦當如仲景察證以

辨其吐汗下者有不可下之殊况仲景治痢又有合下合
溫之法焉此得非孟浪乎

丹溪論局方用熱藥瀉藥治痢之誤

按此見滯下門

謹按泄瀉一證古方率以為腸胃虛寒與風冷乘之為論故
多行澁熱之劑彼瀉痢者豈無積滯豈無熱證乎今觀病機
機要所論有屬寒為風濕屬火之證此因於外而傷者也又
云厥陰經動并胃氣下降為瀉痢三因所言七情感動臟氣
不平亦致澹泄此則因於內而傷者也外則當調六氣內則
當平五臟况又有飲食所傷腸胃停滯所致者治法各不同
也然更有因胃氣下流而泄者在法則當升舉因風而成飧

泄者則當解散因痰積於上焦以致大腸之不固而泄者又
當去上焦之痰而不治其瀉因脾胃氣虛而泄者又當補中
益氣使胃氣升騰而泄自止蓋各求其本而治可也

泄瀉門

治濕之劑

機要白朮芍藥湯治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿困弱
無力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜此湯和之身重暴下
是大勢來亦宜和也

白朮

芍藥各兩

甘草五錢

右剉每服一兩水煎

治濕瀉茯苓湯

又治食瀉濕熱

白朮

茯苓各七錢半

右咀每服一兩水煎食前服 一方有芍藥三味等分名白朮散

按已上二方和中除濕是太陰陽明經藥也白朮之甘入胃而除脾胃之濕芍藥之酸澁除胃中之濕熱四支困倦苓利水道而除濕此三味泄痢須用之藥也

蒼朮芍藥湯如前證

蒼朮 二兩

芍藥 一兩

黃芩 半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢煎服清

按此解散濕熱上中二焦之劑太陰經的藥也

良方胃苓湯治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散

平胃散

右合和姜棗煎空心服

按此乃表裏除濕之劑東垣所謂上下分消其濕是也太陽

太陰經藥也出陽明飲痞例

仲景五苓散

宣明益元散

方並見濕劑

按已上二方除濕利小便之劑太陽經的藥也

治風之劑

機要防風芍藥湯治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而得及頭痛微

汗

防風

芍藥

黃芩 各二兩

石咀每服半兩水煎服清

按此治風辛涼之劑太陰太陽經藥也

蒼朮防風湯治泄痢脉弦頭微痛

蒼朮一兩 防風一兩 一方蒼朮四兩麻黃一兩防風

五錢姜七片煎

按此之太陰陽明經藥也

良方神木散治春傷於風夏必殄泄

蒼朮一斤 藁本 川芎各兩 羌活四兩

粉草 細辛一兩六錢

右粗末每服三錢姜三片煎要出汗加葱白

按已上三方治風勝濕辛溫之劑此則太陽經藥也

局方胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下 方見滯下門

按此方名曰治風其實和血之藥也

治熱之劑

局方戊己丸治脾胃濕熱泄痢不止 方見滯下門

按泄瀉局方多以為寒至劉張始言有屬熱屬火之證故諸

方中治熱瀉之方甚少然仲景治傷寒挾熱下痢用葛根黃

芩黃連湯但人未之思耳

治暑之劑

局方來復丹治伏暑泄瀉如水 方見本方

易簡云硝石性寒佐以陳皮其性疎快疏黃且能利人若作

煖藥以止瀉誤矣蓋由咬食生冷或冒暑熱之氣中脘閉結

揮霍變亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚驗

按此出厥陰疏黃例藥也

香薷飲治伏暑吐瀉

方見暑劑

按此治暑之表藥也肺脾經藥也出太陰厚朴例

宣明桂苓甘露飲治飲水不消嘔吐泄瀉或下痢赤白方見暑劑

按五苓散益元散加寒水石解利濕熱太陽經藥也

治寒之劑

機要漿水散治暴瀉如水周身汗出一身盡冷脉微而弱氣少

不能語甚者加吐此為急病

半夏一兩湯洗附子半兩泡

乾姜一作乾生姜桂

甘草炙各五錢良姜二錢半

右為細末每服三五錢漿水二觔煎至半觔和滓熱服

白朮湯

白朮

芍藥

甘草炙各三錢乾姜半兩泡

右如前服甚者去乾姜加附子三錢謂辛能發散也

局方理中湯治臟腑停寒泄瀉不已方見寒劑

按此出厥陰已寒例藥也已上用姜附之藥皆為暴瀉氣脫

如五虛等證救急之劑所謂暴瀉非陽者也然有屬火者亦

當求責

治風寒濕之劑

本事麴蘖丸治中風或中風濕臟腑滑泄

川芎

神麴

白朮

附子炮等分

右為細末麩糊丸桐子大每服三五十九溫米飲下此藥亦

治飧泄

按此出太陰例藥也

止瀉之劑

按諸方論並見滯下

去積之劑

本事溫脾湯治痼冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可畏虛以養病也

厚朴

乾姜

甘草

桂心

附子生各兩

大黃生四錢碎切湯洗漬半日搗去滓煎湯時和滓下

右細剉水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去滓服

按泄痢腹痛其證多種有積滯者固宜取去豈但痼冷一端

而已須詳證虛實寒熱隨其所宜以調之

升發之劑

東垣升陽除濕湯

自下而上者引而竭之

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓各半兩

蒼朮一兩

陳皮

甘草炙

大麥蘖麩各三錢

如胃寒腸鳴加益智仁半

夏各半錢姜棗同煎非腸鳴不得而用之

右作一服水煎早飯後熱服之

升陽除濕防風湯如大便閉塞或裏急後重數至圍而不能便

或有白膿或血慎勿利之利之則必致重病及鬱結而不通

也以此湯舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮 泄浸去皮乾淨四兩

防風 一錢 白朮

白茯苓 白芍藥 各二錢

右咀除蒼朮另作片子水一碗半煎至二觔內諸藥同煎至一大觔熱服食前

按飲食入胃氣上升輸精心肺然後下降若脾胃有傷不能上升及下流腎肝而成泄痢者法宜填補中氣升之舉之不可踈下此東垣發前人所未論也

調補脾胃之劑

錢氏白朮散治小兒泄瀉胃熱煩渴不問陰陽並宜服之

人參 白茯苓 白朮 木香

甘草 藿香 各二兩 乾姜按中論即是葛根

右粗末水煎

按此太陰經四君子例藥也治小兒陽明本虛陰陽不和吐瀉亡津液煩熱口乾以參朮甘草甘溫補胃和中木香藿香辛溫芳香可以助脾茯苓甘平分陰陽導水濕葛根甘平倍於衆藥其氣輕浮鼓舞胃氣上行津液又解風肌熱治脾胃虛弱泄瀉之勝藥也

易簡白朮湯治證同前

前方藿香改黃芪是也

秘藏黃芪補胃湯治一日大便三四次澹而不多有時泄腹中

黃芪 當歸身 枳胡 益智仁

陳皮各錢 甘草炙二錢 升麻六分 紅花少許

右咀作一服水煎食前服

補腎之劑

機要肉豆蔻丸治腎泄久不愈脈沉細無力者效

破故紙炒 肉豆蔻麩裹煨各等分

右為末棗肉為丸桐子大飲湯下空心本事方破故紙四兩

肉豆蔻二兩名二神丸治脾腎虛弱

本事五味子散治腎泄

五味子二兩 吳茱萸 半兩細粒綠色者

右二味炒香熟為度細末每服二錢陳米飲下有一親識每

五更初曉時必溏泄一次此名腎泄服此而愈

局方金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數虛冷之證

五倍子 茯苓各兩 龍骨煨 硃砂別研各兩

紫巴戟去心一斤 補骨脂酒浸炒十兩 肉從容洗焙

胡盧巴 煨各斤

右為末入研藥令勻酒糊丸桐子大每服三十九空心溫酒

鹽湯任下