

武昌醫館叢書

武昌医馆丛书

四函 三十六册

北京市中国书店出版

北京市新华书店发行

定价：三百三十元

活幼心書信效方目錄下卷

後學曾世榮編次

卷之一

湯散門

湯類

日生湯一

牛蒡湯二

黃芩四物湯三

耆歸湯四

枳實湯五

小柴胡湯六

防已湯七

防風湯八

知母湯九

白芍藥湯十

茯苓厚朴湯十一

茯苓神湯十二

守中湯十三

瀉肺湯十四

五和湯十五

養藏湯十六

貝母湯十七

固真湯十八

生地黃湯十九

薑橘湯二十

理中湯二十一

桂枝湯二十二

麻黃湯二十三

獨活湯二十四

五黃湯二十五

化毒湯二十六

青木香湯二十七

排風湯二十八

中和湯二十九

人參甘桔湯三十

人參芎歸湯三十一

五拗湯三十二

六和湯三十三

黃耆六一湯三十四

眞武湯三十五

牡蠣大黃湯三十六

坎離湯三十七

清脾湯三十八

麥門冬湯三十九

化丹湯四十

茴香湯四十一

大柴胡湯四十二

快膈湯四十三

升麻湯四十四

小陷胷湯四十五

散類

百解散一

五苓散二

當歸散三

三解散四

勻氣散五

雄黃散六

惺惺散七

木通散八

烏梅散九

黃金散十

平胃散十一

七寶散十二

三稜散十三

立消散十四

天竺黃散十五

連牀散十六

川草散十七

柿煎散十八

拂毒散十九

金鈴散二十

消黃散二十一

疏風散二十二

陳氏木香散二十三

陳氏異功散二十四

羌活散二十五

香薷散二十六

瀉黃散二十七

調元散二十八

醒脾散二十九

醞醐散三十

二聖散三十一

補肺散三十二

安神散三十三

燒鹽散三十四

綠袍散三十五

益黃散三十六

解表散三十七

參苓白朮散三十八

守胃散三十九

南星腹皮散四十

導赤散四十一

錢氏白朮散四十二

和中散四十三

糖煎散四十四

六柱散四十五

九仙散四十六

草龍膽散四十七

金波散四十八

內金散四十九

霹靂散五十

順搖散五十一

外消散五十二

活血散五十三

桃花散五十四

三白散五十五

麝香人齒散五十六

四黃散五十七

薄荷散五十八

槲皮散五十九

白芨散六十

二香散六十一

萬金散六十二

神效散六十三

赤葛散六十四

四聖散六十五

天花散六十六

蟠龍散六十七

伏龍肝散六十八

益元散六十九

祛風散七十

全蠍觀音散七十一

備急散七十二

黃土散七十三

回陽散七十四

蜜陀僧散七十五

卷之二

圓膏門

圓類

琥珀抱龍圓一

鎮驚圓二

烏犀圓三

香芎圓四

香連圓五

化癖圓六

蘆薈圓七

使君子圓八

補腎地黃圓九

寬腸圓十

香陸胃苓圓十一

二薑圓十二

沒石子圓十三

半夏圓十四

六聖圓十五

內消圓十六

截驚圓十七

散氣圓十八

金粟圓十九

萬應圓二十

金茱圓二十一

二聖圓二十二

商陸圓二十三

枳殼圓二十四

濬川圓二十五

三聖圓二十六

莪朮圓二十七

豆蔻圓二十八

碧玉圓二十九

快活圓三十

沈香檳榔圓三十一

膏類

硃砂膏一

如意膏二

地黃膏三

烏梅膏四

烏附膏五

烏豉膏六

辟塵膏七

草麻膏八

鉤藤膏九

黃連膏十

益中膏十一

玄霜膏十二

清涼膏十三

劫風膏十四

千金膏十五

卷之三

丹飲門

丹類

水晶丹一

不驚丹二

鶴頂丹三

黑虎丹四

卻暑丹五

四神丹六

祛瘡丹七

飲類

百傷飲一

運效飲二

柴胡飲三

四順飲四

清肺飲五

沖和飲六

明目飲七

玉露飲八

寬氣飲九

菜豆飲十

寬熱飲十一

赤蒼飲十二

化蟲飲十三

玄參飲十四

參香飲十五

健脾飲十六

五皮飲十七

立效飲十八

沈香飲十九

拔毒飲二十

藿香飲二十一

參蘇飲二十二

紫草茸飲二十三

天麻飲二十四

黑白飲二十五

白附飲二十六

二仙飲二十七

雙金飲二十八

大順飲二十九

快斑飲三十

消霧清心飲三十一

定喘飲三十二

常山飲三十三

消毒飲三十四

縮砂飲三十五

定吐飲三十六

萬安飲三十七

卷之四

金餅門

金類

一字金一

一七金二

一抹金三

餅類

香橘餅一

通聖餅二

薑豉餅三

拾遺方目錄

香艾圓一

烏白圓二

既濟解毒丹三

輕粉散四

獨聖散五

藿香托裏散六

拔毒散七

神應散八

涼肺散九

玄明粉十

必勝散十一

遠徹膏十二

至聖散十三

八仙飲十四

信效方目錄下卷終

活幼心書信效方下卷

後學會世榮編次

卷之一

湯散門

湯類

日生湯一

治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脈弱飲食不進睡露揚睛晝輕夜重急宜投解

北南星

壹兩剉破瓦器盛東壁土同醋煮少時濾乾切片焙

人參

去蘆

冬瓜子仁

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分候
溫無時少與緩服投之急必吐

此後應諸湯散圓劑所述服藥次序不過言
其大略然煎煮調化分數湯使下法尤在臨
時量兒大小以意加減或多或少隨病輕重
用之餘皆倣此再不繁引

牛蒡湯二

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及諸瘡赤紫丹

毒咽喉腫痛

牛蒡子

三兩略炒研碎

大黃

一兩半

防風

去蘆

薄荷

去老梗二味各一兩

荆芥

去根老梗四兩

甘草

一兩一錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

黃芩四物湯三

理諸瘡丹毒赤瘤燥癢

黃芩

一兩

當歸

酒洗

生乾地黃

赤芍藥

川芎

四味各半兩

何首烏

去粗皮

草烏

炮去皮

玄參

三味各一錢半

甘草

六錢

薄荷葉 一錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

耆歸湯四

治小兒稟賦素弱豆瘡出不快者及肝虛目視不明

黃耆 一兩蜜水塗炙 當歸 酒洗焙乾 白芍藥

川芎 三味各半兩 甘草 三錢炙

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

枳實湯五

主傷風傷寒胃滿氣促咳嗽不活食多夾痰吐出

枳實

去瓢剉片麥
麩炒微黃

赤茯苓

去皮二味
各半兩

甘草

六錢

半夏

七錢湯煮透
漉仍剉焙乾

桔梗

七錢半
剉炒

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時温服

小柴胡湯六

治傷寒温病身熱惡風胃滿脇痛煩渴嘔噦小便不利
大便秘硬能解表裏邪毒痰嗽氣喘

柴胡

去蘆
二兩

半夏

如前
製

黃芩

人參

去
蘆

甘草

四味各
七錢半

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無

時溫服或去棗加薄荷同煎

防已湯七

治感冒風溼之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓

防已

去黑皮

麻黃

去節存根功全表裏剉碎湯泡濾過焙乾

薄桂

去粗皮三味各半兩

赤芍藥

一兩赤茯苓

蒼朮

米泔水浸一宿去粗皮濾乾剉片用火炒至微黃色一兩

甘草炙七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分空心熱服或入薤白同煎

防風湯八

治急驚後餘熱未退時復手足搐掣心悸不寧及風邪
中入肺經兩目視人開眨不常

防風

去蘆

川芎

大黃

白芷

黃芩

甘草

六味各半兩

細辛

去葉二錢

薄荷葉

二錢半

右件剉焙爲末每服一錢用溫湯無時調服

知母湯九

治齁齧氣喘痰鳴發熱咳嗽惡風

知母

甘草

二味各半兩

貝母

羌活

滑石

別研

大黃

小麥子

五味各三錢

麻黃

如前製

苦苧蒘

訶子肉

三味各一錢半

薄荷

去梗二錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時温服

白芍藥湯十

治冷痲腹痛及誤汗誤下即壞證傷寒是也並宜先服

次投對證之劑

白芍藥

一兩半

澤瀉

去粗皮七錢半

甘草

三錢炙

薄桂

去粗皮一錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心温服誤汗誤

下加人參南木香各二錢臍下痛入生薑及鹽同煎加
鉤藤亦好

茯苓厚朴湯十一

主傷寒傷風夾痰嘔逆並吐瀉後喉涎牽響飲食減少
脾胃氣虛

白茯苓

去皮

半夏

如前製二味各七錢半

甘草

三錢炙

厚朴

五錢去粗皮剉碎每一斤用生薑一斤薄片切爛杵拌勻釀一宿慢火炒乾用

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片煎七分無時溫
服或加棗一枚去核同煎

扶神湯十二

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神

去皮木根一兩

人參

去蘆半兩

甘草

炙二錢

當歸

去蘆尾酒洗半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有微熱煩燥入麥門冬去心同煎

守中湯十三

理春夏相交陰溼氣重中傷脾胃致腹痛泄痢經久不

止漸傳手足浮腫飲食少思

桔梗

去蘆
剉炒

蒼朮

如前製二
味各一兩

白薑

四錢
炮

甘草

六錢
炙

右件剉焙為末每服一錢空心沸湯調服
可或用薑棗
吐水煎亦可

瀉肺湯十四

即瀉白散

主傷風後五心煩熱咳嗽喘促脣紅頰赤發渴引飲

桑白皮

剉炒

地骨皮

淨洗焙乾二
味各二兩

甘草

三錢
炙

右件咬咀每服二錢水一盞粳大米百粒煎七分食後
臨臥溫服或不拘時

五和湯十五

主宣利藏府積熱調和榮衛

當歸

酒洗

赤茯苓

去皮二味
各半兩

甘草

炙

大黃

枳殼

水浸潤去壳剉片麥麩
炒微黃三味各七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

養藏湯十六

主生津益氣溫腸止痢

人參去蘆甘草炙二錢半白芍藥 白朮二味各半兩

南木香 肉桂去粗皮二錢罌粟殼去蒂剉碎蜜水炒

肉豆蔻 訶子肉三味各一錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空

心溫服或入倉米同煎

貝母湯十七

主百日內嬰孩咳嗽有痰

貝母一兩 甘草半炙半生二錢

右件剉焙為末每服一字或半錢用陳大米煎湯空心

調服痰盛淡薑湯調下

固真湯十八

主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沈困不省人事

人參

去蘆

附子

湯浸炮裂去皮

白茯苓

去皮

白朮

四味各二錢半

山藥

去黑皮

黃耆

蜜炮塗炙

肉桂

去粗皮

甘草

溫紙裏煨透四味各三錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空

心溫服或無時

生地黃湯十九

治胎黃乳母服嬰兒亦可少與含嚙

生乾地黃 赤芍藥 川芎

當歸酒洗

天花粉

五味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

薑橘湯二十

治脾慢胃冷嘔吐不止

白薑

二錢炮

陳橘皮

去白一兩

粉草

炙三錢

右件剉焙為末每服半錢或一錢用溫棗湯調化空心

少與緩服

理中湯二十一

主溫脾煖胃冷吐冷瀉及治氣虛中寒腹痛

人參

去蘆

白朮

二味各一兩

乾薑

泡

粉草

炙二味各二錢半

右件剉焙為末每服半錢或一錢用溫白湯空心調服

桂枝湯二十二

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝

去粗皮

芍藥

二味各一兩半

甘草

一兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不

拘時溫服

麻黃湯二十三

治傷寒頭疼發熱身痛無汗喘滿又治太陽病脈浮緊無汗發熱身痛八九日表證不解者

麻黃

去根節
一兩半

桂枝

去粗皮
一兩

甘草

半兩

杏仁

三十五粒
湯泡去皮

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

獨活湯二十四

治驚癱鶴膝及中風溼日久致腰背手足疼痛晝輕夜

重及四肢痿痺不仁

川獨活

黃色如兔眼者佳半兩

當歸

酒洗

白朮

黃耆

蜜水塗炙

薄桂

去粗皮

川牛膝

酒洗五味各二錢半

甘草

炙三錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薤白一根煎七分

空心熱服或無時

五黃湯二十五

主解利徧身癰癤惡核發熱及丁黃腫毒丹瘤

黃耆

一兩生用

黃連

黃芩

黃檗

大黃四味各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞蜜一大匙煎七分無時温服

化毒湯二十六

解風熱上攻咽喉腫痛飲食不便

桔梗剉炒半兩薄荷葉 荆芥穗 甘草三味各二錢半

山豆根取淨皮一錢半牙消 鵬砂 朴消

雄黃 硃砂五味各二錢

右前五味焙為末後五味入乳鉢細杵同前藥末一處

再杵勻每用一字至半錢乾點舌上化下或以溫湯濃調少與含嚙亦可

青木香湯二十七

治小兒陰莖無故而腫或痛縮初因陽明經有風熱溫氣相傳所以如是法當寬此一經其證自瘳蓋陽明受病不能養其宗筋故也宜服之及咳嗽痰喘氣促

青木香

去蘆

枳殼

如前製二味各半兩

甘草

二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

排風湯二十八

治中風狂言失音不語精神昏困驚癱鶴膝等證及腫疾才瘡後偶感外風滿面徧體虛浮並宜可服

白蘼皮 白朮 白芍藥 薄桂去粗皮

防風去蘆 川芎 當歸酒洗 杏仁湯泡去皮尖

甘草炙九味各半兩 川獨活 麻黃去節

白茯苓去皮三味各七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時温服

中和湯二十九

此藥大能通和表裏温養脾胃勻調氣血順正陰陽發

散風寒辟除腥穢善使豆瘡易出易收不致倒靨黑陷
傳變危急兼治徧身癰癤已潰未潰排膿止痛自然消
釋常服清神駐顏明目健脾真元益固邪氣無干

人參去蘆

厚朴如前製

當歸酒洗

防風去蘆

白芷

肉桂去粗皮

桔梗

川芎

白芍藥

沈香

檀香

乳香

藿香葉

紫蘇葉

黃耆

蜜水塗炙

甘草

十六味各半兩

右件咬咀用無灰酒四兩重拌勻曬乾天陰略焙每服
一錢水一盞煎七分無時溫服

人參甘桔湯三十

感冒風熱火氣薰逼豆瘡蘊毒上攻咽喉腫痛痰氣不順咳嗽失音飲食減少並宜治之

人參去蘆半兩

桔梗剉用蜜水浸透一兩

甘草半生半炙三錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服風熱加荆芥杏仁煎豆瘡後目生翳膜用蟬殼淨洗去翳足同前咽痛入鵬砂末煎去渣無時含嚥

人參芎歸湯三十一

治九道血妄行

人參

去蘆

川芎

當歸

酒洗三味各半兩

荆芥

二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

五拗湯三十二

治感風溼及形寒飲冷痰嗽咳逆連聲不已

麻黃

不去根節

杏仁

不去皮尖

荆芥

不去梗

桔梗

四味各五錢用蜜水炒判用

甘草

二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

六和湯三十三

治心脾不和氣不升降霍亂吐瀉咳嗽胃滿頭目疼痛

嗜臥倦怠并陰陽不分冒暑伏熱煩悶成痢中酒作渴
心逆畏食

人參

去蘆

縮砂仁

甘草

炙

杏仁

湯泡去皮尖

半夏

如前製五味各一兩

香薷

厚朴

如前製二味各四兩

白扁豆

炒熟剉去壳一斤用生薑一斤碎切爛煮拌勻釀經一宿焙乾

藿香

赤茯苓

去皮

木瓜

各一兩

右件呔咀每服二錢水一盅薑二片棗一枚煎七分無
時溫服或入鹽半字同煎

黃耆六一湯三十四

治諸虛不足煩燥驚口揚身體軟弱不思飲食

黃耆 六兩蜜水塗炙

甘草 一兩炙

右件咬咀每服二錢水一盞棗二枚煎七分無時溫服

真武湯三十五

治傷寒諸疾後表裏俱虛煩渴有熱徧身汗出

白茯苓 去皮

白芍藥 二味各七錢半

白朮

附子 如前製二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

牡蠣大黃湯三十六

治三五歲小兒感受溫溼之氣侵襲膀胱致陰莖膚囊
浮腫作痛

牡蠣

用熟黃泥包裏夾火
煨透出地上候冷用

大黃

紙裏水浸透炮過
候冷二味各一兩

右件剉研爲末每服一錢用無灰溫酒空心調服不能
飲者溫湯調少入酒同服

坎離湯三十七

治虛喘晝輕夜重食減神昏

萆澄茄

石菖蒲

二味各一錢

白朮

白茯苓

去皮

南木香

二味各二錢

甘草

炙

半夏

如前製

紫蘇子

略炒杵碎三味各四錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

清脾湯三十八

治諸瘧久不瘥者脾胃虛弱形容憔悴

厚朴

如前製一兩

烏梅

打破去仁

半夏

如前製

良薑

剉用東壁土炒

青皮

去白四味各半兩

甘草

炙三錢

草果

炮去殼取仁二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分未發前併

三服仍忌生冷油膩時果毒物

麥門冬湯三十九

解斑疹熱毒頭痛煩悶狂渴妄語

麥門冬

去心

乾葛

二味各三錢

人參

去蘆

赤芍藥

升麻

赤茯苓

去皮

甘草

五味各二錢

石膏末

五錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

化丹湯四十

解利丹毒徧身燥癢發熱煩啼

川獨活

射夜干音夜

麻黃

如前製

青木香

甘草

黃芩

薄桂

去粗皮各

石膏末

八味各五錢

右件吹咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

茴香湯四十一

和脾胃進飲食理腹痛散邪氣

茴香

炒

良薑

剉用東壁土炒二味各一兩半

蒼朮

如前製二兩

甘草

炙一兩

右件剉焙爲末每服一錢燒鹽湯空心調服

大柴胡湯四十二

疏利風熱痰嗽腹脹及裏證未解

柴胡

去蘆
四兩

黃芩

芍藥

二味各
一兩半

大黃

半夏

如前製二味
各七錢半

枳實

如前製
七錢

甘草

一兩小方
故加用

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片煎七分無時溫服

快膈湯四十三

理胃膈不快飲食少進亦能順氣和中消導宿滯

人參

去蘆

青皮

去白

縮砂仁

烏藥

良薑

如前
製

香附子

甘草

炙七味
各一兩

右件剉碎爲末每服一錢溫鹽湯空心調服

升麻湯四十四

治時行瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹未見形先疑
貳之間並宜可服大能和順血脈解諸餘毒斑證等疾

升麻

乾葛

芍藥

三味各一兩

甘草

半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

小陷胷湯四十五

治六七歲已上之兒小結胷證

半夏

如前製一兩

淨黃連

栝萇實

各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞半白蜜大匙煎至八分無

時溫服未效再投得微下黃涎爲好也

散類

百解散一

主和解百病虛慢陰證不宜

乾葛

二兩半

升麻

赤芍藥

二味各二兩

黃芩

一兩

麻黃

如前製七錢半

薄桂

去粗皮二錢半

甘草

一兩半

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片葱一根煎七分無時溫服有風熱盛加薄荷同煎

五苓散二

解傷寒溫溼暑毒霍亂分陰陽理煩渴

澤瀉 去粗皮
二兩半

白茯苓 去皮

猪苓 去皮

白朮 三味各
一兩半

肉桂 去粗皮
七錢不過火

右前四味剉焙入桂同研為末每服二錢溫湯調下不拘時若作嘔咀用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞煎七分無時溫服其餘活法明本論中隨證詳述

當歸散三

調順氣血和解表裏爽利心腹疏理百病及治溫熱停

積白痢煩燥不寧

當歸

去蘆酒洗

赤芍藥

二味各二兩

大黃

半生半炮一兩二錢

川芎

麻黃

如前製二味各半兩

甘草

半生半炙一兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

三解散四

一名寧心湯

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂燥氣急渴水驚啼煩悶
丹毒口瘡痰嗽搐掣

人參

去蘆

防風

去蘆

天麻

茯神

去皮木根

鬱金

無以山梔仁代

白附子

大黃

七味各二錢半

赤芍藥

黃芩

僵蠶

三味各五錢

全蠍

十五尾去尖毒

枳殼

二錢如前製

粉草

六錢

右件判焙爲末每服半錢至一錢用温薄荷湯無時調

下或燈心湯

勻氣散五

主調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗

二兩判炒

陳皮

去白一兩

縮砂仁

茴香

二味各半兩

白薑

二錢半炮

粉草

四錢炙

右件判焙爲末每服半錢或一錢空心沸湯調服冷疝

腹痛燒鹽湯調下

雄黃散六

主暴中急慢驚風齁齕痰涎滿口及雨侵閉汗不通或

涼或熱坐臥生煩

雄黃

紅亮者
二錢半

白藥

去黑
皮

川烏頭

炮裂去
皮臍

草烏

炮裂
去皮

天麻

明亮
者

川芎

五味各
半兩

右除雄黃外餘五味剉焙同雄黃為末驚風痰壅每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗水薑葱薄荷同煎並投三服取效

惺惺散七

主傷風傷寒痰嗽咳逆理虛和氣寧心清肌止啼去煩
利咽膈解失音

人參 去蘆
半兩

桔梗 剉
破

白茯苓 去
皮

白朮

天花粉 四味各
一兩

細辛 去葉
二錢

防風 去
蘆

川芎

南星 生用
各二錢半

甘草 半生半
炙七錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉慢火煎
七分無時溫服

木通散八

主上膈熱小府閉煩燥生嗔及淋證諸瘡丹毒

木通去皮節

地菖蓄去老梗二味各半兩

大黃

甘草

赤茯苓去皮三味各三錢

瞿麥去乾梗

滑石末

山梔仁

車前子

黃芩五味各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞燈心三莖煎七分無時温服或入薄荷同煎

烏梅散九

治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾

烏梅

和核

玄胡索

粉草

半生半炙三味各五錢

乳香

沒藥

鈎藤

和鈎三味各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心温服

黃金散七

解口内舌上瘡毒及治豆瘡後目生翳膜

黃檗

去粗皮用生蜜潤透烈日下曬乾再塗上蜜凡經十數次爲度

粉草

二味各一兩

右件剉焙研爲細末治口瘡用藥末乾點患處或用麥門冬熟水調點舌上令其自化治豆瘡後目生翳膜湯

泡澄清無時頻洗仍投糖煎散柿煎散二藥

平胃散十一

主脾胃不和嘔逆噯酸霍亂腹痛

厚朴

如前製

陳皮

去白二味各二兩半

蒼朮

如前製四兩

甘草

一兩

右件剉焙爲末每服半錢至一錢薑棗煎湯空心溫服
燒鹽湯亦好

七寶散十二

治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃肺藏不和口

中腥氣異常或牙縫微有鮮血兼調理諸病後小證得
中以其品味不僭不燥為佳

紫蘇

去老梗

淨香附

二味各三兩

陳皮

去白

甘草

二味各一兩半

桔梗

二兩半剉炒

川芎

白芷

二味各一兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服
咳嗽加製半夏口腥氣入鹽煎調理諸疾加棗子煎

三稜散十三

主諸般停滯疴積發熱瀉痢酸醜水穀不化常服和脾

胃進飲食長肌肉益神氣

人參

去蘆七錢半

三稜

炮

淨香附

二味各一兩半

青皮

去白

益智仁

陳皮

去白

半夏

如前製

枳殼

如前製

神麴

炒

穀芽

洗焙

莪朮

醋煮透瀝乾剉焙

大黃

半生半炮

紫蘇

去老梗十味各半兩

甘草

半生半炙一兩二錢

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片倉米百粒煎七分

無時溫服氣虛勞加白茯苓一兩

立消散十四

治膀胱久受熱毒致陰器膚囊赤腫脹痛

赤小豆

赤芍藥

枳殼

生用

風化朴消

臨入末藥拌勻

商陸

五味各半兩

右件不過火剉曬為末柏枝煎湯候冷調二錢或三錢塗腫處仍服呔咀五苓散加車前子煮苡仁水煎

天竺黃散十五

主上焦風熱口鼻生瘡兩目赤腫咽膈不利痰涎壅滯氣不通暢驚搐煩悶神思昏迷

天竺黃

鬱金

無以山梔仁代

茯神

去皮

甘草 四味各半兩

鵬砂

牙消

白芷

川芎

僵蠶 去絲

枳殼 如前製六味各二錢半

硃砂 水飛二錢

麝香 一字

蟬殼 十五洗去泥土背足

右除礪砂牙消硃砂麝香四味乳鉢細杵餘九味焙乾末同入乳鉢內再杵勻每服半錢或一錢溫薄荷湯無時調服或麥門冬湯

連牀散十六

治滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器膚囊癢則抓爛黃

汁淋漓燥痛

淨黃連

一兩

蛇牀子

去埃土半兩

五倍子

去內蟲屑二錢半

輕粉

十五貼

右前三味曬乾為末再入乳鉢內同輕粉杵勻用清油

稀調二錢或三錢塗搽患處必先以荆芥和葱煮水候

涼淨洗拭乾後傅藥

川草散十七

治腹痛下痢赤白不拘遠近

川芎

白芷

甘草

半生半炙三味各七錢

赤芍藥

當歸

淨黃連

三味各五錢

酒洗

右件剉焙爲末每服半錢至一錢白痢白薑湯調赤痢甘草湯調赤白痢温米清湯調並空心服

柿煎散十八

治豆瘡後目生翳膜

白菊花

菜豆殼

穀精草

二味各一兩

右爲呔咀每服二錢乾柿一枚粟米泔汁大盞慢火煎乾去渣食後臨睡止喫柿肉一日三枚倍加尤好如嬰孩小乳母可服或用煮過柿子去核薄切焙爲細末抄半錢温米泔水調化無時與兒服亦可

拂毒散十九

治諸風熱陰毒腫核已結成未穿潰或正發者

半夏一兩
生用

貝母

大黃二味各
半兩

朴消

五倍子

去內蟲屑二
味各二錢半

右件剉焙爲末用醕醋調一錢或二錢塗患處如乾再塗仍服疏風化毒之劑餘藥成末除朴消臨入杵勻用

金鈴散二十

治疝氣腹痛投諸藥後瘡而復作宜服

金鈴子肉

六錢

三稜

炮

莪朮

醋煮

青皮

去白

陳皮

去白四味各二錢半

赤茯苓

去皮

茴香

二味各半兩

南木香

二錢

甘草

四錢炙

檳榔

枳殼

如前製

鉤藤

和鉤三味各三錢

右除檳榔木香不過火餘十味剉焙仍同木香檳榔爲末每服半錢至一錢仍用炒茴香煎無灰酒空心調服不飲酒者煎炒茴香湯調下

消黃散二十一

治風熱溫氣上攻舌硬腫大不消

風化朴消

真蒲黃

二味各半兩

右蒲黃曬乾爲末同朴消乳鉢內細杵勻每用一字至半錢點揩舌上下

疏風散二十二

主小兒薄劣跌觸頭腦或弄刀錐因而破血感風致面
目傷痕浮腫

荆芥穗

一兩

防風

去蘆二錢半

甘草

半生半炙二錢

右剉焙爲末每服一錢用無灰溫酒調服或葱湯亦好

陳氏木香散二十三

能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽及治腹脹瀉

渴温壯豆瘡

南木香

厚桂

去粗皮

陳皮

去白

訶子肉

丁香

人參

去蘆

赤茯苓

去皮

半夏

如前製

甘草

半生半炙

大腹皮

淨洗焙

前胡

去蘆十一味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

陳氏異功散二十四

能除風寒溼痺調和陰陽滋養血氣使豆瘡易出易斂不致癢塌瀉痢

南木香

當歸

洗酒

人參

去蘆

肉豆蔻

陳皮

去白

丁香

白茯苓

去皮

厚桂

去粗皮

白朮

厚朴

如前製

半夏

如前製

附子

如前製二味各二錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心温服或不拘

羌活散二十五

治傷風時氣頭痛發熱身體煩疼痰壅咳嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢赤白

人參法

羌活

赤茯苓去皮

柴胡去蘆

前胡去蘆

川芎

獨活

桔梗炒

枳殼如前製

蒼朮如前製

甘草十一味各一兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉煎七分無時溫服發散風邪入葱白同煎痢證薑倉米煎

香薷散二十六

主夏秋藏府冷熱不調或飲食起居不節致吐痢心腹疼痛發熱煩悶身體拘急或腳轉筋四肢厥冷有似陰

證但口氣温脈按沈緊爲驗

陳香薷

去老梗
三兩

白扁豆

如前
製

厚朴

如前製二味
各一兩半

右三味六兩咬咀了用無灰酒三兩半勻仍曬乾或焙
臨入咬咀生甘草一兩和勻每服二錢水一盞煎七分
去渣以瓦器盛在水中沈温不拘時服如熱極或瀉痢
中有鮮血者加淨黃連一兩細剉拌勻名黃連香薷散
下法如前

瀉黃散二十七

治胃虛脾實生熱煩渴頭痛惡心

藿香葉 七錢半

梔子仁

防風 去蘆二味各一兩

甘草 四錢半

石膏末 八錢

右前四味剉同石膏末用酒蜜微炒香爲呔咀每服二錢水一盞煎七分空心温服

調元散二十八

主稟受元氣不足顛顛閒解肌肉消瘦腹大如腫致語遲行遲手足如癩神色昏慢齒生遲者服之有效

乾山藥 去黑皮五錢

人參 去蘆

白茯苓 去皮

茯神 去皮木根

白朮

白芍藥

熟乾地黃酒洗

當歸酒洗

黃耆蜜水塗炙入味各二錢半

川芎

甘草炙二味各三錢

石菖蒲二錢

右為收咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無

時溫服如嬰孩幼嫩與乳母同服

醒脾散二十九

主醒脾養胃止吐痢進飲食及調理病後神昏目慢食

睡多困脈弱氣短微有痰涎並宜投服

人參去蘆

白茯苓去皮

藿香葉

白朮

甘草炙五味各五錢

丁香四十粒不見火

大南星

八錢剉作小塊紙裹水透溼炮過用

縮砂仁

四十粒

右爲咬咀每服二錢水大盞薑三片冬瓜子仁五十粒杵碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

醍醐散三十

治吐瀉後調和脾胃消進飲食及丁奚哺露虛熱煩渴氣逆心惡

陳皮

去白

縮砂仁

厚朴

如前製

麥芽

洗淨焙乾

烏梅

和核五味各五錢

良薑

如前製

乾葛

烏藥

三味各二錢半

草果仁

炮二錢

甘草

炙三錢

右爲咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚鹽少許煎七分空心温服

二聖散三十一

治風痰壅閉語音不出氣促喘悶手足動搖似搐非搐

訶子

十箇大者半生半炮去核

大腹皮

洗淨焙乾五錢

右爲咬咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

補肺散三十二

治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠

一兩半
剉炒

白茯苓

馬兜苓

去老
梗

糯米

三味各
半兩

杏仁

二十一粒湯
泡去皮尖

甘草

四錢
炙

右爲呔咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

安神散三十三

治吐瀉諸病後心虛煩悶觸物易驚氣鬱生涎涎與氣搏睡不得寧預防變生他證

人參

去蘆

白茯苓

去皮

半夏

如前製

甘草

炙

陳皮

去白

枳實

如前製六
味各五錢

右爲呔咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚竹筍小團

煎七分無時溫服有微熱微渴入麥門冬去心同煎

燒鹽散三十四

治走馬疳牙根肉潰爛黑臭

橡斗 不拘多少

右件每用大者兩箇入鹽滿殼蓋作一合或五六箇或十數箇安在火內和鹽燒透取出地上以瓦盤蓋定存性候冷入麝香少許乳鉢內極細杵勻每以半錢塗搽患處常收用小瓦合盛貯勿使紙裏蓋鹽能作潤

綠袍散三十五

治重舌及滿口內外瘡毒咽膈不利

薄荷

去老梗

荆芥穗

二味各五錢

青黛

玄明粉

鵬砂

三味各二錢半

百藥煎

甘草

二味各三錢

右件剉焙為末除玄明粉鵬砂二味在乳鉢內細杵同前藥末再杵勻用一字至半錢乾點舌上令其自化或以新汲水入蜜調點舌上亦好

益黃散三十六

治脾虛受冷水穀不化泄瀉注下盜汗出多

陳皮

去白

肉豆蔻

炮二味各五錢

丁香

二錢

訶子肉 炮去核 甘草 炙二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心溫服

解表散三十七

主傷風感冷咳嗽痰喘嘔吐瀉痢驚悸有熱證在表裏

發當用氣解藥可投

麻黃 如前製 杏仁 湯炮去皮尖 赤茯苓 去皮三味各一兩

川芎 防風 去蘆 枳殼 如前製三味各二兩

甘草 半生半炙七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無

時溫服有熱入薄荷同煎

參苓白朮散三十八

主脾胃虛弱飲食不進多困少氣中滿痞噫嘔吐咳逆
此藥不寒不熱性味溫平常服調脾悅色順正去邪

人參

去蘆

白茯苓

去皮

粉草

白朮

白扁豆

如前製

山藥

去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔梗

剉炒九味
各一兩

蓮子肉

去心煎

右件剉焙為末每服半錢至一錢用棗湯空心調服或

溫米湯亦可

守胃散三十九

治陰陽不和吐瀉不止預防風證常服調脾胃進飲食

人參 去蘆 白朮 白茯苓 去皮 山藥 去黑皮

乾葛 扁豆 如前製 南星 如前製 甘草 藿香 去老梗

防風 去蘆 天麻 十一味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片冬瓜子仁五十粒

搗碎煎七分空心溫服如瀉不止入沉香白豆蔻同煎

南星腹皮散四十

主腫疾欲瘡未瘡之閒脾胃虛慢氣促痰喘腹脹胸滿
飲食減精神困小便不利面色痿黃

南星

同前製
一兩

大腹皮

淨洗
焙乾

生薑皮

陳皮

去白

青皮

去白

桑白皮

剉炒

甘草

炙

扁豆

同前製七
味各半兩

右為吹咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

導赤散四十一

治心經壅熱煩燥睡語或時復上竄齧五巧切牙小便

黃澀久則成驚觸物易動

生乾地黃

淨洗

木通

去皮節二
味各一兩

黃芩

赤茯苓

去皮二味
各二錢半

甘草 三錢

右爲呔咀每服二錢水一盞竹葉三皮煎七分無時温服或加麥門冬去心同煎

錢氏白朮散四十二

治脾胃不和嘔吐瀉痢惡心發渴大能補虛損調榮衛

南木香

白朮

二味各
半兩

人參

去蘆

白茯苓

去

皮藿香葉

甘草

四味各
一兩

乾葛

二兩

右爲呔咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

和中散四十三

主久病才瘡面黃清瘦神昏氣弱脾胃未實食物過傷
停飲生痰留滯中脘耗虛真氣或成吐瀉此藥性味甘
平大能調治常服和胃氣進飲食悅顏色理風痰

人參

去蘆

白扁豆

同前

白茯苓

去皮

川芎

縮砂仁

香附子

半夏

同前製

甘草

八味各一兩

肉豆蔻

訶子

去核二味各七錢

右爲呔咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空
心溫服或不拘時

糖煎散四十四

治豆瘡餘毒攻目成瞖澀痛有熱多淚羞明

赤芍藥 當歸尾 大黃 川芎 荆芥

防風 去蘆 漢防己 去黑皮 龍膽草 黃耆 生用

黃芩 十味各半兩

右爲咬咀每服二錢水一盞沙糖小塊煎七分食後臨睡溫服或無時

六柱散四十五

治吐痢泄瀉胃虛脾慢手足俱冷六脈沉微

人參 去蘆 白茯苓 去皮 熟附子 南木香

肉豆蔻

白朮

六味各半兩

右爲呔咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不

拘時溫服

九仙散四十六

解諸目疾不拘歲月遠近並宜先服

柴胡

去蘆

蒼朮

同前製二味各二兩

赤芍藥

荆芥

甘草

三味各六錢半

麻黃

同前製

川芎

薄荷

和梗三味各半兩

旋復花

去老梗三錢

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分不

拘時溫服

草龍膽散四十七

治暴赤火眼晝夜澀痛作腫淚多

草龍膽

木賊

去節

荆芥

菊花

防風

去蘆

草決明

半生半炒

甘草

七味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服痛甚加

羌活乳香同煎

金波散四十八

治時行赤眼腫痛成瞖有熱多淚

淨黃連 一兩 鵬砂 寒水石 大黃 二味各二錢

海螵蛸 銅青 二味各一錢 玄明粉 二錢半 麝香 一字

全蠍 七尾去尖毒

右除玄明粉麝香餘七味剉曬為末仍入玄明粉麝香乳鉢內同前藥末杵勻每用一字至半錢溫淨湯或涼水調化澄清去渣無時頻洗有風夾蟲作癢入輕粉取效仍忌酒葷三五日

內金散四十九

治牙根肉臭爛黑色有蟲作痛

雞內金

即雞肫內麤皮陰乾一兩

白芷

銅青

三味各半兩

麝香

一字

右前三味剉曬或焙為末仍以麝香乳鉢內同杵勻每用一字或半錢乾擦患處先用溫鹽水灌漱後傅藥

霹靂散五十

解急慢驚風不省人事

猪牙皂角

三錢

細辛

川芎

白芷

三味各二錢

躑躅

一錢半

右件剉曬為末每以少許用大燈心三寸長蘸點鼻內

得噴嚏爲驗前藥不可焙焙則不應

順搐散五十一

解男右女左搐不順者

枳殼

如前製

鉤藤

法製

荆芥

羌活

防風

去蘆

甘草

六分各
分兩

右件咬咀每服二錢水一盞順切薑三片煎七分無時
溫服或入薄荷同煎

外消散五十二

治嬰孩初生旬日外臍突或痛或不痛痛則啼聲不已

及療小兒因感溫熱相搏致陰器膚囊浮腫

大黃 牡蠣 刻前製二味各半兩 朴消 二錢

右前二味剉焙爲末仍入朴消乳鉢內同杵勻抄一錢或二錢取田螺三枚淨洗再以水半盞活過一宿去螺用水調塗腫處卽消其螺仍放水中勿害之昔賢有曰殺生救生去生遠矣物命雖微亦可戒也治陰器膚囊腫車前子煎湯候冷調傳患處

活血散五十三

解破血傷風

當歸 酒洗 生乾地黄 酒洗 川芎 紅花

赤芍藥 蘇木 六味各半兩 甘草 三錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

桃花散五十四

治一切破損肢體血出作痛

好石灰 用紗淨篩十兩 清油 小半盞 大黃 五錢剉碎水浸透取汁大半盞

右石灰先用鐵鑊炒令帶熱次入大黃汁清油和勻仍以慢火炒如桃花色烏盆盛之傾出在內浮而不沉鵝翎拂聚紙上別著瓦器收藏凡是破損傷痕用塗立效

仍服疏風散活血散

三白散五十五

解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風溼相乘

白牽牛

半生半炒杵碎

桑白皮

剉炒

白朮

木通

去皮節

陳皮

去白

甘草

六味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

麝香人齒散五十六

治豆瘡黑陷因毒氣入腎而形於外

麝香

少許不拘多少火煨過得小兒自脫者佳

右二味同研爲末每用半錢至一錢無灰温酒調下止
以一服然此藥固好但人齒難得嘗用一七金取效

四黃散五十七

治小兒身上一切熱毒瘡疾燥癢抓破有汗不乾

淨黃連

黃檗

黃芩

大黃

滑石

五味各半兩

五倍子

去內蟲屑二錢半

右件剉曬爲末用清油入桐油和調二錢至三錢塗搽
患處仍服四順飲消毒飲

薄荷散五十八

治陽證脫肛

薄荷

和梗

骨碎補

去毛二味各半兩

甘草

二錢半

金罌刺根

七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞入無灰酒大匙煎七分空心溫服或無時

槲皮散五十九

解癰癰作腫疼痛

槲皮

仍去粗皮此樹在處有之即包鹽槲葉木也

右件不拘多少剉碎煮水候溫頻洗患處

白芨散六十

治瘰癧膿汁不乾

白芨 貝母

淨黃連

三味各半兩

輕粉

三十貼

右前三味剉焙爲末仍以輕粉乳鉢內同杵勻抄一錢至二錢清油調擦患處必先用槲皮散煮水候溫淨洗拭乾方塗藥

二香散六十一

治同前證

白膠香

降真香

用心無土氣者

海螵蛸

五倍子

去內蟲屑四味各半錢

右件爲末如前先用槲皮散煮水淨洗患處後以此藥一錢或二錢乾塗上外將水紙封掩三五次即效

萬金散六十二

治水瀉下痢久不瘥者

罌粟殼

去蒂二兩一兩到碎醋蜜炒一兩生用

陳皮

去白二兩

甘草

不去節二兩一兩炙一兩生用

烏梅

和核一兩

右件咬咀每服二錢熱湯一盞略煎二沸和查傾出盃

內上以蓋蓋定候澄清去渣空心溫服

神效散六十三

治赤白痢晝夜頻數食減腹痛小便不利

罌粟殼

去梗蒂剉碎蜜水炒

白芷

烏梅

和核三味各一兩

乳香

撫芎

二味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心溫服

赤葛散六十四

治因血熱與風熱相搏徧身丹毒燥癢日久不消

赤葛 二兩

甘草 三錢

右件咬咀每服二錢無灰酒一盞煎七分無時溫服不
飲酒者止用水一盞入酒大匙同煎

四聖散六十五

主嬰孩胎受熱毒生下兩目不開

燈心 黃連 秦皮 木賊 棗子 和核五味
各半兩

右爲咬咀每服二錢水一盞煎七分澄清去渣無時頻
洗兩目自開

天花散六十六

治外腎膚囊腫痛

天花粉 二兩

甘草 三錢

右件咬咀每服二錢無灰酒一盞煎七分空心溫投不能飲者止用水煎少入酒同服

蟠龍散六十七

治陽證脫肛

乾地龍

蟠如錢樣者佳
略去土一兩

風化朴消

二錢

右剉焙研爲細末仍和勻朴消每以二錢至三錢肛門溼潤乾塗或乾燥用清油調塗先以見毒消荆芥生葱煮水候溫浴洗輕與拭乾然後傅藥

伏龍肝散六十八

治陰證脫肛

伏龍肝 一兩
髓頭骨 半兩
百藥煎 二錢半

右三味焙研爲末每用二錢至三錢濃煎紫蘇湯候溫
和清油調塗患處並如前法浴洗拭乾方上藥

益元散六十九

解暑毒利小便理煩渴除驚悸

滑石 六兩
粉草 一兩細剉

右二味或曬或焙研爲細末每服一錢至二錢溫熟水

無時調服涼水亦好

祛風散七十

治卒暴中風全不能言口眼喎斜驚癱搐掣痰實煩燥
神昏有熱睡臥不穩

防風

去蘆一兩半

南星

生用

甘草

生用

半夏

如前製

黃芩

四味各一兩

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分不

拘時溫服

全蠍觀音散七十一

治外感風寒內傷生冷吐瀉交作脾胃俱虛盜汗出多
神昏色慢常服温中益氣進飲食寧心

蓮子肉 去心 人參 去蘆 扁豆 如上製三味各一兩 天麻

防風 去蘆 全蠍 去尾尖毒 羌活 白芷 南木香

甘草 炙 黃耆 鹽蜜水塗炙 神麴 炒

白茯苓 去皮二味各七錢半

右除木香不過火餘十二味剉焙仍同木香碾為末每
服半錢至一錢用棗湯無時調服

備急散七十二

治小兒諸般骨硬致咽喉腫痛

五倍子末

一兩

先春茶末

半兩

右二味和勻抄一錢溫湯半盞調化無時少與嚥下依此法服餌不過三五次卽效如骨出或刺破處血來多者鵬砂末六錢水煎消毒飲調服血止痛住腫消食進黃土散七十三

治豆瘡餘毒太甚徧身潰爛濃汁不乾

黃土

不拘多少取曠野背陰處深掘爲妙

右件安地上炭火煨透候冷研爲乾末用絹或紗兜撲

患處仍服解餘毒之藥併忌動風發熱等物

回陽散七十四

理脾虛感受風寒溼氣傳作吐瀉手足逆冷腹痛有痰及陰證脫肛疝疾盜汗

附子

如前製

甘草

半生半炙二味各二錢半

人參

去蘆七錢半

細辛

去葉一錢半

桔梗

剉炒五錢

厚桂

去粗皮

白茯苓

去皮

川獨活

三味各二錢

半夏

同前製三錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服或入棗子同煎

蜜陀僧散七十五

治走馬疳齒焦黑爛

蜜陀僧 一兩
輕粉 五十貼
麝香 一字

右件爲末同輕粉麝香乳鉢內杵勻每用半錢擦患處

卷之二

圓膏門

圓類

琥珀抱龍圓一

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火所謂生我者父母也肝爲母心爲子母安則子安況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍圓理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致煩燥不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投其藥性溫平不僭不燥

常服祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

眞琥珀 天竺黃 檀香細人參 去蘆 白茯苓

去皮五味 粉草三兩 枳殼如前製 枳實如前製

水飛硃砂五兩先以碎石引去鐵屑次用水乳鉢內細杵取浮者飛過淨器中澄清

去上餘水如此法一般 山藥去黑皮一斤剉作小塊慢火炒令熱

透候 南星一兩剉碎用臘月黃 金箔百片去護

冷用 一兩同在乳鉢內極細杵仍和勻前藥末用

右前十二味除硃砂金箔不入研內餘十味檀香不過火外九味或曬或焙同研爲末和勻硃砂金箔每一兩

重取新汲井水一兩重入乳鉢內略杵勻隨手圓此樣
○大一粒陰乾晴霽略曬日色燥甚則捩折宜頓放當
風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯痰
壅嗽甚淡薑湯下豆瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安
燈心湯下暑天迷悶麥門冬熟水下百日內嬰孩每圓
分三次投二歲以上者止一圓或二圓其品劑修合之
日但缺一味不依製度必無效矣常用瓦瓶入麝香同
貯毋使散泄氣味入珍珠末一兩合和名金珠散蓋珍
珠能鎮心寧肝墜痰尤效治法湯使同前此藥乃家傳

祕方嘗自精製出賣人多信用取者甚眾今推誠利行願與天下共之非敢自矜特以全嬰爲念耳

鎮驚圓二

主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜燥煩生嘔精神昏悶常服寧心鎮驚疏風順氣

人參

去蘆三錢

粉草

半生半炙

茯神

去皮木根

僵蠶

去絲

枳殼

如前製四味各五錢

白附子

南星

如前製

白茯苓

去皮

鵬砂

牙消

硃砂

水飛六味各二錢半

全蠍

拾尾去毒

麝香

一字

右除牙消鵬砂麝香硃砂四味用乳鉢細研餘九味焙
爲末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水煮清糊爲圓
梧桐子大就帶潤以銀硃爲衣每服三圓至五圓或七
圓急驚用溫茶清磨化投服慢驚以生薑熟附子煎湯
研化溫服薄荷湯化下或麥門冬湯

烏犀圓三

主諸積滯夾風溫胃調脾消進飲食吐逆有酸醜氣面
黃肌瘦不拘孩兒生後歲月遠近並宜可服

烏犀

皁莢

剉三寸長安灰火中見清煙起爲
度取出地上瓦盤蓋定存性冷用

七錢 硫黃 白薑 二味各三錢半 陳皮 去白

川烏 炮去皮臍二錢 巴豆 七十七粒去殼膜心存油

右硫黃一味先入研內研細除巴豆外餘四味同焙爲末仍以巴豆薄切在乳鉢極細杵再同前五味藥末杵勻用粳大米飯包作糗子一大箇小瓦瓶盛水熟煮候冷取出在沙鉢中爛杵細布兜緊捻出如稠糊安在別器內以藥末亭分同杵細軟圓粟穀大取諸積每服十五圓或二十一圓至三十三圓並用淡薑湯泡冷飯取汁小盞五更初空心送下通利三五行以勻氣散止補

治積吐有酸醜氣每服三圓至五圓用淡薑湯入米醋
少許候温空心投下

香芎圓四

治諸淋證若患風閉尤效

淨香附鹽水炒

川芎 赤茯苓去皮三味各半兩

海金沙 滑石二味各一兩 枳殼如前製

澤瀉去粗皮 石葦去毛梗 檳榔不過火四味取薄葉各二錢半

右件剉曬爲末糯米粉煮爲清糊圓麻仁大每服三十

三圓至五十五圓或七十七圓並用麥門冬熟水空心

送下若小便澀痛滴三五點者取長江順流水用火微
温入鹽少許調勻空心嚥服

香連圓五

治赤白下痢煩渴作痛

南木香

半兩不
過火

淨黃連

一兩剉用茱萸
炒仍去葉梗

烏梅肉

二錢半薄切用
屋瓦慢火焙乾

右件爲末用阿膠半兩剉碎炒脹水化如糊候冷入乳
鉢內同前藥末亭分杵勻圓作麻仁大赤痢每服三十
三圓至五十五圓或七十七圓甘草湯空心下白痢圓

數同前白薑湯空心下赤白交作温米清湯空心嚙服

化癖圓六

主癖結氣塊在兩脇之間日久不化乍寒乍熱藏府不調米穀不消哽氣喘促胸腹滿悶及理丁奚哺露

南木香

陳皮

去白

莪朮

去毛炒

三稜

炮剉

青皮

巴豆九粒去殼膜心微炒

枳殼

如前製

檳榔

七味各半兩

白朮

丁香

二味各二錢

細墨

燒存性用四錢

石除木香檳榔丁香不過火餘七味焙同前三味爲末

麩糊圓作麻仁大每服十五圓至二十一圓清米湯空

心下有寒熱往來以柴胡飲閒服忌油膩生冷飲食

蘆薈圓七

主五疔八痢蛇蟲藏府虛弱身體瘦悴頭髮焦疏腹脹
青筋小便白濁渴水無度洞泄不時穀食難化徧身瘡
疥神色乾燥此藥大能養胃壯氣止痢除蟲長肌健力

南木香

丁香

二味各二錢半訶子

去核取肉

肉豆蔻

二味各半兩

使君子肉

蘆薈

二味各四錢

棗肉

一兩薄切用屋瓦盛慢火焙乾

右除使君子肉薄切於乳鉢內極細杵仍將前南木香

等四味溼麩裏煨至香熟取出地上候冷去麩剉焙
棗肉蘆薈爲細末再入乳鉢同使君子肉杵勻煉蜜圓
作麻仁大每服三十圓至五十圓溫米湯空心送下兒
小米湯化服

使君子圓八

治腹內諸蟲作痛口吐清水

使君子肉

薄切屋瓦焙乾

檳榔

酸石榴根皮

東向者佳淨洗

剉

大黃

半生半炮四味各七錢半

右除檳榔剉曬不過火餘三味再焙同檳榔爲末沙糖

水煮麩糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓淡猪肉汁空心下或雞肉汁亦好

補腎地黃圓九

治稟賦不足腎氣虛弱骨髓枯竭顛大頭縫不合體瘦語遲行步多艱齒生緩者

乾山藥去黑皮

山茱萸酒浸潤烝透去核取皮爲用

熟乾地黃酒洗焙乾三味各五錢

鹿茸蜜塗炒酒亦好

川牛膝酒洗焙二味各四錢

牡丹根皮淨洗

白茯苓去皮二味各三錢

澤瀉去粗皮二錢

右件剉焙爲末煉蜜圓作麻仁大每服十五圓或二十
五圓至三十五圓空心溫鹽湯下溫酒亦佳

寬腸圓十

治痢後裏急大府閉澀不通

枳殼同上製仍用清油浸透一宿焙乾五錢 麻仁去殼

木通去皮 大黃半生半炮

檳榔

大腹皮淨洗焙乾五味各二錢半

右除麻仁用乳鉢極細杵外五味檳榔不過火餘焙同
研成末入乳鉢中與麻仁再杵勻煉蜜圓棗豆大每服

三十圓至五十圓仍以枳殼甘草煎湯空心送下一二月
月嬰孩溫蜜湯化服

香陸胃苓圓十一

治腫疾日久不瘳此藥大能實脾導水多服取效

丁香去梗 商陸 赤小豆 陳皮去白 甘草炙

味各 蒼朮如前製 澤瀉去粗皮 赤茯苓去皮 猪苓

二兩 白朮三味各 肉桂去粗皮 厚朴同上製

石除丁香肉桂不過火餘藥剉焙同前二味為末用麩
微炒水浸透煮糊圓茶豆大每服二十圓至五十圓或

七十圓空心溫湯下兒小者圓作粟穀天吞服粒數引
子並如前法

二薑圓十二

治瘧疾往來寒熱經久不瘳者

良薑

一兩剉片
東壁土炒

白薑

一兩剉片巴豆九粒去
殼同炒微黃去巴豆

右爲細末用獾猪膽汁和水煮麪糊圓麻仁大就帶潤
以硃砂末爲衣熱多用溫湯早晨面北空心送下寒多
亦於清旦用溫酒面南空心嚥服若寒熱相亭用陰陽
湯以一半冷水一半熱湯參和是也不拘向南北投服

沒石子圓十三

治久患疝痢及釀瀉

沒石子

二枚

南木香

溼紙包略炮過

肉豆蔻

一枚

淨黃連

剉碎薑汁炒過二味各二錢半

訶子

四枚炮去核

右剉焙成末如烏犀圓內製飯糊為圓粟穀大每服十五圓至三十圓或五十圓溫白湯空心下或米清湯

半夏圓十四

治痰證神妙若驚搐後風涎潮作服之尤驗

半夏

生用二兩

赤茯苓

去皮枳殼

同上製二味各一兩

風行枳消 二錢半

右煎三味剉焙爲末入乳鉢同朴消杵勻生薑自然
汁煮糯米粉爲糊圓菜豆大每服三十圓至五十圓
以淡薑湯食後臨睡送下兒小者圓如粟穀大

六聖圓十五

治諸積和胃大能主氣厚腸消疝快膈屢用取效

莪朮

炮剉

淨黃連

陳皮

去白

白薑

炮四味
各五錢

南木香

二錢半

右除南木香不見火餘四味剉焙同木香爲末每一錢

重巴豆三粒去殼膜心存油碎切入乳鉢極細杵同煎藥末再拌勻醋煮麪糊圓麻仁大每服十五粒至二十五圓或三十五圓淡薑湯五更初空心送下利三五行勻氣散止補常服助脾化積進食消疳臨睡以淨湯或溫酒下三粒及五粒而已每一次止圓藥末三錢重淨巴豆九粒爲則不可多合久則味過用之效遲

內消圓十六

治療癥作膿穿破久不瘡者或初得此證投之亦效

斑貓

一兩除翅足粟米大盞炒令粟米破焦色仍去粟米

石件入薄荷葉三兩同研爲末雞子清爲圓茶豆大初
用半飢半飽閒以溫茶清下一圓逐日加一圓加至五
圓之外又逐日減一圓減至一圓之後每一日只服五
圓得瘥卽止不可過投

截驚圓十七

治驚風搐掣煩燥有熱兩目上視口噤牙關

龍膽草 去蘆 防風 去蘆 青黛 鉤藤 和鉤

淨黃連 牛黃 甘草 硃砂末 水飛者八味各五錢

薄荷葉 二錢半 麝香 半錢

右除牛黃麝香外餘八味剉曬或焙爲末仍同前二味
乳鉢內杵勻煉蜜圓芡實大每用一圓至二圓溫湯化
服或茶清

散氣圓十八

理諸疝氣小便利或不通臍下作痛不堪忍者

海藻

湯浸洗七次焙乾用

澤瀉

去粗皮

茴香

炒

車前子

焙

蘿蔔子

用屋瓦慢火焙乾

川練子

取肉斑貓九枚去翅足同炒少時仍去斑

貓候冷用

大腹皮

淨洗焙乾七味各一兩

右件剉焙爲末酒煮麪糊圓棗豆大每服三十圓至五

十圓南木香煎酒空心下或防風牡丹皮煎酒下不能
飲者於木香湯中防風牡丹皮湯內各少入酒並空心
投亦可再用鹽炒茴香煎湯尤妙

金粟圓十九

治下痢赤白水穀不化

淨黃連

一兩神麴

一兩別研
爲末作糊

川芎

枳殼

如前製

穀芽

淨洗
焙乾

赤茯苓

去
皮

白芷

南木香

六味各
半兩

右除木香別剉不過火餘六味焙入木香同爲末用神
麴末煮糊圓粟穀大每服七十圓至百圓空心温米清

湯下不拘時

萬應圓二十

治諸般疔證胃口有熱飲食不進頭髮作穗面色痿黃

五倍子

去內蟲屑

胡黃連

青皮

去白

陳皮

去白

黃檗

神麴

麥芽

淨洗焙乾

三稜

炮剉

莪朮

炮剉

蕪荑

檳榔

龍膽草

川練子肉

使君子肉

十四味各一兩

右除檳榔不過火麥芽二味外餘十二味剉碎炒令微焦色候冷同前麥芽檳榔研為細末水煮麴糊圓麻仁

大每服三十圓至五十圓或七十圓温米清湯無時送下或空心兒小者圓作粟穀大粒數下法同前

金茱圓二十一

治冷痲氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉

一兩

家茱萸

半兩

右二味焙研爲末酒煮麩糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓空心温鹽湯下温酒亦好兒小者圓作粟穀大粒數下法如前

二聖圓二十二

治腹內諸蟲及消穀逐水下氣去風

檳榔 一兩

巴豆

十五粒去殼膜內存油

右檳榔剉曬為末巴豆碎切在乳鉢內極細杵仍入檳榔末同再杵勻麪糊圓菜豆大每服七十七圓至九十丸圓用溫茶清五更初空心止投一服見蟲下盡進以稀粥自安

商陸圓二十三

治水腫小便不通勿拘遠近

商陸

一兩

淨黃連

半兩

右二味焙爲末薑汁煮麪糊圓菜豆大每服三十圓至五十圓用溫紫蘇熟水空心下或溫葱湯

枳殼圓二十四

治大府虛閉氣連日不通痢後裏急用之亦效利小便熱閉

枳殼

不拘多少剉片麥麪炒過仍以清油潤透一宿焙乾

右焙爲末煉蜜圓作芡實大兒小者用甘草糯米煎湯化下一圓至二圓兒大者圓菜豆大每服三十圓或五十圓食前溫米清湯送下小府熱閉用車前子煎湯候

温空心投之

濬川圓二十五

治水腫及單腹滿脹氣促食減徧身面浮

大戟

芫花

醋炒

沉香

檀香

南木香

檳榔

莪朮

大腹皮

焙乾淨洗

桑白皮

剉炒九味各半兩

黑白牽牛

曬研取生末一兩

巴豆

去殼膜心存油三十五粒

右除牽牛末巴豆外前九味內有沉香檀香木香檳榔
不過火餘五味焙乾同沉香等爲末就加牽牛末和勻

巴豆碎切在乳鉢內極細杵入前藥末同再杵勻水煮
麩糊圓麻仁大每服十七圓濃煎葱湯候溫五更初空
心下去水未盡停一日減用十三圓次減作九圓再減
至七圓湯使下法如前證退卽止仍投南星腹皮散如
單腹腫甚能飲食氣壯者加甘遂末同圓取效仍忌有
甘草草藥餌不致相反

三聖圓二十六

治諸癰不拘遠近

穿山甲

一兩半湯浸透取甲剉碎同
熱灰鑊內慢火炒令焦黃色

雞骨常山 雞心檳榔 二味各一兩
薄剉曬乾

右件再曬為末水煮糯米粉為糊圓菜豆大就帶潤以紅丹為衣陰乾每服三十圓至五十圓未發前隔晚用酒空心投一服重則二服經久不瘥下祛瘧丹

莪朮圓二十七

和脾益胃消進飲食寬膈快氣悅色清神

莪朮 炮剉 三稜 炮剉 淨香附 三味各四兩
醋浸一七慢火煮乾再焙 檳

榔 一兩薄剉 生牽牛末 一兩別研 青木香 去蘆 穀芽 淨洗焙乾 青

皮 去白三味各半兩 萆澄茄 丁香 南木香 三味各

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉焙仍同檳榔丁香木香爲末臨入牽牛末和勻水煮麪糊圓菜豆大每服三十圓至五十圓無時用淡薑湯下溫茶溫酒皆好兒小者圓粟米大粒數下法如前

豆蔻圓二十八

治患豆瘡脾虛作瀉

肉豆蔻

南木香

縮砂仁

三味各三錢

白龍骨

訶子肉

二味各五錢

赤石脂

枯白礬

二味各七錢半

右除木香不過火餘六味剉焙仍同木香爲末稠煮麩糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓温米清湯空心送下或不拘時兒小者圓粟穀大下法同前

碧玉圓二十九

治痰嗽氣喘胸滿飲食減少睡不得寧煩燥有熱

青黛

明白礬

生用

南星

生用

滑石

四味各二錢半

輕粉

五十貼

全蠍

十五尾去尖毒

巴豆

四十九粒去殼膜心存油碎切入乳鉢極細杵

右除輕粉巴豆外餘五味或曬或焙爲末仍入前二味

同在乳鉢杵勻薑汁煮糯米粉爲糊圓粟穀大每服七圓至九圓或十一圓用淡薑湯空心投熱甚者薄荷湯下或不拘時

快活圓三十

治丁奚疳證皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便白濁睡臥煩燥神氣昏沉常服健脾化積進食肥肌

蒸餅

一兩去頂剗空入青礬內半錢重仍以碎餅屑緊塞上用水紙封定灰火中炮透取

出候冷用

右件剗焙爲末別以肥棗用米泔水浸經一宿飯上蒸

少時去皮核用乳鉢爛杵如糊同煎餅末亭分再杵勻
圓麻仁大每服三十圓至五十圓溫米清湯無時送下
兒小者亦以米湯化服其蒸餅不拘箇數大約以一兩
入青礬半錢重爲定下常如前法製半斤作一料後人
切勿以見方不重藥爲誤余嘗屢試屢驗

其餅如南
饅頭樣者

沉香檳榔圓三十一

和脾助胃進食清神寬胸快膈順氣調中悅顏色壯筋
骨理面帶痿黃肌膚瘦弱過食生果停寒在裏乳癖腹
脹作痛及吐痢瘡腫瘡後諸疔蟲積並皆可投

沉香 檳榔 檀香 南木香 丁皮 三稜

炮剉 莪朮 炮剉 神麴 炒 穀芽 洗焙 厚朴 同上製

蒼朮 同上製 使君子肉 剉以屋瓦焙乾 青皮 去白 陳皮 去白

縮砂仁 益智仁 淨香附 枳殼 同上製 良薑

同上製十九兩 粉草 炙一兩半

右除沉香檳榔檀香木香丁皮不過火餘十五味剉焙仍同沉香等為末水煮熟麵糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓溫米清湯無時送下兒小者不能吞嚥煉蜜圓如芡實大每以一圓或二圓溫湯化服

膏類

硃砂膏一

五心煩熱喉痰壅盛驚風搐搦渴飲無時睡中不甯見
人煩燥口瘡糜爛

硃砂

水飛五錢

牙消

鵬砂

玄明粉

三味各二錢半

麝香

一字

金箔

銀箔

各十貼

白附子

枳殼

如前製二味各三錢

川芎

粉草

二味各四錢

人參

去蘆

黃芩

薄荷葉

三味各二錢

右前七味入乳鉢杵勻後七味剉焙為末仍入鉢中同

前藥和煉蜜圓芡實大每服一圓至二圓用麥門冬熟水無時化服

如意膏二

治痰喘氣促咳嗽連聲不已冷熱二證皆可投

半夏

炮裂

南星

炮裂二味各一兩半

右二味爲末以生薑汁和勻捻作小餅如錢樣用慢火炙乾再爲末復取薑汁如前經兩次炙乾仍焙爲末煉蜜圓芡實大每服一圓至二圓仍用薑蜜湯無時化服有熱以薄荷湯

地黃膏三

治口內舌上生瘡作痛飲食艱進晝夜煩啼

山梔仁

菘豆粉

二味各一兩半

粉草

六錢

右件或曬或焙爲末用生地黄爛杵取汁一兩半好蜜一兩半以薄瓦器盛在銅鐵銚中水煮成膏如稀糊相似候冷亭分入前藥末同在乳鉢再杵勻圓芡實大每一圓至二圓麥門冬熟水無時化服兒大者每用一圓納口內含化或以新汲水調點舌上

烏梅膏四

治諸渴不止吐瀉後口乾無味及病中昏悶咽痛不利
心悸似驚此藥品味不寒不燥用得其宜暑月出路含
化則津液生而煩渴少神效異常

人參

去蘆

檀香

剉曬

薄荷葉

三味各半兩

烏梅肉

薄切用屋瓦慢火焙乾

乾葛

縮砂仁

百藥煎

粉草

五味各一兩

右除檀香不過火烏梅肉別焙餘六味或曬或焙仍同
前二味研爲細末煉蜜圓芡實大每服一圓或二圓無
時含嚙兒小者麥門冬熟水化服

烏附膏五

理顛門陷

綿川烏

生用

綿附子

生用二味各五錢

雄黃

二錢

右件爲末用生葱和根葉細切爛杵入前藥末同煎空心作成膏貼陷處

烏鼓膏六

治六七歲以上小兒疔顛腫毒牙關緊硬飲食不便

綿川烏

水浸潤炮裂去皮臍半兩

玄明粉

二錢

淡豆豉

三錢重水浸潤飯上蒸透

右以川烏爲末同烝豆豉玄明粉在乳鉢爛杵爲膏圓
芡實大每用一圓兒大者安在牙關內令其自化和痰
吐出又再如前法含化腫毒自消兒小者用薄荷蜜湯
化開以指頭抹入牙關內嚥下亦不妨

辟塵膏七

治小兒塵埃入目揩成腫熱作痛啼哭不已

油煙細墨

右以煙墨新汲井水濃磨入玄明粉半錢和勻爲膏用
筆多點目內三五次卽效仍忌飲酒一晝宵

萆麻膏八

治暴患脫肛

萆麻子 一兩

右件爛杵爲膏捻作餅子兩指寬大貼顙上如陰證脫肛加生附子末葱蒜同研作膏依前法貼之

鉤藤膏九

治百日内嬰孩唇面青冷腹痛夜啼及周歲以上者盤腸內弔諸疝氣疾

鉤藤 和鉤

玄胡索

當歸 酒洗

粉草 炙

乳香

五味各五錢

肉桂

去粗皮二錢

麝香

一字

右前四味焙乾桂不過火同為末乳香菟葉裏熨斗盛火熨透候冷入乳鉢同麝細杵後入前藥末再杵勻煉蜜圓芡實大每用一圓至二圓白湯空心化服

黃連膏十

治時行火眼赤腫澀痛晝夜煩啼

淨黃連

二錢半

右件細剉雞子一枚筋背札開一頭大處取清瓦盞盛入黃連和勻釀一時見黃色以絹濾過成膏患者仰面

臥外令人挑一字許頻點目內覺口中有苦味滿舌上藥之驗也豆瘡餘毒攻眼眇多有熱用之亦驗

益中膏十一 一名助胃膏

治脾胃虛弱吐瀉腹脹肚疼困倦有因感冷而瀉夜起頻數大便過時食不剋化

肉豆蔻 丁香 縮砂仁

訶子肉 炮去核四味 各二錢半 粉草 炙 青皮 去白二味 各半兩

陳皮 去白 一兩 馬芹 淨洗焙 乾三錢

右除丁香不過火餘七味焙仍同丁香為末煉蜜圓芡

實大每用一圓至三圓白湯空心化服

玄霜膏十二

治一切湯火瘡但傅上痛止更無癩痕

好糯米五升

或不拘多少

右用堅硬鐵器盛貯見天處以雪水浸一二月不問腐爛仍用竹器撈出於大笊箕內別取淨水淋過曬乾焦炒研爲細末新汲井水調塗患處如乾燥又以軟雞翎蘸水添拂瘡上使之滋潤痛減藥少再添用自然效速末久成團再研細一名玄霜散炒透黑色煙清爲度

清涼膏十三

治暴赤火眼腫痛及血癩作疼發熱

大黃 淨黃連 黃檗 赤葛

細辛

和葉

薄荷葉

風化朴消

七味各兩

右前六味或曬或焙爲末臨入朴消乳鉢內同杵勻每用一錢至二錢冷水加薑汁調塗太陽或新汲井水調妙熱癩以涼米湯水調搽患處

劫風膏十四

治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅盛咽喉腫痛

葳靈仙

去蘆一兩半細
剉焙研爲末

右用阜茨三兩去皮莖搥損挪溫水一盃絹濾過慢火熬若稀糊入醕醋半兩再熬三五沸去火候冷用前藥末亭分乳鉢內杵勻圓芡實大先用鹽梅肉擦牙根次以此膏一圓或二圓溫白湯濃調抹入左右牙關內卽開續進別藥熬時得瓦器爲上銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少與含嚙咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

千金膏十五

治水瀉疴瀉下痢赤白腹痛煩渴

橡斗子 一兩

細茶

白薑

甘草

三味各
二錢半

白芷

五錢

右件剉焙爲末煉蜜圓芡實大每服二圓至三圓溫米
清湯空心化下入醋與蜜相亭爲膏尤妙湯溫化服

卷之三

丹飲門

丹類

水晶丹一

治驚積食積蟲積腹脹煩啼心惡食減面黃並宜通利
此藥有頑積驚重風緊涎多熱極乃可服非常用之劑
及急驚後風痰未盡免生癡疾宜再投

南星

剉作小塊
湯煮少時

半夏

如前製二
味各三錢

滑石

四錢

輕粉

五

貼

淨燕蕒

二百片

巴豆

五十粒去殼全者湯泡七
次又去心膜作二邊水煮

少時曬
乾碎切

右前三味焙爲末拌和輕粉外蕪荑仁巴豆二味同碎
切在乳鉢內細杵入前藥末再杵勻如烏犀圓內製麩
糊圓麻仁大每服十五圓至二十五圓或三十五圓糯
米湯泡葱白取汁小盞五更初空心下過三五行進勻
氣散調補下風痰用淡薑湯空心服

不驚丹二

治因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮目睛斜視
常服疏風順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼

同上製一兩

淡豆豉

焙乾

茯神

去皮木根

南星

同上製三味各

半兩 蠍梢

五十尾去尖毒

淨蕪荑

二錢半先入乳鉢內極細研爛

右除蕪荑外餘五味焙為末再同蕪荑乳鉢內杵勻醋

煮糯米粉糊為圓周歲內嬰孩粟穀大每服三十圓至

五十圓乳汁下三歲以上者麻仁大每服五十圓及六

十圓溫米清湯下候一時得喫乳食

鶴頂丹三

治陰陽二證結胸神妙勝陷胸承氣瀉心三藥

明白礬

一兩

真銀硃

半兩

右二味同研爲末用熨斗盛少炭火坐小瓦盞在上平抄礬硃末一錢入盞中鎔化急刮出就搓成圓如有前證每用一圓研細茶清調勻溫服或入薑汁少許同炒下聽心上有隱隱微聲結者自散不動藏府不傷真氣無問虛實證皆可投白礬能化痰解毒銀硃是水銀或硫黃煉成汁專破積聚故治結胸

黑虎丹四

治諸般風證

草烏

去黑皮只
一兩生用

川烏

去黑皮
生用

甘草

二味各
七錢半

麻黃

不去根節甘松 熟乾地黃淨洗 藿香葉 白芷

油煙墨燒存性 猪牙皂莢 川芎 當歸

何首烏 南星生用 僵蠶去絲 赤小豆

羌活 白膠香 木鼈子去油十六味各半兩

右件剉碎或焙或曬研為細末糯米粉煮糊圓麻仁大
每服三十圓至五十圓或七十圓稍空心用淡薑湯下
兒小者圓作粟穀大治法如前

卻暑丹五

治小兒暑月五心煩熱睡臥不穩無時噉噉及小便少

乳食減渴飲水漿

硃砂末

水飛三錢

黃芩末

甘草末

二味各半兩

五苓散末

二兩

右件和勻煉蜜圓芡實大每服一圓至二圓麥門冬熟水無時化服臨睡時投亦佳

四神丹六

治水瀉赤白痢

淨黃連

一兩三錢

黃檗

去粗皮七錢

白薑

當歸

酒洗焙乾二味各七錢半

右四味薄剉或曬或焙爲末用烏犀圓內製飯糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓烏梅煎湯空心下其他病證多好甘甜鹹美惟瀉痢惡之專喜酸苦澀淡爲上故以烏梅作湯使兒小者圓粟穀大下法同前

祛瘧丹七

治瘧疾經久不瘥

常山

二兩
細剉

烏梅

和核一
兩薄切

紅丹

半兩

右除烏梅屋瓦別焙常山或曬或焙仍同烏梅紅丹研爲細末糯米粉煮糊圓麻仁大每服三十圓至五十圓

未發前涼酒空心送下或隔晚酒下重則二服輕則一服忌雞麩羊生冷飲食毒物

飲類

百傷飲

主百物所傷感冒風寒邪氣不拘冷熱一證並宜可服
惟慢驚慢脾不用

乾葛

三兩

淨香附

二兩

升麻

淨洗

青皮

去白

陳皮

去白

穀芽

淨洗焙乾

麥芽

淨洗焙乾

桔梗

剉炒

紫蘇

和根

縮砂仁

甘草

神麴

炒

赤芍藥

十一味各一兩

麻黃

同上製

枳殼

同上製二味各七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服或入薑

葱同煎有積加水酒麴熱多添燈心竹葉煎投

速效飲二

治長成小兒因他物或跌著觸損兩目血脹腫痛

荆芥穗

薄荷葉

二味各半兩

草決明

一兩微炒

甘草

三錢生用

右爲粗末和半生半炒芝蔴等分炒二錢在掌中盛以乾喫咀嚼味盡吐去渣如此法投三五次卽效

柴胡飲三

治骨蒸疴氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身瘦

胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡

去蘆淨洗

人參

去蘆

當歸

酒洗

黃芩

赤芍藥

甘草

炙六味各一兩

大黃

生用

桔梗

去蘆剉炒

北五味

去梗

半夏

同上製四味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞烏梅小角薑二片煎七分

無時溫服

四順飲四

治血脈壅實藏府生熱頰赤煩燥四肢驚掣及因乳哺過傷寒暄失理令兒腸胃不調蘊蓄積滯並風熱結核

頭面多生瘡癩目赤咽痛

當歸

酒洗二兩

大黃

一兩半

赤芍藥

三兩

甘草

一兩

右件剉焙爲末每服一錢湯調溫服不拘時

清肺飲五

治肺受風邪客熱嗽聲不斷氣促喘悶痰壅鼻塞流涕失音及解時行疹毒豆瘡涎多咳嗽咽痛煩渴

人參

去蘆半兩

柴胡

淨洗二兩

杏仁

湯泡去皮尖

桔梗

剉炒

赤芍藥

荆芥

枳殼

同前製

桑白皮

剉炒

北五味

麻黃

同前製

半夏

同前製九味各一兩

旋復花 五錢 甘草 一兩半

右件吹咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服或入薄荷同煎

沖和飲六

治感冒風寒頭疼發熱肩背拘急惡心嘔吐腹痛膨脹兼寒溼相搏四肢拘急冷氣侵襲腰足疼痛

蒼朮 同上製一兩二錢 人參 去蘆 前胡 去蘆 桔梗 剉炒三味各五

錢 枳殼 同上製 麻黃 同上製 陳皮 去白三味各三錢 川芎

白芷 半夏 同上製 當歸 酒洗 薄桂 去粗皮 白芍藥

赤茯苓 去皮七味 各一錢半 乾薑 厚朴 同上製二 味各二錢

甘草 炙七 錢半

右為呔阻每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無
時溫服傷冷惡心嘔吐煨薑同煎開胃進食加棗子煎
空心溫投寒疝痛入鹽炒茱萸茴香同煎

明目飲七

治心脾蘊熱肝受風邪致兩目羞明經久不瘡

山梔仁 淨香附 二味各 一兩 夏枯草 去梗 半兩

右件呔阻每服二錢水一盞蜜大匙煎七分無時溫服

玉露飲八

治頰赤咽乾心煩燥睡不穩身熱頭痛兼中暑發渴昏
悶小便不通驚氣入腎夢中齧牙加金珠散薄荷湯空
心調服

寒水石

中有細紋以手可碎者是

石膏

潔白堅硬而有牆壁者是二味各一兩重

甘草

三錢曬乾天陰火焙

右除前二味外甘草剉曬或焙同為細末每服半錢至
一錢溫湯無時調服或麥門冬熟水

寬氣飲九

主通利關節除胸膈痞結消痰逐水進美飲食及治蓄
氣而成搐傳變急慢驚風氣逆不和精神昏倦

枳殼 同上製二 枳實 同上製二 人參 去蘆 甘草 炙二味各半兩

右件剉焙為末每服半錢至一錢淨湯無時調服驚風
痰搐加薑汁葱湯同調熱極者入寬熱飲薄荷蜜湯調
下或麥門冬湯

菘豆飲十

解誤服熱劑煩燥悶亂或作吐或狂渴宜先投之次服
對證藥劑

菉豆粉 一兩
淨黃連 乾葛 甘草 三味各半兩

右除菉豆粉外餘三味或曬或焙爲末入乳鉢同菉豆粉杵勻每服半錢至一錢溫豉湯調服

寬熱飲十一

主伏熱在裏風痰壅滿氣促昏悶或脾胃停滯日久飲食減少面黃脈實發熱無時並宜可服

枳殼 去瓢一兩剉片巴豆十五粒作二邊去壳膜心同炒枳殼見微黃色去巴豆片

大黃 一兩
粉草 七錢半
玄明粉 二錢半

右前三味剉焙爲末臨入玄明粉乳鉢內同前藥末杵

勻每服半錢至一錢兒小者抄一字並用薑蜜湯無時調服或薄荷湯

赤蒼飲十二

主脾胃因虛受溼面浮而黃或徧身作腫飲食減少氣不升降小便赤色腹肚膨脹咳嗽有痰及腫後當服神妙加草果仁炮過水薑棗煎投

赤茯苓

去皮

蒼朮

同上製二味各一兩半

枳殼

同上製一兩

藿香

和根

半夏

同上製

淨香附

紫蘇

和梗

厚朴

同上製

陳皮

去白六味各七錢半

甘草

炙一兩二錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

化蟲飲十三

治化蟲毒在腹作痛

檳榔 酸石榴根皮 淨洗焙乾二味各一兩 紅丹 煨過

雷丸 貫眾 如雞頭者佳 使君子肉 薄切焙四味各二錢半

甘草 炙 枳殼 同上製 大黃 二味各五錢

右為細末用清油煎雞子一枚如春餅樣候冷抄藥末一錢於上攤勻空心捲而食之兒小者用糯米粉水煮糊圓粟穀大每服十五粒至三十圓以淡猪肉汁空心

下雞肉汁亦好

玄參飲十四

治療癰證及頸上生惡核腫痛

玄參

升麻

二味各五錢

川烏

炮裂去皮臍去

草烏

炮裂去皮

當歸

酒洗

川芎

赤葛

生乾地黄

赤芍藥

七味各二錢半

甘草

三錢

大黃

半生半炮四錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

參香飲十五

治胃虛作吐投諸藥不止

人參

去蘆一兩

沉香

丁香

藿香

和梗

南木香

四味各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分去渣臨入薑汁少

許作三次空心溫服

健脾飲十六

健脾養胃理嘔吐治瀉痢及諸病後氣色虛弱有痰惡心腹中微痛飲食減精神慢並宜投服

厚朴

同上製再熱炒入醋

人參

去蘆二味各一兩

白茯苓

去皮

肉豆蔻

半夏

同上製

益智仁

淨香附

五味各二錢半

良薑

剉片東壁土炒

訶子肉

二味各二錢

甘草

炙五錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空

心溫服或無時

五皮飲十七

主頭面四肢浮腫時有微喘飲食不進

大腹皮

淨洗焙乾

桑白皮

去粗皮剉炒

茯苓皮

淨去埃土

生薑皮

略洗焙乾

陳皮

去白五味各一兩

右件咬咀每服三錢水一盞煎七分無時溫服此劑但

多投自然作效勿以見方不重藥爲誤

立效飲十八

主口內牙根舌上發瘡作痛致語言飲食不便咽痛茶清調下

淨黃連

一兩

北細辛

去葉二錢半

玄明粉

二錢

右件細剉或曬或焙爲末仍同玄明粉乳鉢內杵勻每用一字乾點患處或以一錢新汲井水調塗瘡上兒小者畏苦不肯點嚙用蜜水調抹爛處及舌上令其自化

沉香飲十九

治吐痢後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虛水穀不化或
隨時直下五心煩熱盜汗常出或聞食心惡

沉香

丁香

南木香

藿香葉

四味各二錢半

陳皮

去白

白朮

半夏

同上製

白茯苓

去皮

肉豆蔻

五味各五錢

粉草

炙三錢

右除沉香丁香木香不過火餘七味或曬或焙仍同前
三味研為細末每服半錢至一錢用紫蘇木瓜煎湯空
心調服棗湯亦好

拔毒飲二十

解風熱毒氣上攻頭項浮腫作痛發驚及治發斑

天花粉

去粗皮 一兩

生乾地黄

淨洗

白芷

當歸尾

酒洗 桔梗

剉片蜜水炒過

甘草

五味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時温服

藿香飲二十一

理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣除邪

人參

去蘆

半夏

同上製

赤茯苓

去皮

甘草

炙四味各一兩

蒼朮

同上製 二兩

陳皮

去白

藿香

去皮二味 各七錢半

厚朴

同上製 一兩半

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心温服或入燒鹽同煎

參蘇飲二十二

解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參

去蘆

紫蘇

和梗

前胡

去蘆

乾葛

半夏

同上

製

赤茯苓

去皮六味各七錢半

枳殼

同上製

陳皮

去白

桔梗

剉炒

甘草

四味各五錢

右件呔咀每服二錢水一盞薑三片煎七分無時温服

紫草茸飲二十三

和益脾胃催張豆瘡庶使易收不致傳變

紫草茸

無嫩茸取近蘆半寸者代

人參

去蘆

黃耆

生用

當歸

酒洗去尾

白芍藥

甘草

六味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞糯米五十粒煎七分無時

溫服或入棗一枚去核同煎

天麻飲二十四

治諸般風搐不省人事

天麻

明亮者

川烏

炮製去皮二味各七錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無

時勤與温服

黑白飲二十五

治臍風氣實者及急驚壯熱發搐

黑牽牛

半生半炒

白牽牛

半生半炒

大黃

生用

陳皮

去白

檳榔

五味各半兩

甘草

炙三錢

玄明粉

二錢

右除檳榔不過火餘五味或曬或焙仍合檳榔爲末同
玄明粉入乳鉢再杵勻每服半錢至一錢温蜜湯調化
空心投服或無時此藥新合最妙久則效遲

白附飲二十六

治肝風剋脾土痰涎壅盛和飲食吐出蓋風能生痰痰壅甚食故吐出

白附子 南星 生用 半夏 生用 川烏 生用仍去皮臍

天麻 明亮者 陳皮 去白 南木香 全蠍 去尾尖毒

僵蠶 去絲 丁香 各二錢

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分作五次空心温服

二仙飲二十七

治瘧疾不拘歲月遠近

青蒿

去梗二兩五月五日采暴乾用

桂枝

去粗皮半兩

右二味剉曬為末每服一錢寒熱未發前用涼酒調服或先隔晚亦以酒調下加香薷葉二兩好茶芽半兩合研成末又名斬邪飲治證下法同前療暑瘧尤勝

雙金飲二十八

治下痢赤白晝夜頻密及泄瀉經久

大罌粟殼

去蒂剉碎蜜水炒透曬乾一兩

大川芎

剉碎釀醋炒透候乾半兩

右二味再曬或焙為末每服一錢至二錢用粳米清湯空心調服或溫蜜湯

大順飲二十九

解冒暑毒煩渴吐瀉腹痛發熱神昏或衄血咯血及大府下血小便黃少口乾汗多

細麪

二十兩

生薑

十六兩

赤茯苓

去皮

粉草

二味各五兩

右先以生薑方切如菜豆樣石鉢內略杵爛入麪再杵勻攤作薄片烈日中暴乾赤茯苓粉草二味細剉同前薑麪片或曬或焙合研爲末每服一錢至二錢新汲井水無時調服或溫熱湯

快斑飲三十

治豆瘡出不快

麻黃去節存根一兩半略紅色麩半兩

薄桂去粗皮甘草二味各三錢

右剉焙為末每服一錢用溫白湯無時調服

消暑清心飲三十一

解伏熱中暑煩燥作渴神氣不清及有驚搐名暑風證

投之即效

香薷去老梗澤瀉去粗皮二兩扁豆同上淨黃連

羌活 猪苓去皮厚朴同上白朮

乾葛 赤茯苓去皮 升麻 川芎十味各半兩

甘草一兩二錢

右件呔咀每服二錢水一盞煎七分無時帶涼服治暑風證先投此劑得效次服卻暑丹其搐不致再發

定喘飲三十二

治夾風痰喘氣促不拘冷熱二證

人參去蘆 麻黃不去根節 防己去黑皮 訶子去核

半夏同上製 甘草六味各五錢

右件呔咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時温服

常山飲三十三

治瘧後單熱不退

常山

檳榔

二味各二兩

烏梅

一兩和核

右前二味各剉片各用醕醋釀一宿常山炒乾檳榔曬乾仍同烏梅咬咀每服二錢水一盞煎七分熱未發先空心帶涼服仍忌雞酒羊麩生果毒物有寒熱經久不除者加此劑於小柴胡湯或藿香飲內同煎亦效

消毒飲三十四

解急驚風毒赤紫丹瘤壯熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶

咽喉腫痛九道有血妄行及徧身瘡疥

牛蒡子

六兩

荆芥穗

二兩

甘草

一兩

右爲呔咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

縮砂飲三十五

和胃氣消宿食及理腹痛快膈調脾

沉香

一兩

縮砂仁

烏藥

二味各二兩

淨香附

四兩

甘草

炙一兩二錢

右除沉香不過火餘四味剉焙仍同沉香研爲細末每服一錢用溫鹽湯無時調服或空心燒鹽湯調下亦好

及紫蘇棗湯尤妙

定吐飲三十六

治吐逆投諸藥不止用此神效

半夏

同前製咀咀如棗豆大篩去細末二兩

生薑

淨洗拭乾和皮二兩

薄桂

去粗皮咀咀三錢

右生薑切作小方塊如棗豆大同前半夏和勻入小鍋內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以皮紙攤盛地上出火毒候冷略簸去黑焦末每服二錢水一盞薑二片煎七分稍空心少與緩服

萬安飲三十七

此劑能推陳致新除邪輔正和益脾胃宣通氣血調順
飲食疏解風寒寧心化痰去煩理熱不拘證在表裏並
宜可投常服百病不生貞元益固補養諸虛亦有驗矣
此方與宣明論當歸飲相類不遠治法最多其藥品之
外惟加枳殼半夏

人參

去蘆

當歸

酒洗

大黃

生用

防風

去蘆

柴胡

去蘆

枳殼

同前製

半夏

同上製

芍藥

淨洗

黃芩

甘草

十味各一兩

滑石末

六兩

右件呔咀除滑石末臨入和勻每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服或加棗一枚同煎

卷之四

金餅門

金類

一字金一

治初生嬰孩一七之外欲成臍風撮口及卒中急驚慢

風牙關緊閉痰涎上壅

僵蠶

去絲

威靈仙

去蘆二味各四錢

明白礬

生用二錢

細辛

去葉一錢

甘草

生用二錢半

右件剉焙爲末每服一字至半錢薑汁沸湯調和以指

抹入牙關內治卒中急慢驚證口噤不開用鹽梅湯調擦上下牙根二處

一匕金二

治豆瘡黑陷或變紫黯色證在急危但投此藥亦能頓蘇而復紅壯則此劑又勝人齒散若精神昏慢口鼻氣冷不復救矣

穿山甲

同上製五錢

紅色麴

炒

川烏一枚

灰火中帶焦炮二味

各二錢半

右研爲末入麝香半字同在乳鉢杵勻每用一匕用葱

白濃煎湯調下止投一服或二服

一抹金三

治徧身生瘡潰爛如糜梨燥痛膿汁不乾

黎蘆淨洗

蛇牀子去土

紅丹

火飛過三錢

硫黃

赤石脂

明白礬火飛過

五倍子

去內

黃檗

去皮五

味各輕粉五十

二錢貼

右前八味或曬或焙為末仍同輕粉在乳鉢再杵勻用

生肥猪膏碎切以瓦鉢和藥末爛杵塗抹患處或清油

調搽亦可

餅類

香橘餅一

治嬰孩過傷乳食或吐或瀉及病後虛中感積成痢氣弱神昏面黃目慢

南木香

陳橘皮

去白

青皮

去白三味各二錢半

厚朴

同上製七錢

縮砂仁

神麴

溼紙裏炮

麥芽

淨洗焙乾三味各五錢

三稜

炮剉三錢

右除木香不過火餘七味剉焙仍同木香研為細末煉蜜捻作餅子如芡實大每服一餅至三餅用棗湯化開

空心温投米清湯亦可

通聖餅二

治大府閉澀連日不通滿腹膨脹氣壅悶亂服藥罔效

淨黃連

二錢

巴豆

生蒜

一箇

生鹽

半錢

右以黃連剉碎爲末同後三味石鉢內爛杵捻作餅子
寸半闊貼臍緊搓乾艾切作菘豆大五枚作五次安臍
間餅子上以火灸之卽通

薑豉餅三

治久因溼氣中於膀胱復爲風邪客熱攻激小便不利

臍凸腹脹食減作痛先投解表散後用此藥貼之

生薑

一兩碎切

生葱

五根

豆豉

七錢潤者

生鹽

一錢

生蒜

七個碎切

醎糟

一盞蓋無有糟酒代

穿山甲

同上製五錢

右件入石鉢內同杵爛捻作餅子二寸闊用微火炒熱帶溫貼臍上外以絹帕兜住如冷依前法換帶溫者貼之或再以火烘煖亦好

..

拾遺方

香艾圓一

此劑小兒常進驚積自除色澤殊異手足肥健脾胃調和兼理男子婦人諸虛不足生氣血暖中焦固養精神消進飲食男子服之身體強壯寒暑耐安婦人投之百病不生經脈通順

淨香附 一斤
乾艾葉 四兩

右二味瓦器盛用醕醋浸經七日於淨鍋內用火煮令醋盡就炒乾研爲細末仍用醋煮粳米粉爲糊入乳鉢

亭分杵勻小兒圓如蘿蔔子大人圓如梧桐子每服三十圓至五十圓或七十圓湯酒米飲隨意送下並不拘時婦人血氣素虛無生育者加琥珀二兩同作圓服極效粒數湯使下法亦依前或用棗湯

烏白圓二

治五六歲已上小兒頭風苦痛或一邊作痛及療耳聾耳

綿川烏 湯浸潤略炮去皮臍 草烏 略炮去皮

川白芷

蒼朮 如上製四味各一兩

右件剉焙爲末用生葱汁合麪糊圓菘豆大慢火焙乾
晴曬亦好每服三十圓至五十圓或七十圓食後臨臥
用溫清茶送下其葱汁法用生葱不去根葉入水同搗
爛取汁

既濟解毒丹三

治小兒中熱睡中齧牙夢語驚悸不寧或吐血瀉血強
渴引飲手足動搖狀似鬼祟並宜投服

淨黃連

五分黃檗

去粗皮

黃芩

淨者

大黃

三味各

二錢半肉

桂皮

去粗皮枳殼

同上

白茯苓

去粗皮

甘草

生用

七錢

錢

右除桂不過火餘七味剉焙仍同桂爲末滴水乳鉢內
熟杵圓菘豆大帶潤以水飛硃砂末爲衣陰乾每服三
十圓至五十圓用麥門冬熟水無時送下吐血溺血梔
子仁煎湯下兒小者薄荷湯磨化投服

輕粉散四

治長成小兒蟲蛀牙疼飲食不便

輕粉

白礬

生用

雄黃

紅丹

四味各一錢

麝香

半字

右件入乳鉢細杵爲末先用五倍子鶴蝩生葱煮水大
半盃候溫灌漱令淨次以前末藥一字或半錢擦患處

六七次卽效

獨聖散五

治嬰孩滿口白屑或如粟穀糜爛作痛不能乳食晝夜
煩啼此名鵝口證

大北南星

判開白者爲
佳不拘多少

右件爲末炒一錢或二錢醋蜜調塗顙門上於中間留
一小指大不塗及傅男左女右足心仍以立效飲溫蜜
水調點舌上令其自化尤佳

藿香托裏散六

治諸腫毒癰疽已潰未潰者及丁瘡流注徧身並內外
一切黃證惡心嘔逆憎寒壯熱晝夜疼痛不拘老少悉
宜服之此藥非特解毒大能正氣理虛祛風去煩排膿
活血定痛消腫

藿香

連翹

山梔仁

川當歸

酒洗

木通

去節

芍藥

僵蠶

去絲

甘草

八味各二錢半

大黃

生用

茵陳

黃耆

生用

貝母

四味各五錢

右件咬咀每服二錢酒水各大半盞煎八分病在上食
後溫服病在下食前溫服

拔毒散七

治癩犬惡犬所傷不拘老幼並宜可投

斑貓

七枚去翅足用屋瓦盛入糯米同一處勻炒候米黃爲度以乳鉢細杵羅過不用米

黑牽牛末

二錢半先曬研取末

右二味和勻用無灰溫酒調作一服空心投其毒自小便中出或從大府過似蒲萄肉或如犬形見毒出盡尙覺腹中有痛取用青黛入乳鉢杵勻仍羅爲末每服三錢井花水調下二服不拘時

神應散八

治小兒大人虛嗽神效

嬰粟殼

去梗蒂剉碎蜜水炒透

杏仁

湯泡去皮尖炒過

白膠香

浮者水煮過濾

乾人參

去蘆 阿膠

剉碎炒過 麻黃

去節存根 烏梅

和核五味各二兩

桑白皮

去粗皮剉碎蜜水炒透

款冬花

浮者四味各一兩

甘草

炙一兩

右件咬咀每服二錢水大盞薑三片棗一枚煎八分空心溫服或不拘時

涼肺散九

治小兒大人一切實嗽

桑白皮

去粗皮剉碎蜜水炒過二兩

桔梗

剉炒

天花粉

淨者

乾葛

麻黃

不去根節

薄荷

和梗

黃芩

杏仁

不去皮尖

知母

貝母

木通

去節十味各一兩

款冬花

淨者

麥門冬

去心二味各七錢半

甘草

生用一兩八錢

右件咬咀每服二錢水大盞薑三片葱一根煎八分無時溫服如有熱氣促加大黃製枳殼各一兩

玄明粉十

治腎水衰虛肝經邪熱視物不明或生障翳脰肉攀睛迎風淚出或如蠅飛油星或睛澀腫痛癢不可忍並皆治之及療風熱上壅咽痛口瘡痰實咳嗽不活悉宜加

諸藥內自然作效

明淨朴消

右於臘月霜雪凝寒之際用阜莢三兩重略炮搥碎溫熱湯六盃挪去渣浸化薄皮紙二重瀘過澄清入鐵鍋煮至一半候溫傾出瓦盆內於見天處露一宿次早結塊再用淨熱水六盃化開入大蘿蔔八兩重切作二分厚一片同煮見蘿蔔熟爲度仍便在瓦盆去蘿蔔片放在見天處露一宿次日結塊去水取去瀘乾入好皮紙袋盛懸挂當風處自然成粉用以點眼只如常法治風

熱等疾隨意加減用之

必勝散十一

治小兒大人病中聞飲食藥氣卽惡心乾嘔不能療者

川白芷

不拘多少

右件剉曬或焙研爲細末抄一字及半錢於舌上令其自化或用掌心盛之以舌舐嚙兒小者溫淨湯濃調少與含化並不拘時至六七次卽效

遠徹膏十二

治大小府秘澀投諸藥無驗不拘老幼並皆療之

穿山甲

尾足上者佳
燒透二錢重

五靈脂

淨者二
錢重

右二味研爲細末次以巴豆二錢重去殼研碎和前藥末仍用大蒜四錢重去上粗皮三五層於砂鉢內爛杵如泥圓作一餅納臍中以絹帕繫之外以掌心火上烘熱熨至八九次聞腹中微響卽通

至聖散十三

治老幼暴吐服藥不止者神驗

枇杷葉

淨刷去葉後毛
剉碎二兩重

半夏

吹咀淨者
四兩重

右件用生薑四兩重切作菜豆大拌勻釀一宿慢火炒

令微焦色以皮紙盛於地上候冷每服二錢水一盞煎七分去渣空心少與緩投或入諸藥內同煎服亦效

八仙飲十四

治小兒男子婦人血風目疾經久不瘥晝夜澀痛視物不明甚至生醫散漫投諸藥未驗者

生乾地黄

淨洗焙乾

赤芍藥

大川芎

羌活

川當歸尾

酒洗焙乾

龍膽草

漢防已

甘草

入味各五錢

右件咬咀每服二錢水一盞白蜜半匙煎八分去查食後臨臥二時溫服

活幼心書下卷終

曾世榮活幼新書上中下三卷上卷爲決證詩賦中卷爲明本論並拾遺下卷爲信效方並拾遺余向曾見此刻多闕失故未收後又收得一本非此刻矣適從五硯樓以醫書一廚歸海寧友人余爲之介遂檢得是書中多缺葉影鈔別本補全卽所收之又一本而非原刻也重付裝池而識其緣起如此

嘉慶辛未中秋前二日復翁丕烈識

元本活幼心書三卷每半葉十一行每行二十一二字不等蓋至元甲午曾氏原刻全表藝風前輩所藏士禮居本也德顯出處無徵是書辨證詳明處方精審允爲仁人之言自序備述淵源極有心得爰爲重刻以廣流傳同治衡陽縣志及各家著錄多作新書黃跋偶沿其誤千頃堂書目光緒湖南通志据抱經堂補元志並作二卷殆亦未見全書明宣德庚戌有修補本日本高保甲寅曾爲校刻皆不及此本之善因屬翟君展成鳳翔

蕭君伯丞

延平

再三讎校改正良多並附校記於後其

昭晰無疑者不復贅列庶後之君子有所考焉宣統二
年庚戌二月武昌柯逢時

活幼心書決證詩賦上卷校記

吳序 善狀 狀原作壯 反激他證 反原作及 成効之速

成原作盛速下原有者字

決證詩六論 因有薄荷 原文恐誤下文有皮嫩皮厚

之說或係皮有薄厚之訛

皮嫩 嫩原作漱 不言之疾

乎 乎原作耳

詩七論 蓋周歲以前 蓋原作盡 疏滌積聚 滌原作條

詩十九 揚睛 原作揚晴

詩五十一 風痰結聚 風痰原作冷熱據明本論咳嗽

詩五十六 風溼 溼原作温

詩七十一 暑溼 溼原作温

賦七十五 腎有證攻 腎原作輕 怨咨 咨原作恣 晉代

叔和 代原作伏

活幼心書明本論中卷

胎寒一 庶漸瘥也 漸原作壘

夜啼四 遏熱鎮心 遏原作遇

急驚五 目睛 原作日晴 如怒 怒原作恕 勻氣散止補

勻原作鈞

慢驚六

惟載陰癇

載原作戴

不可治也

治原作洽

風毒七

營化

營疑作鎔

但依前

依原作攸

傷積八

風寒所襲

襲原作餐

熱證九

面慘

慘原作慘

恰五百一十二日

恰原作怡

日原作目

腹疼嘔吐

腹原作腸

中指獨自冷

原作中

指毒獨冷遇晚二發

二疑誤

傷寒十

省音省

省原作肩

閒以無驚圓

閒原作問

本書丸多作圓猶沿宋槧嫌名之例惟多錯出今一

律改圓 遽然出外 遽原作據 正氣將衰 正氣二字增

百骸 骸原作駭

咳嗽十一 癖塊 原作頑塊

吐瀉十二 詳究治法 究原作丸 養宗筋 宗原作宮

諸吐十三 其吐自減 減原作咸

諸瀉十四 素弱 素原作索 化癖圓 癖原作病 粳米 粳

原作占 案粳應作秈 稻不黏者 以下照改 糞稠 糞原

作姜

赤白痢十五 亦效 效原作故

腫證十六

施治

施原作於

兩脇

脇原作協

鴨塘

塘原

作塘

手足背皆腫

背原作背

其腫如初

其原作甚

脫肛十九

風屬木

木原作未

癩證二十七情所汨

汨原作汨

瘧疾二十一

閒日而作

閒原作閒

勻氣散止補

勻原

作白

加草果

果原作菜

為醫為父母者

者原在醫字

下

瘡疹二十六

發之亦少

之字原作而

導赤葛散

導字

當衍

為其藥性

藥原作藥

異功散

功原作攻

噬臍

臍

原作劑
蚊蚤
蚊原作蛟
病必致危
病原作痢

陰囊腫二十七
縱弛
原作弛張
感風溼
溼原作溫

驚癱鶴膝二十八
閒服排風湯
閒原作問

五淋三十
而為洩
洩原作瘦
名曰陰閉
閉原作問
薑

鼓餅
鼓原作鼓

口瘡三十三
脣弦
弦原作竝

諸瘡三十四
及三解散
及原作乃
木通散閒服
閒原

作雖

目疾三十五
紅弦
弦原作竝

重舌三十七

卷音捲

原作捲音卷

札針

札原作扎

五軟三十八

鞞音報

原作鞞音昂

諸汗三十九

驚汗

汗原作肝

黃證四十

兩目弦

弦原作玆

辨藥病不相主對二

所傳藥性

傳原作侍

評非時用附子大黃四

侯自牧

侯原作候下同惟楊

侯二家原作侯

活幼心書信效方下卷

目錄 使君子圓

原原作丸以下同今改一律

拾遺目錄

凡十四原無今補

白芍藥湯十

臍下痛

臍原作劑

六和湯三十三

水一盅

盅原作中

黃耆六一湯三十四

口揚

揚原作傷

甘草一兩

一原

缺

坎離湯三十七

甘草

無分數或下二味當是三味

化丹湯四十

石膏末

無分數薄桂下注入味各五錢

當移此

雄黃散六

川烏頭

此葉鈔補作川芎

按下重川芎

據幼科準繩引改烏頭

瀉黃散二十七

微炒香

炒原作妙據錢氏直訣改

調元散二十八

手足如癩

癩原作簡

霹靂散五十

白芷

三味各二錢原作二味據準繩改

麝香人齒散五十六

入腎

腎原作胃

補腎地黃圓九 取皮為用

用原作則

香陸胃苓圓十一

此藥

藥原作茲

二薑圓十二

就帶潤

帶原作滯

沒石子圓十三

肉豆蔻一枚

一原刻模糊

二聖圓二十二 逐水 逐原作遂

地黃膏三 納口內 納原作紙

烏豉膏六 炸顯 原作詳腮

劫風膏十四 劫原作方據目錄改

寬熱飲十一 見微黃色去巴豆片 原作見微去黃色

法巴豆片

白附子飲二十六 白附飲共十味 原注五味各二錢

茲據幼科準繩去五味二字

信效方拾遺

輕粉散四 五倍子 倍原作部

藿香托裏散六 托原作柘當作托

拔毒散七 犬形 形原作刑

玄明粉十 蠅飛 飛原作腎據類方準繩改