

臨證指南醫案

肝腎
溫毒
門症

古兵葉桂天士先生著

龔初起腰足俱痺。肝腎溫毒不得外越。目泛血舌。繼增喘促。是繫悶不治之症。諸醫僉用石膏大黃等。然則此藥僅通陽明胃腑之壅。未能搜逐肝腎之陰。診視宋醫錢仲陽直訣。毒伏於陰。亦有下奪之法。其製方曰棗燮百祥丸。乃百中望一二生全者。

紅芽大戟蠍。紅東枝。水煮至棗熟去核。及大戟湯。但用棗肉研化開水送。

某毒伏不肯宣透。氣滯血凝。焉能起綻成漿。七八險關。診視肉腫瘡枯。神躁不安。議疏利內壅。佐活血透肌法。○犀角。柴草。炒查。鮮生地。酒浸大黃。紅花。青皮。丹皮。連翹。牛蒡。茅根。筍尖。湯代水。愈發熱五六日來。神煩不寧。腹脹欲絕。詢知二三日前。眉間見點數粒。狀如麩培。隨即隱伏不見。乃毒蘊經過閭伏。景象設或發出。亦屬重險。且甫生六月。胃乏穀食。難進湯藥。擬進紫雪。須少搜其溫畜之邪。使其神安再商。紫雪丹一分。

禹點雖繁密。根腳縱立。寒涼藥不宜太重。可以維持收功。

犀角。連翹。牛蒡。炒查。紫草。丹皮。天蠅。桔梗。

龐鰲神倦腹痛。點粒繁頸。地界不清。是時邪毒火兼重。急進雙解法。使大便稍通。六腑氣宣。則痘毒外透。再商犀角。連翹。牛蒡。酒大黃。紫草。青皮。桃仁。炒查。木通。生石膏。荆芥。筍尖。愈成片不立。頂焦黑滯。肝肺毒重。不能起張。馬得化毒。今咳喘交加。九朝難過。

矜羊角。元參。連翹。天蠅。土貞。紫草。丹皮。炒查。銀花地丁湯代水。
錢朝雖未發齊。其點形繁密。色澤不潤。重險何疑。今痧未全退。尚宜清解。

禹犀角。生石膏。炒查。紫草。連翹。牛蒡。亦芍。桔梗。木通。
程躬身小氣弱。佈痘繁稠。用藥不宜寒冷。五日後受得補托。可冀有成。

連翹 牛蒡 炒查 紅花 天蠅 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

身小氣弱。發驚。屬虛。人參 炒歸身 炙草 廣皮 炒白芍 炒黃米

童癬痘形粘着肌肉。不肯起綻高立。兼之繁紅殼薄。乃時火毒火交熾。而元氣素虧體弱。自今六日前時癰未徹。宜先清解。沽血提項。希冀勗勗分成地界再究。

犀角 犀牛 犀角 元參 丹皮 炒查 泰皮 紫草 莖 紅花 天蠅 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉
鄭。痘發猶然身熱咳嗽。乃風溫入肺未解。診其點粒粘着不爽。溫邪鬱滯。氣血更體質素虛。誼開肺氣以宣之。活血以疏動之。冀其形色克長。若一進沉降。恐無好音。

連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草 炒查 紅花 天蠅 丹皮 炒查 泰皮 紫草 莖 紅花 天蠅 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

又。昨進輕揚提項沽血。痘形頗長。所嫌色不光潤。蓬鬆盤奕有乾塌無漿之慮。今明時氣將解。氣血用事。况正欲納穀。苦寒不但冰伏毒氣。更防大傷胃口。古人於重症更加詳慎者為此。

川芎

當歸 天蠅

桔梗 甘草 角刺

紫草 莖

丹皮 炒查

泰皮 紫草 莖 紅花 天蠅 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

又。六朝進和氣血法。形色畧潤。究不肥緩。焉得起脹成癰。議進十宣散法。

川芎

當歸 天蠅

桔梗 甘草 角刺

紫草 莖

丹皮 炒查

泰皮 紫草 莖 紅花 天蠅 川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

張朝船小重載難許全功。幼議進雞鳴散二分。

陸五點雖不密。色滯形瘡。痰多嗆逆如嘶。是痘雖發出。毒猶在內。上冲心肺。故有喘咳不甯之象。進涼血透毒

法

羚羊 桔梗 甘草 紫草 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蠅 西牛黃分

朱四朝炒黃米

炒山楂 紅花 筍尖

丹皮 紫草 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蠅 西牛黃分

又。五身小痘。多元氣最薄。胃腑未納穀。味湯藥太過。須慮嘔泄。宜少少與藥。扶過八九風皮方得平安。

川芎 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雜丸

又。軀薄嫩無漿。仍宜內托。

黃芪 防風 歸身 川芎 紫草茸 丹皮 天蠅 桔梗 甘草 雜冠血

宋軒顧頰形似紅沙。餘痘乾枯不潤。昨進清毒活血。續發點子盈千。仲仁謂毒重壅閉。氣血必乾焦退縮。今五朝形象僅似初齊。痘似十二日為常數。已經壅遏未發三日矣。當此質薄神弱。恐難延多日。即或望其堆沙發真。然必在旬日以外。目下總以解毒清涼。八九波濤洶湧。恐難人力穩全。

犀角

羚羊角

川連

炒查

土月母

紫草茸

元參

鮮生地

連翹

丹皮

牛蒡子

猪尾血

吳半

痘子分顆。原屬純正。所嫌色滯乾枯。防八九癟塌。涼藥兼以活血。是為平准方法。看守勿懈為上。

羚羊角

丹皮

連翹

炒查

紫草茸

黃連

元參

天蠅

生地

雞冠血

孫

肌柔白嫩。體質是虛。但怖痘必由時癟感觸。地中六氣。咸從火化。癟固客氣。相混氣血。若非清解。何以透達。今視色油紅。按形鬆軟。再視面部肌肉先腫。痘形未具。起脹之象。體症未為全局。慮進銳退速。清涼解毒。佐以提頂。在五六日之法。然險症變遷不一。未可以經常定論。

羚羊角

丹皮

連翹

炒查

紫草茸

川連

炒查

桔梗

銀花

花湯煎和入雞冠血數滴。

汪五朝痘形繁瑣成片。色紫滯乃火毒重險症。藉身大氣旺。扶持十日險關。冀其發真堆沙。庶幾可以圖倖。

犀角

羚羊角

桔梗

炒查

連翹

天蠅

紫草茸

丹皮

石膏

銀花

地丁

牛蒡

猪尾血

冰片

人六雖血熱毒重。猶幸八卦體堅。急清解活血。莫令痰阻廢食。扶持堆沙。可望向安。

照前方去石膏。

地丁天蠅。

牛蒡加川連。

元參。貢。

查 痘子成漿。濕氣滯於皮毛。與熱氣相蒸。內應乎肺。發出草痘疹。宜忌草腥。輕清理肺。淡滲消其濕熱。驗其體質。取薄慎勿過剝。○苡仁。茯苓。連翹。地骨皮。通草。桑葉。白沙參。甘草。

顧。痘發由絡。其毒不化而轉陷。亦歸於絡。當世畧曉攻補而已。讀古人書。辛香溫煦。乃治毒陷大法。

人參 肉桂 紫草 丁香 厚朴 詞子皮 廣皮 木香 前胡 茯苓

徐。未納穀食。但以湯藥。所以滑泄不止。頭仰胸突。擁瘞身熱。肺熱未清。不可驟補。翁仲仁有泄瀉安神大虛。

少毒之議。姑以和中清咽再商。

桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮 炒查 炒黃米湯煎 冲雞冠血

又。朝身小痘密。氣弱難仕。雖清漿三四防護宜慎。八九日不致損破。可以有成。

人參 黃芪 紫草 紫耳 天蠶 廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查 加炒冬米

孫朝色矯皮薄。漿汁未灌。緣身小痘多。氣血交虧。不能運毒化漿。八九日期。最有瘡塌之慮。扶過十二朝無變。庶幾可望有成。進參歸鹿茸湯法。

人參 歸身 鹿茸 生黃芪 紫草 廣皮 厚朴 煥木香

又。輒照前方加肉蓴炒冬米。

又。漿清四五。不能充灌。因元氣微弱不振。不能煅煉。毒氣成漿。恐有內陷之慮。再進補托。冀其堆沙。或可回

春。人參 黃芪 廣皮 紫草 木香 鹿茸 歸身 肉蓴 坎炁 官桂

又。射三。瘡癰甚溝。中凝血跡。兼之嗰逆帶嘔。食入便有不化之形。此虛中有毒。非純補純清之症。

炒川貝 炒銀花 茗苓 茜仁 甘草 地骨皮 方太輕耳

楊八。閨壙瘡陷。漿色白滯。不榮。謂之氣衰毒陷。所冀堆沙加食一線機耳。

人參 黃芪 川芎 歸身 木香 紫草 廣皮 桂心

又。十一。漿滿堆沙。四肢圓痏。但氣弱恐其不肯收縮。必實脾利水為法。

人參 冬朮 紫草 茗苓 新會皮 白芍

又。十三。已經堆沙加食。都是向安之象。便溏滑膩。苔寒涼傷裏。腸中脂垢自下。當脾胃藥中。少佐固陽。以火延。

不已尚胎變症。人參 焦術 詞子 腎皮 肉果 白芍 木香 炙草 沉苓

又軀六納食不化。腹脹便黃白色。要之胃滯當消。脾弱宜補。古稱痞滿屬氣。氣行滯通。但痘後虛體。純消猶恐變症。○人參 集朮 炒杏 木香 佳麥芽 廣皮 藜苓 澤瀉

鮑飴漿不外達。毒欲內陷。經交牙滑瀉嘔惡。內症諸敗皆屬深畏。二十四總屬陰闊。痘子毒氣必氣元旺。

冀其托出議以陳氏木香散救裏托毒。

人參 木香 丁香 官桂 炒歸身 厚朴 廣皮 肉菓 詞子

孫 面腫目泣。頭搖微嘔。肝風離體。乘上逆攻。此乃變驚欲屢之象。夫相火寄於肝膽。氣欬痘加。宜進涼解清毒。倘得微熱緩仍進穀方有佳音。

羚羊角 川連 鈎藤 石菖蒲 黑山梔 膽星 天麻 連翹

又 肝風熱定。疳膿亦緩。仍宜清熱解毒。但不可犯胃。

羚羊角 連翹 膽星 丹皮 炒銀花 金石斛 茯苓

諸朝^{十三}痘已收厥。當然瘀落太早。恐有餘毒。今瀉止溺短。宜進清涼佐以分利。

生苡仁 百合 茯苓 川斛 白沙參 炒麥冬

某 已經回奶。不宜再進補劑。恐氣血壅滯。致有餘毒變幻。宗翁仲仁清涼以助結痂之法。

黃芩 銀花 川貝 甘草 地骨皮 桔梗 連翹 汝仁

胡^{十五}雖然堆沙壓加。咬牙發瘡。毒氣未盡。上沖心肺。補清皆在難進。扶過十八日後。癰毒尚可療治。若發疽

餓。恐難全愈。炒麥冬 白沙參 汝仁 川貝 炒銀花 地骨皮

沈^{十三}漿未充滿。忽然乾涸。即是倒盛。咬牙寒戰。元氣大虧。非峻補難挽。

人參 麋耳 炒當歸 桂心 桂圓 煙木香 仍當加托藥一二味

程 回奶太早。餘毒流走四肢。臂腿腫痛。議活血解毒。

連翹 小生地 當歸 赤芍 刺蒺藜 丹皮

夏枯草 銀花

酒半小杯

吳朝 喎咳嘔逆腹膨。都是餘毒內閉。小便少。大便溏。不得通。倘再加喘急。便是燥手。必得瘍毒外發。可望挽回。

桑白皮 大腹皮 茼豆皮 茄苓皮 飛滑石

生甘草梢

查 痘後發癰。係肺熱未清。宜平涼佐以解餘毒。

連翹 杏仁 桑皮 地骨皮 黃芩 木通 銀花 牛蒡 夏枯草

吳朝 滌漿回珈。毒氣未化。已有疳蝕之患。理進清解餘毒。但勉進稀粥。溏瀉未罷。胃未旺。相脾氣積弱。議以滲利分消。做古痘毒當利小便意。桑皮 地骨皮 連翹 茄苓 川貝 汝仁 銀花

某 痘末退。珈火內逼為喘。川連 犀角 連翹 銀花 杏仁 甘草

又 瘦火二清。川連 黃芩 山梔 連翹 銀花 元參 大貝 丹皮 地骨皮

沈 滌漿回珈。毒氣未盡。只宜清肺解毒。炒川貝 茄苓 汝仁 車前 炒澤瀉 炒銀花

徐朝 痘毒已發。咳嗽未止。珈落如魅。肌色㿠白。雖屬氣血交虛。但痘後餘毒未可驟補。議進和脾胃利溼方。法痘毒宜速調治。恐日久愈虛。致有慢驚之慮。

汝仁 川斛 茶芩 百合 廣皮 炒澤瀉

沈二朝 痘瘍失音。不嗜食物。晝則稍安。暮夜煩躁。此肺熱未肅。磨耐多日。體氣陽亢陰虧。肝風內熾。突起驚厥。可慮。地骨皮 甘草 生地炭 茼豆皮 炒丹皮 炒川貝 川斛

李朝 納食嘔吐。脾胃不和。肝風內動。肢浮肉腫。治宜培土制木。以緩肝風。是尤驚疳之患。

人參 茶芩 炒芍 生穀芽 霽香 廣皮 半夏麵

馮二朝 痘瘍粘連。神氣昏昧。元為漿泄而生。變幻慢驚欲脫。此皆脾亢陽亢陰虧。差明目。鼠肝陰之絕。恐難再

振 人參 茶神 茼豆 炒杞子 生白芍

又七朝 陽極則煩。陰涸為躁。夜甚劇。自從陰分設法。益虛和陽為治。

人之所能沉者
備去其耗而取其純
我即有如斯家而師法偏
格唐妄人不論嘔餘不論
虛實總以石羔大黃之種惡毒之藥大劑灌
死每當出痘之年枉犯道全不知憐此有對根之心也

又

人參

熟地

芡實

茯苓

建蓮

遠志

炒山藥

五味

連翹

牛蒡

丹皮

赤芍

飛滑石

木通

山梔

甘草

邵痘中復感溫邪。口鼻觸入。由中道以佈及絡脈。目泛失明。左肢不舉。少腹突起腫滿。兩足皆瘡。詢知痘見六日。陡然頭搖煩躁。而得小便淋漓。大便漸塞。乃厥陰肝熱。疝瘕失其疏泄。內風旋轉。腑陽不通。經言暴腫。暴脹。皆風火變動。至於迅速病來。其能食稍遲。熱化自可殺穀。考古半散酸泄甘緩三法。難圖肺絡壅結。仲景於厥陰條例。有下之利不止者。死之大戒。議進鹹苦以通在下。結熱愚見若此。再與高明商酌良治。○川棟子 小茴 蘆薈 山施 橘紅 龍膽草 方諸水七匙。

自古治痘名家。不曾廿數。各有精確卓識。以補前人之未備。雖各有所偏。實所以相濟也。醫者貴統審群書。隨宜施治。安可執偏隅。苟見以應無窮之變哉。先生治痘。夙稱神奇。觀其案中寒熱攻補。不勝於一見。如毒水深伏。氣血壅遏者。精分香以搜逐。用紫雪丹。氣滯血凝。毒重火伏者。以酒大黃石膏青皮桃仁荆芥犀角楮尾。血之類。主治肝肺。毒火不宣。氣血有焦燔之勢者。用犀角羚羊紫草丹皮石膏鮮生地之類。元氣不支。陽虛獨陷。而見灰白濕爛。泄瀉嘔惡等症者。用辛香溫煦。如陳文仲之法為要。氣血極虛。而致清竭。全無實症相兼者。當峻補氣血。用參歸鹿耳湯。及坎毛湯之類。氣虛莫外乎保元。及四君子。血虛不離於四物。及補血湯。又於氣虛血熱者。補氣之中兼涼血。血虛氣滯者。補血之中佐辛香。用攻法須分部位經絡。用補法當辨寒熱燥溼。遇清則有水伏之慮。偏熱則有液涸之虞。此皆先生採擇先賢之去。因人見症而施治。可謂善法。古者矣。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。如痘點既起。或不慎風寒。而營衛凝滯。或縱欲飲食。而氣機呆鈍。以致身熱不食。腹脹。嘔惡泄瀉。漿水不行。不究治其病因。但執清寒膩補。常有凶危之變。亦有痘形雖重。若神甯安靜。飲食二便如常。聲音清響。調理得宜。亦可轉危為安。大凡形老而色鮮明者。雖甚密。變幻恒少。形嫩而色晦滯者。雖稀疎。變幻恒多。表裏相參。竇症的確。然

後設法處治。方無貽後。至於逆症條款已現。雖自昔名醫亦莫能挽救。小兒天枉者不可勝數。深可憐憫。通年以來。幸有種痘一法盛行於世。實可挽回造化。凡有小兒者。俟週歲後。即可選用種痘之苗。引而發之。百不失一。此誠補痘科之未備。而為最上一乘之法也。正痘有先賢諸成法。避險有種痘之良方。痘症於是乎大全矣。陸履安曰。痘之發也。一由於胎毒內伏。一由於外感時邪之氣引導而出。其延之順逆。若內毒輕而外感之氣亦輕者。痘必稀疎。此為順症。若內毒輕而外感之氣重者。慮其遏悶不齊。不易灌漿。若能至灌漿。則時邪漸退。後易收功。此為先重後輕症。若內毒重而外感之氣輕者。慮其灌漿之後。毒難盡滅。不易收斂結痂。恐發痘毒疳蝕之患。此為先輕後重症。若內毒重而外感之氣亦重者。痘必稠密。色不鮮澤。發熱見點之後。一路蹭蹬。難以收功。此為逆症。然胎毒之輕重。人皆易明。若外感之氣。人莫能曉。夫天地間祇有六氣。氣平則為和。氣不平則有勝。復勝復至極。則為癟氣。為瘟疫氣。瘡氣。更有道塗中穢濁氣。人若感之。不拘老幼俱病。今出痘所感之氣。則異乎是。此氣獨與未洩胎毒之小兒兩相感觸。未聞痘症盛行之時。已出過痘之兒。亦染病患也。考是氣自古迄今。從未有人申說明白。確定為何氣。故前賢於痘症一科。未嘗不殫心瘁慮者。方因不明其氣之源。不無偏執之弊。有喜於寒瀉者。有喜於溫托者。有先用寒瀉而後用溫補者。有先用溫托而後用清火解毒者。更有不審見體之虛實寒熱。俱宗費建中救偏瑣言。每於發熱見點時。娶用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等。不知費氏之書。名為救偏。乃救慣用熱藥之偏耳。若本不偏。而示其法。則不偏者反生偏矣。嬰兒之命。其何以堪。幸古有種痘良法。相傳至今。其法簡易靈驗。至穩至當。蓋正痘因外感時邪而發。種痘則種於無病之時。故所出稀疎。輕者不過幾十粒。此豈非避危就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出。彼此相較。其理自明。假使一村之中。有百兒出天花。未嘗不延醫服約。若能八九十收功。人咸稱為太平痘矣。其有竭力調治而損傷幾及一半者。不聞其歸咎於醫生。惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不信而為之。仁人之言。全活不少。其利溥哉。然有命焉。自然有命焉。

此段詳載
之法。明白
通達。使人
人能行之。
其利溥哉。
然有命焉。

此等醫利
之徒害人
不少并今
世人追尋
痘法亦不
信矣

當種與不當種自決矣。至於種法全在乎好苗。大苗者即取他兒之痘痂也。必要用種出之痘落丁之痂。謂之種苗。此苗之中毫無天行時毒之氣在內。故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中。有時行之氣。若不辨而用之。名雖為種。實與傳染他兒天行時痘之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內。尚要揀擇。必取痘粒稀少。其色紅潤。灌漿濃厚所結之痂。厚實光澤尖圓者。此氣血充足。陰陽合德。上好之苗也。俟痂落丁。用紙包好。記明何日收得。收貯新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸熾熱之氣。其苗在北方天氣涼。春月之苗。一月之內尚可種。冬月之苗。四五十日尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五日。春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。欲覓此等種苗。先訪有人家正在種痘之際。向彼明言其故。懇求四五粒。即可源源而種。或平日於同道種師內相與一二位。志誠老實者。議明彼此互借。則苗亦可不斷。亦有膽大種師。於五六月中。覓家貧壯實之兒種之。不惟不索酬謝。反肯津貼銀錢。次遞傳種三四箇兒。延至七月。則苗亦可以不斷矣。近有種師。因種苗已斷。權取時苗種之。往往有種出稠密棘手重痘者。皆時苗之過也。不知時苗之性。即選上好者。亦必要傳種過四五兒。俱各順當者。其苗性始和平。方能與種苗相等。至於下手種法。尤須詳慎。凡種一兒。用痘痂三四粒。兩兒則用六七粒。放於乾淨茶杯中。傾入清水四五茶匙。用小指尖在內三四攬。則痂已溼。急將水傾去。用柳木杵研其杵約長四寸。粗如筆管。兩頭要光圓。研十數轉足矣。如痂太乾。加入清水一二滴。切不可太潮。只要研如乾漿糊狀。用簾熟新棉花。捏一小團。如棗核大。兩頭要圓。其長短粗細。量兒鼻孔之大小為之。其綿團不可太鬆。軟鬆則苗氣易往外洩。且見涕則縮。小易於脫出。數棉團只用一頭。蘸痂末糊於上。塞兒鼻中。男女左右。塞不可太進。太進則兒不適意。亦不可太出。太出則易於脫落。總要脣邊深適中為妙。寒後勿放小兒用手拈出。若被噴嚏打出。或將苗仍塞入鼻。下苗後以六個時分為度。天氣熱早取出數刻。天氣寒多留數刻。痘苗取出之後。其苗氣漸次傳遍五臟。至七日或八九日。始發熱。發熱三日而見點矣。此誠至穩至當之種法也。種痘之苗。不過痘痂一味。今各處種師。說稱痘痂之外。必要加他藥為引導者。此係

脾虛
氣不和

惑人謠語。切勿信之。既種後。將發熱時。小兒頸項內。男女左右。必發一小塊。狀如瘻核。此乃毒氣結聚於此。故痘發必稀疎。此塊不必腫治。待落痂後。則塊亦漸消矣。若用時苗種者。項中無塊。當以此辨之。又間有驚。還於發熱時。小兒忽然驚搐。手足踴。不語。目上視。有片時。即平復者。有發一二個時辰者。有發一次者。有發兩次者。總屬不妨。斯時切不可擾動叫喚。之。待其自平即已。不必服藥。須預對痘家說明。免其憂慮。以上諸論。皆時下種師之秘訣也。若夫辨兒之可種與不可種。須察兒體之虛實。及有無宿病。若調治之法。當節飲食。適寒溫。防驚嚇。此皆種師俱各明悉。茲不重贅。鄭望願。

沈

辨年歇乳進穀。脾胃氣餒少運。腹脇目翳。是為五疳。夏日中土司令。久病投以補氣。恰令調其脾胃。近日嘔吐泄瀉。身熱。乃寒暄天和。致食不易化。小溲既少。腑氣不和。余幼科久疎。憶錢氏每以調中為主。而驅邪

都主輕法。深慮脾上傷。則延驚癇耳。

益智仁

焦术

茯苓

廣皮

藿香梗

厚朴

查肉

澤瀉

張四歲

五疳腹脃數月。法當疎補。

人參

茯苓

麥芽

炒查肉

廣皮

半夏

湖蓮

內傷
夾滯
血積

又 照前方去半夏。湖蓮加澤瀉。

陳歲官人。自汗短氣。咳嗽。風溫見症。肌腠有瘡痍之形。與疹瘡肺病不同。但幼稚生陽尤肺。春深入夏。形質日減。色脈是虛。而補脾辛甘不應。腹滿按之自安。一便原得通利。腹痛時發。止痛已。即能飲食。考幼科五疳。與大方五勞相類。疳必因營熱為積。為蟲。此飲食不克。肌膚也。病來非暴攻之。由漸。再論疳熱蟲積。古人治肝。治胃。恆多而潔。古東垣。於內傷夾滯。每製丸劑以緩治。取義乎。渣質有形。與湯飲異。此刻下溫邪擾攘之餘。聊以甘涼之屬。清養胃陰。以化肺熱。其辛氣泄表。不宜進。

甜杏仁

麥冬

地骨皮

生甘草

冬桑葉

玉竹

和入青甘蔗汁一酒杯

散治

府熱

羸瘦

從陽明

陰疏通

消補兼施

丸 人參 黃連 蘆薈 川連子 使君子 茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山楂
某微食物不節。脾胃受戕。腹脹大便不調。此屬脾疳。

焦朮 茯苓 蘆薈 廣皮 益智仁 大腹皮 木瓜 炮薑 炒神麩

吳歲能食色枯形瘦。暮熱泄瀉。此皆口腹不慎。值長夏溫熱。脾胃受傷。將成五疳。

青葛梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍 炒山楂 廣皮 茯苓 澤瀉

王 五疳已久。脾胃受傷。食物不運。腹脹瀉瀉。此積聚未清。中焦先餒。完穀不化。腫脹皆呈難治之症。

七香餅

疳者乾也。小兒腸胃柔嫩。若乳食失調。甘肥不節。運化不及。停積發熱。久津乾。此因積成疳者也。或五

臟偏熱。或因病後。或醫藥悞下。致亡失津液。脾不輸化。積滯不行。此因乾致積者也。故五疳不離乎脾胃。其治法。胃滯當消。脾弱宜補。熱者用苦寒清火。冷者宜辛溫健運。有蟲者兼用殺蟲之品。其虛者。各隨本臟補其母。總宜丸劑緩調。不能旦夕速功。或用雞肝納入。治疳藥燉食。最為有效。陸續安

此老幼科痘症。不僅名家可推。大家矣。敬服敬服。

陸續安

溫邪

暑濕

胃陽
傷

吳王

身熱吐乳自利。溫邪內擾脾胃。稚年防驚。藿香葉 飛滑石

未到周歲。熱犯脾胃。嘔逆下利。壯熱不已。最多慢驚之變。

人參太重

川連

黃芩

藿香梗

廣皮

生白芍

烏梅

某暑邪犯肺。土王用事。脾胃素弱。不運暑溼。腹鳴泄瀉。惡心露睛。怕成慢驚。慢驚二字亦有此名。

人參

藿香

炒厚朴

木瓜

川連

茯苓

炒扁豆

澤瀉

章傷食一症。考古用五積散之義。取燥使其腐熟也。既上湧頻吐。大便溏瀉。胃氣益傷。陽氣困日甚。清不升。濁不降。痰潮乾嘔。腹鳴便遺。睡則露睛。齦黑唇紫。小溲竟無陽。不流行。津液自耗。有慢驚昏厥之危議。

通胃陽。讀錢氏薛氏之書。能知此意。

人參
鬱金
炒半夏
炒白附子
茯苓
菖蒲
炒廣皮
炒梗米

又
陽明胃陽受傷。腑病以通為補。若與守中必致壅逆。昨日用方。通勝於補。獲安。幼稚非真虛寒之病。

人參
茯苓
益智
廣皮
炒荷葉
炒梗米

又
鼻明汗出。頭暉。陽明虛胃氣未和。不宜涼降。六神湯加炒廣皮。
虧
面色痿黃。脈形弦遲。湯水食物入咽吐出。神氣渙散。欲如昏寐。此胃陽大乏。風木來乘。漸延厥逆。俗稱慢
脾陰症。幼稚弱質。病延半月有餘。豈可再以峻藥攻急。宗仲景食穀致嘔者。桑菊羹湯主之。

人參
吳萸
茯苓
半夏
薑汁

又
昨用泄木救胃土法。安妥不見嘔吐。然中焦陽氣太虛。濁氣上僭。則為昏厥。津液不升。唇舌乾燥。豈可妄

寒再伐生氣。今如寐神倦。陽陷於陰。何疑。仲景通陽理虛。後賢錢氏薛氏皆宗其義。

人參
炒半夏
茯苓
廣皮
煨姜
南棗

此方偏於溫補

食傷
脾胃
內伏

蘇
周歲幼小。強食腥羶。身不大熱。神氣呆鈍。上吐下瀉。最防變出慢驚。此乃食傷脾胃。為有餘。因吐瀉多極
動正氣致傷耳。廣皮
厚朴
茯苓
廣藿香
生益智
木瓜

陳
涼風外受。內鬱熱伏。身發瘡瘍。便解血膿。煩渴得汗。僅解外風。在裏熱滯未和。啾唧似痛。大便仍有積滯。
清裏極是。但半歲未啖穀食。胃弱易變驚症。少少與藥。

藿香梗
川連
黃芩
生白芍
淡竹葉
廣皮
滑石
炒查肉

胃不
余
形神衰弱。痕泄純白。而癰瘍瘡瘍。未罷。氣喘痰升。總是損極。今胃虛納減。倘內風掀動。驚立至。孰不知

因虛變病也。人參
炒梗米
茯神
炒廣皮

炒荷葉蒂

呂二十
疫中帶血。食已嘔吐。因驚。仆氣逆。令胃不和。與茵連溫膽湯。因年弱質怯。以金石斛代之。

溫營湯去甘草

加金石斛
薑汁

胃虛
氣逆

濕熱

某耽久嘔少食。人參

半夏 茯苓

廣皮

薑汁

久病
傷陰
未清滯

王歲久

瀉兼發瘡瘍。

是溼勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升。胃宜降之奇。

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

何十夏病入冬。仍腹痛下積。椎年不慎食物。腸胃屢滯。痢久陰傷。身熱發瘍。先與理陰。疎肺滯濁。

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

升麻

羌活

防風

羌活

熟地炭

當歸炭

山楂

炮薑

炙草

決明

麥芽

柴胡

某傷陰動風

伏邪經旬

發熱不解。唇焦舌渴。暮夜袖識不清。慮其邪陷心胞。有痙厥之變。

犀角

捲心竹葉

鮮石菖蒲

連翹

元參心

麥冬

浙生地

又化熱液枯

生地

竹葉心

丹皮

元參

麥冬

生白芍

吳久月伏邪。入春病自裏。裏邪原無發散之理。更悞於禁絕水穀。徒以芩連枳朴。希圖清火消食。以退其熱。殊不知胃汁再劫。肝風微動。變幻症候危疴。診視舌絳鼻乾黑燥。肌膚甲錯。乾燥渴欲飲水。心中反熱。柯一非肝腎陰液之盡。引水自救。風陽內燐。躁亂如狂。皆緣醫者未曾曉得溫邪從陰。裏熱為病。清熱必以存陰為務耳。今延及一月。五液告涸。病情未為穩當。所恃童真食穀多歲。錢氏謂幼科易虛易實。望其尚有生機而已。

阿膠 生地 天冬 川石斛 雞子黃 元參心

之元參心

真阿膠 真金汁 細生地 天冬 銀花露

又 胃未得穀。風陽再熾。入暮煩躁。防其復厥。

生地

白芍

麥冬

金汁

阿膠

牡蠣

金銀花露

又 神識昏迷。常欲煩躁。皆是陰液受傷。肝風不息。議歸陰和陽。

生地

牡蠣

麥冬

金汁

阿膠

牡蠣

金銀花露

又 腸中熱熾。神躁古乾。痰多咳嗆。皆火刑肺金。宜用紫雪丹一錢。

小兒癇症。屬本屬險。症十中每死二三。奈今之患者。十中常死六七。其故何也。蓋緣醫者不察病情。概以芩連鉤藤菖蒲橘紅等寒金石之藥投之。以冀清火降痰而已。此醫之不善治也。而最可惡者。尤在病家之父母。失於調治。有名為愛之。實以殺之之故。何也。小兒諸症。如發熱無汗。煩躁神昏譖語之項。或戰汗大汗將止之時。或嘔吐泄瀉之後。或痘瘡漸甦。或便久閉而遁然大便。或灌藥之後。斯時正元氣與病邪交戰之際。若能養得元氣一分。即退一分病邪。此際小兒必有昏昏欲睡。懶於言語。氣怯神弱。身不轉動。

之狀。此正當養其元神。冀其邪退正復。乃病家父母。偏於此際。張惶驚恐。因其不語而呼之喚之。因其鼾睡而頻叫醒之。因其不動而搖之拍之。或因微有昏譖。而父詳詰之。或急欲以湯飲進之。或屢問其痛癢之處。嘵嘵不已。使其無片刻安甯。如此必輕變為重。重變為死矣。更有豪富之家。延醫數人。問候者多人。房中聚集者多人。或互談病情病狀。反則多燃燈燭以照之。或對之哭泣不已。或信巫不信醫。祈禱疊興。舉家紛擾。此非愛之實以殺之也。試以大人之病情體貼之。抑好安然寂靜乎。抑好喧譁動擾乎。此理概可知也。予曾見一孩兒患暑溼初瘥。半月有餘。病勢甚重。醫者投以蒼朮白虎湯。夜半發汗。至寅時身體漸涼。冷汗不止。默默倦睡。口不肯言。氣息甚微。醫云六脈安靜。並不煩躁。此病退之象也。因戒其父母切勿擾動。直至申時汗止。聲出而病已霍然矣。可見大人與小兒諸病。總宜安然寂靜為主。其調養之法。有非筆墨所能盡者。惟在病家能細心體會。醫者能詳諄告。戒勿以余之言為迂拘。則幸甚。更有幼孩發熱昏迷。手足厥冷。竊絡阻塞。哭不出聲。藥難下咽。斯時惟有請善於推挾者。可使立時甦醒。然後再議用藥。至於治法。痼疾成本屬三症。與大方相類。茲不重贅。華岫雲

小兒無癆症不必另立一門
即癆屬亦僅病中之一症耳

(蟲)

陳氏濕傷脾胃失調。下注小腸。蟲從溺竅而出。糞瀉完穀。不可溫補。

黃柏 桂苓 猪苓 椋米 澤瀉 草薢

又 蟲自小便而出。經月瀉皆粘膩。及不欲食物。此非虛寒。皆溫蟲內蘊。運化失司。當苦藥勝溼。兼理幼稚疳積。苗連 黃柏 茅木 厚朴 澤瀉 槐角子 木通 使君子 淡竹葉 三服後續
進肥兒丸

龜殼溼熱生蟲。腹痛便溏。惡食。川連 胡連 生白芍 烏梅 枳實 川椒 炒楂 青皮 水法丸

許 腸有濕熱生蟲。用苦寒引導小腸。

苦棟皮 北秦皮 槐角子 胡粉 黃柏 牡蠣 生研末猪肚腸一條漂潔煮丸

此語亦通俗不可以爲難解
張子升溪云。小兒盜汗不須醫。以體屬純陽。汗乃陽泄故也。至於瘡多。溼熱浮腫。腹滿得攻下而消。此六腑以通為補也。其小腹痛。屢發亦由溼熱生蟲。當以酸苦泄熱。

川連 胡連 生白芍 雜肥皮
汪六缸滿時腫。瀉過白蟲。手足陽明熱甚。

川連 胡連 生白芍 雜肥皮 炒查肉 蘆薈 积寶 苦棟皮 烏梅肉 滋丸

槐角子 黃柏 檬子肉 生芽水 槐根皮 小川連 藥苓 炒地榆 茶餅為丸

蟲類雖多。其由皆有飲食停滯濕熱鬱化變而成者也。凡面色痿黃。飲食不為。肌膚起伏作痛聚散不定。痛止即能飲食者。皆有蟲精。或從嘔。或從小便。或從大便而出。治法當觀其微甚。若蟲勢駭急者。當用攻逐之劑。如黑豆殼榔榔大黃胡粉山楂枳术之類。蟲去則調其脾胃。緩者用酸苦泄熱躁溼。兼以相制相畏之品。如川連胡連蒼苔苦棟烏梅川椒雷丸蕪荑史君榧肉之類。脾弱者兼運其脾胃。滯者兼消其滯。蟲症治法大略如此。陸履安

案中所用諸方開載於後以便初學之士查閱

治蟲有緩急之法，其病熱甚，而日久不退者，當用清九等藥氣補兼清之。若病勢危急者，必另有峻厲之方，并奇藥秘方，可殺蟲去積，否則元氣消之，不可補救矣。

川芎○黃芪建中湯 即小建中湯加黃芪○皂莢丸 皂莢 密丸裹膏湯送○麥門冬湯 天冬 半夏
人參 甘草 大棗 穀米○草庵大棗湯肺湯 草庵 大棗○千金華蓋湯 草莖 沔仁 桃仁
桃仁 瓜瓣○瓜萎薤白白酒湯 瓜萎實 蕃白 白酒○赤石脂丸 蜀椒 馬頭 附子 炮薑 亦
石脂○附子粳米湯 附子 半夏 甘草 穀米 大棗○當歸生薑羊肉湯 當歸 生薑 羊肉 甘
遂半夏湯 甘遂 半夏 炙藥 甘草一本無○木防已湯 木防已 石膏 桂枝 人參○小半夏湯
半夏 生薑 外臺茯苓散 茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮 生薑○桂苓五味甘草湯 桂枝
茯苓 五味 甘草○越婢湯 麻黃 石膏 甘草 生薑 大棗 防已茯苓湯 防已 黃芪 桂枝
當湯建中湯 即小建中湯加當歸○甘草小麥大棗湯 甘草 小麥 大棗○旋覆花湯 旋覆花 蔥
新絳○腎氣丸 與崔氏八味丸同

右金匱要略中方

六味地黃丸 即八味去桂附 煎服名六味地黃湯○都氣丸 即六味丸加北味 再加附子名附都氣
丸○還少丹 熟地 山藥 牛膝 桑杞 山萸 茯苓 遠志 杜仲 五味子 肚實 小茴 巴戟
蓆蓉 石菖蒲 丹溪滋陰大補丸 即還少丹去楮實○黑地黃丸 蒼朮 熟地 五味 乾薑 虎
潛丸 熟地 虎胫骨 跪板 黃柏 知母 琉陽 當歸 牛膝 白芍 陳皮 羊肉○天真丸
精羊肉 肉蓆蓉 山萸 當歸 天冬 黃芪 人參 白朮○三才湯 天冬 熟地 人參○大造
丸 紫河車 跪板 人參 熟地 天冬 麦冬 黃柏 牛膝 杜仲○人參固本丸 人參 天冬
麥冬 生地 熟地○天王補心丸 生地 人參 元參 丹參 藤仁 遠志 茯神 相子仁 天冬
麥冬 當歸 五味 桔梗 石菖蒲 石砂○孔聖枕中丹 龍骨 跪板 遠志 菖蒲○天補陰丸
黃柏 知母 熟地 跪板 肚脊髓○滋腎丸 黃柏 知母 肉桂○斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 茄

絲子 柏子仁 玉貞丸 硫黃 硝石 石膏 半夏 茍汁糊丸○宋復丹 玄精石 研黃

硝石
黑鉛 硫黃 此方藥味尚多○二至丸

冬青
玄精石

五靈脂

青皮

陳皮 半硫丸 半夏 硫黃○黑錫丹 黑鉛

硫黃○川芎○川芎余調散

川芎

六神散

冬青

子 旱蓮草○參苓白朮散 人參 茯苓 白朮

甘草 山藥 扁豆 茯仁 建蓮 砂仁 桔梗

升麻

川芎

即四君

冬青

陳皮○玉屏風散

黃芪 防風 白朮○四君子湯 人參 茯苓 白朮

甘草○六君子湯

川芎

即四君

冬青

子 加陳皮半夏○異功散

即四君子湯加陳皮○四獸飲

即六君子湯加烏梅草果生薑大棗○六神散

川芎

即四君子湯加山藥扁豆薏米煎○補中益氣湯

冬青

人參 茯苓 黃芪 白朮

甘草 山藥 扁豆 茯仁 建蓮 砂仁 桔梗

升麻

川芎

即四君子湯

冬青

柴胡 生薑 大棗○三拗湯

麻黃 杏仁 甘草○葱豉湯

葱白 淡豆豉○川芎余調散

川芎

即四君子湯

冬青

薄荷 荆芥 茉蒼

白朮 甘草 防風 細辛

為末茶調服○霍天膏 牛肉熬膏加麵○防風通聖

川芎

即溫膽湯加人參遠志棗仁熟地○逍遙散

冬青

散 防風

荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎

當歸 白芍 白朮 山梔 大黃

芒硝

黃芩 石

冬青

膏 桔梗

甘草 滑石 薑○溫膽湯

陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳實 竹茹○十味溫膽湯

川芎

即溫膽湯加人參遠志棗仁熟地○逍遙散

冬青

本方加丹皮山梔名加味道逍散○六和湯

砂仁 藥香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜

人參

川芎

即溫膽湯加人參遠志棗仁熟地○逍遙散

冬青

赤芍 白朮

甘草 薑○藿香正氣散

藿香 紫蘇 白朮 大腹皮 茯苓 白朮 陳皮

川芎

即溫膽湯加人參遠志棗仁熟地○逍遙散

冬青

半夏曲

厚朴 桔梗 甘草 薑○駐車丸

黃連 阿膠 乾薑

當歸○越鞠丸

香附 蒼

川芎

尤 川芎

神曲 山梔○四物湯

生地 當歸 白芍 川芎○張子和玉燭散

歸尾

生地 川芎

即理中湯加附子○理中安丸

肉桂 五味

遠志 陳皮 加薑棗○犀角地黃湯

犀角 生地 白芍 丹皮○地黃飲子

熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

巴戟

山萸 附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲

遠志 參養榮湯 人參

川芎 白朮 甘草

當歸 白芍 熟地

黃芪

肉桂 五味

遠志 陳皮 加薑棗○犀角地黃湯

犀角 生地 白芍 丹皮○地黃飲子

熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

巴戟

山萸 附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲

遠志 參養榮湯 人參

川芎 白朮 甘草

當歸 白芍 熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

巴戟

山萸 附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲

遠志 參養榮湯 人參

川芎 白朮 甘草

當歸 白芍 熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

巴戟

山萸 附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲

遠志 參養榮湯 人參

川芎 白朮 甘草

當歸 白芍 熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

巴戟

山萸 附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲

遠志 參養榮湯 人參

川芎 白朮 甘草

當歸 白芍 熟地

黃芪

即理中湯去甘草加茯

荸川椒烏梅○連理湯 即理中湯加黃連茯苓○治中湯 即理中湯加青皮陳皮○四神丸 破故紙
 五味 肉蓴 吳萸○清暑益氣湯 人參 黃芪 白朮 蒼朮 青皮 陳皮 神曲 甘草 麥冬
 五味 當歸 黃柏 澤瀉 升麻 葛根 加葛根○生脈散 人參 參冬 五味○益元散 滑石
 甘草 長砂○大順散 乾薑 肉桂 杏仁 甘草○四苓散 猪苓 茯苓 澤瀉 白朮○桂苓丸
 肉桂 茯苓 蜜丸○胃苓散 即平胃散合五苓散○加味腎氣丸 即六味丸加附子肉桂車前牛膝○
 濱川散 黑牽牛 大黃 甘遂 芒硝 郁李仁 輕粉○草薢分清飲 川萆薢 石菖蒲 烏藥 益
 智仁 甘草梢 食鹽 茯苓○禹功散 黑牽牛 茵香 薑汁調 或加木香 瓊玉膏 地黃 茯苓
 人參 白蜜 腰仙加琥珀沉香○通幽湯 當歸 升麻 桃仁 紅花 甘草 生地 熟地 白朮
 加蒼朮湯 即白虎湯加蒼朮○涼膈散 連翹 大黃 芒硝 甘草 山梔 黃芩 薄荷○當歸龍脣
 丸○當歸 龍膽草 山梔 黃連 黃柏 黃芩 大黃 青黛 薑香 木香 腐香 蜜丸薑湯下○
 左金丸 苗連 吳萸 水泛丸○戊己湯 黃連 吳萸 白芍○甘露散 生地 熟地 天冬 麥冬
 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 杭杞葉 甘草 一方加桂苓名桂苓甘露飲 河間桂苓甘露散滑石膏
 膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉猪苓桂肉每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加入參乾葛藿香木香亦
 名桂苓甘露散○瀉白散 桑皮 地骨皮 甘草 穰米○導赤散 生地 木通 甘草梢 淡竹葉
 藜蘆 黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 元參 甘草 犀角 犀牛角 沉香 木香 丁
 香 朴硝 硝石 長砂 蘭香○清骨散 銀柴胡 胡黃連 泰丸 鱷甲 地骨皮 青蒿 知母
 甘草○陳湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 生薑○二賢散 陳皮 甘草○控涎丹 甘遂 大戟
 白芥子○滾痰丸 青礞石 沉香 大黃 黃芩 煅硝 白金丸 白礬 鐘金○平胃散 蒼朮 厚
 朴 陳皮 甘草○橘半枳尤丸 白朮 枳實 橘皮 半夏 保和丸 山楂 神曲 茯苓 半夏
 陳皮 茴子 連翹○水陸二仙丹 金櫻膏 茂實○桑螵蛸散 人參 茯神 遠志 石菖蒲 桑螵

娟 龍骨 虬板 當歸○蠅礬丸 黃蠟○膠父四物湯 即四物湯加阿膠父葉○柏子仁丸
柏仁 牛膝 卷柏 澤蘭 繢斷 熟地 右汪訥菴醫方集解中方所載古方○補陰益氣煎 人參
當歸 山藥 熟地 陳皮 炙草 升麻 柴胡 生薑○兩儀膏 人參 熟地 救膏白蜜收○貞元
飲 孰地 炙草 當歸○王女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝○理陰煎 熟地 當歸 炙甘
草 乾薑 或加肉桂○何人飲 何首烏 人參 當歸 陳皮 煙薑○參附湯 人參 製附子 茯
附湯 黃芪 製附子 加生薑○青囊斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 范絲子 熟地 茯苓
補骨脂○斑龍二至百補丸 鹿角 黃精 杞子 熟地 范絲子 金櫻子 天冬 麥冬 牛膝 桃
實子 龍眼肉 已上藥同鹿角熬成膏加入煉蜜調入後藥末杵合為丸 鹿角霜 人參 黃芪 茉實
茯苓 山藥 知母 熟地 茄肉 五味子 十味為細末和前膏為丸○糯米半夏湯 粳米 半夏
錢氏益黃散 陳皮 青皮 詞子肉 炙草 丁香○和中丸 白朮 厚朴 陳皮 半夏 檀櫟 枳
實 炙草 木香○東垣和中丸 人參 白朮 炮薑 炙草 陳皮 木朮○神保丸 木香 胡椒
乾竭 巴豆不成方○子和導水丸 大黃 黃芩 滑石 黑丑○脾約丸 大黃 杏仁 厚朴 麻仁
枳實○華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤苓 檔紅 甘草○石刻安腎丸 附子 肉桂 川
烏 川椒 巴戟 兔絲子 破故 赤石脂 遠志 茯苓 茄木 山茱萸 杜仲 胡蘆巴
石斛 蕤子 小茴 蔴蓉 麋草 柏子仁 川棟子 青鹽 山藥○王荊公妙香散 人參 龍骨
益智仁 茯苓 茯神 遠志 甘草 硃砂○豬肚丸 白朮 苦參 牡蠣 猪肚一具 劉松石方
威喜丸 茯苓 猪苓 青蠟○交加散 生地 生薑○烏鰡魚骨丸 烏鰡魚骨 薑如即茵草根
雀卵 鮑魚湯下○三豆散 大黑豆 赤小豆 緣豆 甘草水煮 萬氏牛黃清心丸 蕁連 黃芩
山梔 蕃螽 長砂 西牛黃

已上四部書。諒業醫者必備。故但開藥品。其分量炮製加減服法。以及治症。俱未載明。井內有峻利之方。所服不過幾釐幾粒者。須按方查閱。切勿草率臆度。且不遵古法。不惟無效。反有遺悞。慎之。

清燥救肺湯

經霜桑葉錢三

杏仁七分去皮

麥冬錢二分

石膏二錢

人參分

阿膠八錢

胡麻炒一錢

甘草一錢

枇杷葉毛刷一片去

水一碗煎六分食遠服

進退黃連湯

川黃連錢半錢

乾薑炮錢

人參人乳半錢

桂枝錢

半夏錢半錢

大棗

右進法用本方土味

不製水三茶鐘前減半溫服。退法桂枝不用黃連減半或加肉桂五分如上製煎服。

當歸桂枝湯

即桂枝加當歸

參歸桂枝湯

即桂枝湯加人參黃氏

人參建中湯

參芪建中湯

即建中湯加入參黃氏

歸芪建中湯

吳萸理中湯

即理中湯加吳萸

人參溫胆湯

黃連溫膽湯

即溫膽湯加黃連

星附六君子湯

生脈四君子湯

即生脈散合四君子湯

生脈六味湯

養榮湯

即人參養榮湯

六神湯

即陳擇六神散即四君子加山藥扁豆

戊己湯

即四君子湯加陳皮白芍

與前戊己湯各別

生脈尤桂湯

只此四味

五子五皮湯

即五皮飲加杏仁蘇子葶苈白芥子橘子

加桂理中湯

即理中湯加桂

子和桂苓湯

即子和桂苓飲

資生丸 人參

白朮土炒 没仁各三

山楂肉

神曲

橘紅各二

扁豆

蓮肉 厚朴各一

山藥

淡芩

麥芽 茯苓各兩

桔梗

甘草炙

藿香各五

澤瀉

川黃連

白芷蔻各三

鐵半

右製為末煉蜜丸每丸重一錢

每服一丸。臘後二丸細嚼淡鹽湯下

聚精丸

黃魚鱠膠蛤粉炒碎

炒乾蒸熟湯煮一炷香

右為末煉蜜丸每服八十九白湯下

禹餘糧丸

蛇含石

本草名蛇黃大者三兩醋燉透

禹餘糧石

者三兩醋燉透

鈿砂

五兩醋燉透

三物各研極細配入下項

藥

羌活

川芎各五錢

三棱

蓬朮

白朮

白蒺藜

陳皮

青皮

木香

大茴

炒

牛膝

當歸

炮薑

禹餘糧丸

禹餘糧石

三兩醋燉透

十九最忌鹽一毫不可入口否則病發愈甚日三服兼用溫和調補藥助之

附子蓬朮青皮加茯苓藥氏名鍼砂丸

小溫中丸

白朮

二兩

茯苓

一兩

陳皮

熟半夏

一兩

甘草

三錢

神曲

一兩

生香附

半兩

苦參

五錢

黃

連錢

禹餘糧丸

右製為末入前約拌勻神曲糊為丸如桐子大食前或溫酒或白湯送下三十九至五

連錢

鍼砂

醋炒紅研如

為末

醋水各半打神曲糊為丸桐子大每服七

八十九白朮六錢

陳皮一錢

生薑

一片煎湯下虛甚者加人參一錢本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕服至六七兩小便長甚者服一

助小便始長

繆仲濬脾腎雙補丸

人參

蓮肉

炒

山萸肉

山藥

炒各

五味子

蜜炙絲子各一兩

橘紅

砂仁

炒各六兩

車前子

洗巴戟肉

甘草汁煮各十二兩

肉豆蔻

十兩

補骨脂

鹽水浸二日炒一助

洗巴戟肉

甘草汁煮各十二兩

肉豆蔻

兩半

補骨脂

日炒一助

肉豆蔻巴戟補骨脂忌羊肉羊血

阿魏丸

阿魏

錢

鱉甲

兩

黃芪

二兩

廣皮

枳實

柴胡

白朮

各一

青皮

草果

黃芩

當歸

水法丸

淡芩各八

白豆蔻

錢

山楂

一兩

神曲

兩

延胡

水法丸

又方

阿魏

連翹

胡黃連

山楂

青皮

山楂

皮

山楂

皮

山楂

皮

山楂

皮

山楂

皮

山楂

更衣丸

硃砂

五錢研

蘆薈

七錢研

好酒

和九每服一錢

二分

濟生腎氣丸

即八味丸加車前半

膝葉氏用

茯苓八兩

為君熟地只用四兩

又薛氏濟生丸分量不同

海粉丸

蛤粉

亦真貴

杏仁

兩各一

廣皮

紫蘇

兩各二

白朮

土貝母

兩各四

紫苑

兩

木香

五錢

燒蜜

用葱白汁九

三棱

蓬朮各一

乾薑

大茴

木香

七兩

肉桂

五錢

用葱白汁九

又方 人參 阿膠 川芎 寶歸 厚朴 用葱白汁丸

安胃丸 烏梅 川椒 附子 桂枝 乾薑

各一兩

黃柏二兩

當連五錢

川棟子肉兩

白芍兩

人參者可加如右

巴豆三百十五粒去皮

再用川椒烏梅湯法九

一方無廣皮有當歸細半

妙香丸 巴豆心膜炒熟研如粉

牛黃研龍腦研麝香研

輕粉研各三兩

硃砂九兩

研細砂九兩

真金箔九十

右各研細黃蠅六兩入白蜜三分同煉丸為丸每兩作三十九

海蛤丸 天冬 小蘿蔔霜 海浮石

蛤粉 風化硝

桔梗 檉紅

香附 竹沥

薑汁 蜜丸

蜜丸

局方龍鬚丸 即當歸龍鬚丸 白芍參丸

即一味用山梔湯製為丸用大豆黃卷湯送下

禹餘糧石脂丸 即二味為丸○橘尤丸

即二味為杏真武丸

即真武湯作丸

歸脾丸 即歸脾湯料作丸 桑麻丸 桑葉

黑芝麻

蜜丸 滋川丸

即滌川散

四物丸 即禹功散 生脈六味丸

即六味丸合生脈散

肥兒丸 景岳全書中有四方

益母丸 比方不一總用益母草膏為君有加四物者

附山楂者有去山楂加阿膠者有加八珍香附砂仁

肉者

東垣清心涼膈散 連翹 薄荷 黃芩 山梔 桔梗

甘草 竹葉 水煎服

金鈴子散 金鈴子

即川棟子主核一兩

延胡索兩

為末每服三錢酒調服

水煎服亦可

茺蔚散 杜牛膝根汁

二三兩古方本用茺蔚草汁今人當門子麝香研

一分右將麝香入汁中和勻隔湯燉溫服

葛可久花蕊石散 花蕊石

燬存性研如粉以童便一盞男人入酒少許女人入醋少許煎溫食後調服三

錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後用獨活湯補之

歸芍異功散 即異功散加當歸芍

雞鳴散 牛蒡子

炒香研細臨服加入雄雞冠血五匙狀元

紅酒少許調引以炒荆芥三分煎湯送下

通聖散 即防風通聖散 歸芪異功散

即異功散加當歸黃芪

香砂異功散 即異功散加木香砂仁 正氣散 即藿香正氣散

王壺丹 即扁鵲玉壺丸 治命門火衰。陽氣暴絕。寒水脹。却有神效。古吳王晉三先生得異授製法。當宗之。好硫黃八兩。配真麻油八兩。以硫打碎入冷油內。燉爐上炭火宜微勿烈。以桑條徐調候。硫溶盡。即傾入大水內急攏去上面油水。其色如金。取缺底淨硫。稱見若干兩。仍配香蘇油若干兩。照前火候。再溶再傾。連前共三轉。第四轉用真棉花核油配硫若干兩。照前火候。再溶再傾。入大水內。攏去上面油水。其色如綠。第五轉用肥皂四兩。水中同煮六時。第六轉用皂莢四兩。水中同煮六時。拔淨製硫之油。攏去其水。其色如硫火之紫。第七轉用爐中炭灰淋蘸水製六時。第八轉用水豆腐製六時。拔淨皂莢之性。第九轉用田字草水(芥稻田中其葉如田字八九月採搗汁和水煮六時。臨用研如飛麪。凡淨硫一兩。乳炒糯米粉二兩。或水法。或溼搗為丸。每服以硫三分為准。漸加至一錢止。開水溫下。

回生丹 大黑豆(三升用水浸取殼用絹袋盛殼同豆熟去豆不用將殼晒乾其汁留用) 紅花(三兩炒黃色入好酒四兩煎十餘滾去渣存汁聽用) 蘇木(三兩河水五錢) 地榆(各三兩) 橘紅(白芍) 巍活(炙草) 五靈脂(山萸) 三棱(各五錢) 良薑(木香各四錢) 青皮(木瓜) 白术(青皮) 右將大黃末一觔入淨鍋下。醋三觔微火熬用長木筋不住手攪之。將成膏再加醋三觔熬之。又加醋三觔次第加畢。然後下黑豆汁三碗次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏。取入瓦盆盛之。大黃鍋焦亦鏟下入後約同磨。

人參(二兩) 川芎(當歸) 熟地(芍苓) 香附(延胡) 蒼朮(米泔水五錢炒) 桃仁(蒲黃略一兩) 烏藥(二兩半) 牛膝(地榆) 橘紅(白芍) 巍活(炙草) 五靈脂(山萸) 三棱(各五錢) 良薑(木香各四錢) 青皮(木瓜) 白术(青皮) 白术(白术)

右三十味并前黑豆殼共晒乾為細末入石臼內下大黃膏再下煉熟蜜一觔共搗千槌為丸每丸重二錢。七分靜室陰乾二十餘日不可烘晒乾後止重二錢外以蠟作殼護之用時去蠟調服一方無益母草馬鞭草秋葵子二味并不用蜜醋止用八碗。

至寶丹 犀角(錢) 研水 雄黃(研水) 茄珀(研水) 水安息香(研水)

明以前無
水安息香
可救嘔

水安息香

一兩無灰酒熬成膏如
無以早安息香代之

西牛

黃錢 麻香一錢 龍腦錢 金銀箔各五片 為極細末將安息膏重湯煮入諸藥搜和分作百丸蠟護臨服
剖用參湯化下

紫金丹 牛黃 水片 狗寶 鴉片 分六廣木香二兩為末人乳丸重五釐金箔為衣
震靈丹 禹糧石 赤石脂 紫石英 代赭石各四兩上四味作小塊入淨鍋中鹽泥封固候乾用炭十觔煅
炭盡為度入地出火氣必得二晝夜研細末

乳香二兩 没藥二兩 砂砂水飛一兩

五靈脂二兩

為末同前四味和勻糯米飯丸宜堅細

四順清涼飲 大黃 當歸 茜草 甘草 各等分水煎服

露蓋飲 人參 生姜 水煎露一宿空心隔湯燉溫服 子和桂苓飲 即桂苓甘露飲

七香餅 香附二錢丁香皮一兩 甘松八錢 益智仁六錢 砂仁二錢 蓬朮二錢 廣皮

阿膠雞子黃湯

阿膠湯非黃連

河間中滿分消湯 清阿膠丸 蘭瘤丹 香連飲 已上五方候考

按先生雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減之妙如復脈建中瀉心等類至用牡蠣澤瀉散、
取此二味故案中有但書用某方而不開明約味者決非盡用板方必有加減之處觀者以意會之可也

論中所述諸方開列於後以便查閱

麻黃人參芍藥湯 桂枝 麻黃 黃芪 炙草 白芍 人參 麥冬 五味 當歸

甘草湯 生甘草 生姜甘草湯 生姜 人參 甘草 大棗大棗

調中益氣湯 即補中益氣湯去當歸白朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 羌活 防風 獨活 白芍 磨廣皮四錢黃芪二兩人參 半夏 炙甘草五錢柴胡

黃連錢二錢 白朮 茯苓 濤瀉錢三錢每服三錢加薑東煎

桂枝黃連湯 即仲景黃連湯 黃連 桂枝 乾薑 人參 半夏 炙草

溫脾湯 乾薑 肉桂心 熟附子 炙草 柴胡 厚朴錢二錢 大黃錢四錢 用一兩水煎服

五仁丸

火麻仁

郁李仁

柏子仁

松子仁

桃仁

指迷丸

茯苓丸

即指迷茯苓丸

清六丸

滑石

甘草

紅曲

蘇合香丸

蘇合香

安息香

犀角

冰片

射香

香附

木香

薰陸香

沉香

丁香

白朮

煉蜜丸

硃砂為衣外作蠟丸

五味

水銀

黑鉛

五癇丸

硃砂

真珠

雄黃

生地

當歸

甘草

硃砂安神丸

硃砂

黃連

棗仁

遠志

益智仁

牡蠣

硃砂

棗肉丸

人參丸

人參

茯苓

建蓮

酒糊丸或加五味子

杜仲

茯菟丸

茯苓

菟絲子

蓮肉

山藥

炙草

五味

白石脂

杜仲

濟生固精丸

杜蠅

菟絲子

韭子

龍骨

北五味

桑螵蛸

茯苓

杜仲

家韭子丸

家韭子

鹿茸

肉蓯蓉

牛膝

菟絲子

熟地

當歸

巴戟

石斛

肉桂

炮薑

烏雞煎丸

烏骨雄雞一隻

烏藥

蛇床子

丹皮

白朮

人參

黃芪各一茅尤

米泔浸半海桐皮

白芍

肉桂

附子炮去川烏

炮殺

陳皮

熟地洗培

延胡

木香

肉荳草

右細剉以烏雞湯

去毛及腸雜將上藥納雞肚內用新磁瓶

以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單盛

培乾為末

煉蜜和丸如桐子大

每服三十九隨症用湯引下

安蛇丸

即理中安蛇丸

侯氏黑散

菊花

白朮

防風

桔梗

黃芩

細辛

茯苓

杜蠅

人參

礬石

當歸

乾

川芎

桂枝

為散酒服

雞金散

雞內金

沉香

砂仁

陳香櫟皮

天水散

即六一散

本草方神效散

白海浮石

蛤粉

蟬蛻

為細末用大鯽魚膽七箇調服三錢

人參敗毒散

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

桔梗

茯苓

甘草

枳殼

薄荷

生薑

金盞散

瓜蒂

赤小豆

香豉

蒼耳散

白芷

薄荷

辛夷

蒼耳

為木通茶湯調服

聖濟透闕散

雄黃

猪牙皂莢

等分研末先含水一口用藥吹鼻即吐去水

備急如意

散有白藜等分

花蕊石散

花蕊石四兩研黃

兩研細泥封煅赤服一錢重便下

失笑散

蒲黃

五靈脂

五積散

白芷

陳皮

厚朴

當歸

川芎

茯苓

桔梗

蒼朮

芍藥

枳殼

半夏

麻黃

乾薑

肉桂

甘草

薑

葱

牛黃膏

牛黃二錢

硃砂

鬱金

丹皮

鐵三

水片

錢甘草錢

煉蜜丸如桐子

服一丸新水化下

三才封髓丹

天冬

熟地

人參

黃柏

砂仁

甘草

一死丹

河車

人乳粉四兩

秋石四兩

紅鉛五錢

蜜丸每丸重七釐

琥珀黑龍丹

龍丹即黑

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地各二兩

剉碎入砂鍋內

百草霜

雨硫黃

乳香鐵各二

琥珀

花蕊石各一錢

右為細末

醋糊丸如彈子大

每用一二丸炭

火煅紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌

左歸散

熟地

山藥

枸杞

炙草

茯苓

山萸

右歸飲

即左歸飲去茯苓加杜仲肉桂附子

人參

白朮

炮薑

扁豆

當歸

陳皮

炙草

陳皮

溫胃散

熟地

茯苓

扁豆

炮薑

丁香

藿香

炙草

陳皮

陳皮

大和中散

陳皮

枳實

砂仁

麥芽

厚朴

山楂

澤瀉

四柱飲 人參 附子 乾冬 木香 六柱飲 即四柱飲加肉豆蔻訶子

五磨飲子 烏藥 沉香 檀榔 枳實 木香 白酒磨服

生鐵落散 生鐵落 清水浸研澄飲水

普濟消毒飲 黃芩 黃連 陳皮 甘草 元參 連翹 板藍根 牛蒡 薄荷 疊蚕 升麻 柴胡

桔梗 馬勃 或加入參 便閉加大黃

清心蓮子飲 石蓮肉 人參 黃芪 荸苓 柴胡 黃芩 地骨皮 麥冬 車前 甘草

七福飲 人參 熟地 當歸 白朮

胃鬱煎 熟地 白朮 山藥 扁豆 炮薑 吳萸 炙草

二陰煎 生地 麥冬 菓苓 白朮 山藥 元參 茯苓

秘元煎 人參 菓苓 白朮 炙草 茄仁 山藥 五味 遠志 金櫻子

固陰煎 人參 熟地 白芍 山藥 川斷 甘草

保陰煎 生地 熟地 白芍 山藥 建蓮肉 遠志

壽脾煎 人參 白朮 炒草 當歸 山藥 茄仁 炮薑

玉鑰匙 馬牙硝半 硼砂五 蒜黃一兩炒 清酒十爵沃之溫服

種福堂公選溫熱論醫案

(溫熱論)

溫邪上受。首先犯肺。逆傳心胞。肺主氣屬衛。心主血屬營。辨營衛氣血。雖與傷寒同。若論治法。則與傷寒大異。蓋傷寒之邪。留戀在表。然後化熱入裏。溫邪則執變最速。未傳心胞。邪尚在肺。肺主氣。其合皮毛。故云在表。在表初呈涼輕劑。挾風則加入薄荷牛蒡之屬。挾濕則蘆根滑石之流。或透濕於熱外。或滲濕於熱下。不與熱相搏。勢而入故曰。上受但春。陰遇春時。溫冬時火。從口鼻而入。

溫氣而發
非火上炎
之邪也。則
此所論溫
邪乃是溫
風溫溫之
發於著木
之初者也。

必於矣。不爾。風被溫熱而燥生。清數必乾。謂水主之氣不能上榮。兩陽相劫也。溫與溫合。蒙蔽而蒙瘧於上。清竅為之壅塞。濁邪害清也。其病有類傷寒。其驗之之法。傷寒多有變症。溫熱雖久在一經不移。以此為辨。前言平涼散風。甘淡驅溼。若病仍不解。是漸入營也。營分受熱。則血波受劫。心神不安。夜甚無寐。或班點隱現。即撤去氣藥。如從風熱陷入者。用犀角竹葉等屬。如從溼熱陷入者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁。大便不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代之。急退斑為要。若斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒。重則如玉玄煎。輕則如梨皮蔗漿之類。或其人腎水素虧。雖未及下焦。先自傍徨矣。必驗之於舌。如甘寒之中。加入鹹寒。務在先安未受邪之地。恐其陷入易易耳。若其邪始終在氣分流連者。可冀其戰汗透邪。法宜益胃。令水與汗併熱。達腠開邪。從汗出。解後胃氣空虛。當膚冷一晝夜。待氣還自溫暖如常矣。益戰汗而解邪。退正虛陽。從寒泄。故漸膚冷。未必即成脫症。此時宜令病者安舒靜卧。以養陽氣來復。旁人切勿驚惶。頻頻呼喚。擾其元神。使其煩躁。但診其脈若虛軟和緩。雖倦卧不語。汗出膚冷。却非脫症。若脈急疾。躁擾不卧。膚汗大出。便為氣脫之症矣。更有邪盛正虛。不能一戰而解。停一二日再戰汗而愈者。不可不知。再論氣病。有不傳血分。而邪留三焦。亦如傷寒中少陽病也。微則和解表裏之半。此則分消上下之勢。隨症變法。如近時杏朴苓等類。或如溫胆湯之走泄。因其仍在氣分。猶可望其戰汗之門戶。轉瘡之機枯。大凡看法。衛之後方言氣營之後方言血。在衛汗之可也。到氣纔可清氣入營。猶可透勢轉氣。如犀角芝參羚羊等物。入血就恐耗血動血。直須涼血散血。如生地丹皮阿膠赤芍等物。否則前後不循緩急之法。慮其動手便錯。反至慌張矣。且吾吳溼邪害人最廣。如面白者。須要顧其陽氣溼勝則陽微也。法應清涼。然到十分之六七。即不可過於寒涼。恐成功反棄。何以故耶。溼熱一去。陽息亦衰微也。面色蒼者。須要顧其津液清涼。到十分之六七。往往熱減身寒者。不可就云虛寒。而投補劑。恐爐煙雖灰。中有火也。須細察精詳。方少少與之。慎不可真辛而往也。又有酒客裡溼毒盛。外邪入裡。裡溼為合。在陽旺之軀。胃溼恒多。在陰盛之體。脾溼亦不少。然其化熱則一。熱病救陰則易。通陽最難。救陰不在血而在津與汗。通陽不在溫而在利小便。然較之雜症。則有不同也。

辛涼開肺
之用。味甘
辛溫也。

再論三焦。不得從外解。必致成裡結。裡結於何。在陽明與胃腸也。亦須用下法。不可以氣血之分。就不可下也。但傷寒熱邪在裡。却燼津液下之而猛。此多濕邪內搏。下之宜輕。傷寒大便溏為邪已盡。不可再下。濕濕病大便溏為邪未盡。必大便硬。慎不可再攻也。以屎燥為無濕矣。再入之體。脫在腹上。其地位處於中。按之痛。或自痛。或痞脹。當用苦泄。以其入腹近也。必驗之於舌。或黃或濁。可與小陷胸湯。或瀉心湯。隨症治之。或白不燥。或黃白相兼。或灰白不渴。慎不可亂投苦泄。其中有外邪未解。裡先結者。或邪鬱未伸。或素屬中冷者。雖有脫中病痛。宜從開泄。宣通氣滯。以達歸於肺。如近俗之杏蔻橘桔等。是輕苦微辛。具流動之品可耳。

再前云。舌黃或濁。須要有地之黃。若光滑者。乃無形溼熱。中已虛象。大忌前法。其膍以上為大腹。或滿或脹。或痛。此必邪已入裡矣。表症必無。或十之存一。亦要驗之於舌。或黃其或如沉杳色。或如灰黃色。或者黃色。或中有斷紋。皆當丁之。如小承氣湯。用枳榔青皮枳實玄明粉生首烏等。若未現此等舌。不宜用此等法。恐其中有溼聚太陰為滿。或寒溼錯雜為痛。或氣壅為脹。又當以別法治之。

再黃胎不甚厚而滑者。熱未傷津。猶可清熱透表。若雖薄而乾者。邪雖去而津受傷也。苦重之藥當禁。宜甘寒輕劑可也。

再論其孰傳營。舌色必絳。深紅色也。初傳絳色中兼黃白色。此氣分之邪未盡也。泄衛透管。兩和可也。純絳鮮澤者。胞絡受病也。宜犀角鮮生地。連翹鬱金石菖蒲等。延之數日。或平素心虛有痰。外熱一陷。裡絡就開。非菖蒲鬱金等所能開。須用牛黃丸。生寶丹之類。以開其閉。恐其昏厥為痙也。

再色絳而舌中心乾者。乃心胃火燔。却燼津液。即黃連石膏亦可加入。若煩渴煩熱。舌心乾。四邊色紅。中心或黃或白者。此非血分也。乃上焦氣熱。燼津急。用涼膈散。散其無形之熱。再看其後轉變可也。慎勿用血藥。以滋膩難散。至舌絳。望之若乾。半柵之原有津液。此津虧溼熱。蕙萎。將成瘡瘍蒙心胞也。

再有熱傳營。其人素有瘀傷宿血。在胸膈中。挾熱而搏。其舌色必紫而暗。柵之溼。當加入散血之品。如琥珀丹。參桃仁丹皮等。不圖。瘀血與熱為伍。阻遏止氣。遂變如狂發狂之症。若紫而腫大者。乃酒毒衝心。若紫而乾

晦者。腎肝色泛也。難治。舌色絳而上有粘膩似苔。非苔者。中挾機濁之氣。急加芳薑逐之。舌絳若伸出口而抵齒難驟伸者。痰阻舌根有內風也。舌絳而光亮。胃陰亡也。急用甘涼濡潤之品。若舌絳而乾燥者。火邪劫營。涼血清火為要。舌絳而有碎點白黃者。當生疳也。大紅點者。熱毒乘心也。用黃連金汁。其有雖絳而不鮮。乾枯而萎者。此腎陰涸急以阿膠雞子黃地黃天冬等救之。緩則恐涸極而無救也。其有舌獨中心絳乾者。此胃熱心營受灼也。當於清胃方中加入清心之品。否則延及於尖。為津乾大盛。舌尖絳獨乾。此心火上炎。用導赤散瀉其腑。

再舌胎白厚而乾燥者。此胃燥氣傷也。當歸藥中加甘草。令甘守津還之意。舌白而薄者。外感風寒也。當疏散之。若白乾薄者。肺津傷也。加麥冬花露蘆根汁等。輕清之品為上者上之也。若白胎絳底者。溼遏熱伏也。當先泄溼透熱。防其就乾也。勿憂之。再從裡透於外。則變潤矣。初病舌就乾。神不昏者。急養正微。加透邪之藥。若神已昏。其內陷矣。不可救藥。又不拘何色舌。上生芒刺者。皆是上焦熱極也。當用青布拭。令薄荷水揩之。即去者輕。旋即生者險矣。舌胎不燥。自覺悶極者。屬脾溼盛也。或有傷痕血跡者。必問曾輕搔挖否。不可以有血而便為枯症。仍從溼治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾溼胃熱鬱極化風。而毒延口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。

再舌上白苔粘膩。吐出濁厚涎沫者。口必酣味也。為脾虛病。乃溼熱氣聚。與穀氣相搏。土有餘也。盈滿則上泛。當用醒頭草。芳香半散以逐之。則退。若舌上苔加鹹者。胃中宿滯挾濁穢鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從募原達出矣。

若舌無胎。而有如烟煤隱隱者。不渴肢寒。知脾陰病。如口渴煩熱。平時胃燥舌也。不可攻之。若燥者。甘寒益胃。若潤者。甘溫扶中。此何故。外露而裡無也。

黑而乾者。津枯火熾。急急瀉南補北。若燥而中心厚痞者。上燥水竭。急以鹹苦下之。

舌淡紅無色者。或乾而色不榮者。當是胃津傷而氣無化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。若色白如粉而滑。四邊色紫綠者。溫疫病初入募原。未歸胃腑。急急透解。莫待傳陷而入為險惡之病。且見此古者。病必見凶。須要小心。凡癥疹初見。須用紙燃照看。胸背兩脇點大而在皮膚之上者為癥。或雲頭隱隱。或瑣碎小粒者為疹。又宜見而不宜見多。按方書謂癥色紅者屬胃熱。紫者熱極。黑者胃爛。然亦必看外症所合。方可斷之。然而春夏之間。溼病俱發。疹為甚。且其苗要辨。如淡紅色。四肢清口不渴。脈不洪數。非虛班即陰班。或胸微見數點。面赤足冷。或下利清穀。此陰盛格陽於上而見。當溫之。若班色紫小點者。心包熱也。點大而紫。胃中熱也。黑斑而光亮者。熱勝毒盛。雖屬不治。若其人氣血充者。或依法治之。尚可救。若黑而晦者。必死。若黑而隱隱四旁赤色。火鬱內伏。大用清涼透發。間有轉紅成可救者。若火斑帶疹。皆是邪之不一。各隨其部而泄。然班屬血者恒多。疹屬氣者不少。班疹皆是邪氣外露之象。發出宜神情清爽。為外解裡和之意。如班疹出而昏者。正不勝邪。內陷為患。或胃津內涸之故。

再有一種白瘡。小粒如水晶色者。此溼熱傷肺邪。雖出而氣液枯也。必得甘藥補之。或未至火延。傷及氣液。乃濕鬱衛分。汗出不徹之故。當理氣分之邪。或白枯如骨者。多凶。為氣液竭也。

再溫熱之病。看舌之後。亦須驗齒。齒為腎之餘。齦為胃之絡。熱邪不燥胃津。必耗腎液。且二經之血。皆走其地。病深動血。結辨於上。陽血者色必紫。紫如乾漆。陰血者色必黃。黃如齧辦。陽血若見安胃為主。陰血若見。致腎為要。然豆瓣色者多險。若症還不逆者。尚可治。否則難治矣。何以故耶。蓋陰液竭。陽上厥也。

齒若光燥如石者。胃熱甚也。若無汗惡寒。衛偏勝也。平涼泄胃。透汗為要。若如枯骨色者。腎液枯也。為難治。若上半截潤水不上承。心火炎上也。急急清水救水。俟枯處轉潤為安。若咬牙斷齒者。濕熱化風。疫病但咬牙者。胃熱氣走其絡也。若咬牙而脈症皆衰者。胃虛無穀。以內榮亦咬牙也。何以故耶。虛則喜賁也。舌本不縮而硬。而牙關咬定難開者。此非風痰阻絡。即欲作痘症。用酸物擦之。即開。酸走筋木。來泄土故也。若齒垢如灰糕樣者。胃氣無權。津亡溼濁用事。多死。而初病齒縫清流血痛者。胃火衝激也。不痛者。龍火內燔。

也。齒焦無垢者死。齒焦有垢者腎熱胃劫也。當微下之。或玉女煎清胃救腎可也。再婦人病溫與男子同。但多胎前產後。以及經水適來適斷。大凡胎前病。古人皆以四物加減用之。謂護胎為要。恐來害胎。如熱極用井底泥。藍布浸冷。覆蓋腹上等。皆是保護之意。但亦要看其邪之可解處。用血膩之藥不靈。又當審察不可認板法。然須步步保護胎元。恐損正邪陷也。至於產後之法。按方書謂慎用苦寒藥。恐傷其已亡之陰也。然亦要辨其邪。能從上中解者。稍從症用之。亦無妨也。不過勿犯下焦。且屬虛體。當如虛怯人病邪而治。總之母紀實實虛虛之際。况產後當氣血沸騰之候。最多空竇。邪勢必乘虛而入。虛處受邪為難治也。如經水適來適斷。邪將陷也。至少陽傷寒言之詳悉。不必多贅。但數動與正傷寒不同。仲景立小柴胡湯。提出所陷熱邪。參棗扶胃氣。以衝脈隸屬陽明也。此與虛者為合治。若邪熱陷入與血相結者。當示陶氏小柴胡湯去參棗。加生地桃仁杏肉丹皮為庫角等。若本經血結自甚。必少腹滿痛。輕者刺期門。重者小柴胡湯去甘藥加延胡歸尾桃仁。快寒加肉桂。心氣滯者加香附陳皮枳殼等。然熱陷血室之症。多有譖語如狂之象。防是陽明胃實。當辨之。血結者身體必重。非若陽明之輕旋便捷者。何以故耶。陰主重濁。絡脈被阻。側旁氣壅。壅胸背皆拘束不遂。故去邪通絡。正合其病。往往处爻上逆。心胞胸中痛。即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯。加海蛤桃仁。原為表裡上下一齊盡解之理。看此方大有巧手。故錄出以備學者之用。

曹六述去冬因惱怒時食厚味。遂致不飢。嗳氣脫漸。食物不下。視舌上佈苔如粉。不渴飲大便通調。議從太陰脾陽為寒痰濁氣凝遏半溫定法。厚朴 草果仁 薑汁 薑撥 生益智仁 廣皮白

又 前因陽結濁聚。舌胎白厚。不渴飲。用吳草半溫得效。近日食物不慎。水穀氣凝。清陽再呈為嘔。舌胎猶未淨。便下白膩如凍脂。陽亦衰。公丁香柄 蕃撥 蕃苓 生益智仁 厚朴 生乾薑

胡二疾走作勞。身前脇腹悶。氣上下串痛。交正月。寒戰氣衝。呼吸皆阻。腹脹。剝上橫梗。有形作痛。自痢已兩月。思勞必傷陽。春令病加。是木旺侮土。中陽困憊。濁氣充塞。正氣全傷。大肉盡削。述食入逾時。必加嘔噫。後天生化之源大困。議急理中土之陽。人參 蕃苓 公丁香柄 川椒 烏梅肉 炒黃乾薑

便血督脈
虛寒

噎膈反胃

陽結

瘡瘍癰癧

瘡瘍癰癧

司固東議用青囊斑龍丸。

潘二中年脈垂入尺澤。按之緩濡腰椎痠痛形體即欲僵僂旬餘大便必下血。此少壯不慎督真先客臍脾不

高。老年逆氣上升。脘阻妨食。涎沫上湧。此屬反胃。夫陽氣結閉為無形之傷。前藥小效未幾反覆。以老人生

陽不生耳。人參 生淡乾薑 炒黑附子 猪胆汁

沈七十坐目注針繡。少陽氣火上升。陽明氣血因熱沸逆。遂有結癰癰癧之累。前醫不明解鬱兩和肝胃之治。致病日加增。今每日寒熱心燥若裂。經水較前已少。須慮熱熾血乾且納穀大減。難投重劑清寒。

生蠶甲

牡丹皮

川貝母

香附

穀芽

夏枯草花

楊七食入即飢。心空易驚。經水或歇或至。病起座後逾年不復。自述多食生冷。據理肝陰久損。不宜驟用溫補。

人參

茯神

炙草

黃精

龍骨

金箔

腹痛氣滯

顧 腹痛氣上下。行動即緩。從肺陽治。人參 生穀芽 茯苓 煙薑 新會皮 砂仁壳

喫腎氣不

李八哮喘久發。小溲頻利。此腎虛氣不收納。痰飲從氣而上。初病本屬外邪。然數年混處。邪附臟腑之外。廓散

逐焉得中病宿哮不發時用腎氣丸三錢。喘哮坐不得卧。議用開太陽之裏。小青龍湯去麻辛

痞中陽虛

唐五病是勞傷陽氣。陽衰不主流行。清濁升降不得自如。是為虛痞之結。內經為勞者溫之。此溫字乃溫養之

稱。若妄炎大熱。開泄仍是攻伐。與勞傷原氣相反。苓桂木甘湯

賈二痰血頻發七八次。形寒妨食。無治療。急扶後天生氣。望其知味進穀。戊己湯。
錢八十冲牛陰精走泄。陽無依倚。血隨氣升。色紫成塊。此血出於肝絡。瀆當鎮補。

人參

炒黑棗仁

炒白芍

炙草

青花龍骨

金箔

咽喉溫邪

傷陰

又浮熱上炎。精走泄於下。致陰液陽精不肯上供。望色萎瘦。納食不旺。攝陰恐妨胃口。况初夏曾患喉症。大

古營陰虛

暑熱泄。陰難生復。先議水陸二仙丹。攝固精闢。

人參 秋石 茄實

金櫻子膏丸

濕暑熱

顧三操持無有不動心神。心陽上引相火。交升燔灼營液。舌為心苗。遂起沸瘡。病由情志不通。非湯藥直清宣降可治。議天王補心丹。制伏躉陽道路。營液得以升降自如。然必心境怡悅。方能却病。天王補心丹。

李四長夏時令。溫熱內阻。氣分宗內經溼淫於內。治以淡滲。佐以苦溫。

飛滑石

川通草

淡竹葉

杏仁

厚朴

頭痛肝腎
陽浮

始五向來無病。因服地黃丸。反左脇腰中臍旁氣攻作痛。間有遺精。目暗虛花。或起浮翳。據述用細辛桂枝點傷陰。

退。遂加頭痛。此體質陽虛。誤用陰寒膩濁所致。夫肝主疏泄。腎主藏固。肝宜涼。腎宜溫。納腎佐以通肝。溫下仍佐腎陰。以制木火。是為複方。

當歸

小茴

補骨脂

胡桃肉

茯苓

穿山甲

炒黃柏

青鹽

虛勞易氣

林八色蒼形瘦。稟質陰虛火亢。津液不充。喜冷飲。夏季熟蒸。須培生氣。順天時以調理。

麥冬

知母

川貝

地骨皮

丹皮

菜豆皮

淋帶陰虛

項八心熱。膈空。交寅卯帶下。向來陰不足。少陽陽動。中虛食減。靜養至秋涼可望陰充。

人參

柏子仁

丹參

天冬

茯苓

建蓮

龍骨

白薇

癥瘕火大

曹四笑則癥厥病發。晝少夜多。思二月起病。春木正旺。內應厥陰肝臟。木火乃陽極之化。其來迅速。由內而升。

神明遂亂。口吐涎沫。四肢寒冷。肝病何疑。由春病及長夏。醒則如無。納食如昔。法以純苦。直泄厥陰躉陽。

蘆薈

青黛

龍胆草

川棟子

黑山梔

白芍

青皮

歸尾

猪胆汁

又 前方用純苦。直清肝膽。初服即瀉。病久陰分已虛。議理陰和陽。入酸以約來之。

生雞子黃

阿膠

川連

黃柏

生白芍

米醋

吐血中陽
虛
嘔腸反胃

鄖五酒客食管窄隘。回有脘痛。今多食即反胃。氣阻日久。必致瘀凝。食物宜淡薄。以上中焦宣通氣血治。

人參建中湯

浮 淩
瘡陰虛陽

止血氣分
熱

鬱心脾

吐血勞傷
氣道

嘔膈反胃
關格

產後不癥
陰陽並虛

桃仁

蒲黃

降香末

蘇梗

香附

橘紅

程六形瘦肌削。稟質偏熱。夏秋病甚。是陰虧不耐暑熱。發泄之氣且。霜降收肅。令行。浮陽潛伏。陰得自守。病覺稍退。述食平疎。熱燥不安。其臟陰丘液為陽症變疾。非如瘧餒。可用陽藥溫通者。

人參 茶肉 川石斛 磁石

淡秋石 胡桃肉

女貞子 旱蓮草

炒桃仁 降香末

桑葉 南花粉

大沙參

知母

止血氣分

熱

單歲為母喪悲泣。淹淹不食。面黃唇淡。情志不適。生陽鬱。室內經謂思為心疾。鬱必傷脾。病屬無形。非傷食惡。食之比。稚年調理。後天脾胃為要。佐以開益心氣。○人參 茶苓 炒甘草 淮山麥 益智仁 石菖蒲

于 駆騎習武。百脈震動。動則絡逆為痛。血沸出口。納食起居無異平日。非虛損也。凡氣為血帥。氣順血自循。經不必因血用。沉降重藥。杞杞葉 炒鱸子 生苡仁 金石斛 炒桃仁 降香末

王四望五年歲。真陽已衰。納食逾二三日。反胃鴻吐。仍有不化之形。痰涎濁水俱出。大便漸秘。此關格大症。陰

枯陽結使然。人參 半夏 茶苓 泡淡吳萸 生淡乾薑 夜另服半硫丸一錢五分

蔣正晨瀉數年。跗蹠足冷。長夏土旺初交。知飢痞閼妨食。述兩三次半產不育。下焦氣微不固。任督爻空。本病當以肝腎奇脈設法。今議先以胃藥。以近日雨後暑溼乘隙侵犯耳。

人參 茶苓 益智仁 砂仁殼 炒扁豆 木瓜

又 連年半產不育。瘕泄。足跗浮腫。前用養胃和肝。非治本病。因暑溼傷而設。議固下焦之陰。益中宮之陽。

人參 禹糧石 紫石英 五味子 菖絲餅 砂仁 用蒸餅為丸

邢 暴怒傷肝。白帶下注。繼而間血。人身衝任督帶諸脉皆麗身半已下。醫用上中二焦痰藥。焉能圖倅。自言

月事來而漏帶。初起少腹腰痛。此內熱。是血絡陰液損傷耳。性嗜酒。酒力先入肝胆。急當禁止。議固脈

以攝下。炒枸杞 炒黑薑歸 白薇 桑螵蛸殼 青花龍骨 生紫石英 前藥送震靈丹

陸二腰全。膝骨緩軟。牀榻。渴後坐中空痛。少年未婚。此是勉強勞傷精闘。且卧床必要熟養腰背。虛象太有。久

冬病加問食少胃弱。非地黃膩滯知柏湯陽可投。

遺精勞心
損神

泄濁腎陽
衰

謂經奇脉
陽虛

菟絲子 覆盆子 茄實 沙苑 家韭子 補骨脂 舶茴香 金櫻子 細魚膠丸

桑螵蛸

人參 伏神

青花龍骨 金箔

瑣陽

蜜丸

王六過用心思。營氣日漓。心悸眩暉。遺精腰膝下部畏冷。陰陽造偏。心腎交損。議鍼法以固攝溫納。

固下一法。人參 赤石脂

禹餘糧

五味子

泡淡乾薑

蜜丸

顏塊病已半年。夜寐易醒。汗泄自覺元海震動。腹鳴晨瀉。年歲望六。不僅經營煩勞傷陽。腎真亦漸散越。仍議徐九月事將至。尻骨脊椎痠痛。此督脈循行之位。况經水之下。必由衝脈。產育頻多。奇脈失固。議治陰中之陽。

麋茸

人參

歸身 炒黑小茴

伏苓

川斛

調經肝胃
不和

唐二經來一日。偶食冷物。經水即止。遂痞悶不食。乳房堅腫痛脹。此是肝氣鬱結。蓋經水由衝脈而下。衝隸陽明。胃中受冷。而衝脈血凝。理從肝胃同治。

青橘葉

香附汁

漏蘆

蒲公英

厚朴

杏仁

產後嘔傷
神怯

徐八產後未經旬。長途馳驅。以勞形神。歸值母喪。悲哀哭泣。傷及情志。遂肉瞞惕驚恐。少寐。產傷陽分起。見肌

肉悉熱如焚。乃陰不攝陽。

熟地炭

萸肉

龍骨

伏神

淮小麥

南棗肉

瘡瘍溼

何十述無病時形瘦。病發時形充。古稱入水之物。無物不長。陰寒襲入。右肢肉瞞筋惕。而痛。指不屈伸。法當通瘀塞以逐留者。川烏一錢泡黑 全蝎一兩炙焦 蜂房五錢炙焦 自然銅五錢 麝香分炒熟大黑豆淋酒汁為

丸每服一錢。陳酒下。

汪 肺熱膈消熱灼。迅速如火。臟真之陰日削。先議清肺以平氣大法。當苦降以輕。鹹補以重。繼此再商滋養。血液。枯黃芩湯。溶入阿膠錢。

寒精血損

孫三行走閃挫。左腿筋弛無力。亂藥雜技。五六不愈。延及精血內損。不可束筋充骨矣。猶半年壯冀其生直續。旺藥用平補。然必絕於戒勞。庶克臻效。虎潛去瑣陽加從容精羊肉膠丸。施六陰寒已入陰股。道路深遠。湯藥過胃。其力已薄。邪網仍在。議用許學士法。蠲痛丹每服一錢二分。

虛勞勞傷
中陽
肝風下虛
不攝

鬱木乘土

濕兼風溫

痰氣火不
降

虛浮陰虛

陽痿淫熱

趙納食不充肌膚。陽傷背痛。陰寒水冷。經營作勞。勞則氣乏。經言勞者溫之。甘溫益氣以養之。歸農集中湯。陳五操勞動怒耳鳴頭脹暉眩肢麻。內起火風。皆厥陽之化。中年以後。男子下元先虛。處其仆中。議填鎮固攝。以實下合乎上病治下之旨。

熟地女武版靈磁石五味子山萸肉炒杞子天冬牛膝青鹽

程人標梅逾期。病由情志鬱傷。虧賢不究病因。朝暮更方。病延日久。內經謂二陽之病發心脾。蓋思傷心鬱傷脾。二臟有病。不可統血。笄年莫重於經水通調。今經閉半載。嘔吐清涎。腹痛泄瀉。心熱皮寒。顯是木鬱乘土。胃口漸敗。生氣曷振。病成乾血勞怯。考古通經等丸。難施於胃憊乏穀之體。姑議安胃和肝。俟秋深時再議。做經旨溼溼於內。主以淡滲佐以苦溫為治。

飛滑石茯苓皮白蔻仁竹葉厚朴杏仁蘆根

陳三煩勞氣火多升少降。喉中梗阻。痰出噫氣。凡酒肉皆助熱痰。凝氣分上焦。痽塞。

枇杷葉瓜蒌皮降香末杜蘇子黑施皮苡仁

宋四精壯年歲。面色萎浮。風沖逆。必心悸眩暉。問足跗易冷。間有遺洟。此皆煩勞辦事。心陽過用。暗吸腎陰。下元日虛。虛風挾陽。旋動不息。全是內損之病。治法取質味凝厚以填之。甘酸以緩之。重以鎮怯。補以理虛。方是培本尋源之治。熟地四萸肉二瑣陽二兩茯神四五味兩龜甲心二兩秋

石一兩青龍骨二兩金櫻膏二兩艾實四兩蜜九

夏三陰筋曰宗筋。肝主之。冷則筋縮。熱則弛長。少壯空瘦。起於長夏天氣已熱。地中溼蒸。內經病機一十九條例。謂因溼者大筋央短。小筋弛長。更短為拘。弛長為痿。此雖統論痿症而言。非指空瘦立論。然理亦相通。今逾年不愈。大暑時令。診得脈象。非下焦陽衰。兩目紅赤。想經營煩冗之勞。陽氣交集於上。與暑熱內迫。加以

水穀之溼。溼蘊化熱。而燭筋致瘓矣。法當以苦取陰。燥以勝溼。介以潛陽。溼去熱清。自有愈期。

生虎骨 熟地 蒼朮 黃柏 茯苓 龜板 石決明 天冬

虛勞腎虛
不攝

吐血勞傷
心神

脇痛勞熱
嗜血

鍾未及五旬。肉消食減。此未老已衰。身動喘急。足跗至晚必腫。皆是腎真不司收攝。納氣根本先撥。草木微功難以恢復。坎炁 人乳粉 五味子 胡桃肉 蛋丸人參湯送下

王三煩勞曲運神思。形與神交傷。陽氣旋動。絡血何以甯靜。甘以緩熱。補以益虛。必佐甯神鎮怯。以攝之固之。

人參 柏子仁 炒枸杞 焦歸身 桂圓肉 炙甘草 龍骨肉 茯神

單因門控腸痛。久則嘔血。絡血氣熱內迫。新血瘀逆。鮮生地 蘿蔔節 生桃仁 新

宋暑熱入營。舌絳煩渴。形脈皆不足。怕邪陷神昏。

犀角尖 南花粉 連翹心 益元散 淡竹葉 細葉菖蒲汁

程二男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。孤陽升騰。薰蒸上竅。已失交泰之義。此非外來之症。凡陰精殘弱。務在胃旺納穀生陰。今咽喉鼻耳諸竅。久遭陰火之迫。寒涼清解。僅調六氣中之火。而臟真陰火乃閃電迅速。莫過清寒。必不却病。良由精血內空。草木藥餌不能生精充液耳。

細生地

清阿膠

楮桂木甘湯

徐子

孤疝氣墜

鹿茸

大茴

當歸

沙苑

乾蓆蓉

生薑

肉桂

羊肉丸

寒凝

肝腎虛

調經陰虛

熱灼

痰飲中陽虛

虛

寒

熱灼

心火

氣血

虛

血

虛勞奇脈
虛腰痛

又癆盡發氣間嘔。此陳腐未掃。乃無形之聚。用辛芳涼滑治之。
鮮首頭草錢滾水泡湯和入竹瀝錢
孫心遠腰近劑。久痛若空。秋深屆冬。四肢不暖。此由幼年精未充旺。早洩既損難復。八脈司失。是陰損及陽。約須達及奇經。可冀漸效。

鹿茸

淡蓀蓉 巴戟 當歸 茯苓 虎膝骨 牛膝 大茴

羊肉膠丸

淋渴脾腎
陽衰

吳二精濁已行。步久無力。食冷口吐酸水。陽氣微弱。治在脾腎。

益智仁 家韭子 覆盆子 胡蘆巴

遠志

小茴 兔絲子 金櫻骨丸

王五陽結於上。陰泄於下。晨汗多因腎虛。陰傷及陽。胃口自備。舌畏辛竦。不受桂附之猛烈。虛腫虛脹。先宜固劑。

人參

禹餘糧

赤石脂

五味子

砂仁末

茯神

金匱要略

遺精陰虛
陽浮

熟地 黄肉

五味

龍骨

湖蓮

遠志

熟地

黃肉

五味

龍骨

湖蓮

遠志

痿精血虛

邵七望七男子。下元必虛。操持繁思。陽墜入陰。精虧即化紫黑之色。宿者出竅。新復瘀結。溺出不痛。非久積宿

腐據。述常飲火酒。酒毒半熱。必先入肝。腎虛宜溫補。肝宜清涼。閑方用歸脾湯。且非嚴氏法。雜湊成方。焉能治此大症。細生地 清阿膠 黑稽草皮 赤芍 丹皮 童便一杯冲入。

周十五陽維脈循行外踝。遇勞形辨事。環跳跗骨酸麻而痛。丹溪云。麻為氣虛。益年力已衰。不得安養。怡悅。痿論云。意傷肢欲廢矣。且痛處肉形瘡。無腫赤之象。此氣血不布。濡濡筋骨。不足之症。比比然。

生精羊肉

虎胫骨 肉蓀蓉 枸杞子 沙苑

巴戟肉

牛膝

當歸

川石斛

痿厥肝鬱

翁四少腹有形。左脇膜脹。熱發必肌肉麻木。嘔吐痰沫不爽。此屬肝厥。由乎懷抱抑鬱。不得條達。數載病不肯愈者為此。

淡吳萸 川棟子

川棟子

生香附

南山楂

青蘭葉

杜鵑

虛勞陰陽
雨虛

暑勝脫熱
閉

中風水瘤
風動

羸陽氣虛

目肝虛

肺養勞傷

溫陽陽氣
氣

咽候陰火
虛精血虛

何二壯年脈芤。少神色。瘦食進不充。形骸不耐煩勞。乃內損也。節欲養精。安神養氣。藥用血肉有情。氣血

兼補。年少望其生脈。河車。人參。熟地。五味。山藥。茯神。蓮肉。父實。

宋六吸受暑熱異氣。入表中之裡。為淋痛溺赤。形肥素有溼疾。議通太陽。

桂枝。木梢芩。茯苓。草薢。

海金沙。寒水石。

鄭伯夏至陰生。忽然口渴煩斜。且數無聞。此非外來之邪。皆由男子望六下元已空。下虛則上實。水虧風內起。

凡腎以溫為養。肝宜涼。乃平溫養腎精。必佐涼肝。水中有真陽內蓄。是為命根。蓋胆肝相火內寄。性惡執燥。用七方中之復方。熟地。磁石。龜板。丹皮。五味。天冬。枸杞。蕤谷。菊花炭。川斛。

方七高年宿疝不愈。入夏陰囊足跗腹大。乃陰臟之真漸竭。腑中陽氣不行。一派濁陰迷漫。二便皆不通。

明知老弱久虛。然呆補必助濁壅塞。議通陽一法。白通湯去芍。白

周一正視一物見二。晚視則否。凡積勞氣洩陽傷。當夏熱氣再大泄。雖曰肝竅閉目。實臟真精華會聚之處。當

甘緩理虛。酸收其散。大忌苦降半開。桂圓肉。枸杞子。炙黑甘草。五味子。山萸肉。菊花炭。

俞一父教失音。飲食仍進。自覺淹淹無力。此是內傷勞倦。夏月泄利。是暑溼氣感。不在本病之例。食減而消治。

嗽無益。以肺痿論。白芨。生黃芩。炙甘草。苡仁。黃精。

周二暮勞下元先空。咳音不轉。以致嘔吐。是衝脈虛氣逆上攻。董靈肺臟延及不飢減食。腹痛便溏。乃清內熱。

泄肺。醫嗽之悞。炒當歸。

生白芍。炙草。

南棗肉

莫五平昔飲酒。夏令再受地溼之感。內外溼邪傷陽。阻遏氣機流行。遂致一身盡腫。針刺出水。消癰復腫。皆因

陽氣已衰。水溼無以分逐。苟非氣雄通陽。陰凝何以走泄。所服八味湯。僅溫煦腎陰。與陽維不合。

川烏。附子。生白朮。茯苓。木香。黑荳皮。

曹三陰火喉痺。滋腎丸。

李四勞必瘡瘍。按之有聲而解。是虛而氣乘。非因寒也。問所服之藥。半屬辛熱。不知質偏精血內空。法當攝固。

不必偏熱偏寒。熟地。伏神。炒遠志。線魚膠。柏子仁。五味子。紫胡。

沙苑子

管七少腹有形。六七十漸加脹滿。述臨暮納食。夜必腹鳴。瘕泄。蓋老年坎陽日衰。坤土不運。濁陰下聚。凡冷滯

肥膩食物宜忌。勿預家務。怡悅情懷。以為却病之計。若徒恃醫藥。非養生之法矣。人參。兔絲子。茯苓。

胡蘆巴

舶茴香

上肉桂

補骨脂

砂仁

金鈴子

肉果山荊糊

橘丸

吐血營

吳七十腸中刺痛血逆。心中凜凜隨嗽吐出。兼有嘔惡腹痛。此笄年情志鬱勃。陽氣多升。絡血逆行。經水不下。恐

延乾血重症。

山楂

桃仁

柏子仁

丹皮

延胡

益母草

張十暑入心胞煩熱。多驚。舌胎黃而不渴。連翹

犀角尖

益元散

大竹葉

石菖蒲

川貝

周十四先天稟薄。壯盛精氣不足。形神勞動。陽乃浮越。精血皆有形。非旦夕可生。培養無形元氣。可生有形之精。血勿誦。讀煩心。勿搖精動腎。靜養百日。壯年可以生復。

孔六頭風傷目。是內起之風。屢投發散清涼。約不對症。先傷胃口。做內經辛苦。急食甘以緩之。

桂圓肉

伏苓

炒熟半夏

楊一肝風化熱犯胃。惡心痞悶。食入作脹。口渴。議養胃制肝。

人參

金石斛

烏梅肉

麥冬

新會皮

施坐不得卧。胸滿氣喘。暑風溼氣。漫處三焦。太陰膀胱不開。邪鬱生熱。氣壅生腫。先議開三焦。氣分之室。王一桔搘勞形。操持勞神。男子向老。下元精血先虧。陽失交護。浮越上冒。致耳目清空。諸竅不爽。凡下虛者。火上實。此風大非由陰不配陽使然。

虎潛丸

杏仁

白蔻仁

滑石

寒水石

猪苓

廣皮

厚朴

伏苓皮

暑濕三
虛勞煩勞
陽升

勤。此風大非由陰不配陽使然。

虎潛丸

李子肌柔色白。形氣不足。當知識年歲。龍雷突起無制。乾倉咳逆。情萌不遂。有夢遺精。月熱理嗽。清熱。胃減墮入虛勞。能知命靜養。冀其漸次充復。

三才湯加蓮肉芡實茯神柏子仁

姜五痢已八月。久痢自必傷腎。下失收納。據述泄氣薰通稍炎。非寒厥固濡所宜用。景岳理陰煎。

唐二陽浮汗泄衄。血皆下焦。真陰不充。適值乘龍之喜。與病相悖。議填竇下元之全。制伏乎陽。

病腎虛
脾肝腎陰

濕溫熱

王三瘡邪流入肝絡。或舉寐中夢擾。執逼筋骨。夜傷疼痛。正虛邪伏。滋養不效。

熟地

萸肉

女貞子

旱蓮草

茯神

秋石

黑殼建連

蜜丸

生鱉甲

生地

胡芦連

丹皮

黑山梔

青黛

計四酒客內有溼熱。瘍膿初愈。精神未復。小暑泛潮。外溼與內溼併合。致傷脾胃之絡。便血繼以吐血。久延肉消神倦。然脈絡之溼蒸熱蘊仍在此。病邪為本虛為標。非補濁藥所宜。

茵陳

茯苓皮

厚朴

廣皮

海金沙

雞肫皮

大腹皮

查肉

砂仁殼

王六日患其來甚。驅醫投風藥。寒涼漸起。翳障。睞肉欲遺未泄。已見淋濁陰虛弱質。暑溼熱氣。直入於陰經。非欲速易愈之症。石蠶。苦丁茶。金石斛。桑白皮。飛滑石。乾荷葉。夏枯草。顧此裏質聰慧。當此已有知識。勤讀夜坐。陽升則上。熱下冷。真陰不能生旺。長夏變幻腹疾。以渾濁脾熱論之。乃虛人暑伏脾胃。議用東垣法。

人參

煨葛根

唐皮

黃柏

生穀芽

澤瀉

茯苓

川連

胡三形質偉然。吸氣不入。是腎病。自言心緒少適。六七年久藥無效。近來納食不運。夜必驚惕而醒。先以兩安心腎。鎮怯理虛。人參。茯苓。龍骨。小麥。炙草。金消。

顧四凡寒溼癥。久則變熱。六氣客邪。悉從火化。邪客驅殼節骱。熱氣還蒸。諸竅脣脹。瘻疹搔痒。忌食酒肉。方可向愈。羚羊角。犀角。殼蠶。粗桂枝。花粉。白蒺藜。

錢五中年。食入涎沫。上壅吐食。此屬反胃。姑以淡薄滋味。清肅上氣。平昔飲酒惡甜。約不宜重以損胃。

鮮杞杞葉

杜蘇子

降香

橘紅

蘆根

苡仁

瘡瘍發癢

張二上年產後。至今夏經轉。寒凜遂結氣痕。自少腹攻至胃脘。脘痛氣結。宜開先用金鈴子散。

延胡

金鈴子

青礞石

山楂

生香附

蓬莪术

沈十平素飲食少用。已見脾胃不和。暑溼熱氣從口鼻入。暮原受邪。邪氣蒸搏。口舌疳蝕。脾胃胃衝。寒氣混交。

遂為瘡潮熱。辨質純陽。微冷熱勝。當以廓清三焦。蘊伏而脾胃最為衝要。

飛滑石

大竹葉

杏仁

厚朴

廣皮白

茯苓皮

白蔻仁

痛熱益

胃痛氣滿
血淤於

癰疽溫
邪閉

瘡疽溫
氣滯通陽

方二。正在壯年。交四月陽氣升舉。忽然跌仆無知。頭搖肢搐。越旬又發。問病因忿怒所致。大凡病來迅速。莫如風火鬱怒。由肝膽木火生風。從此而發癰厥。若僅謂疫火用辛香燥劑。劫疫利氣宣竅。厥陽不甯。病勢得減。龍蒼丸。每服二錢。四服。

陳六酒溼熱氣。氣先入胆。溼者胃係。痰聚氣室。絡血瘀。痛在腕。忽映少腹。氣血交病。先和少陽陽明之陽。酒客惡甜。治以苦辛寒。土裏反。半夏。枳實。川連。許四五暑溼。皆氣室成瘡。初起舌白嘔吐。乃太陰脾病。誤用寒涼滋柔陰藥。助其溼邪。引邪入營。舌亦不喜飲水。何從氣分開其結。遂其溼。做古賢治瘡務在通陽。

茯苓一兩。國藥厚朴。草果仁。半夏。新會皮。高良薑。沖入薑汁五分。

中風陰虛
陽浮

蔣上。上年久暖少寒。冬不藏。固花甲己外。腎真既虧。水不涵木。肝陽之風勃然上泛。遂令眩暉。經云。下虛上實。為厥。乃欲朴中之根芽也。此非外來之氣所感。由操持勞思。五志之陽刻升。煩動在裏。營血肢液暗耗。診脈左尺空弦。望色浮紅光亮。欲便用力。汗洩聚熱。偶爾立起。則足附骨痿。色脈見症顯彰者。閱所服諸藥。參內典聖訓。昔劉河間內經與旨。凡上實下虛。耳鳴足痿。便溺竊阻等證。每以濁藥清投。名曰飲子。宋是議主治。

主治

製熟地

柏子仁

川斛

天冬

五味

淮牛膝

泄渴寒溼

劉山泄渴二年。食物不減。胃氣未損。脾陽已弱。水溼陰濁不易輸運。必須慎口。勿用寒滑厚味。議用暖中佐運

法。生茅术

生於术

炒香兔絲子

茯苓

侵血肝脾
不和

寒風溼熱

張瀉血八年。腹左有形梗痛。液耗渴飲。肝風大震。肺氣開闔失司。洩漏不利。未可遽投固澑。茯苓 木瓜 炒白芍 炒烏梅 澤瀉 焉草

澤瀉

焉草

許 風溼熱。燦於經脈。右肢牽掣。邪未驅盡。發為瘡痍。有年。陽明脈空。遂致偏瘻。

生黃芪

歸身

防風

丹皮

木防己

黃柏

銀花

炒白芍

當歸

炙草

生薑

南棗

沈 背寒戴標。而後發熱。二使頗利。並不渴飲。入暮倚枕。氣自下衝。嗰咳不已。脈空大。按之不鼓。肌消神躁。是煩勞抑鬱傷陽。寒熱更起。丑衰解時無汗。非外感表病。顯然溫養營分。立方參入奇脈。示陽維為病。苦寒熱之例。

川桂枝

廖角霜

當歸

炙草

生薑

南棗

又進通和營分兼走奇脈二劑。寒熱已止。而操持煩心。皆屬傷營耗氣。未免滋擾反覆。經謂心營肺衛之虛。都是上損。立方不越。益氣養營矣。

人參 茯苓 廣皮 炙草 炒白芍

當歸 束仁 生薑

南棗

龐 久損精神。不復刻下土旺。立春大節。古辟齶腐。陽升陰不上承。食不知味。欲吐下損及胃。最屬不宜。

人參 炒麥冬 紫衣胡桃肉

熟地

雞子黃 茯神

褚 氣鬱肝不疏泄。神狂譖語。非是外感。乃七情之病。先進滌痰湯法。

川連 膽星 石菖蒲

半夏 鉤藤

山梔

遠志

橘紅

風溼上焦

溼感鬱閉

肝脾不和

調經熄閉

方風溫上受。心營肺衛皆熱。氣不宣降。則痞脹。熱重膻中。則神迷。此上焦客邪。想有酒食內因之溼。互相挾持。

七八日未能清爽。以施豉湯主之。

山梔 益豉

杏仁 鬱金

姜皮

鮮菖蒲

郭徵 診脈左勁似數。右寸虛大。中下虛濡。面色㿠白。少寐。消渴納穀最少。經候不至。已十四月。上年夏秋間。跡

面肢體曾發風疹。此屬血液內壅。陽動化風。以和肝清熱得安。今患藏血統血。固在肝脾。必得陽明脈絡充旺。斯海流行。稱職議。甘補佐以兩和方意。

人參 炙黑甘草 歸身 赤白製首烏 茄蔚子 酒炒白芍 桂圓肉 小黑糟菖皮

潘 下血。純用苦寒。幸得補陽救正。陰陽造偏。浮腫咳嗽。此藏聚失司。當春升發洩之候。宜通補攝納。治其肝虛。便血。升腫

蘆

腎若益木呆補，恐助濁凝。有脹滿之變。

人參

五味

茯苓

車前

熟地炭

炒歸身

巴戟肉

赤

脉濡面赤。呃嘔吐自利。此太陰脾陽受傷。濁陰逆侮。高年不可純消。擬用理中法。

人參 炒黃乾薑 厚朴

薑汁炒半夏

又

中下陽微嘔。呃下利。溫中不應。恐延衰晚。夫陽宜通。陰宜守。此關閘不致潰散。春回寒谷。生氣有以把握。

候王先生議

人參 附子

炮薑

炒梗米

赤石脂

生白芍

桑芽膏丸

。

宋

脈帶濁。減食不運。脫中常痛。糞後血下如線。按經云。陰絳傷則血下溢。閨前方補陰不應。反滋脹悶。蓋因不明經營操作。多有勞鬱。五志過動。多令化熱。氣鬱血熱。三焦失於宣暢。若非條達氣熱。焉望血止。

於木炭 枳實炭

鬱金

廣皮

炒焦桃仁

炒白芍

炙草

茯苓

。

褚

晨起未納飲食。吐痰致嘔。減穀。胃陽傷也。由多進知柏所致。其苦寒。胃先受傷矣。先用小半夏湯加泰米。

席

積勞。氣血凝遏。脘悶。助痘食減。治以宣通脈絡。

桃仁

當歸鬚

鬱金

柏子仁

小胡麻

桑葉

桑芽膏丸

。

施

忽然神迷。逾時自醒。病起一年。頻發漸近。今診脈細弱。必未實熱。此因憂慮。情志受傷。手厥陰膻中之清。

失音肺熱

直為濁涎所阻。內因之病理難速攻。姑以宣通神明。兼理痰氣為治。

午

服 鮮菖蒲根

天南星

遠志

竹節附子

茯苓

薑汁

夜服白金丸

。

徐

三聲音不宣。痰出鼻竅。上焦肺氣窒塞。經營着急。

傷肺。酒熱薰蒸。亦主傷肺。宜辛涼以宣之。薄味以清之。

每日吃淡荳腐花一杯。

枸杞葉 薄荷葉 桑葉 杏仁 牛蒡子 甘草 午前服

徐

十二父病氣血膠結。絡中不和。攻補皆不去病。仿古五積治例。每以疏通緩逐為法。不必峻劑。

雞內金

海浮石 蛤粉 歸鬚 桃仁 半夏

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

便血陰傷

及陽肝風

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

嘔吐胃脣
虛
瘀勞傷風
血癥

動
便血陰傷

及陽肝風

咳嗰。心悸耳鳴。足股痿弱。不耐步趨。種種見症。顯然肝腎真陰。五液大傷。八脈無以攝固。陰既虧損。陽無有不傷。此滋補原得安妥。嘗謂仲景少陰病治例。有填塞陽明一法。意謂脂液大去。闢門皆撤。而內風虛陽。得以掀旋內擾。屢投補陽。暗風隨至。聖人每以填塞其空。似與內經腑通為補之義相左。然闢門不固。焉有平期。既驗之後。再以血肉有情。另佐東垣升陽之法。安養調攝。自有成驗。先用方。

禹糧石

赤石脂

人參 五味 茄肉 木瓜

蒸餅為丸

爆肺胃津
傷

肝風脾虛

吳

辛泄太過

肺胃津傷

咽喉乾涸

出納氣阻。蓋肺為出氣之臟。姑進滋養上焦。以充化源。

獨活

廣皮 炙草

炒歸身 防風 羌活

白茯苓

生雞子白

玉竹

麥冬

甜杏仁 生甘草

眩肝陽升
動

嚴

填陰則陽和。風熄雖已獲效。春分後。診左脈垂尺已減。右脈弦。恐夏熱氣泄。有減食神煩之慮。早上仍用

前方。晚進戊己法。倣仲景肝病實脾之意。人參 熟術 桂令 炙草

廣皮 白朮

白朮

上昇

方

飢不欲食。氣衝咽嗌。頭眩寒熱。汗泄皆肝陽升動太過。若加怒勞。恐有暴厥之慮。

川連

烏梅 人參

生白芍

炙草

鬱火傷肝

包

熱灼且鼻。諸數皆痒。浮陽化風上擾。汗多不渴飲。此非氣分實火。鎮固不應。法當攝補。

三才散

合參參散主之

人

牡蠣

生白芍 炙草

白朮

勞陽亂傷

葉

三鬱怒致病。心胸映背痛甚。至氣阻咽喉。呼吸有音。吐涎沫。又不熱渴。由肝病蔓延。所傷非一經矣。光理上

焦與苦辛輕劑

鮮枇杷葉 香豉 苦杏仁

鬱金

瓜萎皮 黑山梔

何二脣流穢水。咳嗽腹痛。欲瀉。詢知勞動太過。陽氣受傷。三年久恙。大忌清寒。治嗽法。當甘溫以治之。

喘下焦陽

葉四鬱怒致病。心胸映背痛甚。至氣阻咽喉。呼吸有音。吐涎沫。又不熱渴。由肝病蔓延。所傷非一經矣。光理上

焦與苦辛輕劑

鮮枇杷葉 香豉 苦杏仁

鬱金

瓜萎皮 黑山梔

溫肝化胃

陸二服腎氣湯。得效是下焦陽微致神氣昏昧吸不得入為喘。溫補收納一定成法。

人參

熟附

茯苓

車前

紫衣胡桃肉

生白芍

生白芍

陰虛肝陽動

姚

人參 川連

黃柏 川椒

川棟子

桂皮 烏梅

生白芍

寒涼潤氣

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

半投辛柴半散

是昧於根蒂已虛

雜用升泄

恐咳喘躁成矣

生地

阿膠

生白芍

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

胃汁

風溫劫損

風溫劫損

潘

眉心痛 心中熱 腰脊痠痛

五心皆熱

自產後半載

形消食減

乃下焦陰液大耗

而肝風挾陽震動矣

病目

內損

固當補益

然閱所服方藥

雖曰養陰

<p

如內經煩勞則張。精絕辟積於夏。令人煎厥薄厥之謂。蓋張指陽氣之弛。張精絕謂真陰之內奪。木失水涵。肝風大動。皆為厥之因也。法宜味厚固陰。甘緩和陽。內風熄可冀博定安寐。倘執方書不寐。投以溫胆湯。或畏虛亂補。是不明陰陽臟腑之先後矣。

人參半
扶神錢
真阿膠
麥冬錢
生牡蠣
龍骨
生白芍
細甘草
一錢
人參
扶神
湖蓮肉
遠志
熟地
河車豚
山藥粉
五味
覆盆子
鹿角霜
炒杞子
茯苓
接服斑龍丸加參

周病小愈即食。腥滯粘膩之物。胃陽尚弱。穢濁痞結。中焦不運。腸氣不行。大便七八日不更衣。舌自涎瀉。鼻覺氣穢。清濁混亂。所服之藥。半條半寒。不究陽傷致纏綿逾月。先用來復丹。每服一百粒。薑湯送下。

汪日前誠味淡輕揚。少佐微辛。正合經言肺欲平之旨。然發表之半。則升。開洩之半。則降。大肺主一身之氣。清空之體。長不受濁。前云穢瘡上入肺位最高。受戕最先。因失治而漫滯中下。內經色診。謂從上病者治其上。斯源清流潔矣。

水蘆根
白通草
山茵陳
生以似
浙茯苓
桑皮
研入白蔻仁末
卧時服感喜丸一錢
又濕阻經絡為痛。初在虛里穴。漸延肋背附骨。日來背部發現溼症。微微紅色。此溼邪由氣及於血分。丸約攻滯。僅走腸中。未能引經宣通。所用氣分肺藥。咳喘濁痰已緩。今經絡久痛。當以三因瘤症參看。

陳大雨潮溼下痢。都是陰寒。服黃連陽傷腹脹。繼雖用溫。又是守中。今二便不爽。脹必兼痛。腑為陽。陽宜通。通則濁陰不聚。痛脹自減。大針砂丸。每服一錢一分。

金根少腹痠鬱不和。據述因寒溼而起。緣產後精米不復。衝任已空。躋維不溫。經言陽微為病。苦寒執矣。若云瘻邪。馬有三五日休息而至。蓋脈絡空乏。填補孔隙。區區滋潤之補。與產後奇脈之病迥殊。故不獲效。

厥陰頭痛

喉嚨腫脹

舒 口鼻觸入臭穢濁氣蒙閉心胞。遂心胸痛嘔瘀血。且欲昏閉。即方書中惡之症。蘇合香丸能辟穀惡之邪。若誤認陰虛。擅投桂附。則犯新救火矣。蘇合香丸二錢。
張姐時時驚恐。不食不便。狀如神附。頭面肌浮。舌強脣腫。寤不能寐。夜多妄言。經少紫黑。此五志煎厥。風陽上逆。故俞氏治楊季登女例用龍會丸二錢。

吳 厥陰頭痛。舌乾消渴。心下煩疫。無寐多躁。少腹脹滿。小溲澀滴。時時瘡瘍。最怕厥竭。

阿膠 鮮生地 雞子黃 小黑葛根皮 前半盞送滋腎丸二錢。

顧 幼稚喉嚨。由外來風寒。必從肺治。因過食甘膩。必兼理胃。久發不已。病氣蔓延。不獨在肺胃間矣。故因勞致發。遇冷而發。乃衛陽已虛。煩動火升。面赤皆腎陰內怯。雖非色慾之損。然因病致虛也。須知病是有餘體屬不足。不可徒用攻疾逐氣。取快一時。當未發之時。病機潛伏。只宜培土以運痰。土旺則肺氣充。壯水納氣。以益腎子氣。尤長母氣自強。此為子母相生之治。守之日久。發作自緩。況宿病無急攻之法。或寓攻於補。或攻補互施。然寒暄飲食之調攝。於此症尤當加慎。

早上服補納腎氣方

溼防變症

薑汁製熟地 生白芍 懷山藥 丹皮 雲苓 紫衣胡桃肉 酸秋石 澤瀉 密丸桐子大
午後服健中連溼方 人參 熟半夏 新會皮 茯苓 枳實 地栗粉 金石斛湯法丸

嘔吐大便不通

王 濕鬱熱。必陽氣鼓。溼邪乃解。是寒戰。後身痛已緩。蓋溼從戰而氣舒。戰後陽氣通和。為身熱汗出耳。但脉濡神倦。餘邪未盡。正氣已虛。有轉寒之象。用大半夏湯。通補陽明。人參 半夏 茯苓 薑汁
蘇 早食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷胃痛。痰寒有形之阻。桃仁 半夏 蕤汁 枳實

姚 老年伏氣。溫邪五十日不解。脘痞不饑。心中脇內獨熱。藥下咽則嘔。痰多呃逆。舌焦微渴。四末微冷。此胃傷已極。久之穀氣致津液不復。氣機鬱悶。間用藥須忌。若燥。半溫妨胃。先議芳劑輕清。兼以穀氣開醒。上中

吐傷傷呢

香梗露

香櫞露

玫瑰露

銀花露

米漿

蘿汁出陽
虛

便血怒勞
血虧

嘔吐胸陽
滯渴

肝痛腰背
胃氣少降

肝胃平
肝和

溫邪發傷
溫液

憂愁傷肝
陰

劉

瘕聚攻觸中脘。痛喫背。嘔吐涎沫。凡久病。病必在絡。絡空必成脹滿。已經旦食苟安。暮食痛嘔。其胃中清陽久失旋運之司。飲食尚助嘔脹。焉能承受湯藥。病退無期。頗為棘手。閱古人書。於久病有形通劑是議。先擬通陽。改投小九一味阿魏丸。硃砂為衣服五分。

張

形寒。手足痛。肌肉漸腫。勞力行走。陽氣受傷。客邪內侵。營衛失和。倣局方適在四肢。汗出陽虛者。製黃氏五物湯。黃氏桂枝茯苓炙草當歸煨茲。

胡

胸臆不爽。食入內脹。糞後便血。病已二年。診脈左小澀右微弦。食減形瘦。是內傷犯鬱。初病在氣。久延血絡。而瘀腐色鮮。血液皆下。從怒勞血鬱治。桃仁杏仁柏子仁歸尾紫苑。久瘀子

青

臍下有形。攻觸氣上則嘔吐。降下則失氣。服消。脹中必有濁滯阻塞。椒附難投。僅能開無形陰濁。老年陽衰。不可遽投攻下。用半硫丸一錢。俾肺陽流通。滯濁自去。

丁

脈右弦。脘痛映背。得嘔痛發。氣鳴痛緩。乃胃氣少降。寒暄七情。皆令痛發。病屬肝胃。議河間金鈴子散。

金鈴子

延胡炒半夏薑汁茯苓橘紅

杜

酒客胃中釀熱。嗔怒亦令肝腸犯胃。今納穀。脘中微痛。乃陽逆失降。酒家忌用甘膩。辛苦清降。平肝胃。治之。川連吳萸半夏薑汁茯苓橘紅竹瀝

王

清明穀雨。氣候已暖。所感溫邪。從口鼻吸收。自上及中。為三焦病。羌防乃散足太陽風寒表邪。溫病篇云。悞用辛溫表散。即為重劫津液。令頭身痛咽痛。心胸煩悶。視其舌心反黃。邊紫絳。渴飲不能下咽。斑疹隱津涸。呼吸漸閉。所謂一逆尚引日。再逆促命期矣。重症之尤勿與目下時行客邪同視。

玄參

連翹銀花白金汁中大芷黃卷飛滑石象貝川通草

錢

肝藏魂。因怒則諸陽皆動。所見病情。皆屬陽動化風。而為厥。故凡屬厥症。都隸厥陰。考內經治肝之法。不外辛以理用。酸以治體。甘以養之。今肝陰素虧之體。驟加暴怒。病已決旬。液涸陽亢。急急鎮固收攝。猶慮弗及。閱所服諸方。僅以泄肝。用平肝為事。膚淺膚妄。一至於此。不知補法。都以子母相生同治。蓋壯水則木。

得滋榮陰充則風陽自熄。醫不師古。倘敢稱虛道實耶。

生地 阿膠 麦冬 人參 金泊 生雞子黃

謝 濕熱傷陰。心腹中熱。浮陽升降。真衄汗出。遺精便難。此因濕加病。久臥氣機亦鈍。食入難消。然調脾胃一藥。皆氣勝助燥。施於液虧體質。於理有悖。

焦穀芽

生地炭

炒知母

製首烏

鱉甲

白芍

服二劑後接服後方 豉露

人參

麥冬

鮮生地

北五味

鹿茸

補骨脂

家韭子

蛇床子

生兔絲子

遺精溫養
痰飲文脉
通攝

汪 矢遺漫溺淋瀝三年。下焦常冷。脊膂腰腿瘦楚如墜。此腎臟虛寒。但填精固濶。多進不應。是督任二脈失司。粘膩濁藥。未能走入奇經。倣孫真人九法中采用。鹿茸 补骨脂 家韭子 蛇床子 生兔絲子 覆盆子 金櫻子 瑣陽 生杜仲 炙草 茯苓 黃精 羊內腎 青蘚 共為丸。

將 病已三載。仍然能寢能食。諒非腑臟虛損。自述冷氣或聚胸臆。或竄肋腸。水飲下咽。汨汨有聲。氣得下降。宛若病去。此必支脈結飲。久又阻遏氣隧流行。決非重墜攻逐。以及溫補。膩濁可治。蓋絡脈為病。非半身偏。以開鬱議宣通氣血方法。降香 枇杷葉 麝香 橘紅 蘇子 桔梗 汝仁 桑葉 淩薑渣。金 動氣兼有遺精。已是下焦陰陽虛損。况父病欲進溫養。必須通攝。桂附氣雄而剛。非下損藥也。

淡蕪蓉

補骨脂

胡桃肉

生菟絲子

覆盆子

家韭子

舶茴香

茯苓

安

脈小數色蒼

心痛引背

腸肋皆脹

早上牙宣

頭血

夜寐常有遺洟

此形質本屬木火

加以情性動躁

風火

內燃營陰受劫。故痛能進食。歷來醫藥治痛。每用半溫香氣。破泄真氣。不知熱勝液傷。適令助其躁熱。是經年未能痊期。議以柔劑熄其風。緩其急。雖體質病情。必有合竅之機。

細生地 冬溫陽肺
胃津液

細生地

阿膠

牡蠣

女參

丹參

白芍

小麥

南棗

季 秋瘡愈未復。原冬季連次感觸溫邪。老年平素有痰嗽本恙。溫動燐肺氣。劫胃汁。致痰多嗽甚。微嘔。脉散條熱。右脇常痛。大色升於右頰。由胃津漸傷。肺不主降。而升騰莫制。古稱肺乃柔金。胃為陽土。已經百日纏

綿開提半屬苦辛。辛泄肺氣苦再傷胃致不思納食。議甘藥濡胃潤肺。胃汁自充。肺氣自降。土旺生金。古賢之定法。

玉竹

麥冬

花粉

甜杏仁

橘紅

蔗漿

秦老年腫脹四肢俱冷。皆陽氣衰憊。濁陰僭踞。蓋脾陽主運。腎陽司納。今食入愈脹。二便不爽。中下之陽消乏。豈可小視此病。炮黑附子。

淡乾薑

生白朮

生厚朴

茯苓

澤瀉

尤

由肝氣升舉犯胃。胃逆不降。幽門不通。旁趨為脹。數月久延。氣分已入血分。

桃仁

郁李仁

降香

川棟

山梔

嚴

兩寸脈獨搏。不飢不食。上焦氣分之阻。時當仲夏。必有溼熱客氣內伏。

半夏

瓜萎皮

滑石

黃芩

通草

杏仁

(中風)

牛黃清心丸

通草

杏仁

此藥專治痰厥。昏暈不醒。口噤痰喘。及小兒驚風發搐。五癇等症。極效。

膽星一兩

炒白附子一兩

鬱金五錢

川烏一兩

包煨

半夏一兩

硝湯泡五次。每次良藥湯泡一次。頭煎為末用之。

右五味共

為細末。用臘月黃牛膽三個取汁和藥。仍入膽內。紮口掛風簷下。至次年取膽內藥一兩四錢。加度過芒硝水飛辰砂硼砂各一錢。冰片麝香各一分研極細末。和在一處。稀糊為丸。如芡實大金珀為衣。薑湯化下。治暴仆瘓涎壅塞。竹瀝一盞。薑汁五匙。調入白芥末一錢。灌下。

治筋骨疼痛如夾板狀不可忍者。用驃子修下蹄爪甲燒灰存性研末或黃酒或湯調服立愈。

治癰瘍秋方

熟牛骨髓

熟白蜜

一肋半

火燄過

炒白麵

一筋半

炮薑末

三兩

九細鳴黃酒下大效

又

威靈仙

蒼木

牛膝

桂枝

木通各一

右為末。黃酒五助煮一炷。杳早

晚服

治雞腳風。手足及指。拳攣如雞腳狀。疼痛不時發者。當從鬼眼灸之。左右膝骨蓋下。兩邊各有小窩。共四穴。謂之鬼眼。各將薪艾炙三次即愈。愚謂以鹽瓦塗雷火針刺四穴亦效。

(補益)

奇想補心丸 柏子仁二兩去皮為末 白朮一兩炒 生地一兩
當歸一兩 紅棗肉三兩熟 右煉蜜為丸。每服百粒。日後百病消除。

棉子丸 烏鬚黑髮。緩腎種子。陽虛人宜服此藥。用棉花子十數粒用滾水泡過放蒲包內悶一炷香。取出曬裂。先去仁。井去外皮。用淨仁三粒壓去油。用火酒三兩泡一夜。取起蒸三炷香曬乾。故紙一張。泡一夜炒乾。杜仲一兩。去外皮及黃酒泡一晚。杞子一助。黃酒浸蒸晒乾。夜晒乾。薑汁一杯炒去絲。共為細末。蜜丸桐子大。每日服二錢。

養元固本暖腰方

廣木香 真川椒

大茴炒 故紙

升麻各一兩 川附子五錢

斬父助 丁香四錢 上

右為末入腰子

肉桂 川棟子各一兩

先將艾燭軟次以各藥為末。和勻用綾絹做暖腰入藥盒行腰上。著肉者神妙。

腰痛神方 雄豬腰子一付。銅刀破開去中間血膜及外邊油膩。

青鹽炒二錢

大茴半錢

當歸半錢 杜仲五錢去絲

右為末入腰子

內放磁器中過一宿。明日早用韭菜上下鋪蒸熟。用火酒洗去藥末。將腰子用銅刀切片。好陳酒空心送下。

多年者吃五六付。乍起者一二付即愈。

又 杜仲

補骨脂 牛膝 香附各三錢

青鹽半錢

將雄豬腰子

二對竹刀剖開去筋絲。每個內外拌藥用溼草紙包灰火煨熟。去藥酒下一醉即愈。

治下部無力 雄豬肚一個

紅棗肉半斤 蓬肉四兩 茯仁四兩

將糯米半升填入肚內。好酒一鍾。醬油少許。煮

熟。每日切幾片空心好酒下。

長春方 治腎虛精冷之症

烏鵲成珠極焦炒一助。當歸八兩

棉花子一助。去仁去皮。白蓮鬚八兩

金櫻子一助去毛

川石斛八兩

沙蒺藜四兩

杞子六兩

菟絲子四兩

五味子四兩炒

將鹿角五助鋸薄片。河叉煮三盡。夜去角取汁。

教膏和藥末。為九桐子大。每服三錢。

歸國酒方 甘菊花八兩

杞子一助當歸八兩

龍眼肉三兩

右藥將火酒三助酒釀十助。泡二十日用。

二仙酒方 燒酒一鐘。十助入龍眼肉一助。桂花四兩。白糖八兩。將泥封固。愈久愈佳。

(癆)

治吐血勞症

桂圓肉

紅棗四個

蓮子二兩

小黑豆四十粒

水二碗煎一碗空心早服連藥吃完為妙。

治虛勞咳嗽吐血肺痿肺癰吐膿血垂危者服之即愈。用艾白細根約三四兩搗碎將真陳酒煮絞汁每日

服一二次至一二十日即愈。

治咯血吐血癆久不止。

雪梨六十隻取汁二十杯生地黃根蘿蔔各取汁十杯蘿蔔麥冬各取汁五杯將六

汁煎

煉入蜜一斤

飴糖八兩

薑汁半杯再熬如稀糊

則成膏矣

每日用一二匙

治酒癆吐血

用雞距子一兩

水二鐘煎一鐘

不拘時服渣再煎服服至數十日愈。

(盜汗)

治盜汗方 蓼子七粒

黑棗個

浮麥合

馬料荳一合

用水一大碗煎八分服三劑愈

又方 黃芪

馬料荳二味

煎服半月愈

又 五倍子去蛀

乾研末男用女唾女用男唾

調厚糊填脣中外用舊膏藥貼之勿令泄氣兩次即愈。

止汗方 黑荳錢

浮麥錢

烏梅個

煎湯服

(咳嗽)

治發嗽諸虛寒驗方 蘿蔔汁

梨汁

蘿蔔汁

人乳

薑汁

白糖

沙糖

童便各四兩

將八味放磁瓶

內用炭火熬煎去刺一肋為止。每日空心白滾湯送下四錢服完即愈。如能常服則精神強健永無虛損。

治小兒吼嗽併大人咳嗽屢驗方

款冬花錢

晶糖五錢

將二味放茶壺內泡湯當茶吃自然可愈。

治小兒天哮一切風溼燥熱咳嗽痰喘兼治大人。

海浮石淨末

飛滑石淨末

甜杏仁淨末

薄荷淨末

右為極細末

每服二錢

用百步煎湯下

治瘧火骨蒸吐血不止之症重者

十服八服即愈

人參

天冬

麥冬二味去心

失念五

古二粒去

五更二枚

直方六粒

一三

一三

一三

大班林 挑去心
治痰火方 咳嗽吐痰面鼻發紅者。一服即愈。

青黛水飛極細曬乾

蛤粉錢

二味

煉蜜

為丸如指頭大。臨卧口噙三丸。其效如神。

治痰火方 大神水方 一名玄霜 黑鉛一觔。研成一薄餅。中穿一洞。以繩繫之。將好米醋半甕。即以鉛餅懸掛甕中。離醋約一寸許。甕口用皮紙簽子紮緊。再以磚石壓之。勿使泄氣。放屋下陰處。待數日取起鉛餅。上有白霜拭下。每鉛一觔。取白霜二兩為止。其霜溫厚隔。每服五分。噙口內。以白湯送下。若治痰火咳嗽。每服三分。照前法服。

治痰火方 枇杷葉五十葉。去淨毛。水五十杯煎至五六杯。再重湯嫩至三四杯。每藥三茶匙。用蜜一茶匙調下。立愈。

治老人上氣喘急。喉不得卧。生薑汁五兩。黑砂糖四兩。用水煎二十沸時。服半匙。漸漸熱之。

治喘 瓜萎一個。明礬桑大一塊。同燒存性。研末。以熟蘿蔔醃食。藥盡病除。

[吐血]

治吐血不止。用碗盛清水。吐血在內。浮者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉心血也。各隨所見。以羊肺肝心者烹。蘸白芨末。日日吃之。或只用白芨為末。米飲調服亦效。

治吐血方 吐血者偶吐一二口。或不時吐之。側柏葉濃煎。和童便常服之。

又 用鷄腳為末。入炒蒲黃血餘灰等分。調服之。奇效。

又 用雞子一個。打開和三七末一錢。搗汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟食之。不過兩三枚自愈。

[赤白二濁]

治赤白濁 蘭治夢遺。名將軍蛋。生大黃分。生雞子個。將雞子頂尖上敲損一孔。入大黃末在內。紙糊者。熟空心吃之。四五朝即愈。神奇秘方。

治色慾過度。精濁白濁。小水長而不痛者。并治婦人虛寒淋帶崩漏等症。生龍骨飛。生牡蠣水。生虎掌。

粉 生韭菜子粉 右四味各等分。不見大研末。生乾麵冷水調散為丸。每服一錢。六七服即愈。

治白濁 用頭生雞蛋五枚。開一小孔。每個入生白菓肉二枚。飯上蒸熟。每日吃一個。即愈。

治遺精滑失 白龍骨 研細一兩 韭菜子炒一右為末。空心陳酒調服二錢。

小免絲丸 治女勞夜及遺精。白濁崩中。帶下諸症。石蓮肉 二兩 白茯苓 二兩蒸 兔絲子 五兩酒浸研 右為細

末。山藥糊為丸。桐子大。每服五十九。加至百丸。或溫酒或鹽湯下。空心服。如腳膝無力。木瓜湯下。晚食前再服。此方治遺精之聖藥。屢用屢效。但石蓮子陳久者難得。

治精氣虛滑遺不禁 龍骨 蓼蕡 茱萸 烏梅肉 各等分為末。用山藥丸如小豆大。每服三十九。空心服。

治遺精方 文蛤研細末。以女兒津調貼臍內立止。

治一切淋閉白濁。因火結壅中。滑痛。新鮮以仁根搗爛絞汁一碗。或滾酒或滾水冲入。空心服二三次。必效。思仙丹 治陰虛火動。夢遺神方 蓼蕡 十兩 石蓮肉 十兩去內青 茱萸 十兩去壳 右為末。再以金櫻子三粒。去毛子水潤淨。入大鍋內。水煎濾過。再煎。加飴糖和匀。煎藥丸如桐子大。每服七八十九。

(鹽)

治五臟神方 蘿蔔子

四兩用巴豆十六粒同炒

牙皂 兩五錢根去殼

沉香

威靈草 四兩大酒煮切片炒

大黃 一兩酒炮

琥珀 兩 右

共為末。每服一錢。隨病輕重加減。雞鳴時熱酒送下。薑皮湯亦可。後服金匱腎氣丸調理收功。

治水臌腫脾 輕粉 一兩巴豆四錢去油 生硫黃 一錢 右研末。做成餅。先以新棉一片鋪臍上。次以藥餅當臍按之外。以帛縛之。如人行五六里。自然瀉下。候五六次。除去藥餅。以溫粥補之。久患者。隔日方取去藥餅一餅。可救二十人。其效如神。愈後忌飲涼水。

治水臌方 陳芑種 去蕩旋灰存性五分 千金子 二分半去油壳 滑石 二分 共為細末。以麻皮色滾水送下。十服全愈。

治水臌氣臌方 治黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚剖開。去盡腸。入好黑礬五分。松蘿茶三錢。男子用蒜八

瓣。女用七瓣。共入魚腹內。放在磁器中蒸熟。令病人吃魚。連茶蒜吃更妙。此藥從頭吃。病從頭上消起。如從尾上吃。起即從腳上消起。立效之仙方也。

治氣臌方 將大蠅墓一隻破開。用大砂仁填滿腹中。黃泥封固。炭灰煅紅冷定。去泥研末。陳皮湯調服。放屁即愈。

治氣臌氣脹方 蘿蔔子二兩。搗研以水濾汁。用砂仁一兩。浸一夜。炒乾又浸又曬。凡七次為末。每米湯送下一錢。立效。

治臌脹方 四五月將黃牛糞陰乾。微炒黃香為末。每服一兩。煎半時。濾清服之。不過三服即愈。

解脹敷臍方 治一切臌肚飽發虛。大田螺一個。雄黃一錢。甘遂末一錢。麝香分。先將藥末用田螺搗如泥。以麝置臍放藥臍上。以物覆之。束好。待小便大通去之。重者用此相兼。小便大通。病即解矣。

治中滿脹 蔊蘆一個。要三五年者佳。以糯米一斗。作酒待熟。用葫蘆瓢於炭火上炙熱。入酒浸之。如此五六次。將瓢燒存性為末。每服三錢。酒下。神效。

治臌脹方 雄豬肚子一個。入大蒜頭四兩。加小核柳砂仁末三錢。木香二錢。砂鍋內河水煮熟。空心服。豬肚立效。

又 取舊葫蘆一個。浸糞坑內一月。取起掛長流水中三日。炒黑為末。每兩加木香末二錢。每日空心砂仁湯送下二錢。

治肝氣方 烏梅二錢。鮮橘皮三錢。青鹽二錢。真川椒錢。右藥空心服。

(痞塊)

治痞塊方 不問男女左右。纖痕積聚癰瘡。收取水紅花。即水半老梗頭。連葉蒂子曬乾。不拘多少。量用者。蒜頭去皮膜。同放石臼內打爛。搗成餅。曬乾為末。每丸入蛤子壳細研粉四兩。再將老蒜打膏為丸。桐子大。每服百丸。空心食後白湯下。一日三服效。

治大人小兒痞積 將水紅花子為細末以麵和作一處少加麝一釐放痞上以熨斗烙之數次即愈。

又 水紅花子敷膏入麝少許貼之亦效。

治痞塊 用水紅花新鮮者同老蒜打爛量入皮硝一二兩搗成餅比痞塊大一圓放活上用祫緊繫待乾再瘡則痞亦消。

又 紅芥菜子即猪血芥不拘多少生薑汁浸一夜大約芥子一酒杯加麝香一錢阿魏三錢同搗極爛如膏藥。

攤青布上貼患處外用汗巾紮緊一宵貼過斷無不消。

又 名藥豬泡 麝香錢一錢阿魏三錢水紅花子大黃歸尾甘遂急性子甘草錢各五右為細末用豬水胞一個量痞塊大小用尿胞大小裝入乾燒酒半胞將前藥末放入胞內緊紮住口用白布將胞兜紮於患處俟塊化盡即去之不可遲也。

治痞塊八反膏 鯉頭 茄菜 葱 瓣 甘草 甘遂 芫花 海藻 阿魏 鱖甲 水紅花子 右應為末者為末應搗爛者搗爛入末再搗如和不勻加燒酒調之先以水調白麵作圈圍痞上大六七分厚其藥敷在痞上外用錫注二把放燒酒在內熨痞上冷則更換至痞內動痛方止明日大便下膿血即除根治氣癖在小腹上攻衝心痛 用穿山甲片土炒脆為末砂糖調陳酒送下每服三錢止痛如神如不能飲糖酒調亦可。

化癖膏 治塊如活蟹能行動諸藥不效者 每日空心將龍花三四五匙冲熱陳酒內服至十日即不動服一二月即消盡矣外用敷之。

治大人小兒癖塊方 甘草 甘遂各三 硬砂錢一木鱗子四個

錢一

錢一

錢一

錢一

錢一

錢一

錢一

錢一

錢一

少許搗成膏以狗皮攤貼如藥乾用葱蜜潤之二次即消。

治癖塊方 腹中攻痛面黃肌瘦者愈有應驗

真陳阿膠

一兩蛤粉

研細

九製陳膽星

五錢人乳浸

微火烘研

川貝母

以上五味共為細末

用無臍真柏油二兩

火鎔開後

去心

麝香四分忌

鯉甲

三個必要九晉七者骨

佳真麻油炙晚黃研

入前藥末在內攪和。每服用乾腐衣溫水浸軟。取乳腐大一塊。包藥約一分五厘。刀拗滾湯飲。治寒氣下。

清晨服三包。飯後服三包。不必多服。柏油用三兩亦可。極重者兩料必愈。

治傷寒結胸停食方 陳香糟六兩 生薑四兩 水菖蒲根兩 鹽兩

右炒熱為餅敷胸前。以火熨之。內嚮即去。如口渴任吃茶水。待大便利下惡物即愈。

治腹內虫痛方 烏梅一個 老薑二片 椒子十粒 花椒十四粒 右加黑糖少許。煎服虫盡出矣。

〔膈〕

治膈食脹方 五六月用老生薑二三肋或四五肋放在竹簾內。或麻布袋浸在糞缸內七日。取出洗淨。竹刀刮去皮切片。空中弔著陰乾為末。每服三錢。火酒調下。不過三服即愈。

治一切痰膈食膈方 黑砂糖一兩 連皮老生薑一肋 將二味共搗如泥成膏。入磁罐內。封固埋乾燥。消黃

土地內七日。取出每日和滾水服之。

繆仲高秘傳膈噎膏 人乳 牛乳 茄漿 梨汁 薑根汁 龍眼肉濃汁 薑汁 人參濃汁 右七味俱等分。惟薑汁少許。隔湯熬成膏子。下煉蜜徐徐頤服之。其效如仙丹。更須心安氣平。勿求速效。又 好陳酒一斤 米糖兩錢 貝母錢二錢 砂仁二錢 廣木香二錢 廣陳皮二錢 右咀片。入磁瓶內。箬葉緊裹。上放米一撮。重湯煮。以米熟為度。每日清晨服一大杯。藥完病痊。

又 糖坊內上好糖糟一觔。加水薑四兩。先將糟打爛。和薑再搗。做小餅。曬乾放磁瓶內。置竈煙櫃上。每日清晨將餅一枚泡滾水內。少停飲湯。已經屢試屢驗。

治噎食 生薑汁 生薑汁 雪梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁 蜂蜜 白藥汁 竹酒 右各一盞。和勻飯上蒸熟。任意食之。

治翻胃膈氣 此症必起於腸枯血燥。大便三四日一次。糞如馬糞。若如羊屎者不治。口常吐白沫者不治。牛乳 羊乳 人乳 不拘分量。適宜常服。生血潤腸之妙藥。

又 青州柿餅五六枚。飯上蒸熟食之。不用湯水。常服即愈。

治噎膈氣不通方 用雞喙燒研。入木香丁。沉香。紅棗九服。

治膈氣暫開闊方 用荔枝一個去核。將蟻蛭一條放在荔枝肉內。將冰片三四釐。撒在蟻蛭上。即將荔枝肉裏好。仍放在荔枝壳內。紮好。即令病人含在口內。有冷涎水滲出。可徐徐咽下。俟一時許。蟻蛭即化完。亦無水滲出。令病人連壳吐去。只服一次。可以立進飲食。逾四五月。但不可病人知之。恐其穢不肯吃也。

〔便閉〕

五子丸 治老人大腸燥結等症。火麻仁 紫蘇子 松子肉 荔枝肉炒去 芝麻炒 共研如泥。磁器收貯。每服一丸。彈子大蜜水化下。

治大便不通 皮硝三錢水 香油一盞。皂角末五分。右三味入豬胆內。在用竹管一頭入胆口內。用線繫緊。一頭入穀道內。用力將猪膽一擠。其藥入臟。立通。治大便燥結 用雞子白一二枚。生食即愈。

治老人大便艱澀方 熟地炭

山藥四分

山萸肉一錢

茯苓一錢

丹皮錢

澤瀉錢

人乳半

白蜜錢

先將六味煎湯去渣。後入人乳蜜煎一沸。空心溫服一二劑愈。

治小便不通 獨瓣大蒜一個。梔子二十個。鹽匙共搗敷臍中。良。即開。若不通。敷陰囊上。立愈。

治中暑大小便不通 用田螺三枚。搗爛入青鹽三分。攤成膏。貼在臍下一寸。即愈。

〔風寒溼痺〕

治太陽風寒頭痛。及半邊頭痛。生薑三片。將桑皮紙好水溼。入灰火中煨熟。乘熱將印堂兩太陽各貼一片。以帶經之。立愈。

治半邊頭痛 因風寒而起者更效。肉桂心一分。麝香二分。人言釐 北細辛半分。半夷半分。胡椒粒一錢。共為末。用東肉搗丸。如豌豆大。一粒放膏藥中心。貼准太陽穴內。一日日效。如壯年火盛者。愈後服黃芩大黃。泻火即日自愈。

又

白芷

細辛 石膏 乳香

去油 没藥

去油

右等分爲末。吹入鼻中。左痛吹右。右痛吹左。

此治暑天甚怕風。亦欲綿裏頭極重之症。用鴛兒不食草陰乾。將上好燒酒浸一宿。日間曬乾。晚間又浸。如此七次。若右邊痛。將此草塞右鼻。左痛塞左鼻。約一時許。鼻流冷水。盡即愈。

治箭風方 俗名鬼箭打。或頭項手足筋骨疼痛。半身不遂等疾。照方一服即愈。真仙方也。

山甲

一錢

白薇

二錢

澤蘭

三錢

照分量好酒煎服。

治一切麻木痺症。痛風。歷節。虎骨。木通煎湯。煩熱多汗。即愈。

治痛風 厲節四肢痺痛。用醋磨硫黃敷之。或用葱白杵爛炒熟熨之。

又 紅花 白芷 防風

各五錢

威靈仙

三錢

酒煎服。取汗三服全愈。

治脚氣 足疾。腫痛。拘攣。川牛膝 威靈仙 各等分。爲末。蜜丸。每服五十九空心服。

治癰方 真茅山蒼朮五筋。洗淨泥垢。先以米泔水浸三宿。用蜜酒浸一宿。去皮。用黑豆一層。拌蒼朮一層。蒸

二次。再用蜜酒蒸一次。用河水在砂鍋內熬濃汁。去渣。隔湯燉。滴水成珠為度。每膏一觔。和煉蜜一觔。白湯

調服。一老人專用此方。毒至八十餘身。輕體健。其於少年。

治風寒溼痺藥酒方 川羌錢 川桂枝錢 歸身半錢 秦艽錢 金毛狗脊

錢半

虎骨

錢半

防風

錢

杜仲

錢二

川斷錢

川芎八錢

晚蠶沙

錢一

熟附子

錢一

加桑枝三錢

生薑一大片

大棗二枚

陳酒二觔

浸

煎服。

治溼氣初起法 嫩松枝 小松秧多少

將一味入石臼內搗爛。

傾入陳酒。絞取濃汁。燉熟。隨量飲醉醒時。

痛即止。多飲幾次更好。

七製松香膏 治溼氣第一神方 松香

助第一次薑汁者

第二次葱汁煮第三次白鳳仙汁煮第四次燒酒

者第五次鬧楊花汁者第六次商陸根汁煮第七次紅醋煮桐油

三川烏

草烏

蒼朮

官桂

乾薑 白芥子 草麻子

以上各四兩

血餘

右八味共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠濾去渣入牛皮

膏四兩烊化用煎製過松香漸漸收之離火加樟腦一兩。好麝香二錢。厚紙襯之貼患處神效。

九製松香膏 名九汁膏 上好松斤香三觔用清水煮烊。拉拔過傾去水。再換水煮。再拉拔換水。如此以十偏為度。將松香研末。用薑汁葱汁白鳳仙汁燒酒鬧楊花汁茵陸根汁韭菜汁童便。挨次將松香拌浸透。乾作八次製過。其第九次將好醋少許。不可多。再拌松香曬乾研極細末。川烏 草烏 蒼朮 上肉桂。再熬。先入廣膠四兩。俟溶化後。將製過松香末篩入收之。離火入樟水一兩。待冷入麝香二錢。攪勻收貯。貼神效。

見晚膏 專治風寒溼氣。骨節疼痛。筋節痛。風瘡。瘻。麻木不仁。鶴膝風。偏頭風。漏肩風等症。並治跌撲閃剎等。

傷陰症無名腫毒已破爛者勿貼。小兒孕婦勿貼。活短頭髮

曬乾二兩用壯年入荆下者

大黃 靈仙 雄鼠糞

各一 川烏 草烏 劉寄奴各八 土鳖蟲大者三

十個

羌活 獨活

紅花

蛇牀子

蒼朮

當歸

生南星 生半夏 白芥子 桃仁

各五 各五

右十八味俱切碎

樟米

一兩

廿松

山奈

花椒

猪牙皂

山甲

研

華撥

沒藥

以上各三錢不必去油同乳香矣熱同眾藥研細

乳香

錢

白芷

五錢

右十味極細末

新鮮烟葉汁

半觔松香

新鮮艾葉汁

半觔松香

白鳳

仙花汁

半觔松香

老生蠅汁

半觔松香

葱汁

半觔松香

韭汁

半觔松香

大蒜汁

半觔松香

用足

秤秤麻油

二觔

四兩

先將頭髮入油熬半炷香

再將前藥入油熬至焦黃色

不可太枯

即濾去渣

入前松香

熬化

再將絲棉濾去渣

再熬至油面起桃花紋

先加入極細蜜陀僧

四兩

再徐徐加入好西硫黃末一觔

投此二味時務須慢慢灑入

不可太多太駭

以滴水成珠離火待溫

然後摻入細藥攪勻

磁器收貯

熬時須

用桑枝不住手攬青布攤貼

每張滿藥重四錢

臨時加肉桂末五錢

細辛末二錢

集寶瘡瘍膏 川烏 草烏 南星 半夏 當歸 紅花 羌活 獨活 大黃 桃仁

各四

山甲

一兩

白芷

五錢

肉桂

一兩

麻油

一觔

葱汁

一碗

薑汁

一碗

松香

一兩

陀僧

二兩

硫黃

一觔

白芥子

乾

草烏

四兩

血餘

兩

另用桐油

三觔

浸藥

春五夏三秋七冬十日

熟枯濾去渣

再熬

先入廣膠

四兩

俟溶化後

將製過

松香末

篩入收之

攤

貼神效

藥血竭 胡椒樟水細辛牙皂末各二錢。若加商陸根鳳仙閣楊花鮮烟葉鮮赤朮等汁更妙。

摩腰膏 治老人虛人腰痛。婦人帶下清水不臭者。虛寒者宜之。

附子 川烏 南星

川椒 雄

黃 檀腦 丁香各錢半
乾薑錢一

麝香分右為末蜜丸連子大用生薑自然汁化開如摩蘸手掌上

烘熱摩腰中痛處即以燒帛紮之少頃其熱如火每日飯後用一丸

摩風膏

治風毒攻注筋骨疼痛

草麻子一兩淨肉研

川烏頭一兩生去皮

乳香錢半

右以猪油研成膏烘熱

塗患處以手心摩之覺熱如火效

治寒溼氣方 真白芥子研爛陳石膏醋調攤厚雙皮紙上做夾紙膏以針鑿密刺孔先將新棉花薄薄鋪一層放在患處然後將夾膏貼在棉花上片時即似火燃熱過即揭去棉花以薄為妙此膏不可預製須要臨時調合攤就即貼

(針灸)

雷火針 治風寒溼毒留住經絡痛腫不散者

蒼耳子肉桂去

乳香 没藥各三

羌活 川烏 穿山甲

土炒

丁香 蘇香 茯苓 黑附子 猪苓 澤瀉 大茴香 白芷

獨活 廣木香 肉桂各一

右

共研細末和勻先將薦艾捲綿用紙二層鋪於上捍薄以藥末捲上要極密外用烏金紙捲緊粘固兩頭用線紮緊用時以手擦患處用黑點記將針在火上燒者用紅布二三層鋪於痛處針之

又 蘭父一兩松熟成蜜
辰砂錢 乳香 没藥 雄黃 桃樹皮 川烏 草烏 硫黃 山甲錢一
右為細末作針接穴針之忌尻諸神值日

分五

右為細末作針接穴針之忌尻諸神值日

三氣合痔針 乳香 沒藥 牙皂 羌活 獨活 川烏 草烏

白芷 細辛各五

肉桂 蒼朮 雜

川烏 草烏 檀香木 降香木 大月母

黃 硫黃 山甲 檀冰錢一

麝香分三 父誠錢

作針

百發神針 治偏正頭風漏肩鵝膝寒溼氣半身不遂手足癱瘓痞塊腰痛小腸疝氣癰疽發背對口癰核初起不破爛俱可用各按穴針之

蜈蚣一條

木蠍

五靈脂 雄黃 乳香 没藥 生川附子 血竭

川烏 草烏 檀香木 降香木 大月母

麝香錢三

母丁香四十粒

浮蘄父綿或一

作針

消癰神火針 蠕蚣條 木鱉 五靈脂 雄黃 乳香 没藥 阿魏 三稜 蓬木 甘草 皮硝各

鬧楊花

硫黃

山甲

牙皂錢各二

麝香錢二

甘遂分五

艾誠兩

作針

陰症散

針 乳香

沒藥

羌活

獨活

川烏

草烏

白芷

細辛

牙皂錢五

硫黃

山甲 大

貝 五靈脂

肉桂

雄黃錢各三

蟾酥分二

麝香分三

艾誠半兩

作針

香硫餅

治寒溼氣

麝香鐵

辰砂四錢

硼砂一錢

細辛

俱為細末

角刺鐵

川烏尖

二味俱用黃酒半助者乾為末

硫黃六兩

右先用硫黃角刺川烏入桐杓內火土化開再入前四味末攪打澆在乾淨土地上候冷取起

打碎成黃豆大用時以乾麵捏成錢大比錢薄些先放在患處置藥一塊在上以香火點着連灸三火即愈

蒸法

治腿膝疼痛

風寒溼三氣傷於足膝

名為足痺

川椒杞

葱莖三大

鹽杞

小麥麩麵四五升

右用

醋和溼潤得所炒令極熱攤卧椅下將所患腿腳就臥董橐薄衣被蓋得汗出勻遍約半個時長待一兩

個時辰覺汗消解勿令見風立效

熨寒溼痺痛麻木不仁妙方

川烏 草烏 菖蒲

甘松

山柰錢各五

右為末炒熟布包熨痛處神方

尉背法

治胸背疼痛而悶因風寒溼而起者

肉桂心 附子

羌活

烏頭

細辛

川椒各錢半

川芎

歲 右共為細末以帛包之微火炙令暖以熨背上取瘥止為度

增補臨證指南醫案指

卷八

黃疽

癰癰

溺血

目癰

癰疽

諸丹毒

代針點頭

雀斑

小兒門

婦人門

雜症

急慢驚風

胎前

初生

疳積

痘瘡

河白

瘡氣

鼻瘡

疔瘡

無名種毒

長肉收口

疔瘡

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

中暑霍亂

泄瀉

心口胃脘痛

口瘡瘍

瘡瘍結毒

跌打損傷

麻藥

雪口

產後

經帶

脾風

消渴

吐逆

下疳

舌瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘧疫

脫肛

欬逆

牙中毒

提藥

諸風

稀痘方

血崩漏

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡漏

耳瘡瘍

咽喉瘡瘍

降藥

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍


瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍

瘡瘍



臨證指南種福堂公選良方卷八

葉桂天士先生論

全人公較

〔黃疸〕

治疽神飲。將茵陳草煎濃湯。每日以多吃數為妙。要忌葷腥魚肉。并忌鹽味而淡食。則能速愈。此草真治疽神藥也。若腹中不快。量加神曲麥芽同煎服之。更無他藥功能勝此者。若小便不利。或以車前子湯同煎。或用瓜蒂根打汁碗許服。連服更效。

劉黃胆方。雄鯽魚一個去頭骨至

胡椒十粒止研細

麝香三分

右二味同春蠶麝香另加。不必同春蠶

粘染白上。將蛤蜊壳填滿。合於病人臍上。用絹縛緊。一日夜即愈。

〔河白〕

治河白良方。將梔子黃同雞子白飛麵搗成餅貼臍內。再以茵陳草通草甘草燈草煎湯服之。
名四草湯。

〔中暑霍亂〕

治中暑昏眩。煩悶欲絕急救方。取田中乾泥做一圈。堆在病人肚上。使少壯人撒尿於泥圈肚臍中。片時即得生矣。甦後不可飲冷湯。須進溫米湯。又挖地深三尺。取新汲水傾入坑內。攪濁飲數碗即愈。

治中暑法。用大蒜一瓣。同新黃土研爛。以新汲水和之。濾去渣灌入即活。凡中暑傷者。不可便與冷物。俟稍甦。方可投冷物。則中氣運動無患也。

治傷暑霍亂神方。綠瓜葉一片。白霜梅肉一枚并。右同研極爛。將新汲水調服。入口立瘥。切不可即飲熱湯。

又取扁豆葉搗汁一碗。飲之立愈。

治傷暑急暴霍亂吐瀉方。陳皮

藿香各五

右用土澄清水二杯煎一盃服之立愈。

急救霍亂吐瀉。抽筋危症方。不問轉筋霍亂令人僵卧。將膝下腕內。以手蘸溫水輕輕急拍。直待紫紅筋現。起用磁鋒刺出血立愈。此名委中穴在膝後對面。

治乾霍亂煎方。

上不得吐。下不得瀉。身出冷汗。危在頸刻者。

食鹽一

兩 蓋五錢

切片 同炒變色

以水一大碗

前腹吐出自愈。不可熱服。好後切不可遽吃飯食。俟餓極後方可吃稀粥。

治乾霍亂方。只一樣腹痛絞痛。不可忍。都切不可吃藥。并熱湯水。一吃即死。將冷水一碗。調入食鹽二三錢。

吃了吐則再吃。多吃多吐。則邪散而愈。

消渴

玉泉散 治消渴之神藥也。

白粉 甘葛 天花粉

麥冬 生地 五味子 甘草 糯米

右服一劑

冰片 分

硼砂 錢

共研極細為丸每含一丸

還津丸

生津止渴。霜梅

烏梅各二十五個俱去核

蘇薄荷末一兩

冰片半分

硼砂半錢

共研極細為丸每含一丸

津液立至。

消渴潤燥方。

白蜜

人乳酥各一

右溶化一處。每日不拘時服。

消渴方 用織絲湯飲之。

瘧疾

辟瘟丹方

此藥燒之能令瘧疾不染。室房內燒之可辟穀惡。

乳杏

蒼朮

細辛 川芎 甘草

再加檀香一兩。亦可共研細末。粟肉為丸如芡實大。

神聖辟瘟丹。

蒼朮倍用 炙活

獨活 白芷 香附

大黃 甘松

山柰 赤箭

雄黃各等

右爲

木麵糊丸。如彈子大。黃丹為衣。曬乾焚之。

治大頭瘟方。

頭面腮際腫脹極大。寒熱交作。甚者崩裂出膿。不可敷藥。恐邪氣入內。以至於死。

人中白即馬

下屎垢也。

火煅研末。每服二錢。白滾湯調服。又

將好青黛末

調服二錢。

又 只用馬藍頭一把搗汁。將鵝毛搽上。一日五六次。熱氣頓出。就驗。真神方也。

治抱頭火丹。

即大頭瘟。

將扁柏葉搗爛。用雞子清調敷神效。

治鷄溫方。兩腮腫脹。憎寒惡熱者。外用赤豆半升為末。水調敷。或用側柏葉搗爛敷之。內用薄荷濃湯熱服。

(痧)

治痧脹腹痛方。凡痧脹。夏月多患此症。面色紫赤。腹痛難忍。使飲熱湯便不可救。即溫湯亦忌。如遇此症。速取生黃豆咀嚼嚥下。約至數口。立刻止痛平人。食生豆最引惡心。止有痧脹人食之。凡覺甘甜。不知腥氣。此方既可療病。且可辨症。真奇方也。

沉香鬱金散。

治痧氣寒凝。以及腹痛。

沉香 木香 鬱金各一

烏藥錢

降香二錢

細辛錢

右忌見

火生研為細末。每服三分。將砂仁湯稍冷送下。

痧藥方

名火龍丹 牛黃一錢

麝香二錢

冰片二錢

硃砂二兩研飛

華撥一錢

真金箔一百張

大鎗硝兩

硼砂五錢

牙皂一錢

各研極細。端午午時合。如痧脹腹痛。將此藥嗅鼻中。并放舌尖上吃下。亦可。

又名蟾酥丸

雄黃三錢

麝香分三錢

木香一錢

丁香一錢

俱不見火

蒼木錢

蟾酥一錢

山茨姑半

右共為末。火酒化蟾酥為丸。如粟米大。硃砂為衣。如雞丸。少加米飲。每用二三粒。放舌尖上化下。

加入西牛黃金箔。

端午日午時合。尤妙。又

沉香三錢

細研

母丁香一錢

硃砂水

雄黃五錢

廣木香

一兩 膜香三錢

芳山荳木淨末二兩

真蟾酥三錢

右俱忌見火為細末。各秤准分量。將火酒化蟾酥為

丸。如丸不就。少加米飲丸。如粟米大。每服二三丸。放舌尖上化下。

神妙痧藥方。北細辛三錢

荆芥六錢

降香末二錢

鬱金一錢

右共為末。每用一茶匙。放舌尖上。冷茶送下。或津嚥。

白痧藥方 白胡椒一

牙皂一錢

火硝 檀香末

明礬

丁香 蟾酥三錢

以上各

北細辛錢 冰片

麝香各五

金箔量加

(瘰癧)

內消瘰癧痰毒方。未穿破者為痰核。已穿破者為瘰癧。三五個連者為串核。用羊角數對。以威靈仙四兩。共入瓦罐內。加清水煮數沸。候角軟取出。切薄片。用新瓦燒紅。將角鋪上。焙炒過研細。每灰一兩。加廣木香一錢。白芥子三錢。共為末。煉蜜為丸。用楨榔煎湯下。或夏枯草湯下亦可。服至七日後。大便下如黑羊屎。小便出黑水。自消。婦人如燭開兩脇。服之亦效。忌生冷。煎炒房事。

內消瘰癧應驗方。土貝母。白芷各五錢。共為末。糖霜調陳酒下。三錢重者三服愈。

治瘰核方。半夏末川貝末各一分。用雞蛋大頭穿一孔。不破內膜。入藥在壳內。膜外虛空處。如虛人再加人參末三分。和入紙封固。置飯鍋內。蒸熟吃之。每日一個。久之自愈。

又。每雞子一個。入貝母末三匙。照上法蒸熟。夏枯草湯或銀花湯下。

取瘰核法。名提瘰丹。水銀。硼砂。火硝。明礬。皂礬。食鹽各一兩。硃砂二錢。用粗瓦盆放前藥上。

合。粗碗一隻。鹽泥封固。炭火鍊三炷。香先文後武。冷定。取出昇在粗碗上藥。白米飯搗丸。菜荳大硃砂為衣。每用一丸。放瘡上。棉紙封二三層。一日夜急揭起。則核隨紙帶出。丸可再用。

治療癰方。將胡桃一枚。劈做兩半。將一半挖去肉。以蟬脫塞實。對合。用山泥包好。煅存性。研細。陳酒下。每日服一枚。一月愈。

治療癰結核。九真藤即何首烏藤。洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。

蝙蝠散。治療癰多年不瘥。蝙蝠一個。貓頭一個。右同燒灰。撒上黑豆。煅其灰骨化碎。為細末。濕即乾。掺乾。則油調敷。內服五香連翹湯效。

治療核瘰癧方。用鼠糞揀兩頭尖者為雄。兩頭圓者為雌。揀開各臘乾研末。男用雌。女用雄。將雞子一個。頂上打一小洞。傾去白。但存黃。入鼠糞在內。以滿為度。攪勻。用皮紙封固。小洞。飯上蒸熟去壳。臨睡時。桂碎好酒送下。隔一日再服。雖遠年破爛者。不過三四枚而愈。未破者即消。

燕鵲膏。治療癰瘍核。瘡疽發背腫毒。全蝎熬水浸透。流三次。晒乾。漿二兩。白芷。黃連。黃柏。黃芩。當歸。山甲。

各一

生地

赤芍
錢五

官桂
兩

海藻
二兩
五錢洗

番木鱉
五錢切碎

用麻油一觔四兩。浸藥五日熬。

焦黑色去渣。將淨油秤准。每油二兩。用飛淨黃丹一兩。收滴水不散。先入白占一錢五分。黃占三錢。即下黃

丹。再下杭粉一兩。用桑枝不住手攢成膏。候冷入水浸三四日。再用文火溶化。再入

沒藥三錢。阿魏錢

麝香
錢一

血竭
錢二

朝南燕窩泥
五錢

雄黃
錢一

硃砂
錢一

兩頭尖
錢七

白昇丹
錢四

以上各藥為極細末入膏內。攬極勻。用時隔湯浴化。攤貼勿見火。

白昇藥方。

水銀
錢一

皂藥
錢一

火硝
錢一

白昇丹
錢一

以上各藥為極細末入膏內。攬極勻。用時隔湯浴化。攤貼勿見火。

研極細。照昇三白頭法。昇之。

治療癰瘍藥方。

瘡已破。膿正多。瘡正腫。用此敷之。呼膿退腫。

蚯蚓糞
並菜地
上者佳

細芽茶
存性

肥皂核
獨核

敷者假

有性

蟻螂虫
用泥包

壁虎
瓦上
培乾

猫頭骨
矣

雄鼠糞
焰

右各等分。共為細末。和生麻油調敷。每日

清晨用藥湯洗淨敷之。

一日洗五六次。

敷五六次。待膿乾。即用膏藥貼之。

敷瘍核瘻藥方。

生南星

生半夏
各一

海藻
錢三

昆布
錢二

麝香
錢一

冰片
分各二

紅花
牡丹
各二

青

鹽分

右俱生研

極細末。另將白芨兩許。切片煎膏。和煎藥做成梃子。曬乾用時磨敷。

又生南星

生半夏

生大黃
各一

大貝母
錢一

昆布
錢一

海藻
錢一

海浮石
錢一

銅綠
錢一

明礬
錢五

右用商陸

又生南星

生大黃

根汁
葱汁
蜜
四味調敷

又用鉛三兩。鐵器中熬。久當有脚。如黑灰。取此灰和脂塗瘻上。或用醋調塗。以舊帛貼之。數換舊帛。拭去惡汗。又貼。如此半月許。不痛不破。不作瘻。內消為水而愈。

大紅膏。

治瘍核瘻。

不分新久。未穿破者。

南星
兩

銀硃
錢一

血竭
錢一

消石
潮腦
各三

輕粉
乳香
各二

磁石
醋燜各

乳香
沒藥

錢一

狗頭骨
一具

石灰
兩

大黃
五錢切片同石灰炒

右共為細末。陳醋熬稠。調藥敷核。三日一換敷。

後繕皮核不消者。

另換紫露膏貼之。

其核自消。

瘍核瘻藥膏。

治未穿破者。

貼之即消。

狗頭骨牙爪
一付

存性

蟻螂虫
矣

磁石
五錢

醋燬各

乳香
沒藥

各一錢

生明礬

五錢八雄猪脚
內脚存性

海藻
兩

大貝母
兩

草麻子肉
五錢

用麻油四兩。同上海貝麻三味。

熬至滴水不散。瀝去渣。入乳沒再熬。將稠離火。乘滾入貓頭蠅蠍磁石飛礬攪匀。燉冷水中出火氣。乘軟取起打條。臨用攤貼。凡去渣後。入細藥時。仍用青州丹少加松香黃蠟。看老嫩得宜。方入貓頭等末。始易成膏。如已穿破。再取密廁梁上塵加入。

瘰癧收口藥方

龜版殼過埋地中四十九日
如要緊埋七日亦可

青葉煅陰乾

右同研細末收口神效

瘡

治三日太瘡神妙方。用活大烏龜一個。連壳左右肩上各攢一孔。近尾處亦攢一孔。以明雄黃九錢研細。每孔捲入三錢。外以磁黃泥包固。勿令泄氣。炭火上煅存性。研細。每服准一錢。空心陳酒送下。二三服即止。又用陳香櫟一個。去頂皮。大者每隻加透明雄黃三錢。中者二錢。小者一錢。雄黃研細。捲入香櫟內。炭火中煅存性。再研極細。每服七分。用軟腐衣分作六七包。乾咽下。此日不可吃湯。任其嘔去。頑痰即愈。

截瘡丹 斑蝥 巴豆肉 砧砂各一 膚香分 雄黃半 鏽酥分 右用黑棗二三個。揭丸如菜豆大。貼眉心穴一周時揭下。投長流水巾。

又 只開香氣不必煎食。亦可愈瘡。常山 草果 川烏 草烏 陳皮 甘草各一 右將絹袋盛貯。聞於鼻間。即止。

貼臍瘡丸 胡椒 雄精 右二味等分研末。將飯研爛為丸。如桐子大。外以硃砂為衣。將一丸放在臍中外。以膏藥貼上。瘡即止。親驗。

治諸瘡代參丸 白朮一斤
土蒸白朮渣晒乾 生薑一斤
搗出汁拌 右為末。將黑棗一筋煮熟。去皮核為丸。貼。

治不論雙單瘡方 用大掌膏。將好燒酒。自春浸至秋間。如瘡至。不食飲食。食則脹滿不下者。每日服掌膏兩個。三日即愈。

泄瀉

治老幼脾瀉。久不愈神方。飯鍋杷四兩 蓼肉四兩去心淨末 白糖四兩 右共和匀。每服三五匙。一日三次食遠

服。

止久瀉丸。治一切久瀉。諸藥無效。服此一服自愈。

黃丹飛過枯礬

黃臘各一

石榴皮八錢炒

將臘溶

化小銅杓內。再以丹礬二味細末投入乘熱為丸。如豆大。空心服五丸。

紅痢清茶下。白痢薑湯下。

治白痢不止神效方。乾飯鍋杷兩

乾飯鍋杷兩 花炒五錢

臘肉骨頭五錢

共為末。砂糖調不拘時服即止。

治脾泄方。陳火腿骨研末 紅麪 松花 右三味各等分。砂糖調陳酒送下。

小劑

治痢初起法。不問男婦。室女姍娠。小兒皆能治之。無有不效。

白蘆薈二三兩。洗淨連皮放石臼內搗碎。緩

取濃汁。如十歲以內小兒。每日吃一飯碗。大人每日吃二三飯碗。俱要冷吃。不必見火。忌葷腥雜味。并治瘧

痢如神。

又 水晶糖四兩。如赤痢用濃苦茶一杯。白痢用薑汁一杯。赤白痢用濃茶薑汁各半杯。將水晶糖入內。微

烊服。見糞即愈。吃至二服無不見效。親驗。

人參三錢

石蓮肉二錢

黃連錢一錢

鮮荷葉片

老黃米撮

水二鐘煎六

治噤口痢。此係元氣虛極者。人參三錢。石蓮肉二錢。黃連錢一錢。鮮荷葉片。老黃米撮。水二鐘煎六

分入木香末三分。和勻服。積未淨者。加山楂二錢。枳榔枳殼各七分。

又 米粒不下百藥不效者。用五穀烘焙乾為末。每服二三錢米湯下。

又 不能飲食者。用烏梅肉和蟻蟎同爛成丸。含口內片時。即能飲食。烏梅酒不宜嚥下。

又 蒼朮 甘草 陳皮 厚朴。右各等分。為粗末。用布包之。放在肚上。將熨斗盛火熨布上。逼藥氣入

腹。病者覺腹中爽快。即將藥放枕頭下。以受藥氣。一日連熨三四五次。痛痢漸止。口中即飲食矣。

治赤白痢并水瀉。車前子炒紅麪 赤石脂 清石。右各等分。砂糖調。每服三錢。滾湯送下。一

二服即效。

治赤白痢。不論初起久痢俱可用。柿餅一個。開一口。入白蠟三分。在內。將紙包好。紮住。以水濕透紙。放在灰火中煨熟食之。大人兩個。小兒一個。即愈。

治赤痢。木耳灰 椰米灰 紅麪灰 砂糖調空心服。

治赤痢人不愈者。初起者宜先服通利清濕熱之藥。幾劑。然後用此方。用鮮紅菱連殼搗爛。絞自然汁一飯碗。露一宿。加白糖霜少許。隔湯燉。略溫。清晨空心服。每日一服兩三服。必愈。加糖者恐其味濃也。如不畏濃。即不可加。

香參丸。治痢極效。百發百中之藥也。

木香

四兩

苦參

酒炒

六兩

左為末。將甘草一觔。熬膏。丸桐子大。每服三錢。白痢。薑湯下。紅痢。甘草湯下。噤口痢。砂仁蓮肉湯下。水瀉。豬苓澤瀉湯下。

治久痢如神。用刀豆莢。飯上蒸熟。洋糖蘸食。一二日即愈。

又 陳大腿骨

煅存性

四錢

黃連

一錢

薑汁炒

砂糖

四錢

烏梅肉

五分

右共為末。將烏梅煮爛。搗丸。每服三四十九。空心黃米湯下。

治久痢虛滑。不禁可以實腸。裏急後重。腹痛者不可服。用臭椿樹皮切碎。酒拌炒為細末。用真阿膠水化開。和為丸如桐子大。每服三五十丸。空心米湯下。

治久痢。初起者不可服。

松花

三錢

地榆

二錢

乾荷葉

二錢

臭椿樹根皮

一兩取向東南

右為細末。白痢。

紅糖調。紅痢蜜調。紅白相兼。蜜與糖調。加溫水少許。每服二錢。忘藥食。葷腥油膩等物。

又 烏梅

四兩

白滑石

二錢

臭椿樹根皮

二兩取在土者剥

右用陳米飯搗為丸。每服四五十九。空心米湯下。

治痢方。不拘赤白泄瀉。至八九年者。三四服即愈。

香茹

二十

藿香

十兩

蘇葉

七兩

木瓜

五兩

禮香

半兩

木香

二兩

赤苓

五兩

甘草

半兩

厚朴

五兩

枳壳

五兩

右為末。蜜丸彈子大。約重二錢。每服一丸。白痢。

淡薑湯下。紅荆木香湯下。其餘開水下。

治久瀉久痢方。陳石榴皮。酸耆焙乾研細末。每服三錢。米飲湯下。患二三年。或二三月。百方不效者。服之即止。不可輕忽。

治休息久痢。但痢而後無重痛者。用壯大豬小腸一條。不落水。將箸頂翻。轉出腸中油膩穢濁刮下。但將刮下之物。在瓦上炙。乾存性。研末。用沙糖少許。空心調服。一條腸垢大者。分作二分。小者口作一服。若翻轉腸內有糞。先去其糞。但刮其近腸之血膩油垢。炙用。重者吃兩三條。腸垢必愈。

治赤白久痢。腹中不痛者。桂圓七個。栗壳七個。荔枝七個。建蓮去心七粒。水二碗。煎八分。空心服。朝服可以一日晚服。可以一夜不痢。親驗良方。

治毒痢方。下膿血者是。金銀花一兩。煎湯送香連丸三錢。

脫肛

潤腸散。治痔後脫肛。鱉頭灰。五倍末。伏龍肝。生蠶末。赤石脂。訶子肉各五錢。俱晒乾。右為極細末。

葱湯洗淨。擦於腸頭上。頻頻換之。以愈為度。

治脫肛方。名枯蠶煎。五倍子三分。白蠶少許。右為末。水一碗。煎湯洗之。立效。若婦人產後。脫肛。五倍子末。

擦之。

縮肛散。鱉頭煅一個。枯蠶分。五倍子三分。共研極細。擦之。又用爬牆草。煎湯溫洗浸。肛隨浸隨縮上。

此草上生根。一路沿牆而上者。但有二種。一種葉大似絲瓜葉者。不可用。須葉小如茶匙樣光亮者。

治外痔疼痛。坐卧不得者。大田螺八九個。將針挑開。盛益入冰片。白蠶末少許。在內。以螺尖埋土中。令其蓋仰。經一宿。去螺水。以雞毛搭痔上。六七次。即消愈。

縮痔秘方。內痔落水。用大圓魚頭一個。火煅為末。搽痔上。即刻收進。親驗。

治外痔疼痛。坐卧不得者。大田螺八九個。將針挑開。盛益入冰片。白蠶末少許。在內。以螺尖埋土中。令其蓋仰。經一宿。去螺水。以雞毛搭痔上。六七次。即消愈。

薰洗痔方。

五棓子個三四

皮硝撮一水二碗煎濃先量。先後洗一二次即愈。絕妙。

治療漏丹方。

名長明酒。

用積年舊硫礦燈洗淨油膩。火煅研細。以紅酒服四錢。不過七日。其管自去。

點痔方。

銀珠錢三

大雄黑背蛭蛇條共搗爛。用鹽泥封固作團。要留一孔。大昇煙盡為度。取出用田螺水

調搽。即縮上。不用銀珠。將上仔黃丹拌之亦效。又

蛭蛇一條

冰片五釐。胆礬二釐。和化蛭蛇水點之。

止痔下血方。

蛭蛇一條。用鹽泥裹

硼砂。硃砂。雄黃。冰片。

共為極細末。入龍骨少許。更妙。大便時乘其脫出。以細草紙盛藥少許託之。使人太效。

治痔漏方。

新象牙屑二觔為末。安單用軟蛭子三個。將牙末和吃。或入稀粥內吃亦可。服盡一料。自愈。

又 露峰房

一大個每孔內入鹽錢一錢

殼蟲。木香各三錢

象牙末。猪胰油打

豬懸蹄蜜炙各五錢

白頭蚯蚓

瓦培乾淨末一錢

右共為細末。用黃占半觔。溶化將藥酒漸入。搗勻為丸如棗核大。每服一丸。

空心好酒送下。連服三丸。瘡口自消。隔一日第五日再服一丸。第七日再服一丸。痔管自退出矣。將玉簪花根三段。三日搗爛搽上。自愈。

又 名蛭蠅丸。

螞蝗十數條。將黃泥做成小管。如筆管大。入蠅蝗在內。上以硫黃泥塗護之。以鐵繩捆緊。外再以鹽泥封固。炭火煅以烟盡為度。取出去火毒。為末二錢。蟾酥錢一錢。

熊胆八分

麝香五分

水牛分

青黛漢深。用飯粒為條。插入盡頭。久者五六條。近者二三條。其管為膠水。

用洗藥。

洗方。

烏柏樹根皮。枸杞根皮。槐花。五味子。水楊樹根皮。瓦花。黃柏。荔枝草。

右煎湯一大碗。

先薰後洗。再以十寶丹收口。

十寶丹方。

龍骨八分。象皮分。琥珀六分。血竭五分。黃

丹分

冰片四分

珍珠屑。牛黃二分。乳香。沒藥三分。

共為細末。收貯聽用。

痔漏退管方。

象牙末二兩。

人腳指甲錢五分。

牛骨腮兩分。豬腳筋一錢。刺猬皮。鍋內蜜。右為末。再將

地榆槐角二味。

入豬臟內。煮熟搗爛。共搗塞丸。每服三錢。

空心滾湯送下。其管自出。半月即愈。

又 白鵝糞一升。

放罐內。以滾水冲入罐中。乘熱。病人坐於罐口上薰之。其管自落。數日即收。要坐久。恐

用豬臘頭。水煮爛。或鹽或醬油蘸吃。每日吃一個。吃至二百個必愈。若脾胃畏油膩者。只吃近肛門。

處管一段亦可。再每日切茅薈帶一片。吃數片。二物常兼吃。更妙。

又

金餘

即人手指甲

銀餘

即人脚指甲

二味不生

真血餘

兩

血珀

五錢

黃牛角腮

火煅四兩

羊角腮

火煅四兩

利猾皮

二張刮去毛

陳松蘿

細末

用黃大

大腸者

爛加煉老白蜜

為丸如無大腸

以豬臘代之亦可

空心淡鹽湯送下三錢壯盛者加或

至五錢虛人桂圓湯下

新象牙屑

兩

穿山甲

先用醋炒再用酒炒

四兩

槐角子

兩

青黛

淨五錢水淘

地榆

兩

以上十六味

如法煅煉為

痔漏插藥方

百草霜

黃連

各二錢半

冰片

分

麝香

分

鵝鴨虫

旱蓮草

頭炒五錢瓦

東丹

血竭

共為末摻之

收功末藥方

輕粉

乳香

麝香

分

韶粉

東丹

血竭

共為末摻之

又

雄大蟇螂

不拘多少

陰乾生研

加冰片少許

將綿紙

摺作條

用白芨水蘸溼晒乾

待硬再蘸溼

染藥末

於紙條上量漏孔深淺插入漸漸生肉

其條自然退

出用剪刀剪去

外一段即滿壓矣

治療漏九加

利猾皮

大者一張小者二張

象牙屑

兩

菜豆粉

兩

青黛

三錢

槐花木

兩

陳細茶

五錢

雞子

三枚

將象牙

細末

掺在內

淡吃

連吃三五日

或將元米

粉

擦象牙屑

攤餅吃

亦可

象牙末

吃至一二

丸

再無不效

此

法不用刀針

掛線

有管自然

退出

屢試屢驗

象牙要真

更要新而雪白者

錢碎

再用乳鉢細研

好酒送下病重者兩三服其管自出再用長肉藥收功

治漏疾秘方 香菜油一觔以三十歲婦人血餘二兩入油內熬煎去渣每日用油一鍾煎雞子三枚將象牙

細末三錢

掺在內

淡吃

連吃三五日

或將元米

粉

擦象牙屑

攤餅吃

亦可

象牙末

吃至一二

丸

再無不效

此

法不用刀針

掛線

有管自然

退出

屢試屢驗

象牙要真

更要新而雪白者

錢碎

再用乳鉢細研

處管一段亦可再每日切茅薈帶一片吃數片二物常兼吃更妙

又金餘

即人手

銀餘

即人脚指甲

二味不生

真血餘

兩

血珀

五錢

黃牛角腮

火煅四兩

羊角腮

火煅四兩

利猾皮

二張刮去毛

陳松蘿

細末

用黃大

大腸者

爛加煉老白蜜

為丸如無大腸

以豬臘代之亦可

空心淡鹽湯送下三錢壯盛者加或

至五錢虛人桂圓湯下

治腸風下血丸方。

槐花二兩一斤炒爲末

柿餅七個去蒂

烏梅個

共打爲丸。桐子大。每日空心滾湯送下。

又 末藥方。扁柏葉一斤蜜浸一宿晒乾爲末。

青州柿餅一斤炭火煅過爲末。右二味拌勻。每服五錢。空心陳酒送下。極重

者五六服可除根。

治血痔腸風方。將龜肉煮爛吃一碗。血即止。其效如神。

治腸風并痔漏。木耳一觔。煮成膏。再入豬肉三觔。煮熟食盡。即愈。

漏管自出。

治瘡瘍下血方。棉子仁四兩。晒乾去油生研。

青州柿餅十二兩搗爛。

百草霜四兩

烏梅肉四兩蒸爛。

共搗爲丸。每服三錢。

白滾湯下。或腐漿加青黛少許。下更妙。

治腸風下血方。青州柿餅三個。

地榆一兩。錢炒。

共研末分七服。空心開水調服。忌燒酒椒蒜芥。

又 當歸兩。懷生地一兩。竹刀切片。炒泡。

萸肉一兩。真阿膠一兩。將石膏二兩研碎和炒成

細末。入鍋內炒至逐粒爆開。并至集黑色存性。

真柿霜。即柿餅上白霜也。但假者甚多。入口甘而涼。

右逐味炒佳。要如墨色。又各

要存性。共研爲細末。和入柿霜拌匀。每日空心服藥末四錢。白滾湯一飯碗冲和將飴調末。即半浮半沉。連

湯飲下。若下血太甚。

臨晚再服三錢。俟糞色變黑。血漸止矣。忌食胡椒燒酒。辛熱之物。有此病者。終身宜戒。

此方修合之法。不過極細黑四字。則藥末決治於臟腑。所以要黑者。血遇黑而止。以水煎火五行之理也。

治腸風。臭椿樹根皮四兩。熬爲大茴香一大把。木耳四粒。

以雄豬肚子一個。將藥俱裝入肚內。紫好煮爛。去椿皮。但吃木耳。肚子連湯吃完。重者兩料必愈。

治腸風久不愈者。臭椿樹根皮。烏梅。

共煎陳酒沖服即愈。

治腸風。青州柿餅一個。內放白蠟六錢。飯鍋上蒸熟食數次愈。

治大便下膿血。即日夜數次。數年久病皆愈。雄豬大臟一條。洗淨。桂圓肉二兩。新鮮白扁豆花四兩。將二

味同打爛。用白糯米拌和裝入臟內。頭紫住。砂鍋內燒爛。忌見鐵器。然後將人中白火脆研末蘸吃。或鹽

油蘸吃亦可。不論吃粥吃飯空口皆可。吃四五條即愈。

治大便下血。

茅薈搗汁半鍾。

將好酒半鍾沖入空心溫服。三日即愈。

治大便下血。

用涼藥不效者。

用歸脾湯加槐花黃芩治之自愈。

下二服即愈。

溺血

治溺血者。溺血者。不痛而小便出血也。痛者為血淋。用頭髮燒灰研末。每服三錢。空心滾酒調下。或用百草霜酒調服。或用伏龍肝白滾湯調下。夏月水調。痛者車前草綫取濃汁。碗許入糖霜一二匙。燉溫服之。此可

多服自愈。初痛時用韭汁亦好。或將亂髮灰糊丸。桐子大。每服七十九粒。空心開水下。

治男子並中痛。及婦人血結腹痛。取牛膝一大握。酒煮飲之立愈。

治小便下血。用清利不效者。用補中益氣湯加車前子治之自愈。

治小便下血立效。旱蓮草。車前子各等分。將二味搗自然汁。每日空心服一茶杯。

葉桂天士先生論

同人較

疝氣

治諸疝海上丹方。雄豬大腰子一對。不落水去膜。併血切作片。以大茴香、小茴香各一兩俱炒為粗末。同腰子拌勻。復以豬尿胞一個。入拌者在內。禁固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出。一併切碎焙乾研細存酒。打糊丸如桐子大。每服空心陳酒送下七十九。一方用生白酒三碗者。

治响疝并小腸氣。

木通川楝各一

大茴分

飛鹽三分

右為末水酒調服。頭服出汗。服七日全愈。如

少年者加一倍。俱空心酒下。

治疝氣方 荔枝核六

橘核一兩

川棟子一兩

蘿巴酒拌炒一兩

吳萸一兩

澤瀉一兩

甘草五

青皮兩

山甲二兩

右為末。每服一錢。升麻一分。半黃酒調下。

治濕疝陰丸作痛。

蕲艾紫蘇葉

川椒炒熟各

右三味拌勻乘熱

絹袋盛夾囊下勿泄氣。

治陰囊腫子腫大方。

竈心土三升。砂鍋內炒熱。加川椒小茴香末各一兩。拌勻將陰囊坐在上面。冷則再換。

如此三次即愈。

治陰子腫大不消。

項大荔枝核十二三個。煅灰存性。以火酒調。如糊吃下。即消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。

用肥薑切片。鋪湊板上。上堆蕲艾一尖。點火燒之。候將完。即乘熱帶火。連薑并艾搗極爛。將鮮

菜葉一大片。放手掌內。即以薑艾搗勻。菜葉上。用手向腎囊底托之。初時其冷如冰。須臾滾熱。通身出汗而愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。良薑厚朴薑炒。

靈脂右各等分為末。每服一錢。醋湯下即止。

治心痛方 實胃口痛也。若真心痛不治。

高良薑酒洗次煖研。

香附子醋炒七

次煖研。右二味各記另收之病。因寒

治心頭痛欲死不可忍者。良薑厚朴薑炒。靈脂右各等分為末。每服一錢。醋湯下即止。

得者。薑末二錢。香附末一錢。病因怒起者。香附末二錢。良薑一錢。寒怒兼有者。各用一錢五分。臨時以米湯加入。生薑汁一匙。食鹽一捻。或二服。或三服。痛止後。用鎌刀挑鹽一撮。火上燒紅。泡湯服。并服大棗數枚。約數朝速效。

治心痛不。婦人服之甚效。丹參一兩。檀香一錢。砂仁一錢。共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。用大黑棗去核。每個中間入胡椒七粒。仍將棗包好。炭火上煅焦黑。存性研末。每服三四分。陳酒送下。三四服必愈。加木香枳壳紅花當歸五靈脂少許。更妙。

治胃口痛方。手指甲。男痛用女右。女痛用男左。剪下放新瓦上。炙脆存性。為末。約四五分。入砂糖少許。或湯或酒調之。食遠服。

治胃寒常發。惡心嘔吐或痛。用老生薑半觔。去皮搗爛。絞汁去渣。隔湯煮二十沸。停火將上白洋糖半觔。攪入內煎一滾收之。時時吃二匙。作三四日吃完。重者服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐

兼治寒瘈。大黑棗七個去核。每個內入丁香一隻。煮爛去丁香。將棗連湯空心服七服。見效。

治嘔吐不止。

陳梅醬煎成湯。如有火加竹茹。有寒加豆蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。

見食即嘔。或食罷即嘔。初起者易治。此痰在胃口也。生薑二兩。打碎陳皮五六錢。切碎泡湯一碗。

慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝。薑汁和勻。逐匙桃在舌上咽下。若咽急。并藥吐出矣。

治感氣或飲食傷脾作痛方。

橘皮一把。煎濃汁一碗。打入鹽薑少許。吃下神效。

補脾養胃方。名陽春白雪糕。

茯苓。山藥炒

芡實

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升

俱炒

白糖一

半

白

糖一

兩

先將藥米粉熬熟。再入白糖印作餅子。曬乾。每日空心吃幾個。極有益。

治老人脾泄最宜。名玉露霜。

白朮

二兩微炒

陳皮

二兩

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩

糯米

菜豆

陳米鍋

各一升

俱炒

共為末。收貯臨用時。糖霜量加。將滾水調服二三兩。

治腫飲。燈草碗煎至二碗。

蘿蔔子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺。

治腫飲。燈草碗煎至二碗。

蘿蔔子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺。

內 慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便長而腫即退。

(呃逆)

治呃逆欲死。

半夏五錢

生薑二錢

水煎服即愈。

治病後呃逆不止。

刀豆子燒存性。滾水調服二錢即止。

治呃逆不止方。

用荔枝七個。連皮燒灰存性為末。白湯調服立止。

(欬逆)

治欬逆方。

明雄黃一錢。酒一杯。煎七分急令患人喚其熱氣即止。

又 好硫黃乳香各等分。

以酒煎急令患人喚之。

又 硫黃 乳香

父各二錢

治食物醋心。

用胡桃嚼爛生薑下立止。

(耳)

治耳暴聾方。

菊花 木通 石菖蒲 捣爛酒服之。

治耳聾方。

真芷細辛研末。溶黃蠟為丸。如鼠糞大。以綿裹塞耳中二三次即愈。

又方 老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈。

治耳內出膿方。

胭脂 枯礬 鈎鑄粉

右各等分為末吹之立效。

又方 羊屎殼燒灰

一錢

枯礬 輕粉各五錢

右為末用棉花捲淨耳內膿。將葦管吹入立效。

治耳中膿水不止方。

龍骨

枯礬 乾胭脂

要產山東濟寧府如銀珠樣紫者非綿胭脂亦非油胭脂

海螵蛸各等分

麝香少許

右為末先以棉紙撫乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。

黃魚牙齒。瓦上炙存性為末。放土地上退火氣。研末加冰片少許。米油調。雞毛蘸

又方 用橄欖核燒灰存性。每核一枚。入冰片二釐研極細末。次入耳中即愈。

又方。如乾胭脂更妙。

治耳中常出血方。五色龍骨煅研細末吹入耳中即止。

治出真膿方。龍骨煅五倍子炒乳香枯礬血餘灰右各等分為末捲淨吹之。

治耳中膿水不乾。石榴花瓣不拘多少炙脆研末加些冰片再研吹耳自愈。

治百蟲入耳方。如蟲入耳不可驚動。在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔。氣至左耳虫自出。右耳亦然。

目

烏羊肝丸

大能烏鬚黑髮聰耳明目。

黑羊肝

一具竹刀切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗酒乾又塗膽汁多為妙。酒浸以紗罩罩極乾。

炒白芍酒

當歸酒浸

川芎各四

熟地蒸

何首烏蒸

覆盆子炒

山萸核

桑螵蛸

白茯苓

血餘

生地酒洗各四兩

旱蓮草

酒浸拌

白茯苓乳

血餘

生地酒洗各四兩

右藥不犯鐵器

製完共和一處

再用大熟地十二

雨酒煮一晝夜

取濃汁一碗

拌藥內煉

煉蜜爲丸

桐子大

每服百丸

空心酒下

臨卧亦服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到點燈時候即不見物

或羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也

石决明

夜明砂各二錢

將肝二片

中間盛藥麻線繫

定淘米泔水

一碗砂罐煮熟臨卧服

又方用羯羊肝一具

不見水不犯鐵器

以竹刀切開入谷精草細末瓦罐內煮熟

不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方

歸尾 胆礬 銅青各一

防風 荆芥 赤芍 川連各二

杏仁十四粒去

右細包

煎洗

治弦爛風赤眼洗方

文蛤 黃連去淨

防風 荆芥穗各五

苦參四錢

銅綠分

右為細末以薄荷煎

湯九

蟬子大臨用以熱水化開

乘熱洗眼每日三次

神效一方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方

用桂金燈淨壳

每壳一個擦入研細透明

綠色胆礬末二釐

或用壳十個或二十個裝套好

外放淨磁黃泥包裹好勿令泄氣

炭火煅至中間

壳將成黑灰存性放地上

用碗蓋燒火將中間灰研細包好

放土地上一夜出火毒

母用灰少許放茶杯內以冷松蘿茶浸之

用茶葉一束

以冷茶水浸之用薄紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上

將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

治火眼熱障眼痛不可忍者。用黃連爲末。人乳拌勻。似糊樣。摊碗底上。用父如雞子大一塊。放地上點着。以黃連碗覆上。令父薰透。取起以清水一小杯調濃。上覆棉紙一張。隔紙透出黃藥汁。以簪頻頻點洗即愈。

治眼中努肉方。用蛇退一條。將麻油三錢炒黃色不可焦黑。菜豆三合。炒砂糖一碗。水一碗。共煎七分。食遠

服立退。二三年者可治。兩服即愈。

治火眼方。用小兒糞中蛔虫一條。用水洗淨。挂陰處下。用磁盃盛其滴下之水。入冰片五釐。再加入人乳一茶匙。用熱水隔湯燉溫。以雞毛蘸眼上立愈。

治風火眼方。童便煎甘菊湯。頻頻洗之。

點眼神方。真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 密蒙花

各五

北細辛 川芎 蟬蛻

青葙子即冠子

黃柏 白蒺藜

蔓荆子

各三錢

以上諸藥須揀淨。用

水

一大碗。熬前濃汁成膏。去渣。一小鍾。將上好蘆甘石三兩。放銀罐內。煅酥研極細末。用甜水飛過。入冰片三

分。麝香一分五釐。仍入乳鉢內磨細。將前藥汁入內成丸。如菜豆大。銀硃為衣。一時烘乾。即收磁瓶內。不可

見日。臨用以水磨化。點入兩眼角內。輕者則用半丸。重者一二丸。即愈。

又方。冬天取淨臘雪。將大芋蕷同雪水磨粉。曬乾。加冰片少許。入鵝毛管中。點眼神效。

又方。名磨光散。

野芋蕷粉如做藕粉法

入豆腐內煮

乾珍珠過研細水飛

每芋蕷乾粉一兩。配製過

甘石五錢珠末三錢。各將磁瓶收貯。臨用漸漸配和加入。

冰片少許。點之。

明目去翳秘方。錦文大黃一兩。北細辛一兩。將二味用上高泉水一百二十兩。將藥入砂鍋煎至二十兩。

細絹濾去渣。用大銀碗一個。盛藥。碗下以磚三塊。放定。碗底下將燈盞注麻油。用燈草七根燃燈。薰碗底內。

煎藥成膏。滴水成珠。每膏一兩。用竹牽藤分五羹。早晚各服一羹。十日一換。

水飛過。蟬蛻末五分。須要去頭足。抹碎去泥沙。水洗曬乾為末。水飛三次用。又治飛絲入目。每兩加銀硃五分研細末。水飛曬乾用。如風寒等翳。每兩加青黛五分研細。水飛曬乾用。以上諸症隨症加藥入膏調均貼之。最良。用頭生小兒乳蘸點。取牽鬚粉法。如取菜豆粉與藕粉同法。須水澄極細曬乾再研極細。須忌鐵器。

又方。野牽鬚。猪胰。各等分。搗和。用雞子壳半個。放藥在內。臨卧含印堂上。俟水流入目中。翳隨淚出。二十日即愈。并治田螺頭眼。

又方。將新象牙物件。水磨點翳膜上。即去。又方。用新象牙磨屑。將生男乳浸透點之。即愈。

又方。刮孕婦大指甲末。乳調敷即愈。又方。枸杞

錢木賊

七根長

桂圓肉

個

煎湯服

月餘自效

前湯

後湯

效

治遠年攀睛翳膜。

名五退散

人退

即指甲乳

山甲炒

蟬退洗淨

龍退壳炒

鳳退

即雞子壳

內白膜炒

右

為極細末。每用三釐。令患人含水一口。患在左眼吹入右鼻。患在右眼吹入左鼻。再以鋤作眼樣合患眼上。如此三次。則翳膜或血絲俱落。

治眼吹鼻散。

穿山甲五釐炒

鵝兒不食草

人金

即指甲

分半炒

刺猬皮

三分半炒

蟬退分

半

蟬退釐

石蟹

二分

醋

麝香

釐

桔梗

四分

右為末

每用三釐

吹入鼻中

其翳即下

開瞽復明方。

生地

枸杞

甘菊

淨辦

穀精草

止用草

不用葉

木賊草

如無翳

不必用

右藥各四兩

用人乳拌浸一日

曬共九日。又用童便浸曬。共十八日。倘遇陰天下雨。即將微火烘乾。共研細末。陳米粉調和為丸。清晨白滾水下。三錢。半月即開光。

治損目破睛方。用牛口涎。每日點兩次。須要避風。黑睛破者亦瘥。

一鼻

治鼻漏膿漏方。用羊卵子一對。去膜切片。頂大者尤妙。醬油陳酒拌之。放磁碗內。隔湯煮熟。以陳酒送下。飲徹醉三五次。即愈。端午服。

治鼻渊方。用老刀豆文火焙乾為末。酒服三錢。重者不過三服即愈。

治鼻中時時流臭黃水甚者。腦亦時痛。名控腦砂。有虫在腦中。用絲瓜藤近根處三五尺燒存性為末。酒調服即愈。

治鼻痔方。霜梅個一。草麻仁粒七。生礬少許。右三味同打。將絲綿包裹。塞鼻內一日夜即愈。

又方。輕粉錢二。杏仁七粒去油。白礬五錢。右為末吹入。即化為水。

治鼻內生疔方。爛黃雞屎。荔枝肉。同打爛塗上即愈。

治鼻瘻方。七月七日收甜瓜蒂。陰乾臨用一分研末。再用白礬少許。綿裹塞鼻。

又方。瓜蒂五分研末。麝香少許。含水口中。嗅味自落。

治鼻効方。麥冬五錢。生地五錢。水煎服立止。又方。

菜豆粉兩。細茶錢二。右為末。涼水調服。

又方。梔子炒熟。百草霜。龍骨煅。京墨。牡蠣煅。血餘煅存。右為末。用茅花水蘸濕蘸藥入鼻孔如

無芽花。將紙擦水蘸藥入鼻孔即止。又方。馬蘭草汁一杯吃下立止。

又方。大蒜頭搗爛。左鼻効。將蒜塗左足心。右鼻効塗右足心。立止一方。左塗右。右塗左。

又方。用象牙屑吹入鼻中即愈。又方。胎髮燒灰。

烏梅煅一個。

共研吹鼻中立止。

又方。用生吳萸研末。津調塗足底心。湧泉穴上。用山梔炒黑為末。吹鼻中效。

治赤鼻方。枳杷葉去毛一兩。梔子仁五錢。右為末。每服二三錢。溫酒下。早服去右邊赤。晚服去左邊赤。再用後

敷藥。忌食胡椒生薑辛辣之物。敷藥方。木鳖子壳去。大楓子壳去。輕粉。硫黃。共為末。不時以唾調擦。亦治面瘡風利。

又方。用極臭鹽蛋二十個煮熟。取黃煎油一小盞。和細辛末。白菊花末各二錢。調勻。常擦患處。每日用鮮
桃杷葉刷去毛。蜜火煎湯服半月愈。

神效吹口藥方。并治喉症。

薄荷葉 磨蠶 青黛 朴硝 白礬 火硝 川連

硼砂各五分
右共爲

細末。臘月初一收雄猪胆八個，倒出胆汁以小牛和藥拌勻，復入胆壳，以線繫頭，外用青銅紙包裹於淨地

挖一大孔，深濶各尺許，將膽懸空橫吊於竹竿上，以板鋪上，用泥覆蓋，至立春日取出，挂透風處陰乾，去壳

收磁瓶內，每一兩加冰片三分同研極細，末吹患處立愈。

又方。兒茶一錢

人中白八分銀 磨蠶 冰片五分 破砂六分

薄荷六分 甘草五分 煙先將黃柏薄荷甘草另研細，次用兒茶等藥研細篩淨，珍珠另研和再入冰片

牛黃不用篩，即小兒痧痘症後俱可用。

又方。薄荷錢

青黛三錢 黃柏三錢 人中白四錢 兒茶四錢 水片五分 青果核灰十個 經霜西瓜皮錢

又方。燈草灰

以青竹管填滿，春寶燒過，棟灰去竹炭可也 大水片 薄荷葉晒乾 石膏各等 分共爲細末，和勻，蘆管吹下

治口瘡方

用陳白螺螄壳燒灰加兒茶少許為末，吹患處一次即愈。諸母悉治。

金

治舌効出血。用槐花末敷之即愈。

治舌腫方。用蒲黃末擦之即愈。若舌腫出外，或以冰片少許抹上，或以草麻油蘸紙作燃燒烟薰之，隨即消縮。若舌忽然腫硬，或出血如泉湧，用烏賊魚骨、蒲黃各等分為細末，敷舌上愈。

治重舌方。將蒲黃為細末，敷五六次即愈。

牙

治大牙痛方。并治口舌生熱瘡腐爛。

七八月間俟西瓜將完時，將瓜剖開去穰，將瓜皮合竹籃內，挂露天。

俟其日曬夜露，經霜取下，止存外面青薄皮研末，擦牙止痛，或和入吹口藥內極妙。西瓜在藤上經霜者更妙。一方加冰片少許。

治虫牙痛方。名韭子湯。

用韭子一撮，將碗底盛之，覆水中，用火燒煙，外用小竹梗將下截劈為四開，以紙

糊如喇叭樣。引烟薰蚯蟲。如下牙蛀者。以韭子煎濃湯漱之。虫自出。

治牙痛方。名一笑散。

火硝一錢。冰片一分。明雄黃一錢。元明粉五分。

右共為細末。擦患處立愈。

治風火蟲牙痛方。

真樟腦一錢。花椒三錢。薄荷葉三錢。

先將薄荷花椒用水拌勻。放在磁碗底內。後將潮腦研細。益面將碗合住。用紙封好碗口。以炭火昇之。俟青烟出為度。取碗上昇起之藥。將磁瓶收貯。痛時擦一

二次。即愈神效。

取牙方。雄活鯉魚一尾。約四五兩。

白硫錢六

將硫末入魚腹中。待其肉爛去硫不用。只用淨魚骨曬乾為細末。每

用米粞大少許。放患牙根上。自落。

治走馬牙疳方。

用人龍在瓦上焙乾研極細末。加青黛少許。冰片少許。研勻吹入即愈。

治牙根出血不止方。甚有成碗成斗。如線索牽拽而出者。

大黃二錢切片生研。若人壯者。或五錢亦可。滾

水調下。按此症乃胃中實熱。非降不可。故也。

咽喉

治一切喉症屬火者。

用鮮扁柏搗汁。加生白蜜調和。忌見火以茶匙。時時桃嚥之。消腫退火神效。

治喉症屬時邪風火痰壅閉。喘急危篤。發來迅速者。

先深針委中穴中。出血自愈。其穴在膝蓋對後。大小腿交界縫中。并治繩喉風急症。

治一切痰火風喉症。用青脆梅子百枚。挾活蠅蚰一二百條。同放瓦罐中。每日將梅取出。曬後仍入罐中。明日再曬。以收乾汁為度。再用微火烘乾。用則以一個噙化。或炙脆研末。加入諸藥內。

又方。霜梅一個。

明雄黃一錢。桔梗五分。

將二味入梅中搗爛成膏丸。如豆大。磁瓶收貯。每用一丸。放舌

底下噙化。重者二三枚。輕者一枚。或為末吹下亦效。

治喉嚨忽脹似喉癰不能飲食。用草麻子三四兩杵去壳。搗爛鋪夾在草紙內。將油壓在紙草中。去草麻屑。

不用。將草紙捲煤頭點火燒。令病人將烟吸入。或次入喉間。自然腫脹漸消。

治急鎖喉風方。其症先一二日胸膈氣鬱呼吸短促忽然咽喉腫毒手足厥冷氣閉不通急用巴豆七粒生四粒熟者去殼研熟者去殼炒去油存性將明雄黃五分鬱金一個共研末每用末半茶匙清茶調下如口禁咽塞用小竹管吹藥喉中須臾吐利即愈。

又方。用生巴豆半粒川貝母一粒去心共研。蠟燈心湯灌下即愈。

治癰喉風方。此症猝然脹起痰涎壅甚不速救即死。急尋野牛膝根草一二觔許此草隨處有之掘取根打濃汁碗許灌下即消。如腫痛不能入咽即令其人仰卧滴入鼻中流至咽喉下方能得命再將生韭菜連根打敷項下甚效。

治喉風舌大如脣即時不救即死。

冰片一分 火硝三分 胆礬二分 青黛分 瘡蠶五分 破砂三分

右藥共為細末吹之即愈。

治喉風方。用年久夜壺垢瓦上炙研細吹入即愈。

治喉鵝方。人已氣絕心頭微熱者藥入口聽有聲能下最無不活。三九冬天取老豬婆糞放在屋上日曬夜露七八日取下在炭火上煅至烟盡為度以水調如糊徐徐灌之。

急救乳蛾方。用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下以繩紮住男左女右大指甲旁以針刺出血即止。此少商穴在大指甲去側去甲韭葉大。

治乳蛾并治喉內一切熱毒。硼砂一錢 膽礬二錢 共為細末入青魚膽內陰乾研末加山豆根一錢磁器收

貯吹患處流涎即愈。

治喉癬方。喉症惟此最遲久則失音不可救。

治喉癬閉結不開。

將土牛膝草搗汁滴鼻孔中吐去塞疫即愈。

西牛黃一分 真山羊血二分 川黃連五分 血珀三分 冰片一分 破砂一錢 青果核灰三分 燈草灰五分 共為細末每一茶匙藥用一茶匙蜜調之放舌尖上徐徐嚥下一日五次兩月可愈。此方或加入蟻蝨梅灰更妙。

喉症開闢方。

牙皂 巴豆

共為末米湯調刷紙上曬乾作捻子點火以烟薰鼻孔立能開口鼻流涕涎專

治十八種喉閉

又方 巴豆四十五粒夾草紙內壓出油

撲成油紙條薰鼻并薰口內

治咽喉失音方

人乳 白蜜

梨汁各四兩 香椿芽汁四兩如無新鮮者用

(癰疽)

治肺癰丹方

用屎坑內鑿下坑堵名坑砂以草鞋包好浸長流水中七日取出炭火煅紅醋淬三次研細同

搗用桑肉搗丸桐子大

每服二三錢

吐出血膿而愈

又方 大白梨

四復銅鍋煮爛搗汁

上白蜜

上洋糖兩八

同熬將好下川貝母末四兩收之

又方 用百年鹹芥菜酒

久害地中者服數匙立起

此酒加興府城中大家多藏之

又方 將苡仁為末糯米湯調入或入粥內煮吃或以水煎服或將苡仁連根搗汁沖好酒服總以當下膿血便愈。又方 將魚腥草水煮多吃即愈

治肺家吐臭痰或吐如魚腥痰要藥

川通草 蘆根

苡仁 桔梗

治腸癰腹中疔痛

煩躁不安或脹滿不食小便澁婦人產後虛熱多有此症

繼非癰疑似間亦當服之

苡仁三錢

瓜蔞仁三錢

牡丹皮二錢

桃仁二錢

右水二鍾煎一鍾不拘時服

治腿癰方

未潰前服

歸尾半錢

官桂一錢

真漢防己一錢

蠶沙三錢

川獨活分

牛膝梢錢

乳香錢

蠶沙錢

川獨活分

牛膝梢錢

乳香錢

木瓜八分

井水煎食前服

治陰癰疽發

艾葉斤

硫黃 硫黃各五錢

以水同煮半日搗爛候溫敷上再煮再易十餘次知疼者可生

(疔)

治疗方 名飛龍奪命丹

蟾酥二錢乾

血竭一錢

乳香二錢

沒藥二錢

雄黃三錢

輕粉五錢

胆礬一錢

麝香五分

銅綠二錢

寒水石錢

海羊二十七個即

天龍一條即蜈蚣是也

天龍酒天黃土頭是也

硃砂二錢

右為細末先用

海羊連壳研為泥和前藥為丸如菉豆大如丸不就

入酒打麵糊為丸每服二丸先用葱白三寸令病入爵

爛。吐於手心。男左女右。將藥丸裹在勿白內。用無灰熱酒三四杯送於避風處。以衣被覆之。約人行五里之久。再用熱酒數杯。以助藥力。發出大汗為度。初起者服二丸。即消如不出汗。重者再服二丸。汗出即效。三五日病重者。再進二丸。即愈。如疔瘡走黃過心者。難治。汗出冷者亦死矣。如病人不能嚼。搗碎裹藥在內。熱酒送下。瘡在上食後服。在下食前服。服後忌冷水。黃瓜茄子。豬肉。雞魚。濕麵。一切發風發瘡毒物。又忌婦人洗換狐臭。人觸之必發。此藥活人多矣。按疔毒切忌用風氣藥。發散藥。蓋疔毒散則死。聚則生。不腐則死。須外敷拔疔。腐藥內服。清涼解毒諸藥。凡疔發於頭面者。切不可用冷藥敷之。逼熱毒於喉間。不能生矣。

又方。名追毒丹。取黃土疔頭膿者。

蟾酥一錢乾

蜈蚣酒浸吳

硝砂一錢

雄黃二錢

輕粉一錢白丁香

一錢無此
味加巴豆

巴豆七粒去壳
不去油

硃砂二錢

砂為衣

右俱為細末

麵調水為丸

如丸如麥大

兩頭尖入於針破口內。用水澄膏品之後。用青藥及生肌散。追出膿血毒物。又如有黑陷漏瘡。四圍死敗肉不去。不生肌者。亦用此藥追毒去死肌。生新肉。方愈。小者用一粒。大者加之。病輕者不必用針。只以手指甲爬動於瘡上。以藥放好。用水澄膏貼之。其瘡即時紅腫為度。去其敗肉為妙。用之神效立驗。水澄膏方。將白芨末放在盞內。用水澄下去。用紙貼之。以此膏圍貼。則不傷好肉。

治面上生疔腫大。用活蠅蠅一隻。將小刀劃開胸前。露出肝來。取下貼在疔上即愈。

治疗毒生唇上。在大腿灣中紫筋上。用銀針刺出血來即愈。此名委中穴。

治紅絲疔。手足間有黃泡即起紅絲一條。走入心腹。令人悶亂不救。皆因大喜大怒。氣血逆行所致。急用針於紅絲所到之處。刺之。擠出惡血。再細嚼浮萍草根敷之立愈。

拔疔方。

荔枝肉一兩

吸鐵石一錢

雄黃三分

右共搗分作三餅

分三次敷之。其疔自落。

又方

荔枝肉一兩

蝸牛一個

右和爛難服。同搗爛入昇藥少許。刺破皮膚塗上。疔根自出。

又方

將銀簪脚刺破疔頭。用多年靈天鐵鑄或水中者更妙。研如飛麵。將四五釐捺入疔孔內。外用膏藥護

之。疔根緣緣拔盡愈矣。又方荔枝肉 蝦蟆肝 黃丹 同搗敷之。

治疗方 用患者耳垢蕊垢手足指甲屑和卯如豆大放茶匙內燈火上炙少頃取作丸將銀簪脚桃開疔頭抹入外用棉紙一層浸濕覆之痛立止內服仙方活命飲二帖兼可治紅絲疔。

治疗膏藥方 乳香粒 麝香米大一粒 黃連末 連翹末

桃仁去皮二個

右同蝦蟆肝腸肺三味共一處

入乳鉢內搗如泥白皮紙一小方攤膏藥貼患處三四日連疔搗却

治疗方 用家園菊花搗爛取汁一碗服下即愈無花根葉搗汁亦可有此方諸方可廢

(廣瘡結毒)

治廣瘡結毒神效方 川芎

當歸 金銀花 花粉 防風 生半夏

製蜜川貝母心去皮

海螵蛸去皮水飛

白芷各

兩半錢

南星雨半錢

用土茯苓一觔米泔浸竹刀去皮搗爛不犯鐵器放沙鍋內用水四碗將竹箸

量定深淺再加水四碗煎至四碗將前末十兩五錢換入再加水四碗煎至四碗濾去渣一日內服盡去鹽與一切毒物發物粥飯只可淡吃輕者一料重者兩料全愈一方每日調入八寶丹一分二錢

八寶丹方 真犀黃

錢一錢

血珀

二錢

珍珠

二錢

冰片

一錢

滴乳

五錢

飛鴟

八錢

辰砂

二錢

飛滑石

四錢

又方 胡連

宣連一兩

大川芎

牛膝各二錢

豬胰脂

一個

臭葵子

七粒

先將土茯苓一觔以石槌碎

用水八

碗煎至六碗

入前藥煎至五碗

入胰脂再煎至四碗溫服仍用水四碗煎至二碗服第二次前時用竹箸在

罐內逐碗量定水痕此瘡必先吃毒物發透然後服此二三服瘡勢便覺稍可矣後剉即加苡仁當歸各二

錢於前方內照法煎重者不過四五劑輕者無出兩三服遍體貼然且無結毒之患脫痂後再服排毒散數貼尤妙前藥俱不可犯鐵器切忌飲茶

治頭面結毒方 蒼耳

一兩 川椒

八錢 麻黃

三錢去節

川芎

二錢

白茯苓

兩

猪頭天靈蓋骨

大煅存五錢

右研極

細末蒸餅丸如菜豆大飯後白湯下三錢三四日瘡口乾燥不臭是其驗也服至瘡平方止

治楊梅瘡方 雄黃

一錢

杏仁三十粒

右共為末用雄黃膽汁調茶

比武定醫府中方也

治楊梅結毒方

殼蠶蟬

蟬蛻蟬

蟬蛻蟬

土茯苓錢

生大黃半錢

甘草錢

川山

甲
火
三片

右將河水二大碗酒一大碗煎一碗。不拘二服三服以瀉為度。若腸中一响欲瀉可即往高處出恭不可復聞臭氣瀉後若身子壯者再服一服弱者不必再服。忌雞鴨魚腥等物。

治結毒敷藥秘方

真輕粉錢

杏仁霜二十粒去皮尖取霜

番木鱗性三錢

兒茶三錢火煅存

胆礬三分

片腦分

右

共為極細末用鵝胆或猪胆調敷一日一換數日全愈

治楊梅瘡點藥

兒茶杏仁霜各一

輕粉五分水片三分

右用鵝胆調點一次過夜即脫

治棉花瘡點藥方

凡棉花瘡毒及下疳或初感或毒盛經久難愈

速用新槐莢搗淨不必炒每日早午晚在食前用清酒吞下三錢許服至二三日則熱毒盡去除根亦無寒涼敗脾之病此經驗神方也如不能飲酒即用潔水湯俱可送下但不能如酒速效耳

治服輕粉毒

名五寶湯

紫草金銀花

山慈姑兩

一

乳香沒藥各五

錢

用新鹽水六碗

好陳酒五

碗煎六七碗空心溫服取汗不可見風一二服其毒即從大小便瀉出若結先服五寶湯

後用搽藥如

有爛去鼻與陽物等患即能復原

應驗如神

搽藥方

輕粉一錢

乳香分

沒藥分

血竭一分

兒茶分

紅薑子二分

文蛤二分燒

宮粉六分

麝香分

大珍珠三

紅薑子二分

燒灰

文蛤存性

宮粉六分

麝香分

水片一分

蟾骨五分

胎髮二分燒

白

螺螄壳存性右十四味共為細末磁器收貯用時先將濃甘草湯洗患處然後搽之

又方臘豬首骨搗碎

土茯苓存性

金銀花各一

水煎服藥畢即愈

治輕粉結毒洗敷方

臘水淋漓臭不可近者

楓子肉四

輕粉錢

草麻仁兩

蘆甘石錢

杭粉兩

花椒錢右共為細末搗加麻油搗成膏用油紙攤貼瘡上其瘡先用花椒甘草煎湯洗淨三日一換五六

次即愈

治服霜粉牙根爛出血不止

管仲

黃連錢五

右二味為末水一鍾煎四五沸入冰片少許攬勺漱口

每日一次忌猪腥油腻一月

治雞膽甘魚口下疳方。婦人陰戶臭爛亦用此藥愈。

熟乳香 冰片 珍珠末 象牙末 兒茶各三

搽面粉一兩入傾銀罐內 紅鵝黃色

牆上白螺螄壳洗淨入傾銀罐內

右共研細末磁瓶收固。若要上藥先用米泔

水前滾入雄黃三錢於湯內淋洗患處然後上藥不拘男婦三日後立效。

治漏還疳。半邊溜爛是也。又名蠟燭疳。從內爛出者將人腳根上老皮不拘多少瓦上焙脆為末黃柏末

用猪膽汁拌曬乾再研搽患處烏金紙包頭。

治下疳方 土牆上白螺螄壳灰一錢 五倍子灰二分 燈草灰五分

甘草灰五分 黃柏灰五分 輕粉四分 牛黃

釐五分

茶分

五分

冰片

釐一錢

右為細末

先用皮硝湯洗

次用土茯苓湯洗

後將藥搽患處。

又方

大紅絨

錢一

冰片

分三

鐵鏞

錢一

鳳凰衣

存性五分

煅

血竭

錢一

右研極細末

敷患處效。

又方

用白鵝

一隻

以白米養三日

後取鵝糞

以新瓦

培乾黃

為末

衣服一錢

和丹砂

一分

共研極

細用米泔水洗

淨其瘡如瘡乾

用雄豬胆潤之

以藥敷之

如瘡濕則不必用

雄豬胆潤之矣。

又方

蜜底蠅

燒紅童便

火燒七次

橄欖核

燒灰

冰片

釐五分

陳鴨蛋壳內衣

共研末

濕乾搽

乾唾津調搽。

〔中毒〕

解百毒 粉甘草

生用二兩

菜豆一升

水煎服立效。

又方

凡覺腹中不快即以生黃豆試之入口不聞腥氣此真中毒也急以升麻煎汁連連飲之將手探吐自

愈或嚼生葵一塊覺甜而不澀者是毒否則非也。

治服截瘧毒藥身體發腫氣喘方。此症因藥內有常山砒信等毒使瘧邪遏抑於內藥毒攻於皮膚頭面故滿身浮腫氣逆發喘煩躁用生菜豆或一升或半升連皮搗碎浸湯泡出濃汁涼服少頃肌膚間有聲一

日夜腫消喘止。

解砒信毒。急用密院僧一兩或二兩研細冷井水飛徐徐灌下或吐或瀉則砒信裏在藥末內出矣神效無

比或外再以井底泥塗胸前。或以生蠶或用田螺搗塗臍四旁更妙。

又方。白蠟三錢研末調雞子清三五枚入口即愈。

治信毒併治銀匠爐中矽子毒方。

錫灰一錢雞子一個

將二味攪勻吃下即愈。按錫灰即白鐵消後鍋內所遺渣垢也。再連鍋燒紅即化成灰研為細末。每服二錢。若服毒過多。加倍用神效誠急救良方也。

解食銀硝毒方。

將黃泥水服二三茶盃即愈。

解斑蝥毒方。中其毒者必腹痛嘔吐煩躁欲死。

急以生雞子清三四枚灌之即時止痛而愈。

解誤服水銀方。

在背陰處掘地二三尺。取泥為丸如梧子大。以冷井水過下碗腹中即瀉水銀隨下矣。

解巴豆毒方。若中此毒必口渴面赤五心煩熱泄利不止。

用黃連煎湯服。

解鹽漬毒方。將豆腐漿灌下或肥皂水皆能令嘔吐。

切不可飲熱湯飲活羊血尤妙。

解燒酒毒方。用鍋蓋上氯水一盃灌下即醒。

解中百果毒方。小兒食之過多飽脹欲死。

急用白朮頭煎湯頻頻灌之少頃自定。

解食桐油嘔吐不止方。

將乾柿餅食之立解。

解頓狗咬方。即不咬破亦有毒。

先用蓑衣草紮住兩頭。以眾人熱小便洗搗去血水。急取班蝥七個去頭

翅足酒洗和糯米一把水淘趁潮同班蝥炒。

以米黃為度。須於銅杓內炒加六一散二兩。共為細末酒下。或

木通燈心煎濃湯下。老少虛弱者分作四分。

壯年者作兩服。當時一服餘明日清晨服。服後本人頭頂心必

有紅頭髮一根要拔去。將草紙摊在灰沙內。撒灰於其上。應有或紅或白惡物如狗形者。如服完即無狗形

出亦不妨矣。服後用甘草湯漱口。忌一切葷腥油膩。鷄鴨蛋百日內要忘房事。如不忘男女俱傷。小紅赤豆

茄子狗肉終身禁食。茄子并不可相近。邪犬之形尾反舌垂。舌吐出黑色者是宜急避之。

治狗咬方。用木鱉子燒灰存性敷之。

解毒蛇咬方。

明雄黃一兩

五靈脂一兩

共研細末。每服二錢。陳酒送下。即將此末用麻油調敷患處。隔一時

再進一服立愈。亦有加白芷、貝母四味等分者，亦每服二錢。

又方。用香白芷為末，每服三錢，麥冬煎湯調服。其腥氣黃水從瘡口出而愈。

解蜈蚣咬方。

用舊毛竹筋將圓頭寸許燒焦，取下研末敷患處立愈。

又方。取蚯蚓塗上，其痛立止。

治疥毛利方。

用甘草煎濃湯浸洗，砂糖擦之，糖霜亦可。

治誤吞針方。

名吸針丸。用透磁石生研，將黃蠟和熱，如針，涼水送下。裏針從大便出。

治誤食銅錢方。

胡桃肉四兩，荸薺一斤，共搗汁和酒服。其錢即消，自大便而出。

瘡

治疣瘡方。

白雞子油、松香、小兒頭髮，用香油煎油成膏，塗上即愈。

治一切疣瘡。

并陰陽頑癖，用不落水豬網油攤開，將松香研細，捲在網油上，捲如煤頭，在燈火上燒著，下用蚌壳內放生礬末少許，受滴下之油，乘熱攪勻，冷定，搽在患處，或用攤油紙攤膏貼更好。

治疣瘡方。

先用黃蘋汁洗之，醋湯亦可。

皂莢七個，內浸七日，洗淨，晒乾，火煅。

榆白皮煅，枯礬，牛煙膠，輕粉。

霜梅肉、銅青，將醋浸調搽之。

又方。白松香四兩。

肉墩頭屑三兩，燒灰存性，碎新青布二兩，燒灰存性。

將多年竹燈焰寫，放松香在內，燒炷連油滴出。

以碗受之，將前三味調勻敷之。

四五日後待其自落即愈。

治對口瘡神效方。

用活鯽魚一尾去腸鱗，搗爛，加髮垢四兩，白蜜少許，攪勻，從瘡外圈入裡面敷之，極厚留一孔，出氣外以紙貼之，一二日即愈。

又方。名蟾瘡膏。

飛鹽五分，葱白三根，活蝦三個，蜜一兩。

共搗一處敷之。

又方。婦人頭上油垢。

三錢黑背鯽魚一個，約一兩。

猪眼梢對。

右同搗爛敷之。

又方。將雄豬眼梢肉。

三錢，剁爛如泥，加滑石末四錢，和勻敷患處，頂上以膏藥蓋之，拔去瘡肉，放出黃水即愈。

鮮茄蒂乾七個，何首烏一兩。

右用河水三碗煎一碗，食遠服，一服出膿，兩服收口。

又方。鮮茄蒂乾七個。

何首烏一兩。

右用河水三碗煎一碗，食遠服，一服出膿，兩服收口。

治痄腮方

用陳石灰不拘多少燒七次地土窖之次醋調敷之愈

又方 山梔木飛麵各等分。猪胆汁好醋各半薄調敷患處

治拍解毒。即手大指食指間所生俗名丫指。用活蟹打爛塗之。

治指上疔瘡。名天蛇頭。又名雄公蛋。用雞子一枚頂上敲一小孔。先去其清放盆內。後去其黃。仍以清入壳。將蜈蚣一條煅灰。明雄黃末各一錢二味共納入壳。攪和以指入壳周圍以棉紙封固三四層候一晝夜打碎遠遠拋擲。切不可聞其臭氣。此瘡立愈。一方只用蜈蚣為末。雞子不去黃。套指上候熱再換一個即愈。

又方。猪胆一個。入雄黃末一分。攪匀套指上二三時即愈。又方。雄黃細末和蟻蛹搗爛敷之即愈。

又方 雄黃分白芷分共為末入雄猪胆內套指上立愈。

治坐板瘡方 生在臀上俗名臀丈瘡。用八九月間的西瓜皮刮薄存一粒米厚者。日中曬脆研細。瘡有膜則乾擦無膜將自己津涎調末敷上少頃瘡中即流出水來敷二次即愈。

治爛腿方 用白芷黃蠟飛丹片粉。各等分葱頭搗猪髓調敷油紙紮住七日一換二次全愈。

治腳面生瘡不收口。松香 枯礬 杉木灰各一錢右共為末用麻油調塗數次即愈。

治脫疽方 此症發於腳趾漸上至膝色黑肉痛不可忍逐節脫落而死亦有發於手者。土蜂窠研細醋調搽應手而愈。真神方也。

治陰濕脚瘡久爛。銅青 膽礬各五錢 飛丹二錢 密陀僧 輕粉 石膏各一錢 右研末臨卧時搽上。一夕即結痂或有痒處毒水不乾又搽上痒極擦之。

治腳指縫爛。鮮鵝掌黃皮陰乾燒灰存性為末搽之極效。

又方 好黃丹一味搽三五次即愈。又方 陳松蘿茶末搽之。

治腳指縫濕爛瘡方。用三白頭昇藥底少許和白糖霜打爛敷之。

治脚指頭上臭爛瘡方。俗名臭田螺。

青石屑

用市中多人踏者又
要潔淨者湏研極細

絲棉灰許

冰片少許

三共和勻搽

上外以膏藥貼之即愈。

治行路足腫方。

用草鞋浸尿缸內半日，以磚一塊燒紅置鞋於上，將足踏之。令熱氣入足內，腫即消。

治臙瘡方。陳石灰

坑砂

伏龍肝

百草霜各一錢

右共為末先將忽父煎湯洗之。

桐油調敷。將草紙禁

翳。

又方。修船舊油灰

飛丹

石膏等分

右研極細先將豆腐溫水洗淨患處用麻油調藥敷之。極厚三

日一洗一換最無不愈。

又方。桐油

菜油

麻油各五錢

松香製一兩

飛丹三錢

銅綠二錢

白占

黃占各五錢

先將三油熬數

滾後入松香黃白占再熬數

滚後入飛丹銅綠細末收之。

攤隔紙膏貼之。

一方。松香只用三錢銅綠只

用一錢五分。

治臙瘡久不收口方。杭州破黑傘紙燒灰。

飛丹

輕粉各一錢

牛腳脴

再刮直下至無心為末三錢

而

味與豬油同搗極爛做夾紙膏以針刺孔先以葱椒飛鹽湯洗淨拭乾貼之。生肌長肉再貼五六日收口愈。

又方。用鮮桑白根皮一筋。

生豬板油四兩

共搗作餅

將一餅貼之

每日換一餅貼之

五六日後換生肌末藥

用赤石脂乳香沒藥白占冰片炒黃輕粉細過狗脰骨以麻油調塗碗內覆定燒斷父薰黑碗內藥連番十

餘次方以此藥做夾紙膏貼之數日即愈。

治濕爛臙瘡并一切頑瘡不收口者

麻油

柏油各二兩半

管仲三錢

象皮五分切片

血餘一大

同前至髮枯

去髮再煎滴水成珠下炒飛丹五錢方下後藥

硃砂一錢半

乳香

去油三錢半

血竭一錢

共為末攪匀離火候半冷下

黃蠟二錢五分

杭粉一兩五錢

如法熬成膏攤貼患處一

日一換神效。

治臙瘡久不愈者。

秘傳夾紙膏。

老松香

樟腦

琥珀丹炒

水龍骨

即舊船底內油石灰

輕粉

共為細末溶化

松香加小清油和之以油紙隨瘡大小作夾紙膏洗淨後貼之二三日一換即愈若不敷加白芷川芎蟬

娟於前膏內若不加入以此三味煎湯洗之亦效。凡腫瘡用夾膏須用舊傘紙以甘草湯煮密刺其孔此他紙尤效。如用尋常油紙須用甘草白芷花椒荆芥煎湯煮過曬乾攤膏則不痛且不生癩。

又方。麻油兩大活雄鯽魚一個約斤許者

大楓子肉四兩去油

同熬至魚焦枯濾去渣將油再煎滴水不散將油

稱見分量每油一分用飛砂過黃丹半分加銀硃二錢收之攤貼若不能收口用哺胎不出雞子瓦上煅存

性研極細擦上即收口此擦藥方不但治腫瘡凡結毒癰疽久瘍者立能收口生肌。

又方。名白玉膏 乳香 沒藥 象皮 白蠟各五錢

輕粉四錢 密院僧 鉛粉 黃蠟兩各二

以上除蠟外取起入二蠟溶盡攪勻待油

稍溫方入細藥攪三百餘遍以大棉紙攤上陰乾隨瘡大小剪成膏貼時瘡中毒水流出膏藥遍黑再換新者貼之。

又方。名紫脂膏 好麻油四兩 淨花椒三錢 蒜頭七個連鬚七寸長

三味同煎至熟焦脆去渣入白色松香五錢。

黃占六錢文火煎化去上面浮出渣滓煎至油面上有花紋急離火傾碗內加入好銀硃一錢攪均收之待冷凝將碗合土地上三日去火毒攤夾紙膏貼之紙只要一面刺孔每膏貼五日一換如痛者用甘草湯先洗痒者花椒湯洗若貼一膏即流盡黃水者貼至五六膏即愈若貼至三膏方流盡黃水者須貼至二十膏而愈凡初貼之膏出水者膏中有毒氣在內揭下則無用。水盡後再貼之膏須存之以待後來將長肉結蓋時用此貼過舊膏貼之以為收功最妙。

治濕毒瘡方。蘆甘石用童便製八九次猪油調搽神效。

又方。伏龍肝 蚌壳灰各一錢半

右或加蒼朮一錢 輕粉半錢

共研末

黃柏一錢

各炒焦為末和勻用菜油調攤夾紙

膏將針刺孔紫瘡上三日一換先用花椒米泔煎滾洗瘡

治濕瘡方。取桑樹根上土中鮮白皮去粗皮切細同生豬油放石臼內打糊先用冷茶洗瘡拭乾用此藥敷

之外以油紙蓋之。將帛紮緊。換四五次即愈。加白蠟同搗作餅。反覆貼之。一日夜再換。拔去毒水。裏膚生肌收口。濕瘡與臘瘡有別。濕瘡有水窯頭不爛而甚痒。臘瘡必爛而痛。凡治濕瘡。切不可用昇藥及冰片。非惟不能奏效。反致潰爛難愈。凡遠年濕風瘡痒。甚諸藥不效者。必有蟲在內。須用藥引出其蟲。則用藥有效矣。

又方。疥瘡白泡亦治。楓子肉一兩。蛇床子炒。煙膠瓦上炒乾。黃柏末。自外通板五錢。各。黃丹二錢。飛水紫金。右為細末。桐油調擦。上以油紙覆紮五日一換。三次即愈。柏油調藥更妙。一方無灰膠有燬。

龍骨用熟桐油調藥。

又方。黃柏末。銀硃。飛丹各五錢。煅石羔。龜板灰。蚌壳灰各一兩。輕粉二錢。嫩松脂三錢。共為細末。菜油調作灰紙膏貼。

又方。名葱連膏。飛丹錢。乳香。沒藥。黃連各五錢。血竭。水片分。松香五錢。草麻子十八錢。共為細末。
帶皮七根共為末。將葱頭打爛和匀。以菜油調做灰紙膏貼之。

治臘瘡。黃丹。無名異各五錢。輕粉一錢。乳香。沒藥。樟木。水龍骨。百草霜各一兩。共為細末。桐油調夾紙膏貼。之前後翻換神效。或加血竭。血餘。兒茶。蝶蛸。銀硃。銅綠等藥。貼過舊膏藥藏好。以備日後收瘡口之用。

治一切瘡毒。隨貼隨愈。並治風濕癰疽。癰癧。鶴膝風等症。俱神效。南星。川大黃。桃仁。羌活。半夏。

草烏。川烏。紅花。獨活。當歸各四錢。用真麻油一觔。加生薑一兩。葱白不拘多少。亂頭髮一團。入藥內熬焦枯色。用絹濾去渣。用上好松香一觔。入濾過清油內。又熬至胡桃花起。先加入密院僧二兩。再徐徐加入硫黃末半觔。投此二味時。務須慢慢灑入。不可太多太驟。以滴水成珠為度。將此膏藥項入水中去火。治熱毒濕瘡。遍體生瘡。痛而不痒。手足尤甚。粘着衣被。日夜不得眠者。用石菖蒲三斗為末。鋪席上五六日。即治諸瘡。弩肉如蛇頭凸出寸許者。用烏梅肉煅灰。搽上即愈。

治臘瘡瘍

名通黃丹
燒石羔金

寒水石錢
黃丹

硫黃錢
共研細末

菜油調搽即效

共研極細末
將雞子黃熬出油調敷

黃丹

硫黃錢

共研極細末
將雞子黃熬出油調敷

。

又方 大黃牛三錢

吳萸錢半
共研細末

菜油調搽即效

。

。

。

。

。

。

。

治諸瘡搽藥方 煅熟石羔兩

松香 白芷各三

樟腦錢

輕粉分 水片分 右為極細末
熬熟豬油

。

。

。

調搽治白泡瘡更效

治天泡瘡方 黃柏末錢半
輕粉一錢 雄黃一錢 青黛二錢

滑石錢 寒水石大半錢 銀珠半錢
辰砂分 鉛粉

。

。

錢二側柏葉末一錢右為細末
絲瓜葉打汁調搽立效

。

。

。

。

又方 將菜豆裝入粗瓦瓶內以毛竹筷一把塞緊瓶口再用瓦盆一個底下鑿一孔將瓶倒插於盆孔內盆

內用礬糠炭屑燒之菜豆油即在箸頭上滴出下以碗收之俟出火毒用油抹點瘡上二三次立愈

。

。

。

又方 青黛 滑石 各等分馬蘭汁調敷

。

。

。

。

治瘻子方 將臘雪收藏瓶內封口至端午日放黃瓜在瓶內浸之封好遇有瘻子敷上即愈

。

。

。

。

治瘻瘡痒痛方 滑石五錢 菜豆粉四兩

微炒右研細和勻以棉撲之一方有棗葉一兩

。

。

。

治瘻瘡不愈年年發歇先痒後痛後即腫破出黃水及出血不止者

。

。

。

。

又方 用白蘿蔔打碎或切碎內揀大者切二三寸一段同用水煮一二十滾不可太爛亦不可太生以所煮

。

。

。

。

湯薰洗浸並將所煮蘿蔔在瘡上摩擦一日洗三次連洗三日即愈永不發

。

。

。

。

治冬月手足開裂方 用清油五錢文火煎沸先入黃蠟一塊煎化再入光粉五倍子少許熬令稠紫色為度

。

。

。

。

須以火炙動挑敷亦不妨。一方加魚膠白芨末。

又方。名油胭脂。用生豬板油去筋膜一兩。入鍋熬淨。再入黃占五錢。白占三錢。同化清。次入銀珠黃丹各五分。攪勻以軟能攤開為妙。敷之即愈。

又方。用童子刺下頭髮洗淨。令乾。將一二兩放杓內熬烊。入羊油再同熬。令其無滓去火候冷。如膏藥機成細條。放入縫內。一日夜即裂縫不痛矣。

治湯火瘡方。當歸 生地各一兩 麻油四兩 黃占一兩白者用五錢 右先將當歸生地入油煎枯去渣。將蠟溶化。攬匀候冷。即成膏矣。用塗患處。將細紙蓋之極效。若發背癰疽。清蠟者用之亦甚效。凡死肉潰爛。將脫止有些些相連者。宜用剪刀剪去。蓋死肉有毒。遲則傷新肉矣。死肉去盡。尤宜速貼。蓋新肉最畏風寒。切不可忽也。

又方。將豬毛燬存性研末。加輕粉硼砂少許。麻油調和敷之。立效且無瘢痕。

又方。用雞子黃置銀石器中。熬出油。調糊粉敷之。

治湯泡方。將煮熟雞子黃炒出油一杯。調生大黃末一兩搽之。

治火燬熱油傷方。用生雞子清。好陳酒冲和調敷。三次必愈。

治火燒爛神方。凡遇此症。切不可浸冷水中。熱毒內攻。必爛至骨。用好陳酒一二十觴。傾入浴缸內。略燒溫。令患者坐酒中。浸之極重者不死。

治火燬傷方。急使一二歲小兒。不拘男女。撒尿於室中結實。淨土地上少頃。取地面上浮膩滑濕之土敷之。即日止痛解火毒甚妙。

治燬泡火燒方。此症切不可用冷水澆洗。如藥不便。先飲童便一碗。或生蘿蔔汁一碗。再將生大黃細末。或

香油或生桐油調敷。如爛至肌肉者。用山野人家百草霜三錢。輕粉一錢。五分研末。香油調敷甚效。

治初燬與潰爛方。名解毒行血膏。當歸

劉寄奴

頭髮

生地各一

將麻油六兩。桐油內煎至

度

將

麻油六兩。桐油內煎至度

化藥黑瀝去渣下白占八錢不住手攪匀候藥稍溫下生寒水石煥大黃鐵黃柏生薑木各一兩輕粉末二錢攬至藥冷埋土內出火毒患者塗之

治漆咬瘡方。木形人每患此症。用杉皮煎湯洗之。蟹壳湯洗亦可。又方。將活蟹搗爛塗上即愈。取瘡中多骨方。用烏骨雞腔骨實以硫石鹽泥封固煅紅出火毒研末飯丸栗米大。將白芷撲送入孔中。以拔毒貼之其骨自出。

(諸丹毒)

治蛇丹方。刺鱗魚尾血同蛇油搗空。

治火丹方。將蛇油搗爛磨好京墨汁和塗之。

又方。柏葉 蚊蠅泥並采地上者尤妙 黃柏 大黃各五錢 赤小豆 輕粉各三錢 共研末新汲水調搽。凡生

火丹。流大切不可吃豬肉。吃則發腫不消。又方。將冬青樹葉搗爛和入雞子清敷患處。以絹縛之。一周時即愈。

治流火方。鮮紫蘇 鮮鳳仙花 將二味洗淨連根葉搗爛放木盆內以滾水冲入。將脚架盆上薰至可洗以軟棉洗之立愈。十餘年者不過洗三四次不發矣。

治流火毒方。大黃 山梔 黃柏 雄黃 南星 右共為末。將瓜花搗汁調敷立效。

(無名腫毒)

治無名腫毒。未成初起五天之內照方一服即消。如毒旺者接連三服無不消盡真神方也。用雞蛋一個。傾

在碗內攪匀。入芒硝一錢。隔湯燉熟。用三白酒照量飲食盡為度。

內托護心散。防毒氣攻心。真荳豆粉一錢。乳香錢五分。燈心灰。右共為末。和勻以生甘草一兩。煎濃湯調一錢時呷之。

治男婦小兒一切無名腫毒。將苦絲瓜連筋帶子燒存性為末。每服三錢。白蜜湯送下。日二服。夜一服。則腫

消毒散。不致內攻。真妙方也。

治一切無名腫毒。魚口便毒。楊梅結毒等症。即消。

名二角消毒散。

雄羊角二

血餘灰一
穿山甲半

角刺灰一斤

右四味俱用文武火煅灰存性。每服二錢。或三錢酒送下。

治一切無名腫毒。瘰癧尤效。

名四製鯉鱗丸。歸尾五

錢

大黃

荆芥

桂梗

乳香

沒藥

各二錢

黃芩

連翹各三錢

防風。羌活各二錢半

全蝎一錢

蟬蛻二十個去頭

殼蟬五個

牛皮膠一兩土炒

雄黃七分

用金頭

蜈蚣四條

去頭足分作四樣法製一條

用薑汁搽焙乾一條

用醋搽焙乾一條

用香油搽焙乾一條

用酥搽

錢五分共為衣磁瓶收貯。瓶內放麝香五分以養之。每服一丸。滾酒送下。未成內消已成膿神效。

治諸毒已成未膿之際。服此毒不內攻。名琥珀蠟禁丸。

白礬一兩黃蠟一兩雄黃二錢

硃砂二錢白蜜一錢

右四味先研極細。另將蜜與蠟銅杓內溶化離火片時候。蠟四邊稍凝。方入上藥攪

勻。共成一塊。一人將藥火上微烘。衆手急丸。小寒豆大。硃砂為衣磁瓶收貯。每服二三十丸。白湯食後送下。

病重者早晚日進二次。

移毒方。凡毒在緊要處。移在閒處。庶不傷命。

用地龍裝在經霜絲瓜內煅枯焦。連瓜為末。每瓜末三錢。入

麝香一分。乳香沒藥各五分。雄黃一錢。蟾酥一分。黃蠟一兩。共為末。蠟丸。每服三分。上部要處。甘草桂枝麻

黃煎酒下。即移在手上而散。如在肩上。羌活防風薑煎湯下。移在背上。如下部。木瓜牛膝靈仙陳皮獨活薑

煎湯下。移在足上。神效。

前湯下。移在足上。神效。

治陰症諸毒膏。附子肉桂川烏草烏大戟芫花甘草甘遂各一錢。一方加乾薑一兩四錢。入

移毒方。凡毒在緊要處。移在閒處。庶不傷命。用地龍裝在經霜絲瓜內煅枯焦。連瓜為末。每瓜末三錢。入

麝香一分。乳香沒藥各五分。雄黃一錢。蟾酥一分。黃蠟一兩。共為末。蠟丸。每服三分。上部要處。甘草桂枝麻

黃煎酒下。即移在手上而散。如在肩上。羌活防風薑煎湯下。移在背上。如下部。木瓜牛膝靈仙陳皮獨活薑

煎湯下。移在足上。神效。

治陽症腫毒膏。馬錢子四

附子肉桂川烏草烏大戟芫花甘草甘遂各一錢。一方加乾薑一兩四錢。

治陽症腫毒膏。

大黃生地各二

薄荷玄參黃柏黃芩梔子

血餘各一

蝸牛肝

右用蒲油煎去渣淨水。治諸惡瘡腫核。赤暈已成膿。不肯用針刺。以此藥代之。但用小針點破瘡頭貼上。膏藥膜即自潰此秘妙良方。

名萬寶代針膏。

蓬砂

血竭

輕粉各錢半

金頭蜈蚣一個

蟾冬五分

雄黃一錢

水片少許

麝香一分

右

為細末。

用蜜和為膏。

看瘡有頭處。

用小針挑破。

以藥少許放紙上封貼。

次早其膿自出。

如腋下有要孩兒名

暗疔瘡。

或有走核。

可於腫處用針挑破。

如前用之忌雞羊魚酒麵等物。

吃白粥三日為妙。

加味太乙膏。

肉桂

白芷

當歸

玄參

赤芍

生地

大黃

土木鱉

各二兩

上阿魏

錢二錢

輕粉四錢

金剛

水片二錢

麝香一分

右

槐枝

柳枝各一百段

血餘一兩

東丹四十兩

沒藥末三錢

乳香五錢

麻油五錢

將藥入油熬熟濾過

煉成膏。

每油一觴

加丹六兩

五錢夏秋再加五錢。

治癰疽神應膏。

真阿膠三錢

麝香二錢

硃砂四錢

雄黃

五靈脂

甘草各一兩

川烏

草烏各四兩

將新

鮮鬧羊花十觴

揀去梗葉打自然汁。

入瓦器中煎成膏。

如稠糖為度。

將藥為細末。

入羊花膏內攪匀勿令凝

底用大磁幾個每盆

將藥攤一薄層置烈日中曬乾

取入磁瓶封固。

如遇腫毒用酒調勻

如半乾糊將筆蘸

藥先從紅腫上面畫一圈待藥將乾

再畫第二層於圈內與前圈相連

即將酒潤舊乾圈上等第二圈將乾

再畫第三層於圈內與第二層相連

又將酒潤外邊乾處每乾一層

再畫進一層止空當頭如豆大一孔使

毒氣從此而出圈完

用酒常潤藥上不可間斷至半日乃止

待藥自乾落不必洗去其毒自消

一方只用

三味新鮮鬧羊花五十觴打爛絞汁熬膏。

川烏草烏各一兩

和入膏內用法同前。

八仙膏

龍骨

赤石脂

兒茶

血竭

乳香

沒藥各一錢

輕粉五分或

冰片一分

用麻油二兩入當

歸五錢煎枯去渣入龍石茶竭四味

再煎一二沸次入乳沒略煎勻

後入黃占五錢溶化令定

入輕冰攤貼

千搘膏

松香

銅內溶化傾入清水內

草麻子六兩

柏油二兩

白蠟兩

大黃

銀硃各二兩

左顧牡蠣

二兩用粗草包好

搗之法在光平青石上先將松香一二兩與草麻一二兩鋪於石上用鐵打碎乾則

入火內煅存性

加草麻濕則加松香

餘藥亦漸漸添入搗至極細膩為度

遇無名腫毒搗貼用麝香少許初起者一張便效

若已潰者。用阿魏少許。即止痛且易收口。此膏忌見火。須隔湯燉軟攤之。

密膏。治一切膿瘍癰癰。黃瘡下疳。久不收斂者。

松香一斤四兩醋葱汁煮過為末篩淨一斤。

乳香 沒藥 樟冰 象牙末 炒

竹蛀屑 龍骨火煅

赤石脂煅

海螵蛸去壳

人中白煅

面粉炒各五錢

黃占 白占各一兩

輕粉一兩

兒茶 錢三 血竭六

白蜜一兩 桐油十五兩

右十八味先用松香溶化次下桐油次下黃白二占

下龍骨

等藥次下輕粉次下象牙末次下乳沒次下樟冰次下白蜜

生肌收口膏。治諸瘡并下疳及輕粉毒。

乳香 沒藥各去

兒茶 血竭 輕粉各一錢

寒水石 水龍骨

麻油四兩

將油先熬數沸下蠟後下藥末用槐枝攬斗攤膏

先以防風荆芥苦參黃柏黃連連翹銀花甘草槐花菜豆粉各三錢煎湯洗淨其瘡然後貼之。一方有鬱金一味。

(跌打損傷)

黎洞丹。治一切無名腫毒。昏困欲死。並跌打損傷瘀血奔心。昏暈不醒等症。

牛黃 冰片 各二錢半

阿魏 雄黃各一兩

麝香二錢半

生大黃 兒茶 天竺黃

人參三七

乳香去

羊蹄

川羌五錢 川芎

沒藥去

血竭 腫黃

羊血加五錢不必用子羊血以上藥各一兩

右共為末將腫黃化開為丸如芡實

大若乾少用白蜜外用蠟皮封固每服一丸用無灰酒送下外敷用兒茶麝香一切生冷發物。

紫金酒。治一切風氣跌打損傷寒濕疝氣移傷定痛。血滯氣凝此酒善通經絡。況久久病無不獲效。每飲三

五杯立見痛止。若預飲之跌傷亦不痛。

官桂 明乳香 沒藥 廣木香

羊蹄

川羌五錢

川芎

玄胡 紫荊皮 五加皮 丹皮 變金

烏藥各一錢

右為粗末

將好酒十觔懸胎煮三炷香分作十瓶

火候存性為末

人指甲灰 血餘灰各一錢

陳松香五錢

共研極細末。擦傷處斷骨即續力傷即愈以四味等分。將酒內服亦可。洗方。防風 荆芥 甘遂

共研極細末。擦傷處斷骨即續力傷即愈以四味等分。將酒內服亦可。洗方。防風 荆芥 甘遂

共研極細末。擦傷處斷骨即續力傷即愈以四味等分。將酒內服亦可。洗方。防風 荆芥 甘遂

溫箭鏃木器傷方。用父婦搗成餅子。將火研細末。再用大蠅頭搗成末。酒水研上。隨指處敷之。一日一換。

即出。

又方。用陳臘肉去皮。取紅活美好者。連肥切細。將新象牙末。及人指甲末。拌臘肉內。剝合一處。厚敷四旁。飯項其穢自出。一方巴豆微炒。同蟻蟲同研敷之。

治金瘡方。真降香一兩。五倍子五錢。共為末。搽患處。紫好即收口。加象皮一兩更妙。

治金瘡方。用墨青不拘多少。為末。加响銅屑和匀。搽立愈。

又方。陳石灰無毛小鼠。韭菜根。共搗極爛。作餅貼在背陰牆上。待乾。用刀刮下。研細末敷之。

又方。并治筋骨斷。生半夏。降香節。紅銅屑。五倍子炒。右共等分。為末。搽上紫好。

又方。降香節。製白松香各一兩。血竭錢半錢。沒藥五錢。文蛤五錢。共末。搽紫。一方用五倍子五錢。不用

蛤。

又方。五倍子。黃丹。血竭。大貝母。各一錢。赤石脂四錢。海螵蛸二錢。龍骨錢。共為細末。搽之。

又方。用好雞骨炭。擲地有聲者。不拘多少。與好松香等分。搗成一塊。用老韭菜汁。拌入陰乾。如此搗拌三四

次。方研細末收貯。每遇金瘡敷之。即愈。切不可飲冷水及稀粥。只吃乾飯。

又方。白蠟一兩。勝黃三錢。將麻油四兩。煎數滾。後下二味。再煎數滾。塗傷處即愈。此方止痛止血。並治打傷及湯火傷皆妙。一方用白蠟二錢。勝黃一錢。麻油一兩。

治刀斧傷。止血定痛生肌。真降香。到碑炒存性。五倍子。頭髮灰。右各等分。為末。搽之。將乾箬葉護住。以

軟綿紮定。兩日一換敷。

立止血方。並治針灸危肉發紅出血。及一切血管出血不止者。用熟黃牛糞金之即止。

立止血方。用舊棉絮燒灰掩之。

集靈接骨膏。

生地。當歸。大黃。

寄奴。雄鼠屎。各二

錢。

二錢。

闌楊花。紅花。上肉桂。川烏。草烏。

上肉桂。川烏。草烏。

印

大戟 芫花 甘草

各一兩

甘遂

五錢

五靈脂

山甲

各一兩

紫荆皮 血餘

地鱉蟲

各三兩

野蕪根

四兩

燒仙草

兩

右用麻油四十兩桐油二十四兩煎丹收好。加乳香沒藥竭阿魏各一兩。加桃柳桑槐更妙。另用地鱉蟲一兩。鬧楊花末五錢收。

接骨丹。將龜殼內多年瓦片洗淨。醋煅九次研末。每末一兩。加五加皮。男子髮灰各五錢。好醋調每歲一分。

好酒送下。再用竹四片。將竹青向內夾定患處。勿動。若皮破者勿用。參藥。

又 古銅錢五錢。醋淬。去毛焙。骨碎補

去毛焙

三錢

乳香

沒藥

各去

自然銅

醋

土蠶虫

用生半夏

去半夏不

用以上各三錢。血竭

錢半炒

共為末服

一分。加瓜萎仁七個。同研放舌上。

酒送下頭一次加麝香一釐

又 用母雞一隻。要一筋重者。殺後連毛骨剝爛如泥。再將雞血和內再剝。敷于患處。用紗包緊。三日即愈。

透骨丹。治跌撲損傷。深入骨髓。或隱隱夜痛。或天陰則痛。或年遠四肢沉重無力。此藥主之真神方也。

鬧楊花子

一兩火酒浸炒三次

沒藥

乳香

不去

油

真血竭

錢三

右為末秤准

和勻

再加麝香一分

同研磁瓶收貯。每服三分。壯者五六分。不必用夜飯。須睡好方服。酒可盡量送下。服後避風。有微汗出

為要。忌房事。酸寒茶。醋等物。虛弱者。間五日一服。壯實者。間三日一服。

日數更妙。

加味風灰散

陳石灰

六兩

大黃

一兩

童子髮灰

乳香

沒藥

蒲黃

略炒

各

右石

灰與大黃同炒至

石

灰紫色為度。研細取末。開眼小鼠搗爛極和藥。又搗勻為餅。布包懸掛陰處。不拘刀斧等傷。研末用韭汁拌

敷之。

治跌打損傷方。門柱初時。即于無風處。將紙燃觸鼻內。用力打噴涕二三十則。氣升而止痛。再用胡桃肉搗

爛。傾熱酒內。盡量一醉而愈。

又方。用韭菜汁。與童便各半。和熱酒飲醉。或有折傷脫節。外用糟湯浸洗。外痛搽上。用竹木綁緊。鼻地鱉蟲

又方。骨節跌損脫者。將生蟹一隻打極爛。用滾熱酒傾入。連飲數碗。即以蟹渣塗患處。半日間瑟瑟不休。始處自合。不能飲者。數杯為率。

又方。地蠶虫十個。

地蟻乾培乾

自然銅二錢

骨碎補三錢

乳香五分

右為末。加蘇木三錢。酒煎服。

又方。名七厘散。

當歸尾 紅花

桃仁 大黃

酒浸自然銅一錢

土蠶虫去頭足

骨碎補三錢

乳香五分

右為末。加蘇木三錢。酒煎服。

根燒灰存性

血竭 乳香 没藥

兒茶 硫砂

雄黃 古銅錢

上各三錢

麝香分

骨碎補三錢

右為末。每服大人一分。二釐小兒七釐。以陳酒送下。出汗為度。

和傷方。用遠年地坑中坑砂婆瓦。雖不必在露天。却要透風。有日光照着者為妙。

其砂取淌水石畔。鑿下厚三四寸者更佳。放屋中淨瓦溜中。風吹雨洒。日晒夜露。常常反轉四五個月。看兩面俱白已無臭氣。研極細。

末每兩配入辰砂二三分。每服五六分。空心放舌上。陳酒送下。此方兼治一切虛勞吐血發熱。並婦人一切血瘀。乾血癆症。

治青腫不拘破不破。不用開刃。一夜復原不痛。

名松肉葱白膏。將不精不肥鮮豬肉二斤。去皮骨。加葱白

要一筋半。再加明松香三兩。研極細末。以篩篩過。方可連勿放在肉內。砧為極細。攤貼患處。以布腳帶裏緊繫。不可寬。至過時皮肉還原。與不打五共床上房內。最忌放檀皮等物。須切忌。若膿血水任其流放。總不妨。治過身打傷方。用大生蠍一隻。小者兩三隻。搗極爛。大熱酒沖服。極醉一夜即安。

治頭面跌撲青紫方。用生牛夏末醋調敷之。神效。

治破傷風久不愈。手背彎直。牙關緊閉者。

南星一兩薑汁製

防風一兩

蟬蛻五錢

右為細末。每服三錢。滾黃酒

一碗調服。再吃生葱三四根。以被蒙頭出汗。汗盡為止。忌燒酒。病重者加魚腥一兩。炒存性研末。每服三錢。黃酒調下。其風自退。

一方名獨勝散。但用蟬蛻五錢。去頭足為末。好酒煎服之。

臨枝預服方。自然銅

醜次

當歸酒洗

無名異洗去

土蠶虫

乳香 没藥

地龍去土

蘇木右

各等分。為末。煉蜜丸。雞豆大。每服三丸。開水下。

治杖傷方。初杖時甚者即服童便酒紅花酒。傷處用熱酒浸搽洗。血淨或未淨即用熟豆腐鋪上。其氣如蒸。則血散矣。豆腐連換數次。或白蘿蔔煮半熟打爛。乘熱敷上。連換則不至成杖癰。傷命亦不至潰爛日久也。又方。用細白礦灰成塊者五錢。以泉水或井水入灰于內。化碎攪數十下。澄清。將麻油小半碗亦可。以前澄清灰水傾去灰脚。不用清者。傾入油內。以箸攪數十下。其油即乾。次將大黃細末五錢。樟冰五錢同研勻。入油入調和。然後敷上。以皮紙蓋好。再加草紙。用腳帶繫緊。立時黃水血水流盡。鬆則再替。腫消痛止而愈。一方加生半夏末五錢。白欒二錢尤妙。又方用毛竹節燒灰重者五錢。輕者三錢。好熱酒送下。其痛立止。

治棒瘡神膏。

用猪板油一筋。熬去渣。再入黃蠟三兩。同熬滴水軟硬得中。再下乳香沒藥去油兒茶各一錢。

二分。冰片一錢。共為細末。即傾入磁器內。候溫再加輕粉末三錢。布上攤貼三日。滿口五日平復。

神效打板膏。

治死血鬱結。呃逆。不食。並夾棍傷爛。

乳香沒藥各去油。

輕粉血竭各三錢。

冰片三分。

右為細末。將油蠟同化成膏。貼患處。晝夜

流出惡水。即時蘇甦。

治夾打傷痛。不可忍者。

腳魚一個。鵝二三兩重者。陳酒糟一鍾。銅末錢五。

胡桃肉四

兩。

共搗敷患處。

預備夾棍方。並名小金蓮方。

乳香

沒藥

各一錢。

去油

川烏

草烏

各五錢。

共為末。

將肥皂

炒

二十個。

去弦及內外筋膜。

同藥搗極爛。

在火棍先

一日做四餅。

敷兩拐骨。

過夜次日洗去。

任夾無妨。

如治婦

人金蓮敷在足骨上。

過一夜。

次日洗去。

骨軟如綿。

義方 肥皂一個。

地蠶虫二十

銅末五

陳糟二

共搗敷如前法。

治夾棍瘡方。初夾下將豬肉四兩。用胡椒照人一歲。一粒搗爛敷上。紫好。不用洗。不可解動。一夜即愈。

又方。一出衙門。

即用熟童便一盆。

將足浸之。如便冷。

燒紅磚二塊。淬之即熱。

直至童便面上浮起白油。

其傷

末藥方。人中白

自然銅錢。乳香二錢。

木耳性五錢。

牛膝三

錢。

共為末再用牛膝三

五錢煎

將

酒調服如無末藥可用。

當歸 川芎 乳香 獨活 蟬蟇 胡麻 元薑 紅花 五加皮錢

治櫻傷方。指上櫻過有凹痕用銀硃和酒磨濃依痕圈之自復。

治自刎斷喉方。

自刎者乃迅速之症須救在早遲則額冷氣絕必難救矣初創時氣未絕身未冷急用熟雞

皮貼患處安穩枕臥或用絲線縫合刀口捲上桃花散多此為要急以棉紙四五層蓋刀口上以女人舊布

裹腳週圍遠五六轉繫之頭項鬱而不直刀口方不開三日後急手解去前藥再用桃花散捲患處仍急繩

禁過數日用紅肉膏敷患處外用生肌長肉大膏藥貼之再以絹帛圍裏針線縫緊俟其長肉收功桃花

散方石灰半升 大黃一兩切片二味同炒至石灰變紅色為度去大黃篩細末一切刀瘡出血不止

捨此俱效。

涂糧丸 治脫力勞傷。

皂礬八兩用紅醋二茶杯燉至通紅色放地上熱火毒

殼四錢 厚朴四錢

炒四錢 真廣皮三錢

乾漆一兩炒盡

白芷二錢

川貝母二錢

鐵梗茵陳五錢

不見火

海金沙一錢

餘糧石四兩醋

砂仁四錢

薑汁炒薑

白芨炭錢 枳

仁

錢

共

益母花錢 幾地骨錢 石各為末煮黑棗為丸緩症朝服七分夜服八分重症每服一二錢好酒下此方不獨治腫脹如婦女乾血勞產後朝涼暮熱男婦反胃噎隔腹痛小兒吃泥土生米等物及積年虛黃脫力黃疸等症極重者服至六兩全愈孕婦心服服此藥者忌河豚終身忌蕷葵。

丸方 禹鐘石四兩

炮炙皂礬四兩浮麥

生地二兩

熟地二兩酒煮

當歸一兩當歸酒炒

貝母一兩去心

紅花五

錢

香附

童便浸生木香一兩

陳香櫟炒兩

白术一兩土炒

茵陳杜仲炒

鹽水砂仁去衣

菟丝子炒白芷炒川

牛膝酒炒兩

川椒培

陳皮炒

陳松蘿

百草霜炒

枳壳各一
豨莶草酒拌益母花各二

棗肉二筋九桐子大朝服七分暮服八分陳酒送下忌蕷葵諸豆麵食魚腥萱花糟物瓜茄生冷產後去

皂礬。

園藥

將軍鐵箍散

治諸毒瘡紅腫突起用藥四圍繩之。不令滋蔓走注毒氣。

南星

大黃

鹽霜白梅

蒼耳

根各一兩

白芨 白斂 防風 川烏

各五錢

草烏

雄黃各三錢

右為細末先以蒼耳根霜梅搗爛拌藥

如乾入醋調勻在瘡四圍用藥作鐵箍敷之止留瘡高突處如藥乾以雞毛蘸水潤之日換二三次大妙方

內亦可再加陳小粉五倍白芷蠅牛芙蓉葉薄荷人中白等藥

又方 白芨 白斂 南星 半夏 劉寄奴

各四兩

草烏 五倍子 石膏 大黃

各六兩

芙蓉葉八兩 右

共為末毒硬者菉豆粉和醋調敷毒軟者以蜜調敷留頭出紙外以紙貼之神效

又方 五倍子

十兩

鳳仙花子

三兩

皂莢

三兩

大黃 陳小粉

炒黑 明礬

各三兩

如無皮硝代之共為細末醋調敷神效

一方加芙蓉葉三兩

圍藥方 無膿即消有膿即潰

五倍子一兩

白芷

錢六兩

膝黃

百草霜

各三錢

生半夏

生南星

白芨

陳小粉 飛麵各四

共為末紅醋調敷

一筆消 治切癰腫

雄黃

胆礬 破砂 膜黃 銅綠

皮硝

草烏各一兩

麝香

二錢

右為細末和

蟾酥為條如筆管大金箔為衣用時以醋磨濃

將新筆蘸藥塗四圍連塗數次即愈

神應圍藥 治氣血不和壅遏為瘡高腫赤痛又兼治痰癰寒濕為瘡者用雄小活魚七個鮮山藥四兩大葱頭連鬚二十一個共搗爛再用千年陳石灰半斤生南星生半夏白芨細末各一兩和研陰乾研為細末臨用之時蜜水調敷四圍外用綿紙掩之

治一切無名腫毒圍藥

膝黃

五倍子

兩

白芨

葱頭各一兩

用米醋調圍患處留頂勿敷

塵手散

金銀花

白芨 白斂

川烏

草烏

芙蓉葉

南星

半夏

大黃 五倍子

黑炒

陳小粉

黑炒

陳石灰

紅色為度各四兩

牙皂

乳香 沒藥

蟾酥各五錢

丁香

四錢

共研細末臨用時加麝香一

分陽毒用醋調敷陰毒燒酒調敷加鮮山藥蕩白頭

人頭上垢擦霜鴉和前藥調敷患處中留一丸出

一兩酒乾或
失乾亦可
薑汁 大蒜汁各半
葱汁 五兩
右藥用陰陽水四斤煎至半斤去濁再用江蛇三兩麝香
三錢雄黃一兩研蜈蚣一兩研燒酒三兩盛傾銀罐內將鐵油盞蓋定炭火升過候酒盡即起再用燒酒一
角并後五味入藥內熬成膏子用磁器收貯臨用時將井水化開圍患處如火之熱其毒即時消退可收下
再治後人如不前膏將前藥晒乾酒燒酒再晒再酒酒盡為度作末收藏臨用時細以井水調圓亦妙
立消腫毒方名五色蟾酥墨雄黃銀硃胆礬韶粉膳黃銅綠硃砂麝香

右共為末蟾酥為條如筆管大陰乾水磨塗患處立消

〔提藥〕

治一切陰症惡瘡毒癰初起白色不甚腫附骨疼痛敷藥提出陽分生半夏生山梔生白芥子右谷等分飛麵葱汁白蜜調圓頂上留一小孔乾則以葱蜜汁潤之一日兩換自然紅腫高起

治陰症痘發父葉一斤硫黃雄黃各五錢以水同煮半日搗爛候溫敷上再煮再易十餘次知痛者可生

治陰症敷藥方山梔苦杏仁各二十粒北細辛錢青壳鴨蛋清個白蘿蔔一小生葱頭二個飛

麵一兩蜜一兩右藥研末共搗爛寒天隔湯敷溫敷患處每日一換敷三次即消

治陽症圓藥方花粉黃柏薑黃薄荷葉人中白大貝五倍子芙蓉葉各三白芷南星

白芨白欵各兩大黃小粉各五兩右共為末敷患處

拔毒異法以極細鐵屑將好醋煎二三沸撈醋中鐵屑鋪于患處將上好活磁石一大塊頻頻吸之陰症用此其毒自出也

清涼救苦散治一切天行時疫頭面耳目鼻腮項頸紅黃煎濃汁將甘石放在銀罐內燒極紅收汁約九次以甘石酥為度晒乾研細加冰片五分治口碎點眼甚妙加珍珠少許治下疳可生肌長肉凡有熱毒配三白頭翁藥人乳調敷立愈

提藥方 治諸毒不起敷之立起

勝黃 雄黃各三錢

蟾酥

紅藥各二錢

冰片

麝香各一錢

草麻子肉一兩

先將草麻子去皮打如魚凍水入諸藥打成膏磁罐收貯勿令泄氣按此方與砂勝散相較斟酌其分量該用勝黃雄黃各三錢紅藥三錢或四錢冰片蟾酥或不用麝香或三分再宜加辰砂一錢
大提藥方 圍敷初起對口發癰惡疽四五日即可消
雄黃 腹黃 真當門子各一錢
要不丸不散
紅昇藥一錢五分如用一錢則畧緩難效
先將草麻子研如泥後和各藥研爛用蒙牙匣封藏外用虎皮包好則不泄氣

黃提藥方

鬱金 雄黃 腹黃各二錢

牛黃 蟾酥

礦砂

麝香 冰片各五分

巴豆肉八錢

草麻子肉

右各研細搗碎遇症放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成用之化腐疗毒更妙

白靈藥 蘆甘石

黃連一兩 黃柏

黃芩各二錢

將三黃煎濃汁將甘石放在銀罐內燒熱紅收汁約九

次以甘酥為度晒乾研細加冰片五分治口辟點甚妙加珍珠少許治下疳可生肌長肉凡有熱毒凡三白朝昇藥人乳調敷立愈

紅昇丹 名五靈昇藥 水銀 淨火硝 白藥 皂礬 炒白鹽 以上藥各九錢煉法將前藥共研至不見水銀星盛于新大傾銀罐內以微火溶化火急則水銀上昇走燭須用炮炭為妙熬至罐內無白烟起再以竹木枝撥之無藥屑檢起為度則藥吸于罐底謂之結胎胎成用大木盆一個盛水水盆內置淨鐵火盆一個以木盆內水及鐵盆之半腰為度然後將前結就之胎連罐覆於鐵盆內之舌中以鹽水和黃土封固罐口勿令出氣出氣即走燭再用淨灰鋪於鐵盆內灰及半腰將灰按平不可搖動藥雖恐傷封口那要

降藥

白降丹 名夏冰對配丹 水銀 淨火硝 白藥 皂礬 炒白鹽 以上藥各九錢煉法將前藥共研至不見水銀星盛于新大傾銀罐內以微火溶化火急則水銀上昇走燭須用炮炭為妙熬至罐內無白烟起再以竹木枝撥之無藥屑檢起為度則藥吸于罐底謂之結胎胎成用大木盆一個盛水水盆內置淨鐵火盆一個以木盆內水及鐵盆之半腰為度然後將前結就之胎連罐覆於鐵盆內之舌中以鹽水和黃土封固罐口勿令出氣出氣即走燭再用淨灰鋪於鐵盆內灰及半腰將灰按平不可搖動藥雖恐傷封口那要

走爐鋪灰畢。取燒紅栗炭。撥鐵罐底用扇微扇。煉一炷香。謂之大丹。略重扇。燒一炷香。謂之小丹。隨添勿令間斷。而見罐底再煉一炷香。即退火。待次日盆灰冷定。用帚掃去。盆灰併將封口土去淨。開看鐵盆內所有白霜。即謂之丹。將磁瓶收貯。待用。愈陳愈妙。其罐內原胎研搽。瘡神效。若恐胎結不老。罐覆盆內。一遇火煉。胎落鐵盆。便無丹降。亦為走爐法。用鐵絲作一三脚小架。頂爐內擇住丹胎。再為穩妥。此丹若遇癰疽發背疔毒。一切惡毒。用一釐許以津唾調點。毒頂上以膏藥蓋之。次日毒根盡拔于毒頂上。結成黑肉一塊。三四日即脫落。再用昇藥數次即收功。此丹用葛粉糕以水少潤。共和極勻。為細條晒乾。收竹筒內。名為錢子。凡毒成管。即約量管之深淺。插入錢子。上蓋膏藥。次日擠脰。如此一二次。其管即化為膿管。盡再上昇藥數次。即收功矣。此丹比昇丹功速十倍。但性最烈。點毒甚痛。用生半夏對搗。再加冰片少許。能令肉麻不痛。

又方。水銀一

青鹽

皂礬各二

火硝二兩

硝砂

雄黃

硃砂各三錢

白砒五分

明礬二兩

右共研

勺放陽城罐內。微火煨乾。後降三炷香。候冷取藥。不可放生人難大冲破石腫毒。未成名件者。用醋調點。患處頭上看毒大小。如桐子大。泡起毒即消。若已成不肯穿者。亦用此丸。將膏藥貼頭上。半日即穿。

又方。水銀一

火硝一

生礬各五

食鹽二分

右共研末

入傾銀罐內

放炭火上。文火煎滾

至邊上。先起焦

黃色。候至滿面俱焦。黃米為度。將罐離火候冷。再用圓正擂盆一個。裏面須擦光細者。將銀罐連藥輕輕倒合。在擂盆內罐口與擂盆縫間。須用棉紙調墨水潤濕。加鹽泥封固。然後將擂盆坐于大水盆中。罐底上先

加文火。用扇扇之。先文後武。煅玉五寸。纏香為度。退去炭火。候冷先掃去罐口外鹽泥。然後開罐。取降子擂

盆底內之藥。藥色以潔白如霜者為上。若青黃黑色者。不可用。或以銀簪腳與磨壳刀頭略沾微唾。蘸藥在

上。即刻起鏽者為佳。每用新棉花蘸藥。敲些于膏藥上。比昇藥更要少些。貼後兩杯熱茶時即發痛。半

日即止。毒重者每日一換膏。毒輕者貼兩三日亦不妨。若貼大腫膏。膏上先放些寸香阿魏。然後上此藥少

許。貼之若要做咬頭藥。代針丸。將麪糊以竹片拌和。做成細條。切作三。麻粒大。放膏心中。對腫心貼之。此藥

不可沾在指頭上。沾則要疼痛發泡退皮。此藥陳久者少痛性和緩。却要多用些。如第一次降完開出。倘藥色不白。可將罐內之藥刮盡此藥無所用處。只將降于擂盆底內之藥刮出。另將水銀火硝生礬各五分。食鹽二分。並將擂盆內降不透之藥與四味頭一併研和從新再入銀罐照依前法降之。此藥若一次降不好。不妨兩次三次連降。即降至十數次方能降好。計算已有水銀五錢在內矣。每次只要將銀罐刷淨或另換新銀罐。每次只要水銀火硝生礬各五分。食鹽二分。直至降到好方止。初起前時須要火候得法。若火候不及。則罐中結胎尚嫩。水銀尚活。倒合轉來。非連胎墮入擂盆底內。即活。水銀先溜入擂盆底中。若火候太過。結胎太老。非水銀先已飛去。即有降不下之病。總以結胎不嫩不老為度。用煤炭火最得法。凡瘡毒已穿破者忌用。

代針點頭

代針膏 治瘍瘻膿熟不潰 乳香分 白丁香 巴豆炒 碱各五
水潤之。

又方。桑木灰鐵 磚子灰鐵 蒼麥楷灰 茄科灰各一
渣。將水從瓶用鐵杓熬至一小杯存用。如腫毒數日內有膿不得自破其頭如瘡大者。將此藥在頭上畫一
十字。即破。其膿就出。諸般大瘡。有疔角腐肉不脫者。用此藥水洗之。即去。又點面上黑痣雀神效。
透骨丹。蟾酥硼砂 輕粉 巴豆各五 蝎牛個 膏香分
每用少許。乳汁化開。將瘡頭輕輕撥破。挑藥如米許。大納于瘡口。外以膏藥蓋之。

長肉收口

生肌散 即名海龍粉 龍骨 血竭 紅粉霜 乳香 沒藥 海螵蛸 赤石脂各一 嫩石膏分右
為細末敷上極效。大凡諸生肌散內。要配紅粉霜。若要去腐肉。每生肌散一兩。配入粉霜或三分或五分。
右下生肌散。每兩只配入一二分。

又方 火焰 象皮 味覺灰 大貝母 青膏錢

赤石脂 鹿角膠 雞子白肉 雞子白肉
兒茶分 雞子白肉 雞子白肉

白螺

收口擦藥 龍骨一錢 厚象皮二錢 熟石膏五錢 兒茶輕粉 乳香沒藥去油 琥珀各五分

蟬壳煅末
二錢

右共為細末擦上即愈

又方 燈草灰 白螺蟬壳煅末 藪黑傘紙煅灰

輕粉各三冰片 珍珠各五分

血竭分

八寶丹 治膚肉已盡新肉遲生 擦上立效

血竭分

八寶丹

治膚肉已盡新肉遲生 擦上立效

乳香沒藥各去油

血竭輕粉各二錢

兒茶龍骨

鉛粉

潤肌散

治一切瘡癩結蓋後乾痛及冬月手足凍裂並湯火傷

當歸生地各五錢

真麻油四兩

將藥入磁瓶收貯

一方用黃占七錢白占五錢

潤肌散

治一切瘡癩結蓋後乾痛及冬月手足凍裂並湯火傷

當歸生地各五錢

真麻油四兩

將藥入磁瓶收貯

一方用黃占七錢白占五錢

〔麻藥〕

麻藥方

此係外科動刀針不痛之藥 白芷 製半夏 川芎

木鱉去壳依法炮製

烏藥牙皂當歸大

茴香

紫金皮各二兩 杜香五錢 川烏 草烏各一兩

共為細末每服一錢好酒調下

麻木不知疼痛若

人昏沉

用鹽水飲之即解

又方

名孫武散 菖撥 生半夏 南星 肉桂 乳香 没藥 胡椒各一錢 川烏 三七 蟬酥 草

烏各二

丁香八分 腰香少許 花蕊石二錢 風茄子三錢

共為細末入磁瓶內臨用敷之

〔瘡癩〕

治血瘤方

用甘草煎膏以筆塗四圍一日上三次又將芫花大戟甘遂各等分為末醋調另以新筆塗甘草

圈內勿近甘草次日縮小再如前塗三四次愈

繫瘤法

兼去鼠蠶痔用芫花根洗淨帶過不得犯鐵器于木石器中搗取汁用線一條浸半日或一宿

之極

如無芫花根口用花泡濃水浸線

之極

之極

之極

消瘤方。用極細生鐵屑醋拌於銅杓內煅乾則再煅。如此三四次研極細。再用醋調敷。便覺患處不甚適意。過宿剥去。再敷以平為度。

治眼皮生瘤方。用生雞蛋一個。頂上敲一小洞。入川貝母末。仍糊好飯上煮熟食之。每日吃三個。一月自愈。
枯瘤散。灰覓采即藜藿晒乾。蕎麥燒灰。風化石灰。三味和一處淋汁三碗。慢火熬成霜。取下配後藥。
番木鳖去油三十個搗半碗。巴豆六十粒搗半碗。胡椒十九粒搗明雄錢。人參一錢。右共為末。入前藥和。并以磁瓶收貯。不可見風。以滴醋調勻。用新羊毛筆蘸藥點瘤。當頭瘤有椀大。則點藥如龍眼核大。若茶盃大。則點藥如黃豆大。乾則頻頻點之。瘤自枯落。如血瘤破以髮灰擦之。粉瘤破以白麻皮燒灰擦之外。以膏護好。自能歛口成功。

飲瘤膏。治癰瘤枯落。後用此搽貼。生肌收口。海螵蛸。血竭。輕粉。龍骨。象皮。乳香各一錢。雞蛋五個煮熟用黃。熬油一小鐘。右各研細。末將蜜油調勻。用甘草洗淨患處。以雞毛掃敷。再將膏藥貼之。
治癰氣頸腫方。黃藥子一觔。酒十觔。浸之入瓶蒸透。常常飲之。勿絕酒氣。三五日漸消。常把鏡照。或以線每日量之。覺消即停飲。否則令人項細也。

海帶丸。治癰氣久不消。海帶。海藻。貝母。青皮。陳皮各等。右共為末。蜜丸如彈子大。食後噙丸。

〔諸風〕

治大麻風方。此症全身腫脹。頭髮眉毛俱落。兩脚臭爛者。重將蝦蟆一隻。用泥裹之。燒熟去泥。乘熱放磁碗

內。以滾黃酒冲入。上用小磁碗蓋之。泡半時止。服酒取汗為度。只用一次。三日全愈。

治鵝掌風方。用白鵝糞為末。夜間先用生桐油塗患處。將鵝糞燒烟薰之。須用舊吊桶去底。罩火上。以手置桶上。手上用物遮蔽。勿使烟氣泄去。薰至黃色為度。薰後勿洗手。須過一夜二三次即愈。

又方。用紫背浮萍。不拘多少。晒乾瓦上燒烟。將患處熏之。到熱時用扁柏搗汁塗之。極重者三次必愈。
又方。將稀荳草一把。藏糟一小塊。煎湯洗手。將生桐油搽患處。用青松毛繫炭火上燒烟薰之。勿見易水。

次日再搽再薰。如此七日全愈。指甲壞者俱發。屢試屢驗。真神方也。六月伏中治之更復除根。
又方。用大黃蟷一條。去腸與頭尾。切一寸一段。以香油四兩入鍋內。將魚豎起。煎至將枯。去魚留油入磁
罐內。將穿山甲燒為末。用少許。以此油調搽患處。將炭火炙。

又方。併治一切手足癰。用香樟木打碎煎湯。每日早晚溫洗三次。洗半年必愈。

治鴟膝癰方。此症初起。雖用火針及灸。及一切敷提之藥。皆不能效。必要使兩膝眼發泡。泡穿出黃水。方能
奏功。用老虎腳跡草。取其根打爛。入蜆壳內。合膝眼上。紮好。待發泡桃穿出水。俟其結疤。即能行矣。大約一
月全愈。一方用鐵線吊草根一分。石見穿草用根梗。俱紅色者佳。連根梗葉俱用。如秋冬根梗俱老。止用
其葉半分。俱要當日取新鮮者。隔宿勿用。同打加飛麵少許。亦紮膝眼內。

又方。開年花。蒼术各四兩。雨蒼术各四兩。將童便煎數滾貼患處。

又方。大肥皂四個。去核。生薑。葱各四兩。大附子八錢。硫磺五錢。將陳米醋一斤煎藥搗如膏。加樟冰一兩共

研和敷患處。止痛。

治白癰風方。硫磺蜜陀僧輕粉各一錢。

麝香釐五

右共為細末。白水加蒂。蘸藥擦之。生薑片亦可糟加

蒂。更妙。

治腎囊風濕熱症。搭作痒。搔之則痛。名蛇床子湯。

蛇床子歸尾靈仙苦參各五

用水五碗。煎數

滾入盆內。先薰後洗。兩三次即愈。

治腎囊痔方。用葱三十根。胡椒花椒各一兩。蛇床子末一兩。均作三服。煎湯洗之立愈。

治腎囊腫內有疥虫。用好花椒烘脆。研極細末。真柏油調金外。以舊帛包之。

治腎囊風腎子腫大。一名癢癩風。將雞蛋煮熟。去白留黃。炒出油。再用老杉木燒灰。存性。調油搽之。

治腎子爛出方。用老杉木燒灰。存性。蘇葉為末。各等分敷上。仍以蘇葉包之。

治腎子腫如水晶。陰汗潮濕方。用灶心土三升。研碎砂鍋內炒極熟。加川椒小茴香子上。將陰囊放在上面。

冷即再炒三次即愈。內服除濕湯。

治腎濕方。

白枯礬五錢

蛇床子二錢

黃柏

大黃

石菖蒲

各一兩

右為細末和水河水調敷濕則乾燥或

用六一散擦之亦效。

治男子陽痿囊濕女人陰痒方。

用蛇床子煎湯洗之立愈。

(癬疥)

治各種癬疥方。用新鮮羊蹄葉不拘多少搗爛加川椒白糖並食鹽少許以布共包之浸好陳醋內半日取布包搽癬三日即愈。

治濕癬方。癬成濕瘡浸淫轉甚以至諸藥不效者。

用蘆薈二兩炙甘草一兩俱研極細末先以溫漿水將癬洗淨調敷之乾便瘥真神方也。

治癬方。大靈蜂房一個不拘多少以生礬填入孔內用破罐盛之仰口朝上用炭火煅令白礬化盡為度取

出共研末搽癬上一二次即除根永不再發。

又方。

火硝 石灰 輕粉 硫磺 銀硃

右各等分研細用老薑汁。樹汁大蒜汁蜜汁土大黃汁。共和

一錘將前藥入汁內攪如漿糊先用穿山甲刮破取桺榔切斷蘸藥搽五日愈。

又方。名九薰丹。

用上好銅青二三兩研細將上好燒酒拌之須不乾不濕。金子粗工碗底內翻轉合地上

以磚墊露一線下以薪艾薰之候乾再拌再熏如此九次少亦要七次約以青色帶黑為度然後再研細將燒酒拌做成錠子用時以醋磨搽每日三五次三五日後若覺乾裂以菜油少許潤之七日可愈。

又方 生半夏三粒

明礬一錢

鳳仙花葉二十朵梗

土大黃根不拘多少

右共搗爛和醋少許先以穿山甲刮碎

患處搽上即愈。

又方 銀硃

勝黃各一錢

將谷樹汁調搽一二次即愈。

又方 川槿皮

海桐皮 尖檳 樟木 苦參 黃柏 白芨

雷丸五分

楓子 杏仁

各二粒木蠶

用火酒浸七日將井山甲刮碎少許以酒茶之即愈。

又方

土槿皮兩

苦參兩

研蟻足尾炒黃

土木鵝子肉錢

米梢根生熟

生南星錢

生半夏

生甘草

錢三

用河水井水火酒各一碗將前七味先浸一宿至臨前時入南星半夏再添河水井水火酒各一碗煎

一炷香時候去渣存性埋土中七日出火毒否則發泡痛甚不時塗擦

又方名五黃散

雞腳大黃

硫磺

雄黃

薑黃

右各等分

為細末

菜油調塗患處

七日勿

洗沐全愈

又方硫磺研細

蛇床子一兩畧炒枯取起乘熱

生礬

枯礬炒過花椒衣

樟腦

水片各五錢

硃錢飛鹽分三

右共為細末以生豬板油去筋膜

搗如泥調和少許

先將患處刮碎

以手指染藥擦之

藥

不須多但取滋潤

浴後擦之每日三五次忌浴三日即愈或柏油調亦可

并治疥瘡

治癩疥瘡方生礬

枯礬水銀各二錢

尖梅榔五錢忌

蛇床子五錢

斑蝥七個用糯米同

炒熟去米不

用先將水銀放罐子內

即入青鉛二錢俟青鉛與水銀烊成一塊

取起然後將梅榔研細

次將斑蝥研再

將明礬雄黃研總以極細為妙諸藥和勻方入水銀再研用無蠟柏油再研和搽擦一二二次即愈

凡男婦

並小兒頭上乳頭上陰囊上俱忌搽

未出痘小兒忌搽

又方蛇床子

苦參無美各一錢

雄黃五錢

枯礬二兩

硫黃五錢

輕粉錢

右各為細末

生豬油調搽

椒榔五錢

右各為細末

生豬油調搽

(汗斑)

治汗斑方白附子

硫黃蜜院僧各一兩

右俱為末用生薑蘸搽三五日即愈

又方蜜院僧錢五

硫黃一兩右研細末

醋調燒薑蘸搽患處次日即佳

每日搽一次七日內須忌洗浴待其

黑色退即愈矣

治夏月汗斑如疹方

蜜院僧八錢雄黃四

右研極細以薑蘸藥搽之

治癰子方菜豆粉一兩滑石五錢

輕粉二錢右為細末

以棉蘸藥搽于患處

雀斑

治雀班方 名艷容膏。白芷

甘菊花去梗各三錢

白蘿蔔二十個

紅棗十五個

珠兒粉五錢

豬胰一個

右將珠

粉研細餘俱搗爛拌勻。外以蜜拌酒釀燉化。

入前藥蒸過。每晚搽面清潔洗去。

硼砂各三錢

石羔

滑石錢各五錢

又方。名玉容散 白僵蠶 白附子 白芷 三柰

研末

右為細末

臨睡用少許水和搽面

人乳調搽更妙

滑石一錢

白芷一錢

白附子錢

白丁香一錢

冰片

治雀斑酒利白屑風皮作癢。名玉肌散 真桑豆粉八兩

滑石一兩

白附子一兩

白芷一兩

白附子錢

右共為細末每

晚用數錢搽面

治雀斑亦治瘡疤。將清水調鷓鴣盞之自愈

疣瘻

點一切疣瘻及癰肉雞眼方。桑紫灰 風化石灰各一觔

鮮威靈仙六兩

前濃汁淋二灰取汁熬成稀膏

器貯用。點諸患處不必挑破應手而除

治瘻方。用水調石灰一盞如稠粥樣。揀整糯米不破者半插灰中半出灰外經一宿米色變如水晶樣用簪桃少許置米於瘻上半日瘻自脫出不得着水三二日愈

小兒

治小兒初生下滿身無皮但是紅肉。用早稻米粉乾撲至生皮方止或以伏龍肝雞子清調全

小兒初生

小兒初生即服此藥。花痘稀疏并不生瘡癰。大黃分 甘草分 砂砂研末

將上二味人乳浸飯上擦

一時去渣加入砂砂調勻服之

凡小兒初生口脣并牙根生白點。名馬牙不能食乳急用針挑破出血用好京墨薄荷湯磨以手指蘸墨遍口
脣擦之切勿令食乳待睡方可

小兒雪口

硼砂七厘 火硝三厘 水片五厘 銅綠一厘

日即愈。甚者敷二三次。

小兒初生數日內不吃乳。舊方用猪婆乳然而難得。今即用活蚌剖開。取水三四茶匙服之。即能吃乳矣。神效。

小兒臍風

初生後七日或臍口受風。令兒生病。令乳母每日午時前看小兒上膀才根。但有如粟米白泡。隨用手輕磨破可免他疾。

臍爛不乾

用白羯子即獐子燒灰敷上。即愈。或用枯礬龍骨煅過為末敷上。

封臍散

斷臍帶後用

龍骨一錢

紅棉灰一錢

歸頭一錢

右為細末。用少許乾擦臍上。

小兒無辜卒死

取葱白納入下部及兩鼻孔中。氣通或嚏即活。

稀痘丹。赤豆赤豆飯

黑豆 綠豆

粉草兩

各二

為細末。用竹筒刮去皮。兩頭留節。一頭鑿一孔以藥末入

筒中。用杉木砧塞緊。黃蠟封固。以小繩繫之。投入臘月廁中。滿一月即取出。洗淨。風乾。每藥一兩。配臘月梅

花片三錢。和匀。若得雪中梅花片落地上者。不着人手。以針刺取者更妙。如急用。入紙封套內。略烘即乾。兒大

者用一錢。小者用五分。俱以霜後絲瓜藤上小絲瓜煎湯調空心服。湯宜多服。服後忌葷腥十二日。解出黑

糞為驗。一次可稀。三次不出。每年服一次。

稀痘神方。傳方之家已十三代未出天花矣。

草麻子三十六粒去壳揀

白色朱砂一錢須透紅碧

真麝香五厘

將三味於乳鉢內

研爛如泥。每年端午日午時。用手蘸藥搽兒頭項心前心後兩手心。兩足心。兩手灣。兩腿灣。腋下。共搽十

三處。如銅錢大約半分厚。搽藥後任其自乾自落。不可洗去。即端陽前半月初生小兒亦可至期搽用。

梅花丸 治小兒痘疹。起死回生之病。臘月取梅花，不拘多少。陰乾有一兩外用。

當歸一錢

茯苓一錢

升麻五分

竹茹八分

甘草三分

用水鐘牛煎至八分，溫熱時將梅花拌浸一日，取出曬乾研極細末。

如小兒兒病，用老雄雞兩只，右足如前取血，製造曬乾，以好磁器收貯，不拘遠年，近日應用。

此方濟人萬無一失。小兒臨危，任是毒甚，略有微氣，用滾水送下，不拘時，只不宜多服。

人牙散 人牙（一兩鹽泥固存性）研極細末，每服一枚，酒下。凡痘密如蠶種，皮毛一片無異，跡者，死症也。法取人牙煅研，酒調四五朝時服之，痘可立起。

換痘丹 屏角一錢 梅蕊一兩 絲瓜灰一兩 雄黃一錢

硃砂二錢

滑石一錢

麝香三分

右為末，用麻黃膏丸，如

芡實大每服一丸，酒漿化下。凡痘密如蠶種，皮毛一片者，服此毒使解痘即變，另發一層，好痘起死回生。

紫金錠 治小兒一切危痘。各照湯引磨服神效。

辰砂五錢 陳胆星一錢 蟬蛻三錢 甘草三錢 膜香一錢

硃砂二錢

滑石一錢

麝香四分

白附子一錢

白附子四錢

一方加殼蠶三錢 白附子五錢 減去甘草一錢

共為極細末，飯搗丸，無鍊重五分。

救逆痘

痘至七八日，或十日，灰陷倒塌，扒破無血，空壳無漿，目閉不食，破損處如焦木灰色，危篤垂死。老白雄雞冠愈多愈妙。白酒釀十匙，芫荽汁二十匙，三味攪和，隔湯燉，徐徐熱服，少待皮膚紅活，即有另發大痘，目復閉合，面復腫，其內陷之毒皆復發出，漸思飲食，初與米飲，次與黃芪粥飲，不必更服他藥也。服一次，若未全起，五更再與一服，倘面紅氣喘不妨。

神燈照法 治痘瘡塌之極火到癰除，川椒、艾葉、紅棗、芫荽、茵陳、乳香、白芷梢、陳香櫟。

安息香

共為末，作紙燃薰照。

象牙散 治痘後翻疤

新家才

兒茶半錢 磬壁斷絲

大貝母錢 無床乾擦

共為極細末。宜用油胭脂調金。

毒水如注漸收口

痘瘡餘毒。眼目膜障。用蛇退一具。洗淨煆燥。又用天花粉。與蛇退各等分。以羊肝破開。入藥在內。麻皮縛定。

再用米泔水煮熟食之。旬餘即愈。再蛇退用潔白色者。若用雜色者有毒。

拔毒散

治痘後手足肩背痘毒癰腫

韶粉一兩

大黃五錢

雄黃三錢

五倍子一兩

乳香五錢

沒

藥另研

黃丹五錢

白芨一兩

黃柏七錢

白芷一兩

共為細末

蜜水調搽

治痘毒方

用鮮棟樹根皮同菜豆搗爛。厚敷患處立愈。

齒病敷藥方

治小兒痘疹餘毒。牙齦破爛出血。或成走馬牙疳者。立效。并治大人牙爛口舌破碎如神。

人中白

銭一分

銅綠三分

麝香分

共為細末。茶洗口牙。淨後用指頭蘸藥。末敷上即愈。

天花開在眼中方

用新象牙磨水滴入眼。其花即退。

痧症發不透

穿山甲五分。火未收起

先以西河柳一兩

薄荷五分

水煎濾清。入白酒釀。

山甲末調和熱服。暑月

不用酒釀。

探生散。治小兒急慢驚風諸藥不治。以此定其死生。

雄黃錢一粒

沒藥錢一粒

乳香五分

麝香二分

右為末

用少許。吹鼻中。如眼淚鼻涕皆出者可治。

青礞石散

治小兒急慢驚風。潮涎壅塞。命在須臾。此藥入口即活。

青礞石一兩

入砂鍋內同火硝一兩

用炭火煅令通紅。以硝盡為度。候冷如金色。研為細末。每服二三分。薄荷湯下。

治小兒急慢驚風。

五月五日午時。取白頭蚯蚓。不拘多少。去泥活搗爛。加辰砂等分。和勻為丸。如菜豆大。金

箔為衣。每服一丸。白湯送。

取蚯蚓時。用竹刀截兩段。

看其跳快者。治急驚風。

跳慢者。治慢驚風。作二處修

合極妙。

毒水如注漸收口

痘瘡餘毒。眼目膜障。

用蛇退一具。洗淨煆燥。又用天花粉。與蛇退各等分。以羊肝破開。入藥在內。麻皮縛定。

再用米泔水煮熟食之。旬餘即愈。再蛇退用潔白色者。若用雜色者有毒。

拔毒散。治痘後手足肩背痘毒癰腫。

韶粉一兩。大黃五錢。雄黃三錢。

五倍子一兩。乳香五錢。沒

藥另研。黃丹五錢。白芨一兩。

黃柏七錢。白芷一兩。

共為細末。蜜水調搽。

治痘毒方。用鮮棟樹根皮同菜豆搗爛。厚敷患處立愈。

齒病敷藥方。治小兒痘疹餘毒。牙齦破爛出血。或成走馬牙疳者。立效。并治大人牙爛口舌破碎如神。

人中白銭一分。銅綠三分。麝香分。共為細末。茶洗口牙。淨後用指頭蘸藥。末敷上即愈。

天花開在眼中方。用新象牙磨水滴入眼。其花即退。

痧症發不透。穿山甲五分。火未收起

先以西河柳一兩。薄荷五分。水煎濾清。入白酒釀。

山甲末調和熱服。暑月

不用酒釀。

探生散。治小兒急慢驚風諸藥不治。以此定其死生。

雄黃錢一粒。沒藥錢一粒。

乳香五分。麝香二分。右為末。

用少許。吹鼻中。如眼淚鼻涕皆出者可治。

青礞石散。治小兒急慢驚風。

五月五日午時。取白頭蚯蚓。不拘多少。去泥活搗爛。

加辰砂等分。和勻為丸。如菜豆大。金

箔為衣。每服一丸。白湯送。

取蚯蚓時。用竹刀截兩段。

看其跳快者。治急驚風。

跳慢者。治慢驚風。作二處修

合極妙。

小兒急驚風

急驚者。身熱面紅。瘡盛忽然手足牽引。啼不出聲。目睛上視者是。取活蚌一個。銀簪腳挑開。滴入薑汁。將蚌仰天片時。即有水出。用磁杯受之。隔湯燉熟灌下。立愈神效。

小兒急驚風。石菖蒲搗爛绞汁二三十匙。老薑汁數匙。和均灌下即愈。

啞驚風。細葉菖蒲搗汁和雪梨汁同飲。

小兒驚癇迷悶。嚼舌仰目者。犀角尖五分。磨成粉。滾水冲服。

小兒五癇。

甘遂末一錢。

蜜水

猪心一個。外以乾麵糊包在竈火內煨熟。去甘遂末連麵食之。

秘傳抱龍丸。專治小兒着驚。傷心肺。二經即唇青四肢搖動起卧不安。蓋抱者保也。龍者象東方肝木也。

故此丸為治驚之要藥也。

赤芍一錢。

川貝母七錢。

防風五錢。

桔梗三錢。

明天麻一錢。

鈎藤三錢。

枳

壳三錢。

薄荷葉三錢。

胆星錢。

陳皮三錢。

天竺黃三錢。

茯神二錢。

共為細末。

煉蜜丸桐子大。砂砂為衣。每服

一丸。滾湯下。有外邪薑湯化下。

諸手癲癇。

白礬一兩。雨茶一兩。

共為細末。蜜和丸桐子大。每服五十九。食遠陳茶送下。小兒二三十丸。

猴子瘡。

名二粉散。是症從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結痂。或眼稍口旁亦紅若不早治必至

爛死。

凡見此症時切忌洗浴。只見軟綿帛蘸甘草湯揩淨。用藥雖延蔓遍身可保立愈。此方極秘已救人無

算矣。

菜豆粉一兩。標硃一兩。

水片一分或二分。

輕粉半錢。

右為極細末。

將金汁調鵝毛蘸敷上。如無金汁

雪水亦可。或用燈心甘草湯亦可。

一方輕粉用二錢。加牛黃二分。內再服化毒丹。

乳母煎藥方。

小兒患喉。乳母亦宜服藥。養精神強弱。服分數不拘。

黃連一錢。

金銀花一錢。

連翹一錢。

甘草一錢。

赤

芍一錢。

當歸一錢。

牛膝一錢。

桔梗一錢。

黑山梔一錢。

薄荷一錢。

木通一錢。

右各等分。用新汲水煎渣。再煎食。遠服。

頭耳疳瘡。

將明松香用草紙捲之。浸菜油內半日。取出點火。將淋下油加飛丹枯礬在內調匀。冷定搽之。

黃丹三錢。

枯礬一錢。

黃柏三錢。

銅綠三錢。

白芷三錢。

共研細末。菜油調合。一二次外敷。

頭面疳瘡。

黃丹三錢。

枯礬一錢。

黃柏一錢。

銅綠一錢。

白芷一錢。

共研細末。菜油調合。一二次外敷。

頭上疳瘡 明松香一兩 入葱管內煎乾了同飛丹一兩炒過研細水酒調擦
治面耳疳瘡下疳諸般惡症 樟腦二錢 銅青一錢 輕粉一錢 楓子肉各一兩 蛇床子二錢 雄黃一錢 黃丹一錢 寒水石一錢

硫黃豆腐製各一兩五錢

漏蘆

枯礬各二分

共為細末

猪油調擦

痧痘後走馬牙疳 明礬五錢

冰片半分

白硼砂二錢

人中白一錢

皮硝一錢

雄黃牛糞尖一個火燄

黑存性

共研細末

吹入患處立愈

小兒痘後痧後牙疳方。雄黃牛糞尖須用經霜者妙。瓦上炒成灰存性。每錢入冰片二分研細吹患處立愈。

治小兒走馬牙疳方。用女人溺桶中白以火煅過研末一錢。銅綠三分。麝香一分。共為末擦患處即愈。小兒口疳。並治走馬牙疳。冰片半分。甘草二分。兒茶二分。龍骨一分。黃柏五厘。薄荷五厘。春夏用薄荷五分。兒茶二分。秋冬季用薄荷三分五厘。兒茶一分五厘。腐爛者方加龍骨。走馬牙疳加珍珠五厘。西牛黃三厘。症癰者方用上二物。

口疳吹藥 人中白一兩 黃柏末一兩 青黛錢 枯礬錢 水片許 文蛤錢 紫甘蔗皮灰五錢 共為細末吹之立愈。

集仙固齒丹

五倍子

龍骨二分

甘草三分

蔗皮灰五分

人中白五分

黃柏末三分

青黛一分

枯礬一分

冰片一分

薄荷三分

兒茶三分

黃牛糞尖一錢

炙存性

共為細末吹之

治小兒口疳并治牙疳

人龍用尿洗淨瓦上焙脆研細

和青黛少許冰片少許研匀擦之立愈

珠駕散

治小兒五疳積發熱牙疳并花後牙疳

真蘆薈五分

龍腦五分

薄荷葉五分

珍珠四分研至無聲

真膏

糞分官硼砂二分

大冰片五厘兒茶五分

右為極細末

磁瓶貯好以蠟塞口勿令泄氣

臨用吹患處

治小兒疳疾

用蝦蟆一個放在瓶內將紙封口

過七日再用洗淨糞中蛆不拘多少入瓶中任蝦蟆食之

炭火煅存性為末蜜丸食之

治頭面疳瘡及白泡濕毒等瘡

並治痘後翻癰婦人蝕瘡神效

五倍子一兩去蟲

枯礬五錢

沒藥二錢

桂枝一錢

白芍一錢

甘草一錢

桔梗一錢

升麻一錢

葛根一錢

白芷一錢

白芍一錢

飛丹五錢湯
泡淡炒

蛇床子七錢
燙焙

白芷一錢
真輕粉三錢

明雄黃一錢
共為極細末

乳香二錢
去油

共為極細末

將老松香

和熟猪油
捲在青布內

以火燃之
滴油於碗內

待冷將油調藥

搽之即愈

消疳無價散
治小兒疳積

並治疳眼
石決明一兩半

共為細末

量兒大小或三分

或五六七分用不落水雞肝

竹刀切片上開下連

水片分海螵蛸去壳

入砂罐米泔半碗重湯煮熟

連湯食盡

眼盲者服四五服

即愈

雞肝藥滑石六錢
雄黃二錢

共為細末

量兒大小或三分

或五六七分用不落水雞肝

竹刀切片上開下連

水片分海螵蛸去壳

入砂罐米泔半碗重湯煮熟

連湯食盡

眼盲者服四五服

即愈

赤石脂七錢
共為末每雞肝一具入藥末分

陳酒米泔各半盞

飯上蒸熟食之

開瞽復明

又

方每歲服一分

疳積夜眼方名五色雞肝散

石決明一兩九孔
量便煅

蘆甘石六錢

赤石脂五錢

硃砂五錢水飛

靖炒黃錢雄黃四錢

白滑石八錢

各研極細末

每歲一分用不落水雞肝

一具竹刀切開

海螵蛸在內

瓦罐內米泔煮熟食之

極重者二三服即愈

此藥忌見銅錫鐵器

治小兒夜盲或疳積後目閉翳膜者

羯羊肝一具

穀精草一錢

蘆甘石六錢

赤石脂五錢

硃砂五錢水飛

小兒咳嗽發喘鼻扇肺脹

名百花藥

透明生白礬

一錢研極細末

用生白蜜三四錢

調和放舌上

徐徐吃下

即愈

治小兒痞塊名三反膏

生甘草甘遂

荳菜各三錢

鱉肉一兩

硝砂一錢

木蠍子肉四個

加芍白七

根入蜜少許搗成膏

攤狗皮上貼之如藥略乾

加葱蜜潤下

用二次愈

治虫朝吃榧子三四個

下午吃君子三四個

其虫即盡但須兼服

補脾胃藥不然虫盡則傷人慎之

治小兒虫積方

榧子二三粒

陸續吃完即愈

蒜螺丹治小兒水腫腹脹小便不利

大田螺四個

大蒜一個

車前三錢

麝香許

右前三味同研

後加麝

香再研為餅每用一個貼臍中

將膏護之水從小便而出

兌金丸有黃黑二種

通治小兒百病二種藥共十四兩

白丑錢歸白朮兩去

太黃仁川連翹桂

黃雨 胆星錢 神麴錢

黑丑壳磨極細頭末

蝦蟆蓋住鐵絲扎好外用炭火燒出黑烟至黃烟為

度放地上冷透出火毒穿開如望黑者良如小者使用雨具五月五日午時取

青黛一兩

石膏一兩滑石一兩

胡連錢 神麴錢 右二種丸藥

俱用生研水法丸如米糬之大每歲各一丸午服早晚各進一次

陽春白雪糕

補養脾胃白茯苓四兩

山藥四兩

芡實四兩

蓮肉四兩

陳倉米升

先將藥水粉蒸熟再入白糖印作餅子酒乾

鍋焦丸 小兒常用健脾消食

鍋焦三斤炒黃

神麴四兩

砂仁二兩

山楂四兩

蓮肉四兩

雞肫皮一兩

肥兒丸 常用可免飲食傷脾之症

山藥二兩炒神麴四兩

白扁豆炒

五穀虫淘洗山楂

炒白芍炒麥芽炒

蓮肉去心

雞肫皮一兩

鍋焦丸

共為細末加白糖米粉和勻焙作餅用

使君子肉一兩

生甘草七錢

胡連汁炒蜜丸

茱萸豆大每服一錢

蜜丸或雞鴨蛋清調

小兒胎瘡獨生一個白色不紅者

南星半夏川烏草烏俱生用等分研末或勿蜜或雞鴨蛋清調

敷一切外症色白者皆可用

胎瘡名粉父母先用猪胆汁浴淨再用玄粉調塗碗內晒乾用火薰至老黃色取下為末綢袋裝之

小兒白癩瘡名美育膏百草霜一兩雄黃一兩

膽礬六錢輕粉一錢榆樹皮三錢

用石灰窯內燒紅流

結土渣四兩共為細末猪胆汁調剃頭後搽之神方也

治白癩頭瘡方俗稱臘梨頭用皂礬一錢炒紅

土棟樹子三錢川椒一錢炒共研極細以

豆腐泔水洗之待燥用柏油調搽即愈

小兒頭上黃水瘡及疮疖神效名香粉油黃丹一兩水飛無名異一錢

宮粉一錢炒輕粉三分片松香

二兩為末入沙管內用線紮定水煮融化去葱候乾共為細末香油調搽神效

治黃水瘡八寶丹嫖蛸一錢赤石脂分炒

文蛤分錢炒白龍骨錢兒茶錢枯礬錢黃丹

錢一宮粉分共為末摻上神灰

治小兒黃水瘡。不論頭面遍身俱有水流濕處即生。用鉛粉不拘多少研細。并花水濃調糊乾。大碗內將父火薰烟覆碗內。粉薰至綠色為度。取下研細。瘡濕者乾擦乾者用麻油調搽。

治黃水瘡方。石膏煅三錢。龍骨煅三錢。片松香錢。白礬煅三錢。右藥共研細末。以雞蛋黃熬油和前藥敷上。

治小兒體肥耳後腋下陰間濕瘡者。用海螵蛸研末炒微黃敷之甚良。其次用宮粉敷之亦好。

治小兒瘡瘍頭。銅綠錢。杏仁去皮尖七十五粒。木別子五個去壳。乳香錢。沒藥錢。血竭錢。輕粉錢。明松

香四兩。草麻子肉一兩。共搗成千柏膏貼之。

又方。用死貓頭一個在瓦上煅焦黑存性研末。掺在加味太乙膏上貼之即愈。

小兒鼻衄不能吃乳。

鮮生地黃搗爛。

取汁灌之即愈。

小兒瘡瘍頭。名綠燕丹。取多年柏油入銅杓內熬滾去渣。再入銅綠生礬燕窩泥調勻搽。

〔破小兒丹法〕

小兒頭上生遊丹欲破者必令卧在櫈上。將腳跟一頭用磚二塊墊起。櫈脚以墜毒氣於頭頂。然後用磁鋒破之。使毒氣皆從頭頂而出。若乳母抱立則毒氣順下壅塞咽喉必難生矣。慎之慎之。

赤遊丹。青黛分雄黃五錢。蚯蚓一條。用瓦松一枚同打爛絞汁敷。

又方。活蟻蛹。葱頭。飛麵。雞子白調敷。一方加白蜜少許。

小兒遺尿。用不落水雞胫一具。雞腸一條。猪尿胞一個。各炙焦為細末。每服一錢。黃酒送下。女用雄男用雌。

治乾血癆奇方。過三年者不治。用白鵝子一隻。去肚腸淨入血竭。一年者一兩。二年者二兩。三年者三兩。

用針線縫住。用無灰酒煮數沸。令病人吃之。瘀血即行。如心中慌亂者。食白煮肉一塊即止。

治婦人女子帶下虛脫症極效方。

芙蓉粉二

白茯苓二

赤石脂二兩

杜橘子兩

禹餘糧二兩

牛

角腮一兩
失黃

共為末好醋一杯。拌和前藥晒乾再搗末打糊為丸每服二錢。

治婦人久積虛寒。小便白濁。并滑數不禁。用鹿角屑炒黃為末。每服二錢溫酒空心下。

生甘草一兩 小麥一升 紅棗十個 水六升煮三升。分三次服即愈。

經閉。土鱉虫存性一個 上好血珀末五錢 麝香三錢 酒打和為丸每服三分。

血淋。

用髮灰兩

藥汁調

腹痛甚者三日即愈。

治血崩。大生地一兩 炒

龍骨四錢煅

生牡蠣研極細

石榴皮三錢炒

烏梅肉三錢炒

阿膠六錢蒲

棕灰三錢 百草霜三錢

陳京墨三錢炒

右研極細末用淮山藥五錢研末醋水打糊為丸分作七日服內加

人參三錢。尤效或用人參湯送下。

血崩方。陳棕灰一兩 百草霜各一

共為末每服一錢陳酒下。

小便血。

鮮地骨皮洗淨搗自然汁無汁以水煎濃汁。

每服一杯加酒少許食前溫服能清心腎開鬱結兼以

分利。若虛溫補反生濕熱為害矣。

治血崩不止。用陳棕棉花二味燒灰存性黃酒送下即止。

月水逆行上出口鼻。

薑汁童便溫服。

安胎方。胎氣不安或腹痛或腰痛或飲食不甘俱宜服之。或五六個月常服數貼最妙。足月亦可服。人參

五分虛者加倍。

白朮一錢土炒

陳皮五分

甘草三分

當歸一錢

川芎八分

白芍一錢炒

砂仁七分炒

紫蘇一錢

香附

炒黃芩一錢

腹痛倍加白芍。

腰痛加鹽水炒。

杜仲川斷。內熱口渴去砂仁加麥冬見紅加酒炒地榆生地以上各一錢。

牡蠣一兩

禹餘糧一兩

牛

又方 彙身錢 川芎分 白芍一錢 熟地一錢

川芎半
熟地錢

條芩錢半
砂仁一錢

陳皮錢 索梗五分

陳皮一錢 索梗五分

失甘草四分 如或下血加蒲黃阿膠

腹痛加香附枳壳

如惡阻加竹茹去地黃

治胎漏方 用炒熟蚕豆壳磨末每服三四錢加沙糖少許調服

治死胎不下 皮硝二錢壯者三錢寒月加熟附子五分酒半杯童便一杯煎二三沸溫服

治胎衣不下 用牛膝三錢癸子五錢水煎服

產後腹脹閉結悶脹氣結坐卧不安 大麥芽炒為末用一合陳酒調一方每服三錢

產後面紫 乃惡血上冲氣壅故目不合

山楂炒枯一兩

童便煎服

產後嘔吐 乃惡血入肺發喘欲死

蘇木一兩

水三鐘煎至一鐘調人參細末五錢服

治產後惡露不盡發熱

用童子母雞一隻竹刀殺乾擣去毛破肚將陳酒洗淨用益母草花一二兩裝入雞

肚內加陳酒浸隔湯煮爛去益母花只將雞淡吃連酒汁亦吃留雞骨火存性研末沙糖調酒過下先吃雞

一隻

將第二三隻金茶匙草代益母花照前法入雞肚內煮吃骨亦吃一二隻即愈

產後血暈 芥菜切入有嘴瓶內將醋三碗煎滾入瓶內將瓶嘴塞產婦鼻孔即醒

產後陰翻 澄蘭葉煎濃湯薰洗即收

吹乳不通 雄猪前脚爪一個鬼饅頭二個并煮食之一日即通雖無子女食之亦有乳

治乳不通 絲瓜連子燒存性酒下一二錢蓋被取汗即通

雜症

治乳巖方 此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋七八年後方破爛一破則不可再治矣宜急服此藥

生蟹壳數十枚放砂鍋內焙集為末每服二錢好酒調下須日日服不可間斷

青皮散

治乳癰初起 青皮去

山甲炒

白芷

甘草

土貝母各八分

為細末溫酒調服

乳癰煎方 乳香一錢 沒藥五分 故仁一錢 川芎五分

甘草五分 防風錢 銀花錢 知母錢

當歸五分 瓜

姜仁錢 陳皮錢 木通錢 香附一錢 貝母五分

橘葉二十片鮮者更妙

水酒各半煎食後服四服必愈

乳癰乳巖及外吹 蟑螂熟取脚上指甲砂鍋內微火炙脆研末一兩配鹿角挫末二錢如遇此症用陳酒

飲一杯將藥一錢或八分放在舌上以酒送下再飲一杯俱食後服

治乳癰 用蝦蟆個去皮令淨入半夏錢麝香分共打爛為一大餅敷患處用帛縛之約三時許解去其效如

乳癰奶癆 活蟾蜍十餘隻取爪腳尖約七八錢陰陽瓦炙黃為末陳酒送下出汗即愈

治乳癰癬瘡敷藥 用野花椒葉晒乾為末雞子清調敷立愈

神效瓜蒂散 治婦人乳疽奶癆 黃桔梗子多者一個去皮焙為

川當歸洗去蘆芽切細半兩

生甘草半兩 滴乳

杏一錢 通明沒藥二錢半

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬至一升清汁分為三次食後服如

有婦勞便服此藥杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消疾甚者再合服以退為度乳疽之方甚多獨此一方神效無比萬不失一

內消乳癰方 大貝母白芷等分為末每服二錢白酒下如有鬱症加白蒺藜若有孕忌用白芷

治男婦乳癰秘方 無不立愈 鮮橘葉多者夏枯草 香附童便 青皮 先將夏枯草切碎用青皮香附晒乾後將橘葉放石臼內打爛同前藥拌勻再晒極乾後方上磨為極細末陳米飯為丸白湯下不拘時服

治乳癰瘍潰爛者方可服神效

雄蟲糞三錢兩頭是也

土棟樹子三錢經霜者

露蜂房三錢

俱煅存性為末

約分為三服酒下間兩日服一服痛即止膿盡收斂奇效

治乳痛 極凶者不過四貼 炒白芍八錢

甘草三分 蘇梗六錢

柴胡三分

炒黃芩八錢

香附一錢

當歸八錢

洗

川芎一錢 金銀花半錢 貝母半錢 連翹八錢

瓜蒂霜八分去油

加橘紅葉三十片水二鍾煎八分食遠

服無孕加青皮八分醋炒有孕去青皮加薑汁炒砂仁末五分同煎

一方瓜蒂用一個去油

海上乳毒奇方。

當歸

漏蘆

穿山甲

獨活

乳香

沒藥

桔梗

青皮

水酒煎服立消。

雄黃
藜蘆散。

治婦人陰中突出。如蛇或雞冠菌樣者。

雄黃

冰片

輕粉

礬頭研黃色

葱管

川芎
細如麵研

俱為末和勻再研。磁罐收貯先用芎歸湯煎洗隨後搽藥早晚二次其患漸收。

芎歸湯

當歸
白芷

甘草

胆草各等分

每用五錢煎湯洗患處搽藥。

婦人乳腫不論內外吹名必消散。

取五穀大楊樹上木耳菌拭淨瓦上炙焦存性為末。

每服三錢沙糖調陳

酒送下即消。

婦人陰戶內生瘡瘍痛難堪。

用鮮豬肝切成條於香油中微燙過抹樟腦川椒末插入戶內引蛆

辰取出再換二三條即愈。

婦人陰瘡如虫咬痒痛者。

生搗桃葉綿裏納之。

一日三四易。

婦人交接傷陰出血不止者。用五倍子研極細末摻之。

立消疔瘡外治神效方

松香廿兩

製法附後

沒藥三兩

研極細末

白蠟二兩

切為粗末

銅綠五兩

研細過絹篩再

研至無聲為度

黃蠟十兩

剖取粗片

百草霜五兩

研細過絹篩再

至無聲為度

明乳香三兩

研極細末

麻油六兩

研細過絹篩再

研至無聲為度

選吉日淨室焚香齋戒虔誠修合忌婦人雜大及孝服人見用桑柴火先將麻油入鍋煎滾次下松香候稍滾

三下白蠟候稍滾四下黃蠟候稍滾五下乳香候稍滾六下沒藥候稍滾七下銅綠候稍滾八下百草霜漆過

數次於鍋內冷透搓成條子丸如桂圓核大藏淨磁瓶內臨用時以一丸呵軟捻扁貼患處頃刻止痛次日腫

消即愈已走黃者貼之亦無不霍然神速之效百發百中疔瘡藥之至寶也此方活人甚多是當廣為傳佈

貼後忌食葷腥辛辣沸湯大熱食生冷發物麵食豆腐茄子黃瓜酒忌水洗忌惱怒憂鬱大忌房事

製松香法用桑柴火煎汁澄清入松香煮爛取出納冷水中少時再納灰水中煮以色白如玉為度

取百草霜法 先須刮盡鐵灰。專燒茅柴稻草取烟煤用。如以別種柴燒。并入則不驗。

戒鴉片烟處方

潞黨參一錢 金櫻子一兩 粟壳四錢 茶菔子一兩 半夏一兩 陽春砂仁五錢 廣陳皮五錢 陳酒五斤
倭紫谷灰五錢 此方將各味煎好。撗去渣滓。和入陳酒內。再煎一沸。置蓋鉢中。勿令洩氣。於癮至之時。先飲一鍾。可不至更將淡酒一盃。沖入其內。每飲一鍾。即冲入一鍾。藥性冀其漸減。而烟癮庶可全消。

急救誤食洋烟方

明雄錢二個 雞蛋清一個 生桐油一兩 調入河水灌服。即吐。或吐有未盡。用硬雞毛。或鳴毛蘸桐油。直掃咽喉。乃吐。若同燒酒誤食者。加葛花三錢炒末。調服醒後。用生甘草五錢。食鹽分五錢。明礬五錢。金銀花五錢。煎服。又宜多食柿餅。以解洋烟。并桐油之毒。如毒重時。久。萬無生理。用艾耳如大黃豆。炙氣海穴。在臍下。較准後用墨一記。即按記處灸之。久時肚腹兩邊。即注下推運。不可歇手。灸到手足能動。略知疼痛乃止。仍宜照前服藥。

急救難產良方

三麻四豆脫衣裳。合研細末加麝香。共成一餅貼交骨。須臾母子兩分張。此方用單麻子三個 巴豆四個。均去皮加麝香一分。全研成餅。貼產門上。交骨其胎立下。如月分未足胎或轉動。不可輕用。若足月臨盆。周日不下者。用此立驗。儀徵張姓婦生產。三日不下。子死腹中。命在呼吸。照方配用。死胎立下。產母保全。治傷方

晉人尚氣。每有事甚細微。一語不合。輒即鬪毆。及傷較。他省為多。又不善於調治。動輒喪命。今訪有秘方。屢試屢驗。神效異常。時行剖發。有牧民之責者。亟須相資。慎選真實藥材。如法製備。一有報傷之案。無論跌打損傷。金刀他物。骨折骨碎。立即給藥。照方醫治。勿卧熱炕。定有奇效。州縣仁心為質。遇有命案。往往執罪。疑惟輕之。論。不肯嚴辦。然與其曲為開脫。以致死者。含冤何如。速加拯救。俾兩命俱得保全。功德不更大乎。急救方開列於

水片分
二、麝香分
辰砂錢
乳香錢
子紅花錢
血竭錢
雄黃錢
兒茶分
歸尾一
沒藥錢

以上十味共為細末貯磁瓶黃蠟封口勿令走氣。

一治跌打損傷皮肉青腫未破者用陳醋調敷患處腫消即愈。

一治及傷并器械傷皮破血出者以藥末捲上包裹不可見風血止即愈。

一治內傷骨碎或骨已斷折先將骨節湊准用陳醋調藥末厚敷患處以紙裹外加老棉絮包好再用專反片夾護將繩慢慢細緊不可移動藥性一到骨自接矣須靜養百日如犯房事必成殘疾。

一治及傷深重未致透膜者先用桑皮綫縫好多捲藥末於上以活雞皮急急貼護如前骨損養法即愈。

一遇跌打昏迷不醒急用少許以陳酒沖服自然醒轉以便調治此方神奇雖遇至重之傷鮮有不起者。

張蘭諸中丞頒發天長縣署奉到後即照方修合用之屢效因思此種良藥不特牧民者可以救人即民間如法製備取以治傷亦甚有益。

急救跌打損傷方並治馬踢刀箭等傷。

白附子十二兩研末
白芷
天麻
生南星
防風
羌活各一兩研末
就破處敷上傷重者用黃酒浸服數錢青

腫者水調敷上

破傷風方

荆芥五錢

黃蠟五錢

魚鱠黃色

父葉三片

入無灰酒一碗重湯煮一炷香熱飲之汗出愈惟自日內不可食難

解砒毒神效方

防風一兩研細末

又方石青研末

水調服

以上諸方係百試百驗真有起死回生之功勿以尋常方藥視之還望好善諸君廣為傳播造福無量。