

序

夫醫之為道相成也非相違也後人執其一說言人人殊曾無折衷焉是何醫道之違哉病之來也如人面之不同而醫之治也如舟車之各至若夫炫其岐繙紛其論說不本靈素以為之準其害皆可以殺人而幼科為尤甚此我奉先生不囿於方各因其時各因其人未始謀其有合也機識所指曠若同歸其常也簡左足以述古其變也聰明足以服物爰成折衷三書俾宇內醫者翕然知所歸遑居恒診視出奇無窮先生之學原不盡乎醫即以醫求之未嘗不可以見先生也憶于十齡昔遭竒疾先生相遇隔垣問

視旦夕霍然時予雖幼心竊欣嚮嚮焉已亥春以仲氏娶沉疴
始得日趨函丈或篝燈丙夜或立雪侍從親沐宗風既深且渥不
可謂不知己也昔卜商面授尼山西河之教遂以名家予幸知先
生而其書顧不能表彰焉用是日夜疚心戊申春旅寄駕湖獲交
于厚陳子亟欲購先生之遺書以公天下予不禁慨然曰大方之
症有據幼科之病無端而痘疹之治更難測也陳文中錢仲陽而
微後先生其誰與歸余抱茲念久矣匪陳子其曷克傳之迺先梓
其痘疹一書更附圖翼以行使後學知所矜式夫然後知事固有
不相違而相成者是不可無述也予既仰先生之風而又樂子厚

之能相與有成也敬為之申曰昔太常朱先生之刻是書也爲經濟之津梁今予厚之梓是書也爲嬰推之司命予樂得而從事焉以庶幾告無愧於先生云爾

康熙八年天中月雲間後學夏之昇東步甫漫識於雲林山房

痘疹折衷凡例

一集中諸論皆述前賢大經大法更參以近日切近精實之語間或附以己意成篇皆係素所經驗非虛說也

一魏氏順逆險三法千載不易之定論第法太拘而詞太約恐有按圖索驥之謂今廣而推之雖定以十四日為期其間吉凶

悔吝則一覽無遺矣

一證治之法不過為後學設繩墨大約以十五日為準其間活潑之機全在吾人自用慎弗執古方以治今病也

一看痘人出痘時百般小心結痂後飲食起居遂致懈弛，有九仞一簣之嘆故有痘後禁忌之論

一古人補鴻之方原備之以俟後學參酌而用者也奈何世醫不辨虛證似實、證似虛妄行補鴻多致夭折論中雖不能悉辨大約近世習俗所用已備錄用藥禁忌條矣

一痘中雜證、治論載之甚詳深恐略而未備另擇痘證最急

者重復著論二十二首詞雖鄙俚惟欲發明其理而已
一集中論辨有發前人之旨而不嫌于因襲有出一已之見而
不嫌于獨創玩之則確有根據行之則實有成驗非飾浮辭
以要名也識者鑒之

甲木胆木水
乙木肝火水
丙火小腸火土
丁火心火土
戊土胃土金
己金脾金水
庚金屬土
辛金屬水
壬水屬火
癸火屬水

甲木胆木水
乙木肝火水
丙火小腸火土
丁火心火土
戊土胃土金
己金脾金水
庚金屬土
辛金屬水
壬水屬火
癸火屬水

新刻秦景明先生痘疹折衷卷上

雲間後學夏之昇東步訂

天都陳維坤子厚閱

痘原論

秦子曰自古談痘原者、議論多端、各有確見、余未暇辨、惟論淫火所致者、此言最切乎理。內經曰諸痛瘡癆皆屬心火、張子和曰瘡癆癰瘍皆火之用而根於心、則知痘之發為火也明矣、然曰淫火者何哉、心鑑云乾道成男、坤道成女、男主乎精、女主乎血、故知乾坤交會、二五妙合、無愆不成、無火不動、精之行血之就、何莫非火

之所爲則先天形始成時、其火毒已中於象體矣、斯時也、感之輕
則輕、感之重則重、無聲無臭、豈可得而測之哉、然必待時而發者
何也、蓋天地之淫火、與人身之遺毒、同一橐籥相扇、而動如水流、
溼火就燥、雲從龍、風從虎、自然之義、然又有同室同眠、有出有未
出者、何也、因人之正氣所勝客氣、一時不能相搏、故有出有不出
也、間有終身不出者、必其人原感火毒不深、或曾患瘡疥、或曾出
赤痘、雜出其中、不覺其痘、非不出也、或又以母懷胎之時、不畏禁
忌、恣意所慾、好啖辛酸、過食炙燙、其氣搏於胞胎之中、故兒受之
發為痘瘡、此更不察乎理之語矣、此等之毒、兒若受之生下、或爲

瘡瘍瘰癧或為驚悸丹瘍者有之至若痘瘡受氣於父成形於母爾我分受其咎焉可槩責其母哉此淫火之論當不辨而自明矣或曰痘疹出於漢後而痘書久未聞有出漢之前者豈淫火之反上世之人獨未之染耶予曰凡有血氣者莫不有此火毒但一授一受之間火有重輕感有深淺當時之人風古民醇未凋未琢雖賴此火以成形然一點太和之氣陽施陰受不過同其自然之理而已即有此證亦輕而不自覺也降而末世以酒為漿以妄為常以欲竭精耗散其真父精母血俱受此火遞相傳習代復一代莫不受此災患之苦至人憐焉乃著痘疹一書以救世亦不過象形

以名因理立論、因證立方、以救世不覺世愈澆漓痘愈怖酷方書競出各執一科以成名非上古無而今世有也若爲從外國而來尤妄矣。予故曰非闢天之所爲寔係人之自造不然何故有一家之中一身之內所有況女郎有稀密輕重之不同虛實寒熱之迥異耶。

諸醫用藥寒熱必以時論

秦子曰古之治痘者各有心得不可輕議其偏如文陳中用木香散、吳攻散、峻熱之藥丹谿發揮其誤然亦有用之而獲捷効者劉河間張子和則專用黃連解毒湯白虎湯升麻葛根湯等寒涼之

劑然氣虛者往、無益有損此豈古人之用藥迥別有如斯哉名
因所值之時所犯之證而爲之處方耳後之宗陳氏者多用熟藥
宗劉張者多用涼藥此刻舟求劍之道君子誠能億度寒暄推詳
脈候、因時致宜、因病進藥、則宗陳氏可也、宗劉張可也、焉有執丁
之病哉、秦子近治一富家之痘本火證以解毒清熱之劑連服八
九朝而漿得灌倘有疾喎火證之纏綿乃正氣不虛邪氣猶實禁
服參术時也是日因強其食而傷脾即渴酸餒數行傍晚隨作渴
塌瘡此大毒雖因之而洩然暴渴而津液驟脫也急用異攻散以
大劑人參煎湯連服二劑渴止而漿復充滿結痂乃知一日之間

而虛實並見、涼溫雜用。譬之良將，用兵奇正，間出雖有智人，莫可測度。方能前驅取勝，若畏首畏尾，少遲時刻，即便取敗，不救機，其可不活潑乎。

痘疹未發宜預防論

秦子曰：善治痘者，期于未然。所以前人之于痘疹，防微杜漸，無不曲盡其意焉。假如冬令風寒水冽，迺天地正氣閉藏之時也，反得和暖，是寒暑不得其正。小兒係純陽無陰，以制之熱，停于胸胃，至春陽氣發生，與伏熱相搏，必發痘疹。龐安常云：冬若和暖，春必發痘，正此之謂也。此時有熱證者，或犀角以涼之，紫草以消之，三豆

靈山觀音真言傳法事五輪諸尊者見如來五輪
之靈皆見五輪諸尊者入佛門也

唐子曰：禪家教契，萬象同源。見人萬象，見一
萬象，見萬象，見萬象，見萬象，見萬象。

詮修真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳
真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳真傳

乍熱手足稍冷多脾證也面燥頰赤咳嗽噴嚏肺證也驚悸心
證也骯冷耳冷腎之平證也已上諸證獨見多者主其臟之毒時
甚治之者要識此意又觀心窩有紅色耳後有紅筋亦綿或身熱
手指皆熱惟中指獨冷男左女右乃知是痘證矣然此亦不過大
法耳總之時氣傳染者為多每遇身熱而晝夜不涼更兼睡卧驚
悸或嘔吐而足冷便是痘疹然傷食者此證或一見要當臨證時
細辨之也

痘疹用藥涼熱補瀉全要活變論

秦子曰全書以痘疹治法久無定論喜行溫補者不問其人壯實

藥用丁桂薑附參芪木芷之屬以致皮肉潰爛。咽瘡目昧傳諸惡
毒不可治者多矣。喜行涼瀉者不問其人虛弱。藥用芩連梔檗柴
草犀角金汁大黃芒硝之屬以致脾胃傷損。嘔吐瀉泄不食癟塌。
而死者多矣。予深痛之故詳立治法。先察色脉以審病勢次定歲
氣以觀時候。如果天令嚴寒形體虛瘦六脉微弱或曾經大病而
未愈或初起吐瀉交作此當從虛而治宜行溫補使正氣勝而邪
氣退也。如果天時暄熱形體壯盛六脉洪數飲食如常大小便秘
此當從實而治宜行清涼解毒之法使邪氣無畱滯之患以爲正
氣之賊也。如是而更視其痘之形色加以活變之法庶無遺情矣。

更有虛實相似之證。最未易辨。寧可暫停藥餌。再視其病之的確。
方可投劑。倘苟且以應之。縱然僥倖得生。難免日後變遷之患矣。
慎之、

痘瘍首尾不宜汗下。必不可太執論。

秦子曰：凡痘瘍將出，已出之後，不可妄用汗下之藥。蓋汗則虛其
表，而難起發。下則虛其裏，而易倒陷。誠古人深戒之言，亦至當不
易之論。但亦語其平證耳。若遇風寒外襲，應出不出，則汗劑必不可
用也。如大便連日不行，煩悶狂燥，不與下之寧，不失人之性命哉。
則是下劑亦可用也。但能消息虛實，與時權變，斯可稱通醫矣。予

篇

曾遇痘出三朝不見起發而以麻黃乾葛連服而獲愈者又遇大便堅閉煩燥不能出而以大黃芒硝下之而頓發出者治法全在變通不可執一也但表裏虛實必先詢問其平日起居服食之何如以合出痘時之表裏虛實則洞燭其腠理之疎密臟腑之強弱當汗當下了然自明而用藥自無差悞矣一兒痘後衣被太薄感寒發熱便結無汗劑中用發散如麻黃二劑而發熱除乳母因而慎加調護倍增衣被釀成內熱瘡燥面赤大便四五日不能去因而腹痛作嘔遂用三黃加減一劑而便通諸證悉平

察痘之形色

夫形者痘形也始出之形喜尖細而漸發崇滋長惡伏陷而密似針頭隱如蚊迹起脹之形喜綻突充肥惡平塌倒陷養漿之形喜歟束完固惡嫩薄塌瘡瘍收瘻之形喜痂如繩屨而惡如麩紙之薄黏著不脫也

色者痘之色也始出之色喜淡，桃花而漸加紅潤，惡淡白乾紫而日漸無神。起脹之色喜根紅光澤而項白鮮明惡根雖紅而散亂不附項雖白而灰滯無神。養漿之色喜漿水漸厚成膿蒼老而黃惡白嫩乾灰倒腐而黑收腐之色喜蒼蠅而漸如栗殼惡麩色乾枯破爛而難痂也。疤痕之色喜紅潤而突惡淡白乾紫枯滯也。

察痘之老嫩

繆

夫痘喜老而惡嫩。如蒼老嬌紅色之老嫩也。堅厚虛浮形之老嫩也。濃濁清淡漿之老嫩也。堅實軟薄痂之老嫩也。老嫩之故衛氣主之經云衛氣者則以溫肉分充皮膚司開闔者也。衛氣強則肉分堅肌膚厚腠理密而開闔得也。所以收歛禁束制其毒而使不得以放肆故色蒼而蠟形緊而實漿濃而濁痂厚而闊自然易壯易癰雖有邪穢不能害也。若衛氣弱則肉分脆皮膚薄腠理疎而開闔失也。所以不勝其毒而毒得以恣其猖狂之性故色嬌而紅形虛而浮漿清而淡痂軟而薄易破難痂不待邪穢而自壞矣。

審痘之善惡

夫痘有五善七惡。五善者飲食如常。二便清調一善也。紅活綻凸頭面稀疎。二善也。痘出身涼。睡卧安寧。三善也。語聲清亮。動止安靜。四善也。口舌滋潤。漿濃疣厚。五善也。七惡者煩躁悶亂譖妄恍惚。一惡也。嘔吐洩利。飲食不進。二惡也。乾焦黑陷。癢塌破爛。三惡也。頭面預腫。舌刺唇裂。四惡也。咽喉腫閉。噦嗰聲啞。五惡也。寒戰咬牙。腹脹喘急。六惡也。四肢逆冷。空殼無漿。七惡也。已上三論乃出傳心錄中其間吉凶悔吝大槩已備于三論之中矣。若更以魏氏順逆陰三法以別明之。則庶乎洞然明白而無悞矣。

痘疹要明五運六氣

秦子曰吾身之氣與天地相為流通故痘疹之發要之感天地之氣而成則運氣亦在所當知假如甲己化土則為土之運土愛暖而不愛寒宜加溫劑以助之乙庚化金為金之運金宜清而不宜燥宜加平劑以清之丙辛化水則為水之運水欲暖而寒則凝宜加熱劑以溫之丁壬化木則為木之運木性寒及怕燥宜加和劑以平之戊癸化火則為火之運火宜寒而不宜熱宜加涼劑以解之然此又非定論不可不知亦不可固執須參之以氣血虛實後佐以此法斯得之矣

五運圖



天十干爲合有則五

子午卯酉年

少陰君火。陽明燥金。司天在泉宜清之。

辰戌丑未年

太陰濕土。太陽寒水。司天在泉宜溫之。

寅申巳亥年

少陽相火。厥陰風木。司天在泉宜涼劑以和之。

己未天主上半年

在泉主下半年

六氣圖



地支有十配合則爲六氣

已上五運六氣之圖雖當究心凡遇痘瘍時行必須洞曉此圖不

獨治痘其傷寒時疫瘡痘等病證俱宜參看故內經云必先歲氣
母伐天和又曰先立其年以明其氣但不可太拘因患痘之人自
有寒涼溫熱虛實羸瘦肥厚之不同及寒暑春秋之各別天時人
事合而觀之庶無偏失之虞矣

發熱時起每日順逆險至十四朝論

順

微發熱三四日後報痘即身涼或驚搐甦即見痘人事安寧飲
食如常二便如昔痘出必順

逆

壯熱昏亂譫妄顛狂喘脹吐利煩燥失血或腰腹痛甚驚搐不止一熱即出者痘出必逆

陰

乍寒乍熱一二日報痘而熱不退雖雜證混擾而便調安枕痘出雖險可治

放痘第一日候

順

初出部位其形尖細色如淡桃花身微熱人事清來飲食如常睡卧安寧二便調和無雜證順也

逆

初出形平塌。色乾紫。喘脹悶亂。煩燥不寧。澹妄恍惚。吐瀉噤口。飲食不進。二便秘滯。或身一熱而齊湧出。或如瘡瘍者逆也。

險

初出形雖粗肥。如饅頭樣。雖稠密而紅澤。或赤色。或淡白少神。或雖順而間乎內傷外感。或雖險而為雜證。壅過急治之可生。

放痘第二日候

順

先出者漸長。次增者亦尖綻。如珠桃花光澤。相去二三寸。一顆者。

縱出亦稀。內證如前順也。

逆

先出者反平塌。次出者成叢後必密如蠶種。紫黑乾枯。內證如前而驚搐不止者逆也。亦有因雜證壅遏氣血不運而為形色逆者。有之。

險

先出者不長。次出者二三相竝必密而重。或淡白。或赤色。當辨氣血虛實治之可生。

放痘第三日候

順

陸續漸出。先出先長。次出次長。大小不一。尖圓先澤根窠紅活堅實。碍指漸加明亮。內證如前。不治自愈。

逆

先出者稠而平塌。次出者隱、不起紫黯乾枯。諸痘未起間有痘點如漿。先黃熟頭目預腫。內證如前。治之無益。有因內外傷而表裏壅窒不出。不可不辨。

險

雖稠密陸續出來。雖頂陷跟脚歛束。雖陰惡內證和平。或夾痧夾

斑治之可生

放痘第四日候

順

陸續出齊。先出先起。脹尖綻光澤。跟塞鮮活。內證如前。不治自愈。

逆

先出者漸平陷。次出者穴平塌。根血散亂。灰滯紫黯。內證如前。雖

治無益

險

雖勻朗而頂陷少神。雖稠密而綻凸紅活。日漸生長。或形色雖順。

而內證不平。或形險惡而內證中和。宜辨虛實而治之可生。

放痘第五日候

順

先出者先起脹。次出者漸起脹。尖圓光澤。根窠紅活。堅實碍指。
日漸生長。內證如前。不治自愈。

逆

稠密無縫。發之不起。平塌灰滯。根窠不活。或紫黑枯槁。內證如前。
治之無益。

陰

雖稠密平塌而能食便調。人事安寧。形色雖順而內證不平。當辨虛實而治之可生。

放痘第六日候

順

不拘稀密粒成珠起脹綻突根紅頂白紅似雞冠白似脂膏以具漿勢此氣尊血附心鑑曰氣尊血附者生內證如前不治自愈

逆

雖根紅頂白紅似蚌血白如枯骨平塌灰滯此毒參陽位又內證如前反加噦嗆聲啞者不治

陰

雖起發而嬌紅嫩皓或赤色過頭或血雖附而不肥白或險惡而內證和平急治之可生。

放痘第七日候

順

不拘稀密人中兩傍先行漿諸處日漸生長跟紅頂白光澤明淨稠者目閉而稀者不閉內證如前不治自愈

逆

漿勢不行色如瓦灰或紫黑乾枯根血不附稠密而目不閉內證

如前此氣血乖離。毒不化漿。故不治也。

陰

雖行漿而內證不平。雖不行漿而內證中和。當補正氣以勝其毒。而邪自化矣。

放點第八日候

順

不拘疎密。面漿充滿。色黃如蟹。腹中身俱行漿。四肢起脹。光澤內證如前。不治自愈。

逆

空穀無漿。灰白塌陷。或雖行漿。瘡塌破損。而不能復灌。禁之不止。
搖頭扭頸。目闊唇裂。如證尤前。不治也。

陰

漿不易滿。瘡色少神。雖作癢而欲人拊之。雖破損而復腫灌。形色
雖順。而內證不平。雖險惡而能食便調。當審虛實。治之可生。

放點。第九日候

順

正面漿俱蒼老。如黃蠟色。而有結疣之勢。身中漿俱充滿。四肢行
漿內證如前。此為氣旺拘血。化毒成功。不治自愈。

逆

空殼無漿或雖行漿而痒破不復腫灌腫消而目反開張內證如前反加寒戰咬牙者不治。

險

漿雖充而不易蒼老便溏少食或漿半足為火迫而收之太急或漿充滿而潰爛難收或空地而後出贈痘當辨虛實而治之可生放痘第十日候。

順

先蒼老者先收疣乾圓堅厚如螺鈿色如栗殼者為上漿極充滿

頂破堆聚如桃姿者為次中身漿俱蒼老四肢充滿內證如前順也
逆

漿難行而不蒼老痒塉破損或雖結疣如麸紙之薄淡白無神內
證如前治之無益

險

漿充而不易蒼老或破損而復灌結疣或內傷而吐利或外感而
身熱宜審虛實治之

放痘第十一日候

順

正面中身結疣如前先結先脫四肢漿俱蒼老內證如前不須服藥

逆

結疣如斐淡白無神身肢破損如無膚之木內證如前又唇口腫破逆也

陰

停漿不腐或痂結雖順而少食便溏或疣紫黑而二便堅閉或足
潰爛難收黏席黏衣經曰熱勝則肉腐宜辨虛實治之可生
放痘十二日候

順

正面脫腐痕色如桃花紅澤身肢俱疣內證如前不須服藥

逆

疣結如麩薄黏著不脫雖脫而形色乾枯身肢破損如無膚之木內證如前治之何益

險

正面痕色雖順身肢疣結如麩其瘡不脫此脾虛而氣血不充不能填滿肌肉滋益皮毛令瘡得脫也宜調脾養血治之可生

放瘡第十三日候

順

正面身肢俱脫屬痕色如前惟額上與膝下收遲者何也曰頭為

諸陽之會自額而上陽之陽也陰氣不達足為陰純自膝而下陰之陰也陽氣不行二氣每收遲無慮也

逆

內外證如前治之無益

正而陰

痕色乾枯而能飲食索點而尚有神或色順而便利或膚爛而瘦蝕或餘毒而疔癰或爲目疾或外感內傷治之可生

放痘第十四日候

順

痂死俱脫盡或足屬尚未脫或不易結痂者何也曰足收屬獨遲者此常候也蓋天地之化生于陽者成于陰痘始見于頭面者生于陽也而足獨收遲者成功于陰也痕色內證如前順也

逆

痂雖結而不脫痂雖紅而不潤聲啞嚥嗆便溏不食目閉無神昏睡不醒者逆也

險

痂死不易盡脫或有餘證變遷詳見痘後雜證中治之已上日逐證候乃治痘之常期也如毒勢淺氣血盛飲食如常確

守禁忌亦有三四日便行漿八九日即愈者何待十四日也如毒
盛氣弱食少氣候乘張調理失度有綿延十日外行漿二旬後收
拾者又不止十四日也其間或有雜證之混擾則痘之不易生畏
收拾而綿延日久者不可一槩取必也治痘者其可拘其日數哉

發熱三朝證治

一痘疹非熱下出若微熱不渴大小便清調此肌表之熱非裏熱
也不必妄治若身熱如火痘勢稠密其毒必盛宜解毒兼利小便
以升麻葛根湯加連翹桔梗防風荆芥木通燈心之類治之
一發熱之初或吐或瀉者皆由毒盛而奔越也謹防斑疔在內不

可驟用止瀉之劑宜透肌解毒使毒得外出則吐瀉自止矣若久
不止者大是危證如脾胃弱者治用五味異攻散加川芎升麻之
類必有傷食吐瀉吐必酸酸瀉必糟粕上下反欬其通利略加消
食等藥

一發熱而增寒壯熱者乃風邪在表宜升麻葛根湯加防風荆芥
等治之或痘毒畱連于腠理欲出不出不能發寒熱也升發之愈

一發熟身肢骨節俱痛者乃肌表感六淫之邪不散耳宜羌活湯
主之必有毒攻發不透而作痛者

一衄血不止乃心主血血熱上衝于肺迫血上行而為衄也經曰

邪從衄解。又曰火鬪則發之以升麻葛根湯加荆芥牛蒡子治之。
痘透衄止愈。

一熱盛腹脹喘急便祕狂煩口噤不醒極係危證切忌輕自投劑。
久有風寒壅遏腠理堅閉者以葛根湯加升麻桔梗蟬蛻山楂枳
殼蘇子選而治之使其邪從汗散候痘出而諸證自愈也。

一小兒遍身見點如蚊咬謹防熱毒為風寒所遇與傷寒發斑者
同用葛根荆芥防風桔梗前胡枳殼等治之慎勿以蚊追蚤斑刺
期鬼籠而不治之也。久真有蚤蟲蚊蟲所傷者不論。

一小兒發熱及見點時兩目忽然紅腫此證往往無害乃風熱上

攻也以芍藥散加蟬蛻荆芥防風治之為善

一小兒搐搦竄視妄毒自心經而出乃痘欲出而搐以升麻葛根湯加鈎藤蟬蛻木通枳殼治之發二三次者不妨若屢發不止者惡候也

一初發熱腰痛如折不能坐立此折腰痘也乃腎虛醞毒所致速以荆芥防羌桔芍甘之類發之如癰斑或口鼻出血者不治

一發熱時遍身作癢此客胃風寒封閉腠理也發汗則解以升麻葛根湯加蟬蛻荆芥防風川芎治之

一發熱時妄有所見譖語昏睡或煩躁者此毒邪犯心心為熱迫

其神浮越而然也宜葛根湯導赤散加木通山楂蟬蛻主之其痘即出而清爽者吉若連綿不止魂魄將離不治矣

報痘三朝證治

一放點紫色或黑滯而腰背痛不止者不治

一放點青色如豆大不起凸此名冷疔凶也肌肉成塊紫黑者凶也紅斑如錦紋者遍身如蛇皮者如疹如瘡者俱逆候

一報痘點而口中腥臭者乃毒乘肺胃煎熬潰爛而臭也速用清金解毒加甘桔連翹蟬蛻治之若喘急失聲噦嗆者凶

一痘疹已見形而噦嗆不止口唇焦黑色枯槁此胃氣脫絕毒

伏于内凶也

一痘隱不出面白神疲微熱飧泄此脾胃氣虛不能送毒也以五味異攻散加川芎升麻蟬蛻木通陳米服之

一耳前紅腫如桃此癰毒也以葛根湯加荆芥防風牛蒡甘桔若腫起痘起者愈若膿潰痘陷者凶

一見點而驚搐不止此心血不足邪因而客之危證也以茯神遠志加四物湯少加起痘藥治之使其搐止為順驚出于心搐屬於脾傷食者必然以山楂枳實之類治之

一痘中碎密如麻子者此夾瘀也看本集有痘中序肉鮮紅成塊夾瘀論有痘中序肉鮮紅成塊

者此夾斑也

看本集夾斑論

二證有吉有凶當究痘之形色而斷

一痘出喘急腹脹煩躁便祕譖語不寧此毒火盛也法當用承氣湯通利之如便通利不可用也一見痘而痰喘壯熱煩渴此肺胃二經實熱也以前胡枳殼芩連治之

一痘雖見勻潤紅澤而腮邊或左或右有青紫腫塊而熱盛煩躁者即金鏡錄所稱鬼腫以雞痘是也謹防其發痰喘而不治一痘纔出二三日而間有膿泡此非奪漿也乃未至而至謂之太過名為賊痘日後不能貫汁為不治

一痘未出齊而痢下赤白此血熱毒盛之痘兼有食積于平素耳

以葛根湯加山楂麥芽川芎當歸芍藥主之

一痘未出齊而手足搖動狀似寒戰者乃似寒而實熱火之象也宜葛根湯加以平肝之劑

一痘左半身稠密紅澤右半身間有數點乃左屬陽痘發于陽順也宜照當法治之

一痘右半身稠密灰滯平塌左半身間有幾顆乃右屬陰毒發于陰逆也漿雖行恐不能收斂

一痘出諸處俱勻朗紅潤而腰圈轉稠密灰滯腰痛坐不能此毒乘腎經名癰腰痘不能成漿者凶又有諸處勻朗紅澤而腰間

臥

攢簇如盆許灰滯者凶

一痘未熟先出二三粒至五六朝而復煩躁發熱睡卧不寧者一名母痘一名報痘乃感痘之厲氣先發之于外也其痘必平塌宜以針刺破敷以四聖膏爲善

起脹三朝證治

一痘初脹時頭面紅腫如爪狀者頭面浮腫如錫餅形者皆爲不治若未發而先腫及已發而皮肉平擡者亦皆不治
一痘起脹時而吐蛇虫者乃熱毒拂鬚于胃因不能食其蟲爲熱所逼但聞食氣即上湧吐出也此證多有不治痘色光澤者無妨

一痘見紫色而不起脹此毒盛壅遏以紫草紅花蟬蛻犀角地黃
加升發之劑使紅潤起脹而愈。

一起脹時有大而黑者名曰痘疔以針挑破吹去惡血以油臘脂
點入痘內加解毒藥治之若疔少而根窠紅活者可治疗多及根
血不活腰背胸前多者不治

一起脹時不食引飲乃毒壅脾胃也極是險證若胃素弱者而然
宜以調補脾胃內托治之或食反吐者用陳皮和胃氣

一痘不易起脹反加疾喘嗽甚飲食入口即嗽而吐出者危
一起脹時痘不光澤而無神者倍用人參

一寒戰咬牙四肢逆冷者輕則用薑桂重則用附子

一痘瘡作癢者不論虛實俱宜用殭蠶白芷大約未貫漿時而癢者多屬火不必治之

一熱水鴻者用四苓散亦可然不必如此治

一大便閉結內有實熱而不起脹者宜加黃芩紫草門冬當歸若大便利口發渴者此內虛熱也宜四君子湯若不渴而大便利者此內虛寒也宜理中湯若氣實為痰所鬱而不發者宜黃芩枳實一起脹時要防痘疔如灰白色中至大項陷者為疔必有遍身隱隱不出起者須要辨頭面背腹胸膈或有初起至大頭焦者是也

失而不治則有口噤不開狂躁不寧或嘔吐泄瀉身熱悶亂者此因一身毒氣盡朝此瘡以致遍身不能起發遲則毒氣攻心而不治者多矣速用銀針撥破以四聖散點上即時紅活而痘瘡起矣

貫膿三朝證治

一灌漿時內却無水而乾涸空虛此氣虛伏陷也人事清爽飲食如常者倍用保元湯加官桂川芎若脹喘噦瀉煩悶外剥者不治一瘡頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色灰白如天泡此名漏瘡乃不治之症一有清水非膿無事自破水出而乾黑不成痂者凶一痘稠密白色而昏睡不醒妄言譖語乃心血太虛神無所依而

然以保元湯加當歸茯神枣仁如服藥不醒者不治

一養漿時大便下血或下黑糞或昏睡不醒或多睡者蓋心主血
血虛邪因而入心故有此證也如毒未出盡宜犀角地黃湯加安
神之劑若毒盡外出當純用補托主之

一養漿時驚搐不止宜以養血佐以安神若服藥不醒仍加昏亂
者不治

一養漿時漿半足而煩渴熱甚引飲不已此虛甚也宜倍人參煎
湯頻服

一養漿時而嘔噦不止漿不能充滿此毒入內攻土敗之象也速

以保元湯補抱漿滿者不妨漿不足者不治

一貫漿時有壯熱發渴舌乾唇燥若津液不足者宜多用保元為佳若痘色乾紫或重稠厚被或紅鱗煖室因而及助其內熱者宜速撤去以黃連牛蒡少加催漿之劑

一貫漿時癢破不已若能復便調以保元湯加川芎或桂托之能止復腫灌結疣為妙若增寒戰咬牙或破處乾陷者危

一貫漿忽然倒黓而色灰白泄瀉煩渴寒戰咬牙此氣血虛寒以異攻散治之若治之不止反加昏悶者死

一貫漿滿足而身痛不已乃諸痛為實以為藥陳皮山楂治之

有因痘而血虛者則仍用保元湯以佐之

一貫漿時忽然痰喘氣急便竇此因肺氣實熱而過于補益也。以枳殼貝母天花粉治之如便溏而然者乃係虛證須當大補。

一貫漿時忽然泄瀉漸而漿縮者皆由脾土有虧元氣下陷故也。須倍用保元以阿子肉蘿卜以參苓白朮散益之或用升麻以升提之能食而漿復充者吉。

一貫漿足而膿俱紫黑熱盛便祕此乃血熱毒壅以黃連、翹柏之。一貫漿足而不易蒼蠅色者乃脾主結痂脾弱之故也宜保元湯加芍藥陳皮使之收厚腐者吉若屬如趁薄者以參苓白朮散主

之要防餘毒

一貫漿時成作瘻。爬搔潰爛。此火溼并作也。脾屬土而惡溼。熱浸淫故瘻而潰爛也。譬之禾稻將收。宜燥其田。以疏溼調脾收歛之劑。復加腫澁成疣為吉。

一貫漿時痘色灰白。溏泄厥逆。此元氣虛憊。陰陽不接。而四肢為上之厥逆也。以陳氏異攻散治之。

一貫漿時昏睡不醒。便溏能食。此脾虛倦怠而昏睡也。以歸脾湯加芍藥山藥苡仁蓮肉治之。

一貫漿而多黑血者。乃肺脾二經皆有熱也。宜破血涼血以歸地。

紅花蘇木丹皮犀角芩連天花之類三服之後黑血化為黃膿而收全功矣

一貫漿時有索血泡者。亦是肺有大熱。皮毛者肺之合也。熱毒在肺。故傳于皮膚之間。宜歸地芩連甘桔杏仁之類。

收屬三朝證治

一漿滿破損而潰爛者。乃正氣不足。法當補益。使其腫灌成瘡者吉。必有補托。而後出贈痘于空處者。此乃正氣不虧。神氣不散。故復出于外。極為逢凶化吉。如無贈痘。又不能復灌漿者凶。一過期不結痂。此熱毒鬱蒸。陽氣太甚。無陰以歛之。宜用清涼解

毒收腐之劑又有因泄瀉而元氣外耗陰氣太甚無陽以飲之以木香異攻散等藥治之

一收腐時而瀉水穀不分完穀不化此毒氣反逐水穀脾虛不能制之以參卷白朮散加肉蓴芍藥共為末煎獨參湯調下
一收腐時外腎膚囊赤腫通明此乃膀胱熱甚毒氣流于小腸而然也用車前子加化毒之藥用外敷藥亦可

一收腐時乾黑黏著皮肉不脫身熱煩渴睡卧不寧此乃毒火燔熾謂之火盛則水竭以地黃連加連翹牛蒡治之火漸消而諸證平只有手足發毒而愈者曾有一醫認其氣血不足也大補益

之延至十六日而不治。

一收腐時內復潰而生蛆虫。此乃陰陽之氣鬱遏而生所謂氣化而生也。法用花椒湯拭之。并用清涼收斂之劑而愈。又有蠅集而生者。乃自外而入。所謂形化而生也。治法雖同。但要謹其幃帳。

一結痂如麸。乃正氣不足。不能化毒耳。宜補中托毒。使發毒可止。

一收腐後。咳嗽咽喉不利。宜以甘桔湯加貝母。牛蒡。玄參治之。

一收腐喘急。腹脹而謂倒腐者。不治若漿如期而死。又厚此必傷食所致。法當消毒。

一將腐之際。寒戰咬牙。口渴聲啞。大便溏泄。小便清利。此寒證也。

宜木香散或理中湯等以溫之雖有身熱口渴此為虛熱之故乃
渴多亡其津液以作渴也宜四君子湯加木香乾薑之類

結膚後餘證

一膚後身熱喉嚨聲啞血痰鼻衄此心火乘金越出上竅以黃連
解毒湯加門冬犀角丹皮牛蒡知母主之

一痘瘡脫盡正額一痘潰而不歛若臭而聲啞悶亂者不治又有
痘瘡脫盡頭上一痘不歛忽癢甚而出蛆一團以致聲啞悶亂者
亦不治

一痘後潮熱譖妄者乃氣血兩虛所謂火從虛發之義以保元湯

加歸芍黃連治之

一痘後自汗不止。痕色淡白。此陰陽俱虛。以十全大補湯治之。加
枣仁少妙。

一痘後能食而身熱便閉。口渴此乃胃中蘊熱也。胃熱則消穀。治
宜去胃中積熱。否則鬱為口疳等證。

一痘癰之證必出時。或不能盡發。或頭粒細小。四五日不灌漿而
即焦。或發時漿不能足。或收癰結痂如麸薄。此皆毒猶未盡。必有
內攻臟腑之虞。必使脾胃壯盛堅固。使毒內無可容之地。然後奔
走于曲池委中肩骨之處。而為癰未成膿者。法當解毒已成膿者。

補托以決之。潰爛者益而飲之。若遍身流注清水。奔流延綿不已者不治。

一痘後有疔者。乃氣血不足。毒不能自散。故聚結成形。若疔結于四肢而不近臟腑。慎宜治之。此證必用四聖膏。或生肌散敷之。使疔根潰出為愈。內須服解毒養血之劑。

一痘後生疔害眼。皆因頭而痘密。膿水膠固。或破爛而復腫灌毒火鬱蒸。內攻于目。或痘出火盛。成就太遲。或過服辛熱。或失于清解。或啖辛辣。或逼近火氣。或厚衣食。或客冒風寒。或恣食煎炒炙燄。皆能害目。治當活血解毒。禁用點眼。

一痘後目赤而腫。乃心肝二火。土衝于目。以犀角地黃湯加胆草連翹草決明大力子治之。

一痘後目患羞明而不紅腫。此腎水不足。血少神勞也。宜壯水之主。以鎮陽光。以補血藥。加六味丸服之。

一痘後口舌生瘡。或牙根潰爛者。皆由餘毒不解。乘于陽明。薰逼上焦。而然也。宜犀角解毒清胃之劑。若唇腫面虛。及穿頤潰齒者。凶。

一痘後咽喉腫痛。有二皆由餘毒。留于管籥。或過用辛溫補劑。以致毒火刑金。不能清肅。而成內鬱。積熱相搏。而為化火。性上炎。

而咽喉為出納之門戶。故使腫痛耳經曰鬱火可發又曰實火可
瀉。必先解散清利。如甘桔牛蒡連翹射干黃連知母門冬玄參之
類選而治之。

又有脾胃虛衰則元氣不足坎離不交不能使水升火降故火炎
無制得以乘其土位其勢上騰結于會厭故為痺而腫痛也經曰
一陰一陽內結謂之喉痺又曰虛火可補宜補益而薰治之宜用
理中湯加減或六味地黃丸料加知母麥冬玄參甘桔之類

一痘後心煩而不得眠者因心中血少元氣虛憊也宜溫胆湯加
人參枣仁遠志茯神辰砂石菖蒲之類

一痘後身熱不愈或用退熱藥不能効者或熱退而復熱者此乃表裏俱虛陽浮于外陰伏于內也宜用溫平之藥治之此正治反治之法于此可見矣宜四君子湯加乾薑之類治之若口瘡唇裂而赤如粧六脉虛數此虛火上升之故內真寒而外假熱水極似火證也以理中湯加木香冷服之

痘後飲食起居禁忌

凡痘結痂之後往往父母便生懈怠不慎謹護至于危殆不救者多矣蓋小兒五臟六腑四肢百骸痘後未盡還元精神氣血肌肉脾胃咸未充實風寒最易冒感若投之發散之劑則精神愈耗飲

食易傷投之以消導之劑。則脾胃愈。蕩藥石之所難療。保佑之所當周。故葷鮮煎。燙忌而不食。能杜瘡癥之患。糲粽生冷禁而不食。能免傷食。腹痛反悶脹之楚。辛辣酸鹹忌而不食。能免疾嗽。汗出哮喘之病。肥甘油膩忌而勿嗜。能免齒疾。脾泄之疴。眼鼻勿動。其痂能免。鼻龜眼吊之醜。行坐勿使太早。能免腰疼脚痠之咎。此而忽之未有不生他證者。又有諸般穢觸。及尸氣觸者。宜用中和湯加減治之。其驗如神。如此不獨為父母者所當謹者。即調治醫人。尤當究心留意。諄告戒使其遵守。勿失方為人之司命也。

痘後用藥禁忌

紫草金汁性多沉寒。有等虛紅難起之痘。狀似血熱。若候服之。不惟痘疹陷伏。且能傷損胃氣。致有泄瀉癢瘍。寒戰咬牙之禍。如果索色煩躁作渴者。可暫用當歸生地養血滋陰之聖藥。世多用之以治血虛之痘。殊不知血虛者。氣必先虧。用之不惟無補于血。而有滑腸助便之患。如果血熱便鞭者。方可。用麥門冬。天花粉。用之以治痘中煩渴。咳嗽極當然。脾肺虛而嗽渴。而渴倘誤用之其疾益甚。

芍藥性寒收斂。痘後用以助結痂者。今痘中脚散。徃用之。豈知寒則凝。斂則滯焉。有發生滋長之益耶。初起脚濶者。暫用一二劑。無害。

人牙燥熱而屬腎最能起痘。如黑陷而毒氣入腎者立應。若血虛氣弱。灰白癰瘍及紫色乾枯者用之。則有肉裂皮逆之憊。穿山甲極能攻托痘毒。要分部位。如頭面欠起宜取頭上甲。用背部欠起則用背部甲。下部欠起則用下部甲。隨其形像炒燥研細入藥同用取効最速。

蟬蛻有治癢發痘之功。五日之內可用。若氣虛作癰。又灌漿時發癢。俱當禁為其能損真氣。以參芪補之。其癰自愈。

升麻葛根用之。于將發未發以解利肌表。自然出快。若表虛自汗。大宜禁之。日後外剥痒瘍皆從此起。宜慎。

牛蒡荆翹用之于熱毒則効如病後出痘或脾胃傷損用之必致耗散氣血反不出快而生變證

芩連等類用之于痘後解毒。是定法。有等陰虛發熱虛火上升目赤面紅者。妄行施治其病反劇。當行從治之法以溫補之。

參芩白朮散用之于脾虛滑泄者。應手而愈。若邪熱作渴或挾熱有積者。用之反致喘滿煩躁。必須細察不得亂投。

硃砂雄黃鎮墜之劑。冰片麝香走竅之藥。凡痘疹初起有驚搐者。丸錠藥內。誤用之不惟鎮壓其毒使痘難發。且有能入竅反致引風入骨古人譬之如油入麵斷不可解正謂此也。

百祥丸內有大戟乃膀胱經藥也。膀胱與腎為表裏。毒氣入腎。其瘡有黑陷。青乾之色。及腹脹者。服之立効。使腎中之毒從膀胱而泄也。若灰白項陷者。慎用之。其害非淺。

陳氏木香散內有丁香。官桂。乃治肺經之寒。白朮。半夏。乃治脾經之溼。如有此證。則中病之藥矣。若無此證。則何處消受耶。

當帰散三黃熟艾湯。乃黃芩。黃連。苦寒之藥也。脾肺有熱。用之則効。若無此證。尤如惡寒。而入水。其害更甚矣。

錢氏白朮散。若氣虛。胃弱。脉無力者。用之必効。若氣實。而脉有加者。服之。則胸膈飽悶。氣反短促。絕食而不治者有之。

猪尾膏用之以治痘瘡陷伏極為神劑。又不若用新殺猪心血同研片腦為膏服之更覺効捷。

婦人出痘

秦子曰婦人出痘其所難者胸背四肢不能縱觀經行胎產不能細陳全憑細察詳問蓋痘癆多用氣血為主若初發熱及痘生長時經水應期而來應期而止氣血雖循其度無足過慮也然氣血未免走失亦宜滋養之劑為主其未及期而來又過期不止此乃熱迫其血一熱妄行過其常度治宜清熱解毒涼血為主其血自止若初發熱生長之時經行應期而不行此雖不可輕動其血然

六宜防蓄血內攻當解血室之毒若痘正起發成漿經水應期而來不止恐陰血虧損而陽氣虛弱不能充灌宜補托清熱為主
一、娘婦出痘最防熱毒侵損胞胎治宜清熱安胎以防墮落漏血等證
一、新產後而值出痘或痘生長而值產蓐其時瘀血未盡新血未足恐血虛不能任毒治當大補氣血繼有他證以末治之

一、痘正出時值經水應期而來適然間斷煩躁乍熱譖妄昏憤此邪入血室與血相搏分爭而然也以升發解毒活血之劑治之一痘出時非經期而月水適來不止此乃痘之毒火內熾迫血妄行而黑以犀角地黃湯加紫草蟬蛻牛蒡治之使熱清毒解而痘

得出經水止方無變患若久遲則內虛瘡陷而變成危證矣

一娘婦出痘正起發養漿時而墮胎血去過多以大劑保元湯加當歸阿膠艾炒黑乾薑治之若人事昏憤伏陷者不治

一娘婦正養漿而正產其痘順者以保元湯加川芎當歸益母草山楂治之

一產婦出痘不易透而熱甚煩躁狂言譖語此毒太過而壅遏也以川芎當歸加紫草黃連蟬蛻甘草牛蒡治之

一產婦出痘隱而不易透精神疲倦血去不止此氣血兩虧以川芎當歸益母草炮薑人參升麻治之

一產婦出痘雖稀。而去血不止。因而倒腐者不治。

一產後出痘。形色雖順。而痰涎壅盛者。宜翹行清解之法。如不効者。此陰血虧損不能制陽火也。宜六味地黃丸料。加當歸。麥門冬。治之。更要防其氣虛。痰壅者。以大劑參耆托之。則痰不治而自愈。

一婦人新婚後出痘。雖順。而腰痛不已。此陰血虧涸。宜地黃丸。加溫補劑。

一痘愈後最忌房事。

一方產之後。或半月十日之間。適逢出痘。此于有血氣者不同。宜照常治之。不必妄為之慮。反致變悞。不測。但宜專補氣血為主。可

也

一婦人初痘時。及收齶之時。胎落者多見無事。惟初發熱時。胎落者多致不救。蓋血氣衰敗。不能逐毒而出也。

新刻秦景明先生痘疹折衷卷下

雲間後學夏之昇東步訂

天都

陳維坤子厚閱

痘後雜證論

寒戰咬牙

秦子曰寒戰咬牙之證諸書立論各執一偏如博愛心鑑則曰表裏氣血兩虛以七日前寒戰為表虛以七日後寒戰為氣虛以咬牙為血虛而陳文中不論前後槩以異攻散木香散加官桂丁香治之此真一偏之見矣而金鏡錄又止分七日以前為熱七日以

後為虛諸論雖確然以未盡其善蓋寒者有之而熱者不少虛者屢見而邪氣實者少間或有之此機不在於我全在活法變通而後可也然如何而治之必也審冬夏之節令看嬰兒之厚薄驗痘色之紅白察二便之秘利診脉色之遲數觀起居之靜躁內外表裏判然明白于胸中如此則安得有遁情耶如見痘色淡白或皮薄頂陷身涼而靜惡寒不渴大便利小便清長脈來沉遲者此屬寒也肺氣虛寒則為寒戰胃血虛寒則為咬牙並宜倍用保元湯加川芎肉桂煨薑或木香甚者加附子泄濁者加荳子肉荳以佐之如痘色紅赤或紫黑齊湧掀發身熱煩躁惡熱作渴大便秘小

便濁赤脉來洪數者此屬熱也故陽明胃熱則為咬牙太陰肺熱則為寒戰治宜四物湯後黃連解毒湯加連翹玄參紫草犀角門冬甚若加酒大黃以利之已上二證見于七日以前者其治易見于七日以後者其治難然亦不必拘熱予見七日後寒戰咬牙晝夜不止此為大虛之證然能睡能食者急須大劑保元而佐以薑桂等劑便濁者速用止濁之方使其漿水灌滿縱有前證可保無虞慎弗以七日後為危證竟棄之而弗治也

癰瘍

秦子曰癰瘍之患痘家最忌因氣虛則癰瘍甚則瘍此不易之論

故黃石峰曰氣失其衡痘自作癰然血虛久有致癰者不可不知。丹溪曰血不榮于腠理所以癰也柳真虛曰血不能滋灌痘癰難釋則氣血之虛俱能作癰予見癰塌之痘居稠密者多四五朝形色雖見起發至七八朝殼薄漿清燈光水泡痘形雖綻而血不歸附純白不榮手足掙動而作癰不已破塌乾焦而無血咽啞泄濁之證互至形綻者氣不虧也純白不榮者血不足也此可見血虛之有癰塌之患先賢所謂毒者譬之貨也血者譬之船也貨盛船窄何以能負載蓋血虛必致癰虛甚則不能載毒而癰塌治法當于未癰塌之前用保元湯加芳桔速進數服尚可保全或曰血虛

何不用四物湯補血而適用保元湯氣家藥也。庸知血虛益氣先聖之良法也。所以甘溫之劑舉世皆混為補氣而不知甘能養陰。此又陽生陰長之妙理。若用四物湯為補歸地能滑腸芍藥能酸斂求其速効。豈不難哉。間有擦破者宜以赤石脂一兩煨熟白石膏二兩共研細末敷患處此亦外治之一法也。若作癰而悶亂煩躁語言不聽禁之不止搖頭扭項手足舞亂者毒已內攻不治之證矣。

水泡

秦子曰水泡有溼有火有肺熱有脾虛有氣不足或氣有餘或素

黑泡之別其溼者或向曾感溼或飲水過多脾家受損流入皮膚
滲入肌表而發水泡是也宜保元湯多加車前木通茯苓之類
有火者痘四五朝之前煩躁不寧頭面乾紅色滯乃毒盛火熾火
不能炎上水不得潤下搏激于皮膚之間而為水泡譬之沸釜之
中其下之火盛必為之發泡也宜清火解毒以紫草犀角金汁之
類選而用之有肺熱者蓋皮毛乃肺之合也熱毒在肺因皮毛受
損并其膚間之津液俱發為水泡也宜托漿中加貝母丹之類
有脾胃虛弱不能制水以致水溢皮膚之間而為水泡者防其發
鴻其候必腸鳴或作渴並宜用保元湯及參苓白朮散

氣有餘者乃氣分毒盛以致津液上蒸隨毒所出而發為水泡也
宜生發劑中佐以山楂陳皮之類

氣不足者其色必白而無清水宜倍用參芪加桂主之至若發為
黑紫紅泡者乃血熱之極其毒未出而賊邪先為之病也宜涼血
解毒大劑投之擇其紫黑者剔破而諸痘灌漿者也能可生若反
加瘡瘍煩燥而痘色焦枯則不治者多矣

大抵已上之證縱使飲食如常身無所苦然往往日後多有變證
若起發而殼中出水者此氣至而血不隨也或窠囊浮脹中合清
水如水泡之狀者此血氣俱虛不能制毒反為毒逼漸變癰瘍也

治此諸證最要察其起居飲食隨證調治慎勿恃其無虞反取謗
怨也痘中間或有水泡藥粒者因邪不能勝正之無大害然托漿
之中累防發癢之劑為要大都水泡多者後必發痒漸成倒陷之

證耳

渴

秦子曰渴有數條不可不辨心鑑云三焦者水穀之道路津液者
乃氣之精化而流通三焦以制火者也今曰渴而乾者係火盛而
津液枯竭耳然此亦總其大綱之論也詳細如左

有發熱時便大渴者此毒氣萃于陽明乃熱滯于內而毒未能宣

發于外也宜葛根解毒湯主之

如痘已出或起發或收癟一向久渴不止者倍加人參門冬之類
主之

有泄濶而渴者乃精液下陷而然也宜四君子湯加河子肉菓以
寃脾上甚者佐升麻以提下陷之氣

如不能食而渴者此脾虛也叔和曰口乾饑飲水多食之肌虛由
脾胃素弱不能為胃行其津液故渴也治在上焦以參苓白朮散
主之

如能食而渴者肺熱也經曰心移熱于肺傳為膈消由心火上炎

乘于肺。金薰蒸焦膈。傳耗津液。故渴也。治在下焦。古人雖以人參白虎湯加黃連療治。然莫如麦冬。黃連。人參之為尤妙也。

如陰虛火動而作渴者。諸論中俱稱不治為其血屬陰血虛。不能峻補。難取効于一時。其宜四君子湯倍加當歸。黃芪。少加官桂。以補不足之陰。

有痘後身熱大渴。夜多呻吟。或腹痛。或腹脹者。此餘毒未盡。乃氣凝毒滯。謹防其痘毒之發。宜連翹。牛蒡。金銀花。及人參貝母。而少佐以橘紅。山楂。大腹皮。木通之類。大抵痘中諸渴。悉宜照證加減。不可擅食諸水菓。及水漿生冷。使寒涼傷胃。便有變證百出之禍。

聲啞失音

秦子曰痘之前後聲音最宜清朗然其候有聲啞有失音之別有痘初出客胃風寒痰壅而聲啞者宜疎利為主有漿足而聲啞者乃氣道不清也宜甘桔湯主之有痘初出咽喉初小而不覺及至成漿壅塞以致氣道不利而聲啞者痘收自愈有胃實聲啞者必口渴熱甚大便秘結其瘡久起發宜三黃湯主之有心火刑肺而失音者肺屬金主聲金空則鳴寢則啞乃火氣上薰于肺氣脹鬱故竅塞而無音也若七日前失音不治若七日後失音者乃內瘡先熟先膿則咽喉漸寬毒氣漸消聲音自亮也或內本無瘡因食

辛熱或悞服熱藥而致失音者。急用甘桔湯牛蒡子湯加玄參連
翹葦治之。有毒歸腎而失音者。其痘必黑陷不起。乃毒攻于內。會
厭不能開闔不治之證也。有喉舌潰爛而失音者。乃初出時失于
調治。以致咽喉腫塞。毒聚于內。呼吸不能。飲食不進。而成壞證也。
六、不治

水嘔論

秦子曰。水入則嘔者。乃毒壅咽門也。蓋咽門司飲食通于口。入于
胃。今咽門為痘所傷。則水不得溢入。會厭會厭掩而不納。故氣逆
噴出而嘔然。遇飲水或藥則嘔。若穀食有粗。自能咽下。非若水溢。

以犯氣道矣。七日後見者不必治之外。痘結痂而瘡自愈。若七日
前見者。乃熱毒壅遏。漿水不能行于肌表。最為逆證。故先輩預以
甘桔湯加牛蒡玄參荆芥。門冬之類。安有此患哉。一兒痘後作瘡。
不止餘無所苦。飲食如進。惟鬱鬱不樂之狀。音聲不甚清楚。父母
以為飲食如故也。不宜藥與至三十朝後。竟以潮熱痰喘而不治。
乃知痘後發瘡。必要細心調治。慎勿以不治自愈而貽後悔也。

腰痛

秦子曰。腰乃腎之府。一身之大關節也。痘瘡發于四肢。而腎無害
邪。則血氣流通。而無此患。若發熱之時。腰痛不絕。見點一二日。則

青乾黑陷或反閨不出此毒氣留于腎而不發越十無一生之證
若情竇開後覺腎虛而痛若速于扶元氣中加杜仲龜板枸杞之
類治之不愈者凶若女婦正值經期來而腰痛者雖稱凶證亦無
大害多服芎歸自愈但要升發痘子而已又有六氣乘虛而感有
感寒而痛者有感溼而痛者有挫閃而痛者有瘀血蓄而不行作
痛者但要醫者慎加細察對證投治可也近視一女十四歲形體
肥大發熱一日即見痘標煩躁作悶不食而赤腰痛如折天癸尚
未至余曰果爾則腰痛諸證乃火逼經行之兆非真腰痛也純用
解毒生發之劑天癸適至痘亦無恙此等腰痛又屬於火更非前

證可例也。

喘

秦子曰諸證雖云皆屬於火然虛實之辨迥然不同不可不知也。蓋肺為五臟之長為心之華蓋心火一炎則肺葉焦舉氣即不利而成喘况薰之以毒邪相干乎此痘必乾紅色滯脇脹便秘而為邪寔之證大都難治法當清火解毒利氣以前胡枳殼湯服之或之有生者亦有初出而噴涕鼻流清水而喘者此風寒客于肺家而然也和解自愈之有因食而傷穀氣蒸而為熱上乘于脾者消導則減有瀉後而喘者乃元氣下陷虛火上擁下氣不續此脾氣

不足而然宜四君子湯加寔脾等劑而佐之以升麻柴胡以提之
有吐後而喘者乃胃虛不能制伏相火逆上冲而然也治宜六
君子湯主之。又有過用補劑而生痰喘者宜加破氣之劑以消參
芪之滯有痘太密以致鼻塞而口中氣促似乎喘而非喘也不可
一舉而治

痰論

秦子曰內經云諸氣膶鬱皆屬於肺氣鬱則生熱盛則生痰
疾者乃津液之所生也今痘出而有痰者由毒火太盛榮衛蔽塞
氣血濁敗凝滯而成故為痰為嗽而嗽中作聲也有風痰客肺

氣不能通陽邪鬱為熱而生疾者宜散風順氣為主有漿水不足
反生疾者乃毒氣倒陷于內氣逆而成疾者為難治須要補托為
主不受補而疾仍舊者有過能飲食損其脾氣失其健運之常不
能致化精微而肺生疾者治宜調脾為主有氣實而悞投補益有
氣虛而過用參耆氣滯而生疾者俱宜順氣為主或有紅爐暖閣
蒸發而生疾者或衣被太厚蓄熱而生疾者或啖厚味蘊釀而成
疾者俱察其緩急輕重標本而酌治之可也

失血論

秦子曰氣為陽血為陰夫陰陽不可偏勝偏則致病此自然之理

况痘疹一證。始終全賴氣血滋養。今痘中有諸項失血者。何哉。蓋因熱毒之氣泛濫無歸。則血必隨之而走泄。乃氣盛傷血。毒載血行。諸書雖云。鼻出無忌。乃云斬關而出。不犯其內。然去之太多。榮氣日損。日後必成瘍瘍。故涼血和氣之劑。尤當急用。至于口中吐出者。經中咸斷。為不治之證。而奉子隨證調治。屢奏績。此無他。惟詢驗其平時飲食起居。及臨時風寒暑火之感能。因時加減而已。至于失血之證。痘色身然。慘白少神。而欠起發。如初起時。佐之以生發之劑。候有起意。便宜速進。參芪較平時用藥預期先用。一兩日不可照常。五六日之期方進保元也。此亦素所經驗。若大小。

便俱出者痘瘡內不動而自出者此皆毒火內攻臟腑敗壞俱成
不治之證惟從大便出者間或可治然亦有由向時瘀血停留今
為火毒逼迫而由且為其元氣足以勝之故雖見腰痛而痛後便
見起發雖見煩躁而躁後便能飲食便能睡卧或煩躁呻吟不止
或不能睡卧或痘不能起或有紫黑斑點則雖無血證仍係不救
治之何益耶痘瘡前五日悉宜用犀角地黃湯若血出不止加炒
蒲黃藕節及炒黑側柏葉如初吐時宜加重便溺血宜加滑石木
通大便出宜加炒槐花及炒黑荆芥穗之類

夾疹

秦子曰夫痘已出而另有稠密細小如麻子者此為夾疹痘心鑑
云痘毒之發被風寒蔽塞腠理熱毒擊動腑毒故與痘併出此亦
無妨于痘之證也蓋疹出于腑痘出于臟屬陰乃為積受之地
其受毒最深腑屬陽而為傳送之所其受毒尚淺故痘之始終每
以二旬日為限而疹之消長一辟時而已可不從其急而先治之
乎經曰急者先治治宜先散其疹而後治其痘疹不散則痘不起
疹一散則痘勃然而莫之能禦矣若疹散痘起綻凸勻朗紅潤其
勢吉矣若疹散而痘稠密平塌灰白紫滯其勢之陰也故經曰痘
夾疹者吉凶相半也又有出痘時或冒風寒不能出汗發而為疹

之與傷寒發疹者同。先散其疹而後治其痘也。

夾班

秦子曰夫斑者形似蚕斑有頭粒而大。又有形如雲頭而突色赤成片而無頭粒者乃謂之丹。而傳心錄中又謂之斑總之乃血之餘也。因火毒壅遏煎熬陰血血熱相搏故與痘相夾而發之于外急用涼血解毒輕而小者仍加發散涼血則自愈至如青紫黑斑乃毒氣不能發洩之故面腫唇裂十無一生之證。予曾間或治之而獲効者因諸色之斑雖見而痘自能起發且能睡而進食宜多服紫草犀角及一切涼血解毒等方此亦僥倖中之萬一不可一

藥施治反取怨于人也

大小便閉

秦子曰凡痘瘡五日間小便欲其流而長大便欲其潤而實則邪氣不伏止氣不病故經曰小便數者大便必鞭雖二三日不更衣無苦也如覺小水少則病必進矣故大便閉者由毒火內乘耗損津液以致腸胃乾燥而大便閉也用猪膽導之可宜涼血清火若痘白而色少神不復嘔清水者虛秘也宜專補氣血為主之有醫過利小便以致津液乾涸而秘者宜生脈散加當歸益之又有氣血拘化成漿而四五日不大便者候漿足自利不必治之也小便

赤澀者由火盛膀胱受熱而不利也。乃心火移熱于小腸。小腸移熱于膀胱以致津液內涸而溺赤澀也。宜清金解毒以泄其熱而小便自利矣。又有毒流在肺。積痰塞其氣道以致上竅閉而下竅不通也。宜清肺而溺自利矣。又有元氣虛弱不能清理傳道。則清氣不升。濁氣不降而溺澀者。宜補中益氣湯加知母麥門冬主之全在因時致宜也。至若灌漿時大便不來而小便一日夜僅有不多者。乃一身之津液盡蘊釀其漿毒。不必憂治漿足而小便自利也。

腹痛

秦子曰原病式云熱鬱于內則腹滿便結而痛今痘未出而腹先

痛者何也。由蘊熱積毒與外邪相干。稽遲不行欲出而不得出故卒然而痛。宜陳皮枳壳乾葛山楂甘草防風。甚則發厥者隨即加蟬蛻使毒氣得泄。四肢溫緩。腹痛自止矣。有實痛腹滿。不大便者。熱毒火盛。氣不得伸也。輕則蜜煎。或猪膽導急。則大黃以通利之不可執首尾。不宜下之。旬反遲悞。其證有腸鳴。自利而痛。此胃寒邪。或悞食生冷也。宜加煨薑以溫之。有收癟之後。忽然腹痛。或嘔或利。不思飲食者。此乃傷食證也。量加消導。如無傷食。而腹痛煩悶。欠安者。此毒氣內攻。急加解毒和氣。不爾。則手足逆冷。氣促而成不治之證矣。又有平時釀成食積。到大便時而痛。便後而痛即

減者縱有虛證。山查白芍之類。必不可缺已。上等證宜以脉辨之。
方知虛實寒熱之痛。如六脉至數平而無力。謂之虛。六脉至數平
而有力。謂之實。數而有力。謂之熱。遲而無力。謂之寒。又有六脉數
而無力。謂之表熱。裏寒不可用寒藥。宜溫熱之劑。又有六脉遲而
有力。謂之表寒。裏熱不可用熱藥。宜寒涼之劑。不獨治腹證。諸病
依之不悞也。

譖妄

秦子曰。夫譖多言也。妄虛妄也。乃妄有聞見而語言無倫也。由邪
氣熾盛。毒氣內攻。神識不清。所致夫言為心聾。心熱則多言。睡中

呴喃者熟之微也。寤而語言差謬。熟則甚矣。必有胃熱而譫語者。此必大便久未能去是也。其妄有見聞而譫語者。為難治。為腎主志。開竅于耳在目。為瞳子毒邪入腎。則志喪。志喪則耳目妄。有聞見故也。並宜解毒清火。諸書以辰砂鎮神之劑。恐未妥當。又有成漿之時。乃昏。而睡。呼之不醒。或口中喃。妄言狂語。如被邪之狀。時人不知多生驚恐。殊不知此由膿血出。多心舍室虛。神無所依。此名鄭聲。經曰。實則妄語。虛則鄭聲。法當養血安神。其病自愈。以寧神化毒湯及安神丸加減。療之如服藥不醒。反加悶亂者。不治。

驗口唇

秦子曰口唇為脾之竅經曰六腑之華在唇故痘瘡始終以唇口紅潤為吉若唇口腫硬或口瘡燥烈乃毒火乘脾毒聚于中則熾熾于外宜升解以化其毒次補益以培其本若痘出稠密唇口之瘡相黏乾里諸瘡未起唇口先以黃熱而成腫硬諸瘡未收唇口先以焦枯其唇剥落一層又一層者口中臭氣者口中涎如膠黏者魚口者皆凶證也

舌

秦子曰舌乃心之苗一為脾之脈凡痘之始終以舌紅潤為吉若燥黑有芒刺為凶若氣虛火甚津液不能上行而舌乾口燥者補

並為主。若毒火盛而舌乾口燥者解利為主。若陰虛火炎無制而舌乾口燥者治宜壯水之主。舒舌者脾之熱弄舌者心之熱。有因唇燥而舒舌歟。唇者脾土之熱也。若舌上純見白胎遇飲食則嘔嘔者此毒入于胃為胃爛之證。若內熱甚而有白胎此又不在危證之例。宜朝暮以絹裹指攬其口舌但不可太重以傷唇口。則飲食有味而兒自能進食矣。

驚搐

秦子曰素問云痘瘡出于心驚搐之由于心錢仲陽云肝風心火二臟交爭而致搐乃知心移熱于肝火風相搏而發為驚搐痘將

發而兩目忽上竄者乃俗呼為驚痘不妨大體然久搐不止恐火
毒甚而不發越亦稱危證金鏡錄曰宜平肝木利小便平肝木則
風去利小便則熱退而痘自出也用升麻葛根湯兼消毒飲及導
赤散治之或痘已出而有此症由熱毒之未解耳搐而痘起者生
搐而痘沒者凶亦宜消毒飲合導赤散治之如痘瘡收廬之後而
又發驚此真氣虛弱火毒內鬱心神不定不定則舍空而邪氣客
之最為不治之證矣以牛黃清心丸主之然寒涼之不宜輕進也
久有風寒所激而發者有大便秘內有燥屎不行而成者有傷食
不能化而成者有脾氣虛弱而作者俱能發搐不可不辨

痘後身腫陰囊腫

秦子曰。凡痘癰之後。面目虛浮。四肢腫滿者。此屬於肺。因表虛而受風溼之氣。致傷脾土。土虛不能制水。水溢上行。故發而為腫也。宜加味五皮飲暫用之。或腹脹如鼓。目胞浮腫者。此屬於脾。因脾胃素虛。飲水太多。以致水畜于中。滿而不去。又或一食。脾不能消。溼熱內畜。宜以利解厚朴湯主之。若虛脹者。不可妄攻。宜補中行濕。利小便。與諸書治法同至。若陰囊腫亮如瓠者。乃膀胱熱甚。毒氣流入小腸。而然也。急宜清利。用車前茯苓牛膝木通澤鴻燈心。井草之類。仍佐以寃脾等方。

痘毒

秦子曰痘毒之發。皆因餘毒太盛。更兼榮衛太虛。不能運行營而
不散。而成癰腫。當其未成功時。便宜服金銀花甘草連翹。及當歸
生地之類。其脾胃不實者。當歸宜禁。生地但以實脾為主。如毒盛而勢
必發。不宜即用寒涼等劑。及一切敷藥。宜縱之發。內用參芪甘草
歸芍金銀花助之。如氣血弱者。倍用參芪加桂。主之。發癰掀腫。能
食身熱。大便堅。而元氣實者。稍用生芪加芍歸連翹金銀花生地
為藥。甘草荆芥稍加羌活。主之外用。土南星生為末。清水調薄炭
火上煮。一滾。候其質稠。乘溫熱時。用鴉羽蘸。時常忖腫處。日十數

度不拘時以腫消乃止

汗證

秦子曰汗乃心之液。發熱而初出時由心火上炎。熱氣內蒸。腠理疏通。毒氣發越而無停滯。丹溪自曰汗不妨。蓋溼熱薰蒸而然耳。決無大害。亦不必治。然汗多而久。則榮衛虧損。恐痘之難成功。禁用防風荆芥及諸升發之藥。宜用當歸六黃湯加白芍藥。麥門冬之類。若收瘡之後。而汗出者。皆由衛氣弱不能歛束玄府。宜多服參芪以寒腠理。有熱者。六黃湯中加地骨皮主之。大都痘後汗出。屬虛證者。多補劑中加炒枣仁及浮麦湯為妥。如果天氣炎熱而

汗多者不必用藥但禁扇風可也。

吐瀉

秦子曰痘疹前後吐瀉各有不同不可一槩施治。凡發熱初出時有單吐者。有單瀉者。有吐瀉並行者。雖不可久吐久瀉然亦不可驟行止法。令毒氣上下分瀉也。但于催發痘子之中。稍加利水止吐。不可執痘書而妄用理中湯及五苓散之類。必有感冒風邪。寒熱相搏而或吐或瀉。量加和解之劑。如傷食。少從傷食治。如三焦火熱甚而然者。則當用清涼解毒之法。少從出後可施。若成漿之後。而犯吐瀉者。則最大忌。若乾嘔者。更不宜乃衝任之火。主衝于

胃係毒氣內攻直犯清道而上也。八九朝作渴者大都屬虛全仗參术滋補。渴久不止者加以訶子肉莫甚者加以龍骨赤石脂手足冷者附子可用。亦有不時作渴而手足和暖飲食如常者治之雖不能止日後亦無大害。此秦子素所歷驗者。又曾遇一痘用百般補脾止渴藥不効。後用升提又不効。一日夜數十次。此藥仍其胃喜其能復也。竟不藥而愈。乃知全仗胃氣為本信哉。

麻疹

秦子曰：麻疹乃時行不正氣候暄熱非其時而有其氣傳染而成者也。稱之為胎毒則誤矣。內經有曰少陰所致為癆疹。夫少陰所

致者乃君火有餘熱令大行言戊子戊午之歲也在人則心主之
心火大過則制其所勝而燒燬肺金肺主皮毛故紅色如錦見于
皮膚間實心火侮而乘之色也又曰麻屬於脾故金鏡錄謂毒
盛于脾熱流于心乃知心與脾胃俱受其病而發者其欲出之時
腮紅眼赤壯熱增寒身體疼痛嘔吐泄瀉咳嗽煩渴是其候也宜
服開豁腠理湯使之易出如頭面愈多而精神爽健且鮮明勻淨
氣息和平吉之兆也服前藥即愈矣若紫紅燥暗或未出透身熱
煩悶聲啞喘急隱不出而復隱此危急之兆也急將前方加
炒麻黃羌活之類發之如不出透或喘更甚此為不治之候其大

便堅燥不可輕用藥以下之或用蜜煎猪膽之類導之大便自來其或微瀉者不必治之正假此發洩熱毒也若麻後瀉痢不止此熱毒下陷之故當以五苓散去桂加芩連芍藥木通之類毒解熱退則瀉痢自止不可用燥濕溫補之藥古人云可汗不可下可表不可補是矣其壯熱氣促不止者此餘毒畱速未盡也用解火清金之劑以竹葉石膏湯加參連玄參桔梗陳皮枳殼天花粉牛蒡之類咳嗽不止者四物合二陳加瓜萎桔梗玄參黃芩治之渴則天花門冬喘則蘇子桑皮枳殼可也若出過三日後而麻不沒者此內有實熱也加清利之藥則自解消矣此乃治麻證之大槩也

凡初出之時最忌米穀葷腥之食風寒水溼之氣苟有不謹最為
深患間有犯之而獲愈者皆因內稟之實氣外感之邪輕耳不可
執此以望僥倖也

附麻疹輕重及不治訣

凡麻疹出時或熱或涼五六日而後出者輕 淡紅滋潤頭面勻
靜而多者輕 發透三日而暫沒者輕 頭面少或不出者重
紅紫暗燥者重 咽喉腫痛不能食者重 見風而沒早者重
變癆疾者重 黑暗乾枯一出即沒者不治 鼻扇口張目無神
者不治 鼻色青而下糞黑者不治 氣喘而擡肩者不治 麻

後牙疳臭爛者不治。

古今經驗方

升麻葛根湯 初發熱腹痛頭疼或咳嗽痘瘡疑似之間用之解
發 升麻 葛根 白芍藥各一錢 甘草五分

水鍾半盞二片葱白一根煎半鍾服加山楂一錢尤易出。天
寒甚加蘇葉八分麻黃五分 天炎甚加牛蒡子一錢五分

葛根解毒湯 發熱作渴者用之

乾葛 天花粉 麦門冬 生地黃 升麻各等分 甘草三分

水一鍾煎半鍾入茅根汁一合服之

導赤散

治心經熱及發搐良方

生地黃、木通、甘草炙、防風、黃連各等分、竹葉七片、水煎服。
一方加人參、麥冬、目直視煩叫哭，加黃連、梔子。

牛黃清心丸 治心熱神昏良

牛黃二分

辰砂五厘

黃連五錢

鬱金一錢

山梔

黃芩各三錢

共為末，臘雪調麪糊為丸，如黍米大。每服七八分，燈心湯下。

四君子湯 養胃補氣良方

人參、白朮、茯苓、甘草、生姜一片、枣一枚，水煎服。

四物湯 養血涼血良方

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

水煎服

十全大補湯 補養氣血良方

人參 黃芪 白朮 白茯苓 生地

白芍藥

當歸

甘草

五分 川芎 杏仁 桂枝 三分

薑三片 杢二枚 水煎服

補中益氣湯 治虛熱

人參

白朮

黃芪

當歸

陳皮

甘草

升麻

柴胡

加 姜 杢 水 煎 服

保元湯

人參

黃芪

甘草

生

姜

二片 煎 服

參 茯 之 多 寨 有 痘 色

虛 實 輕 重 而 加 之

參 茯 之 多 寨 有 痘 色

虛 實 輕 重 而 加 之

甘桔湯

甘草

桔梗

水煎服

四苓散

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

水煎服

加南桂名
五苓散

犀角地黃湯

大便實宜用

犀角
生地
赤芍
丹皮

為末三錢水煎服

羌活湯

羌活

川芎

防風

胆草

山梔

當歸各等分

甘草

薄荷各半

水煎服

黃連解毒湯

鮮火毒治痘中血泡良方

黃連

黃芩

黃藥

山梔

炒黑

水煎服上三味治赤泡俱用酒炒鮮火毒生用

陳氏木香散

木香

另磨冲

人參 各半錢

肉桂半錢 前胡

赤茯苓一錢

甘草炙 陳皮 各等分

甘草炙

訶子肉

去核

大腹皮

黑豆汁洗

青皮 炒

半夏

湯泡七次

丁香

加姜三片 杧一枚 煎服

陳氏異攻散

木香

另磨冲入服

當歸 酒洗

白茯苓 各三錢五分

肉桂

人參 陳皮

半夏

姜汁炒七次

肉果

煨酒丁香各二錢

厚朴

姜汁炒急用

附子

炮緩各半錢

白朮

東壁土炒各半錢

每服三錢 用薑三片 杧二枚 水煎服

錢氏異攻散

專補脾胃

人參

白茯苓

去皮

白朮

甘草炙 陳皮 各等分

人參 為末每服二錢生薑五片枣二枚水一鍾煎服

猪尾膏 取猪尾熟血同入片腦研膏用

承氣湯

大黃三錢枳實三錢芒硝半錢生參厚朴姜子炒水煎服

當歸六黃湯

當歸 生地 熟地 黃芪各一錢

黃芩 黃連 黃藥各五分 水煎服

歸脾湯

人參 白朮 茯神去木黃芪蜜炙 地骨皮

遠志去心各一錢

棗仁一錢甘草三分 木香五分

加柴胡山梔名加味歸脾湯

安神丸

辰砂水

龍腦

牛黃各一分

猪心血為丸

五皮飲

桑白皮

地骨皮

大腹皮

姜汁洗

生薑皮

五加皮

各等分

加燈心煎服

白虎湯

加人參名人參白虎湯

石膏

知母
甘草

每服二錢水一盞糯米五十粒煎服

三黃熟艾湯

黃芩 黃檗 黃連 熟艾

右剉散每服三錢水煎不拘時服

溫膽湯

半夏 枳實 橘紅

茯苓各五
錢半

甘草四錢 竹茹一團

右㕮咀每服三錢姜三片枣一枚水一鍾煎至半鍾熟服

大安神丸

血虛不睡者用之

黃連

酒浸

甘草

五分

酒生地

三分

酒當歸

五錢

炊餅丸如黍米大用辰砂為衣每服十五丸

百祥丸

紅芽大戟

去骨一兩

青州枣

去核三十個

用水一碗煎水乾為度去大戟將枣培乾作劑以利為度

參苓白朮散

人参 白朮

茯苓 甘草

蓮肉

山藥

各二兩

藿香

白扁豆

炒

薏苡仁

桔梗

各五錢

每服二錢加薑二片枣一枚水煎服

中和湯

人参 厚朴

當歸 防風

白芷

肉桂

桔梗

川芎

白芍

沉香

檀香

乳香

藿香

蘇葉

黃芪

甘草

右用無灰酒拌勻晒乾天陰略焙每服二錢水一盞煎半盞不拘時服

三黃湯

黃連

黃芩

大黃

水煎服

四聖散

真珠

五粒

豌豆

四九粒
燒存性

頭髮

燒存性為末

右同油臘脂搗成膏用銀簪撥開瘡口以紙撲展去汁以藥入瘡口遍身瘡紅活矣

理中湯

人參

白朮

乾薑

炮黑
炙甘草

加熟附子若附子理中湯水煎服

消毒飲

牛蒡子

荆芥子

炙甘草

三錢

水煎服

一方加黃芩防風紫草鬱金食減加人參

人齒散

治腎經黑陷

人齒火煅為末每個作一服酒調入獐猪尾血三五點加麝香少許尤妙

桑虫散

治灰白紫黑難起者

桑虫不拘多少
焙乾為末

每服五分虛寒酒下 實熱竹尖湯下

救命散

治紫黑斑疔一切難起者

川山甲另用紫草防風荆芥牛蒡蟬蛻連翹各五錢

水煮軟

去藥取出以山甲入罐內蓋泥封固打火半炷香取出聽用

每甲一兩入麝者一分人牙三個

大頭蕉葉
汁淬七次

共為末五六日不

起者葡萄煎好酒調下小者三分大者一錢未起再進効

當歸散

當歸

赤芍各一錢

大黃

七分

甘草

象牛蒡連翹

荆芥

各六分

水煎服

秦氏鮮毒湯

發熱之初用紙燃火徧身照察如蚕種赤如癰

傷者急服以解之

枳殼

防風

桔梗

麻黃

蘇葉

荆芥

蟬蛻

山楂

水煎服

起痘神方

初隱于皮膚難起發者用之

人中黃

三克

麻黃

五分

酒炒

升麻

五分

蟬蛻

紫草

各一錢

山荳根

紅花子

牛蒡子

連翹

山甲

酒拌炒脆研

共為末酒密為丸如芡實大辰砂為末薄荷湯下

仙方消毒化穢丹 平時服之能令稀少臨時用之又能易出

嬰兒臍帶三條

瓦上失
脆研

鱉豆藤

名金絲草八月間
毛豆上取陰乾二兩

黑荳

三十粒

苦絲瓜二條

長五寸陽年經
霜者燒灰存性

山楂肉

可
赤豆七十粒

神黃荳

一百粒

升麻

辛

兔絲子

八錢荆芥五錢

牛蒡子

可炒

防風

五錢

赤芍五錢

人參五錢

連翹

辛

生地

兩黃連五錢獨活五錢

桔梗

五錢

甘草

五錢

辰砂

水蕊五錢

當歸

五錢玄參七錢五錢

右各為細末和勻煉蜜丸如龍眼大交春分末分時及痘發鄉

城時用甘草湯磨服一丸永無凶危之證修合時宜擇天醫黃道時日忌婦人鷄犬孝服人

三荳湯 小黑荳 赤小荳 荸薺 略加甘草節煮爛預食之

只能稀痘如痘毒初起紅腫時以酸醋浸研漿時以鷄翎

刷上隨手退去如神

治痘後濕爛方 取好菉荳磨粉炒象牙色撲之即愈此方神効
十倍于敗草散宜備用

奪命五毒丹 治痘黑陷倒齷乾枯不起者神効

牛黃三分 雄黃三分 冰片三分 硃砂一錢 蟾酥少許

五味俱研細用瀍猪血丸如麻子大每服一丸薄荷湯下一丸立刻紅活

開豁腠理湯

陳皮 防風 荆芥 桔梗 枳殼 前胡 乾葛 甘草
柴胡 羌活 升麻雖可加久要看時候而用之

已上方乃逐日必用其古方之効驗者尚未盡其十之一悉備

于痘疹全書內茲不編入

治痘毒神方

用活榔魚一個鹽泥固煅研末乾者菜油調敷溫熱花枝屢施驗也

秦景明先生痘疹折衷卷下

子之子也。子之子也。


子之子也。子之子也。子之子也。子之子也。

子之

痘瘡玉髓圖像

諸

經面部位之圖



肝為水泡色青而小肺為膿泡

色白而大心為班主血色赤

而小次於水泡脾

為痧色淺黃色

次於班發熱三

四日後痘先出

於面之下部兩頤為上


兩頰為中額先出為下紅活光潤為上先吐



自此以後有九不識

此痘背馳三陰毒轉五俞煩躁讒語惡渴嘔吐火熱其痘似背疽名焉懸鏡一不識也

懸鏡痘



治法 由來懸鏡背疽切莫妄攻先清其肝漸愈也

此痘發於肝經，裏毒總歸於左脇。一大痘居中，四沿小者如珠，乾渴煩燥，嘔逆不寧，名為蝎子痘，二不識也。

蝎子痘

治法：速用銀針挑去其血，以酒和蟾酥服。

一二厘可漸愈也。



此痘毒總會於諸陽巔峻之處。旋統連繹下部俱無
嘔吐、頭痛。名為覆釜三不識也。

痘 釜 覆



治法

梟炎總會諸陽之轄。焦毒上攻。速服

鷄鳴清熱散。以桑枝煎洗可愈。

此痘毒轉於脾絡群聚口沿旋純僅止數粒喫舌難咽
名為鎖井痘四不識也

鎖井痘



治法鎖井乃脾枲也乾葛升麻湯

加減再用荆芥浴之明朝重發可以收功

此痘毒鬱匿於肺絡弗克標散故先發於頸軸圍圈旋鎖形如瘰
癧疾延繫併眼赤臉紅惡渴

名為盤蛇五不識也

盤

蛇 痘



治法 每多誤治命在須臾用升麻飲煎浴或有愈也

此痘毒轉攻脾胃盤結臍輪左右肚痛
洩瀉吐逆手冷惡寒名為豢虎
六不識也

豢虎
痘



治法、豢虎之狀似痘須連進升麻飲再服鷄鳴散自安

此痘經心達腎毒轉玉莖小腹悶脹便澁而赤乾渴火烙
名為元蚯七不識也

元 蚯 痘



治法 元蚯之痘用水楊湯一浴

升麻托裏或臻奇效

此痘經於陽明轉於兩腋中窩圈鎖十五六顆手臂垂痛口吐涎沫惡熱臉赤名為掩八不識也

痘 月 掩



此痘經於脾毒轉於陽明兩掌心四五顆連聚碧眼煩燥名為卷
阿九不識也按兩掌心名勞宮穴屬心胞絡經此云陽明經再當

卷

阿

痘



治法 卷阿梟毒伏于

陽明吐漏無日夜須用木通煎酒服之或有三春之麗也

臉屬心部丙

臉痘如箱珠

則下部痘如

桃花紅必美

潤而無損顴

屬心部兩顴

紅潤光澤心

經之美痘也



內顴屬心經

未三日而顴

骨先灌漿者

誠為芝生午

位生全之兆

也



嵩岳鼻也。

五岳皆在

其中五岳

之痘吐如

石榴則手

足之痘必

美、



五經高處

痘出少而

色赤主神


安好食



自額骨以
上皆充滿
足縱下體
囂而不灌
亦不妨也



自背座以下
皆充灌滿足
上則囂而不
灌宜速治之
遲則凶



舌下生疔曰

捲簾舌乃心

之苗此心經

梟毒邪毒所

發宜降心經

之火可愈治

遲則凶



兩腋下疔

曰燕窠亦

心經巢矣

所發須逐

少陰之邪

火



一月兩月

之孩肌骨

柔脆防心

經巢毒厚

培元本則

可無憂



五岳地勢

穹窿痘必


於此先見

陽毒之正

傳也吉兆



不論部位經絡之先後一
發便齊者凶如萬馬之齊
奔也中必有一大痘先出
餘痘隨出



五經閨煞要

轄之地有一

點疔毒或紫

或黑名片花

落徑必遍身

之痘皆瘻大



六七相連爲

遊痘丙額心

部也額臉遊

痘必椒皮

而難救三四

相連爲疊錢

大指食指之

間爲虎口痘

如疊錢則痘必難醫峻



心爲太腎

屬水心犯

腎腎犯心

是水火相

激痘必盡

瘡凸



心犯乎胃

胃火炎梟

故頭痛汙

湧棄痘也。

速治



肺犯乎脾

脾火燶金

故吐頻身

熱亦棄痘

也速治可

生



絲竹在眉頭

尖陷中足太

陽脉所發眼

者肝之樞也

兩眼眶之下

不可多痘商

丘在足內踝微前陷中足太陰脉所經此二處俱不可多痘若
多痘哀猿聚泣凶




青田肝

部也不

可有鶴

猿聚泣



青帝殺門座
於兩眼眶肝
之關也、兩眼
胞上浮綠色、
氣血充順吉
兆也。



眼為肝竅血

之宗也。封蛤

肝榮花易充

滿。若見灰煤

知為死兆。如

流清淚定屬、

生榮三日蛤

者易充易灌

五日蛤者難充。難屬蛤而灰煤者死之兆。蛤而流淚者生之徵。



眼乃肝之

關煞紫黑

則氣毒攻

衝肝木受

傷凶



眼乃肝之然
門忌盤屍之
形海棠之色
尚可救藥黑
陷椒皮鐵葉
皆為危症也



兩眼不封則五
氣散而痘不起
少則不妨痘多
而眼不封則肝
傷而枯竭睛翻
則肝絕陰氣重
而陽亡死在旦



肝犯肺肺

犯肝二經

相犯金木

相剋皆主

不吉



兩眉梢之上與兩太陽相近痘若疎朗則六府無虧損之失氣血調和吉



額上痘美

兩眼眶稀

少乃吉山

林之地亦

宜少



鼻竅封而竅

外乾黑者死

之兆封而有

涕者生之徵

鼻肺竅也鼻

封須逐去漸

蜴言竅中生

痘毒竅黑則

肺絕主死



肺經痘癰
於鼻沿者
必失音而
下鼻不固
則金失色
喻其色之
變也



喉突為陰維

任脉所會乃

肺之殺門不

宜有痘

氣突在喉突

下窩中肺之

樞也三星垂

照必主難治



氣樞在領下
近喉處痘連
片則氣塞聲
啞喉突宜清
朗膜搭則肺
氣囂清而有
嗽逆之禍



喉咽肺之樞

也腸痛咽燥

則毒歸腸胃

而聲必啞。譬

之鐘去架則

不鳴。喻其聲

之啞也。宜逐

脾毒清肺金。



肺之闢轄氣

樞喉突氣窩

是也氣樞不

宜有痘癧生

則凶喉濺聲

啞則心肺被

癧丹田有傷

其痘必重



口吐白沫


肺遭心火

熬煎宜速


救氣樞焦

紫身多黑

陷主必死



痘愈後而膿
癥中復出名
擣杌痘主凶
若後項鎖先
發縱充灌而
必死其凶尤
甚



四疗

耳疗速宜

挑破眼疗

不宜挑指

疗膝疗可

挑以藥治

之



宮

俱脾部痘
如金錢懸
珠則身安
吉兆



兩天倉在眼
角上屬肺兩
食倉在唇上
屬脾如痘稀
朗則五經傳
注無他症吉
兆也



兩手脾之軸痘
如金柑脾之正
色也中脘在臍
上四寸胃之膜
手太陽少陽所
主任脉所會不
攢蜂蠻則脾不
受傷而無瘡漏
之患



脾胃受傷

氣血俱敗

凸

板黃結膜

鴻逆罹凸



兩顴脣部
也痘出色
如梅白形
似魚鈎脣
受傷必多
泄瀉



兩腮堆錢

則脾傷而

泄瀉之危

難免宜速

治



腮井癰腫

則毒必生

於足下陷

谷之處決

不可治凶



腮頤脾部
也倒珮之
形此棄痘
也、脾土崩
壞名為鐵
蛆嚼粒凶、



口上下唇

為雙鉗痘

形相鎖主


不食而死

速與理脾


扶胃可生



沿口起水
窠則脣封
亦水泡而
脾土壤口
脾竅也脣
脾開也



兩食倉脾
部也痘如
嘻子窠則
脾失職有
嘔吐鴻逆
之危



額肺部也

鼻胃部也

地閣腎部

也名三鎮

各一顆高

竦爲狀元



鼻為嵩岳

胃部也鼻

上吐石榴

手足之痘

必美麗



鼻准鼻冲

年壽俱胃

部流裔灰

煤紫泡俱

梟毒主凶



痘一日二日骨髓分點黑不亮

者凶黑如添亮

者轉紅而吉陽


莖腎之關也上

止一粒身必少

而痘美氣血調

和之美

發腎見黑黑可轉而為紅龜頭一粒
如櫻桃氣血調和終不逆



元門兩腎也屬水男之龜女之牝
疗火不生若疗生于此大凶耳孔交骨之前腎部也生疗名
卷虎其色紫黑速宜挑破



交骨耳邊前

一寸腎部也

痘治遊癰焦


紫必凸耳邊

結為刀梶毒

盡發于此雖

痘不灌漿可

治



地閣不可
先發乃腎
之軸也
若先發則
痘必灰煤
陷黑

