

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷二十六

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十六

五痔方一十二首

唐 王燾 撰

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時
 時膿血出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也
 若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出
 者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆

坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不為患
 久久不差終能困人別有大方今單行亦要便宜依按
 用之 肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方

生槐煎 五分

皂角 二兩炙去皮子 麝香 研

鰻鱧魚 炙

雄黃 研

葇荂 熬

丁香

木香 各二分

右八味搗篩以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一
 升以耒掘地理之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內

火瓶中灰蓋之然後內藥一九燒以下部著疊孔上
坐便通汗其盡一九藥即止內痔以藥一九內下部
立效仍不及薰忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方

蝟皮

灸

龜甲

灸

當歸

各六分

黃芪

槐子

大黃

各八分

蛇皮

灸五寸

露蜂房

灸五

分

藁本

桂心

各五分

猪後懸蹄

甲

十四枚灸

右十一味搗為散空腹以米飲服方寸七日二漸加

一七半不利忌如前方

又療五痔下血不止方

槐子

五色龍骨

槲葉

炙令紫色

乾薑

芎藭

當歸

茜根

吳茱萸

各六

分

白斂

附子

五分炮

黃芪

八分

大黃

十分

猪懸蹄甲

十四枚

髮灰

四分

右十四味搗篩蜜丸空腹以飲服如梧子二十九日

二漸加至四十九若利恐多以意減之忌如前方出第

四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居

血縱橫出方

赤小豆

四分熬

黃芪

三分

附子

炮

白飲

桂心

各一分

芍藥

黃芩

各二分

右七味擣為散以酒服方寸七日三止血大驗

支仲同備

急集驗同

又方

藜蘆

大黃

黃連

各半

練木子

十四

枚

桃仁

十四枚
去皮

巴豆

四枚
去皮心

草麻

十四枚

名狗脾

右七味咬咀以猪肪一升煎三沸下去滓傳贅肉上

日三外著此膏內服紫參丸常併行

古今錄驗同

又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療不差服之無不

差方

紫參

秦朮

亂髮灰

紫苑

厚樸

炙已上
各一兩

藁本

二兩

雷丸

半升

白芷

一兩

麈蟲

半兩
熬

貫衆

三兩
去毛

猪後懸蹄甲

十四
枚炙

蚤蟲

半兩
去
翅足熬

石南

半兩
炙

右十三味擣篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和

丸如梧子未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜

一服四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十

日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三

寸服此方即愈亦療脫肛有人熱可除羊髓以赤蜜

代

集驗備急千金同

集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之牡痔
生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鼈甲主之牝痔
從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸痔更
衣挺出久乃縮牡豬左懸蹄甲主之脈痔更衣出清血
蜂房主之方

右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦

早以井花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服唯得食乾白肉病差之後百日乃近房室又用藥內下部有瘡內中無瘡內孔中

千金刪繁文仲同

又方

野葛

末

右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日

愈

徐安用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮桃根洗之

千金備急同並出第九卷中

刪繁療五痔桃葉蒸痔方

桃葉 一斛

細糠

胡麻 各一斗熬

右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口甕中

將肛門坐桃葉氣熏入肛門蟲出當死

出第十七卷中

千金療五痔方

蝟皮 三指大切

熏黃 如棗大

熟艾 一握

右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣

出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差
勿犯風冷羹闕臙將補慎雞猪魚生冷

又方

桑耳

右一味作羹空腹下飮飽食之三日食之待孔卒痛
如鳥喙取大豆小豆各一升合搗作兩囊中蒸之及
熱更互坐之即差

並出第二十四卷中

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄為
 病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者
 有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之
 即發方

槐子

乾漆熬

檄木根皮

各四兩一名檄子即茱萸

秦朮

黃芩

白歛

青木香

牡蠣熬

龍骨

附子

炮八角者

雷丸

蒺藜子

白芷

桂心

雞舌香各二

兩

黃芪 二兩

右十六味搗篩蜜和為丸一服二十九日三服 千金翼同

千金翼有丁香 香茅 萸根皮 無雞舌香 檄木根皮

千金小槐實丸主五痔十年方

槐子 三斤

龍骨 十兩

礬石 燒

硫黃 各一斤

白糖 二斤

大黃 十兩

乾漆 十兩 熬

右七味搗篩石二種及糖並細切內銅器中一石米

下蒸之以綿絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如

梧子大陰乾一服二十九日三服

深師同

又槐酒主五痔五十年不差方

槐東南枝

細判一石

槐東南根

細判二石

槐白皮

判一石

槐子

一石

右四味大釜以水十六石煮取五石澄取清更煎取

二石六斗炊兩石黍米上麩二斗釀之攪令調封泥

七日酒熟取清飲日三四適寒温量性常令小小醉

耳合時更煮滓取汁漉米洗器不得用生水此藥忌

生水故也

深師并翼同

又方

塗熊膽取差乃止但發即塗一切方皆不及此急救

并翼同並出第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘰橫肛中此牡痔肛邊生乳此牝痔皆飽勞氣所生方

大黃如金色者十兩滑石七兩研碎芒硝三兩桑白皮二兩

棗 三十枚

黃芩 五兩

杏仁 二兩研

右七味切以酒一斗二升煮取二升盡服之當下

又療十年痔如鼠乳膿出便作血劇白斂散方

赤小豆 四分

黃芪 三分

芍藥 二分

白斂 二分

黃芩 三分

桂心 三分

附子 炮

牡蠣 各二分熬

右八味擣篩為散酒若泔汁服方寸七日三服 並出第三

十卷中

五痔脫肛方二首

千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方

槐白皮 二兩

薰草

辛夷

甘草

白芷

各半兩

野葛

六銖

巴豆

七枚去皮

漆子

六枚

桃仁

十枚去皮

猪脂

半

右十味切以猪脂煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔

中日四五過蟲死差止痒痛大佳

出第二十四卷中

必效五痔脫肛方

以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔

板覆坑坐上蟲盡出

張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方

以蒲黃水服方寸七日三差

備急文仲崔氏千金古今錄皆同

又方

礬石熬

附子

炮各一兩

右二味搗篩蜜丸如梧子服二丸酒下日三稍增百

日永差不發

備急文仲崔氏千金同

又方

以鯉魚作鱠薑薑食之任性多少良

崔氏用鱈魚

又方

常食鯽魚羹及蒸隨意任之

備急文仲同並出第
三卷中

文仲療腸痔方

以槐木上耳擣末飲服方寸七日三

肘後古今錄
千金同

又方

白薔薇根

枸杞根

各二分
暴乾

右二味擣篩為末服方寸七日三五六日當更小腫

是中病

崔氏備急肘後同

又方

生地黄

一斤切 酒 二斗

右二味以酒漬地黄三日隨意飲多少即差

肘後備急同

又方

取枳根皮末飲服方寸七日三亦可煮汁常飲

肘後

備急崔氏皆同

備急療腸痔方

以穀子燒末傳之深者導之

文仲崔氏同

又方

以槐白皮一擔剉水煮令濃脫衣入中坐當如欲大便狀冷更易不過三蟲出

又方

擣槐白皮作屑粉以導之

崔氏文仲千金必効同

又方

以繁萋燒灰礬石熬和為粉粉之

崔氏文仲范汪同出第六卷中

刪繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有

核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而瘡生猪懸蹄青龍

五生膏方

猪懸蹄甲

三枚 炙

生梧桐白皮

四兩

生龍膽

五分

生桑白皮

五分

蛇蛻皮

五分

雄黃

五分

生青竹皮

六分

生栢皮

七分

露蜂房

炙

蜀椒

汗各三分

蝟皮

附子

炮各四分

杏仁

去皮二十枚

右十三味細切綿裹以苦酒二升浸一宿於火上炙
燥擣篩以猪脂三升和微火煎之如薄糖傅并酒服

如棗核

出第七卷中

崔氏療大便後出血此腸痔之疾宜服薤白湯方

薤白

切七合

羊腎脂

一升

右二味緩火煎令薤白黃去滓頓盡未差更服即止
得膿血與糞相和即差

又方

白礬

燒汁 盡

附子

炮去皮

乾姜

各一兩

右三味搗篩蜜和飲服二丸至三丸日二服

並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方

以蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和婆羅粥著少鹽食之大效一無所忌

又黃芪丸方

黃芪

枳實

各三兩

烏蛇

炙

當歸

赤石脂

各二兩

蝟皮

二兩炙

右六味搗篩蜜丸空腹酒下如梧子二十九二日服

更不加減

並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方

黃連

二兩

麴

一兩

右二味搗篩薄蜜溲先食以飲服五分七日三不知
增至方寸匕

集驗療痔蝟皮丸方

槐子 三兩

附子 炮二兩

當歸 二兩

連翹 二兩

乾地黄 五兩

乾薑 二兩

礬石 二兩燒令汁盡

續斷

黃芪 各一兩

蝟皮 一具細切熬令焦

右十味擣篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三

十九丸亦可主瘻常用大驗 肘後備急文仲刪繁千金古今錄驗同

又方

以生槐皮十兩削去黑皮熟擣丸如彈子綿裹內

下部中大效 備急千金同

又方

以槐赤雞一斤為散飲服方寸匕

千金云槐糯也

千金療痔神方

以七月七日多採槐子熟擣涎取汁重綿絞內銅

器中盛庭中高門上暴之二十日以上煎成取如

鼠糞大納穀道中日三亦主瘻及百種瘡

救急崔氏古今

錄驗同

又方

鯉魚腸 三具以火炙令香

右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數

易之盡數枚當差一方云坐上蟲出 古今錄驗同

又方

虎頭骨 炙 犀角

右二味各為末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上

即差 救急深師同並出第二十四卷中

崔氏療痔方

雀林草 一大握粗切

右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑無不差者

又方

取駱駝頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之 並出第四卷中

必效熨痔法痔頭出或疼痛不可堪恐方

取枳實煨灰中煨之及熱熨病上盡七枚立定發

即熨之永除也

又方

以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方

以野猪肉炙食十頓即差三方云奇效

又方

取五月五日蒼耳子陰乾搗末水服三方寸七日

三差乃止

又方

以二十年久鍼線袋口燒作灰分和水服

又痔正發疼痛方

以葱和鬚濃者湯置盆中坐浸之須臾即當痛止

又方

以狸肉作羹食之或作脯食之不過三頓無不差

又方

以肥大棗一顆剝去赤皮取水銀掌中以唾研令極熟塗棗瓢上內下部中差

又方

以篇蓄根葉搗汁服一升一兩服差

又方

薑屑 二兩

右一味以水三大合煮之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

倚死竹色黑者取之折斷燒為灰篩和薄飲服之

方寸七忌牛肉餘無所忌

出第三卷中

古今錄驗療痔黃芪丸方

是直殿中省散騎常侍郎甄立言處

黃芪

青箱子

漏蘆

鼈甲炙

狼牙

各五分

黃蘗

四分

犀角屑

八分

班猫

去足翅熬

蝟皮

四分

白礬

十分燒去汁

芫青

去足翅熬

地膽

去足翅熬

蜈蚣

各十枚炙

猪懸蹄甲

七枚炙

右十四味搗篩為散蜜和丸如梧子大空腹以飲服
二丸日二增之以知為度忌一切油膩葷菜

又方

掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以魚簿
著口上取葇荳子一合內坑中燒煙出痔人坐上
以被擁當汗出密室內作之以煙盡更著一合葇
荳子熏避風如發汗法則差

又療諸痔及下血不止轉虛羸者服之無不效方

黃芪

枳實

各二大兩半
細剉熬令黃

黃礬石

一大兩炭火燒經一伏時仍數翻
轉令勻著火冷訖細羅去沙淨

右三味先搗黃芪枳實篩訖然後和礬石更搗勻蜜

和丸空腹以酒下二十九加至三十九日再服忌菘

麩猪肉蒜魚勞事惟久服一年半愈良驗

又療痔方

鯉魚腸

可半升

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可濶二尺以來

厚二寸當中鑿孔深一寸半圓如醬盞口大布魚腸於其內以好麝香碎末滲魚腸取厚毡二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是虫出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐虫入於腸中虫可長一二寸許細如網絲班作五色每出不過十餘枚不問度數虫盡則止許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下部有孔每出血從孔中出內痔每便即有血下

血甚者下血擊地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥方

生槐子 一斗候未堅硬時採

右一味搗令碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾搗篩為散和槐子煎作丸以飲服十九日再加至三十九丸如桐子大兼以煎撚作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可搗苦參末代地膽

依前生槐子煎不覺可宜合後黃芪十味散服之方

黃芪 五兩

苦參

玄參 各六兩

附子 炮

大黃 各三兩

乾薑 二兩

蝟皮 炙二兩

黃連 四兩

槐子 六合

猪懸蹄甲 一具 炙

右藥擣篩為散空腹以飲服方寸七日再服之漸漸

加至二七忌猪肉冷水 出下卷中

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉 水銀

右二味以棗膏調勻綿裹夜卧内穀中導之效

崔氏同

又方

以菟絲子熬令黃黑末以雞子黃和塗之

集驗文仲備急

范汪崔氏等同

又方

以杏仁熬令黑搗取膏塗之

集驗備急文仲崔氏同

又方

以蝟皮燒灰傅之又獺肝燒搗散服之

崔氏備急文仲同

又方

以溺温令熱内少礬石以洗之良

崔氏同並出第二卷中

文仲療痔下部如蟲齧方

擣桃葉一斛蒸之令熱内小口器中以布蓋上坐

之蟲死即差

肘後崔氏備急同一方有烏梅

又方

掘地作小坑燒令赤以酒沃中擣吳茱萸三升内
中及熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃下

不過三度即差

肘後崔氏備急同

又方

以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復內
令酒盡止搗末以酒服方寸七日三

崔氏備急同

又方

以猪椒子一升酒一升漬經五日稍稍飲一日令

盡佳

崔氏同出第六卷中

大便下血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合而少血色此是內傷風冷積年多變作痔方

大黃 五分

甘遂 三分

黃芩 二分

乾姜

附子

各四分炮

桃仁

三七枚去皮尖

葱白

七莖

右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌猪肉等

又方

煮桃皮李皮篇蓄苦參取汁漬之大佳

出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方

燒稻藁灰淋汁煎熟漬之三五度佳

崔氏肘後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法

以繩圍病者項令兩頭相拄展繩從大椎正中量之垂繩一頭當脊正下以墨點訖又量病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便

中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使相當所
三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法

令疾者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至
尾株骨尖頭訖再折繩更從尾株尖頭向上量當
繩頭正下即點之高號州初灸至一百壯得差後
三年復發又灸之便斷兼療腰脚

並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻疽瘡方

光明砂 別研 麝香當門子 別研

蛇皮 五月五日者熬

右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡上傳少蜜以散傳上差止

小品療穀道中痒痛痔瘡槐皮膏方

槐皮 五兩

甘草

白芷 各二兩

陳豉

桃仁 各二十粒去皮 赤小豆 二合

右七味剉以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以塗

之日三度

集驗同

刪繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在大孔

傍時時膿出名壯痔鼈甲丸方

鼈甲 炙

乾地黄

黃連

連翹

各七分

括樓

黃芪

乾姜

各六分

蟻螯

五枚炙

猬皮 炙

續斷

各五分

附子

炮

槐子

礬石

燒汁盡各四分

右十三味搗節以蜜丸如梧桐大飲下二十九漸加

至三十九日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所為酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房 三兩 炙

生槐白皮 十兩 練實

桃仁 各五枚

熬

白芷 二兩

赤小豆 一合 碎 猪膏 一升 半

右七味咬咀綿裹以苦酒一升漬一宿下膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大綿裹內肛門中又酒服一方

寸七 出第三卷中

必効療痔及諸蟲方

石榴東引根

深者取一握

右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片
炙兩畔令熟搥碎擘以水三升煮取一升適寒溫空
腹頓服之其患痔盛發者服即定諸蟲無問赤白並

出差

出第三卷中

脫肛方三方

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所為

肛門為大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣嘔而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也

出第十七卷中

小品療脫肛熏方

以女萎一升以器中燒坐上熏肛門即愈

范汪集
驗千金

同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便道肺大腸合也號為通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若藏傷熱即肛閉塞大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛

寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之不虛不實依經調之

療肛門主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兌通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得丸長六七寸許兌肛門中到身中向上入頭向下停少時

兌煇斯須即通泄

千金同出第三卷中

千金療肛出方

磁石

研四兩

桂心 一尺

蝟皮

炙一枚

右三味篩為散服方寸七一日服十服即縮勿舉重

須斷房室周年乃佳

出第二十五卷中

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出猪肝散

方

猪肝

一片炙令黃燥

黃連

阿膠

炙

芎藭

各二兩

烏梅肉

五兩熬

艾葉

一兩熬

右六味擣篩平日空腹溫服方寸七日再若不能酒

白飯服亦得

千金同出第三卷中

千金肛門凸出壁土散方

故屋東壁土

一升碎研

皂莢三挺

長者

右擣土為散裹敷肛門其頭出處取皂莢炙煖更遮

熨之取入則止

又麻履底按入方

麻履底

鼈頭

一枚

右二味燒龜頭為散敷肛門凸出頭炙履底以按熨
令入永不出矣 並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方

灸頂上迴髮中百壯

又方

以豆醬清合酒塗之 文仲備急同

又方

燒虎骨末水服方寸七日三即差

范汪療卒大便脫肛方

以緣桑枝螺取燒末猪脂和敷之立縮亦可末以

粉之

備急張文仲同出第三卷中

千金療卒大便脫肛方

以猪膏和蒲黃敷之指推內之但以粉粉之亦佳

張文仲備急同

又方

灸鳩尾骨上七壯

備急文仲集驗同出第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方

擣生括樓取汁溫服之以猪肉汁洗手隨抑按自

得入効

范汪小品張文仲備急千金同

備急若腸隨肛出方

熬石灰令熟布裹熨之隨按令入冷即易

小品文仲備急

同出第八卷中

脫肛歷年不愈方三百

集驗療脫肛歷年不愈方

以上鐵三斤以水一斗煮取五升以洗之日再

范汪

千金備急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方

以死鼈頭一枚燒令煙盡作屑以敷肛門上手按

之令入兼灸橫關骨百壯

又方

以鐵精粉上按令入即愈 並出第二十五卷中

疝氣及癩方六首

廣濟療疝氣核腫疼方

黃芪

桃仁 去尖皮熬

山茱萸

五加皮

檳榔仁 各八分 牛膝 六分

茯苓 六分

蓰蓉 八分

五味子 十八分 人參

續斷 各六分

桂心 八分

遠志 去心 石南 各五分

海藻 洗八分

玄參 十分

枳實 炙

龍骨 八分

蒺藜子 二十分熬

右十九味搗篩蜜丸如桐子大酒服三十九日二漸
加至四十九

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰丸方

狐陰一枚

木香

蒺藜子

膾肭臍

昆布

各六分

牛膝

菟絲子

各八分酒漬

桃仁

去尖皮熬

石斛

各十分

檳榔仁

十枚

右十味搗篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十九

至三十九日再服忌熱麪蕎麥猪魚粘食等物

並出第六

卷中

集驗療癩方

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熟以故布乾掩腫處取柳枝更互拄之如此取差止

文仲備急千金同

千金療癩方

牡丹 二兩

海藻 二兩
洗

狐陰 一具
灸

地膚子 二兩

茯苓 二兩

五味子 二兩

芍藥 二兩

橘皮 二兩

蜘蛛 五十個熬

防葵 二兩

細辛 二兩

蒺藜子 二兩

桂心 二兩

澤瀉 二兩

桃仁 五十枚去皮尖熬

右十五味下篩蜜和服十九如梧子大稍加至二十

丸忌胡荽生葱生菜酢物 出第二十五卷中

備急療癩方

以桃 擣敷之亦療婦人陰腫乾即易

集驗同出五卷中

古今錄驗療癩蒺藜丸方

蒺藜子

乾地黄 各一分

鹿茸 炙十分

白歛 八分

磁石研十分

礬石煉十分

鐵精

桂心

續斷各五分

巴戟天

芍藥

玄參

通草

升麻

牛膝

寄生各八分

澤瀉七分

射干八分

蓰蓉十分

海藻八分如髮

者

右二十味擣篩以蜜和為丸如梧子大飲下十九日

二漸增至二三十丸甄立言處出第四十一卷中

卒病癩方五首

肘後療超躍舉重卒得陰癩方

白朮 五分

地膚子 一分

桂心 一分

右三味搗末以飲服一刀圭日三

古今錄驗同

又方

狐陰 一具

海藻

牡丹皮

各三分 桂心 二分

右四味搗篩為散蜜和為丸如梧子大小兒服五丸

大人增之

集驗灸卒癩法

以蒲橫度口折之一倍增之以布著小腹大橫理
令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二
處隨年壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼喚

千金

范汪同

又方

牽陰頭正上向灸莖頭所極又牽下向穀道又灸
所極又牽向左右髀直下行灸所極皆使正直勿
偏四處炷隨年壯佳

千金范汪同

又法

灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也

千金范注

同並出第九卷中

癩卵偏大方三首

千金療癩疔卵偏氣上方

牡丹

防風 各一方

右二味擣為散温酒服方寸七日二忌胡荽

出第二十五卷

中

張文仲小品牡丹散療癩偏大氣脹方

牡丹

桂心

防風

鐵精

豉熬等分

右五味搗篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日

愈嬰兒以乳汁和大豆與之大効忌如前

肘後同出第七卷中

古今錄驗牡丹五等散療癩疔陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方

牡丹皮

防風

黃蘗炙

桂心各一分

桃仁

二分去皮尖研

右五味搗為散以酒服一升圭二十日愈少小癩疔

最良小兒以乳汁和如一大豆與之忌如前

出第四十一卷

中

灸諸癩法一十四首

千金論曰男癩有腸癩卯癩氣癩水癩四種腸癩卯癩

難差氣癩水癩鍼灸易差

又卯偏大上入腹方

灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

又男陰卵偏大癩法

灸肩井解臂接處隨年壯男癩灸小指端七壯病
在左者可火左在右者灸右良効

又法

灸關元百壯

又法

灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

又法

灸泉陰百壯三報之在橫骨邊三寸

又癩病陰卒腫者法

令並足合兩拇指爪相並以一艾丸灸兩爪端方
角處一九令頓上兩爪角各令半丸上爪上七壯
又兩丸縮入腹法

灸三陰交隨年壯神効

又男陰卵大癩病法

灸足太陽五十壯三報之

又法

灸足太陰五十壯又在內踝上一穴

又法

灸大拇指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙
灸之

又法

灸橫骨兩邊二十壯夾莖是也

又法

灸足大指理中十壯隨邊腫灸之

灸小兒癩法

先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故
灸汝三七二十一灸訖便牽小兒令碓頭下向著
囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽簪頭
大耳

又法

凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸
軸木上隨年壯即愈

並出第二十五卷中

陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故

致腫也

出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方

以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生用切水一斗
煮取二升以洗之忌海藻松菜

又方

取苜菜根搗薄之

范汪千金同

又方

取蔓菁根搗薄之

范汪同

又方

搗馬鞭草薄之

范汪同並出第九卷中

文仲療陰腫方

取桃仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差

千金備急同出第七卷中

古今錄驗療腫大如斗方

取雞翅燒灰飲服其毛一孔生兩毛者佳腫在左

取左翅在右取右翅雙腫取兩邊翅

千金治小兒
卵腫出第四

十一卷中

陰疝腫縮方一首

病源疝者氣痛也衆筋會於陰器邪客於厥陰少陽之
經與冷氣相搏則陰痛而孿縮也

出第四卷中

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疝方

狼毒

灸四兩

防葵

一兩

附子

二兩炮

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三九日三夜二今古

錄驗范汪同出第七卷中

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方

灸足大指第二節下橫理文正中央五壯姚云足

大指本三炷

亦治小兒陰疝發時腫痛隨痛左右灸之出第七卷中

備急療男子陰卒腫痛方

雞翮

燒六枚

蛇床

等分

右二味為末以飲服少許隨卵左右取雞羽

集驗同
姚方無

蛇床

又若有息肉突出方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗一日夜三四

度差

肘後同出第五卷中

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶
不得眠睡方

取生椒擇之令淨以布綿裹著丸囊令厚半寸須
臾熱氣大通日再易之取消為効乃止

又方

煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方

醋和麵炙令熱熨之

又方

以醋和麪塗之

又方

釜月下土以雞子白和敷之効

肘後同並出第二十五卷中

陰下痒濕方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘之則搔痒也其湯鍼灸石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云卧令兩手布膝頭取踵置尻下以

口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裏痛

膝冷不隨 出第四卷中

文仲療陰痒生瘡方

嚼胡麻塗之驗 肘後千金同

葛氏療陰囊下濕痒皮剥方

烏梅 十四枚 錢 四十文 鹽 三指撮

右三味以苦酒一升於銅器中浸九日洗之効 肘後同

又方

煮槐皮苦參黃蘗及香薷汁洗之並良

肘後同出
第七卷中

救急療陰下濕痒成瘡方

猪蹄

兩脚

槐白皮

切一升

右二味斟酌以水煮洗瘡一日五六遍永差

又方

煮桃皮和黍米汁洗之

並出第五卷中

古今錄驗療陰下痒濕湯洗方

甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度

便愈

又療陰下濕痒生瘡方

吳茱萸一升水三升煮取三五沸去滓以洗瘡諸

瘡亦治之

出第四十一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損為風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故令陰痛但冷者惟痛挾熱者則腫其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引

法云兩足指向下拄席兩涌泉相拓坐兩足跟頭兩膝
頭外叉手互前向下盡勢七通去勞損陰膝冷
出第四卷中
集驗療卒陰痛如刺汗如雨出方

小蒜 一斤
韭根 一斤一方無
楊柳根 一斤

右三味合燒以酒灌之及熱氣熏之即愈
千金同出第九卷中

千金療陰腫痛方

灸大敦三壯

又方

車前子末酒服之佳

出第二十五卷中

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪客湊理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡

出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方

地榆

黃蘗

各八兩

右二味切以水一斗煮取六升去滓適寒溫洗瘡日

再只以黃蘗湯洗亦効

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似
疔瘡作白方

用銀釵以綿裹用臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙
瘡上令熱取乾槐枝蕪塗之以麝香黃礬青礬末
敷之小便後即敷之不過三兩度差但用疔瘡方

中藥敷之即差

出第二十五卷中

葛氏療男子陰瘡方

爛煮黃蘗洗之又用白蜜塗之

又方

黃連黃蘗各等分末之先煮肥猪肉湯洗之然後
以藥粉之

又方

以蜜煎甘草末塗之大良比見有人患塗頭腫坎
下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之及
依陶方即差神驗

出第七卷中

必効療陰生瘡膿出作白方

高昌白礬

一兩

右一味搗細研之鍊猪脂一合於磁器中和攪作膏
取槐白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏敷上及以
楸葉貼上不過三兩度永差

古今錄驗療陰瘡方

黃蘗

黃連

各三分

胡粉

一合

右三味搗為末粉上日三婦人綿裹棗核大內之

出第

四十一卷中

陰邊粟瘡方五首

必効療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒方

以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以
水二大升煮取一升洗之日三五遍適寒温用若
涉遠恐衝風即以米粉和塗之神効

又療陰瘡有二種一者作白膿出名曰陰蝕瘡二者但
赤作瘡名為熱瘡若是熱瘡用此方

取黃蘗黃芩各一兩切作湯洗之用黃蘗黃連末
粉之云神良

又方

以黃連和胡粉末敷之必效

又方

紫芽茶末 一分

荷葉 一片燒灰

右二味為末以鹽漿水洗訖敷之三五度即愈

又方

取停水處乾卷地皮末敷之神效

是長安郭承恩用之得效出第

四卷中

著硃砂方四首

救急邂逅著硃砂損陰方

猪蹄 一具 劈破

浮萍草 三兩

右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁內陰瓶中漬之冷即出拭乾便敷後藥粉之

又粉法

薔薇根皮

黃蘗

各三分

朴硝

蛇床子

各一

分

甘草

二分炙

右五味擣為散用前法浸洗後以粉瘡上亦不甚

痛慎風

出第八卷中

必効主著礪砂方

取雞子一枚煮熟剝取肉更用生雞子二個傾取

白和熟研令細以綿裹之立定

李饒州云奇効

又方

甘草

黃蘗

白礬

燒令汁盡

右二味為末敷之

出第四卷中

九蟲方一首

病源夫九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶形六曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細微形如菜蟲伏蟲羣虫之主也蛔虫貫心則殺人白蟲相生子孫轉大長至四五尺

亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃虫令人嘔

吐胃逆喜噦弱虫又名隔虫令人多唾赤蟲令人腸鳴

蛻蟲居胴腸多則為痔劇則為癩因人瘡處以生諸癰

疽癬癭疔疥齧蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必

盡多或偏有或偏無者此諸蟲依腸胃之間若腑藏氣

實則不為害若虛則能侵蝕隨其蟲之動而變成諸患

也 集驗同出第十八卷中

集驗貫衆丸主療九蟲動作諸病方

貫衆熬

石蠶熬五分

狼牙四分

藿蘆二分

蜀漆炙六分

殭蠶熬三分

雷丸六分

蕪荑四分

厚樸三分

檳榔六分

右十味搗篩蜜丸空心煖漿水服三十九日三不知

稍稍加之白蟲用榧子湯服

備急文仲古今錄驗范汪同出第九卷中

五藏蟲方七首

刪繁療脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔而胃

中駭駭一作嘔而不吐出前胡湯方

前胡 三兩

白朮 三兩

赤茯苓 三兩

枳實 炙三兩

細辛 三兩

旋復花 三兩

常山 三兩

松蘿 三兩

龍膽 三兩

竹葉 切一升

杏仁 三兩去尖皮

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分三服若腹

中熱滿下菰硝三兩黃芩三兩苦參二兩加水二升

依方煎忌如常

又療脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔菜萹根下

蟲湯方

茱萸東引根

大者一尺切

大麻子 八升 橘皮

二兩切

右三味切搗麻子爛並和煎服或下黃汁凡合藥禁

聲勿語道作藥蟲當聞便不下切須忌之甚驗以水

煎服臨時量之效

又療肺勞熱損生肺蟲形如蠶在肺為病令人欬逆氣

喘或謂憂恚氣隔寒熱皆從勞之所生名曰膏鍼灸不

著麥門冬五隔下氣丸方

麥門冬

十兩去心

蜀椒

四分汁

遠志

附子

六分炮各

乾薑 五分

甘草 十分

人參 七分

細心 六分

桂心 五分

百部根

白朮

黃芪 各五分

杏仁 四十枚

檳榔 五分

右十四味擣篩蜜丸如彈子許含一丸稍稍嚥汁忌

如常

千金療腎熱四肢腫急蟻蟲如菜中蟲生腎中為病方

貫衆 大者三枚

乾漆 二兩

茱萸 六分一云五十枚

杏仁 四十枚

蕪荑

胡粉

槐白皮 各四

分

右七味搗散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生蟲在肺為病方

東行桑根白皮升切一

東行茱萸根兩切五

狼牙三兩

右三味切以酒七升煮取一升半平旦服盡

又療肝勞生長蟲在肝為病令人恐畏不安眼中赤方

雞子五枚去黃

東行茱萸根升切三

蠟三兩

乾漆 四兩 熬

粳米粉 半升

右五味搗茱萸根漆為末和藥銅器中打雞子調火
鍊可丸如小豆宿勿食旦以飲服一百二十九小兒
五十九丸蟲即爛出差

又療心勞熱傷心有長蟲名蛔蟲長一尺貫心為病方

雷丸 熬

橘皮

桃仁 各五分

狼牙 六分

貫衆 三枚

蕪荑

青箱子

乾漆 各四分 熬

亂髮 如雞子 燒

殭蠶 二十枚 熬

右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之
並出第十八卷中

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方

雞子白三枚

乾漆

四兩熬蠟三兩一本無

粳米粉

半斤

右四味內銅器中於微火上煎攪令調內粉令凝可
丸置土上溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿
食以飲下小豆許大一百二十九小兒五十九効驗

又方

取棟實以淳苦酒中漬再宿以綿裹內下部中令入三寸許一日易之

千金范汪同並出第九卷中

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑藏虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作種聚去來上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水賁傷心者則死診其脈腹中痛其脈法當沉弱

弦今反洪而大則蛔虫也

出第十八卷中

廣濟療蛔虫方

酸石榴根

東引入土五寸者切二升

檳榔

十枚碎

右二味以水七升煮取二升半絞去滓著少米煮稀

粥平旦空肚食之少間虫便死快利効無忌

出第四卷中

肘後療蛔虫或攻心痛如刺口中吐清水方

取龍膽根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平

旦服一二升不過再服下蛔虫也

又方

取有子棟木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食旦取肥香脯一片先喫令虫聞香舉頭稍從一口為度始少進漸加服一七服至半升便

下蛔虫

千金文仲同

又方

以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之虫悉出矣

文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔虫攻心腹痛方

取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服

之虫死盡出

千金范注同出第九卷中

千金療蚘虫方

藿蘆下篩以餅臠和服方寸匕虫不覺出之亦主

蚘虫出

肘後云藿蘆一兩末以羊肉作臠和服出第十八卷中

崔氏療蚘虫方

取繅蠶蛹汁空腹飲之良若非繅絲時即須収蛹

暴乾患者搗篩取意斟酌多少和粥飲服之

又方

鶴蝨 三兩

右一味擣散以肥猪羊肉但得一色以葱豉為臙汁
每旦空腹服以臙汁和一方寸匕頓服稍多飲臙汁
佳若不能散服即以蜜和為丸如梧子一服十九還
以此臙汁下之假令明旦服今日暮即勿食明旦服
藥訖還至巳時為佳要服此丸散使盡已後三十日

勿雜食永差 出第五卷中

必効療蛔虫方

菘豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以
下然後取麻子汁半升和豆汁一升更煖令溫溫
正發即炙羊肉脯令熟先含嚥汁三五嚥即服之
須臾即吐出或利其虫已消如綿練帶三二百條
如未盡更服即永絕 郭參軍云頻試無不差者一
方服麻子汁效出第六卷中

寸白蟲方一十九首

病源寸白者九虫之一也長一寸而色白形小褊因腑
藏虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之
并食生魚所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發
動則損人精氣腰脚疼弱又云此虫生長一尺則殺人
出第十八卷中

廣濟療白虫如馬蘭葉大於下部出不盡以刀截斷者
令人漸漸羸瘦石榴湯方

醋石榴根

東引者
一大握

牽牛子

半兩
熬末

蕪荑

三兩

右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每服如人行五里更服盡快利虫亦盡死出忌生冷猪魚牛肉白酒葵笋等此方神驗

又方

狼牙

白歛 各四分 蕪荑 六分

右三味擣散空肚以大醋和如膏溫頓服之無所忌

千金同並出第四卷中

肘後療白虫方

淳漆 三合 猪血 三合

右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先吃肥香脯一片服如大豆許一百丸日中虫悉出

亦主虬虫 范汪同

又方

濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之虫盡出

文仲備急同

又方

熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之虫當下文仲備急同出

第二卷中

范汪療白虫橘皮丸方

橘皮四分 牙子 蕪荑各六分

右三味擣篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食日

再服

又方

狼牙五兩

右一味搗篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿
水下一合服盡差

又方

棟實破其上取皮中子搗合蜜丸如梧子宿不食
旦以醋漿水若米汁下三百丸蟲並死或以麋爛
皮亦可丸服八十九忌如常法

出第十九卷中

備急療白虫蕪莖散方

狼牙 三分炙
蕪莖 二分

右二味搗為末酒和服之先食脯後頓服盡立差

張文

仲同出第六卷中

救急療白虫方

石榴枝

東引者一握去瘡皮

檳榔七枚

右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚼鹿脯嚙汁即進之每月一二三日喫藥必差以虫頭向上月三以後服藥不効為其虫頭向下也今日欲服預前一日莫食其虫吃藥之後或利出或內消皆差

忌食生繪白酒諸生肉冷物一月餘

又方

取榧子一百枚去皮火然啖之能食盡佳不能者

但啖五十枚亦得經宿虫消自下無忌

崔氏同出第八卷中

崔氏療白虫諸方不差方

取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿一握兩頭出者摠留之又取乾脯肥者如手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煮取一升去滓分

三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後飲藥并令人以手按所患人腹令藥易宣都服了有頃當自便虫出服藥以月一至五日以前是虫頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑虫未盡更合一劑永愈

又方

東引茱萸根

一大握切

麻子

半大升

右二味先擣麻子極碎又盆中熟研以水一大升更

和研絞取濃汁以浸茱萸根一宿明旦煮兩三沸頓服如不頓服分再服至明旦欲服藥今日午後便不得食仍須先嚼一片肥乾脯噉汁然後服藥服一劑去虫不盡停一日更作服一劑永差後一月日勿食脂

膩魚肉必效

出第五卷中

千金療白虫方

取榧子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡虫消為水永差

又方

取茱萸北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦
去滓分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若指
以上大者皆不佳用之無力

范注同

又方

熬錫令速燥末平旦作羊肉臠以藥方寸匕內汁
中服之一方熬胡粉

又方

桑白皮切三升以水七升煮取二升宿不食明日
頓服之

又方

用石榴根如茱萸根法

又方

胡麻 一升
胡粉 一兩

右二味搗末明旦空腹以猪肉臠汁服盡即差
並出第十

八卷中

蛻蟲方六首

病源蛻蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因
腑藏虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癩癰疽疔
諸瘡蛻蟲此是人體虛弱極重者故蛻蟲因之動作無
所不為也 出十八卷中

范汪療蛻蟲芫花散方

芫花

狼牙

雷丸

桃仁

去皮尖

右四味搗散宿勿食平旦以飲服方寸匕當下蟲也

又巴豆白膏療蟪蟲方

巴豆

一枚燒令烟
斷去心皮

桃仁

四枚熬令黑去皮

右二味合搗作三丸大人清旦未食以漿服盡少小
服一丸若不下明旦更復作服 並出第十九卷中

千金療蟪蟲在胃中漸漸羸人方

淳酒

白蜜

好漆 各一升

右三味合銅器中微火上煎之令可丸丸如桃核大
一枚宿勿食空腹温酒下蟲不下再服之

肘後備急
集驗范汪

同出第十八卷中

備急葛氏療蛟蟲攻心如刺吐清汁方

擣生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令蟲聞香後飲

汁一升當下蛟蟲

備急文仲並同時後云療虵虫

陶氏療蟲方

取七月七日疾藜子陰乾燒作灰先食服方寸匕

一服三日止

范汪千金同

又方

以好鹽末二兩淳酒半升於銅器中煮令數沸宿
勿食清旦空肚頓服之

備急文仲千金范汪等同
並出第七卷中

三蟲方七首

病源三蟲者長蟲赤蟲蟣蟲為三蟲也猶是九蟲之數
也長蟲者虵蟲也長一尺動則吐清水出則心痛貫心
則死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蟣蟲細微形如菜蟲也
居胴腸之間多則為痔劇則為癩因人瘡處即生諸癰
疽癰瘻疔疥齧蟲無所不為此既是九蟲內之三者而

今別立名者當以其三種偏發動成病故為三蟲也其
湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引
法云以兩手著頭相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚
以兩手從外抱膝中疾低頭入兩膝間兩手交叉頭上
十二通愈三蟲又云叩齒二七過輒咽氣二七如是三
百通乃止為之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日
大病除三蟲伏尸皆去面體光澤

出第十八卷中

肘後療三蟲方

茱萸根

取東引指大者長一尺

括樓

四兩切

右二味細剉茱萸根以酒一升漬之一宿旦絞去滓宿勿食旦空腹先喫脯然後頓服之小兒分三服亦療寸白蟲

又方

擣桃葉絞取汁飲一升

千金集驗同一方云平旦飲三合

又方

真珠

一兩研

亂髮

如雞子大燒末

右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡

集驗范汪同
千金治燒蟲

又三蟲者謂長蟲赤蟲燒蟲也乃有九種而燒蟲及寸
白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則
殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未
已更宜速除之燒蟲多是小兒患之大人亦有其病令
人心痛清朝口吐汁煩燥則是也其餘各種種不利人
人胃中無不有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白歛丸方

白歛

狼牙

瞿蘆

桃花

貫衆

各三分

橘皮

二分

蕪荑

分

右七味搗篩蜜丸如小豆大宿勿食旦以漿水服一

劑日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥

下赤蟲如笋莖者一尺所有頭目百餘枚病愈又九

江謝丘病脅下有積大如杯小腹亦堅伏痛上下移

嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤

身有口尾二百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿

常欲食生菜服此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立
差妊身婦人不得服之

又療三蟲竹節丸方

燒竹節

雷丸

各三分

錫屑

二分

橘皮

一分半

右四味搗篩蜜丸如梧子大一服八九日三服

又療三蟲芎藭散方

芎藭

雷丸

桔梗

白芷

各四分

右四味搗散以蜜飲苦酒或米汁服方寸匕日三服

又可用蜜丸如梧子吞三十九丸當稍稍下不盡更服

一劑 出第十九卷中

備急療三蟲方

藿蘆 四兩
炙

乾漆 二兩
熬

吳茱萸 四兩

右三味為末依前法嚼脯以粥清服方寸七日一服

肘後范注同

雜療蟲方三首

廣濟療蛔蟲寸白蟲方

檳榔 分十二

當歸

鶴蝮

蕪荑 熬

橘皮 分各六

貫衆

雷丸 分各四

右七味搗散空腹煮大棗湯服方寸匕日二服漸加

至三七微利無忌 出第四卷中

千金療螭蟲蛔蟲及痔墮蟲食下部生瘡桃湯方

桃皮 一兩

槐子 三兩

艾葉 兩

大棗 三十枚

右四味以水三升煮取半升空腹頓服之 出第十八卷中


又療寸白蟲化為水泄出永除方

榧子

檳榔

蕪荑等分

右三味為散温酒服二錢七先燒牛肉脯喫後服藥也



外臺秘要方卷二十六

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

膳錄監生臣茅琳