


12

T 7970/0692 B

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961



重脩政和經史證類備用大觀本草十三卷

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

出夔州興德宮龍德宮竊修思所置藥提奉內醫編類聖濟至提舉大醫李臣曹孝崇

敕校勘

水部中品總九十二種

一十七種神農本草經白字

三種名醫別錄聖字

一十一種唐本先附注云唐附

一十四種今附皆醫家常用有效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮

葉耳五木耳附桑椹
桑根唐注葦菌續注

吳茱萸

根附葉并林
子根續注 檳榔

紫葳

其葳易唐附自玉
馬馬血石部今移

食茱萸

唐附皮
續注

枳實

厚朴

秦皮

秦椒

紫葳

凌霄花也並葉
寺附根續注 胡桐淚

棘刺花

實葉
針附

烏藥

沒藥

安悉香

新補草仙
人杖人杖附

毗梨勒

菴摩勒

衛矛

海桐皮

紫藤

合歡

五倍子

今附自草
部今移

伏牛花

今附自草
部今移

蜜蒙花

今附自草
部今移

天竺桂

桑花新補

掠子木

四十五種陳藏器餘

必栗香

欄木

黃龍眼

箭籜

都咸子

鑿孔中木

省藤

松楊木

竹葉

根汁實歷皮茹
笋附竹黃續注

梔子

山梔子
續注

龍腦香

唐附相思
子續注

枳殼

茗苦捺

山茱萸

胡藟子
續注

墨

白棘

龍眼

松蘿

鬱金香

大腹

虎杖

天竺黃

折傷木

每始王木

研藥

元慈勒

櫟木皮

揚盧耳

故甌蔽

侵本

象豆

地主

腐本

石刺木

柎木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴拓

温藤

鬼齒

鐵槌柄

古櫬板

慈母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳篦

倒掛藤

故木砧

占廁木

桃楸

梭頭

汝月杖


地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘其寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉

絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利

水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心麻子為之使

葉主除寒熱吐汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汗血病癥瘕積

聚陰肩陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳曰者止

久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥

蜀本麥作
浚詮苟切

五木耳名糯 音軟 **益氣不饑輕身強志** 生健為山谷六月

多雨時採即暴乾 多出土不可輕信桑耳斷殺方云木

糯又呼為桑土寄生此云五木耳而不顯 田者是何木

按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕

者人採以作道皆无復藥用 唐本注云 搯耳人常食槐

耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者並堪服桑椹味其

寒无毒单食主消渴葉味苦并寒有少毒水煎取濃汁

除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有少毒蒸淋取汁為

煎与冬灰等同滅誌 陳藏器本草云 桑葉汁主霍

亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡

又主小兒吻瘡細割大芥中煎取如赤糖去老風及宿

血葉極者名鷄桑最堪入用 利五藏 閉節通血氣又

服不飢多收暴乾搗末蜜和為丸每日服六十九變白

不老取黑椹一斤和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東頭

一百日及化為黑泥染白髮如漆又取二十枚和胡桃

脂研如泥核去白髮點孔中即生黑者 臣禹錫等謹按

藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷

絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一

名桑臣又名桑黃味并辛无毒能治女子崩中帶下月

閉血凝產後血疑男子疝癖兼療伏血下赤血 又云木

耳亦可单用平孟詵云寒无毒利五藏宣腸胃氣癰毒

桑葉灸煮飲止霍乱

又入散用下一切風氣

一如茶法 又云 桑皮煮汁可染褐色久不落子燒灰淋

汁入鍊五金家用 日華子 云桑白皮温調中下氣益五

棧消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍乱吐

瀉此即出桑根皮 又云 家桑東行根暖无毒研汁治小

兒天弔驚癇客忤及傳驚口瘡大驗 又云 家桑葉暖无

毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汁并撲損瘀血

並蒸後晉蛇蟲蜈蚣咬搗搗傳上春葉未開枝可作煎

酒服治一切風 又云 桑耳温微毒止腸風瀉血婦人心

腹痛 藥性論 云葶耳亦可单用平古槐桑樹上者良能

治風破血益刀其餘樹上多動風氣癰疾令人助下

急損經絡比目膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生葶

葶

葶

葶

葶

葶

葶

葶

葶

次柘木者良... 生者良野田中者恐有毒殺人... 又多發冷氣令腹中微上痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土全處上有之採

白皮亦可用物採得以銅刀刮去上翕皮取其裏白切

焙乾其皮中青近勿使刮去藥力都在其上惡鐵及磁

不可近之桑葉以夏秋再生者為上霜後採之煮湯淋

濕手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又

有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實性有白黑二

種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦各桑花狀似地錢

刀削取炒乾以止衄血等其柴燒灰淋汁醫家亦多

用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主

小兒口瘡傳之便愈又以塗金刀所傷燥痛須臾血止

更剥白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白

皮作線以縫金瘡勝出者更以熱鷄血塗之唐安金成

剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎煎水氣

脚氣肺氣癰腫煎風氣桑條三兩用大秤七兩一物相

切如豆以水一大升煎取三大合如散得多造準此增

加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每

服半大升亦无禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以

常服療備休風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈

肺氣嗽銷食利小便又眼輕身聰明耳目令人光澤兼

療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本

方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升

-5 190 35 900" data-label="Text">

一日服食元問食前後此服以依前方也桑葉可常服

乾搗末九散任服或在者名神仙葉即採取與前葉同用

之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服

治痢亦主金瘡及諸損傷上血方書稱桑之功最神在

人資用尤多尔雅云桑辨有甚与堪同梔郭璞云办半

也一半有甚半无名曰梔又云女桑隗桑俗間呼桑木

之小而條長者為女桑又山桑木樵弓弩檠

桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云凡使十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥

於槐砧上用銅刀剉子焙令乾勿使皮

上涎落涎是葉刀此蒸惡織并淋也

聖惠方治大風頭面髮脫落以桑柴灰執湯淋取汁

熟水入菉豆麵濯之取淨不過十

度良三日一淋頭一日一洗面

外臺秘要

治偏風及一切風桑枝判一人升用今年新

恐酸壞每日服一盞空心服又前服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 水淹浸煮五六沸去滓洗沐髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飯飽食之日三食之待

之及熱更互坐之則差

千金方 治口瘡白漫七取桑樹汁

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三

上以布帛急裹之若有腫者更作爪薙白佳

肘後方 治人少小鼻衄小芳輒出桑耳无多少熬令焦

師方 可

葛氏方 辛小便多消渴入地三尺取之桑根剥取白皮炙

水

又方 產後下血不止炙

又方 白露不絕鋸截桑根取屑

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹

又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病

上有三斗水煮取二斗澄取清微火煎

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身体悉腫取東引花桑

不得喫飲

又方 治金瘡止痛取桑

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米

一處搗為末每服米飲調下一兩錢

又方治青盲此一月當依而用之視物如鷹鵠有此効

又方正月八二月八三月六四月六五月五六月二十七
月七八月二十五九月十二十月二十十一月二十六
十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以前煎湯沃之
於甕器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯
熨令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本
法也

經驗後方治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨
洗過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服

又方墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水二升煎成
膏傅於損如便止已後亦无宿血終不發動

廣利方治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大
升三合煎取六大合去滓空心分温三服

又方治蛇咬瘡桑樹
白皮汁傅之差

又方治金瘡取新桑白皮燒灰
和馬糞塗瘡上數易之

勝金方治小兒温用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳
將線繫葉蒂上絹陰乾細末用水煎汁服之差

錢相公篋中方治蜈蚣及蜘蛛毒取
桑白皮汁傅之効

子母秘錄治落胎下血不止以桑木中蝎

又方小兒重舌桑白皮
煮汁塗乳飲之

又方小兒鵝口桑白皮
汁和胡粉傅之

楊氏產乳凡子不得與桑根
子食令兒心寒

宮氣方治小兒舌上生瘡如粥皮
桑白皮汁傅之三兩度差

仙方桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐
子大空心酒服四十九丸長服之良

史記桑樹根旁行出土者名為伏蛇治心痛一絕本
經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更可訪

毛詩泮水篇云食我
桑椹懷我好音

氓詩无食桑葚注甚桑實
也食過則醉傷其性


丹房鏡源桑灰
結示

衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑
之精英不在於此採摘微研以布憲去滓石罈

大見本

中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯瓷器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

淡竹



苦竹



篔簹竹



竹葉 篔簹竹葉 味苦平 大寒無毒 主欬逆上氣 痰喘急

惡瘍殺小蟲 除煩熱 風瘞喉痺 嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣 消毒 汁主風瘞

實通神明輕身益氣 生益州

淡竹葉味辛平 大寒主胃中痰熱 欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺 胃中大熱 止煩悶

皮茹微寒 主嘔吐 溫氣寒熱 吐血崩中 溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡 目痛 明目利九竅

竹筍 獨本作 味甘無毒 主消渴 利水道 益氣可久食

又一種薄殼者名其竹葉最勝 又有實中竹筍竹並以筍為佳 於藥无用 凡取竹瀝惟用淡若篔簹竹耳 竹實出蓋田江東乃有花而无實 而傾來斑上有實狀如小麥

堪可為飯今按陳藏器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣禹
錫等論散寒性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤又云青竹茹使味其能止肺痿唾血鼻衄治五痔日華子云淡竹并根味其冷無毒消痰治熱狂煩悶中風夫音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天芎莖葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡主消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同論云筍寒主逆氣除煩執動氣死冷癥不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍雖美然發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經云竹節間黃白者味其各竹黃木制石藥毒發執

圖經曰有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能別謹按竹譜筆字陰斤淡竹空而促節休圓而質勁皮白如霜大者宜刺胎細者可為笛苦竹有白有紫并竹似筍而茂即淡竹也然今之刺胎者多用桂竹作笛者有一種亦不名筍竹苦竹亦有二種一種出江西

及闔中本極麗大筍味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊筍微有苦味俗呼甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器久渴心煩

食療淡竹上茸竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡唾苦竹筍

主下熱壅苦竹根知到一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五歲熱毒氣苦筍不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣筍淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺秘要療凡脫折七骨齒齧腫者慎不可當風及多頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口

禁以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中央承取投之可活

千金方凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令內破鷄子三枚攪調更煮三沸飲之

又方 治齒斷間津液血出不止苦
竹筴四兩以醃浸一宿含之

又方 治齒間血出以竹葉濃煮
與鹽少許寒温得所含之

又方 齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令
一人含嚙其背上二过并取茗草濃煮汁適寒温
含漱

之差

又方 治時氣五六日心神煩燥不解用竹
歷半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹
葉湯五六升令灼已轉筋處

又方 傷寒五六日已上者作青竹歷
小煎分減數匕飲之厚覆取汁

又方 卒失聲上啞不出
濃煮苦竹葉服之

又方 小兒身中惡瘡煮
取竹汁日深洗

葛氏方 卒消渴小便多作
竹歷恣飲數日愈

孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒
苦竹葉和鷄子黃傳

梅師方 治產後身或強直口噤示而去青手
竹強反張飲竹歷一二升醒

又方 主妊娠恒若煩悶此名子煩竹歷湯茯苓三兩竹
歷一升水四升合竹歷煎取二升分三服不差重
作亦時上
服竹歷

又方 治目赤背痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳
苦竹歷五合黃連二分綿裹入竹歷肉浸一宿以
點目中數度
令執淚出

食醫心鏡 理心煩悶益氣力止渴苦筴熟煮任性食之
又苦竹筴主消渴利水道下氣理風熱脚氣
取蒸煮食之又筴竹筴主消渴風
挾益氣力癸氣脹蒸煮炒任食

簡要濟眾 頭瘡大筴竹葉燒為灰量瘡大
小用灰調生油傳入少賦粉佳

兵部手集 治癸背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角
之如綠豆大戩上然
出如不止遍匝要助

又方 治瘡慈竹筴籜
灰油和塗之妙

又方 治中風口噤服

又方 治湯火灼爛竹中

又方 蟲蛆未傳之良

又方 小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服見新

以田舍小兒任其白

然皆无此疾可甚之

又方 治小兒大人欬逆短氣胃中吸上欬出涕唾嗽出

廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹

姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一頭

傷寒類要 治交接勞服措腫腹中絞痛便欲死刮竹皮

子毋秘錄 治胎動取中

又方 安胎取竹

又方 治任娠八月九月若墜樹或牛馬驚傷得心痛青

又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

又方 小兒疳積上又以鷄子白傳之亦妙

又方 去滓服一合兼治小兒口噤體熱病

產書 治妊娠候有失墜忽推築箸疼痛刮青竹筴

產寶 治妊娠因夫所動困絕

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹

楊氏產乳 療瘡疥燒竹葉為末以鷄子白

又方 妊娠苦煩此子煩故也竹

又方 瀝不限多少細服之

又方 療胎動安胎方甜竹

姚和衆 小兒連夜後狂語竹瀝每一

李畋該聞集 云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山魘所

經報謝而妖崇崇弼盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若

除夕爆竹數十竿叟然其方爆竹至曉寂然安帖遂止

別說云 謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開

江浙人號為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞

鳳之所食也近有江南餘下人來言彼有竹實大如鷄

子竹葉層上包裏味其勝蜜食之令人心曠清涼生深

竹林茂盛蒙密處頗因得之但日久汁枯乾而味尚存

爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰 竹葉凡諸竹与笋性皆微寒故知葉其用一致

本經不言笋及苦取歷作油亦不必強擇也張

仲景竹葉湯用淡竹笋難化不益脾鄰家一小兒方二

歲偶失照管壯熱喘急不食多睡仰頭呻吟微嘔逆瞑

目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈勿心然

其切誤將有巴豆食藥作驚藥化五九如麻子大嚙之

良久大吐有物噎於喉中乳媪以指滴出之約長三寸

籠如小指乃三日前痛結暴者乾箭筍是夜諸證皆安

次日但以和氣藥調治遂安其難化也如此經日間子

知之者謂之工小兒不能問故為難治醫者當審慎也

臨江軍吳茱萸



越州吳茱萸



吳茱萸味辛温 大熱有小毒 主温中下氣止痛效逆寒

熱除濕血痺 逐風邪開腠理 去痰冷腹內絞痛諸冷實

不消中惡心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲 根白皮殺蟻蟲治喉痺效逆止洩注食不消

女子經產餘血療白癩 一名藜 生上谷川及寃句九月

九日採陰乾 藜實為之使惡丹參消食白聖畏此紫石英 云禮記名藜而俗中呼為藜音殺

子當是不識毅字似毅字仍以相傳其根南行東行者
為勝道家去三尸方亦用之唐本注云尔雅釋木云檄
檄醜抹陸氏草木疏云檄檄屬亦有檄名陶誤也巨
錫等謹按藥性論吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹
疾積冷心下結氣產心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉
腹痛不可勝忍者可愈療遍身痛痺冷食不消利大腸
攢氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸
白蟲博雅云祝檄檄越檄茱萸也祝音考孟詵云茱萸
主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮上齒痛又患風寒痺痛
者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖
洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮
四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼瘴氣
又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛莫一盞汁服
之止又骨在肉中不出者爵封之骨當爛出脚氣衝心
可和生薑汁飲之甚良聖手云建脾通關節治霍亂
瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下產後
餘血又云茱萸葉熟無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣
內外腎鈞痛鹽研罾神驗乾即又浸復暑霍亂脚轉筋
和文以醋湯拌罾也陳藏器云林子根濃煮浸痔有
驗燒末服亦主痔病又尔雅云櫟實林也其子房生為
林又赤瓜草一名羊林一名鼠查揀此乃
名同耳揀似小相而赤人食之生高原

圖經曰

吳茱萸生上谷川谷及宛句今處處有之江浙
蜀漢尤多木高大餘皮青綠色葉似椿而闊厚

紫色三月開花紅紫色七月八月結實以檄子嫩時微
黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九
月九日謂為上九茱萸到此日氣烈熱色赤亦可折其房
以揮頭云辟惡氣禦灾又續齊諧記曰汝南桓景嘗
長房孝長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家
各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消
景如言卒家登高山夕還見鷄犬半羊一時暴死長房
聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸
囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可為服食之
藥也張仲景治嘔而胃滿者茱萸湯主之吳茱萸一升
棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升
每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南
行枝主大小便卒閉格不通取之斷度如手第二指中
節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞
熱有白蟲在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大
者一尺大麻子八升桐皮二兩凡三物咬咀以酒一斗
浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升
取尽蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲
勿語道作藥
蟲便下驗

雷公云

凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽

脩事十兩用鹽二兩醋作末投東流水四斗中分作一

百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入

菜更待醋一盞乾每用十兩使醋一盞為度

食療

微溫主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多

聖惠方

治陰毒傷寒四肢逆冷官熨以菜更一升酒和勻暖即停

外臺秘要

集驗熨癰法菜更三升碎之以酒和煮熟布裏熨癰上冷更炒更番用之癰移走逐熨之

候消乃止也

又方

治癰疽發背及癰乳房菜更一升精之以苦酒和帖癰上

又方

陰下濕痒菜更一升水三升煮三沸去滓洗痒差

千金方

治寸白蟲菜更根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平日分再服此菜更皆用細根東北

陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方

治心腹內外痛菜更一升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼

產後虛羸盜汗時啻惡寒菜更一雞子大以酒三升浸半日煮服

又方

主大人小兒風癰菜更一升酒五升煮取一升帛染拭之

又方

主頭風沐頭菜更二升水五升煮取三升以絹帛拭髮根良

肘後方

治中風不能語歧菜更各一升水五升煮取二升稍上服之

又方

治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒冷赤酒沃中持菜更二升內中乘熱板開小孔

以下部塌上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方

赤痢臍下痛菜更一升黑豆湯吞之下

經驗方

治脾元氣發歇痛不可忍者菜更一兩桃仁一兩和炒令菜更焦黑後去菜更取桃人去皮尖

研細葱白三莖煨熟以酒浸温分三服

大見本草

卷之三

一

一

經驗後方

補水氣藥赤茱萸二兩末醋者爛細研為膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心服

兵部手集

治醋心每醋氣上攻如酸醋茱萸一合水二盞煎七分頓服發濃亦須強服近有人心如

整破服此方後二十年不發

又方治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

又方小兒火灼瘡一名廩漿瘡一各火爛瘡用酒煎茱萸更拭上

楊氏產乳以酒三升煮三沸分三服


衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與注及注中藥法皆不言亦漏落也此

物下氣最速腸虛人報之愈甚

廣州檳榔



檳榔



檳榔味辛溫無毒主消殺逐水除痰癖殺三蟲伏尸療

寸白生南海

此有三四種出交州形小而味

名猪檳榔作藥皆用之又小者南人名茱子俗人呼為

合入七來者皆先灰汁煮熟仍火熏使乾始堪停久其

中仁主腹脹生痔未服利水殺道傳瘡生肌肉止痛燒

為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙臣馬錫等謹按

藥性論云白檳榔若味耳大寒能主宣利五藏六腑雍

滯破腎滿氣下水腫治心痛風血積聚廣志云木實白

彼方珍之以為口實陳藏器云茱子小檳榔也生長火

乾中無人者功劣於檳榔顧徵廣州記云檳榔形小而

刺若棘針重疊其下一房數百實如鷄子狀皆有皮殼

圖經曰

檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃榔而

木葉大如柘頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有

肉蒲殼中色白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而其美嶺南人嗽之以當果實其俗云南方地温不食此無以祛瘴疠其春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙重乾始堪傳久此有三四種有小而味甘者名山栴柳有大而味澁核亦大者名猪栴柳最小者名蒟子其功用不說有別又云尖長而無紫文者名栴柳而矮者名栴柳力小御力大今醫家不復細分但取作鷄心狀存坐正穩心不虛破之作錦文者為佳其大腹所出與栴柳相似但葉根幹小異并枝莖之謂之大腹栴柳或云栴柳難得真者今賈人貨者多大腹也

海藥 謹按廣志云生東海諸回樹莖葉根幹與大腹云向陽曰栴柳向陰曰大腹味澁温無毒主賈狹諸氣

五隔氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛屎一盞磨

一枚空心煖服治脚氣壅毒水腫浮氣秦醫云栴柳

二枚一生一熟栴柳酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療 多食發熱熱南人生食調中名栴

雷公云 凡使好取作坐穩心堅文如流水辟破肉文如

浪別栴與柳頭圓身形矮毗者是柳身形尖紫文為栴

是栴換力小柳力大欲使先以刀刮去底細切勿經火

使無力效若熟使不如不用

聖惠方 治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傳之妙

又方 治胎動腰痛捨心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢

外臺秘要 若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者栴柳仁

為末以栴柳殼汁或茶飲或豉汁中調服方

甚利

經驗方 治金瘡白栴柳黃連少許為末傳之即差

梅師方 治醋心癩柳四兩橘皮二兩細搗為散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌 治嘔吐以白栴柳一顆煨橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方 治腰重痛用栴柳為末酒下一錢

又方 治木藏器以鷄心栴柳小便濃磨半個服或用熱酒調一錢匕効

簡要濟衆 治諸蟲在臧腑久不差 換柳半兩 炮持為末 每服一錢 至二錢 葱蜜煎湯調下 空心服

又方 治脚氣衝心 白換柳一個 雞心大者為末 用童子小便生薑汁温酒共半盞 調只作一服 無時服

廣利方 治脚氣衝心 致悶亂不識人 白換柳十二分為末 分二服 空心暖小便 五大合 調服 日再服

御藥院 治痰涎 換柳為末 白湯点一錢

齊民要術 白蟲消穀 麥飲

衍義曰 換柳四書所說甚詳 今人又取尖長者入藥 言其快銳 速効 屢嘗試之 果如其說

臨江軍子



建州子



江陵府子



梔子味苦寒 大寒無毒 主五內邪氣 胃中熱 氣面赤 酒

炮鼓鼻白頰赤頰瘡 瘰癧目熱赤痛 腎心大小腸大熱

心中煩悶 胃中熱氣 一名木丹 一名越桃 生南陽川谷

九月採實 暴乾 小異以上稜者為良 徑霏乃取之 今皆

入藥 用於藥 甚稀 王支即羊躑躅也 臣禹錫等謹按藥

性論云 山梔子殺糜虫 毒去熱毒 風利五淋 主中惡通

除熱 煩消渴 口乾 目赤 痛病 圖經曰 梔子生南陽川谷 今南方及西蜀州郡皆有之 木高七八尺 葉似木子而厚硬 又似檉蒲子 二三

月生白花七比皆六出甚芬香俗說即西域詹訶也夏秋
结实如詞子狀生青孰黃中仁深紅九月採實暴乾南
方人競種以售利貨殖傳云梔苗千石亦比千乘之家
言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所
謂越挑也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大
而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲
景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵陳香豉
甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠屎
等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢
挾毒挑下者葛洪方以十四枚去皮搗蜜丸服如梧桐
子凡日三大効又治霍亂轉筋燒梔子三枚末服立愈
時行重病後勞發水煮十枚飲汁溫卧微汗乃愈挾食
加大黃別煮汁臨熟
內之合飲微利遂差

雷公曰如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去

皮鬚了取仁以其草水浸一宿
漉出焙乾搗篩如赤金末用

食療七疳瘕紫廕風
黃疸積熱心躁

又方治下鮮血梔子仁燒灰水和一
升服之量其大小多小服之

千金方治火瘡未起梔子仁灰麻油和封厚

肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下
若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方治火丹毒搗
和水調傳之

又方治熱毒下血或因食物發動以三
十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煮
取一升去滓溫服即令微汗若食不消加大黃三

兩

又方治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不
能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方治獒犬咬梔子皮燒末石硫黃等分
同研為末傳瘡上日三二傳之差

博濟方治冷熱行下和不想飲食或腹痛疴刺山梔子
川烏頭等分主搗為末以酒糊丸如梧子大每

服十五丸炒生薑湯下如小腹
氣痛炒茴香葱酒下二十九

兵部手集治頭痛不可忍是多風痰所致
梔子末和蜜濃傳舌上吐即止

勝金方

治婦人臨產前不限多少燒灰細末

孫尚藥

治傷寒下痢後更煩按之心下硬者虛煩也

取二升半內豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗

秦王散胃疸食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源

梔子 柔金

衍義曰

梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反熨顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲

景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澀去皮山梔子

火炮大黃連翹甘草多時分末之水煎次三二錢匕服之

无不効

廣州騏驎竭



紫釰音騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止

痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異

如膠作赤麋音京皮及室細用為假色亦以膠室物云

渴留喻如蜂造窠研取用之吳錄謂之赤膠者今按別

本注云紫釰騏驎竭二物同條功效全別紫騰色赤而

黑其葉大如盤鉢從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平

無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附正石部今移

錫詩謹按云紫釰無毒治野馬啼漏可鎔補又

云騏驎竭暖无毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癩久不合者傳此藥性亦不可多使却引膿

圖經曰：騏驎竭，舊不載。所生州土，今出南蕃諸國及廣
 州。木高數丈，葉似櫻桃，而有三角，具
 脂液，從木中流出，滴下如膠，鉛狀，久而堅凝，乃成竭。赤
 作血色，故亦謂之血竭。採無時，其味鹹而氣腥，者是海
 丹血，不可用。真竭微鹹，而其作梔子氣味，舊說與紫銖
 大相類，而別是一物。功力亦殊。今按段成式《酉陽雜俎》
 云：紫銖出真臘國，人呼為勒法。亦出波斯國。木高
 丈許，枝幹繁鬱，葉似橘柚，冬不凋落。三月花開，不結子。
 每有霧露微雨，濡其枝條，則為紫銖。波斯國使人呼
 及沙利，兩人說如此，而真臘國使人言是蚊運土上於
 木端，作窠，以壤為霧露所濡，即化為紫銖。又交州地志
 亦云：本州歲貢紫銖，出於蚊壤，乃知與血竭雖俱出於
 木，而非一物。明矣。今醫方亦罕用，惟染家所須耳。

海藥：紫銖，謹按廣州記云：生南海山谷，其樹紫赤色。
 造胡燕脂，餘滓則王作家使也。又騏驎竭，謹按南越志
 云：是紫銖樹之脂也。其味其溫無毒，主打傷折損一切
 疼痛，補虛及血氣，挽刺內傷，血聚並宜酒服。欲驗真偽，但嚼之，不爛如臘者上。也。

雷公云：騏驎竭，凡使勿用海母血，真似騏驎竭，只是味
 鹹，非腥氣。其騏驎竭味微鹹，其似梔子氣是也。

欲使先研作粉，重篩過，臨使安於丸散，或
 膏中任使用，勿與衆藥同燒，化作飛塵也。

聖惠方：產後血暈，不知人，及狂語，騏驎竭一
 兩，細研為末，非時溫酒調，二錢匕。

廣利方：治金瘡，血不止，兼痛。
 鱗竭末，傅之立止。

賈相牛經：牛馬有漏蹄，以此紫礦少許和
 豬脂內入，漏處燒鐵篋烙之。

酉陽雜俎：紫銖樹出真臘國，使衝都尉沙門陀沙尼拔
 陀言：蚊運土於樹下，作窠，以壤得雨露結而
 成紫礦，崑崙者善波斯吹。

善波斯吹

太清伏煉靈砂法：騏驎竭出於西胡，稟於炎惑之氣，生
 於湯石之陰，結而成者，紫銖形若爛

石其功亦能添益
 陽精消陰滯氣

衍義曰：紫銖如糖霜結於細枝上，累累然，紫黑色，研破
 則紅，今人用造錦綉，蔽迹來亦難得，餘如經

廣州龍腦



龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪
氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白
松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳
云合糯一作梗米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本
樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂危腦是根中乾
脂子似豆蔻皮有錯中香似危腦味辛尤下惡氣消食
散脹滿香人口備云出婆律國藥以目為名即杉脂也
江南有杉木未經試或方土無脂猶其蕉無實唐本先

附圖錫等謹按段成式酉陽雜俎云危腦香樹出婆

利國呼為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七
圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦七者出危腦香
肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏
於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有別法南唐藥
譜云危腦油性温味若本出佛誓國此山從樹所取摩
一切風陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣
令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又
主蠱毒取二七枚未服當吐出生
嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳
圖經曰危腦香出婆律國今惟南海番禺賈客貨之相
狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即
木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之
婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦七者出危腦
香其香在木心波斯斷其木剪取之肥者出婆律膏其
膏於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異亦
云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢危腦皆如蟬
蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼為
瑞危腦帶之衣於香聞十餘步外是後不聞有此今海
南危腦多用火煨成片其中亦容雜偽
入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

海藥

謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也

如白膠香狀味若辛微温无毒主內外障眼三

蟲治五痔明目鎮心秘精又有倉危腦主風瘡黥黯入

膏煎良用點服前有新汲水調服立差又唐太宗

研末小許以新汲水調服立差又唐太宗

時西海律國貢危腦香是知彼處出之

經驗方治急中風目瞋牙禁無門下藥者以中指點散

藥危腦天南星等分為末乳鉢內研白五月五

日午時合出者只用一字至半錢各開散

經驗後方治時疾發碗豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁

氣喘妄語或見鬼神危腦一錢細研旋滴猪

心血和丸如鷄頭肉大每服一丸紫草湯下少

時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

衍義曰危腦條中与圖經所說各未及此物大通利開

壅及暴得驚熱甚清用然非常服之藥独行則勢弱佐


使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味万物中香無出

其右者西方抹羅短吒國在印度境有錫布羅香餘

如松栝葉異温時無香採乾之後折之中有香狀類雲

用色如冰雪此危腦香也蓋西方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾

療水氣用之乃佳本草注云皮薄開口者是雖名為食

經久色黃黑乃是食茱萸穎粒大

茱萸今按陳藏器本草云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起

陽殺牙齦蟲痛唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云食

茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾

殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙齦蟲止痛本

經已有吳茱萸云是口折者且茱萸南北總有以吳地

為好所以有吳之名兩處俱堪入食若充藥用要取吳

者止可言漢之與吳豈得去食与不食其口析者是日

乾口不折者是陰乾本經云吳茱萸又云生宛胸死胸既非吳地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰或云即茱萸中顆粒大經云色黃黑堪飲者是

人南比皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青

黃上有水白点葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子

蓋札記所謂藪者藪文声訛故云耳宜入食羹中能

發辛香然亦不可多食多食衝眼煎又脫髮採無時

食療温主心腹冷氣痛中惡除飲逆去臧腑冷能温

偏不語者取子一升美鼓三升以好酒五升和煮四五

沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升

水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又

魚骨在腹中刺痛魚汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝

心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入骨不出者持

封之其骨自闌而出又明目者名攬子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末

冷水調分為三服立差

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫温

行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗚嗚喘息一名無姑

一名藪音殺唐音生晉山川谷三月採實陰乾陶隱君云

麗狀如偷莢氣臭如椒音信彼人皆以竹醬食之性殺

虫置物中亦辟姓但患其臭唐本法云爾雅云蕪荑一

名藪藪今名藪藪字之誤也今延州同州者最好今注

蕪荑河東河西處上之况經云生晉日川谷而陶以

為推出高麗蓋是不知其元也臣禹錫等謹按爾雅釋

本云無姑其實夷注無姑上掄也生山中葉圓而厚刺

取皮合漬之其味辛香所謂無美藥性論云無美使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫七如蟲差又和白蜜治温癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生

日華子云心腸風痔癩惡瘡疥癬而無美生晉山山谷今近道亦有之大抵榆類而圖經曰差小其實亦早成此榆乃大氣臭如飢雨雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑七榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂無美也又釋草云並黃葍牆注云一名白黃而与本經一名葍音殿塘音唐相近蘇恭云葍音殿善字之誤也然並葍草類無美乃木也明是二物或氣類之相近次三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人多取作屑以芫五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此等不堪入藥在可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不止無美五兩搗末以飯丸每日常空心午飯前各用陳米飲下三十九丸增至四十九丸久服去三尸益神駐顏六得之章錄

陳葍器

作將曾食之主五鷄病除瘡癬其氣鹽者良此山榆仁也

海藥

謹按廣州記云生大秦國是波斯無美也味辛子巨瀉得詞

食療

散腹中氣痛又和馬酪可治癰作將曾甚香

外臺秘要

治膀胱氣急宜下氣葍葍搗和食鹽末二物等分以錦裏如束大內下部或下水惡汁并下氣

佳

千金方

主脾胃有蟲食即瘡黃無色疼痛無時必効以石州蕪蕪仁二兩和麩炒令黃色為末非時

錢七差

衍義曰

蕪蕪有大小兩種小蕪蕪即榆莢也採取仁醞為醬味辛入藥當用大蕪蕪別有種然小蕪

蕪醞造多假以外物相和不可不擇去地治大腸寒滑及多冷氣不可闕也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胃膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓢核賈主療稍別故特出此條今附
臣禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦平治遍身風痺肌中如麻豆惡痺主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛閉膈塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之
臣禹錫等謹按藥性論云徒脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結疝疔腫疝氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚瘙癢痔腫

川炙對火入藥浸
 軟判炒令熟

圖經文具枳
 實條下

陳藏器云根皮主野鷄病未服方寸匕本經採實用
 九月十月八月既厚且辛書曰江

南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江
 北有枳無橘此曰別種非干變易也

雷公云凡使勿使枳實緣性劫不同若使枳殼取辛若
 腥并有隙油能消一切摩要陳久年深者為上

用時先去瓢以麩炒過待麩焦黑遂
 出用布拭上焦黑然後單搗如粉用

千金方主口僻眼急風枳殼刮取上青為末欲至瓢上
 者得茹五升微火灼去濕氣以酒三升漬微火

緩令得藥味
 遂性服之

肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮枳殼皮一升
 酒三升浸一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼
 一兩杵末如茶法煎之

經驗後方治風癢痒不止以枳殼三兩麩炒微黃去瓢
 為末每服二錢非時水一中盞煎至八分去

服

梅師方

治一切瘰癧以水煮枳殼

傳濟方

治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存

濃米飲一中盞調下空心服五更初

必効方

熨痔上頭出或痛不可忍枳殼於糖灰

杜壬方

瘦治散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩其

產仍無胎中惡病忌登高劇

衍義曰

枳殼文具

成州枳實



枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦

痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胃脅痰

癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安

胃氣止溘洩明目生河內川澤九月十月採陰乾

今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮

以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實

俗方多用道家不須唐本注云枳實日乾乃得陰便濕

爛也用當去核及中瓢乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳

實須合核瓢用者殊不然也今按陳藏器本草云枳實

根皮主痔未服方寸七本經採實用九月十月不如七

月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南但

等謹按蔡性論

云枳實神味苦辛解傷寒結胃入陷胃

圖經曰

枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江

五七尺葉如椶多刺春生白花至秋成實九月十月採

陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今

醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為殼皆以翻肚
 如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不
 堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所積實木湯煮
 之枳實七枚木三兩以水一斗煎取三升分三服腹中
 軟即稍減之又胃痺心中痞堅留氣結胃七滿脅下逆
 氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤
 白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴
 取二升去滓內餘藥於湯中前三兩沸分溫三服當愈
 又有橘皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主胃痺心痛高洪
 治卒胃痺痛單用枳實一物搗末服方寸七日三夜一
 其根皮治大便下血未服之亦可煮汁常飲又治卒中
 急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹
 一升酒一升漬一宿
 服五合至盡再作良

外臺秘要

至風癩取枳實以醋浸令濕火
 灸令熱滴寒溫用熨上即消

千金方

治胃痺氣壅滿心隔不利枳實二兩熬炒微
 黃為末非特以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方

治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽者極
 密塗灸令煖更湯熨肛取縮即止

經驗方

治腸風下血枳實半斤炒去麩綿黃老同半斤
 洗剉為末米飲非時下二錢上若難服以糊為

九湯下二

集驗方

治五痔不以年月日久新枳實為末
 煉蜜九如桐子大空心飲下二十九

濟衆方

治傷寒後卒胃膈閉痛枳實一味剉麩
 炒黃為末服二錢米飯調下一日二服

廣利方

治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分搗末以
 飲汁調二錢七二歲服一錢子母秘錄方同

子母秘錄

治婦人陰腫堅痛用半斤碎
 炒熟故帛裹熨冷即易之

衍義曰

枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性
 詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中

用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義他
 方但尊取風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此

商州厚朴



歸州厚朴



厚朴味苦温大温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲温中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胃中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠屨明日益氣生交趾冤句三九十月採皮陰乾乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石陶隱居云今出建平且都逐厚肉紫色為好殼薄而白者不用之削去上中麤皮俗方多用道家不須也**用法**出梓州龍川者最佳臣請錫等謹按吳氏云厚朴神農岐伯雷公皆无毒李氏小温范子厚朴出洪農**藥性論**云厚朴臣已且食此者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴虛吐宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大温胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而尿白**明華子**云建脚主反胃霍亂持筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安調閉節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去麤皮薑汁灸或薑炒故用又名列朴

圖經曰厚朴出交趾冤句今京西陝西江淮湖南蜀川三四丈徑一二尺春生葉如柞葉四季不凋紅花而青實皮極鮮皴而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脈數厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎取三升温服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚枳殼二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去滓温服八合日三服者如半夏五合下劑者去大黃寒多者如生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排此也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或在散便去麤皮若湯飲下使用自然薑汁八兩炙一升為度

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香為末非時新水調下二錢匕佳

又方 治痰壅嘔逆心胃滿悶不下飲食用一兩塗

梅師方 治水穀痢久不差厚朴三兩煎取一升空心服

斗門方 治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不

又蘆薑汁炙直待焦黑為度搗篩和麩以陳米


飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙

子母秘錄 治月水不通厚朴三兩炙水三升煎

衍義曰 厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡

棘人猴舌平胃產中用最調中至今此藥盛

茗苦椽



茗苦椽茗味甘苦微寒無毒主瘦瘡利小便去痰執瀉

令人少睡春採之

苦椽主下氣消宿食作飲加茱萸薑等良

云檟若椽注樹小似椀子冬生葉可煑作羹飲今呼早

採者為茶晚取者為茗一名苒蜀人名之若茶生山南

漢中山谷今按陳藏器本草云茗若茶寒破熱氣除瘴

氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰椽是茗嫩葉搗成餅

並得火良久食令人瘦去

人脂使不睡唐本先附

圖經曰 茗若椽舊不注所出州郡今閩浙蜀荆江胡淮

似椀子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為茶晚採者

為茗一名苒蜀人謂之若茶是也今通謂之茶茶上聲

近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與

古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺

至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如

瓜芦葉如椀子花如白蒿薇實如拊擱蒂如丁香根如

胡桃其各一曰茶二曰價三曰設音設四曰茗五曰苒

又曰茶之別者有枳殼芽枸把芽枇杷芽皆治風疾又

有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南
 人輸官茶性上雜以衆葉惟茅蓋竹箬之類不可入自
 餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇真茶性極冷惟
 推州蒙山出者温而七疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶
 園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂
 曰蒙之中頂茶當以春分之先後多備人力俟雷之發
 聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能
 祛宿疾二兩當眼前無疾三兩固以擴骨四兩即為地
 仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而疾差其四頂茶園
 採摘不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性以不
 甚冷大却飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐母景
 茶飲序云釋滯消壅一日之利暫
 佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療

云茗葉利大腸去熱解痰煎取汁用黃粥良又
 宿用陳故者即動風發氣市
 人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要

治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胃膈
 有痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差

單着茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又
 飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡

主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙搗末濃煎
 二三盞喫差如久患痢亦且服又主氣壅暨

腰痛轉動不得煎茶
 五合投醋二合頓服

經驗方

治陰囊上瘡用蠟面茶為末
 先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部手集

治心痛不可忍十年五年者
 煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方

治蠅虻尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如
 火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以

生油調傳止其
 痛藥至立止妙

別說云

謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其
 嫩者是今之茶芽經年者又老葉二者安可作

羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有
 之然則性類各異近世蔡襄蜜李所述極備閩中惟建
 州北苑數處產此性味獨與諸方畧不同今亦獨名臘
 茶研治作餅日得火愈良其他者或為芽葉或為末收
 貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎州一種
 芽茶其性味畧類建州今京師及河北北京西等處磨為
 未亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄
 瀉甚効則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州

上供品第
備見茶經

衍義曰茗者條今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶
古人謂其芽為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發
便長寸餘微麗如針惟芽長為上品其根幹水土力皆
有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識設為品題
唐人言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶
者宜原其始終又晉江嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭
璞云早採為茶晚採為茗茗或曰辨尺充切葉老者也

河中府秦皮



成州秦皮



秦皮味苦微寒大寒無毒
風寒濕痺洗寒氣除熱

目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癩身熱可

作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大子一名

岑皮一名石檀生廬江川谷及寬句二月八月採皮陰

乾大戟為之使惡吳茱萸陶隱居云俗云是樊槻音規

爾俗方惟以療目道家亦有用作處唐本注云此樹似檀

葉細皮有白點而不蠶錯取皮水漬便碧色書紙看皆

青色者是俗見味苦名為若樹亦用皮療眼有効以葉

以檀故名石檀也醫方湯等謹按秦性論云秦白皮平

惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚

不止心小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤

眼極效日華子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂

大觀本草卷一八十三卷

富春堂梓

外臺秘要 治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於以筋頭纏綿仰臥點所患眼仍先從大背脊中滿眼著微痛不畏良久三五針間即側臥瀝却熱汗每日十度已上著不過

兩日差

又方 治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水一升五合煮取七合澄清用漬目中

淮南子 藥也注榨若歷木水浸皮清用洗眼效


沈存中 秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃

疾遂者火汁一斗飲之差

歸州秦椒



越州秦椒



秦椒 生溫熟寒有毒主風和氣溫中除寒痺堅

醫明目 療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出

汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通補主太山川

谷及秦嶺上或瑯琊八月九月採實惡括樓防葵畏曲

西來形似椒而大色黃黑味亦類有椒氣或呼為大椒

又云即今摻居此切樹而膠子是猪椒恐謬唐本注云

秦椒樹葉及莖子却似蜀椒但味短實細蓋田南秦嶺

間大有也百馬錫等謹按范子計然云蜀椒出武都赤

色者善秦椒出天水陇西細者善藥性論云秦椒君味

辛能治惡風遍身四肢癢痺口齒浮腫搖動主女人

月閉不通治產後惡血崩多年痢主生髮療腹中冷痛

圖經 曰秦椒生秦山川谷及秦嶺上或瑯琊今秦厚及

十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云檉大椒郭璞云椒叢生實大者名為檉詩唐風云椒聊且陸機疏云椒似茱萸有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合者其葉以為香今成臯諸山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熟不中合藥可著飲食中又用蒸鷄豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上鹿食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶茗皆其葉今不後如此蓋古人所食與今異者多矣故苦茶與茶同條云作飲加茱萸煎薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益下不止衝也服食藥當用蜀椒

肘後方

手足心風腫益木

傷寒類要

治膏痺其入飲少小便多方秦椒二分

續千金方

治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少灌耳蟲自耳出

衍義曰


秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒

皺紋高為異也然秦地亦有蜀種椒如此區別

海州山茱萸



兗州山茱萸



山茱萸味酸平微溫無毒 主心下邪氣寒熱溫中逐寒

溫厚去二虫 腸胃風和寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞

目黃耳聾面炮溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九

竅止小便利又服輕身明目強力長年一名蜀棗一名

鷄足一名魁音妓實生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣

大見本草 卷之三 富春堂梓

九月十月採實陰乾

蓼突為之使惡枯梗防風防已

熟未乾赤色如胡蘆子亦可嗽既乾皮其薄當以合核

為用爾 **雷公** 錫丹 **雷安藥性論** 云山茱萸使味鹹辛大

熱治腦骨痛止月水不定補腎氣與陽道望長明益添

精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節 **雷華**

子云暖腰膝助水滅除一切風逐一切氣破癥結治酒

腫陳文 **雷** 云胡蘆子熟赤醃小兒食之當果子止水

痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早

諸菓莖及葉煮汁飼狗主癆又有一種大相似冬凋春

突夏熟人呼為木半夏无別功根平无

毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬癩瘡

圖經 曰山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今

乾赤色似胡蘆子有核亦可嗽既乾皮甚薄九月十月

採實陰乾吳晉云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如

杏四月實如酸棗赤五月採實与此稍異也旧說當合

核為用而雷教炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤

成四兩半其核入後者名雀

兒蘇別是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山株萸只是核入後

不入藥用使山茱萸須去内核每修事去核

了一斤取肉皮用只秤成四兩而已未緩
火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精
衍義曰山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如
胡椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如
此命名然山茱萸補養腎藏无一不宜經与注所說備
矣

紫葳



紫葳 音威 **味酸微寒** **無毒** **聖婦人產乳餘疾崩中癥瘕血**

開美 **補氣養胎** ○莖葉味若無毒主痿癭益氣一名

陵茗一名菱華生西海川谷及山陽 根今方用至少博

物志云却晦行音杏華草於大行山北得紫歲華必當
 奇異今瞿麥華乃可愛而處上有不應乃在大行山且
 有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云凌霄
 亦恐非也唐本草云此即凌霄花也及莖葉俱用按爾
 雅釋草云苕一名陵苕黃花藥必瞿切白花莖郭云一
 名陵射又名麥霄本經云一名陵苕莖華即用花不用
 根也山中亦有白華者按瞿麥花紅无黃白者且紫歲
 瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫歲何得復用莖葉
 體性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云稜霄此為貞
 說也巨野錫共董安樂云紫歲臣一名女歲畏鹵
 鹹味耳主熱風七疔大小便不利腸中結實止產後奔
 血不定淋瀝安胎回生子云根治熱風身痒遊風七癰
 治瘀血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒
 豔熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下
圖經曰紫歲凌霄花也生西海川谷及山陝今處上皆
 依大木歲久延引至巖而有花其花黃赤夏中乃盛陶
 隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云
 苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵射本草
 云而无陵霄之說豈古今所傳書有異同郭又云陸機
 及孔穎達疏義亦云苕一名陵射時乃是鼠尾草之
 別名郭又謂苕為陵射本草云今紫歲无陵射之名而

鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵射作凌霄耳又陵
 霄非是草類益可知其誤矣今醫家多採其花乾之入
 婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癩
 彫并行經脉方凌霄花不以多少持羅為散每服二升
 温酒調下食
 前服甚効

斗門方

治暴耳聾陵霄葉爛
 杵自然汁灌耳內差

衍義

紫歲今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為
 木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也

故分入木部為至當唐白居易天詩有木名凌霄擢秀非
 孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是与瞿麥
 別一種甚明唐本注云且紫歲瞿麥皆本經所載若用
 瞿麥根為紫歲何得復用莖葉此說尽矣然其花赭黃
 色本條虽不言其花又却言莖
 葉味苦則紫歲為花故可知矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀錐藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚声訛也西域博云胡桐似桑而

唐本先附草部今移
 出州以而有之物生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相染出如並石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之
 中入藥用石律形如小石片子黃土色者為上即中入齒藥用煎殺火毒并麩毒

圖經曰有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉物生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得之狀如黃礬並石味極鹹苦

得水便消如消石也古方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律上淚声近也然有一種水律極相類不堪用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也各胡桐淚又有石淚在石上採也主風痺蠶齒牙疼

痛骨構風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通典西戎樓國多出怪樹胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似虫食其樹而津下流出者俗名為胡桐

淚可以錐金銀俗訛呼淚為律

墨味辛無毒止血生飢膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩照瞳子上又止血痢及小兒客忤搥篩和水温服之好墨入藥龕者不

堪今附錄
按陳藏器云黑土油

外臺秘要墨未之行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好

下一二十九丸如人行五里再服

千金方 治物落眼中不出好墨

肘後方 客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人

水和服

又方 崩中漏下青黃赤白使人

又方 難產墨一寸末

又方 治赤白崩並墨丸乾並好墨各五兩篩以醋漿和

可六七服如死醋漿以醋入水解之令其味如醋漿

又方 治墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊

梅師方 治鼻衄出血多眩暈欲死

子母秘錄 治產後血暈心悶氣絕以

又方 妊娠胎死腹中若胞衣不

衍義曰 墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用

首墨於我中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達

不敢嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿

膠清調稀稠得所頓服按多者尤相宜又劇証界內有

石油燃之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙不及其

識文曰延川石夜者是

棘刺花味岩平無毒主金瘡內漏冬至後百一十日採

之○實主明目心腹痠痺除熱利小便生道傍四月採

一名折莫一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺

不通 其花一名折莫此一條又相遠越恐俚言多是然復道

人皆用天門冬前吾亦不許門冬前乃是好作飲益人


大規本草

棘刺當用白者為佳花即棘花定无別物然刺有兩種
有鈎者有直者補益宜用直者療腫宜用鈎者又云棘
在東部南人味於寒棘之別所以同用棘條中也臣馬
錫等謹按蜀本草注云棘有赤白二種切韻曰棘小束也
田野間多有之叢高三二
尺花葉莖實俱似枣也


圖經曰棘條下

聖惠方治小兒一切疳用刺針瓜
蒂寺分末吹入鼻中口二

龍州猪苓



施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痰音
瘰癧解毒蠱疰不祥利水道
又服輕身耐老一名殺猪屎
生衡山山谷及濟陰宛句

二月八月採陰乾陶隱居云是楓樹苓其皮去黑作塊
之削去黑皮乃秤之臣禹錫等謹按吳氏云猪苓神農
本草公苦无毒司馬彪注非云豕藜一名苓根似猪

屎治渴藥性論云猪苓臣微熱解傷
寒濕疫大熱癘汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰宛句今蜀州眉州亦
有之旧說是楓木苓今則不必楓根下乃有生

上底皮黑作塊似猪粪故以名之又名地烏桃二月八
月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕藜司馬
彪注云一名苓根似猪屎治渴張仲景治傷寒諸病在

藏加渴者諸苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一
兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而
思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓

散兌其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬時寒嗽如瘧
狀亦与猪苓散此即五苓散也猪苓木茯苓各三分澤
瀉五分桂三分細搗篩水服方寸匕日三多飲煖水汗
出即愈利水道諸湯劑无苦此駛今人皆用之又黃疸

病反狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每
服方寸匕与水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏
採根削皮焙乾彼土人用傳
瘡毒殊效云味其性凉无毒

唐本餘氣去邪

雷公云凡採得用銅刀削去麤皮一重薄切下東流水

去升麻葉令淨晒乾用

外臺秘要治姪姪患子淋猪苓五兩一味末以白湯三

宜轉用之

又方治小兒大便不通猪苓一兩以水

子母秘錄治姪姪從脚上至腹腫小便不利微湯引

楊氏產乳療通体遍身腫小便不利猪苓五兩搗

衍義曰猪苓行水之功多又服必損腎氣

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹腫潰膿止痛尖刺結療

丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓各棘鍼一名

棘刺生雍州川谷陶隱居云李云此是酸東樹針今人

云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中叶復有之亦為難得也

圖經曰有之棘上鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆

而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同

赤棘中叶復有之亦為難得耳然有鈎直二種直者宜採實四月採又刺療喉痺不通藥中亦用陳子昂觀

玉篇云在張掖郡時有人以仙人杖為白棘同旋皆信之物都不相類不知何故疑惑若此其說見拘杞條

外臺秘要 治齒蟲腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之

又方 治尿血棘刺三升水五升煮取三升分三服

千金方 治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭山

又方 虫食齒根內黑燒腐棘取灰服之即愈

子母秘錄 小兒驚風口禁乳不下棘燒末水服一錢匕

又方 棘根汁洗之出千金方

衍義 白棘一名棘鉞一名棘刺按經如此甚明諸家棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先刺起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘无他義今人燒枝取油塗垢髮使垢解

信州烏藥



信州烏藥

台州烏藥



台州烏藥



潮州烏藥



衡州烏藥

烏藥味辛温無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小

兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三桠葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其

八月採根 今附 **臣馬錫** 臣馬錫 **日華子** 云治一切氣除 鮮冷熱其功不可悉數 猶大百病並可摩服

圖經曰 烏藥出嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州微圓而尖作三桠而青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極麗大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方

治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑烟起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差


別說云

謹按本草圖經及世稱以天台者為勝今北之衡州洪州者其香味惟天台者為劣入藥功效亦不及但肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之

衍義曰

烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛與沉香同磨作湯點治胸膈冷氣甚穩當

廣州沒藥



沒藥味若平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中腎暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊

大小不定黑色

今附 **臣馬錫** 臣馬錫 **論** 云沒藥單 用亦得味苦辛能主打棹損心腹血瘀

傷折踈跌筋痛金刃所損痛不可忍昔以酒投飲之良




破癥結宿血消腫毒

圖經曰沒藥生波斯國今南海詩國及廣州或有之木液流淌在地凝結成塊或大或小亦類安息香採無特今方多用治婦人內傷痛楚又治血暈及胎腹痛者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脰骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥同研令細溫酒調二升日二服大佳

海藥謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫無毒上折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野鷄漏痔產後血氣痛並宜丸散中服兩行義曰帶則氣壅痰氣壅痰則絡滯急於絡滯急於痛且腫凡打撲着肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅瘀故如是

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒至五藏邪氣安志厭食除蟲去毒又

服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳

柳生南海山谷陶隱居云廣州別有龙眼似荔枝而小

之並利人唐本注云益智似連翹子頭未開者味辛

殊不似柳其葉花根與豆無別惟子小爾龙眼一

名益智而益智非龙眼也其龙眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如棋柳有鱗甲大如雀卵味其酸也今注按此樹高一丈餘枝葉冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似棋柳而小者有鱗甲其肉薄於荔枝

而其美堪食本經云一名益智者蓋其味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本龙眼除盡毒去

虫

圖經曰龙眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有

百夏物生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形

圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿其甘美其實極

繁每枝常三二十枚荔枝纒過龙眼即熟故南人目為

荔枝奴一名益智以其味其歸脾而能益智耳下品自

有益智子非此物也東觀漢記云南海旧獻龍眼荔枝

十里一置五里一候奔馳險阻道路為患孝和用汝南

唐范為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復

受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴

乾寄遠比中以為佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注

收入今除為果之外別無龍眼若謂為益智子則專謂

諸氣今為果者復不能也矧自有益智条遠不相當故

知木部龙眼即便使是今為果者按今注云其味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松

脂黃黑色為塊新者亦柔韌音刃唐本先附音刃唐本先附

辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開

花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如胎名安息

香六七月孕疑乃取之燒之通神辟衆惡百華子治邪

氣贈驅鬼胎血和辟虫毒脊氣霍亂風痛治婦人血噤并產後血暈

海藥董按廣州記云生南海波斯国樹中脂也狀若

黃合為丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精暖脊辟惡氣

仙人杖味鹹平云無毒主噦氣嘔逆辟疝小兒吐乳

大人吐食並水者服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良久

主痔病燒為末服方寸匕此是筭欲成竹時立死者色

黑如膝五六月收之若桂竹多生此又別一種仙人杖

服長生空筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生
劔南平澤葉似苦苣叢生陳子昂規玉篇序云夏四月
坎于張掖河洲草木无他異者皆仙人杖往七叢生子
家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味成人有
薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶
吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰文具拘
杞條下

松羅味若甘平無毒主頭怒邪氣止虛汗頭風女子陰

寒腫痛療痰執溫瘡可為吐湯利水道一名女蘿生熊

耳山川谷松樹上五月採陰乾爾雅居云東山甚多生

真毛詩云葛音鳥与女萝施于松上葛是寄生以桑上
者為真不用松上者此亦有異同爾

用松上者言錫等謹按藥性論云松萝使味苦辛微
熱能治寒熱能吐胸中客痰延去頭瘡疔頂上痛癭

華云今
人得得眠

圖經文具又示寄
生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南

交愛芋州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦

无稜用亦同法唐本先附爾雅錫等謹按藥性論云毗
梨勒使能溫暖腸腹兼去一切冷氣蕃中人以此作漿

甚熱能染髮變黑色
爾雅云下氣止瀉痢

**海藥董按唐志云生南海諸国樹不与訶梨子相似
即圓而毗也味苦帶澁微温无毒主烏髭髮燒**

灰乾
血効

戎州菴摩勒



菴音摩勒味若甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺

南交廣愛寺州

舊本注云樹葉細似合歡花黃子似李

藥用今按陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣今合鉄粉用一斤變曰不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風庠物塗髮脫後生如漆人食其子先苦後甘故曰絲甘唐本先附

圖經曰

菴摩勒餘其子也生嶺南交廣愛寺州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈

枝条甚軟葉青細密朝開暮欽如夜合而葉微小春生冬凋三月有花着条而生如粟粒微黃隨即結實作莢每系三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子噉之物竟味苦良久更甘故以名也

海藥

生西国大小如枳椇子狀林九云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒无毒主用石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也

衍義曰

菴摩勒餘其子也鮮金石毒為末作湯点服佛經中所謂菴摩勒果者是此盖西度亦有之

爵金香味苦温無毒主蠱點諸毒心氣鬼疰鸛鷓等臭

陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也

謹按陳藏器云爵金香平人諸香藥用之說文爵香芳草也十二葉為貫將以煮之用為爵為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于水部

陳藏器云味苦平无毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花

即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺

鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解

名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾爾雅居云山野處有其莖有三羽

狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚稀用之削取皮羽
今法醫家思鬼箭療婦人血氣大效
臣馬錫壽謹按藥
性論云鬼箭使一名衛茅有小毒能破陳血能落胎主
中惡腰腹高及百邪鬼魅
用草云鬼箭羽味其澁通
月經破癥結止血崩帶下殺
腹穢虫及產後血咬肚痛

圖經曰三月以後生葉苗長四五尺許其幹有三羽狀
如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖
陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡症在心痛不可忍有
鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡
氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也


雷公云此使勿用石節根頭真似鬼箭只是上葉不
酥緩炒過用之每修事一

兩用酥一分炒酥盡為度

外臺秘要治乳无汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服

衍義曰衛茅所在山谷皆有之然木嘗於平陸地見也
多蟠之遺崇方
家用之亦必

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡亦白久痢除其蠱疥
癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩

索入水不爛出南海已南山谷似梓一作白皮
今附臣

謹按日華子云温治血脈
麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡
翻可作繩入水不爛不拘時採之古方多用浸酒治
風歷南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃

年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此陰立脩製一劑便減斤分步履便輕故錄之耳梅桐皮二兩半膝弓翦老活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入无灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日干晚卧時上一盞長

海藥

謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦温无毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼

痛霍乱赤白瀉刺血痢疥癬

大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生南海諸國今附臣禹錫詩謹按日華子云下

胃調

圖經

文具棋脚條下

孫真人云

棋脚皮鶴烏多棲此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花接碎拭酒醋白腐壞子作角其中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云

主水瘰病京都人亦種之以飾庭池

合歡



合歡味甘平無毒至安五藏利心志令人歡樂無憂久

服輕身明目得所欲生益州山谷圖隱居云按稽康券

草忘憂也詩人又有萱草者即今鹿葱而不入藥用至

於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略

遂致未謝猶如長生之法罕數尚亦為遺棄唐本草

云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花癸紅白色所在

山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合

歡或曰合昏秋實作莢子極薄細爾今按陳藏器本草

及葉前去垢葉至暮即合故云合昏也雷斅錫鬻董按

蜀本草音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來

輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不念日華子云

筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有

似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相

解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花癸

紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮

及葉用不枸時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以

冊棘七一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合

歡也故嵇康種之舍前是也帝宙獨行方胃心甲錯是

為肺癆黃昏湯治取夜合皮掌

大一枚水三升煮取半分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合花

又方打搥損疼痛夜合花

散合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅


衍義曰散垂如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之

夜合花陳藏器曰華子皆曰皮

杀虫又曰續筋骨經中不言

殺虫又曰續筋骨經中不言

越州虎杖



汾州虎杖



滁州虎杖



虎杖根微温主通利月水破留血癥結其多此狀似大

馬蓼莖班而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也今按陳藏

器本草云虎杖主風在骨節間及血淋煮汁作酒服之

葉持傳蛇咬一名苦杖莖上有赤占者是臣禹錫等謹

按蜀本草云生下湿地作樹高丈余其莖赤根黃二

月八月採根日乾所在有之爾雅云茶虎杖注云似苙

草而麗大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大

虫杖也味甘平无毒主治大抵煩燥止渴利小便壓一

切熱毒暑月和牛草煎色如琥珀可愛堪看嘗之其美

瓶置井中令冷徹如冰白堊器及銀器中盛似茶啜之

射人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通持

以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血

不下心腹脹滿排膿主蒼癰瘰癧婦人血暈撲損瘀血

破風毒結氣又名酸杖又名班杖

圖經曰虎杖一名苦杖旧不載所出州郡今處七有之

枝葉似小杏葉七月開花九月结实南中出者无花

根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者尔雅云漆

虎杖郭璞云似葑草而麗大有細刺可以染赤是也二

月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醫二

取根洗去皴皮剉焙搗篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸

痔下血甚佳俗間以其草同煎為飲色如琥珀可愛瓶

盛置井中令冷徹如水極解暑毒其汁染米作糜齋益美

雷公云似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉稟

一夜出晒乾用

外臺秘要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不

得石餘許洗乾搗作末捺米五升炊飯內撓之好酒五

斗漬封侯藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚鹽麕當出

亦可但取其一斗乾搗酒漬飲之從

少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方 治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煮適寒温以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方 治五淋苦杖不計多少為末每服二升用針飲下不拘時候

衍義曰 虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖葉差大為異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋七開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎之其味甘即是甘草之味非虎杖也然論其攻治則甚當矣

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣痺墮肺燕風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘁膿水五痔下血不止小兒面鼻疔瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰 五倍子旧不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月结实无花其木青黄色其实青至熟而黄大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云 五倍子治腸虛泄痢熱湯服

博濟方 治風毒上攻眼腫痺溢痛不可忍者或上下臉皆赤爛浮腫瘰癧肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荆子一兩半同杵末每服二升水二盞銅石罍內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去遊摩

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二个一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同搗末每服米泔調下去遊摩

半斤
立差

冊房鏡源

五倍子
佐鉛

衍義曰

五倍子今染家亦用口
磨以未摻之便可飲食

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼
痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花七黃色
生蜀地所在皆有三月採

圖經曰

伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之
多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有
刺花淡黃色作穗似杏
花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸
風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及
葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得

之

今附
音不語小兒客忤及痲瘰此是南海邊竹內塵沙結
成者

衍義曰

天竹黃自是竹內所生如黃土着竹成片
凉心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚醫赤澁多眵淚消
目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈
餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高
丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘

葉花微紫色二月三月採花暴乾用
此木類在草部不知何至於此也

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌
蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度

又却日乾用每修事一兩用酒入兩浸待
色變用蜜半兩蒸為度此元名水錦花

衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青
蓋柔而不光絮不深綠花細碎數十房成一朶

冬生春開此木也
今居草部恐未及

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮
薄不過烈生西胡國今附

圖經文具桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補腰脚破產後
惡血治血痢腸風功力与桂心同方家少用

衍義曰天竺桂与牡菌
挂同但薄而已

拆傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產

後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷
唐本注云藤生繞樹

上葉似菌草葉而尤厚八月
九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒健脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此

大觀本草卷之五十一

不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入

藥微炒使新備見日華子

圖經文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎

止痛生肉唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木空重煮汁赤色尔雅云椋

即來是也郭注云椋林中車輞八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛

酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似萝摩葉二月

八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚

葉擣碎置上沅魚悉暴鯁一名花木香詹香也葉如椿

生高山堪為書軸白魚不損書也

海藥主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛温無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及執服出

安南及南海人作床几似紫檀而色赤為枕令人頭痛

為執故也

海藥謹按廣志云生安南及海南山谷胡人用為床坐性堅好主疰惡露衝心癥瘕結氣赤白漏

下並判煎服之

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之

出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並判煎服之

黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合
空心少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥 功力勝解
毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所卧席下勿令婦人
知覺

元慈勒末其無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血
痢下血婦人帶下明目去障醫風淚努肉生波斯國似

龍腦香

海藥 慈勒樹中脂也味甘平消醫
破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤脚去煩除痰火乾
作飲服之三南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大

如指取子及皮作飲極香美

海藥 謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒
主煩燥心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服
子食之香大
小如半夏

鑿乳中木主難產取入鐵裏者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎
汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北恣有作柴亦云櫟

音同也

于金方 治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三
斛濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日為之

差止

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口
中含之又取和米煮粥飼狗去癩生南地深山皮赤如

指堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎冷
黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼
木松楊縣以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血者服之楊廬木
上耳也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主
盜汗書云止鹹味

聖惠方

治膀胱虛熱下澀石澀痛利水道
燒灰研食前溫酒調下一錢匕

浸木味苦平無毒破產後血黃服之葉搗碎封蛇咬亦
洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月門花白如雪生江

東林管問

象豆味耳平無毒主五野鷄病蠱毒飛尸喉痺取子中
仁碎為粉微熬米服一二匕亦和大豆藻面去黥生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若
鷄卵皮紫色剖中仁用之二名榼子一名合子主野鷄
病為上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐
爛者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者
煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔已

江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也

柚木枝葉味苦温無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云柚破占大木葉如桑也

息王藤味苦温無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服
之生嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西
山谷似茱萸獨萎也

鴟鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒
故曰鴟鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不
凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫
下癭蛇虺蟲螫狂大毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血
長層一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至
秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘温無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽
道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰
乾也

枕材味辛小温無毒主咳嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤
煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山
谷作舩舩坎於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去

大觀本草
風血生江南林澗中葉如梨子如柰子山人亦名鬼薄
者也

木戟味辛温無毒主瘰癧氣在臧府生山中葉如梔子
也

奴柘味苦小温無毒主老血癥男子瘰癧閉痞取刺和
三稜豈馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服
當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷
不凋著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮
服之亦名鬼針為其賊惡隱豈名爾

鐵鎚柄無毒主鬼打及疆鬼排突人致惡者和桃奴鬼
箭等丸服之

古槻板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢
悸常為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎服當得
吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神
作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主
小兒痰瘕生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並
識之

飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方
人謂筐也又藍耳燒作灰末傳狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃
荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癩風以物
揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石
榴而短小對節○紫葳味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重
下水癢亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古
木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水蜜濟方云長髮也
梳篦無毒主蟲病者汁服蟲病是活蟲入腹爲病如癥
瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒生一切老血及產後諸疾結痛血上
欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而
長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來
參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢
及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹
痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵瓦上屑燒傳吻上
喚瘡

古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在
日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上
薰之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣
徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三
載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃極同功也

梭頭生失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月
蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳
瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大
如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂尤堪為
藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知
北地何意獨無為當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺
僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有
遠飛鷄朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南
方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不
作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤
樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蝎螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡
土止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

重修政和經史證類備用本草卷第千三

六觀本草

十三卷

五十九

