


導水瑣言

特
836



導水瑣言

特 1
836

27.7.11



国立国会図書館 タイトル『導水瑣言』 請求記号 特1-836

ガラス使用


導水瑣言序

故侍御醫味田韞卿以方脉聞天下而不著方
論以為意之不解口莫能言唯有導水瑣言一
書即記其屢試而驗者也此惟特舉導水之
法善及之則一尺之矩可以定天下之方矣今嗣
泰中將梓而公于世問序于余以為太史公
作倉公傳錄其所珍後世欲觀古人珍法者於
是乎取焉因閱其於籍導水之治驗此編未載



導水瑣言序

倉庫齋藏



I
特 836

者頗夥。今舉三則云。一夫嘗患疥癬。已愈滿身。洪腫。游溢氣促。宿留利水之劑。無驗。乃為四物加香附子甘草茯苓湯使服之。不日諸瘡盡除。所以知利水而不利者。証其脈微而細。膚黃。膝枯。心下痞塞。腹滿而無力。病得之因患疥癬。發燥銜泣。水道由此不利也。一士徇役于江戶。患兩脚浮腫。筋掌肉痺。眾皆以為脚氣治之。無驗。求于京師請治。韞卿曰。此疝瘕也。即為四逆

散加吳茱萸牡蠣劉寄奴湯与之。未三旬病已。所以知非脚氣者。切其脈沈緊。心下痞硬。腸下。逆滿。臍左有塊。而胃腹無動。氣息如常。故曰疝瘕。一婦浮腫脚弱。筋掌氣急。至夜氣自左脇貫。衝胸臍。煩悶不能寐。眾皆以為脚氣治之。無驗。乃按其腹。心下拘急。胸下痞而有動。然心中不悸。身無所麻痺。即為大柴胡加龍骨牡蠣吳茱萸甘草湯与之。一劑而知。十劑而愈。所以知非

論
二
論章醫藏



脚系者切其脉。弦而紧。病得之肝氣亢而中氣
塞。水道由此不利也。之熙曰。古之善用兵者。法
初無不同。而不同之用。子儀以寬。光弼以嚴。王
翦以流。謝玄以寡。孫臏滅竈。而虞詡則增竈。皆
家之察四然二反。亦何異乎斯。吳廷紹以楮實
湯治喉痺。以薑豆湯治腦痛。亦皆記其方。它日
試之。無効。故曰古方法。今病。猶拚舊。建新
屋。諸家有醫案。亦不以拚舊建新之方也。趙玄

度好聚賢書。為醫藏。繆仲醇指之曰。此皆誤人
之物也。仲醇豈不讀醫書者乎哉。恐泥法費人
也。所謂以書印者。不盡為之情。後學者。由此編
得具一副活眼力。尚免為趙玄度耳矣。
文化二年九月

栲亭源之熙撰并書



導水瑣言 序 三 栲亭源藏



導水瑣言
其腫多シトイヘ凡治スルノ容易ナリ間腫コレ
ニ次ク虚腫ニ夕其次ナリ然レ凡此三症ハヨク
彼ノ三候ヲ識得シテ藥ヲ施セハ治セスト云フ
ナシ唯極虚ノ腫ハ其腫些少ナリトイヘ凡藥効
ナシ故ニ此ヲ不治腫ト名ケテ療セス不治腫ノ
診法左ニ詳ナリ此ニ贅セス

○凡實腫ハ其腫シツカリト堅ク勢アリテ手ニ
テ按セハ凹メ凡手ヲハナセハ乍故ノ如ク肉脹
ス虚腫ハ勢ナク其腫フワクト和ラカニシテ按
セ凡其跡急ニ起リ難シ是順症ノ腫状ヲ以テ虚


實ヲ辨スルノ梗槩ニ又虚腫ニテ石ノ如ク硬キ
アリ其候實腫ニ紛レヤスシ實腫ニテフワクト
和ラカナルアリ其候亦大ニ虚腫ニ疑ハシ此ニ
症ヲ辨スルノ他ナシ唯脉ノ虚實ト腹ノ虚實ト
皮膚ノ虚實ト舌色ノ虚實ト眼中ノ虚實ト腎間
ノ動トヲ參候シテ然後ニ始テ其虚實ヲ知ルヘ
シ吾門是ヲ以テ六診ト云六診ノ内腎間ノ候舌
色ノ候皮膚ノ候皆別ニ口傳アリ又一種腫多ク
有ナカラ其水肌表ニ達セス皮膚ニ皺ヨリタル
者アリは大虚ノ腫ニ又一種腫ノ形状前症ノ如

一論
一論
一論



クナルカ又ハ石ノ如ク堅キ腫ニテ腹腰ヨリ以
下夥シク腫テ臂肩胸背甚シク羸瘦スル者アリ
是亦大虚ノ腫之右ノ二種多ハ不治ニ至ル者ニ
又實腫ニテ腰腹以下多ク腫テ上部腫ナキ者ア
リ是ハ臂肩胸背唯腫ナキノミニテ羸瘦スルニ
ハ非ス能ク心ヲ用ヒテ此處ヲ辨シ且テ診ヲ審
ニシテ其實腫タルヲ知ヘシ治法後ニ附ス
凡水腫ノ虚實ハ他病ト異ニシテ實腫トイヘ
凡脾胃ノ虚ヨリシテ發スル者ナレハ攻利ノ劇
劑ヲ用テナク脾胃ヲ損スルヲ勿レ唯病ニ於

テ益無キノミニ非ス人ヲ損ルヲ甚多シ深ク是
ヲ慎ヘシ是水腫ヲ療スルノ一大戒ニ余聲ニ吠
ヘ耳ニ食シテ此説ヲ立ルニ非ス往年此病因ヲ
深ク考ヘス滿腫ノ症ニ遇ヘハ必巴豆甘遂桃花
牽牛ノ類ヲ以テ瀉下ヲ逞ス唯病者ヲ苦惱セシ
ムルノミニニテ効ヲ全スルヲ甚希ニ邂逅ニ効ヲ
得ルヲアリトイヘ凡多ハ遠カラサル内ニ再ヒ
滿腫ス此時ニ至テ再ヒ瀉下ノ劑ヲ投スレバ其
効始ノ如クナラス漸クニ異症蜂起シテ終ニ救
ヘカラサルニ至ルモノアリ此時ニ當テ余カ滿




腔子一箇モ他ノ手段ナケレハ唯水腫ハ治スヘ
 カラサルノ病ト錯悟シ凡一歳餘モ水腫ノ治ヲ
 施サ、リキ然レモトヨリ方術ヲ好ノ癖深ケ
 レハ手ヲ空シテ治ヲ施サルモ心ニ於テ穩ナラ
 ス乃博ク古人ノ方籍ヲ讀ミ始テ其病因ヲ了悟
 シ次ニ其法方ヲ取捨シ是ヲ病ニ徴シテ其實効
 ヲ推シ方藥ヲ取用ルヲ至テ簡約ニシテ無數ノ
 症ニ應ス縱横ニ治ヲ施スモノ今ニシテ五年餘
 ナリ極虚不治ノ症ハ驗ナシトイヘ凡其他ノ諸
 症ハ効ナシト云フナシ總シテ水腫ハ小水ヨリ

利セスレテ大便ヨリ瀉下ヲ取ルハ益ナキモノ
 ト知ヘシ勉テ方症ヲ能對配シ小水ヨリ通シ去
 ルヘシ然レモ實腫勢甚盛ニシテ二便閉塞シ利
 水ノ劑ヲ投スレモ消滴モ利セス腹脹鼓ノ如ク
 呼吸逼迫シ苦悶シテ死セントスルモノニハ甘
 遂末野薔薇實桃花ノ類ヲ投シテ下ヲ取ヘシ然
 レモハクスヘカラス快下利シテ病勢ユルハ
 ハ能ク診候シテ其方症ヲ對シ平和ナル行氣利
 水ノ劑ニ轉スヘシ是實ニ已クヲ得サルノ奇策
 ニシテ常法ニ非ス


導水瑣言

四 卷之三



○凡水腫ノ脉沈實ニシテカアルヲ實トシ吉ト
 ス沈微沈細ニシテカナキヲ虚トシ凶トス浮虚
 浮大ニシテ是ヲ按テ精神ナク譬ハ風ニ木葉ノ
 散ルカ如ク木ノ水ニ浮カ如クナルモノハイヨ
 く虚ニシテ凶ト知ルヘシ腫状舌色其他ノ諸候
 凡皆虚候ナルニ其脉反テ弦緊洪大ニシテ強ク
 コレヲ按セ凡其脉勢イヨク盛ニシテウツクシ
 ク丸ミアルヲ聊モ無ク譬ハ薄キ竹篋ニテ指頭
 ヲ彈クヤウナル者ハ是極虚不治ノ脉ニ
 ○凡水腫ノ舌甚薄キ白胎ニシテ潤澤アルハ實

腫ノ輕症ニ厚キ白胎又ハ黄胎ノモノハ一層重
 シト知ルヘシ然レ凡虚腫ノ舌ニモ白胎黄胎ア
 リ腫状ト脈状トヲ参考シテ其虚實ヲ辨スヘシ
 白胎ニテ枯骨ノ如ク乾燥スルモノ多ハ大虚ノ
 舌ニ黒胎虚實二種アリ此舌口授ニ非レハ明ナ
 リカタシ故ニコハニ是ヲ略ス厚キ白胎又ハ黄
 胎ニシテ舌ノ四邊紅鮮ニシテ譬ハ緋帛ニテ緑
 ヲ取リタルカ如クナル者又舌ニ胎ナク火ノ如
 クニシテ乾燥セサル者皆虚候ニ又胎ナク殷然
 トシテ火ノ如ク乾燥甚ク或白灰色ニテ乾燥甚



キモノ俱ニ極虚不治ノ舌ニ又白胎黄胎或胎十
 ク赤色ナル舌ニテモ舌ノ左右ノ縁ニ紫黑色十
 ル斑點アルモノ是虚候ニシテ結毒アルノ舌ニ
 總テ諸病凡ニ舌傍ニ紫黒ノ點ヲ生スルハ皆結
 毒ノ候ト知ヘシ此外舌候數多アレハ形色相似
 テ紛レ易キユヘ此ニ載セス凡舌候脈候トモニ
 水腫ノミニ非ス萬病皆是ヲ以テ候フヘシ
 ○凡水腫大便秘硬ナルヲ實トシ吉トス下利ス
 ルモノヲ虚トシ凶トス又大便下利モセス常ノ
 通りニテ一日ニ五六度モ通スルアリ又氣急晝

夜ニ五六度モ發シ其發スル度毎ニ大便ヲ催ス
 モノアリ此ニ症皆大虚ノ兆ニ又實腫ニシテ利
 水乏ク水穀分チカタク下利スル者アリ虚腫ニ
 シテ大便秘澁スル者アリ仔細ニ其腫状ト六診
 トヲ参考シテ混同スヘカラス
 ○凡水腫ノ症食ヲ嗜ム者ヲ實トシ吉トス食氣
 ナキ者ヲ虚トシ凶トス又虚腫ニシテ食ヲ貪ル
 者アリ此症皆脾胃虚損ノ甚シキ者ニシテ吉兆
 ニ非ス又實腫ニシテ心下痞塞甚シク食ヲ思ハ
 サルアリ此症亦前條ノ如ク腫状ト六診トヲ審

ニレテ虚實ヲ辨スヘシ
 凡水腫吐血痰血下血アル者多ハ不治ノ症ト
 成リ易シ然レモ十中一二救ヘキ者アリ能ク診
 候ヲ審ニスヘシコレ血症ノ後ニ腫ヲ發スル者
 ヲ云ニ非ス水腫中血症ヲ兼ルヲ云ク
 凡水腫ヲ病ム人ハ堅ク鹽ヲ禁スヘシ麥飯ヲ
 和テカニタキ昆布ヲ水煮ニレテ其汁ヲカケテ
 食スヘシ汁ノ内ヘオロシ菘菴淺草海苔ナトヲ
 和スルモ苦シカラス或昆布ノ鹽ヲ入レ冬瓜赤
 小豆ナトヲ煮テ食スルモ宜シ鳥獸魚鼈ハ云フ

ヲ待ス膏粱ノ飯ヲ食スルモ甚宜シカラス唯前
 ニノフル通ノ至極淡薄ナル食ヲ與ヘシ必飽滿
 セシムヘカラス夫食飽滿スル寸ハ脾氣轉セシ
 脾氣轉セサル寸ハ水道通セス故淡薄ヲ食セシ
 メ鹽ヲ禁スルハ水道ヲ利センカ爲ク是水腫ヲ
 療スルノ一大手段之脾胃大ニ虚損スル者又極
 虚ニ至ラサルモシバク下利スル者ハ麥飯ニヨ
 ロシカラス陳倉米ナトノ味至テ淡キモノヲ一
 合或一合五勺ハカリヲ稀粥トナシ斟酌シテ一
 日ノ食トスヘシ是亦一手段之麥モシクハ米多

脾胃氣轉
 七
 倉庫
 齋
 檢



ク食セシムルモ其量ニ合ニハスクヘカラス凡
水氣盡ルノ後五十日許モ鹽ヲ禁シイヨク再發
ノ萌モ無レハ徐々ニ鹽ヲ食セシムヘシ


○凡水腫ヲ病ム人固ク浴湯ヲ禁スヘシ水腫ヲ
病ム人浴湯スレハ其腫イヨク下ス水氣盡ルノ
後早ク浴湯スルモ宜カラス其腫多ハ再發スル
者ニ大法水氣盡ルハ後輕者ハ三十日重者ハ六
十日許ヲ經テコレヲ許スヘシ必輕忽ニスヘカ
ラス

○凡水腫ヲ病ム人最房事ヲ謹ムヘシ呼吸逼迫
等ノ苦腦モナキ腫ヲ病ム人ハ閑暇無事ナルヨ
リシテ慾情ヲ動シ間々慾事ヲ犯ヌモノアリ慾
慙ニコレヲ告戒スヘシ若是ヲ謹マサル人ハ其
水通利シカタシ大法水氣盡ルノ後半歲許固ク
是ヲ謹ヘシ若法ノ如クセサレハ其腫再發シテ
頻年腫ヲ患ルモノニ

○實腫治法并方

○水腫心下痞硬小便短少ニシテ大便秘硬シ其
腫勢アリテシツカリト堅ク指ヲ以テ按ヤハ暫
ク凹斥手ヲハナセハ乍故ノ如ク肉脹シ其脉沈

導水瑣言 卷之三



實ニシテカアル者は實腫ニ分消湯ヲ用ユヘシ
若水氣多腹部ニ聚リ腹脹甚シキ者ハ三聖丸ヲ
兼用スヘシ每服一錢白湯ニテ送下ス一日ニ二
次若腹脹減シカタキ者ハ増テ三五錢ニ至ル
分消湯方

木 茯苓 猪苓 澤瀉 大腹皮 灸

橘皮 厚朴 枳實 縮砂 香附子 各

蜜香 甘草 灸 生姜 中

右水ニ合テ以テ煮テ一合ヲ取り滓ヲ去リ
分温テ兩度ニ服ス晝夜三劑ヲ用事若胸中

微飲アリテ微喘スル者ニハ蘘子ヲ加フ水

ニ至氣脇下ヨリ上衝スル者ニハ吳茱萸ヲ加フ

○腫状脉状及心下ノ痞大抵分消湯ノ症ニ類シ

テ唯心胸痞悶脇肋膨脹シテ飲食ヲ思ハス志氣

鬱結シ快ニトシテ樂マサル者ハ分心氣飲ヲ用

ユヘシ

分心氣飲方

肉桂 茯苓 半夏 通草 各 桑白皮 橘皮

羌活 腹皮 各 蘘葉 灸 芍藥 甘草 生姜

燈心 各

右水煎症ニ隨テ出入加減スヘシ


○腫状脉状大抵分消湯ニ類シテ心下覆盃ノ如ク痞硬最甚シク纒ニ身ヲ動揺スレハ氣息逼迫スルモノ是水モツハラ心下ニ結聚スル之他ノ藥ニテ救フヘキ者ナシ外臺黑豆湯ヲ用ユヘシ
此症心下ノ診只傳アリ筆授ノ盡ストコロニアラス 若腹滿減シ難キ者ハ三聖丸ヲ兼用スルモヨシ若脇下ヨリ水氣上衝スルコトアラハ木茱丸ヲ兼用スヘシ三四錢目ヨリ五六錢目ニ至ル或方中呉茱萸ヲ加ルモ亦可ク

新黑豆湯方

桑白皮^大 檳榔 茯苓^各
右三味黑豆煎汁ニ合ヲ以テ餘藥ヲ入レ煮テ一合ヲ取り滓ヲ去リ分チ温テ兩度ニ服ス

黑豆煎汁ヲ作ル法

其新黑豆一合半洗淨シ砂鍋ニ内レ水一升ニ具テ合ヲ以テ煮テ六合ヲ取り黑豆ヲ去リ汁ヲ用ユ即六合ヲ以テ前藥三劑ノ水トス
又黑豆ヲヒキワリ前藥一劑ニ二錢目ヲ合シ水ニ合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ其効



本方ニコトナラフ

○凡其腫状脉状黑豆湯ノ症ニ類シテ心下痞硬
マタ一層甚シク呼吸逼迫シ利水シカタキモノ
吳茱萸橘皮湯ヲ用ユヘシ此方黑豆湯ニ比スレ
ハ其病勢ニ等劇ナル者ニ宜シ

吳茱萸橘皮湯方

吳茱萸 橘皮 枳實 茯苓 各等分

右水煎 症ニ依テ犀角ヲ加ヘ或一角ヲ兼
用スルコトアリ又ハ半夏厚朴湯ニ犀角一角
ヲ兼服スルモノアリ 虚腫ニハ附劑ニ


一角或犀角ヲ加ルコトアリ犀角ト一角ト効
驗ノ差別アルコト屢實驗ヲ得テ一家ノ口授

○腫状脉状大抵分心氣飲ノ如クニシテ唯心下

急縮甚シク胸膈滿悶利水シカタク吳茱萸橘皮
湯ナト用ユルニ至ラサル者ハ理氣湯ヲ用ユヘ

○即半夏厚朴湯ノ方内ノ蘓葉ヲ蘓子ニ代テ

橘皮枳實桔梗連翹ヲ加フル方ニ 若心下



和シ難ク利水少ハ麥芽犀角ヲ加フヘシ
 ○凡其腫狀脉狀大略分消湯ノ症ニ類シテ喘咳
 甚シク呼吸短促ナルモノ是水胸中ニ聚ルニ先
 其上ヲ疏スヘシ越婢加朮苓湯コレヲツカサト
 ル或云此症背惡寒ト煩渴トヲ主トシテ用ユト
 此説的當ノ論ニ非ス惡寒ト渴トハ有ルモアリ
 又無キモアリ畢竟水氣胸膈ニ聚リ喘咳ナトア
 ルヲ主トシ用ユヘシ

越婢加朮苓湯方
 麻黄 石膏 生姜 大枣 甘草 雲末

茯苓

右水煎 若腹脹甚者三聖丸ヲ兼用ス

鐵粉煨赤 禹餘糧 蛇含石各等分

右各末トナシ糊ニテ丸トスルヲ梧子大
 水氣專腹部ニ結聚シ腹脹氣急小水不利ス
 ル者此丸大ニ驗アリ然レハ虚腫腹脹ノ者
 ニハ効ナシヨク三候六診ヲ審ニシテ過ツ
 下ナカレ
 ○實腫四肢十分ニ腫脹シ心下痞スレハ硬ニ至



ラス腹部滿スレ疝脹ニ至ラス手ヲ以テ腹ヲ按
ニ空濡ナルカ如クニシテ腹底隱トシテカア
ルモノ疏水湯ノ症ニ

疏水湯方

赤小豆五分

大麥九分

地膚子七分

猪苓五分

澤瀉五分

茯苓五分

黑牽牛三分

右七味各炒水煎

若心下痞シテ食ヲ思ハ

ス志氣舒暢セサルモノハ宿砂木香青皮各

二分ヲ加フ

○滿身洪腫其腫手ヲ以テ按ニシツカリトカア

リテ其跡忽ニ起脹シ腫脹極テ甚ケレ疝曾テ呼
吸ニ礙ラス氣息平常ノ如クナル者猪苓湯ノ症
ニ又一種腫ノ勢前ノ如クシテ腰以下滿腫スレ
疝臂肩胸背少モ腫ナク呼吸平常ノ如クナル者
是亦猪苓湯ヲ用ユヘシ渴ノ有無ヲ問ハス必此
湯ヲ用テ先下ヲ疏スヘシ大ニ奇驗アリ然レ疝
此ニ症虚腫ニ紛レヤスシ能ク三候六診ヲ審ニ
シテ其實腫タルヲ辨スヘシ又腫状脉状前症
ノ如クニシテ心下痞滿シ快トシテ樂マス氣
息少短促ナルハ大橘皮加膠湯ヲ用テ其上ヲ和



レ且其下ヲ疏スヘシ

猪苓湯方

猪苓 澤瀉 茯苓 阿膠 又滑石

各等分

右水煎

大橘皮加膠湯方

橘皮 茯苓 猪苓 澤瀉 桂枝 木香

木 甘草 檳榔 生姜 滑石 阿膠

右水煎

虚實間腫治法

并方

○腫滿指ヲ以テ按ニ濡硬其中ヲ得テ肌表ヒカ

ト光澤アリ其脉實ニシテ稍浮數ヲ帶フル者

是實ニシテ虚ヲ兼ヌルノ症此診口傳アリ筆授ニ盡ストコロニアラス 温藥

ニテ是ヲ導クヘシ大蒜煎ニ宜シ若病人蒜臭ヲ

惡ム者ニハ鯉魚煎ヲ以テコレニ代フヘシ若又

鯉魚ノ腥ヲ惡ム者ニハ鯉魚霜ヲ用ユヘシ

大蒜煎方

赤小豆一合 蒜 生姜 生商陸根

各三錢目 細剉

右四味先赤小豆ト水トヲ以テ砂鍋ニ入レ

火上ニ安シ次ニ三味ヲ以テ布囊ニ入レ赤

小豆中ニ著シ是ヲ煮ルヲ凡ニ時許赤小豆



熟爛ノ時ヲ候フテ布囊ヲ去リ赤小豆ヲ食
セシム一日ニ一劑若其多ヲ厭者ハ劑半ヲ
減セヨ唯病人ノ食量ニ隨テ増損スヘシ

鯉魚煎方蒜 生姜 葱 薑 椒

鯉魚長七八寸者一頭去其鱗不去其腸 昆布方三寸 二片 花椒一匙

右水一升八合ヲ以テ煮テ四合ヲ取り其汁

熱クテ飲ミ且鯉ヲ食セシム毎日一劑

鯉魚霜方大蒜 麩 豆 豉 蒜 椒 胡椒 葱 薑 椒

右土器ニ入レ鹽泥ニテ固濟シ炭火ヲ以テ

燒テ性ヲ存シ末トナシ白湯ニテ送下ス每

服一匙日ニ二三回

水氣久シク去ス唇口乾燥シ其皮膚堅厚ニシ

テ枯燥シ譬ヘハ槁木ノ潤澤ナキカ如ク心下痞

硬胸中不利シ微シク喘氣アルモノ是虚ニシテ

實ヲ兼ルノ症ニ木防已加茯苓湯ヲ用ユヘシ

木防已各三 茯苓六分

石膏二 桂枝八 人参各三 茯苓六分

右水煎

其腫状脉状大抵大蒜煎ノ症ニ類シテ心下和

其腫状脉状大抵大蒜煎ノ症ニ類シテ心下和

其腫状脉状大抵大蒜煎ノ症ニ類シテ心下和

其腫状脉状大抵大蒜煎ノ症ニ類シテ心下和



セス築トシテ悸動スル者は畜水ト固有ノ積
 癖ト併セテ心下ニ聚ルニ姜桂加茯苓湯ヲ用ヘ
 シ總レテ實腫虚腫トモ多ハ動悸ナキモノニシ
 テ唯此間腫ニハ必動悸アリ然レ庄草ニ診察
 スレハ脚氣ノ動悸ニ取紛フコアルヘシ脚氣動
 悸ノ症ハ此治法ト大ニ異リ必治ヲ誤ルヘカラ
 ス

○木犀姜桂加茯苓湯方
 柴胡 黄芩 桂枝 乾姜 牡蠣 甘草
 瓜蒌根 茯苓

○右水煎 若脇下ニ上衝スル者ハ呉茱萸ヲ
 加フ若脉一層虚候ヲ見ハシ心下和シ難キ
 者ニハ附子ヲ加フ

○脉症略大蒜煎ノ症ニ似テ呼吸短息喘咳スル
 者ハ千金越婢湯ヲ用ユヘシ

○千金越婢湯方
 即越婢湯ニ木附ヲ加ル方ニ更ニ茯苓ヲ加
 フ

○其腫勢ト少ク心下痞硬或少シ氣急シ或腹脹



スルモノ是虚腫ニシテ未極虚ニ至ラサル者ニ
濟生實脾散ヲ用テヘシ此上シハク下利ナトア
リテ木瓜檳榔草菓ノ類ヲ用ヒ難キ症アリ四苓
散ニ附子橘皮ナト加テ用ル欤又ハ真武湯ヲ用
ルノ場合モアリ真武湯ニ理中湯ヲ合テ用ルモヨシ
然レモ心下ノ候口傳アリ能ク三候六
診ヲ審ニシテ誤治スヘカラス

○ 濟生實脾散方

- 厚朴
- 木香
- 草菓
- 檳榔
- 附子
- 茯苓
- 乾姜
- 甘草
- 右水煎

○ 其症實脾散ニ同フシテ唯心下ノ痞コレヲ按
テカナクハ香砂六君子湯ヲ用ユヘシ痞悶氣急
ヲ苦ハ犀角麥芽ヲ加ヘ腹脹甚キハ厚朴ヲ加ヘ
下利スルハ附子ヲ加フ然レモ此診加減ノ法口
授シカタシ能ク心ヲ用ヒテ是ヲ察スヘシ

香砂六君子湯方

- 白朮
- 茯苓
- 人參
- 甘草
- 陳皮
- 半夏
- 香附子
- 宿砂
- 藿香
- 右水煎

○ 其腫虚濡ニシテカナク按セモ其跡急ニ起リ

難ク或腹以下腫アリテ臂肩胸背羸瘦シ其脉微細或浮虚ニシテ心下大ニ痞悶シテ飲食美ナラサルモノ是虚腫ニシテ實脾ノ症ヨリ又一層脱ノ甚シキ者ニ壯原湯ヲ用ユヘシ

壯原湯方

人参 白朮 茯苓 桂枝 附子 乾姜

宿砂 陳皮 破胡紙

右水煎

○其腫状脉状大抵前症ノ如クニシテ腰脚解伏シテカスクナク或臍下不仁スル者八味丸料ヲ

用ユヘシ


八味丸料

地黄生乾熟隨宜 山茱萸 薯蕷 澤瀉 茯苓

牡丹皮 桂枝 附子生製隨宜

右水煎

○腫滿堅硬ニシテコレヲ摩スルニ潤澤ナク譬ハ革囊ニ水ヲ盛リテ其口ヲ紮ルカ如ク手當リカサクトシテ堅キ腫ハ陽氣ノ脱スルニ或水氣十分ニアリナカラ其腫肌表ニ達セズ肌膚皴アルモノニ症凡ニ陽脱ニシテ多ハ不治ニ至ルモ



ノ之已コヲ得スシハ防已茯苓加附子湯ヲ用ユ
ヘシ或附子ヲ去リ本方ハカリ用ルノ症アリ又補中益氣湯ニ附子ヲ加ル

カ又ハ五苓散ナトヲ合シテ用ユルコモアリ

防已茯苓加附子湯

防已各桂枝各茯苓大甘草中黄蓍各附子各

右水煎

附録

○疥癬頭瘡内攻シテ腫ヲナスモノ是亦虚實
ノ二症アリ其内虚症少クシテ實症多キモ
用エノニ能診候シテ虚實ヲ辨別シ症ニ隨テ利

水ノ劑ヲ投スヘシ必瘡ニ拘泥スヘカラス

元來疥癬内陷ヨリシテ起ルコナレハ當時

満腫シテ腹脹氣急スルハ皆水ノコノ故ニ

先其水ヲ利スルヲ以テ治トス其水快利ス

レハ先ノ内陷セル瘡發表ノ藥ヲ待スシテ

悉皆表發ス是予カ近年ノ新手段ニシテ屢

効ヲ得ル所ノ者ニ若腹脹氣急至テ甚シク

消滴ノ利水モナク苦悶死セント欲スル者

ニハ甘遂桃花ノ類ニテ一下ヲ取ルヘシ然

レハ同シクハ下劑ヲ用ヒスシテ効ヲ全フ



スヘシ是マコトニ已ヲ得サルノ一計ノ
 ミ治驗後ニ附ス
 ○尼真雖者年二十八疥癬内陷シテ遂ニ腫脹
 ナナス醫ニニコレヲ下ヌ腫益甚シ尋テ發
 表利水ノ劑ヲ投ス亦効ナシ困苦已ニ極レ
 リ予ヲ延テコレヲ診セシム通身洪腫シテ
 腹鼓ノ如ク咳逆短氣喘鳴鋸ヲ拽カ如シ予
 乃越婢加朮苓湯ヲ投ス每料重廿十錢兼テ
 三聖丸ヲ服セシム初昏ヨリ平且ニ至ルマ
 テ湯藥凡五劑丸藥凡四錢平且ノ後腹中鳴

動シ小水利スルコト一升許喘鳴半ヲ減ス一
 時許ニシテ復利スルコト二升餘喘鳴失フカ
 如ク腹脹半ヲ減ス爾後小水日ニ益快利シ
 十日ヲ過スシテ滿身カツテ水ナシ然後ニ
 先ノ陷スル所ノ瘡ニ夕勃然トシテ發ス乃
 藥ヲ敷テ其毒ヲ盡シ藥湯ヲ製シテ浴セシ
 ム三十日ニシテ全ク安シ
 ○縫屋五兵衛者年四十前症ヲ患フ其症稍虛
 候アリ予乃千金越婢湯ヲ作テコレヲ服セ
 シム十日ニシテ腫脹悉ク平ク



右ノ外治驗數多アレ此ニ録セス能ク三
候六診ヲ審ニシテ其症ニ對スル利水ノ方
ヲ處スヘシ必瘡ニ拘泥スヘカラス是予カ
内攻ヲ治スルノ法ニ

○夫脚氣ノ病其初發多ハ皆膝骨弛緩行歩シカ
タク或踝骨疼痛或足筋攣急或臑脹硬脹シ遠行
シテ疲タル扶ノ如ク或兩脚酸疼或痺痺シテ痛
痒ヲ知ラス或環口及臍下不仁シ或兩脚痿弱頑
痺ス各皆小水短澁ニシテ呼吸促迫シ虚里ノ動
盛ナル者劇者ハ滿胸ノ骨間悉ク皆悸動ス此

症甚恐ルヘキヲニテ多ハ心ニ衝ノ根脚ト知ル
ヘシ凡前ニ説ク諸症ノ内一二症アリテ小水イ
ヨク不利シ遂ニ腫ヲ發スル者ヲ脚氣腫滿ト云
又始終腫ヲ發セスレテ唯痿弱麻痺氣急ナトハ
カリノ者アリ是ヲ乾脚氣ト云俗醫ヤ、モスレ
ハ輒云フ凡腫脚ヨリシテ發スルモノハ脚氣ノ
腫トト嗚呼是何ノ言ソヤ笑フヘキノ至ニ水腫
ノ初發ハ皆脚ヨリシテ腫ルハモノニ唯前ニ説
ク通リノ諸症アリテ後腫ヲナス者ヲ脚氣腫ト
定ムヘシ右ノ症ナクシテ腫ヲ發スルモノハ皆




平常ノ水腫ニ能ク心ヲ用テ脉腹ヲ察シ猶且腫
 ヲ發セサルノ前右ノ諸症有ヤ無ヤト委シク是
 ノ問フヘシ若水腫ヲ脚氣腫トナシテ誤治スレ
 ハ利水少キノミニテ格別ノ害ナシ脚氣腫ヲ誤
 テ水腫ノ劑ヲ投スレハ其變踵ヲ廻ラサス謹テ
 誤治ヲナスコナカレ

○凡脚氣ノ脉大抵水腫ニ同シ故ニ脉候ヲ載セ
 ス四肢微冷シ脉伏シテ應セサルモノハ極危劇
 ノ候ニ然レ凡此内ナヲ救フヘキ症アリ此診口
 授

○凡脚氣ノ舌候亦水腫ニ同シ是亦類ヲ以テ推
 へシ


○凡脚氣ノ病其因ニ夕水腫ト同事ニテ虚實ニ
 症凡ニ皆脾胃ノ虚ヨリシテ發スル者ナレハ其
 治吐下ノ劑ヲ用ヒスシテ効ヲ取ルヲ以テ上策
 トス然レ凡吳茱萸木瓜檳榔桑白皮童便石膏麻
 黄ノ類ヲ用レ凡衝氣少シモ降テス昏悶苦楚シ
 消滴ノ水モ利セス嘔吐スル者ハ能ク三候六診
 ヲ審カニシテ却テ瓜蒂ノ類ヲ用ヒ一湧ヲ取レ
 ハ豁然トシテ速驗ヲ奏スルコトアリ是脚氣水毒

卷之四



胸中ニ固泥スルノユヘ湧吐ニ非レハ治スル
 能ハサルモノ之然レ其其實症ナルヲ徹識セ
 甘レハ却テ命期ヲ促スノ助トナルヘシ若前症
 ノ如クニシテ嘔吐ナク呼吸逼迫腹脹甚シク實
 候疑ナキ者ナラハ甘遂桃花野薔薇實ノ類ニテ
 一下ヲ取り衝氣ユルマハ症ニ隨テ降氣ノ劑ニ
 轉スヘシ右ニ症口傳アリ能診候ヲ審ニセサレ
 ハ必人ヲ誤ル容易ニ施スヘカラス若虚症ナレ
 ハ前症ノ如クナルニ犀角ヲ用ユルノ症アリ真
 武ノ類ヲ用ルノ症アリ此ニ症亦口傳アリ

○凡脚氣ノ禁忌亦水腫ニ同シ食禁ヲ嚴ニセサ
 レハ藥ストイヘ厄効ナシ能ク病者ニ告戒スヘ
 シ
 ○凡脚氣ノ症水藥口ニ入レハ即吐スルモノ是
 劇症ニシテ多ハ急變アリ又病勢イマ夕劇ナラ
 サルニ時々吐アル者は亦多ハ危篤ニ至リヤス
 シ能ク心ヲ用ユヘシ
 ○凡脚氣初發手足少シク麻痺ヲ覺ヘ或腸腸硬
 脹シ或少ク氣急或手足微腫シ或否ラス其脉實
 スル者擯蘓湯ヲ用ユヘシ其効却テ小擯榔湯ニ



優レリ蘇蘇散ニ用ユヘシ其故味マ小蘇散ニ

擯蘇湯方

即香蘇散ニ木瓜擯榔羌活木香ヲ加フル方

外臺小擯榔湯方 半夏生姜桂枝擯榔末以上四味水煎

○脚氣乾濕二症ニ拘ラス小水短澁ニシテ氣急

シ手足麻痺甚シク或膝骨弛緩スル者越婢加朮

苓湯ヲ用ユヘシ此症診候口傳アリ

方水腫中ニ出

若心下和シ難ク氣急スル者ニハ木瓜擯榔ヲ加

ヘ或吳茱萸桑白皮ヲ加フ或木茱丸ヲ兼用スル

ト一日夜ノ間三四錢ヨリ四五錢ニ至ル若脉症

虚候アリテ心下和シ難キ者ニハ附子ヲ加フ即

千金越婢湯ニ千金越婢湯ニ木瓜擯榔吳茱萸十

トヲ加フル症モアリ木茱丸ヲ兼用スルトモア

リ症ニ隨テ出入スヘシ

○脚氣乾濕二症ヲ論セス小水不利シ心下痞硬


最甚シク其状覆杯ノ如ク呼吸短促ソノ脉症實

ニ屬スル者外臺黑豆湯ヲ用ユヘシ大ニ奇効ア

リ然レ凡此症心下ノ候ヲ識得セサレハ用テ効

ナシ心下候口傳アリ方水腫中ニ出

○脚氣胸滿氣急シ其氣上冲セント欲スルモノ



大擯榔湯ノ症

大擯榔湯方

大擯榔

生姜

橘皮

呉茱萸

紫蘓

木瓜

右水煎

外臺大小擯榔湯方名ナレ近來醫流ノ探索ニ便ナランコトヲ欲シテ名ヲ命スルノミ

脚氣心ニ冲シ昏悶シテ死セントスル者桑白

皮湯ヲ用ユヘシ

桑白皮湯方

此方外臺方名ナレ假ニ其名ヲ命スルノミ

桑白皮

呉茱萸

右水煎

本方生姜アリ時ノ宜ニ隨テ加減

○京都六七年前ヨリ急劇ノ病流行シ人ヲソコ

ナウコ少カラス其症心腹脹痛シ或胸中痛裂カ

如ク腹攣急シ呼吸短促其状全ク結胸凡云フヘ

シ大抵形状右ノ如クナルユヘ時醫多ク大陷胸

湯ヲ用ユ予モ亦手段ナケレハ大陷胸湯ヲ用ユ


ル者凡五六人服藥ノ後暫時ハ病勢ユルムヤウ

ニ見ユレ凡ヤカテ前ノ如ク盛ニナリ其後ハ大

陷胸ノ類ヲ用レ凡即時ニ吐出シ次第ニ胸中ニ

上冲シ昏悶百苦シテ皆死ス其迅速ナルコト或三

日或六七日ニ過ス京師ノ俗コレヲ三日坊ト名



ク予屢ソノ病ヲ診スルニ其症結胸ニ似タレ凡
其脉結胸ノ脉ニ非ス皆浮虚或浮弱或沈微沈細
ニシテカナシ因テ思フ此症實ニ非スシテ虚ニ
下劑ノ宜キ所ニ非ス全ク脚氣ノ一種ニテ水毒
急ニ胸中ニ上冲スル者ト乃外臺卒上氣門ニ
テ桑白皮湯ヲ選ミ出シ專一ニコレヲ用ユルモ
ノ五六人或大便秘結ヲ苦ムモノアレ凡聊モ下
法ヲ行ハス始終此湯ヲ用テ救メテ得タリ其後
右ノ症ニテ脱候多キモノ五六人アリ乃本方ニ
附子ヲ加テ飲シム亦皆全ク安シ此症極急劇ノ

症ユヘ其梗槩ヲ記シ以テ参考ニ備ト云

○脚氣乾濕二症ヲ問ハス小水不利呼吸短促煩

悶スル者吳茱萸橘皮湯ヲ用ユヘシ 方水腫門ニ出

此症桑白皮湯ト大同小異アリ 診候口傳

○脚氣冲心ノ症桑白皮湯或吳茱萸橘皮湯ナト

用レ凡苦味ヲ惡テ嘔吐スルモノニハ沈香降氣

湯ヲ用ユヘシ然レ凡沈香交趾産ノ上品ニアラ

サレハ効ナシ


沈香降氣湯方

沈香 五分

縮砂 五分

香附子 一钱

甘草 五分



右水煎

不用鹽

或症ニヨリテ蕪子茯苓ヲ加

フルコアリ此症病勢最甚シキ者ハ本方ニ

一角ノ末ヲ兼用スヘシ大抵晝夜ニ三錢ハ

カリヲ用ユヘシ大ニ奇効アリ又水氣心胸

ニ畜滯シテ利シカタク呉茱萸橘皮湯十ト

用テ益通利セサルモノニハ半夏厚朴湯加

犀角ヲ用ユヘシ又疥癬内攻ノ腫格別喘滿

スル程ニ至ラス唯腹脹シテ利水シカタクキ

者ニ用テ妙シ

○脚氣上冲死セント欲スル症桑白皮湯ニ犀角

茯苓ヲ加ヘ豁胸湯ト名ケテ用ユ其効殊ニ著シ

此症心下急迫最甚キモノハ豁胸湯ニ沈香降氣

ヲ合テ用ユ若形病凡ニ虚シテ勢ユルキモノハ

真武湯ニ呉茱萸桑白皮犀角或甘草ヲ加ヘテ用

ユ診候口傳

右ノ二方或童便ヲ加ヘテ用ユルコトモ

アリ

○脚氣心ニ冲シ死セントスル者ヲ救フ方外臺

檳榔三顆末


生姜汁三合

童子小便

二升新者不須煖

右三味攪テ頓服ス劑ノ大小臨時ニ斟酌ス

ヘシ



○脚氣痿弱ノ症附子ヲ用ユヘキ症ニシテ千金
附子湯ナトヲ用ルニ胸中一物アルカ如ク胸肋
膨脹シテ却テ快カラサル者ハ千金越婢湯ニ木
瓜檳榔ヲ加テ用ユル欬甚シキ者ハ犀角麻黄湯
ヲ用ユヘシ此症ニハ二方凡炮附子ヲ用ユヘシ

犀角麻黄湯方

犀角^{二兩}

麻黄^{二兩}

甘草^{二兩}

茯苓

防己^{各二}

黄芩^{一兩}

石膏^{三兩}

附子^{一兩}

木^{二兩}

芎藭^{一兩}

防風^{一兩}

當歸^{一兩}

生姜^{三分}

細辛^{一兩}

桂^{一兩}

右水煎

○脚氣上冲氣急治シテ後麻痺痿弱スル者千金
附子湯ヲ用ユヘシ若氣急全ク去ラヌニハ檳榔
木瓜呉茱萸ノ類ヲ加ユヘシ若心下結聚久ク去
リ難キハ鼈甲ヲ加フヘシ

千金附子湯方

桂枝

芍藥^各

甘草

附子

木

茯苓^各


人參^{或代生姜}

右水煎

○脚氣冲心治シテ後痿弱最甚シク小水不利或
腫勢少ク小腹力ナク麻痺スルモノハ味丸ヲ用

味丸

論



方水腫中二出

ユヘシ煎湯トナシテ用モ亦可シ

○脚氣冲心治シテ後小腹疝瘕有テ下焦ノ氣メ
クラス痿弱麻痺久ク愈サル者アリ是千金附子
湯八味丸等ノ症ニ非ス其脉腹ノ虚實ト疝瘕ト
ヲ能ク候ヒテ寄奴湯ヲ用ユヘシ若心下痞硬脇
下逆滿等ノ症ヲ兼ハ具茱萸牡蠣乾姜ナトヲ加
フヘシ

寄奴湯方


桂枝 茯苓 柴胡 劉寄奴

○甘草 本無甘草今知之

右水煎

千金八所灸穴

風市 千金云令病人起正身平立垂兩臂
直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀
大筋上是 此法ノ如クシ穴ヲトルヲ婦
女子ナトノ忌嫌フモノハ別ニ一法アリ類
經圖翼云在膝上七寸外側兩筋間此法ノ如
ク曲膝頭ヨリ七寸上ノ髀ノ大筋ノ上ニ點
スヘシ兩筋ノ間トアレ凡是ハ千金ノ通り
大筋ノ上ニ定ムヘシ



伏兔 千金云令病人累夫端坐以病人手
夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際
當中央是 此法ノ如キハ即膝上三寸陰市
ノ穴之按ニ千金云陰市在膝上當伏兔上行
三寸臨膝取之ト此法ノ如シハ伏兔ノ上三
寸陰市ノ既ニ伏兔ヲ以テ膝上三寸ニ定メ
其レヨリ上三寸ヲ陰市ト定ムルコト明ケ
シ然ラハ臨膝取之ノ四字誤リ之甲乙經云
伏兔膝上六寸陰市膝上三寸是ヲ以テ考フ
レハ千金陰市ヲ以テ伏兔トシ伏兔ヲ以テ

陰市トシ前後相誤レル之今膝上六寸ノ法
ヲ以テ伏兔ヲ定ムレハ風市ト大抵相並之
然ラハ同シ胃經ナレハ膝上三寸陰市ニ灸
スルモ亦可ナランカ
擯鼻 千金云一云在膝頭下近外三骨箕
踵中動脚以手按之得窟解是 三里ノ穴ヨ
リ上ノ方へ押上レハ膝眼ノ下一寸ハカリ
ノ所ニ行トマル之其ユキトマリノ骨ノ下
ノクホカナル所ニ點ス
膝眼 千金云在膝頭骨下兩傍陷者宛



中是^下 足ノヒサ、ラノ下ニ兩眼ノ如ク、
 ホカナル所アリ其クホカナル所ニ點ス兩
 眼ノ如キ故膝眼ト云犢鼻モ形犢ノ鼻ノ如
 クナルユヘ名クル之
 三里 千金云、在膝頭骨節下一夫附脛骨
 外是^下 足ノムコウス子ノ骨ノ外ノ方ヨリ
 押上レハ膝眼ノ下三寸ハカリノ所ニテ行
 トマル之其ユキトマリノ骨ノ下ノクホカ
 ナル所ニ點ス又一法大指次指ヲ以テ膝ヲ
 圍シ中指ノ當ル所ヲ穴トス

上廉 千金云、在三里下一夫亦附脛骨外
 是 三里ノ下三寸之三里ヨリ斜ニ脛骨ニ
 ヲセテ附クヘシ
 下廉 千金云、在上廉下一夫 上廉ノ直
 下三寸ニ脛骨ニヨセテ附クヘシ
 絶骨 千金云、在脚外踝上一夫亦云、四寸
 是^下 外踝上四寸トイフモノヨシ外踝ノ上
 カトヨリ押上レハ骨ノタユルトコロアリ
 其骨ノタエメヲ少ハキホ子ノ考ヘヨセテ
 點ス



凡足部ノ穴ヲトル寸法ハ三里ヨリ解谿ニ
至テ折テ一尺一寸トスルヲ用ユヘシ千金
ニハ同身寸ヲ用ユレ凡足ハ足ノ寸ヲ以テ
量ルヘキコトニ
右八所ノウチ犢鼻膝眼ナトノ一穴ヲ去テ
三陰交ヲ加フルモ亦ヨシ三陰交ハ内踝上
三寸骨ニソウテ附クヘシ此灸痿弱等ノ症
大ニ驗アリ一穴ニ五十壯毎日灸スヘシ然
レ凡腫滿或上冲ノ氣味アリテ虚候多キモ
ノ灸宜カラス右ノ症去テ後唯脚弱又ハ膝

骨弛緩等ノモノ灸スヘシ腫滿上冲ノ氣味
アルモ實症ナラハ灸レテヨシ


○風毒亦脚氣ノ類之然レ凡此病實症多クシテ
虚症スクナシ其症脚腫或炊痛スルモアリ輕キ
者ハ檳蘇散熱氣カロク炊痛忍フヘカラス或皮
膚赤ク色ツキテ皮破レテ水モレント欲スルヤ
ウナルハ當歸拈痛湯ヲ用ユヘシ熱氣甚シク痛
モ准シテ甚シキ者ニハ越婢加朮湯ニ木瓜檳榔
ヲ加テ用ユヘシ此藥ニテ痛去リ難キ者ニハ
大黃一匁 黑牽牛一匁 甘遂五分 右三味ヲ糊ニテ

千金要方 卷之九 風毒脚氣



九シ毎夜一錢ツ、兼用スヘシ若脉症脱候アル
 者ニハ千金越婢湯ニ木瓜檳榔ヲ加テ用ユ此症
 ニハ下劑ヲ用ユヘカラス或桂枝附子湯ナト用
 エルノ症モアリ能ク三候六診ヲ審ニスヘシ
 當歸拈痛湯方
 羌活 當歸 猪苓 知母 白朮 澤瀉
 黃連 人參 隨症
加減 苦參 升麻 蒼朮 葛根 防風 蒼朮
 ○風茵陳 黃芩 藤甘草
 右水煎 實症ノ風毒硬腫シテ屈伸スヘカラス其痛咬

カ如クニシテ忍フヘカラス日夜號泣スルモノ
 禹功散ヲ用ユヘシ
 禹功散方
 黑牽牛 炒末五十目 小茴香 十枚
 右爲末和勻シ熱酒ヲ以テ送下スル一錢
 日ニ五六次頻ニ快下利ヲ得ルトキハ愈ユ
 凡一晝夜ニ五六錢ヲ用ユヘシ然ラサレハ
 効ナシ予屢試ルニ風毒ノ腫痛ハ牽牛ヲ以
 テ下スヲ上トス他藥ニテ快下ヲ得ルヲア
 阻レ凡其効牽牛ノ如ク速ナラス



○風毒ハ脚氣ノ類タリトイヘ凡唯水氣手足關節肌肉ノ間ニ凝滯シテ痛ヲナスハカリニテ脚氣ノ如ク冲心ノ患ナシ故風毒ハ病淺シテ治ラナシ易シ然レ凡性ニ脚氣ニ風毒ヲ兼タル症アリ此症單ニ風毒ノ治ヲ施シ却テ人ヲ誤ルコトアリ心ヲ用テ診候スヘシ治法口傳アリ

藥品説

木 高良薑 脾氣ノ虚ヲ主トスルハ白朮ヲ用

高良薑ヲ用ユ七 利水除濕行氣ヲ主トスルハ蒼朮ヲ用ユモ凡日齊醫心スルモノ


草木橘皮

脾氣ヲ和シ行ラスハ陳皮ヲ用ヒ 鬱氣ヲ快クシ行ラスハ青皮ヲ用

ユ

劉寄奴 本草家乙切草ヲアツルノ説アリ


又ハンコン草秋ノキノ草ヲ劉寄奴ニアテオトキリ草ヲ小連蕘ニアツルノ説アリイツレカ是ナルヲ知ラスコレヲ試ルニ乙切草効アリ故乙切草ヲ用ユ



導水瑣言

會章齋藏

會章齋藏



導水瑣言 畢


隱書... 本草... 味... 刺... 用...

三都

發兌

書肆

同 日本橋通貳丁目	須原屋茂兵衛
同 日本橋通貳丁目	山城屋佐兵衛
同 日本橋通四丁目	小林新兵衛
同 浅草茅町三丁目	金花堂佐助
同 芝神明前三嶋町	須原屋伊八
同 芝神明前	和泉屋吉兵衛
大阪心齋橋安堂寺町	岡田屋嘉七
京寺町通松原下丸	秋田屋太右衛門
同 町	梅村三郎兵衛
同 寺町通高辻上丸	勝村治右衛門板
	同 伊兵衛




特 1
836



国立国会図書館 タイトル『導水瑣言』 請求記号 特1-836

ガラス使用



国立国会図書館 タイトル『導水瑣言』 請求記号 特1-836

ガラス使用