



漢書卷之九十四

卷之九十四

寒

寒為天地殺厲之氣故見於冬則為水為霜草木因之而摧敗鳥獸  
各巢穴以自居氣體虛弱之人或調護失宜衛斥道遠一特為寒氣  
所中則昏不知人口噤失音四肢圖直卒急疼痛或酒酒惡寒身  
發熱面赤若有汗五臟之極者皆能有所中也是時多淫而陰被風  
則脈帶浮收量不仁蕪溫則脈濡明四肢腫痛治瘳之法只宜以姜  
附之藥溫散寒氣切勿不可安有吐下如舌卷囊縮者難治  
和劑方治體虛中寒昏不知人及肢體冷痛霍亂轉筋一切  
虛寒並皆治之

乾姜一兩

附子生去皮臍細切一敬

右以咀每服二升水豈平煎土分食前溫服

三白散

和劑方治感冒寒邪頭疼身痛項背向急惡寒嘔吐或

有腹痛又加傷寒發熱頭疼惡風無脈內傷生冷外感風寒及雙  
客于經絡腰腹酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷三兩

陳皮去血六兩

厚朴去皮姜製四兩

桔梗去芦十二兩

枳殼去穢炙炒六兩

川芎

甘草炙

姜炙去皮各三兩

蒼朮米泔浸去皮二十四兩

當歸去老三兩

麻黃去根節分 肉桂去皮

芍藥各三兩

乾姜四兩

半夏湯洗土灰三兩

右艾明每服四錢水一盞半姜三片葱白三根煎七分熟服胃寒用蝦姜秋氣則加藥更婦人調經催產則入艾醋

和劑方治五臟中寒口禁失音四肢強直

治尸厥喘咳

氣刺痛

人參

乾姜炮

甘草炙

白朮各等分

右艾咀每服四錢水一盞煎服

三因方加附子各附子理中湯

和劑方治傷寒陰虛遺精寒熱

治氣逆冷

半夏

厚朴各三兩同為末以生薑四兩研爛同為餅子

花荵香葉

白朮

陳皮各二兩

甘草炒土錢

右為細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分熟

服常服順氣寬中除痰

# 重刊袖珍方大全一卷

○暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心是以暑之中人先著於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頭痺入脾則昏腫不覺入肺則喘滿發熱入腎則消渴其脉多沉伏一時昏中者切勿便與冷水并引濕地古法尚以熱湯先灌及用布衣蘸熱湯熨脊下及氣海結續以湯林布上令煖氣透徹脐腹俟其甦省進以黃連香薷散五苓散若体虛者冷香飲子霍亂吐瀉來復用二氣丹夾食則州胃苓湯若挾風則其脉沉而浮蓋有搖擗當於黃連香薷散內加羌活煎服却不可作鷓鴣瀉治之多致不救此方乃散代累用之而有驗者若採途中卒然暈倒急扶在陰涼處搦人中蘇合香散土撥明作 藪令人尿於其中以待求執湯并生薑或大蒜各一塊剖爛以湯送下立醒

和劑方治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如神恍惚如衣紗又名辰砂五苓散

澤瀉二十五兩 肉桂去粗皮十兩 赤茯苓去皮十五兩  
白朮去粗皮十五兩 猪苓去粗皮十五兩

右為細末每服三錢熱湯調下不拘時

**香薷散** 和劑方治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並治之一方又加黃連四兩用姜汁同炒令黃色各黃連香薷散如有搖擗如羌活煎服

白扁豆微炒半斤 厚朴去皮姜汁炙熟半斤 香薷去土一斤

右以咀每服三錢水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服

**大順散** 和劑方治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臍腹不調

甘草三十斤 乾姜四斤 杏仁去皮尖炒四斤 肉桂去皮四斤

右先將甘草用白芷塗炒及八分黃熟炭入乾姜同炒却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩篩淨後入肉桂一石如打碎為末每服三錢水一中盞煎至七分溫服如煩燥并花水調下不計時候以沸湯點服亦可

**和劑方** 治中暑伏熱煩渴引飲無厭心煩口乾

**枇杷葉** 去毛炙半兩 香薷七錢半

麥門冬去心一兩 丁香半兩 甘草炙

乾木瓜各一兩 陳皮去白焙半兩 厚朴去皮姜汁炙兩

右為末每服二錢水一盞薑二片煎服煩燥冷水調下

**消暑散** 和劑方治伏暑引飲脾胃不利

半夏醋者二斤 甘草生用 茯苓去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為丸如梧桐子每服五十圓熱湯下

**和劑方** 治上熱下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

消石一兩同煎黃為末入乳器內以微火炒用柳條搗不可

夫大過心傷藥力再研極細各二氣末

太陰交精石研飛一兩

五靈脂水澄過砂石兩乾二兩

舶上硫黃透明者一兩

青皮去白二兩 陳皮去白二兩

右用五靈脂二搗皮為末入交精石末及前一氣末拌勻好醋打糊為丸說巨大每服二十九空心米飲下

**三氣丹** 濟生方治伏暑傷冷三氣交錯中脘痞結或泄或嘔

消石 硫黃各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸梧桐子大每服四十九粒新井水下不拘時

**益元散** 御藥院方治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃院積熱

滑石六兩好者 甘草微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白煎

**桂木自靈散** 御藥院方治伏暑引飲過度腹肚膨脹霍亂瀉利並

比日治之

白茯苓去皮 白朮 滑石研各二兩 蜜水石研 甘草炙 肉桂去皮半兩 附子炮去皮二兩

右為末每服三錢執湯冷任下入蜜少許亦好

**冷香散**

附子炮去皮 甘草炙 肉桂去皮半兩 附子炮去皮 橘紅各一兩

右為末每服一兩水二錢執湯冷任下入蜜少許亦好

**成霍亂之證**

甘草炙半兩

右為末每服一兩水二錢執湯冷任下入蜜少許亦好

**成霍亂之證**

良姜二兩

右為末每服五錢以水二升煎干數枚於瓶內沉井底代熱水服

丁香一錢

白豆蔻五箇去殼

右為末每服五錢以水二升煎干數枚於瓶內沉井底代熱水服

大能消暑止渴

**和劑方** 治胃暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

白朮 白茯苓各半兩

右以咀每服四錢水一盞薑五片灯心十根煎八分不拘時服

**黃龍丸** 和事方治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連去頭三十二兩

右為連以酒煮乾研為細末透心為丸如梧桐子每服三十丸

水吞下

不食  
六黃散  
一匙方治中暑身熱頭眩狀如脾寒或煩嘔吐昏

柏上流黃

消石各一兩

白礬

消石各半兩

白麩四兩

雄黃半兩

右五味研末入麩和勻滴水丸如梧桐子每服三十九新水下

十未百... 一匙方消暑氣和脾胃

香薷一兩

人參去芦

陳皮湯泡去白

白朮

黃耆去芦

白扁豆炒去殼

甘草炙

石膏碎姜汁製炒黑色

乾木瓜

白茯苓去皮各半兩

右為末每服二錢熱湯水任調下

桂枝湯  
御藥院方治中暑暈倒水過多心腹脹滿小便赤少

肉桂去皮

赤茯苓去皮各五兩

右為細末每服九每刀作十九每服一九細嚼白湯冷水任下

利刺方消暑氣除煩渴

宿砂仁四兩

物首二兩

烏梅肉四兩

白扁豆二兩

草菓黑美殼

甘草炙各四兩

右父祖每服四錢水一大碗煎八分以水沉冷服

桂枝湯  
張子和方

官桂五兩

人參去芦

藿香各半兩

茯苓去皮

白朮

甘草炙

芍藥

澤瀉

石膏

寒水石各一兩

骨石二兩

木香一分

右為細末每服三錢白湯下新水生姜湯亦可

白濁湯  
徐同和方治伏暑嘔吐

石膏四兩研

知母一兩半

甘草一兩

梗米一合

右為散每服一兩水二盞煎至一盞不拘時洗眼如伏暑作症  
熱夫蘇宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或更冷物皆宜  
在脾不養解令日作寒條此熱渾身洒漸宜加桂前服出汗便解  
宣明方治傷寒中暑大汗後昏中乾煩躁不得眠

猪鬃去皮

茯苓去皮

白朮各半兩

桂一分去皮 澤瀉一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈如消石二兩甚甚而心不得服者加河膠半兩此夏月大暑新水調服立愈

**香薷散** 和育方治大人小兒傷暑者伏熱躁渴或惡頭目昏眩或嘔煩滿嘔或惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐痢專飲宜服

香薷安生

蘇蘇去腫

木瓜各一兩

丁香

伏神去木

檀香

藿香葉

甘草各十錢

右為細末姜汁梧桐子大每服五十九水下一方每兩作三十丸每服一圓至二圓初發濕湯下或新汲水化下

**五寶香薷散** 直育方治暑者和中通用

香薷去土三兩

白扁豆姜製炒

厚朴去皮姜製炒

白茯苓去地各一兩半

甘草一兩

右咬咀每服水二盞煎至一盞去渣溫服

**香薷散** 直指方驅暑和中除煩止渴

縮砂

草菓

烏傷肉

香薷

甘草各一兩半

白芍藥

白扁豆各一兩

右剉每服三小生姜五厚片水煎去滓微溫服

**利藥石膏湯** 和劑方治伏暑內外熱煩躁大渴

方見傷寒門

**香散** 醫方集成治暑熱霍亂專治頭煩渴門亂用和劑方中

霍香正氣散黃連香需散各用生薑每服

黃連香需散方見傷

黃連香需散方見本門

**香散** 名甘草二兩惠方治暑者迷惘尚人事及泄瀉霍亂作

渴一服即愈亦能解暑

白凡生一兩

五倍子生一伍五味子烏梅各二兩

甘草一兩半炙一方生飛羅麩二兩方用清明白麩九佳

右為末入飛羅麩拌勻每服二錢新水調下霍亂易名霍亂散

一方加柯子肉滴水九加彈十大細前水下各散死丸

香朴散 聖惠方治大人小兒伏熱吐瀉霍亂

人參去芦

茯苓去皮

甘草炙

紫蘇葉

木瓜

澤瀉

香薷去皮

半夏麩

白扁豆炒

陳皮

烏梅肉

厚朴各四兩

右以咀每服一兩水二錢犀角三斤棗子一个煎至一匙去渣食前熱服

桂枝湯 宣明方治月暑溫熱吐瀉轉筋腰痠小兒亦可服

官桂半兩去皮

茯苓一兩去皮

白朮五兩

甘草二兩炙

澤瀉一兩

石膏

白朮水石各二兩

滑石四兩

猪苓一兩

右為末每服二錢熱湯新汲水或生薑湯調下切庭瑞方不用猪苓

加米五錢 濟生方治伏暑熱二氣及月暑溫熱瀉注下或煩或渴或小便不利

赤茯苓去皮

澤瀉

猪苓去皮

官桂不見火

白朮各一兩

甘草炙

右以咀每服一兩水二錢犀角三斤棗子一个煎至一匙去渣亦可

玉冰燒餅 張子和方 治暑

寒水石

滑石

石膏

磁石各四兩

甘草一兩

右為細末每服五錢新水調服

六和湯 和劑方治心脾不調霍亂轉筋嘔吐泄瀉家熱交作痰喘咳嗽胃膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫暑外感忌小便赤澀并傷寒陰陽不分月暑伏熱煩悶或成痼疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並服

縮砂仁

半夏湯泡七次

杏仁去皮尖

人參

甘草各一兩

赤茯苓去皮

藿香葉去土

白扁豆姜汁炒

木瓜各二兩

香薷

厚朴姜汁製各四兩

右以咀每服一兩水二錢生薑二片棗子一枚煎至一匙去渣

服不拘時候

**治喉痛**

痛不可忍，長轉在地，或起或仆，其腸絞縮，結喉

此是中毒之深，須更令人死。古方各執，霍亂急聖藥，用並一兩。

**右方** 湯調，灌入病人口中，益氣一到，腹中腹即定。

**又方** 經驗方，治絞腸痧。

陳文

陳文

陳華王等分

**右方** 未水前，瀉派系，連進三四服，即安。

**又方** 經驗方，治急心，痛絞腸痧，腹痛嘔吐泄瀉，及霍亂，心胃煩渴，不省人事。

右用馬糞，其研同，蜜搗，過用新水，下流，手即愈。

**治絞腸痧**

手足厥冷，腹痛不可忍者，以手蘸溫水。

於病者，臍內拍打，有紫黑點，必以針刺去，惡血即愈。

○濕

濕之為氣，沖溢天地之間，流注四時之內，體虛之人，或為風雨所襲，或卧卑濕之地，遠行涉水，或感山澤蒸氣，或汗出衣重，表冷則浸膏脾，腎行於所中，傷者，肢有腰痛，身重如坐水中，小便不利，若脾則四肢浮腫，不得屈伸，若挾風，則肢暈，振感心悶，煩熱，寒則拳攣，擊痛無汗，惡寒帶暑，則煩渴引飲，心腹疼痛，面垢惡寒，九感濕之証，其脉多沉緩而微，其証多四肢倦怠，食不舉，法當諒利，小便為先，失不可輕易汗下，并用火攻，若有泄瀉等証，又當於各類求之。

**泄瀉** 和劑方，治寒濕所傷，身體重者，如坐水中，小便赤澀，大便溏。

蒼朮 米泔浸

白朮

甘草 炙各二兩

茯苓 去皮

乾姜 炮各二兩

橘紅

丁香 各二錢半

右交咀，每服四錢水一盞，薑棗一枚，姜三片，煎七分，食前溫服。

**利** 腎者湯三因方，治腎虛傷，身重腰冷，如坐水中，不渴，小便自

乾姜炮

白朮各二兩

茯苓去皮各四兩

甘草炙

右以咀每服四錢水一盞前七分空心温服

**大瀉湯** 濟生方治坐卧濕地或為雨露所籠身重脚弱關節疼痛熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑澹泄

白朮二兩

人參半兩

乾姜炮

白芍藥

附子炮去皮脐

白茯苓去皮

桂枝不見火

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分不拘時温服

**大瀉湯** 宣明方治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩

橘皮去白一兩半

木香二錢半

滑石六兩

澤瀉

茯苓一兩去皮

木猪苓去黑皮

甘草二錢

白朮

官桂各半兩

右為木每服五錢水一盞生姜五片煎至六分去滓食後温服

**天麻湯** 和方治風濕相搏腰膝疼痛四肢重著不嘔不渴

便取發小便自利

甘草炙二兩

白朮四兩

附子炮去皮脐薄四片一兩半

右以咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分空心温服

**五苓散**

和劑方 方見暑門治湯濕有熱小便赤少

**白黃耆湯**

和劑方治風濕相搏客在皮膚四肢乏力關節煩疼

防己四兩

黃耆百五兩

甘草炙二兩

白朮三兩

右以咀每服五錢水一盞姜棗同煎七分熱服不拘時

**除濕湯**

百一選方治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便澹泄小便或澀或利

半夏麴炒

厚朴姜製

蒼朮米泔製各兩

藿香葉

陳皮去白

白茯苓去皮各二兩

甘草炙七錢

白朮生用二兩

右以咀每服五錢水一盞姜七片棗一枚煎十分食前温服

**生附湯**

直指方治受濕腰痛

附子生二錢半 蒼朮炒 杜仲姜心各半兩  
牛膝酒浸焙 厚朴姜製 乾姜生

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚食前煎服 甘草炙三錢半

羌活去芦 附子炮去皮臍 白木

右咬咀每服五錢水一盞半姜五片煎七分溫服不拘時

等分二散 本事方治濕氣傷腎肝氣不調自然生風遂成周濕  
流注四肢肌肉疼痛

薏苡仁一兩 當歸 茵芋 小川芎  
乾姜 川烏 甘草

官桂 麻黃 人參 防風  
白木 獨活各半兩 羌活

右為細末每服一錢空心臨臥酒調下日三服

白木三因方治中濕骨節疼痛

右白木一兩酒三盞煎一盞煩服不能飲酒以水代之

麻黃去節湯浸三兩 杏仁十六箇去皮尖 甘草炙各二兩  
白木四兩 桂心

右咬咀每服五錢水盞半煎土分食前服

附子炮去皮臍 扶苓去皮 白木 桂心各等分  
乾姜炮 澤瀉

右咬咀每服五錢水一盞煎七分空心服

扶苓去皮 白木 乾姜炮  
甘草炙 桂心各一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分食前服

白木 扶苓去皮 乾姜炮

細辛

烏梅去核

桂心

乾葛

甘草炙

陳皮

右為末每服二錢白湯調下

**御藥院方治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸**

附子炮一錢

肉桂八錢

白木六錢

甘草四錢

右咬咀每服半兩水一盞姜五片煎八分溫服

**直指方治感寒濕頭目眩暈**

官桂去麋皮

甘草炙各二錢半

川芎

附子炮

白木各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜十片煎八分去滓食前服

**治寒濕傳於經絡疼痛不可忍**

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸各六錢

水蛭碎炒各烟尽

麝香各一錢

虎胫骨酥炒黃五錢一方用虎骨

右八末為末和勻每服三錢溫酒調下食前服  
**接粹方治痺濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤泄**

葶藶四兩

防己二兩

一赤茯苓二兩

木香半兩

右為末棗肉為丸梧子大每服三十丸煎桑白湯下食前

**接粹方六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱**

相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟難舉不能動行步不正兩足歌側以此藥主之

黃耆一錢半

黃連一分

大倉木一錢米泔浸

五味子九箇

白木半錢

橘皮半錢

人參三分

麥門冬二分去心

當歸二分

生地黃二分

神麵二分炒

白茯苓三分去皮

猪苓二分

酒黃柏一分

柴胡一分去苗

升麻三分

甘草二分炙

澤瀉半錢

右咬咀每服半兩用水二盞煎至一盞去粗通口服食前  
**接粹方**治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脈緊急津液  
凝澁便溺不利目赤癢疹疽癰發背疥癬走注脚氣无首尾瘡毒  
不可盡述

續稿

得遂

歲灵仙

赤芍藥

葶藶各二兩

乳香

沒藥各一兩

牽牛五錢

火戟炒三兩

陳皮去白四兩

右為末麵糊丸如桐子大每服五十九加至七十九九溫水下食  
前得更衣止如服藥前後忌酒二日藥後亦忌濕麵三兩日食溫  
淡粥補胃尤佳經驗良方有澤瀉青皮無葶藶

**治諸濕**接粹方如腎痛項強腰似折項似拔上衝頭痛及足太  
陽經不行

羌活去芦

獨活一錢去芦

葶藶本半錢

防風半錢去芦

蔓荊子三分

川芎一分

甘草半錢炙

如身重腰沉沈然乃經中有濕也加黃柏一兩附子半兩  
水二盞煎至一盞去渣溫服食后

**治諸濕**接粹方治濕氣下注者因久坐久立陰濕之地坐則當風  
晚靴鞋肯成脚氣若暑月久立濕熱野萊菜滯不和與熱冬月  
氣少麻或疼痛肉亂時陰身發當貴人亦有此用驗

澤瀉木一兩半

玄胡索一兩

蛇粉三兩

陳皮一兩

右為末每服二水煎黑豆五十粒以湯一鍾生薑三片煎至五分  
去滓調服

**治諸濕**接粹方胃有太寒手足夏月盜出未解裙衫忽覺熱  
遂致濕入腎經外腎腫脹背曲多醫以五苓散一貼入服脂膏少  
許下青木香丸一貼如此三服服時不過腫消腰且痛告自木香丸  
方見氣明

**治諸濕**接粹方治寒濕合而成痺脚痛不仁疼痛少力足不  
穩痛不能起地腰腿筋牽不能屈伸及項背拘急于臂无方耳內  
蟬声頭眩目旋諸証脚氣行步艱難宜服

木心内

虎胆骨酒炙

鼠香脂

甜瓜仁

安息香豆乃酒熬

右为天酒糊为丸如桐子大每服三五十九木瓜汤下温酒引得

御染院方治经终凝滞骨节疼痛筋脉挛急遇冷寒愈

痛

乳香另研

当归

血竭二末半另研

右为末用木心一抄切破去子入乳香二钱末在内麻缠定无

透气好酒二升煮酒温取木瓜去皮研入蜜拌和丸如桐子大每

服三五十九酒下

獨活寄生湯

治生方治腎氣虛弱公利濕地腰背拘急筋骨疼痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺痿弱疼痛

血竭研

木香

骨碎補去毛

敗龜炙

乳香五錢研

地龍二刀去土

肉桂各二刀

當歸

赤芍藥

虎骨酥皮各二兩

沒藥另研

熟地黃

桑寄生知无續斷代杜仲炒去絲

細辛去葉

桂心

人參各二兩

烏藥

熟地黃各二兩

甘草炙半兩

防風去蘆

秦艽去芦

獨活三兩

牛膝酒浸

茯苓去皮

地骨

當歸去皮

右咬咀每服一兩生薑三片水二盞煎一盞去渣通口服

和劑方治男子婦人脚气停滯同濕客痺脚氣受濕氣不流

行皮頭面腫浮兩肢腫滿少腹脹脹上氣促急腹脇如鼓膝脛脹心

有妨飲食上肢半旺來去不定卒動喘乏並治之

六膠皮

五加皮

地骨皮

生髮皮

茯苓去皮

黃芩

白木

黃連各三錢

澤瀉三錢

枳實炒去穢

神麩 各五錢

大黃一兩

右件為細末場浸蒸并為丸知梧桐子大每服五六十丸溫水下

食遠

大黃

黃芩各三兩

滑石

粳米半頭末各四兩

去溫性腹痛泄水溫腫痛久兩則加甘草一兩

去遍身走疰腫痛加白芥子一兩

退熱散腫毒止痛久早宜加刺消一兩

散結消阻悶即泄腸胃行滯氣通血脈加郁李仁一兩

大腰腹沉重加樟柳根一兩

石為末求九桐子大每服五十九加至一百丸臨卧溫水下

天麻散秘方治風濕痠痛黃腫

天麻

全蝎各四錢

地黃

木瓜各三錢

沒藥

乳香

川山甲各一錢

川芎

烏頭各二錢

牛膝二錢酒浸一宿

當歸二錢

右為末每服三錢空心溫酒調開

○傷寒

傷寒之證固有天時流行一時所感病無老少皆相似者然多是本  
重勞殺之人冬月值年道途不謹調護以至為風寒所傷其毒藏伏  
於內不即發見或為熱所擊搏然後發而為病故經去冬息寒春發  
溫者是也其為證有陽有陰有表有裏又當知受病不同傳變不一  
其發也未有不自頭疼發熱自汗惡寒而如者若發於大陽即熱而  
惡寒發於大陰止惡寒而不發熱也傳陽則潮熱任言如有所忌其  
脉多長浮變陰則舌強不語手足厥冷多有自利其脉多沉細傷寒  
為治雖曰有法又須問證以察於外切脉以審於內故在表宜汗之  
在上宜汗之在裏宜下之在半表半裏者利解之其固一定之法也  
又須考得病之日傳變之期方可施治二日至三日病在皮膚者為  
表宜麻黃桂枝之類變散邪特汗之後脉靜為愈有汗不得服麻  
黃無汗不得服桂枝仲景至切之論不可不謹四日五日之間病在  
胃腸發氣緊滿於心胃以瓜蒂豆豉之類吐之血愈六日七日之閒  
其病入腹傳胃藏腑結燥正言潮熱須大黃芒硝之類下之而愈古  
今治法總曰如此却又有得病之日便四肢厥冷名為陰厥欲絕者

丹田氣海大寒之又有徑口微厥而後發者為熱厥甚苦黑是  
燥考今人多以水清布帛重疊於之若熱頻頻更候候去執其亦良  
法也又有不厥而即變陽證或胸腹走刺牽引疼痛坐臥不安胃氣  
喘息則又不可拘以日數即宜下之又有六七日大脈證浮上不能  
食其脈細者皆自當下却有頭痛惡寒者上有汗或小便清利乃表  
證未除仍宜汗之或裏寒表熱或裏熱表寒皆當先救其裏後治其  
表寒汗而反下之則逆高者裏或為涼血發血為狂而者有之結胸  
乃証為結胸者有之結胸者心下聚滿而痛按之如石手不可所痞  
者因聚滿而不痛証非用藥却未不同若應下而反汗之則津  
液枯竭文有仁陽證諸者證証為實其証言云虛右應吐而反溫之則  
毒氣鬱結於胃發而為斑其色多紫者佳黑者即死脈應有榮若  
不辨其餘陽証其傳變審而行之則必致錯亂怪証日出流而為嘔吐  
傷寒之不一救以此傷寒一證不可不謹病愈之後切不可輕用佈  
藥尤忌其苦辛勞陽飲食過度因之再作亦易治也致有肢氣度飲  
食積而致西証與傷寒相類更宜審之但肢氣則肢勝軟痛卒之即  
倒痰飲則頭不痛項不強食積則身不痛手足麻痺則不惡

桂枝

寒身不痛為異決不可有誤治傷寒治之其中亦各功正一端發果  
舉其說以辨倉卒其詳又當於仲景論中千金百問內求之自感胃  
本與傷寒治證一同但有輕重之不同耳故重者為傷輕者為感上胃  
之中有凡有寒又百詳別天感寒則必惡寒面色黧孫項背拘急亦  
或頭痛發熱其脈沉遲當以五積散香正氣散養胃湯衣之感風  
則以惡風面色光浮身熱如雁單寒發重時引清涕或咳唾稠  
粘其脈多浮數當以十神湯敗毒敗治之或風寒兼之又當門和鮮  
之藥休虛之人不可過於發散恐致他疾并不于後審之審之  
麻黃湯治人方治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗  
杏仁七十个去皮炒別研如膏 麻黃去節三兩  
甘草炙一兩 肉桂去皮二兩

右為粗末入杏仁膏令勻每服三升水二匙煎八分溫服

桂枝湯 和劑方治傷寒太陽經受病頭身痛或身熱發熱或酒  
酒惡風

桂枝 芍藥各二兩 甘草 兩炙

右以水一斗每服三升水一匙要安三升藥一投前七分去滓溫服不計

時症唯春初可依此方自春未至巳前宜加黃芩半兩至至  
加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減  
無汗休服

五清散和劑方一方見寒門 治傷寒頭痛發熱惡寒  
亦黃連散各半湯活方治傷寒白發熱惡寒如瘧狀但不嘔小便  
清利六脈雖微四惡寒此乃陰陽俱虛不可更發汗及吐下此藥主

桂枝一兩 麻黃去根節 芍藥  
生薑 甘草炙各五錢 杏仁二十

右父咀每服五升水煮取前八分溫服

柴胡一兩三升 桂枝去皮半兩 黃芩半兩  
甘草一升 生薑半兩 人參半兩  
半夏四升 大棗一枚 芍藥一兩  
右剉每服五升水煮取前八分去滓溫服

十神

和劑方治時令不正臨夏交行感冒發熱或欲出疹以成  
問法陽心感風寒普服之

川芎 甘草炙 麻黃去根  
乾葛 紫蘇 升麻  
赤芍藥 白芷 陳皮

右咬咀每服三升水煮取前七分去滓熱服不以時候如  
發熱頭痛如連綿者白芷兩氣實加枳殼煎  
和劑方治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇葉 香附子各二兩 陳皮一兩  
甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一錢藥湯前七分空心熱服如頭疼如出言

人參散和劑方治傷寒頭痛壯熱惡寒及風寒咳嗽鼻塞重  
如心登惡熱口舌乾燥者加黃芩  
柴胡去白 甘草炙 桔梗

人參去芦

羌活去苗

芎藭

茯苓去皮

枳殼去核炒

前胡去苗洗

獨活去苗各等分

右以咀每服三錢水一錢薑三片薄可少許同煎七分去滓不拘時

升麻為湯和劑方治大人小兒特氣瘟疫頭痛發熱及發冷身發

未發疑信之間並宜服之

川升麻

白芍藥

甘草各二兩

葛根十五兩

右以咀每服三升水一盞煎七分去滓熱服不拘時

和劑方治時行瘟疫壯熱惡凡頭痛體疼昏冥頭乾發

柴胡去芦

前胡去芦

乾葛各七兩

荆芥去梗七兩半

赤芍藥去芦

石膏各各一兩

升麻五兩

桑白皮

黃芩去皮各一兩

右以咀每服五錢水一錢薑三片煎十餘粒煎服

和劑方治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐利

陳皮洗

厚朴去皮制各四兩

薑本

桔梗

甘草各半斤

蒼朮去皮一斤

右為粗末每服二升水盞半姜棗煎七分不拘時熱服

和劑方治四時傷寒頭疼發熱及寒雍咳嗽鼻塞聲重

荆芥

白芷

陳皮去白

麻黃去節

蒼朮各四兩

甘草各二兩

右以咀每服五錢水一錢薑三片葱白三莖煎七分不拘時如咳

嗽加烏梅煎

和劑方治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急胸膈煩悶

葛根四兩

麻黃去節三兩

肉桂去皮一兩

甘草灸

黃芩

芍藥各二兩

右以咀每服五升水一盞束束一枚煎八分去滓熱服

和劑方治四時傷寒頭疼發熱惡寒多汗嘔逆惡心

人參去芦

茯苓去皮

甘草灸

陳皮去白

藿香去土

白朮去芦

右林去皮姜製

半夏湯洗七次各一兩

**十味和氣散**

楊氏家藏方治頭痛發熱發散寒和

白木二兩

桔梗一兩

人參去芦

甘草炙

當歸洗焙

陳皮去白

枳殼去核炒

赤芍藥

防風各二兩半

右林姜製半兩

右咬咀每服四升水一盞姜三片葱三莖煎熱服不拘時

**人參養胃湯**

和劑方治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏倦不

問月寒二訂夾食停變俱能治之但感風邪以微汗為度

半夏湯洗

右林姜製去皮

橘紅七兩半

蒼朮米泔浸兩

藿香白葉去土

草果去殼

茯苓去皮

人參去芦各半兩

甘草炙二兩半

右咬咀每服四升水盞半姜七片烏梅一箇煎六分熱服兼治

食傷脾証為瘧寒多者加附子各十牙不換金散

**五續文加感**

濟寮方治內感風寒上膈發熱

**生料玉積散**

人參敗毒散二料等分

古和勻每服四升水一盞姜五片棗一枚煎八分溫服

**十味膏瀉散**

濟寮方治四時傷寒發熱頭痛

川芎七兩

紫蘇葉

乾薑各半兩

桔梗生二兩半

柴胡去芦

茯苓去皮各半兩

甘草三兩

半夏六兩湯洗

枳殼炒三兩去核

陳皮三兩半

右咬咀每服三升姜棗煎服

**神味散**

和劑方治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼朮米泔浸五兩

蒼朮本去芦

香白芷

細辛去葉土

羌活去芦

川芎

甘草炙各二兩

右為細末每服三升水一盞姜三片葱三寸煎七分溫服不拘時

如傷風鼻塞用葱茶調下

**中氣散**

簡易方治感冒風溫之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠欠

伸出淚

蒼朮木片浸沙六兩荆芥穗二兩  
甘草一兩不平

右咬咀每服五升水一盞煎八分去滓執服不拘時

解肌熱寬中快膈或然或勞瘵潮熱往來並能治

木香 茶蘇葉 乾葛洗 人參去芦 桔梗去芦

半夏湯洗七升姜製前貼去毒

茯苓去皮冬七升半枳殼去穢炒

甘草冬 陳皮去白各半兩

右咬咀每服四升水盞半姜七片棗一枚煎六分去滓執服不拘時

時易簡方以氣盛者不用木香

旋覆花去梗三兩 荆芥穗四兩 麻黃去節 赤芍藥

前胡去芦各三兩 甘草冬 半夏湯洗七次姜汁浸各二兩

右咬咀每服五升水盞姜三片 棗枚煎八分溫服

服除山嵐瘴氣 和劑方治傷寒頭痛增寒壯熱或感風濕痺痛

大腹皮 白芷 茯苓去皮 厚朴皮製

紫蘇去土 藿香三兩 陳皮去白 苦梗

白朮 半夏湯各三兩 甘草冬二兩半

右咬咀每服五升水一盞煎八分去滓執服

借加推本方治傷寒體熱頭痛及風確痰軟咯等

甘草冬三兩 人參 桔梗

青皮去穢 白芷 乾葛

白水各三兩 乾葛炮炙半 一方加豆豉

右咬咀每服三升水一盞煎二片棗一枚煎七分去滓執服

未霍亂吐瀉下利示白心宜服若吐逆方不飲水土者宜高服之

厚朴去皮製 藿香 甘草 陳皮去白各等分

半夏煮 蒼朮木片浸

右咳阻每服三升水 薑三片 棗二枚 前七分去滓 食前熱服  
鼻窒咳痰涎出風者 凡此並治之

川芎 蒼朮 水浸 白朮 各二兩  
麻黃 去根 即三兩 甘草 炙 石高 月吸

古咳阻每服五升水 生薑三片 葱白二寸 前七分去滓 不拘時  
如欲汗 井進數服

喘而治肺經受寒 湯嗽喘急 肺氣乾 嘔吐 痰壅  
半夏湯洗 吹二兩半 乾姜 炮 內釋 黍黃

細辛 去葉 麻黃 去根 節 甘草 炙 各二兩 五味子 二兩

右咳阻每服五升水 辛前七分去滓 後溫服  
麻黃 三兩 去節 桂枝 去皮 甘草 炙 各二兩

杏仁 去皮 二十个 大棗 五个 生薑 兩

右咳阻每服五錢水 薑三片 八分 去滓 溫服 取汗 為度 不可過汗

惡亡陽也 若汗多 不用 湯粉 撲之  
便或利 或瀉 或嘔 或咳 已 汗 不 止 仍 發 熱 一 半 松 季 頭 目 眩  
暈 昏 由 渴 後 飲 水 停 中 院 所 致 並 皆 治 之

附子 炮 一个 用 四分 之一 唯 者 之 加 生 姜 一 升 半  
茯苓 比 示 半 去 皮 小 侯 利 者 去 之 生 姜 七 升 半

白朮 五升 咳者 五味子 七錢 半 細辛 乾姜 各 三錢 半  
右咳阻每服五升水 辛前八分 溫服 不拘時  
四逆湯 和劑方 始傷寒 自利 脈微 欲 絕 手足 厥 冷

甘草 炙 二兩 乾姜 一兩 半 附子 去皮 臍 半 兩  
右咳阻每服五升水 辛前七分 溫服 不拘時  
表解 湯 和 劑 方 始傷寒 自利 六 脈 沉 伏 手 足 厥 冷

失血過多易証人方治傷寒汗下之後病証不解而煩燥者  
附子不去皮生破八片只用二片

甘草七兩半

乾姜三兩

人參二兩半

茯苓二兩去皮

右咬咀每服五錢水一盞煎八分溫服

桂枝一兩半 甘草六錢三字彖 附子一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎八分溫服

治傷寒汗後身熱惡寒九日不解風溫相傳身熱惡寒

五六散 和利方 方見暑門 治傷寒汗後身熱惡寒九日不解風溫相傳身熱惡寒

小黃中必倍人方治傷寒陽脈浮陰脈沉按之微中急痛治黃芩與小建

中陽若不度者小柴胡湯七之

桂枝去皮一兩半

芩麥一兩半重不用

膠飴半斤旧有微瘻或嘔者去膜重不用

芍藥三兩

甘草一兩

條下生姜

膠飴半斤旧有微瘻或嘔者去膜

大棗六枚

生薑一兩半

右剉每服五錢水一盞煎八分去滓下膠飴兩

膠飴半斤旧有微瘻或嘔者去膜

和劑方治傷寒發熱如瘧自膈痛小便利大便難

半夏湯洗七次二兩半

黃芩

人參去芦

柴胡去芦半斤

甘草各三兩

右咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓下膠飴兩

利劑方治傷寒十日不解邪氣結在裏身熱煩燥

語言謔妄大便不通繞臍刺者

枳實去殼炙黃芩半兩柴胡去芦斤

黃芩各三兩

赤芍藥

半夏湯洗七次二兩半

右咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓下膠飴兩

治傷寒內熱重裏實者身體疼痛自汗表証未解不可服之

小柴胡湯活人方治傷寒微瀉語謔知有所見大便六七日不

通是得米其結滯外藥主之

枳實一枚 燒炒 獐大黃去皮二兩

右朴去皮 姜製

右吹咀每服五升水 煮半前八分 溫服 少利為度

結在裏心四月 渴甚 飲水

知母七十五兩

甘草冬八三十七兩半 石膏洗土斤半

右吹咀每服五升水 煮八鞭米三十餘粒 煎七分 去滓 溫服 如

煩渴不已者 加人參服之

大便閉結 活人方治傷寒 表訂未解而誤下之則熱畜于

裏小便不利 身熱 黃烏 四月之訂 臥沉而察心下痛 按之

為未 右吹咀服五升水 煮半前分 去滓 丹下 苦 前 三沸 八 廿 是

未溫服 仍快利 為愈 心

味浮者 是黃連三升半

半夏湯洗 秤六升半

括樓實一枚 用四分之二

石吹咀每服五升水 煮半 煮括樓實二匙 煎下 諸藥前八分 去

滓 溫服 以微吐 黃涎 為愈 心下方有生薑

肥瘠子 豆豉湯 主之 若少氣 絕者 瘠子 甘草 厚 豉 湯 主之

肥瘠子 四升 香豉 半兩

古對水二大匙 先煮瘠子 至一匙 入豉 同煎 取七分 去滓 溫服

活人方治傷寒 四五日 病在胸膈 痰氣 聚於上 不為息者

瓜蒂 一兩 赤小豆 一兩

占及咀每服三升水 煮半 入豉 一合 同煎 至六分 去滓 溫服 少吐

月快 為度 亡血 體虛 者 不可 服

味 劑 方 治 傷 寒 已 平 汗 下 表 裏 俱 虛 痰 結 喘 心 煩

麥門冬 去心 五兩 半 人參 去骨 甘草 炙 各 二兩

石膏 一斤 半夏 湯 洗 行 次 二兩 半

右咳咀每服五升水一盞入青竹葉生薑各五六片煎半去滓  
入粳米百餘粒丹即米熟去米溫服不拘時

**溫服湯** 易簡方治傷寒一切病右孟煩不心解卧應治心膈虛怯  
半夏 枳實去穢各兩 枳殼一兩半

茯苓五升半去皮甘草四升炙  
右咳咀每服四升水五升半生薑七片東木一枚竹葉一塊煎七分去  
滓食前服

**白木煎** 和利方治傷寒病右氣脈不和食復勞復病訂初

枳殼二兩 茯苓去皮三兩 乾姜炮二兩  
白木四兩 白芷 陳皮去白

香附子 甘草炙 青皮去白  
山藥各三兩

右咳咀每服五升水一盞生薑三片棗一枚乾木瓜一升紫蘇葉  
煎七分食前服右瀉入白梅喘急桑白皮杏仁湯寒常後痛  
苛喘氣入木通三寸射香少許中身者極便入香薷產前產後  
血氣不利入荆芥極佳亂入犀香煎氣厥為未入煎湯調下

**白木煎** 御藥院方病后最宜服之生津止渴順氣下痰

白木 葛根 茯苓去皮 木香各一兩  
藿香葉去土 人參去芦

陳皮二兩 乾生薑一錢  
右咳咀每服四錢水一大盞半煎七分去滓溫服不拘時

酸棗四分 麥門冬二升去心 甘草炙一兩  
知母二兩 茯苓去川 川芎

乾姜各三兩也  
右咳咀每服四錢水一盞煎吐分去滓溫服

**枳實湯** 三因方治傷寒曾至吐利后胃痞軟純膈高起急痛者

枳實去穢炒 茯苓去皮 人參  
白木 乾姜炮 甘草炙各等分

右為末蜜和一兩作四丸熱湯化下渴則如枳殼根下兩加牡蠣  
務下

**生薑湯** 三因方治心下痞滿而不痛者

半夏湯洗七方一錢

黃芩

右咳阻每服四錢水一盞姜五片棗一個煎七分溫服或傷寒中風醫下之腹鳴心痞乾嘔心煩者加甘草半斤人參一分各甘

升麻

升麻

甘草各等分

心咳阻每服四錢水一盞煎七分溫服溫毒外泄發熱

苦茶

白木

黃芩

桔梗

茯苓去皮

甘草各等分

右咳阻每服分錢水盞半煎八分移竹目眩



芍藥

甘草各二兩

乾姜炮

右咳阻每服五錢水一盞煎八分溫服頓覺令少汗

附子炮去皮臍

細辛各一兩

乾姜炮半兩

右為米每服二錢水一盞煎六分熱服不拘時

黃連

寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調服

竹葉

麥門冬去心

人參

茯苓去反

小麥炒

半夏湯洗各一兩

右咳阻每服四錢水盞半姜五片煎八分溫服

柴胡四月

甘草一月

右為末每服二錢水一盞煎八分食后熱服

傷風散 三因方治婦人傷寒病后与男子交接病名陰易

右用婦人裙襠燒灰細研令水調服必小便利為愈

傷風藥湯 三因方治男子傷寒病后与女人交接病名陽易

非根去青一握約徑寸半

右二味水一盞煎六分頓服以汗出為愈

青附子二月

紫蘇梗一月

陳皮一月

甘草半刀

右為散每服四錢水二盞半前一盞生姜二片陳根葱白二

同煎熱服

頭痛加川芎白芷○頭痛如斧劈加石膏連翹葱頭○偏正頭

風加細辛肉苁蓉薄荷○太陽穴痛加荆芥薄荷○傷風自

汗加桂枝○傷前無汗加麻黃去節并乾姜○傷風惡寒加蒼朮

○傷風發熱不退加薄荷胡黃芩○傷風咳嗽不止加半夏杏仁

去皮炙○傷風初起鼻塞加制衣枳殼○傷風鼻塞重咽其不

利加苦梗旋覆花○傷風痰涎壅盛加白附子大南星○傷風鼻

內出血加茅花○傷風氣逆不安加大腹皮桑白皮○傷風鼻塞

不通頭昏加元活刺芥○傷風不散吐血不時如生地黄○傷風

不解耳內出膿疼痛加羌活刺芥○傷風不解咽喉腫痛加若連

○傷風中脫食不思飲食加玄白青皮枳殼○傷風嘔吐惡心不

止加丁香香薷白芍○傷風頭暈眼花頭刺支持不住加熟附子可保

風時作定慄加桂枝○傷風熱壅嘔吐不止加白附子旋覆花

夏○傷風後時作虛熱不退加人參○傷風飲食不能消化

宿砂仁青皮○傷風一向不解作熱白日至日中不退日日如

是加地骨皮清柴胡人參菴蒿○初感風頭痛作熱鼻塞身重

加羌活川芎○感風腰疼不能伸屈加官桂桃仁○感風身痛

不止加赤芍藥紫葳皮○感風頸項強急不能轉頭加羌活官

桂○腹注及痛加木香○傷風寒刺不可忍加姜黃吳茱萸七

粒○小腹疼痛元時不可忍加木香姜黃○婦人分心大便痛

腫不能下地加木香木... 婦人被性所苦... 助刺痛小便急... 乾姜水香... 疝或兩目昏... 人經水將行... 消加入參地黃... 加當歸... 皮草菓... 發熱頭疼... 動加生料五積散... 感寒頭痛... 痛生料五積散... 芍同煎

宋明欒子 張子和方

柴胡

入參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥 各半兩

右為粗末每服三匙水一盞生薑生片去滓溫服

張子和方

柴胡

人參

黃芩

防風

甘草炙

芍藥

大黃

當歸各一兩

滑石六兩

右為粗末每服三五匙生薑生片水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

張子和方

大黃

甘草

朴硝各半

右為粗末每服五七匙水一大盞煎三五沸去粗溫服食後

張子和方

大黃二兩

芒硝九分

蜜炙三分

杏仁去皮尖一合

右搗碎二味內芒硝杏仁合研如脂丸如彈子大一枚入其袋末

一字白蜜少許水二盞半煮以二盞服一宿乃下如不下再服

**大黃** 黃連各二兩 甘草二兩  
右劉為麻豆大沸湯二盞煎清之一時絞出滓投動為服

**附子** 黃連 黃芩各二兩  
附子一枚炮去皮脂煮汁用

右劉如麻豆大沸湯二盞煎清之一時絞出滓內附子汁為溫

**甘草為心湯** 按詳方

甘草二兩炙 黃芩  
半夏二兩二系半 大棗六枚  
人參各半兩 乾姜炮各兩五系  
黃連

右劉如麻豆大每服五系水煎服

**生薑湯** 按詳方

生薑一兩 黃芩炙一兩半  
人參一兩五系

乾姜炮兩半 半夏一兩 黃連半兩

右劉如麻豆大每服五系水煎服

傷寒直格治重俱發病勢更甚者陽明眩暈汗出不惡寒身重短氣或生下后不解不大便五六日至十餘日身微熱不惡寒者為危是危壯劇者則不識人清衣莫味湯血不安微喘直視陽明者表熱甚甚心包月燥熱而燥極復如霍亂世林沉伏或小便利大便下難下易喘不續臥或腹滿實痛須臾喘急脈疾或而先身燥甚腸胃燥甚胃欲不飲胃脘高起痛不可忍但嘔冷液大渴反不飲飲強飲不能止喘息悶亂者

大黃綿散者 芒硝 右朴去皮姜汁製 枳實各五系

右以咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓內芒硝再煎

一二沸通口服不拘時 宣明方治湯寒雜病內外所傷日數遠近腹痛咽乾煩渴謔妄心下按之硬痛小便赤澀大便結滯或血澀內甚折為洛

此藥甚端而效速... 凡患此症者... 宜明方治傷寒... 凡患此症者... 宜明方治傷寒...

大黃 錦紋

枳實 各五片

右次咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞內芒硝再煎一沸去滓通口服不拘時

宣明方治傷寒雜病燥熱毒煩悶乾嘔口燥冷中喘滿湯厥極深厥反沉細欲絕或表之冲和正氣与邪熱升之故重則裏熱元極陽極似陰反為寒戰脈微而絕或同熱燥甚容於下焦西大小便澀滯不通者或虛瀉死胎不下及兩感表重裏甚須可下者

黃芩

大梔子 各等分

右次咀每服一兩水二盞前一盞如腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚生全用右朴二片茯苓二片生薑三片煎服各曰半夏黃連解毒湯

宣明方治傷寒咳嗽不已心煩及凡熱頭痛精神不利... 指虫貝豆服

人參 一兩半

黃芩 各三片

茯苓 去皮

石膏 三兩

半夏 湯泡

川芎

知母 各五片

大梔子

白朮

甘草 一兩炙

右次咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓溫服不拘時服

宣明方治傷寒頭痛心煩悶凡熱并汗右余... 自汗多清頭目定喘嗽

人參 一兩半

黃芩 二片

石膏 一兩

茯苓 三片 去皮

川芎 一兩

甘草 五片 炙

防風三味

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

百果散 宣明方治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保其  
衰老及酒損嘔噦

白木

茯苓去皮

人參各五兩

甘草一兩半

木香二兩半

藿香五兩洗

葛根一兩

右為末每服二升白湯調下煩渴者如滑石二兩甚者加生姜汁  
清之飲之

宣明方治陽明裏熱極甚煩渴熱留飲不散以致偏熱

相搏而身發黃疸但頭汗出身无汗小便不利渴引水飲身必發黃  
宜茵陳湯調五苓散利大小便

茵陳一兩去蒸

大黃五兩

大梔子未精者不

右以咀每服木兩盞半慢火煮至一盞絞汁溫服以利為度甚者  
再作當下如爛魚腸又腹血膠膠等及小便黃此一劑分作四服  
調五苓散三升

千藥之場 宣明方治 癰汗小便利而微 為黃者濕熱相搏也  
宜服

大梔子十五个

葶皮五錢

甘草二錢半

右以咀水一盞煎至八分大滓通口服不拘時

大梔子 宣明方治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子 个

厚朴五錢姜汁製

枳實二錢

右以咀水一盞煎至八分去滓通口服不拘時

宣明方治傷寒陰病下後太早成痞心下痞滿而不痛按之  
虛軟或解毒湯調或瀉心湯調

枳殼

枳殼各等分

右為末每服三錢煎黃連湯調下不拘時溫服

大黃 宣明方治傷寒成病痞不已心腹亦實熱煩滿或  
諸苦安睡從无它證

大黃

黃連

黃芩各二錢半

右以咀水一盞煎至八分去滓通口服一方加生薑一分甚良

西昌湯 宣明方 治傷寒日深表益乃甚而熱不集脈微沉不結育



右二藥一處相和每服一兩水二盞生薑三片葱白五寸豉五  
十粒煎至一盞去滓通口服不拘時  
宣明方治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳痰痛痞滿頭  
痛者并治風痰

茯苓去皮

生薑各二錢半取汁半夏一錢湯洗

一方加黃芩甘草陳皮各二錢半

右以咀水二盞煎至一盞去粗入姜汁食后溫服

傷寒論

治風熱頭疼不止

葛根

芍藥

知母各五錢

杏仁白一握

川芎

生薑各一兩

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後溫服

傷寒論

治太陽病不解熱結胸臑其人如狂血自下

但少腹結者

桃仁五十個

桂枝

芒硝

甘草炙各二兩

大黃四兩

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓入芒硝再煎一二沸

傷寒論

治脈浮欲飲水小便不利者

猪苓去皮

茯苓

滑石

阿膠

澤瀉

右各等分每服一兩水二盞煎至一盞去滓下阿膠烱消溫服下

傷寒論

千金方治大病瘵後勞復者

枳實三枚

梔子十四個

豆豉一升

右以咀每服一兩用清泔水三盞煎至一盞去滓溫服不拘時

如有宿食加大黃如棗子大五六片

傷寒論

治傷寒汗若吐下解後心下痞硬噎氣

除者

旋覆花

甘草炙各三兩

人參三兩

生薑五兩

代赭石一兩

大棗棗十二個

半夏半升先

右以咀每服一兩水三盞煎至一盞去滓通口服不拘時

傷寒論

治太陽傷寒病自下利者

黃芩三兩

甘草炙

芍藥各二兩

右父咀每服一兩水二匙嚼至一匙去滓通口服不拘時如嘔者如半頁半升生薑二三兩

不思飲食一切勞氣厥病服之

右為來醋胡為凡每服三十九如心酒下

地黃四兩

渴起飲此方治秋久傷風傷寒發散

麻黃

葛根

右膏

用法

防風等分

甘草炙

春加麻黃夏減麻黃三錢加石膏月秋冬液方

右父咀每服一兩水二匙嚼至一匙去滓通口服不拘時候

傷寒論陽明病自汗出若欲汗小便利者宜下之

竭雖硬不可攻之當須自欬大便宜密前道者通之

蜜十合

右一味內銅器中卻火煎之稍凝似餅在指之勿令其有欲可丸

併乎於作命今頭鏡大如指長一寸許凡熱時急作冷則硬以內

蒸道中以手執物使大便時切去之

汗內有痰

右用大猪膽一枚瀝汁和醋心許少唯蒸道中如一食頃更慢

汗內有痰

芍藥二升半

生地黃半斤

牡丹皮二升半

犀角二升半如無以升海代

右咬咀分二服水二匙嚼至一匙去滓通口服食後

陽毒升麻湯治人方治陽毒赤狂狂言咽燥漏出膿血或咽角

升麻二分

犀角

射干

黃芩

人參

甘草各一分

右咬咀水一匙嚼至一匙去滓通口服不拘時

百病皆由氣滯活人方治傷寒逆氣胸膈不痛飲死者

結搜

枳殼各一兩

右父咀水三盞煎至一盞去渣分二服不拘時

百病皆由氣滯活人方治熱毒母公喉吐血

結搜皮三兩

黃芩二兩

黃連一兩

右父咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入阿膠二片每煎膠

散服膠痛甚者加梔子一兩小便不利加茯苓一兩半兼治各血

兩其驗

百病皆由氣滯活人方治必陰咽痛

結搜

甘草各半分

右父咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓通口服之

百病皆由氣滯活人方治牙疳煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁

赤芍藥

大青

短母各兩

升麻

黃芩

石膏

杏仁去尖各二兩

柴胡

甘草各半兩

百病皆由氣滯

結搜

右父咀水三盞煎至一盞去渣分二服不拘時

百病皆由氣滯活人方治熱毒母公喉吐血

結搜皮三兩

黃芩二兩

黃連一兩

右父咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入阿膠二片每煎膠

散服膠痛甚者加梔子一兩小便不利加茯苓一兩半兼治各血

兩其驗

百病皆由氣滯活人方治必陰咽痛

結搜

甘草各半分

右父咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓通口服之

百病皆由氣滯活人方治牙疳煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁

赤芍藥

大青

短母各兩

升麻

黃芩

石膏

杏仁去尖各二兩

柴胡

甘草各半兩

右父咀每服四錢水一盞生薑半分豆豉一百粒煎至六分溫服

痛亡不拘時服

百病皆由氣滯活人方治陽寒喘促脉伏而厥及汗下后氣閉或救血

皆治之

五味子半兩

人參

麥門冬去心

杏仁去尖

生薑

陳皮各二兩半

東葶子三兩

右父咀水二盞煎至一盞去滓分二服不拘時

百病皆由氣滯聖惠方治傷寒心腹痞滿

結搜

半夏姜炒製

陳皮去白各三兩

右父咀生薑五片水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時一方有枳

實

百病皆由氣滯活人方治傷寒陰虛后不得振

梔子

黃芩

甘草各半兩

柴胡一兩

烏梅去核十四個

右父咀每服四錢生薑二片竹葉二七片豆豉五十粒水二盞煎

至二盞去滓溫服不拘時  
**羌活湯** 活人方治傷寒太陽病自汗者

羌活 一 大 把 无 花 用 數  
右 咬 咀 水 三 盞 煎 取 汁 一 盞 分 二 服 食 后

**白濁丸** 活人方治發斑口燥煩渴  
石高月四日 甘草半日 知母一升半

右 咬 咀 每 服 一 升 水 一 盞 硬 米 百 粒 煎 至 一 盞 去 滓 不 拘 時 隨 口

**活人方** 治陰證及中風不省人事大効一方无細  
辛各通神效

芍藥 二 升 去 呂 川芎 二 升 半 救 精 草  
石首蒲 東 平 薄 荷 頰 刺 葉 各 四 升

右 為 細 末 先 令 患 者 與 葱 茶 一 盞 右 食 水 在 口 次 以 葱 湯 洗 入 口 鼻 中 即 時 亦 垂 涎 皆 見 効

**活人方** 治陰證用葱白一大握如系絛大用昏掩緊  
以 刀 切 齊 一 指 厚 片 安 於 脐 中 以 熱 熨 斗 熨 之 汗 出 為 度 二 升 天 効 再 切 一 片 熨 之 服 葱 漿

胡椒 五 升 骨 石 五 升 煨 土 次 射 香 一 升

右 為 末 酒 調 服 之 神 効  
和 劑 方 治 傷 寒 表 裏 未 解 頭 眩 發 熱 心 胃 鬱 則 唇 口 乾 焦 神 思 昏 沉 狂 言 譫 語 如 見 神 鬼 及 治 瘧 瘧 煩 悶 未 省 者

辰 砂 研 白 朮 枳 殼 去 皮 各 十 二 升 官 桂 八 升

**小續命湯** 傷寒直格 治干下台極生不已  
右 為 末 每 服 二 升 沸 湯 調 下 不 拘 時 候

半 夏 五 升 姜 製 赤 茯 苓 三 升 去 皮

右 咬 咀 每 服 五 升 水 三 盞 煎 至 一 盞 投 姜 汁 更 煎 二 升 沸 而 飲 者 陽 證 發 逆 痰 逆 惡 寒 反 吐 利 右 目 虛 腫 熱

橘 皮 一 升 竹 茹 一 升 半 甘 草 一 升 半

人參五片

右交咀每服五片生薑十片水一盞半煎至一盞去滓服不拘時

**大補湯**

活人方治嘔吐胃弱虛煩不安

獨支一兩

甘草一兩

人參二片

右交咀每服五片生薑五片水一盞半煎至一盞去滓服不拘時

**小柴胡湯**

一名生薑橘皮湯 活人方治嘔吐手足逆冷

橘紅

生薑各一兩

右交咀水二盞煎至一盞去滓分二服下咽即愈

**小柴胡湯**

仁齋直指方治陽證發熱

小柴胡湯

加生薑

橘皮

竹茹

右交咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓開口服不拘時

**活人方** 治胃弱虛喘咳嗽不止

補藥

丁香各一兩

右交咀每服四錢生薑五片水一盞半煎至一盞去滓服不拘時

**活人方** 治寒不其狀婦人血乳頭向下之瘻骨間是死穴及

乳小者以一指為候若男左女右與乳相自間陷已動脉是穴又

如小一尺右灸三升

**活人方** 治利右攻逆胃寒

羌活

附子炮去皮脉

面香炒各五片

乾姜炒

木香各一棗許下

右交咀存服一諸水一盞后必火加一棗去滓溫服不包有汗去

傷存用不香一因本二香在附

**加味溫膽湯** 加方治心膽虛怯內事易致驚震若小祥異象感

惑遂致心驚驚服指氣鬱生斑與氣傳支主諸丁或恒氣得之或

復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩燥坐卧不安

枳實炒

半夏湯泡一伏

竹茹各兩四錢

編紅十二兩三錢

白茯苓六兩三錢

升草四兩一錢炙

香附一兩半

人參

柴胡

妻門冬

植梗冬六兩三錢

右攻阻每服一兩生薑五片愈不水三毫感去洋溫服不拘時

白芷 枳殼 烏藥 心風

當歸 芍藥 白木 右件用酒半棗一棗煎至八分去滓通口服不拘時熱加柴胡

傷寒直格心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗可用四解愈後送數服心前若不解者病已傳裏後二日在裏法當下不知工之大字則表裏虛入裏遂成結胸痞痞便與也或發黃之丁任者必危也者必死但當以平和之藥宣散其裏和脾其裏病執或有汗而沐愈必無汗而愈當用小柴胡涼隔天水三察合而服之病若半在表半在裏法亦當和解用柴胡涼隔半之若裏熱發者則當微下大柴胡合解毒湯王之極熱未退又以大柴胡合三一承氣下之兩條表裏之熱和至王各有藥丁已甚表熱極微脈雖浮數則以三一承氣內解毒下之其效也

通滿間或喘或嘔腸脈脈甚者可下瓜蒂散滿之并吐下三法之后別無疑丁者之用散調之病勢已去微熱者以益原散以之無公再病此傷寒治陰之大要假光傷風自汗脈浮緩者以解散去府表以汗之其病半起夏半在裏白虎陽和解之病在裏脈沉即者無問風寒暑濕或表裏丁俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗宜解者諸語煩燥去裏內寒極是脈滑者姓用承氣合解毒下之或中暑自汗解以白虎湯直整云夏至真病溫夏至後為暑是以不用白虎宜乎局方云在秋后不用白虎子和天若有白虎丁亦不用呼却用詳審之耳白虎解后以五苓散合天水調之多進數服無效或腹脹滿脈即者亦宜承氣合解毒下之或發汗之后熱不解脈上滑者白虎解者亦宜解之或表熱內成陽大極者皆因失下而成此丁以致身於脈於清增將死勿不得以寒涼下之誤下之即死又一黃腐隋妄言是陰厥使欲換易相南益四連溫機之都漫之下咽立死殊不知此丁乃陰耗湯竭陰氣極弱未之耗湯以極淡末之喝當熱解藥到病除者當大之丁承劑熱劑俱不可投但進涼隔解毒以養陰退陽宜散去熱脈氣漸生得大汗而愈有無汗氣和而愈者亦宜却

解毒合承氣下之次以解毒涼膈天水合而為一調和陰陽洗滌  
腸則其地則証自不生矣有大下之后熱不退再三下之熱愈盛若  
下之不愈則於氣虛力弱不如以法間無汗之理若厥而不下則  
邪熱極盛陰氣極衰脈息斷絕必不可破以此之丁是下之亦死不  
下亦死醫者到此殺人活人一從陽湯落不至手足失指者懸在矣  
直投去傷寒并后汗出不解或友不汗遂上淳昔白虎加蒼朮湯存  
解之又按餘論云傷寒下后自汗虛熱不已白虎加蒼朮木人裝一服  
如神汗止身涼此通山之法也如此則汗下之右熱不退不問有汗  
無汗宜白虎加蒼朮解之又加人參亦妙仍服涼膈解毒調之今云  
三下而熱不退者即死后人有四五次下加至十數行而生者此  
乃偶誤中耳活者米一二死者已千百右云切勿不可以為法但當依  
前用解毒合涼膈調之使王熱徐退脈漸平養不失人命若傷飲  
不解散成結胸之症臨時擇月大小隨胃湯九系下之疎導者不可  
下是表丁未出小柴胡合小陷胃湯投之疎導而熱大極者承氣  
徐疎疎利之望者留飲為度燥熱內生自利不止其熱未退解者湯  
治之陽毒上症涼膈加當歸補腎熱盛在表燥而無汗燥熱柱裏不

能發於外相搏遂成發熱而陳湯調五六散甚者因陳合承氣下之  
煩心不得則梔子湯誤下大早遂成結胸有虛脈涼膈加枳殼枳實  
系二症諸語發在踰地非皆陽熱極成承氣合解毒下之汗下之  
後煩渴飲水則涼膈減桂五苓其路益原選而用之小便不通下苓  
泄之大便閉結承氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥  
人下治皆然惟身燥三四月并七八月不用硝其餘月分用之無妨  
小兒減劑服之此中有古人治傷寒不傳之妙後之學者其真室之  
第一雙解散  
防風通聖散  
防風通聖散合原散一名通解散

防風通聖散

防風湯考次麻黃

麥稷石膏各二兩

荆芥白朮山梔子

右不黃苦硝麻黃三味對丁旋入自利法大黃芒硝自汗去  
麻黃

薄荷生消半兩強

滑三草二要相宜

二錢半重細消解

女益石散又名天水散 方見暑門

第二小柴胡涼膈天水合服

第三原膈小柴胡

第四六柴胡合黃連解毒湯

第五六柴胡合三承氣湯

第六承氣合解毒湯

第七瓜蒂散

第八涼膈散

第九益原散

暑

第十雙解散

第十一白虎湯

第十二承氣解毒湯

暑

第十三白虎湯

第十四五苓散合天水散

第十五承氣合解毒湯

第十六白虎湯加蒼朮

第十七涼膈合解毒湯

第十八解毒合承氣湯

第十九解毒涼膈水

結胸

第二十大小陷胸湯九 第二十一小柴胡合小陷胸湯

第二十二大承氣湯 第二十三解毒湯

發疔

第二十四治小膈散加當歸

發黃

第二十五茵陳湯調五苓散

第二十六茵陳合承氣湯

煩心不眠

第二十七梔子豈湯

第二十八五苓散空腸前涼膈加板殼積梗

劉宗二症

第二十九承氣合解毒湯

汗後煩渴

第三十涼膈散桂五苓其露益原其露飲名桂苓泉散方見暑門

右共十八方如無大承氣第五三一承氣代之亦妙通三十九件

藥味調理傷寒由及其刻百發百中後之學者詳辨証審而用

之起沉痾於反掌策奇功以活人方知其妙也  
傷寒心要餘論

五臟六腑應玉用六氣九病微則當其不化甚則兼其鬼賊之化也  
則害承乃制微則是其本經本藏之本化造化之化也病甚則如金  
衰不能制木木則生火水火者皆陽也故曰人多兼化則風無相推  
賊其金也臟腑之氣應乎三陰三陽實則行乎本化之氣瀉之衰則  
行其勝已之氣瀉之是為殺其鬼賊也如諸陽畜熱以涼膈合解毒  
服之解散極熱如瀉火熱解毒調胃承氣是也如吐法用二下散如  
調理傷寒白虎涼膈合服解之傷寒三日以重連進及解如無汗必  
是傳變待三四日之間以小柴胡解表裏之熱仍間服白虎涼膈蘊  
熱士雙日之間款下面表証猶在以大承氣湯大柴胡湯及行并煎  
攻裏發表最為穩當是濕熱內甚自利者止涼膈却進解毒間白  
虎服之或惡心乾嘔吐者白虎大作一劑調解毒未去錢服之即止大  
小便不通并有腹痛不能忍者以無灰酒煎朴硝三兩執服即愈亦  
按治之法也執中伏寒之矣或大承氣湯加木香瀉之尤妙傷寒  
天下始病時又誤服麻黃湯熱劑太甚必致熱極或有陽發極身冷

穢陽極似陰之證庸醫以為陰證是也須當急救其陰以白虎涼膈  
日進三服脈氣漸生身體漸溫然後以大承氣下之夫大承氣收  
急之妙劑咽膈吐逆不利當令熱服開其鬱結利而即愈也如傷寒  
汗下之後自汗虛熱不止於白虎湯加入參蒼朮一服如神汗止身  
涼此法至妙不容詳悉如赤白痢先服黃連阿膠丸次服解毒湯傷  
寒瘡瘍痧脹風濕傷寒治法一同但以雙解涼膈白虎承氣臨時斟酌  
用之雙解涼膈白虎瀉心此理傷寒之妙劑也孕婦臨月可服益原  
散涼胎聖後仍服如血不盡則以涼膈與四物合煎調理經血甚者  
大承氣合四物乃瀉中有補也涼膈同四物名玉燭散真大走後  
妙劑涼膈四物合大承氣湯名三和湯大承氣合四物治婦人一切  
血積血聚毒疾加紅花尤妙初生小兒五七日有熱證不得已只以  
益原散時時養之如小兒夜啼用涼膈調之肚飢臨臥服凡瘡瘍  
毒涼膈如當歸治之

Large stylized watermark or seal, possibly reading '東洋' (Toyo) or '東洋堂' (Toyo-do), overlaid on the page.



Small vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or a reference mark.



水田以持  
1751

