

世醫得效方卷第五

○大方脉雜醫科

○脾胃

虛證〔沉寒瀉瀉〕治氣滿不快飲食不入胃腸痞悶或時
膨脹腹中刺痛等證

丁香五斤 沉香五斤 木香五斤並 人參去節

青皮去白 神麩各壹兩 茯苓去皮 甘草炙

陳皮去白 厚朴薑汁 草果仁 藿香葉去土

半夏泡七次 縮砂仁去殼 白豆蔻去殼

白朮去芦炒 麥蘖炒 香附子炒去毛

右劉散每服參錢水壹盞半入生薑三片紅棗一校同煎去渣熱服又方治氣滿不食以律味香蘇散同煎大人尤宜服未效更服丁香煮散加葷撥良薑見嘔吐方

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶
脇肋脹滿心腹刺痛可進飲食或多痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰白色萎黃如中焦虛痞不任攻擊臟氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常更受怯弱不能多食

不宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉去毛姜汁炙 石斛細剉酒拌和

沉香參分 薏苡仁微炒 木香參分

杜仲去龜皮用姜汁与酒合 藿香葉三

隨風子如死陳小緊謂子 穀糞微炒 丁香半兩

半夏壹分用鹽洗柴漚生薑壹分切作片 白朮去芦炒

青皮去白 大腹子微炒 檳榔半兩 陳皮去白

萊白皮微炒 白豆蔻微炒去 人參壹兩

五味子微炒 白茯苓去皮神地微炒 甘草微炒

右劉散每服參錢水壹盞入生薑三片肥棗貳枚同煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調理陰陽使無變動越日得安如療五噎入乾柿壹枚同煎十服見效如膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦

可服

四君子湯 治脾胃不調不思飲食

人參

甘草炙

白茯苓

白朮

各等分

右劉散每服參錢水壹觔煎至七分不拘時服一方加橘紅各異功散又方加陳皮半夏各六君子湯嘔吐加藿香縮砂泄瀉加木香肉豆蔻

治脾氣虛寒腹脹滿身體沉重面色萎黃嘔吐不食水穀不化大腑自利

肉豆蔻

白豆蔻仁

附子

厚朴

白朮

乾薑

紅豆

神麥

丁香

胡椒

木香

右劉散每服津錢水一盞半生薑五片紅棗壹枚煎至七分去渣溫服

參苓白朮散

理心脾氣弱神昏體倦飲食不進多困少

中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉利

人參

白茯苓

白朮

山藥

甘草

縮砂仁

桔梗

薏苡仁

蓮肉

扁豆

柴胡

右為末每服貳錢棗湯下小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

千金胃脾丸

治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞及胃吐食

心膈痞滿脇肋虛脹胃腹刺痛牽引背脊食少易傷言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜睡噦酸久病泄利腸胃虛滑病后氣不復常飲食無味形容憔悴酒後痰多

人參

白朮

白茯苓

去皮甘草

山藥炒

木香

丁香

白扁豆炒

縮砂仁

薏苡仁

益智仁

藿香葉

紅豆

肉豆蔻

乾薑炮

高良薑

三棱炮

莖木炮

神麩炒

麥蘖炒

陳皮

枳殼炒

茴香炒

苦梗各壹兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下溫酒

亦得空心食前常服溫養脾胃進美飲食

冷湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉方見

傷寒陰證類

平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦

無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱

怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈

氣反胃並宜服之

蒼朮

去籬皮米泔洗

厚朴

去心皮薑

陳皮

去白各壹兩

甘草

炒叁分

右為末每服貳錢以生薑三片紅棗貳枚煎湯調服或
鹽湯調空心食前熱服常服調氣暖胃化宿食消痰飲
辟風寒冷濕四時非節之氣為散煎亦可加人參尤妙

胃丹治大陰之精不經火煅平附等脾寒陰煉成

用平補不替善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土冲和失

布中州虛寒飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食

而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒水穀不化心腹絞痛泄利不止應是一切脾胃諸疾不問男女子婦人皆可服

朱砂天授不夾石者拾式兩半

羅參去子

細砂去殼

肉豆蔻殼裏 華澄加

白豆蔻去殼 紅豆

高良薑剉碎 附子炮去皮

白朮去芦

厚朴去殼鹽汁拌炒

丁香不見火 藿香葉去土

五味子夫便

乾薑炮去土

胡椒

益智仁

麥門冬去心

草果仁

橘紅去白 上各壹兩

右將人參等式十味各如法修製對如巨大以銀鍋一口用白砂蜜二十兩將藥一半同蜜拌勻入銀鍋內以突生縮袋盛貯朱砂懸胎入銀鍋內以乘柴火重湯煮

三月三夜取沙淘淨焙乾入乳鉢用玉槌研直候十分細米糲為尤如菴豆大陰乾每服十粒加至拾伍粒空心食前用人參湯送下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯

送右忌食猪羊血

補虛湯

大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有

謂為人之有生不善攝養勞過度真陽衰虛坎火不溫不能上蒸脾土冲和失布中州不運致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑唐泄此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補脾予謂補脾不若補腎、氣若壯丹田火經上蒸脾土脾土溫和中焦自洽膈開能食矣

葫蘆巴

附子炮去

陽起石

川烏炮去心

免絲子

油蒸沉香別研

肉豆蔻

肉桂炮

五味子

各半斤

鹿茸

川巴戟去心

鐘乳粉

各乙升

右為末用羊腰子三對治如食法葱椒酒煮爛入少酒

糊杵和為圓如梧子大每服七十丸空心食前米飲益

湯任下

進食散 理脾元虛冷不思飲食久病脾虛全不食者及胃

虛有風不食只三服便效

甘草

乙升

肉桂

去麩皮

陳皮

青皮

各壹分

訶子

五個

草豆蔻去心

右劉散每服二升水乙中蓋生薑二片煎七分空心服

熱證 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴煩痛心煩

唇口乾燥壅滯不食

藿香葉

吐石石膏

縮砂

去殼

甘草

各半兩防風

右劉碎同蜜酒炒香焙為細末每服叁錢水壹大盞煎

至七分溫服不拘時候

濕散 治脾胃虛弱復壅滯四肢麻悶兩脇脹滿大小便不

利方見秘結題

蒲皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噎不食

赤茯苓

去皮

陳皮

去白

枇杷葉

拭去

麥門冬

去心

枳實

去殼

黃芩

去心

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

澤瀉

去心

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

澤瀉

去心

薏苡仁

薏苡仁

去殼

白朮

去皮

白芍

去皮

茯苓

去心

青竹茹

半夏湯泡七次

人參去芦

甘草各半日

右劉散每服四升水壹盞半壹五片煎至八分去渣溫服不拘時候

翻胃

安脾散治胃氣先逆飲食過傷或憂思蓄怒宿食癰積聚冷交動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速藥遲則發煩渴大便秘水飲穢悉不得旋踵斃矣

高良姜

一兩以百年壁土上三合敲碎用水二碗浸乾薄切成片

南木香

草果

麩裹煨去殼

胡椒

白茯苓

白朮

丁香

洗乾

陳橘皮

湯洗去穢

人參

去芦各半日

甘草

一月半

右為末每服式大升食前水飲入鹽點服鹽酒亦得

蘇白粥

治翻胃無問久遠冷熱

人參

丸細切以水

煎取三合

雞子去黃

蘇白去生

熟稀粟米粥

右以雞子白及蘇白粟等三味熟調攪然後煖入參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌當時便定准前服萬不失一如思食即與粟米粥飲漸加粳米和之

白水草果飲法

聖製

烏梅肉 津兩 草果

乾薑炮 各叁兩 赤茯苓 三兩

甘草 半兩

右劉散每服用半兩水壹碗半煎至壹攬去滓磁器盛和熟水隨意服之

桂心散 治翻胃發渴

半夏 四升

桂心

甘草 各三升

赤茯苓 四升

澤瀉 四升

右劉散每服四升生姜煎服

三稜散 治宿食積聚翻吐酸穢方見諸氣類

胃散 治翻胃嘔逆藥食俱不下結腸三五日至七八日

來大便不通如此者必死之疾

白水牛喉

一除去兩頭前并筋膜肺肉筋之脈下刺

連了臨病時

右用喉節以好米醋壹大盞浸頻攪令勻微火炙乾再

醃再炙醋盡為度存性不得見太陽火為末每服一升

食前用陳米飲調下輕者一服見效

靈砂 治脾寒翻胃

靈砂 一兩

蚌粉 同炒畧變色

丁香

胡椒 各四十九粒

右為末生姜自然汁煮半夏糊圓如梧子大每服三十

充翻胃煨生薑湯吞下虛人脾痛炒鹽湯下

青金丹 治一切吐逆

水銀八分 生硫黃

右二件入無油鉢內用慢火化開以柳木篋子按炒或有烟焰以醋酒之結成砂子再研為細末用米糝尖杵和為圓如菉豆大每服三十丸用姜橘皮煎湯送下不拘時服

大當中金 治翻胃服水藥不得者

大綿附一箇生姜自然汁一椀煑乾為度母丁香一箇為末以少許安掌中心祇喫立効

丁香散 治翻胃

大附子一箇切去蓋剝中使揀丁香四十九粒以蓋蓋而止慢火煑乾為度

右為未用一錢匕糝舌上漱津下若煩渴徐徐食糜糜 煮油膩生冷

大當歸 治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

陳倉米壹升用黃土炒 白豆蔻二兩 香薷兩 縮砂仁 二兩

右為未用生薑自然汁法圓如梧子大每服壹伯圓食後用淡薑湯送下

小半真圓 治翻胃及不飲飲食

半夏湯洗 胡椒

右等分為末薑汁圓如梧子大每服三五十圓薑湯下

小丁圓 治翻胃如神

五靈脂

臣父

生辰砂壹斤母丁香壹兩不見火

右爲末入黃狗膽糯米粽子尖爲圓如雞頭大每用湯化下

六字散 治噎噎翻胃吐食神效

先以羯牛用繩掛開牛口以淨布巾抹令口舌淨却拖牛舌出來俟有涎出以槐盛之每服用八分盞爲一服研好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令溫先以絹帛束縛中脫胃口令極緊候氣喘乘熱解開隨氣喘一二口便服藥時先對病人說莫白粥惱煩之并煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫

六字散 治翻胃膈氣

丁香

木香

肉豆蔻

縮砂

青皮

陳皮

胡椒

萹撥

沉香各半兩

右爲末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二瓣入去殼巴豆一粒用餅藥調麩裹蒜片慢火煨熟去巴豆及麩只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和爲圓如梧子大每服卅圓於盆內滾過蘿蔔湯調前藥末二錢空下神效

溫胃散 治翻胃

真附子

壹个去皮搗分作兩塊生薑壹兩研水壹盞盛慢火同煮至水盡取附子切焙

右爲末每服壹錢空腹鹽湯下

治翻胃嘔吐大便秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利之又蘇合香圓用四分感應圓用六分夾研作細圓薑汁

泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜煮凝捻作指
納後部導之或用獺猪膽一枚取汁入法醋少許以筆
蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀道或用連根葱
白一握漢椒伍拾粒搗細作餅焙熱和輕粉掩臍續以
葱椒煎湯熏湯置身下

反方 浴翻胃

真蚌粉

右每服二錢薑汁米飲調下

治吐逆不止

真黃丹

岸兩研細用米醋半升入鍋內煎
令乾更以火煨通紅令研細為末

水米飯為圓如梧子大醋醱湯吞七圓不以時一時佳

灸法兩乳下各一寸以瘰為度又灸臍上一寸二十壯又

灸內踝下三指稍斜向前三壯中腕一穴在臍上四寸

足三里二穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其效尤著

導引方除腹肚冷風宿疾積胃冷食欲進吐逆不下

正坐兩手向後捉腕反拓帶盡勢使腹絃上下七左

右換手亦然

乾良方惟食乾飯餅餌盡去羹飲水漿藥亦用圓自不反

動調理旬日奇效有人三世死於胃天全孫收效此方

○咳嗽

風證痛木
治因時感疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛

及傷寒鼻塞舌重砂嗽頭昏血皆治之

蒼木 五兩味甘

香白芷

細辛 去葉末

羌活 去葉

川芎

甘草 炙

右坐散每服參錢水壹盞生薑三片葱白三寸煎七分

溫服不拘時候如覺傷風鼻塞為未效茶調下

湯 治感冒風邪鼻塞舌重語音不出或傷風傷冷頭

目痛眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿短氣 方見傷寒陽發類

不寐湯 治傷風身熱有汗惡風病證挾熱服否子湯不得

者此藥穩當也

橘紅

紫蘇葉

杏仁 去皮尖

五味子

半夏 湯洗

赤白皮 蜜裹

貝母 去反

白朮 各壹兩

甘草 炙半兩

右劉散每服四錢水壹錢半生薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

參 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出

咽乾項強鼻流清涕

荆芥穗 去根節 細辛 去土洗 桔梗 去芦炒

陳皮 去白

麻黃 去根節

半夏 湯洗

杏仁 去皮尖 人參

通草

甘草 炙

右劉散每服錢水一盞半薑五片煎八分食后溫服

寒 治肺感寒邪鼻塞舌重咳嗽不已增寒發

熱無汗惡寒煩燥或風熱壅在膈間唾黃濁水甚者咯血

方見傷寒陽證類

咳

卷五

加弄龍湯 治表有寒邪喘水飲咳嗽急不得睡卧 方見傷寒通治類

葉蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胃膈煩滿項背拘急舌重鼻塞頭目眩痰氣不利呀呷有音

紫蘇子 炒 赤茯苓 去皮 陳皮 去白 桑白皮 炙

杏仁 去皮尖 酥黃 去根節 甘草 半兩

右剉散每服二錢水壹觔煎至士分去渣食後溫服

暑證 六和湯 治傷暑痰生咳嗽喘滿加麥門冬烏梅煎

天消暑圓 方見伏暑中暑類

濕證 白朮散 治五臟傷濕咳嗽痰涎增寒發熱上氣喘急

白朮 三兩 五味子 茯苓 各壹兩 甘草 壹兩

半夏 四升洗去滑粉依十六片

右剉散分作十六服每服水一盞半薑五片紅棗二枚

煎至七分空腹服

傷濕四肢重著骨節疼痛洒淅咳嗽

厚朴 去皮薑 藿香 去枝土 甘草 鹽 半夏 黃

蒼朮 未泔洗 陳皮 去白 加木瓜 每藥一兩 只煎五升

右等分剉散每服三升水一椀半生薑三片棗子二枚

煎至八分去渣食前稍熱服忌生冷油膩 傷寒陰證 用之亦效

七情 因抑鬱憂思 怒飢飽病失節致臟氣

不平咳嗽膿血漸成肺痿增突壯熱羸瘦困頓將成癆瘵

人參 紫苑茸 洗 阿膠 蛤粉炒 百合 蒸

卷五 咳

細辛

洗去藥土

欵冬花

杏仁

去皮尖

天門冬

湯洗七次

半夏

湯炮七次

經霜桑葉

五味子

略一甘草

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢水一錢半生薑五大片煎至七分去渣食後溫服因急而嗽者宜加木香欵而唾血有熱加生地黃欵而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極而欵嗽者加黃耆因損而唾血者加沒藥藕節欵而嘔逆腹滿不食者加白朮倍加生薑欵而小便多者加益智仁欵而大便溲者去杏仁加鍾乳粉欵而面浮氣逆者加沉香相皮煎

分心氣飲

治憂鬱得嗽

每腹三升加枳殼去穢乙外比五味生薑三片煎方見諸氣類

五證

治上焦有熱咳嗽黃痰痞滿阻食加防

已翹葶歷馬兜令薄荷葉各半兩方見藥類

貝母散治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘

知母

新瓦上焙

貝母

巴豆七粒同貝母炒各

右剉散錫糖一塊同煎服一方以二母為末入巴豆霜少許臨卧用生薑二片蘸藥夾定細嚼咽下

紫花膏治同上

枇杷葉

木通

欵冬花

紫苑

杏仁

桑白皮

各等

大黃

咸半

右如常製為木蜜圓櫻桃大食後夜卧嚼化

五寶圓

治風壅痰突頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參

去芦

乾薄荷

白茯苓

去皮

白礬

湯洗

天南星

米泔浸焙各三兩

半夏

湯洗七次姜汁和作曲六兩

右為末生薑汁煮麩糊圓如梧子大每服三十圓食後薑湯下如痰盛燥熱薄苛湯下

金沸草散

治同上每服三分生薑桑白皮烏梅煎洗吞服半夏丸方見傷寒陽證及疹瘡類

黃連阿膠圓

治肺熱路血亦治熱瀉

黃連 半三兩

赤茯苓 式兩

阿膠 一兩

右黃連茯苓為末水調阿膠和圓如梧子大每服三十

圓食後米飲下黃連茯苓能抑心火肺得其清則嗽止

小柴胡湯

治嗽久瘥身有煩熱嗽冷水而暫止者加桑白

皮北五味子棗子煎不拘時服煩熱加麥門冬嗜臥減食

加白朮煎

方見傷寒陽證類

治心熱上炎肺經胸膈滿痛時乾口燥咳嗽殊甚

方見積熱類

冷證

寧肺和胃袪痰治嗽通腸三焦進羹飲

食寒薑參片鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖比五味又七粒

同煎就服青州白圓子方見傷寒陰證風科通治類

理中湯

治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多嘔富溫養脾

土則生肺金用五味子炒何膠煎湯調服立効方見脾胃

不字湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停積

人參

半夏

茯苓

細辛

乾薑

官桂

杏仁

白芍藥

甘草

五味子

右各等分剉散每服四錢以水貳錢薑四片煎至七分去渣溫服不以時此藥最宜冷嗽熱嗽非所宜若肺浮緊身熱無汗惡風脉浮身熱無汗惡寒而咳加少麻黃去節熟服

百羊皮圓 治肺胃虛寒咳嗽方見痰飲類

胡椒中圓 治寒嗽冷痰吐白涎沫續續不止不能飲食

欵冬花 天授 胡椒 陳皮

乾薑 甘草 良薑

白朮 式兩半 細辛 各二兩

右為末蜜圓如梧子大每服十圓溫湯米飲任下不拘時候

黃耆建中湯 治冷嗽加半夏曲乾薑五味子同煎空心服

方見傷濕類

養榮湯 治冷極嗽可加熟附子白豆蔻北五味子蜜麥粟

殼蚌粉炒阿膠 方見虛損類以上二方所見各少許

破肺圓 治文嗽

欵冬花 人參 五味子 官桂 去皮

紫苑 白石英 微帶青色者 鍾乳粉

右等分為末用鷓鴣羊肺一具去皮犬杏仁半斤水煮肺

爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和衆藥圓如梧子六

陰乾每服五七十圓至百圓糯米飲不食後臨卧服

時行 **金匱** 治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參

苦梗去芦

五味子

赤茯苓去皮

白朮

各一两枳殼炒

甘草炙

各半两

右到散每服臍錢水壹錢半薑五片煎至七分去渣食前溫服嗽多者加棗白皮壹兩痰多加半夏壹兩寒暑之交氣盛人衣厚作癰忽發感微熱此藥最宜若作感冒發其汗致其邪必成大病此方佳處在赤茯苓能導心熱枳殼能疎肺壅故易效一方有半夏一兩又云寒壅者加杏仁不去皮火紫蘇各半兩

服散 治最嗽

阿膠炙片

生薑一斤

大烏梅式个 甘草乙分

紫蘇十葉

杏仁去皮尖

大半夏三个

明礬粟殼三食

右到散水一盞煎至六分去渣臨用服

服散 治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

粟白皮煎有效酌量用之

方並見傷寒湯證及解類

勞嗽

蛤蚧蜜炙一對

人參去芦

百部去心

款冬花去皮

紫苑茸略兩半

貝母

阿膠隔粉炒

鱉甲醋炙

柴胡去芦

肉桂去粗皮

黃耆蜜炙

甘草

杏仁湯浸一夫皮尖半夏生姜汁各一兩

右為末每服三錢水一錢半生薑三片煎至一盞不拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不肯服則當改用細辛風痰嗽白濁散治一種咳嗽直至嗽頗吐飲食廢物伏

出尽方少定此乃肝木剋脾土風痰壅盛宜以青州白圓
子方作生料更加少木香丁香橘紅天麻全蝎去毒足僵
蚕炒去茸足服有效

預嗽當歸飲 治男子因打損負重女子因勞苦用力而傷

肺經肺經既損遇風寒則為咳嗽或咳血或至紫黑宜用
此藥去心肺間瘀血仍灸肺腧病即甦肺腧穴在三椎下
兩傍各一寸半

蘇木

生地黃

當歸

大黃

赤芍藥

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調理

通治 治諸證痰嗽服他藥不效者

南星

蚌粉

知母

貝母

半夏

白礬

右各等分剉散每服三錢水一大盞生薑伍片去渣
清俟溫徐徐咬服食後臨睡服小兒亦用得效

青金丹

治肺虛壅咳喘滿咯痰血

杏仁

去皮夫

牡蠣

煨取粉入杏仁同炒諸
色去牡蠣粉不用

青黛

右研勻入黃蠟壹兩鎔搜和圓如餅子大壓區如餅每
日中用柿壹箇去核蒸在內濕紙裹煨納藥罈方取出

去火毒細嚼糯米飲送下一方名甲乙餅治咳吐血片

兼涎內有血條不問年久月深但盡在一服効用青黛
一分牡蠣粉貳錢已杏仁七粒去皮尖研墻圓了湯浸

並同前

咳嗽

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶脇肋脹滿
道塞短氣喜欲飲冷咽噎引痛及癆肺痿勞嗽唾血腥臭
乾嘔煩熱聲音未出肌肉消瘦倦怠喊食

地骨皮

人參

甘草

阿膠

炙

杏仁去皮

粟白皮

知母

烏梅

去核

桔梗

去戶

罌粟殼去蒂蓋

右等分剉散每服三錢水壹錢半為梅棗子各一枚同

煎至壹匙去渣食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清服功

增補散 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

欬冬花

紫苑

洗工焙乾

甘草

炙

五味子

半斤

粟白皮

桔梗

杏仁

去皮

紫蘇葉

切

神效散

治一切喘嗽

右剉散每服肆錢水一錢黃蠟少許煎食後臨卧溫服

用皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆壹粒微炒定童

子小便浸壹宿火上灸令焦黃去巴豆不用或入二粒

亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油內煎令折裂為

度同為末每服一字乾柿點藥細嚼或用白米糖讓喫

亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物妙不可言

參蘇散

治上膈泛熱咳嗽聲重方見傷寒和解類

寧肺散

治大人小兒諸咳嗽

玄胡索一兩 枯礬二兩半

右為末每服貳錢用軟錫糖一塊和藥含化小兒一分

用蜜亦可

杏仁 治咳嗽失音不出

杏仁去皮尖研三月生薑汁

蜜

砂糖各一月

粟白皮

木通

貝母各壹兩紫苑一分

五味子各一兩

右剉散用水參升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑汁再煎

成稀膏每服挑一匙頭含化更加知母欬冬花各一月効

陳湯 治咳嗽嘔痰方見疾瘵類

欬冬花散 治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胃膈煩悶痰

窰凝盛咳中呀呷鼻塞清涕頭痛瞖目肢麻倦疾咽嗑痛

知母一月 麻黃去根前 粟白皮洗焙 半夏各一月

阿膠去粉炒 貝母去心炙

杏仁去皮炒

甘草二兩 欬冬花去根

右剉散每服水一椀薑三片煎至七分去渣食後溫服

單方 治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡目

甜葶藶二兩半 蘇合一分

右為末每服三匙水一盞煎至六分不拘時溫服

又方 治穀氣素壯人久嗽即效粟殼一味淨去筋膜蜜炙

寫末每服用鹽湯下

又方 治羸弱久嗽發效九尖拒霜葉為末用魚鮓煎服

又方 治少嗽漸成癆瘵鳳尾草為末用魚鮓煎服即效

喘咳 內也散

薄荷

百藥煎

枯礬

防已

甘草

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失声有效

星少圓

治一切風痰利背甯壯脾胃及消痰積溫中順氣

內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神效

南星洗四湯七次 長薑

縮砂仁各刀 香附子二刀炒去土

右為末生薑自然汁煮麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓

生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服

撲酒方 治久病痰嗽百藥未效

橘紅一斤去白

甘草

塩各四兩

右用水五盞慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服

治痰嗽百浮

箕蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌青黛少許

同滾鹽水滴麻油數點服即愈

灸法 上氣效逆短氣胸滿多唾噎噎冷灸灸肺膈五十壯

又法灸兩乳下黑白際各百壯即癢咳嗽咽冷土疔破喉

猜上灸天突伍拾壯宛與灸常 膏肓膈在四椎下五椎

上各去脊三寸近胛骨僅竅一指許多灸之亦效

○喘急

風證 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅塞涕唾稠粘

壬足冷痺

麻黃

去根節拾兩

肉桂

去皮陸兩不見火

欵冬花

各兩去芦枝梗

訥子皮 五兩 甘草 五兩 杏仁 三兩 去皮

右剉散每服參錢水壹盞半入好茶壹錢煎至八分食

後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和勻沸

湯點或乾燕亦得忌魚酒炙煨猪肉腥臊等物

溫肺湯

治肺虛久感風邪喘咳不能坐卧可思飲食

白芍藥 二兩 五味子 去核 乾薑 炮 肉桂 去粗皮

半夏 煮熟 炮 陳皮 去白 杏仁 甘草 各三兩

細辛 去芦藥 各二兩

右剉散每服參大錢水一盞半煎至八分以絹帛搗汁

食後服兩服渣再煎一服一方去芍藥細辛可加減用

金沸草散

治肺熱傷風喘嗽痰實 方見咳嗽類

寒痰

杏仁 去尖 陳皮 一兩 甘草 三兩 半 麻黃 二兩

北五味子 七兩 半 辣桂 五兩

右剉散每服四錢水壹盞半生薑三片煎喘甚加馬兜

鈴粟白皮夏月減麻黃

素者宜服此方見傷寒和解類

子杏仁去皮尖鹽梅煎有泄不用杏仁方見傷寒陰證類

七情四感湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養正

丹黑錫丹

四時湯治驚憂氣遏上喘

半夏製

二兩半 茯苓 二兩

厚朴製

一兩半 紫蘇葉 一兩

右剉散每服參錢半薑七片棗二枚煎服

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸

鳴氣走瀉有聲大小便不利脉虛緊而瀉

紫蘇子 一兩

大腹皮

草果仁

半夏

湯洗

厚朴去皮薑汁製

木香不見火

陳皮

木通

白木

枳實法薤

人參

甘草

炙

右剉散每服四錢水五盞薑三片棗二枚煎至七分不拘時

治心脾俱熱致胸滿壅盛口乾作渴發喘唯

中脘氣每服貳錢薄荷茶清調下

治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮煎

方並見

治過食煎燔或飲酒過度致肺壅喘不得卧及肺

癰咽燥

甜葶藶炒

桔梗去芦

瓜蒌子

川升麻

薏苡仁

桑白皮炙

葛根醃壹

甘草

炙半兩

右剉散每服肆錢水一盞半生薑五片同煎食后温服

治服熱藥過多致身有煩熱作喘數服即安方

見傷寒陽證類

加甜葶藶桑白皮煎方見陽寒

加防己薄芎煎方見發熱類以上

如味密涎圓治風熱上壅或中脘停留水飲喘急治四展
浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之得利則效

大戟

羌花

甘遂

甜葶歷

巴豆

去殼各乙兩

黑牽牛

各兩取頭末

白芥子

二兩

右為末米糊圓粟米大每服三七粒茶清吞下或溫水亦可服後未可服甘草桑及熱水

虛證治氣虛發喘不得安枕宜用舊益梅杏

仁牛皮尖北五味各少許煎吞黑錫丹五十粒

方見諸氣及个餘類

鍾乳圓治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐卧遠年日近並見治之

滑石半兩

鍾乳粉

見成者乙兩

南星

炮功片生薑

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為餅口梧子大每服四圓薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹

方見補冷類

人參湯吞服甚妙方見咳嗽類

安胎圓治腎寒多唾上喘人參益湯下

朱圓不可見虛損類

益氣圓治虛勞喘嗽眩暈

靈沙

壹兩細研

人參

木香

各半

大香附子

大紅椒

去合口并子焙

石為末糕糊圓如麻子大每服二十圓空心橘皮湯下

通浴治肺氣喘咳中有聲坐卧不安胸膈緊

注酒及治肺感塞邪咳嗽声重

人參 去芦 一兩

瞿麥殼 二兩

麻黃 去節

半夏 麩

甘草 各一兩

萊白皮 半斤

阿膠 一兩

五味子 半斤

九宝湯

治經年喘嗽通用常肺痿效

麻黃 去節

橘紅

腦可 各壹分

辣桂

紫蘇

萊白皮 炒

杏仁 去皮火

大腹子 連皮

甘草 各半兩

右劉散每服錢壹伍片烏梅壹箇水一盞半同煎食

後臨卧服或入童子小便半盞尤妙

杏參飲

治因傷風感寒驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急不足

人參 栗白皮 搗紅 大腹皮

檳榔 白木 何子 炒 半夏 湯炮

桂心 不見火 杏仁 去皮尖 紫苑 洗 甘草 炙

右等分劉散每服肆分水壹盞半生薑伍片紫蘇七葉

煎至七分去滓温服不拘時候

分心白飲 治氣逆脉伏發厥而喘者 方見諸

秘津降氣湯 治氣不升降上熱下冷作喘生薑紫蘇蘇葉同

煎就服 **玉華白丹** 效 方見諸

加味白朮散 白肥 方見 癰冷類

陳皮 半夏 人參 白茯苓

白朮 甘草 炙 山藥 炮 白扁豆 製

喘急 卷五

喘急 卷五

喘急 卷五

喘急 卷五

喘急 卷五

縮砂

桔梗炒

石蓮肉

薏苡仁略一

右劉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑粟白皮煎服效

不養木香丸

治喘急泄瀉加官桂生薑煎服方見下利類

神保丸

治交喘胸膈滿悶食不進每服七丸生薑稀蒂

湯下方見諸氣類

玉液散

治久近喘嗽口乾作渴

苡芩麥根

知母

貝母各一兩炒甘草半兩

人參半兩

右末每服三錢先銼下黃鏹三錢同入米飲調下食後服

神應丹

治肺氣喘急晨夜不得睡不問久新一服見效

砒石一兩

萊菔陸各

右一味同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹壹兩同研

爛用紀做卷五七重如豆筒又入砒石黃丹以黃泥固

濟復燒紅為度又入黃丹壹兩為圓如粟米大

又以黃丹貳兩為衣每服二粒新井花水下得效即止

胡利湯

治痰喘

胡桃肉

生薑

杏仁片

右臨卧食畢飲湯三兩呷又再嚼如前飲湯就被即安

葶藶圓

又名防已圓大治肺氣咳嗽面浮目腫喘促睡卧

不得步履艱難小便赤澁等疾

真防已

貝母

木通

甜葶藶

杏仁

去皮尖及雙仁麩炒

右為末棗肉為圓如梧子大每服三十圓前乘白皮湯下不拘時候

炙肝散 治喘併痰嗽兩服病不復作

白礬 飛過研 五倍子 為末

右每服各一水以生豬肝火上炙熱蘸藥食後臨卧服

人參清肺飲 治喘急噎塞加桔梗欬冬花 方見咳類

清膈散 治喘嗽吐唾不利膈熱口申苦氣

南星 壹兩 鉉白霜 少許 乘白皮 鹽乃 白附子 五斤

右劉散生薑三片煎食後臨睡服

灸法 腫脰各十一壯穴在第三椎下兩旁各去一寸五分

天突穴在頸結喉下五寸宛宛中灸七壯立效

○ 泄瀉

風證 **香薷散** 治傷風自汗飧泄每服肆分生薑不瓜

煎服 方見傷寒和解及傷暑割

不換金 治虛傷風冷瀉如官桂烏梅 方見時疫類

胃疝湯 治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下腸中

虛滯大腸受濕下如豆羹汁或下瘀血日夜無度並宜服

人參 白茯苓 去皮 芎藭 桂心 不見火

當歸 白芍藥 白朮 火 甘草 炙

右等分劉散每服肆錢水壹盞半入粟米百餘粒煎至

七分去滓空腹稍執服胃氣弱者不宜多服

火吹丸 治風氣行於腸胃泄瀉

火炊草壹味為末醋糊丸每服三十丸空心服

寒證

風下湯 治腸胃虛弱腹內痛身怯寒泄瀉青里兼

治傷寒挾寒而利臍下冷名鷺瀉證效

人參

白朮

乾薑炒

甘草炒

加茯苓

厚朴薑薑製
各貳兩

右劉散每服參錢水壹盞煎空心服

加味治中湯

治腸胃虛弱腹內痛身怯寒泄瀉

乾薑炮

白朮炒

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

各壹 人參

甘草各半

右劉散每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗子一枚煎至

七分去滓溫服不拘時或兼進感應圓

暑證 **香薷散** 治傷暑煩渴引飲所下如水 方見傷暑類

胃苓湯 治傷暑煩渴引飲所下如水

五苓散 方見傷暑類

平胃散 方見脾胃類

右二水合和紫蘇烏梅煎湯下末效加水香縮沙白朮

丁香煎服求復丹亦可 方見調冷積或感寒濕 湯調不

通來散 分利水穀解煩熱止泄瀉

猪苓去皮

白朮去芦

澤瀉去毛

赤茯苓去皮

車前子

木通

茵陳

瞿麥

右劉散每服肆水壹盞半燈心麥門冬煎服

六和湯

治暑瀉小便赤澀 方見傷暑類

水浸丹

治感暑口乾煩渴頻瀉 方見霍亂類

瀉證 方見傷寒陰證類
霍亂 方見傷寒陰證類
瀉腰脚冷痺小便自利肢體重著所下

胃冷湯 治傷濕瀉每服貳水蘇葉三皮良薑少許調熱服

白朮附子湯 治腸胃虛受濕腸鳴泄瀉自汗

白朮貳兩 附子炮一 茯苓各壹兩

右劉散每服肆水壹盞半生薑七片棗子壹枚煎至

七分去渣溫服不拘時候

麩考丸 治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭 神麩 白朮 附子各等分

右為末糊圓如梧子大每服五十丸米飲下

七情如味 **霍亂自止散** 治飲食中憂怒傷脾腹內膨滿泄

瀉併或作晨泄加丁香百粒砂仁各半錢生薑

二片紅棗一枚煎効

木香散 治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄米穀不化飲

食無味肌肉瘦瘁心多嘔恚婦人產后虛冷下泄及一功

水瀉冷痢

木香 破故紙各壹兩 良薑 砂仁

厚朴各壹分 赤芍藥 陳皮 肉桂

白朮各半兩 胡椒 芩藭各壹分 肉豆蔻肆分

檳榔壹斤

右為末每服壹大錢用不經水猪肝肆兩批薄重口

華漿水一碗入醋茶脚少許入飩蓋覆煮熟入鹽葱白

三个生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食之初微
溘不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑泄只是
一服溘則飲粥湯忌冷油膩如不能食冷則漿水煖食
之若只用漿水煮猪肝為圓如梧子大每服五十九用
粥飲下亦效若暴瀉只一服

熱證黃連赤帶散 治熱瀉溘利大便熱煩燥小便赤喜飲

冷香薷散每壹兩加宣連伍子對碎合和燈心貳拾葉車
前草貳根同煎 方見傷暑類

五苓散 治法湯引同上 方見傷暑類

黃連阿膠丸 每服五十九丸飲下空腹服 方見咳軟類

柴胡湯 治傷寒身熱目疼煩渴泄瀉二藥

和合用生薑礞果烏梅煎服立效 方並見傷寒湯證類

藜皮湯 治協熱泄瀉亦治血痢

藜皮 參兩 黃芩 貳兩 黃連 壹兩

右劉散每服肆錢水壹大觔煎至七分入阿膠末半錢
再煎少頃溫服

調胃承氣湯 治天實熱下利讞言此有燥屎也夫泄瀉反

用大黃者乃因所利而利之此治熱瀉也非大實勿妄輕
用之 方見傷寒陽證類

冷證五苓黃五積散 炒過各和氣飲治脾胃宿冷腹內切

痛或外感風寒內傷生冷泄瀉黃白色不止或肝經受寒
面色青條厥而泄利生薑三片塩梅乙个紅棗二枚同煎

大效 方見傷寒陰證類

巨附丸

治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉
注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮兩

木香

二兩

白茯苓

兩

乾薑

兩

附子

炮去

肉桂

去

丁香

兩

右為末薑汗糊為丸如梧子大每服伍拾圓加至壹伯

圓薑湯吞下粥飲亦可空心食前服

薑附湯

治下泄如水或青或白臍腹痛手足冷脈細欲絕
漸漸短氣由陽氣暴絕為陰所迫則注下不止陽復則生

不復則死又不正交氣海百壯傷寒虛證驚澹亦效

大已寒丸

治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疝痛脇肋脹滿泄

瀉腸鳴自利自汗久痢休息

華撥

肉桂

各四兩

乾薑

兩

高良薑

右為末煑麩糊圓如梧子大每服叁十圓空心米飲下

加法

治臍膈虛怯本氣衰弱脾胃不決不進飲食

時加泄利晝夜不息

人參

去

白茯苓

去皮

附子

去皮

木香

炮

訶子

濕布包

兩

右坐散每服式不薑二片棗一枚煎至六分服

加薑建湯

治洞泄不止

大川烏

綿附

天雄

去

木香

肉豆蔻

訶子

去

右劉散每服叁永生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳米
一撮同煎空腹熱服未效仍服來復丹

來復丹

治同上方見痢冷類

養心圓

治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉炒

赤石脂

川薑各半斤

吳茱萸炒

縮砂仁

肉豆蔻

附子炮去尖 附子各五分

右為末麩糊圓如梧子大每服五十圓食前米飲下

猪膽圓

治臟寒泄瀉不進飲食氣體倦怠

吳茱萸

淨去枝梗不以多少用水浸透

右用猪猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內以頭
扎定慢火煨令極爛用甌蒸熟尤好將二味磨細內研

千下令極細圓如梧子大每服五十圓米飲下

猪肚圓

治臟寒泄瀉先用製成厚料附子二味生薑棗子

煎服空心仍服此猪肚圓

川烏炒

附子炮

各二兩 乾薑炮

白朮

厚朴各壹兩

良薑炮

肉豆蔻煨

華換

禹餘糧炮 縮砂仁

丁香

桂心各五分

右為末用猪猪肚壹隻淨洗以川椒壹兩去日茴香一

兩大麩二兩入猪肚內用線縫定酒醋煮爛取出川椒

茴香大麩焙乾為末均和前藥以猪肚并和得所為圓

如梧子大每服五十圓空心米飲送下

椒圓

治臟虛寒泄瀉不止

烏梅

去核生兩半
醋浸布米蒸

揉成無滓艾

乙兩半

川椒

炒去目

乾薑

赤石脂

黑附

炮裂各壹兩

右除烏梅外同為末將蒸過烏梅同研勻更入熟棗肉蜜少許和圓如梧子大每服二十圓米飲下

茱萸湯

治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸

取淨下以多少

右用白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也

大理中圓

治大便虛滑不禁每一圓用平胃散壹貼煎化

服便止加鹽梅同煎尤妙

人參

白朮

乾薑

甘草各等分

右為末煉蜜圓如指頭大

君子湯

治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉

人參

甘草

白茯苓

白朮

肉豆蔻

溫帝畏熱剉碎以厚布或壓去油訶子各等分

右劉散每服參錢生薑三片紅棗二枚煎服或為末熱益湯調服亦可

養氣丹

治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十圓空心米飲

吞下多服收功方見痢冷類

冷拉不調

參連圓

治湯胃虛弱冷拉不調泄痢腸鳴日夜

無度

艾葉

用糯米糊拌勻焙取細末秤式兩半乾薑炮取末式兩用艾末末

宣連

壹兩半別如礬豆大用吳茱萸兩 訶子壹兩

木香

壹兩半別用黃連壹兩半為籠末將木香簿水壺升慢火煮盡冰去黃連不用切焙乾

人參

去芦

白木

烏梅

乾研

百草霜別研

白茯苓

去皮

酸石榴皮

炒

當歸

洗焙各

地榆已上各

赤石脂

一兩

龍骨

壹兩三

阿膠

分火煨

聖藥

設

壹兩

右為末將前項艾膏和為圓如梧子大每服五十圓陳

米飲下

圓 治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化腸鳴腹痛

黃連

白芍藥

吳茱萸

泡七次培乾

右葶分為末用糊圓如梧子大每服三四十圓空心食

前濃米飲下

腎泄 **安腎圓** 治腎洩腹痛无定處似痢非痢骨痛面顴腫

脚時公用 **七氣湯**

送下

安腎圓

方見虛

七氣湯

見心痛類

震靈丹

治同前每服三十圓炒破故紙棗子煎湯調種乳

粉少許空心送下小兒腎泄白膿褐汁面黯齒脫俚人法

寒震靈丹未入些鐘乳粉以棗煎炒破故紙取熱汁調下

效方見類

益瀉正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷

之證並皆治之 方見通冷類

脾泄 **炙肝散** 治久患不愈

白木

白芷

白芍藥

桔梗

右等分為米炙益肝煎服

和氣散

即除麻黃五積散治久虛脾泄大效方見傷寒陰證類

補附圓

治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻胃惡心臟

腑滑泄

厚朴

去龜皮薑汁製壹兩

綿附子

炮去皮臍淨壹兩

神麩

炒五升

乾薑

炮三兩

右為末酒煮麩糊圓如梧子大每服三十圓空心食前

米飲或鹽湯下

脾腎泄

不食散

治脾胃俱虛泄瀉

肉豆蔻

麩爆

破故紙炒

白朮

白茯苓

各半兩

木香

甘草

炙各七升

右劉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前溫服

治脾胃虛弱泄瀉不止全不進食

肉豆蔻

二兩破故紙四兩

右為末用肥棗肆拾玖箇生薑肆兩切片同煮棗爛云

薑取棗剥去皮核用肉研為膏入藥和杵圓如梧子大

每服三十圓鹽湯下立効弱甚加茯苓二兩木香一兩

積蓄不化治食傷脾胃意生熟氣及所泄穢氣殊甚或

腹緊塊痛水煎吞服每服三七粒立効久患豆

積油瀉不止經驗方見傷寒和劑及諸積類

治傷食成積下瀉與和每服二錢

紫蘇葉食塩煎湯調常服有效方見諸氣及脾胃類

酒泄虛者和治飲酒多遂成酒泄骨立不能食恒再

飲一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

草火燎去毛蘇炙黃

肉豆蔻

火煨

生麝香

另研

右為末白陳米飯為圓如梧子大每服五十圓空腹米

飲下熱者酒蒸黃連圓 方見下痢類

胃氣專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽神麩各五

錢為末空腹米飲調二錢豆愈

晨泄又名溲泄

生薑 四兩切如豆大

黃連 二兩剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連末每

服二錢用漿茶清調一劑而愈又用米飲酒調治白痢

尤妙若欲速效一料只作二服

五更天明溲泄一次名腎虛泄感陰氣而然

五味子

陳去便

吳茱萸

半兩

右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲調下食則止

剉服或加破故紙炒香肉一錢煨裂為末蒜膏為圓如

梧子大每服三十圓米飲下大效

滑泄 大斷圓 治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入味細皮

寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗也則氣奪由穀

氣不入胃也無王以養故形氣消索五臟之液不收謂之

五虛此為難治畧能食者生

附子

肉豆蔻

牡蠣

服研

細辛

乾薑

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮

醋煮乾為度焙乾各一兩半

白礬

枯訶子去核

右為末糊圓如梧子大每服三十圓粟米湯下

草薢飲 治滑泄神效

陳米一兩

肉豆蔻麩 五味子

赤石脂研細

右為末每服二錢粟米湯飲調下日進三服

乳白圓 治滑泄不止諸藥無效

肉豆蔻生為末

右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥末為圓如梧

子大每服五十圓空腹飯飲下

草薢圓 治滑泄妙甚

草薢

川薑炮

丁香不見火

附子炮去

吳茱萸炒

良薑

胡椒上各

山茱萸

草豆蔻

去皮各半兩

右末粟肉圓梧子大每服五十圓食前陳米飲下日三服

固腸圓 治臍腑滑泄晝夜無度

吳茱萸揀爭

黃連去須

附子粟殼去無蒂

右為末醋糊圓如梧子大每服三十圓空腹米飲下

暴瀉 治所下如破水

生硫黃

白滑石

右為末溫水調下立止

車前散 治石豆蔻不止小便不通

車前子右為末每服二錢米飲調根葉亦可立效

針頭圓治夏月水瀉不止

大巴豆 一點去衣

右以針刺定灯上燒存性不可過研細用蠟如小豆大
蘸些油灯上炙令鏹圓已豆灰作一圓倒流水吞服食
前一服效

神麴圓治暴瀉不止

神麴炒 二兩 萊菔 半兩湯包七次

右為未用醋糊圓如梧子大每服四十圓食前米飲下
肚痛圓治水瀉

猪肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內以肚子滿為度
晨至晚以肚蒜藥爛為度將成膏子入平胃散同煎

梧子大每服三十圓鹽湯或米飲空腹服

粟殼圓治暴瀉
肉豆蔻 炒 粟殼 炒 赤腸 蒂

右為未醋糊圓如梧子大空腹米湯下三十圓

單方 鍾乳粉一味棗肉為圓治久瀉極重棗湯下

小兒亦可服

灸法 泄利不止灸脐中各神闕穴五壯或七壯艾炷如小
筋端大及關元穴三十壯其穴在脐下三寸

通治 大人小兒腸胃虛弱冷熱米調臟腑

受寒下痢泄瀉或便膿血有女魚腦裏急後重脐腹疼痛
日夜無度胸膈病悶脅肋脹滿全不思食及治脫肛墜下

酒毒便白諸藥不效者並以此治之

嬰粟殼去蒂蓋

人參去芦

當歸去尾

肉桂去蘖皮

木香一兩四分

肉豆蔻麩裹煨

白朮六錢

白芍藥一兩

甘草八錢

右劉散每服二大錢水一盞半煎至八分去渣食前溫

服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈思酒麩生冷魚

腥油膩如臟腑滑泄夜起久不瘥者可加炮附子三片

煎服此的有神效或有積用縮砂煎湯下感應圓二生

粒矣其積消然後服此

香圓治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱調泄瀉煩渴米

不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脇助脹滿或下痢膿血裏急后
重夜起頻併可思飲食或下便不利肢躄怠惰漸即瘦弱
並宜服之

黃連去芦麩去十兩

木香四兩

右為末醋糊圓如梧子大每服貳十圓飯飲吞下空腹

食前日進三服

人參散治渴後煩渴方見嘔吐類