

唐千金類方

上海千項堂書局發行

嚴若經署

備急千金要方卷第九

下傷寒

後學三水黃恩榮幹南編述

三男

中醫藥學專門畢業

悌君校對

學生

廣州中醫藥實驗館專門畢業

陳景山覆校

傷寒雜治第一

熟毒喉開口告

嘔氣攻手足

利口乾毒腫

下利虛腫

利斑出或豆瘡

汗不止鼻衄

盜汗附

傷寒復第二

食忌理髮附陰陽易

百合第三

傷寒不發汗變成狐惑第四

傷寒發黃第五

溫瘡第六

溪毒證第七

傷寒雜治第一論

灸法一首

方五十一首

論曰。凡除熱解毒無過苦酢等物。故多用苦參。味苦寒。本經。青葙。味苦微寒。本經。治心腹結氣。青葙。唇口青。上卷傷寒。青葙。與黃連龍膽苦參同用。九味苦微溫。射後方。溫疫頭痛壯熱。艾。味苦微溫。射後方。溫疫頭痛壯熱。梔子。味苦寒。本經。治氣。破堅逐瘀利水。即米醋。殺邪毒。烏梅。除熱煩渴。之屬。是其要也。夫熱非苦酢之物。不解也。熱在身中。既不時治。治之又不用苦酢之藥。此如救火不以水也。必不可得脫免也。又曰。今諸療多用辛甘。薑桂人參之屬。此皆貴價難得常有。比行

求之轉以失時。而苦參青葙慈艾之屬。所在盡有。除熱解毒。取良勝於向貴價藥也。前後數參并用之。得病內熱者。不必按藥次也。便以青葙苦參艾苦酒療之。但稍與促其間。無不解也。扁鵲曰。病在腠理。湯熨之所及。病在血脈。針石之所及。病在骨髓。無可奈何。而凡醫治病。或言且待。使病成乃頓去之。此為妄矣。當預約束家中。及所部曲。具語解此意。使有病者知之為要。

毒熱邪閉

方 治溫氣病欲死

苦參一兩。以酒二升。煮取一升。盡飲之。當吐。則除諸毒病服之。覆取汗。皆愈。

張文仲及肘後云。治熱
毒氣。卒死。破棺千金湯。

毒熱邪閉。溫氣病欲死。苦參本經治心腹結氣積聚。徐洄溪苦參以味為治。苦入心功。用相近。黃連去心臟之火為多。邪在心腹。當吐。或復取汗。皆借酒力以利溫行。邪有出路。凡溫毒邪閉。深伏陽分。而不出者。宜之。

毒熱火盛

苦參湯 治熱病五六日已上。

苦參三兩

黃芩二兩

生地黃八兩

右三味咬咀。以水八升。煎取二升。適寒溫。服一升。日再。

毒熱火盛。溫病五六日已上。苦參湯。倍用苦參。治心腹結氣積聚。佐黃芩泄濕熱。加生地瀉陰火。酒煮易水不必吐汗。邪已內解。凡溫毒火盛。深伏陰分而不出者。宜之。

毒熱陽厥

凝雪湯 治時行毒病七八日。熱積聚。胸中煩亂欲死。起死人。搗湯。

芫花一升。以水三升。煮取一升半。濱故布薄。胸上不過三薄。熱即除。當溫暖肢護厥逆也。

毒熱陽厥。溫病七八日。熱積聚。胸中煩亂欲死。厥逆至危。陰陽氣不相順接。手足逆冷。時脈還。手足溫者生。脈不還者死。非氣逆不知人之厥也。凝雪湯。芫花破積聚痰。水性味辛溫却利其攻下之力。濱故布薄。胸上熱因寒用。故湯有凝雪非田光不開。以止煩亂熱解。四肢緩而時行毒病。陽氣厥逆不通。欲死亦除。

毒熱斑出

猪膽湯 治傷寒五六日斑出。

猪膽

苦酒各三合

雞子一枚

右三味合煎三沸。強人盡服之。羸人須煎六七沸。分為二服。汗出即愈。

傷寒五六日毒熱斑出。前論除熱解毒無過苦酢等物。猪膽湯。猪膽味苦而滑。苦酒味苦而酸。除熱解毒以勝肝膽之火。雞子味甘而平。清氣涼血能去心胞之熱。合煎內服。由肝膽直達肌肉。汗出即愈。方意與上傷寒宜吐第七酒膽湯及下毒熱瘡盛。

醉膽湯同。足補仲景陽毒發斑。升麻鱗甲所不及。

毒熱瘡盛

方二十三首

方 治內發瘡盛。

醉四合 大豬膽一具

右二味合煎三沸。服一合。日五服之良驗。

消塗去。有豬膽和芒。

摩方 治時行病發瘡。

取好蜜。偏身摩瘡上。亦可以蜜煎升麻摩之。并數數食之。

方 治豌豆瘡。初發覺欲作者。

煮大黃五兩。服之愈。

又 治熱病後發豌豆瘡。

黃連三兩。以水二升。煮取八合。頓服之。

又方

真波斯青黛。大如棗。水服之瘥。

又方

青木香二兩。以水三升。煮取一升。頓服之。

傅方

小豆屑。雞子白和傅之。

傅方

苦赤黑發。如疥大一作疾大者。煎羊脂摩傅之。

洗方 治人及六畜。時氣熱病。豌豆瘡。

濃煮黍穰汁洗之。一莖是穄穰。即不瘥。瘡若黑者。擣蒜封之。黍穰者。穄穰小米之粘。即高粱。

洗方

煮芸薹洗之。

拭方

婦人月水帛拭之。

浴方

小兒著。取月水汁。和水浴之。

灸法

熱病後。發豌豆瘡。灸兩手腕研子骨尖上。三壯。男左女右。

木香湯 治瘡出煩疼者。

青木香二兩

薰陸香

丁香

礬石各一
兩

麝香半兩

右五味㕮咀以水四升煮取一升半分再服。熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代。病輕者去礬石神驗。

塗方

瘡上與芒消和猪膽塗勿動痂落無痕仍卧黃土末上良此病小便澀有血者內壞瘡皆黑靨不出膿者死不治也

漏蘆連翹湯 治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫及眼赤痛生鄣翳。

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白斂

升麻

甘草各二兩

枳實

大黃各三兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服相去五里久更服熱盛者可加芒消二兩。

時行熱毒發於週身則赤癰丹疹發於頭面則赤痛目翳漏蘆連翹湯以漏蘆連翹解皮膚熱毒升麻麻黃白斂發頭面熱毒黃芩大黃枳實瀉腸胃熱毒甘草解臟腑熱毒熱盛毒深更藉芒消鹹潤以助大黃所不及為毒熱陽癰第一法

塗方 治毒熱攻手足赤腫焮熱疼痛欲脫

猪膏和羊屎塗之亦佳。

清方

煮馬屎。若羊屎汁。清之。日三度。

清方

濃煮虎杖根。適寒溫。以清手足。令至踝上一尺止。

清方

取酒煮苦參。以清之。

清方

稻穰灰汁。清之。

清方

取常思草。绞取汁。以清之一。名蒼耳。

毒熱喉閉

方 治傷寒熱病。喉中痛。閉塞不通。

生烏扇一斤 猪脂一斤

右二味合煎。藥成去滓。取如半雞子。薄綿裹之。納喉中。稍稍咽之。取瘥。

又方

升麻三兩

通草四兩

射干二兩

芍藥

羚羊角各三兩 生蘆根切一升

右六味㕮咀。以水七升。煮取二升半。分三服。

烏扇即射干葉叢生。橫鋪一面。如鳥翅及扇狀。俗呼扁竹。謂其葉扁生。而根如竹。花有白有黃有紅有紫。丹溪獨取紫花必有試驗。近人呼為紫蝴蝶。開藥稱紫蝴蝶根。又曰紫花扁竹根。即是此物。本經主治喉痺咽痛。首方佐猪膏。以潤肺和胃。其力專。次方加升麻羚羊解毒。熟蘆根通草。開痰熱芍藥瀉陰熱。其力厚均良法也。

虛熱浮腫

方 治病後虛腫。

豉五升。醇酒一斗。煮三沸。及熱頓服。不耐酒者隨性覆取汗。

虛熱自汗方五首

方 治汗不止。

地黃三斤切。以水一斗。煮取三升。分三服。

又方

白朮方寸匕。以飲服之。

又方

白朮葉作飲。飲之。

汗之與血異名而同詞。汗不止即血不止。故重用地黃滋血以止汗。又脾統血。脾虛不攝致汗。則用白朮補脾。或白朮葉之流走四肢者。以攝之。血有所統。則汗自斂。

方 治卒得汗不止。

溫酒服牛羊脂。

卒汗不止。則非陰血不攝。由風濕毒氣鬱於肌膚。蒸為熱汗。取牛羊脂之甘潤。去風熱。毒者。借酒力以溫行膚表。散風熱。而汗自收。

又方

服尿亦止。

虛熱盜汗方六首

牡蠣散 治臥即盜汗。風虛頭痛。

牡蠣

白朮

防風各三
雨

右三味治下篩酒服方寸匕。日二。止汗之驗。無出於此方。一切泄汗服之。三日皆愈。神驗。

虛熱盜汗。陽越頭痛。牡蠣散防風。開肺表。杜虛風。白朮。本經上除熱補脾土。除虛熱。牡蠣汗。汗為液。止虛汗。酒服溫行。一散一斂。為風虛陽越盜汗之妙法。

方 止汗。

牡蠣

杜仲等分

右二味治下篩。夜卧以水服五錢匕。

虛熱盜汗。陰虧津泄。前方去防風白朮易杜仲。補腎陰。仍用牡蠣斂心陽。水服和濟。為風虛陰虧盜汗之妙法。

粉方

麻黃根

牡蠣

雷丸各三兩

乾薑

甘草略一

米粉二升

右六味治下篩。隨汗處粉之。

盜汗不可無粉法。麻黃根。麻黃發汗。根節能闢能闔。雷丸。別錄。作摩膏。逐邪氣。惡風汗出。乾薑。本經。中止汗。一寒一熱。仍用牡蠣。別錄。止汗。一散一斂。甘草米粉和濟。粉汗之方。無以易此。

通治方

方 治盜汗及汗無時。

韭根四十九枚。水二升。煮取一升。頓服。

又方

豉一升。以酒二升。漬三日服。不瘥更合服。不過三劑止。

洗方

死人席緣灰煮汁。洗身癢。

虛熱口苦

方 治熱病口苦。下氣除熱喉中鳴煎。

石膏半升 蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃納蜜復煎取如餳含如棗核盡復合之大良。

熱病口苦非膽汁之上溢即胃火之上炎苦從火化其理宜然石膏甘寒清胃更藉蜂蜜甘緩潤喉使熱氣下行口苦去而鳴煎亦止。

虛熱口乾

方 治傷熱病後口乾喜唾咽痛。

大棗二十枚 烏梅十枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗。

熱病後口乾廉泉開陰津溢喜唾咽痛烏梅酸平斂肺生津合大棗甘平和胃止嘔更和蜂蜜潤喉止痛凡喉舌病千金多主甘潤不主苦泄此秘法也。

虛熱乾嘔方四首

桔樓湯 治傷寒中風。五六日已上。但胸中煩乾嘔。

桔樓實一枚

甘草各三兩

生薑四兩

大棗十二枚

柴胡半斤

右六味㕮咀。以水一斗二升。煮取五升。絞去滓。通寒溫。服一升。日三。

虛熱乾嘔。傷寒中風。五六日已上。胸中煩少。陽火鬱。桔樓湯即小柴胡湯活法。柴胡生薑止嘔逆。去半夏。人參用黃芩。加桔樓實。除煩滿。不必用半夏。煩不可用。人參今并去半夏。以煩嘔津乾嘔去半夏。人參加桔樓實。不嘔惟生薑辛潤。得以止之。桔樓實除胸痺。小陷胸法也。甘草大棗。調脾胃。上焦得通。津液得下。胃氣因和。而胸中煩乾嘔自愈。

蘆根飲子 治傷寒後。嘔穢反胃。及乾嘔。不下食。

生蘆根切

青竹茹各一升

粳米三合

生薑三兩

右四味。以水七升。先煮千里鞋底一隻。取五升。澄清下藥。煮取二升半。隨便飲。不瘥。重作取瘥。

虛熱乾嘔。傷寒後。反胃。不下食。陽明火燥。蘆根飲子。輕用生薑。止嘔。重用生蘆根。青竹茹。清痰熱。多取粳米。養胃津。尤妙。千里鞋底。即草鞋底。俗名草鞋為千里馬。取陳草以退餘熱。并履地親下。得土氣最多者。助蘆根竹茹所不及。而嘔。反胃。及乾嘔。不下食。亦除。

方 治傷寒後嘔噦。

通草三兩

生蘆根切一升

橘皮一兩

粳米三合

右四味㕮咀。以水五升。煮取二升。隨便稍飲。不瘥更作。取瘥止。

虛熱乾嘔。傷寒後。陽明火燥。如上法。易味。生薑橘皮。止嘔。重用生蘆根佐通草。開痰熱。多取粳米養胃津。而傷寒後嘔。亦除。

方 治傷寒後虛羸少氣嘔吐。

石膏一升

竹葉二把

麥門冬一升

人參二兩

半夏一升

右五味㕮咀。以水一斗。煮取六升。去滓。納粳米一升。米熟湯成。飲一升。日三服。一方加生薑五兩。此方正是仲景竹葉湯方。前卷汗後門中已有此方。仍少甘草。分兩小劑。

虛熱乾嘔。傷寒後。虛羸少氣。陽明火燥。變上法。生薑易半夏。止嘔。吐蘆根通草。易竹葉石膏。清痰熱。麥冬人參。益虛羸。仍用粳米養胃津。而傷寒後虛羸少氣嘔吐。亦愈。

虛熱衄血

方 治傷寒鼻衄。肺間有餘熱。故也。熱因血自上不止。用此。

牡蠣一兩

石膏一兩

六銖

右二味治下篩酒服。方寸匕。日三四。亦可蜜丸服。如梧子大。用治大病瘥後。小勞便鼻衄。

虛熱。衄血。大病瘥後。肺間有餘熱。小勞血自上不止。太陰火逆。肺竅於鼻。屬太陰。石膏清燥救肺。牡蠣退熱。斂陰。酒以行之。蜜以和之。丸以緩之。而傷寒後。小勞血自上不止。鼻衄自除。

虛熱下利方三首

方 治溫毒及傷寒。內虛外熱。攻胃下黃赤汁。及爛肉汁。赤滯下。伏氣腹痛。諸熱毒。

熱毒。

梔子

一枚二十

豉一升

薤白一握

右三味。以水四升。煮梔子薤白令熟。納豉煮取二升半。分三服。頻服取瘥。虛熱下利。溫毒及傷寒。內虛外熱。下黃赤汁。及爛肉汁。赤滯下。伏氣腹痛。諸熱毒。仲景太病瘥後勞復。原有枳實梔子豉湯。今用梔子豉。清心腹虛熱。去枳實。易薤白。開腸。胃滯痛。而溫毒攻胃。下黃赤汁。及爛肉汁。赤滯下。伏氣腹痛。諸熱毒以除。

方 治傷寒後。下利。膿血。

阿膠一兩

黃蘖二兩

黃連四兩

梔子

一枚十四

右四味㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓納阿膠。更煎令消。

分為三服。

甲乙方無黃芩。藥有黃芩。

虛熱下利。傷寒後。但純膿血。陽盛陰虛。仲景婦人產後下利虛極。原有白頭翁加甘

草阿膠湯今去白頭翁秦皮用黃連黃藥加梔子吐熱以止利。徐洄溪古方梔子皆人作湯以梔子炒黑不復吐全失人意終當從古法生用為妙去甘草用阿膠降火以滋陰陽盛陰虛治法同而後

不同如此。

麻黃升麻湯治傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利。唾膿血泄利不止為難治。

麻黃

知母

姜蕤一作菖蒲

黃芩各二兩

升麻

芍藥

當歸

乾薑

石膏

茯苓

白朮

桂心

甘草

麥門冬各二兩

右十四味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升分服一升微取汗愈。

虛熱下利傷寒六七日大下後津竭脈沈遲陽虛手足厥逆下部脈不至陰絕咽喉不利。唾膿血泄利不止上熱下寒為傷寒壞症仲景厥陰病誤下泄利原有麻黃升麻湯今用其法。麻黃升麻合桂心開發伏陷之邪。黃芩石膏知母清降鬱蒸之熱。姜蕤麥冬養陰津。芍藥當歸排膿血。白朮乾薑救厥逆。茯苓甘草止泄利法微取汗邪有出路而大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利。唾膿血泄利不止亦除。

虛脫下利

赤石脂禹餘糧湯 傷寒服湯藥而下利不止。心下痞堅。服瀉心湯竟復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。而利益甚。理中治中焦。此利在下焦。此湯主之。

赤石脂

禹餘糧各碎

右二味以水六升。煮取二升。分三服。若利不止。當利小便。

虛脫下利。心下痞堅。治痞利不止。理中利益甚。上熱下寒。亦傷寒壞症。赤石脂禹餘糧湯。赤石脂禹餘糧溫下固脫。培土以制水。利仍不止。更濱川以防河。小便利而大腸亦固。前方開鬼門。而此則兼潔淨府矣。

蟲積下利

納方 治赤白膿。小兒得之三日皆死。此有蠶蟲在下部。

麝香

礬石

巴豆

附子

真珠

雄黃

右六味等分。治合取桑條如箭筈長三寸。以綿纏頭二寸。唾濡綿。展取藥著綿上。納穀道中。半日復易之。日再神效。

蟲積下利。赤白膿。小兒得之三日皆死。礬石雄黃真珠清濕熱麝香辟蟲毒。經附子巴豆攻堅積。綿著納穀道。不傷元氣。足見神奇。

勞復第二 方二十一首 食忌九條

勞復

論曰。病新瘥後。當靜臥。慎勿早起梳頭洗面。非但體勞。亦不可多言語用心。使意勞煩。凡此皆令人勞復。

食勞復

凡熱病新瘥及大病之後。食豬肉及羊血肥魚油膩等。必當大下利。醫所不能治也。必至於死。若食餅餌粢黍飴哺鱠炙棗栗諸果物。脯脩及堅實難消之物。胃氣尚虛弱。不能消化。必更結熱。適以藥下之。則胃氣虛冷。大利難禁。不下之必死。下之復危。皆難救也。熱病及大病之後。多坐此死。不可不慎也。

幹南按。素問評熱論。病已衰而熱有所藏。因其穀氣相薄。兩熱相合。故有所遺視其虛實。調其從逆。可使必已。發明食勞復病義。極深細。

病新瘥後。但得食糜粥。宜少食令飢。慎勿飽。不得他有所食。雖思之勿與之也。引日轉久。可漸食羊肉白麋。若羹汁雉兔鹿肉。不可食猪狗肉也。

時病瘥後。未滿五日。食一切肉麪者。病更發。大困。

時病瘥後。新起飲酒及韭菜。病更復。

時病新瘥。食生魚鮓。下利必不止。

時病新瘥。食生菜。令顏色終身不平復。

時病新瘥。汗解。飲冷水者。損心包。令人虛不復。
時病新瘥。食生棗及羊肉者。必膈上作熱蒸。

時病新瘥。食犬羊等肉者。作骨中蒸熱。

時病新瘥。食蒜鱠者。病發必致大困。

女勞復

新瘥後。當靜卧。慎勿早起。梳頭洗面。非但體勞。亦不可多言語用心。使意勞煩。凡此皆令人勞復。故督郵顧子獻得病已瘥未健。詣華專視脈曰。雖瘥尚虛。未得復。陽氣不足。慎勿勞事。餘勞尚可。女勞則死。當吐舌數寸。其婦聞其夫瘥。從百餘里來省之。經宿交接。中間三日。發熱口噤。臨死舌出數寸而死。病新瘥未滿百日。氣力未平復。而以房室者。略無不死。有士蓋正者。病愈後六十日。已能行射獵。以房室。則吐涎而死。及熱病房室。名為陰陽易之病。皆難治。多死。近者有一士大夫。小得傷寒瘥。以十餘日。能乘馬行來。自謂平復。以房室。即小腹急痛。手足拘拳。而死。

勞復方六首

黃龍湯 治傷寒瘥後。更頭痛壯熱。煩悶。仲景名小胡湯

柴胡一斤

半夏半升

黃芩三兩

人參

甘草各二兩

生薑四兩

大棗十二枚

右七味㕮咀以水一斗煮取五升去滓服六合日三不嘔而渴者去半夏加桔梗根四兩。

傷寒瘥後脾氣未運膽火逆升因勞復作頭痛壯熱煩悶而嘔仲景傷寒瘥後更發熱原有小柴胡湯柴胡生薑半夏達肝邪人參甘棗益脾氣恰可移用不嘔而渴去半夏加桔梗根猶是常法易名黃龍足表變化神明之妙用。

枳實梔子豉湯治大病瘥後勞復者

枳實三枚

梔子十四枚

豉一升
綿裹

右三味㕮咀以酢漿七升先煎減三升次納枳實梔子煮取二升次納豉煮五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者納大黃如博棊子五六枚

大病瘥後胃中空虛客氣動膈因勞復作必有煩熱胸中窒及心中悶懷之候仲景大病瘥後勞復原有枳實梔子豉湯梔豉清上焦虛熱之邪枳實開心胸痰涎之結茲更用酢漿先煎酢漿淘米之泔水久貯味酸者有開胃調中解煩之用不取吐而取汗使餘邪仍從表出若兼宿食則加大黃不取汗而取下胃強食復治法如此

麥門冬湯治勞復起死人氣欲絕用有效

麥門冬一兩

京棗二十枚

竹葉切一升

甘草二兩

右四味㕮咀。以水七升。煮粳米一升。今熟去米。納諸藥。煎取三升。分三服。不能服者。綿滴湯口中。

大病瘥後。胃陰不充。餘熱未盡。勞復氣絕。仲景傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。原有竹葉石膏湯。茲用其法。麥門冬湯。去石膏半夏人參。專用竹葉麥冬。本經麥冬主傷中。傷飽。胃絡脈。清肺胃。甘草京棗。益虛勞。粳米先煮。生津液。藥雖平淡。能起死人。則神奇矣。

方 補大病後不足虛勞。萬病虛勞同用。

取七歲已下。五歲已上。黃牛新生者乳一升。以水四升煎取一升。如人體溫。稍稍飲之。不得過多。十日服不絕為佳。

大病瘥後。胃陰不充。真液內耗。嫩黃牛新生乳。養心肺。補虛羸。以有情精血。飲食消息。緩緩調復。良法也。

方 欲令病人不復。

燒頭垢。如梧子大。服之。

方 治病後勞復。或因洗手足。或梳頭。或食等。勞復。

取洗手足汁。飲一合。又取頭中垢。如棗核大。吞一枚。

病後勞復。既因洗手足。或梳頭起。即以洗手足汁。及頭中垢飲吞。即經言衰。以其屬

之法。頭垢推陳致新。特取陽氣之上達者。為之升發。即不因洗手足梳頭。或食勞復。亦有殊功。故上方有令病人不復之效。

食復

方 治病新瘥。遇美飲食。食過多食。復者。

取所食餘燒作末。飲調服二錢。七日三服。

亦經言衰以其屬之義。

食勞復方四首

方 治傷寒瘥後一年。心下停水。不能食。

生地黃五斤 白朮一斤 好麯二斤

右三味合搗相得。暴乾下篩。酒服方寸匕。日三加至二匕。

傷寒瘥後一年。胃氣尚弱。宿食不消。心下停水。不能食。生地黃本經除寒熱。精聚。別錄去胃中宿食。飽力絕。消積滯。白朮燥土濕。好麯化穀食。酒服溫行。而心下停水。不能食。亦愈。

方 治食勞。

麯一升煮取汁。服之。

又方

杏仁五十枚。以酢二升。煎取一升。服之。取汗。

杏仁利肺氣潤大腸。合酢酸苦。均有消食去積之功。不取吐而取汗。上焦得通。津液得下。胃氣因和。而食勞自愈。真神術也。

又方

燒人屎灰水服方寸匕

食復兼女勞

方 治新瘥早起及食多勞復。

豉五合

鼠屎二十
頭者一枚

加水一升亦可納枳實三枚。葱白一虎口。

右二味以水二升煮取一升。盡服之。溫卧令小汗愈。

崔氏加梔子七枚尤良。肘後有麻子仁納一升。

食復挾女勞。新瘥早起及食多勞復。謂女勞入足厥陰肝經。甘寒開泄以瀉肝。溫卧令小汗使毒熱深入。仍從外出。崔氏加梔子。肘後加麻仁或枳實葱白。若恐餘熱滯氣。猶有未盡者。其用意可謂周密矣。

方 治傷寒溫病後勞復。或食或飲或動作。

梔子仁

三十
七枚

石膏

五兩

鼠屎

尖頭大者
二十枚

香豉

一升

右四味㕮咀。以水七升。煮取三升。分三服。

食復挾女勞。傷寒溫病後。或食或飲。或動作勞復。謂女勞。毒熱深入厥陰。香豉加梔子。汗。使毒熱深入。仍從外出。而飲食動作勞復亦除。

方 治食大飽不消。勞復脈實者。

豉一升

鼠屎

二十
一枚

梔子七枚

大黃

三兩

右四味㕮咀。以水六升。煮取二升。分三服。微取汗。應小鴨瘡者止。不瘡者復作。

食復挾女勞。大飽不消。勞復。謂女勞。素問厥陰論。數醉若飽。氣聚於脾中。不得散。證如前。惟脈實。熱毒深入厥陰。結於陽明。小異。前枳實梔豉加大黃。既為勞復有宿食立法。今兼女勞。梔豉以涼膈。鼠屎以瀉肝。去枳實加大黃。以通胃。覆微取汗。及小鴨瘡。使毒熱深入。仍從外出。而大飽不消。勞復脈實亦除。

方 治重病新瘥。早起勞。及飲食多致復。欲死。

燒鱉甲末。飲服方寸匕。

食復挾女勞。重病新瘥。早起勞。及飲食多致復。必有勞熱。堅積在裏。非鱉甲不

能深入厥陰。搜邪而消積。燒灰尤去滯氣。所以得力。

方 治勞復垂死。

煖湯三合。洗四五歲女子陰取汁。納口中服即愈。小男兒亦得。女勞復垂死。未有挾食。四五歲女子陰洗汁。以陰補陰。奇妙不可思議。小男兒陰陰中之陽。亦得兼補之義。所以取四五歲女子及小男兒者。天全故也。

陰陽易附

論曰。婦人溫病雖瘥。未若平復。血脈未和。尚有熱毒。而與之交接得病者。名為陰易之病。其人身體重。熱上衝胸。頭重不能舉。眼中生眵。四肢膝脛拘急。小腹絞痛。手足拳皆即死。其亦有不即死者。病苦少。腹裏急。熱上衝胸。頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛。骨髓竭。便虛。噓吸氣力轉少。著牀不能動。搖起止仰人。或引歲月方死。醫者張苗說。有婢得病。瘥後數十日。有六人姦之皆死。

方 治婦人得病易丈夫。丈夫得病易婦人。

取女人中棍近隱處。燒服方寸匕。日三小便。即利。陰頭微腫。此為愈矣。女人病可取男棍。一如此法。

方 治男子新病起近房內復者。

取女人月經赤帛。燒服方寸匕。亦治陰卵腫縮。入腹絞痛。欲死。膀胱癱霍亂。門治女勞復。

衣合血燒灰熱病水服寒病
酒服起死回生不傳之秘

方 治交接婦人衣裳以覆男子立愈。

方 令病人不復。


取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若米飲汁服之。

幹南按女勞復為自病因房室而復陰陽易為自無病因房室而易女勞復壯熱頭痛煩悶心中懊惱甚則胸室心結痛病情總與梔子豉症相類故以梔子豉為主而用鼠屎入陰出陽以攻毒熱陰陽易病情不一惟以陰卵腫縮腹中絞痛為的驗本無藥可治仲景獨有燒棍散一法千金廣其義而用月經赤鼠婦人衣裳及手足爪中衣帶等物同氣相求莫名其妙兩症重者均足致死非藥所能救可不慎歟。

理髮附

通頭法 治病後頭亂不可理。

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之細細將釵子領髮斯須并自通。



百合病第三

論二首

論曰。百合病者。謂無經絡。百脈一宗。悉致病也。皆因傷寒虛勞。或誤汗。大病已後。不平復變成斯病。

百合之為病。令人意欲食。復不能食。或有美時。或有不用聞飲食臭時。如有寒。其實無寒。如有熱。其實無熱。常默默欲卧。復不得眠。至朝口苦。小便赤澀。欲行復不能行。諸藥汗吐下。不能治。治之即劇吐利。如有神靈所為也。

百合病。身形如和。其脈微數。其候每漏時。即頭覺痛者。六十日乃愈。百合病候之漏時。頭不覺痛。淅淅然寒者。四十日愈。百合病候之漏時。覺快然。但覺頭眩者。二十日愈。百合病症。其人或未病。而預見其候者。或已病四五日。或病一月。二十日後。見其候者。治之或下喜誤也。言醫誤者。每易誤。依症治之。

百合病。其狀惡寒而嘔者。病在上焦也。二十三十日當愈。其狀腹滿微喘。大便堅。三四日一大便。時復小溏者。病在中焦也。六十三日愈。其狀小便淋瀝難者。病在下焦也。三十三日當愈。各隨其症以治之。

論曰。百合病。於內熱盛。見在於陰。而攻其陽。則陰不得解也。復發其汗。為逆也。於外熱盛。見在陰。攻陽。此為逆。其病難治。見發其汗。此亦為逆。

幹南按百合病即腦病也無經絡百脈一宗者言百脈皆系於腦。腦為髓海。其輸上在於其蓋。兩證見靈樞海論。其蓋即督脈之百會。從太陽還出下項貫脊而迴絡於周身細

者至如牛毛。西醫初謂腦氣筋知覺運動須由於此內而陰陽百脈無不會歸

於腦。故曰一宗無經絡者言無一定經絡即病情亦不能專屬何經何臟。故名

為百合。夫腦者陰也。

見素問解精微論。腦者五臟別論。腦體為臟。地

氣之所生。皆藏於陰。元神之所藏也。頭

為

精明之腑。

見脈要精微論。腦即精明之臟。靈海論。髓海有餘。則輕勁多力。自過其度。

髓海不足。則脛痠眩冒。目無所見。懈怠安卧。今百合病欲食不食。欲卧不卧。欲

行不行。寒不知寒。熱不知熱。精神默默。皆神經瞀惑。煩擾無奈之狀。非腦病而

何。夫抵傷寒虛勞大病後真液告匱。虛火內擾。肺熱移於腦。其見症朝口苦。為

膽熱。渴赤澀。為膀胱熱。皆腦熱之變。其症之最易辨者。為渴其頭痛。素問奇病

論。髓以腦為主。腦逆。故令頭痛。又五臟生成論。頭痛。癲疾。下虛。上實。過在足少

陰。巨陽。腳太巨陽屬膀胱。

足巨陽之脈上頸交頸。其直者從顙入絡腦。

巨陽主氣絡腎。虛則不能引

精。上達於腦。故溺時頭痛。若溺時頭不痛。則腦髓深藏。不能動搖。但淅浙然寒

熱邪。尚在太陽之表。猶未傷腦。溺時覺快然。則腦髓精明。不生瞀亂。但覺頭眩。

餘邪尚在太陽之表。猶未及腦。夫頭為諸陽之會。諸陰脈又皆上應於頭。刺熱

論。心肝肺熱病皆頭痛。厥論。太陰之厥不欲食。食則嘔。不得卧。少陰之厥口苦。

溺亦厥陰之厥。涇溲不利。巨陽之厥。足不能行。少陽之厥。脈不可以運。其候種種與百合病同。蓋經逆而厥。即腦逆而厥。百脈兼合於腦。即諸症並見於腦。但分上中下。焦隨其症之陰陽以治之。總不能離百合一物以為之主。其證汗吐下皆不能用。如病見在陰。為熱盛於內。宜通陽利小便。以導陰。百合湯。滑石而反汗以攻其陽。則陰不得解為逆。病見在陽。為熱盛於外。宜用陰以和陽。百合湯。百合知母湯。而反下以攻其陰。則陽不得解。亦為逆。病本在腦髓。不在經絡。臟腑諸藥不能治。治徒傷胃。即劇吐利。腦髓反晬亂。如神靈所為。不能自持而已。此思邈之微旨。後人未經發明者也。

又按膽移熱於腦。合於陽明。行身之面。則辛額辛謂酸痛鼻淵。濁涕不止。轉為衄。瞑目得之氣厥。厥論素問氣肺移熱於腦。合於太陽。行身之背。則頭痛澀濁。寒熱如無。防於飲食。起卧如有神靈。均之腦熱而由膽熱致者。治當以苦寒。由肺熱致者。治當以甘寒。此生理學化學藥物學之精微。通乎天地之玄奧者也。

百合本病

百合地黃湯。治百合病。始不經發汗吐下。其病如初者。

百合七枚擘。浸一宿去汁。以泉水二升煮取一升。納生地黃汁二升。復煎取一升半。分再服。大便當去惡沫為候也。

百合病。自以百合同類主治。百合色白多瓣。象腦。又名蒜腦。諸本經治心腹邪氣利大。小便。原非以百合病主治得名。但形象腦。故以形為治。大法百合病用百合為君。各隨陰陽見症以為解。今陰陽熱俱盛。熱盛於內外當退陽滋陰。不經發汗吐下。熱邪如初。是始終陰陽熱不得解也。其熱愈深。百合地黃湯。百合清腦。加地汁滋陰。泉水更妙。推新之用。服後去惡沫為候。而病在陰或陽之腦熱自除。

百合壞病方三首

百合知母湯 治百合病。已經發汗之後更發者。

百合七枚 知母三兩

右二味以泉水安神治熱潤脣推陳出新。能鎮心。先洗瀆百合一宿。當沫出水中。明日去水取百合。更以泉水二升。煮百合。取一升汁置之。復取知母切。以泉水二升。煮取一升汁。合和百合汁中。復煮取一升半。分再服。更依法合服。

百合病。用百合為君。各隨陰陽見症以為解。今病見於陽。於外當用陰以和陽。已經發汗。熱當解。乃病更發。是發汗陽不得解也。其熱愈盛。百合知母湯。百合清腦。加知母。肺火滋腎水。本渴下水補不足。百合水。更妙。推新之用。而病在於陽之腦熱亦除。

百合雞子湯 治百合病。已經吐之後更發者。

百合七枚擘。瀆一宿去汁。以泉水二升。煮一升。取雞子黃一枚納汁中。攪令

調分再服。

百合病。自以百合為君。各隨陰陽見症以為解。今病見於陽。於外熱盛當用。陰以和陽。已經吐後。熱邪當解。乃病更發。是取吐陽不得解也。其熱愈盛。百合雞子湯。百合清腦。加雞子黃補陰。泉水更妙。推新之用。而病在於陽之腦熱亦除。

百合滑石代赭湯 治百合病。已經下後更發者。

百合十枚 滑石三兩 代赭一兩

右三味。先以泉水漬百合一宿去汁。乃以水二升煮百合。取一升去滓。又以水二升煮二物。取一升。納百合汁如前法。復煎取一升。分再服。

百合病。自以百合為君。各隨陰陽見症以為解。今病見於陰。於內熱盛當通陽利便。小以尊陰。已經下後。熱邪當解。乃病更發。是攻下陰不得解也。其陰轉逆。百合滑石代赭湯。百合清腦。加滑石利竅。代赭鎮逆。泉水更妙。推新之用。而病在於陰之腦熱亦除。

百合變病

方三首

方 治百合病。經月不解。變成渴者。

百合根一升。以水一斗漬之一宿。以汁先洗病人身。也洗身後。食白湯餅。勿與鹽豉也。渴不瘥。乃用桔梗根。并牡蠣等分為散。飲服方寸匕。日三。

百合變病。亦以百合為君。治經月不解。變成渴。熱在胃口。但以百合根洗身。使熱透。

於外。白湯餅淡食。使甘和於內。渴不瘥。再與桔梗根生津。牡蠣壯水散以散之。變洗為飲。渴止。而腦熱變病亦除。

方 治百合病變而發熱者。

百合根一兩
乾之 滑石三兩

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急。

百合變病亦以百合為君久不解變而發熱熱入膀胱用前百合滑石代赭湯以百合根清腦去代赭之沈濁取滑石之滑利散以散之下篩飲服使發熱得微利而解小便赤澀臍下堅急去而腦熱變病亦除。

方 治百合病變腹中滿痛者。

但取百合根隨多少熬令黃色擣篩為散飲服方寸匕日三滿消痛止。

百合變病亦以百合為君久不解變腹中滿痛熱入大小腸百合根本治邪氣腹脹心痛熬黃不煮微與甘和以盡百合之能變散以散之擣篩飲服腹滿痛止而腦熱變病亦除。

幹南按百合病自以百合地黃湯為陰陽見症正治之法前四方經汗吐下而更發者用湯用泉水後三方未經汗吐下而變病者用散不用泉具有深意總

之比症。熱在腦隨。不在經絡臟腑。汗吐下之法。諸病可用百合。病不可用也。

傷寒不發汗。變成狐惑病。

第四方

論一首

論曰。狐惑之病。其氣如傷寒。嘿嘿欲眠。目不得閉。起卧不安。其毒在咽喉為惑病。在陰肛者為狐病。狐惑之病。并惡飲食。不欲食。聞食臭。其面目翕赤。翕白翕黑。毒食於上者。則聲喝也。喝一作嘔毒食下部者。則乾咽也。此由溫毒氣所為。食於上者。瀉心湯主之。大黃黃連瀉心金匱。食於上則聲嘔。甘草食於下者。苦參湯淹洗之。食於肛外者。瀉心湯主之。醫宗金鑑以為傳寫之誤。熏之。并用雄黃三片。稍置瓦瓶中。炭火燒向肛熏之。并服湯也。

已上治法。均見金匱。

幹南按。狐惑病。疳濕病也。義見千金翼。千傷寒不發汗。濕停熱鬱。上蒸於腦。因成疳濕。

金翼

默欲眠。目不得閉。起卧不安。精神恍惚。狐疑迷惑。與百合腦病相同。但百合腦

病在熱。狐惑腦病在濕。濕生蟲。生蟲即為疳食。金匱因疳食上下而別為狐惑考。

千金翼。疳濕之為病。或熱或寒。病如瘧狀。或時睡眠。嗜卧食少。若蟲已入腦。病

難愈。蟲未入腦。醫可瘥。明明以疳濕關係於腦。今蟲未入腦。食於咽喉上部。則

聲喝。溫熱傷氣食於陰肛下部。則乾咽。濕熱傷津若肛食爛盡。見五臟即死。語見千金翼。疳濕第六。

此皆傷寒餘毒所結。其症候惡飲食。不欲食。聞食臭。面目乍赤乍白乍黑。皆蟲氣所為。諸書皆以脣紅面青。或面白點定為蟲候。又謂上脣有點。蟲蝕上部。下脣有點。蟲蝕下部。病情猶未若斯之顯也。金匱以狐惑次百合病後。千金因之。旨深哉。

方治狐惑

黃連

薰草各四兩

右二味㕮咀。白酢漿一斗。漬之一宿。煮取二升。分為三服。

疳濕病。腦積熱溫毒。狐惑。前論食於上者瀉心湯。以中有黃連。清熱解毒。治疳殺蟲故也。此方兼治食於上下狐惑。用瀉心法去大黃。以黃連為主。薰草即零陵香。芳香透達去臭惡氣。加入酢漿。推陳致新。以碎除濕。蜜味少力專。其功不在大黃黃連瀉心之下。

濕熱成膿

赤小豆當歸散 其人脈數無熱微煩。默默但欲卧。汗出初得之三四日。眼赤如鳩眼。得之七八日。其四眎黃黑。能食者。膿已成也。此散主之。

以赤小豆三升。漬之令生牙足。乃復乾之。加當歸二兩為末。漿水服方寸匕。日三即愈。

疳濕病。腦積熱成膿。狐惑。默默欲卧。汗出目赤。眎黃黑。火伏於內。毒發於外。咽瘡。肛腐。急與消腫排膿。免其蝕爛深入。五臟致危。赤小豆當歸散。以赤小豆浸生牙足。取其蒸發生氣。泄熱消腫。合當歸通血排膿。相需為用。蓋脈數微煩而無熱。顯屬血虛。

濕熱。膿成不化。不得不變。黃連之苦寒。而用赤豆當歸之甘溫。以佐瀉心所不及。

濕熱腐腫

瀉心湯 其病形不可攻。不可灸。因火為邪。血散脈中。傷脈尚可。傷臟則劇。井輸益腫。黃汁出經。合外爛肉。腐為癰腫。此為火疽。醫所傷也。夫脈數者不可灸。因火為邪。即為煩。因虛逐實。血走脈中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。應在瀉心瀉心湯兼治。下利不止。腹中樞堅。而嘔吐腸鳴者。

半夏半升

黃芩

人參

乾薑各三兩

黃連一兩

甘草三兩

大棗十二枚

右七味㕮咀。以水一斗。煮取六升。分服一升。日三。

仲景名半夏瀉心
要畧用甘草瀉心

疳濕病。腦積熱。癰腫。狐惑。血散脈傷。汗出肉腐。火伏於內。毒滯於外。下痢嘔吐。致成壞症。瀉心湯。黃連佐黃芩。以治燥薑。千金翼患濕薑蟲下痢赤白亦有半夏乾薑以治濕。薑寒熱互用。參甘大棗。和濟兼施。仲景本名半夏瀉心。千金但名瀉心。不治痞而治疳。且治臟傷肉腐之疳。用佐赤小豆當歸散所不及。

幹南按。千金瀉心湯。映北宋本用連芩。夏薑參甘棗。即仲景之半夏瀉心。張氏衍義。則用連芩大黃。為仲景之大黃黃連瀉心矣。此症因火傷脈。心熱內煩。非連芩不解。由脈傷臟。下痢嘔吐。脾寒內結。非夏薑不解。血散難復。氣因益虛。膿

蝕內陷。非人參甘棗不復。若單用大黃黃連於方下。吐痢腹堅腸鳴。諸症不協。總之論首所言瀉心治蟲蝕上部聲嘎。金匱之大黃黃連瀉心也。後方所言瀉心治蟲蝕上下部癰腐壞症。金匱之半夏瀉心也。當以映北宋本為方與症合。惟明眼人正之。

又按傷寒雜治第十。下痢門赤白下膿。小兒得之三日皆死。此為瘻蟲在下部。方用礬石雄黃收濕化瘻。附子巴豆通陽消積。真珠麝香辟邪解毒。治合著綿。納穀道中。能起死人。此症疳濕下利不止。可以兼用。

傷寒發黃第五

論一
方三十四首

證五條
灸圖三首

論曰。黃有五種。有黃汗。黃疸。穀疸。酒疸。女勞疸。

黃汗者。身體四肢微腫。胸滿不渴。汗出如黃藥汁。良由大汗出。卒入水中所致。
黃疸者。一身面目悉黃。如橘。濕熱下注膀胱。故黃現一身面目。小便必不利。裏實者必腹滿。由暴得熱。以冷水洗之。
熱因留胃中。食生黃瓜薰上所致。黃成黑疸者多死。

穀疸者。食畢頭眩。心忪。怫鬱不安而發黃。邪熱佛鬱陽明。由失飢大食。胃氣衝薰所致。
酒疸者。心中懊痛。足胫滿下流。小便黃。面發赤斑黃黑。酒濕上蒸。由大醉當風入水所致。
女勞疸者。身目皆黃。發熱惡寒。黃家之為病。日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞疸。小腹滿急。小腹當膀胱之部。小便難。又金匱女勞疸。小便自利。由大勞大熱。而交接竟入水所致。但依後方治之。

幹南按。諸黃家。其人素有積熱。外被風寒相搏。水溼浸入。注於膀胱。膀胱主一身肌表。久久鬱蒸。黃即外發。肌理疏者。熱越於表。但發黃汗。肌理密者。熱留於胃。胃屬陽明。主肌肉。遂成黃疸。穀疸。酒疸。女勞疸。又其加入之原因。黑疸。由酒疸誤下傷營。與女勞疸過極傷腎。多死。大旨黃疸。穀疸。胃熱。酒疸。心熱。女勞疸。腎熱。金匱更有所致。不盡。闕女勞其證。皆小便不利。或黃疸而渴。熱深難治。疸而不渴。熱淺易治。尤要辨表裏虛實。小便不利在表。大便閉在裏。黃而鮮潤。能食脈浮。為陽

黃。又素問平人氣象論。黃而黯晦不能食。脈沈遲為陰黃。黃疸。又靈樞論疾診尺篇。
嗜諸黃主脾土。土寄旺於四季之末。各十八日。金匱病以十八日為期。治之十
日以上瘥。反劇則土敗難治。

黃汗之為病。身體洪腫發熱。汗出不渴。汗出而渴。熱深苦狀如風水。汗染衣色正黃。
如藥汁。其脈自沈。惟水故從何得之。此病以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。

風溼在表

黃耆芍藥桂苦酒湯 治黃汗。

黃耆五兩

芍藥三兩

桂心二兩

右三味㕮咀。以苦酒一升。水七升。合煎取三升。飲二升。當心煩也。至六七日
稍稍自除。心煩者。苦酒阻故也。

黃汗經病。經即前論。見黃耆芍藥桂苦酒湯取桂枝湯之半。輕用桂心芍藥和營。重用黃耆實衛。尤妙。苦酒泄水氣。消腫滿。汗微。腫滿四肢散而能斂。使汗微阻於內。心先煩而後快。為桂枝湯減味之變法。

黃疸之為病。疸而渴者。其病難治。疸而不渴。其病可治。發於陰部。其人必嘔。在裏發於陽部。其人振寒而微熱。溼熱在表

風濕在表方三首

桂枝加黃耆湯 諸病黃疸宜利其小便假令脈浮當以汗解宜此湯。

桂枝

大棗十枚

黃耆五兩

芍藥各三兩

甘草二兩

生薑三兩

右六味㕮咀以水八升微火煎取三升去滓溫服一升覆取微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯若不汗更服湯。

黃疸經病風溼在表振寒發熱其人小便不利宜利小便脈不沈而反浮當以汗解桂枝加黃耆湯取桂枝湯之全輕用桂枝芍藥甘草生薑大棗解肌重用黃耆實衛變苦酒之斂津為熱粥之充胃覆取微汗津液得下振寒發熱解小便利而黃疸亦除為桂枝湯加味之變法。

麻黃醇酒湯 治傷寒寒熱出表發黃疸。

春月宜用水。

麻黃三兩醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗出即愈冬月寒時用清酒。

黃疸經病風溼在表寒熱無汗衛氣過實取麻黃湯一味麻黃醇酒湯獨用麻黃表散風溼醇酒升發陽氣溫覆取汗寒熱散而黃疸亦除為麻黃湯減味之變法。

麻黃連翹赤小豆湯 治傷寒寒熱在裏身體必發黃。

麻黃

連翹

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

杏仁三十枚

赤小豆一升

生梓白皮切二升

右八味㕮咀以勞水一斗先煮麻黃去沫納諸藥煎取三升分三服。

黃疸經病風溼在表無汗瘀熱過深麻黃連翹赤小豆湯取麻黃湯之半。麻黃杏仁甘草生薑大棗加連翹梓白皮本經治熱毒散風熱赤小豆通溼瘀勞水即甘瀉水金匱方取瀉水輕揚甘緩溫覆取汗瘀熱去而黃疸亦除為麻黃湯加味之變法。

已上黃疸汗法。

幹南按麻黃連翹赤小豆湯中用赤豆梓皮汗兼利法前三方熱越膀胱之表故取汗而疸自除此方熱瘀膀胱之裏故兼利小便而疸始解。

瘀濁在上方二首

方 治黃疸

瓜蒂

赤小豆

秫米各二升

七枚

右三味治下篩病重者取如大豆二枚納著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死大慎之剛繁瘡天行毒熱通貫臍腑沈伏骨髓之間或為黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等症喘息不通不絕次不

黃疸。經病。瘀濁在上。法當用吐。無過瓜蒂。赤小豆。瓜蒂苦。赤小豆酸。告涌泄為陰。仲景用瓜蒂赤小豆變引。吐為搐鼻。出黃水。以治頭中寒溼。發熱面黃。千金用瓜蒂赤小豆加水米丁香。多變引。吐為搐鼻。出黃汁。以治胸中瘀濁。或從鼻。或從口。不吐之吐。各有所宜。取效尤捷。

秦椒散 治黃疸。飲少溺多。

秦椒 六銖

瓜蒂 半兩

右二味治下篩。水服方寸匕。日三。

古今錄驗
用治膏疸。

黃疸。經病。瘀濁在下。飲少溺多。膏疽肉瘤皆飲少溺多。色泔白淋瀝不止。秦椒散秦椒溫肺泄濁。瓜蒂開膈吐涎。變搐鼻為飲服下病。上取升達膀胱邪有出路而黃疸自愈。

已上黃疸吐法。

濕熱在裏

苦參散 治人無漸。忽然振寒。發黃。皮膚黃。麴塵出。小便赤少。大便時秘。氣力無異。飲食不妨。已服諸湯散。餘熱不除。久黃者。此散吐下之。

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘖

大黃各一兩

葶藶二兩

右六味治下篩。飲服方寸匕。當大吐。吐者日一服。不吐日再服。亦得下。服五

日知可消息。不覺退更服之。小折便消息之。

黃疸經病入腑。瘀熱在裏。忽然振寒發黃。皮膚麴塵出。小便赤少。大便時秘。餘熱不能盡者。下得而去之上焦。得通津液得下邪有出路。而忽然振寒。皮膚麴塵出。小便赤少。大便祕。餘熱久黃亦除。忽然振寒成久黃與下藥源發熱心戰為急黃一則卒寒而無熱一則外熱而心寒。病情緩急不同。病勢輕重二點異。

此方黃疸吐下法。

濕熱在裏

方十一首

方 治風疸。小便或黃或白。洒酒寒熱。好卧不欲動。

三月生艾

一味擣取汁。中煎如漆。密封之。

大黃

黃連

凝水石

桔樓根

苦參

芩藪各六

銖六

右六味末之。以艾煎和。先食服如梧子五丸。日二。可至二十九。有熱加苦參。

渴加桔樓。小便澀。加芩藪。小便多。加凝水石。小便白。加黃連。大便難。加大黃。

黃疸經病入腑。濕熱在裏。風疸。洒酒寒熱。好卧不欲動。小便或黃或白。重用生艾。辟

風寒。別錄治身面黃。別錄治八疸。加桔樓根。凝水石。清濕火。芩藪。利飲結。大黃。瀉瘀。

熱。方後大便難。再加大黃。上焦得通。津液得下。邪有出路。而洒酒寒熱。好卧不欲動。

小便或黃或白。大便難。風疸亦除。

大黃丸 治黃疸。

大黃

葶藶子各二
兩

右二味末之。蜜和丸如梧子大。未食服十九日三。病差止。

又方

大黃二兩

黃連二兩

黃芩

各一
兩

麴衣五合

右五味末之。蜜和丸如梧子。先食服三丸。日三。不知加至五丸。

兩方即上法。蜜丸和劑緩與通下。次方重用麴衣。即麥麴黃衣。麴蒸生綠廬者。調中下氣。療食疸黃疸。具有專長。亦要藥也。

大黃黃蘖梔子芒消湯 黃家腹滿。小便不利而赤。自汗出。此為表和裏實。當下之。

大黃三兩

黃蘖四兩

梔子十五
枚

芒消四兩

右四味㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓納芒消。復煎取一升。先食頓服之。

黃疸經病入腑。濕熱在裏。腹滿。小便不利而赤。自汗出。表雖和。裏則實。急與通下。大黃黃蘖梔子芒消湯。大黃瀉腹滿。梔子黃蘖通淋熱。治身黃發熱。芒消開瘀結。大

小便利而腹滿自除。良法也。

方 治急黃。熱氣骨蒸。兩目赤脈。

大黃半兩

生地黃汁八合

芒消一兩

右三味合和一服五合。日二以利為度。不須二服。

黃疸經病入腑。濕熱在裏。時行急黃。熱氣骨蒸。兩目赤脈。瘀雖實。血則虛。微與通下。輕用大黃。芒消瀉瘀結。重用生地汁。滋血虛。大使得利。而熱氣骨蒸。兩目赤脈。急黃亦除。

茵陳蒿湯

治傷寒七八日。內實瘀熱結。身黃如橘。小便不利。腹微脹。滿下之。

茵陳六兩

梔子十四枚

大黃三兩

右三味㕮咀以水一斗二升。煮茵陳得五升。去滓。納梔子大黃。煎取三升。分

服一升。日三小便當利。如皂莢沫狀。色正赤。當腹減。黃悉隨小便去。范汪用療

穀疽小品方
用石膏一斤

黃疸經病入腑。法宜用下。惟仲景下法。則以茵陳蒿佐大黃為要藥。茵陳本經主熱結黃疸。兼利小便。合梔子以清心胞。佐大黃以通胃腑。先煮茵陳。則黃從小便出。此以利為下之妙法。而實瘀熱結。身黃如橘。小便不利。腹微脹滿。亦除。

方 治發黃。

茵陳

黃藥

梔子

大黃
各二兩

黃連
二兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸

丸方

大黃五兩

茵陳

梔子各三

黃芩

黃藥

黃連各二

右六味末之以蜜丸白飲服如梧子二十九丸令得微利。

方

治發黃身面眼悉黃如金色小便如濃煮藥汁衆醫不能療者。

茵陳

梔子各二

黃芩

柴胡

升麻

大黃各三

龍膽二兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸熱為虛去大黃加梔

子仁五六兩生地黃一升

延年祕錄無茵陳有梔子四兩

桔梗

大黃已久

近效方

枳實二兩

心下有堅

嘔逆不下飲食

小便極赤少

四肢逆冷脈

深沈極微細遲者

不宜服此方得下必變嘔也

宜與大茵陳湯除大黃加生

變作桃皮色

黃而紫黯為桃皮色

心下有堅

嘔逆不下飲食

小便極赤少

四肢逆冷脈

深沈極微細遲者

不宜服此方得下必變嘔也

宜與大茵陳湯除大黃加生

地黃五兩

服盡消息看脈小浮出形小見不甚沈微便可治也

脈浮見者黃

尚明不復桃皮色心下自寬也

酒疸十一味者是

大黃湯方出下

此方仍用茵陳大黃合梔子黃芩。加龍膽升麻柴胡。為升陽散火法。以其血虛邪陷於陰。故用生地汁。即前急黃骨蒸目赤方。用生地汁之義。內伏真熱外現假寒。倘以薑附辛熱濟之。則殺人矣。

茵陳蒿湯 王黃痘。身體面目盡黃。

茵陳

黃連各三兩

黃芩二兩

大黃

甘草

人參各一兩

梔子一枚七

右七味㕮咀。以水一斗。煮取三升。分三服。日三。亦治酒疸酒癬。
此方仍用茵陳大黃合梔子黃芩黃連。為涼膈瀉心法。以其氣虛邪陷於陽。故用人參甘草。即前傷寒瘀熱發黃。麻黃連翹赤小豆湯。用甘草大棗之義。

茵陳丸

治時行病急黃。并瘡瘍疫氣及瘻瘍。

二日一發者為瘻瘍。瘧與瘍同。

茵陳

梔子

芒消

杏仁各三兩

巴豆

恆山

鱉甲各二兩

大黃五兩

豉五合

右九味末之。以餳為丸。飲服三丸如梧子。以吐利為佳。不知加一丸神方。初覺體氣有異。急服之即瘥。

急黃卒病。時行毒熱鬱發。命在須刻。與尋常發黃不同。巢源但言脾胃穀熱。千金直明。瘡瘍疫氣。前治急黃。熱氣骨蒸。兩目脈赤。重用生地汁。佐大黃芒消。以解毒熱。此

治急黃。熱氣脢瘡。寒熱積聚。變用。板山。吐瘡。鼈甲。別錄。麻溫瘡本。經治寒熱積聚。巴豆。本經治傷瘡。破積聚。吐劑。

合茵陳大黃芒消。梔子杏豉。梔子或吐劑。杏仁。以攻毒熱。前方為體虛。毒熱治法。此方為體壯。毒熱治法。妙錫丸甘緩。且力猛。藥小雖吐利而元氣不傷。

巢源急黃候。脾胃有熱。穀氣鬱蒸。因為熱毒所加。故卒然發黃。心滿氣喘。命在頃刻。故云急黃。有得病即身體面目發黃者。有初不知是黃。死後乃身面黃者。其候得病但發熱心戰者。是急黃也。

已上黃疸下法。

濕熱在裏 方二首

礬石滑石散 濕疸之為病。始得之一身盡疼。發熱。面色黑黃。七八日後。壯熱在裏。可次其內必有血。急下之。由小便出。亦一身盡黃。目黃易微者。尤在腹滿。小便不利。有血當下由小便去之。如肫肝狀。其或無壯熱。但小腹滿者。亦可次其內必有血。急下之。由小便出。亦一身盡黃。目黃易微者。尤在腹滿。小便不利。

右二味治下篩。大麥粥汁。服方寸匕。日三。當先食服之。便利如血者。已當汗出瘥。

黃疸經病入腑。濕熱在裏。腹滿。小便不利。有下法。即有利法。前金匱茵陳蒿湯。主茵陳以茵陳治熱結黃疸。兼利小便。茲變其法。以滑石治熱結黃疸。利小便。兼利蓄血。去大黃。用礬石。開痰泄濕。不走大腸而走小腸。妙大麥粥汁甘緩。便利如血。已汗出。

而元氣亦不傷。

五苓散 王黃疸利小便。

猪苓 茯苓

澤瀉

白朮

桂心

十枚

右五味擣篩為散。渴時水服方寸匕。極飲水即利小便。及汗出愈。

此方與第
九卷方相
同。故再出之。

黃疸經病入腑。溼熱在裏。小便不利。礬石滑石散能利蓄血。不能利蓄水。五苓散。猪苓。茯苓。澤瀉。導渴飲。白朮。燥土溼桂心。化水氣。不走大腸而走膀胱。妙極飲水和濟。即利小便。及汗出。而津液亦不傷。

已上黃疸利法。

虛熱在裏

方 治黃疸。

取生小麥苗擣絞取汁。飲六七合。晝夜三四飲。三四日便愈。無小麥。續麥大
皮者亦得用之。

黃疸經病入腑。有甘辛以化津。即有甘寒以和液。生小麥苗止消渴除煩熱養心氣。
寒為心氣別
養心氣

飲寒在裏

小半夏湯 黃疸。小便不異。欲自利。腹滿而喘者。不可除熱。言不可用大黃熱除必噦

者。此湯主之。

半夏

生薑各半斤

右二味㕮咀。以水七升。煮取一升五合。分再服。有人常積氣結。言小便閉結。攻其心上暖。以此湯少許汁入口。遂治。

黃疸經病入腑。必小便不利。腹急滿。邪在陽明。宜除熱。若小便自利。腹滿喘。邪在少陽。宜和飲。傷寒例。陽明病不能食。攻其熱必嘔。今誤除熱。非和少陽。無以救陽明。故取小柴胡之半。半夏以消飲寒。生薑以定喘滿。救逆之法。不治痘而痘亦除。

寸口脈浮而緩。浮則為風。緩則為痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。趺陽脈緊而數。數則為熱。熱則消穀。緊則為寒。食則滿也。尺脈浮為傷腎。趺陽脈緊為傷脾。風寒相搏。食穀即眩。穀氣不消。客熱不化。謂寒水言太陽之寒水不化。則被于內。受穀者濁。靈樞陰陽清濁篇。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。水不化則被于內。熱流膀胱。身故盡黃。名曰穀疸。

穀疸

勞熱在裏

丸方 治勞疸穀疸

苦參 三兩

龍膽 一兩

右二味末之。牛膽和為丸。先食以麥粥飲服如梧子五丸。日三不知稍加之。

刪繁方。加梔子仁三七枚。以諸膽和九。

穀氣入胃。胃氣冲和。則運化精微。靈樞營衛篇中焦受氣。必糟粕蒸津液。化其精微。內輸五臟。胃氣苦濁。則蒸化濕熱。下瀦膀胱。腎為內臟。化精既少。不足以運膀胱之寒水。而濕熱遂停。黃即外發。外雖由風寒相薄。內實原積熱成勞。穀之精氣不消。無以輸化胃濁。欲求泄濁。非清熱不可。此方苦參味苦。清濕熱而平胃氣。膽草和牛膽極苦。瀉肝火而澄膽汁。况有麥粥以為之輸運。膽汁充胃液化。而穀疸以除。

幹南按。疸屬胃熱。當無疑義。然千金治諸黃濕熱。多用大黃。或佐苦參以清胃。治穀疸濕熱。乃用龍膽牛膽佐苦參以瀉肝。何也。考西醫學說。膽為肝液之囊。貯汁以待用。乃下部迴血入肝所化。主攝食物之精液。凡食小腸飽滿。腸頭上逼膽囊。使其汁流入小腸之內。以消化食物。而利傳澄濁。即經所謂泌清別濁者是也。若無膽汁。或膽氣不足。則穀食消化無力。精粗不分。溲便即為之變。故膽汁泄。上溢則口苦。病名膽疸。素問瘡論。肝氣熱則膽泄。口苦。靈樞四時氣篇。邪在膽。逆在胃。膽液泄。則口苦。下溢則便溺。黃外越。則身面皆黃。即黃可知。胃與膽功用相因。穀氣與膽汁相需為用。此中

西匯通之旨也。

夫酒疸。其脈浮者先吐之。沈弦者先下之。夫人病酒疸者或無熱。靖言了了。腹滿欲吐。嘔者宜吐之。方前苦參散七味者是。方見上黃酒疸法。黃酒疸必小便不利。其候當心中熱足下熱。於足下而聚於足心。故陽氣盛則足下熱。是其症也。夫酒疸下之。則營久久為黑疸。目青面黑。心中如啖蒜薹狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖黑微黃。故知之。

酒疸

心熱痰結 方二首

枳實大黃梔子豉湯 治傷寒飲酒食少。飲多。痰結發黃。酒疸。心中懊憹而不甚熱。或乾嘔。

枳實五枚

大黃三兩

梔子七枚

豆豉半升

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服。心中熱疼懊憹皆主之。

穀疸。若濁在胃。酒疸。苦熱在心。食少飲多。痰結發黃。至心中懊憹。乾嘔。非吐下不解。枳實大黃梔子豉湯。梔子豆豉除煩熱。大黃枳實開痰結。使膈上吐。膈下下。而痰結發黃。心中懊憹。或乾嘔亦除。即傷寒勞復有宿食。枳實梔子豉湯加味之變法。

膽熱痰結

牛膽丸 治酒疸。身黃麴塵出。

牛膽一枚

芫花一升

蕘花半升

瓜蒂三兩

大黃八兩

右五味四味咬咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓納牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺不知復服一丸至八丸膈上吐膈下下或不吐而自愈苦熱在心而滲熱在膽靈樞論勇篇酒者熟穀之液也其氣剽悍入於胃中則胃脹氣上逆滿於胸中肝浮膽橫以上膽之經文熱滿而汁溢於外以漸滲於經絡則身目皆黃牛膽丸首用牛膽清膽熱輕用瓜蒂涌濕邪重用芫花蕘花合大黃利痰結酒漬以酒導酒使膈上吐膈下下而酒疸身黃麴塵出亦除即前穀痘苦參龍膽湯加味之變法。

已上酒疸吐下法。

胃熱痰結方二首

大茵陳湯 治內實熱盛發黃黃如金色脈浮大滑實緊數者夫發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱者故黃如金色

茵陳

黃蘆各一兩半

大黃

白朮各三兩

黃芩

桔梗根

甘草

茯苓

前胡

枳實

枚一
二十

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服得快下消息三四日更治之

酒痘。滲熱在膽。積熱仍在胃。內實熱盛。發黃如金色。脈浮大滑實繫數。病因勞熱食少。或溫毒內熱。不得不下。前治黃痘內實瘀結。小便不利。茵陳蒿湯曾用。茵陳合大黃。梔子。攻實熱。兼利小便。茲用其法。加黃芩。黃藥。清勞熱。前胡。桔梗根。枳實。開瘻結。白朮。茯苓。甘草。扶胃弱。原方先煮茵陳。則黃從小便出。以利為下。此合煮茵陳。得快下。為茵陳蒿湯加味之變法。

茵陳丸 治氣淋。膿脹。膿音閼廣。腹前曰膿。腹大。身體面目悉黃。及酒痘。短氣不得息。

茵陳

梔子

天門冬

各二兩

大黃

桂心

各三兩

通草

石膏

各二兩

半夏

半升

右八味。蒸大黃梔子。天門冬。半夏。暴欒。乾合。擣篩蜜丸。服如大豆三九日三忌。生魚。以豆羹服。不得用酒。一方去石膏。納滑石二兩。不知加至十九丸。

酒痘。熱在心膽。宜吐。在腸胃。宜下。在膀胱。宜利。亦宜下。氣淋。膿脹。腹大。不利必身面目悉黃。短氣不得息。茵陳丸仍用。茵陳合大黃梔子。攻實熱。重用半夏。開瘻結。桂心

通草利膀胱石膏天冬滋氣液。前茵陳蒿湯先煮茵陳則黃從小便出以利為下。此合擣茵陳蜜丸豆羹服得緩下為大茵陳湯減味之變法。

已上酒疸利下法。

心痞痰結

茯苓丸治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者。

茯苓

茵陳

乾薑

兩一

白朮

熬

枳實

各三
十枚

半夏

杏仁

各十
八銖

甘遂

六銖

蜀椒

當歸

二十
二銖

白朮

熬

右十味為末

蜜和丸如梧子大空腹服三丸日三稍稍加以小便利為度針

翼加黃連一兩

大黃十八銖名茵

陳丸治黑疸身體闊黑小便澀。

酒疸熱在膀胱宜利痞在心胸亦宜利心下縱橫堅小便赤非不曾無氣淋臚脹腹大之候。病情不在下而在上無用大黃之必要。茯苓丸去大黃仍用茵陳合茯苓甘遂利水濕半夏杏仁枳實開痰結變用蜀椒乾薑消痞堅當歸白朮補脾土上病下取小便利為度亦茵陳丸易味之變法。

心脹痰結

半夏湯

治酒澼陰胸心脹滿骨肉沈重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛

勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致。

半夏一升

生薑

黃芩

茵陳

當歸各一

前胡

枳實

甘草

大戟各二

茯苓

白朮各三

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服。

酒痘。痘堅在胸宜利。脹滿在胸亦宜利。酒癖蔭胸。心脹滿至骨肉沈重。逆害飲食。小便赤黃。利非不飲食衝心。病情亦不在下而在上。况根本虛勞風冷。更無用大黃之必要。半夏湯重用半夏。佐茯苓大戟黃芩。逐水經利水濕。輕用前胡杏仁枳實。開痰結。乾薑散飲滯。當歸白朮補脾勞。上病下取。小便利為度。亦茯苓丸易味之變法。

已上酒痘利法。

肉疽附

凝水石散 治肉疽。飲少小便多。如白泔色。此病得之從酒。

凝水石

白石脂

桔梗根

桂心各三

菟絲子

知母各十
八銖

右六味治下篩麥粥飲服五分匕日三服。五日知。十日瘥。

肉疽別乎。酒疽而實。不離酒疽。酒疽小便黃赤肉疽小便泔白且多。以其平日精虛。

濕熱蒸變肌肉。浮腫發黃。故名凝水石散。凝水石
母本經治熱中邪氣。清濕熱。菟絲益精氣。桂心石脂。煖水臟。麥粥厚腸胃。而飲少。小便多。如白泔色亦除。

幹南按肉疽別本作內疽。或以飲酒使內為解。據宋本作肉疽。千金翼秦王丸。疽散亦有膏疽。髓疽。肉疽諸證。當從宋本為是。若以為飲酒使肉。則與女勞疽相混矣。

又按近醫有甜尿證。由脾腎兼虛。肉味過厚所致。本方飲少。於內小便多。熱逼如白泔色。白泔即米汁味。不鹹而甘淡。得之從酒。夫嗜酒必飫肉。濕鬱熱蒸。內傷脾土。脾氣不運。下注膀胱。膀胱屬腎。腎氣內虛。巨陽不能引精歸肺。語本內經。以故飲少溺多。土敗色變味亦變。但色不必白。身不必黃。為黑故。不曰肉疽。而直名為甜尿。病由脾腎兩虛。肉味過厚。證雖不同。而用之往往有效。此又可變通而善悟者也。

黃家至日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞得之。當膀胱急。小腹滿。體盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疽。其臚腹脹而滿。如欲作水狀。大便必黑。時溥泄。此女勞疽非水也。腹滿者難治。

女勞疽

勞熱瘀結

消石礬石散 治女勞疸

消石

礬石各半兩

右二味治下篩大麥粥汁。服方寸匕日三重衣覆取汗。病隨大小便出。小便正黃。大便正黑。

女勞疸。病因大勞大熱。交接入水傷腎。不發熱反惡寒。不應寒而膀胱急。小腹滿。體盡黃。額上黑。足下熱。甚則臚腹脹滿。傷腎及脾如作水狀。但以大便黑。時溏泄。決其非水。蓋膀胱為腎之府。腎傷。則巨陽不能引精歸肺。入裏故膀胱急。小腹滿。消石礬石散。即前黃疸濕熱在裏。礬石滑石湯。滑石易消石。消勞瘡。仍用礬石。開瘻結。大麥粥汁甘緩。覆衣取汗。病隨大小便出。而元氣亦不傷。

滑石石膏散 黃疸之為病。日晡所發熱惡寒。小腹急。身體黃額黑。大便溏黑。足下熱。此為女勞腹滿者難治。

滑石

石膏等分

右二味治下篩大麥粥汁。服方寸匕日三。小便極利。則瘥。

女勞疸。證如前。小便必不利。滑石石膏散。即前黃疸濕熱在裏。礬石滑石湯。仍用滑石。利小便。逐凝血。通血瘀。礬石易石膏。清勞熱。大麥粥汁甘緩。不必取汗。病隨小便出。而元氣。

氣亦不傷。

已上女勞疸利下法。

黑疸附

方 黃疸變成黑疸。醫所不能治者。

土瓜根搗汁一小升。頓服。日一服。平朝服。至食時。病從小便出。先須量病人氣力。不得多服。力衰則起不得。

黑疸周於身。不惟額上。由酒痘誤下。傷營。女勞疸過極。傷腎而變。瘀熱入深。多死。要無不膀胱急結。腹滿小便難者。土瓜根本經。主治消渴。內瘡。瘀血。寒熱。性寒。滑通利量人與服勿多。平旦至食時。病從小便出。亦奇藥也。

此方黑疸利法。

幹南按。素問厥論。數醉若飽以入房。氣聚於脾中。不得散。酒氣與穀氣相薄。熱盛於中。故熱偏於身。內熱而溺赤。夫酒氣盛而慄悍。腎氣內衰。陽氣獨勝。故手足為之熱。此合酒穀女勞而成病。身熱溺赤。尚未成疸。千金未有成方。然治法亦不外此。可神明而善用也。

針灸黃疸法

正面圖一

寅門
挾人中

上斷裏
巨闕

上脇
上管

脣裏
陰絛

顚顫

寅門穴。從鼻頭直入髮際度取通繩。分為三斷繩。取一分入髮際。當繩頭針是穴。治馬黃。黃疸等病。

上斷裏穴。正當人中反脅。針三錐。治馬黃。黃疸等病。

上脇穴。入口裏邊。在上縫赤白脈是。針二錐。治馬黃。黃疸。四時等病。

舌下穴。挾舌兩邊針。治黃疸等病。

脣裏穴。正當承漿裏邊逼齒斷。針三錐。治馬黃黃疸。寒暑溫疫等病。

顚顫穴。在眉眼尾中間。上下有來去絡脈是。針灸之。治四時寒熱所苦痘氣溫病等。挾人中穴。火針。治馬黃黃疸疫。通身并黃。語音不轉者。

挾承漿穴。去承漿兩邊各一寸。治馬黃急疫等病。

巨闕穴。在心下一寸。灸七壯。治馬黃。黃疸等病。

上管穴。在心下二寸。灸七壯。治馬黃。黃疸等病。

男陰縫穴。拔陰反向上灸。治馬黃。黃疸等病。若女人。玉門頭是穴。男女斜灸無在。

覆面圖第二

風府
肝輸

熱府
脾輸

肺輸
腎輸

心輸
腳後跟

風府穴。在項後入髮際一寸。去上骨一寸針之。治頭中百病。馬黃。黃疸等病。熱府穴。在第一節下。兩傍相去各一寸五分。針灸無在。治馬黃。黃疸等病。

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五分。灸一王黃痘通治百毒病。

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸五分。

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分。

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸五分。

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸五分。

脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃痘寒暑諸毒等病。

側面圖第三

耳中
瞬子頭

頰裏
錢孔

手太陽
太衝

耳中穴在耳門孔上橫樑是針灸之治馬黃黃痘寒暑疫毒等病。

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針主治馬黃黃痘寒暑溫疫等病。頰兩邊

同法。

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃痘。

腋石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太澤澤當作淵文向上一夫接白肉際灸七壯。
治馬黃黃痘等病。

錢孔穴度乳至腋中屈肋頭骨是灸百壯治黃痘。

太衝穴針灸隨便治馬黃黃痘溫疫等病。

溫瘡第六

論一首 方三十四首
灸刺法十九首

論曰。夫瘡者皆生于風夏傷于暑秋為瘡瘍也。

瘡同瘻二日發名瘡瘍

問曰。瘡先寒而後熱者何也。對曰。夫寒者陰氣也。風者陽氣也。先傷於寒而後傷於風。故先寒而後熱也。病以時作。名曰寒瘡。問曰。先熱而後寒者何也。對曰。先傷於風而後傷於寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘡。其但熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘡瘍。

問曰。夫病溫瘡與寒瘡而皆安舍。舍于何臟。對曰。溫瘡者得之冬中于風寒。氣藏于骨髓之中。至春則陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓鑠。肌肉消。腠理發泄。因有所用力。邪氣與汗皆出。此病先藏于腎。其氣先從內出之於外也。如是則陰虛而陽盛。盛則病矣。衰則氣復反入。入則陽虛虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘡。

問曰。瘡瘍何如。對曰。瘡瘍者。肺素有熱氣盛于身。厥逆上衝。中氣實而不外泄。因有所用力。腠理開。風寒舍于皮膚之內。分肉之間。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰。則病矣。其氣不及於陰。故但熱而不寒。氣內藏於心。而外舍於分肉之間。令消鑠脫肉。故命曰瘡瘍。幹南按。溫瘡得之。冬寒病邪先藏之腎。故先寒後熱。瘡瘍得之。肺熱病氣內藏於心。故但熱不寒。剖別最為精細。

夫瘡之且發也。陰陽之且移也。必從四末始也。陽已傷陰從之。故氣未并。先其時一

食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解此即內經之法

夫瘧脈自弦也。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者可下之。弦遲者可溫之。若脈緊數者可發汗。鍼灸之。脈浮大者吐之。瘧脈弦數者風發也。以飲食消息止之。

瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脅下有痞也治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利本仲景傷寒陽明病腸焦得通津液得下胃氣因和即愈瘧者病人形瘦皮上必粟起也下腹滿與小柴胡湯上

牡瘧表實

牡蠣湯牡瘧者多寒主之

牡蠣

麻黃各四兩

蜀漆三兩無以板山代之

甘草二兩

右四味先洗蜀漆三過去腥㕮咀以水八升煮蜀漆麻黃得六升去沫乃納餘藥煮取二升飲一升即吐出勿復飲之

牡瘧表實汗熱深厥深陽盛陰格非溫瘧陽盛陰衰者比牡蠣湯麻黃祛表寒牡蠣退邪熱蜀漆逐瘧痰甘草調胃氣一說蜀漆得甘草則吐一吐而陽氣得通陰氣自散而牡瘧多寒以除

牡瘧表虛

蜀漆散多寒者牡瘧也主之

蜀漆

雲母

龍骨

右三味等分治下篩先末發一炊頃以酢漿服半錢

臨發服一錢溫瘡雲母加蜀漆半分

取火燒之三日三夜

要略不用雲母用雲寶

壯瘡表虛

汗熱深厥深陽盛陰格。非溫瘡陽盛陽衰者比。蜀漆散麻黃易雲母。徐洄

母色白屬肺本經。王中風寒熱如在車船上。肺氣震蕩此能鎮之。

安肺氣。壯蠣易龍骨。飲心陽。汗為心液。仍用蜀漆逐瘡痰。

酢漿滋胃液一吐

蜀漆生用或湯煮必吐。酒蒸炒熟及為末蜜丸。或吐或不吐。况有酢漿之甘酸制之。即吐亦微而陽氣得通。陰氣

自散而壯瘡多寒亦除。若溫瘡多熱小變其法畧加蜀漆以竭餘邪一方兩用亦妙

此方壯瘡吐法

幹南按壯瘡之名見於金匱千金因之王肯堂徐洄溪均謂壯當作牝皆泥牡本屬陽多寒屬陰于牝為切不知熱深厥深陽為陰伏內真熱而外假寒與溫瘡之真熱無寒同為陽氣之發越非龍牡不能收納陽氣使之內潛非蜀漆不能導引陽氣使之外越前方用甘草後方用酢漿法皆助吐促引蜀漆之上行以壯為牝似非善悟仲景微旨

溫瘡表虛

白虎加桂枝湯

有瘡瘍者陰氣孤絕陽氣獨發而脈微其候必少氣煩滿手

足熱欲嘔。但熱而不寒。邪氣內藏於心。外舍於分肉之間。令人消鍊肌肉也。
有溫瘡者。其脈平。言如無寒時。病六七日。但見熱也。前論以先熱後寒為溫
溫瘡正不必泥。其候骨節疼煩時嘔。朝發暮解。暮發朝解。名溫瘡。此又以但熱無寒為
溫。此湯主之。

石膏一斤

知母六兩

甘草二兩

粳米六合

右四味㕮咀。以水一斗二升。煮米爛去滓。加桂枝三兩。煎取三升。分三服。覆令汗。先寒發熱。汗出者愈。

溫瘡表虛。汗熱入陽明之經。白虎加桂枝湯重用石膏。知母清胃熱。輕用桂枝解肌。表覆令汗。營衛和。津液布。濶然汗出而解矣。

溫瘡表實

麻黃湯

治瘡須發汗者。

麻黃

桔梗根

大黃各四兩

甘草一兩

右四味㕮咀。以水七升。煮取二升半。分三服。未發前食頃一服。臨發一服。服後皆厚覆取汗。

溫瘡表實。汗熱入陽明之腑。麻黃湯前方桂枝易麻黃。發肌表。石膏知母易樓根。生津液。大黃合甘草。調胃氣。由裏達表。大黃沈降之力。轉隨麻黃輕揚之性。以上行厚覆取汗。營衛通津液。布亦濶然汗出而解矣。

二方溫瘡汗法。

溫瘡表鬱

小柴胡去半夏加桔樓根湯 瘡而發渴者。

柴胡八兩

黃芩

人參

甘草

生薑各三兩

大棗十二枚

桔樓根四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三

溫瘡表鬱熱入少陽之經熱而發渴小柴胡去半夏加桔樓根湯以小柴胡方後渴者去半夏加桔樓根例。生胃津前傷寒瘡後頭痛壯熱煩悶而渴亦用之易名黃龍湯以盡神明變化之妙其效可覩矣。

此方溫瘡和法

二日溫瘡表實

恆山丸 治瘡瘡說不可具。

恆山

知母

甘草

大黃各十銖

麻黃一兩

右五味為末蜜和丸未食服五丸如梧子日二不知漸增以瘡為度大黃後無溫瘡二日發名瘡表實撫熱入陽明之腑變上法恆山丸即前麻黃湯仍用麻黃發

肌表去石膏。樓根用知母。清陰火。大黃合甘草。調胃氣。加恆山。驅瘡痰。易湯為丸。蜜和甘緩。雖吐不吐由裏達表。大黃沈降之力。轉隨麻黃輕揚之性。以上行方下。雖不言汗。然同用麻黃。必當厚覆取汗。營衛通津液。布亦濁然汗出而解矣。

此方二日溫瘡汗法。

間日溫瘡內燥

方 治瘡或間日發者。或夜發者。

恆山

竹葉各二
兩

秋米粒一百

石膏八兩

右四味㕮咀以水八升。銅器中清藥。露置星月下。高淨處。橫刀其上。明日取藥於病人房門以銅器始終用銅器。金生水之義。緩火煎取三升。分三服。清旦一服。未發前一食頃一服。臨欲發一服。三服訖。靜室中卧。莫共人語。當一日勿洗手面及漱口。勿進食。取過時不發。乃潔洗進食。并用藥汁塗五心。胸前頭面。約

潔置頭邊。曾用神驗。

救急方。用烏梅二七枚。

溫瘡間日發。或夜發。內燥熱入。陽明之經變上法。去麻黃。知母。易竹葉。涼心經。石膏。清肺燥。去大黃。甘草。易秫米。滋胃氣。仍用恆山。驅瘡痰。妙露置高寒。更取金水之精。以勝熱邪之氣。內服外塗。法無不備。方下雖不言吐。然中有恆山。或吐或不吐。而瘡要無不解矣。

此方間日溫瘡吐法。

幹南按。後人治寒瘡。有薑露飲。以生薑煎湯。露置一宿。明早飲服。為以陰引陽之法。此治瘡瘻。以竹葉石膏清湯。露置一宿。明早煎服。為以陰勝陽之法。而妙製巧思。種種周備。尤益人神智不少。

間日溫瘡裏濕方二首

又方

先作羊肉臘。臘羹也 麵餅飽食之。并進少酒。隨其所能。令欣欣有酒氣。入密室裏。燃炭火。厚覆。取大汗。即瘻。

又方

燒黑牛尾頭毛作灰。酒服方寸匕。日三。

溫瘡。間日發。或夜發。裏濕。熱在太陰之經。變上法。羊肉臘。補脾土。麵餅。調胃氣。飽食飲酒。燃炭取火。厚覆大汗。而瘡自解。又方則取黑牛尾頭毛。屬坤土。至陰之盡者。燒灰酒服。以取微汗。而瘡亦無不解矣。蓋諸毛皆收濕。牛尾頭毛尤得力。

二方間日溫瘡汗法。

經年瘡內熱方二首

方 王瘡經數年不癒者。

恆山三兩為末。以雞子白和。并手丸如梧子大。置銅器中。于湯中煮令熟。殺腥氣則止。以竹葉飲服二十九丸。欲吐但吐至發令得三服時。早可斷食。時晚不可斷食。可作葉汁煮糜少食之。

溫瘡經年不瘥。內熱熱入少陰之經。即前溫瘡內燥。竹葉石膏。林米恆山法。去石膏。用竹葉涼心。經去林米煮稀糜。滋胃氣。仍用恆山驅瘡。易湯為丸。雞子白亦利清心之用。雖置銅器。不露高寒。欲吐取吐。而瘡亦無不解矣。

此方經年瘡吐法。

梔子湯 王瘡經年不瘥者。兩劑瘥。一月以來一劑瘥。

梔子一枚 恒山三兩 車前葉二七枚

炙乾 林米粒十四

右四味㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。未發一服。發時一服。發後一服。以吐利四五行為瘥。不止冷飯止之。

溫瘡經年不瘥。內熱熱入少陰之經。手少陽心梔子湯。即前溫瘡內燥。竹葉石膏。林米恆山法。去竹葉易車前葉。利小腸。去石膏易梔子。清心熱。仍用林米滋胃氣。恆山驅瘡。瘦或吐或利。而瘡更無不解矣。

此方經年瘡吐利法。

經年瘡內冷

方 治老瘧久不斷者。

恆山 三兩

鼈甲

升麻

附子

烏賊骨各一兩

右五味㕮咀。絹袋盛。以酒二升半漬之。小令近火轉之一宿成。一服一合。比發可數服。或吐下。

方 治瘧。

鼈甲 二寸

烏賊骨 二寸

附子

甘草 各一兩

恆山 二兩

右五味㕮咀。以酒二升半漬之。露一宿。明日塗五心手足。過發時瘧斷。若不斷。可飲一合許瘥。

老瘧久不斷。內冷邪入厥陰之經。升麻鼈甲。解陽毒。附子破陰邪。烏賊骨通血脉。深入厥陰。除寒熱瘧疾。酒漬溫行。或吐下。而瘧亦無不解矣。次方去升麻。易甘草。酒漬露宿。塗五心手足。瘧不斷。再飲服。法尤周備。

此方經年瘧吐下法。

通治方 方九首

方 治瘧無問新久者。

小便半升 蜜二七

右二味煮三沸頓服。每發日平旦時服勿食。重者漸退。不過三服瘥。

又方

鼠尾草

車前子各一

虎口

右二味㕮咀以水五升煮取二升未發前服盡。

鼠尾草治
肝散血。

又方

馬鞭草汁五合酒三合分三服。

馬鞭草入
肝散血。

又方

服翹搖汁。

又方

擣良岩根燒為灰和水服一合量人大小強弱用之。

良岩即天仙子。
治邪瘧殺蟲。

又方

瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之。

又方

水服桃花末方寸匕。

又方

常以七月上寅日採麻花酒服末方寸匕。麻花治諸風惡血。

又方

故難底去兩頭燒作灰。并華水服之。

瘡瘻內癬

鯉鯉湯 治乍寒乍熱。乍有乍無。山瘡瘻。

鯉鯉甲一枚十四枚

鼈甲

烏賊骨一枚

恒山三兩

附子一枚

右五味㕮咀。以酒三升。漬一夕。發前稍稍啜之。勿絕。吐也。兼以塗身。斷食過時。乃食飲之。

瘡瘻藥源。溪源嶺障濕毒氣。其病重於傷暑之瘡。內癬。乍寒乍熱。乍有乍無。邪入厥陰之經。鯉鯉湯。鯉鯉

烏賊骨。入通經脈。鼈甲。入搜肝邪。附子。直攻堅癖。酒漬。升發陽氣。雖吐勿絕。兼以塗身。與前溫瘻內燥方下同法。經年瘻內冷。方藥同意。皆千金之秘。

此方瘡瘻吐法。

瘡瘻內飲

大五補湯 治時行後變成瘡瘍。

桂心

三十枚

遠志

桔梗

芎藭各二兩

茯苓

乾地黃

芍藥

人參

白朮

當歸

黃耆

甘草各三兩

竹葉五兩

二十枚大棗

生枸杞根

生薑各一斤

半夏

麥門冬

各一升

右十八味㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次納諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡。

瘡瘍時行後變病內飲邪入三陰_{肺心肝腎}之經變上法大五補湯桂心芍藥甘草生薑大棗和營衛竹葉桔梗半夏茯苓泄濁飲芎藭當歸通肝血遠志安心神地黃枸杞麥冬滋腎水黃耆人參白朮益脾陽妙先煮竹葉枸杞先清後補入陰出陽曾無誤補助邪之患而時行後變成瘡瘍亦除。

此方瘡瘍補法。

勞瘞內燥

蜀漆丸 治勞瘞并治積勞寒熱發有時似瘧者。

蜀漆

麥門冬

知母

白薇

地骨皮

升麻各三
十銖

甘草

鱗甲

烏梅肉

萎蕤各一
兩

恆山半兩

石膏二兩

豉一合

右十三味為末。蜜和丸如梧子大。飲服十九日再服之。稍稍加至二十九。此神驗無不瘥也。加光明砂一兩。

勞瘡巢源勞瘡候。凡瘡積久不瘥。則表裏俱虛。客邪入厥陰。未散真氣不復。故疾雖暫間小勞便發。內燥。并積勞寒熱似瘡。邪入厥陰之經。蜀漆丸升麻白薇豆豉。別錄豆豉治傷寒熱瘡氣。散寒熱。石膏知母甘草。麥冬萎蕤地骨皮。清火燥烏梅鱗甲。搜肝邪。蜀漆恆山驅瘡瘻。方後加光明砂。補真氣。蜜丸甘緩。或吐或不吐。而勞瘡并積勞寒熱似瘡亦除。

勞瘡內瘻

烏梅丸治寒熱勞瘡。久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少。或因行遠久經勞役。患之積年不瘥。服之神效。

烏梅肉

豆豉各一

升麻

地骨皮

柴胡

鱗甲

恆山

前胡各一

肉蓯蓉

玄參

百合

蜀漆

桂心

人參

知母各半兩

桃仁八十枚

右十六味為末。蜜丸空心煎細茶下三十九日二服。老少孩童量力通用。無所忌。

勞瘡內癥。寒熱久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少。邪入厥陰之經。如上法加味。烏梅丸。升麻柴胡前胡桂心豆豉散。寒熱知母百合地骨皮玄參。清燥火。烏梅鱗甲。搜肝邪。蜀漆恆山驅瘡痰。加桃仁攻勞瘡。旋覆。補腎精。人參益胃氣。蜜丸甘緩。或吐或不吐。而勞瘡寒熱久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少亦除。

二方勞瘡吐法

幹南按。勞瘡治法。兩方皆用恆山蜀漆。而方後並不言吐。大約勞瘡久深。有烏梅鱗甲。直入肝臟。且蜜丸甘緩。停留胃腑。或吐或不吐。自在意中。即吐亦必微耳。

勞瘡內癥

方 治勞瘡。積時不斷。衆治無效。

生長大牛膝一握切。以水六升。煮取二升。分再服。第一服取未發前食頃。第二服取臨發時。

勞瘡內癥。積時不斷。衆治無效。不可無截法。生長大牛膝一味逐血氣。走經絡。直入

膀胱導積熱邪氣轉出太陽之表。通法即截法。未發臨發一再服功專力厚。用奏殊功。

此方勞瘧截法。

肝瘧內熱

烏梅丸 治肝熱為瘧。令人顏色蒼蒼氣息喘悶。戰掉狀如死者。或久熱勞微動如瘧。積年不瘥。

烏梅肉

蜀漆

鼈甲

姜蕤

知母

若參各一兩

恆山半兩

石膏二兩

甘草

細辛八銖

香豉一合

右十一味末之蜜丸如梧子酒服十九日再飲服亦得。

肝瘧內熱顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉如死。內風厥逆或久熱勞如瘧邪入厥陰之臟。如上法減味烏梅丸專用豆豉。別錄治傷寒散寒熱石膏知母甘草姜蕤合苦參清勞熱烏梅鼈甲搜肝邪。恆山蜀漆驅瘧痰佐用細辛開喘悶蜜丸酒服和濟。或吐或不吐而肝瘧色蒼氣喘戰掉及久勞熱如瘧亦除。

心瘧內熱

方治心熱為瘡。不。止。或。止。後。不。歇。乍。來。乍。去。令。人。煩。心。甚。欲。飲。清。水。反。寒。多。不。甚。熱。者。

甘草一兩

蜀漆三兩

恆山四兩

石膏五兩

鼈甲四兩

香豉一升

梔子

烏梅各三枚

淡竹葉切二升

右九味㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。

心瘡內熱。乍來乍去。令人煩心。欲飲清水。反寒多不甚熱。熱盛於內。寒格於外。如上法減味竹葉石膏梔子香豉。清心熱。烏梅鼈甲。搜肝邪。恆山蜀漆。驅瘡瘍。或吐或不吐。而心瘡乍來乍去。煩心。欲飲清水。反寒多不甚熱。亦除。

脾瘡內熱

恆山丸治脾熱為瘡。或渴。或不渴。熱氣內傷不泄。令人病寒。腹中痛。腸中鳴。汗出。

恆山三兩

甘草半兩

知母

鼈甲各一兩

右四味末之。蜜丸如梧子。未發前酒服十九。臨發時一服。正發時一服。脾瘡內熱。或渴不渴。熱氣內傷不泄。土鬱不發。木氣不伸。病寒。腹痛。腸鳴。汗出。邪入太陰之臟。恆山丸知母甘草。泄脾熱。鼈甲。搜肝邪。恆山。驅瘡瘍。蜜丸酒服和濟。或吐或不吐。而

脾瘡或渴不渴。熱氣不泄。腹痛腸鳴。汗出亦除。

腎瘡內熱

恆山湯 治腎熱。發為瘡。令人淒淒然。腰脊痛。宛轉大便難。目睭睭然。身掉不定。手足寒。

恆山 三兩

烏梅 三七

香豉 八合

竹葉 切一升

葱白 一握

右五味㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。至發令盡。

腎瘡內熱。腰脊痛。宛轉大便難。腎為二便之關目睭睭然。身掉不定。手足寒。陽盛格陰邪入少陰之臟。恆山湯。竹葉。葱白。百合。香豉。通腎熱。仲景少陰病白通湯用葱白成無己腎惡燥急食辛以潤之。葱白辛溫以通陽氣也。烏梅搜肝邪。恆山驅瘡瘍。或吐或不吐。而腎瘡。腰脊痛。大便難。目睭睭。身掉。手足寒。亦除。

肺瘡內熱

恆山湯 治肺熱。痰聚胸中。來去不定。轉而為瘡。其狀令人心寒。寒甚則發熱。熱間則善驚。如有所見者。

恆山 三兩

秫米 一百二十粒

甘草 半兩

右三味㕮咀。以水七升。煮取三升。分三服。至發時。令三服。

肺瘡內熱。痰聚胸中。來去不定。心寒。發熱。善驚。如有所見。邪入太陰之臟。恆山湯。秫

米林別錄。治寒熱利大腸時珍。
米肺之穀。肺病宜食之。甘草清肺熱。恆山驅瘧疾。或吐或不吐。而肺瘧痰聚胸
中來去不定。心寒發熱。善驚。如有所見亦除。

五方肝心脾腎肺瘧吐法

胃瘧內積

藜蘆丸 五臟并有瘧候。六腑則無。獨胃腑有之。胃腑瘧者。令人旦病也。善飢
而不能食。食而支滿腹大。此湯主之。

藜蘆

皂莢

恆山

牛膝各一
兩

巴豆

一枚十

右五味先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末

蜜丸如小豆大。旦服一丸。正發時一
丸。一日勿飽食。

肘後無恆
山牛膝

胃瘧內積。旦病善飢。不能食。食而支滿腹大。邪入陽明之腑。其人本有寒濕鬱熱。蒸
將成蠱證。藜蘆九。藜蘆皂莢。涌痰濕。牛膝逐血氣。前治勞瘧。內瘡截法。巴豆破寒積。仍用恆山
驅瘧。蜜丸甘緩。或吐或不吐。而胃瘧。旦病善飢。不能食。而支滿腹大。亦除。

此方胃瘧吐下法

瘧母內積

鼈甲煎丸 痘瘍一日發。當以十五日愈。設不瘥。當盡月解也。不愈。當云何。師

曰。此病結為癥瘕。名曰瘧母。急當治之。

成死鼈

十二斤。要畧作鼈甲。治如食法。

半夏

人參

大戟各

八銖

瞿麥

阿膠

紫葳一
紫宛

牡丹皮

石韋

乾薑

大黃

厚朴

桂心

海藻

赤消。要畧作

葶藶

羌蠅各

二銖

蜂窠

桃仁

芍藥

烏羽

燒一
烏扇作

黃芩各十
銖

麤蟲

蟲蟲各三十
銖。要畧作鼠婦

柴胡

一兩

瘧母內積。病結癥瘕邪入少陽。陽明之腑。鼈甲煎丸用大柴胡湯加味。柴胡半夏芍藥生薑。黃芩大黃。瀉膽熱加桂心厚朴乾薑。溫經冷。葶藶烏羽海藻大戟瞿麥石韋。泄痰濕。丹皮紫葳桃仁。通瘀濁。阿膠滋血液。死鼈搜肝邪。蟲蟲蟲蟲羌蠅蜂窠破堅。積酒漬溫行。而瘧母結為癥瘕亦愈。

海藻

仲景方。
無大戰

此方瘡母下法。

灸瘡法

凡灸瘡者必先問其病之所先發者先灸之。從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止。從腰脊發者灸腎輸百壯。從手臂發者灸三間。

瘡灸上星及大椎至發時令滿百壯。灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也。覺小異即灸百會七壯。若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線頭三七壯。炷如小豆。

又灸風池二穴三壯。

一切瘡無問遠近正仰卧以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右瘠瘡上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆是也灸七壯先取諺語後取天牖風池。

瘡日西而發者臨泣主之穴在目背上入髮際五分陷者灸七壯。

瘡實則腰背痛虛則羸弱飛揚主之穴在外踝上七寸灸七壯。

瘡多汗腰痛不能仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯五臟一切諸瘡灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也。

針瘡法

諸瘡而脈不見者，刺十指間出血，血去必已。先視身之赤如小豆者，盡取之。

瘡刺足少陰血出愈。

肝瘡刺足厥陰見血。

心瘡刺手少陰。

脾瘡刺足太陰。

肺瘡刺手太陰陽明。

腎瘡刺足少陰太陽。

胃瘡刺足太陰陽明橫脈出血。



診谿毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲。名短狐。谿毒亦名射工。其蟲無目。而利耳能聽。在山源谿水中。聞人聲。便以口中毒射人。故謂射工也。其蟲小。毒輕者。及相逐者。射著人影者。皆不即作瘡。先病寒熱。身不喜冷。體強筋急。頭痛目疼。張口欠放。呼吸悶亂。朝旦少蘇醒。晡夕輒復寒熱。或似傷寒發石散動。亦如中尸。便不能語。病候如此。自非其土地人。不常數行山水中。不知其證。便謂是傷寒發石散動。作治乖僻。毒盛發瘡。復疑是癰疽。乃至吐下去血。復恐疑蠱毒。是以致禍耳。今說其狀類。以明其證與傷寒別也。方在第二十五卷中。二十五卷備急蛇毒第二今改編二十七卷

備急千金要方卷第九

備急千金要方卷第十 肝臟

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫藥學專門畢業
學生 廣州中醫藥實驗館專門畢業 陳景山 覆校

肝臟脈論第一

肝虛實第二

肝膽俱虛附

肝勞第三

筋極第四

筋虛附

堅癥積聚第五

肝臟脈論第一

論五臟

論曰。夫人稟天地而生。故內有五臟六腑。精氣骨髓筋脈。外有四肢九竅皮毛爪齒。咽喉脣舌。肛門胞囊。以此總而成軀。故將息得理。則百脈安和。役用非宜。即為五勞七傷六極之患。有方可救。雖病無他。無法可憑。奄然永往。所以此之中秩。卷卷。卷與拳通。備述五臟六腑等血脉。根源循環流注。與九竅應會處所。數語。擇要。乃十二經全論。千金十二經脈論及方意。並論五臟六腑等輕重大小。長短闊狹。受盛多少。仍列對治方法。丸散酒煎湯膏摩熨及灸鍼孔穴。並窮於此矣。其能留心於醫術者。可考而行之。

其冷熱虛實風氣準藥性而用之。則內外百病無所逃矣。凡五臟在天為五星在地為五嶽。約時為五行。在人為五臟。五臟者精神魂魄意也。論陰陽察虛實知病源。用補瀉應稟三百六十五節終會通十二經焉。

論肝臟

論曰。肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也。目者肝之官。肝氣通於目。目和則能辨五色矣。左目甲。右目乙。循環紫宮榮華於爪外。主筋內主血。肝重四斤四兩。左三葉右四葉。凡七葉。有六童子三玉女守之。神名藍藍主藏魂號為魂藏。隨節應會。故云肝藏血。血舍魂在氣為語。在液為淚。肝氣虛則恐。實則怒。靈樞本神篇。肝氣虛則恐。實則怒。肝氣虛則夢見園花生草得其時。夢伏樹下不敢起。肝氣盛則夢怒厥氣氣即寒。客於肝則夢山林樹木。

凡人卧血歸於肝。肝受血而能視。足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能攝。扁鵲曰。肝在聲為呼。在變動為握。在志為怒。怒傷肝。精氣並於肝。則憂。肝虛則恐。實則怒。怒而不已亦生憂矣。

肝有病則目奪精。虛則寒。寒則陰氣壯。壯則夢山樹等。實則熱。熱則陽氣壯。壯則夢怒。

論肝病

扁鵲曰。肝中風者。頭目瞞。兩脇痛。行常僵。令人嗜甘。如阻婦狀。

肝中寒者。其人洗洗惡寒。翕翕發熱。面翕然赤。藜藜有汗。胸中煩熱。

肝中寒者。其兩臂不舉。舌本大。作燥。善太息。胸中痛。不得轉側。時盜汗。咳食已吐其汁。

肝主胸中喘。怒罵其脈沈。胸中火窒。即傷寒論所云手自冒心也欲令人推按之。有熱鼻窒。

肝傷。其人脫肉。又卧口欲得張。時時手足青。目瞑。瞳人痛。此為肝臟傷所致也。

肝水者。其人腹大不能自轉側。而脇下腹中痛。時時津液微生。小便續通。

肝脹者。脇下滿而痛引小腹。

靈樞論

肝著。著實。其病人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。

肝之積。名曰肥氣。在左脇下如覆杯。有頭足如龜鱉狀。久久不愈。發咳逆瘡瘻。連歲月不已。以季夏戊己日得之。何也。肺病傳肝。肝當傳脾。脾適以季夏王王者不受邪。復欲還肺。肺不肯受。因留結為積。故知肥氣以季夏得之。

難經五十六難。

病先發於肝者。頭目眩。脇痛。支滿。一日之脾閉塞不通。身痛體重。二日之胃而腹脹。三日之腎。小腹腰脊痛。脛痠。十日不已死。冬日入夏早食。

素問標本病傳論。

病在肝。平旦慧。下晡甚。夜半靜。

假令肝病。西行。若食雞肉得之。當以秋時發。病以庚辛日也。家有血腥。死女子。見之

以明要為災。不者。若感金銀物得之。

論肝病脈

凡肝臟象木。與膽合為腑。其經足厥陰與少陽為表裏。其脈弦相於冬。王於春。春時萬物始生。其氣來濡而弱。寬而虛。故脈為弦。濡即不可發汗。弱則不可下。寬者開。開者通。通者利。故名曰寬而虛。

春脈如弦。春脈肝也。東方木也。萬物之所以始生也。故其氣來濡弱輕虛。王注。經輕作寬。而滑。端直而長。故曰弦。反此者病。何如而反。其氣來實而弦。此謂太過。病在外。其氣來不實而微。此謂不及。病在內。太過則令人善忘。志當作怒。忽忽眩冒而癲疾。不及則令人胸痛引背。兩脇胠滿。素問玉機真誠論。

肝脈急甚為惡言。

一作妄言。素問大奇論。肝脈大急沈為疝。

微急為肥氣。在脇下如覆杯。

大奇論。肝脈小急為癰瘍筋攣。

緩甚為嘔。微緩為水瘕瘡。

大奇論。肝脈小緩為脇癖。

大甚為內癰。善嘔。微大為肝痺縮。咳引小

腹。小甚為多飲。微小為消癰。滑甚為穎疝。微滑為遺溺。濁甚為淡飲。微濁為癰癰筋

攣。靈樞邪氣臟腑篇。

肝脈沈之而急。浮之亦然。苦脇痛。有氣支滿。引小腹而痛。時小便難。苦目眩。頭痛。腰脊痛。足為寒。時癃。女人月事不來。時無時有。得之少年。有所墮墮。凡有所墮墮。惡血留內。若有所大怒。氣上而不能下。積於左脇下。則傷肝。

論肝死脈

肝脈來濡弱。招招如揭竿末梢曰平。巢源作綽綽如按琴瑟之絃。如揭長竿。春以胃氣為本。肝脈來盈實而滑。如循長竿曰肝病。肝脈來急而益勁。如新張弓弦曰肝死。

春胃微弦。微字着眼曰平。弦多胃少曰肝病。但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病。毛甚曰今病。

真肝脈至內外急。如循刀刃責責然。巢源作蹠蹠然。如按琴瑟弦新張弓弦色青白不澤。毛折乃死。素問玉機真臟論

肝脈來灌灌如倚竿。如琴瑟弦再至曰平。三至曰離經。四至脫經。五至死。六至命盡足厥陰脈也。

肝死藏浮之弱。按之中如索不來。或曲如蛇行者死。

肝藏血。血舍魂。悲哀動中則傷魂。魂傷則狂妄。其精不守。一作狂妄不精。不敢正當人。令人陰縮而攣筋。兩脇肋骨舉。不舉毛悴色夭。死於秋。

足厥陰氣絕。則筋縮引卵與舌。厥陰者肝脉也。肝者筋之合也。筋者聚于陰器。而脉絡于舌本。故脉弗營而筋縮急。筋縮急則引卵與舌。故脣青舌卷。卵縮則筋先死。庚篤卒死。金勝木也。

扁鵲曰。肝病胸滿脹。善恚怒叫呼。身體有熱而復惡寒。四肢不舉。面白。身體滑。其

脉當弦長而急。今反短濇。其色當青。而反白者。此是金之尅木。為大逆。十死不治。
論曰。春肝木王。其脉絃細。細字。而長曰平。反得沈濡而滑者。是腎之乘肝。母之歸子。
為虛邪。雖病易治。反得浮大而洪者。是心之乘肝。子之乘母。為實邪。雖病自愈。反得
微澀而短。千金翼微浮而短溫者。是肺之乘肝。金之尅木。為賊邪。大逆。十死不治。反得大而緩。
者。是脾之乘肝。土之陵木。為微邪。雖病即瘥。心乘肝。必吐利。肺乘肝。即為癰腫。
幹南按。此辨脉之祕法。母歸子為虛邪。子乘母為實邪。寇害我。金尅為賊邪。我
能制敵。木尅敵乘我。木陵不能深入為微邪。內經祕旨。

又難經五十難。從後來者為虛邪。後謂生我者也。從前來者為實邪。前我生者也。從所不勝
來者為賊邪。我不勝尅我者也。尅從所勝來者為微邪。所勝我者也。自病為正邪。自病本臟自
假令心病。中風得之為虛邪。心生傷暑得之為正邪。傷暑自病。飲食勞倦得之為實
邪。脾也。傷寒得之為微邪。心尅中濕得之為賊邪。嗜心也。此以五行辨證之要義

論肝病色

扁鵲曰。肝病。其色青。手足拘急。脇下苦滿。或時眩冒。其脉弦長。此為可治。宜服防風。
青脉之至也。長而左右彈。有積氣在心下支胠。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。腰痛。
足冷頭痛。

竹瀝湯秦光散

論曰。肝脉搏堅而長色不青。當病墜。若搏因血在脇下。令人喘逆。其濡而散色澤者。當病溢飲。溢飲者渴暴多飲而溢入肌皮腸胃之外也。素問溢入作易入。

扁鵲曰。診得肝積。脈弦而細。兩脇下痛。邪氣走心下。足脰寒。脇痛引小腹。男子積疝。女子瘕淋。身無膏澤。善轉筋。爪甲枯黑。春癓秋劇。色青也。

青為肝。肝合筋。青如翠羽者吉。肝主目。目是肝之餘。其人木形相比于上角。蒼色。小頭長面大肩平背直。身小手足有材。好勞心小力。多憂勞于事。耐春夏。不耐秋冬。感而生病。足厥陰他他然。脇廣合堅。脆弱傾正。則肝應之。正青色。小理者。則肝小小則臟安。無脇下之病。粗理者。則肝大大則虛。虛則寒。逼胃迫咽。善膈中且脇下痛。廣脇反較者。則肝高。高則實。實則肝熱。上支賁。加脇下急為息貴。合脇危一作兔。較者。則肝下。下則逼胃。脇下空。空則易受邪。脇骨堅者。則肝堅。堅則臟安。難傷。脇骨弱者。則肝脆弱。脆弱善病消癰。易傷脇腹。好相者。則肝端正。端正則和利。難傷。脇骨偏舉者。則肝偏傾。偏傾則脇下偏痛。正青色小理以下見靈樞本臟篇而此獨詳。

凡人分部陷起者。必有病生。膽少陽為肝之部。而臟氣通于內。外部亦隨而應之。沈濁為內。浮清為外。若色從外走內者。病從外生。部處起。若色從內出。外者病從內生。部處陷。內病前治陰。後治陽。外病前治陽。後治陰。陽主外。陰主內。凡人死生休否。則

臟神前變形於外。人肝前病目則為之無色。若肝前死目則為之脫精。若天中等分。
墓色應之必死不治。看應增損斟酌賒促。賒則不出四百日內。促則不延旬日之間。
肝病小愈而卒死。何以知之。曰青兼而白色。青屬肝。則金剋木。如拇指大蹙點見頰頬上。此必
卒死。肝絕八日死。何以知之。面青而目赤。赤屬心。木火亢極。但欲伏眠。視而不見人。汗出如
水不止。一日二日死。面黑目青者。不死。青如草滋死。吉凶之色。在於分部順順而見
青白入目必病。不出其年。若年上不應。三年之中。禍必應也。

幹南按。肺臟論。風入肺經。膽氣妄泄。目則為青。不可復生。以木刑金故。今云面
黑目青不死。以青屬肝。黑屬水。惟白屬金。金剋木。故雖部分順。而青白入目。必
病而死。

論肝病聲

襄公問扁鵲曰。吾欲不診脉。察其音。觀其色。知其病生死。可得聞乎。答曰。乃聖道之
大要。師所不傳。黃帝貴之。過于金玉。入門見病。觀其色。聞其呼吸。則知往來出入吉
凶之相。角音人者。主肝聲也。肝聲呼。其音琴。其志怒。其經足厥陰。謂厥逆少陽。謂則
榮衛不通。陰陽交雜。陰氣外傷。陽氣內擊。擊則寒。寒則虛。虛則卒然啞。啞不聲。此為
厲。風入肝。續命湯主之。方在第七卷中。諸風門 但踞坐不得低頭。面白青黑。四肢緩弱。
遺失便利甚。則不可治。賒則旬日之內。桂枝酒主之。方在第七卷中。諸風門

又呼而哭哭而反吟此為金尅木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則不可治若脣色雖青向眼不應可治地黃煎主之方在下肝虛實篇中

肝病為瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之方在第九卷中

傷寒門瘧第

六若其人本來少于悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不即病禍必至矣此肝病聲之候也若其人虛則為寒風所傷若實則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之

幹南按六經情態惟肝最難識東方生木木生肝肝氣始生其氣少其來濡而弱輕而虛就其濡弱虛輕中微滑且端直而長則為弦其脉根本深入竅于至陰竊陰六在足少趾次趾之端屬少陽膽經膽與肝合而應在窓籠之前耳前上下脉自下而上其風易動火亦隨之故養肝如養騎子投其所好防其所溺戒其所縱將順匡救而後可平也

又六經病情惟厥陰最難治其本陰而標陽為陽中之少陽通于春氣素問六節藏象王吳注均作陽中之少陽其體風木其用相火與少陽為表裏陰之初盡即陽之初出少陽不生則肝氣內變天真論上古故溫膽即以生木仲景烏梅丸主辛椒薑桂而佐藥連千金膽腑方溫膽湯主夏橘枳而佐竹茹義亦同寒因熱用也少陽之氣發少陰之氣始衰見後

論故滋水即以瀉肝千金竹懸前胡兩湯防風遠志兩散地黃煎多主梔苓白虎玄地蕤麥而佐薑辛熱因寒用也仲景治肝用苦酸為肝之自病千金治肝用涼散為肝之客病肝實熱者肝熱中風也肝虛寒者肝虛中寒也知此乃可讀千金肝臟諸方矣

又讀千金肝臟方而滋疑者以有仲景厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱饑不欲食一條為定案及傷寒脉微而厥靜而復時煩得食而嘔吐蛔烏梅丸主之一方為定法以為肝病萬變不能越此範圍不知仲景烏梅丸外尚有實熱虛寒諸方如厥陰篇傷寒嘔而發熱小柴胡湯厥而裏熱白虎湯熱利下重白頭翁湯下利虛煩梔子豉湯下利譖語小承氣湯為肝實熱治法如上熱下寒咽塞吐膿下利麻黃升麻湯熱盛寒格更逆吐下乾薑黃連黃芩人參湯裏寒外熱通脉四逆湯大汗大下厥冷四逆湯乾嘔頭痛吳茱萸湯厥寒脉細當歸四逆湯內有久寒當歸四逆加吳茱萸湯為肝虛寒治法但仲景所詳多嘔吐下利厥逆諸證千金所詳多胸滿脇痛筋急目昏驚恐諸證泄熱補肝諸方實與仲景小柴胡白虎梔豉麻黃升麻四逆吳茱萸諸湯相出入會而通之可也

千金肝臟治法有實熱有虛寒實熱者肝熱中風也虛寒者肝虛中寒也有邪

熱邪熱傷肝驚狂不定為內風中風類也。有絡熱絡熱傷肝青筋牽急亦為內風中風類也。此外有不因熱而因寒。竊風入肝。喑啞不聲為毒風中寒類也。諸方具詳均補仲景所不及。烏梅丸詎足盡肝病之變哉。論中所載惡血傷肝。積左脇下脫肉傷肝。手足青目瞑虛熱傷肝。脉沈胸中叉窒欲推按有熱鼻塞諸病情亦仲景所未及。

論膽經筋

其筋起于小指次指之上。結外踝上。循脣外廉。結于膝外廉。其支者別起于外輔骨上走髀。前者結伏兔之上。後者結于尻。其直者上眇。眇音抄。眇在季脇下。乘季脇上。快腸兩傍虛軟處。走腋前廉。俠于膺乳。結于缺盆。直者上出腋貫缺盆。出太陽之前。循耳後上額角。交顛上。下走頸上。結于勦。其支者結于目外眥。為外維。靈樞經筋篇。

論膽經脉

其脉起于目锐眥上。抵頭角。下耳後。循頸行手少陽之前。至肩上。却交出手少陽之後。入缺盆。其支者從耳後入耳中。出走耳前。至锐眥後。其支者別锐眥下大迎。合手少陽于頤下。加頰車下頸。合缺盆以下胸中。貫膈絡肝屬膽。循脇裏出氣街。繞毛際。橫入髀厭中。其直者從缺盆下腋。循胸過季脇下。合髀厭中以下。循髀陽出膝外廉。下外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上出小指次指之端。其支

者。別跗上。入大指之間。循大指歧內出其端。還貫入爪甲。出三毛合足。厥陰為表裏。
厥陰之本。在行間上五寸。應在背俞同會于手少陰。靈樞經脉篇

論膽經別脈

其足少陽之別。名曰光明。去踝半寸是也。別走厥陰。下絡足趺。以上靈樞經脉篇主肝生病。病實則膽熱。熱則厥厥則陽。病陽。陽脉反逆。大于寸口一倍。病則胸中有熱。心脇頭領痛。缺盆腋下腫。虛則膽寒。寒則痿躄。雙則陰病。陰脉反小。于寸口。病則胸中有寒。少氣口苦。身體無膏澤。外至脅絕骨外踝前。及諸節皆痛。若陰陽俱靜。與其俱動。如引繩俱頓者病也。此是少陽膽經筋脉支別。病令承跗足厥陰肝經後。

論肝經筋

足厥陰之筋。起于大指之上。上結于內踝之前。上循脇上。結內輔之上。下循陰股。結于陰器。絡諸筋。靈樞經筋篇

論肝經脉

足厥陰之脉。起于大指叢毛之際。上循足趺上廉。去內踝一寸。上踝八寸。交出太陰之後。上膍內廉。循股陰入毛中。環陰器。抵小腹。夾胃。屬肝絡膽。上貫膈。布脇肋。循喉嚨之後。上入頤頸。連目系。上出額。與督脈會于顛。一本云。其支者從少腹與太陰少陽。結于腰踝下。第三第四骨空中中。

可以俛仰。大夫頽疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者則寸口大一倍于人迎虛者則寸口反小于人迎也

論肝經別脉

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上舉結于莖其病氣逆則舉腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別

靈樞經
脉篇

論肝經刺法

左手關上陰絕者無肝脉也若瘡遺溺難言脇下有邪氣善吐刺足少陽治陽

左手關上陰實者肝實也若肉中痛動善轉筋吐刺足厥陰治陰

色主春病變于色者取之營

凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內腑善癆節時腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癆

春木肝脉色青主足少陽脉也春取絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉常深其氣少不能深入故取絡脉分肉之間其脉根本並在竅陰之間

竅陰
足少

陽膽經脉在足少趾次趾之端應在窓籠之前窓籠者耳前上下脉以手按之動者是也

肝病春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中都皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯

論肝膽青筋牽病

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從冬三少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱于腠理皮毛之病俱生表裏之疴因春三月起從少陽發動反三月少陰氣則肝膽腑受屬而生其病相反氣相反而病亦相反故若腑虛猶言虛則為陰邪即陰所傷腰背強急脚縮不伸脈中欲折目中生花若臟實猶云裏實則為陽毒所損濤濤前寒而後熱頸外雙筋牽不得屈伸頸直背強眼赤黃不欲轉動合身回側故曰青筋牽病

方在傷寒上卷治肝膽病溫病陰陽毒今補出子後

幹南按此以春溫之陽毒歸本于肝臟之實熱特標青筋牽病名目使人見證知源方治別出傷寒上卷此未明言欲人貫通善悟

又按論中腑虛則為陰邪所傷臟實則為陽毒所損驟讀之語意似未明瞭及觀後肝病為瘧一條內云其人虛則為寒風所傷其人實則為熱氣所損以寒風解陰邪熱氣解陽毒義即了然

扁鵲曰灸肝肺二腧主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

肝虛實第二 脉四條 方十一首

灸法一首

肝實熱

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脇痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消名曰肝膽俱實也

幹南按此明肝膽脉證最為明晰肝經常關係于胃若以胃脹嘔逆食不消為胃病則失之矣

風熱傷肝

方三首

言

竹瀝泄熱湯 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悸非意而

言

竹瀝一升麻黃三分石膏八分生薑

芍藥各四

大青

梔子仁

升麻

茯苓

玄參

知母各

三分

生葛八分

芍藥各四

大青

右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利

下芒消三分去芍藥加生地黃五分

刪繁方無石膏生葛

生葛用人生葛

三分

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

前論。肝舍魂在氣為語。又。痰火內閉之候。竹瀝泄熱湯。竹瀝通痰熱。熟麻黃石膏生薑。引
定喘逆邪。伏于內非。梔子大青知母無以清陽。伏于陰非。玄參芍藥無以瀉生葛。引
清氣以上升。茯苓引濁氣以下泄。清升濁泄而喘悶視暗狂悸自除。方後邪閉須利

下芒消之鹹去芍藥之酸加生地之寒以潤腸通脈而實熱以除。

瀉肝前胡湯 治肝實熱目痛胸滿氣急塞

前胡

秦皮

細辛

梔子仁

黃芩

升麻

蕤仁

決明子

各三兩

苦竹葉

切各一升

車前葉

切各一升

芒消

三兩

右十一味

㕮咀以水九升煮取三升去滓

下芒消分三服

又一方有柴胡三

兩共十二味

風熱傷肝挾陽邪而逆于經目痛胸滿

肝脉起目锐皆其支者別锐

下大迎合缺盆

以下胸中貫膈

氣急塞痰火

內閉之候瀉肝前胡湯前胡合細辛開痰滿梔子黃芩瀉熱實秦皮

本經除目翳白

腫去面目

赤腫疼痛

決明蕤仁療目痛

升麻佐竹葉升清以降火

車前合芒消泄濁

以通腸開肝邪

出路而目痛胸滿氣急塞以除一方有柴胡所以助前胡所不及耳

防風煮散

治肝實熱夢怒虛驚

防風

茯苓

萎蕤

白朮

橘皮

丹參

各一兩

細辛

二兩

甘草一兩 升麻

黃芩

各一兩半

大棗三枚

射干一兩

酸棗仁三分

右十三味治下篩為麤散以方寸兩已帛裹以井花水二升煮時時動裏子煎取一升分服之日二。

風熱傷肝。挾陽邪而擾于魂夢怒虛驚。怒則火升驚則痰逆。痰火外越之候。防風煮散防風合細辛散風熱。橘皮茯苓射干開痰結。黃芩萎蕤佐丹參瀉陰火。酸棗仁益虛驚尤藉白朮甘棗。崇土抑木。井花水鎮心安神。經言肝欲散易湯為散。散以散之而夢怒虛驚亦止。

邪熱傷肝

遠志煮散 治肝邪熱出言反常乍寬乍急

遠志

射干

杏仁

大青

各一兩半

茯神

葛根

甘草

麥門冬

各一兩

芍藥

二兩三分

桂心

三分

石膏

二兩

知母

升麻

各五分

右十三味治下篩為麤散以水二升五合煮竹葉一升取汁用煮藥一匕半煎取八合為一服日二以綿裹散煮之。

邪熱傷肝。挾陽邪而擾于魂出言反常乍寬乍急經曰肝氣甚則多言遠志煮散遠志扶神定肝魂石膏知母甘草清肝熱桂心杏仁射干散肝邪升麻葛根達肝以引陽麥冬芍藥益肝以引陰陽降陰潛方後竹葉煮汁涼心經導大腑實則瀉子之義。

以開肝邪出路。而出言反常。乍寬乍急亦除。

地黃煎 治邪熱傷肝。好生悲怒。所作不定。自驚恐。

各切

生地黃 淡竹葉 生薑 車前草 乾藍

各一升

丹參 玄參各四兩 茶芩二兩 石膏五兩

赤蜜一升

右十味咬咀。以水九升。煮取三升。去滓。停冷下蜜。更煎三兩沸。分三服。

邪熱傷肝。挾陽邪而擾于魂氣逆。則怒。氣下則悲。氣亂則驚。氣怯則恐。火無常性。地黃煎。生地玄參。滋肝陰。丹參。乾藍。通肝血。生薑。散肝邪。石膏。清肝熱。茶芩。定肝魂。赤蜜。和肝氣。竹葉合車前。利心竅。導火腑。實則瀉子之義。開肝邪出路。而好生悲怒。所作不定。自驚恐亦除。

絡熱傷肝

方二首

幹南按。前論載青筋牽病。無方。茲從第八卷傷寒門。肝病溫毒補出。

方 治肝腑臟溫病。陰陽毒。頸背雙筋牽。先寒後熱。腰強急縮。目中生花。

桂心一兩 白朮 芒消 大青 桔子各三兩

各一升

柴胡五兩 石膏 生薑各八兩 生地黃 香豉各一升

各一升

右十味咬咀。以水九升。煮取三升。分三服。

絡熱傷肝。挾陽邪而入于筋。陰陽溫毒。頸背雙筋牽。先寒後熱。腰強急縮。目中生花。

華青筋病

全係木鬱肝熱所致變上法。桂心柴胡生薑開太陽達經石膏芒消瀉陽明

泄熱。梔政大青清上生地滋下白朮安中通上中下三焦使絡血清精氣化經脉舒而寒熱頭背腰筋牽目生花自愈。

幹南按此及下方皆用芒消不用大黃以非有形積熱法取潤利通經脉足矣。

方 治肝膽臟溫病陰陽毒先寒後熱頭筋牽攣面目赤黃身中直強。

玄參一兩

細辛二兩

梔子

黃芩

升麻

芒消各兩

石膏三兩

車前子

暴切二升竹葉切五升

右九味㕮咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去滓下諸藥煎至三升下芒消分三服。

絡熱傷肝挾陽邪而入于筋陰陽溫毒先寒後熱頭筋牽攣面目赤黃身中直強。
筋全係木鬱肝熱所致細辛入厥陰利關節石膏芒消瀉陽明通腸胃升麻梔子
黃芩清上解熱毒玄參滋下救真水竹葉合車前涼心經導火腑實則瀉子之義開
肝邪出路而寒熱頭筋牽面目黃赤身直強亦除。

厲風入肝

方二首

幹南按前論載厲風入肝無方茲從第七卷諸風門補出。

續命湯 治厲風入肝陰氣內傷陽氣外擊擊則寒寒則虛虛則卒然喑啞不

聲諸風門作大續命湯治肝屬風卒然喑啞依古法用大小續命二湯通治五臟偏枯賊風

麻黃八兩

石膏四兩

桂心一升

乾薑兩

二

當歸

黃芩各一兩

杏仁七十枚

荆瀝一升

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下

荆瀝

數沸分四服能言未瘥後服小續命湯

荆瀝

附子

舊無

荆瀝今增之效如神

千金翼

有甘草

附子

當歸

附子

舊無荆瀝今增之效如神

千金翼

有甘草

厲風入肝

肝虛少陽厥逆

前論足厥陰厥逆少陽

附子

外傷陽氣內擊

附子

附子

附子

附子

湯麻黃

重用八兩桂心杏仁散風寒石膏

減用四兩黃芩

本經

遂水清濕熱乾薑逐冷飲芎藭當歸

附子

附子

附子

附子

通經血合

麻黃越婢麻杏甘石成方

諸風門作大續命湯以比

更增荆瀝滌痰涎清聲音

千金治

音

音

音

荆瀝

而厲風入肝卒喑啞不聲以愈

桂枝酒

治厲風入肝但踞坐不得低頭面目青黑

四肢緩弱遺失便利

諸風門治

肝虛寒卒然瘡啞

不聲踞坐不得而目

青黑四肢緩弱遺失便利

屬風所損

桂枝

芎藭獨活牛膝薯蕷

甘草各三

附子

防風

茯苓天雄茵芋杜仲

白木蒴藋根各四

附子

乾薑

五兩大棗四十

鄆躅猪椒葉根皮各一升

附子

右十八味㕮咀以酒四斗漬七日服四合日二加至五六合

厲風入肝。肝虛少陰厥冷。初無喑啞不聲。但踞坐不得低頭。面目青黑。四肢緩弱。遺失便利。經云風入為飧泄 即風毒之脚弱病變。上法桂枝酒。桂枝防風。獨活芎藭。合蒴藋根。別錄治風濕。茵芋躡驅屬毒。猪椒乾薑附子。天雄破陰。邪薯蕷杜仲牛膝。堅筋骨。白术茯苓甘棗健脾胃。酒漬飲服。味取輕薄。流走四肢。溫行腑臟而厲風入肝。踞坐不得低頭。面目青黑。肢弱便利亦除。

肝虛寒

左手關上脉陰虛者。裏為陰表為陽 足厥陰經也。病苦脇下堅寒。熱腹滿。不欲飲食。腹脹。悒悒不樂。婦人月經不利。腰腹痛。名曰肝虛寒也。

幹南按此明肝虛脉證體認全在脇下堅寒。熱若以腹滿不欲飲食。腹脹。悒悒不樂。為脾病。婦人月經不利。腰腹痛。為奇經衝任病。則失之矣。

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者。足厥陰與少陽經俱虛也。病如恍惚。尸厥。不知人。妄見少氣。不能言。時時自驚。名曰肝膽俱虛也。

幹南按膽氣混濁。失其中精之體。往往恍惚。尸厥。驚狂妄見。觀膽腑門載救急萬病。多惡毒內閉。倉卒欲死形證可悠然悟矣。

肝虛血瘀

補肝湯 治肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青者

甘草

桂心

山茱萸

各一兩
金翼作烏頭

細辛

桃仁

千金
作

桃仁

柏子仁

茯苓

防風

各二兩

大棗

四十枚

右九味咬咀以水九升煮取五升去滓分三服

肝氣不足陰血內結兩脇下滿筋急不得太息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴至爪甲枯口面青陰邪不得外散補肝湯防風桂心細辛開邪散陰山萸柏仁別錄柏實療虛損益血肝勞第三論曰肝補精生血桃仁通瘀止痛术苓甘棗培土益肝陰血通而脇滿筋急肢厥心腹痛目暗及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青亦除

肝虛食積

補肝散 治左脇偏痛久宿食不消并目眩昏風淚出見物不審而逆風寒偏甚消食破氣止渴

山茱萸

桂心

薯蕷

天雄

茯苓

人參

各五分

芍藥

白朮

獨活

五加皮

大黃

各七分

防風

乾薑

丹參

厚朴

細辛

桔梗

甘草各一

貫衆半兩

橘皮三分

陳麥麴

大麥麴升一

兩半升一

甘菊花

右二十三味治下篩酒下方寸匕日二。若食不消。食後服。若止痛。食前服之。
肝氣不足。食積內結。脇偏痛久。宿食不消。肝與胃病常相因。目眩。昏。風淚出。陰邪不得外散。如上法加味。補肝散。桂心細辛獨活。卒開以達肝邪。乾薑天雄。辛溫以救肝逆。丹參芎藭。合桔梗。本經桔梗治胸膈痛如刀刺。通血止偏痛。防風甘菊。佐山萸薯蕷。明日止風淚。惟其宿食不消。脾滯即肝滯。故既用五加厚朴橘皮。以泄濕。貫衆本經治腹中邪熱氣。大黃。以瀉積。茯苓。人參。甘草。以調脾。尤重用麥麴麥蘖。以消穀。易湯為散。酒下溫行。食積祛而腸久偏痛。食不消。目昏淚出。風寒偏甚亦除。

肝虛冷積

檳榔湯 治肝虛寒。脇下痛。脹滿。氣急。目昏濁。視物不明。

檳榔

二十枚

母薑

七兩

附子

七枚

茯苓

四兩

橘皮

桂心

各三錢

桔梗

兩

白朮

各四

吳茱萸

五兩

右九味㕮咀。以水九升。煮取三升。去滓分溫三服。若氣喘者。加芎藭三兩。半夏四兩。甘草二兩。

肝氣不足。冷積內結。脇下痛。脹滿。氣急。目昏濁。視物不明。陰邪不得外散。如上法減

味。檳榔湯。桂心母薑。辛開以達肝邪。附子吳萸。辛溫以消肝脹。梗。開結止脇痛。橘皮降逆緩氣急。惟其逆滿不消。脾滯即肝滯。故既用白朮茯苓。以行脾。尤專任檳榔以消積。方後痰鬱氣喘。則加芎藭半夏。合甘草。以佐术苓所不及。冷積去。而脇痛。脹滿氣急。目昏不明。亦除。

肝虛痰濕

防風補煎 治肝虛寒。目睭睭。視物不明。諦視生花。

防風

細辛

芎藭

白蘚皮

獨活

甘草

兩各三

橘皮

二兩

大棗

三枚

甘竹葉

切一斗

蜜

五合

右十味咬咀。以水一斗二升。先煮九味。取四升。去滓下蜜。更煎兩沸。分四服。日三夜一。若五六月。以燥器貯冷水藏之。

肝氣不足。痰濕內結。目睭睭不明。諦視生花。惟無。脇痛。脹滿氣急之候。防風補煎。防風合芎藭。獨活。細辛。息風。眩。橘皮。白蘚。開痰濕。甘草。大棗。蜜潤。肝氣妙重用竹葉。輕清上行。以明兩目。利九竅。痰濕去。而目睭睭不明。諦視生花。以除。

肝虛風濕

補肝釀松膏酒 治肝虛寒。或高風眼淚等雜病

松脂十斤細剉。以水淹浸一周日煮之。細細接取上膏。水竭更添之。脂既盡。

前論。肝脹者。脇下桔滿而痛引小腹。

更水煮如前。烟盡去火停冷。脂當沈下取一斤。釀米一石水七斗好麴末二斗。如家常釀酒法。仍冷下飯。封一百日。脂米麴并消盡。酒香滿一室。細細飲之。此酒須一倍加麴。

肝氣不足。風濕內侵。高風眼淚亦無。腸痛脹滿。氣急之候。補肝釀松膏酒。松脂去濕祛風。麴釀平胃溫膽。隨酒氣以上升頭目。風濕去而高風眼淚以除。


又方

取枸杞子擣碎。先納絹袋中。率一斗枸杞子二斗酒漬訖。密封泥甕。勿泄。暴乾。天陰勿出。三七日滿。且溫酒服。任性飲。忌醉。

肝氣不足。風濕內損。高風眼淚亦無。腸痛脹滿。氣急之候。枸杞酒。枸杞益精。氣除風濕。本經治五臟邪氣風濕。隨酒力以上升頭目。風濕去而高風眼淚亦除。

灸法

肝虛目不明。灸肝輸二百壯。小兒斟酌可灸一二七壯。



肝勞第三

論一首
方二首

論曰。肝勞病者補心氣以益之。補子心王則感于肝矣。人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變。素問四氣調神大論順之則生。逆之則死。順之則治。逆之則亂。反順為逆。是謂關格。

厥陰氣盛少陽之氣不能外營則陰閼少陽氣盛厥陰之氣不能內營則陽格營者和澤也。關者閉絕之義。格者捍絕之義。

病則生矣。

幹南按。肝勞者。肝勞虛損。心氣不足所致。五臟各有勞損。此舉肝臟言之。勞則

肝木生長之氣逆而不順。內傷骨髓。外敗筋肉。血氣將亡。經絡便壅皮裏空疏。

千金翼敘虛損論。經絡便壅皮裏空疏。即膏酒方下所謂閉塞不通毛悴色天是也。

論邪氣所入虛風緩急甚則骨疼筋攣心臟不甯煩悶以起病則深矣。肝勞治

法。自以猪膏酒為主。虎骨酒則因體寒。挾飲肝氣內變。而然益男子五勞七傷。

見膽腑風虛雜補酒煮。

八風十二痺病本相因同為肝臟致損。

見膽腑風虛雜補酒煮。第五天門冬大煎方。

分別觀之可也。

又按。經言陰陽之要。陽氣者煩勞則張。精絕陰氣者靜則神藏。躁則消亡。故安則逸。擾則勞。逸則順。勞則逆。又曰逆春氣則少陽不生。肝氣內變。肝勞主義即

由此體認而出。

虛寒陰竭

猪膏酒 治肝勞虛寒。關格勞澀閉塞不通毛悴色天。

猪膏

薑汁

各四升

右二味以微火煎取三升下酒五合和煎分為三服

肝勞虛寒木氣不生內則閉塞不通外則毛悴色夭病成關格肝陰內竭猪膏酒甘潤溫通一法猪膏以滋肝陰薑汁以通膽氣酒煎溫行隨酒入膽以益肝勞而虛寒關格勞澀閉塞不通毛悴色夭以愈

虛寒陽擾

虎骨補酒

治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶

虎骨

一升炙焦
碎如雀頭

丹參八兩

乾地黃七兩

地骨皮

乾薑

芎藭

各四兩

猪椒根

白朮

五加皮

枳實

各五兩

右十味咬咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再服

肝勞虛寒木氣不生口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶

心臟不甯

肝陽內擾虎骨補酒虎骨

芎藭追風痛五加舒筋攀枳實消胸悶猪椒乾薑白朮理中寒丹參地黃通肝血酒

浸溫行隨酒入膽以益肝勞而虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶亦除

幹南按肝勞治法與膀胱腑風虛雜補酒煮方巴戟酒五加酒天冬大煎等同

一妙義當通檢用之

筋極第四

論三首 方七首

論曰。夫六極者。天氣通于肺。地氣通于嗌。風氣應于肝。雷氣動于心。穀氣感于脾。素谷作穀雨氣潤于腎。六經為川。腸胃為海。九竅為水注之氣。所以竅應于五臟五臟邪傷。則六腑亦傷。而所生極。肝筋極。心脉極。脾內極。肺氣極。腎精極。故曰五臟六極也。

論曰。凡筋過勞盡。由外至內以春遇病為筋痺。筋痺不已。復感于邪。內舍于肝。則陽氣入于內。陰氣出于外。若陰氣外出。出則虛。虛則筋虛。筋虛則善悲。色青蒼白。見于目下。若傷寒。則筋不能

動。十指爪皆痛。數好轉筋。為肝虛之極其源以春甲乙日得之。傷風。風在筋為肝虛風也。

若陽氣內發。發則實。實則筋實。筋實則善怒。嗌乾。傷熱則咳。咳則脇下痛。不能轉側。又脚下滿痛。為肝實之極故曰肝實風也。然則因其輕而揚之。因其重而減之。因其衰而彰之。審其陰陽以別柔剛。陽病治陰。陰病治陽。善治病者。病在皮毛。肌肤筋脉。猶在于經而治之。次治六腑。若深至五臟。而極則半死矣。

扁鵲云。筋勞極不治。九日死。何以知之。手足爪甲青黑。呼罵不息。筋應足厥陰。足厥陰氣絕。則筋縮引卵。與舌筋先死矣。

幹南按肝勞為臟病。筋極為經病。經曰。肝者。罷極之本。動作勞甚謂之罷極。肝主運動。故為罷本。其華在爪。爪為筋之餘其充在筋。可知肝為罷極之本筋。即罷極之用。本論肝

有病從經所應之筋生可知肝勞為肝臟之傷筋極為肝經之極筋極特肝勞虛損之外候為五極之一復感于邪則有虛風實風之病陽病治陰陰病治陽猶是常法若筋極而至絕則不治手足爪甲青黑筋縮引卵與舌一身反若無痛者以病由經入臟故也

筋實極

方三首

脇痛筋傷

橘皮通氣湯 治筋實極則欬欬則兩脇下縮痛甚則痛不可轉動

橘皮

四兩

白朮

石膏各

五兩

細辛

當歸

桂心

茯苓各

二兩

香豉

一升

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

肝勞傷熱則筋實極逆于氣分病在脇下上則欬欬則兩脇下縮痛甚則不可轉側橘皮通氣湯橘皮細辛通氣止欬桂心當歸和營止痛石膏茯苓清熱瀉火香豉白朮開滯行脾以舒罷極之本經曰肝者罷極之本而欬引兩脇下縮痛甚則不可轉動以除

脚痛筋傷

丹參煮散 治筋實極則兩脚下滿滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍

丹參

三兩

芎藭

杜仲

續斷

地骨皮各

二兩

當歸

通草

乾地黃

麥門冬

禹餘粮

麻黃

各一兩

十八

銖

牛膝

二

兩

生薑

切炒取
焦乾

牡蠣

各二兩

甘草

桂心

各一

六銖

牛膝

六

銖

右十七味治下篩為麤散以絹袋子盛散二方寸匕以井花水二升煮數動袋子煮取一升頓服日二。

肝勞傷熱則筋實極逆于血分病在脚下脚滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍丹參煮散丹參芎窮當歸合餘糧本經治血閉別錄通血止痛地骨續斷杜仲堅骨壯筋地黃麥冬牡蠣養肝滋水桂心麻黃生薑升麻散火升陽牛膝通草通關利節又得甘草之緩井花水之和以舒疲極之本而脚下滿痛不得遠行脚心如割斷折以除。

爪黑筋傷

地黃煎

治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿

生地黃汁

三升

生葛汁

生玄參汁

各一大黃

升麻

各二兩

梔子仁

麻黃

犀角

各三兩

石膏

五兩

芍藥

四兩

右十味㕮咀以水七升煮七物取二升去滓下地黃汁煎一兩沸次下葛汁等煎取三升分三服日再。

肝勞傷熱則筋實極逆于血分病在手足爪甲或青或黃或黑四肢筋急煩滿地黃

煎。生地黃。生玄參。汁。生葛。汁。滋液。養筋。麻黃。升麻。石膏。梔子。升陽。散火。犀角。大黃。合
均藥。除煩。消滿。以舒罷極之本。而手足爪甲青黃黑黯。四肢筋急。煩滿。以除

筋虛極方二首

腹痛筋痺

五加酒 治筋虛極。筋痺。好悲思。顏色蒼白。四肢噓吸。腳手拘攣。伸動縮急。腹
中轉痛。

五加皮 一斤 枳刺 二升 大麻仁 三升 猪椒根皮 丹參 各八兩

桂心 當歸 甘草 各三兩

白鮮

通草 各四兩

乾薑 五兩

薏苡仁 半升

芍藥 各五兩

秦椒

右十五味咬咀。以絹袋盛。清酒四斗。漬春夏四日。秋冬六七日。初服六七合。
稍稍加以知為度。

肝勞傷濕。則筋虛極。虛極則痺。病在手脚心腹。好悲思。顏色蒼白。前論陰氣外出。則善悲。
色蒼白。見于目下。四肢噓吸。腳手拘攣。縮急甚。則腹中轉痛。五加酒。五加苡仁。舒筋逐濕。桂
心。猪椒。秦椒。乾薑。天雄。開痺通陽。丹參。芍藥。當歸。行血止痛。通草。枳刺。通關。利節。麻
仁。甘草。滋液。和肝。以舒罷極之本。而好悲思。顏色蒼白。四肢噓吸。腳手拘攣。縮急。腹

中轉痛以除。

腹痛筋絕

人參酒 治筋虛極。則筋不能轉。十指爪皆痛。數轉筋。或交接過度。或病未平復。交接傷氣。內筋絕。舌卷脣青。引卵縮。脈疼急。腹中絞痛。或便欲絕。不能飲食。

人參

防風

茯苓

細辛

秦椒

黃耆

當歸

牛膝

桔梗

半

乾地黃

丹參

薯蕷

鍾乳

礬石

各三

山茱萸

芎藭

各二

白术

麻黃

各二

大棗

十五枚

一升

生薑

切炒

烏麻

碎各二升

右二十二味㕮咀。鍾乳別以小袋子盛。以清酒二升半浸五宿。溫服三合。日再無所聞。隨意增進一本。無烏麻用杜仲。半兩。

肝勞傷精。則筋虛極。虛極則絕。病在舌。脣卵腹。十指爪痛。數轉筋。舌卷。脣青。卵縮。脈疼急甚。則腹中絞痛。欲絕不能飲食。如上法加味。人參酒五加牛膝。舒筋逐濕。麻竅地黃山萸薯蕷烏麻補精養肝。黃耆人參白朮茯苓大棗升陽益胃。以舒罷極之本。而十指爪轉痛筋絕。舌卷脣青卵縮脈疼急。腹中絞痛。欲絕不能飲食亦除。

交接筋攣

方 治交接損卵縮筋攣

燒婦人月經衣灰服方寸匕

交接筋攣。有因肝虛筋極致損。有不因肝虛筋極致損。總以陰陽易病。燒棍散變法治之。

墜搏筋絕

方 治筋絕

熬蟹腦足髓納瘡中

瘡同創言納入筋創傷處筋即續

傷科筋絕祕法不可不傳。見二十四卷備急門。被傷筋絕方。

灸法

勞冷氣逆。腰臍冷痺。脚屈伸難。灸陽蹻一百壯在外踝下容爪。

腰背不便。轉筋急。痺筋攣。灸第二十一椎。隨年壯

轉筋十指筋攣急不得屈伸。灸脚外踝骨上七壯


失精筋攣。陰縮入腹相引痛。灸中封五十壯。在內踝前筋裏宛宛中。

失精筋攣。陰縮入腹相引痛。灸下滿各五十壯。老人加之小兒。隨年壯。又云此二穴

喉腫厥逆。五臟所苦。鼓脹並悉主之。

轉筋。胫骨痛不可忍。灸屈膝下廉橫筋上三壯。

腹脹轉筋。灸脣上一寸二十壯。



堅癥積聚第五

論一
灸法六首 方四十四首

論曰。病有積有聚。何以別之。答曰。積者。陰氣也。聚者。陽氣也。故陰沈而伏。陽浮而動。氣之所積。名曰積。氣之所聚。名曰聚。故積者。五臟之所生。聚者。六腑之所成。故積者。陰氣也。其始發。有常處。其痛。病一作不離其部。上下有所終始。左右有窮處也。聚者。陽氣也。其始發。無根本。上下無所留止。其痛。無常處。謂之聚也。故以是別知積聚也。此節

本難經。與金匱。積者。臟病也。終不移。聚者。腑病也。發作有時。展轉痛移。為可治義同。

經絡受病。入于腸胃。五臟積聚。發伏梁。心之息責。肺之積。肝之肥氣。脾之痞氣。腎之奔豚。腎積。聚之始生。至其已成。奈何。曰。積之始生。得寒乃生。徐氏。四字。乃。成積之總訣。厥止乃成積。以下以

三段義。本內經。

人之善病。腸中積者。何以候之。曰。皮薄而不澤。肉不堅而淖澤。如此則腸胃傷惡。惡則邪氣留止。積聚乃作。腸胃之積。寒溫不次。邪氣稍止。至其蓄積。留止大聚。乃起。由

而聚義。主一串。

病有身體腰脅股筋皆腫。環脅而痛。是謂何病。曰。病名伏梁。此風根也。言由風毒根于中。風之始入。通于肝。肝脉環脅。故環脅而痛。脅為人身之樞。不可動。動之為水溺澇之病。肝脉樞病。則不能旋斡陰陽之氣。故身體脾股筋皆腫。器所生病。為居脅上為逆。素問腹中論。居脅上為逆。居脅下為從。脅上去心臟。漸遺溺閉。瘻。居脅上為逆。近故逆。脅下去心臟。稍遠大小腸膀胱之所部。故從。慎勿動亟奪。王注。言不可移動。但數數去之可矣。其氣溢于大腸。肝脉支者。別貫膈上。注而著。實于肓。肓

之原在臍下。故環臍而痛。

幹南按此節言肝氣之積以肝之積必由氣也舉伏梁心積而肝積可知肺與脾腎之積亦可知矣。

病少腹盛左右上下皆有根者伏梁也

吳注根病之所窮止也。伏梁言如潛伏之橋梁為患深著之名。此與難經論伏梁不同。彼為膿血之聚陽毒也。此裏膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死此下則因陰必下膿血上則迫胃管生

王冰注

當作出

膈

俠胃管內癰

不顯于外

內潰之癰

此久病也難療

幹南按此節言肝血之積以積之成聚必由血也舉伏梁心積而肝積可知肺與脾胃之積亦可知矣。

當作出

膈

俠胃管內癰

不顯于外

內潰之癰

此久病也難療

又按靈樞百病始生篇有曰積之始生得寒乃生厥寒氣乃成積凡積未有不因寒而生者又曰清濕襲虛厥氣傷下脛寒入于腸胃卒多飲食則腸滿過勞用力則絡傷腸滿絡傷則血溢腸外腸外有寒汁沫與血相搏並合凝聚則成積又曰風雨寒暑襲虛厥氣傷上中于津輸若內傷憂怒則氣逆入房汗出則精罷氣逆精罷則血凝蘊裏經中津液因而滯滲留著不去則積成凡積未有不因血而成者至本論所引經文一則曰氣溢于大腸再則曰裏膿血居腸胃之外可見積因寒因血均在經絡及腸胃之外而不在臟明矣凡經所言肝之積心肺腎之積特原其所自生至其所成則由微而著其始積微其後乃聚

故經曰蓄積留止大聚乃起由積而聚義極分明自難經以積為陰氣痛不離其部聚為陽氣痛無常處以積聚分陰陽金匱因之亦以積為臟病終不移聚為腑病痛可移。藥源宗此義亦以積聚分臟腑一若積陰而聚陽積寒而聚熱離積與聚而二之揆之經義轉多出入千金諸方獨出手眼不必分孰為臟孰為腑不必分孰為心積孰為脾肺腎積但以肝積標舉五臟于肝臟虛實門中附入積聚條文以為例誠以肝主發生之氣生氣旺則五臟環周生氣阻則五積留著得溫則順得寒則逆治法大黃連黃芩必與細辛蜀椒桂附互用烏頭狼毒芫花甘遂巴豆蟲蟲蜥蜴蜈蚣斑蝥亦與人參白朮歸地蔴蓉備採寒熱攻補兼施祈盡五臟積聚之變不獨為肝臟一門而設識議實出扁鵲仲景意言之表末第舉堅癥諸雜病而類反之耳。

水飲積聚

方三首

三台丸 治五臟不專指肝寒熱積聚臘脹腸鳴而噫食不生肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘡已愈令不復發食後服五丸飲多者吞十九常服令人大小便調和長肌肉

大黃熟 前胡各二兩
厚朴 附子 細辛 半夏各一兩
消石 藜麩 杏仁各一升半兩

右十味末之蜜和擣五千杵。服如梧子五丸。稍加至十九丸。以知為度。

肝邪留著。由積而聚。陰氣外襲。寒熱。臚脹腸鳴。而噫食不生。肌膚甚者。嘔逆水飲。于經絡三台丸。前胡杏仁。開肺氣。厚朴半夏。茯苓。葶藶逐痰飲。大黃消石。攻熱積附子。破寒積。妙用細辛。別錄破痰利水道益肝膽。辛潤利水道。以達肝邪。寒熱互用。蜜丸緩下。寒熱臚脹腸鳴。噫氣嘔逆止。并可為瘧後。肝邪未盡。及渴飲多者。常服調和之法。

甘遂湯 治暴堅久痞。腹有堅。

甘遂 黃芩 芒消 桂心 細辛各一兩 大黃三兩

右六味㕮咀以水八升。煮取二升半。分三服。

肝邪留著。由積而聚。陽氣內結。暴堅久痞。腹有堅。水飲痼于腸胃。甘遂湯。甘遂泄水飲桂心。通陽氣。黃芩。大黃芒消。瀉痞堅。妙用細辛。辛潤利水道。以達肝邪。寒熱互用。湯取急下。而暴堅久痞。腹有堅。亦除。

陷胸湯 治胸中心下結積。食飲不消。

大黃 桔梗實 黃連各二兩 甘遂一兩

右四味㕮咀以水五升。煮取二升五合。分三服。

肝邪留著。由積而聚。陽氣內結。食飲不消。水飲痼于心胸。陷胸湯仍用甘遂泄水飲。大黃。黃連。瀉痞積變。用桔梗實。開胸膈。潤肺燥。以達肝邪。但寒不熱。湯取急下。而胸

中心結實。飲食不消亦除。

幹南按。水飲積聚三方。首方積聚無形。寒熱嘔逆。邪在少陽治法。寒熱互用丸取緩下。免傷臟氣。二三方積聚有形。暴堅久痞。邪在陽明。腹為陽明。裏部胸為陽明。表部治法。一寒熱互用。一但寒不熱。湯取急下。直達腑邪。首方大柴胡變法。前夏大黃半次方大陷胸變法。甘遂大黃連桔黃芒消三方小陷胸。黃連桔樓實大黃黃連瀉心變法。

具有精義。

痰濕積聚

恒山丸 治肠下邪氣積聚。往來寒熱。如溫瘧。

恒山 蜀漆 白薇 桂心 鮀甲 白术
附子 鱉甲 蟲蟲 貝齒各一兩半 蜇蟲六銖

右十一味末之。蜜丸如梧子。以米汁服五丸。日三。

肝邪留著。由積而聚。陰邪外襲。肠下邪氣往來。寒熱如溫瘧。痰濕阻于血脉。恒山丸白薇桂心散寒熱。恒山蜀漆吐瘧。白术開濕痺。附子破堅積。貝齒鼈甲鮀甲搜肝邪。蟲蟻蟎蟲穿血絡。蜜丸米汁緩下。而肠下積聚往來寒熱。如溫瘧以除。

熨方

蒸鼠壤土熨之。冷即易。腹中切痛。炒鹽半升令焦。納湯中。飲之。大吐瘻。若手

足痛者。燒青布。納小口器中。熏痛處。

鼠性柔而齒剛。善伏而夜動。走肝通絡。功不在貝齒鯀鱉甲二蟲之下。本乎地者親上。取其壤土。以溫熨入肝。瘧邪去。而脇下積聚自散。若猶腹痛。內有痰滯。或宿食。炒鹽吐法。木氣得伸。土氣以平。或移手足。痛走四肢。青布之熏。功在染藍。借大力以清瘀熱。利關節。亦通則不痛之旨耳。第二卷婦人方中心腹痛第四布裹鹽丸。燒作灰酒服之愈可以參用。

痰瘀積聚

方二首

方 治心腹疝。脇下及小腹滿。堅痛。有積寒氣。入腹。使人腹中冷發。甚則上搶。心氣滿。食飲喜嘔。

大黃	茯苓 <small>各一兩半</small>	吳茱萸	桂心	黃芩	細辛	人參
蜀椒	乾薑 <small>各一兩六銖</small>	牡丹	甘草	芍藥	蓴蓉	蠶蟲 <small>各十銖</small>
芍藥	防葵	蟲蟲	厚朴	半夏 <small>各一兩</small>	男髮灰 <small>半兩</small>	

右二十味末之。以蜜丸服如梧子五丸。日再漸加之。

肝邪留著。由積而聚。陰邪外襲。病起脇下及小腹。滿堅痛。自下逆上。入腹搶心。食飲喜嘔。痰瘀滯于血絡。半夏茯苓防葵。開痰濁。大黃厚朴。黃芩牡丹。瀉瘀熱。桂心及乾薑。蜀椒吳萸。攻症瘕。痰瘀。芍藥芍藥髮灰。合蟲蟲蟲蟲。通血絡。從容養腎。精人參甘草。安胃氣。仍妙用細辛。辛潤利水。道以達肝邪。寒熱互用。攻補兼施。蜜丸緩下。而疝瘕脇

下小腹滿痛。入腹搶心。食飲喜嘔。亦除。

神仙度命丸。治久患腹內積聚。大小便不通。氣上搶心。腹中脹滿。逆害飲食。服之甚良。

大黃

芍藥

各二
兩

右二味末之。蜜丸服如梧子。四丸日三。不知可加至六七丸。以知為度。
腹內積聚。氣上搶心。脹滿。逆害飲食。證如前。惟大小便不通為異。神仙度命丸。獨用
芍藥除。痺破堅。經本大黃通瘀。利水穀。經本開大腸。以達肝邪。以攻為補。蜜丸緩下。而
大小便不通。氣上搶心。腹中脹滿。逆害飲食亦除。

勞冷積聚

方二首

五石烏頭丸。治男子女人百病虛弱。勞冷宿寒。久癖及癰瘕。積聚或嘔逆不
下食。并風濕諸病。無不治之者。

鍾乳

鍊

紫石英

硫黃

赤石脂

礬石

枳實

甘草

白朮

紫苑

山茱萸

防風

白薇

桔梗

天雄

皂莢

細辛

旋覆

人參

附子

藜蘆

各一
兩六
銖

乾薑

吳茱萸

蜀椒

桂心

麥門冬

各二
兩半

棗膏

五合

乾地黃

一
兩八
銖

遠志

茯苓

各一
兩半

當歸

二
兩半

棗膏

五合

厚朴

右三十二味末之蜜和擣五千杵酒服如梧子十九日三稍加之。

肝邪留著由積而聚宿寒久癖及癥瘕。嘔逆不下食證如前。惟虛弱勞冷。臟氣久傷。五石烏頭丸。五石通陽破陰。烏頭附子天雄消堅去積。防風白薇祛邪于表。紫菀桔梗。合皂莢藜蘆涌邪于上。厚朴枳實茯苓降逆于下。蜀椒乾薑細辛吳萸溫脾以祛冷。當歸地黃山萸蕤。滋腎以養肝。遠志麥冬補心以益勞。前論肝勞病者參术甘補心氣以益之。參术甘草。崇土以抑木。攻補兼施。蜜丸酒服。通膽氣以達肝邪。而虛弱勞冷宿寒久癖。癥瘕。嘔逆不下食以除。

烏頭丸 治男子女人寒冷腹內積聚。邪氣往來。厥逆。搶心。心痛。痺悶。吐下不止。婦人產後羸瘦。

烏頭

十五枚

吳茱萸

蜀椒

乾薑

桂心

各二兩半

前胡

細辛

人參

芍窮

白朮

各一兩六錢

皂莢

紫菀

白薇

芍藥

各八錢

乾地黃

一兩半

右十五味末之蜜丸酒下。如梧子十九日三稍加之。以知為度。

肝邪留著由積而聚。男子女人寒冷腹內邪氣往來。厥逆。搶心。證如前。惟心痛痺悶。吐下不止。則不僅嘔逆不食。臟氣大傷。烏頭丸。白薇仲景治婦人產後虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸。古中用白薇。

厥痛。人參白朮。益虛羸。仍妙用細辛。潤水道。以達肝邪。攻補兼施。蜜丸酒服。通膽氣。以達肝陽。而寒冷。腹內積聚。厥逆。捨心。心痛。痺悶。吐下不止。及婦人產後羸瘦。亦除。

通治方

方 治萬病積聚

七八月間。收蒺藜子。不限多少。以水煮過熟。取滓暴令乾。搗篩。蜜丸酒服。如梧子七丸。以知為度。其汁煎如飴服之。

蒺藜。本經治惡血。破積聚。藉其清利頭目上行之力。蜜丸酒服。通膽氣。以達肝邪。而萬病積聚亦除。

鬼疰堅癥

方二首

幹南按。巢源。積聚與癥瘕分候。積聚由陰陽不和。腑臟虛弱。風邪搏于腑臟之氣所為。癥瘕由寒熱不調。飲食不化。與臟氣相搏結所生。其病不動者。直名為癥。若病雖有結癥。而可推移者。名為瘕。瘕者假也。謂虛假可動也。病皆在經絡爻。腸胃之外。而不。在。臟。鬼邪蠱毒怪物。均疾。飲食積之所變化而已。

太乙神明臨冰丸 治諸疾。破積聚。心下支滿。寒熱。鬼注長病。欬逆。唾噫。辟除

衆惡殺鬼逐邪氣。鬼擊客忤。中惡胸中結氣。咽中閉塞。有進有退。繞脣惻惻。隨上下。按之挑手。心中悶悶。如有蟲狀。毒注相染滅門。

雄黃油煮一日

丹砂 磬石

當歸 大黃各二兩

芫青五枚

桂心三兩

附子各一兩半

蜈蚣一枚

烏頭八枚

犀角 鬼臼

射罔

黎蘆各一兩

麝香

牛黃

人參各半兩

杏仁四十枚

蜥蜴一枚

斑蝥七枚

樗雞三枚

地膽

三七枚

右二十四味末之蜜和擣三萬杵丸如小豆先食飲服二丸日二不知稍加之以藥二丸安門戶上令衆惡不近傷寒服之無不即瘥若至病家及視病人夜行獨宿服二丸衆惡不敢近

此方與第十六卷尸疰篇方重

鬼疰堅癰。飲邪結于心胸及臍腹。心下支滿。寒熱欬逆。唾噫。胸中結氣。咽塞。繞脣惻痛。上下挑手。心中悶悶。如有蟲狀。非金石通靈獸蟲走竄。卒熱大毒之藥不能深入。經絡。雄黃丹砂。譽石。譽石與礬石功力相反。礬石性寒無毒。本經治腹中堅癖邪氣。殺鬼消癖。真珠。牛黃。犀角。麝香。解毒。開邪。蜈蚣。蜥蜴。芫青。斑貓。樗雞。地膽。穿經入絡。烏頭。射罔。附子。大黃。巴豆。破積攻堅。杏仁。藜蘆。桂心。當歸。通氣活血。人參。扶正抑邪。攻補兼施。蜜丸緩下。開大腸。以達肝邪。仍以二丸安戶上。而心下支滿。寒熱欬逆。唾噫。胸結咽塞。繞脣惻痛。心中悶悶。如有蟲狀亦除。

幹南按鬼擊客忤。皆名中惡。由人精神衰弱。鬼邪之氣所為。當時救療餘氣。停滯心腹。刺痛久後發作。則發為注。亦作瘡即鬼疰。又有風注寒。注氣注生。注涼注酒。注食。注水。注戶。注之不同。亦其類也。

蜥蜴丸 治癰堅水腫。蜚戶遁戶百注戶注。骨血相注。惡氣鬼忤蠱毒。邪氣往來。夢寐存亡。留飲結積。虎狼所噬。猢犬咬鳩。毒入人五臟。服藥已消殺其毒。食不消。婦人邪鬼忤。亦能遣之。

蜥蜴

二枚枝

蜈蚣

二枚枝

地膽

枝五十

鱉蟲

杏仁

各三枚

蟠螭

枝十四枚

蟲蟲

枝三十

朴消

一兩八銖

澤漆

桃奴

犀角

鬼督郵

桑赤雞

各八枚十銖

芍藥

虎骨

各一兩半

甘草

一兩八銖

巴豆

一兩八銖

欵冬

花十八銖

甘遂

一兩六銖

乾薑

一兩

右二十味末之。別治巴豆杏仁如膏。納藥末研調下蜜。擣二萬杵。丸如麻子。先食飲服三丸日一。不知加之。不敢吐下者。一丸日一服。有人風冷注癖堅。二十年者得瘥。此方與第十六卷尸疰篇方重。

鬼疰堅癰。飲邪注于骨血。及神魂惡氣。鬼忤蠱毒。邪氣往來。夢寐存亡。留飲結積。虎狼猢犬鳩毒所傷。非獸蟲走竄。及卒熱大毒之藥。不能深入經絡。蜥蜴丸。虎骨犀角。鬼督郵。桃奴。殺鬼驅邪。杏仁欬冬。乾薑合甘遂。澤漆。本經。澤漆治大腹水氣。開痰泄飲。巴豆破

積。攻堅。蜥蜴。利水道。治五癰邪結。氣蠶。蛇。穿經入絡。芍藥
甘草。調木平肝。攻補兼施。蜜丸緩吐。及下。開腸胃。以達肝邪。而惡氣鬼忤。蠱毒。邪氣
往來。夢寤存亡。留飲結積。虎狼獵犬鳩毒所傷亦除。

陰毒堅癥

方三首

大五明狼毒丸 治堅癥。痞在人胸。脇或在心腹。

狼毒 乾地黃 各四兩

附子

大黃

人參

當歸各一兩

半夏二兩

乾薑

桂心

細辛

五味子

蜀椒

蕓茹各一兩

芫花

莽草

厚朴

防己

各半兩

巴豆四十枚

旋復花半兩

杏仁三十枚

右二十一味末之。蜜和服如梧子二丸。日二夜一。以知為度。

陰毒堅癥。飲邪結于胸脇。及心腹。非辛熱大毒之藥不能深入腸胃。大五明狼毒丸。
桂心。蜀椒。乾薑。五味子。通陽泄飲。杏仁。旋復半夏。厚朴。芫花。防己。降肺開痰。狼毒。莽
草。附子。大黃。巴豆。瀉毒破積。蕓茹。當歸。地黃。從容通血。養陰。人參。崇土抑木。攻補兼
施。蜜丸緩下。開大腸以達肝邪。而堅癥痞在人胸。脇或心腹亦除。

小狼毒丸 治病與前同方

狼毒 三兩

旋復花 附子 半夏 白附子 蘓茹

各二兩

右六味末之蜜和擣五千杵。飲服如梧子三丸。加至十九日三。肘後方。無半夏白附子。簡茹。

陰毒堅癥。飲邪結于胸腹。及心腹。非辛熱大毒之藥。不能深入腑裏。小狼毒丸。前方但取旋覆半夏。降飲開痰。狼毒附子。攻毒破積。簡茹白附。通血宣痺。以攻為補。蜜丸甘緩。而堅癖痞在人胸腹。及心腹亦除。

狼毒丸 治堅癖。

狼毒五兩 半夏 杏仁各三兩 桂心四兩 附子 蜀椒 細辛各二兩

右七味末之。別搗杏仁。蜜和飲服如大豆二丸。

陰毒堅癥。飲邪結于胸腹。及心腹。非辛熱大毒之藥。不能深入腑裏。狼毒丸。前方加味。但取半夏。泄飲開痰。狼毒附子。攻毒破積。桂心。簡茹。通血宣痺。功用細辛。潤利水道。以達肝邪。以攻為補。蜜丸甘緩。而堅癖痞在人胸腹。及心腹亦除。

濕熱堅癥 方二首

方 治堅癖。心下有物。大如杯。不得食。食則腹滿。心腹絞痛。

草慈子 大黃各二兩 澤漆四兩

右三味末之。別研草慈為膏。下二味擣五百杵。入蜜更擣千杵。服如梧子五丸。不知加之。日三服。

濕熱堅癥。水氣壅于心下及腹。心下有物大如杯。不得食。食則腹滿。心腹絞痛。草薙本經治癥瘕積聚結氣。飲食寒熱利水道。澤漆本經治大利氣結。大黃通血閉。開大腸以達肝邪。以攻為補。蜜丸緩下。猶水飲積聚三台丸。草薙杏仁合大黃之法。然彼佐附子細辛。寒熱互用。此但寒不熱為略異耳。

方 治腹中積癥。

草薙子一升。熬酒五升。浸七日。服三合。日三。

腹中積癥。病情不在心下而在腹。而在心胸。此方去澤漆大黃。專任草薙瀉肺。利氣結。酒浸溫行。不走大腸而走小腸。必濁分清。水氣除而腹中積癥自愈。

帶下堅癥 方二首

消石大丸 治十二癥瘕。

婦人帶下三十六疾。有十二瘕。所下之物。一如膏。二如青血。三如紫汁。四如赤皮。五如膿痂。六如豆汁。七

如葵根羹。八如凝血。九如青血。血似水。十

如米汁。十一如月浣。十二經度不應期也。及婦人帶下絕產無子。並欲服寒

食散即五石散。凡服五石藥俱冷食。故名。

而腹中有癥瘕實者。當先服大丸下之。乃服寒食

散大丸。不下水穀。但下病耳。不令人困也。

第一卷婦人方上。名消食大黃丸。

消石六兩朴消亦得

大黃八兩

人參

甘草各二

右四味末之。以三年苦酒三升置銅器中。以竹筋柱器中。一升作一刻。凡三

升作三刻。以置火上。先納大黃。常攬不息。使微沸盡一刻。乃納餘藥。又盡一刻。有餘一刻。極微火。使可丸。如雞子中黃。欲合藥。當先齋戒一宿。勿令小兒女人。奴婢等見之。欲下病者。用二丸。若不能服大丸者。可分作小丸。不可過四丸也。欲令大。不欲令細。能不分為善。若人羸者。可少食。强者。不須食。二十日五度服。其和調半日乃下。若婦人服之下者。或如雞肝。或如米汁。正赤黑。或一升。或三升。下後慎風冷。作一杯粥食之。然後作羹。臘自養。如產婦法。六月則有子。禁生魚。猪肉。辛菜。若寒食散者。自如藥法。不與此同日一服。

帶下。堅癩。瘀熱結于子臟。絕產無子。腹中有癥瘕實者。消石大丸。消石大黃。瀉瘀實。人參甘草。益臟虛。攻補兼施。苦酒熬丸。緩下。味酸達肝。約入病所。而帶下無子。腹中
有癥瘕實以除。

土瓜丸 治諸臟寒。氣積聚。煩滿。熱飲食中。蠱毒。或食生物。及水中蠱卵。生入腹而成蟲蛇。若為魚鱉。留飲宿食。婦人產。瘕。帶下。百病。陰陽不通利。大小便不節。絕傷。墮落寒熱。交結。脣口焦黑。身體消瘦。嗜卧少食。多癰。產乳胞中。餘疾。股裏。熱心。腹中急結。痛引陰中。

土瓜根 末
桔梗 末各半升
大黃 一斤蒸二升
杏仁 一升
右四味末之。蜜丸如梧子。空服飲服三丸。日三。不知加之。以知為度。

帶下。堅癰癩瘍。熱結于子臟寒氣煩滿熱飲食蠱毒留飲宿食。產瘕百病。或為產乳胞中餘疾。土瓜丸變上法。大黃佐土瓜根本經開邪。鴉瘻實。杏仁合桔梗。本經治胸脇氣熱結。

痛如刀刺。鴉瘻實。杏仁合桔梗。

開痛結。易苦酒之煮而為升米之蒸。以攻為補。蜜丸緩下。猶濕熱堅癰方。蓼蕪澤漆合大黃之法。而寒氣煩滿熱飲食蠱毒留飲宿食。產瘕百病。或為產乳胞中餘疾亦除。

通治方

方 治卒暴癰

取商陸根搗碎蒸之。以新布藉腹上。以藥鋪著布上。以衣物覆其上。冷復易之。數日用之。旦夕勿息。

又方

蒜十片。取五月五日戶上者去皮。桂一寸。大一小枝。竈中黃土如雞子。

右三味合搗以酵苦酒和塗布上。以掩病處。不過三日消。凡蒜亦佳。肘後方。不用桂。

野葛膏 治暴癰

野葛一尺。當歸附子雄黃油煮一日。

細辛各一兩。烏頭二兩。巴豆一百粒。蜀椒半兩。

右八味咬咀。以大醋浸一宿。猪膏二斤煎附子色黃去滓。納雄黃粉攬至凝。傅布上以掩癰上。復以油重布上。復安十重紙以熨斗盛火著上。常令熱日。

三夜二須膏乾益良。

徐洄溪謂積病最宜外治癥病何獨不然。

宿食堅癥

方十一首

方 治卒暴癥。腹中有物堅如石。痛如斫刺。晝夜啼呼。不治百日必死。

牛膝二斤㕮咀。暴之令乾。以酒一斗浸之。密塞器口。煎取半升。一服便吐去。

宿食神效。

宿食堅癥。氣血壅于腸胃。腹中有物堅如石。痛如斫刺。晝夜啼呼。僅與鹽湯探吐。前見
瘻食積聚鼠壤土熨法。反下方。無濟。重用牛膝。本經逐血氣利大小腸。止癥瘕。心腹諸痛。性本下行。借酒力。以上涌。一吐而氣血通。宿食去。腹中有物堅痛亦除。

方 治雜中食瘀實不消。心腹堅痛者。

以水三升。煮白鹽一升。令消分三服。刺吐去食也。並治暴癥。

上方宿食不消。腹石堅痛。却不治宿食。而治血氣。此方瘀實不消。心腹堅痛。却不治血氣。而治宿食。蓋彼因血氣之多滯。致宿食之不消。此因宿食之不消。致瘀實之不去。牛膝不吐。必藉酒力以上行。白鹽本吐。更借刺法以上涌。吐雖同。而所以吐者不同。非神明於藥者。孰能知之。

方 治卒食不消。欲成癥積。

煎父汁如飴。取半升一服之。便刺吐去宿食。神良。古今錄驗方。白父五尺圍。
束。慧以根。一大把。二味。

方 治凡所食不消。

取其餘類燒作末。酒服方寸匕。便吐去宿食。即瘥。有食桃不消作病者。以時無桃就樹間得槁桃燒服之。登時吐病出甚良。

方 治少腹堅大。如盤。胸中脹。食不消。婦人瘦瘠者。

煖水服髮灰一方寸匕。日再服。并灸肋端。

又方

飲服上好麴末方寸匕。日三。瘥。又灸三焦輸。隨年壯。

方 治髮癥。由人因食而入。久即胸間如有蟲。上下來去。惟欲飲油。一日之中乃至三二升。不欲飲食者。

油一升。以香澤煎之。大鑊勞貯之。安病人頭邊。令口鼻臨油上。勿令得飲。傅鼻面令有香氣。當叫喚取飲。不得與之。心當瘦極大睡。其髮癥從口出飲油。人專守視之。并置石灰一裏。見癥出。以灰粉手捉癥抽出。須臾抽盡。即是髮也。初從腹中出。形如不流水中濃菜。隨髮長短。形亦如之。

又方

酒三升。煮猪脂二升。三沸。一服一升。日二。白馬尿服之亦佳。無馬。白牛亦得。
髮喜油。但與喫不。與飲以引之。或白馬尿以殺之。引之不出。猪膏酒以化之。

方 治米癥。常欲食米。若不得米。則胸中清水出。

雞屎一升 白米五合

右二味合炒。令米焦。擣末。以水二升頓服。取盡。須臾吐出。病如研米。若無米。當出痰。永憎米。不復食。

方 治肉癥。思肉。不已。食訖。復思者。

空腹飲白馬屎三升。吐肉出。肉不出必死。

方 治食魚肉等成癥。結在腹內。并諸毒氣。

狗屎五升燒末。綿裹之。以酒一斗浸再宿。濾取清。分十服。日三服。三日使盡。隨所食癥結。即便出矣。

蟲毒堅癥右二首

方 治伏梁氣。

白馬屎。銅器中盛取。每旦服一升。

方 治癰。瘕。

槲樹白皮煎。令可丸。服之。取知。病動若下。減之。
槲皮散。治蟲。取其苦澀。以化積毒。

怪病堅癥 方九首

大黃湯 治蛇癥。

大黃

茯苓

各半兩
本作黃芩

烏賊骨

二枚

皂莢

六枚

如指大指者
甘草一尺

芒消

一枚

猪牙者

甘草者

一尺

大黃

如指大指者

芒消

一枚

大黃

如指大指者

芒消

一枚

右六味㕮咀以水六升煮三沸去滓納消適寒溫盡服之十日一劑作如上法欲服之宿無食平旦服當下病根也。

方 治蛇癥。

白馬尾切長五分以酒服方寸匕大者自出更服二分者一方寸匕中者亦出更服三分者一方寸匕小者復出不可頓作一服殺人馬尾一本作馬毛

方 治鱉癥腹堅硬腫起大如盤睡卧不得。

取藍一斤擣水三升絞取汁服一升日二。

又方

蘆葫根白皮一握研取汁以水和頓服之。

又方

白馬屎一升雞子三枚取白合煎取二合空腹頓服之不移時當吐病出

方 治食中得病為鱉癥在心下堅強。

雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸更取半擣為末以所浸酒服方寸匕

日二三日中作一劑。

方 治患癥結病及瓜病。形似瓜形。日月形。或在臍左右。或在臍上下。若鰲在左右肋下。或當心如合子。復有手腳治之法。先針其足。之足以椒熨之。

取一新盆子。受一斗者。盆底鑽一百二十孔。孔上著椒三合。上著一重紙。紙上著冷灰一升。灰上著熱灰半升。上著剛炭火一斤。經一食頃。盆底熱徹。當病上初安。一重即安。火盆大熱。以漸更加一重。若火更熱不可忍。加至三重。暫歇。一口冷飲。還上火消二分許。即停。經三日勿著。及至七日。決得頓瘥。然後食美食自補。若小不瘥。作露宿丸服之。方在第十五卷中。按方見第十五

捲胃腑門。瘤冷積熱第八。主寒冷百病。用碧石桂心乾薑附子。

方 治蛟龍病。

開皇六年三月八日。有人食芹得之。其人病發。似癩癪。面色青黃。因食寒。食餳過多。便吐出蛟龍。有頭及尾。從茲有人患此疾。令服寒食餳三斗。大驗。

方 山野有人噉蟲。在腹生長為蟲癩病。治之。

故敗篋子一枚 故敗梳一枚

右二物各破為兩分。各取一分燒為末。又取一分。以水五升煮取一升。以服前燒末。頓服。斯須出矣。

灸法

心下堅積聚。冷脹。灸上管百壯。三報之。穴在巨闕下一寸許。

積聚堅大如盤。冷脹。灸胃管二百壯。三報之。穴在巨闕下二寸。

積聚堅滿。灸脾募百壯。穴在章門季肋端。

久冷及婦人癥瘕。腸鳴泄利。繞臍絞痛。灸天樞百壯。三報之。萬勿針。穴在俠臍兩邊各二寸。

癥瘕。灸內踝後宛宛中。隨年壯。又灸氣海百壯。