特 7
9
493

本草匯

伊藤大八郎記

陰陽表裏虛實忌宜藥　共十
臟腑虛實門忌宜藥
小兒門忌宜藥
婦人
六淫門
雜症門忌宜藥

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493

ガラス使用

特7-493

堀氏文庫

本草滙卷三目次

藏府虛實標本用藥式
引經報使藥
諸病忌藥
陰陽表裏虛實忌宜藥
陽虛　陰虛
表虛　裏虛
陽實　陰實
表實　裏實
陽厥　陰厥

堀氏文庫

国立国会図書館　タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

上盛下虛

藏府虛門忌宜藥

心虛八證　肝虛十證

脾虛十二證　肺虛七證

腎虛十七證　命門虛四證

膽虛二證　胃虛七證

膀胱虛三證　三焦虛二證

本草滙卷三

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男　樹畦馨阡

姪　維均梅在　參閱

紫藤陳陸坤白筆校訂

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木膽火寄于中主血主目主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇嘔血小腹痾痛疾（音賢）瘕（音加）女人經病標病寒熱瘧頭

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

痛吐涎目赤面青多怒耳閉頰腫筋攣卵縮丈夫癪疝女人少腹腫痛陰病
有餘瀉之

瀉子　甘草　行氣　香附　芍藥　瞿麥　牽牛　青皮
行血　紅花　鼈甲　桃仁　莪蓯　三稜　山甲
大黃　水蛭　蛀虫　蘇木　丹皮
鎮驚　雄黃　金箔　代赭　真珠　夜明砂　胡粉
石決明　銀箔　鉛丹　龍骨　鐵落

搜風　羌活　荆芥　薄荷　槐子　蔓荆　白花蛇
白附子　烏頭　獨活　防風　皂莢　殭蠶
蟬蜕
不足補之

補母　枸杞　杜仲　熟地　苦參　革薤　阿膠
狗脊　兔絲子
補血　當歸　牛膝　續斷　白芍　沒藥　川芎
補氣　天麻　白朮　栢仁　菊花　細辛　蜜蒙花
穀精草　決明　生姜

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

本熱寒之　瀉木芍藥　烏梅　澤瀉　瀉火黃連　黃芩　苦荼　膽草　猪膽　攻裏大黃　標熱發之　和解柴胡　半夏　解肌桂枝　麻黃　心藏神爲君火包絡爲相火代君行令主血主言主汗主笑本病諸熱瞀音茂目不明癒音熾引縱曰瘈同驚惑譫妄煩亂啼笑罵詈怔忡健忘自汗諸痛痒瘡瘍〔標病〕肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心煩熱胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂

火實瀉之　瀉子黃連　大黃　氣甘草　人參　赤苓　木通　黃蘗　血丹參　丹皮　生地　玄參　鎮驚硃砂　牛黃　紫石英　神虛補之

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

補母　細辛　烏梅　棗仁　生姜　陳皮
氣　桂心　澤瀉　茯苓　茯神　遠志　石菖蒲
血　當歸　乳香　熟地　沒藥
本熱寒之
瀉火　黃芩　竹葉　麥冬　芒硝　炒鹽
涼血　地黃　梔子　天竺黃
標熱發之
散火　甘草　獨活　麻黃　柴胡　龍腦
脾藏智屬土爲萬物之母主榮衛主味主肌肉主四肢本病諸濕腫脹痞滿噫氣大小便閉黃疸痰飲吐瀉霍亂心腹痛飲食不化標病身體附腫重困嗜卧四肢不舉舌本強痛足大指不用九竅不通諸痙項強

土實瀉之
瀉子　訶子　防風　桑皮　常山　瓜蒂　礬金
吐豆豉　藜蘆　苦茶　苦參　鹽湯　赤小豆
下大黃　芒硝　大戟　甘遂　芫花　續隨子
藜蘆　蘿蔔子　梔子　葶藶

礞石

土虛補之

補母桂心 茯苓

氣人參 黃芪 升麻 葛根 甘草 陳皮 藿香 蔻 薤 縮砂 木香 扁豆

血白朮 蒼朮 白芍 膠飴 大棗 乾姜 木瓜 烏梅 蜂蜜

本濕除之

燥中宮白朮 蒼朮 橘皮 半夏 南星 吳茱萸 黃 草豆蔻 白芥子

潔淨府木通 赤茯苓 豬苓 藿香

標濕滲之

開鬼門葛根 蒼朮 麻黃 獨活

肺藏魄屬金總攝一身元氣主聞主哭主皮毛本病諸氣臌鬱諸痿喘嘔氣短欬嗽上逆欬唾膿血不得臥小便數而欠遺失不禁標病洒洒漸惡寒熱傷風自汗肩背痛冷腸音撓臂前廉痛

氣實瀉之

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

瀉子 澤瀉 葶藶 桑皮 地骨皮
除濕 半夏 茯苓 苡仁 木瓜 橘皮 白礬
瀉火 粳米 石膏 知母 訶子 寒水石
通滯 枳殼 薄荷 木香 厚朴 杏仁 皂莢
桔梗 乾生姜 蘇梗
氣虛補之
補母 甘草 人參 升麻 黃芪 山藥
潤燥 蛤蚧 阿膠 門冬 貝母 百合 天冬
天花粉

斂肺 烏梅 粟殼 芍藥 五味 五倍
本熱清之
清金 黃芩 知母 麥冬 梔子 沙參 紫菀
天冬
本寒溫之
溫肺 丁香 藿香 款冬 檀香 益智 白蔻
縮砂 糯米 百部
標寒散之
解表 麻黃 葱白 紫蘇

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

腎藏志。屬水。爲天一之源。主聽。主骨。主二陰。本病諸寒厥逆。骨痿。腰痛。腰冷如冰。足胕音杭腫寒。少腹滿急痂痕。音加大便閉泄。吐利腥穢。水液澄徹清冷。不禁。消渴引飲。標病發熱不惡熱。頭眩。頭痛。咽痛。舌燥。脊股後廉痛。

水强瀉之

瀉子 大戟 牽牛

瀉腑澤瀉 豬苓 車前 防己 茯苓

水弱補之

補母人參 山藥

氣知母 玄參 砂仁 苦參 補骨脂

血黃柏 枸杞 熟地 鎖陽 蓯蓉 五味子

山萸 阿膠

本熱攻之

下傷寒少陰證。口燥咽乾。大承氣湯

本寒溫之

溫裏附子 乾姜 官桂 蜀椒 白朮

標寒解之

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

解表　麻黄　細辛　獨活　桂枝
標熱涼之　清熱　玄參　連翹　甘草　猪膚
命門爲相火之原。天地之始。藏精生血。降則爲鉛。主三焦元氣。本病前後癰閉。氣逆裏急。痂痛。奔豚。消渴。膏淋。精漏精寒。赤白濁。溺血。崩中。帶漏。
火强瀉之　瀉相火　黄柏　知母　丹皮　生地　茯苓　玄參　地骨皮

火弱補之　益陽　附子　肉桂　益智　沉香　烏藥　硫黄　胡桃　破故紙　巴戟　當歸　蛤蚧　覆盆　茴香　川烏　天雄　陽起石　丹砂
精脫固之　澀滑　牡蠣　芡實　五味　遠志　山萸　蛤粉　金櫻子
三焦爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五臟六腑。營衛經絡。內外。上下。左右。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

之氣號中清之府上主納下主出〔本病〕諸熱瞀
瘛暴病暴厥暴痛躁擾狂越譫妄驚駭諸血溢血泄
諸氣逆衝上諸瘡瘍痘疹瘤核上熱則喘滿諸嘔吐
酸胸痞脇痛食飲不消頭上出汗中熱則善飢而瘦
解㑊痿病尸厥緩濇中滿諸脹腹大諸病有聲鼓之如鼓上
下關格不通霍亂吐利下趐熱則暴注下迫水液渾濁
下部腫滿小便淋瀝或不通大便閉結下痢上寒則
吐飲食痰水胸痺前後引痛食已還出中寒則飲食
不化寒脹反胃吐水濕瀉不渴下寒則二便不禁臍

腹冷疝痛〔標病〕惡寒戰慄如喪神守耳鳴耳聾嗌腫
喉痺諸病胕腫痰酸驚駭手小指次指不用
實火瀉之
〔汗〕麻黃 柴胡 葛根 荊芥 升麻 薄荷 羌
活 石膏
〔吐〕瓜蒂 淡鹽 藘汁
〔下〕大黃 芒硝
虛火補之
〔上〕人參 天雄 桂心

〔中〕人參　黃芪　丁香　木香　草果
〔下〕附子　桂心　硫黃　人參　烏藥　破故紙　沉香
本熱寒之
〔上〕黃芩　連翹　梔子　知母　玄參　生地　石膏
〔中〕黃連　連翹　生地　石膏
〔下〕黃蘗　知母　生地　石膏　丹皮　地骨皮
標熱散之

解表〔柴胡　細辛　荆芥　羌活　葛根　石膏
膽屬木。爲少陽相火。發生萬物。爲決斷之官。十一臟之主。（主同肝）〔本病〕口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。〔標病〕寒熱往來。痞瘧。胸脇痛。頭額痛。耳痛。鳴。瘰癧。結核。馬刀。足小指次指不用
實火瀉之〕
瀉膽〔龍膽　牛膝　猪膽
連　苦茶
虛火補之〕
本草匯　卷三　用藥式　膽　胃　十　海花閣

溫膽人參 細辛 半夏 炒棘仁 炒棗仁 當歸 地黃

本熱平之

降火黃芩 黃連 芍藥 連翹 甘草

鎮驚黑鉛 水銀

標熱和之

和解柴胡 芍藥 黃芩 半夏 甘草

胃屬土主容受爲水穀之海主同脾本病噎膈反胃中滿腫脹嘔吐瀉利霍亂腹痛消中善飢不消食傷飲食胃管當心痛支兩脇標病發熱蒸蒸身前熱身前寒發狂譫語咽痺上齒痛口眼喎斜鼻痛齲齦赤瘡

胃實瀉之

濕熱大黃 芒硝

飲食巴豆 神曲 山查 阿魏 三稜 硇砂

鬱金 輕粉

胃虛補之

濕熱蒼朮 白朮 半夏 茯苓 橘皮 生姜

寒濕乾姜 附子 官桂 丁香 肉蔻 草菓

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

人參　黃芪
本熱寒之
降火石膏　地黃　犀角　黃連
標熱解之
解肌升麻　葛根　豆豉
大腸屬金主變化爲傳送之官本病大便閉結泄痢
下血裏急後重痘痔脫肛腸鳴而痛標病齒痛喉痺
頸腫口乾咽中如核鼽衄目黃手大指次指痛宿食
發熱寒慄

腸實瀉之
熱大黃　芒硝　桃花　牽牛　巴豆　郁李仁
石膏
氣枳殼　木香　橘皮　檳榔
腸虛補之
氣皂莢
燥桃仁　麻仁　杏仁　地黃　松子　當歸　蓯
蓉
濕白朮　蒼朮　半夏　硫黃

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

陷升麻 葛根
脫龍骨 曰堊 訶子 粟殼 烏梅 白礬 赤石脂 石榴皮 禹餘糧
本熱寒之
清熱秦艽 槐角 地黃 黃芩
本寒溫之
溫裏乾姜 附子 肉豆蔻
標熱散之
解肌石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀爲受盛之官本病大便水穀利小便短小便閉小便血小便自利大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止標病身熱惡寒噎痛頷(音舍)腫口糜耳聾

實熱瀉之

氣木通 猪苓 滑石 瞿麥 澤瀉 燈草
血地黃 蒲黃 赤苓 丹皮 梔子

虛寒補之

氣白朮 棟實 茴香 砂仁 神曲 扁豆

血桂心　玄胡索

本熱寒之

降火　黃柏　黃芩　黃連　連翹　梔子

標熱散之

解肌　蘗本　羌活　防風　蔓荊

膀胱主津液爲胞之腑氣化乃能出號州都之官諸病皆干之本病小便淋瀝或短數或黃赤或遺失或氣痛標病發熱惡寒頭痛腰脊强鼻窒足小指不用實熱瀉之

泄火　滑石　猪苓　澤瀉　茯苓

下虛補之

熱黃蘗　知母

寒桔梗　升麻　益智　烏藥　山茱萸

本熱利之

降火　地黃　梔子　茵蔯　黃柏　牡丹皮　地骨皮

標寒發之

發表　麻黃　桂枝　羌活　蒼术　防巳　黃芪

木賊
引經報使

手少陰心 黃連 細辛
手太陽小腸 藁本 黃蘗
足少陰腎 獨活 桂 知母
足太陽膀胱 羌活 黃蘗 下
手太陰肺 桔梗 升麻 葱白
手陽明大腸 白芷 升麻 石膏
足太陰脾 升麻 蒼朮 葛根 白芍

足陽明胃 白芷 升麻 葛根 石膏 下
手厥陰心主 柴胡 丹皮
足少陽膽 柴胡 青皮
足厥陰肝 青皮 川芎 柴胡 吳茱萸
手少陽三焦 連翹 柴胡 上地骨 中青皮 下
附子 已上俱綱目

○諸病忌宜藥每條備列不勝其繁今將應忌者各分門類總列于前凡遇證所忌一查瞭然宜者則不厭詳載云

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

補氣　人參　黃耆　白朮　人胞　紅鉛
温補　人胞　紅鉛　狗陰莖　鹿茸　兔絲子　蛇牀子　巴戟天　人參　黃耆　白朮　淫羊藿
肉蓯蓉　補骨脂　當歸
大熱　附子　肉桂　仙茅　陽起石　烏頭　海狗腎　羊肉　雀肉　天雄　葫蘆芭　硫黃
破氣　青皮　枳實　枳殼　檳榔　厚朴　牽牛
閉氣　銀杏　白朮　黃耆　米麵食　豬脂油
降氣　降眞香　蘇子　鬱金　枇杷葉　橘紅　沉香　烏藥

破血　桃仁　紅花　蘇木　延胡索　乾漆　五靈脂　花蘁石　乳香　沒藥　薑黃　三稜　蓬茂　肉桂　桃梟　蠐虫　穿山甲　麒麟竭
升提發散　升麻　柴胡　川芎　紫蘇　麻黃　乾葛　羌活　獨活　防風　白芷　生姜　細辛　荆芥　前胡　藁本　葱白　薄荷
辛温辛熱發散　吳茱萸　乾姜　桂枝　麻黃　細辛　羌活　獨活　防風　藁本　葱白　川芎

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

白芷

吐瓜蒂　梔子　豉　皂莢　藜蘆　常山　蝦汁
人參蘆　鹽湯

下大黃　芒硝　巴豆　牽牛　玄明粉　厚朴
枳實

降泄山梔　知母　天門冬　瞿麥　車前子　烏桕
利水豬苓　澤瀉　木通　滑石　琥珀　芫花　甘
根皮　海金沙　商陸　茯苓　防己　郁李仁　葶藶
遂　大戟　續隨子　漢

損精液　郁李仁　白礬　半夏

斂攝白芍　五味　醋　烏梅　白梅　棗仁
固澁龍骨　牡蠣　粟殼　訶黎勒　益智子　山
茱萸　桑螵蛸　蛇牀子　肉果　蓮鬚　金櫻子
原蠶蛾

消導山查　麥芽　草果　檳榔　三稜　蓬莪
神曲　枳殼　枳實　綠礬　萊菔子　紅曲　橘
紅　砂仁

開竅 龍腦香 麝香 蘇合香 檀 安息香
辛燥 火酒 蒜 半夏 南星 二术
香燥 沉香 麝香 龍腦 縮砂蜜 豆蔻 藿香
香附 丁香 烏藥 木香
辛熱 乾姜 吳茱萸 胡椒 荜茇 蒜 茴香 生姜
巴豆 龍腦
濕潤 地黃 當歸 肉蓯蓉 天門冬 知母 猪
脂油 麻仁 栝樓仁
滯膩 猪羊犬肉 鵝 地黃 南麵 油膩 炙煿

滑利 冬葵子 榆皮 牛乳 椿根白皮 柿 瓜
李 桃 梨 蜜 青菜 蓴菜 酥 茄子
發濕 鱖魚 南麵
苦寒傷胃 山梔 黃柏 黃芩 黃連 大黃 苦
參 玄參 知母 蘆薈
補命門相火 鹿茸 巴戟天 附子 人胞 肉桂
仙茅 陽起石 腽肭臍 淫羊藿 補骨脂
狗陰莖 兔絲子 晚蠶蛾 玄參 知母
補腎水苦寒 黃柏 天門冬 海花鎮

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

酸寒 白芍　牛膝　烏梅　秋石

鹹寒 童便　芦硝　玄參

生冷 菱　梨　菜　李　蜜

甘 甘草　飴糖　大棗　密

鹹 食鹽　商陸　城水　鹿茸　蛤蜊　蠣黃　蟶

陰陽表裏虛實

陽虛 即眞氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡陽虛不發熱單惡寒者居多忌破氣降滯利水苦寒及辛熱發散之藥宜補甘溫熱　人參　黃耆

二术　炙草　當歸　淫羊藿　人胞　補骨脂　巴戟天　桂　附子　仙茅　鹿茸　大蘘香　羊肉　雀肉　陽起石

陰虛 即精血虛其證爲欬嗽多痰吐血咯血嗽血鼻衄齒衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無力不眠氣急腰背痛忌補氣復忌破氣燥熱辛溫及大寒大苦傷胃并升提發散利水之藥宜生精補血兼清虛熱斂攝酸寒甘寒甘平鹹寒暑兼苦寒　地黃　栢子仁　人乳　沙苑蒺藜　枸杞　牛膝　麋膠

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

阿膠　沙參　棗仁　芍藥　五味　山萸　石斛　麥冬　山藥　丹皮　續斷　地骨皮　車前子　鼈甲　黃栢　知母　青蒿　溺白堊（音佐。澤垢也。）

表虛　其證自汗。惡風。洒淅寒熱。喜就溫煖。脉浮無力。忌破氣。升發。辛熱之藥。（表虛而中寒者。不忌辛熱。）宜補斂。益氣實表。甘酸。人參　黃芪　芍藥　甘草　桂枝　大棗　糯米　炙草　大棗　糯米　飴糖　（有熱者勿用）　五味子

裏虛　其證。洞泄。或完穀不化。心腹痛。按之即止。或腹脹。或傷寒下後痞滿。忌破氣下。若寒之藥。宜溫補甘佐以辛熱。人參　术　炙草　大棗　糯米　肉桂　附子（有熱者勿用）　乾姜

陽實　即表邪熱盛。其證。頭痛。寒熱。遍身骨痛。無汗。忌補斂。下。大熱之藥。宜辛寒。發散。天寒。暑加辛熱。辛溫。佐之　石膏　知母　葛根　麥冬　前胡　柴胡　黃芩　紫蘇　薄荷　升麻　防風　葱白　荆芥　羌活　麻黃（冬月可用。春夏忌之。）

陰實　即裏實。外感證。屬邪熱內結者。其證。胸腹鞕（同硬）痛。手不可近。大便七八日不行。或挾熱下痢。忌辛

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　　ガラス使用

溫發散補斂之藥。宜下。苦寒鹹寒甘辛。大黃
厚朴　枳實　滑石　山梔　黃芩　黃連　茵蔯
芒硝　桃仁

陽厥　即熱厥。其證四肢厥逆。身熱面赤。唇燥大渴。口苦苦。目閉或不閉。小便赤澀短少。大便燥結不省事。忌升發補斂燥熱辛溫之藥。宜下。清熱甘苦寒鹹寒。大黃　芒硝　石膏　黃芩　黃連
山梔　知母　童便　如挾虛有痰。宜　麥冬
瀝　蘆根汁　梨汁　童便　如婦人熱入血室。

因而厥者。以童便爲君。加　赤芍　生地　牛膝
丹皮　桃仁　甚者大便結燥加　芒硝　大黃
通即止。勿盡劑。

陰厥　即寒厥。其證四肢厥逆。身冷面青。蹉卧。手指爪青黯。腹痛大便溏。或完穀不化。小便自利。不渴。不省人事。忌下。破氣苦寒鹹寒酸寒之藥。宜補氣溫中。甘溫辛熱。　人參　乾姜　附子　桂　吳茱萸

上盛下虛　屬陽盛陰虛。忌升散下。助陽補氣及破氣燥熱辛之藥。宜降。益陰。甘寒酸寒佐以鹹寒。苦

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

寒。蘇子　枇杷葉　麥冬　枸杞　生地　沙參
白芍　山萸　五味　牛膝　童便　玄參　黃
蘗　天冬

五臟六腑虛實

心虛八證　忌升發破氣苦寒辛燥大熱之藥。宜補
血甘溫酸斂。佐以鹹寒鎮墜。　生地　龍眼　人參
炙草　石斛　棗仁　五味　柏仁　丹參　茯
神　遠志　鹿茸　炒鹽　丹砂
驚邪屬心氣虛。　忌升。破氣之藥。　宜降。清熱豁痰。
平。經曰驚者平之。　犀角　丹砂　琥珀　真珠
龍齒　金箔　牛黃　門冬　代赭石　石斛　桔
梗　膽星　射香　竹瀝　遠志　羚羊角　天竺
黃
癲癇屬心氣虛有熱。　忌補斂。升之藥。　宜降。清熱
豁痰。藥見驚邪條。加　犀角　門冬　牛黃　竹瀝
桔梗　貝母　丹參　礬金　釣藤鉤
不得眠屬心血虛有熱。　忌升。辛燥熱之藥。　宜斂
養陰。血。清熱。　棗仁　五味　龍眼　丹參　芍藥

人參　石斛　竹葉　生地　茯神　遠志　黃連
玄參　麥冬　竹茹　木通　生甘草　辰砂
六一散

心煩　屬心家有熱。忌升。破氣。燥熱之藥。宜清熱生津液。甘寒。甘平。辛酸。參用不得眠中諸藥　竹葉　麥冬　生甘草　石斛　丹參　龍眼　生地　玄參　沙參　茯神　遠志　知母　棗仁

怔忡　屬心血不足。忌宜藥俱同心虛。

心澹澹動　忌宜藥俱同心虛。

盜汗　屬心血虛。汗者。心之液也。忌破氣。辛散。燥熱之藥。宜補斂。清虛熱。甘酸。甘平。甘寒。苦寒。鹹寒。生地　當歸　茯神　龍眼　黃耆　五味　芍藥　棗仁　黃芩　黃檗　黃連　牡蠣

伏梁　屬心經氣血虛。以致邪留不去。忌破血。汗下之藥。宜活血。涼血。散熱。通結。辛鹹。麝金　乳香　沒藥　當歸　延胡　赤芍　遠志　菖蒲　五靈脂　茯神　牡蠣　參用東垣伏梁丸治之。

肝虛　十證　忌收斂。破氣。升散。苦寒。下之藥。宜辛散。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

甘緩、當歸　陳皮　生麥　地黃　甘菊、甘草
胡麻　穀精草　決明子　刺蒺藜　兔羊肝
因鬱而虛者、加　細辛　木香　縮砂密　沉香
川芎　香附

胸脇痛屬肝血虛、肝氣實、因而上逆。忌斂、補氣破血之藥。宜降氣養血、和肝。辛甘、平緩。蘇子　鬱金　當歸　生地　陳皮　甘草　白芍　續斷
通草　鹿膠　番降香

轉筋屬血虛。忌下、復忌升、燥熱閉氣、苦寒破氣之藥。宜酸辛、甘平。木瓜　牛膝　歸身　白芍
石斛　續斷　陳皮　炙甘草　縮砂密

目光短屬肝血虛及腎水真陰不足。忌破氣升燥熱之藥。宜補肝、兼滋腎、甘溫、益血、甘寒、除熱。枸杞　生地　甘菊　沙苑蒺藜　五味　決明　天冬　穀精草　麥冬

目昏屬肝血虛有熱、兼腎水真陰不足。忌藥同目光短。宜藥同目光短、加　黃檗　羚羊角

目翳屬肝熱兼腎水不足。忌破氣升燥熱苦寒之

藥。宜補肝血。除熱退翳。甘菊　生地　石決明
決明子　沙苑蒺藜　女貞　青羊膽　羚羊角
犀角　黃連　木賊　穀精草　蟬蛻　密蒙花
珊瑚　眞珠　琥珀

亡血過多角弓反張屬肝血有熱。忌風燥升破氣下之藥。宜補血。清熱甘寒。甘溫。酸寒。鹹寒。辛潤。
當歸　生地　芍藥　牛膝　麥冬　丹皮　甘菊
童便　炙甘草　有汗。加　人參　黃耆　五味
棗仁

少腹連陰作痛按之則止屬足厥陰經血虛。忌宜
藥。俱同角弓反張。

偏頭痛屬血虛肝家有熱不急治。久之必損目。忌
升燥熱苦寒之藥。宜養血。清虛熱。甘寒酸寒。辛寒
生地　天冬　甘菊　芍藥　當歸　川芎　烏
梅　炙甘草　土茯苓　金銀藤　黑豆　有實火
者。加　黃芩　大黃　雨前茶　石膏

目黑暗眩暈屬血虛。兼腎水眞陰不足。忌破氣燥
熱辛溫之藥。宜養血。補肝。清熱。甘寒。甘平。酸寒。苦

寒。生地　枸杞　甘菊　當歸　山藥　五味
蒺藜　甘草　山茱萸　芍藥　天冬　黃檗
肥氣屬氣血兩虛。肝氣不和。逆氣與瘀血相併而成。
忌破氣下。苦寒之藥。宜和肝散結氣兼行氣血
凝滯。甘溫甘平。川芎　當歸　沉香　乾姜　肉
桂　橘皮　紅花　鼈甲　延胡索　香附　山查
赤芍　紅麴　砂仁　參用東垣肥氣丸治之。
脾虛十二證　忌下。降泄。破氣。苦寒之藥。宜甘溫佐以
辛香酸平。人參　大棗　黃耆　山藥　炙甘草
蓮肉　茯苓　橘紅　白扁豆　縮砂　白豆蔻
藿香　木瓜　白芍　棗仁
飲食勞倦傷脾發熱。忌破氣發散下。苦寒之藥。
宜補中。益氣。甘溫。升。酸。人參　黃芪　术　炙甘
草　大棗　柴胡　升麻　石斛　麥冬　橘紅
芍藥　棗仁
飲食不消化屬脾氣虛。已忌破氣消導。尅伐。苦寒復
忌燥之藥。宜益眞氣。甘溫。甘辛。同脾虛藥加　穀
蘗　肉豆蔻

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

傷食必惡食。忌潤濕苦寒之藥。宜健脾消導甘溫辛香。橘皮　薯蕷　蓮肉　扁豆　白芍　茯苓　草果　山查　麥芽　縮砂　穀蘗　草豆蔻　如腹痛大便不通宜下大黃　虛人加　參　朮　枳實　檳榔　厚朴　山查　兼。黃連　重者宜。礬　紅棗肉　丸服二錢不可過。傷麵食宜炒用萊菔子

停飲爲痰飲湯水。或冷茶冷酒所致。忌下。酸斂濕潤滯膩之藥。宜健脾利水。淡滲與辛散。人參　白朮　半夏　茯苓　橘皮　澤瀉　猪苓　木通　桑皮　紫蘇　白蔻　旋覆花

水腫屬脾氣虛　忌破氣下泄。濕潤鹹苦寒之藥。宜補脾益氣燥濕利水。辛香甘溫佐以淡滲。人參　二朮　橘皮　山藥　木瓜　薏苡　桑皮　茯苓　赤小豆　香薷　車前　猪苓　澤瀉　姜皮　通草　縮砂

脾虛中滿屬脾氣虛。兼脾陰虛。忌破氣下。消導。利水。甘之藥。晝劇夜靜。屬脾氣虛。宜補氣健脾。甘

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

溫淡滲佐以辛香　人參　二术　芍藥　桑皮
茯苓　車前　橘紅　藿香　縮砂　無熱
證者佐以　桂　夜劇晝靜屬脾陰虛　宜補脾陰
兼制肝清熱甘平酸寒淡滲
蓮肉　橘皮　山藥　蘇子　五味　白扁豆
木瓜　桑皮　車前　茯苓　棗仁　芍藥　石斛
噎膈屬氣血兩虛由于血液衰少而非痰氣壅逆所
成　忌破氣幵復忌下消導燥苦寒辛熱　宜降清
熱潤燥甘溫甘平以益血畧佐辛香以順氣　蘇子

橘紅　人參　白芍　棗仁　龍眼　人乳　牛
乳　枇杷葉　蔗漿　梨汁　韭汁　白蔻　藿汁
蘆根汁
脾泄屬氣虛　忌破氣下消導苦寒之藥　宜温中
補氣幵清甘温甘平佐以辛香　人參　术　炙甘
草　山藥　蓮肉　扁豆　茯苓　車前　芍藥
升麻　柴胡　肉蔻　縮砂　橘皮　木香　丁香
藿香　白萊菔　兼有濕及痰經年不愈糞色白
者須服九製松脂

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

健忘屬氣血兩虛　忌升燥熱苦寒辛散之藥．宜益脾陰．兼補氣酸斂．甘溫甘寒．辛平以通竅．棗仁　芍藥　五味　人參　炙甘草　黃耆　龍眼　麥冬　栢子仁　丹參　茯苓　神遠志　石菖蒲

倦怠嗜卧屬脾氣不足　忌破氣消導苦寒之藥．宜補氣兼健脾．甘溫辛香．人參　白朮　黃耆　茯苓　山藥　炙甘草　穀蘗　扁豆　白豆蔻　縮砂　橘皮　藿香

脾虛腹痛按之則止屬血虛．忌破氣破血香燥苦寒之藥．宜益氣補血．甘溫酸平．人參　炙甘草　龍眼　大棗　棗仁　石斛　麥冬　芍藥

痞氣屬脾氣虛及氣鬱所致．忌破氣下濕潤苦寒之藥．宜健脾．兼散結滯．甘溫辛香．人參　白芍　橘紅　縮砂　藿香　吳茱萸　穀蘗　麥蘗　紅麴　香附　木香　茶東垣痞氣丸治之

肺虛　七證　忌補氣升散辛燥溫熱之藥．宜清熱降氣酸斂潤燥．天冬　麥冬　蘇子　貝母　沙參

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

百部　百合　桑皮　枇杷葉　五味　杏仁
五倍子　蜜　梨　柿　無熱加人參
齁（吼平聲）喘屬肺虛有熱因而痰壅。忌破氣升發散。收澀之藥。宜降氣消痰辛涼甘寒苦平。蘇子　貝母　桑皮　竹瀝　天冬　麥冬　百部　百合　枇杷葉　括樓根　馬兜鈴　款冬花　沙參　前胡　射干
欬嗽吐血痰屬肺熱甚　忌升。破氣復忌補氣破血。辛燥溫熱收澀之藥。宜降氣清熱潤肺生精液涼

血盆血甘寒甘平鹹寒佐以苦寒。鼈金　生地　蒲黃　側栢葉　茅根　剪草　白芨　阿膠　童便　知母　餘藥肺虛條內參用。
聲啞屬肺熱甚　忌宜藥俱同咳嗽。
咽喉燥痛屬水涸火炎肺熱之極。此證法所難治忌宜藥俱同咳嗽。
肺痿屬肺氣虛有熱　忌宜藥俱同肺虛
龜胸屬肺熱有痰　忌宜藥俱同齁喘欬嗽。
息賁屬肺氣虛痰熱壅結所致。忌破氣辛熱補斂

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

之藥。宜降氣清熱開痰。佐以散結。橘皮　白蔻
白芥子　射干　桔梗　旋覆花　桑皮　黍用
東垣息賁丸治之

腎虛（十八證）即腎水眞陰不足。忌升破氣利水溫熱
辛燥補命門相火之藥。宜滋陰潤生精補血除熱
甘寒酸寒苦寒鹹寒。生地　枸杞　牛膝　人乳
蓯蓉　栢子仁　胡麻　杜仲　沙苑蒺藜　續
斷　天冬　麥冬　五味　山萸　薯蕷　丹皮
車前　兔絲子　知母　黃檗　龜甲　靑蒿　童

便　地骨皮

腎虛腰痛屬精氣虛。忌破氣燥熱之藥。宜藥同
腎虛。

骨乏無力屬陰精不足。腎主骨故也。忌宜藥俱同
腎虛。

骨蒸潮熱屬精血虛極。以致陽無所附。火空上炎。
忌宜藥。俱同腎虛。

傳尸勞　忌藥。同腎虛。宜除熱益陰。殺勞蟲。兼清
鎭。諸藥同腎虛。加　鬼臼　乾漆　漆葉　蘆薈

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

象膽　獺肝　胡黃連　丹砂　磁石　安息香

五心煩熱屬眞陰不足。忌宜藥俱同腎虛。

夢遺精泄屬腎虛有火。忌藥同腎虛。宜滋陰生

精補血除熱酸斂佐以澀精。蓮花蓋　生甘草

石斛　縮砂　龍骨　覆盆子　魚膠　蓮肉　牡

蠣　遠志　韭子　桑螵蛸　餘藥同腎虛條。

小便短澀熱赤頻數屬腎虛有火。忌宜藥同腎虛。

溺有餘瀝屬氣虛　忌宜藥同腎虛。以五味子黃檗

人參爲君。加兔絲子覆盆子爲臣。益智爲佐。如覺平

日肺家有熱。或咳嗽有火者。忌人參。用沙參。

溺血血淋屬腎虛有火。熱傷血分。忌宜藥同腎虛。

加　側栢葉　阿膠　茅根　非白　地黃　蒲黃

戎鹽。

傷精白濁屬房勞過度。以致精傷流出。似白濁證。

忌利小便燥辛熱之藥。宜藥同腎虛。

五淋屬腎虛兼有濕熱。忌宜藥同腎虛。加清濕熱。

茯苓　黃檗　車前　石斛　革薢　薏仁

精塞水竅不通屬房慾不竟。或思慾不遂。或懼泄忍。

海花藏

精或老人氣不足以送精出竅。燥熱之藥。宜行敗精。壯實人。宜兼泄火。老人宜兼補氣血。外治用吮法。牛膝　生地　當歸　桃仁　紅花　車前　鹿角霜

齒浮。眞牙搖動。及下齦軟或齒齦血屬腎虛有熱。忌藥同腎虛。又忌當歸芎藭。宜益陰凉血。固腎。諸藥畧同腎虛。應以地黃黃檗五味子爲君。桑椹牛膝沙苑蒺藜鹿茸天冬爲臣。龍骨牡蠣爲使。

下消屬腎陰虛。火伏下焦。忌破氣。下利小便。忌藥同腎虛。宜清熱及峻補眞氣。潤酸斂諸藥同腎虛。宜以黃檗五味子生地天麥冬人參爲君。石斛牛膝知母人乳童便爲臣。地骨皮青蒿側栢葉爲佐。

善恐屬腎氣虛。腎藏志故也。忌破氣苦寒之藥。宜補氣强志辛平。甘溫。佐以辛香。人參　遠志　茯苓　鹿茸　酸棗仁　栢子仁　石斛　沉香

陰竅漏氣屬腎氣虛不固。腎主納氣。虛則不能納。故見是證。忌破氣降香燥辛熱之藥。宜補眞氣。酸斂固澀。人參　五味　山萸　沙苑蒺藜　覆盆

子　枸杞子　益智子　遠志　龍骨　牡蠣　金櫻子　蓮鬚　參用腎虛條內諸藥。

疝屬腎虛寒濕邪乘虛客之所致。丹溪謂與腎經絕無相干者誤也。又有先因濕邪爲病。後成濕熱者。藥宜分寒熱先後二途。忌升破氣。苦寒濕潤之藥。宜補氣通腎氣除濕。又有陰虛有熱之人病此。兼宜除熱　人參　黃耆　橘核　合歡子　荔枝核　川楝子　牛膝　木瓜　杜仲　萆薢　巴戟天　虛寒而痛。加　桂　蘼香　補骨脂　仙茅　虛熱而痛。加　黃栢　車前　濕濁者。加　朮　奔豚屬腎虛。脾家濕邪下傳客腎所致。忌藥同疝。兼忌燥。宜補氣健脾辛溫散結　人參　山藥　桂　山萸　牛膝　蘼香　蛇牀子　參用東垣奔豚丸治之。

命門虛　卽元陽眞火不足。四證　忌下泄破氣發散。辛寒苦寒淡滲燥補腎水苦寒等藥。宜益眞陽之氣。甘溫鹹溫甘熱酸斂　人參　紅鉛　人胞　鹿茸　白膠　菟絲子　五味子　枸杞子　覆

盆子　巴戟天　山萸　附子　補骨脂　仙茅
陽起石

陰痿屬命門火衰。下焦虛寒。忌宜藥。同命門虛。加
海狗腎　蛇牀　蛾　狗陰莖　雀卵
牛膝　白馬陰莖

精寒精薄屬命門火衰。陽氣不足。忌宜藥。俱同陰
痿

腎泄即五更及黎明泄瀉者。是也。亦名大痕泄。屬命
門眞火不足。忌藥。同命門虛。宜益氣甘溫酸斂
人參　山藥　蓮肉　肉豆蔻　砂仁　補骨脂
木香　吳茱萸　五味子

畏寒足冷　忌宜藥。俱同命門虛。

小腸虛　一證　忌破氣辛散燥熱之藥。宜補氣甘溫。
酸溫。人參　黃芪　麥冬　五味　山茱萸

遺尿屬小腸氣虛。兼腎氣虛。忌宜藥。同小腸虛。兼
固澀　牡蠣　益智　龍骨　金櫻子

膽虛　二證　忌汗下吐苦寒破氣燥之藥　宜甘溫甘
平酸斂。佐以微辛。人參　當歸　穀精草　決明

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

子　木賊草　甘草　竹葉　竹茹　白芍藥　酸棗仁

易驚屬膽氣虛　忌破氣升發燥熱之藥　宜補膽氣甘溫辛溫酸平　人參　棗仁　甘草　竹葉　當歸　白芍　竹茹　橘皮

病後不得眠屬膽虛　忌宜藥俱同膽虛

胃虛　七證　忌下破氣苦寒燥熱　宜益氣甘平甘淡酸　人參　白朮　白藕豆　蓮肉　石斛　橘皮　白茯苓　木瓜　白芍藥　竹葉　竹茹　白芍藥　兼寒加　生姜　白

豆蔻　縮砂　兼熱加　竹茹　枇杷葉　麥冬　蘆根汁　蔗漿

胃弱不納食及不思飲食　熟法

胃虛嘔吐　宜分寒熱　忌宜藥俱同胃虛

霍亂轉筋屬胃虛痰中邪惡氣及毒氣兼有停滯所致　轉筋與肝經血虛不同　忌閉氣滯膩收斂溫補大熱之藥　宜調氣和中辛散消導　由于暑必口渴或口乾齒燥口苦小水短赤　白梅　扁豆併葉　絲瓜葉

滑石　石膏　甘草　橘皮　香薷　木瓜　石斛　童溺　食鹽　泥漿　縮砂　厚朴　由于寒。則小水清白。小渴不熱。縮砂密　丁香　橘皮　藿香　甚者。加　吳茱萸　肉桂　外治。用　杉木楠材　剪湯浸洗

絞腸痧　屬胃氣虛。猝中天地邪惡穢汚之氣。鬱于胸腹間。上不得吐。下不得瀉。以致腸胃絞痛。胸腹驟脹。遍體紫黑。頭頂心。必有紅髮。急尋按之。急以三稜鍼（音箆）針刺委中。擠出熱血。可立蘇。次用新汲凉水。投入鹽兩許。恣飲。得吐瀉即止。委中穴。在兩膝下灣橫紋中間兩筋之中。刺入一分。忌溫補斂切忌　火酒　生姜　蒜　及穀氣米飲　熱湯　入口即死。宜通竅。辟惡。辛散。鹹寒。龍腦香　蘇合香　藿香　檀香　乳香　芸硝　童便　煎藥冷服。

中惡腹中疠（音朴）痛　屬胃氣虛。惡氣客之所致　忌補酸斂之藥。宜辟惡氣。通暢胃氣。辛散。龍腦香　檀香　麝香　孕婦忌用　牛黃　乳香　蘇合香　丹砂　雄黃　藿香　橘皮　木香　沉香　白豆蔻

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

遠志　石菖蒲　乾姜　桂

反胃屬胃氣虛　忌破氣升苦寒甘燥熱之藥　宜補氣降氣和胃清熱酸斂以制肝。人參　蘇子　橘皮　枇杷葉　木瓜　竹茹　麥冬　蘆根汁

石斛　白茯苓　白芍藥　梅醬　蔗漿　若因虛寒而得者。加　生姜　术　白豆蔻

中酒屬胃弱　忌閉氣升甘溫燥熱收澀之藥。宜養胃酸辛散淡滲　人參　麥冬　扁豆　葛花　五味　梅醬　橘皮　黃連　白豆蔻　白茯苓

縮砂　澤瀉

大腸虛四證　忌破氣下燥熱之藥。宜補氣潤燥甘溫　人參　黃芪　麥冬　五味　白芍藥　炙甘草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足。　忌破氣下燥熱之藥。宜生津液潤燥凉血益血　五味子　麥冬　芝蔴　麻仁　生蜜　天冬　肉蓯蓉　生地　當歸　蘆薈　炙甘草

虛寒滑泄不禁屬氣虛　忌破氣下濕潤苦寒之藥。

宜補氣升甘溫酸斂　人參　黃芪　白朮　蓮肉　升麻　炙甘草　吳茱萸　肉豆蔻　補骨脂　五味子　木瓜　赤石脂

腸鳴屬氣虛　忌破氣下苦寒之藥　宜同大腸虛加　升麻　柴胡以佐之

脫肛屬氣虛兼有濕熱　忌藥同大腸虛　宜補氣升提除濕熱　人參　黃芪　炙甘草　白朮　蓮肉　扁豆　升麻　乾葛　柴胡　黃栢　防風　黃連　黃芩　白芍　樗根白皮　外用五倍子傳之

膀胱虛三證　忌破氣燥利小便之藥　宜補氣酸斂　人參　五味子　山茱萸　益智子　金櫻子

小便不禁屬氣血虛　忌降下滲潤燥熱之藥　宜同膀胱虛加　牡蠣　龍骨　鹿茸　桑螵蛸　雞膍胵上皮音鴜雞聲　胵丙金也　頻數不能少忍加　麥冬　五味子　黃栢　山茱萸　天冬　鼈甲　牛膝　栢子仁　枸杞

遺尿屬本經氣虛見小腸條內因膀胱虛亦能致遺

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

尿故復列此　忌宜藥俱見小腸虛。

膀胱氣　忌宜藥俱同疝。

三焦虛二證　忌破氣降升發苦寒之藥　宜補中益氣佐以辛溫　人參　黃芪　白朮　益智　沉香　五味子

腹寒屬中氣虛　忌宜藥俱同三焦虛。　宜補氣益精甘溫甘寒酸溫　人參　黃芪　麥冬　五味子

短氣少氣屬氣虛　忌藥同三焦虛。

武林　楠森　峻

本草滙卷四目次

藏府實門忌宜藥

心實五證　肝實五證

脾實六證　肺實八證

命門實二證　小腸實一證

膽實二證　胃實六證

大腸實六證　膀胱實一證

三焦實三證

六淫門忌宜藥

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

風五條　寒六條
暑五條　濕二條
燥一條　火十四條
雜症門忌宜藥
瘧　雜論
瘧下　五疸
痰　飲
諸氣　鬱
關格　瘕
吐咯鼻齒耳舌等血　蓄血
頭痛　齒痛
胃脘痛　腹痛
痺　疾
交腸　鬼疰尸疰飛尸
客忤
婦人門忌宜藥
赤白帶淋　血枯
經先期後期　月事過多

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493
ガラス使用

崩中
種子
安胎
難産
下乳汁
小兒門忌宜藥
痘癗
嘔吐
急驚
熱入血室
妊娠惡阻
胎漏
產後
痢瘧
泄瀉
慢驚
痞積
胎毒
外科門忌宜藥
癘風
外傅諸瘡藥
瘰癧馬刀
痔
乳巖
內外吹
陰蝕
諸蟲
癰疽
疔
瘿瘤
通腸漏
乳癰

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493
ガラス使用

金瘡
跌撲
火灼
破傷風
折挫
漆瘡

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯
男 樹晦芬墀
姪 維均梅在 參閱

五臟六腑虛實

紫藤陳陸坤白筆校訂

心實 即實火實熱 五證 忌補斂升熱溫燥之藥 宜降火清熱苦寒以折之辛寒以散之甘寒以緩之鹹寒以潤之 黃連 犀角 石膏 丹砂 丹皮

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

滑石　生甘草　麥冬　竹葉　童便　便結燥加芒硝　大黃　發狂亦如之

譫語屬心家邪熱　忌宜藥俱同心實

舌破屬心火　忌宜藥俱同心實

煩燥屬心家邪熱及心火內炎　煩屬心　燥屬腎　忌宜藥俱同心實

自笑屬心家有熱邪　忌宜藥俱同心實

發狂屬心家有邪熱甚　忌宜藥俱同心實

肝實　五證

忌補氣升酸斂辛熱辛溫燥之藥　宜清熱降氣苦寒辛寒甘寒酸寒　橘皮　青皮　蘇子　黃連　黃芩　龍膽草　柴胡　生甘草　赤芍藥　竹葉　青黛

善怒　怒則氣上逆甚則嘔血及飧泄　忌補升熱燥閉氣之藥　宜降氣清熱甘寒酸寒鹹寒佐以辛散　蘇子　鬱金　番降香　生甘草　青黛　麥冬　生地　赤芍　橘皮　蒲黃　當歸　延胡索　砂仁　香附　童便

善太息忽忽不樂　忌宜藥俱同善怒

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

脇痛嘔血　屬肝氣逆肝火盛肝血虛　忌宜藥俱同

善怒

發搐　屬肝家邪熱熱則生風風主掉眩故也　忌藥同善怒　宜清熱降氣利小便緩中　生地　白芍　黃連　丹砂　羚羊角　童便　蘇子　麥冬　生甘草　竹葉　甘菊　茯苓　木通

目赤腫痛　屬血熱　忌藥同肝實善怒　宜涼血清熱甘寒苦寒酸寒　生地　赤芍　甘草　甘菊　穀精草　蜜蒙花　荊芥　黃檗　大黃　黃連

連翹　玄參　山梔　竹葉　龍膽草　木通　童便

外治　銅青　芒硝　石膽　雞核　急者宜以三稜針刺破眼眶腫處將出熱血立解遲則血貫瞳人日損矣

脾實　即濕熱邪勝六證　忌濕潤收澀滯膩熱鹹甘之藥　宜除濕清熱利小便辛散風燥苦寒　木　山梔　茯苓　澤瀉　滑石　車前　茯苓　白蔻　防風　乾葛　黃連　枳實

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

盡脹　由于脾家濕熱積滯或內傷瘀血停積而成。忌補氣甘溫燥熱之藥。宜除濕清熱利小便消積

木通　防已　車前　豬苓　澤瀉　茯苓　葶藶　桑皮　山查　紅麴　三稜　蓬朮

易饑　屬脾家邪火　忌升辛溫大熱香燥之藥　宜清火除熱生津液益脾陰甘寒苦寒酸寒。　黃連　青黛　連翹　山梔　石膏　竹葉　麥冬　石斛　曰芍　棗仁

口唇生瘡　忌溫燥熱之藥。宜甘寒酸寒苦寒辛寒　麥冬　生地　甘草　白芍　烏梅　黃連　黃檗　玄參　連翹　括樓根　乾葛　石膏　龍膽草　竹葉

口糜　忌宜藥俱同口唇生瘡。

中消　屬脾家實火　忌破氣下溫燥熱之藥　宜藥。

同口唇生瘡加　人參

濕熱腹痛按之愈甚　忌閉氣酸斂溫熱燥之藥　宜利小便兼升提苦寒　滑石　車前　木通　黃連　黃芩　升麻　柴胡　葛根　防風　不愈加

国立国会図書館　タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

熟大黃　即土釜則奪之義也

肺實八證　忌斂澁補氣升燥熱酸鹹之藥　宜降氣潤甘寒苦寒佐以辛散　蘇子　桃杷葉　桑皮　天冬　貝母　括樓根　杏仁　白前　前胡　石膏　知母　車前　黃芩

喘急屬肺有實熱及肺氣上逆　忌宜藥同肺實加　桔梗　甘草　括樓仁　玄參　青黛

氣壅屬肺熱氣逆　忌宜藥俱同肺實

聲重痰稠屬肺熱　忌宜藥同肺實加　薄荷　竹瀝

肺癰屬肺極熱　忌藥同肺實　宜清熱消痰降火解毒散結甘寒苦寒辛寒　桑皮　黃芩　貝母　桔梗根　薏仁　虎耳草　鼠粘子　連翹　甘草　敗醬草　百年醃芥菜汁

肺脹悶屬肺熱　忌宜藥同肺實并察用肺癰諸藥

吐膿血血痰欬嗽血屬肺家火實熱甚此正邪氣勝則實之謂　忌藥同肺實　宜清熱降氣涼血豁痰　童便　蘇子　枇杷葉　桑白皮　麥冬　蒲黃

生地　天冬　百部　百合　薏仁　甘草　貝母　白芍　白芨　桔梗　款冬　紫菀

喉癬　屬肺熱　忌宜藥同肺實加　鼠粘子　玄參　射干

上消　屬肺家實火及上焦熱氣清熱補肺生津甘寒苦寒酸寒辛寒　忌藥同肺實　宜降冬　枇杷葉　桑皮　桔梗　百部　百合　黃芩　天冬　沙參　黃連　栝樓根　葛根　知母　玄參　石膏　甘草　五味　白芍　篁竹葉　蘆根　冬瓜　人乳

腎無實　故無瀉法

命門實　二證　忌補氣溫熱之藥　宜苦寒甘寒鹹寒　黃檗　知母　玄參　天冬　車前　木通　澤瀉

強陽不倒　屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治　忌宜藥同命門實　宜清熱利竅甘寒苦寒鹹寒佐以淡滲　黃檗　知母　車

水竅澀痛　屬命門實火　忌藥同命門實　宜清熱滲　生地　童便

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

前　生地　天冬　生甘草　黃芩　牛膝　麥冬
童便　茯苓　木通

小腸實　一證　忌斂澁補氣之藥。宜通利淡滲苦寒。

甘寒鹹寒。車前　茯苓　木通　甘草　黃栢
知母　黃芩　黃連　牛膝　麥冬　生地　童便

小水不利及赤或澁痛尿血

膽實　二證　忌汗吐下。宜和解。辛寒甘寒苦寒辛溫。

柴胡　黃芩　半夏　生姜　甘草　橘皮　龍
膽草

口苦耳聾脇痛往來寒熱　忌藥同膽實。宜用仲
景小柴胡湯。隨所見兼證加減。

鼻淵屬膽移熱于腦。忌辛溫燥熱之藥。宜清熱
補腦甘寒。甘平。佐以辛寒。天冬　甘菊　生地
沙苑蒺藜　山萸　沙參　薄荷　柴胡　辛夷
黃芩　玄參　知母

胃實　六證　忌升補斂辛溫燥熱濕潤之藥。宜下。
如邪未結。宜清熱發散苦寒。辛寒甘寒。大黃　枳
實　知母　石膏　葛根　竹葉　青黛　門冬

甘草

譫語發狂發斑棄衣而走登高而歌屬胃家邪熱實。忌宜藥同胃實。如大便結者。加芒硝亟下之。發斑者。鼠黏子玄參栝樓根多用石膏爲君。便結亦加大黃下之。

口臭數欲飲食屬胃火。忌藥同胃實。宜清熱降火苦寒甘寒辛寒。黃連　青黛　連翹　麥冬　石斛　竹葉　石膏　蘆根汁

嘈雜屬胃火。忌宜藥同口臭略兼消導。山查

麥芽　橘紅　神曲

口淡屬胃熱。忌宜藥俱同口臭。

嘔吐屬胃火者。必面赤。小便短赤或澀。大便多燥。口苦或乾渴。忌宜藥同胃實。加　木瓜　蘆根　橘皮　通草　白茯苓

吞酸屬胃火。忌藥同胃實。宜藥同嘈雜。

大腸實　四證　忌補斂燥熱之藥。宜潤下。苦寒辛寒。

生地　麻仁　桃仁　黃連　黃芩　槐花　大

便鞕閉 忌宜藥同大腸實。加 萵硝 猪膽 檳榔 郁李仁 石蜜

腸風下血屬大腸濕熱。 忌下。燥熱之藥。宜清熱凉血。兼升甘寒苦寒。生地 槐花 地榆 黄連 黄芩 荆芥 防風 甘草 紅麴 白芍 側栢 蒲黄 雞子

臟毒屬血熱。 忌宜藥同腸風下血。加 忍冬 倍加。 地榆 蒲黄

腸癰屬大腸實火。 忌藥同腸風下血。宜下。苦寒解毒。 大黄 白芷 白芨 白斂 連翹 忍冬藤 天明精 甘草 黄芪 生地 明礬 黄蠟 生蜜 已上三味。作丸。

膀胱實 一證 忌燥熱收濇之藥。宜潤淡滲。知母 黄檗 車前 木通 瞿麥 滑石 茯苓 猪苓 澤瀉

癃閉屬膀胱實熱。 忌破氣發散燥熱之藥。如屬水液不足。兼忌利小便。宜同膀胱實。佐以升提。升麻 柴胡

国立国会図書館 タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

三焦實（三證）　忌補斂升燥熱之藥。宜降清熱調氣

甘寒苦寒鹹寒。蘇子　門冬　知母　黃檗　玄參　山梔　黃芩　黃連　童便

喉痺　即纏喉風。屬少陽相火。並熾經曰。一陰一陽結爲喉痺。一陰者。少陰君火也。一陽者。少陽相火也。忌藥同三焦實。宜辛散。佐以苦寒鹹寒。急則有鍼法。吹法。吐法。鼠黏子　山豆根　黃連　黃檗　知母　玄參　童便　麥門冬　射干　蘇子　貝母　甘草　犀角　山慈姑　苦桔梗

續隨子　急治用　膽礬　朴硝　牛黃　爲末。和勻。吹入喉中。又法用　明礬三錢　巴豆七粒　去殼同礬煆枯。去巴豆。即取礬爲細末。吹入喉中。流出熱痰。即寬。

頭面赤熱　屬上焦火升。忌藥同三焦實。宜降清熱甘緩。佐以酸斂。蘇子　枇杷葉　天冬　麥冬　玄參　薄荷　栝樓根　梨　柿　蔗　童便

赤白遊風　屬血熱。熱則生風。故善遊走。俗名火丹。小白芍　五味

兒多患此。大人亦時有之。忌藥。同三焦實。宜清熱涼血。兼行血辛寒。苦寒。鹹寒。生地　黃連　黃檗　甘草　丹皮　薄玄參　鼠黏　牛膝　藍汁　苧根　童便　赤芍　蒲黃　紅藍花　連翹　宜兼外治。砭出熱血。及用　漆姑草　慎火草　搗爛敷之。即易愈。

六淫門

風

諸暴強直。支痛。縮音軟縮也。戾。裏急。筋縮。皆屬于風。

真中風

倅僵仆。口噤不言。不省人事。如遺尿。直視。口開手撒。汗出如珠。屬不治證。西北高寒之地有此。東南無之。忌破氣下。吐。苦寒。酸斂之藥。宜辛甘發散峻補真氣。桂枝　附子　甘草　獨活　羌活　天麻　麻黃　防風　芎藭　細辛　藁本　蔓荊實　牛黃　辛夷　牡荊實　白芷　人參　黃耆　有痰加　竹瀝　南星　半夏　薑汁

類中風

口眼歪斜。語言蹇澀。半身不遂。口噤不言。四肢不舉。痰涎壅盛。昏眊不省人事。忌汗。吐。下。大忌破氣。溫熱苦寒。及一切治風濕。辛燥發散。并開竅走

真氣行血諸藥犯之必重必效如麝蘇合檀龍腦安息等香之類宜滋補陽虛則氣血雙補兼宜清熱降氣豁痰及保脾胃

天冬 脾胃薄弱者勿多用　麥冬　荆瀝　蘇子　梔樓根

貝母　橘紅　枇杷葉　甘草　竹瀝　童便

霞天膏　梨汁　黄蘗　次益血于前藥中加　胡

石斛　牛膝　生地　五味　甘菊　枸杞

肖烏　薯蕷　兔絲子　白芍藥　丹參

朱黄　白蒺藜　酸棗仁　栢子仁　車前子

竹葉　羚羊角　鼈甲　木瓜　青蒿　遠志　梔

樓仁　沙參　巴戟天　茯苓　茯神　如便閉加

肉蓯蓉　當歸　倍麻仁　如兼氣虛加　人參

黄芪　有肺熱者勿入　人參

感冒風寒俗名傷風其證或頭疼身熱體則否鼻必

塞兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅氣

喘咳嗽忌補氣酸斂閉氣之藥宜發散辛甘溫

川芎　細辛　葉本　防風　甘草　荆芥　白芷

前胡　桑白皮　桔梗　紫蘇　薄荷　杏仁

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

石膏

傷風熱　忌藥同感冒　宜辛散甘寒發散　石膏　知母　甘草　竹葉　麥冬　前胡　桔梗　薄荷　葛根　桑白皮　久而不愈者屬虛陽虛加　人參　黃芪　陰虛加　五味　地黃　倍麥冬　白芍

寒諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕痃癖堅痞腹滿急痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬于寒凡中寒必本于陽虛　忌破氣苦寒下甘寒辛寒之藥　宜補氣散寒辛甘溫熱輕者解表重者溫補　桂枝　乾姜　麻黃　人參　附子　黃芪

傷寒冬月即病宜從仲景法

傷寒古今時地不同因之六經治法宜異夫傷寒大病也時者聖人不能違也以關乎众生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景醫聖也其立法造論如華陀孫思邈輩莫不宗之漢末去古未遠風景猶厚形多壯偉氣尚敦龐其藥大都爲北方感寒即病而設況

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

南北地殊。厚薄不侔。故其意可師也。法不可改也。循至今時千有餘年。風氣澆而人物脆。況在荊揚交廣梁益之地。與北土全別。故其藥則有時而可改。非違仲景也。實師其意。變而通之以從時也。如是。則法不終窮矣。故作斯議。條列其方。稍爲損益以從時。俾醫師知所適從。庶患斯疾者。可免夭枉。

辨驗外感眞僞法　凡外感必頭疼。其疼也。不間晝夜。探其舌本。必從喉嚨內乾出于外。多兼煩躁。不煩躁者。卽輕證也。不頭疼而發熱。不發熱而頭疼。頭雖疼而有時暫止。口雖乾而舌本不燥。骨雖疼而頭不疼。雖渴而不欲引飲。至夜或偶得寐。遇食不好亦不惡。居處雖若厄怯而神氣安靜。凡若此者。皆非傷寒也。

三陽治法總要　太陽病。其證發熱惡寒。惡風頭痛項強。腰脊強。遍身骨痛。脉雖浮洪而不數。多不傳經。煩躁脉數急者。是欲傳經。宜先發汗以解表邪。其藥以羌活湯爲主。

羌活湯　羌活三錢　前胡二錢　甘草八分　葛根二錢　生姜三片　棗二枚　杏仁九粒去皮尖研爛　水煎服。秋深冬月。應用此方。亦可量加紫蘇葱白。如冬月天氣

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

嚴寒感邪卽痛。服此藥不得汗。本方加　麻黃一錢　生姜四片　共前七片。得汗。勿再服。如病人自覺煩躁喜就清涼。不喜就熱。兼口渴。是卽欲傳入陽明也。若外證頭疼遍身骨疼不解。或帶口渴鼻乾自疼。不得卧。卽係太陽陽明症。羌活湯中。加　石膏　知母　麥冬　大劑與之。得汗卽解。　如自汗煩躁頭疼遍身骨疼不解者。　羌活一錢　桂枝七分　石膏一兩二錢　麥冬六錢　知母三錢　竹葉一百廿片　白芍二錢　甘草八分

如冬月卽病。太陽證惡寒畏風。頭疼遍身骨疼。自汗不渴。宜用　桂枝八分　芍藥二錢　甘草一錢　大棗二枚　生姜一片　太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下之愈。其外證不解者。不可下。當先解表。表證罷。少腹急結者。乃可下之。桃仁承氣湯。無畜血證。大承氣湯。○正陽陽明病。正陽陽明者。胃氣實熱是也。其證。不大便。自汗。潮熱。口渴。咽乾。鼻乾。嘔。或乾嘔。目眴眴不得眠。畏人聲。畏木聲。畏火。不惡寒。及惡熱。或先惡寒。不久旋發熱。甚則譫語狂亂。循衣摸牀。脈洪大而長。宜急解其表。用竹葉石膏湯。大劑與之。不

嘔無汗與葛根湯亦須大劑若表證已罷脉緩小便利是病解矣若表證罷後邪結于裏大便閉小便短赤宜用調胃承氣湯或小承氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病已解如作痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中和二便通利爲度陽明病不能食若其人本虛勿輕議下痛者用

葛根　甘草　桔梗　麥冬　四味濃煎數數與之陽明病無汗小便不利心中懊憹者當發黃急用

梔子　麥冬　淡豆豉　大劑濃煎與之如已見身黃急加茵陳爲君主之陽明病劒血此緣失于發汗宜用

荊芥二錢　葛根三錢　麥冬五錢　牡丹皮一錢五分　蒲黃二錢　茅根二兩　側栢葉二錢　生地三錢　濃煎與之兼飲童便陽明病心下硬滿者此邪未入于腹中慎勿下之用竹葉石膏湯加

栝樓一個搗碎　桔梗二錢　黃連一錢　陽明病邪結于裏汗出身重短氣腹滿而喘潮熱手足濈然汗出者此大便已鞕也六七日已來宜下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大便不鞕者慎勿輕下陽

明病發汗。不解。腹滿急者。亟下之。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表證。大便難。宜承氣湯下之。陽明病。下之早。外有熱。手足溫。不結胷。心中懊憹。不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。陽明病。發潮熱。大便溏。胸滿不去者。與小柴胡湯去人參加　栝樓　黃連　陽明病。自汗出。或發汗後。小便利。津液內竭。大便雖硬。不可攻之。須俟其自大便。或用蜜導膽導法通之。大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛。本有宿食。宜再用承氣湯下之。食穀欲嘔。屬陽明。非少陽也。胸中煩熱者。竹茹湯主之。

竹茹　三錢　麥冬　五錢
枇杷葉　三大片　蘆根　三兩
內無熱證者。小便利。尿不渴。此爲陽明虛也。吳茱萸黃主之。

吳茱萸　二錢　人參　三錢　生姜　一錢五分　大棗　三枚　水煎日三服。凡陽明病。多汗。津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則譫語。以小承氣湯下之。若一服譫語止者。勿再服。陽明病。譫語發潮熱。脉滑而數者。小承氣湯主之。服藥後。腹中轉氣者。更與一服。若不轉氣者。勿更與之。若服藥後。又日不大便。脉反微澁者。裏虛也。爲難治。勿復議

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

下。陽明病。下血譫語者。此爲熱入血室。汗止在頭。用荊芥三錢　葛根三錢　黃芩一錢五分　生蒲黃二錢　濃煎。以童便對飲之。陽明痼。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱。汗出。惡熱。身重。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上有胎者。梔子豉湯主之。若渴欲飲水舌燥者。白虎湯。加人參主之。若脉浮發熱口渴。小便不利者。猪苓湯主之。陽明病。協熱下利者。宜六一散。心下痞者。以黃連栝樓湯調服之。脉浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之　附子　乾姜　甘草　趺陽脉浮而澀。小便數。大便鞕。其脾爲約。麻子仁丸主之。麻仁十三兩　芍藥四兩　枳實四兩　大黃八兩　厚朴三兩　杏仁六兩　蜜丸。如梧子大。每用十丸。日三服。陽明實則譫語。虛則鄭聲。鄭聲者。重語也。直視譫語。喘滿者死。下利者亦死。發汗多。若重發其汗。譫語。脉短者。死。脉和者不死。若吐若下後。不解。不大便五六日。或至十餘日。日晡時發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣妄撮。惕而不安。微喘直視。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

脉弦者生。濇者死。濇者。陽證見陰脉也。微者。但發熱譫語者。大承氣湯下之。利。勿再服。陽明病。發狂棄衣而走。登高而歌。此陽明實也。以承氣湯急下之。如便不結者。

大劑白虎湯灌之。　石膏四兩　加大青一兩　甘草七錢　太陽陽明病。協熱下利者。宜六一散。以黃連煎湯調服之。　太陽陽明并病。六七日表證仍在。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當硬滿。小便自利。下其血乃愈。當用桃仁承氣湯。　又二陽并病。太陽證罷。潮熱汗出。大便難。譫語者。宜大承氣湯。○少陽病。其證。口苦。咽乾。目眩。往來寒熱。胸脇痛。胸滿或痛。耳聾。脉法。弦細。頭痛發熱者屬少陽。少陽不可發汗。發汗。則譫語。胃和者。當自愈。不和者。則煩而悸。　傷寒三日。少陽脉小者。欲已也。凡太陽病不解。傳入少陽者。脇下硬滿。乾嘔。不能食。往來寒熱。未經吐下。脉沉緊者。與小柴胡湯。　柴胡二錢四分　人參九分　黃芩九分　甘草九分　半夏一錢五分　生姜九分　大棗二枚　水煎溫服。日三。　若心下痞鞕。去大棗。加夏人參。加　栝蔞實一枚　若胸中煩而不嘔。去半

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

牡蠣二錢五分　若渴者去半夏加　人參　栝樓根

若腹中痛者去黃芩加　芍藥三錢　若心下悸小便不利者去黃芩加　茯苓二錢　若不渴外有微熱者去人參加　桂一錢夏勿用　溫覆取微汗愈　若欬者去人參大棗加　五味子一錢　少佐以乾姜　陽明少陽并病必下利脉滑而數有宿食也當承氣湯下之　若吐下發汗溫鍼讝語柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之　三陽合病脉大上關上但欲睡眠目合則汗藥用　百合一兩　麥冬五錢　炙甘草一錢　知母二錢　竹葉五十片　栝樓根二錢　鼈甲如洪三錢

白芍二錢　三陽合病腹滿身重譫語遺尿自虎湯加百合主之　傷寒六七日無大熱其人煩躁者此爲陽去入陰故也　傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也

三陰治法總要　三陰病其證有二一者病發于三陽不時解表以致邪熱傳入于裏雖云陰分病屬于熱糞結宜下腹滿不可按宜下有燥糞協熱下利宜下腹痛下利宜芍藥黃芩炙甘草以和之如便膿血即

加滑石黃連。佐以升麻乾葛。如邪雖入裏。蓄猶未結。宜清其熱。渴者用白虎湯。竹葉石膏湯。不渴。或心下痞者。宜黃連黃芩藥枳殼麥冬栝樓輩。以清之。或邪未結于下焦。少腹不堅痛。而誤用芒硝以伐眞陰。洞泄不已。元氣將脫。宜用人參白朮炙甘草大棗乾姜芍藥大劑與之。不止。佐以升提。升麻葛根柴胡之類。　若從無陽邪表證。從不頭疼發熱。寒邪直中陰經。此必元氣素虛之人。或在極北高寒之地。始有是證。法宜溫補以接其陽。附子人參乾姜官桂大劑與之。陽回寒退。即以平補之劑調之。勿過用桂附以防其毒。　三陰各經見證。悉從仲景傷寒論法治之。如少陰咽痛。咽中生瘡聲不出。用苦酒湯。到咽即效。故知古人立法。非今人可及也。

春溫夏熱病大法　冬傷于寒。至春變爲溫病。大都頭疼發熱。或渴或不渴。三陽證俱然。亦間有先微寒。後即發熱者。大抵發熱。其常也。藥用辛溫。佐以辛寒。以解表邪。太陽宜羌活湯。陽明宜白虎湯。無汗不嘔者。間用葛根湯。少陽往來寒熱等證。不可汗吐下。宜和

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493　　ガラス使用

解。小柴胡湯。渴者去半夏。加栝蔞根。耳聾熱甚。去人參。加麥冬。知母栝蔞根。渴亦如之。至夏變爲熱病。其表證大約與春溫同。但熱比于溫。則邪氣更烈耳。解表用白虎湯。竹葉石膏湯。有太陽證。則加羌活。有少陽證。則加柴胡黃芩。如發斑。白虎湯。竹葉石膏湯。加玄參梔子桔梗鼠黏子連翹大青小青青黛犬劑與之。二證若大便秘。宜按之。其邪已結于內。便鞕宜察。邪結中焦。小承氣湯調胃承氣湯下之。邪結下焦。少腹堅痛。始用大承氣湯下之。　傷寒溫疫

治及難治者。皆屬下元虛。　傷寒溫疫三陽證中。往往多帶陽明者。以手陽明經屬大腸。與肺爲表裏。同開竅于鼻。足陽明經屬胃。與脾爲表裏。同開竅于口。凡邪氣之入。必從口鼻。故兼陽明證者獨多。　邪在三陽。法宜速逐。遲則胃爛發斑。或傳入于裏。則屬三陰。邪熱熾者。令陰水枯竭於法不治矣。此治之後時之過也。　傷寒陰陽易之爲病。其人身體重。少氣少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩灰主之。取婦人中裩近陰處。

剪燒灰。以水和服方寸匕。日三。小便即利。陰頭微腫則愈。婦人病。取男子褌燒灰。大病差後勞復者。枳實梔子湯主之。枳實三枚。梔子十四枚。豉一升。綿裹。以清漿水七升。空煮取四升。納枳實梔子。煮取二升。下豉更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃。如博棋子大五六枚。傷寒差已。後更發熱者。小柴胡湯主之。脉浮者。以汗解之。脉沉實者。以下解之。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。其爲證神思嘗默然。飲食不美。亦不惡。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。百合地黃湯主之。汗後者。百合知母湯。下後者。滑石代赭湯。吐後者。百合雞子湯。

近代醫師鹵莽。既不明傷寒治法。又不識襍證類傷寒。往往妄投汗下之藥。以致虛人元氣變證叢生。元氣本虛之人。未有不因之而弊者矣。戒之哉。汗下之藥。焉可嘗試也。

時氣傷寒。（除陰症不可服。）苦參（一兩）水酒各一碗。煎八分。重者。水酒各半服之。一汗而愈。不論傷寒。久近。立效。本草云。天行尤良。

暑諸病喘嘔。暴注。下迫。霍亂轉筋。身熱瞀鬱。小便濁

赤皆屬於暑。忌破氣升復忌下。濕潤辛溫辛燥熱發散閉氣之藥。宜清暑益氣。健脾甘寒甘溫辛寒酸寒苦寒。

黃連　香薷　葛根　甘草　人參　黃芪　白朮　白藊豆　神曲　橘皮　白茯苓　木瓜　麥冬　五味子　白芍　白梅　烏梅

大約用清暑益氣湯。香薷飲。生脉散。凡病暑之人。其氣必虛。暑傷氣無氣以動。故當補氣爲本。惟肺熱多火者。忌人參朮。

中暑瘈昏暈。急以童便灌入。即省。忌宜藥。俱同暑。

又方用絲瓜葉一片。白鹽梅肉一枚。并取核中仁共研如泥。新汲水調灌。立瘥。兼治中暑霍亂有效。

大陽病中暍　忌藥。同暑。宜人參白虎湯。有肺熱火病人。不能服參者。用竹葉石膏湯。脾胃作瀉者。水調六一散。

霍亂見胃虛條內。忌宜藥。俱同。

痓夏由于脾胃薄弱。胃家有濕熱。及留飲所致。忌藥同前。宜益氣健脾。酸寒苦寒。淡滲。人參　白朮　半夏　陳皮　白茯苓　白扁豆　白芍　木

瓜　澤瀉　兼服生脉散。

濕諸痙強直。積飲。痞膈。中滿。霍亂吐下。體重腑腫。肉如泥。按之不起。皆屬于濕。經曰。地之濕氣感則害人皮肉筋脉。故其病筋骨疼痛。腰重痛。不可轉側。身重。四肢不利。濕在上。病嘔吐。頭重。胸滿。濕在中。病腹脹中滿。泄瀉。濕在下。病足脛跗腫。脚氣。膝瘡久不愈。忌濕潤甘鹹之藥。宜散滲泄燥辛苦。木瓜　薏苡仁　术　石斛　萆薢　石菖蒲　茯苓　佐以防風。葛根　寒濕加　半夏　五加皮　風濕加

獨活　濕熱加　黃檗　車前子　木通　甚者。

加　漢防已

脚氣由於濕熱　忌溫燥濕熱補氣復忌破氣升之藥。宜清熱除濕利小便甘平酸寒苦寒辛溫淡滲。

黃栢　石斛　麥冬　木瓜　石菖蒲　薏苡仁　車前子　茯苓　木通　澤瀉　萆薢　防已

燥諸澀枯涸乾勁皴音青揭皆屬于燥。角弓反張筋攣急不舒。舌強不能言。二便閉澀。口渴口乾舌苦。皮膚皴揭。毛髮脆折。津液不生。血枯胃稿。以致飲食不化。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

噎膈吐食。忌升散破氣下。辛燥大熱溫之藥。宜潤益血。辛甘寒酸寒鹹寒有熱證者。宜兼清熱。麥冬 當歸 地黃 肉從容 蜜 胡桃 甘菊花 麻仁 人參 枳實 天冬 五味子 酸棗仁 白芍 蕨漿 蘆根汁 童便 梨汁 韭汁 佐以薑汁

火諸熱瞀瘈。音茂記暴瘖。胃脉。躁擾狂越。罵詈驚駭。腑臟疼。酸氣逆上衝。禁慄如喪神守。噎嘔瘡瘍。喉痺。耳鳴及聾。嘔漏溢。食不下。目昧不明。暴注。瞤音純瘛暴病暴死。皆屬于火。忌補斂升發閉氣。辛燥溫熱之藥。宜降折下。鹹寒苦寒辛寒甘寒。大黃 童便 芒硝 黃芩 黃連 黃檗 連翹 石膏 山梔 玄參 生甘草 知母 天冬 麥冬 生地 藍汁 虛者。宜甘寒鹹寒以滋水。不宜用苦寒傷胃。

猝眩仆 九竅流血。多不治。忌藥。同火。宜服童便 鹽湯 竹瀝 藍汁 梨汁 生犀角汁

猝心痛 忌藥。同火。宜服山梔 白芍 延胡索 生甘草 鹽湯 蘇子

国立国会図書館 タイトル『本草匯卷1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

目暴赤腫痛甚見肝實條內。忌宜藥俱同。

二便忽閉以利小便爲先。忌藥同火。宜降潤苦寒甘寒辛寒利竅。大黃　蘇子　生蜜　麻仁　桃仁　石膏　知母　天冬　麥冬　黃芩　山梔　滑石　澤瀉　猪苓　車前子　木通　海金沙

頭面赤腫　忌藥同火。宜清暑解毒發散苦寒辛寒甘寒鹹寒。甘菊花　鼠黏子　連翹　荆芥　薄荷　蟬蜕　大黃　玄參　石膏　知母　竹葉　生甘草　童溺

忽大渴思氷水　忌藥同火。宜潤生津液辛寒甘寒鹹寒。石膏　知母　玄參　麥冬　竹葉　栝蔞根　五味子　梨汁　蘆粟　童便　涼水　氷

口乾舌苦　忌宜藥俱同火。

暴瘖　忌藥同火。宜降氣發音聲苦甘寒辛涼鹹寒。蘇子　枇杷葉　貝母　桔梗　百部　竹瀝　梨汁　天冬　麥冬　甘草　薄荷　玄參　桑白皮　童便

暴注　忌藥同火。宜利水苦寒酸寒。茯苓　黃

連　黃芩　白芍　生甘草　葛根　滑石　木通
虛者加　人參　蓮肉　白扁豆

躁擾狂越罵詈驚駭　忌藥同火。宜藥同躁擾狂越。
寒鹹寒。　丹砂　牛黃　黃連　黃芩　山梔　滑
石　石膏　知母　童便　大便閉者加大黃下之。
不行加芒硝。

禁慄如喪神守　忌藥同火。宜藥同躁擾狂越。
氣逆衝上　忌藥同火。宜降氣酸斂甘寒苦寒鹹
寒。　蘇子　枇杷葉　陳皮　五味子　番降香

山茱萸　白芍　麥冬　石斛　黃檗　牛膝　桑
白皮　童尿

嗽痰瞀瘈　忌藥同火。宜清熱和肝酸寒苦寒辛
寒甘寒。　白芍　生甘草　竹葉　玄參　黃連
黃檗　生地　甘菊花　麥冬　知母　石膏

雜證門

瘧經曰夏傷於暑秋必痎瘧其證大都多熱多寒或
熱多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單寒不熱或
先寒後熱或先熱後寒或有汗無汗或汗少汗多或

自汗盜汗。或頭疼骨痛。或大渴引飲。或口苦舌乾。或嘔吐不思食。或煩躁不得眠。或大便燥結。或瀉利。或連發。或間發。或三日發。或發于陽。或發于陰。要皆中氣不足。脾虛胃弱。暑邪乘虛客之而作。雖隨經隨證。投藥解散。必先清暑益氣調理脾胃爲主。有食者。兼消導奪食。有風兼散風。有老痰伏飲者。兼豁痰逐飲。感瘴癘者。兼消瘴癘。汗多者。固表。無汗者。解表。泄利者。升發。兼利小便。便燥者。兼益陰潤燥。病有陰陽。藥分氣血。證有緩急。治因先後。人有虛實。法異攻補。久而不解。必屬于虛。氣虛者補氣。血虛者補血。兩虛者氣血兼補。非大補眞氣。大健脾胃。不得瘳也。忌破氣下之藥。瘧必由于中氣虛。破氣則傷中氣。邪不得解。甚則中滿不思食。作泄惡寒。口乾。惟傷食宜消不同此法。誤下。則邪氣陷于內。變爲滯下。或腹滿腫脹。嘔惡不思食。凡屬破氣下泄藥。切戒勿施。宜清暑益氣。健脾開胃。兼消痰。宜分藏府。手足六經。所見證施治。

先清暑熱多者。宜服白虎湯加減。硬石膏自一兩至四兩　知母自四兩至二兩四錢　竹葉自一百片至四百片　麥冬自八錢至

三兩 自一小撮 二錢 粳米 至二大撮 病人素虛。或作勞者。加人參。自三錢至一兩 有痰。加橘紅 三錢 竹瀝 一盃 大渴者。加栝樓根。三錢至六錢 不渴者。用清暑益氣湯。兼飲食停滯者。加枳實青皮草果 一二劑。食消即止。多服則損中氣。其藥俱宜黃昏煎。以井水澄冷。須露一宿。五更時溫服。蓋瘧乃暑邪爲病。暑得露則散也。

足太陽經 屬膀胱。其證。令人腰痛頭痛。頭重。寒從背起。先寒後熱。熇熇暍暍然。熱止汗出難已。或遍身骨痛小便短赤。 羌活 一錢至二四錢 陳皮 去白二錢五分 黃芩 二錢 前胡 二錢 甘草 炙五分 猪苓 一錢 知母 二錢五分 若口渴者。即兼陽明。宜加石膏麥冬。倍知母。渴而汗少。或無汗。再加葛根。若涉深秋。或入冬。無汗。宜多加蔓皮。因虛而無汗。或汗少者。加人參。三錢 二三露一宿。發日五更溫服。因虛汗多者。加黃耆。三四錢 桂枝 七八分 汗止。即去桂枝。不可多服。若病人素有熱者。勿服桂枝。以芍藥五味子代之。若發于陰。并加當歸。小便短澁。或赤者。與六一散二三服。有濕者。以猪苓茯苓代滑石。下午。服理脾健胃藥。 橘紅 二錢五分

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

白芷蔻五分　白茯苓三錢　山查三錢　麥芽炒三錢　藿香一錢　人參二錢　白朮二錢　白芍三錢　白扁豆三錢　有肺火者去人參白朮加麥冬五錢　石斛三錢　烏梅肉一枚　停食者必惡食加山查傷肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實草果各七分　傷麪食者加炒萊菔子食消即已不可多服多則損中氣胃家素有溼痰者其證不渴寒多方可用半夏橘紅二朮太劑與之嘔甚者兼用薑皮

足陽明經屬胃其證發熱頭疼鼻乾渴欲引飲目眴眴不得眠甚則煩躁畏火光人聲木聲宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不嘔者可加乾葛二三錢病人虛而作勞者加人參汗多加白朮痰多加貝母橘紅得汗即解寒熱俱甚渴甚汗多寒時指爪皆紫黯者加桂枝七八分久而不解屬氣虛用人參兩許薑皮兩許煎成露一宿五更溫服下午服理脾健胃藥如前方加減

足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇痛或嘔宜服小柴胡湯渴者去半夏加石膏麥冬肺家有

熟者。去人參加知母倍麥冬。有痰不渴者。本方加貝母二錢至八錢　术　茯苓各三錢　薑皮一錢至三四錢　病人陰虛而有熱者。雖嘔吐。忌用半夏生薑。悞投則損人津液。令人聲啞。宜用竹茹橘皮麥冬。白茯苓烏梅以代之。○以上三陽經瘧邪客之者其證多熱多渴。亦易得汗。藥宜大劑急逐暑邪。毋使遲留。則病易愈。繼以理脾開胃。大補眞氣。蔑不瘳矣。邪在三陽。藥宜辛寒。如石膏知母柴胡。甘寒。如葛根麥冬。竹葉粳米。苦寒。如黃芩之屬。爲君。乃可以散暑邪。除熱渴。墜頭疼。兼寒甚者。則間用辛溫。如薑皮桂枝。以爲嚮導。以伏其邪。則病易退。凡寒甚者。病因于虛。或作勞者。亦因于虛。皆宜甘溫。以人參黃耆术爲君。佐以辛甘。如桂枝薑皮之屬。脾胃虛弱。飲食不消者。則補之以參术。佐以消導。如白豆蔻麥芽砂仁。草豆蔻枳實橘皮山查之屬。在陰分者。則以當歸牛膝爲君。佐以薑桂。如熱甚而渴者。去薑桂。加知母麥冬。竹葉牛膝鼈甲。

足厥陰經屬肝。其證先寒後熱。色蒼蒼然善太息。甚者狀如欲死。或頭疼而渴。宜先服三黃石膏湯。加柴

胡髓甲陳皮以祛暑邪後用當歸兩許橘皮三四錢甲四五錢牛膝兩許柴胡一二錢濃煎露一宿發日五更溫服如熱甚而渴加栝樓根三四錢麥冬五六錢竹葉一百片知母三四錢髓甲五六錢如脾胃薄弱或瀉泄去當歸加人參三五錢如有肺火不可服參者祇照本方多服自愈寒多或寒甚指爪青黯者加桂枝薑皮人參

足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧必寒從中起善嘔嘔已乃衰然後發熱熱過汗出乃已熱甚者或渴否則不渴喜火宜服桂枝湯建中湯病人虛者以人參薑皮各兩許濃煎露一宿五更溫服有痰者宜加半橘皮各三四錢

足少陰經屬腎其證寒熱俱甚腰痛脊強口渴寒從下起小便短赤宜先服人參白虎湯加桂枝以祛暑邪後用髓甲四五錢牛膝兩許熱甚者加知母麥冬各四五錢寒甚者加桂枝錢許嘔則兼加薑皮三四錢如熱甚而嘔者去桂枝薑皮加竹茹三錢人參橘皮各三四錢用牛膝桂枝者肝腎同一治也瘧病多挾痰以故熱痰須用貝母爲君自三錢至八錢竹瀝竹茹栝樓根

橘紅　白茯苓　稱是以佐之甚者可加霞天膏　如寒痰發瘧寒不渴者用半夏　白朮　橘皮爲君多加生薑皮

瘧病多挾風有風者必用何首烏爲君　葛根　薑皮　羌活以佐之不頭痛者除羌活　暑邪盛解散不早陷入于裏則變爲滯下急投芩連芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裏分消之脾胃薄弱者加人參扁豆蓮肉大劑與之以愈爲度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經隨證以治之不煩多藥而自止也　又暑熱濕之邪內伏不效者用獨雄丸立愈　凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發于陰或間日一發或三日一發三日者爲病深須以鼈甲牛膝何首烏爲君橘皮爲佐發於夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以薑皮熟其勿入大劑與之日三乃差　附諸瘧主治　熟多宜　貝母　石膏　麥冬　橘紅　乾葛　滑石　竹葉　牛膝　知母　黃芩　柴胡　白茯苓　烏梅　何首烏　壯蠣　鼈甲　寒多宜　桂枝　薑皮　朮　人參　黃耆　當歸　橘紅　半夏　草

豆蔻　炙甘草　汗多宜人參　白朮　黃耆
秋冬加　桂枝　無汗宜　乾葛　柴胡　石膏
羌活　薑皮　人參　蒼朮　瘧母宜　鼈甲　射
干　牡蠣　桂　三稜　橘皮　縮砂蓉　青皮
人參　凡瘧疾多熱久不解者。其人必本陰虛。法當
益陰除熱。非鼈甲牛膝不能除也。多寒而久不解者。
其人必本陽虛。非人參白朮黃耆不能除。按瘧有
山嵐瘴氣。停痰留飲而發者。古方類用常山砒霜等
吐之。今人誤執其方。見瘧輒用不知二藥有大毒。損
人真氣。犯之多致危殆。愼之愼之。

滯下　俗呼痢疾。其證腹痛便膿血。或赤。或白。或赤白
相雜。或下純血。或下紫黑血塊。或如豆汁。或如魚凍。
或如屋漏水。或下純黃積類多裹急後重登圊而不
得便。小便短赤不利。或發熱。或口渴。甚則嘔惡不思
食。此皆暑溼之邪。與飲食積滯。膠固腸胃而作。必先
祛暑滲溼。安胃爲主。傷氣分。則調氣益氣。傷血分。則
和血補血。挾瘀血則宜行血。藥雖因證而設。要皆以
補養胃氣爲急。故其證以噤口痢爲最重。胃氣一絕。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

則不可治矣。故曰安穀則昌。絕穀則亡。俗治多藉口迎而奪之之說。輕用大黃朴消。及誤用巴豆牽牛。以致洞泄腸開而斃。又有妄投訶子粟殼。亞芙蓉肉豆蔻收澁之劑。以致便閉腹脹。或溼熱上攻。肢節腫脹。拘攣痛不可忍。難以救療。愼之愼之。忌破氣閉氣收澁燥濕熱鹹寒滑膩之藥。宜清熱消積開胃氣升利小便　黃連　黃芩　白芍　紅麴　山查　廣皮　升麻　葛根　甘草　滑石　蓮肉　烏梅　白扁豆　如胃傷弱。加人參三四錢　蓮子四十粒　橘紅二錢　升麻七分　如腹痛。以黃連四錢　白芍三錢　炙甘草一錢五分　黃蘗一錢　升麻七分　煎服。如裏急。同土藥加當歸二錢　如後重甚。加檳榔一錢五分　枳殼一錢五分　木香汁七匙　如口渴。去木香。倍滑石。如小便赤澁短少。或不利。亦倍之。赤多。倍烏梅。山查。紅麴。白多。加吳茱萸七分　惡心欲嘔。即嚥口痢多用人參。蓮肉。扁豆。白芍。以綠色升麻七分　佐之。久痢不止。加肉豆蔻一錢　人參三錢　砂仁一錢五分　白茯苓二錢　凡滯下。非元氣壯實。多敢能食之人。愼勿輕用大黃。巴豆。牽牛等藥。復有

毒痢一證或痧毒內陷下膿血各藥不效者加忍冬藤爲君地榆丹砂犀角汁次之凡産後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅麴升麻益母草炙甘草滑石末足矣若惡露未盡兼用乳沒各七分五厘炒砂仁一錢久之自愈血虛可加阿膠三錢凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉署用升麻未滿七月勿用滑石

瀉利俗呼泄瀉因于濕忌濕潤破氣下苦寒滑利之藥宜安胃補脾升便人參白茯苓蓮肉白藊豆白朮車前子黃連倍芍藥蓮肉暑澀爲病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃連爲君佐以乾葛升麻由于感風寒者二朮吳茱萸砂仁陳皮乾薑紫蘇主之若由飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉豆蔻

五疸方書所載五疸酒食大饑後過飽女勞失治而

成然其證必由溼熱傷脾及飲食停滯又有瘀血發黃一證方所不載分別一誤則藥不對證多致不救慎之慎之忌破氣閉氣下鹹滑利滯膩潤燥熟之藥有瘀血者兼忌酸寒宜清熱利水除濕養胃氣有停滯者宜消積滯有瘀血者宜行血茵陳蒿湯

黃連　苜蓿酒疸非此不愈　梔子　紫草　梧樓根　秦艽

黃芩　滑石　車前子　白蘚皮　仙人對坐草

白茯苓　連錢草一名蟹甲草一名九里香虛者取汁入薑汁少許飲之良　加人參停滯者加紅麴橘紅穀麥芽山查瘀血加琥珀壯丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲黃五靈脂韭元氣壯實者服前藥瘀血不行可加熟大黃虛者勿用

痰

由於熱

忌燥溫熱補飲升之藥宜降潤清熱苦寒辛寒佐以鹹寒

杷葉　麥冬　黃芩　桑白皮　薄荷　百部　梧樓根及仁　桔梗　貝母　蛤粉　竹瀝　童便　膠囘者加霞天膏并用猫兒刺

由於風寒

忌補飲濕潤酸鹹之藥宜降氣辛散

杏仁　天麻　前胡　半夏　南星　葛根　桑白

皮　薄荷　白前　生薑汁　由于〔淫〕　忌潤鹹酸滯膩發濕之藥。宜健脾燥溼辛散佐以淡滲。人參　二朮　橘紅　半夏　桑白皮　白茯苓　澤瀉

〔飲〕如涎而薄者。或如涎而稠者。伏于胸中。及脾胃間。或吐酸水。苦水。黃水。綠水。或伏而不吐。上支心胸。胃脘作痛。不可忍。按之不得下。或發寒熱。嘔吐不能飲食。忌宜藥。俱同脾虛證內。停飲條。

〔諸氣〕氣有餘。卽是火。忌升閉氣。酸斂滯膩之藥。

〔虛〕者宜降補斂。調溫酸辛甘。蘇子　枇杷葉　麥門冬　橘紅　蘆根汁　甘蔗　番降香　泥香　鬱金　甘草　白豆蔻　童便　五味子　白芍　人參　〔實〕者宜破散香燥。因虛極而氣不得行者。加人參　辛苦辛寒。枳殼　青皮　檳榔　厚朴　木香　沉香　香附　烏藥　降香　藿香　縮砂蔻

〔鬱〕忌酸斂滯膩補氣閉氣之藥。屬情抱者宜開發志氣。調氣散結。和中健脾。遠志　貝母　鬱金　石菖蒲　香附　蘇子　橘紅　白豆蔻　木香

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

蘇合香　縮砂蓽　麥冬　屬五藏者。木鬱達之宜升吐。升麻　柴胡　川芎　瓜蒂　人參蘆　火鬱發之宜散。升麻　葛根　柴胡　防風　羌活　土鬱奪之宜下。檳榔　枳實　厚朴　大黃

金鬱泄之宜降。橘紅　蘇子　桑白皮　猪苓　澤瀉　木通　赤小豆　車前子　烏蠶魚

閉格　不得大小便爲閉。是熱在丹田也。吐逆水漿不得下。爲格。是寒反在胸中也。陰陽易位。故上下俱病。先投辛香通竅。下降之藥。以治其上。次用下泄苦寒之藥以通二便。此急證法。難緩治。總有裏虛遺後再補。忌升補斂閉氣。酸之藥。　宜降下。辛寒辛溫。

沉香　白豆蔻　丁香　蘇子　龍腦香　蘇合香　橘紅　生薑　藿香　次用大黃　黃蘗　知母　滑石　木通　車前子　牛膝

噦　俗呼呃逆。久病沉痼而發者。屬眞氣虛。多不治。忌破氣升散之藥。　宜補斂甘溫甘寒。　人參　黃耆　炙甘草　麥冬　五味子　益智子　白芍　石斛

傷寒失下而發者　忌補斂酸燥熱滯膩之

藥。宜下大小承氣之類。便不鞕閉。按之腹中和軟。未經汗出者。宜辛寒解表。白虎湯之類。氣逆衝上而發者。忌升補之藥。宜降氣甘寒鹹寒。蘇子　橘紅　枇杷葉　竹茹　蘆根汁　麥冬　童便

因痰水停膈而發者。忌升潤。苦寒甘寒酸寒之藥。宜降氣開痰。辛散。橘紅　蘇子　貝母　桑白皮　半夏　旋覆花　生薑　白豆蔻

吐血。咯血。鼻衄。齒衄。耳衄。舌上出血。忌升提發散下。破血補氣。閉氣。破氣。溫熱辛燥。復忌極苦寒傷胃。之藥。宜降氣。清熱。涼血。益陰。兼行血。鹹寒。酸寒。甘寒。蘇子　麥冬　橘皮　枇杷葉　降香　鬱金　天冬　沙參　牛膝　阿膠　生地　枸杞子　五味子　鼈甲　白芍　犀角汁　牡丹皮　青蒿　剪草　白藥子　童尿　側栢葉　小薊　茅根　檽灰　藕節　當歸　蒲黃

蓄血。俗名內傷。或積勞。或多怒。或飽後行房。或負重努力。或登高墜下。或奔逐過急。皆致蓄血。其證多發熱。其熱類外感。而不頭疼。不作渴。天明少間。至午復

劇有汗汗多劑頭而還自汗無氣以息目光短不思飲食不得眠二便自利小便或赤大便或泄忌破氣復忌補氣下苦寒辛燥之藥宜行血辛溫佐以鹹寒瘀血行後宜補血益脾和肝

延胡索　桂有火人勿用　鬱金　歸尾　蘇木　番降香　乳香　沒藥　穿山甲　麝蟲　赤芍　五靈脂　蒲黃　紅麴　馬鱗竭　韭汁　童尿　桃梟

甚者用大黃花蕊石瘀行則止勿過劑如元氣虛脾胃素弱者慎勿輕用大黃如瘀血行後宜生地　續斷　白膠　歸身　麥冬　牛膝　白芍　炙甘草　酸棗仁　大棗　龍眼肉　枸杞子　山茱萸

頭痛挾風寒者忌補斂之藥宜辛溫發散

羌活　防風　細辛　荊芥　薄荷　川芎　藁本　升麻　白芷　蔓荊子　生薑　葱白　挾邪熱者忌藥同挾風寒宜辛寒苦寒解散

薄荷　黃芩酒炒　茅茶　黑豆　烏梅　甘菊花　土茯苓　熱極自昏便燥者加酒蒸大黃挾痰者忌升補斂酸甘滯膩之藥宜豁痰降氣辛燥　蘇

子 橘紅 貝母 半夏
麻 陰虛者 忌辛熱發散之藥 前胡 竹瀝 朮 天
寒酸寒 生地 甘菊花 當歸 天冬 麥冬
枸杞子 黃檗 白芍 忍冬 五味子 烏梅
脅稜骨痛 忌宜俱同陰虛頭痛
齒痛 忌升補斂燥熱辛溫之藥 宜清熱凉血苦
寒辛寒甘寒鹹寒 麥冬 生地 赤芍 丹皮
竹葉 知母 黃連 黃芩 黃檗 玄參 石膏
薄荷 蘇子 甘草 童便 下焦 銀屬胃與大

腸火宜石膏 熟大黃 麥冬 黃芩 黃連 赤
芍 生地 生甘草 青黛 細辛 西瓜皮灰
薄荷 枇杷葉 蘇子 木通 眞牙浮動及黑爛
屬腎虛有火已見腎虛條內忌宜藥俱同
胃脘痛 因火者 忌補斂燥熱之藥 宜降苦寒
甘寒鹹寒辛寒 蘇子 橘紅 黃連 山梔 麥
冬 炙甘草 石膏 知母 玄參 童溺 因寒
者 忌破氣滯膩苦寒之藥 宜辛溫發散 橘皮
草豆蔻 益智子 丁香 桂 白朮 藿香

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

白豆蔻　縮砂蔤　吳茱萸　厚朴　香附　乾薑
因宿食者。忌升補斂苦寒之藥。宜消導兼降
氣。山查　橘皮　草果　紅麴　枳實　朮　檳
榔　草豆蔻　青皮　厚朴　穀麥芽　縮砂蔤
因脾胃虛弱以致食停者。消導藥中。加人參。因癆
血者。忌補氣酸斂之藥。宜辛溫苦溫以行血。桃
仁　延胡索　紅麴　紅花　山查肉　牡丹皮
番降香　韭菜　通草　鬱金　肉桂　三稜　童
溺　琥珀　菴蔺子　牛膝　赤芍　因血虛者。按

之則痛止。忌破氣復忌補氣。燥熱辛溫之藥。宜
潤補斂甘寒甘溫。麥冬　炙甘草　酸棗仁　石
斛　白芍　生地　當歸　因蟲者　忌補升發散
甘之藥。宜殺蟲苦酸。鍚灰　苦楝根　檳榔
使君子　鶴虱　雷丸　蕪荑　薏苡仁根　大黃
烏梅　因惱怒者　虛弱人。忌破氣。壯實人。忌補
氣總忌酸斂升之藥。宜降氣辛溫。蘇子　枇杷
葉　白豆蔻　番降香　縮砂蔤　木香　橘紅
延胡索　五靈脂　因痰飲者　忌宜藥俱見痰飲

腹痛　因于寒者忌苦寒下利之藥。宜溫中辛散

白朮　厚朴　乾薑　吳茱萸　桂　炙甘草

木香　縮砂蔻　橘皮　因于熱火在少腹則絞痛。

忌辛熱香燥補斂之藥。宜甘苦寒。山梔仁

麥冬　石斛　白芍　甘草　桔梗　黃芩　黃連

滑石　木通　戎鹽　諸痛不可按屬實。忌補

氣大熱之藥。宜破散疏利苦寒。枳實　青皮

檳榔　三稜　滑石　蓬莪茂　木通　大黃有積滯宜。

無者勿用。諸痛可按屬虛。忌破氣破血下利發散之

藥　宜補氣血甘溫酸斂。人參　二冬　黃耆

生地　當歸　炙甘草　白芍　薯蕷　酸棗仁

五味子

痺拘攣而痛也。因風寒濕三者合而成。風氣勝者爲

行痺。寒氣勝者爲痛痺。濕氣勝者爲着痺。忌下收

斂酸寒苦寒鹹寒之藥。宜辛散行氣燥濕甘溫淡

滲。漆葉　續斷　黃耆　甘草　甘菊花　車前

子　蒴藿　防巳　白朮　防風　羌活　獨活

泰艽 牛膝 木瓜 天麻 茯苓 澤瀉 菖蒲
桑寄生 狗脊 蔓荊實 杜仲 白蘚皮 石
斛 細辛 松節 松葉 菓耳 原蠶沙 威靈
僊 海風藤

痿屬濕熱經曰治痿獨取陽明。忌破氣升辛耗發
散之藥。宜大補氣血清熱除濕甘寒甘溫苦寒酸
寒。人參 黃耆 二朮 炙甘草 生地 麥冬
白芍 木瓜 石斛 薏苡仁 黃蘗 茯苓
車前子 澤瀉 木通 黃芩

交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂
至曠氣乖亂不循常道法當宣吐以開提其氣使關
門清利得司泌別之職則愈矣。忌破氣燥熱之藥
宜升清降濁兼補氣淡滲。升麻 柴胡 蘇子
降香 橘紅 人參 木 茯苓 澤瀉 豬苓
木通 滑石 車前子

鬼痓尸痓飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣。乘虛
中人或遍身青黯或忽消瘦聲啞。面色青黃不定。或
忽驚厥。目直視。手忽拳。或遍身骨節疼痛非常。忌

破氣。復忌補氣。升燥熱酸斂之藥。宜辟惡氣。安神鎮心。辛香發散。金石鎮墜。生天竺黃　琥珀　沉水香　木香　麝香　安息香　龍齒　犀角　金銀箔　虎骨　代赭　天靈蓋　真珠　雄黃　贅門　牛黃　丹砂　蘇合香　龍腦香　乳香　檀　獺肝　生地　菖蒲　遠志

婦人門

赤白帶下。婦人多憂思鬱怒。損傷心脾肝火時發血。走不歸經。所以多患赤白帶也。白帶多是脾虛。蓋肝氣鬱。則脾受傷。脾傷。則濕土之氣下陷。是脾精不守。不能輸爲榮血。而下白滑之物矣。皆由風木鬱于地中使然耳。法當開提肝氣。補助脾元。宜以補中益氣湯。加酸棗仁茯苓山藥黃蘗蒼朮麥冬之類。濃煎不時飲之。再用六味地黃丸。中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝。蜜丸。光大如豆。空心飢時。吞下五六錢。陰虛火熾。加枸杞子五味子黃蘗。白帶多屬氣虛。補氣健脾。治法之要領也。

帶下如濃泔而臭穢。特甚者。濕熱甚也。且多有濕瘀

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

下墜者。宜蒼朮白朮黃檗黃芩茯苓車前子爲主。佐以升提。帶下如雞子清者。脾腎虛極也。面色必不華。足脛必浮。腰腿必酸。宜五味子八味丸。間用開脾養心之劑。如歸脾湯之類。陰虛有火。宜八味丸中加五味子菟絲子車前子黃檗。叔和云崩中日久爲白帶。漏下多時骨髓枯。蓋言崩久氣血虛脫而白滑之物下不止耳。此證雖有氣血寒熱之分。要歸總屬于虛。赤淋多因于心火肝火。時熾不已。久而陰血漸虛。中氣漸損。遂下赤矣。治宜養心爲主。兼以和肝緩中。涼血清氣。赤帶久不止。則血虛。宜膠艾四物湯加便煆牡蠣粉。酸棗仁麥冬。　標急而元氣不甚憊者。先救其標。標急而元氣衰劇者。則當本而標之。可也。忌破氣。降溫熱之藥。宜補斂。清熱辛甘苦寒。佐以淡滲。生地　人參　白芍　阿膠　山茱萸　黃檗　五味子　麥冬　杜仲　牛膝　白茯苓　白膠　枸杞子　續斷　車前子　澤瀉　蛇牀子　香附　補骨脂　牡蠣　艾　二朮

血枯經閉由于脾胃薄弱。氣血不生。忌破氣破血

燥熱膩膈滑腸升發苦寒之藥。宜補脾胃甘溫甘平。　人參　蓮肉　酸棗仁　白扁豆　甘草　茯苓　薯蕷　橘紅　白芍　縮砂蔻　兔絲子　牛膝　牡丹皮　白膠　阿膠　芡實　麥冬

經行先期爲血熱。忌升補氣辛溫燥熱之藥。如香附當歸烏藥艾類。宜涼血清熱補肝腎兼降氣及甘寒苦寒酸寒。　生地　牡丹皮　白芍藥　天冬　麥冬　枸杞子　杜仲　青蒿　枇杷葉　蘇子　鱉甲　阿膠　黃檗　黃芩　知母

經行後期爲血虛。忌行血破氣燥熱苦寒之藥。宜補肝腎甘溫酸溫。熟地　著蕷　人參　兔絲子　山茱萸　杜仲　續斷　阿膠　艾　五味子　當歸　枸杞子　白膠　牛膝

月事過多屬心火盛脾氣弱。忌破氣降辛溫苦寒之藥。宜涼血飲攝酸平甘寒。　麥冬　生地　瀉泄禁用。　青蒿　生甘草　牡丹皮　白芍　酸棗仁　五味

崩中屬氣血兩虛有熱。忌破氣行血降溫熱辛燥蓄寒之藥。宜補氣血兼清熱甘溫甘寒酸斂。人

參 黃耆 生地 熟地 地榆 芍藥 白膠
阿膠 香附 續斷 甘草 麥冬 山茱萸 杜
仲 五味子 白茅根 蒲黃炒 桑耳灰 側栢葉
艾葉 木耳灰

熱入血室 類傷寒或經事適來忽住或屆期不行忽
發大熱口渴或厥但不頭疼爲異于傷寒耳 忌補
氣溫燥辛燥收斂下泄大熱升發之藥 宜行血清
熱甘寒鹹寒苦寒 生地 牡丹皮 蒲黃 蘇木
牛膝 延胡索 麥冬 犀角 白芍 黃芩

荊芥穗 童溺 如便閉加大黃

種子 內分男女氣虛血虛精寒
血熱火熾精滑因證選用 忌破氣破血燥過
用辛熱之藥 宜調氣補血男子宜固精

柔螵蛸 溫平治男子精滑 陽起石 熱治男子精寒 覆盆子 甘溫治男精滑 車前子 甘溫治男精滑
魚鰾 平治男子精滑 鹿茸 溫鹹治男精寒 蓮鬚 甘溫治男精滑 巴戟天 溫治男精寒
何首烏 苦溫益男子氣血 牛膝 苦平治男子血虛陰痿 補骨脂 辛溫治男子精寒陰弱 沙苑蒺藜 甘平男子固精益虛 白膠 溫平治男女氣血兩虛精寒 肉蓯蓉 溫酸鹹治男女血虛精寒 黃蘗 苦寒治男女火熾 人參 微溫治男女氣虛脾胃薄弱

麥冬 甘寒。男女血熱。五味子 酸溫。治男女精滑精寒。天冬 苦寒。治男女火熾。蓮肉 甘平。治男女胃弱精寒。白薇 溫平。女。當歸 辛溫。女。白芍 酸寒。女。紫石英 溫。女。艾葉 辛溫。女。

妊娠惡阻　忌破氣。升散。燥熱。苦寒。滑腸。膩膈之藥。宜順氣。甘寒。酸寒。蘇子 橘紅 枇杷葉 白茯苓 麥冬 蘆根 竹茹 木瓜 白芍 竹葉 人參 縮砂蔤 白梅 烏梅

安胎　忌破氣。破血。升散。辛熱。辛燥之藥。八月以後及胎前滯下者。方可用枳殼。氣虛者不用。三月以前。宜養脾胃。四月以後。宜壯腰腎。補血益陰。順氣。總宜清熟。茯苓 麥冬 蘆根 竹茹 木瓜 白芍 竹葉 著蓆 人參 芍藥 白朮 橘紅 炙甘草 縮砂蔤 艾葉 杜仲 生地 益母草 白膠 烏賊骨 續斷 黃芩 枸杞子 青蒿子 桑寄生 鯉魚 烏雌鷄 葱白

胎漏　屬氣血虛有熱。忌宜藥。俱同安胎條。

難產　忌破氣。破血。收斂之藥。宜補氣血。滑利。潤。人參 柞樹皮 魚膠 冬葵子 千里馬 白

芷梢　牛膝　桂心　當歸　芎藭　益母草　百草霜　石燕　弓弩　麻油　豬脂　酒　生雞子　兔頭　滑石　麝香　預防血暈。一腹痛坐草時。即用蘇木菊花心者一兩。生地黃一兩。降香末二錢。水三盞。煎一盞。加童便半盞。兒墮地。即飲之。永無惡血衝心之患。房中常打醋炭。萬一血暈。亦須此藥。更以家寶丹一丸灌下。神效。凡婦人氣弱者。無氣力送子出產門。須服人參。此藥能兼治橫生倒產。世醫不知也。凡臨產交骨不開。惟濃煮柞木枝湯飲之。則自開。其木枝幹直上。每一葉下。必發一刺。胞衣不下。用乳香沒藥末。各七分五釐。麝香一分。芒硝一錢五分。研細。以酒調服。立下。飲熱童便以滋藥力。更妙。

產後諸病

忌破氣升汗吐下燥苦寒大熱之藥。宜行血。次宜補血。清熱總宜補養肝脾腎。辛溫甘寒酸寒。蘇木　黑豆　鹿角末　紅花　乳香　沒藥　牛膝　炮薑　當歸（脾胃弱者勿用）　益母草　澤蘭　乾地黃　續斷　白膠（天寒無火之人可用）　桃仁（胃弱禁用亦不可過）　桂

杜仲　山茱萸　人參　青蒿　麥冬　白芍藥
五味子

產後少腹痛按之痛甚有結塊名曰枕痛忌酢斂補氣破氣升下汗燥之藥宜行血活血散結兼健脾延胡索　紅藍花　牡丹皮　蘇木　山查肉
益母草　蓬莪茂　蒲黃　白膠　當歸　黑豆
生地　澤蘭　牛膝　五靈脂　縮砂蓉　橘紅
童便　桃仁　乾薑　痛極加乳沒各六七分天寒
加桂暑月勿用肺熱有火勿用

產後少腹痛按之即止者屬血虛忌行血破氣汗吐下燥若寒大熱之藥宜補血補脾和肝乾地黃　白芍　當歸　續斷　白膠　阿膠　牛膝
人參　酸棗仁　麥冬　炙甘草　大棗　薯蕷
橘皮

產後泄瀉忌消導滑腸脈牖發散生冷破氣苦寒之藥宜溫中補氣健脾開胃人參　甘草　薯蕷　蓮肉　藊豆　茯苓　白芍
肉豆蔻內熱津液不足者少用藿香　五味子　橘皮　車前子
補骨脂內熱者少用

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493
ガラス使用

火熾者、勿用。縮砂蔻

產後發熱、或自汗盜汗、忌苦寒發散升提破氣破血下、辛燥大熱寒滑傷脾之藥、宜補血涼血補肝補心生津液兼斂攝實表、乾地黃　炙甘草　白芍　五味子　麥冬　酸棗仁　牡丹皮　童便　青蒿　鼈甲　澤蘭　黑豆　黃耆　人參

產後頭痛、由于血虛、忌發散破血升提辛燥大熱之藥、宜益血涼血降甘溫甘寒佐以酸寒、生地　甘菊　烏梅　麥冬　蘇子　童尿　甘草　當歸　白芍　黑豆　五味子　鼈甲

產後發渴、由于血虛有熱、忌藥同產後發熱、宜補氣血潤肺下降之藥　人參　橘紅　生地　天門冬　麥冬　蘇子　枇杷葉　栝樓仁及根　童便　五味子　竹茹

產後惡寒、由于氣血兩虛、忌藥同產後發熱、宜補氣血溫中甘溫佐以辛溫、人參　黃耆　炙甘

草　乾地黃　龍眼肉　當歸　炮薑

產後〔小便不利〕或短赤。由于腎水眞陰不足。忌利小便餘忌藥。同產後發熱。宜生津液益陰補血涼血清熱甘溫甘寒酸寒。天冬　麥冬　生地　枸杞子　山茱萸　白芍　車前子　牛膝　五味　青蒿子　鼈甲　竹葉

產後〔大便閉結〕由于血枯內熱。忌補氣行血辛熱燥下升苦寒之藥。宜益血涼血潤燥滋肝腎生津液。生地　熟地　天冬　麥冬　五味子　蔗漿　牡丹皮　肉蓯蓉　當歸　麻仁　人乳　蜜

產後〔不得眠〕忌藥。同產後大便閉結。宜補心降心火。補肝。補脾陰。兼清內熱。生地　麥冬　茯神　丹參　沙參　酸棗仁　白芍　竹葉　遠志　蓮肉　龍眼肉

產後〔腹脹〕由于陰血虛。脾陰虛。忌破氣寬中。升提發散消導。吐下。甘苦寒。鹹寒。大熱溫燥滯膩之藥。宜益脾陰。補脾和胃。酸寒收斂。甘溫。白芍　酸棗仁　人參　茯苓　石斛　橘皮　著蕷　五味子

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

木瓜　蓮實　車前子　芡實

產後惡心欲嘔或吐由于胃虛。忌升提發散濕潤滯膩苦寒。生冷燥熱之藥。宜降氣補氣安胃酸寒佐以辛溫。蘇子　枇杷葉　竹茹　人參　橘紅　麥冬　白芍　藿香　石斛　木瓜　白豆蔻

生薑　由于寒倍生薑白豆蔻藿香由于熱倍竹茹去生薑白豆蔻藿香。

下乳汁　漏蘆　狗四足　麥冬　人參　栝樓仁　土瓜根　葵子　猪胰　木通

小兒門

痘瘡　血熱證。忌溫補燥熱之藥。如天靈蓋雞冠血桑蠹鮫鯉甲人齒官桂附子丁香木香氷片之類。餘忌藥俱見前。宜涼血活血解毒甘寒苦寒。生地黃　犀角　人中黃　紫草　黃連　麥門冬　牡丹皮　白芍　童溺　連翹　金銀花　玄參　貝母　蟬蛻　鼠黏子

虛寒證。忌汗吐下苦寒酸寒之藥。宜辛甘發散補氣溫瘡密者。佐以解毒。人參　紅鉛　黃耆

甘草　桂枝　丁香　當歸　閉者禁用。　薑肉　糯米　大棗　龍眼肉　乾葛　木香　忍冬藤

痧瘴　此證多有嘔吐者。勿治嘔吐。但治痧毒。則嘔止。況嘔中便有發散之義。　忌破氣。溫補酸斂。辛溫滯膩之藥。　宜清熱透肌。辛寒。甘寒。苦寒。　石膏　鼠黏子　赤樸木　即西河柳。知母　甘草　玄參　麥冬　連翹　薄荷　竹葉　黃芩　黃連　犀　蟬蛻　梧樓根　青黛　蔗漿　貝母　如冬月。佐之以辛散。　荊芥　麻黃去節沫。蜜酒炒。只可用一兩。

痧瘴者。手太陰肺足陽明胃。二經之火熱發而爲病者也。小兒居多。大人亦時有之。殆時氣瘟疫之類歟。其證類多咳嗽。多嚏。眼中如淚。多泄瀉。多痰。多熱。多渴。多煩悶。甚則躁亂。咽痛。唇焦。神昏。是其候也。治法。當以清凉發散爲主。藥用辛寒。甘寒。苦寒。以升發之。惟忌酸收。最宜辛散。誤施溫補。禍不旋踵。辛散。如荊芥　西河柳　乾葛　石膏　鼠黏子　麻黃　清凉。如玄參　竹葉　梧樓根　青黛　薄荷　甘寒。如麥冬　生甘草　蔗漿　苦寒。如黃芩　黃連　貝母　連翹　隨證輕重。制劑大小。中病則已。

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

母太過焉　痧瘴。乃肺胃邪熱所致。初發時。必欬嗽。宜清熱透毒。不得止嗽。瘴後咳嗽。但用貝母苦梗甘草薄荷栝樓根玄參麥冬。以清餘熱。消痰壅。則自愈。慎勿用五味子等收斂之劑。多喘。喘者。邪熱壅于肺故也。慎勿用定喘藥。惟應大劑竹葉石膏湯。加西河柳兩許。玄參薄荷各二錢。如冬天寒甚。痧毒鬱于內不得透出者。加蜜酒炒麻黃。一劑立止。凡熱勢甚者。即用白虎湯。加西河柳。忌用升麻。服之必喘多。泄瀉。慎勿止瀉。惟用黃連乾葛升麻甘草。則瀉自止。瘴家不忌瀉。瀉則陽明之邪熱得解。是亦表裏分消之義也。瘴後泄瀉。及便血。皆由熱邪內陷故也。大忌止澁。惟宜升散。仍用升麻甘草乾葛黃連白芍白扁豆。便膿血。則加滑石末。必自愈。

瘴後〔牙疳〕最危。外用牡黃牛糞尖。煆存性。研極細。加真片腦一分。研勻。吹之。內用連翹乾葛荊芥穗升麻玄參黃連甘草生地黃。水煎。加生犀角汁二三十匙調服。緩則不可救藥。

瘴後元氣不復〔脾胃〕薄弱者。宜用白芍藥炙甘草爲

君。蓮肉山藥白藊豆麥冬青黛龍眼肉爲臣。多服必
漸强。愼勿輕用參朮。
痧後〔生瘡〕不已。餘熱未盡故也。宜用金銀花荆芥穗
連翹玄參甘草懷生地髓。雖胡麻黃連木通。濃煎飲
之良痧瘡不宜依證施治。惟當治本。本者。手太陰足
陽明二經之邪熱也。解其邪熱。則諸證自退矣。
〔嘔吐〕因傷乳食者。忌升苦寒之藥。宜溫中消導。
橘皮　縮砂蓎　枳實　厚朴　穀麥芽　草果
山查　紅麴　半夏　人參

因寒者。忌破氣升苦寒之藥。宜辛熱溫中。藿
香　橘皮　丁香　人參　白朮　生薑　半夏
白豆蔻
因暑者。忌升破氣溫熱之藥。宜清暑補氣安胃
兼利小便。黃連　香薷　人參　木瓜　茯苓
竹茹　石斛　橘皮　甘草　白藊豆　麥冬　白
梅　滑石　木通　澤瀉
有蟲者。忌升甘之藥。宜酸斂佐以苦寒。白芍
藥　五味子　木瓜　黃連　楝根　烏梅　檳榔

樝子肉　木香　使君子　總之數嘔吐宜安胃久則宜補氣。

泄瀉　總忌破氣下滑利滯腻之藥。

因食者。宜和胃消食。　橘皮　草果　紅麴　穀麥芽　白豆蔻　白朮　山查　白茯苓　肉豆蔻縮砂蔻

因溼者。宜燥脾利水。　二朮　橘皮　本瓜　茯苓　澤瀉　車前子　石斛　黃連　薯蕷　猪苓升麻　葛根

因暑者。前藥中加人參　蓮肉　白藊豆　總之當補脾胃兼升清利小便。

急驚　忌補斂升燥熱之藥。宜降清熱鎮墜豁痰和肝。　丹砂　琥珀　牛黃　天竹黃　貝母　竹瀝　鉤鉤藤　僵蠶　茯神　犀角　金箔　膽星　眞珠　全蝎　龍腦　麝香　白檀香

慢驚　多因久吐瀉大病後。陰陽兩虛而成　忌破氣下升苦寒。及治急驚之藥。宜補脾健胃和肝益氣。甘溫酸平。佐以辛熱。　人參　黃耆　茯苓　白芍

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　ガラス使用

甘草　龍眼肉　酸棗仁　辛　橘花　峭
冬　茯神　冬瓜仁　橘紅　石菖蒲　遠志　麥

痃積　忌破氣酸斂燥熱之藥。宜除痃熱兼消導
苦寒甘寒佐以辛寒辛溫　胡黃連　川黃連　肉
豆蔻　穀麥芽　神麴　山查　木香　橘皮　白
蕪荑　使君子　蘆薈　白朮　白芙蓉花　五穀
蟲　雷丸　青黛　厚朴

諸蟲　忌升甘之藥。宜殺蟲。酸寒苦寒佐以辛寒。
梹榔　雷丸　使君子　苦楝根　錫灰　鶴虱

蘆會　芍藥　烏梅　黃連　黃芩　犀牛

胎毒　忌補斂燥熱辛溫之藥。宜凉血清熱解毒
兼發散于外。勿從外治。以致熱毒內攻。生地　玄
參　牡丹皮　黃檗　黃連　忍冬藤　甘草　連
翹　麥冬　貝母　犀角　荊芥　鼠黏子　牛黃

外科

癘風　忌破氣酸斂燥熱下之藥。宜凉血殺蟲祛
風苦寒佐以辛寒辛平。　猢荽　天冬　甘菊花
生地　青黛　漆葉　苦參　何首烏　鼈虱胡麻

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

仁　白芷　荊芥　天麻　續斷　羌活　獨活
半枝蓮　白花蛇　烏梢蛇　皂角刺
癰疽　先發後渴。忌升破氣。辛溫燥熱吐下之藥。
宜活血。涼血。解毒散結。生地　連翹　忍冬藤
白芷　白及　白斂　茜草　紫花地丁　夏枯草
甘菊花　地榆　貝母　鼠黏子　黃蘗　梧樓
根　乳香　沒藥　芍藥　生菉豆　半枝蓮　白
藥子　紅藥子　黃蠟　明礬
黃耆　麥冬　五味子
已潰者加　人參

腫瘍　忌宜藥。俱同癰疽先發後渴。更忌當歸。
癰疽毒氣攻心　發譫語。宜以生綠豆粉。丹砂。乳香。
爲丸。服之
潰瘍　忌閉氣苦寒。破氣。又忌燥之藥。宜補氣血
甘酸溫。佐以解毒。人參　紅鉛　胎骨　黃耆
當歸　地黃　芍藥　甘草　白及　白斂　忍冬
藤　甘菊花　貝母　薯蕷　大棗　五味子　麥
門冬
散毒　外傳　雄黃　雌黃　粉錫　礬石　龍腦香

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493
ガラス使用

松脂 地榆 水銀粉 鐵銹 白及 白斂 漏蘆 葉木 青葙子 楝實 茼茹 石灰 鐵漿 苦參 菖蒲 槲皮 葵根 柳華 五加皮 馬鞭草 梓葉 苧根 紫草 艾灸 止痛排膿 外傅 白及 白斂 大黃 乳香 沒藥 丹砂 紅藥子 龍腦 金華 白藥子 麥飯石 米醋 蜜 去瘀肉 外傅 巴豆霜 輕粉 粉霜 烏梅肉灰 蝕膿 外傅 蛙竹屑 茼茹 雄黃 白芷 大黃

巴豆 地榆 枯礬 長肉收口 外傅 仙人杖 燒灰 人參 金華 白蠟 黃蠟 血竭 蛙竹屑 枯礬 末 黃芩 末 珠 末 象牙 末 鉛丹 紅粉霜 胡粉 芝麻油 豬蹄湯 疔瘡 忌補斂溫熱芝藥。宜凉血活血解毒祛風汗下。 生甘草 辟虺雷 茜草 生地 貝母 紫花地丁 白藥子 大黃 金銀花 蒼耳草 連翹 夏枯草 鼠黏子 礬石 已上內 半枝蓮 牛黃 蟾酥 紅藥子 白及 白斂 已上內外 龍腦 鐵

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493
ガラス使用

鏽　桑硾　銅青　雄黃 巳外

瘰癧 馬刀瘡附 同屬少陽膽經。治法亦同。忌補氣辛熱酸斂之藥。宜清熱散結。和肝涼膽苦寒甘寒鹹寒佐以辛寒。連翹　玄參　忍冬藤　紫背天葵　乳香　麝香　夏枯草　鼠黏子　貝母　天明精　沒藥　薄荷　肥皂莢　皂角子　何首烏　柴胡　黃芩　甘草　昆布　牡蠣　鼈甲　栝樓根　惡實　漏蘆　守宮 煆　猫頭　天荷葉　映山紅　海藻　海蛤　蘇合油　雄黃　礬石　斑猫

蟾酥　鼈虱　胡麻　回燕窩泥

癭瘤 忌宜藥。俱同瘰癧。兼宜　薜荔　半夏　文蛤　南星　通草　生薑

痔 內外二症 忌破氣降燥熱辛溫之藥。宜凉血活血除大腸熱兼升。去血過多者。宜補血甘寒苦寒酸寒。佐以辛寒。生地　五倍子　黃連　黃芩　白芍　地榆　蝟皮　大小薊　黃檗　側柏葉　槐實　皂莢灰　熊膽　升麻　鼈甲　紅藍花　龍腦香　茜草　黃耆　赤石脂　猪懸蹄　蛇蛻

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493　　ガラス使用

梔實　白礬　金銀花　青黛　象牙　末　蛀竹屑
牛角鰓　白蠟

通腸漏　忌破氣下。發散溫燥辛熱之藥。宜涼血。清利濕熱解毒。治漏管。補氣血。長肉。槐實　黃連　黃芩　青黛　地榆　白及　忍冬藤　半枝蓮　生地 已上涼血解毒　豬懸蹄　黃牛角鰓　刺蝟皮　蛀竹屑　明礬　金頭蜈蚣 已上消漏等　黃耆　熟地黃　當歸　人參　白芍　五味子　牛膝　山藥　枯蓼　黃蠟　白蠟　麻皮灰　鉛華　月經布　沒食子 已上補氣血長肉　天明精　地骨皮 俱要鮮者　皮硝　文蛤

並煎濃湯。熏洗。

乳岩乳癰內外吹　忌補氣。升溫補辛熱燥酸斂之藥。宜散結氣。和肝。涼血。活血。清熱解毒。貝母　橘葉　連翹　栝樓根　山慈姑　山豆根　蒲公英　紫花地丁　黃連　甘草　柴胡　白芷　青皮　橘皮　牡鼠糞　王不留行　乳香　沒藥　漏蘆　夏枯草　忍冬藤　栝樓仁　頭垢　人爪　鯪鯉甲　半枝蓮　茜根

国立国会図書館　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号　特7-493　ガラス使用

陰蝕 即下部匿瘡。忌藥同乳巖。宜凉血活血除熱散毒苦寒辛寒。青黛 茜草 苦參 鮮地骨皮 黃檗 小薊 艾葉 馬鞭草 木瓜 牛膝 木通 以上內。全蝎 蛇牀子 橄欖核 蛀竹屑 猪脊髓 青箱子 膩粉 官粉 杏仁 珠末 皂角末 鉛丹 象牙末 龍腦香 白殭蠶 粉霜煙膏 天靈蓋 滴乳石 白蠟 以上外。

金瘡 忌破氣閉氣升散酸斂苦寒冷利燥酸寒之藥。宜止血和血凉血甘溫甘寒佐以辛溫 地黃 當歸 續斷 牛膝 甘草 麥冬 地榆 半夏 茜草 白膠 杜仲 川芎 乳香 沒藥 艾葉 水楊花 釣樟根 黃荆子 炒黑 王不留行 古錢 自然銅 狗頭骨 黃麻皮灰 蘆竹籜 非大小薊 劉寄奴 花蘞石 騏驎竭 內外古石灰 白蠟 降香 海螵蛸 桑柴灰 人骨灰 紫檀末 三七 外

破傷風 忌藥同金瘡佐以祛風藥如白芷荆芥防風柴胡之屬。

国立国会図書館 タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』 請求記号 特7-493 ガラス使用

跌撲傷損　忌藥。同金瘡。宜藥。同金瘡有瘀血倍滯者。宜加行血藥。如桃仁紅花蘇木自然銅蠱蟲千年灰古文錢之屬。

蹉折挫閃　忌宜藥。俱同金瘡跌撲。

火灼　忌燥熱及寒物塗。麪。如井泥。冰。涼水。芭蕉根。醋等類。宜扳散火毒。辛散。潤。甘寒。辛寒。苦寒。柴胡　葛根　甘草　升麻　黃連　麥冬　連翹　栝樓根　石膏　黃檗　雞子油　柏白皮　生胡麻　食鹽　豆醬　黃芩　地榆　山梔　外用好酒滿浸傷處。溫即易之。如遍體被傷。用酒滿浸。時時易之。即不死。一方用蜜水潤之。一方。石灰水和生芝麻油敷。治已爛臭甚者。神驗。一方。用黍米炒黑爲末。將菜汁調敷。神效。

漆瘡　宜藥用　蟹　茱萸皮　鷄子白　杉材　石蟹　漆姑草　韭菜　炒熟。罨上。并中苔泮

右本經疏補入

本草匯卷四終

特 7
一 9
493

国立国会図書館　　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『本草匯巻1-8, 11-18』　請求記号 特7-493

ガラス使用