

# 百病丹方大全

實驗靈效



上海中央書店印



民 間 實 驗

百 病 丹 方 大 全

1935

上 海 中 央 書 店 印 行

實驗 百病丹方大全 目次

第一章 內科醫治法

【一】頭腦病附髮

- |     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 一   | 醫治偏正頭風立愈方 | 一 |
| 二   | 醫治偏頭風立愈方  | 一 |
| 三   | 醫治雷頭風立愈方  | 二 |
| 四   | 醫治頭風頭痛立愈方 | 二 |
| 五   | 醫治頭風熱痛立愈方 | 二 |
| 六   | 醫治頭風畏冷立愈方 | 二 |
| 七   | 醫治頭風睛痛立愈方 | 二 |
| 八   | 醫治頭風目盲立愈方 | 二 |
| 九   | 醫治劇烈頭痛立愈方 | 三 |
| 十   | 醫治陽明頭痛立愈方 | 三 |
| 十一  | 醫治太陽頭痛立愈方 | 三 |
| 十二  | 醫治太陽頭痛立愈方 | 三 |
| 十三  | 醫治風寒頭痛立愈方 | 三 |
| 十四  | 醫治風熱頭痛立愈方 | 四 |
| 十五  | 醫治風虛頭痛立愈方 | 四 |
| 十六  | 醫治氣虛頭痛立愈方 | 四 |
| 十七  | 醫治氣厥頭痛立愈方 | 四 |
| 十八  | 醫治痰厥頭痛立愈方 | 四 |
| 十九  | 醫治痰熱頭痛立愈方 | 五 |
| 二十  | 醫治腎虛頭痛立愈方 | 五 |
| 二十一 | 醫治頭腦暈眩立愈方 | 五 |
| 二十二 | 醫治頭腦鳴響立愈方 | 六 |
| 二十三 | 醫治項強立愈方   | 六 |

- 二十四 醫治項軟立愈方……………六
- 二十五 醫治髮禿立愈方……………六
- 二十六 醫治髮枯立愈方……………六
- 二十七 醫治頭髮短少立愈方……………六
- 二十八 醫治頭髮黃赤立愈方……………六
- 二十九 醫治髮易脫落立愈方……………六
- 三十 醫治少年白鬚立愈方……………七

【二】面病附鬚眉

- 一 醫治面上雀斑立愈方……………七
- 二 醫治面上粉刺立愈方……………七
- 三 醫治面上酒刺立愈方……………七
- 四 醫治面上黑氣立愈方……………七
- 五 醫治面上癢痕立愈方……………八
- 六 醫治面上皺紋立愈方……………八
- 七 醫治面上浮腫立愈方……………八
- 八 醫治兩腮赤腫立愈方……………八

【三】眼病

- 九 醫治眉毛不生立愈方……………八
- 十 醫治眉毛脫落立愈方……………八
- 十一 醫治鬚鬢烏黑神效方……………九
- 十二 秘製白鬚變黑神效方……………九
- 一 醫治雞蒙眼立愈方……………九
- 二 醫治爛眼皮立愈方……………九
- 三 醫治赤眼痛立愈方……………九
- 四 醫治風熱目赤立愈方……………一〇
- 五 醫治肝熱目赤立愈方……………一〇
- 六 醫治肝虛目赤立愈方……………一〇
- 七 醫治赤目痒痛立愈方……………一〇
- 八 醫治赤目皆痛立愈方……………一〇
- 九 醫治火眼紅痛立愈方……………一〇
- 十 醫治目熱紅痛立愈方……………一〇
- 十一 醫治積熱眼澀立愈方……………一〇

十二	醫治目生赤脈立愈方	一〇
十三	醫治目生障翳立愈方	一〇
十四	醫治內外障翳立愈方	一一
十五	醫治眯目生翳立愈方	一一
十六	醫治病後生翳立愈方	一一
十七	醫治遠年日障立愈方	一一
十八	醫治赤白翳立愈方	一一
十九	醫治爛弦風立愈方	一一
二十	醫治火眼赤爛立愈方	一一
二十一	醫治風眼赤爛立愈方	一一
二十二	醫治風眼下淚立愈方	一二
二十三	醫治眼中起星立愈方	一二
二十四	醫治眼生珠管立愈方	一二
二十五	醫治眼珠突出立愈方	一二
二十六	醫治眼珠縮入立愈方	一二
二十七	醫治眼目昏花立愈方	一二

二十八	醫治目忽不見立愈方	一二
二十九	醫治黑子遮目立愈方	一三
三十	醫治努肉攀睛立愈方	一三
三十一	醫治眼瞳成漏立愈方	一三
三十二	醫治拳毛倒睫立愈方	一三
三十三	醫治瞳人反背立愈方	一三
三十四	醫治內障青盲立愈方	一三
三十五	醫治病後青盲立愈方	一四
三十六	醫治瞽目重明神效方	一四

【四】耳病

一	醫治兩耳聾閉立愈方	一四
二	醫治腎虛耳聾立愈方	一四
三	醫治病後耳聾立愈方	一四
四	醫治兩耳暴聾立愈方	一四
五	醫治老人耳聾立愈方	一五
六	醫治青年耳聾立愈方	一五

七	醫治耳閉不通立愈方	一五
八	醫治耳內流膿立愈方	一五
九	醫治耳內出血立愈方	一五
十	醫治耳孔出水立愈方	一五
十一	醫治耳內濕爛立愈方	一六
十二	醫治耳邊腫爛立愈方	一六
十三	醫治耳後銳毒立愈方	一六
十四	醫治耳痛立愈方	一六
十五	醫治兩耳腫痛立愈方	一六
十六	醫治耳鳴立愈方	一六
十七	醫治耳癢立愈方	一六
十八	醫治耳定立愈方	一七
十九	醫治底耳立愈方	一七
二十	醫治聾耳立愈方	一七
一	醫治鼻血不止立愈方	一七

【五】鼻病

二	醫治口鼻出血立愈方	一八
三	醫治鼻塞不通立愈方	一八
四	醫治鼻流清涕立愈方	一八
五	醫治鼻流黃涕立愈方	一八
六	醫治鼻中瘰肉立愈方	一九
七	醫治鼻生膩蟲立愈方	一九
八	醫治鼻中生毛立愈方	一九
九	醫治鼻面紅皰立愈方	一九
十	醫治各項鼻症立愈方	一九
一	醫治口乾立愈方	一九
二	醫治口臭立愈方	一九
三	醫治口吐清水立愈方	二〇
四	醫治口角紅腫立愈方	二〇
五	醫治口內肉球立愈方	二〇
六	醫治上脰生蟲立愈方	二〇

【六】口病附唇舌

七	醫治失音立愈方	二〇
八	醫治不語立愈方	二〇
九	醫治唇裂立愈方	二〇
十	醫治唇腫立愈方	二一
十一	醫治唇皸立愈方	二一
十二	醫治唇緊立愈方	二一
十三	醫治舌腫立愈方	二一
十四	醫治舌縮立愈方	二一
十五	醫治舌齟立愈方	二二
十六	醫治舌碎立愈方	二二
十七	醫治舌痛立愈方	二二
十八	醫治舌脹滿口立愈方	二二
十九	醫治舌出口角立愈方	二二
二十	醫治小舌落下立愈方	二二
二十一	醫治重舌立愈方	二二
二十二	醫治木舌立愈方	二三

【七】牙齒病

一	醫治牙痛立愈方	二三
二	醫治風火牙痛立愈方	二三
三	醫治風寒牙痛立愈方	二四
四	醫治風熱牙痛立愈方	二四
五	醫治陰虛牙痛立愈方	二四
六	醫治腎虛牙痛立愈方	二五
七	醫治蟲蛀牙痛立愈方	二五
八	醫治牙根腫痛立愈方	二五
九	醫治牙關緊閉立愈方	二五
十	醫治牙縫出血立愈方	二五
十一	醫治牙齦宣露立愈方	二五
十二	醫治牙齦黑臭立愈方	二五
十三	醫治牙齒作酸立愈方	二五
十四	醫治齒腐齦爛立愈方	二六
十五	醫治齒疏陷物立愈方	二六

- 十六 醫治蟲齧齒動立愈方……………二六
- 十七 醫治睡中磨齒立愈方……………二六
- 十八 取除痛牙神效方……………二六
- 十九 堅固牙齒神效方……………二六
- 二十 預防牙症神效方……………二六

【八】咽喉病

- 一 醫治喉蛾立愈方……………二六
- 二 急救喉蛾真祕方……………二七
- 三 醫治單喉蛾立愈方……………二七
- 四 醫治雙喉蛾立愈方……………二七
- 五 醫治單雙喉蛾立愈方……………二七
- 六 醫治喉蛾腫痛立愈方……………二八
- 七 醫治喉風立愈方……………二八
- 八 醫治白喉風立愈方……………二九
- 九 醫治鎖喉風立愈方……………二九
- 十 醫治爛喉痧立愈方……………二九

- 十一 醫治喉間瘰肉立愈方……………二九
- 十二 醫治喉間結塊立愈方……………二九
- 十三 醫治喉間作癢立愈方……………二九
- 十四 醫治咽喉聲啞立愈方……………二九
- 十五 醫治喉爛立愈方……………三〇
- 十六 醫治喉閉立愈方……………三〇
- 十七 醫治喉痛立愈方……………三〇
- 十八 醫治喉腫立愈方……………三〇
- 十九 醫治咽喉腫痛立愈方……………三〇
- 二十 醫治咽喉急症立愈方……………三〇

【九】心胃肝氣病附胸腹腰脅

- 一 醫治心氣痛立愈方……………三一
- 二 醫治心脾痛立愈方……………三一
- 三 醫治結氣心痛立愈方……………三一
- 四 醫治積年心痛立愈方……………三一
- 五 醫治心痛吐水立愈方……………三一

六	醫治心痛徹背立愈方	三二
七	醫治心氣怔忡立愈方	三二
八	醫治心中嘈雜立愈方	三二
九	醫治惡心吞酸立愈方	三二
十	醫治胃氣痛立愈方	三二
十一	醫治心胃氣痛立愈方	三三
十二	醫治肝胃氣痛立愈方	三三
十三	醫治胃腕氣痛立愈方	三三
十四	醫治胃腕脇痛立愈方	三三
十五	醫治反胃噎膈立愈方	三三
十六	醫治反胃嘔吐立愈方	三四
十七	醫治胃熱嘔吐立愈方	三四
十八	醫治胃寒嘔吐立愈方	三四
十九	醫治嘔吐清水立愈方	三四
二十	醫治嘔吐黃水立愈方	三四
二十一	醫治吐酸立愈方	三四

二十二	醫治乾嘔立愈方	三五
二十三	醫治呃逆立愈方	三五
二十四	醫治消渴立愈方	三五
二十五	醫治食積立愈方	三五
二十六	醫治糯米積立愈方	三六
二十七	醫治麵食積立愈方	三六
二十八	醫治魚肉積立愈方	三六
二十九	醫治牛肉積立愈方	三六
三十	醫治羊肉積立愈方	三六
三十一	醫治雞蛋積立愈方	三六
三十二	醫治鴨蛋積立愈方	三六
三十三	醫治豆積立愈方	三六
三十四	醫治索粉積立愈方	三六
三十五	醫治瓜積立愈方	三六
三十六	醫治果積立愈方	三六
三十七	醫治菱積立愈方	三六

三十八	醫治茶積立愈方	三六
三十九	醫治酒積立愈方	三七
四十	醫治痞積立愈方	三七
四十一	醫治癖塊立愈方	三七
四十二	醫治氣癖立愈方	三七
四十三	醫治痰飲立愈方	三七
四十四	醫治肝氣痛立愈方	三八
四十五	醫治胸痛立愈方	三八
四十六	醫治結胸立愈方	三八
四十七	醫治寒結胸立愈方	三八
四十八	醫治熱結胸立愈方	三八
四十九	醫治腹痛立愈方	三八
五十	醫治小腹痛立愈方	三八
五十一	醫治腰痛立愈方	三八
五十二	醫治腎虛腰痛立愈方	三九
五十三	醫治虛寒腰痛立愈方	三九

五十四	醫治腰骨痛立愈方	三九
五十五	醫治腰背酸痛立愈方	三九
五十六	醫治腰腿疼痛立愈方	三九
五十七	醫治脇痛立愈方	三九
五十八	醫治脇骨疼痛立愈方	四〇
五十九	醫治胸脇氣逆立愈方	四〇
六十	醫治諸般氣痛立愈方	四〇
【十】肺病附吐血		
一	醫治咳嗽立愈方	四〇
二	醫治寒咳嗽立愈方	四〇
三	醫治熱咳嗽立愈方	四一
四	醫治肺虛咳嗽立愈方	四一
五	醫治肺癆咳嗽立愈方	四一
六	醫治肺痿咳嗽立愈方	四一
七	醫治肺熱痰咳立愈方	四二
八	醫治肺熱痰嗽立愈方	四二

九	醫治寒痰咳嗽立愈方	四二
十	醫治熱痰咳嗽立愈方	四二
十一	醫治風痰咳嗽立愈方	四二
十二	醫治痰喘咳嗽立愈方	四二
十三	醫治痰飲咳嗽立愈方	四二
十四	醫治咳嗽痰多立愈方	四二
十五	醫治久咳不止立愈方	四三
十六	醫治久嗽不止立愈方	四三
十七	醫治傷風咳嗽立愈方	四三
十八	醫治秋燥咳嗽立愈方	四三
十九	醫治老年咳嗽立愈方	四四
二十	醫治痰喘立愈方	四四
二十一	醫治氣喘立愈方	四四
二十二	醫治老年氣喘立愈方	四四
二十三	醫治腹脹喘滿立愈方	四五
二十四	醫治冷飲成喘立愈方	四五

二十五	醫治肺熱喘急立愈方	四五
二十六	醫治肺虛喘急立愈方	四五
二十七	醫治啞瘁立愈方	四五
二十八	醫治老年痰哮喘立愈方	四五
二十九	醫治哮喘立愈方	四五
三十	醫治哮喘立愈方	四五
三十一	醫治冷哮喘立愈方	四五
三十二	醫治肺癰立愈方	四六
三十三	醫治咯血立愈方	四六
三十四	醫治吐血立愈方	四六
三十五	醫治猝然吐血立愈方	四六
三十六	醫治咳嗽吐血立愈方	四七
三十七	醫治咳喘帶血立愈方	四七
三十八	醫治痰中帶血立愈方	四七
三十九	醫治酒癆吐血立愈方	四七
四十	醫治虛癆嗽血立愈方	四七

【十一】腸病

一	醫治寒瀉立愈方	四八
二	醫治熱瀉立愈方	四八
三	醫治脾虛泄瀉立愈方	四八
四	醫治腎虛久瀉立愈方	四八
五	醫治久瀉不止立愈方	四八
六	醫治痢疾立愈方	四八
七	醫治赤痢立愈方	四九
八	醫治白痢立愈方	四九
九	醫治赤白痢立愈方	四九
十	醫治噤口痢立愈方	五〇
十一	醫治休息痢立愈方	五〇
十二	醫治五色痢立愈方	五一
十三	醫治腸癰立愈方	五一
十四	醫治腸風立愈方	五一

【十二】前後陰病附大小便

一	醫治疝氣立愈方	五一
二	醫治寒疝立愈方	五一
三	醫治熱疝立愈方	五二
四	醫治小腸疝立愈方	五二
五	醫治橫梁疝立愈方	五二
六	醫治膀胱氣疝立愈方	五二
七	醫治疝氣偏墜立愈方	五二
八	醫治陰囊青腫立愈方	五三
九	醫治陰囊腫痛立愈方	五三
十	醫治陰囊脹痛立愈方	五三
十一	醫治囊濕立愈方	五三
十二	醫治囊癢立愈方	五三
十三	醫治睪丸腫大立愈方	五三
十四	醫治睪丸腫痛立愈方	五三
十五	醫治陰莖濕癢立愈方	五四
十六	醫治腎滿立愈方	五四

十七	醫治陽痿立愈方	五十四
十八	急救縮陽立效方	五十四
十九	急救脫精立效方	五十四
二十	醫治遺精立愈方	五十四
二十一	醫治腎虛遺精立愈方	五十五
二十二	醫治內熱遺精立愈方	五十五
二十三	醫治虛滑遺精立愈方	五十五
二十四	醫治夢遺洩精立愈方	五十五
二十五	醫治陰虛夢遺立愈方	五十五
二十六	醫治勞心夢遺立愈方	五十五
二十七	醫治脫肛立愈方	五十五
二十八	醫治虛冷脫肛立愈方	五十六
二十九	醫治痔痢脫肛立愈方	五十六
三十	醫治久痢脫肛立愈方	五十六
三十一	醫治肛門腫痛立愈方	五十六
三十二	醫治肛門痛癢立愈方	五十六

三十三	醫治肛門蟲蝕立愈方	五十六
三十四	醫治大便不通立愈方	五十六
三十五	醫治大便熱結立愈方	五十七
三十六	醫治大便下血立愈方	五十七
三十七	醫治小便不通立愈方	五十七
三十八	醫治小便過多立愈方	五十八
三十九	醫治心熱尿赤立愈方	五十八
四十	醫治勞傷溺血立愈方	五十八
四十一	醫治便溺不通立愈方	五十八
四十二	醫治便溺見血立愈方	五十八

【十三】臌脹病

一	醫治水臌脹立愈方	五十九
二	醫治氣臌脹立愈方	五十九
三	醫治血臌脹立愈方	六〇
四	醫治各種臌脹立愈方	六〇
五	醫治氣虛水腫立愈方	六〇

六 醫治病後浮腫立愈方……………六〇

【十四】黃疸病

- 一 醫治黃疸立愈方……………六一
- 二 醫治穀疸立愈方……………六一
- 三 醫治酒疸立愈方……………六一
- 四 醫治女疸立愈方……………六一
- 五 醫治勞疸立愈方……………六一
- 六 醫治黑疸立愈方……………六一
- 七 醫治濕熱疸立愈方……………六一
- 八 醫治陰黃立愈方……………六一

【十五】傷寒病

- 一 醫治傷寒頭痛立愈方……………六二
- 二 醫治傷寒喉痛立愈方……………六二
- 三 醫治傷寒心悸立愈方……………六二
- 四 醫治傷寒脇痛立愈方……………六三
- 五 醫治傷寒腹痛立愈方……………六三

六 醫治傷寒煩躁立愈方……………六三

- 七 醫治傷寒昏迷立愈方……………六三
- 八 醫治傷寒發狂立愈方……………六三
- 九 醫治傷寒無汗立愈方……………六三
- 十 醫治傷寒盜汗立愈方……………六三
- 十一 醫治傷寒衄血立愈方……………六四
- 十二 醫治傷寒下痢立愈方……………六四
- 十三 醫治傷寒肢痛立愈方……………六四
- 十四 醫治夾驚傷寒立愈方……………六四
- 十五 醫治夾陰傷寒立愈方……………六四
- 十六 醫治陰毒傷寒立愈方……………六五

【十六】瘧疾病

- 一 醫治瘧疾立愈方……………六五
- 二 醫治瘴瘧立愈方……………六五
- 三 醫治鬼瘧立愈方……………六六
- 四 醫治牝瘧立愈方……………六六

五	醫治牡瘡立愈方	六六
六	醫治三陰瘡立愈方	六六
七	醫治隔日瘡立愈方	六七
八	醫治三日瘡立愈方	六七
九	醫治久瘡不止立愈方	六七
十	醫治久瘡極虛立愈方	六七
【十七】風痺癩狂病		
一	醫治中風立愈方	六七
二	醫治中風口噤立愈方	六七
三	醫治中風口喎立愈方	六八
四	醫治中風舌強立愈方	六八
五	醫治中風不語立愈方	六八
六	醫治中風痰厥立愈方	六八
七	醫治中風偏廢立愈方	六八
八	醫治中風癱瘓立愈方	六九
九	醫治中風掣痛立愈方	六九

十	醫治中風強直立愈方	六九
十一	醫治風寒溫痺立愈方	六九
十二	醫治風緩頑痺立愈方	六九
十三	醫治手足風痺立愈方	六九
十四	醫治歷節痛風立愈方	七〇
十五	醫治軟癱立愈方	七〇
十六	醫治鵝掌風立愈方	七〇
十七	醫治鶴膝風立愈方	七一
十八	醫治大麻風立愈方	七一
十九	醫治羊癩風立愈方	七一
二十	醫治癩狂立愈方	七二
【十八】皮膚病		
一	醫治汗斑立愈方	七二
一	醫治狐臭立愈方	七三
三	醫治血痣立愈方	七三
四	醫治黑痣立愈方	七三

- 五 醫治風疹立愈方……………七三
- 六 醫治痲子立愈方……………七三
- 七 醫治白癩風立愈方……………七三
- 八 醫治紫癩風立愈方……………七四

【十九】四肢病

- 一 醫治手指麻木立愈方……………七四
- 二 醫治手指痠痛立愈方……………七四
- 三 醫治手背皸裂立愈方……………七四
- 四 醫治掌痛立愈方……………七四
- 五 醫治臂痛立愈方……………七四
- 六 醫治脚氣立愈方……………七四
- 七 醫治脚氣衝心立愈方……………七五
- 八 醫治脚氣入腹立愈方……………七五
- 九 醫治風濕脚腫立愈方……………七五
- 十 醫治腿上風濕立愈方……………七五
- 十一 醫治脚冷如冰立愈方……………七五

- 十二 醫治脚心腫痛立愈方……………七五
- 十三 醫治脚腿紅腫立愈方……………七六
- 十四 醫治脚多濕汗立愈方……………七六
- 十五 醫治脚轉筋立愈方……………七六
- 十六 醫治脚麻立愈方……………七六

【二十】瘟疫病

- 一 醫治瘟疫神效方……………七六
- 二 醫治霍亂立愈方……………七六
- 三 醫治乾霍亂立愈方……………七七
- 四 醫治中暑立愈方……………七七
- 五 醫治痧症立愈方……………七七
- 六 醫治吐痧立愈方……………七八
- 七 醫治瀉痧立愈方……………七八
- 八 醫治慢痧立愈方……………七八
- 九 醫治暈痧立愈方……………七八
- 十 醫治癘痧立愈方……………七九

十一	醫治番痧立愈方	七九
十二	醫治斑痧立愈方	七九
十三	醫治絞腸痧立愈方	七九
十四	醫治噤口痧立愈方	七九
十五	醫治角弓痧立愈方	七九
十六	醫治大頭瘟立愈方	八〇
十七	醫治羊毛瘟立愈方	八〇
十八	醫治蝦蟆瘟立愈方	八〇
十九	預防鼠疫神效方	八〇
二十	醫治鼠疫立愈方	八一

## 第二章 外科醫治法

### 【一】癰疽

一	醫治癰疽立愈方	八一
二	醫治癰疽初起立愈方	八二
三	醫治癰疽久潰立愈方	八二

四	醫治癰疽不潰立愈方	八二
五	醫治癰疽作痛立愈方	八二
六	醫治臍癰立愈方	八三
七	醫治腿癰立愈方	八三
八	醫治臀癰立愈方	八三
九	醫治便癰立愈方	八三
十	醫治囊癰立愈方	八三
十一	醫治子癰立愈方	八三
十二	醫治石癰立愈方	八三
十三	醫治牛頭癰立愈方	八四
十四	醫治騎馬癰立愈方	八四
十五	醫治腦疽立愈方	八四
十六	醫治眉疽立愈方	八四
十七	醫治甲疽立愈方	八四
十八	醫治石疽立愈方	八四
十九	醫治陰疽立愈方	八五

二十	醫治癩疽立愈方	八五
二十一	醫治落頭疽立愈方	八五
二十二	醫治對口疽立愈方	八六
二十三	醫治脫骨疽立愈方	八六
二十四	醫治多骨疽立愈方	八六
二十五	醫治附骨疽立愈方	八六
二十六	醫治井泉疽立愈方	八七
二十七	醫治發背立愈方	八七
二十八	醫治搭手立愈方	八七
<b>【二】疔瘡</b>		
一	醫治疔瘡立愈方	八七
二	醫治疔瘡初起立愈方	八八
三	醫治疔瘡走黃立愈方	八八
四	醫治疔瘡出血立愈方	八九
五	醫治疔根不出立愈方	八九
六	醫治疔不收口立愈方	八九

七	醫治疔毒發背立愈方	八九
八	醫治紅絲疔立愈方	八九
九	醫治蛇頭疔立愈方	九〇
十	醫治羊毛疔立愈方	九〇
十一	醫治魚睛疔立愈方	九〇
十二	醫治魚臍疔立愈方	九〇
十三	醫治刀鏢疔立愈方	九一
十四	醫治人中疔立愈方	九一
十五	醫治閉口疔立愈方	九一
十六	醫治唇上疔立愈方	九一
十七	醫治反唇疔立愈方	九一
十八	醫治面疔立愈方	九一
十九	醫治耳疔立愈方	九一
二十	醫治心疔立愈方	九一
二十一	醫治水疔立愈方	九二
二十二	醫治螺疔立愈方	九二

二十三 醫治指疔立愈方……………九二  
二十四 醫治足指疔立愈方……………九二

【三】瘰癧附流注遮腮

一 醫治瘰癧立愈方……………九二  
二 醫治瘰癧初起立愈方……………九三  
三 醫治瘰癧潰爛立愈方……………九三  
四 醫治熱瘰立愈方……………九四  
五 醫治鼠癭立愈方……………九四  
六 醫治痰癭立愈方……………九四  
七 醫治痰核立愈方……………九四  
八 醫治瘰癧痰核立愈方……………九五  
九 醫治頸項結核立愈方……………九五  
十 醫治九子腸立愈方……………九五  
十一 醫治流注立愈方……………九五  
十二 醫治遮腮立愈方……………九六

【四】瘰癧

一 醫治瘰癧立愈方……………九六  
二 醫治頭上瘰癧立愈方……………九六  
三 醫治眼皮瘰癧立愈方……………九六  
四 醫治腋下瘰癧立愈方……………九六  
五 醫治瘰癧結氣立愈方……………九六  
六 醫治五癭結核立愈方……………九七  
七 醫治血瘤立愈方……………九七  
八 醫治肉瘤立愈方……………九七  
九 醫治髮瘤立愈方……………九七  
十 醫治粉瘤立愈方……………九七  
十一 醫治漏瘤立愈方……………九七  
十二 醫治疣瘤立愈方……………九七

【五】痔瘡

一 醫治痔瘡立愈方……………九七  
二 醫治內痔立愈方……………九八  
三 醫治外痔立愈方……………九八

四	醫治血痔立愈方	九八
五	醫治酒痔立愈方	九九
六	醫治痔核立愈方	九九
七	醫治痔漏立愈方	九九
八	醫治痔漏生管立愈方	九九
九	醫治痔瘡腫痛立愈方	九九
十	醫治痔瘡作瘻立愈方	一〇〇
十一	醫治雞冠痔立愈方	一〇〇
十二	醫治翻花痔立愈方	一〇〇

【六】癬疥

一	醫治癬瘡立愈方	一〇〇
二	醫治疥瘡立愈方	一〇〇
三	醫治癬疥瘡立愈方	一〇〇
四	醫治癩疥瘡立愈方	一〇一
五	醫治久年頑癬立愈方	一〇一
六	醫治風癬蔓延立愈方	一〇一

【七】瘡癩

七	醫治咬髮癬立愈方	一〇一
八	醫治爛腳癬立愈方	一〇一
九	醫治蛙毛癬立愈方	一〇一
十	醫治牛皮癬立愈方	一〇一
十一	醫治荷葉癬立愈方	一〇一
十二	醫治梅花癬立愈方	一〇二

一	醫治身面熱瘡立愈方	一〇二
二	醫治遍體火瘡立愈方	一〇二
三	醫治多年惡瘡立愈方	一〇二
四	醫治濕毒結瘡立愈方	一〇二
五	醫治濕瘡起泡立愈方	一〇二
六	醫治諸瘡成管立愈方	一〇二
七	醫治瘡根不滅立愈方	一〇二
八	醫治頭生禿瘡立愈方	一〇二
九	醫治頸項生瘡立愈方	一〇三

十	醫治面上生瘡立愈方	一〇三
十一	醫治鬚鬚瘡立愈方	一〇三
十二	醫治羊鬚瘡立愈方	一〇三
十三	醫治天泡瘡立愈方	一〇三
十四	醫治黃水瘡立愈方	一〇三
十五	醫治對口瘡立愈方	一〇三
十六	醫治千層瘡立愈方	一〇四
十七	醫治翻花瘡立愈方	一〇四
十八	醫治人面瘡立愈方	一〇四
十九	醫治坐板瘡立愈方	一〇四
二十	醫治貓眼瘡立愈方	一〇四
二十一	醫治蛇膽瘡立愈方	一〇五
二十二	醫治蛇纏瘡立愈方	一〇五
二十三	醫治魚脊瘡立愈方	一〇五
二十四	醫治魚臍瘡立愈方	一〇五
二十五	醫治蜂窩瘡立愈方	一〇五

二十六	醫治蜘蛛瘡立愈方	一〇五
二十七	醫治眉瘡立愈方	一〇五
二十八	醫治鼻瘡立愈方	一〇六
二十九	醫治口瘡立愈方	一〇六
三十	醫治唇瘡立愈方	一〇六
三十一	醫治舌瘡立愈方	一〇六
三十二	醫治背瘡立愈方	一〇六
三十三	醫治背搭瘡立愈方	一〇六
三十四	醫治腿瘡立愈方	一〇七
三十五	醫治爛脚瘡立愈方	一〇七
三十六	醫治臙瘡立愈方	一〇七
三十七	醫治凍瘡立愈方	一〇八
三十八	預防凍瘡神效方	一〇八
三十九	醫治軟癬立愈方	一〇八
四十	醫治石癬立愈方	一〇九

【八】外科雜治

一	醫治鼻痔立愈方	一〇九
二	醫治鼻菌立愈方	一〇九
三	醫治耳痔立愈方	一〇九
四	醫治耳疳立愈方	一〇九
五	醫治舌上生菌立愈方	一〇九
六	醫治眼生偷針立愈方	一一〇
七	醫治豎頭肉立愈方	一一〇
八	醫治代指立愈方	一一〇
九	醫治指上肉刺立愈方	一一〇
十	醫治嵌甲作痛立愈方	一一〇
十一	醫治爛脚丫立愈方	一一〇
十二	醫治脚生雞眼立愈方	一一〇
十三	醫治脚底木硬立愈方	一一〇
十四	醫治流火脹立愈方	一一〇
十五	醫治癩瘡頭立愈方	一一一
十六	醫治無名腫毒立愈方	一一一

### 第三章 婦科醫治法

#### 【一】調經

一	醫治月經不調立愈方	一一二
二	醫治經水不通立愈方	一一二
三	醫治室女經閉立愈方	一一二
四	醫治經水不止立愈方	一一三
五	醫治經水逆行立愈方	一一三
六	醫治經來色黃立愈方	一一三
七	醫治經來色紫立愈方	一一三
八	醫治經來色淡立愈方	一一三
九	醫治行經腹痛立愈方	一一四
十	醫治經阻腹痛立愈方	一一四
十一	醫治經後腹痛立愈方	一一四
十二	醫治經來嘔吐立愈方	一一四
十三	醫治痛經不孕立愈方	一一四

- 十四 醫治血冷經寒立愈方……一一四
- 十五 醫治乾血癆立愈方……一一四
- 十六 醫治乾血氣痛立愈方……一一四

【二】崩漏

- 一 醫治血崩不止立愈方……一一五
- 二 醫治老婦血崩立愈方……一一五
- 三 醫治崩漏五色立愈方……一一五
- 四 醫治婦女漏下立愈方……一一五

【三】帶下

- 一 醫治白帶立愈方……一一六
- 二 醫治赤帶立愈方……一一六
- 三 醫治赤白帶下立愈方……一一六
- 四 醫治室女白帶立愈方……一一六
- 五 醫治年久白帶立愈方……一一七
- 六 醫治五色帶下立愈方……一一七
- 七 醫治帶下有膿立愈方……一一七

- 八 醫治白淫立愈方……一一七
- 九 醫治白濁立愈方……一一七
- 十 醫治白沃立愈方……一一七

【四】乳疾

- 一 醫治乳症初起立愈方……一一七
- 二 醫治乳中結核立愈方……一一七
- 三 醫治乳頭破裂立愈方……一一八
- 四 醫治乳頭咬破立愈方……一一八
- 五 醫治乳汁不下立愈方……一一八
- 六 醫治乳流不止立愈方……一一八
- 七 醫治乳塊不消立愈方……一一八
- 八 醫治乳巖初起立愈方……一一八
- 九 醫治乳巖堅硬立愈方……一一九
- 十 醫治乳巖潰爛立愈方……一一九
- 十一 醫治乳癰立愈方……一一九
- 十二 醫治乳疔立愈方……一一九

十三	醫治乳蛾立愈方	一二〇
十四	醫治乳瘡立愈方	一二〇
十五	醫方乳痛立愈方	一二〇
十六	醫治乳結立愈方	一二〇
十七	醫治乳毒立愈方	一二〇
十八	醫治乳妬立愈方	一二〇
十九	醫治無乳立愈方	一二〇
二十	醫治回乳立愈方	一二〇

【五】隱疾

一	醫治初生無陰神效方	一二一
二	醫治陰傷出血立愈方	一二一
三	醫治陰出肉線立愈方	一二一
四	醫治陰中生瘡立愈方	一二一
五	醫治陰後生瘡立愈方	一二一
六	醫治陰腫立愈方	一二二
七	醫治陰痛立愈方	一二二

八	醫治陰癢立愈方	一二二
九	醫治陰戶腫痛立愈方	一二二
十	醫治陰戶癢痛立愈方	一二二
十一	醫治陰冷立愈方	一二二
十二	醫治陰脫立愈方	一二二
十三	醫治陰挺立愈方	一二三
十四	醫治陰蝕立愈方	一二三
十五	醫治陰寬立愈方	一二三
十六	醫治陰爛立愈方	一二三
十七	醫治陰吹立愈方	一二三
十八	醫治交腸立愈方	一二三
十九	醫治小便不通立愈方	一二四
二十	醫治小便下血立愈方	一二四

【六】胎前

一	秘製安胎神效方	一二四
二	秘製保胎神效方	一二四

三	醫治胎動立愈方	一二四
四	醫治胎動下血立愈方	一二四
五	醫治因驚胎動立愈方	一二五
六	醫治跌撲胎動立愈方	一二五
七	醫治胎上衝心立愈方	一二五
八	醫治胎痛欲產立愈方	一二五
九	醫治滑胎易產立愈方	一二五
十	醫治毒藥傷胎立愈方	一二五
十一	醫治漏胎立愈方	一二五
十二	醫治漏胎下血立愈方	一二五
十三	醫治腹內兒啼立愈方	一二五
十四	醫治孕婦心痛立愈方	一二六
十五	醫治孕婦腰痛立愈方	一二六
十六	醫治孕婦腹痛立愈方	一二六
十七	醫治孕婦嘔吐立愈方	一二六
十八	醫治孕婦吐衄立愈方	一二六

十九	醫治孕婦吞酸立愈方	一二六
二十	醫治孕婦感寒立愈方	一二六
二十一	醫治子煩立愈方	一二六
二十二	醫治子嗽立愈方	一二七
二十三	醫治子腫立愈方	一二七
二十四	醫治子懸立愈方	一二七
二十五	醫治子滿立愈方	一二七
二十六	醫治子鳴立愈方	一二七
二十七	醫治子痲立愈方	一二七
二十八	醫治子淋立愈方	一二八
二十九	醫治孕婦瘧疾立愈方	一二八
三十	醫治孕婦痢疾立愈方	一二八
三十一	醫治孕婦行經立愈方	一二八
三十二	醫治孕婦溺血立愈方	一二八
【七】臨產		
一	祕製催生神效方	一二八

二	急救難產神效方	一二九
三	急救血虛難產神效方	一三〇
四	急救過月難產神效方	一三〇
五	急救難產日久神效方	一三〇
六	急救胎澀不下神效方	一三〇
七	急救胞衣不下神效方	一三〇
八	急救死胎不下神效方	一三一
九	急救橫生倒產神效方	一三一
十	急救盤腸生產神效方	一三一
十一	醫治交骨不開立愈方	一三二
十二	醫治產傷子宮立愈方	一三二

【八】產後

一	醫治產後血暈立愈方	一三二
三	醫治產後血昏立愈方	一三二
三	醫治產後血衝立愈方	一三二
四	醫治產後血滯立愈方	一三三

五	醫治產後血脹立愈方	一三三
六	醫治產後血虛立愈方	一三三
七	醫治產後驚風立愈方	一三三
八	醫治產後中風立愈方	一三三
九	醫治產後中寒立愈方	一三四
十	醫治產後發熱立愈方	一三四
十一	醫治產後頭痛立愈方	一三四
十二	醫治產後心痛立愈方	一三四
十三	醫治產後腰痛立愈方	一三四
十四	醫治產後腹痛立愈方	一三四
十五	醫治產後腹脹立愈方	一三五
十六	醫治產後腹硬立愈方	一三五
十七	醫治產後氣喘立愈方	一三五
十八	醫治產後氣逆立愈方	一三五
十九	醫治產後呃逆立愈方	一三五
二十	醫治產後糜勞立愈方	一三五

二十一	醫治產後腸出立愈方	一三六
二十二	醫治產後陰腫立愈方	一三六
二十三	醫治產後陰脫立愈方	一三六
二十四	醫治產後瀉血立愈方	一三六
二十五	醫治產後下痢立愈方	一三六
二十六	醫治產後停瘀立愈方	一三六
二十七	醫治產後便閉立愈方	一三七
二十八	醫治產後尿閉立愈方	一三七
二十九	醫治產後帶下立愈方	一三七
三十	醫治產後淋瀝立愈方	一三七
三十一	醫治惡露不下立愈方	一三七
三十二	醫治惡露不止立愈方	一三七
三十三	醫治惡血衝心立愈方	一三八
三十四	醫治尿泡下垂立愈方	一三八
三十五	醫治子宮墜下立愈方	一三八
三十六	醫治產門不閉立愈方	一三八

三十七	醫治產門受傷立愈方	一三八
三十八	醫治產門受風立愈方	一三八
三十九	醫治小產停瘀立愈方	一三八
四十	醫治小產下血立愈方	一三九

### 第四章 幼科醫治法

#### 【一】初生諸病

一	醫治胎毒立愈方	一三九
二	醫治胎熱立愈方	一三九
三	醫治胎寒立愈方	一三九
四	醫治臍風立愈方	一四〇
五	醫治臍瘡立愈方	一四〇
六	醫治臍濕立愈方	一四〇
七	醫治臍突出立愈方	一四〇
八	醫治臍中出血立愈方	一四一
九	醫治初生無皮立愈方	一四一

十	醫治初生不啼立愈方	一四一
十一	醫治螳螂子立愈方	一四一
十二	醫治馬牙立愈方	一四一
十三	醫治遊風立愈方	一四一
十四	醫治流水立愈方	一四二
十五	醫治吐乳立愈方	一四二
十六	醫治乳癰立愈方	一四二
十七	醫治初生便閉立愈方	一四二
十八	醫治初生脫肛立愈方	一四二

【二】驚風

一	醫治胎驚立愈方	一四二
二	醫治驚風立愈方	一四三
三	預防驚風神效方	一四三
四	醫治急驚風立愈方	一四三
五	醫治慢驚風立愈方	一四三
六	醫治急慢驚風立愈方	一四四

【三】疳積

一	醫治小兒疳積立愈方	一四四
二	醫治小兒食積立愈方	一四五
三	醫治小兒蟲積立愈方	一四五
四	醫治小兒痞塊立愈方	一四五
五	醫治小兒牙疳立愈方	一四六
六	醫治走馬牙疳立愈方	一四六
七	醫治雪口疳立愈方	一四六
八	醫治口内生疳立愈方	一四六
九	醫治滿口爛疳立愈方	一四七
十	醫治小兒疳瘡立愈方	一四七

【四】痧痘

一	預防小兒痧痘神效方	一四七
二	醫治小兒痧痘立愈方	一四七
三	醫治痘出不快立愈方	一四七
四	醫治痘出作癢立愈方	一四八

五	醫治痘出目中立愈方	一四八
六	預防痘入目中神效方	一四八
七	醫治痘入目中立愈方	一四八
八	醫治痘出煩渴立愈方	一四八
九	醫治痘出狂亂立愈方	一四八
十	醫治痘瘡稠密立愈方	一四八
十一	醫治痘瘡黑陷立愈方	一四八
十二	醫治痘瘡潰爛立愈方	一四九
十三	醫治痘瘡生蛆立愈方	一四九
十四	醫治痘瘡成疔立愈方	一四九
十五	醫治痘後生瘡立愈方	一四九
十六	醫治痘後目翳立愈方	一四九
十七	醫治痘毒入心立愈方	一四九
十八	醫治痘後餘毒立愈方	一四九
十九	醫治痘不起漿立愈方	一五〇
二十	醫治痘不落痂立愈方	一五〇

【五】瘡瘍

二十一	醫治痘後癩痕立愈方	一五〇
二十二	醫治痧疹不起立愈方	一五〇
二十三	醫治痧疹喉痛立愈方	一五〇
二十四	醫治痧後咳嗽立愈方	一五〇

【六】幼科雜治

一	醫治小兒頭瘡立愈方	一五〇
二	醫治小兒面瘡立愈方	一五一
三	醫治小兒口瘡立愈方	一五一
四	醫治小兒天泡瘡立愈方	一五一
五	醫治小兒黃水瘡立愈方	一五一
六	醫治小兒火灼瘡立愈方	一五一
七	醫治小兒生癩立愈方	一五一
八	醫治小兒丹毒立愈方	一五一
九	醫治小兒軟疔立愈方	一五二
十	預防小兒瘡癩神效方	一五二

一	醫治小兒顛陷立愈方	一五二
二	醫治小兒顛腫立愈方	一五二
三	醫治小兒顛軟立愈方	一五二
四	醫治小兒解顛立愈方	一五二
五	醫治小兒髮遲立效方	一五二
六	醫治小兒髮禿立效方	一五二
七	醫治小兒口噤立效方	一五二
八	醫治小兒齒遲立效方	一五三
九	醫治小兒唇緊立效方	一五三
十	醫治小兒赤目立愈方	一五三
十一	醫治小兒痰厥立愈方	一五三
十二	醫治小兒咳嗽立愈方	一五四
十三	醫治小兒嘔吐立愈方	一五四
十四	醫治小兒泄瀉立愈方	一五四
十五	醫治啼哭不止立效方	一五四
十六	醫治大小便閉立愈方	一五四

### 第五章 花柳科醫治法

#### 【一】淋濁

一	醫治淋濁立愈方	一五五
二	醫治勞淋立愈方	一五五
三	醫治氣淋立愈方	一五五
四	醫治血淋立愈方	一五五
五	醫治熱淋立愈方	一五六
六	醫治石淋立愈方	一五六
七	醫治五淋立愈方	一五六
八	醫治淋痛立愈方	一五六
九	醫治紅白淋立愈方	一五六
十	醫治赤白濁立愈方	一五六
十一	醫治赤濁立愈方	一五六
十二	醫治白濁立愈方	一五七

#### 【二】梅毒

- 一 醫治楊梅結毒立愈方……………一五七
- 二 醫治梅毒初起立愈方……………一五八
- 三 醫治梅毒斷根神效方……………一五八
- 四 預防梅毒傳染神效方……………一五八

【三】便毒附疔

- 一 醫治便毒立愈方……………一五九
- 二 醫治橫痃立愈方……………一五九
- 三 醫治魚口立愈方……………一五九
- 四 醫治下疳立愈方……………一六〇

第六章 急救科醫治法

【一】橫死

- 一 急救吊死立效方……………一六〇
- 二 急救溺死立效方……………一六一
- 三 急救凍死立效方……………一六二
- 四 急救跌死立效方……………一六二

- 五 急救壓死立效方……………一六二
- 六 急救打死立效方……………一六三
- 七 急救驚嚇死立效方……………一六三
- 八 急救睡魔死立效方……………一六三
- 九 急救自刎死立效方……………一六三
- 十 急救中瘴氣立效方……………一六三
- 十一 急救中邪立效方……………一六三
- 十二 急救觸電立效方……………一六四

【二】服毒

- 一 急救吞生鴉片立效方……………一六四
- 二 吞救吞火柴頭立效方……………一六五
- 三 急救吞金立效方……………一六五
- 四 急救吞金箔立效方……………一六六
- 五 急救吞錐水立效方……………一六六
- 六 急救吞砒霜立效方……………一六六
- 七 急救香水銀立效方……………一六七

八	急救蒙汗藥毒立效方	一六七
九	急救斷腸草毒立效方	一六七
十	急救水莽草毒立效方	一六七
十一	急救輕粉毒立效方	一六七
十二	急救紅粉毒立效方	一六七
十三	急救礬毒立效方	一六七
十四	急救巴豆毒立效方	一六八
十五	急救木鼈毒立效方	一六八
十六	急救木瓜毒立效方	一六八
十七	急救野菌毒立效方	一六八
十八	急救杏仁毒立效方	一六八
十九	急救鹽瀉毒立效方	一六八
二十	急救煤氣毒立效方	一六八
二十一	急救漆毒立效方	一六九
二十二	急救鳩毒立效方	一六九
二十三	急救蛇毒立效方	一六九

二十四	急救蟹毒立效方	一六九
二十五	急救河豚毒立效方	一六九
二十六	急救甲魚毒立效方	一六九
二十七	急救牛馬毒立效方	一七〇
二十八	急救馬肉毒立效方	一七〇
二十九	急救羊肉毒立效方	一七〇
三十	急救猪肉毒立效方	一七〇
三十一	急救鵝鴨毒立效方	一七〇
三十二	急救雞肉毒立效方	一七〇
三十三	急救野雞毒立效方	一七〇
三十四	急救田螺毒立效方	一七〇
三十五	急救馬蝗毒立效方	一七〇
三十六	急救蜈蚣毒立效方	一七一

【三】鯁喉吐煙酒醉

一	急救諸骨鯁喉立愈方	一七一
二	急救魚骨鯁喉立愈方	一七一

- 三 急救雞骨鯁喉立愈方……………一七一
- 四 急救田螺鯁喉立愈方……………一七二
- 五 急救稻穀鯁喉立愈方……………一七二
- 六 急救竹木鯁喉立愈方……………一七二
- 七 急救竹葉鯁喉立愈方……………一七二
- 八 急救諸豆鯁喉立愈方……………一七二
- 九 急救鴉片煙醉立愈方……………一七二
- 十一 急救香煙醉立愈方……………一七二
- 十二 急救酒醉立愈方……………一七二

【四】誤吞錢物

- 一 急救誤吞五金立效方……………一七二
- 二 急救誤吞銅錢立效方……………一七三
- 三 急救誤吞鐵針立效方……………一七三
- 四 急救誤吞鐵屑立效方……………一七三
- 五 急救誤吞玻璃立效方……………一七三
- 六 急救誤吞碗片立效方……………一七三

【五】創傷

- 七 急救誤吞洋油立效方……………一七三
- 八 急救誤吞桐油立效方……………一七三
- 九 急救誤吞頭髮立效方……………一七四
- 十 急救誤吞耳垢立效方……………一七四
- 一 急救跌打損傷立效方……………一七四
- 二 急救跌打傷筋立愈方……………一七四
- 三 急救跌打傷骨立愈方……………一七四
- 四 急救跌破頭顱立愈方……………一七五
- 五 急救腦破骨折立愈方……………一七五
- 六 急救割頸斷喉立愈方……………一七五
- 七 急救閃頸立愈方……………一七五
- 八 急救脫頰立愈方……………一七五
- 九 急救舌頭咬斷立愈方……………一七五
- 十 急救舌斷血出立愈方……………一七六
- 十一 急救眼睛打傷立愈方……………一七六

十二	急救耳朶挖傷立愈方……	一七六
十三	急救閉跌傷腰立愈方……	一七六
十四	急救戳傷腸出立愈方……	一七六
十五	急救閃跌手足立愈方……	一七六
十六	急救手指砍斷立愈方……	一七七
十七	急救刀傷立愈方……	一七七
十八	急救湯火傷立愈方……	一七七
十九	急救湯火傷眼立愈方……	一七八
二十	急救鐵針入肉立愈方……	一七八
二十一	急救槍子入肉立愈方……	一七八
二十二	急救水銀入肉立愈方……	一七八
二十三	急救磁片入肉立愈方……	一七八
二十四	急救骨刺入肉立愈方……	一七八
二十五	急救竹木入肉立愈方……	一七八
二十六	急救麥芒入目立愈方……	一七九
二十七	急救塵芒入目立愈方……	一七九

二十八	急救泥沙入目立愈方……	一七九
二十九	急救石灰入目立愈方……	一七九
三十	急救煙油入目立愈方……	一七九
三十一	急救飛絲入目立愈方……	一七九
三十二	急救蛛絲入目立愈方……	一七九
三十三	急救壁虎入目立愈方……	一七九
三十四	急救蜈蚣入耳立愈方……	一八〇
三十五	急救蜒蚰入耳立愈方……	一八〇
三十六	急救螞蟻入耳立愈方……	一八〇
三十七	急救飛蛾入耳立愈方……	一八〇
三十八	急救飛蠅入耳立愈方……	一八〇
三十九	急救臭蟲入耳立愈方……	一八〇
四十	急救蚤虱入耳立愈方……	一八〇
【六】動物咬傷		
一	急救人咬傷立愈方……	一八〇
二	急救虎咬傷立愈方……	一八一

三	急救狼咬傷立愈方	……	一八一
四	急救瘋狗咬傷立愈方	……	一八一
五	急救家狗咬傷立愈方	……	一八二
六	急救馬咬傷立愈方	……	一八二
七	急救豬咬傷立愈方	……	一八三
八	急救貓咬傷立愈方	……	一八三
九	急救鼠咬傷立愈方	……	一八三
十	急救毒蛇咬傷立愈方	……	一八三
十一	急救蜈蚣咬傷立愈方	……	一八三
十二	急救壁虎咬傷立愈方	……	一八三
十三	急救蟬蛛咬傷立愈方	……	一八四
十四	急救黃蜂刺傷立愈方	……	一八四
十五	急救蠍螫傷立愈方	……	一八四
十六	急救蠶咬傷立愈方	……	一八四

實 驗 醫 書

民衆醫藥顧問	四大厚冊	定價八元	一折	實售八角
增訂驗方新編	兩大厚冊	定價四元	一折	實售四角
萬病驗方大全	兩大厚冊	定價六元	一折	實售六角
民間百病祕方	全書一冊	定價二元	一折	實售二角
百病丹方大全	全書一冊	定價元六	一折	一角六分
腎病自療法	全書一冊	定價一元	一折	實售一角
婦女病自療法	全書一冊	定價元二	一折	一角二分
小兒病自療法	全書一冊	定價元二	一折	一角二分

實驗  
百病丹方大全

趙橋仙醫師鑒定

第一章 內科醫治法

△一 頭腦病 附髮

一 醫治偏正頭風立愈方

偏正頭風有虛實之別。大約左右俱痛者。半屬實。但痛一邊者。半屬虛。然亦有相反者。屬實為風寒濕鬱所致。屬虛則由於腦汁受虧。較諸實症。尤為沈重。茲一方面而兼治。見效用真白茯苓一兩為末。或湯或酒送下。每服二錢。數服全愈。或用生薑三片。將桑皮紙包好。打溼炭火煨熟。乘熱貼印堂兩太陽穴。以帶縛之立愈。

又方 偏正頭風痛不可忍者。用延胡索七枚。青黛二錢。牙皂兩個。去皮子為末。水和丸。如杏仁大。

每以水化一丸。灌入病人鼻內。左痛灌左。右痛灌右。口咬銅錢一枚。當有涎出而愈。

又方 偏正頭風連兩太陽穴痛者。用白殭蠶為末。葱茶調服一錢。立效。

又方 偏正頭風陰雨即發。用桂心一兩。酒調塗額上及頂上。即愈。

二 醫治偏正頭風立愈方

偏頭風久不除根者。清明時將髮分開。用麝香五分。皂川末一錢。薄紙裹置患處。以布包炒鹽於上。熨之。冷則易。如此數次。永不再發。

又方 此症發時。用白芷三錢。炒研末。和米粉三錢。蒸熟。乘熱貼在患處。包頭紮定。次日即愈。甚者三次必好。

又方 偏頭風症極重者。用鵝兒不食草陰乾。將上好燒酒浸一夜。日間曬。晚間又浸。如此七次。左痛塞左鼻。右痛塞右鼻。流出冷水即愈。

三 醫治雷頭風立愈方

雷頭風者。因頭痛而起核塊。或頭中為雷鳴者是也。用升麻天麻各一錢。新荷葉一大張。煎服。如無鮮荷葉無效。

又方 地膚子同生薑搗爛。熱酒沖服。取汗即愈。

四 醫治頭風頭痛立愈方

頭痛惡風者。名曰頭風。頭痛服荆瀝不限多少。以瘥為度。外以甘菊花裝枕枕之。良佳。

又方 凡頭風抽掣作痛者。用生牛蒡子梗葉。無梗葉時。用根亦可。取自然汁二碗。陳酒一碗。食鹽八分。共熬成膏。搽之。須極力搽熱乃效。

又方 頭風頭痛百藥不效者。食茱萸葉細剉。瀉酒拌勻。絹袋盛之。入甑中蒸熱。乘熱分作兩包。更

換枕頭。以效為度。

又方 頭風頭痛不可忍者。用乳香茵麻仁等分。搗餅。隨左右貼太陽穴。解髮出氣。甚驗。

五 醫治頭風熱痛立愈方

頭風熱痛。用山豆根末。油調塗兩太陽立效。

又方 決明子炒研。茶調敷兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。

六 醫治頭風畏冷立愈方

頭風畏冷。首裹重綿。三十年不愈者。以蕎麥粉二升水調作二餅。更互合頭上。微汗即愈。

又方 八月後取荆芥穗作枕。及鋪牀下。立春日去之。則愈。

七 醫治頭風睛痛立愈方

頭風睛痛。用香附子一兩。藿香葉甘草各二錢。為末。每服二錢。沸湯入鹽調下。自效。

八 醫治頭風目盲立愈方

頭風目盲。用野苧菜煎湯注壺內。塞住壺嘴。以雙目就壺薰之。漸明。

**九 醫治劇烈頭痛立愈方**

頭痛初發時。勢甚劇烈。用手指按頭上。有一處按着更酸痛者。以硃筆記之。用斑毛一個。去頭翅足。研末。安於所記痛處。以小黃蜆殼或桃核殼蓋上。用布紮好。過夜。起一小泡。以針刺出黃水。其痛若失。

又方 頭痛欲死者。以硝石末吹鼻內。即愈。

又方 頭痛連睛者。用牛蒡子石膏等分爲末。茶清調服。即愈。

又方 頭痛患風。雖重。綿厚帛。不能禦風寒者。用艾葉揉如綿。以帛夾住。包頭上。用熨斗熨艾。使熱氣入內。良久即愈。

又方 頭痛如斧劈。此血逆作祟也。用川烏三錢。川芎三錢。爲末。燒烟薰碗內。刮下茶調服。立愈。

又方 頭痛不止者。用楊梅爲末。以少許嚙鼻。取嚏即愈。

又方 頭痛起於倉卒。爲外風所襲。用白殭蠶去絲爲末。白湯下二錢。立效。

**十 醫治陽明頭痛立愈方**

陽明頭痛。用石膏、川芎、白芷等分爲末。每服三錢。茶清調下。

又方 香白芷一味洗曬爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一九。茶清或荆芥湯化下。

**十一 醫治太陽頭痛立愈方**

太陽頭痛。用羌活、防風、紅豆等分爲末。嚙鼻內。立愈。

**十二 醫治少陽頭痛立愈方**

少陽頭痛。用片黃芩曬乾爲末。每服二錢。茶酒任下。

**十三 醫治風寒頭痛立愈方**

風寒頭痛。用當歸、木通各等分。酒浸三晝夜。重湯煮熱。乘熱飲之。去枕臥立愈。

又方。川芎、當歸、熟地、連翹、薄荷各二錢。放碗內。將滾湯沖下。鼻吸其氣。候溫即服。自然有效。

又方。大附子或大川烏頭二枚。去皮蒸過。川芎、生薑各一兩。焙研。茶湯調服一錢。或剉片。每用五錢。水煎服。

十四 醫治風熱頭痛立愈方

風熱頭痛。用川芎一錢。茶葉二錢。水一鍾。煎五分。食前熱服。

又方。菊花、石膏、川芎各三錢。為末。每服一錢半。茶調下。

又方。荆芥穗、石膏等分為末。每服二錢。茶調下。

十五 醫治風虛頭痛立愈方

風虛頭痛。以杏仁去皮尖。曬乾研末。用水九升。研濃汁。煎如麻腐狀。取和羹粥食之。七日後。大汗出。

諸風漸減。但須慎風冷。忌食豬雞魚蒜醋。

十六 醫治氣虛頭痛立愈方

氣虛頭痛。用綠茶葉末。水調成膏。攤碗內。覆轉。以巴豆四十粒。作兩次燒烟薰之。曝乾研細。每服二分。滾水食後服。立效。

又方。川芎為末。臘茶調服二錢。神驗。

十七 醫治氣厥頭痛立愈方

氣厥頭痛。用天台烏藥、川芎等分為末。每服二錢。臘茶清調下。

十八 醫治痰厥頭痛立愈方

痰厥頭痛。用水蘇葉五兩。皂莢炙去皮子三兩。芫花醋炒。黑一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每食後服二十九。荆芥湯送下。

又方。白附子、天南星、半夏等分。生研為末。生薑

自然汁浸。蒸餅丸。菉豆大。每服四十粒。食後薑湯下。

十九 醫治痰熱頭痛立愈方  
痰熱頭痛用瓜蒌一個牛蒡子四兩共焙爲末每用三錢食後酒沖服忌食動風發熱之物

二十 醫治腎虛頭痛立愈方

終年頭似痛非痛此腎水不足而邪沖上作痛用山藥四錢山茱萸四錢熟地四錢三味水煎服服後痛甚至重二劑斷根或常飲玉竹熟地自愈  
又方 硫黃六錢烏藥四錢爲末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

二十一 醫治頭腦昏眩立愈方

頭腦暈眩此因血虛風生肝陽上達能使眼目昏花猝倒厥絕用兩儀膏四錢天麻湯下三劑而愈多服更妙

又方 風熱上衝頭目暈眩或胸中不利川芎槐角子各一兩爲末每服三錢用茶清調下  
又方 頭風旋暈痰逆惡心懶食用真零陵香藿

香葉莎草根等分炒爲末每服二錢茶下日三服自效

又方 溼熱暈眩不可當者酒炒大黃爲末茶清服二錢自愈

又方 目赤頭旋眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙各一兩爲末每服二錢臥時溫水下

又方 頭運吐逆胃冷生痰用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服累用有效

又方 失血過多眩暈不醒用芎藭當歸等分酒浸每服四錢水煎溫服

又方 用生白果肉二枚杵爛開水沖服至重者五次必愈

又方 婦人血虛頭暈欲死甚者或倒地不省人事用生蒼耳草嫩心陰乾爲末每用一錢酒調服神效

二十二 醫治頭腦鳴響立愈方

頭腦鳴響狀如蟲蛀。名天白蟻。以春茶子研末。吹入鼻中甚效。

又方 桑葉、黑芝、藤、丹皮、梔子等分爲末。蜜丸。陳細茶煎湯送服。

又方 女貞子、旱蓮草等分爲末。橄欖汁爲丸。桑葉湯下。

又方 甘菊花濃煎。頻服取效。  
又方 土茯苓煮豬肉食之神效。前後忌茶十日。

二十三 醫治項強立愈方  
項強。頭轉動不能自由也。用僵蠶炒爲末。每服五分。或一錢。酒泡薄荷湯下。日三服。自愈。

二十四 醫治項軟立愈方  
項軟。頭不能舉也。用五加皮爲末。酒調塗項骨上。乾則易。卽效。

二十五 醫治髮禿立愈方

髮禿不生。用麻子炒焦研末。豬脂和塗。以髮生爲度。或用甜瓜葉杵汁塗之亦效。

二十六 醫治髮枯立愈方

髮枯不潤。用桑根白皮、柏葉煎汁洗髮。木瓜浸酒潤之自效。

二十七 醫治頭髮短少立愈方

髮短而少。用桑葉、麻葉以淘米水煮汁洗之。洗至七次。卽長數寸。

二十八 醫治頭髮黃赤立愈方

髮黃而赤。用生柏葉研末。豬油和爲丸。如彈子大。每日用一丸。淘米水化開。洗之。一月後。色潤而黑。

二十九 醫治髮易脫落立愈方

髮易脫落。用榧子三個。核桃兩個。側柏葉一兩。共搗泥。泡雪水梳頭。可使髮永不脫落。而且光潤。

又方 用旱蓮草搗敷。可使髮易生而多。

又方 用黑芝、藤、柳樹枝各等分。熬水洗之。可

使已落之髮。重生而且潤。

三十 醫治少年白髮立愈方

年輕之人。頭上多白髮。用土馬駿。五焙子。半夏各一兩。生薑二兩。胡桃十個。膽樊五錢。共為末。搗作一塊。每以絹袋盛少許。入熱酒浸汁。洗髮一月。神效。

又方 將白蜜塗其拔去之毛孔。即生黑髮。如不生。取梧桐子搗汁塗之。無不生者。

▲二 面病 附髮眉

一 醫治面上雀斑立愈方

面上雀斑。其色或黃或黑。碎點無數。由火鬱血分。風邪外搏而成。市上售藥甚多。有效者少。莫妙於用蜜陀僧研末。夜搽。日洗。久之自去。或用菉豆粉洗面。亦效。

又方 茄子切成小片。擦面部。其效如神。

又方 白茯苓研末。加白蜜調和。每夜敷之。七日

見效。

又方 黑牽牛末。雞子清調和。夜敷。旦洗。神效。

二 醫治面上粉刺立愈方

粉刺由肺經血熱而生。有黑點挑出。如飯粒也。用桃花。冬瓜仁等。分研細。蜜和。夜塗。旦洗。自效。

又方 雲母粉。杏仁等。分為末。牛乳調和。略蒸敷之。自效。

又方 山慈姑根。夜塗。旦洗。神效。

三 醫治面上酒刺立愈方

面上酒刺。亦由肺經血熱而生。發於面鼻。如黍如粟。色赤腫痛。破出粉汁。用大黃。硫黃等。分研末。以涼水調敷。內服清肺藥。自愈。

又方 杏仁去皮。搗和雞子清。夜塗之。清晨以煖酒洗去。

四 醫治面上黑氣立愈方

面上黑氣。用半夏焙研末。米醋調敷。不可見風。自

晨至晚。不計數次。三日後用皂角湯洗下。即白。

又方 天門冬和蜜搗爛。日日洗面。即白。

又方 面黑皮厚。用羊脛骨末。雞蛋清調。每夜敷。早以淘米水洗去。十日後面白皮嫩。

**五** 醫治面上癩痕立愈方

面上有癩痕。用白蒺藜、山梔各一兩為末。醋調。夜

塗旦洗。疤痕漸脫。面目潤澤。

又方 馬蘭子自落葉並子。煎湯頻洗。數次自消。

又方 用真玉日日磨之。久則自滅。

**六** 醫治面上皺紋立愈方

春取桃花。夏取荷花。秋冬取芙蓉花。以雪水煎湯

頻洗。自效。

又方 大母豬蹄四個。洗淨。煮成膏。臥時搽面上。

次早洗去。半月後即不皺。

**七** 醫治面上浮腫立愈方

面上浮腫。用赤豆、芙蓉葉等分研末。和蜜塗之。立

愈。

又方 冬瓜煮湯恣飲。亦效。

**八** 醫治兩腮赤腫立愈方

兩腮赤腫。俗名撐耳風。又名疔腮。用燈心一根。點

油燒之。在虎口之下寸許。手背微窩處。燒一下。左

腮燒右手。右腮燒左手。半日即消腫。甚效。

又方 皂角二兩。生南星二錢。糯米一合。共為末。

薑汁調敷。立效。

**九** 醫治眉毛不生立愈方

眉毛不生。用芥菜子。半夏等分。為末。生薑汁調搽

眉上。數次即生。

又方 烏麻花陰乾為末。以烏麻油漬之。日塗眉

上。自有奇效。

**十** 醫治眉毛脫落立愈方

眉毛脫落。用蔓菁子四兩炒研。和醋塗之。

又方 垂柳葉陰乾。研為細末。用生薑汁於鐵器

內調勻。夜夜摩之。

### 十一 秘製鬚髮烏黑神效方

烏鬚法。以五焙子一兩。銅綠三兩。炒紅。用醋淬之。醋不宜多。再炒再淬。如此三次。研碎。青礬二錢。炒研生鹽五分。炒。先將五焙子研碎。用銅鍋炒至出油成團。放地上攤冷。再將各藥研碎。用好燒酒調成麵糊樣。蒸至鏡面爲度。不宜久蒸。先用皂角水洗鬚一次。又用茶洗一次。將藥乘熱濃濃染之。俟乾用熱水洗去。其鬚光潤如漆。可保兩月不白。又方。熟地三兩。生何首烏三兩。要白色而長形者。黑芝麻一兩。炒。萬年青二片。桑葉二兩。白菓三十個。桔梗三錢。爲末。不可經鐵器。爲丸。每日早飯後服一兩。一月後鬚即烏黑。久服不再白。

### 十二 秘製白鬚變黑神效方

先將白鬚拔去。用豬膽塗孔中。即生黑鬚。或用白蠟點孔中。不再白也。

## 三 眼病

### 一 醫治雞蒙眼立愈方

雞蒙眼壯年可愈。若四十歲以後。恐諸方無效。用黃蠟不拘多少。溶汁取出。入蛤粉相和得宜。每用二錢。以羊肝二兩批開。摻藥在內。麻繩紮定。水一椀。同入銅器內。煮熟取出。乘熱薰眼。候溫。連肝食之。日服兩次。以愈爲度。其效如神。又方。用穀精草一把。豬肝四兩。同入罐內。燉食之。連服數次。即愈。

### 二 醫治爛眼皮立愈方

爛眼皮與眼癬形相似也。惟癬癢爛不癢耳。以明礬五錢。醋製研成細末。用乳汁調和。點爛眼皮上立效。

### 三 醫治赤眼痛立愈方

赤眼痛。用生大黃三錢。煎濃汁服之。可愈。如大便秘結。或三四日未下者。可加倍服之。其效如神。

又方 用古銅錢括生薑。取汁。卽以古銅錢點薑汁於眼內。一日卽愈。

又方 鮮蝦肉放膏藥內。貼太陽穴。又方 雞蛋白和冰糖調勻點眼內。

四 醫治風熱目赤立愈方

風熱目赤。用田螺數個搗爛。取汁和冰片五釐。敷於眼皮及太陽穴。卽愈。

又方 車前子川連各一兩爲末。食後溫酒服一錢。每日二次。自效。

五 醫治肝熱目赤立愈方

肝熱目赤。用大田螺七枚。洗淨。新汲水養去泥穢。換水浸洗。起於淨器中。着少鹽花於甲內。承取自然汁點目。

六 醫治肝虛目赤立愈方

肝虛目赤。以青羊肝薄切。水浸吞之。極效。

七 醫治赤目癢痛立愈方

赤目癢痛。用黃連白礬。浸入乳中。上覆白紙。穿小孔蒸之。卽將乳汁點抹眼角。自效。

八 醫治赤目皆痛立愈方

赤目皆痛。用龍膽草一味。熬膏點之。神效。

九 醫治火眼紅痛立愈方

火眼紅痛。五月取老瓜一條。上開小孔。去瓤入芒硝。令滿。懸陰處。待硝透出。刮下點眼。自愈。

十 醫治目熱紅痛立愈方

目熱紅痛。以田螺取汁。入鹽少許。點之。自效。

十一 醫治積熱眼澀立愈方

積熱眼澀。三月三日或五月五日。採青蒿花。或子。陰乾爲末。每次井華水。空心服二錢。久服明目。

十二 醫治目生赤脈立愈方

目生赤脈。貫瞳神者。元參爲末。以米泔煮豬肝。日日蘸食之。自愈。

十三 醫治目生障翳立愈方

目生障翳。臘月取羯羊肝十餘枚。以白蜜裝滿紙套籠。掛簷下。待霜出。掃下點之。自愈。

又方。芒硝一兩。置銅器中。急火中煉之。俟冷後。以生絹細羅。每夜臥時點眼角中。

**十四** 醫治內外障翳立愈方

內外障翳。用麻黃根一兩。當歸身一錢。同炒黑色。入麝香為末。時時噴鼻。

**十五** 醫治眯目生翳立愈方

物入目中。久而不出。即生翳障。用瞿麥乾薑炮為末。并華水調服二錢。日二服。即愈。

**十六** 醫治病後生翳立愈方

病後生翳。以白菊花。蟬蛻。等分為散。每用二三錢。入蜜少許。水煎服驗。

**十七** 醫治遠年目障立愈方

遠年目障。人指甲炮一分。穿山甲。蟬蛻。各五釐。蛇蛻分半。哺退雞蛋殼白皮二分。人乳炒研。每用三

釐。含水吹。不患一邊之鼻內。

又方。鹽研細末。以燈心點患上。神驗。

**十八** 醫治赤白翳立愈方

目生赤白翳。用烏賊魚骨一兩。去皮為末。入龍腦少許。點目。一日二次。自愈。

**十九** 醫治爛弦風立愈方

爛弦風。係眼弦赤爛也。雄豬油煉淨一兩。川椒去核。開口者三錢。入油內熬枯。去淨渣滓。以銅綠五錢。研細末。入油和成膏。臨睡時。敷眼邊周圍。次早洗去。數次愈。

又方。晚蠶砂五錢。人麻油內浸透。研爛。塗敷二次。亦效。

**二十** 醫治火眼赤爛立愈方

火眼赤爛。以艾葉燒。用碗覆之。候烟盡。盤上刮煤下。溫水調化洗眼。即愈。

**二十一** 醫治風眼赤爛立愈方

風眼赤爛。用明淨皮硝一錢。水三碗。煎濃露一宿。濾淨澄清。朝夕洗目。三日即消。雖年久者亦愈。  
又方 真麻油浸蠶砂二三夜。研細塗患處。亦效。

二十二 醫治風眼下淚立愈方

見風流淚。用鮑魚膽和人乳半杯。飯上蒸之。再露天一宿。點於眼角。再以桑葉煎汁洗之立愈。  
又方 用臘月不落桑葉煎湯。日日溫洗之。或加芒硝少許更佳。

二十三 醫治眼中起星立愈方

眼中起星。用胡椒七八粒。塞鼻內。早晚換二次。約半月星即退。  
又方 用葶藶汁磨真象牙。曬乾成粉。點眼星即退。或以人乳磨象牙亦效。  
又方 公丁香一分。黑棗一枚。去核。共搗爛。塞鼻孔內。左目塞右。右目塞左。  
又方 白蒺藜三錢。煎水洗。日三四次自愈。

眼生珠管。用生蜜塗於目內。仰臥六小時。乃可洗下。每日一次。良效。

二十五 醫治眼珠突出立愈方

眼珠忽然突出。下垂至鼻。痛不可忍。甚或大便出血。名曰肝脹。用羌活煎汁服之立愈。  
又方 淫羊霍威靈仙各一。淡水煎服。亦效。

二十六 醫治眼珠縮入立愈方

眼珠縮入。老薑燒熱。敷眉心。可治。

二十七 醫治眼目昏花立愈方

眼目昏花。用馬料豆一升（即黑豆）枸杞子四兩。同煮。曬乾為丸。每晨空腹服三錢。鹽湯送下。

二十八 醫治目忽不見立愈方

目忽不見。令人嚼母薑。用舌日舐六七次。以明為度。  
又方 黃土攪水中。澄清洗之。即明。

**二十九** 醫治黑子遮目立愈方

黑子遮目。用雞蛋二枚。煮熟去殼。同桑寄生四五錢。清水三碗。煎至一碗。如冰糖適可。連食數次。功效甚速。

**三十** 醫治努肉攀睛立愈方

努肉攀睛。杏仁去皮尖。研膏。人乳化開。日點三次。自愈。

又方 努肉急起遮目。鐵銹磨水。時時滴之。自愈。

又方 努肉菌毒。川連、杏仁各一錢。歸尾、赤芍、地膚子、菖蒲各二錢。羌活五分。白礬三分。煎洗良佳。

又方 鮮鯽魚一片。中央開竅。貼眶上。日三五易。亦效。

**三十一** 醫治眼瞳成漏立愈方

凡眼下空處。生癩。出濃流水。不乾。日久成漏。諸藥不效者。以柿餅去皮。取肉。搗爛塗之。十日全愈。

**三十二** 醫治拳毛倒睫立愈方

拳毛倒睫。睫毛倒向內捲也。用五倍子為末。蜜調敷眼皮上。其睫自起。

又方 石斛、川芎等分為末。口內含水。隨左右搐鼻。日二次。自效。

又方 木鼈子仁。槌爛。以絲棉包作條。左目塞右鼻。右目塞左鼻。一二夜即愈。

又方 木鼈子仁。槌爛。以絲棉包作條。左目塞右鼻。右目塞左鼻。一二夜即愈。

又方 木鼈子仁。槌爛。以絲棉包作條。左目塞右鼻。右目塞左鼻。一二夜即愈。

又方 木鼈子仁。槌爛。以絲棉包作條。左目塞右鼻。右目塞左鼻。一二夜即愈。

**三十三** 醫治瞳人反背立愈方

瞳人反背。用蜜蒙花、蟬蛻、白菊、郁李仁、生石膏、生草、決明、石決明、甘草、穀精草、白礬各四錢。百部二錢。珍珠四分。共為末。分量不可加減。搗爛。煮服。即發冷者。其光必轉。若光未盡轉。再服一劑。必愈。

**三十四** 醫治內障青盲立愈方

內障青盲。目不能視物也。用白羊肝一具。黃連一兩。熟地二兩。同搗丸。梧子大。食遠茶服。七十九日。三次。自愈。

又方 用烏鴉膽一個。以綫陰乾。點之。即愈。

三十五 醫治病後青盲立愈方

病後青盲。日近者可治。用仙靈脾一兩。淡豆豉百粒。水一碗。半煎一碗。連服即愈。

又方 青羊肝切薄片。水浸吞之亦效。

三十六 醫治瞽目重明神效方

瞽目重明。冬至日。取大蘆菔一枚。開蓋挖空。入新生紫殼雞蛋一個在內。蓋仍嵌好。埋淨土中。約深四五尺。到夏至日取出。用女人衣具包裹。藏瓷器內。俟卵內黃白。俱成清水。用點諸目疾。雖瞽者可以復明。

四 耳病

一 醫治兩耳聾閉立愈方

聽聲不聰者。名曰聾閉。兩耳聾閉。乃氣虛也。用梧桐子搗爛沖服。一月自愈。

又方 巴豆一粒。斑毛三個。麝香少許。共研末。和葱搗爛為丸。用潔淨棉花裹入耳內。覺響聲如雷。

勿得驚駭。輕則三日。重則七日。將丸取出。耳漸復聰。惟此丸切忌入口。慎之慎之。

又方 取龜尿滴入耳內。亦屬有效。(以鏡照龜。則尿自出)

又方 活鯉魚一尾。將腦髓取出。飯上蒸出油。滴入耳內。自然竅開。

二 醫治腎虛耳聾立愈方

腎虛耳聾。用烏雄雞一隻。洗淨。以無灰酒四斤。煮熟。乘熱食三五隻。極效。

又方 真磁石一塊。如豆大。穿山甲燒研二分。用棉包裹塞耳口。含生鐵一塊。覺耳內有風雨之聲。須臾自通。

三 醫治病後耳聾立愈方

病後耳聾。用石菖蒲汁滴入耳內。自愈。

四 醫治耳暴聾立愈方

耳暴聾。用活蚯蚓二條。和生葱二枝。置於小磁瓶。

內蚯蚓能化爲水。滴於耳內見效如神。

又方 白菊花、木通、石菖蒲、三味搗爛沖酒服。

又方 香附子、瓦砂研末。蘿蔔子煎湯。早夜各服二錢。忌用鐵器。

又方 竹筒盛鯉生魚腦。於飯上蒸之令烱。注入耳中。

**五 醫治老人耳聾立愈方**

老人耳聾。用豬腎一對。去膜切片。以粳米二合。葱白二根。薤白七枚。人參二分。防風一分。爲末。同煮粥食。

**六 醫治青年耳聾立愈方**

青年耳聾。此亦腎氣不足也。第一日清晨服胡桃一枚。每日遞加。至第七日七枚爲度。至是逐日減一枚。至第七日減至一枚爲度。先後十四日。依方循行。必能見效。

**七 醫治耳閉不通立愈方**

耳閉不通。用大田螺一個。撥開其蓋。入麝香五分。自化成水。滴入耳內。

又方 甘草、甘遂塞兩耳。稍久則氣自通。或用前龜尿法治之。

**八 醫治耳內流膿立愈方**

耳內流膿。雞冠血滴之。石榴花片。瓦上焙枯。研末。加冰片少許。吹入三四次愈。

**九 醫治耳內出血立愈方**

耳內出血。用龍骨末吹立止。又方 耳內膿血不乾。用木鱉子以清茶磨汁。蘸葱頭上。塞耳內。日換三次。亦效。

**十 醫治耳孔出水立愈方**

耳孔出水。以蜘蛛三個。煨煉成性。再置泥土上。消其火熱。加白礬五分。冰片少許。研細吹入。又方 枯礬研末。加麝香少許。吹入耳內。或用綿裹塞入。即效。

十一 醫治耳內溼爛立愈方

耳內溼爛。用白鯨或江魚腦骨（即石首魚之首石）燒灰存性。入冰片少許吹入即愈。

又方 海螵蛸炙末。加麝香少許。研細吹入。又方 明礬龍骨各一錢。煨研末吹入即愈。

十二 醫治耳邊腫爛立愈方

耳邊腫爛。用皂莢炙灰。香油調和敷之即愈。

十三 醫治耳後銳毒立愈方

耳後銳毒。乃風痰上壅也。用天南星火煨存性。醋調敷三次即愈。

十四 醫治耳痛立愈方

耳忽作痛。將經霜青箬露在外。將朽者燒存性。爲末。敷入耳中其痛即止。

又方 菖蒲附子各一錢。爲末。和烏麻油煉。滴之立止。

又方 用北細辛次末。以醋爲瓦塞耳。有奇效。

又方 鹽五斤蒸熟。以耳枕之。次復更換。痛能漸止。

十五 醫治耳腫痛立愈方

耳卒腫痛。牛蒡根切細。絞汁二升。砂鍋內熬膏塗之自愈。

又方 耳內膿血腫痛。用韭菜汁灌入耳內。見效甚速。

十六 醫治耳鳴立愈方

無聲自聞者。名曰耳鳴。用白毛烏骨雄雞一隻。甜酒四斤。煮食三五隻。神效。

又方 生地黃截塞耳中。日易數次。或煨熟尤妙。

又方 耳內作風水鼓鳴。用川烏頭。菖蒲等分。燒灰綿裏塞耳內。

十七 醫治耳癢立愈方

耳癢。用生烏頭一個。乘溼削如棗核大。塞入耳內。日換數次。過三五日便愈。兼治耳鳴。

十八 醫治耳定立愈方

耳定形如棉花子大極痛身發寒熱用人指甲瓦上焙枯存性研末加冰片少許吹入極效

十九 醫治底耳立愈方

耳內溼癢者名曰底耳用桑螵蛸一個燒存性麝香二分半同研每用以分許糝入有膿先捲淨神效

又方 黃箬燒過綿裹塞之或以筆管吹之

二十 醫治聾耳立愈方

耳內生小瘰或溼或乾者名曰聾耳用桃仁熟杵以舊紅絹裹塞之日易三次以瘥為度

又方 乾結不出者用白頸蚯蚓入葱管內化為水滴耳令滿數次即易挑出

又方 流出膿水不絕用輕粉一錢麝香一分為末摻之自愈

又方 聾耳有蠱用鯉魚腦和桂末搗勻綿裹塞

之。

又方 耳中有核如棗核大痛不可忍以酒滴之仰之半時即可筈出

▲五 鼻病

一 醫治鼻血不止立愈方

治鼻血方甚夥然有驗有不驗非方藥之不靈實感證之各異也今皆備於後惟此方百發百中且簡便神速以燈心一莖點清油燒少商穴一下立止以起泡為度少商穴在兩手大指內外甲縫之中不上不下即是左流燒左手右流燒右手雙流雙燒起泡後將泡挑破立止

又方 胎髮燒灰烏梅七個煨灰吹末吹入

又方 淡菜（向南貨店賣）燉豬肉常食

又方 柏葉燒灰淡酒沖服另以甘草切末水調和敷足心男左女右

又方 千瓣石榴花。或葉灸燥研末。以黃酒調和塞鼻內。

又方 大蒜頭搗爛敷足心。

又方 茅花一大把如無花用茅根。惟須去心。水煎膿汁。分二次服。

又方 用線紮緊手中指第二骨節灣曲之處。即止。左流扎右。右流扎左。雙流扎雙。極效。

又方 鼻血百法不止者。可令病者雙足浸入熱水中。俾血向熱行。從上至下。不止自止。

二 醫治口鼻出血立愈方  
口鼻出血。以韭菜汁約一碗。飲之立愈。

三 醫治鼻塞不通立愈方  
調塞不通。名曰鼻閉。用通草細辛附子共為末。蜜

鼻綿裹納鼻中。即通。

又方 乾薑末蜜調。塞鼻中自通。

又方 鼻塞久不聞香臭者。用生葱分作三段。早

用葱白。午用中段。晚用末段。搗塞鼻中。氣透自效。

又方 蓖麻子仁三百粒。大棗一枚。去皮搗勻。綿裹塞之。一日一易。三十日可聞香臭。

四 醫治鼻流清涕立愈方  
鼻流清涕。用花生四五斤。入鍋內。令本人親手炒之。數次即愈。

又方 用紙煤烟薰之。取嚏自愈。

五 醫治鼻流黃涕立愈方  
鼻流黃涕者。名曰鼻淵。為腦漏之見端。用黃實根及莖。煎濃汁。盛茶壺內。以鼻按壺嘴薰之。覺熱悶

難開。隨有濁物流出。即愈。

又方 石首魚腦骨二三十枚。煨末。每服五分。酒下。先用二分吹鼻中。

又方 白鯨脊骨。燒烟熏洗之。

又方 絲瓜藤取近根者一尺。瓦上煨枯研末。嗅之。並冲酒服。

六 醫治鼻中瘰肉立愈方

鼻中肉塊名曰瘰肉。以生藕節連鬚瓦上焙枯。研末吹鼻。其肉自落。並治鼻瘡。

又方 枯礬生豬油和綿裹塞鼻中。數日內隨藥落。

七 醫治鼻生膩蟲立愈方

鼻生膩蟲。以韭菜子燒烟。向鼻薰入。引蟲出盡。自愈。

又方 豬肝焙研末。麻油調敷。

八 醫治鼻中生毛立愈方

鼻中生毛。晝夜可長一二尺。漸粗如繩。痛不可忍。此食豬羊牛血過多所致。用礪沙乳香等分。為丸服十粒。毛自落。

又方 豬毛焙存性。研末吹入鼻中。即愈。倘食牛羊血過多者。或牛羊毛亦可。

九 醫治鼻面紅皸立愈方

鼻面紅皸。用蜜陀僧為末。乳香調。臨臥搽。數次自去。

十 醫治各項鼻症立愈方

凡鼻淵、瘰痔、鼻瘰、鼻瘡等症。以辛夷花苞（一名木筆花。又名旱蓮蓬）去赤肉毛子。用芭蕉煎水泡一夜。焙乾為末。加麝香少許。用葱白蘸入鼻中。數次自愈。

六 口病 附唇舌

一 醫治口乾立愈方

口乾。用元參二三片。含口中。便生津液。大佳。

又方 虛勞口乾者。用麥冬一兩為末。大棗肉三十個。以蜜一升和令熟。用米五升蒸之。任性服。自效。

二 醫治口臭立愈方

口臭。用香薷煮取汁。或飲或漱之。甚妙。

又方 口噙雞舌者。便可解臭。雞舌者。即沉香花。

也。如無。用沉香可代。

又方 藿香洗淨煎湯。時時噙漱。

又方 白梅善治口臭。常含之。可以香口。

又方 尋常口臭。每夜於臨臥時。口含荔枝肉一

二枚。次早吐去。七日後即能見效。

又方 心氣不足。致口臭者。用益智去殼。加甘草

爲末。乾嚥下。或沸湯點服。

又方 飲酒口臭。啖柚子即解。亦可煎湯飲。

又方 食葱韭等物口臭。嚼砂糖即解。

三 醫治口吐清水立愈方

口吐清水。用艾葉汁煎飲。神效。

四 醫治口角紅腫立愈方

口角乾燥紅腫。用松毛煮豆腐。約半日許。取豆腐

貼之。日換數次。自愈。

五 醫治口內肉球立愈方

口內生肉球。名血餘症。有根如線。吐出乃能飲食。

捻之痛入心。用麝香一錢。研末。作兩次服。自愈。或  
用人髮燒灰亦可。

六 醫治上膠生蟲立愈方

上膠生蟲。癢不可忍。因食生冷過多所致。用明礬  
水或香油漱口自愈。

七 醫治失音立愈方

失音。有語無聲也。用豬脂一斤。煉過去渣。入白蜜  
一斤。再煉少頃。濾淨冷定。不時挑服。或用梨汁頻  
飲。或用人乳竹瀝和服。或用蘆薈汁。略加生薑汁  
和服均效。

八 醫治不語立愈方

不語。用美酒半斤。人乳半合和服。或煮淡豆豉湯  
加美酒服之。

又方 因驚而不能語者。用蜜陀僧末一匙。茶調  
下。

九 醫治唇裂立愈方

唇裂。用烏元參三錢。煎水飲。並潤唇上。  
又方。白荷花瓣。貼之神效。雖開裂出血者。貼之亦立止。

又方。桃仁搗泥。和豬脂敷之。  
又方。冬月唇裂。香油頻頻抹之。

### 十 醫治唇腫立愈方

唇忽腫脹。色黑。痛癢難忍。用大錢四文。石上磨豬脂汁塗之。不過數次。即愈。

又方。人中腫大。用生蒲黃二錢。川連及頂上梅片各一錢。共研細末。麻油調敷。

### 十一 醫治唇裂立愈方

唇裂。唇上出血不止也。用栗子一個。連殼燒灰。硫黃等分。同研敷。

### 十二 醫治唇緊立愈方

唇急作痛。五倍子。訶子肉。等分爲末。敷之立效。  
又方。用鼈甲及頭。燒研敷之。

又方。蛇蛻燒爲末。先拭後敷。  
又方。青布燒灰。酒調下。

### 十三 醫治舌腫立愈方

舌忽腫出口外。或長數寸。此心火熱極所致。用雞冠血一小盞。以舌浸之。即縮入。

又方。以冰片少許。抹上。或用草麻油。蘸紙作燃。燒烟薰之。即消縮。

又方。舌忽腫硬。或出血如泉湧。用烏賊魚骨。蒲黃等分爲末。敷舌上立愈。

又方。用甘草煎濃湯。熱漱頻吐。  
又方。生蒲黃研細糝之。或以釜底煤和醋。厚敷舌之上下。自愈。

又方。用皂礬於新瓦上煨紅。色爲度。放地上。候冷。研細。搗開牙關。以細竹吹舌上。極效。

### 十四 醫治舌縮立愈方

舌忽縮入。用銀針刺破舌尖。出盡惡血。以蠟燭油

搽之立效。

又方 生艾葉搗敷之。如無生艾。以乾艾浸濕亦可。

十五 醫治血衄立愈方

舌衄。舌上出血不止也。用海螵蛸、蒲黃、炭等分研。糝自愈。

又方 香薷煎湯服之立愈。

又方 槐花末敷之立愈。

又方 舌硬出血不止者。取刺薊搗汁。和酒服。乾者為末。冷水服。

又方 舌尖出血者。蒲黃末擦舌上。內煎服。生黃連一錢。連翹三錢。竹心二十根。自效。

十六 醫治舌碎立愈方

舌皮碎裂。須將雞蛋煮熟。取其硬殼與蛋白間之薄皮。套於舌上。易三四次。舌即脫皮全愈。

十七 醫治舌痛立愈方

舌痛。用兒茶一塊。約二三分。含口內。越宿即愈。

十八 醫治舌脹滿口立愈方

舌脹滿口。用雄雞冠血。擦舌四週。立愈。

十九 醫治舌出口角立愈方

舌出口角。時時搖動。名翠舌風。用翠鳥舌。在兩頰上點戳幾下。即愈。翠鳥舌。須預備。應用倉卒。或無從措辦。或用百舌及鸞鸞舌亦可。或用醋浸舌。或用鹽微糝。亦效。

二十 醫治小舌落下立愈方

小舌落下。用鹽以篋點之。即上。或用鹽橄欖連核。燒灰存性。研末吹之。

二十一 醫治重舌立愈方

重舌。舌下又生一舌也。急用新真蒲黃。研細末。敷之。五七次。即愈。再須吐去再敷。又方 用大黑棗一枚。去核。裹入青礬一錢。紙包煨熟。去棗留核。以一二分調水塗之。無不立愈。

又方。重舌腫痛。用蜂房炙研。酒和敷之。日三四次自愈。

又方。重舌涎出。水漿不入。用太陰玄精石二兩。牛黃。硃砂。龍腦各一分爲末。以針刺舌上去血。鹽湯漱口。摻末。嚥津神效。

又方。重舌且厚。以銹鐵燒紅。用鐵錘擊之。則銹鐵之屑落下。再研細。水調和敷之。立愈。

### 二十二 醫治木舌立愈方

木舌。舌麻木無知覺也。用僵蠶研末吹之。吐痰即愈。

又方。蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久自愈。

又方。秤錘燒赤。淬醋一盞。飲之即愈。

又方。川椒以生麵包丸。每服十粒。醋湯下。

又方。半夏醋煎。含漱之。

### 七 牙齒病

#### 一 醫治牙痛立愈方

牛痛。用老蒜頭兩瓣。輕粉一錢。同搗爛。敷經渠穴。穴在手大指後。手腕處。寸脈後。即是。如不知穴處。可敷於大指二指間之火。又口外用蜆壳蓋住。或用別物亦可。男左女右。少頃。微覺其辣。隨起一泡。將泡挑破。揩去毒水。即愈。百發百中之神方也。

又方。用紫蘇根曬乾。點紅燒痛處。即愈。

又方。冰片。硼砂。各等分。加提硝少許。調敷腮上。及作痛之牙肉上。無論風火蟲挂。均效。

又方。石碱一小塊。含於痛處。俟吐出涎沫。其痛即止。

又方。白礬少許。含於痛處。即愈。

又方。冰片六分。牙硝五分。硼砂三分。辰砂三分。研細末。用陳茶漱口。以藥搽上。即愈。

又方。輕粉五錢。牙硝三錢。冰片二分。共研細末。擦之立愈。

又方。輕粉五錢。牙硝三錢。冰片二分。共研細末。擦之立愈。

又方。輕粉五錢。牙硝三錢。冰片二分。共研細末。擦之立愈。

又方。輕粉五錢。牙硝三錢。冰片二分。共研細末。擦之立愈。

又方。輕粉五錢。牙硝三錢。冰片二分。共研細末。擦之立愈。

#### 二 醫治風火牙痛立愈方

風火牙痛。惡熱者是。此症腮外發腫。呵氣亦痛。用生大黃末燒酒調敷腮上。自效。

又方 白炭灰（即炭灰之白色者）散膏藥上貼腮際。即愈。

又方 沒實子（藥店中購）一粒。分為兩片。以一片含於痛牙間。一片貼於腮上。漸見流涎吐出。其痛立止。

又方 五倍子末。冷水調敷腮頰。亦效。

又方 細辛三錢。豬牙皂角三錢。各炒共研細末。搗大蒜汁為丸。用雄黃壹錢五分。一半入前末內。

和丸。一半為衣。左牙痛塞在右耳內。右牙痛塞在左耳內。丸如桐子大。每用一丸。以綿裹塞。

又方 南瓜蒂浸入鹽內。取出風乾。痛時取一小塊嵌齒間。試無不驗。

又方 生竹葉一斤（去梗）生薑四兩。淨白鹽六兩。先將竹葉熬出濃汁。又將薑搗汁同熬。瀝淨。

同鹽共熬乾。如遇牙痛。擦一二次。即愈。

三 醫治風寒牙痛立愈方

風寒牙痛。惡寒者。是用川椒三分。細辛二分。白芷防風各一錢。用滾開水泡透。時時含入口。片刻吐出。再含自愈。

四 醫治風熱牙痛立愈方

風熱上蒸牙痛。此實痛也。用連翹滑石銀花各二錢。水煎服效。

又方 淡竹葉三錢。石膏三錢。煎服即愈。

五 醫治陰虛牙痛。愈方

陰虛牙痛。此症緩痛而無間斷。用生地一兩。枸杞八錢。栗子念枚（去壳）精豬肉四兩。共煮熟食之。自愈。

又方 龍眼肉貼痛處。或用上附子敷足心。亦效。

又方 用陳呂宋煙灰代牙粉擦牙。亦有奇效。

又方 陰虛邪火上蒸。牙痛連及頭頂。此症陽明。

有餘少陰不足。用熟地五錢。石膏、麥冬、各三錢。煎服神效。

### 六 醫治腎虛牙痛立愈方

腎虛牙痛用甘松、香硫黃等分爲末。泡湯漱之。  
又方 補骨脂二兩。青鹽五錢。炒研擦之。

### 七 醫治蟲蛀牙痛立愈方

蟲蛀牙痛。痛在一處。或有濃者。是用明雄末二兩。小磨麻油四兩。調勻。搽痛處。漱去。再搽。日數次。自愈。

又方 以芥子泥敷於頰部及耳後。再用生薑二斤。貼於太陽上。時取上好老酒。合於口中。若有蛀孔。則先以棉花團成小團。然後浸於石灰酸水內。填入孔中。

又方 韭菜子燒烟熏之。牙蟲即出。其法以筆管用紙糊喇叭樣。可以收煙。

又方 以芭蕉自然汁一椀。煎熱。含漱。自愈。

又方 剪取桃樹之枝。以綿布條裹其一端。蘸菜油於燈上熏熱。置痛齒上。炙其一端。如是數次。蟲斃痛止。屢試屢驗。

### 八 醫治牙根腫痛立愈方

牙根腫痛。用瓦花、白礬等分水煎漱之。立效。  
又方 芥菜桿燒存性。研末。頻敷之。即愈。

### 九 醫治牙關緊閉立愈方

牙關緊閉。用鹽梅擦牙上。涎出。即開。

### 十 醫治牙縫出血立愈方

牙縫出血。用黃豆渣敷之。立止。

### 十一 醫治牙齦宣露立愈方

牙齦宣露。每晨嚼鹽熱水。含百遍。五日後。即復原。

### 十二 醫治牙齦黑臭立愈方

牙齦黑臭。用苦參煎湯。漱口數日。有效。

### 十三 醫治牙齒作酸立愈方

牙齒作酸。以胡桃內食之。即愈。

**十四** 醫治齒腐齧爛立愈方

齒腐齧爛。以上好鹵鹼。熱湯淋取其汁。用石器熬乾刮下。入麝香少許。研勻。搽上。神效。

又方。絲瓜藤一握。川椒一撮。燈心一把。水煎濃汁。漱吐。

**十五** 醫治齒疏陷物立愈方

齒疏陷物。以爐甘石。寒水石。等分爲末。每用少許。擦牙。忌用牙刷。久之自密。

又方。絲瓜藤陰乾。臨時火煨存性。研擦最妙。

**十六** 醫治蟲齧齒動立愈方

蟲齧齒動。用鹽半兩。皂角兩枚。同燒赤。研細。夜夜揩齒。一月後。其齒自愈。

**十七** 醫治睡中磨齒立愈方

睡中磨齒。於臨睡時。含糖一小塊。可免。

**十八** 取除牙痛神效方

取除痛牙。可將鳳仙花子。研末。入砒少許。點痛牙

根上。除之極易。

又方。將礪砂入鯽魚肉。煨過。瓶收。待有霜刮下。以針披開牙根。點少許於內。牙自落。

**十九** 堅固牙齒神效方

固齒。用火煨羊脛骨爲末。入飛鹽二錢。同研勻。日擦牙。其法最妙。

又方。用旱蓮根一斤。酒洗淨。青鹽四兩。醃三宿。同汁炒乾。研末。日用擦牙。連汁嚥之。自能固齒。

又方。小便時咬緊牙關。牙齒堅固。且永無牙痛之患。

**二十** 預防牙症神效方

預防牙痛。用頂上白礪砂二錢。薄荷油二滴。溶化於六兩之淨開水中。作漱口料。每日漱口數次。可免一切牙症。

**八** 咽喉病

**一** 醫治喉蛾立愈方

喉蛾。腫起有塊也。用巴豆霜一錢。豬牙皂一錢。麝香一分。共研末。納入瓶中。用時即以小紅棗半枚去核。以藥少許納棗內。捲緊塞內鼻孔中。神效。

又方 燈草（即油蓋內所燃之燈草）燒灰成性。又以人指甲焙燥研末。勻和吹喉內。亦效。

又方 白鵝糞開水沖之。待澄清後。將上面清水輕輕傾於他碗。頻漱其喉。少傾吐出。切勿下咽。再以人指甲焙乾研末。加百草霜。西瓜霜。燕子窠泥。少許。另以冰硼散調和。吹入喉內。即愈。

又方 凡喉間覺有梗痛而微癢者。此即喉蛾初起之朕兆。急以人中白二錢。膽礬二錢。共研末。日吹數次。即愈。

## 二 急救喉蛾真秘方

凡患者頭部及手之兩虎口內（即在大指二指之間）見有紅疹及水泡。立以銀針挑破。再以大蒜搗爛敷經渠穴（即在大指寸脈後面微窩處）

男左女右。用蜆壳蓋上。紮住片時。患者覺有微辣。搗去。或起一水泡。仍用銀針挑破。毒水出而喉蛾亦穿。其患立愈。

## 三 醫治單喉蛾立愈方

地骨皮、雄黃等分爲末。吹數次。即愈。

## 四 醫治雙喉蛾立愈方

壁蟾珠窩十八個。拭淨。裝入筆管內。用燈火燒成灰。取出。放在紙上。加冰片二三釐。和勻。蛾在左。將藥吹右鼻。若在右。吹左鼻。若雙蛾。二鼻俱吹。即消。

## 五 醫治單雙喉蛾立愈方

單雙喉蛾。用桐油（須原料。即名白油。切勿用紅光油）一杯。取新筆一枝。浸油內。少頃。蘸油滴入患處。即破。流出淡血。吐之而愈。

又方 天竹葉、黃柏洗淨。共搗汁。加好醋少許。調和。含口中。漸漸咽下。毒消自愈。

又方 木鱉壳一錢六分。煨乾存性。研末。再加鹽

一錢六分。上號麝香二分。頂上梅片二分。研細。共  
同勻和。貯藏瓶內。用黃蠟封口。勿令泄氣。用時吹  
喉間。少許立效。

又方 牛鼻繩（即穿在牛鼻中之繩）愈久愈  
妙。取繩剪其兩端。將常穿在牛鼻中者。約五寸許。  
燒灰存性。吹患處。即時潰破出膿。吐之立愈。

又方 真正牛黃冰片二味。將烟筒內烟油加入  
藥內。搓成小丸。含入喉嚨間。其藥漸化。俟毒涎吐  
出。其患立愈。

又方 鴨蛋一個。取清。另加皂角刺末七分。調和  
以鴨毛蘸點喉間。並撥弄作癢。令吐膩痰。愈多愈  
妙。再吹冰硼散。立能見效。

又方 橄欖核二個。煨燒研末。加冰片數分。勻和  
吹患處。即愈。

又方 不論雙單蛾。於初起時。將剪斷葶藶數根。  
約寸許長。析為細絲。裝入旱烟筒內。如吸煙之法。

吸三次。即愈。此法奇而有效。

六 醫治喉蛾腫痛立愈方

喉蛾腫痛。吐咽不下。須於十二月初八日。取雄豬  
膽一個。裝入白礬末。陰乾研末。待次年。仍於是日  
取雄豬膽一個。將上年豬膽末裝入同瓶。如遇此  
症。即取膽末三分。吹喉立愈。惟虛大喉症。切忌此  
方。須慎之。

七 醫治喉風立愈方

喉風腫起有塊。且惡風也。用壁喜兒窠二十個。瓦  
上焙。研細吹之。即刻血散痰消而愈。

又方 黃瓜去瓤。人生礬末裝滿。仍將瓜口蓋好。  
外以紙封之。挂而風無日處。陰乾過驚蟄後七日  
取下。研細收藏。吹患處立瘥。

又方 木鱉一枚。用碗片刮去皮毛。取仁切薄片。  
浸冷水內三時許。搗開病人口。連水滴下。潤至喉  
間。立時見效。

又方 人指甲、白蟻窠、各等分。以藥每錢。加麝香一分吹之。並治各種喉症。

八 醫治白喉風立愈方

白喉風。以蒼耳煎水服之。神效無比。

又方 以廣東萬年青搗汁灌之。亦效。

九 醫治鎖喉風立愈方

鎖喉風。用甘菊花根洗淨搗汁灌下即愈。

又方 用鵝毛一根粘真桐油一分入喉捲攪痰隨油吐即愈。服甘草水可解油氣。

十 醫治爛喉痧立愈方

患爛喉痧者。喉間作痛爛不收口者是也。服櫻桃十粒即愈。如無新鮮者服蜜餞者亦可。

又方 象牙屑、廉珠各三分、飛青黛六分、梅花冰片三釐、壁錢二十個、犀黃人指甲各五釐共研極細粉吹患處。雖瀕死者可救。

又方 將患者頭頂髮拔去數莖。視有無紅筋紅

點。先用生薑一大片蘸青桐油擦之。以皮白為度。紅筋等自然顯露。用銀針挑破擠去惡血。喉間結毒自消。然後進藥。可保萬全。

十一 醫治喉間瘰肉立愈方

喉間生小塊名曰瘰肉。用綿裹箸頭蘸鹽點肉上。日五六次自愈。

十二 醫治喉間結塊立愈方

喉間結塊不通水食。危困欲死者。用百草霜蜜和丸。芡實大新汲水化服。一丸灌下自效。

又方 膽礬含口內俟惡涎吐盡亦效。

十三 醫治喉間作癢立愈方

喉間作癢不可吃茶酒湯水。用薄荷二分。麝香五釐。研極細末吹入喉中。吐出涎水碗許。再用陳米二合煎湯飲之。若先服茶酒等物則難治矣。

十四 醫治咽喉聲啞立愈方

咽喉聲啞。用真硼砂一兩。元明粉膽星各一錢。訶

子肉二錢。冰片三分為末。外加烏梅一兩。搗為丸。為龍眼核大。每用一丸。含化數粒。即愈。

十五 醫治喉爛立愈方

喉爛。用紫蘇葉八分。蘆薈湯煎服。極效。  
又方。蘆薈菜。於初冬時。攤於屋瓦上。任其風吹日曬。雨洗霜凌。至立春前一日。收下。懸挂簷下。有風無日處。愈。久愈佳。煎濃湯服。亦效。

十六 醫治喉閉立愈方

喉閉。用鵝血山豆根。煎湯服之。良效。如痛腫者。用巴豆一粒。不拘何物。包裹鼻中。男左女右。  
又方。以鴨嘴膽礬。研細。用醋調灌。藥下咽後。即吐涎膠痰。自愈。

十七 醫治喉痛立愈方

喉頭或癢或痛。用明礬一兩。薄荷腦五釐。分作二十分。每分以水二合。至三合。溶解數百回。含漱自愈。

又方。冰片三分。殭蠶五釐。硼砂二錢半。牙硝七錢半。共研細末。吹患處。

十八 醫治喉腫立愈方

喉腫。用括萋皮。白殭蠶炒。甘草炒。各二錢半。為末。每服三錢半。薑湯下。或以綿裹五分。含嚥。一日二次。自愈。

又方。青艾和莖葉一握。同醋搗爛。敷於喉上。冬月取乾艾亦可。

十九 醫治咽喉腫痛立愈方

咽喉腫痛。紅腐。用真青黛一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。粉口兒茶一錢。元明粉五分。馬屁勃五分。梅花冰片二分。研細。搽之。痛甚者。加犀黃三分。珍珠五分。其效尤捷。

二十 醫治咽喉急症立愈方

凡遇咽喉急症。用蜒蚰數十條。放入小口磁瓶內。將梅花冰片五錢。傾於上面。將瓶用黃蠟封固。弗

令洩氣。稍久化爲水。如用時。將此水滴入喉間。立刻見功。對於喉蛾。尤有特效。

又方 青魚膽最大者（小者無效）刺取膽汁。以拌白米。仍放入青魚膽衣內。緊紮其口。懸透風處。陰乾研末。加入礪砂二兩。冰片一兩。麝香三分。共研細末。勻和。一切喉症治之均效。

▲九 心胃肝氣病 附胸腹腰脅

一 醫治心氣痛立愈方

心氣痛。將蒲公英焙焦研末。封貯磁瓶內。用時。加燒酒少許。搓成小丸。服之即愈。如善飲者。用酒送下。更妙。

又方 鬱金一錢。香附八分。煎服亦效。

又方 稀簽草搗汁。服之即愈。

又方 真山羊血。溫酒沖服。頗效。

又方 豹心切爲薄片。開水沖服。上效。

又方 鹿角三錢。剉末。用黃酒沖服。立效。

又方 大川芎一個。研末。燒酒沖服。立效。

又方 公丁香。白荳蔻。研末。開水沖服。甚效。

又方 烏梅一枚。紅棗二枚。杏仁七枚。搗碎。男用酒。女用醋。調服亦效。

二 醫治心痺痛立愈方

心痺氣痛。氣實有痰者。用煨牡蠣粉調酒服。二錢。甚效。

又方 服藥已止而後痛者。用元明粉一服。立止。

三 醫治結氣心痛立愈方

結氣心痛。用人參一兩。橘皮去白一兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每次米飲下。五六十九。自效。

又方 刺蝟心。剖取帶血。掛簷下。風乾研末。用陳酒或開水沖服。甚效。

四 醫治積年心痛立愈方

積年心痛。濃煮小蒜飽食。勿著鹽。自效。

五 醫治心痛吐水立愈方

心痛吐水。飲食不下。用雄黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。蒸乾。和九。梧子大。每服七丸。薑湯下。極妙。

六 醫治心痛徹背立愈方

心痛徹背。用赤石脂。乾薑。蜀椒。各四分。附子炮二分。烏頭炮一分。共為末。蜜丸。梧子大。先服一丸。如不止。再服自效。

七 醫治心氣怔忡立愈方

心氣怔忡。用龍眼核一斤。去黑皮。長流水煮極爛。加大烏棗一斤。去核。搗爛如泥。和丸。每晨淡鹽湯下三錢。即愈。

又方。人參。當歸。各五錢。用猪腰子一對。以水二碗。煮至一碗半。取腰子切細。與人參。當歸。同煎至八分。空心食腰子。以汁送下。其滓焙乾為末。以山藥末和丸。如菜豆大。每服五十九丸。棗湯下。不過二三服。即愈。

八 醫治心中嘈雜立愈方

心中嘈雜。此症似餓非餓。似痛非痛。得食暫止。可用猪護心油。蒸糯米食。即愈。

又方。水仙花子。同荷葉芍藥為末服。亦效。

九 醫治惡心吞酸立愈方

惡心吞酸。此脾胃虛冷也。用吳萸四錢。滾水泡去苦味。水煎服。或加乾薑壹錢。亦可。忌夜食。並忌生冷食物。

又方。核桃嚼爛。薑湯送下。

十 醫治胃氣痛立愈方

胃氣痛。用蛤蜊粉約兩茶匙。開水沖服。立愈。

又方。廣木香二錢三分。乳香一錢三分。雄黃二錢三分。明礬四分。共服五分。黃酒送下。亦效。

又方。香附子炒熱。以燒酒澆之。將附子盛於布袋內。徐徐運於腹部胸部。使胃痛受其熱氣。即能止痛。

又方。煨姜三片。每晨煎服。連服一月。自可斷根。

又方 赤白芍二錢。川棟子一粒。煎湯服之。即愈。  
又方 天門冬二錢五分。燈草一錢。硃砂數十文。  
紅棗七枚。煎服立效。  
又方 烏梅二枚。砂仁少許。同焙。研細末。和服。亦效。

### 十一 醫治心胃氣痛立愈方

治九種心胃氣痛。用瓦楞子肉。煨乾研末。每服一錢。開水送下。立止。

又方 荔枝核七枚。燒灰存性。一即置於地上。用碗蓋之。研存細末。加牛膝共研和為丸。陳酒送下。亦效。  
又方 沙穀芽煎湯代茶。久服。無論各種心胃氣痛。均效。

### 十二 醫治肝胃氣痛立愈方

肝胃氣痛。用檀香泥。一係檀香樹內結成之泥。非樹外面之泥。五分。開水沖服。立愈。

又方 婦女肝胃氣痛。用乾海參。剖開。取其肚內腸雜。置於瓦上。炙燥研末。陳酒沖服。甚效。

### 十三 醫治胃腕氣痛立愈方

胃腕氣痛。用香附子炒三兩。烏藥泡二兩。共研細末。水醋煮蒸餅糊丸。如梧子大。每服二三粒。白湯下。並治氣鬱諸病。

又方 胃腕劇痛。諸藥不效者。取牙皂燒存性。研末。以燒酒調服。錢許。亦效。

### 十四 醫治胃腕脇痛立愈方

胃腕脇痛。以生韭菜搗汁。約服一小杯。即愈。  
又方 真山羊血一兩五錢。蒸熟。置於新瓦上。用炭火焙乾研末。分作三服。每服加糖少許。黃酒送下。止痛如神。

### 十五 醫治反胃噎膈立愈方

反胃噎膈。用豬肚一只。老姜六兩。切片入豬肚內。煮熟。淡食能愈。

又方 白蘿蔔葉。河水濃煎。日服三次。輕者一月。重者二月。不可間斷。其方甚效。

又方 雞蛋殼。用炭火烘。至黃色微焦。研成細末。早晚用米湯送下。如善飲者。用酒調服。亦效。

又方 覓醋缸內蟲。焙乾研末。陳酒沖服。亦效。

十六 醫治反胃嘔吐立愈方

反胃嘔吐。用老薑一大塊。挖孔納紅棗一枚。紅棗去核。內包砂仁一顆。外用黃泥包裹。煨透。去泥與薑棗。只取砂仁嚼食。每食數顆。數次即愈。極效。

又方 蚯蚓糞壹兩。木香叁錢。大黃七錢。為末。每服五錢。無根水調服。忌煎炒酒醋椒薑熱物。一二服即愈。其效如神。

又方 以豆蔻仁和冰糖塊。合入口中。數分鐘即止。奇效。

又方 石蓮肉為末。入少許蔻豆末。米湯調服之。亦效。

十七 醫治胃熱嘔吐立愈方

胃熱嘔吐。用蘇葉一分。黃連二分。徐徐呷下。自愈。

十八 醫治胃寒嘔吐立愈方

胃寒嘔吐。用大黑棗七個。去核。入丁香煮爛。去丁香。將棗連湯空心服。七服自愈。

十九 醫治嘔吐清水立愈方

嘔吐清水。乾蘄艾煎湯。啜之。極效。

二十 醫治嘔吐黃水立愈方

胃寒疼痛嘔吐黃水。用生薑壹斤。搗汁碗許。入牛皮膠。乳香末。沒藥末。各五錢。同煎。膠化離火。將藥作三四大膏藥。以一張貼胃脘痛處。用綢綁捆三個時辰。然後取週歲小孩所穿之鞋一雙。銅鑼上烘極熱。在膏上輪流熨之。熨至膏硬。換膏再貼。再綁三時再熨。至愈為止。

二十一 醫治吐酸立愈方

吐酸。用黑山梔三錢。煎濃汁。入生姜汁少許。和服。

二十二 醫治乾嘔立愈方

乾嘔。苔白不渴者。用橘皮。生姜煎湯服。口苦而燥者。黃連煎湯服。

二十三 醫治呃逆立愈方

呃逆。濃煮蘆根汁飲之。或以枇杷葉濃煎服。或以橘皮竹茹煎服均效。

又方。呃逆不止。用荔枝七個。連殼燒灰為末。白湯下極妙。

又方。用燈草一小束。燒灰。熱水沖服。立即止呃。

二十四 醫治消渴立愈方

消渴。用白芍藥。甘草等分為末。每用一錢。水煎服。日三服。自愈。

又方。取稻穰中心。燒灰。每以水浸一小杯。澄清飲之。即愈。

又方。冬瓜。或留葉。不論鮮乾。並煮汁飲。黃連煎服。甚效。

又方。好梨汁。蜜湯熬稠。不時服。

又方。消渴飲水。日夜不止。小便數者。用田螺五升。水一斗。浸一夜。渴即飲。每日一換水。或煮汁飲。亦可。

又方。消渴引飲。兼小便不利者。用葵根五兩。煮汁。平日日一服。

又方。消渴有蟲。用苦楝根白皮一握。切焙。入麝香少許。煎空心飲。雖困頓不妨。

又方。消渴變水腫。用真蘇子。蘿蔔子。等分。微炒研末。桑白皮湯煎。調末服。三錢。自效。

二十五 醫治食積立愈方

凡飲食停滯。胸膈脹滿。大便不通者。皆是用亂髮一團。剪斷。酒麪大者一塊。葱白七個。生薑三厚片。胡椒七粒。取鷄蛋一個。破殼。傾入碗中。將各藥搗融。和入調勻。用隔夜燈油煎成一餅。貼病人心坎下胃脘處。以布紮住。冷則煎熱再貼。半日許即愈。

又方 飯搓成團。加鹽少許。燒枯。煎水飲下。即消。  
又方 蓖麻油、牛乳等分。煮沸。入糖少許。冷服。自效。

二十六 醫治糯米積立愈方  
凡食糯米積滯。神麴炒為末。加木香鹽湯下。數日。口中必聞酒香。其積即消。

二十七 醫治麵食積立愈方  
食麵積滯。生蘿蔔取汁。燉服。極效。

二十八 醫治魚肉積立愈方  
魚肉積滯。用山查炭研末。沖服。每服四錢。數次即消。

二十九 醫治牛肉積立愈方  
牛肉積滯。用乾稻草一握。煎濃湯。熱飲。自消。

三十 醫治羊肉積立愈方  
羊肉積滯。用栗子殼煎湯。服之。即愈。

三十一 醫治雞蛋積立愈方

雞蛋積滯。飲好醋。或豆豉水。即消。

三十二 醫治鴨蛋積立愈方  
取淘糯米水。煮熱。飲一杯。自消。

三十三 醫治豆積立愈方  
食豆積滯。取生蘆菔汁。飲一杯。即消。（豆腐同）

三十四 醫治索粉積立愈方  
索粉積滯。用杏仁五十粒。去皮尖。蒸熟。搗爛。開水沖服。自消。（涼粉同）

三十五 醫治瓜積立愈方  
食瓜積滯。即將瓜皮煎湯。飲。自解。

三十六 醫治果積立愈方  
食果積滯。用桂心五錢。麝香五分。研細。飯和為丸。

菜豆大。每服十五丸。開水下。

三十七 醫治菱積立愈方  
食菱積滯。取生薑汁。飲下。立消。

三十八 醫治茶積立愈方

飲茶積滯。川椒炒碾末。糊丸。梧子大。每服十九。茶湯下。

### 三十九 醫治酒積立愈方

飲酒積滯。用雞內金、乾葛等分爲末。蒸餅丸。梧子大。每酒下五十九。自消。

### 四十 醫治痞積立愈方

痞積。係結塊於腹內者。取雄黃、白礬各一兩。共研。麵糊調膏。貼患處。重者再貼。必消。  
又方。陳醬茄燒存性。入麝香、輕粉少許。豬油調貼。自愈。

### 四十一 醫治癖塊立愈方

癖塊。係痰凝氣滯之病。在皮裏膜外者。用延胡索爲末。豬脂一具。切塊炙熟。蘸藥食之。自愈。  
又方。臭椿樹皮內肉。打碎煎膏。貼患處。塊即下行而消。

### 四十二 醫治氣癖立愈方

氣癖在小腹上。攻衝心痛。用穿山甲片炒爲末。砂糖調陳酒送下。每服三錢。止痛如神。

### 四十三 醫治痰飲立愈方

頑痰不化。名曰痰飲。用石青一兩。石綠半兩。並水飛。麴糊丸。菘豆大。每服十九。溫水下。吐去痰一二。碗即愈。

又方。停痰宿飲。風氣上攻。胸膈不利。用香附（皂莢水浸）半夏各一兩。白礬末半兩。薑汁。麵糊丸。梧子大。每服三十九。薑湯隨時下。

又方。冷痰惡心。以葦荻一兩爲末。食前。用米湯服半錢。

又方。痰飲宿水。收桃花陰乾爲末。溫酒服一合。取利如覺虛。食粥少許。自效。

又方。飲酒痰癖。兩脅脹滿。時復嘔吐。腹中如水聲者。用括囊實去殼焙一兩。神麴炒半兩。共爲末。每服二錢。葱白湯下。

**四十四** 醫治肝氣痛立愈方

肝氣痛。用茉莉花一百朵。去蒂。加冰糖數兩。共貯蓋碗內。於飯鍋上蒸數十次。每服一調羹。開水沖服。食完即愈。

又方 陳香櫟一個。砂仁三錢。炒萊菔子三錢。共炙乾研末。用糖拌勻。日常食之。可望斷根。

又方 鱖魚腹中。時有小魚。將小魚焙乾研末。黃酒送下。永不再發。

**四十五** 醫治胸痛立愈方

胸痛。胸脅脹痛如刺。不得俛仰。用生韭菜或根五斤。搗汁服。自愈。

**四十六** 醫治結胸立愈方

凡心胸脅下有邪氣結實。硬痛脹滿者。名曰結胸。用生薑一斤。搗渣留汁。慢炒待潤。以絹包於患處。款款熨之。冷則再以汁炒。再熨良久。自豁然寬爽。又方 桔梗枳殼各等分。水二鐘煎。一服自愈。

**四十七** 醫治寒結胸立愈方

寒結胸。用巴豆飛麵研。調餅敷胸前。極佳。

**四十八** 醫治熱結胸立愈方

熱結胸。用大黃芒硝二味。葱白搗敷。神效。

**四十九** 醫治腹痛立愈方

腹痛。將鹽炒熟。布裏熨之。自愈。

又方 烏藥水磨汁一杯。入橘皮一片。紫蘇一葉。煎服自愈。

**五十** 醫治小腹痛立愈方

小腹痛。用鴿糞一合。研細。極熱酒一杯。和勻。澄清服。自愈。

又方 乾黃土煮數沸。去滓溫服。

**五十一** 醫治腰痛立愈方

腰痛。用黑芝蔴炒香。研末。酒溫下。服至一斗。自愈。

又方 刀豆壳焙乾。研灰。黃酒沖服。頗效。

又方 大豆六升。水拌濕。炒熱。布裏熨之。冷即具。

去。

又方 鱧甲炙研末。酒服一匙。每日二次。

又方 腰痛難忍。絲瓜根燒灰存性。每服二錢。用酒冲服。甚效。

又方 男女腰痛。用竹根八錢。陳酒煎服。早晚二次。其痛自止。

**五十二** 醫治腎虛腰痛立愈方

腎虛腰痛。將白扁豆。時常煮食。頗效。

又方 用猪腰子一枚。切片。以椒鹽醃去腥氣。入

杜仲末三錢在內。荷葉包煨食之。酒下。

又方 破故紙一兩。炒為末。溫酒服三錢。神效。

**五十三** 醫治虛寒腰痛立愈方

虛寒腰痛。用糯米二升。炒熟。盛袋中。拴靠痛處。內以八角茴香研酒服。

**五十四** 醫治腰骨痛立愈方

腰骨痛。蒼蠅老虎（即食蠅之蟲）兩個。焙燥。陳

酒冲服。自愈。

**五十五** 醫治腰背酸痛立愈方

腰背酸痛。取黑芝蔴、白糖霜各三錢五分。用水煎濃服之。能愈。

又方 山楂核五錢。用瓦焙乾。研灰存性。陳酒冲服。數次即愈。

又方 明天麻三錢。秦艽二錢五分。獨活一錢五分。煎濃服。有效。

**五十六** 醫治腰腿疼痛立愈方

腰腿及兩膝疼痛。用生黃芪八錢。遠志三兩。牛膝

三兩。石斛四兩。用水煎濃成液汁。再以銀花一兩

煎湯冲服。分兩次服完。服後蓋被而睡。覺兩腿發熱如火。汗出即愈。

**五十七** 醫治脇痛立愈方

脇痛。兩脇脹痛也。地膚子為末。酒服二錢。

又方 元胡索去皮。金鈴子去核。等分為末。旋覆

花湯下二錢。

又方 腎氣衝腦。如刀刺痛。喘息不得。將生茴香。搗汁一合。投熱酒一合。和服。

又方 脅下刺痛。用小茴香一兩。炒。枳殼五錢。麩炒。共為末。每服二錢。鹽酒調下。神效。

**五十八** 醫治脇骨疼痛立愈方

脇骨疼痛。因驚傷肝者。用枳殼一兩。麩炒。桂枝生半兩。為細末。每服二錢。薑棗湯下。

**五十九** 醫治胸脇氣逆立愈方

胸脅氣逆。用茯苓一兩。人參半兩。每服三錢。水煎服。日三服。自愈。

**六十** 醫治諸般氣痛立愈方

治諸般氣痛。用頂好高粱酒三兩。浸冰糖一兩五錢。將高粱酒燃火燒之。待其自熄。將餘存冰糖。開水沖服。甚效。

▲十 肺病 附吐血

**一** 醫治咳嗽立愈方

燥喘日咳。有痰而喘。日嗽。用猪脰一具。薄切。煮食。神效。

又方 甘梨恣啖。或加白蜜蒸服。

又方 陳海蟄。清水洗淨。便無鹹味。和以冰糖。約十分之四。同放蓋碗內。飯上蒸熟。蟄化為水。咳時飲一二口。久飲能愈。

又方 白菓十粒。冰糖十塊。蒸熟食之。一日見效。

又方 橄欖七枚。冰糖七粒。蒸服亦愈。對於風寒咳嗽尤效。

又方 藕切去兩頭。以白糖實於藕孔。稍頃。糖化為水。飲之亦效。

**二** 醫治寒咳立愈方

寒咳嗽。用乾薑末半錢。熱酒調服。或以錫糖和丸。又方 核桃連皮。加冰糖少許。搗爛。開水沖服。數次極有效驗。

又方 寒咳痰喘者。用白菓七個。煨熟。以熟艾作七丸。每果入艾一九。紙包再煨香。去艾食。

### 三 醫治熱咳嗽立愈方

熱咳嗽。用濃茶一杯。蜜一杯。大熟括萸一個。去皮。將麪入茶蜜內。洗去子。椀盛飯上蒸之。候飯熟。取出時時挑三四匙嚥之。

又方 熱盛而咳嗽者。用石膏二兩。甘草炙半兩。爲末。每服三錢。生薑蜜調下。

又方 用甘蔗汁一升半。青梁米四合。煮粥。日食二次。極潤心肺。

### 四 醫治肺虛咳嗽立愈方

肺虛胸熱。咳嗽氣急。煩滿。咽喉燥渴。體倦肌瘦。發熱減食。喉嚨音嘶。用黃蠟溶。瀝極淨。再用酸漿水。煮過八兩。入銅器內。化溶。作一百二十九。蛤粉四兩。爲衣。每服一九。核桃半個。細嚼。溫水下。靜臥。閉口不語。日服二丸。漸漸平愈。忌食鷄半年。

### 五 醫治肺癆咳嗽立愈方

肺癆咳嗽。用大藕一段。去一頭節。灌蜜全滿。仍合好紙封。煮極熟食之。自愈。

又方 少年肺癆咳嗽。用豬肺一個。弗落水洗淨。生鷄蛋灌於肺中。白水煮食。自愈。

### 六 醫治肺痿咳嗽立愈方

風寒入肺。或勞力內傷。以致咳嗽聲重。胸膈隱痛。頸項強硬。不能轉側。此肺癰也。久則鼻流清涕。咳吐膿痰。黃色腥穢。甚至胸膈脹滿。呼吸不靈。飲食減少。脈洪自汗。漸至咳吐皆痰血。寒熱往來。形體消瘦。聲啞喉痛。轉爲肺痿。此危症也。用大瓜萸一個。開一孔。先數內有子多少。粒用杏仁去皮尖。照數配入。封好。外用黃泥包裹。燒紅。燒至無煙。取出。用物蓋住。候冷去泥。又用川貝母。照瓜萸子數配入。共研細末。臨臥時。每用二錢。白蜜調勻。燈草煎水送下。其效如神。

七 醫治肺熱痰咳立愈方

肺熱痰咳。胸膈塞滿。用括蕁仁半夏湯泡七次。焙研各一兩。薑汁打麵糊丸。梧子大。每服五十九。食後薑湯下。

八 醫治肺熱痰嗽立愈方

肺熱痰嗽。用製半夏括蕁仁各一兩。研末。薑汁打糊為丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。或以括蕁麵煮熟丸之。

九 醫治寒痰咳嗽立愈方

寒痰咳嗽。用燒酒四兩。豬脂蜜香油茶末各四兩。同浸酒內。煮成一處。每日挑食。以茶下之。極效。

十 醫治熱痰咳嗽立愈方

熱痰咳嗽。用白礬建茶等分為末。糊服。善化痰止咳。又方。絲瓜煨研末。棗肉糊丸。彈子大。每一丸酒下。功用同上。

十一 醫治風痰咳嗽立愈方

風痰咳嗽。用大天南星一枚。炮製研末。每服一錢。水一盞。薑三片。煎五分。溫服。每早午晚各一方。

十二 醫治痰喘咳嗽立愈方

痰喘咳嗽。用多年陳白蜆殼燒存性。為極細末。米飲調服一錢。日三服。自愈。

又方。生梨蘿蔔茅草根生薑各搗汁一小碗。和白蜜四兩煎服。神效。

又方。杏仁二錢。石膏二錢。麻黃二錢。甘草二錢。煎湯服之。亦效。

又方。向日葵梗。去皮取肉。三兩煎湯服之。亦效。

十三 醫治痰飲咳嗽立愈方

痰飲咳嗽。用葶藶子紙襯炒令黑。知母貝母各一兩。為末。棗肉半兩。沙糖一兩半。和丸。彈子大。每以新棉裹一丸。含之。嚥津。甚者不過三丸。自效。

十四 醫治咳嗽痰多立愈方

咳嗽痰多。用童子鷄一只。去其五臟。將白木耳四兩。白楊梅頭花十餘個。同塞鷄腹內。煮熟。將白楊梅頭花棄去。取鷄及木耳淡食。立愈。(白楊梅頭花。年輕者只用數個。其多少視年歲定之)。  
又方。熟括蕓十個。明礬二兩。搗和餅。陰乾研末。糊丸。梧子大。每薑湯下五七十九。

**十五** 醫治久咳不止立愈方

久咳不止。用熏黃。木香。苘荳子。等分爲末。羊脂塗青紙上。以末鋪之。作筒燒烟吸。輒效。

又方。紫菀。款冬花。各一兩。百部半兩。搗爲末。每服三錢。薑三片。烏梅一個。煎湯調下。日二次。甚佳。  
又方。五味子一兩。真茶四錢。曬研爲末。以甘草五錢煎膏。糊爲丸。菉豆大。每二十九。沸湯下。數日即愈。

**十六** 醫治久嗽不止立愈方

久嗽不止。用川貝母末二錢。豬肺一個。同煮淡食。

連服三次。重者亦愈。

又方。三十年老嗽。用百部根二十斤。搗取汁。煎如飴。服一錢。日三服。自效。

又方。久嗽欲死。用厚榆皮削如脂大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。

又方。積年咳嗽。呀呷作聲。用鱈魚殼半兩。貝母煨一兩。桔梗一分。牙皂一分。去皮酥炙爲末。煉蜜丸。彈子大。每含一丸。嚥汁。服三丸。即吐去惡涎而瘥。

**十七** 醫治傷風咳嗽立愈方

傷風咳嗽。如熱嗽則用生梨一大只。寒嗽則用福橘一大只。均加冰糖二兩。清水煮之。愈濃愈妙。連服數次。即愈。

**十八** 醫治秋燥咳嗽立愈方

秋燥咳嗽。用柿餅一枚。切開去核。夾入貝母末二錢。於飯鍋蒸熟。服之。即愈。

十九 醫治老年咳嗽立愈方

老年咳嗽用豬肺一個。弗落水洗淨。加薑汁半杯。蜜糖四兩。杏仁四十九粒。放入肺內。煮熟食之。能愈。

又方。杏仁、胡桃仁等分。搗爛。蜜丸。彈子大。薑湯送下。亦效。

又方。生薑汁五兩。黑砂糖四兩。水煎二十沸。每半匙。漸漸嚥之。亦效。

二十 醫治痰喘立愈方

痰氣哮喘。用馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃。吐出痰涎。極效。

又方。咳嗽痰喘。不問年深日近。用經霜篋麻葉。經霜桑葉。御米殼。蜜炒。各一兩。為末。蜜丸。彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。亦效。

又方。胸喘痰氣。苦丁香三個。為末。水調服。吐痰即止。

二十一 醫治氣喘立愈方

氣喘。將青菜搗汁。置飯鍋上蒸熟。和白糖少許。飲之。每天服一碗。連服十餘天。即愈。並可除根。

又方。高麗別直參一兩。研末。和鷄蛋白為丸。如桐子大。再以溫臘茶（即臘月內之茶）一錢。復煎稍頃。熱服立效。

又方。胡桃肉連衣。杏仁去皮尖。生薑各二兩。研膏。入蜜煉丸。彈子大。臥時服。

又方。人參末三錢。鷄子清調。五更初服。便可仰臥。年久者再服愈。

又方。豬爪甲二枚。燒灰研細。入麝香。當門子一枚。同研細。用蠟茶清調下。奇效。

又方。青橘皮一片。入巴豆一粒。麻線繫定。火上燒煙盡。存性為末。生薑汁酒一杯。呷服之。到口便定。真神方也。

二十二 醫治老年氣喘立愈方

老年氣喘。將蘿蔔子炒研末。蜜丸。梧子大。每服五十九。白湯下。

**二十三** 醫治腹脹喘滿立愈方  
腹脹喘滿。用山豆根一錢。爲末。滾湯調服。

**二十四** 醫治冷飲成喘立愈方

冷飲成喘。用竹葉三斤。橘皮三兩。水一斗。煮取三升。去滓。三日服畢。自愈。

又方。大錢七文。洗淨。白梅七個。水一盞。同浸三宿。空心一呷。良久得吐。奇效。

**二十五** 醫治肺熱喘急立愈方

肺熱喘急。寒熱往來。不堪服藥者。用生茅根一握。剉碎。水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服立止。

**二十六** 醫治肺虛喘急立愈方

肺虛喘急。用光明生鍾乳粉五錢。糯米飯團和。飯甑內蒸過。研丸。梧子大。每溫水下一丸。漸愈。

**二十七** 醫治痰哮喘立愈方

痰哮喘。浸濕海帶四兩。煎湯。調飴糖服。  
又方。漂淡陳海蜆皮。煎湯。生蘿蔔搗汁和服。

**二十八** 醫治老年痰哮喘立愈方

老年痰哮喘。用肉桂一錢。廣木香三錢。分作十天。於每晨服之。能愈。

**二十九** 醫治哮喘立愈方

哮喘。用白鳳仙花全科。冷開水洗淨。泥汚。連根帶葉。搗爛絞汁。須稱準分量。加上好高粱。如汁有一兩。加高粱一兩。向日曬之。候溫。以手蘸汁。輕拍膏肓穴。隨蘸隨拍。初覺微冷。旋熱。旋辣。繼而微痛。乃止。用巾揩乾。勿使受風。連行數日。輕者即愈。

**三十** 醫治哮喘立愈方

哮喘。每晨飲豆腐漿。以愈爲度。

又方。夏秋間清晨。收取荷葉上露水。和飴糖常食之。一切哮喘。無不斷根。靈驗異常。

**三十一** 醫治冷哮喘立愈方

冷哮喘。用扁老南瓜一個。挖蓋去子。入大麥糖二斤。候冬至。蒸一時為度。每晨取二調羹。滾水冲服。

三十二 醫治肺癰立愈方

肺癰。係咳吐濃血臭痰。胸膈痛悶。用白花百合。洗淨搗汁。日服一杯。七日愈。

又方 橘葉搗汁服。吐出膿血即愈。

又方 冬月腌芥菜。瀟貯罈封埋土中。年久則清。淡如水。略無鹹味。飲之自愈。

三十三 醫治咯血立愈方

咯血。咳嗽見血者是也。用杏仁（杜蟻粉拌炒）青黛各一兩。研勻。黃蠟化和。作三十餅子。每服一餅。以乾柿半個。夾定濕紙包煨。香窰去火氣。嚼食。粥飯送下。日三服。自效。

三十四 醫治吐血立愈方

吐血。不咳嗽而見血者是也。用糯米五錢。蓮子心七枚。研末。陳墨汁丸。如梧子大。童便下。自效。

又方 藕節、荷蒂各七枚。為末。米飲下二錢。日二服。亦效。

又方 白茶花和精猪肉煮熟。淡食亦效。

又方 蘿蔔二十兩。削去頭梢及皮。加明礬三分。和蘿蔔搗爛。瀝取其汁。又加白蜜二兩。調和。將汁燉熱。飲之立效。且可斷根。

又方 蠶豆花陰乾研末。煎湯飲之。日久能愈。

又方 白蜜一斤。好酒釀一斤。淨童便一中碗。人乳一中碗。緩火熬至濃厚成膠。置磁鉢內封好。埋土中三日。去其火氣。每日服數錢。開水冲服。亦效。

又方 大當歸一只。約四五兩重。切片和好陳酒一斤。緩火燉至腐化。取汁飲之一錢可愈。

又方 羊肝一個。煮至爛熟。取出搗爛。加白芨末一兩。搓和成丸。日服二三錢。米湯送下。亦效。

又方 羊肝一個。煮至爛熟。取出搗爛。加白芨末一兩。搓和成丸。日服二三錢。米湯送下。亦效。

三十五 醫治猝然吐血立愈方

猝然吐血。急止之方。用細生地三錢。生大黃三錢。

研末。開水送下。即愈。

又方 蠶豆嫩梢十餘枝。或蠶豆花及葉亦可。

每枚約長二寸。煎湯飲之。立止。

又方 人參湯冲童便。服之立止。

又方 頂好陳墨磨汁。服之亦效。

### 三十六 醫治咳嗽吐血立愈方

咳嗽吐血。每日用仙鶴草三錢。煎湯代茶飲。又須

靜養。久服能愈。屢試有效。

又方 白前、桔梗、桑白皮、三兩炒。甘草一兩炙。水

六升。煮一升。分三服。忌猪肉、蒜菜。

又方 小兒胎髮灰入麝香少許。乳汁下。每一兒

胎髮作一服。男用女用男。

又方 咳嗽吐血。勞瘦骨蒸。日晚寒熱。煮白粥。臨

熟。入生地汁三合。攪勻。空心食之。

### 三十七 醫治咳嗽帶血立愈方

咳嗽痰多帶血。便溏。甚至喘急妨食。脈弦無力。無

論已否成癆。用北沙參三錢。生白扁豆一兩。炙黃

芪皮四錢。炙甘草五錢。叭杏仁三錢。淮山藥五錢。

霍石斛四錢。淮牛膝酒炒。錢半。煎服。旬日即愈。

### 三十八 醫治痰中帶血立愈方

痰中帶血。絲用生野百合七瓣。搗爛。將生鷄蛋清。

共調和。每晨空心開水冲服。數日即效。

### 三十九 醫治酒癆吐血立愈方

酒癆吐血。用鷄距子一兩。清水煎之。連服數十日。

即愈。

### 四十 醫治虛癆嗽血立愈方

虛癆嗽血。用扁柏葉四兩。白茅根四兩。馬蘭頭根

四兩。枸杞根四兩。共搗爛。取汁。另加大南棗一斤。

和汁熬煎。使汁收入棗內。每晨空心服棗數枚。日

久必效。

又方 菱白根約三四兩。搗爛取汁。好陳酒冲服。

每日服三次。連服半月。能愈。

又方 紅棗半斤。仙鶴草一兩。煎服亦效。

### ▲十一 腸病

#### 一 醫治寒瀉立愈方

寒瀉。瀉出氣不酸臭。色如清水者是也。將胡椒末和飯作餅。敷貼臍上。或用熱柴灰布包敷。或炒鹽運。或用糯米酒糟和鹽炒敷。或酒炒艾絨作餅敷。或用胡椒大蒜作餅敷。均效。

又方 大蒜搗貼足心。或貼臍中。亦效。

又方 敷服建曲一塊。良佳。

#### 二 醫治熱瀉立愈方

熱瀉。瀉出氣極酸臭。色則渾濁者是也。六一散服之最妙。或用菘豆湯溫服亦可。

又方 車前子為末。米飲下二錢。亦效。

#### 三 醫治脾虛泄瀉立愈方

脾虛泄瀉。用土炒白朮。炒白芍各一兩。冬月加煨肉豆蔻五錢。共為末。飯丸。梧子大。每服五十九。米

飲下。日二服。

#### 四 醫治腎虛久瀉立愈方

腎虛久瀉。將破故紙焙乾為末。一錢。用豬腰子一個。去白筋油膜。破開。將故紙末裝入裏。緊蒸熟。不用着水。食二三次。自愈。極效。

#### 五 醫治久瀉不止立愈方

久瀉不止。燒天樞二穴。離臍邊左右各二寸。是氣海穴。離臍下寸半。是。雖瀉久垂危不止。亦效。燒法。將大蒜瓣切片。安穴上。用艾葉一小團。如豆大。在蒜上燒之。或用燈草一根。蘸油點燃燒之。亦可。但不如艾火之妙。艾火每穴可燒三次。燈火只燒一次。

又方 生薑四錢。黃連一錢。慢火同炒。令薑乾成深赤色。去薑。取黃連。空腹臘茶清下。極效。

#### 六 醫治痢疾立愈方

痢疾。腹痛如絞。坐桶不便。起即欲便。便時極艱難。

者是也。將鮮荷葉燒研。每服二錢。陳皮甘草湯下。  
又方。乾薑黃連當歸黃檗等分炒為末。每服二錢。烏梅一個煎湯下。自愈。

又方。風菱壳煎濃汁飲。亦效。

又方。山查肉生熟各半。不拘多少。蒸熟去核。晒乾磨為細末。大人每服二錢。中年每服一錢。五幼童每服一錢。白者砂糖下。紅者白酒送下。紅白者砂糖白酒同下。

### 七 醫治赤痢立愈方

赤痢。用粳米半升。水研取汁。入磁瓶中。蠟紙封口。沈井底一夜。平旦服之。自效。

又方。地膚子五兩。地榆黃芩各一兩。為末。每服一錢。溫水調下。

又方。烏梅肉炒。黃連各四兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每米飲服二十九。日三服。亦效。

又方。苦參炒焦為末。水丸。梧子大。每服十五丸。

米飲下。

又方。白紙三張。裏鹽一匙。燒赤研末。分三服。米飲下。

又方。木耳灰。槐米灰。紅麴灰。砂糖。空心服。

又方。白槿花五六朵。置瓦上炙研。調紅糖湯服。效。曬乾次年用。亦效。

### 八 醫治白痢立愈方

白痢。用山查炭三錢。研極細。白糖和服。極效。

又方。訶子二個。一煨。一生。為末。沸湯調服。水痢。加甘草末一錢。

### 九 醫治赤白痢立愈方

赤白痢。用鴉片木香黃連白朮各一分。研末。飯丸。小豆大。壯者一分。老幼半分。空心米飲下。忌酸物。

生冷油膩茶酒麵口渴。略飲米湯。

又方。山豆根末。蜜丸。梧子大。每服二十九。空腹白湯下。三服自止。

又方 荔枝殼、橡斗殼炒、石榴皮炒、甘草炙、各等分。每半兩水一盞半煎七分溫服。日二服。自止。

又方 赤白暴痢如鵝鴨肝痛不可忍者。用黃連、黃芩各一兩水二升煎一升分三次熱服。

又方 陳細茶葉、山查炭、紅沙糖、白沙糖各三錢。老薑一錢煎服。一日服盡即愈。

又方 金銀花蕊、焙焦研極細末。大人每服一錢。日三服。小兒每服三分。日三服。俱用蜜糖沖服。

十 醫治噤口痢立愈方

噤口痢。用炒神曲、山查、白沙糖各二兩。川連一錢。

另蒸真烏梅三個、甘草五分、荔枝肉七個。用水三大碗煎溫服。且吐且飲。自然思食止痢。此方屢試屢驗。

又方 糯殼一升炒出白花。去殼用薑汁拌濕再抄為末。每服一匙。開水下。三服即止。

又方 人參、蓮肉各三錢。以新汲井水二盞煎一

盞。徐徐呷之。或加薑汁炒黃連三錢亦可。

又方 山藥半生半炒為末。每服二錢。米飲調下。

又方 野山查炒研末。每服一錢。酒下。小兒服五分。另用布鞋底炙熱熨小肚。升熨臍上。待小肚內有响聲即止。

十一 醫治休息痢立愈方

休息痢。用熟附子半兩研末。鷄子白兩枚搗和為丸。如梧子大。傾入沸湯煮數沸。漉出。作兩服。米飲。

又方 杏仁去皮。麩炒研。以豬肝一具切片水洗血淨。置淨鍋中。一重肝。一重杏仁。鋪盡。以童便二升同煎乾。放冷。任意食之。

又方 凡多年痢疾。腹不作痛。惟下濃血。兼流黃漿。此係平素愛食冷茶水酒所致。取活鱧魚去腸。

雜切段。放瓦上焙枯成炭。研粉。每服三錢。黃糖拌熱陳酒送下。數服全愈。忌食生冷酒水。海參海蜆等物。

等物。

十二 醫治五色痢立愈方

五色痢用酸石榴五個。蓮子搗汁二升。每服五合。神妙。

又方 乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。亦效。

十三 醫治腸癰立愈方

腸癰有生於腸內者。腹內脹急。大小便牽痛如淋。轉側搖之如水聲。潰後則膿從大便出。有生於腸外者。肚臍腫痛作脹。或一足彎曲。口有臭氣。或濃自臍出。甚則腸穿。用丹皮五錢。苡仁壹兩。瓜蒌仁去油二錢。桃仁去皮尖研貳拾粒。水煎服。極效。又方 野菊花打汁。以黃酒沖服。即愈。

十四 醫治腸風立愈方

腸風用鐵脚威靈仙及椿樹皮。須所植之地潔淨。如樹旁有牛馬糞等污物者。樹必染毒。即不能用。且以樹之方向。係陽面者為佳。煎汁加紅糖。

熬膏。惟忌置鐵器中。以開水沖服。漸漸見效。

十一 前後陰病 附大小便

一 醫治疝氣立愈方

疝氣用川棟子。吳朱黃。小茴香。各二錢。共研末。縫於細蜜之布兜內。束小腹上。數日即愈。

又方 老絲瓜。連蒂燒灰存性。研末。每服三錢。陳酒沖服。重者三服立愈。

又方 霜打葫蘆。炙灰。以酒送下。亦效。

又方 荔枝核。炙燥研末。陳酒沖服。亦效。

又方 乾荷葉。帶二十一個。炒焦。海金沙三分。好酒一碗。煎一滾。乘熱服。以醉為度。即愈。

二 醫治寒疝立愈方

寒疝痛連小腹。及睪丸偏縮者。以胡椒十餘粒。研細。糝膏藥上。烘熱貼陰囊上。痛即已。若偏縮者。須

貼小半邊。蓋縮即寒也。

又方 附子去皮。延胡索炒。各一兩。生木香五錢。每服四錢。水二盞。薑七片。煎八分。溫服。

又方 鮮荔枝核。橘核。小茴香。各一兩。焙乾研末。和紅糖。高粱。適宜。每服一錢。甚效。惟陰虛體熱者忌服。

三 醫治熱疝立愈方

熱疝痛處如火。溲赤便艱。口乾畏熱。多露火象。熱藥忌施。用芙蓉葉。黃蘗。各三錢。為末。以木鼈子仁一個。磨醋調塗囊上。即愈。

又方 取芙蓉花根。去心用皮。搗極爛。加大黃末。敷患處。二三日必愈。

四 醫治小腸疝立愈方

小腹引睪丸。連腰脊而痛。名小腸疝。用四製香附。炒茴香。等分為末。空心酒下三錢。神效。  
又方 莖縮囊腫者。浮水石為末。每服二錢。木通。

赤茯苓。麥冬。煎湯調下。

又方 生鷄子攪碎。入銅器中。一面將秤錘燒紅。先淬以醋。再入銅器中。將鷄蛋收上。候冷剝下。臨臥食之。疝可立愈。

五 醫治橫梁疝立愈方

小腹有塊。直衝心胸。此症名橫梁疝。最難醫治。用補骨脂一斤。黑芝麻二兩。拌炒。去芝麻不用。只將補骨脂在瓦器中磨末。以酒為丸。每服三錢。開水送下。

六 醫治膀胱氣疝立愈方

小腹腫痛。不得小便者。名膀胱氣疝。用五苓散。加棟子。茴香。葱白。入鹽少許。熱服。更有肺氣不化。膀胱乃熱邪所滯。而小便不通。小腹與睪丸脹痛。用沙參一味。大劑煎服。肺氣化而小溲通。覆杯可愈。但溲不閉者勿用。

七 醫治疝氣偏墜立愈方

疝氣偏墜。用絲瓜子一錢。小茴香五分。橘絡一錢。共炒成黃色。加鷄子一個。陳酒少許。連藥煎汁服之。蓋被而睡。出汗即愈。

又方。偏墜初起。用穿山甲、茴香、二味。研末。酒調服。乾物壓之。若患久者。用牡蠣灰、良薑末等分。唾津調塗腫墜一邊。須臾如火熱而痛已。

又方。大茴香、蘿蔔子炒。各五錢。共為末。加硃砂一錢八分。作九服。每早鹽湯下一服。九日即愈。

### 八 醫治陰囊青腫立愈方

陰囊青腫。以馬鞭草搗爛塗之。即愈。

### 九 醫治陰囊腫痛立愈方

陰囊腫痛。將蛇床子研末。鷄子黃調塗。

又方。陰囊忽腫。水調牡蠣粉塗。

又方。葱白汁調飛麵塗。

又方。囊腫如斗。以鷄翅毛一孔兩莖者。燒灰服。左腫用右翅。右腫用左翅。全腫並用。

### 十 醫治陰囊脹痛立愈方

陰囊脹痛。以葱白汁調乳香末塗。

### 十一 醫治囊濕立愈方

囊濕。用石斛二錢。生薑一片。煎湯代茶。

### 十二 醫治囊癢立愈方

囊癢。以川椒、杏仁研膏塗。

又方。陰囊奇癢。以陳葫蘆燒灰存性。敷之即止。其重者再以葱頭煎湯洗之。即愈。

### 十三 醫治睪丸腫大立愈方

睪丸腫大。掘取韭菜地內之紅曲蟪十條。加白糖拌和。盛於碗內。數小時。即化為水。以鴨毛蘸敷患處。漸漸收束。五次即愈。

又方。棉花子煎湯洗之。即愈。

又方。棉花子煎湯洗之。即愈。

### 十四 醫治睪丸腫痛立愈方

睪丸腫痛。用荊芥穗一兩。朴硝、蘆朮各三兩。葱七根。煎湯淋洗。

**十五 醫治陰莖濕癢立愈方**

陰莖濕癢。將肥皂燒存性。去火氣。研末。麻油調搽。

**十六 醫治腎滿立愈方**

腎滿。又名強中。係時時舉陽。甚或精出不止也。用韭子。破故紙。各一兩。為末。每服三錢。水一盞。煎至六分。服日三次。即愈。

又方 甘草、黑豆煎湯頻飲。

**十七 醫治陽痿立愈方**

陽痿。用蛇牀子、五味子、菟絲等。分為末。蜜丸。梧子大。每服三十九。溫酒下。日三服。自效。

又方 紫梢花、生龍骨各二錢。麝香少許。為末。蜜丸。梧子大。每服二十九。燒酒下。欲解。飲生薑甘草湯。

又方 腎虛陽痿。用豬腰子一對。切片。枸杞葉八兩。以豉汁一盞。同椒鹽煮羹食。

**十八 急救縮陽立效方**

縮陽。將火藥二錢。研碎。滾水沖服。用熱酒更妙。如得吐瀉。即回生。若不用此。猛烈之藥。決無生理。勿以危險忽之。但火藥研時。須輕且遲。以免爆發。

**十九 急救脫精立效方**

男女交感樂極。精脫而死。切不可驚走下牀。男脫則女以口哺送其熱氣。女脫則男以口哺送其熱氣。一連數十口呵之。則必悠然。陽氣重回矣。再用人參附子湯灌之。送氣之法。先須閉口。提丹田之氣上來。盡力哺於口中。送下喉去。可救氣絕於俄頃。若貧者不能得參。急用黃芪四兩。當歸二兩。附子五錢。水煎服。

又方 男子精瀉不止者。女急咬其人中。痛極自止。

**二十 醫治遺精立愈方**

遺精。將五倍子搗爛。醋調為餅。敷於臍上。即止。又方 石蓮肉、白茯苓各二兩。蒸菟絲子五兩。酒

浸。研爲細末。山藥糊丸。梧子大。每服五十九。溫酒或鹽湯下。如脚膝無力。木瓜湯下。甚效。

又方。熟地六兩。山萸肉。真山藥。各四兩。芡實。丹皮。雲苓。各二兩。蓮鬚二兩。龍骨。生研。水飛淨。三錢。魚鱈四兩。蛤粉炒成珠。共爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每日早晚服三四錢。一月卽止。屢試屢效。

又方。服六味地黃丸卽止。

又方。用牽轉白牛法最妙。其法不拘布帛。做一小兜。將外腎兜起。拴在腰後袴帶之上。此病自免。

### 二十一 醫治腎虛遺精立愈方

腎虛遺精。用猪腰子一個。切開去膜。入附子末一錢。濕紙裹煨熟。空心食之。飲酒一杯。不過三五服。效驗非常。

### 二十二 醫治內熱遺精立愈方

內熱遺精。以鐵鏽末冷水服一錢。三服自止。

### 二十三 醫治虛滑遺精立愈方

精滑善遺。用龍骨、蓮鬚、芡實、烏梅肉、各等分。爲末。山藥丸如小豆大。每服三十九。空心米飲下。

### 二十四 醫治夢遺洩精立愈方

夢遺洩精。以白果和燒酒煮熟食之。四五日。連服弗間卽愈。

又方。砂仁二兩。黃蘗二兩。炙甘草七錢。煉蜜爲丸。每服三錢。淡鹽湯送下。輕者一二料。重者三四料。必愈。

### 二十五 醫治陰虛夢遺立愈方

陰虛夢遺。將鼈甲燒研一分。以酒半盞。童便半盞。葱白七寸。同煎去葱。日晡時服之。出臭汗卽愈。

### 二十六 醫治勞心夢遺立愈方

勞心夢遺。將龍骨、遠志等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三十九。蓮子湯下。

### 二十七 醫治脫肛立愈方

脫肛。肛脫在外面也。用萬年青煎湯熏洗。再以五

倍子炙燥研末。敷之即愈。

又方 大鯊魚頭一個。瓦上炙灰。再加五倍子末。

香油調和。敷之亦效。

又方 蟬蛻研末。菜油調敷。

又方 磁石煨研極細。米飲下一錢。外以鐵屑煎

湯洗之。自愈。

又方 脫肛後堅硬難收者。用帶鬚葱一斤。煎湯

入桶。先熏後洗。軟後再照上各方治之。

二十八 醫治虛冷脫肛立愈方

虛冷脫肛。將石灰炒熱。舊帛裹坐。冷即易之。自效。

二十九 醫治痔痢脫肛立愈方

痔痢脫肛。以冷水調黃連末塗。極效。

三十 醫治久痢脫肛立愈方

久痢脫肛。用訶子、赤石脂、龍骨各二錢。研細末。以

茶少許和藥。搽肛上。絹帛揉入。

三十一 醫治肛門腫痛立愈方

肛門腫痛。以木鼈子肉四五枚。研細泡湯洗。另用

少許塗之。如作痒者。杏仁杵爛敷。

又方 馬齒莧、葉、三葉酸草等分。煎湯熏洗。一日

二次。頗有效驗。

三十二 醫治肛門痛癢立愈方

肛門痛癢。以杏仁不拘多少。取膏頻頻敷之。

三十三 醫治肛門蟲蝕立愈方

肛門蟲蝕。蒸木棗取膏。以水銀和捻長三寸。以綿

裹夜納下部。中明日蟲自出。

三十四 醫治大便不通立愈方

大便不通。用連鬚葱白三根。淡豆豉七粒。共搗爛。

貼臍上。紮定。良久自通。

又方 將草烏為極細末。以葱一根。切去根。蘸草

烏末納肛門內。即通。

又方 蘇油半杯。蜂蜜杯半。調和熱服。即下。

又方 松子仁去衣搗爛。加陳酒少許。開水沖服。

即解。

又方 雄猪膽汁。用小管灌入肛門內。即解。

又方 蘿蔔菜燒熱煎湯。傾於空馬桶內。乘熱坐上。大便即通。

又方 每晚臨臥時。以杏仁露一杯。開水冲服。連服數日。即解。

**三十五** 醫治大便熱結立愈方

大便熱結。用叭咀杏仁、松子仁、火麻子仁、柏子仁、各三錢。搗爛。滾水冲。蓋片刻。當茶飲。或加甘蔗汁。半杯更妙。老年人或患癰毒。大便閉結者。服此最效。

又方 皂角刺炒燥研末。加蜜調和。稍冷。搓成細條。冷透則硬。納入肛門內。約寸許。逾小時。即解。

**三十六** 醫治大便下血立愈方

大便下血。用茜草一兩。七星猪蹄一只。同藥煮爛。和湯食之。連服數次。便血自止。

又方 黑芝蔴一兩。扁柏葉一兩。猪肚腸一條。用水洗淨。將藥塞入猪腸內。兩頭用線緊紮。煮熟。每日清晨。空心食之。亦效。

又方 柿餅燒灰存性研末。陳米湯送下。每服二錢。連服十次。立效。

又方 醋製香附一兩。百草霜一兩。均焙燥研末。又加麝香五釐。調和。以米飯為丸。如梧子大。每服三十粒。一劑即愈。

**三十七** 醫治小便不通立愈方

小便不通。將白蘆菔子炒香。白湯下數錢。外以紙撚搐鼻。取嚏立通。

又方 葱數十根。剪斷炒熱。以布包之。敷於小便處。立效。

又方 車前草煎服。亦效。如無鮮草。即用車前子亦可。

又方 小麥芽煎湯。飲之亦效。

又方 生明礬一塊。硃砂少許。天葱白三枚。共搗爛作小餅。貼於臍眼上。亦效。

又方 用乾麵做一團。高寸許。放臍眼上。以葱管裝麝香。直安臍中。圈內以鹽填滿。用艾一小團。安葱頂上。燒之。或三四次。或五七次。即通。此法極妙。

**三十八** 醫治小便過多立愈方

小便過多。以益智仁鹽炒。烏藥各等分。為末。酒煮山藥為丸。如梧子大。每服七十九。空心淡鹽湯下。又方 夜間尿多。懶於起動者。臨臥時服胡桃數個。甚效。

又方 牡蠣煨。赤石脂煨。各等分。酒糊為丸。鹽湯下。

**三十九** 醫治心熱尿赤立愈方

心熱尿赤。用木通。生地黃。炙甘草。等分。入水。葉七片。水煎服。立愈。

**四十** 醫治勞傷溺血立愈方

勞傷溺血。用茅根。乾薑。等分。入蜜一匙。水二盞。煎一盞。一服即可全愈。

**四十一** 醫治便溺不通立愈

便溺不通。將白礬末填滿臍中。以新汲水滴之。覺冷透腹內。即通。

又方 田螺一個。揭開加冰片少許。移時螺內即化為水。再以麝香少許調和。將田螺口合置肚臍上。使人平臥。另以小杯蓋之。用布緊縛。則水不致流溢。少頃即解。惟此後須忌食田螺。永遠弗忘。至要至要。

又方 蝸牛三個。去殼搗爛。加麝香五釐調和。貼於肚臍眼之四周。片刻即通。

**四十二** 醫治便溺見血立愈方

便溺見血。以臭樟樹根。去皮約三錢。加黨參或人參一錢。煎服立止。

又方 旱蓮草。車前子。每日空心煎服。一杯亦效。

又方 鳳尾草連根一把煎服亦效。

### ▲十二 臟脹病

#### 一 醫治水臟脹立愈方

水臟脹。手按之下陷不起者。是用鮮扁蓄草。濃煎一大碗。時時飲之。約半日許。其水即由小便下泄。而腹亦寬舒。四肢腫退而愈。此方試之甚效。

又方 蟾蜍七個。陳酒三斤。置罐中。煎去烱化。以布瀝去其渣骨。每飲一酒杯。約一時後。由大便通洩。其腫自消。

又方 車前子葉。清水淡煎。久服亦愈。

又方 巴豆四錢。硫黃一錢。共研爲末。加小麥粉三錢。水少許。共勻和作餅。用新棉薄鋪肚臍眼上。再以藥餅覆其上。外以布縛之。使患者步行室中。一小時則由大便瀉洩。日行數次。其脹自消。

又方 田螺大蒜車前草。共搗爛作大餅。覆於臍眼上。水由大便排洩。自效。

又方 兔絲子、車前子、大蒜、白蜜各四兩。放入豬肚內。煮熟。淡食亦效。

又方 用活黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚破開。去腸。入好黑礬五分。松蘿茶三錢。男用蒜八瓣。女七瓣。共入魚腹內。盛瓷器中。蒸熟。令病人食魚。藥從頭上食起。病即從頭上消起。從尾食起。即從脚上消起。立效。

#### 二 醫治氣臟脹立愈方

氣臟脹。按之隨手即起者。是用陳葫蘆七個。連子燒灰存性。陳酒沖服。即愈。

又方 黑豆一升。清水浸透。風中吹乾。另用礬二兩。泡水一碗。和黑豆同煮。至礬水收乾爲度。日常食之亦愈。

又方 大癩蝦蟆一個。砂仁不拘多少。爲末。裝砂仁蝦蟆內。令滿縫口。黃泥封固。炭火煨紅。取出候冷。將蝦蟆研末。作三服。陳皮湯下。以放屁多爲效。

二三服全愈。

又方。雞內金一副。沈香、砂仁各三錢。陳香櫟五錢。去核。共為末。每服一錢五分。姜湯下。神效。

又方。蘿蔔子研。以水瀝汁。浸縮砂一兩。過夜炒乾。又浸。又炒。凡七次為末。米飲服一錢。亦效。

三 醫治血臟脹立愈方

血臟脹。週身老黑色。皮內有紫黑斑點者。是用雄豬肚一個。去臟。茜草一兩。雄雞屎四兩。炒。紫背浮萍一兩。老絲瓜筋半條。各藥共裝肚內。用麻線縫好。煮好去藥。將肚切片。仍入原湯。再加螞蝗一條。燒枯存性。乾漆三錢。煨令煙盡。炒。真花蘆石。研真血竭各三錢。紅花降香各五錢。甘遂綿大戟。麵包煨。荒花醋炒。各二錢。文武火煮好去藥。食肚與湯。分作二三次服。服後以大便下黑水數次為驗。其臟自消。切忌鹽醬。一百二十天。

四 醫治各種臟脹立愈方

各種臟脹。取蓋屋稻草煎湯。傾入盆內。先坐盆上。薰之。待湯溫。方洗其腹。小便隨下。黃水薰洗數次。永不再發。

又方。黃牛糞。男用雄糞。女用雌糞。四五月間。取淨者陰乾。微火焙黃為末。每用一兩。酒三碗。煎一碗。瀝去糞渣。止飲酒。三服全愈。

五 醫治氣虛水腫立愈方

氣虛水腫。用大蒜煮半熟。入蛤粉搗為丸。食前白湯下二十九。小便下數桶而愈。隨服補脾藥。又分。甘遂細末一兩。水調塗腹及臍。令滿內服。甘草湯。其腫便消。

又方。牽牛研末。入豬腎煨熟。溫酒下。

六 醫治病後浮腫立愈方

病後浮腫。用老鴨三隻。加真川厚朴二錢。蒸熟食之。連食三隻。即愈。惟體虛者勿服。

▲十四 黃疸病

一 醫治黃疸立愈方

黃疸。面目身體俱黃者是也。用甜瓜蒂一兩炙為末。男左女右。每日搐鼻數次。有黃水流出。自愈。

又方 野薔薇花根去皮洗淨。搗汁以陳酒沖服。每日服一小杯。連服數天即愈。

又方 珍珠草煨豬蹄。至重食二三次即愈。

又方 萬年青根四兩洗淨打汁。陳酒沖服。連服三次即愈。

又方 生豆腐每晨冷服半碗。或隔湯燉熟亦可。連服半月必愈。惟飯後須將茵陳草煎湯。日服二次。其效尤速。

又方 青皮陳皮芫花醋炒焙乾。研末。每服五分。開水送下。亦效。

又方 茅柴根煎湯常服。亦效。

二 醫治穀疸立愈方

穀疸。即食積黃疸也。亦各食疸。服絲瓜子燒末。每

服二錢。因麵得病者。麵湯下。

又方 石膏蒼耳黃連各等分。粥飲湯和丸。小豆大。每服四十九。以痊為度。

又方 用豬脂一小升。溫熱頓服之。日服三次。燥矢下即愈。

三 醫治酒疸立愈方

酒疸。沉湎發黃者是也。用小麥苗水和絞汁。每服六七合。日服三次。自愈。

又方 青括蕞焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。臥時服。五更瀉下黃物。立愈。

四 醫治女疸立愈方

女疸。此因經水不調。房事獨犯所致。用礬石燒消。石熬黃。等分為末。以大麥粥汁和服。一小匙。日三服。病從大小便出。即愈。

又方 用亂髮如雞蛋大一團。豬脂半斤煎令消。盡分二服。自愈。

五 醫治勞疸立愈方

勞疸。用力勞傷。神疲黃腫。俗云黃胖者是也。當服六君子湯。

又方。用青礬。鍋內安炭煨赤。米醋拌為末。棗肉和丸。梧子大。每服二三十丸。食後薑湯下。

六 醫治黑疸立愈方

黃疸變黑。危疾也。用括蕁根一斤。搗汁六合。頓服。隨有黃水。從小便出。如不出。再服自效。

七 醫治濕熱疸立愈方

濕熱成疸。以真青黛一分。潔白明礬五分。六釐。研細末。分七服。包開。每早空心。用雞蛋一個。去黃瀝。清調送一服。

又方。柳枝煎湯服。即愈。

八 醫治陰黃立愈方

陰黃。身面雖黃。小便色如故。大解不實。此寒濕疸也。不可誤用寒涼藥。以半夏四錢。生薑六錢。水煎。

分三服。

十五 傷寒病

一 醫治傷寒初起立愈方

傷寒初起。頭痛咳嗽。發熱憎寒。用淡豆豉二兩。蔥頭七個。煎服即愈。

二 醫治傷寒頭痛立愈方

傷寒頭痛。用連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。又方。烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。溫服。取吐。吐後避風最良。

又方。馬蹄香為末。每服一錢。熱酒調下。少頃。飲熱茶一椀。催之出汗即愈。

三 醫治傷寒喉痛立愈方

傷寒喉痛。用大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。大嚥汁甚效。

又方。甘草二兩。蜜水炙。水二大碗。煮一椀。服半椀。日二服。亦效。

四 醫治傷寒心悸立愈方  
傷寒心悸。用甘草二兩。水三升。煮一半。服七合。日一服。甚良。

五 醫治傷寒脇痛立愈方  
傷寒脇痛。即心下痞滿。痛引兩脇者是也。用芫花。甘遂。大戟。等分。為末。以大棗十枚。水一碗。半。煮取八分。去渣。身強者服一錢。弱者服五分。平旦服之。

六 醫治傷寒腹痛立愈方  
傷寒腹痛。用牽牛末一錢。白糖化湯調下。

又方 川烏頭去皮臍。冷水浸七日。切曬紙裏收之。遇有患者。取為末一錢。入鹽八分。水一盞。煎八分服。

七 醫治傷寒煩躁立愈方  
傷寒煩躁。乃晝夜煩躁。不得安眠也。用乾薑一兩。生附子一枚。去皮。水煮頓服。

又方 寒水石半斤。燒半日。淨地坑內。盆合。四面

溫土壅起。經宿取出。入甘草末。天竺黃。各二兩。龍腦二分。糯米糕丸。彈子大。蜜水磨下。

八 醫治傷寒昏迷立愈方

傷寒昏迷。不省人事者。先用皂莢末。以紙燃燒煙入鼻。有嚏可治。無則不治。可治者。隨用皂莢。半夏。生白礬。共一錢半。為末。薑汁調服。探吐痰去。即愈。

九 醫治傷寒發狂立愈方

傷寒發狂。目不識丁。甚致踰垣上屋。用玄明粉二錢。朱砂一錢。冷水服。

又方 用新抱出雞雞蛋壳。煎湯服。即安。真奇方也。

又方 陽毒大熱發狂。不能制服。用青布五六尺。疊摺。新水浸之。搭病人背上。須臾蒸熱。又浸水中。又搭。日數十易為。

十 醫治傷寒無汗立愈方

傷寒無汗。凡初覺頭痛。身熱脈洪者是也。用葱湯

煮米粥入鹽鼓食之取汗極效。

又方 真丹砂一兩水一斗煮一升頓服覆被取汗而愈。

又方 以水七椀燒鍋令赤投水於內取起再燒再投如此七次名沸湯乘熱飲一椀衣被覆頭取汗神效。

又方 大梨一枚生薑一小塊同搗取汁入童便一椀重湯煮熟服。

十一 醫治傷寒盜汗立愈方

傷寒得汗不止者以溫酒服牛羊脂即愈。

又方 傷寒後汗不止用地黃三斤切水一斗煮取三升分作三服亦效。

十二 醫治傷寒衄血立愈方

傷寒衄血乃當汗不汗所致其血紫黑時出不止用滑石末飯丸梧子大每服十九微嚼破新汲水嚥下立止。

十三 醫治傷寒下痢立愈方

傷寒下痢以豉一升薤白一握水煮薤熟納豉更煮色黑去豉分爲二服自愈。

十四 醫治夾驚傷寒立愈方

夾驚傷寒用紫背浮萍一錢犀角屑半錢鈎藤鈎三七個爲末每服半錢蜜水調下連進三服出汗爲度。

十五 醫治夾陰傷寒立愈方

夾陰傷寒男子腎囊女子乳頭內縮或手足彎曲紫黑甚則牙緊氣絕用紋銀一塊鵝扁燒紅如病人未絕氣止燒滾熱放在臍上再用活雞一隻連毛破開不去腸雜包於銀上用布縛住以手按緊即愈。

又方 胡椒四十九粒連鬚葱頭四十九個加百草霜一撮共搗成泥分二處布攤一貼臍上一貼龜頭用線捆住少頃奏效如神。

又方 肚痛面青者。滾水冲鴿糞一升。熏被蓋睡。

### 十六 醫治陰毒傷寒立愈方

陰毒傷寒。取雞血衝熱酒飲。自效。

又方 剖雞一隻。燒酒噴之。覆胸口。亦效。

又方 生草烏頭為末。以葱頭蘸納穀道中。亦效。

又方 陰毒腹痛者。用油松木七塊。炒焦。冲酒二鍾。熱服自愈。

## ▲十六 瘧疾病

### 一 醫治瘧疾立愈方

寒熱往來。發作有定時者。名曰瘧疾。用川常山一錢五分。葛根三錢。甘草一錢。於臨發一點鐘前。煎湯熱服即止。

又方 車前子數兩。搗汁和陳皮服之。兩服必愈。

又方 真川貝六兩。生半夏四兩。置銅鍋內。炒燥。

研末。藏置磁瓶內。弗令泄氣。用時以生薑汁二三匙和藥末二分。燉熱於臨瘧一小時前服之。重者

連服兩次必愈。惟百日內忌服生薑。芋。茱。南瓜等。生冷各物。

又方 土牛膝煎湯。於臨瘧時一小時前服之。或發時再服亦效。

又方 青蒿三錢。知母一錢。煎湯。早晚服之。服後蓋被出汗即愈。

又方 白茯苓。當歸。橘紅。各一錢。甘草五分。以燒酒少許。浸潤。露天一夜。明晨加水煎湯。空心服之。兩次必愈。

又方 蛇蛻研末。塞兩耳內。立效。

又方 金鷄納霜一錢。為丸。作一百八十粒。每服十粒至十五粒。未發前六時至八時服。極效。

又方 凡瘧疾初起。越三四日後。用草菓研細末。置臍中。外以膏藥一張掩之。隔日即愈。

### 二 醫治瘴瘧立愈方

瘴瘧。以茵陳煎湯服之。或煮羹作齏。食之均效。

三 醫治鬼瘡立愈方

鬼瘡。晝鍾。燄紙。燒灰二錢。阿魏。信石。丹砂。各一粒。如黃豆大。寒食麵和丸。菘豆大。每服一九。發時冷水下。即愈。

又方。鬼箭羽末一分。砒霜一分。五靈脂一兩。為末。發時冷水服一錢。亦效。

四 醫治牝瘡立愈方

牝瘡。將雲母燒兩日夜。龍骨。蜀漆。燒去腥。等分為末。未發時漿水服五分。神效。

五 醫治牡瘡立愈方

牡瘡。用蜀漆錢半。甘草一錢。麻黃。牡蠣粉。各二錢。水二鍾。先煎麻黃。蜀漆去沫入藥。再煎至一鍾。未發前溫服。得吐即止。

六 醫治三陰瘡立愈方

過正午而發者。謂之三陰瘡。疾用八柳條。白扁豆。各少許。大棗一個。生姜一片。茶葉一撮。陳酒一斤。

煎服即愈。

又方。鵝蛋一個。以朔日或望日所生者為妙。開一小孔。塞入花椒。每歲十粒。例十歲塞十粒。塞畢。封固。飯上蒸熟。剖分為二。於瘡未來時。服半個。如不止。再服半個。至重者兩個。無不全愈。

又方。馬料豆二十四粒。常山二錢五分。鱉甲酒炒二錢五分。烏梅二個。紅棗七個。煎服亦效。

又方。青皮。陳皮。當歸。知母。各三錢。真烏梅五個。水二碗。煎八分。露一宿。臨發時炖熱服。其效如神。

七 醫治隔日瘡立愈方

隔日瘡。將旱蓮草研碎。如黃豆大。以紫蘇葉裹之。男左女右。塞鼻孔內。半日即出涕淚。輕者立愈。重者漸次而愈。

八 醫治三日瘡立愈方

三日瘡。用首烏五錢。蒼朮三錢。白朮二錢。甘草一錢。知母五分。水四碗。煎碗半。雞鳴時服。立止。

又方 獨蒜一枚。黃丹一錢。搗和分作三丸。於發日早起向東。以井花水送下一丸。連服三日。自愈。

### 九 醫治久瘡不止立愈方

久瘡不止。將蠶甲醋炙。研末。每用二錢。酒服。隔夜一服。清晨一服。臨時一服。無不斷者。入雄黃少許。更佳。

又方 桃花陰乾為末。酒服一小匙。良效。

又方 檳榔紅花常山各四錢。水煎。連服三劑。自效。惟此方須發至三四十次者。方可服。

### 十 醫治久瘡極虛立愈方

久瘡極虛。用於潛白朮。米泔水泡透。土炒一兩。生老薑通皮五錢。水煎。露一夜。五更時隔水燉熱服。夜發者加當歸三錢。輕者三服。重者五服。自效。

### ▲十七 風痺癲狂病

#### 一 醫治中風立愈方

凡中風忽然昏倒。不省人事。須先順氣。然後治風。

用竹瀝薑汁調蘇合丸。如口噤。撬開灌之。如撬不開。急用牙皂。生半夏細辛為末吹之。鼻內有嚏。可治無嚏則死。

又方 生薑嚼碎。不拘多少。向患者面上天庭等處頻擦。又以生薑汁滴眼角內。男左女右。即醒。

#### 二 醫治中風口噤立愈方

中風不省。涎潮口噤。語言不出。手足驛曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。用柏葉一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不進酒。分作四五分服。方進他藥。又方 細研乳香末一錢。以酒煎蘇方木調服。立吐惡物。自愈。

又方 先以烏梅擦齒令開。有痰聲者。研白礬末一錢。生薑汁調灌。無痰聲者。黑大豆三升。炒焦。清酒三升。淋取汁灌。

三 醫治中風口喎立愈方

中風口喎。用新石灰一合。醋炒。調如泥塗之。左塗右。右塗左。立能牽正。

又方。取大鱧魚。以針刺頭上出血。左斜塗右。右斜塗左。正即洗去。

又方。青荊芥一斤。青薄荷一斤。同入砂盆內。研爛。生絹絞汁。於磁器中煎成膏。濾去渣。三分之一。將二分曬乾為末。以膏和丸。梧子大。每服三十九。白湯下。早暮各一服。忌動風物。

又方。巴豆七枚。去皮研。左喎塗右手心。右喎塗左手心。仍以暖水一盞安藥上。須臾即正。洗去。

四 醫治中風舌強立愈方

中風舌強。用烏雄雞一隻。切葱白一握。煮汁。空心食之。又方。雄黃、荊芥穗等分為末。豆淋酒服二錢。亦效。

五 醫治中風不語立愈方

中風不語。用生銅綠二兩。乳細。水化去石。慢火熬乾。再研入麝香一分。糯米粉糊丸。彈子大。陰乾。卒中者。每丸作二服。薄荷酒研下。餘風硃砂酒化下。吐出青碧涎。瀉下惡物。大效。

又方。酒五合。和人乳汁鍾半。分為二服。即能言。又方。陳醬五合。人乳五合。調和研勻。以布絞汁。隨時與服。良久當語。

六 醫治中風痰厥立愈方

中風痰厥。用白礬一兩。牙皂莢五錢。為末。每服一錢。溫水調下。以吐痰為度。即愈。

七 醫治中風偏廢立愈方

中風偏廢。用生附子一枚。去皮臍。羌活、烏藥各一兩。每服四錢。生薑三片。水一盞。煎取七分。溫服。自愈。又方。生香杏仁七枚。不去皮尖。逐日加至七七。

四十九枚。周而復始。食後。仍飲竹瀝。以瘥爲度。

八 醫治中風癱瘓立愈方

中風癱瘓。卒然手足不舉。用穿山甲。炮熟。大川烏。頭。炮熟。紅海蛤。如棋子大者。各二兩。爲末。每用半兩。搗葱白汁。和成厚餅。徑寸許。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻汗出。急去藥。宜避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根。但須忌口。遠色爲要。

又方。五靈脂研末。以水飛去上面黑濁。下面沙石研末。每服二錢。熱酒調下。日一服。自效。

九 醫治中風掣痛立愈方

不仁不遂。掣痛甚劇。以乾艾揉團。結瓦甑中。並下塞諸孔。獨留一孔。以痛處著甑孔。燒艾熏之。一時即止。

十 醫治中風強直立愈方

中風強直。用橘樹皮。細切一升。酒二升。浸一宿。每

日溫服半斤。酒盡再作。自愈。

又方。夜合枝。柏枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。紅麴七斤半。先以水五斗。煎五枝。取二斗五升。浸米豆。蒸熟入麴。與防風羌活。如釀酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉。致吐。常令有酒氣。

十一 醫治風寒溫痺立愈方

風寒溫痺。通身麻木。或疼痛者是也。用生川烏末四錢。薏苡仁末二錢。入米粥內。再熬。下薑汁一匙。蜜三匙。日三服。

又方。紫蘇二兩。杵碎。以水三升。研取汁。煮粳米二合作粥。和葱椒薑豉食之。

十二 醫治風緩頑痺立愈方

風緩頑痺。諸節不隨。腹內宿痛者是也。用原蠶砂炒黃。袋盛。浸酒飲。自效。

十三 醫治手足風痺立愈方

手足風痺。用皂莢一斤。(不蛀者)食鹽五升。細  
剉皂莢和鹽炒熱。以青布裹熨病處。自效。

又方 威靈仙炒五兩。生川烏頭五靈脂各四兩。  
為末。醋糊丸。梧子大。每服七丸。鹽湯下。忌茶。

十四 醫治歷節痛風立愈方

歷節痛風。由下而上。逐節疼痛者是也。先自兩踝  
骨痛起。次日上流於膝。三日流於兩股。上至於肩。  
肩流於肘。肘流於後灣。每至一骨節。疼痛難熬。且  
日輕夜重。諸藥不效。用壁虎三枚。生研。鱗鱒三枚。  
紙包煨研。地龍五條。生研。木香五錢。乳香末二錢。  
半麝香一錢。龍腦五分。研成膏。入酒糊搗為末。如  
梧子大。每日空心。乳香酒服三十九丸。神效。  
又方 虎脛骨酒炙三兩。沒藥七兩。為末。每次溫  
酒送下二錢。亦效。  
又方 生薑搗汁。和黃明膠。熬貼。甚妙。  
又方 地龍一兩。去土炒。麝香二錢半。另研。共為

細末。每服一錢。溫酒調下。不拘時。

十五 醫治軟癱立愈方

軟癱。用杜仲一兩。切碎。酒水各半。煎服三日。能行。  
又三日愈。

又方 五茄皮釀酒服。或水煎代茶飲。

十六 醫治鵝掌風立愈方

鵝掌風。用真蘆艾四五兩。水四五兩。濃煎。乘熱灌  
入大口瓶內。以夏布二層縛蓋其口。再將手掌放  
瓶上。使艾之熱氣上薰。如冷。將湯艾再熱。再薰。日  
換一次。數日即愈。或入雄黃甲片五倍子。去蟲。各  
五錢。和艾共煎薰之更佳。  
又方 白芷防風土槿皮猪牙皂晚姜蠶白茄根。  
各五錢。研碎和勻。分作四劑。做四日燻。每日一劑。  
用上好陳米醋搽手上。另用竹籃糊紙上。不使走  
煙。下用微火。將藥徐徐入內。取煙燻之。手上醋乾。  
又搽醋。再燻。燻過七日。再下水洗。多日更妙。

十七 醫治鶴膝風立愈方

鶴膝風。風勝則走注作痛。寒勝則如錐刺痛。濕勝則腫屈無力。病在筋則伸不能屈。在骨則移動維艱。久則日腫日粗。大腿日細。痛而無膿。顏色不變。即成敗症。亟宜速治。可用酒糟四兩。皂莢去子一個。芒硝一兩。五味子一兩。砂糖一兩。薑汁半盃。研勻。日日塗之。加入燒酒尤妙。

又方 初起時膝下酸痛。漸至膝蓋膨腫。股筋憔悴。以腎虛虧之故。用尖嘴鯪魚數尾。和白糖搗爛。敷於患處。三四次立可保愈。

又方 乳香沒藥各一錢五分。地骨皮無名異各一錢五分。麝香一分。共研細末。另以車前草搗爛。漉汁。將藥末和汁調勻。燉熱。搽於患處。即愈。

十八 醫治大麻風立愈方

大麻風用糞蛆（即糞缸內之蟲）清水漂淨。炙燥研末。約半茶杯。另購冰片及白糖各數十文。調

和以黃酒半斤。燉熱沖服。先令患者穿土布衫褲及襪。並以土布一方包頭部。服後即令蓋被而睡。愈暖愈妙。不使漏風。不見日光。臥後約半日許。必渾身出汗。然後將被輕輕卸去。其所穿之衫褲襪及包頭布亦令脫去。速即焚滅。因此衣衫沾有濃臭之汗。汗及微蟲。大足傳染。切勿愛惜。區區之衣服而貽莫大害毒也。即所蓋之被褥等。能棄去最好。否則亦須用解毒藥水洗淨消除。並曝露日中數日。方可留用。即其親近之用具亦然。稍一不慎。受害不淺。再將病人稍加揩拭。換着潔淨之衣服及臥具。另臥潔淨之房。其患自愈。

十九 醫治羊癩風立愈方

患羊癩者發時立仆於地。不省人事。急將青草或不拘何種青菜塞入口中。移時即醒。又方 豬心一枚。辰砂二錢。甘遂二錢。二味研為

細末。置於猪心內。以黃牛糞燃火。煨熟。再將藥取出。研細作小丸。以猪心煎汁和丸服之。即愈。屢試屢效。

又方 以青橄欖一斤打破。砂鍋內熬十數沸。去核入石臼內。搗爛再熬。熬至無味。去渣成膏。用白礬八錢。研末加入攪勻。每日早晚取膏三錢。開水送下。服完自愈。

二十 醫治癩狂立愈方

癩狂。取甜瓜蒂不拘多少。細碾為末。壯年用二分。半十五歲以下。及老怯者減半。早晨井華水下一食頃。含沙糖一塊。良久涎如水出。涎盡食粥。一兩日愈。如涎出太多。覺困甚者。以麝香少許研細。溫水調下。即止。

又方 蠶紙燒灰。酒下一匙。或於手拇指甲下針之。血出便效。

又方 猪肚一具。內放起碼金箔十張。仍用綫縫

好。煮熟。水不須多。約兩湯碗為度。連肚帶湯。設法令其服盡。瘋病自愈。誠奇方也。

又方 頂上砂一錢。燈草灰一兩。陳酒調和。使飲至醉。飲後睡二三日始醒。其病若失。

又方 大黃、黃芩、川連各一錢五分。煎湯連服數次。亦愈。

又方 青菓數斤。去核。加明礬少許。濃煎成汁。開水沖服。漸愈。

十八 皮膚病

一 醫治汗斑立愈方

汗斑。用密陀僧末。以黃瓜蒂蘸擦數次。即愈。惟須先用水洗淨汗垢。然後擦之。

又方 陀僧乾葛、硫黃、海螵蛸、川椒等分。共研細末。先用老薑切片擦患處。復以藥擦之。永不復發。

又方 雄黃、雌黃、硫黃、輕粉、蛇床子、蜜陀僧各等分。為細末。臨臥或洗浴時。搽斑上。聽其自落。或過

一時洗去亦可。

又方 用鄉間車棚畔河內所插久年枯竹（即俗名夾水闌）內之臭水泥塗之約二次不及一時皮膚即潔白異常。

二 醫治狐臭立愈方

腋下狐臭用麝香一分。膽礬二分。水粉三分。取田螺二個將際起開以各藥入螺中過一夜螺肉即化為水將水擦腋下其臭即從大便而出。

又方 密陀僧潮腦各四兩。枯白礬二兩。輕粉二錢。共為細末。頻擦兩腋。擦至半月見效。不可間斷。半年全愈。

又方 用蒸餅一個。劈作兩片。放密陀僧細末一二錢。急夾在腋下。略睡片時。候冷棄去。如係一腋狐臭。只用一片夾之。

又方 石羔五錢。三仙丹三分。紫花地丁三分。共研細末。撒少許於腋下。其臭立止。止後旬日。如要

復發。須用末藥再擦為妙。

三 醫治血痣立愈方

血痣初起如痣色紅。漸大如豆。觸破時流鮮血。用黃鱗血同蒜汁好墨汁頻塗之。自效。

四 醫治黑痣立愈方

黑痣用針挑破。以鹼水泡石灰點之。即消。

五 醫治風疹立愈方

風疹將赤土研末。空心溫服一錢。自效。

又方 蠶沙一升。煮水去滓。洗浴避風。其疹即退。

又方 枳實醋浸。火炙熨之。即消。

六 醫治癩子立愈方

癩子用綠豆粉二兩。滑石一兩。和勻撲之。或加蛤粉二兩亦佳。

又方 乾東壁土末敷之。隨手而愈。

七 醫治白癩風立愈方

白癩風用白鱈油搽之。無則取白鱈曬乾。煎枯取

油擦之即愈。

又方 白蒺藜子六兩。生搗為末。每開水下二錢。日二服。一月絕根。

又方 杏仁連皮尖。每早嚼數粒。措癩令赤。夜臥再用。

八 醫治紫癩風立愈方

紫癩風。用硫磺、白礬等分。為末。每以黃丹津液和塗之。一月見效。

又方 雄黃、硃砂為末。以茄蒂蘸擦。其風可治。

▲十九 四肢病

一 醫治手指麻木立愈方

手指麻木。不知痛癢者。用經霜桑葉煎濃湯頻洗。自效。

二 醫治手指腫痛立愈方

手指腫痛。恐防患毒。用漿水入鹽熱漬之。冷則易去。極效。

三 醫治手背皸裂立愈方

手背皸裂。以生白果嚼爛塗之。神效。

四 醫治掌痛立愈方

又方 老絲瓜燒存性。研豬油和塗。亦效。

五 醫治臂痛立愈方

掌痛。用椒鹽末醋和塗之。極效。

臂痛。用當歸浸醇酒頻飲。自愈。

六 醫治脚氣立愈方

又方 桑枝熬膏服。亦效。

脚氣。兩足腫脹或出水也。以田螺搗敷兩股。便覺冷氣下趨。至足而安。

又方 甘遂末調水外敷。內服濃煎甘草湯。常以杉節或蘆葶煎湯洗之。可除根。

又方 鼈一個。重約一斤者。清燉。但入大蒜頭五。六個。不另加作料。熱時淡食。即愈。不能食者。但飲其湯亦可。

又方 每日於早起夜睡時。一手握腳趾。一手以掌心用力擦足心中。數日後。溼氣即發為脚汗。由湧泉穴而出。病自去矣。

又方 脚上溼氣起。泡用蒼朮、白芷、各一兩。煎湯洗脚。數次即愈。

又方 脚上溼氣潰爛。用野桑樹根洗淨。去其外面黃皮。將裏面白皮搗爛。加猪油調和。敷於傷處。每天用茶水洗換數次。更易收功。

### 七 醫治脚氣衝心立愈方

脚氣衝心。用白檳榔十二個為末。分二服。熱童便調下。外用附子末。鹽滷塗涌泉穴。自效。

又方 陳皮一斤。和杏仁五兩。去尖熬少。加蜜搗和丸。如梧子大。每日食前米飲下。三十九。極效。

又方 杉木四兩。橘葉三兩。大腹皮三個。水煎。加重便一盃。合服。

又方 木瓜檳榔各二錢半。吳茱萸錢半。水煎服。

或用黑豆一茶盃。甘草三錢。煎濃汁服。更妙。

### 八 醫治脚氣入腹立愈方

脚氣入腹。用威靈仙為末。酒服二錢。痛減一分。藥亦減一分。

### 九 醫治風溼脚腫立愈方

風溼脚腫。用蠶豆一斤。紅糖四兩。老姜二兩。共煮爛。熱去姜片。將豆和汁飲之。三次必愈。

### 十 醫治腿上風溼立愈方

腿上風溼。用風藤草煎湯飲一盃。並薰洗患處。立可見效。

### 十一 醫治脚冷如水立愈方

脚冷如水。用生附子二錢。好酒麴一錢。共為末。燒酒調敷脚心。極效。

### 十二 醫治脚心腫痛立愈方

脚心腫痛。因遠行久立所致者。水調蚯蚓糞塗一夕。自效。

又方 因毒熱而痛欲脫者。用苦參煮酒浸之。即愈。

十三 醫治脚腿紅腫立愈方

脚腿紅腫。熱如火炙。俗名赤遊風。用鐵銹水塗之。極效。

十四 醫治脚多溼汗立愈方

脚多溼汗。以楊花著鞵內。自愈。

十五 醫治脚轉筋立愈方

脚轉筋。俗名勝牽筋。用大蒜擦脚心。令熱。復以冷水吞大蒜一瓣。有特效。

又方 炒茱萸二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。得下。即安。

十六 醫治脚麻立愈方

兀坐與如廁。苟時久。兩足輒麻木不仁。只須於初覺時。探手膝彎間。頻頻抓之。即愈。

二十 瘟疫病

一 醫治瘟疫神效方

普通時瘟。多發於春分之後。夏至之前。能轉向傳染。故曰瘟疫。取黃沙糖一盃。生姜自然汁一盃。用白滾水一大盃調勻。乘熱急服。蓋被出汗。即愈。四時瘟疫皆治。

又方 麻黃、乾薑、明天麻、菴豆（研成粉）、松蘿茶各一兩二錢。生甘草、明亮硃砂、明雄黃各八錢。生大黃二兩。共為細末。蜜丸如彈子大。大人一丸。小兒半丸。涼水調服。出汗即愈。重者連進二服。服藥之後。未汗切忌食熱湯熱物。汗後不忌。此方專治一切瘟疫時症。並傷寒感冒。無論已傳染。未傳染。功極神奇。百試百效。

又方 凡聞病人汗氣。人鼻透腦。即散布經絡。初覺頭痛。用芥菜子研末。溫水稠調。填肚臍中。隔布一二層。上以壺盛熱水熨之。至汗出而愈。

二 醫治霍亂立愈方

霍亂。上吐下瀉者。是無論冬夏皆有。又有吐而不瀉。瀉而不吐者。凡遇此等症。斷不可與飯食。卽米湯亦不可飲。並忌食姜。一入口。卽不救。須俟愈後。方可進食。與枯礬末一錢。沸湯調下。極效。

又方。食鹽一撮。放刀口上。燒紅。以陰陽水（卽半滾水半冷水）一鍾沖服。服後腹痛自止。

又方。菜豆粉白糖各二兩。新汲水調服。卽愈。

又方。用桃葉煎汁。服一升。立止。冬月用桃樹皮亦可。

又方。霍亂口渴者。用生菜豆。急火煎清湯。涼服自愈。

又方。霍亂轉筋。患此者。氣絕欲死。用青銅錢四十九枚。木瓜一兩。烏梅炒五枚。水二盞。煎溫服。

又方。以苦酒。煮上好棉絮。最好用絲棉。裹於患處。立能止痛。神效。

又方。轉筋身冷。心下微溫者。硃砂研二兩。蠟三

兩。和丸。著火籠中。薰之。周圍厚覆。勿令烟洩。兼床下著火。令腹暖。當汗出而甦。

### 三 醫治乾霍亂立愈方

乾霍亂。上不得吐。下不得利。腹痛欲死。用鹽一大匙。熬令色黃。和童便一盞。溫服。少頃吐下。卽愈。

又方。土坎黃泥。新泥水攪濁。候清飲之。得吐卽愈。

### 四 醫治中暑立愈方

中暑。急取蒜頭兩個。研爛。再取街心熱土。去面層。不用。污泥亦不可用。攪新汲水調勻。服一盃。甚效。

又方。暑日行路。受陽光所逼。最易受暈。速用蕎麥麩一撮。炒黃。水煎服。立愈。

又方。大蒜一握。同新黃土研爛。新汲水和之。瀝去渣。灌入卽活。惟切不可與食冷物。

### 五 醫治痧症立愈方

痧症。初起時。多半腹痛。亦有並不痛。只覺昏沉。脹

悶者。切忌服姜。急用南蛇藤煎水。兌酒服之。立愈。最為神驗。

又方。頂上高粱酒半斤。真樟腦一錢五分。共浸於瓶。患者灌飲一盃。即解。改用白蘭地（外國酒名）其效尤神。

又方。急用生芋頭食之。如非痧。則生澀難食。若是痧。食之味美。連食兩個。便愈。

又方。生白礬為末。每服一錢。不拘男婦。用陰陽水調下。各項痧症。及受暑昏暈。不省人事者。服之立可回生。

六 醫治吐痧立愈方

吐痧。湯水入口即吐。研伏龍肝泡水解飲。即定。藥亦以此水煎。方用山查、連翹、枳殼、延胡索各一錢。薄荷七分。霍香、香附各四分。冷服。

七 醫治瀉痧立愈方

瀉痧。水瀉不計遍數。用猪苓、茯苓、澤瀉、蒼朮、車前

木通等分。煎服自愈。

八 醫治慢痧立愈方

痧之慢者。或十日半月而死。甚至三四月而死。必須速治。遲則痧毒蔓延。便成死症。初犯痧症。邪氣勝。元氣衰。或旬日輒發。久則日近。一日蓋由胃氣本弱。故爾數犯。俟痧退後。當用食鹽炒明礬。火飛各一兩。川烏、炮甘草各五錢。乾薑三錢。共為細末。米飯為丸。每服一錢。白湯溫下。新犯痧者。一二服即愈。久犯痧者。十服全愈。

九 醫治暈痧立愈方

暈痧。一時暈昏跌倒。乃痧毒所攻。毒血一衝。必壞臟腑。蓋毒血與食積痰氣。結聚心腹胸膈之間。而經絡不轉。氣血不通。雖欲刮放。而痧不出。急用藥消散。俟胸膈一鬆。昏迷自醒。然後驗筋刺之。用萊菔子、枳實、厚朴各七錢。仙子、廣皮、三稜、莪朮各六錢。姜黃、沈香、檳榔各五錢。白蔻、烏藥各四錢。木香

三錢。水丸。菘豆大。每三十九。砂仁湯稍冷下。

**十 醫治瀉痧立愈方**

瀉痧。滿身脹痛。面色塵黑。身有黑斑。毒在臟腑。氣滯血凝。以致疼痛難忍。用蘇木、延胡、五靈脂、天仙子、蘿蔔子各一兩三稜、莪朮、姜黃、陳皮、檳榔、枳實、厚朴各七錢。烏藥五錢。香附四錢。沈香、降香各三錢。阿魏二錢。水泛為丸。如菘豆大。每服十五丸。砂仁湯稍冷下。

**十一 醫治番痧立愈方**

番痧。狀如蚊咬。粒如瘡癩。看頭額及胸前兩邊。或腹上與肩膊處。照定紅點。以紙捻條。或粗燈草。微蘸香油。點着燂之。

**十二 醫治斑痧立愈方**

斑痧。頭眩眼花。惡心嘔吐。身有紫斑。痧在肉內。急用刮痧法。遲則入裏。生變。再用花粉、丹皮、薄荷、地骨皮、山楂、元參、細辛等分。煎服自愈。刮痧法擇

一光滑細石磁盤。或用磁匙。另用熱水一盅。入香油一二匙。將背心上輕輕向下順刮。以漸加重。盤乾則再蘸。再刮良久。刮至痧點起塊為止。

**十三 醫治絞腸痧立愈方**

絞腸痧。心腹絞腸大痛。如繩縛。如筋吊。如錐如割。輕者亦微絞痛。脹悶非常。先用刮痧法治之。後用細辛一兩。荆芥五錢。降香三錢。鬱金二錢。共為末。每服三錢。清茶稍冷服。

又方。旱烟筒中油。如豆大一丸。放病人舌下。掬水灌之。垂死可救。

又方。陳馬糞不拘多少。瓦上焙乾為末。用陳酒沖服二三錢。不足再服。無不愈。

**十四 醫治噤口痧立愈方**

噤口痧。默默不語。語亦無聲。用刮痧法放痧。再服烏藥、青皮、陳皮、山楂、紫朴等分。溫服自愈。

**十五 醫治角弓痧立愈方**

角弓痧。心胸脹極。痧毒內攻。故頭頂向上。形如角弓反張。是臟腑已壞。危症也。急用好火酒。將毛青布醮。抹手足拘急處。再噴其遍體。少頃鬆動。然後用藥。或可回生。藥用木香。沈香。檀香。等分。共為細末。每五分。砂仁湯微冷下。

**十六 醫治大頭瘟立愈方**

大頭瘟。頭面腫大。咽喉閉塞。急用延胡索。錢半。皂角。川芎。各一錢。梨蘆五分。躑躅花二分半。共為末。用紙捻醮藥。推入鼻中。取嚏。日三五次。甚效。噎出膿血者。更妙。無噎者。難治。又方。蚯蚓十餘條。拌白糖。入盤碟蓋好。半日。即化為水。用鴨毛醮水敷之。即愈。

**十七 醫治羊毛瘟立愈方**

羊毛瘟。陡然腹痛。不過一二時。即死。醫藥不及用。針灸不及施。急用蕎麥粉。以冷水和丸。如雞蛋大。即在病人臍旁及心窩內外磨擦。良久。俟坭丸稍

熱。破開看之。如丸中有羊毛。是其症無疑矣。另換坭丸再擦。以不見羊毛為度。雖已氣絕。身未冷者。皆可治。若擦之。並無羊毛。即非此症。當另求名醫診治。

又方。用十字街頭土。照上治之。亦效。

**十八 醫治蝦蟆瘟立愈方**

蝦蟆瘟。時行。面赤。項腫。即用青蛙搗汁。水調。空心頓飲。極效。

**十九 預防鼠疫神效方**

鼠疫不止一種。有核子瘟。又名結核疫。及肺炎疫。等。核子瘟。熾於熱時。天寒則熄。肺炎疫。則反是。愈寒愈熾。氣候熱度。如在八十度時。即全熄。預防方法。用生蘿蔔。不拘多少。切碎。食鹽拌浸。約兩點鐘。再用真生麻油拌和。每日早晚食之。便可不發生矣。

又方。以金銀花三錢。野菊花四錢。甘草二錢。薄

荷一錢。生白芍二錢。生熟蘿蔔子各一錢五分。右藥七味。如在疫氣傳染地方。或自覺略有不適。即用清水煎服。神效。

## 二十 醫治鼠疫立愈方

鼠疫用生石膏一兩。至八兩。元參四錢。至八錢。野菊花四錢。至一兩。金銀花四錢。至一兩。連翹四錢。甘草一錢。薄荷二錢。丹皮四錢。射干二錢。川貝母二錢。右藥十味。用清水煎服。不拘劑數。全愈為止。此方係治肺炎者。肺炎係最險之熱疫。傳染甚易。人患此病。則頭痛如破。昏憤如迷。甚至咽喉乾燥。眼白全赤。吐血數口。二十四分鐘即可致命。危險殊甚。惟南方水土淺薄。石膏、元參、野菊花三味。似宜少用。仍視病人體氣如何。務宜詳慎審之。又方。結核鼠疫發生時。人家之鼠。並不畏人。到處覓水吸。如大渴然。須臾倒地而斃。人觸其氣。或肋間。或腿膀間。忽然結核作痛。初起時畏冷發熱。

宛如風寒感邪。重者一二日即斃。輕者亦不過苟延四五日而已。染疫者如一時無西醫就治。急用蜜水炙製香附一錢五分。黑梔子一錢五分。粉丹皮一錢五分。紫草茸一錢。紫菜五錢。即南貨店中買者。忍冬藤八錢。連翹心一錢五分。芫薺子二錢。生研牛蒡子二錢。橘紅一錢。苦杏仁坭去皮尖研末三錢。鮮竹心一錢。蓮子心十四粒。臨服藥時沖入鮮藕汁一小酒盃。如熱毒攻心。加犀角心。羚羊尖。磨沖各一分。如陰虛而熱重者。加鮮生地。元參之類。此方乃清理營分之熱。佐以調氣去瘀之品。極其神效。

## 第二章 外科醫治法

### 一 癰疽

#### 一 醫治癰疽立愈方

焮赤腫痛者曰癰。陽證也。毒自臟發。外不焮腫者。

曰疽。陰證也。用真青黛二錢。紅井藥二錢。熟石膏一兩。冰片二分。共研為末。敷於患處。能化腐提膿。殊有奇效。

又方 臭梧桐枝葉。搗爛敷之。即愈。

又方 野菊花連莖搗爛。酒煎熱服。取汗。以渣敷之。即效。

又方 龍葵一兩為末。麝香一分。研勻塗之。極效。  
又方 癰疽久不收口。用活鯽魚一尾。去鱗雜。不經水洗。將山羊糞裝滿其腹。瓦上炙乾。存性研末。冰片調敷。即能收口生肌。

二 醫治癰疽初起立愈方

癰疽初起。以熱湯頻沃之。即散。

又方 大黃五倍子黃蘗等分為末。新汲水調塗。日四五次。自消。

又方 乾薑一兩。炒紫研末。醋調敷。四圍留頭。自愈。奇方也。

又方 外貼洞天嫩膏。內服醒消丸。熱陳酒送下。三錢。其痛即止。夜間得睡。次日皮即起。皺。再服全消。

三 醫治癰疽久潰立愈方

癰疽久潰。用桐葉醋蒸貼上。退熱止痛。漸漸生肉。收口。極驗秘方也。

又方 棗膏三斤。煎水噴洗。即愈。

又方 癰疽久潰生蛆。用海參焙燥研末。塗之。則蟲疽化水。立效。

四 醫治癰疽不潰立愈方

癰疽堅硬不潰。來勢腫惡。以蠶繭已出蛾者。燒灰酒服。一枚出一頭。二枚出二頭。累效。

又方 龍葵莖葉搗敷之。亦效。

又方 黃葵花子研末。酒沖服。一粒則一頭破。兩粒則兩頭破。神效異常。

五 醫治癰疽作痛立愈方

癰疽作痛。用杏仁去皮。研濾取膏。入輕粉麻油調搽。神效。

又方 葵花根去黑皮搗爛。入井水調和貼之。

### 六 醫治臍癰立愈方

臍癰。肚臍腫大如瓜。臍眼高突者是。紅赤者。照癰毒治法治之。不紅不熱者。照陰疽治法治之。甚驗。

### 七 醫治腿癰立愈方

腿癰。以老松香研末。用好高粱酒調塗。即消。

### 八 醫治腎癰立愈方

腎癰。用芙蓉葉曬研。胡椒焙研。各二錢。野苧根一兩。葱頭七個。酒糟兩半。共搗爛。加米醋和敷。即消。又方 葱白杵爛。蜜和塗。亦效。

### 九 醫治便癰立愈方

便癰初起時。用皂角子七個研末敷之。極效。

又方 黃葵花子七七粒。皂角半挺為末。以石灰同醋調塗之。

### 十 醫治囊癰立愈方

囊癰。又名脫囊。陰囊潰爛。腎子落出。用紫蘇湯洗之。並用紫蘇葉根搗敷。取新荷葉包好。內服黃連六分。歸尾連翹。雲苓各一錢五分。甘草木通各一錢。極效。

又方 抱出雞卵壳。加黃連、輕粉等分。共為細末。用煉過香油調塗。

又方 鳳仙花子生甘草各二錢。研末。麻油調敷。即生肌肉。

### 十一 醫治子癰立愈方

子癰。腎子作痛。外見紅色。遲則成膿。潰爛致命。急用枸橘全個。川棟。秦艽。陳皮。赤芍。甘草。防風。澤瀉。各一錢五分。一服即愈。

### 十二 醫治石癰立愈方

石癰。堅硬不作膿者。是用葇荍子為末。醋和敷。瘡頭根即拔出。

又方 橡子一個。以醋於青石上磨汁塗之。乾則易。不過十度即平。

十三 醫治牛頭癰立愈方

牛頭癰。膝上生癰腫而紅者。是用連鬚葱頭切碎。以糯米飯乘熱拌敷。重者五六次必消。或照癰毒治法治之亦效。

十四 醫治騎馬癰立愈方

騎馬癰。俗名偷糞老鼠。生於穀道前後。初發如松子。大漸如蓮子。數十日後赤腫如桃李。或腫即破。破則難愈。用橫文甘草一兩四寸截斷。以溪澗長流水一盃。河水井水不用。以文武火慢慢醮水炙之。自早至午。令水盡為度。劈開視之。中心水潤。乃止。細剉用無灰好酒二小盃煎至一盃。溫服。次日再服。便可保無虞。但此藥不能急消。須過二十日方得消盡也。

又方 潰爛之後。一經房事。即成漏生管。體弱者

患之甚危。諸漏易治。獨此難治。治則漏管愈大。難救。未成膿時。用生甘草熟大黃各三錢。酒煎。空心服一劑。如已成膿。服醒消丸。倘患色白者。服小金丹。無有不愈。

十五 醫治腦疽立愈方

腦疽。初起未潰時。急用活雄鯽魚一尾。婦女髮垢。退。即頭髮上油膩。一撮。搗爛調塗患處。即能消。

十六 醫治眉疽立愈方

眉疽。用生菘豆五倍子等分研末。醋調搽。極效。

十七 醫治甲疽立愈方

甲疽。指甲邊生一赤肉突出。時常舉發者。用狼毒一兩。黃芪二兩。醋浸一宿。入猪油五兩。微火上煎取二兩。絞去渣。退火氣敷之。日換三次。神效。

十八 醫治石疽立愈方

石疽。初起一核。漸大如拳。堅硬如石。急以陽和湯

犀黃丸。每日早晚輪服。如遲至大如升斗者。仍如石硬不痛。日久漸見紅根。則不能治。若生斑片潰爛。在卽潰後卽放血三日而死。若現青筋可治。內服陽和湯。外用活商陸根搗爛。加食鹽少許敷之。數日作癢。半月皺皮。日敷日軟。有膿袋下垂。以銀針穿破。用千金托裏散。加熱地生著各一兩煎服。十劑後用陽和解凝膏貼上。空出穿針之眼。膏外用布捆緊。務使皮膜相連。內服臺黨炙著熱地各四錢。白朮酒炒。焦朮茯苓上桂（研末沖服）當歸各二錢。川芎一錢五分。炙草一錢。水煎服。自效。又方。蛇蛻炙灰研細貼之。經宿便愈。

### 十九 醫治陰疽立愈方

陰疽。用艾葉一斤。硫黃雄黃各五錢。煮半沸搗爛。候溫敷。冷再易。知痛可生。

### 二十 醫治癰疽立愈方

癰疽。生手足肩背。紫紫如赤豆狀。將痂剝淨。以大

麻子炒研末塗之。

又方。大鯽魚長三四寸者。亂髮一團。如雞子大。豬脂一盃。同煎膏塗之。

又方。枸杞根葵根葉。煮汁煎如飴。隨意服之。

### 二十一 醫治落頭疽立愈方

落頭疽。生在腦後。由小而大。係屬陰症。斷不可服寒涼等藥。倘醫不得法。卽腐爛落頭而死。宜用上好麝香一錢。胡椒一兩以上。共研細末。熟蜜和爲兩丸。病在左。放左手。病在右。放右手。病在中。男女右。緊緊握住。用布帶將手指捆攏。不緊不鬆。免使藥丸移動。捆至六個時辰。再換如前。日夜不斷。無論如何潰爛。用至數丸。自能收口生肌。

又方。烏羊骨蜂窠。煨燥研末。存性。加冰片少許。用麻油調敷患處。毒水流。卽愈。

又方。烏羊糞置瓦上。炭火焙燥。酌冰片少許。同研爲末。敷於患處。亦效。

二十二 醫治對口疽立愈方

對口疽。用新鮮鱒魚一尾。和白糖少許。搗爛敷於患處。即愈。

二十三 醫治脫骨疽立愈方

脫骨疽。生手足各指。或云生手足第四指者。是初生如粟米。起一黃泡。其皮或如煮熟紅棗。黑色不退。久則潰爛。節節脫落。延至手足背腐爛。黑陷。痛不可忍。古方有截去指頭一法。斷不可用。宜以頂大甘草。研極細末。香麻油調敷。要敷極厚。一日一換。不可間斷。忌食發物。不出十日必愈。再用金銀花。元參各三兩。當歸二兩。甘草一兩。水煎服。一連十劑。永無後患。藥味不可減少。減則不效。並忌抓擦為要。

又方。有發於腳趾。漸上至膝。色黃。痛不可忍。逐節脫落而死者。用土蜂窠。研細。陳醋調擦。應手而愈。

又方。初起時。覓天竹枝。上胡蜂窠一個。用陰陽瓦。炙灰研末。和冰片二分。滴醋少許。調勻敷患處。奏效如神。

二十四 醫治多骨疽立愈方

多骨疽。瘡內不時出細骨。乃母受胎未及一月。與六親骨肉交合。感其精氣。故有此病。以密陀僧末。和桐油調敷。攤貼之。即愈。

又方。蝮蟻炙研極細末。每一錢。入乾薑末五分。要細如灰。入瘡孔內。次日自有骨出。骨盡自愈。

二十五 醫治附骨疽立愈方

附骨疽。又名貼骨疽。生大腿外側。初起不熱不紅。甚則錐痛。難以屈伸。轉動不便。久則寒鬱為熱。熱甚作膿。而無頭。皮色不變。漸透紅亮一點。則為內膿已成。潰則收功甚難。用白芥子末。燒油調敷。或以大戟。甘遂研末。白蜜調敷。內服熟地一兩。真鹿角膠三錢。上肉桂。甘草各一錢。麻黃。炮薑各五分。

水煎服。卽陽和湯每日一劑。四五服可消。消後再服子龍丸。或小金丹。以杜患根。切忌開刀。開則定成縮脚損疾。

又方 蟻螂七枚。同大麥搗敷亦效。

又方 用檲樹皮燒存性。研末。米飲下三錢。自愈。

### 二十六 醫治井泉疽立愈方

井泉疽。又名慢心銳毒。初起時。心口內有塊。漸大。心口發高。毒陷不救。治法以本人兩手十指。以線量其長短。共有若干。於一線放喉管正中處。雙環至背脊之中。看兩線合攏盡頭處。爲中穴。又以本人中指之中一節。用竹片量准。作一寸。放在中穴之左右。各遠一寸。以墨記分立三穴。如△之形。每穴用艾三團。一齊火灸。灸畢全愈。

### 二十七 醫治發背立愈方

發背。乃癰疽中之大患。緣其對心對肺對臍故也。若悞服涼劑。悞貼涼膏。定然毒攻內腑。不救。宜用

瓜萐五枚。取子去壳。真乳香五塊。如棗大者。共研細末。以白蜜一斤。同熬成膏。每服三錢。溫黃酒化服。神效。

又方 初起時用黃明膠四兩。酒一盃。重湯頓化。隨意飲盡。不能飲者。滾白湯飲之。服此毒不內攻。不傳惡症。

又方 潰爛不堪者。用蘆葉爲末。以葱椒湯洗淨。後敷之。效驗如神。

### 二十八 醫治搭手立愈方

搭手。因手可搭而名。可照發背初起治法治之。無有不驗。

### ▲二一 疔瘡

#### 一 醫治疔瘡立愈方

疔爲最急險之毒瘡。設悞食猪肉。則潰爛愈甚。性命堪虞。急搗芭蕉汁服之。則毒解腫退。

又方 疔瘡無論已破未破。取飯一團。嚼爛放疔

頭上再用桂圓肉一枚蓋之。用布扎住。每日如是數次即愈。

又方 生白菊花根。搗汁服之。以渣搽患處。亦效。

又方 螳螂子。同青菜葉搗爛。塗於疔上。即愈。

又方 雞糞敷於疔上。以膏藥蓋之。而免穢汚。狼籍。無論何疔皆效。

又方 大黃雄黃巴豆三味。分量各等。共研細末。

以麵少許。和為丸。如蘿蔔子大。最重服十九丸。輕

則以二丸遞減。至十三丸為止。服後必瀉。瀉則腫

退。如瀉而仍不止。服陰陽湯一杯。(即河水及井

水)立止。此方奇驗。治愈甚多。

又方 疔毒攻心。最為難治。病人如有嘔噦懊懣

等症。即是攻心先兆。急飲真菜子油一盃。或小麻

油亦可。

又方 坑底坭。蟬退。全蝸。各等分。和捏如錢。用香

油同煎。去渣溫服。即愈。再用渣圍疔之四畔。其疔

自出。

自出。

又方 於陰溼地方。如門角牆壁等處。捕駝背蟲

一隻。俗名灰駝駱。狀類蚱蟻。而身短背駝。前段四

足。後段有兩長腿。略與蟋蟀相似。而無翅。色帶淡

黃。跳躍甚遠。將蟲剖開。肚皮貼合患處。立愈。

又方 糞坑底泥。蟬退。全蝸。等分。搗作餅。如錢大。

香油煎滾。溫服。以渣敷瘡。四圍疔自出。

又方 煙管中煙油。厚敷四圍。頭留出。少刻疔破

出水而愈。

又方 將疔刺破。以老葱生蜜杵貼兩時。疔出。以

醋湯洗之神效。

二 醫治疔瘡初起立愈方

疔瘡初起。見小白泡。根盤如盃。用木通滑石甘草

煎服。並治一切毒瘡。服之止痛消腫。如在冬季。加

麻黃少許。服後如出汗。最妙。

又方 百合及白糖。搗爛敷患處。即退。

又方 嚼生黃豆數合。至知豆腥。即愈。  
又方 芙蓉葉、相思豆、菊葉。搗汁敷之。  
又方 生山藥和白糖搗食之。立退。或服真菜油一盃亦效。

又方 初發時。用盤鋒割開。急取生煤敷在患處。頃刻立消。切忌油膩。

又方 疔瘡初起。不拘已成未成。用翻白草十科。酒煎服。出汗即愈。

### 三 醫治疔瘡走黃立愈方

疔瘡走黃。用螻蛄一只。放疔瘡上。能吸毒水。再捕十餘只。搗爛。溫酒吞服。雖毒重痛極。無不見效。  
又方 巴蕉根搗汁服之。即愈。

### 四 醫治疔瘡出血立愈方

疔瘡出血。飲真麻油一大盃。或飲菜子油。更妙。

### 五 醫治疔根不出立愈方

疔根不出。用鐵粉一兩。輕粉一錢。麝香少許。為末。

計畫十字。以點藥入內。醋調。麵糊敷之。神效。

又方 蒼耳根葉搗和童便絞汁。冷服一升。日三服。拔根甚效。

又方 取戶邊蜘蛛。杵爛醋和。先挑四圍血出。根梢露。敷之。乾即易。一日夜根拔出。大有神效。

### 六 醫治疔不收口立愈方

疔不收口。用雞子黃數十個。放銅鍋內煎熬。出油去渣。貯磁瓶中。固封其口。用時將鵝毛蘸油搽之。神效無比。

### 七 醫治疔毒發背立愈方

疔毒發背。用烏玄參二兩。蒲公英三兩。銀花三兩。當歸二兩。煎服。即潰出膿。漸愈。

### 八 醫治紅絲疔立愈方

紅絲疔甚危。生於足者。紅絲漸延至臍。生於手者。紅絲漸延至胸。生於面者。紅絲漸延至喉。即不可治。急用針刺破其紅絲出血。以浮萍草嚼碎塗刺。

處。隨用白礬末三錢。川葱頭七根。搗爛。和白礬末。加酒吞服。蓋被出汗。即愈。

又方。鍋底煤少許。黑魚鱗一錢。焙燥研末。用麻油調塗。依紅絲用筆敷之。惟尖頭之處。用魚鱗一二張貼之。其紅絲疔瘡。自然內消。若鄉間不及用藥者。急用茨菇葉搗汁。依紅絲敷之。即愈。

九 醫治蛇頭疔立愈方

蛇頭疔。生於中指上。用小坭蚶一條。搗爛敷之。立愈。

又方。雄黃末一錢。青田雞一隻。搗爛敷之。亦愈。

又方。雞蛋開一小孔。入雄黃末一錢。以指插蛋內。浸二時。再換一蛋。仍入雄黃浸之。三次無不愈。

又方。雄黃五分。面粉一兩。麝香五厘。共為末。酒調敷之。即愈。

又方。生疔於羅紋間者。用白蘿蔔一個。去蒂挖空。入冰片末。將指塞入。初時甚痛。片刻即止。一週

時毒消腫退。

十 醫治羊毛疔立愈方

羊毛疔。初起頭痛。身發寒熱。前心坎。後背心。有紅點如疹子形。先用針挑破。取出羊毛。再用明雄黃末三錢。青布包緊。醮熱酒於前心坎。瘡上一二寸外。四圍團團擦之。漸漸搽出瘡眼。其毛即奔至後背心。亦照前法擦之。其羊毛俱拔於布上。即埋入土中。內用紫花地丁一兩。白礬甘草各三錢。銀花三兩。煎服自效。

十一 醫治魚睛疔立愈方

魚睛疔。用枯礬末。寒食麵糊調貼。消腫無膿。

十二 醫治魚臍疔立愈方

魚臍疔。四面赤。中央黑凹者。是用銀硃。水和丸。每服一丸。溫酒下。自愈。

又方。臘豬頭燒灰。雞子清調敷。日數易。亦愈。

又方。葱白蜂蜜拌塗。四圍甚佳。

十三 醫治刀鑷疔立愈方

刀鑷疔。疔頭如韭菜寬長一二寸。肉色紫黑者是。忌用針刺。用明礬三錢。研細。葱白七個。二味研爛。分作七份。每份以熱酒一盞送下。服完即睡。蓋被取汗。如無汗。再以葱頭湯催之。少頃汗出。便佳。外以溲雞糞塗之。即愈。遲則毒歸心臟。不救。

十四 醫治人中疔立愈方

人中疔。用真銀硃。桂圓肉三四個。搗融敷患處。內服白菊花根汁。即消。

十五 醫治閉口疔立愈方

閉口疔。生在人中。上初起時。用生雞冠血點之。即退。

十六 醫治唇上疔立愈方

唇上疔初發時。大腿灣中發現紫筋。用針刺之。出血立愈。

十七 醫治反唇疔立愈方

反唇疔。用生芋莖。搗爛取汁。內服外塗。立見功效。

又方。荔枝燒灰研末。存性。麻油調塗。兼治諸毒。

十八 醫治面疔立愈方

面疔。用鐵銹不拘多少。又蜒蚰三條。霜梅一枝。三味打爛。搽之。立效。

又方。飯蠅七個。去翅足。加入頂上冰片二釐。同搗爛敷疔上。一日夜便腫消。屢試屢驗。但仍須服藥以清其毒。

十九 醫治耳疔立愈方

耳疔。將荔枝煨燥研末。用麻油調敷。極效。

又方。鮮紅菱柄。炙灰存性。加月石冰片各少許。研末吹入。亦效。

二十 醫治心疔立愈方

心疔。一時頭面腫脹。并臂腫腹大。迷亂不省人事者。用野苧薺菊花葉。搗汁。加酒少許。如牙關緊閉者。搗開唇齒。灌下。渣塗患處。即消。

二十一 醫治水疔立愈方

水疔。生指甲內。痛楚異常。初起時。祇須以石鹼碎為小塊。用膏藥貼患處。二次即愈。

又方。以金或銀三稜針（忌鐵針）刺患處四畔。後用銀杏去殼。浸油中。年久者。杵爛。罨自愈。

二十二 醫治螺疔立愈方

螺疔。生於手指之間。受害無窮。小則多延時日。大則手腕麻木不仁。用大葉榔雞（即甬地野柴之根）與馬齒莧之莖。加酒釀搗爛。敷之。立見奇效。

凡遇患處起紅點者。則用紅莖馬齒莧。起白點者。則用白莖馬齒莧。是為至當。

又方。馬蹄草、大青葉、臭紫草、各等分。搗爛。以酒一盃浸之。去渣。溫服。三服立愈。

二十三 醫治指疔立愈方

指疔。用生雞蛋敲一孔。入蜈蚣粉一條。雄黃一錢。將蛋套指上。周圍綿紙固封。周時脫去。輕者即愈。

重者日換一枚。三日全愈。

又方。雄黃七分。白芷三分。共研末。入雄豬膽內。套於指上立愈。

又方。醃鴨蛋之紅坭一塊。將指之患處。伸入坭中。久之即愈。

二十四 醫治足指疔立愈方

指足疔。用蛤巴皮貼之即愈。

▲三一 瘰癧 附流注遮腮

一 醫治瘰癧立愈方

瘰癧。小者為瘰。大者為癧。色樣甚多。項前為痰瘰。項後為溼瘰。左右兩側形軟。遇怒即腫。為氣瘰。堅硬筋縮。為筋瘰。若連綿如貫珠者。為瘰癧。形名各異。受病固不外痰溼。熱風毒而成。然必兼恚怒鬱憂。謀慮不遂。而致者也。用雄豬膽數十個。在銅鍋內熬煎。攤在油紙上。煎成膏藥樣。貼在患處。如有膿。旋貼旋換。遂得治愈。奇效。

又方 每日取略帶白色之老鼠屎七粒。須揀兩頭尖者。加真化州橘紅一錢。和水在飯鍋上蒸之。取其湯分三次服。如是七日自消。

又方 青黛馬齒莧同搗。日日塗敷。自效。

又方 壁虎十條。頭脚俱全。炙燥研末。以麻油調塗患處。即毒退生肌而愈。

又方 大蝦蟆兩只。放清水缸內。須經三日。以洩其毒。再以雄豬肚一只。用竹刀刮去污穢。切勿落水。將蝦蟆入豬肚內。共煮去蝦蟆。食豬肚。食完即痊。

又方 生芋芴切片。晒乾研末。作小丸。日服一二錢。十日見效。

### 二 醫治瘰癧初起立愈方

瘰癧初起時。用煙桿中黑烟油。或鳳仙膏塗敷。三日即消。屢試神效。

又方 以鮮金絲荷葉搗碎取汁。用雞毛蘸汁敷

患處。乾即再敷。不令間斷。二三天即愈。

又方 取乾割人藤六兩。作一劑。鮮者倍之。最妙用純根。洗淨切斷。置瓦罐中。加水煎至大半。傾出。趁熱加紅沙糖一二匙。陳黃酒（即米酒）照量。和服。每劑可煎二次。作一日早晚之用。初患者二三劑可愈。重者須常服。此藤無毒。而味亦不惡。即小兒亦易令服。但十歲之內。須減半。其已潰爛者。則無效。

### 三 醫治瘰癧潰爛立愈方

瘰癧潰爛。用赤練蛇一條。置籠糠內。煨焦。取骨研末。以麻油調敷。甚效。

又方 用黑色蝦蟆一枚。去腸焙乾。研。油調敷之。忌鐵器。

又方 潰爛流串者。用荊芥根下段煎湯洗。良久。著瘡。破紫黑處。以針刺去血。再洗三四次。用韭菜地上蚯蚓一把。五更時收取。炭火上焙紅。為末。每

一匙入乳香、沒藥、輕粉各五分。穿山甲九片。炙為末。油調敷之。神效。

四 醫治熱瘰立愈方

熱瘰。用青藤烟筒內之烟。辣水敷之。立效。濃者尤驗。

五 醫治鼠瘰立愈方

鼠瘰。此症瘡口已合。旁邊有眼。出膿不止。又有頸項生之不已。復從脚底而生。俗名鼠子打洞。其症最惡。用老鼠一個。去毛搗爛。亂髮一團。另用火腿肥肉煎出油。入鼠髮二物。煎至消盡為度。以一半敷瘡眼。一半沖服。神效之至。

又方 貓頭骨。燒灰存性。油調敷之。以瘡為度。

又方 鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃熬令黑。先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。

六 醫治痰癭立愈方

痰癭。以海螵蛸。每晨共煮食之。一月即愈。

七 醫治痰核立愈方

痰核。大者稱惡核。小者痰核。結毒根最深。却不易潰。未潰之前。忌貼涼膏。忌服涼藥。內服陽和湯。犀黃丸。可消。亦有以大田螺搗敷塗消之者。大忌開刀。

又方 大南星磨酸醋調敷。數次自消。頗驗。

又方 壁虎一條（藥材舖可購）置新瓦上。炭火炙成灰存性。研成細末。再用紫衣胡桃三枚。去其殼。炙研如前。續加頂上冰片五分。水磨麻油一兩。拌和塗敷患處。累效。

又方 捉活蝙蝠炙成灰。和菜油塗患處。二三次即愈。

又方 柏子和鷄蛋白中搗爛塗敷。塊上即消。已穿則不能用。

又方 冬天未落桃葉。浸滴醋內。令透。取出貼患處。乾則更換。約十餘次。定能消退。

八 醫治瘰癧痰核立愈方

瘰癧痰核。用製半夏、生芒硝、研末、醋調敷之。即消。

九 醫治頸項結核立愈方

頸項結核。將野菊花搗爛。煎酒服。渣敷患處。即消。

又方。連翹、脂麻。為末。時時服之。極效。

又方。頰下結核。用大蜘蛛。不計多少。好酒浸過。

同研爛。澄去渣。臥時服之。亦效。

十 醫治九子瘍立愈方

九子瘍。生頸上。一連九個者。是用鷄卵一只。淨水

煮熟。破為兩邊。去黃。以真麝香一分。冰片五分。摻

在瘡子上。從初生第一瘍子起。將鷄蛋一邊蓋上。

外以乾艾一大團燒蛋外。總以瘍子大痛為度。如

痛不可忍。則將艾暫除。痛止。又燒。蛋乾。又換。每日

夜約燒五六度。次日又換新冰麝。仍用新蛋照前

法燒之。再用蒲公英、夏枯草、金銀花、各二錢。甘草

節一錢五分。水煎服數劑。效驗非常。

十一 醫治流注立愈方

流注。發無定處。如塊如核。漫腫無頭。皮色不變。或

痛或不痛。久則破而流者是也。此症一曰寒痰。一

曰氣毒。初起用二陳湯加陽和丸同煎。數服全消。

消後即服小金丹七丸。以免復發。如皮色稍變。極

痛難忍者。須服陽和湯以止其痛。已成膿者。不痛

而破。此乃大疽變小之法。如患處稍軟。可用針刺

破。膿多白色。以陽和膏貼之。但此症破後。毒痰走

盡。患生不一。故初破之後。五日內須仍服小金丹

十丸。以免後患。接服陽和湯犀黃丸。每日早晚輪

服。使毒痰消盡。必可收功。屢試屢驗。

又方。於春夏之交。多取奶奶草（即乳丁草）

洗淨。懸掛簷際風乾。愈陳愈佳。陳則毒性退盡。初

起時。取甘草二三莖。與針刺七孔之雞蛋一枚。和

水煮之。俟蛋煮熟透時。去渣與湯。只吃蛋一二吹。

即愈。或用露蜂房一個。愈大愈好。大者力更大。和

雞蛋一枚。以水煮之。煮至濃厚時。去蜂房。取蛋和湯飲之。此方無論初起已潰。有膿無膿。多則兩次。即可止痛收口。立有起色。無須再用別種膏藥及敷藥。極效。

十二 醫治遮腮立愈方

遮腮。又名疔瘰。用燈心一根。點油燒之。在大指二指之下。手背微窩處。左腮燒右手。右腮燒左手。其效如神。

又方 柏葉、車前草、柏子仁、杵碎。熱敷患處。或用

雞子清調赤小豆末亦效。

又方 腮間突然腫起。亦風熱也。用野菊花葉搗爛。四圍敷之。其腫自消。

▲四 瘰癧

一 醫治瘰癧立愈方

瘰癧。用豬鬃七枚。酒熬三錢。入水瓶中。露一夜。取出炙食。二服妙。

又方 豬鬃焙四十九枚。沈香二錢。真硃砂罐煨四十九粒。橘紅四錢。為末。臨臥冷酒徐徐服二錢。五服見效。重者一料愈。以除日合之。忌酸鹹油膩。澀氣之物。

又方 羊鬃一具。去脂。酒浸。炙熟。含之。嚥汁。日一具。七日瘡。

二 醫治頭上癭瘤立愈方

頭上癭瘤。將烏梅核研末。用井水調敷。即愈。

三 醫治眼皮癭瘤立愈方

眼皮癭瘤。用櫻桃核磨水塗之。即消。

四 醫治腋下癭瘤立愈方

腋下癭瘤。用長柄壺。燒存性。研末。搽之。以消為度。或加麻油調敷。尤妙。

五 醫治癭瘤結氣立愈方

癭瘤結氣。用自然銅貯水甕中。逐日飲食。皆用此水。其癭自消。或水燒烟氣。久久吸之。亦可。

又方。鐵砂。入水缸中浸之。飲食皆用此水。十日一換砂。半年自消散。

### 六 醫治五癭結核立愈方

五癭結核。壘壘腫硬。以昆布一兩。洗去鹹。曬乾為散。每以一錢。綿裹好酢中浸過。含之。嚙汁味盡。再易之。

### 七 醫治血瘤立愈方

血瘤。將甘草熬膏。用筆醮圈瘤之四周。又用芫花、甘遂、大戟、研細末。醋調。另用新筆塗圈內。務與甘草圈離分許。數次愈。

### 八 醫治肉瘤立愈方

肉瘤。每夜睡時。將新熟熱飯敷上。冷則易。連敷三次。自愈。

### 九 醫治髮瘤立愈方

髮瘤。多生耳後。髮下寸許。按之不痛。用針刺破。劑盡粉髮。用生肌藥敷之。自愈。

### 十 醫治粉瘤立愈方

粉瘤。用舊牛皮鞣底洗淨。煮熟極爛。成凍子。常食之。瘤自破。如豆腐。極臭。又方。蜘蛛網纏住瘤根。次日另換蜘蛛網再纏。約換四五次。則瘤自消。內有結實小白粉。用手取。不腫不痛。

### 十一 醫治漏瘤立愈方

漏瘤。浸淫日廣。癢不可忍。愈後復發。時流黃水。用羊蹄草根搗爛。將醋洗淨。塗上一小時。以冷水洗之。日一次。有效。

### 十二 醫治疣瘤立愈方

疣瘤。初起時。用柳樹上花蜘蛛絲纏之。久則自消。又方。稻上花蜘蛛十餘。安桃枝上。待絲垂下。取東邊者。熬為線。繫之。七日一換。自消落也。

### ▲五 痔瘡

### 一 醫治痔瘡立愈方

痔瘡。用地骨皮三兩。龍衣五錢。礬石一兩。同煎水洗之。久即愈。

又方。活田螺一個。搗去其蓋。加入梅片一分。稍

延片刻。螺即自斃。其壳內之片。亦化為水。用雞毛

蘸搽患處。即愈。

又方。魚腥草煎水洗患處。甚效。

又方。鮮枸杞子根煎湯薰洗。神效。

又方。野芥菜根洗淨。加水煎湯。乘熱傾在甕內。

人坐其上。使熱氣上蒸。待溫。再以水洗之。連試數

次。痔即結痂而脫。

又方。南棗一枚。去核。斃魚骨一個。搗碎。銅青裝

滿。棗內紮緊。火煨烟盡。伏土存性。研細。用秋海棠

煎洗。然後用藥和水敷之。三日即消。

又方。胡葱二三斤。煮熟。藏甕內。令患人坐上。不

逾時。即收復。如覺腹中膨脹。即將利濕藥。可保無

虞。

又方。用盆盛沸湯。以器蓋之。留一孔。用洗淨。菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先熏後洗。數次。自然全愈。

二 醫治內痔立愈方

內痔。落出肛外者。用大團魚頭一個。火煨為末。擦痔上。即刻收。

又方。冬青樹葉煎湯薰洗。甚效。

三 醫治外痔立愈方

外痔。疼痛異常。坐臥不得。用大田螺八九個。將針挑開。蓋入冰片。白礬末。少許在內。以田螺尖埋土中。令其蓋仰上。經一宿。螺化水。以雞毛搽痔上。便自縮入。

又方。槐花煎湯頻洗。并服之。極妙。

又方。番木鱉馬齒莧。同磨汁敷之。數次即愈。

四 醫治血痔立愈方

血痔。用益母草葉搗汁飲。極效。

又方 棉花子炒黃黑色。去殼爲末。陳米濃汁。加黑沙糖。丸如梧子大。每晨開水送三錢。服三斤斷根。

又方 雞冠花不拘多少。濃煎。空心服。自愈。

又方 生豆腐渣。鍋內炒乾爲末。每服三錢。白沙糖湯下。日三次。遠年垂危者亦效。

### 五 醫治酒痔立愈方

酒痔。用青蒿葉爲末。糞前血冷水調服。糞後血酒調服。神效。

又方 絲瓜燒末。酒服二錢。亦效。

### 六 醫治痔核立愈方

痔核。用老牌花露水。以新棉蘸少許。擦核上。痛癢自止。極驗。

### 七 醫治痔漏立愈方

痔漏。用鯽魚一條。去腸。入白礬令滿。瓦上燒末。以雞羽掃藥敷。甚效。

又方 蠶紙曬乾。小刀刮下蠶空殼。陰陽瓦煨黃。好酒送下。連服十張。除根。

又方 款冬花嚼爛敷上。一二次即愈。

又方 刺蝟皮兩大張。新瓦上炙脆爲末。象牙屑一兩。菘豆粉一兩。青黛三錢。槐花末一兩半。陳細茶五錢。爲末。用陳糙米煮爛飯和瓦。每服三錢。金銀花湯下。亦效。

### 八 醫治痔漏生管立愈方

痔漏生管。用白雞糞一斤。入甕內。以開水沖之。人坐甕口薰之。其管自脫。數日即收口。漸愈。惟坐時須耐久忍痛始效。

又方 象牙末二兩。人脚趾甲炙五錢。牛骨膠炙一兩。豬脚爪炙一兩。刺蝟皮鍋內蜜滾。炙乾爲末。將地榆、槐角二味入豬臟內。煮熟搗爛。共搗蜜瓦。每服三錢。空心滾湯送下。痔漏自然退管。

### 九 醫治痔瘡腫痛立愈方

痔瘡腫痛。用壁上背包。蜒蚰一個。研泥。入龍腦少許。臘脂。环子五分。同敷。自愈。

十 醫治痔瘡作癢立愈方

痔瘡作癢。用水銀。棗膏。各二兩。同研。綿裹納下部。明日蟲出。

又方。猪大腸六兩。蚯蚓十餘條。煮融。去蚓食腸。極效。

十一 醫治雞冠痔立愈方

雞冠痔。用黃連末敷之。加赤小豆末。自效。

十二 醫治翻花痔立愈方

翻花痔。以木瓜為末。用鱧魚身上涎調貼。紙護住。極效。

▲六 癬疥

一 醫治癬瘡立愈方

癬瘡。用五倍子去蟲。白礬火煨。各等量。研末。先以乾擦。再用油調塗之。即愈。

又方。斑蝥半兩。研末。用蜜調塗。雖年久之癬。治之亦效。

又方。蘆薈一兩。炙甘草五錢。研末。先以溫水洗淨。將藥敷之。立愈。

又方。白芷。細辛。樟腦。土荆皮。四味。各數錢。用高粱燒酒半斤。將藥浸半月。封口。勿洩氣。然後用布蘸酒擦患處。頗有神效。

又方。白芨。木鱉子。土槿皮。共研末。加白糖及醋調塗。即愈。

又方。皂角。和醋熬煎成膏。塗敷患處。數次便愈。殊驗。

二 醫治疥瘡立愈方

疥瘡。用生明礬一斤。硫磺四兩。共研為末。加燒酒拌炒。再研。用雞油調敷。即愈。

三 醫治癬疥瘡立愈方

癬疥瘡。用巴豆去殼。和猪油搗爛。以夏布包之。周

擦數次即愈。

四 醫治癩疥瘡立愈方

癩疥瘡。用野大黃根四兩。花椒壳一錢。白礬二錢。樟腦四分。加生豬油二兩。拌油搗爛。將藥用粗夏布包裹。周擦患處。甚效。

又方。用胡桃肉數枚。搗爛。再以紅燭油與水銀三分。混和擦敷。亦效。

又方。硫磺末以雞子煎香油。調搽極效。

五 醫治久年頑癬立愈方

年久頑癬。用王不留行。五倍子。煨燥研末。加醋調敷。即愈。

又方。五倍子一兩。濃煎取汁。再以好醋四兩。調和塗於癬上。初覺微痛。日塗數次。三日即愈。永不復發。屢試屢效。

六 醫治風癬蔓延立愈方

風癬蔓延。用苧麻根。煨炙研末。麻油調敷之。無論

何癬。治之均效。

七 醫治咬髮癬立愈方

咬髮癬。以生薑浸高粱酒內。取出擦諸患處。其效如神。

八 醫治爛脚癬立愈方

爛脚癬。用雞脚上之黃皮。炙灰存性。研末。加枯礬三分。冰片少許。共研細。時擦之。即愈。

九 醫治蛙毛癬立愈方

蛙毛癬。用鐵屑粉。以醋調搽。即愈。

十 醫治牛皮癬立愈方

牛皮癬。用桃樹根。加丹礬共搗爛敷之。立愈。

又方。用黃牛皮一塊。燒存性。加麻油調和。以鵝翎拭患處。百發百中。

又方。石榴皮。蘸明礬末。抹之。自愈。

十一 醫治荷葉癬立愈方

荷葉癬。將荷葉蒂晒乾。研末。香油調敷。數日。脫去

厚皮一層。癬亦不復發矣。

又方 槿樹皮為末。醋調。重湯煮如膠。敷之。亦效。

十一 醫治梅花癬立愈方

梅花癬。用清油一盃。以小竹子燒火。入內煎沸。瀝猪膽汁一個。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。勿令日晒。

七 瘡癤

一 醫治身面熱瘡立愈方

身面熱瘡。用榆白皮研末。油和塗。自效。

又方 鮮菊葉搗爛敷。亦效。

二 醫治遍體火瘡立愈方

遍體火瘡。初起似痱。漸如水泡。熱似火燒。瘡色紫赤。不治殺人。用油菜葉搗汁。調大黃。芒硝。生鐵銹。等分。塗之。自愈。

三 醫治多年惡瘡立愈方

多年惡瘡。諸藥不效者。用馬齒莧搗爛塗之。極效。

四 醫治溼毒結瘡立愈方

溼毒結瘡。用豆渣（即豆腐之渣）敷於患處。日換數次。數日即愈。

五 醫治濕瘡起泡立愈方

溼瘡起泡。將棟樹根搗爛取汁。加雞脚。大黃。生礬。生豬油。共攪勻。用細夏布包之。周搽患處。見泡以針破之。數日即愈。

六 醫治諸瘡成管立愈方

諸成瘡管。用大蒜梗燒灰。搽之即脫。

七 醫治瘡根不滅立愈方

瘡根不滅。將橄欖切斷。蘸麝香少許。搽之無癢。

八 醫治頭生禿瘡立愈方

頭生禿瘡。將葶藶搗爛。以白糖調和。塗於瘡上。日易二次。惟先將頭髮剃光。然後搽髮。方效。  
又方 羊肉切片。炙香。乘熱徧貼頭上。取蟲。蟲盡。以鹽湯洗之。再用雄黃末和猪胆汁塗之。自愈。

九 醫治頸項生瘡立愈方

頸項生瘡。用秋茄一只。對剖去心。以半只覆於瘡上。越宿即能咬頭出毒。連換數次即愈。惟夏茄無效。

十 醫治面上生瘡立愈方

面上生瘡。將有壳蝸牛。搗融攤紙上貼之即愈。紙上留一小孔出氣。初起用之甚效。  
又方 銀花、黃柏各三錢。研細和冰片少許。醋調服之亦效。

十一 醫治鬚鬚瘡立愈方

鬚鬚瘡。以煙袋中之煙油。加水十分之一。煎成膏。搽極效。  
又方 雄黃、豬膽汁和敷甚效。  
又方 取年久窖磚（即窖內之磚）經火煨炙。搗為細末。加冰片少許。用麻油調搽立效。  
又方 蘿蔔汁加醋調塗即愈。

十二 醫治羊鬚瘡立愈方

羊鬚瘡。生於上下唇。癢而出水似膿。用白礬、花椒研末。加冰片少許。雞蛋白、麻油調塗。三日即愈。  
又方 舊棉花炙灰。香油調塗即愈。

十三 醫治天泡瘡立愈方

天泡瘡。用水銀、硼砂、豬油調和敷之即愈。  
又方 蠶豆夾壳燒灰。菜油調敷立愈。  
又方 蓮蓬燒枯研末。井坭調敷。神效。或用鮮荷花瓣貼之亦佳。

十四 醫治黃水瘡立愈方

黃水瘡。初如米粟。癢而兼痛。破流黃水。浸淫成片。流處即生。發於心下者。若不早治。難救。用胡燕窠中土研末。水和敷自效。  
又方 紅棗、燒炭八錢、飛黃丹、松香、枯礬各四錢。右共為末。麻油調搽亦效。

十五 醫治對口瘡立愈方

對口瘡。生後頸正中處。偏生者名偏對口。用新鮮茄子蒂十四個。生紅何首烏二兩。煎服二三劑。未破即消。已破拔膿生肌。雖根盤八九寸寬大者亦效。

又方 象貝母研末敷之神效。

又方 尋取韭地蚯蚓搗爛涼水調敷。日換三四次。

十六 醫治千層瘡立愈方

千層瘡。用新鮮橄欖核燒灰和雞蛋油調敷。極效。

十七 醫治翻花瘡立愈方

翻花瘡。內生惡肉和飯粒血出隨生。反出於外。用鼠尾草根切。同豬脂搗敷。神效。

又方 蒼耳葉搗汁。日塗數次。有效。

又方 鴿糞三兩。炒黃為末。溫漿水洗後敷之。亦效。

又方 柳枝葉三斤。水五升。煎汁二升。熬如餿。日

塗三次。自愈。

十八 醫治人面瘡立愈方

人面瘡。生在兩膝。亦有生在兩手彎者。眼口能動。能食用。雷丸三錢。輕粉。真白茯苓。各一錢。共為細末。敷上即愈。

又方 貝母末敷之。亦效。

十九 醫治坐板瘡立愈方

坐板瘡。用胡椒三錢。鉛粉一兩。枯礬一錢。共研細末。生豬油搗爛敷之。即愈。

又方 大蒜苗炙灰。敷之。亦效。

又方 松香。宮粉。硫磺。寒水石。共研末。豬油調敷。

又方 黎明摘桑葉。即有白汁。以磁器承之。搽患處。二次。即愈。

又方 蠶豆莢壳燒灰。菜油調搽。即愈。

二十 醫治貓眼瘡立愈方

貓眼瘡。形似貓兒眼。有光彩。無膿。血癢。痛不常。飲

食減少。名曰寒瘡。用生草烏三兩。生薑二兩。煨白芷。炒南星。各一兩。肉桂四錢。不見火。共爲末。用頂好燒酒調敷。名曰回陽玉龍膏。

又方 多食雞魚葱韭四物自愈。

### 二十一 醫治蛇胆瘡立愈方

蛇膽瘡生於腰間。形如水泡。用鮮魚血加雄黃調塗。卽效。

又方 獨脚蓮（野生之藥草）之根。與雄黃共研末。以黃鱔血調和敷之。日敷二次。數日卽愈。

### 二十二 醫治蛇纏瘡立愈方

蛇纏瘡。又名纏腰龍。此丹毒也。生腰下長一二寸。或碎如飯。或紅腫堅硬。用雄黃末醋調敷之。自愈。又方 水缸底蚯蚓一條。連坭搗爛敷之。卽愈。又方 舊糞桶箍煨研。麻油調塗。亦效。

### 二十三 醫治魚脊瘡立愈方

魚脊瘡。多生筋骨間。堅硬作痛。初起白泡。漸長狀

如魚脊。破流黃水。初起時。用老蒜切片。如三文錢厚。安放瘡頭上。艾一團。如豆大。於蒜上燒之。蒜壞另換。燒至不痛爲止。名曰隔蒜灸法。再照貓眼瘡第一治法。回陽玉龍膏治之。

### 二十四 醫治魚臍瘡立愈方

魚臍瘡。穿而長。腫而黑者。是用臘豬頭骨。燒灰研末。生雞蛋白調搽。數日卽愈。

### 二十五 醫治蜂窩瘡立愈方

蜂窩瘡。不拘何處。形如蜂窩者。是用胡粉、硃砂等分爲末。和白蜜塗敷。甚效。

### 二十六 醫治蜘蛛瘡立愈方

蜘蛛瘡。形如蛛網。癢不能忍。用豆腐衣。燒枯存性。香油調搽。自愈。

### 二十七 醫治眉瘡立愈方

眉瘡。用大皂莢。燒存性。枯礬。要燒透。各等分爲末。麻油調塗。先用白礬水洗淨爲妙。

二十八 醫治鼻瘡立愈方

鼻中生瘡。將薏米、冬瓜煎湯當茶飲。神效無比。

又方 蜜陀僧、白芷各二錢。共研末。蠟燭調搽。甚效。

又方 杏仁（去皮尖）搗爛。以人乳調和塗患處。亦效。

又方 用苦參、枯礬各一兩。生地汁三合。水二鍾煎至三合。少少滴之。自愈。

二十九 醫治口瘡立愈方

口瘡。用黃連、乾姜等分。為末搽之。即愈。

三十 醫治唇瘡立愈方

唇瘡。用旋覆花煨存性。研麻油調敷。自效。

三十一 醫治舌瘡立愈方

舌瘡。用丁香三錢。山豆根五錢。煎水含口中。稍頃吐出。再換食之一日。即愈。

三十二 醫治背瘡立愈方

背瘡。皮膚未潰者。將山藥（藥草名）去皮搗爛。再加銅錢數枚。火石（即舊時用以取火之石）數小塊。拌和。越宿再搗之。則錢與火石均能自化。再將藥末敷於患處。頗有神效。

三十三 醫治背瘡立愈方

背瘡。用頂上五倍子五兩。研末。真白蜜三兩。置飯鍋上蒸熱。和藥末調勻。敷於患處。中留小孔。使瘡頭露出。則毒氣向外透洩。日換塗一二次。奏效如神。

又方 初起未成者。用癩蝦蟆一只。繫於瘡上。越半日。蝦蟆飽吸其毒。勢將垂斃。急置水中。以救其生。再換一只。仍如前狀。三換。毒散自愈。

又方 野薔薇花含苞者。及益母草嫩頭葉等分。陰乾研末。入冰片少許。未潰者塗之。一宿即退。已潰者周塗爛處。即能生新肌肉。漸漸收功。惟塗時須留尖頭。不可塗滿。使餘毒發出也。

**三十四** 醫治腿瘡立愈方  
腿瘡以桑樹根上青苔括下晒乾炙燥研末以麻油調勻塗之即效

**三十五** 醫治爛脚瘡立愈方  
爛脚瘡取初生之鼠將腹破開貼在牆上吹乾取  
下用炭火焙炙研末以冰片麻油調敷即愈  
又方 活鮑魚一尾冰片約一百文灌入魚肚內  
覓澄清之尿一桶將魚放尿桶內令魚飽飲再用  
炭火置瓦上炙乾研末加蘆甘石少許麻油調塗  
如藥已乾用葱頭湯洗去再搽七日即愈  
又方 黃蠟銅綠燒融與豬油調勻塗油紙上作  
膏貼之即愈

**三十六** 醫治臙瘡立愈方  
臙瘡多因溼熱而起又被手甲風毒抓傷破爛淋漓纏綿不已以佛前多年舊供花用香油浸敷即愈

又方 龜版一個火煨研細末黃占三錢葱白三個真麻油三匙共搗成餅用陳茶將瘡洗淨看瘡大小攤膏貼之治遠年者極效

又方 白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換毒血去盡再用松香一兩杏仁三十粒去皮尖油黃丹八錢輕粉五分舊玻璃三錢火焙為末研細麻油調搽一日一換數次即愈

又方 龜版炙蘆甘石煨各三錢輕粉二錢冰片一二分共研細末麻油半杯銅銚內熬滾入白蠟黃蠟各二錢融化離火將凝入前藥末攪勻攤油紙上貼患處以葱椒甘草湯洗一日一換自愈

又方 臙瘡不合以蟹汁溫洗拭乾用葱汁調輕粉敷之極效

又方 臙瘡不乾用白堊土煨研末生油調搽亦效

又方 臙瘡久不愈用川烏頭黃蘗各等分為末

以漿水調塗紙上貼之大有效。

又方 臙瘡久爛用竈內黃土年久者研細入黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入絹中貼之勿動數日愈。

三十七 醫治凍瘡立愈方

凍瘡用紫馬勃五分梅片少許共研末搽之即愈。

又方 萊菔與辣椒煎湯洗之亦愈。

又方 蟹壳燒灰加蘇油調塗先以蘿蔔苗及甘蔗皮煎水洗之然後塗上即愈。

又方 蝦壳焙燥研末以香油調敷即愈。

又方 櫻桃收貯磁瓶內瓶口封閉勿令洩氣待

冬天用時取出和水搗爛敷之數天即愈惟嗣後忌食櫻桃。

又方 新鮮萊菔一個中間挖空實以燭油放脚

爐上烘熱將油抹之即愈。

又方 取生豬脂切塊浸入燒酒中十日用油頻

塗甚效。

又方 臨臥時用綿花浸洋油包患處數次即愈。皮破潰爛者取大黃末用水調敷即可止痛。

又方 凡足跟生凍瘡未破時用冷水浸半點鐘之久連浸二三日即愈。

三十八 預防凍瘡神效方  
暑伏時搗大蒜為坭敷在上年生過凍瘡之處過一日一夜洗去遲三四日再敷一次若連日敷之則肉上起泡破皮矣本年冬雖極寒亦不再生凍瘡凡小兒手足各處雖未凍過亦敷兩次可以耐寒。

三十九 醫治軟癢立愈方

軟癢用代赭石饒丹牛皮膠等分為末好酒一盃沖之澄清服以渣敷乾則易之自效。

又方 露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎

清油二三沸去豆用油調敷亦效。

又方 露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎

清油二三沸去豆用油調敷亦效。

清油二三沸去豆用油調敷亦效。

又方。抱出雞卵壳。燒存性。研末。入輕粉少許。清油調塗。即愈。

又方。頭上軟瘡。用野芋頭磨醋塗。極效。

#### 四十 醫治石瘡立愈方

石瘡。將菊花葉搗汁。調白蜜敷之。用渣敷四圍。留頭不敷。俟毒水流盡。即消。

又方。紫薇花半茶盅。煮精肉食之。可保一年不生。

### 八 外科雜治

#### 一 醫治鼻痔立愈方

鼻痔。用雄黃五分。月石五分。冰片少許。研末敷鼻中。自愈。

又方。輕粉二錢。杏仁七粒。（去油）白礬五錢。共為末。吹鼻中。即化為水。

#### 二 醫治鼻菌立愈方

鼻菌。乃鼻中涕泗結成。形扁而層疊。用胭脂綿石

膏。燒灰存性。研末吹入。極效。

又方。月石五分。礞砂五分。冰片少許。研末吹入。亦效。

#### 三 醫治耳痔立愈方

耳痔形如櫻桃。或如羊奶。係由肝經怒火。腎經相火。胃經積火。凝結而成。微腫悶痛。觸之痛引頸項。用礞砂一錢。輕粉。雄黃。各三錢。加冰片少許。點患處。內服清熱之品。自愈。治耳聾耳挺亦效。

#### 四 醫治耳疳久潰立愈方

耳疳久潰不愈。用桑螵蛸（俗名螳螂子）炙燥研末。加冰片少許。吹入耳內。即愈。

#### 五 醫治舌上生菌立愈方

舌上生菌。初起如豆。漸大如菌。痛極。紅爛無皮。朝輕暮重。由心脾熱毒所致。取蜘蛛絲。擗作一條。打圈套在菌上。其絲自漸收緊。收至極痛。忍耐片時。

菌落血出。再用蒲黃末敷之。並服六味地黃丸。加槐花三錢。極效。

又方。瓦松兩棵。青苔三錢。溲雞屎一錢半。加礮砂一錢。共為末。擦數次。即愈。

六 醫治眼生偷針立愈方

偷針。用南星、地黃各三錢。研成膏。貼兩太陽。自愈。

七 醫治豎頭肉立愈方

豎頭肉。用紅菱柄擦之。即永不復生。

八 醫治代指立愈方

代指。俗名癩爪。用烏梅入醋。研浸患處。自愈。

又方。忍冬藤、蒲公英煎濃汁。浸或以甘草濃湯漬之。亦可。

九 醫治指上肉刺立愈方

指上肉刺。住往拔去。復生。觸着甚痛。殊覺不便。可於入廁時。順手在糞桶邊上磨之。越一宿。即自落。

十 醫治嵌甲作痛立愈方

嵌甲作痛。不能行履。用濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕輕剪去。再以虎骨膠擦之。自愈。

十一 醫治爛腳丫立愈方

爛腳丫。用茶葉嚼爛敷。自效。

又方。蚌蛤粉研細糝。亦效。

十二 醫治腳生雞眼立愈方

雞眼。用軟竹布塗松節油。貼患處。日換二次。早晚行之。其效極速。閱數日。雞眼自能消去。

又方。取萬年青葉搗爛。敷患處。可以斷根。且極效驗。

又方。搗葶藶一個。和蕎麥麵少許。貼患處。不過一晝夜。便效。

十三 醫治脚底木硬立愈方

脚底木硬。用牛皮膠、生姜汁化開。調商星塗。烘物熨之。自愈。

十四 醫治流火脹立愈方

流火脹。用鮮紫蘇、鳳仙花、連根葉洗淨。共搗爛。放脚盆內。以滾水泡之。腿架盆上。薰洗。再以布帶水揩擦。數次即愈。即年久者亦無不愈。惟愈後忌食螺螄。

又方 木鼈子。以水磨汁塗之。亦效。

### 十五 醫治瘡癩頭立愈方

瘡癩頭。用銅青一兩。松香五錢。草蓀子六十粒。葱三根。共搗爛。攤青布上。敷之。即愈。

又方 久年古屋上之舊瓦。研碎為末。麻油調塗。立愈。

又方 初起時。服小金丹三服而消。已潰爛者。服七丸而愈。外貼陽和解凝膏。

### 十六 醫治無名腫毒立愈方

無名腫毒。用烏梅一兩。去核。輕粉一錢。共研末。作小餅。用時。塗於膏藥上。貼之。即消。

又方 水仙花根。野薔薇花根。芙蓉花葉。芭蕉根。

共搗爛成汁。敷之。亦效。

又方 紫玉簪花根。搗爛敷之。亦效。

又方 雞蛋白。飛麵。食鹽。共搗和敷之。一宿即愈。

又方 生藤黃。磨擦患處。消腫立效。

又方 蜒蚰一條。山藥一兩。搗爛敷之。亦效。

又方 野菊花。莖葉。蒼耳草。各一握。共搗入酒一盃。絞汁服。以渣敷之。取汗即愈。

又方 野葡萄根。晒研為末。水調塗之。即消。

又方 不問生熟。軟硬。取楸葉十重。敷腫上。舊綿裹之日三易。當重重有毒氣。為水流在葉上。冬月取乾葉。鹽水浸軟。或取根皮搗爛敷之。皆效。止痛消腫。化膿。血勝於衆藥。

又方 一切腫毒。已成未成者。用水膠一片。水漬軟。當頭開孔貼之。未白者自消。已潰者令膿自出。

## 第三章 婦科醫治法

▲一 調經

一 醫治月經不調立愈方

月經不調。用當歸二兩。紹酒二斤。浸數日。每晚睡時溫服一盃。甚效。

又方 熟地黄八兩。當歸二兩。黃連一兩。並酒浸一夜。焙研為末。煉蜜丸。梧子大。每服七十九。米飲溫酒下。即效。

又方 經行不准。或前或後。用丹參曬研。每二錢溫酒下。亦效。

又方 竹紙三十張。燒灰。淡酒半斤。和勻。頓清溫服。亦效。

又方 月經不調。氣血乖和。不能受孕。或生過一胎。停隔多年者。用全當歸五兩。切片。遠志肉五兩。甘草湯洗。用稀夏布袋。盛甜三白酒十斤。浸之。蓋好。浸七日。後晚溫服。隨量飲之。勿間斷。

二 醫治經水不通立愈方

經水不通。用黑魚頭。塗泥。炙燥。去泥。研末。每服三錢。黃酒送下。即通。

又方 益母草膏。常服。輒有神效。

又方 薏苡根一兩。水煎服。不過數服。甚妙。

又方 或兩三月。或半年一載者。用麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熟酒一升。浸一夜。服。升便通。

又方 月經不通。腹大如瓠。氣短欲死者。用虎杖一斤。去頭。曬乾。切。土瓜根汁。牛膝汁。各二升。水一斛。浸虎杖一宿。煎取二斗。入二汁。同煎如餲。每酒服一合。日再夜一宿。血當下。

又方 因病或身體虧弱。久久閉經者。用紅棗。紅糖。生薑。馬蘭豆根。各四兩。合煎。日三服。勿間斷。至經水復來為止。極效。

三 醫治室女經閉立愈方

室女經閉。用當歸尾。沒藥。各一錢。為末。紅花浸酒。面北飲之。一日一服。便效。

又方 茜草三錢。陳酒一盅。水煎服三劑。如經仍未通。再服三劑。必效。

又方 室女經閉。恍惚煩熱。用鉛粉半兩。生地黃汁一合。調服。日三次。自通。

**四 醫治經水不止立愈方**

經水不止。用蓮蓬壳一個。炒燥研末。陳酒送下。立止。

又方 箬葉灰。蠶紙灰等分。為末。每服二錢。米飲下。極效。

又方 紅雞冠花一味。曬乾為末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥猪肉。

又方 白芍藥。香附子。熟艾葉。各一錢半。水煎服。亦效。

又方 側柏葉尖。芍藥。各等分。每二錢。水酒各半煎服。

**五 醫治經水逆行立愈方**

經水逆行。用火紙或竹紙。燒灰。約一二兩。開水沖。澄清服之。即順。

又方 先以京墨磨汁服。次用當歸尾。紅花各一錢。水一盅半。煎至八分。溫服。其經即順。

又方 菲菜搗汁一盞。入童便半盞。蒸熱服。極效。若無童便。其功稍緩。

**六 醫治經來色黃立愈方**

經來色黃。忌用涼藥。須暖其經。以和其血。用當歸。烏藥。川芎。元胡。小茴。白芍。各八錢。熟地一錢。薑棗引。空心服。

又方 用老茄子陰乾。研末。酒下。極效。

**七 醫治經來色紫立愈方**

經來色紫者。熱也。用歸尾。川芎。赤芍。香附。製生地。黃連。甘草。丹皮。各一錢。水煎服。

**八 醫治經來色淡立愈方**

經來色淡者。虛也。用台黨。白朮。茯苓。歸身。川芎。白

芍、熟地、炙芪、香附製、各一錢。炙草五分。薑棗引。水煎服。並常服地黃丸。

**九 醫治行經腹痛立愈方**

行經腹痛。凡經水將行。腰脹腹痛者。此氣滯血實也。用歸尾、川芎、赤芍、丹皮製香附、元胡索、各一錢。生地、紅花、各五分。桃仁二十五粒。水煎服。如瘦人有火。加炒黃連、炒黃芩、各一錢。肥人有痰。加枳壳、蒼朮、各一錢。

**十 醫治經阻腹痛立愈方**

經阻腹痛。用穿山甲六兩製香附二兩。於經水來時服之自愈。

**十一 醫治經後腹痛立愈方**

經後腹痛。用台黨、白朮、香附醋炒、茯苓、當歸、川芎、白芍、生地、各一錢。炙草、木香、各五分。青皮七分。薑棗引。水煎服。

**十二 醫治經來嘔吐立愈方**

經來嘔吐。用丁香、香乾、姜、各五分。白朮一錢。為末。每清晨米湯下。

**十三 醫治痛經不孕立愈方**

痛經不孕。取將開未足之玉蘭花。每歲一朵。二十歲用二十朵。每日清晨空心水煎服。甚有效。

**十四 醫治血冷經寒立愈方**

血冷經寒。不能生育。用艾葉絨四兩。紅花二兩。裝於布袋。溫水泡之。將布袋帶水。在小腹部揉擦數十週。每月數次。不滿期年。即能有孕。

**十五 醫治乾血癆立愈方**

乾血癆。用黑魚頭一個。瓦上焙灰。存性研末。每服六錢。陳酒沖服。甚效。

**十六 醫治乾血氣痛立愈方**

乾血氣痛。用絲瓜一枚。燒存性。空心溫酒服。

**▲二一 崩漏**

一 醫治血崩不止立愈方

凡血崩不止。諸藥不效者。用多年舊烟袋桿。以紫色油透者為佳。截一寸。燒灰。黃酒調服。下喉即止。屢試屢驗。

又方 舊棕墊燒灰。置瓦上。收火氣。清晨溫湯沖服三四錢。神效無匹。

又方 當歸一兩。荆芥一兩。酒水各一盅。煎服立止。

又方 陳槐花一兩。百草霜五錢。為末。每服二錢。燒紅秤錘。淬酒調服。

又方 燈心一根。蘸香油點燃。燒大敦穴十下。即止。穴在兩足大趾外側甲縫內中間。不上不下。即是如止而又崩。即在原處燒之。若原處起泡。將泡挑破。燒之無不止矣。此治血崩症神效第一方也。止後再請醫調治。

又方 旱蓮草二兩。白毛烏骨雞一隻。共煮食之。

即愈。

又方 貫衆一兩。醋炒透。煎湯服之。立止。

又方 五倍子一錢。烏梅肉三錢。搗和為丸。每服二錢。開水送下。亦愈。

二 醫治老婦血崩立愈方

老年婦人血海大崩不止。名曰倒經。用陳阿膠一兩。米粉拌炒成珠。全當歸一兩。西紅花一兩。冬瓜子五錢。天泉水煎服。其渣再煎服之。方名膠紅飲。屢試如神。少婦減去紅花一半服之。仍用六君子湯加當歸白芍調理全愈。

三 醫治崩漏五色立愈方

崩漏五色。將蜂巢焙枯。研末五分。溫酒下。神效。

四 醫治婦女漏下立愈方

婦女漏下。用陳蘄艾醋炙三兩。真阿膠五兩。煎湯服之。有效。

又方 用伏龍肝半兩。阿膠。蠶砂炒。各一兩。為末。

每空心酒服二三錢。神效。

▲三 帶下

一 醫治白帶立愈方

白帶。以人乳和稀粥久食之。自愈。

又方 白木槿花。裝猪肚內。煮熟。連肚帶花。服之。頗效。

又方

白雞冠花。煎水服之。亦效。

又方 真蕎麥麵。不拘多少。雞子清和丸。如梧桐子大。每服三錢。早晚空心送下。

又方 白棉花子仁四兩。烘晒九次。打爛。米糟為丸。每服二三錢。開水送下。

又方 蓮蓬壳炙灰。研細末。用熟雞子。去黃取白。裹末服之。頗效。

又方 選青色無沙眼之牡蠣。火煨紅。冷定。又煨

七次。研細。腐漿調下。二錢。

又方 沙參為末。每服二錢。米飲湯下。亦效。

赤帶。用紅雞冠花。曬乾為末。每日空心酒服。自愈。

又方 赤白帶下。用炒杜仲五兩。斷續三兩。白蒺藜三兩。煎湯服之。甚效。

又方 黃荆子二兩。炒黑研末。米糊為丸。每服二錢。燈心煎水送下。

二 醫治赤帶立愈方

赤帶。用紅雞冠花。曬乾為末。每日空心酒服。自愈。

三 醫治赤白帶下立愈方

赤白帶下。用炒杜仲五兩。斷續三兩。白蒺藜三兩。煎湯服之。甚效。

又方 黃荆子二兩。炒黑研末。米糊為丸。每服二錢。燈心煎水送下。

又方 白果去皮。煮熟蜜餞。每日清晨吃七粒。再食炒馬料豆一兩。白滾水送下。數日愈。

又方 豆蔻仁一枚。乳香一小塊。麵裹煨黃焦。同麵研細。每米飲湯服二錢。日二次。自愈。

又方 貫衆狀如刺蝟者一個。全用不剉。只揉去毛及花萼。以好醋蘸溼。慢火炙令香熟。候冷為末。米飲空心每服二錢。亦效。

四 醫治室女白帶立愈方

室女白帶。以金毛狗脊（燎去毛）白斂各一兩。

鹿茸（酒蒸焙）二兩。共爲末。用艾煎醋汁。打糯米糊丸如梧子大。每服五十九。空心溫酒下。自愈。

**五 醫治年久白帶立愈方**

年久白帶。用白果十個。搗爛。豬油一錢。用豆腐漿沖服。一月自愈。

**六 醫治五色帶下立愈方**

五色帶下。用久年古磚一塊。燒極紅。以油煎麵餅七個。安放磚上。再用黃瓜根研末。鋪麵餅上。加布兩層。令患者坐上。使藥氣熏入腹中。三五次即愈。

**七 醫治帶下有膿立愈方**

帶下有膿。用白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥。白枯礬各半兩。爲末。以蠟化丸。梧子大。每空心及食前服十九。俟膿盡自愈。

**八 醫治白淫立愈方**

白淫。用炒車前子三兩。白蒺藜二兩。煎服立效。  
又方 糙糯米。花椒等分。炒爲末。醋糊丸。梧子大。

每服三四十九。食前醋湯下。亦效。

**九 醫治白濁立愈方**

婦人白濁。將鹿角屑炒黃爲末。酒服二錢。自愈。

**十 醫治白沃立愈方**

白沃。經水不利。子臟堅僻。中有乾血。即下白沃。如漿者是也。用礬石燒杏仁各一分。研勻。煉蜜丸。棗核大。納入子臟中。日一易之。自效。

**四 乳疾**

**一 醫治乳症初起立愈方**

乳症。如乳癰。乳疽。乳中結核。內外乳吹等。初起時。用鮮石首魚脊翅五十兩。炙研淨末。小青皮一百兩。晒脆磨末。二味共和篩勻。用粥湯爲丸。如梧桐子大。藏貯磁瓶。每服三錢。葱頭一個。陳酒送下。酒隨量飲。醉臥蓋被。出汗即愈。避風爲要。重者三服。九錢。無不奏效。真乳症之至寶也。

**二 醫治乳中結核立愈方**

乳中結核。用未落水鮮黃魚翅。脊骨。炙灰。陳酒吞服。即消。

三 醫治乳頭破裂立愈方

乳頭破裂。將秋月冷露。茄子裂開者。陰乾。燒存性。研末。水調塗之。即愈。

又方 鮮黃魚背翅。煨灰研末。加冰片。麻油調塗。傷處。頗效。須忍痛。仍令小兒每日吸食。一二次。如停止不食。恐乳水閉塞。變成重症也。

四 醫治乳頭咬破立愈方

乳頭咬破。用北瓜蒂。燒灰研末。麻油調搽。即愈。

五 醫治乳汁不下立愈方

乳汁不下。用赤小豆。煮汁飲。或煮粥食。俱效。

又方 絲瓜連子。燒存性。研末。酒服。一二錢。被覆取汗。即下。

又方 乾胡荽煎湯飲之。乳汁自來。

又方 萬苡子。糯米。各一合。研細。水一盞。入甘草。

末三分。攪勻煎。頻呷。自效。

又方 通草二兩。七星豬脚一只。鹽酒水煮食。亦效。

六 醫治乳流不止立愈方

乳流不止。用炒麥芽一兩。水煎代茶。服之。自止。

七 醫治乳塊不消立愈方

乳塊積久不消。用鯽魚一尾。搗爛。去鱗骨。和酒糟敷患處。一夜即消。

八 醫治乳巖初起立愈方

乳巖初如豆。大漸大如塊。不痛不癢。至一年後。或二三年。漸漸腫痛。臭爛孔深。亦有初起色白。堅硬一塊。作痛異常。此係陰疽。最為險惡。急宜早治。初生者。服犀黃丸三錢。酒下十服。全愈。倘誤貼膏藥。必漸腫大。內作一抽之痛。已覺遲治。假如皮色變異。難以挽回。

又方 乳巖初起之時。用夏枯草。蒲公英。漏蘆。菊。

葉、雄鼠糞、甘菊、貝母、紫花、地丁、山慈菇、連翹、白芷、瓜、蕪仁、炙草、廣皮、茜根、乳香、沒藥、銀花、各二錢。研末。另用夏枯草熬膏。和勻爲丸。如梧子大。每服五錢。滾水送下。至重二服全消。屢試神驗。

又方 冬至日收買小鯽魚腸雜鱗甲一概不去。但將背部剖開。中實川椒七粒。每尾如是懸掛簷際風乾。滿九九日。取下收藏。始終忌經婦女手。遇一切乳症初起。取此魚一尾。瓦上焙存性。研末。陳酒沖服。蓋被出汗。卽效。

### 九 醫治乳巖堅硬立愈方

乳巖堅硬。用槐花三錢。炒黃爲末。黃酒送下。立卽消散。

### 十 醫治乳巖潰爛立愈方

乳巖潰爛。將螞蟻放瓦上。炙灰研末。真菜油調敷。自愈。

又方 急覓熟蟹壳蝦灰存性。研細末。小磨麻油

調敷患處。甚效。

### 十一 醫治乳癰立愈方

乳癰。用鮮蒲公英四錢。鮮鳳尾草一把。同搗爛。加陳酒煮數沸。盡量飲之。卽效。

又方 蝦醬用好醋蒸熱敷之。亦效。

又方 取豆腐瀝下之水。俗呼黃泔湯。置錫鍋中煎成凝汁。敷於患處。奏效甚速。

又方 新鮮黃魚背脊。扯下黏貼牆上陰乾。用時取下三數條。瓦上炙灰存性。研末。另用陳酒半盃。水半碗。青皮錢半煎濃。送下黃魚脊灰。三服立愈。誠神方也。癰已潰者服此亦收。但須另用外敷之藥。

又方 柳根刮去皮。搗爛。燉溫。盛煉囊中。熨乳上。冷則易。極驗。

### 十二 醫治乳癰立愈方

乳癰。用葶藶子十四粒。去殼搗爛。以雄黃少許和

勻。再取雞蛋二枚。刺一小孔。使蛋白流盡。惟剩蛋黃。將藥放入。以紙封好。飯上蒸熟。陳酒送下。不吃酒者。開水亦可。食後出汗即愈。

又方。收集已開謝之水仙花懸簷下風乾。遇婦人患乳癰者。取以搗爛敷之。極效。

又方。白頭翁草根四五寸。煎酒服。若成膿。用青木香末二分酒送下。立愈。

**十三** 醫治乳蛾立愈方

乳蛾。用臭花根搗汁。約三小匙。服之即愈。

**十四** 醫治乳瘡立愈方

乳瘡。用生芝麻炒焦研末。燈油調塗。即愈。

**十五** 醫治乳痛立愈方

乳痛。用細辛八分。生半夏三錢。共研末。合新鮮車前草二三莖。連鬚葱二三莖。及白糖少許。以棉花團蘸藥末塞鼻。左乳痛塞右鼻。右乳痛塞左鼻。數次即愈。

又方。白芷木通谷回香。三味各少許。煎服。酣睡使出汗即愈。重者三服立效。此方治小兒吃乳吹風入乳內。以致母乳紅脹腫痛。服之立效。

**十六** 醫治乳結立愈方

乳結。用蚯蚓糞。陳醋調敷患處。以手揉之。如乳結硬痛。用大鯽魚頭煨灰。酒服二三錢。汗出即愈。又方。百藥煎研末。每三錢酒一盞。煎數沸服。極效。

**十七** 醫治乳毒立愈方

乳毒初起。用鮑魚膠炙灰。陳酒沖服。立愈。又方。敗龜板一枚。燒研。酒服四錢。亦愈。

**十八** 醫治乳妬立愈方

乳妬。將黃蘗研細。雞子清和塗。自效。又方。蒲公英煎濃汁服。亦效。

**十九** 醫治無乳立愈方

無乳。用黃芪五錢。木通一錢。七星豬蹄一隻。煮爛。

食便有乳。

又方 赤沙糖煮豆腐。以醇酒下之。極效。

又方 母猪蹄一對。通草同煮食。併飲汁亦效。

二十 醫治回乳立愈方

回乳。將大麥芽炒為末。每服五錢。白湯下。即愈。

又方 用男子包脚布勒住。經宿即止。

▲五 隱疾

一 醫治初生無陰神效方

初生無陰。女子初生前。陰膜輓如鼓。雖有小孔。通溺礙於人道。名曰鼓女。幼時用鉛作錠。日紙之久。欠自開。無異常人。

又方 以金刀或銀刀割開外膜。即愈。

二 醫治陰傷出血立愈方

陰傷交接違禮及他物所傷。血出不止者。用頭髮煨灰糝。或海螵蛸研末糝均效。

又方 青布燒灰。加血餘研敷之。自效。

又方 蛇床子研末。綿裹納陰中。立效。

三 醫治陰出肉線立愈方

陰道出肉線尺許。動之痛欲絕。先服失笑散數服。次以帶皮薑三斤。研爛入清油二斤。煎乾為度。用絹兜起肉線。於水道邊煎薑薰之。冷則熨。自縮入。線斷不治。

四 醫治陰中生瘡立愈方

陰中生瘡。用杏仁。雄黃。明礬。各五分。冰片一分。共研分作四次。敷入陰中。甚效。

又方 桃葉杵爛。綿裹納陰中。極效。

又方 陰瘡爛痛。用杏仁燒黑。研膏敷。立愈。

又方 陰戶內生瘡。癢痛難堪。將鮮猪肝切成條。於香油中微燙過。抹樟腦。川椒末。插入引蛆。蟲候一時辰。取出再換。自愈。

五 醫治陰後生瘡立愈方

陰後生瘡。將家貓捉住。以胡椒放入貓鼻口內。隨

將貓倒懸。貓即流涎。以碗盛之。搽於患處。神效異常。

六 醫治陰腫立愈方

陰腫。將甘菊葉杵爛。煎湯重洗。極效。

又方。葱白研膏。入乳香末。拌勻。敷患處。亦效。

又方。生地、當歸、川芎、白芍、乳香等分。搗成餅。納

陰中即愈。

七 醫治陰痛立愈方

陰痛。以青布裏炒鹽熨之。立愈。

又方。枯礬、甘草切分。為末。綿裏納陰中。亦愈。

八 醫治陰癢立愈方

陰癢。將桃仁搗成泥。綿裏納陰中。自愈。

又方。蛇床子一兩。白礬二錢。煎湯頻洗。亦效。

又方。雞肝或猪肝。炙熟。切一長條。插入陰戶內。

過一夜。次早取出。數次即愈。

九 醫治陰戶腫痛立愈方

陰戶腫痛。用生地、當歸、川芎、白芍、乳香等分。搗成  
挺。納入陰中。極效。

十 醫治陰戶腫癢立愈方

陰戶腫滿。且作奇癢。可以蒜湯洗之。能消腫止癢。

十一 醫治陰冷立愈方

陰冷。用乾薑、牡蠣各一兩。為末。火酒調稠。搽兩手  
上。揉兩乳。自愈。

又方。川椒、吳茱萸。為末。煉蜜丸。彈子大。綿裏納

陰中。日再易。亦愈。

又方。五味子四兩。為末。漿水和丸。如豆大。頻納

陰中。有效。

陰中有效。

十二 醫治陰脫立愈方

陰脫。用蛇床子五兩。烏梅十四個。煎湯。日洗五六

次。神效。

又方。桂心、吳茱萸各一兩。戎鹽二兩。並熬。令色

變。研末。綿裏如指大。納陰中。日再易。亦效。

又方 婦人陰下脫若腸。先以淡竹根煎湯洗。再用五倍子、白礬末摻自愈。

### 十三 醫治陰挺立愈方

陰挺。將茄根燒存性。研末。油調塗紙上。捲筒插入陰中。日易一次。甚效。

又方 水仙花瓣。紅糖搗極爛。敷之。神效無比。

又方 鮑魚生煎。煉油。搽之。極效。

### 十四 醫治陰蝕立愈方

陰蝕。陰戶如蝕形也。用肥豬肉煮汁。頻洗。極效。

又方 狼牙草三兩。水四升。以箸纏綿浸湯。瀝汁洗之。一日四五次。自愈。

又方 豬肝煮熟。削如挺。鑽孔數十。納陰中。良久取出。內有蟲。另易一挺。蟲出盡。即愈。

### 十五 醫治陰寬立愈方

陰寬。將肥皂子浸去黑皮。用其白肉。加白芨。五倍子。蛇床子。石榴皮。甘松。山柰。龍骨等分。煎濃湯。日

日薰洗。極效。寬而冷者。加石硫黃煎。

### 十六 醫治陰爛立愈方

陰戶臭爛。用熟乳香。冰片。珍珠末。象牙兒茶。各三分。搽面粉一兩。煨鵝黃色。牆上白螺螄壳。煨淨末一兩。共研細末。先用米泔水煎。入雄黃三錢。淋洗患處。然後上藥。極愈。

又方 牡蠣煨。滑石飛。各三錢。陳蚌壳煨二錢。人中白煨一錢。龍骨煨錢半。冰片二分。共研末。摻之。亦效。

### 十七 醫治陰吹立愈方

陰吹。放如撒屁之聲也。用猪板油八兩。亂髮三團。雞蛋三個。以肥皂水洗淨。同熬髮烱。分二次服。病從小便出。即愈。

### 十八 醫治交腸立愈方

交腸。大便由前陰而出也。得之大怒。大飽。氣火錯亂。升降失常。清濁混淆。用明礬七分。敲小塊。腐衣

五層包扎。淡鹽湯送下。神效。

又方 服五苓散亦效。

十九 醫治小便不通立愈方

婦女小便不通。用紫苑為末煎服。或以萱草煎湯飲之均效。

又方 用皂角、葱白煎湯洗陰戶亦效。

二十 醫治小便下血立愈方

婦女小便下血。用蓬草、車前子取汁。每日空心溫服一盃自愈。

▲六 胎前

一 祕製安胎神效方

安胎。將蓮肉去心不去皮。家用青、苧、蔴洗淨膠。白糯米各三錢。水煎去蔴。每早連湯服一次。或服湯不服蓮肉糯米亦可。此方專治婦人慣於墮胎。屢試神驗。平時無小產之患者服此亦妙。

又方 炒杜仲三兩。先煎水去渣。煮糯米粥。紅糖

調服。安臥即紅止痛定。

二 祕製保胎神效方

保胎。孕婦未足月動胎見血者。急取黃鱧一條。將尾切去寸許。令孕婦平臥床上。將黃鱧握住。使血滴於臍中。即胎定血止。

又方 綠萼梅梗三五條。煎濃湯飲。再飲龍眼湯。頻服自效。

又方 南瓜蒂煨研。糯米湯下。亦效。

三 醫治胎動立愈方

胎動。服淡竹瀝一盃即安。

四 醫治胎動下血立愈方

胎動下血。用百草霜二錢。樓灰一錢。伏龍肝五錢。為末。每服一二錢。白湯入酒及童便調下。神效。

又方 大葱白二十莖。濃煮汁飲之。胎未死即安。已死即出神效。

又方 蓮房燒研。麵糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒

任下。日二服。亦效。

又方。阿膠二兩。搗末。生地半斤。搗取汁。以清酒三升。絞汁。分三服。亦效。

五 醫治因驚胎動立愈方

因驚胎動。用黃連末。酒服一小匙。日三服。自效。

六 醫治跌撲胎動立愈方

跌撲胎動。用砂仁不拘多少。放熨斗內。慢火炒熟。透去筋膜。為末。每服二錢。熱酒下。最為神效。

七 醫治胎上衝心立愈方

胎上衝心。用蘿蔔或根。煮濃汁。飲。即下而安。

又方 好醬油開水調服立效。

八 醫治胎痛欲產立愈方

胎痛欲產。用菖蒲根。搗汁一二升。服之立效。又方。以全蛇脫一條。絹袋盛。繞腰繫之。亦效。

九 醫治滑胎易產立愈方

滑胎易產。用車前子為末。酒服一匙。不飲酒者。水

調服亦可。

又方。弓弩弦燒末。酒服二錢。立效。

十 醫治毒藥傷胎立愈方

毒藥傷胎。腹痛口噤。手強頭低。自汗。似乎中風者。用生白扁豆末。米飲服一匙。或濃煎汁亦可。

十一 醫治漏胎立愈方

漏胎。用五倍子末。酒服二錢。自效。

又方。炒熟蠶殼磨末。每服三四錢。加砂糖少許。調服。亦效。

十二 醫治漏胎下血立愈方

漏胎。下血。用益智仁六錢。砂仁三錢。共為末。開水調下。每服三錢。三服見效。

十三 醫治腹內兒啼立愈方

小兒在腹內啼哭。此係兒口離母血管所致。用篋子一把。亂撒滿地。使母彎身向地。手拾兒口。接血管。即愈。

又方 黃連煎濃汁。母常呷之。極佳。

十四 醫治孕婦心痛立愈方

孕婦心痛。用大紅棗十四個。燒焦為末。以童便服之。立愈。

又方 人參、乾薑、炮等分為末。以生地黃汁和丸。

梧子大。每服五十九。米飲下。神效。

又方 鹽燒赤。酒服一撮。亦效。

十五 醫治孕婦腰痛立愈方

孕婦腰痛。用黑料豆二合。炒焦。熟白酒一大盃。煎至七分。空心服。自愈。

又方 當歸、川芎各三錢。切如米。銀器中煎三四沸。入青竹茹一錢。再煎三四沸。去渣。入阿膠錢半。烱服。極效。

十六 醫治孕婦腹痛立愈方

月分未足。孕婦腹痛。如欲產之狀。用知母二兩為末。蜜丸。梧子大。每次粥飲湯下二十九。自愈。

又方 胎動腹痛。或下黃汁。如漆。如豆汁者。用野

苧根、金銀花根各五錢。水酒相半煎服。亦愈。

又方 乾荷葉一張。炙研。糯米泔一盃。調服。亦效。

十七 醫治孕婦嘔吐立愈方

孕婦嘔吐。用竹茹三錢。陳皮一錢。煎服。自愈。

又方 香附二兩。藿香葉、甘草各二錢。為末。每二錢。淡鹽湯下。

十八 醫治孕婦吐衄立愈方

孕婦吐衄。用馬勃研細末。米飲下一錢。神效。

十九 醫治孕婦吞酸立愈方

孕婦吞酸。用台黨、白朮、半夏、陳皮、茯苓、炙草、枳實。炒神麴炒砂仁炒。各五分。薑引。水煎。食後服。

二十 醫治孕婦感寒立愈方

孕婦感寒。用鯉魚一尾。燒末。酒服一匙。令汗出。即愈。

二十一 醫治子煩立愈方

孕婦心驚胆怯。終日煩悶不安者。謂之子煩。用黨參、茯苓、麥冬、黃芩、知母、生地、炙草各一錢。竹茹一大團。水煎空心服。

又方 黃連末每服一錢。粥飲下。或酒蒸黃連丸亦妙。

### 二十二 醫治子嗽立愈方

子嗽。將貝母去心。麩炒黃。爲末。砂糖爲丸。芡實大。每合嚙二十九。神效。

又方 用台黨、白朮、茯苓、蘇葉、阿膠、桔梗各等分。水煎食後服。

### 二十三 醫治子腫立愈方

孕婦面目身體四肢浮腫者。謂之子腫。用大腹皮、生薑皮、桑白皮、白茯苓皮、白朮、紫蘇各等分。棗引去核煎水。另用木香磨濃汁三匙。沖服自愈。

又方 冬瓜湯恣飲。或冬瓜皮煎湯服。

### 二十四 醫治子懸立愈方

孕婦五六月後。胎氣不和。上凌心腹。脹滿疼痛。謂之子懸。用紫蘇、陳皮、腹皮、川芎、白芍、歸身各一錢。潞黨、炙草各五分。薑五片。葱白七寸。水煎空心服。

又方 香附炒研。紫蘇湯下一二錢。自效。

### 二十五 醫治子滿立愈方

孕婦至七八個月。胎已長成。肚大腹滿。逼迫子戶。坐臥不安。謂之子滿。用白朮、黃芩、蘇葉、枳殼、大腹皮各錢半。砂仁五分。連壳略研。炙草二分。薑引水煎空心服。

### 二十六 醫治子鳴立愈方

子鳴。令孕婦作男子拜狀。或以豆撒地。令孕婦被之。則止。

### 二十七 醫治子癰立愈方

孕婦忽然眩暈卒倒。口噤不能言。狀若中風。須臾即醒。醒而復發。謂之子癰。用縮砂仁帶殼炒黑。熱酒調下二錢。不飲酒者。用米飲湯送下。

二十八 醫治子淋立愈方

子淋。用桑螵蛸為末。每服二錢。空心米飲湯下。

又方。地膚子三兩。切細。水四升。煮取二升半。去滓。分三服。日三次。食盡自愈。

又方。冬葵子煎湯飲。亦愈。

二十九 醫治孕婦瘧疾立愈方

孕婦瘧疾。先因傷寒而變成者。用高良薑三錢。剉以豬胆汁。浸一夜。東壁土炒黑。去土。以肥棗肉十五枚。同焙為末。每用三錢。水一盞。煎熱。將發時服之。神效。

又方。夜明砂末三錢。空心溫酒服。亦效。

三十 醫治孕婦痢疾立愈方

孕婦痢疾。用雞蛋一個。破孔如指頂大。以銀簪攪勻。加入黃丹五分。用紙封口。在飯上蒸熟食之。即愈。神效非常。

又方。梔子燒研。空心熱服一匙。甚者不過五服。

亦愈。

三十一 醫治孕婦行經立愈方

孕婦行經。用赤小豆末。酒服一匙。日二度。自愈。

三十二 醫治孕婦溺血立愈方

孕婦溺血。用豆醬一大碗。熬乾。生地黃二兩。為末。每服一錢。米湯下。神效。

又方。阿膠炒黃為末。食前粥飲下二錢。亦效。

▲七 臨產

一 秘製催生神效方

凡催生非正產之時。切不可預先驚動。混服催藥。直至腰腹一陣痛似一陣。痛極難忍。糞門挺急。如欲大便。眼中時見金光。漿破血來。方是正產之候。若未至產時。悞用催藥。轉動非時。以致倒產。橫生。為害不小。催生之方最多。惟茲保產無憂方。服之當生。即生不生。亦能安胎。即有橫生。倒產。胎死腹中。亦能順生。毫無苦楚。百發百中。萬應萬靈。方用

紫厚樸、薑汁炒。蘄艾醋炒。各七分。當歸酒炒。川芎、各一錢五分。生芪、荆芥穗、各八分。川貝母、去心淨。爲末。不入煎。以藥沖服。兔絲子、揀淨酒泡。各一錢。川羌活、生甘草、各五分。枳殼、麩炒。六分。白芍酒炒。二錢。冬月只用一錢。藥須照方揀選泡製。後用戥秤準。不可加減分毫。引用老生薑三片。水二大盅。煎至八分服。預服者。空心溫服。

又方 百草霜研末。每服三錢。童便米泔醋調服。其效如神。

又方 當歸一兩。川芎六錢。荔枝十個。煎湯服之。立效。

又方 黃蜀葵子四十九粒。研爛。溫酒服之。頃刻即產。

又方 大麻根。以水濃煎取汁。頓服立產。胞衣不下亦效。

## 二 急救難產神效方

諸般難產。用陳麥桿一兩。露天者尤妙。洗淨剪寸段。煎湯服。極效。

又方 雲母粉五錢。溫酒服。入口即產。不順者即順。

又方 凡胎已轉動。數日不能下產。勢甚危急者。用牛屎及新石灰少許。置入洗淨之便桶中。將開水兩面盆。沖下攪勻。蓋之。勿令出氣。約數分鐘去。蓋。即扶產婦坐桶上。如騎馬狀。使氣上薰。片時胎即下。胞衣亦隨落。產婦無恙。

又方 五月五日。取黃瓜全藤晒乾。陰陽瓦焙存性。研細末。遇有橫生倒產。及一切臨產疑難。或三五日不能分娩。即用開水送服一二錢。立刻轉危爲安。

又方 兔腦丸二粒。如數日不產。熱甚危急。用此丸服下。即產。

又方 以其夫之袴帶剪寸許。煎湯飲。即下。

又方 雙頭蓮一名催生草。左手把之。即生。

又方 用乳香。以五月五日午時。令一人在壁內。捧乳鉢。一童子。在壁外。以筆管。自壁縫中。逐粒遞。過入鉢內。研細。水丸。芡子大。每服一九。無灰酒下。極效。

三 急救血虛難產神效方

血虛難產。用當歸一兩半。川芎五錢。為末。以黑豆炒焦。入流水。童便各一盞。煎減半。調服。自效。

四 急救過月難產神效方

過月難產。用舊絹篩底一個。捲筒。燒盤內。白湯下。即產。

五 急救難產日久神效方

難產日久。漿水下多。胞乾。兒不得下者。用香油。白蜜各一盃。火上煎微沸。調滑石末一兩。攪服之外。以油蜜塗母臍腹上。神效。

六 急救胎澀不下神效方

胎澀不下。用白蜜一兩。麻油五錢。煎數十沸。服。極效。

又方 鮮猪肉三斤。煎清湯。吹去浮油。恣飲。即產。

七 急救胞衣不下神效方

胞衣不下。視所生之小兒。依男左女右法。男者將產婦左足。向上抬舉。女者將產婦右足。向上抬舉。則胞衣立下。百試百驗。

又方 生雞蛋五六個。去黃。將蛋白生吞。即下。

又方 芒硝二錢五分。牛膝三錢五分。水煎。童便半盃。沖服。立下。

又方 草蓆子兩粒。巴豆一粒。麝香少許。搗爛。敷於臍中及足心上。立下。

又方 用荷葉一全張。煎湯服。立刻即下。若煎時。荷葉扯成幾塊。則胞衣亦成幾塊下。務使產婦切勿驚慌。此方極有奇驗。

又方 水煮弓弩弦。飲汁五合。或燒灰酒服。均效。

又方。胞衣不下。惡血衝心。用五靈脂。半生半炒。研末。每服二錢。溫酒下。卽下。

### 八 急救死胎不下神效方

死胎不下。用牛屎熱塗產母腹上臍下。立下。

又方。取產婦鞋底炙熱。熨腹上下數次。卽下。

又方。烏雞一隻。去毛。以水三升。煮二升。去雞。用

帛蘸汁摩臍下。自出。

又方。子死腹中。月數未足。母欲昏絕者。用大黑

豆三升。以醋煮濃汁。頓服。立出。

又方。孕婦因患熱病。致胎死腹中者。用紅花酒

煮汁。飲二三盞。亦效。

又方。紫草一兩。胎一日不下。加麝香三厘。二日

不下。加六厘。三日不下。加一分。酒二盃。煎至一盃。

食前服之。卽下。

又方。官桂三錢。麝香五分。另研爲細末。作一服。

酒調下。須臾卽落。

### 九 急救橫生倒產神效方

橫生倒產。用半夏、白芨各一兩。爲末。酒服。橫生三服。倒產四服。難產二服。卽效。

又方。凡有倒產兒足先下者。因兒在腹中。不能

得轉。故脚先出。須臾不治。母子俱亡。法用以小鋼

針刺兒足心三五次。又用鹽少許塗刺處。卽時收

足。順生。又法以鹽塗兒足。以指甲搔之。并以鹽磨

母腹上。亦效。

又方。婦人舊頭繩一條。燒灰。加人參一兩服之。

自然順流而下。實有不可思議之妙。

又方。益母草六兩。酒煎濃汁。加童便一大盃。服

之極效。

又方。手足先出者。急令產母仰臥。略以鹽半分。

手出塗手心。足出塗足心。仍抹油輕輕送入。推上

扶正。待兒身轉。頭出自順。

### 十 急救盤腸生產神效方

婦人娩時腸出。乾不收上。俗名盤腸生。以磨刀水潤腸。煎好磁石湯一盃。溫服。自然收上。

又方 麻油潤火紙撚。點火吹滅。以煙熏鼻。立效。  
又方 半夏末。頻搐鼻中。亦效。

十一 醫治交骨不開立愈方

臨產交骨不開。用黃牛粉炒熱。加酒少許。以布縫成枕頭。或將牛糞裝入。紮於產婦腰間。令人就腹邊聽之。如影約有聲響。骨即撒開。立時產下。甚驗。

十二 醫治產傷子宮立愈方

產傷子宮。用活蛤蚧全隻。連殼炙灰。和冰片敷之。即愈。

八 產後

一 醫治產後血暈立愈方

凡產後血暈。不知人事。至危篤之時。不可平臥。背後用人撐住坐起。急用好醋。將火炭浸醋中熏之。使醋氣收入鼻中。然後再用花蕊石末一錢。童便

調下。如口已噤。撬開灌之。即醒。

又方 五靈脂二兩。炒至半生半熟。為末。每服二錢。白開水調下。如口閉者。撬開灌入。即愈。

又方 鬱金煨存性。為末。用好醋調服。立效。

又方 半夏為末。丸如大豆。納鼻中。即甦。

又方 產後血暈。心氣欲絕。將益母草研汁。服一盞。絕妙。

又方 產後狂言血暈。煩渴不止者。用生薑香附子。去毛為末。每服二錢。薑棗水煎服。亦效。

又方 兒出即暈迷不語。急用銀針刺眉心。得血即生。再行服藥。

二 醫治產後血昏立愈方

產婦血昏。將韭菜切斷。納酒壺內。以熱醋泡之。壺口向鼻。使醋氣上冲。即醒。

三 醫治產後血衝立愈方

產後血衝。心冒喘滿。命在須臾。用血竭沒藥各一

錢。研細末。童便和酒調服。自愈。

四 醫治產後血滯立愈方

產後血滯。用生薑五兩。水八升。煮取三升。分三服。自效。

五 醫治產後血脹立愈方

產後血脹。搗芭蕉根絞汁。溫服二三合。即效。

六 醫治產後血虛立愈方

產後血虛。暴虛汗出。用淡竹葉煎湯服之。一服三合。須臾再服。自愈。

七 醫治產後驚風立愈方

產後驚風。將荆芥穗焙研。每服二錢。以黑豆炒焦。乘熱入好酒中。取酒調下。極效。  
又方 五月五日午時。取黑魚頭。浸雄黃酒中。後用繩穿好。置於風口處。不經陰人手。用時置陰瓦焙灰。研末。和木瓜酒吞下。立愈。若無木瓜酒。即百花酒亦可。

又方 產後驚風。遍身發腫。惡露不行。用糞坑中陳年磚一塊。活水洗淨。真陳酒五斤。放鉢內。栗炭火將磚燒透。浸酒內。提出復燒。如此三遍。其酒不過二斤。候溫。令產母服一二杯。不飲酒。用天泉亦可。

八 醫治產後中風立愈方

產後中風。用當歸荆芥穗等分。為末。每服二錢。水一盞。酒少許。童便少許。煎七分。灌之下咽。即有生。意神效。

又方 產後中風。血熱煩渴。以紅藍子五合。熬搗。旦日取半大匙。以水一升。煎取七合。去渣。細細嚙之。自效。

又方 產後中風。口噤身直。面青。手足反張。飲竹瀝一二升。即甦。

又方 難產後中風。危急。用黑豆一杯。葱五六根。先將黑豆炭火炙之。再入葱及黃酒一大杯。煎服。

出汗即愈。

九 醫治產後中寒立愈方

產後中寒。遍身冷直。口噤不識人。用白朮一兩。澤瀉一兩。生薑五錢。水一升。煎服。

又方 川烏頭五兩。剉塊。黑豆大半升。同炒半黑。以酒三升。傾鍋內。急攪。以絹濾取酒。微溫服。一小盞。取汗。若口不開。拘開灌之。如不效。加烏雞矢一合。炒。納酒中服。以瘥為度。

十 醫治產後發熱立愈方

產後發熱。用台黨歸身。熟地肉桂。酒芍各錢半。麥冬一錢。水二盞。先以粳米一合。淡竹葉十片。煎至一鍾。去米葉入藥。並棗三枚。煎七分。溫服。如熱甚。加炒乾薑一錢。

又方 黑豆一茶鍾。炒至煙起。再入連根葱頭五個。同炒。隨入好酒一鍾。水半鍾。煎至一鍾。溫服。出汗自效。

又方 生藕汁一升。合生地汁服。亦效。  
又方 產後發熱不寒。用真葡萄酒溫服。每次一杯。以熱為度。不必服藥。

十一 醫治產後頭痛立愈方

產後頭痛。用川芎當歸各五錢。俱不洗炒。連鬚葱頭五個。生薑五片。焙乾。水煎。食後服。

十二 醫治產後心痛立愈方

產後心痛。將鬱金燒存性為末。二錢。米醋一呷。調灌即安。

又方 桂心為末。狗膽汁和丸。芡子大。每熱酒服一丸。即愈。

十三 醫治產後腰痛立愈方

產後腰痛。用敗醬當歸各八分。川芎白芍桂心各六分。水煎。分二服。切忌食葱。

十四 醫治產後腹痛立愈方

產後腹痛。因感寒起者。用陳蘆艾二斤。焙乾。搗鋪。

臍上以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則寒氣亦出。腹痛自止。

又方。產後腹痛。兒枕痛也。用真蒲黃研細。酒調服二錢。如燥渴者。新汲水調下。自愈。

又方。兒枕痛。百藥不效者。用螃蟹一隻。燒存性。研為末。空心溫酒一盞調服。立止。生男用尖臍蟹。生女用團臍蟹。

又方。產後腹痛如絞。用當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分為二服。如不效。再服自止。

又方。產後腹中空痛。用蓮蓬壳七個。去子煎湯服藥。即止。

又方。新鮮移星草一把。煎濃汁一碗。服之即止。

### 十五 醫治產後腹脹立愈方

產後腹脹。用麥芽一合。為末。和酒服。良久自愈。

### 十六 醫治產後腹硬立愈方

產後腹大堅硬。喘不能臥。用商陸根三兩。大戟一

兩五錢。甘草遂一兩。為末。每服二三錢。開水沖飲。即愈。

### 十七 醫治產後氣喘立愈方

產後氣喘。用人參末一兩。蘇木二兩。水二盞。煮汁一盞。調參末服。神效。

又方。胡桃肉。人參各二錢。水一盞。煎七分。頓服。自愈。

### 十八 醫治產後氣逆立愈方

產後氣逆。用青橘皮為末。葱白。薑便煎二錢服。極效。

### 十九 醫治產後呃逆立愈方

產後呃逆。用白荳蔻丁香各半兩。研細。桃仁湯服一錢。少頃再服。自愈。

### 二十 醫治產後蓐勞立愈方

產後蓐勞。用豬腎一對。切細片。以鹽酒拌之。先用粳米一合。葱椒煮粥。鹽醋調和。鋪於盆底。以熱粥

傾於上蓋之。煮粥食之。

二十一 醫治產後腸出立愈方

產後腸出。盛以潔淨漆器。濃如煎黃芪湯浸之。腸即上。如產腸不收。用油五斤。煉熟。盆盛。令婦坐盆中。約一食時。先用皂角炙去皮。研末。吹少許入鼻。作嚏立上。

又方 用大紙撚蘸香油點燈。吹滅。以煙熏產母鼻中。腸即上矣。

又方 全蠟炒研末。口噙水。鼻中啗之。立效。

又方 酸頭草一把。以水三椀。煎一椀半。去渣。薰洗神效。

二十二 醫治產後陰腫立愈方

產後陰腫。用桃仁燒研塗敷。其腫自消。

又方 葱白杵爛。入乳香末。烘熱貼。勿洗去。亦效。

二十三 醫治產後陰脫立愈方

產後陰脫。用鐵爐中紫煙羊脂。二味和勻。布裹炙。

熱熨推納之。有效。

又方 絹盛蛇床子。蒸熱熨之。或用蛇牀子五兩。

烏梅十四個。煎水。日洗五六次。亦效。

又方 溫水洗軟。雄鼠糞燒煙薰之。即入。

二十四 醫治產後瀉血立愈方

產後瀉血。用乾艾葉半兩。炙熱。老生薑半兩。濃煎湯。一服立愈。

二十五 醫治產後下痢立愈方

產後下痢。不拘赤白。用紫莧菜一握。切煮汁。入粳米三合。煮粥食之。立瘥。

又方 產後痢渴久病。津液枯竭。四肢浮腫。口舌乾燥者。用冬瓜一個。外以黃土泥厚五寸。煨熟。絞汁飲。極效。

又方 產後下痢赤白。裏急後重。用桃膠焙乾。沈

香蒲黃炒。各等分。為末。每服二錢。食前米飲下。

二十六 醫治產後停瘀立愈方

產後停瘀。以鷄蛋兩枚。用當歸血餘煮熱去壳。再煮。然後將蛋滾旋於產婦腹上。如冷。再易一枚。瘀即流通。

又方 花蕊石數錢。煎服即效。

**二十七** 醫治產後便閉立愈方

產後汗多。則大便閉。難於用藥。惟麻子粥最穩。以大麻子仁紫蘇子仁各二合。洗淨研細。再以水研。瀉取汁一盞。分二次。煮粥啜之。

又方 五六日不通。宜用大麥芽炒黃為末。每服三錢。沸湯調下。與粥間食。自效。

**二十八** 醫治產後尿閉立愈方

產後尿閉。用陳皮一兩。為末。溫酒下二錢。自效。

又方 橘紅二錢。為末。空心溫酒下。亦效。

又方 洋蔥三根。蟋蟀三隻。煎水服之。即通。

**二十九** 醫治產後帶下立愈方

產後帶下赤白。用羊肉二斤。香豉大蒜三兩。加酥

一盞。水煮服。即愈。

**三十** 醫治產後淋瀝立愈方

產後淋瀝。以紫草一兩為末。每食前。用井華水服一錢。自效。

又方 紫荊皮五錢。半酒半水煎。溫服自愈。

**三十一** 醫治惡露不下立愈方

產後惡露不下。用台黨白朮雲苓炙草歸身川芎。赤芍熟地。元胡香附各等分。薑棗引水煎。食前服。神效。

又方 用鍋底墨煙。熱酒服二錢。即下。

又方 生藕搗汁。燉溫服。或用山查煎湯。調沙糖服。均效。

**三十二** 醫治惡露不止立愈方

產後惡露不止。用菖蒲一兩半。酒二盞。煎取一盞。去渣。分三服。食前溫服之。自止。

又方 鋸截桑根。取屑五指撮。以醇酒服之。日三

服亦效。

又方 產後血攻。或下血不止。心悶面青。身冷欲絕者。用新羊血一盞。飲之。三兩服愈。

**三十三** 醫治惡血衝心立愈方

產後惡血衝心。腹中成塊。用大黃一兩為末。醋半升。同熬成膏。和為丸。如梧子大。以溫醋化五丸服之。良久血下即愈。

又方 下胎或產後血氣上冲。心痛欲死。用鬱金燒成性。為末。二錢。米醋一呷。調灌即愈。

又方 產後心腹痛悶。或單心痛。惡血不盡。用荷葉炒香為末。每服一錢。沸湯或童便調下。或燒灰。或煎汁皆可。

**三十四** 醫治尿泡下垂立愈方

產後尿泡下垂。用白牡丹根一錢。黃絹一尺。白芨二錢。濃煎半碗。徐徐服之。服後靜臥。忌言語。

**三十五** 醫治子宮墜下立愈方

產後子宮墜下。先用淡竹根煎湯洗淨。次以五倍子白礬為末。搽之神效。

**三十六** 醫治產門不閉立愈方

產後陰道不閉。或陰脫出。用石灰一斗。熬熱。以水二斗。倒下。澄清後薰洗。極效。

**三十七** 醫治產門受傷立愈方

產門受傷。由嬰兒體大。或收生不妥。或天時炎熱之故。以致產下即腫而疼。宜用蚌肉濕草紙包煨研末。搽之即效。

**三十八** 醫治產門受風立愈方

產門受風。紅腫作痛者。先以羌活防風陳艾各一兩。煎湯薰洗。次用葱白杵爛入乳香末。烘熱貼患處。自愈。

又方 用尺長許鯉魚一尾。浸童便內一夜。平旦以文火炙熟去皮。空心頓服。勿用鹽醋。

**三十九** 醫治小產停瘀立愈方

小產停瘀。用蒲黃三兩。水三椀。煎一椀。頓服自下。  
又方。小產血瘀不下。更兼狂悶寒熱者。用鹿角  
屑一兩。爲末。豉湯服一錢。日三服。自通。

#### 四十 醫治小產下血立愈方

小產下血。用益母草一把。炒黑荆芥三錢。煎湯。童  
便沖服。卽愈。

又方。小產下血不止。用代赭石末一錢。生地黃  
汁半盞。調服。日三五次。以瘥爲度。

又方。烏賊魚腹內墨。炒爲末。醋湯調下。亦佳。

又方。小薊根葉益母草各五兩。水三大椀。煮一  
椀。再煎至一盞。分二服。立止。

### 第四章 幼科醫治法

#### 一 初生諸病

##### 一 醫治胎毒立愈方

胎毒。奇癢而濕爛也。將淡豆豉煎濃汁。與三五口。

其毒自下。又能助脾氣。消乳食。

又方。急用花椒三錢。黃柏三錢。鉛粉二錢。枯礬

二錢。共研成末。麻油調搽。自愈。

又方。小兒落地時。用橄欖一個。燒研。硃砂末五

分。和勻。嚼生芝蔴一口。吐唾和藥。絹包如棗核大。

安兒口中。待啞一個時。頃方可與乳。此藥取下腸

胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少。

又方。松香尿坑。浸百草霜各等分。用麻油調敷。

卽愈。

##### 二 醫治胎熱立愈方

初生小兒胎熱。或身體黃者。以真牛黃一豆大。入

蜜調膏。乳汁化開時。時滴兒口中。形色不實者。勿

多服。

又方。黑豆二錢。甘草一錢。入燈心七寸。淡竹葉

一片。水煎服。極效。

##### 三 醫治胎寒立愈方

胎寒。晝夜啼哭不止者。用當歸末一小豆大。乳汁灌之。日夜三四度。自愈。

又方。小兒初生。面青身冷。口噤。乃胎寒也。用白蠶蠶木香肉桂陳皮檳榔甘草炙各五分。水煎取汁。以綿蘸入兒口中。極效。

又方。煮梨葉濃汁七合。可三四度飲之。亦效。

四 醫治臍風立愈方

臍風。面色青白。撮口不食。是也。用生葱二根。搗爛取汁。蠶蠶三枚。炒去絲。研極細末。將葱汁調勻。塗乳頭上。喂兒。或灌兒口內。均效。

又方。帶子蝗蜂窠一個。約重數錢。焙乾。研末。開水吞下。甚效。

又方。用壁虎後半截。焙為末。男用女乳。女用男尿。調勻。入稀雞矢少許。搽舌根。或牙關。仍以手蘸摩兒。取汗出。甚妙。

又方。艾葉燒灰。填臍中。以帛縛定。亦效。

又方。用生地生薑葱白蘿蔔子田螺肉。共搗爛。塗臍四圍。一指厚。抱住。泄矢氣而愈。

五 醫治臍瘡立愈方

臍瘡。用臘脂海螵蛸研末。油調搽。立愈。

又方。臍瘡濕爛。不論哆囉呢羽毛緞嗶嘰絨氈子。皆可燒灰。研末。搽之。勿見風。如濕再搽。自愈。

六 醫治臍濕立愈方

小兒臍濕。若不早治。恐成臍風。或赤腫。或出水。用當歸末敷之。即效。

又方。臍間出水。用附子二錢。甘遂錢半。蛇床子一錢。麝香五釐。各研細末。和勻。填臍中。外加膏藥封之。

七 醫治臍突立愈方

小兒臍突。多因啼哭所致。須先設法。使之不哭。外用赤小豆淡豆豉天南星白蘇各一錢。為末。搗芭蕉自然汁。調塗四圍。小便下。即愈。

又方 兒臍突出。將原斷臍帶并艾葉同燒灰。油胭脂調搽亦愈。

八 醫治臍中出血立愈方  
初生小兒臍中出血。用白石灰研末搽之即愈。

九 醫治初生無皮立愈方

小兒初生無皮。色赤筋紅。乃受胎未足也。用早稻白米。研爲細末。頻頻撲之。皮膚自生。

又方 掘土坑臥之即長皮。

十 醫治初生不啼立愈方

小兒初生不能發聲。謂之夢生。傭俗不知此理。遂棄而不救。極爲可憫。設或遇此。切不可剪斷臍帶。宜將胞衣用火燒炙。令氣入兒腹內。待兒身已暖。乃取貓一隻。用青衣包裹其頭足。令一乖覺婦人捉住貓頭。在兒耳邊。著力以口齒咬破貓耳。貓遂大叫一聲。孩兒即開口啼哭矣。

又方 取冷水灌之外。以葱白莖鞭之。即啼。

十一 醫治螳螂子立愈方

嬰孩有痰火者。吃乳數日。腮間必腫。俗名螳螂子。用元明粉一分。硼砂五釐。薄荷尖二釐。青黛五釐。冰片四釐。共研末。以手指蘸搽口中腫處。三四次即愈。此方功效如神。

十二 醫治馬牙立愈方

小兒初生。忽患撮口不飲。名曰馬牙。不治則百無一生。便看兒齒齦上有小泡子。如粟米狀。急以針挑出血。用墨磨薄荷汁。斷母髮少許。裹手指搽擦自愈。

又方 白蠶蠶二枚。爲末。蜜和。敷兒口內。如無。

原蠶蛾二枚。炙黃代之亦可。

又方 生甘草一分。細剉。水一盞。煎至六分。去渣。放溫。分數次灌兒口中。令吐出痰涎穢物。後取豬乳汁點兒口中。即愈。

十三 醫治遊風立愈方

遊風。身有赤斑。蔓延紅腫也。用生葦豆五錢。大黃二錢。為末。蜜調塗。自愈。

**十四** 醫治流水立愈方

小兒初生。遍身如魚脰。又如水晶。破則流水。以蜜陀僧生研。撒之。再服蘇合香丸。自愈。

**十五** 醫治吐乳立愈方

小兒初生。吐乳不止者。用蘆條少許。同人乳二合。鹽二粟許。煎沸。入牛黃粟許。與服。自止。

又方。石燕子末。以蜜調少許。塗兒唇上。日三五次。自效。

又方。蚯蚓屎為末。每服五分。空心米湯送下。即止。

**十六** 醫治乳癖立愈方

乳癖。乳停不化。膈下硬如有物也。用白芥子研末。水調攤膏貼之。再用麥芽煎濃汁服。極效。

**十七** 醫治初生便閉立愈方

小兒初生。小便不通。將葱白搗爛。加麝香三釐。搽敷臍上。即通。

又方。生葱汁和乳灌下。即解。切忌蜂蜜。

又方。小兒初生。大便不通。此症一名鎖肚。由胎熱毒結於肛門所致。故凡兒生之後。大便閉而不通。三日者。宜急令婦人以溫水漱口。啞兒前後心。手足心并臍七處。四五次。另以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時與服。自通。

又方。小兒初生。大小便閉。用麻油一兩。入芒硝少許。煎滾冷定。徐徐滴入口中。嚥下。即通。

**十八** 醫治初生脫肛立愈方

小兒初生。脫肛。用百草霜。冰片。雄黃。各等分。加灶心土（即灶內之泥）為末。蘇油調搽。即愈。

**驚風**

**一** 醫治胎驚立愈方

胎驚。病之受自母腹者。狀如急驚風。惟面現青白。

色用緊小乾蠟四十九枚。每一蠟以四葉薄荷包合。棉線繫之火炙焦。去線研末。每服三豆許。金銀湯下。三歲者用六豆許。以此遞加。若以硃砂麝香少許調服更佳。並治痢。

### 二 醫治驚風立愈方

小兒驚風。用甘草二分。硃砂一分。生大黃三分。共為細末。加黑砂糖一錢五分。將開水調和。徐徐灌下。立即安善。

又方 母丁香。葱頭蓬頭（即艾）三味。各七個。打勻。納入臍中。以布袂裹之。立效。

又方 葱薑同搗爛。搽額上及脈息等處。亦效。

又方 鮮車前草根。鮮野菊花根。各二錢五分。清水兩碗。濃煎至半碗。灌服二三次。即愈。惟須忌風。

### 三 預防驚風神效方

初生小兒。至三朝。用鷄蛋按在手心。向小兒背上。及臀部左右。揉擦至啼哭為止。少頃。視揉擦處。似

平生毛。用鉗揭去。或日久自脫。如初次不生。至七八朝再揉之。諸邪自退。永免驚風。

### 四 醫治急驚風立愈方

小兒急驚。若搐搦身仰之時。不可用力緊抱。但以手扶。聽其自抽自止。庶不傷筋絡。而成廢人。先用通關散吹鼻取嚏。次以竹瀝或梨汁。或石菖蒲汁。皆可灌之。大降痰消。則病自愈。

又方 遠年白田螺殼燒灰。入麝香少許。水調灌之。亦愈。

### 五 醫治慢驚風立愈方

小兒慢驚。此由吐瀉之後。脾胃虛弱所致。故神氣憊懣不振。手足微搐無力。糞色青白。面色痿黃。急宜用喂薑紅棗各等分。煎湯頻服。

又方 用平正附子。去皮臍。生研為末。以白頸蚯蚓於末內滾之。候定。刮蚓上附末為丸。黃米大。每服十九丸。米飲下。自效。

六 醫治急慢驚風立愈方

小兒急驚慢風。弔眼撮口。搐搦不定者。是用代赭石。火燒醋淬十次。細研水飛。日乾。每服一錢。或半錢。煎真金湯調下。連進三服。候兒脚脛上有赤斑。即是驚氣已出。病自愈也。無斑點者不可治。

又方。有子小丁香七粒。葱頭七個。共搗爛。敷臍內。上貼膏藥。周時洩下氣。即愈。

又方。青菜洗淨。及老生薑打汁。各半酒杯。溫服即愈。

又方。紫花田內白花。連根打汁。服下。如牙關已閉。撬開灌之。或煎飲亦可。

又方。大田螺置於臍上。能伸首外出。吸去風驚。迨螺斃則病愈矣。

又方。孩兒肚上。以手巾蓋之。將真白毛鷄一隻。令人捧住立肚上。少刻。其鷄自能撲翅蹲伏肚上。數小時。鷄自走下。小兒可保無恙。惟鷄吸驚毒後。

快灌香油以解之。不然。鷄必立斃。

又方。燕殼一個。研末。廣黃一分。一同吹入小兒口內。後以天竺黃一錢。煎湯送下。即愈。

又方。用五月午時取之白頸蚯蚓。不拘多少。去泥焙乾。研為細末。加辰砂等分。糯米糊丸。如菉豆大。金箔為衣。每服一丸。白滾湯送下。

三 疳積

一 醫治小兒疳積立愈方

疳積。俗名疳膨。食積。取活蟬螂。愈多愈好。置油鍋內焙燥。外塗麵糖。再炒燥。日日食之。凡是疳積病者。無不喜食此物。俟有厭棄之象。其病已愈。誠良方也。

又方。白丑五錢。黑丑五錢。檳榔三錢。木香三錢。使君子五錢。苦練樹根白皮一兩。生大黃五錢。共為細末。每服一錢。砂糖湯下。即愈。

又方。小兒疳積腹大。立秋後取大蝦蟆。去頭足。

腸以青油塗之。陰陽瓦炙。熟食之。穢積自下。連服五六枚。一月之後。形容頓改。

又方 葱白（每個約寸多長）苦杏仁生黃梔子紅棗各七個。皮硝三錢。真頭道酒糟一兩。白灰麵三錢。以上七味。用石槽搗爛成泥。五寸寬白布兩塊。攤膏藥兩張。前貼肚臍。後貼背上。要對正肚臍之處。用布捆好。貼三日。肉見青色即好。如未見再換一次。無不愈矣。

又方 小兒胸痞腹脹疳積。用葱汁生薑汁生大黃汁石榴樹根皮汁四汁。每日服半杯。連服七日。自能飲食漸增。脹消痞解。真良方也。

又方 小兒傷食。臍脹疳積。臨睡時。將鹽硝二三兩。用紙包好。放入布袋。縛於兒臍上。自能退脹化積。

又方 雄黃三錢。青黛三錢。寒水石七錢。加白鷄肺三個。打爛和藥。每服三錢。日三服。立效。

## 二 醫治小兒食積立愈方

小兒食積。用五穀蟲研末。入甘草末少許。米糊丸。梧子大。每十九。米飲下。或調服亦可。

又方 小兒食積黃腫。用皂礬四兩。加小麥麵調和作餅。每日空心服。立效。

又方 小兒食積血痞。用木賊草。研末四分。空心開水送下。數服即消。外用葱白打爛塗布上。貼患處。以熨斗熨之。亦消。

## 三 醫治小兒蟲積立愈方

蟲積。腹痛時作時止也。患此者之小兒。每月上旬。食其日。食生樞肉最妙。殺蟲而不傷元氣也。或用蠶蛹炒食。亦效。

又方 棟樹根煎服。其蟲立去。

又方 小兒蟲積肚痛。用葱汁菜油各半盞。調和服下。蟲化為水。痛除病愈。

## 四 醫治小兒痞塊立愈方

小兒痞塊。用使君子仁三錢。木鼈仁五錢。爲末。水丸。龍眼大。每一丸。用鷄子一個。破頂入藥。在內蒸熟。空心食之。其痞卽解。

又方。小兒痞塊。面黃肌瘦。用白芙蓉花。陰乾研末。加鷄肝飯上蒸熟食之。卽愈。

五 醫治小兒牙疳立愈方

小兒牙疳。取屋上猫屎乾。白色者。研末。計一兩。加冰片麝香各二分。吹入患處。卽愈。

又方。茄子蒂頭晒乾。瓦上炙焦。入冰片少許。研末。貯於磁瓶中。愈陳愈妙。用時調敷。立效。

又方。五倍子一個（不破者）於頂上開一孔。去其蘗。以蘆薈研細。填滿。更入生蟾酥少許。以厚紙麵糊封好。文武火煨成性。放泥地去火氣。以雄黃麝香少許。共研細末。每用少許。搽之。神效。

六 醫治小兒走馬牙疳立愈方

走馬牙疳。用鯽魚一尾。去腸。入砒一分。生地黃一

兩。紙包。燒成性。入枯白礬麝香少許。爲末。搽之。極效。

又方。五倍子青黛枯礬黃蘗等分。爲末。先以鹽湯漱淨。搽之。卽愈。

又方。黃蘗青黛各一錢。冰片一分。研細擦之。亦效。

又方。紅棗一枚。去核。加白信一釐。火上煉紅。無烟。研末吹之。卽愈。

又方。紫口蛤蜊殼三錢。煨灰成性。礬砂一錢。兒茶一錢。人中白一錢。冰片二錢。共研細末。蜜貯。勿令洩氣。雖極重者。搽之。立效。

七 醫治雪口疳立愈方

小兒雪口疳。用礬砂一二錢。炭火煨熟。研末。桑葉汁調和。搽口中數次。卽愈。

又方。桑樹皮內。刮取白汁。搽之。亦愈。

八 醫治口內生疳立愈方

小兒口內生疳。用棗子一兩。雄黃五錢。新瓦上炙灰存性。研極細末。吹入患處。即愈。  
又方。石榴皮青菓核炙灰。西黃冰片共研末。搽之亦愈。

#### 九 醫治滿口爛疳立愈方

小兒滿口爛疳。用天竺葉煎水洗淨。再打汁抹之。出血不妨。頗能收效。

#### 十 醫治小兒疳瘡立愈方

小兒疳瘡。身面爛成孔白者。嚼芝蔴敷。極效。  
又方。鉛粉研末。豬油調搽。亦效。

### ▲四 痧痘

#### 一 預防小兒痧痘神效方

預防小兒痧痘。將未放之綠萼梅蕊探藏。逢四時八節。節前一日。用鷄蛋一箇。打孔入蕊。紙糊好。飯上蒸熟。吃數次。永不出痘。即出亦不過數粒而已。  
又方。用雄黃和蘇油塗鼻孔。甚效。

又方。老絲瓜近蒂者三寸。連皮煨存性。研沙糖湯調服。即出亦稀。

又方。橄欖三斤。連核焙乾。研細。每日拌粥食之。甚效。

又方。每遇痘疫流行。恐其舉發。用生麻油涼開水各半。柳枝攪稠如蜜。服三蜆殼。但使大便快利。毒自去矣。

#### 二 醫治小兒痧痘立愈方

小兒痧痘。七月內。取野茄窠梗葉連根。吹乾備用。能治發痧子。出天花。發斑。傷寒。及一切內炎。不透。即將此乾炙灰研末。吞服。功勝紅棗幾倍。

又方。銀花（金者不用）一兩。陰乾。鍋巴一升。共研末。用洋白糖做成糕餅。或開水調和。令小兒食之。

#### 三 醫治痘出不快立愈方

痘出不快。用葦菜根煎湯服。立效。

又方 蘆薈子生研。米飯服二錢。亦效。

又方 貫衆赤芍藥各一錢。升麻甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服即出。

四 醫治痘出作癢立愈方

痘出作癢。房中燒茶葉薰之。立效。

又方 蟬蛻三七枚。甘炙草一錢。水煎服。亦效。

五 醫治痘出目中立愈方

小兒痘出目。中用新象牙磨水滴入眼中。其痘自退。

又方 蠅蚰蟲。放眼皮上。周圍走動。吐出涎水。其痘自散。屢試如神。

又方 鯉魚膽點之。即愈。或鱧魚膽亦可。

又方 白鷄冠血。每日點二三次。亦愈。

六 預防痘入目中神效方

凡痘初起時。將獨女胭脂揩眼眶。則痘不入目。一見痘時。用牛蒡子不拘多少。其母嚼碎。貼兒額門。

其效如神。

七 醫治痘入目中立愈方

痘入目中。取豬血點之。即不生翳。或以鱧魚尾血點之。即移開。頗驗。

又方 浮萍乾陰為末。以羊肝半個。同水半盞。煮熱。搗爛絞汁。調末服。甚效。

八 醫治痘出煩渴立愈方

痘出煩渴。用炙甘草。天花粉等分。水煎服。自愈。

九 醫治痘出狂亂立愈方

痘出狂亂。用滑石水。飛過六兩。粉甘草一兩。為末。硃砂二錢。冰片三分。麝香一分。蜜少許。每服三錢。燈草湯下。二三服。即愈。

十 醫治痘瘡稠蜜立愈方

痘瘡稠蜜。用生犀角水磨濃汁飲之。甚效。

十一 醫治痘瘡黑陷立愈方

痘瘡黑陷。用玳瑁生犀角同磨汁一合。入豬心血。

少許。紫草湯五匙。和勻溫服。即愈。

又方 箬葉灰一錢。麝香少許。酒調服。亦愈。

**十二** 醫治痘瘡潰爛立愈方

痘瘡潰爛。用蕎麥粉頻敷之。自效。

又方 枇杷葉煎湯洗。或黑大豆研末敷。均愈。

**十三** 醫治痘瘡生蛆立愈方

痘瘡生蛆。將嫩柳葉鋪席上臥之。蛆盡出。

**十四** 醫治痘瘡成疔立愈方

痘瘡成疔。用雄黃一錢。紫草三錢。爲末。胭脂汁調。

先以銀簪挑破。搽之。極效。

又方 甘蔗滓曬乾。真香油點燈燒成灰。以津液

調勻。銀簪挑破。點上。立效。

**十五** 醫治痘後生瘡立愈方

痘後生瘡。將生黃豆研末。麻油調搽。極效。

**十六** 醫治痘後目翳立愈方

小兒痘後。目生翳障。用黑大豆。菉豆。赤豆各三斤。

枸杞子。甘菊花。去蒂各八兩。俱洗淨。用甘泉水煎三次。去渣。重綿將汁濾清。瓷罐內慢火熬膏。收淨水氣。入煉白蜜四兩。攪勻。收瓷餅內。每服一匙。挑於口內。開水下。神效。

又方 白菊花。穀精。草蓂。荳皮等分。共爲末。每一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一碗。同煮。食柿日三服。半月愈。

**十七** 醫治痘毒入心立愈方

痘毒入心。始有白泡。忽搐入腹。作紫黑色。無膿。日夜叫亂者。用鬱金一枚。甘草二錢半。水半盞。煮乾。去甘草切片。焙研爲末。入真龍腦炒五分。每用一錢。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過二服。即愈。

**十八** 醫治痘後餘毒立愈方

小兒痘後餘毒。用蠶豆殼不拘多少。燒灰。蘇油調搽。即愈。

十九 醫治痘不起漿立愈方

凡痘不起漿。或漿起復收。急取癩蝦蟆一個。用手捉住。將蝦蟆頭對住小兒之口。用布將小兒眼遮住。以免蝦蟆吐漿入眼。離一寸許。約一頓飯久。放去。另換一個。仍向兒口對之。連換三次。其毒已被蝦蟆吸盡。即灌漿收功。此方神效之至。

又方 頂好熱燒酒。用袖帕蘸透。時時熨之。亦效。

二十 醫治痘不落痂立愈方

痘不落痂。用白砂糖湯點服。自效。

又方 用上等白蜜。不拘多少。水和。時時以鵝翎刷之。其痂易落。且無癢痕。

二十一 醫治痘後癢痕立愈方

痘後癢痕。用雞子一箇。酒醋浸七日。白蠶蠶二七枚。和勻塗之。甚效。

又方 黃明膠炒研末。溫酒調服一錢。痘已出者。服之無癢。未出者服之瀉下。

又方 蜜陀僧研細。入乳調。夜塗旦洗。自愈。

二十二 醫治痧疹不起立愈方

痧疹。一名麻疹。紅點發自膚間。而寒熱頭痛者。痧疹不起。用芝蔴五合。杵碎。沸水泡。乘熱薰頭面。即效。

二十三 醫治痧疹喉痛立愈方

小兒痧疹。咽喉腫痛。用苦參三錢。白蠶蠶二錢。研細吹入。即愈。

二十四 醫治痧疹咳嗽立愈方

痧後咳嗽。將枇杷葉煎濃汁。點白蜜少許。服之立效。

五 瘡瘍

一 醫治小兒頭瘡立愈方

小兒頭瘡。用益元散。加枯礬少許。麻油調敷。極效。又方 煮飯將沸。取鍋蓋上之米沫。擦之。尤為神速。

又方 小兒頭瘡。晝開出膿。夜即復合。用四寸長  
鯽魚一條。去腸大附子一枚。去皮研末。填入鯽魚  
腹中。炙焦。研敷。搗蒜封之。自愈。

### 二 醫治小兒面瘡立愈方

小兒面瘡。焮赤腫痛。用地榆八兩。水一斗。煎五升。  
溫洗之。神效。

又方 以大麥燒存性爲末。生油膩粉調塗。亦效。  
又方 面上生瘡出膿。以蛇蛻皮炙焦爲末。和猪  
脂敷上。即愈。

### 三 醫治小兒口瘡立愈方

小兒口瘡。取老黃瓜一根。於端五日午時。將瓜開  
口。裝入冰片稍久。瓜外有霜（即黃瓜霜）以霜  
抹瘡。即愈。

又方 亂髮灰。胡絮灰。黃連。乾薑等分。爲散。以敷  
瘡上。不過三遍。即愈。

### 四 醫治小兒天泡瘡立愈方

小兒天泡瘡。覓韭菜根邊蚯蚓泥。以天雨水調敷。  
即愈。

### 五 醫治小兒黃水瘡立愈方

小兒黃水瘡。用旋覆花。燒灰存性。香油調敷。即愈。  
又方 風菱殼。燒灰爲末。塗二三日。即愈。菱殼愈  
陳愈佳。

### 六 醫治小兒火灼瘡立愈方

小兒火灼瘡。一名火爛瘡。用吳茱萸煎酒拭之。自  
效。

### 七 醫治小兒生癩立愈方

小兒頭上生癩。用鹽西瓜皮。炙灰研末。麻油調敷。  
患處。即能結痂而愈。

### 八 醫治小兒丹毒立愈方

小兒丹毒。用猪油切片貼之。極效。  
又方 綠豆五錢。大黃二錢。爲末。用生薄荷汁入  
蜜調塗。亦效。

又方 伏龍肝爲末。以雞子白和敷。乾則易之。自愈。

九 醫治小兒軟癩立愈方

小兒軟癩。將油麻炒焦。乘熱嚼爛敷之。即愈。

又方 桑螵蛸燒存性。研末。油調敷。亦愈。

十 預防小兒瘡癩神效方

凡小兒每年六月六日。照年歲吞皂莢子若干。可免瘡癩之患。

▲六 幼科雜治

一 醫治小兒顛陷立愈方

小兒顛陷。用生烏頭附子。去皮臍。各二錢。雄黃八分。爲末。葱白搗汁。和貼陷處。即效。

又方 水調半夏末。塗足心。亦效。

二 醫治小兒顛腫立愈方

小兒顛腫。用黃蘗末。水調貼兩足心。即效。

三 醫治小兒顛軟立愈方

小兒顛軟。用青黛。冷水調敷。即效。

四 醫治小兒解顛立愈方

小兒解顛。顛門不合也。將天南星炮去皮。爲末。醋調紅。綢上貼顛門。炙手頻熨之。極效。

又方 防風。柏子仁。白芨。各一兩。爲末。乳和敷。二十餘日。即愈。

又方 生蟹足白。歛各半兩。搗末。乳汁和敷。亦效。

五 醫治小兒髮遲立效方

小兒髮遲。以陳香薷煎濃膏。和豬脂頻塗。極效。

六 醫治小兒髮禿立效方

小兒髮禿。以桃柳煎湯。入豬肝汁。和抹頭髮。自生。

又方 飩氣水。最長毛髮。以器於炊飯時。丞取沐頭。其髮自長密黑潤。

七 醫治小兒口噤立效方

小兒口噤。體熱。以青竹茹三兩。醋一椀。煎取三分之一。分數服。自效。

又方 小兒口噤。牙關不開。將天南星一個煨熟。急用紙封固。不令透氣。即以紙裏近上尖處剪一竅。令熱氣出。對小兒鼻孔中熏之。牙關立開。

又方 小兒口噤。面青赤者。用雞矢白如棗大。綿裹以水一合。煮分二服。一方酒研服之。立效。

又方 小兒口噤。病在喉中。如麻豆許。令兒吐沫。不能乳食。以葛蔓燒灰和乳汁點之。即瘥。

又方 小兒口噤。中風不能乳者。用雀屎水和為丸。麻子大。飲下二丸。即愈。或用雀矢四枚為末。著乳頭飲兒。亦效。

### 八 醫治小兒齒遲立效方

小兒齒遲。取路旁遺却稻粒。牙齦上點三七下。其齒自生。甚效。

### 九 醫治小兒唇緊立效方

小兒唇緊。以赤莧搗汁洗之。立效。

又方 葵根燒灰。用酥調塗之。即愈。

### 十 醫治小兒赤目立愈方

小兒赤目。將胡黃連研末。茶調塗手足心。即愈。

又方 生南星生大黃等分。為末。用醋調塗兩足心。亦愈。

又方 蚯蚓泥搗塗額門。乾則再換。三次即愈。

又方 淡竹瀝點之。或入人乳亦可。

又方 兒生艱難。血瘀眊睡。致睛不見瞳人。輕則外泡赤腫。上下弦爛。用杏仁二枚。去皮尖嚼爛。和乳汁三五匙。入輕粉少許。蒸熟。絹包頻點。重者加黃連朴硝。尤佳。

### 十一 醫治小兒痰厥立愈方

小兒痰厥。以明礬洗腹部及足。洗後用明礬灰。麥麵各半。醋調燉熱。敷兩足心。用紙包好。乾則再換。痰由大便解出。即愈。

又方 生半夏末。用水和成小餅。敷於兩足心。用布紮住。越一周時。取下。痰即從大便引出。

十二 醫治小兒咳嗽立愈方

小兒咳嗽。連咳數十聲。甚至出血。此名驚驚。須向大藥店買驚驚涎丸。服一二丸。立效。又方 豬小腸。蜜棗煨食。三四次。即愈。

十三 醫治小兒嘔吐立愈方

小兒嘔吐不定。用五倍子兩個。一生一熟。甘草一握。濕紙煨過。同研為末。每服半錢。米泔調下。立瘥。又方 鹿角粉。大豆末。等分。和乳調塗乳上。飲之。自愈。

十四 醫治小兒泄瀉立愈方

小兒泄瀉。用木鼈子一個。煨熟去殼。小丁香三粒。共為末。米飲為丸。入小兒臍中。以舊膏藥封之。自愈。

又方 製白朮陳皮川厚朴薑汁炒各三分。煎服

自效。

又方 薺菜一把。老薑一片。紅棗七個。煎湯入紅

糖。灌服即愈。

又方 小兒久瀉。腹大脚細。胃口不醒。用砂仁五粒。檳榔二錢。五穀蟲三錢。使君子三粒。紅棗五枚。另用大癩蛤蠟一隻。活破其肚。即將以上五味藥。物藏入腹內。惟肝腸等均勿取出。即用線縫好。其腹再用黃泥。椿極細。以燒酒練好。將癩蛤蠟糊如皮蛋樣。四邊勿可露出。在白炭風爐中。煨至黃泥色赤紅就好。即去黃泥。將癩蛤蠟研細末。篩過。攤地上。出盡火氣。或沙糖拌食。或做糕吃。吃完一隻。即愈。

十五 醫治啼哭不止立效方

小兒啼哭不止。以乳汁與燈草灰。調和塗頭上。令小兒吮之。立效。

十六 醫治大小便閉立愈方

小兒大小便閉。將白礬研細末。令病兒仰臥。以藥填滿肚臍眼上。用溫開水滴入。片時自通。

## 第五章 花柳科醫治法

### ▲一 淋濁

#### 一 醫治淋濁立愈方

小便不利者曰淋。利而小便前有膿者曰濁。白曰白濁。赤曰赤濁。其管痛則一也。用天芥菜搗汁一杯。加蜂蜜一匙。調服。小便漸爽。數日能愈。

又方 白果燉熟。連湯食之。日常代點心。半月必愈。

又方 葵花根。置煎數沸。（不可久煮）服之亦效。

又方 六一散（藥店內有）豆腐漿沖服亦效。

#### 二 醫治勞淋立愈方

勞淋。小便不出。小腹急痛。尿出白汁。一點一滴者。是用牛膝一兩。乳香一錢。酒煮溫服。諸藥不效。痛

不可忍。服此數劑。其效如神。血淋更效。如有遺夢失精之症。則不可服。

又方 胡桃連殼。黃泥包裹。用火燒黃泥至黑色。取淨肉。有油者不用。研末。早夜用鹽開水空心送下。三錢。三日即愈。

#### 三 醫治氣淋立愈方

氣淋。小腹急滿。小便欲解不出。解後常有點滴者。是治法與勞淋同。或用甘蔗上青草梢一兩。酒煮服亦愈。

#### 四 醫治血淋立愈方

血淋。小便內有血點。或血條者是。以尖檳榔煎濃汁。加白蜂蜜沖服。神效。

又方 髮灰二錢。藕汁調飲。數次即愈。

又方 白荷花煎飲即愈。

又方 用棕箬三大張。煨灰。研細篩過。地上窖去火氣。另用小粉五錢。研碎。以停湯滾水沖之。不可

成糊。將棕箬灰送下。連服七天。即止。

五 醫治熱淋立愈方

熱淋。小便熱而赤。短而澀。臍下急痛者。是用滑石六錢。甘草末一錢。水沖服。日服數次。三日即愈。  
又方。白茅根四斤。以水一斗五升。煮取五升。每服一升。日三服。夜二服。即愈。

六 醫治石淋立愈方

石淋。又名沙淋。小腹急脹。莖內痛如刀割。苦楚萬狀。尿如沙石者。是瓦松煎濃湯。乘熱薰洗小腹。約以兩時即通。

又方。牛角燒灰。酒服二錢。日服五次。奇效。

又方。銀硝入鍋內。隔紙炒。至紙焦為度。研細。用溫水沖化。每服二錢。再加滑石二錢。水調服。神效無比。

七 醫治五淋立愈方

五淋通治。將好銀硝研細。每服二錢。勞淋用葵花

子煎湯調化服。血淋熱淋冷水調化服。氣淋用木通煎水調化服。石淋調溫水服。

又方。血珀三兩。分七次。陳酒沖服。即愈。

八 醫治淋痛立愈方

淋痛。用海金沙。泡水飲之。久服極效。  
又方。瞿麥三兩。滑石二兩。生甘草梢二兩。煎服即愈。

九 醫治紅白淋立愈方

紅白淋。用蓼花根。濃煎飲之。即愈。

十 醫治赤白濁立愈方

赤白濁。用生半夏三錢。和雞蛋白為丸。服完即愈。  
又方。雞蛋一個。頂上敲損一孔。入生大黃末三分。在內。紙糊煮熟。空心服四五朝。即愈。

又方。石菖蒲。草薢。益智仁。烏藥。各一兩。水煎。不拘分服。自效。

十一 醫治赤濁立愈方

赤濁。用兔絲子。麥門冬。等分。爲末。蜜丸。梧子大。鹽湯下。每服七十九。神效。

又方。乾紅蓮子。連心衣。六兩。炙甘草一兩。共研末。每服一錢。燈心湯下。

### 十二 醫治白濁立愈方

白濁。用豬脊筋。青魚膽。搗爛。爲丸。如梧子大。每服四五粒。數次即愈。

又方。芡實。去殼研末。以棠梨煎湯送服。甚效。

又方。用乾冬瓜子。炒研末。每服五錢。米飲下。亦效。

又方。用鹽炒貝鱗一兩。煎服。則小便大通。再買琥珀一元。作三四次。空心吞下。其毒均由小便而出。誠治濁之良藥也。

又方。野芝。蘇炒黑。研末。以陳酒沖服。奇驗。

又方。生蘿蔔。剝空。留蓋。入吳茱萸。填滿。蓋定。籤住。糯米飯上蒸熟。取去茱萸。以蘿蔔焙研末。糊丸。

桐子大。每服五十九。鹽湯下。日三服。自愈。

又方。清明所插簷之柳條。煎服。治白濁極效。

### ▲一 梅毒

#### 一 醫治楊梅毒立愈方

楊梅結毒。用珍珠二分。西牛黃一錢。土茯苓一片。煎湯服之。即愈。（西牛黃用布包好。入煎珍珠研末。調和藥汁內。）

又方。水調黃土一升。澄清取水。蚯蚓糞二兩。生大黃一兩。生甘草五錢。萱草根五錢。水煎湯。連前黃土水。兌服。食後便瀉。隔一日再服。如此數劑。三星期。其毒自消。不生後患。

又方。牛角一對。羊角二對。用粗草紙包好。復將童便浸透。以炭火炙之。後去紙灰研末。以穿山甲一兩。少焙。研細末。攪入。每天服三錢。最好陳酒送下。極效。

又方。紹興酒及小磨麻油二味。每日清晨隔湯。

燉熱。飲時須要調和。蓋酒在下。油在上。麻油十分。酒七分。如餘毒未消者。再用荷葉濃煎作茶飲。連服七日即愈。

又方 用黑豆生甘草節煎湯。先薰後洗。更以鯉魚膽汁搽之。極效。

又方 楊梅瘡最毒。治不得法。多致纏綿不救。且最忌服輕粉。服則毒留筋骨。難以斷根。抑且不能生子。如已誤服。雖易收功。其毒竄入經絡。或口齒腫爛。或筋骨疼痛。攣縮久而潰爛。經年累月。甚至終身不愈。致成殘廢。解救之法。當用土茯苓一兩。苡米銀花防風木通白蘚皮各一錢。木瓜錢半。皂角子四分。氣虛加頂上黨參一錢。血虛加當歸七分。煎服。日服三次。忌食茶。並牛羊鷄鵝魚肉燒酒。麵食辣椒及一切發物。謹戒房事半年。服至十日。其毒即解。

## 二 醫治梅毒初起立愈方

初起時。用木瓜一枚。煨灰存性。研末。蜜和為丸。每日二次。用開水送服一錢。再用土茯苓一二斤。浸童便中。越宿取出曬乾。每日用四兩煎水代茶飲。之日以為常。不久毒盡。

又方 羊角核桃殼俱燒存性。研細末。每用錢半。好酒調。早晚各一服。四日毒從大便出。如血如膿。漸減作每日一服。半月毒盡。後再服熟地白芍當歸人參白朮白茯苓炙甘草以補之。虛則多服數劑。

## 三 醫治梅毒斷根神效方

欲梅毒斷根。宜用金銀花皂角刺蟬退僵蠶各七錢。杏仁去皮與尖七粒。土茯苓一斤。水若干。煎存一半。限一日當茶服盡之。戒茶。避風靜居。越一二日再服一劑。七劑全愈。永不再發。

## 四 預防梅毒傳染神效方

凡生楊梅瘡。在傍伺候親近之人。難免傳染。宜用

雄黃川椒去子各五錢。研末。杏仁百粒。蒸熟。去皮。尖炒。研末。燒酒打麵糊爲丸。梧桐子大。每服十五丸。開水下。於病人初發時服。即可免也。

### ▲三 便毒 附下疳

#### 一 醫治便毒立愈方

便毒。用隔年陳水仙花兜。和口津。在粗石上磨成濃汁。用杯盛貯。搽於患處。未潰者搽之。即散。已潰者搽之。膿即提出。俟膿盡。再用野菊花。煮水洗淨患處。然後向藥店購九乙丹。搽上收口。至爲神效。又方。棉地榆四兩。穿山甲二片。土炒白酒三碗。煎一碗。空心服。雖有膿者亦愈。

#### 二 醫治橫痃立愈方

橫痃。生小腹兩傍。大腿縫中。形如腰子。皮色不變。按之堅硬而微痛者是也。每日用皂角刺六錢。研末。布袋裝好。同糯米二合。煮粥。時時服之。三四日全消。忌開刀。開則惟出白漿。三百日內必死。

又方。五倍子新瓦上焙乾。研末。好陳醋調勻。攤布貼之。布上如紙一層。過夜即消。潰爛久不收口。貼之亦效。

又方。鮮生山藥五錢。活鯽魚一尾。搗爛敷之。自愈。

又方。鮮瓦松。搗爛。加冰片。鷄蛋白。調塗亦愈。

又方。胡桃二個。連殼杵碎。澤蘭。白芨。松蘿。茶各三錢。井水河水各一碗。煎取四分。和酒服。連服五劑。即愈。

#### 三 醫治魚口立愈方

魚口毒。用芙蓉花葉。連根搗爛。加白礬少許。調敷患處。毒即退散。

又方。雄黃乳香各二兩。黃蘗一兩。爲細末。用新汲水調敷。腫處自消。

又方。無論患者已否潰爛。均堪救治。用夏枯草五錢。蒼耳子三錢。煎水常洗。另用生荔枝中仁。青

菓核中仁桃仁各三錢。共搗爛。醋浸一宿。搽之。然後用黃柏燒灰。同松花粉撲之。如是貼三四劑。即愈矣。

#### 四 醫治下疳立愈方

下疳。用白鵝一隻。以白米養三四日後。取鵝糞。置新瓦上焙乾為末。每糞一錢。和丹砂冰片各一分。研極細。另用米泔水洗淨患處。將藥敷上。二三次。即有效驗。如瘡乾者。可用雄豬膽潤之。

又方。先用甘草銀花葱頭煎湯洗淨。再用生橄欖核一個。燒存性。頂上梅花冰片一分。共為細末。麻油調塗。雖臭爛。不堪敷之。即愈。

又方。蘆甘石一兩。火煨醋淬。再煨再淬。五次。兒茶三錢。共研末。香油調敷。立愈。

又方。陰頭生瘡。人不能治者。用鼈甲一枚。燒研。鷄子白和敷。效如神。

### 第六章 急救科醫治法

#### ▲一 橫死

##### 一 急救吊死立效方

吊死者。不可割斷繩索。急以衣裹手。緊抵糞門。若係婦女。則連前陰抵住。緩緩抱住。解下。安穩放倒。一人踏其兩肩。以手緊提其髮。不可使頭垂下。一人微微推摩喉嚨。一人按擦心胸。又輕輕摩其肚腹。一人摩擦手足。緩緩彎動。若已硬直。但漸漸強彎。屈之。又用腳裹衣緊抵糞門前陰。不使洩氣。以兩人用竹管吹其兩耳。不可住口。或用鷄冠血滴鼻中。男左女右。男用雄鷄。女用雌鷄。如此一飯之久。即有氣從口出。不可鬆手。少頃。以淡薑湯或清粥與食。令潤咽喉。漸漸能動。乃止。凡吊死。從早至晚。雖已冷。可活。自夜至早。稍覺難救。總之。身體稍軟。心下微溫者。雖一日以上。若依此救法。多吹多摸。無不活者。勿謂已冷。忽略不救。

又方。照前法救治。再將其兩手大拇指排平正。

以小帶縛定。從兩指縫中。離指甲角一分半之處。名鬼哭穴。用艾火燒三七次。並燒兩脚心。三次。即活。凡無故中邪或吊死者。以多燒鬼哭穴爲要。又方。炒熱生鹽二大包。從頸喉熨之。臍下冷則隨換。不可住手。其痰盡下。並用人對口。以氣灌之。效驗如神。

## 二 急救溺死立愈方

溺水死者。撈起時。急急將口撬開。橫啣筷子一根。使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏取汁。或末吹其鼻孔。又用皂角末置管中。吹其穀道。如係夏月。將溺人肚腹橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩而行。腹中之水。自然從口中並大小便流出。再用生薑湯調蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。並用生薑擦牙。若無牛。用一人覆臥躬腰。令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上。令活人微微搖動。水亦可出。如係冬月。即將濕衣更換。一面炒鹽用布

包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。臍下墊以棉枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰眯於眼內。其撬口啣筷灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻。穀道等事。俱照夏天法。冬天甦醒後。宜少飲湯酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蒼蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明驗也。又方。初救起時。尚有微氣。或胸前尚煖。速令生人脫貼身熱衣。爲之更換。抱負身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流。若水往外流。即有生機。一面用粗紙燒燃。取烟薰其鼻竅。稍薰片時。即用皂角研細末。吹入鼻竅。但得微有噴嚏。即可得生。又方。先打壁泥一堆。置地上。以溺人仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喻入泥間。其人即甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。又方。陳醋灌鼻中。綿裹石灰粉。納糞門陰戶內。

水即流出。再以人口灌氣。即活。

### 三 急救凍死立愈方

冬寒凍死之人。雖人事不知。但胸前覺有微溫。皆可施救。倘或微笑。則急掩其口。如不掩。則笑而不止。中氣外散。不可救治矣。且不可近火。因見火必大笑而死。救法。先用生半夏末。吹入鼻內。再用灰炒熱布包熨心腹上。冷則更換。更以熱水盆置臥具之四面。俟稍能活動。用溫酒徐徐潤其口。再用生薑汁和陳皮煎服。極效。落水凍死者。救起時。急須脫其溼衣。換他人貼身暖衣包之。餘與冬寒凍死治法同。

### 四 急救跌死立效方

又方。用氈或草荐捲之。繩索繫定。放在平穩處。令二人相對推踏。滾轉往來。如扞氈法。候四肢溫即活。

末約豆大。吹兩鼻中。以生薑汁灌之。只要心頭微溫。雖至一日亦活。再用白糖調水與服。散其瘀血。或加童便灌之。

### 五 急救壓死立效方

凡壓傷之人口耳出血。昏暈不醒。只要身體尚軟。皆可救活。切忌人多嘈雜。先呼而扶之。就坐於地。緊為抱定。曲其手足。如和尚打坐樣。隨以熱童便灌之。馬尿更妙。或用白糖沖熱酒灌之。用水調灌亦可。但能強灌得一二杯。下喉便好。然後輕移於懷中。抱入室內。如前坐法。更以足緊抵糞門。若係婦女。連陰戶一並頂住。恐其氣從下洩。以致不救。並將窗櫺遮住。以房中黑暗為佳。傷重者。瘀血必多。煎服當歸湯。白糖飲。藥最簡便。易得。急切不可令出大便。恐其氣脫而死。必俟其腹中動而有聲。上下往來數遍。急不能待。方可使解。所下盡是紫血。毒已解下。方可令睡。倘瘀血未盡。當歸湯。白糖

飲尤宜多服。

六 急救打死立效方

打死之人將松節槌碎一二升入鐵鍋內炒起青烟爲度以老黃酒二三升四圍沖入瀉淨候半熟搗開牙關灌入即活。

七 急救驚嚇死立效方

驚嚇死者用醇酒一二杯（或紹興陳酒亦可）溫熱灌之自活。

又方 用生半夏末吹入鼻中亦效。

八 急救睡魔死立效方

凡因睡魔死者不得近前急喚但痛咬其脚根頻呼其名以口水唾其面再灌薑湯必甦。

又方 原有燈即存無燈不可用燈照急用生半夏末吹入鼻中再用鷄冠血搽面上乾則再搽即醒。

九 急救自刎死立效方

自刎者割頸斷喉急宜早救遲則額冷氣絕乘初勿時輕輕扶住將頭抬起合攏刀口將血拭去用大雄鷄一只快手去其毛生剝鷄皮乘熱貼上刀口可無妨害。

十 急救中瘴氣立效方

天地不時之氣隨在可謂瘴癘不必雲貴兩廣始能爲害也其避瘴之法每日飲酒少許或吞川椒五六粒如已中瘴氣覺手足重滯腕痛不快者用生熟大蒜各七片共食之少頃得吐血或大便即愈。

又方 用磁片有鋒者刺頭額及上唇或刺兩手膊出血即解血紅而多者輕血黑而少者重遲則血凝無救矣。

十一 急救中邪立效方

中邪死者用韭菜心男左女右刺入鼻內六七寸令目開血出即活或搗韭菜汁灌鼻中更視上唇

內如有粟米粒者。以針挑破。或皂角末。或生半夏末吹入鼻中。或燒灰一爐。以醋潑炭上。使患者聞氣即活。

### 十二 急救觸電立效方

觸電者。如手足一部份致麻木不能活動。急取黃土泥與水調和。將觸電之手或足伸入泥內。設電已通行全體。不省人事。急取沙土泥鋪地。用水灑之。使溼。令觸電者臥其上。再將溼沙土鋪身上。自然蘇醒。

### ▲二 服毒

#### 一 急救吞生鴉片立效方

凡吞生鴉片者。雖四肢已冷。而身體必軟。無不可救。身體柔軟。則臟腑筋絡之氣。尚在流通。實未死也。乃鴉片性烈。醉迷之故耳。勿以體冷而忽略也。其法急用生鴨血多多灌之。最為神效。如牙齒緊閉。用筷子撬開。或用烏梅擦之。亦開。若用銅鐵等

物。反不能開矣。救時不可見日光。一見日照。即不可救。三四日後。鴉片之氣散盡。即生。如身體不硬。即七日之內。亦可回生。切不可以為無救。遽行棺殮。此法曾救多人。無論服毒輕重。雖手足青黑。照此救法。無不生也。切忌灌服醬油。恐受鹽滷之毒。反致誤事。若服藥亂投。亦不能救。慎之慎之。愈後多服白糖水及生棗豆粉。沖開水服。最效。

又方。用明雄二錢。鷄蛋清兩個。生桐油一兩。若和燒酒吞下者。如葛花三錢。炒黃為末。各味均用河水調和。服下即吐。如未和燒酒吞食者。不用葛花。或所吐之烟未盡。或不肯速吐。可用硬鴨毛或硬鷄毛。蘸桐油掃咽喉。必令其烟毒吐盡。然後進以稀粥。如胃氣未安。食之又必作吐。再吐之後。即用生甘草五錢。食鹽五分。明白礬五分。金銀花五錢。土茯苓五錢。煎湯服之。以追餘毒。愈後即多食柿餅。以解桐油之毒。

又方 木棉花六錢。倉卒不可得。可於廣東香牛皮墊褥內取之。然總以預蓄爲妙。撕鬆用潔淨大瓦鉢。將鐵火鉗。叉開架於鉢口。置棉鉗上。火燒成灰。放在鉢內。加食鹽二錢。用木棍搗灰。並鹽成極細末。開水半碗。沖入鉢內。用手將鉢內四面之灰。洗入湯內。復用箸在鉢內調勻。連灰帶湯。全行服下。不吐再服之。以多爲妙。片刻之間。烟毒可吐出矣。間有不吐者。則從大便瀉出。烟毒亦自解去。神效。

又方 用洋肥皂。化水服之。大吐後。卽愈。

又方 用真南礪砂（黃色如膠者爲真）五錢。冷水調服。可以立解。屢試有效。

## 二 急救吞火柴頭立效方

凡吞紅頭火柴入腹。炎毒猝發。臟腑驟灼。其慘毒實過於鴉片。醫書中向無此項急救方法。近人始有發明。要以皮絲烟方爲最簡捷而有效。方用皮

絲烟四兩。先將清水一大鍋。燒至滾而不泡之時。將皮絲烟如下麵一般。攪入鍋內。約十分鐘。勿令過性。擦在夏布上。瀝出其湯。以冷水冰之。去其熱氣。俟溫和適口。卽將此湯灌入。扶其人行走。不使停住。卽能吐出毒燐。再灌再吐。至無紅頭顏色而止。此方百發百中。屢試屢驗。

又方 從速用生鷄蛋白。儘多傾入服毒人口。蛋白涼滑。揉膩火柴頭。經裏不能發展炎毒。再助以嘔吐之法。使之盡情傾吐。實可起死回生。

又方 膽礬末五釐。溶化於清水一茶杯中。每五分鐘服一次。連服四五次。必將火柴頭吐出。再用陳松節油二錢半。蛋黃一枚。溫水二兩半。加白糖兩調羹。調勻。每隔半時服一調羹。因膽礬之成分爲硫酸銅。與火柴頭之磷質相遇。卽擁護於磷之表面。使不易消化。此誠救吞服火柴頭者。最可恃之解毒法也。

三 急救吞金立效方

吞金。用葶藶搗汁飲之。即能消解。

又方。韭菜一把。滾水煮熟。不切斷。淡食之。少頃。即吐出。或從大便瀉出。

又方。巴豆去殼。西月石。礬紅。三味。共研末爲丸。每服七八粒。用開水送下。立效。

又方。羊脛骨。用炭炙灰。米湯送下。其羊脛骨灰。約以三錢爲度。服後。其物即從大便而出。（如吞銀。以此方治之。亦效。）

又方。雞蛋清二三枚。用新棉花撕極碎。攪入蛋清內。灌下。則金從大便而出。

四 急救吞金箔立效方

金箔吞下。或閉喉管。或閉肺管。遲即難救。急取羊血灌之。立效。

五 急救吞錘水立效方

吞錘水者。速服肥皂水最效。或用刀將壁上石灰。

刮下一二酒杯。沖水一大碗服之。亦能起死回生。

六 急救吞砒霜立效方

吞服砒霜者。用防風一斤煎膏。冷水調服。如牙關緊閉。須搗開灌下。愈多愈妙。惟服後須扶病人行走。令其作吐。如不吐。加服冷開水數大碗。即吐。吐後。再灌至毒盡爲止。如煎膏嫌緩。即用防風八兩煎服。亦效。毒重者。可加數倍用之。

又方。柏子殼三錢。紅土泥三錢。（紅泥可向顏料店內購之。）用研爲末。以雞蛋白調和。用水沖服。服後即作寒顫。則其毒自解。重者兩服。無不愈也。

又方。生桐油兩茶杯。灌下。令其大吐。亦效。

又方。先用食鹽兩調羹。防風末四錢。開水一大碗服下。使其嘔吐。及毒物大半吐出。乃用生鷄子清四五枚吞下。則鷄子清自與腹中餘剩之砒毒化合。腸胃即不能消化。再用吐藥或瀉藥。嘔出瀉。

出之。

七 急救香水銀立效方

吞服水銀欲死者。用真川椒數斤。炒熱鋪席下。令患者脫衣蓋被臥之。過一夜。水銀從毛孔中鑽入川椒內矣。

又方 用好茶葉二兩。嚼咽後。用紫貝母、天葵草等分煎服。即解。或以炭煎湯服之亦效。

八 急救蒙汗藥毒立效方

服蒙汗藥。速飲冷水。其毒即解。

又方 白茯苓五錢。生甘草二錢。陳皮五分。甜瓜蒂七個。水煎。俟冷服。大吐而愈。

九 急救斷腸草毒立效方

斷腸草有尖圓兩種。如服尖葉者。不過一二日。肉即消化。急用活羊血灌一二碗。即活。或服羊油二三兩亦妙。此草惟羊食之最肥。故飲羊血羊油即解。

十 急救水莽草毒立效方

中水莽草毒。用黑豆一升。煮濃汁。候冷透。飲之立解。或照解救斷腸草毒方治之。

十一 急救輕粉毒立效方

中輕粉毒者。用川椒去目。白湯煎服。自解。

又方 中輕粉毒。齒縫出血而臭腫者。速用貫衆、黃連各半兩煎水。入冰片少許。時時漱之。其毒即解。

又方 服輕粉口破者。以三年陳醬。化水頻漱。可保無恙。

十二 急救鉛粉毒立效方

中鉛粉毒者。用麻油調蜂蜜。自然解毒。

又方 蘿蔔搗汁飲。自效。

又方 面青腹腫者。生葶藶。亦效。

十三 急救硫磺毒立效方

中硫磺毒者。用生羊血熱飲一椀。立解。

又方 烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿水一大碗。煎七分呷之。亦效。

**十四 急救巴豆毒立效方**

中巴豆毒者。用大黃黃連煎湯冷服。即解。

又方 芭蕉葉搗自然汁服之。即效。

**十五 急救木髓毒立效方**

中木髓毒。身發抖戰者。急用上好肉桂二錢。煎服立解。

**十六 急救木瓜毒立效方**

中木瓜毒。舌大滿口者。用好醋調黃糖（紅糖亦可）含口中。吐出涎水。數次即解。

**十七 急救野菌毒立效方**

中野菌毒者。用綠豆生研。新汲水攪之。澄清服。即解。

又方 掘地穴深數尺。注水攪之。澄清。名地漿。取漿飲之。自效。

**十八 急救杏仁毒立效方**

杏仁生熟服之。都不為害。若火炒不透。半生半熟者。服數十粒。即死。其屍眼閉。舌唇耳竅。手足青色。肚腹有青色塊。惟急取吐。吐出可解。方用杏樹皮煎湯飲之。雖迷離將死者。皆效。

又方 用麝香一分。沖水服。立效。

**十九 急救鹽滷毒立效方**

中鹽滷毒者。急用生薑腐漿一椀。灌下。再用鵝翎攪喉管。令吐。即愈。

又方 用生豆腐漿。或沫布煎水。或肥皂水灌之。皆能令吐。其毒立解。惟切勿用熱水灌飲。須待所煎之湯。冷後灌之。

又方 以紅色金魚一尾。搗爛。取汁灌之。令吐出涎水。鹽毒自解。

又方 白糖八兩。沖湯灌下。即愈。

**二十 急救煤氣毒立效方**

中煤氣毒者。其尸必軟。與夜臥夢魘。不能復覺者。相似。多食蘿蔔。其毒自解。如鮮蘿蔔。一時難覓。可  
以蘿蔔乾代之。或飲涼水亦解。

又方。火鑪中投棗數枚。可解煤毒。房中宜常置  
水一盆。並使窗戶有透氣處。則煤氣雖臭。不能為  
害。若已中毒者。速擡出室外。令仰臥地上。用涼水  
洗頭部。並用人對口呼吸。可救。

二十一 急救漆毒立效方  
漆有毒質。凡中之者。皮膚忽作痛癢。甚至潰爛。用  
杉木皮煎湯洗。或蟹殼湯洗亦可。或用生蟹黃。鴨  
蛋青塗。或用活蟹搗爛敷上。均愈。

二十二 急救鳩毒立效方  
中鳩毒者。用犀角磨汁服之立解。

二十三 急救蛇毒立效方  
中蛇毒者。用雄黃調水冷服。即效。

二十四 急救蟹毒立效方

食蟹過多。寒氣凝結。必生腹脹胃鈍等症。用紫蘇  
葉三錢煎湯飲立解。

又方。生藕汁。生大蒜汁。生黑豆煎服俱效。  
又方。螃蟹誤同荊芥或柿食。均宜濃煎木香飲  
之。可免害病。

二十五 急救河豚毒立效方  
食河豚受毒者。用蘆根一二斤。搗汁服之立效。

又方。多服麻油。使吐毒即解。  
又方。槐花微炒。與乾胭脂等分。同搗成粉。冷水  
調服。極效。

又方。多食橄欖。並用橄欖核磨水服。亦效。  
又方。食之過多。面黃腹脹者。用紅麵三合。糞糊  
連渣服。即從大便出。臭不可聞。連服三次。其毒自  
解。

二十六 急救甲魚毒立效方

甲魚腹部紅者有毒。飲藍靛汁即解。

又方 飲白馬尿亦解。

又方 淡豆豉一合搗爛冷水調服自效。

二十七 急救牛肉毒立效方

食牛肉過多。每有胃不消化。身體倦困之病。用稻草汁煎飲之立愈。

又方 石菖蒲研水服亦效。

二十八 急救馬肉毒立效方

食馬肉受毒者。用人乳飲之即解。

二十九 急救羊肉毒立效方

食羊肉受毒者。用栗子殼濃煎服。或服甘草汁均效。

三十 急救猪肉毒立效方

食猪肉受毒者。用白砂糖一兩。白湯調服立效。或用芭蕉根搗汁服亦效。

三十一 急救鵝鴨毒立效方

食鵝鴨受毒者。用糯米半斤淘水去米。溫服一碗。

即愈。

三十二 急救雞肉毒立效方

食雞肉受毒者。以地漿飲之立解。

三十三 急救野鷄毒立效方

食野鷄受毒者。吐泄不止。用犀角末三分。冷水調服即愈。

三十四 急救田螺毒立效方

食田螺受毒者。以鴨涎灌之。或用冰片三分。水化服均效。

三十五 急救螞蝗毒立效方

螞蝗入腹。久必生子。食人肝血。面目黃瘦。不治必死。用桂圓肉包烟油吞之。蟲即死。隨於大便瀉出。屢試如神。

又方 田中泥一兩。雄黃二錢。為丸。分作四服。開

水下。其蟲入泥。隨大便而出。有時螞蝗行至鼻孔。血流不止。只用田泥泡水一碗。放鼻孔前。必然乘

泥而下。

又方 用白蜜頻頻食之。至一二觔方愈。螞蝗火燒為末。見水即活。惟以蜜浸之。即化為水。故服蜜最佳。以多為妙。少則不效。如食蜜不愈。更食羊肉可化。

### 三十六 急救蜈蚣毒立效方

夏月鷄之隔宿者。每有蜈蚣食之。或遺子鷄上。食之腹痛。用鷄子去黃。食白數個。自解。再服生菜油。自愈。

### 三十一 鯁喉 附烟酒醉

#### 一 急救諸骨鯁喉立愈方

諸骨鯁喉。宜急治之。若飲食難進。餓倒胃氣。即屬難救。凡係獸骨及鷄鴨等骨鯁者。用狗一隻。倒吊。取涎緩緩嚥下。其骨即化。屢試如神。  
又方 用苧麻根搗融為丸。如桂圓大。魚骨用魚湯下。鷄骨用鷄湯下。或用苧麻根搗汁飲之。亦可。

又方 砂仁、草菓、威靈仙各二錢。加白糖一兩。水煮連服三四碗。無論何骨俱化。  
又方 白鳳仙子研水一大杯。以竹筒灌入咽喉。其骨即軟。但不可經牙。恐牙受傷。救用竹筒灌之神效無比。

#### 二 急救魚骨鯁喉立愈方

魚骨鯁喉。用鷓鴣或鴨子倒掛。取垂涎。令患人仰臥時時灌下。其骨盡化。  
又方 用橄欖核磨濃汁。滾水調服。即愈。  
又方 灰麵四兩。用冷水調稠。敷兩膝頭上。一時之久。其骨即化。真奇方也。一切禽魚獸骨皆治。  
又方 以烏梅擦貓口。貓涎即淋出。取灌喉中。立消。

#### 三 急救鷄骨鯁喉立愈方

鷄骨鯁喉。食山查膏甚效。或以山查煎濃汁服之。亦可。緣鷄骨入山查膏即化也。

又方 用威靈仙沙糖酒煎服亦效。

四 急救田螺鯁喉立愈方

田螺鯁喉用鴨一隻以水灌口少頃將鴨倒吊取涎與服即化。

五 急救稻殼鯁喉立愈方

稻殼鯁喉食糯米糖即下。又方 急取鵝口中涎灌之亦效。

六 急救竹木鯁喉立愈方

竹木鯁喉用老絲瓜燒灰每服三錢兌酒下立效。

七 急救竹葉鯁喉立愈方

竹葉鯁喉易閉喉管遲則難救急取牛口涎以滾水兌服即化。

八 急救諸豆鯁喉立愈方

諸豆鯁喉用蛤蜊數個搗爛敷喉外腫處其豆自下。

九 急救鴉片烟醉立愈方

鴉片烟醉傷服鹽水即愈。或飲醬油湯及糖湯均效。

十 急救水旱烟醉立愈方

水旱烟醉傷用胡黃連一錢煎水兌茶飲即解。

十一 急救香烟醉立愈方

吸香烟過量必醉醉後昏眩實過於酒可用鹹橄欖以沸水泡湯飲之即醒或靜臥數小時亦可解。

十二 急救酒醉立愈方

凡酒醉死者急解醉人頭髮放新汲井水盆內將衣解開用豆腐遍身貼之少刻再換換至數次必醒惟寒天不宜。

又方 樟樹子一兩煎水服之即醒屢試如神。

又方 白蘿蔔汁或熱尿灌之均效。

▲四 誤吞錢物

一 急救誤吞五金立效方

誤吞金銀銅鐵錫用磁石二錢醋炙研末芒硝三

錢研末。蜂房（即蜂窠）一兩。搗研細末。將三味調和服之。其物於一周時內自下。

又方 土泥三錢（此泥能在地深掘數寸得之為妙）和少許清水服之。便能瀉出。

又方 橄欖核燒枯研末。開水調服。自出。

### 二 急救誤吞銅錢立效方

誤吞銅錢。食葶藶數斤。次日。錢從大便而出。

又方 以胡桃肉充量飽食。其銅化解。從大便出。

又方 胡桃肉四兩。生葶藶一斤。共搗成汁。和酒吞之。錢即由大便出。

又方 砂仁二兩。煎湯服之。亦可化。或照上誤吞五金等方治之。亦可。

又方 砂仁二兩。煎湯服之。亦可化。或照上誤吞五金等方治之。亦可。

又方 砂仁二兩。煎湯服之。亦可化。或照上誤吞五金等方治之。亦可。

### 三 急救誤吞鐵針立效方

誤吞鐵針。以蠶豆煮葦菜同食。針隨葦菜。從大便出。如無蠶豆。用鹽蛋亦效。

又方 以磁石置肛門外。可引下。

### 四 急救誤吞鐵屑立效方

誤吞鐵屑。取硬炭外層之皮。搗成細末（須用綑篩篩過）和粥食之。炭未必裹鐵屑。次日即從大便隨炭瀉下。

誤吞鐵屑。取硬炭外層之皮。搗成細末（須用綑篩篩過）和粥食之。炭未必裹鐵屑。次日即從大便隨炭瀉下。

誤吞鐵屑。取硬炭外層之皮。搗成細末（須用綑篩篩過）和粥食之。炭未必裹鐵屑。次日即從大便隨炭瀉下。

### 五 急救誤吞玻璃立效方

誤吞玻璃。用赤豆煮湯。儘量熱飲。再服瀉藥。不逾時。赤豆裹玻璃瀉出。

誤吞玻璃。用赤豆煮湯。儘量熱飲。再服瀉藥。不逾時。赤豆裹玻璃瀉出。

### 六 急救誤吞碗片立效方

誤吞碗片。用羊脛骨炙灰研末。開水沖服。其碗片即化。從大便出。

誤吞碗片。用羊脛骨炙灰研末。開水沖服。其碗片即化。從大便出。

### 七 急救誤吞洋油立效方

誤吞洋油（一稱火油。又名煤油）用海帶（南貨店內均有）煎汁。多飲立愈。

誤吞洋油（一稱火油。又名煤油）用海帶（南貨店內均有）煎汁。多飲立愈。

### 八 急救誤吞桐油立效方

誤吞桐油。用乾柿餅食之。立解。

又方 蓮蓬殼煎水服。亦效。

九 急救誤吞頭髮立效方

誤吞頭髮用亂髮燒灰水調一錢服立效。(髮須燒透若有生髮未經燒燼者食之更足致害)

又方 舊木梳燒灰酒沖服亦效。

十 急救誤吞耳垢立效方

誤吞耳垢陡然腹脹或越數日然後腹微痛而膨脹用黃連三錢人中黃五分煎服愈後可免聲啞之患。

▲五 創傷

一 急救跌打損傷立愈方

跌打損傷用大鯽魚一尾獨核皂莢一個胡椒七粒黃梔子九個老薑一片葱頭三個野苧麻根一段乾麵一撮香糟一團紹酒隨意用同藥搗如泥炒熱敷患處外用布包紮緊次日青出即愈  
又方 乾冬瓜皮牛皮膠各一兩剉碎研末每五錢熱酒下能飲者酒宜多酒後蓋取微汗痛即止

又方 十一月採野菊花連枝葉陰乾用時取一兩加童便無灰酒各一椀同煎熱服灌下立甦

又方 先用熱童便灌後以麻油好酒各一椀煎服暖臥一夜即愈

又方 週身打傷用大生蟹搗極爛熱酒沖服極醉為度

又方 跌打重傷用舊蒲鞋燒灰砂糖酒送下如打死未絕氣者用白頸蚯蚓火煨為末酒送下均效

二 急救跌打傷筋立愈方

跌打傷筋用韭菜搗爛敷過一次即愈

又方 生蟹去殼同黃搗爛微炒敷傷處筋能連續

又方 跌打筋斷者當絲瓜開花時清晨採肥厚之葉陰乾摻之大妙

三 急救打傷骨立愈方

跌打傷骨。用糯米一升。皂角半升。切碎。青錢百枚。同炒焦。去錢研末。酒調貼。其效如神。

又方。南星木鼈各四兩。乳香沒藥宮桂各一兩。研末。生薑一斤。去皮搗汁。入醋少許。加白麵調糊。攤紙上貼。外用帛纏杉木夾縛。自能痊愈。

#### 四 急救跌破頭顱立愈方

跌破頭額。用生半夏研末。醋調敷。極效。

又方。五倍子末。白礬末。各半。研和。置於玻璃瓶中。臨時取少許。敷於傷處。此二藥能使破壞之微血管收縮。血即止而不流。

#### 五 急救腦破骨折立愈方

腦破骨折。用透明龍齒人參各三錢。生地三錢。象皮三錢。冰片三分。地氫二十個。蝸螻三個。去頭翅。先將人參各項研末。然後用蝸螻地氫搗爛。入前藥搗之。佩身上。三日乾為末。貯瓶中。遇有此等險症。服一錢。即愈。神效之至。

又方。蜂蜜和葱白搗勻。厚塗立效。

#### 六 急救割頸斷喉立愈方

割頸斷喉。急宜早救。遲則額冷氣絕。乘初割時。輕扶住。使仰睡。將頭墊起。合攏刀口。將血拭去。用大雄鷄一隻。快手輕去其毛。生剝其皮。乘熱貼傷口。再請傷科治之。自愈。愈後鷄皮目落。

#### 七 急救閃頸立愈方

閃頸。以舊油木梳。在火上烘熱。梳背於疼處極力刮之。自愈。

又方。真礬砂研。以燈心蘸點眼內四角。淚出即鬆。連三次立效。

#### 八 急救脫頰立愈方

脫頰。須平身正坐。令人以兩手托住下頰。向腦後送上。關竅。隨用布條紮住。務須避風。外用天南星研末。薑汁調敷兩頰。一夜即上。另服調理藥。自愈。

#### 九 急救舌頭咬斷立愈方

舌頭咬斷。先以乳香沒藥煎水含口中。止痛後。再用活蟹一隻。炙乾為末。敷上即能生肌。

十 急救舌斷血出立愈方

舌斷血出。以鵝翎蘸米醋。頻刷斷處。其血即止。再用蒲黃杏仁。研砂少許為末。蜜調成膏。噙化。

十一 急救眼睛打傷立愈方

凡眼睛打出。或跌傷。或碰傷。或火爆傷。用南瓜瓢搗爛。厚封外。用布包好。勿動。漸即腫消。痛定。乾則再換。如瞳人未破。愈後仍能視也。瓜以愈老愈佳。有鮮地黃處。用地黃亦可。

又方 打傷眼睛突出。急揉入眶內。用生猪肉。

瘦者為佳。糝以當歸末及赤石脂。將肉貼傷處。即愈。

又方 取牛口涎水。日點三次。惟須避風。尤忌飲

酒及食熱性之物。如眼中出血。治之亦愈。

十二 急救耳朵挖傷立愈方

耳被挖傷。用冰片。胭脂。燒灰。牡蠣。煨粉。共為末。以骨簪點香油。蘸藥末入耳內。即愈。

十三 急救閃跌傷腰立愈方

閃跌傷腰。用續斷。大黃。骨碎。補沒藥。歸尾。虎骨。赤芍。各二錢。紅花。自然銅。煨醋淬。穿山甲。劉寄奴。各一錢。絲瓜絡半個。共煎水。酒服立效。

又方 真橙子核一錢五分。製香附一錢。炒研為末。酒服三錢。極效。

又方 白葡萄乾一兩。用好酒煎服。至重者。兩服全愈。

十四 急救戳傷腸出立愈方

戳傷腸出。以好醋煮熱洗之。不可太熱。亦不可冷。隨洗隨入。外用活剝雞皮。乘熱貼上。再服傷藥。自愈。

十五 急救閃跌手足立愈方

閃跌手足。用生薑。葱白。搗融。和灰麵炒熱敷之。或

用生大黃和生薑汁磨敷均效。

又方 當歸葱白荊芥煎洗自愈。

### 十六 急救手指砍斷立愈方

砍斷手指將指接上用蘇木細末敷之外用蠶繭包縛牢固數日自愈。

### 十七 急救刀傷立愈方

刀傷以龍眼核去外黑衣研末敷於傷處頗奏奇效。

又方 陳年石灰粉一兩生大黃一兩同炒至粉變淡紅色爲止去黃留粉凡遇刀傷敷上立可止血定痛。

又方 用舊氈帽燒灰研末敷亦能止痛收口。

又方 海蝶蛸研末敷之亦效。

### 十八 急救湯火傷立愈方

凡經湯火傷者無論輕重急用童便灌之以免火毒攻心或用白沙糖熱水調服或用蜂蜜調熱水

灌之均可切不可用冷水及井泥溝泥等物即使痛極難受亦必忍耐倘誤用冷水淋之則熱氣內

逼輕則爛入筋骨手足彎縮重則直攻入心必難

救矣先用真麻油敷之再用糯米淘水去米取汁

加真麻油一茶鍾多加更妙用筷子順攪一二千

下切莫少攪可以挑起成絲用舊筆蘸油搽上立

刻止痛愈後並無疤痕神效無比。

又方 用麻油煎滾加入白臘白蜜調勻待冷敷

於傷處即止痛如在手足上可浸於煤油及菜豆

油生油麻油內即可止痛。

又方 尿桶內陳尿（新尿亦可）或浸珠淋一

時之久再用蜂蜜和真麻油敷之自愈。

又方 南瓜裝罈內埋土中數月即化爲水愈陳

愈佳有湯火傷者取水塗之隨手而愈或用黃瓜

亦可。

又方 先用鹼水洗燙處後用上好燒酒頻頻拭

之約一小時能止痛。

又方 地榆一斤。焙黃色。研末。麻油調敷。神效。

又方 生桐油半盃。銀硃三錢。調敷亦效。

十九 急救湯火傷眼立愈方

湯火傷眼。急倒臥地下。令人解小便澆眼上。再取

牛涎水。點之自愈。

二十 急救鐵針入肉立愈方

鐵針入肉。用陳火腿皮。搥爛塗敷。即出。

又方 括蕒根搗爛敷之。日三易。頗驗。

又方 如針隨血流動。磁石不能吸出者。用胡桃

肉。白糖等搗和。敷於入針原孔內。其針即由原孔

徐徐退出。

二十一 急救槍子入肉立愈方

槍子入肉。用南瓜瓢敷之。即出。

二十二 急救水銀入肉立愈方

水銀入肉。以真川椒研末。生蛋白調敷。用布包緊。

過夜即出。

二十三 急救磁片入肉立愈方

磁片入肉。用三角形白果。去殼與心。不拘多少。浸

菜油內。取出搥融。貼之日換一次。雖入肉多年。爛

而不出者。三次即愈。

二十四 急救骨刺入肉立愈方

骨刺入肉。將象牙刮末。以水煮白梅肉。調塗。骨刺

自軟。

又方 山查研末。調敷亦效。

二十五 急救竹木入肉立愈方

竹木入肉。可用蒸汽拔出之法。以小口燒料瓶。中

儲沸水及半。將被刺之處。與瓶口緊接。須不洩汽。

俟瓶內之水漸冷。蒸汽凝結為水。則瓶內之空氣

壓力較瓶外為低。自能將膚中之刺吸出。

又方 竹木入肉不出者。用鹿角燒灰研末。水和

塗。不過一夜即出。

**二十六** 急救麥芒入目立愈方

麥芒入目。疼痛非凡。用大麥汁洗之。芒自出。

又方 以新布覆目上。持螬蟻從布上磨之。芒即着布上而出。

**二十七** 急救塵芒入目立愈方

塵芒入目。用生藕汁。以絲綿蘸點目中。其塵即出。或用墨汁亦效。

**二十八** 急救沙泥入目立愈方

沙泥入目中。用粗牛膝三寸。自嚼爛如腐。吐出搓成小丸。塞兩眼角。則流淚必多。泥沙裹丸藥而出。又方 手指甲研末。燈草蘸點目中。即愈。

**二十九** 急救石灰入目立愈方

石灰誤入目中。用土牛膝汁點之。自能消痛止腫。且能保全眼光。

又方 生山梔煎濃汁。頻頻洗目。不可間斷。約二小時。即腫退痛止。

**三十** 急救烟油入目立愈方

烟油入目。如將他物洗之。愈洗愈痛。甚至損睛。須用亂髮緩緩揉之。自愈。

**三十一** 急救飛絲入目立愈方

飛絲入目。以蜂蜜灌入。將葱之尖頭。略為摘破。復將葱內之蜜。滴於眼內。連滴數次。可保無恙。又方 好墨磨濃。用新筆蘸墨。點眼角內。閉目片時。其絲自然成塊。用手輕抹。即出。

又方 用雄雞冠血。滴入。看有紅絲。捲去甚效。

**三十二** 急救蛛絲入目立愈方

蛛絲入目。用明礬末。和入滾水。貯於盆內。將首俯於盆上。頭上罩以布。以水氣薰之。其絲即落於水內。屢試屢效。

又方 生白菜搗汁。滴眼內。即愈。或取桑樹漿點之。亦愈。

**三十三** 急救壁虎入耳立愈方

壁虎尾入耳。極為危險。如不急治。則其尾入腦部。有性命之憂。宜用鷄冠血滴入。其尾自出。

**三十四** 急救蜈蚣入耳立愈方

蜈蚣入耳。用鷄冠血滴入。自出。或一時難覓。即以薑汁或韭菜汁灌之。亦效。

又方 用炒肉放耳邊。蜈蚣聞香自出。或用烹鷄更妙。

**三十五** 急救蜒蚰入耳立愈方

蜒蚰入耳。用白糖熱水調濃汁。滴耳內。蜒蚰即化為水。

又方 蚯蚓為末。入葱內化水。點入則蜒蚰亦化為水。奇效。

**三十六** 急救螞蟻入耳立愈方

螞蟻入耳。以穿山甲燒研。水調灌之。即出。又方 取貓尿滴入耳。其蟲自出。取尿之法。以生薑或大蒜擦入貓鼻。即得。

又方 以椒末浸醋滴入。亦出。

**三十七** 急救飛蛾入耳立愈方

飛蛾入耳。以銅器向耳邊敲擊。自出。

**三十八** 急救飛蠅入耳立愈方

飛蠅入耳。急尋取皂角中蠹蟲。研爛。同鱈魚血灌之。極驗。

**三十九** 急救臭蟲入耳立愈方

臭蟲入耳。用鱉甲炙熱薰耳。其蟲得薰氣即出。再服菊花湯二三日。以解火氣之熱。

又方 緊閉口目。以一手掩鼻孔。一手掩其餘一耳。力屏其氣。臭蟲自出。否則用香油滴耳。亦效。

**四十** 急救蚤虱入耳立愈方

蚤虱入耳。以菖蒲末炒熱。袋盛枕之。即出。

**▲六 動物咬傷**

**一 急救人咬傷立愈方**

凡被人咬傷。其牙最毒。若有牙黃入肉。則痛不可

忍咬手指者。指與手掌俱漸漸爛落。年久難愈。宜用童便洗淨。汚血洗時。雖痛至不省人事。亦須忍住。用人糞敷之。或用人中黃煎湯時洗。此爲治人咬良方。不可嫌污穢自誤。

又方 先用童便洗淨。再用荔枝核焙研。篩細摻之外。用荔肉蓋貼。雖不水不爛。神效。  
又方 用鰲頭燒存性。研末。菜油調敷。或生栗子肉搗爛敷亦效。

### 二 急救虎咬傷立愈方

凡被虎咬傷。血必大出。傷口立時潰爛。疼不可當。急用猪肉貼之。隨貼隨化。隨化隨換。再用地榆一觔。爲細末。加入三七末三兩。苦參末四兩。和勻。摻之。隨濕隨摻。血止痛亦止矣。  
又方 樟樹嫩葉嚼食。並令人將此葉嚼融敷之。亦效。

### 三 急救狼咬傷立愈方

狼咬傷者。用乾薑末敷。或胡椒末敷。初覺腫痛。少刻即腫消痛止。三日而安。

### 四 急救瘋狗咬傷立愈方

瘋狗咬傷。最怕七日一發。發時天本無風。病者俱覺風大入帳。蒙頭躲避。過三七之日。無此畏風情形。方爲可治。被咬時。先看頭頂。如有紅髮二三根。趕緊拔去。最爲要緊。隨於無風處。以冷茶洗淨。汚血。用杏仁搗融敷之。內服韭菜汁一碗。隔七日再服一碗。四十九日。共服七碗。傷口上再用煮熟鷄蛋白蓋上。用艾絨在上燒數十次。百日內忌鹽醋。一年內忌猪肉魚腥酒色。終身忌食狗肉。蠶蛹紅飯豆。  
又方 花盆內栽種之萬年青。連根搗融。絞汁灌之。腹內如有小犬。變成血塊。由大便而出。不論久近。皆治一切不忌。  
又方 初被咬時。即用砂酒壺兩個。內盛好燒酒。

燙滾去酒。以壺按在傷口。拔出汚黑血水。滿則自落。再以一壺去酒。仍按傷口。輪流提拔。以盡爲度。奇效無比。或用癩蝦蟆。破開肚。連腸雜敷傷口。一日一換。換過卽埋土內。並另取癩蝦蟆。煮食。神效。仍照前忌食一切。

又方 此方小人減半。孕婦忌。用生軍三錢。桃仁去皮尖七粒。地龍蟲炒去足七只。上三味藥研末。再用白蜜三錢。酒一碗。煎至七分。連渣服之。如不能飲酒者。用水對和亦可。空心服此藥後。別設糞桶一只。以驗大小便。大便必有惡物。如魚腸猪肝之類。小便如蘇木汁。數次後藥力盡。大小便如常。再服則惡物又下。不拘帖數。總要大小便無纖毫惡物爲度。不可中止。留餘毒於腹中。以致復發。又方 此方專治毒蛇瘋犬咬傷。點眼神妙。用火硝五分。提淨。製蘆甘石一錢。上雄精五分。當門子三分。大冰片三分。共研極細末。將藥點兩眼角。

視傷處。有黃水流出。流淨卽愈。其妙非常。

又方 以草繩緊束傷處兩頭。後以熱小使洗去血水。用斑貓七個。去頭足。酒洗和糯米一把。用銅灼炒。以米黃爲度。加六一散二兩。共爲細末。或木通燈心煎濃湯送下。老少虛弱者。分作四服。壯年分作二服。當時一服。次早再服。後看本人頭頂心。必有紅髮一根。急拔去。服藥後。用甘草湯嗽口。忌一切葷腥油膩。及鷄鴨蛋。百日內忌聞鑼鼓聲。及房事。終身忌小紅赤豆茄子狗肉。

### 五 急救家狗咬傷立愈方

家狗咬傷。刮肉店砧板上油膩。拌白糖敷之。立效。又方 甘草煎水洗淨毒氣。以熱牛糞敷之。卽時痛止。

又方 胡椒研細末敷之。雖傷重。亦不過數日收功。惟初敷必痛而且腫。少頃痛止腫消。

### 六 急救馬咬傷立愈方

馬咬傷。用白煮猪肉一大片。同飯。本人自嚼。貼患處。立時止痛。

**七 急救猪咬傷立愈方**

猪咬傷。用生龜板炙研細。麻油調搽。即愈。  
又方 熟松香貼傷處。數日愈。

**八 急救貓咬傷立愈方**

貓咬傷。用薄荷葉煎水洗之。或用川椒亦可。  
又方 陳薑頭嚼爛敷之。次日結痂。神效。

**九 急救鼠咬傷立愈方**

鼠咬傷。用荔枝嚼融敷。即愈。或用麝香少許。斑貓口水調搽亦愈。

**十 急救毒蛇咬傷立愈方**

凡遇毒蛇咬傷。惡毒攻心。半日必死。急取竹木桿。烟筒內烟油。用冷水洗出。飲一二碗。受毒重者。其味必甜而不辣。以多飲為佳。傷口痛甚者。內有蛇牙。多用烟油搽擦。必出。此為蛇咬第一良方。

又方 用兩刀在水內相磨。取水飲之。雖痛苦欲死。可救。

又方 用雄黃五錢。五靈脂一兩。共研細末。每服二錢。陳酒下。再將此末用麻油敷患處。隔一時。再進一服。即愈。若能割去所嚙之死肉。更妙。

又方 用白鳳仙花一棵。退根葉。和獨囊大蒜頭一個。搗爛。再加人口涎吐。調敷傷口。能使毒水吊出。即愈。

**十一 急救蜈蚣咬傷立愈方**

蜈蚣咬傷。取鷄口內涎搽傷處。立愈。或用蜒蚰塗上。即止痛。又用秋海棠子搗爛敷之。亦效。

又方 急以手向花枝下。泥書田字。勿令人見。取其泥向螫處擦之。立愈。

又方 十指甲磨水敷。其效如神。

**十二 急救壁虎咬傷立愈方**

壁虎咬傷。即覓活蜘蛛一隻。大者最好。將蜘蛛放

於傷處。蜘蛛即在傷口。伏而不動。其痛隨止。

又方 桑葉煎濃汁。調白礬末敷之。亦愈。

十三 急救蟾蛛咬傷立愈方

蟾蛛一名壁蟾。又名蟾子。時作白窠如錢。貼壁上。

咬人最毒。用桑樹皮燒枯。煎濃汁。調白礬末敷之。

極效。

又方 以刀燒紅。置白礬於上。汁出。乘熱滴之。立

愈。

十四 急救黃蜂刺傷立愈方

黃蜂刺傷。取鮮花搽擦傷處。立愈。或用芋莠擦之。

亦效。如有芋莠葉亦可。

又方 用紅糖塗患處。亦效。

又方 蚯蚓糞井水調敷。其痛立止。

又方 即用泡過茶葉。不計多少。擦痛處。立時止

痛。

十五 急救蠍螫傷立愈方

蠍螫傷。雄者傷人。痛在一處。雌者傷人。痛牽遍體。

用井底泥敷之。乾則再換。或用新汲水。以青布隨

痛處搭之。乾則再敷。亦效。

又方 蝸牛一條。搗融敷之。其痛立止。

十六 急救蠶咬傷立愈方

凡蠶嚙人。毒入肉中。令人發寒熱。以家用苧蔴葉

搗汁塗之。神效。

民國二十四年七月出版

百病丹方大全 全一冊 定價大洋一元六角

版權所有  
翻印必究

出版者 中央書店

校訂者 儲菊人

印刷者 上海中央書店

發行者 上海中央書店

總發行所 上海 中央書店

四馬路  
世界里

分發行所 上海及各省各大書局

Handwritten scribbles and marks at the top of the page, possibly representing a signature or a set of initials.

