



大德重校聖濟總錄

一百八十三

卷一百七十五

存卅三葉四六三

卷一百八十三

存三葉四六二



犀角

鎊

青橘皮

去白焙

京三稜

剉

木香

各半兩

巴豆

去心膜出油盡取霜抄半錢



皂莢

參擬不艸大者剉炭火內燒煙絕為度淨水內蘸去火毒

黑牽牛

炒貳兩

右七味擣六味為細末與巴豆研勻麩糊

丸如麻子入每服七丸至十九丸食後生薑

橘皮湯下量兒大小加減

治小兒乳食不消紫霜丸方

代赭貳兩 搗末 杏仁去皮尖 雙人炒 研壹錢壹字

巴豆柒枚 去皮心 膜出油盡研

右三味再研勻細水浸炊餅和丸如黃米大每服三丸溫米飲下量見大小加減

治小兒宿滯不消止吐逆利關膈溫脾胃進乳食定心腹痛小丁香丸方

丁香肆拾玖枚 肉豆蔻大者壹枚去殼 五靈脂不夾石者貳錢

木香壹錢半 巴豆去皮膜研出盡油為霜抄壹字

右五味將前四味搗為細末後入巴豆霜

令勻滴水丸如芥子大每服量見大小加

減五七丸至十九煎桃葉湯下不拘時

治小兒乳食不化腹急氣逆順氣丸方

巴豆拾粒 去皮分作貳拾片 胡椒貳拾粒 丁香貳拾粒

青橘皮貳拾枚 全者易及去白每枚入巴豆半粒胡椒丁香各壹粒用線纏之

右四味用米醋一升煮俟醋盡取出焙乾

為末爛飯丸如粟米大每服二丸米飲下

更量兒大小加減

治小兒胃虛宿食不消人參湯方

人參 赤茯苓去黑皮 白朮

半夏各半兩湯浸過生薑汁炒乾 甘草炙壹分

右五味麤擣篩每服二錢匕水一盞生薑

二片煎至五分去滓溫服不計時候日三

量兒大小加減

治小兒脾胃氣弱乳食遲化宿昔成積久而

不消香朴散方

厚朴去魯皮生薑汁炙四壹兩 木香

麥蘖炒 陳麩炒 青橘皮去白焙

陳橘皮去白焙各壹分

右六味擣羅為細散每服半錢匕湯調下

小兒腹脹

論曰小兒府藏怯弱氣血未定風冷客之搏於正氣外降不調故令兒心腹脹滿遇胃氣

虛則食不消腸虛則為注泄矣

治小兒腹虛脹脾氣不調理中茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

犀角

磨

赤石脂

黃連

去須

龍骨

厚朴

去麤皮生薑汁炙

陳橘皮

湯去白培

人參

乾薑

炮各壹兩

桂

去麤皮

甘草

炙各貳兩

右一十一味鹿藟篩五六歲兒每服一錢

匕水一盞煎至四分去滓溫服量兒大小加

減一方去龍骨加麥門冬一兩

治小兒腹脹虛熱不能食白朮湯方

白朮

人參

甘草

炙

枳殼

去穢炒

當歸

切焙各壹兩

牡蠣

熬半兩

右六味鹿藟篩一二歲兒每一錢匕水七

分煎至四分去滓分溫二服更量兒大小

加減

治小兒胃膈痞塞心腹脹滿木香丸方

木香 貳兩

黑牽牛 其拾四兩炒香別

擣取末壹拾貳兩

補骨脂 炒

葶澄茄

檳榔

酸粟米 筋裏濕

紙煨熟去 飯各肆兩

右五味擣四味為末與牽牛末和勻漸滴

清水和丸如菉豆大每服三丸或五丸食

後茶湯熟水任下更量兒加減

治小兒心腹脹滿下利乾嘔不止人參湯方

人參

陳橘皮

去白焙 各壹分

甘草

炙

右三味麤擣篩五六歲兒每服一錢匕水

七分生薑二片煎至四分去滓溫服日再

更量兒大小加減

治小兒腹脹通氣散方

青橘皮

湯去 白焙

木香

檳榔

各壹分

右三味細剉用巴豆三十粒同炒令赤色

為度不用巴豆只擣三味為細散每服半

錢匕煎紫蘇木瓜湯調下更量兒大小加減

治小兒腹脹胡椒丸方

胡椒

蠟梢炒

甘遂炒

右三味等分擣羅為末用燒飯丸如黍米大每服二丸陳米飲下乳食前服并理脾積氣更量見大小加減

治小兒心腹氣脹喘麈不下食款氣湯方

牽牛子

炒熟壹兩

馬兜零

壹兩

木香

半兩

右三味麈擣篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓溫服更量見大小加減不拘時候

治小兒腹脹消氣丸方

續隨子

去殼研

胡椒

各伍拾粒

丁香

貳拾壹枚

木香

壹錢

蠟梢

拾肆枚炒

阿魏

壹字研

右六味擣羅四味為末入研藥合研勻燒粟米飯丸如麻子大淡醋湯下五丸至七丸

治小兒胃虛腹脹豆蔻散方

肉豆蔻

壹枚去殼

青橘皮

湯去白焙半分

木香

壹分

陳粟米合壹

右四味將陳粟米同巴豆三七枚炒巴豆
每枚刺作竅子候色焦去巴豆不用將粟
米并餘藥為細散每服一錢匕生薑湯下
更量兒大小加減

治小兒發歇寒熱心腹脹滿調中丸方

人參 赤茯苓去黑皮 各壹兩 桂 去鱗皮

芫胡去苗 大黃剉炒各壹兩 枳殼炒 去穰

木香各半兩

右七味細擣羅為末鍊蜜丸菉豆大一二
歲每服二丸至三丸溫熱水下更量大小
加減

治小兒胃虛腹脹鞞橘紅丸方

陳橘皮湯去白 焙半兩 胡椒 黑牽牛各壹百粒

巴豆各拾粒 去皮通前參味 同炒令焦去巴豆不用 木香壹分

右五味除巴豆外為細末用葱白汁丸菉

豆大每服三九至五九萊菔子湯下乳食
後臨卧服更量兒大小加減

治小兒腹脹鞭款氣丸方

巴豆

拾伍枚燈上
燒成灰細研

丁香

錢

木香

壹分

麝香

半錢

右四味為細末麩糊丸粟米大每服三九
煎萊菔子湯下乳食後服更量兒大小加減
治小兒腹脹手足漸細精神昏冒不欲乳食

縮沙散方

縮沙人

木香

丁香

牽牛

炒壹半熟壹半
生用各壹兩

膩粉

壹分

右五味擣羅為散每服一字匕酒調下

治小兒氣脹胃膈腹滿丁香湯方

丁香

甘草

炙

人參

各壹分

右三味鹿擣篩周歲內兒每服半錢匕水
半盞煎至三分去滓温服日三三四歲兒

漸加至一錢匕

治小兒腹脹冷氣結塊疼痛黃連飲方

黃連大須炒 壹兩 人參 黃芩去黑心

當歸炙 剉 桂去麤皮 高良薑各半兩

右六味細剉如麻豆大每服一錢匕以水

七分煎取四分去滓溫服

治小兒腹脹欲死方

右取半夏不拘多少湯洗去滑炮熟切酒

服如米粒大五塊一日三服

又方

右擣薤根以豬脂為膏煎服之

治小兒哺露

論曰哺露之病與傷飽丁奚之病本同皆本

於乳哺不調傷於脾胃致氣血減損不榮肌

肉故柴辟羸露謂之哺露甚則府藏之氣不

宣熖熖苦熱是其候也

治小兒哺露化腸胃食滯疝氣腹滿發熱破積丸方

木香 壹兩

青橘皮 湯浸去白 焙壹兩

桂 去鹿皮 壹兩

吳茱萸 湯洗焙乾 炒叁兩

硃砂 醋熬成霜研末抄壹錢匕

巴豆霜 抄半錢匕

右六味擣羅前四味為末與硃砂巴豆霜同拌研勻醋煮麩糊為丸如菉豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便澹

為度量兒大小虛實以意加減

治小兒哺露傷飽煩熱羸瘦雞骨丸方

雞骨 青熟雞左右骨各兩黃

赤芍藥 半兩

川大黃 半兩剉微炒

紫苑 半兩洗去苗土

赤茯苓 半兩

細辛 壹分

黃芩 壹分

桂心 壹分

茈胡 半兩去苗

右九味擣羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服溫水下五丸早晚各一服量兒大小加減

治小兒哺露失衣當風濕浴腹大時痢寒熱

如瘧不欲飲食縱食難消化四肢羸瘦人參黃耆日丸方

人參 去蘆頭

黃耆 日剉

麥門冬 去心焙

半夏 湯洗去滑

川大黃 剉碎微炒

白茯苓

芫胡 去苗

黃芩 已上各參分

訶梨勒 壹兩煨用皮

甘草 半兩炙微赤剉

鼈甲 壹兩塗醋炙令黃去裙爛

芎藭 半兩

右一十二味搗羅為細末鍊蜜為丸麻子大每服三丸溫粥飲下五歲服五丸量兒

大小加減

治小兒寒熱久不解仍不能食飲若食不消

哺露堅痞大腹下痢不止芍藥丸方

芍藥 參分

桂 去蟲皮半兩

芫胡 去苗

大黃 剉炒各壹兩

赤茯苓 去黑皮

鼈甲 去裙爛醋炙各半兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大一歲

已上每服三丸米飲下早晨日午夜卧各一

治小兒哺露脅下痞堅腹滿虛脹手足煩熱

往來無時大黃丸方

大黃

剉炒 貳兩

乾薑

炮半兩

人參

貳兩

丹參

去蘆 壹兩

沙參

苦參

防風

去叉各壹兩

桂

去麩半兩

玄參

壹兩半

麩蟲

炙焦 捌枚

附子

炮裂去臍 皮半兩

白朮

赤茯苓

去黑皮 各壹兩

葶藶

紙上炒 半兩

杏仁

去皮尖雙 人麩炒研

蜀椒

去目并閉口者 炒出汗 各壹分

巴豆

拾枚去皮膜 研出油盡

右一十七味搗羅十五味為末與巴豆杏

人同研鍊蜜丸如麻子大每服二九至三

丸米飲下量兒大小加減

治小兒哺露腹脹身熱下痢不止鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴 醋炙

常山

剉

肉苁蓉

酒浸 切焙

各壹分

右三味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大一二

歲每服三丸三五歲五丸米飲下空心午

後各一服更量兒大小加減

治小兒哺露腹脹體瘦訶梨勒丸方

訶梨勒皮參分肉豆蔻去殼壹枚青黛研

麝香研盧會研熊膽研

丹砂研各壹分

右七味擣研為末和勻酒煮粳米飯丸如

黍米大每服三丸粥飲下日二更量兒大

小加減

治小兒哺露腹脹體瘦代赭丸方

代赭研赤石脂研丹砂研各壹分

巴豆拾粒去皮心研紙壓去油盡杏仁貳柒粒針穿燉

上療作聲為度

右五味先別研細再合研勻爛飯丸如粟

米大每服一丸乳汁或粥飲下更量兒大

小加減

治小兒哺露腹脹體瘦檳榔丸方

檳榔判丹砂研阿魏麩裏煨麩熟為

度去

代赭搗

乳香研

木香

五靈脂

麝香研

肉豆蔻

去殼各宜分

蟾頭

壹枚炙焦

巴豆

柒粒去皮心膜

紙壓去油盡研

右一十一味搗研為末麪糊丸如黍米大

每服二丸溫生薑湯下更量兒大小加減

小兒丁奚腹大

論曰小兒病腹大頸小黃瘦者名曰丁奚此

由哺食過度脾胃氣弱不能消化內成痼滯故令津液減損不能榮其氣血豐其肌體久而不差變穀堅之病

治小兒骨中微熱腹內不調食不為肌或苦寒熱丁奚腹大雞骨丸方

雄雞骨

壹具炙黃

赤茯苓

去黑皮

石膏

搗末

芍藥

大黃

剉炒

紫苑

去苗土

陳橘皮

湯浸去白培

礬石

燒令汁盡研

細辛

去苗葉

附子

炮裂去皮
齊各半兩

黃芩

去黑
心

桂

去
皮

葶藶子

炒各
參分

右一十三味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸米飲下早晨日午夜卧各一服更量大小加減

治小兒新生客忤所中驚癇發熱哺乳不消中風掣縮踈口吐舌卒注面青目上揺腹滿丁奚羸瘦脰交三歲不能行麝香紫霜丸方

麝香

研

牛黃

研

雄黃

研

丹砂

研各
壹兩

黃連

去
須

桂

去
皮

烏賊魚骨

各半
兩

特生礬石

鍊成者
壹分

赤足蜈蚣

半枚
炙

附子

炮裂去皮
齊壹兩

巴豆

參拾枚
去皮心

綃袋貯灰汁煮
半日別搗如泥

右一十一味並搗研為末鍊蜜和成劑蜜器盛勿令泄氣每用旋丸兒生十日至三十日服如黍米大二丸乳汁下四十日至

百日服如麻子大三丸米飲下一歲至三歲以意增之兒雖小而宿實甚者亦當增丸數

治小兒丁奚堅癖黃瘦髮脫代赭丸方

代赭 碎

大黃 剉炒

丹砂 研各壹兩

鼈甲 醋炙黃去裙爛參分 芍藥

木香

杏人 湯浸去皮尖炒黃別擣如膏

知母 焙

巴豆 去皮心研紙裏出油柒遍各半兩

右丸味擣研為末鍊蜜為丸百日兒如菘豆大一丸二百日兒二丸二歲兒三丸米飲下以溏利為度

治小兒丁奚腹大疳氣羸瘦黃連丸方

黃連 去須 桂 去麋皮

代赭 碎各壹兩

木香 杏人 湯浸去皮尖雙麩炒別研

肉豆蔻 去殼各半兩 丹砂 研 麝香 研各壹分

巴豆 去皮心膜出油盡壹錢別研

右九味搗研為末令勻鍊蜜和丸如麻子
大每服粥飲下三丸量兒大小加減服之
治小兒食不生肌肉丁奚腹大飲食不消芍
藥丸方

芍藥 炒參 兩

大黃 剉 炒

桂 去麋 皮

赤茯苓 去黑 皮

茈胡 去苗各 貳兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸一歲兒如麻
子大二九煎蜜湯下早晚各一服更量兒

大小加減

治小兒丁奚腹大羸瘦骨立疳氣水穀不消

訶梨勒丸方

訶梨勒 煨去核 參分

肉豆蔻 壹枚 去殼

青黛 研

麝香 研

盧會 研

熊膽 研

丹砂 研各 壹分

右七味搗研為末粟米飯和丸如黍粒大
每服七丸粥飲下日二服量兒大小增減

治小兒腹大羸瘦疳氣脹滿腹痛減食使君子丸方

使君子 壹兩

木香

胡黃連

麝香 研

盧會 研各半兩

蟾頭 壹枚炙令焦

墨 搗研

青黛 研

雄黃 研

熊膽 研各半兩

右一十味搗研為細末鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下十九量兒大小增減

治小兒傷食失衣當風濕冷水浴腹大丁奚時下痢寒熱如瘧不欲飲食雖食不充肌肉又不能消化羸瘦不耐人參丸方

人參

麥門冬 去心焙

半夏 湯浸拾遍去滑

黃耆 剉

大黃 剉炒

苦參 剉

礬石 煨汁盡研

甘草 炙剉

遠志 去心

黃芩 去黑心各參分

消石 研

芎藭 各半兩

右一十二味搗研為末鍊蜜為丸如麻子

大一二歲兒每服三丸米飲下四五歲兒
五丸早晚各一服量兒大小加減

治小兒堅痞面黃羸瘦下痢不欲食食不充
肌心中躁悶時發寒熱五藏虛脹腹中疝痛

蜀漆丸方

蜀漆

細辛

葉

龍膽

附子

炮裂去皮
臍各半兩

乾薑

炮

牡丹皮

蜜

炒

桂

皮

曾青

研各
參分

右九味擣羅為末鍊蜜和丸如菉豆大空

心五丸米飲下量兒大小加減

治小兒下痢腹大項細貪食不充肌肉黃瘁

又名無辜黃芩丸方

黃芩

去黑
心

黃連

去須各
半兩

附子

炮裂去
皮臍壹

枚半
兩考

右三味擣羅為末用黃雌雞肥嫩者一隻
去毛勿令著水腹上開一小竅子取去腸

肚內藥末於飯上蒸餾即取出暴乾不用
雞為末軟飯丸如棗豆大量兒大小十九
至十五丸二十九米飲下不拘時候日三
小兒脾胃氣不和不能飲食

論曰脾胃者倉廩之官水穀入胃脾主磨而
消之脾與胃合俱象土其氣喜溫而惡寒故
府藏內溫則消穀引食若脾胃虛寒則食物
化遲故不能飲食

治小兒脾胃氣不和不能飲食溫脾人參湯方

人參參分

白朮半兩

訶梨勒皮分

木香半兩

黃耆剉半兩

白茯苓去黑皮參分

藿香葉半兩

陳橘皮湯浸去白焙半兩

桔梗半兩炒

甘草炙微赤剉五分

右一十味鹿藹篩每服一錢匕水七分入
生薑二片棗一枚擘手煎至四分去滓不計
時候量兒大小增減溫服

治小兒脾胃氣弱乳不消化陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙

高良薑

人參

各壹分

白茯苓

去黑皮半兩

甘草

炙剉半分

右五味麋擣篩一二歲兒每服一錢匕水

七分煎至三分去滓食前溫服至晚三服

隨兒大小增減

治小兒脾胃氣不和憎寒壯熱不納乳食白

豆蔻湯方

白豆蔻

去皮

甘草

炙赤剉

陳橘皮

湯浸去白焙

芎藭

枇杷葉

拭去毛炙粉黃各壹分

乾木瓜

蕃薯

剉

人參

各半兩

右八味麋擣篩每服一錢匕水七分入生

薑二片棗一枚擘破煎至四分去滓不計

時候量兒大小分減溫服

治小兒脾胃氣不和腹脅妨悶不能飲食四

肢羸弱六味人參湯方

人參

甘草炙

丁香

黃耆

剉各壹分

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒皮

各半兩

右六味麋搗篩每服一錢匕水七分入生薑

薑二片棗一枚擘煎至四分去滓食前溫服量兒大小以意加減

治小兒脾胃虛冷吐利不思飲食和中湯方

人參壹兩半 白朮 白茯苓去黑皮各壹兩

甘草

炙剉

厚朴

去麋皮生薑汁炙各叁分

厚朴

剉

白朮

去麋皮生薑汁炙各叁分

右五味麋搗篩三四歲兒每服一錢匕水

半錢同煎至三分去滓帶熱服至夜可三服量兒大小以意增減

治小兒脾胃氣不調不嗜食飲乾地黄丸方

生乾地黄焙半兩 大黃剉碎炒令香半兩 白茯苓去黑皮壹分

當歸

炙半兩

苡胡

去苗半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙

人麋炒

黃半兩

當歸

炙半兩

苡胡

去苗半兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如麻子大每

服五丸生薑湯下日三服隨兒大小以意
加減不拘時

治小兒脾胃虛冷氣逆不能飲食橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去麋皮各壹兩

右二味剉碎分作三貼每用一貼以水三

盞入薤白五莖細切黍米一合同煮稀粥

熟去藥分二服

治小兒傷冷脾胃氣不和腹痛不欲飲食高

良薑湯方

高良薑

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

草豆蔻

去皮

當歸

剉碎微炒

桂

去麋皮各壹分

人參

半兩

右六味麤擣篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒脾胃氣虛乳不消腹脹白朮湯方

白朮

人參

厚朴

去麋皮生薑汁

炙各壹分

右三味麋擣篩一二歲兒每服一錢匕水
半盞煎至三分去滓溫服至晚三服隨兒
大小以意加減

小兒欬嗽

論曰肺之合皮也其榮毛也而主氣其俞在
背若風冷傷之皆令欬嗽小兒血氣肌膚嫩
弱若襁褓解脫不時風寒傷於皮毛搏於肺
氣則成欬嗽其乳子未滿百日傷於背循俞

而入者則病難治

治小兒一切欬嗽解寒壅杏仁湯方

杏仁

生去皮
尖雙人

知母

焙

貝母

去
心

款冬花

仙靈脾

麻黃

去根
節

甘草

炙

人參

赤茯苓

去黑
皮

玄參

等
分

右一十味麋擣篩每服一錢匕水七分煎
四分去滓溫服如傷寒嗽入葱白鹽豉煎

更量兒大小加減

治小兒欬嗽紫苑散方

紫苑去土

貝母去心各半兩

款冬花壹分

右三味搗羅為散每服一字至半錢匕用生薑米飲調下更量兒大小加減

治小兒欬嗽汗出杏仁湯方

杏仁去皮尖雙仁炒肆拾玖枚

皂莢去皮酥炙壹挺

甘草生用

蛤粉各壹兩

惡實炒半分

紫苑去苗土壹分

右六味麋搗篩每服半錢匕水半盞入藜

汁少許煎三五沸去滓溫服更量兒大小

加減

治小兒暴嗽五味子湯方

五味子

桂去麋皮

乾薑炮等分

右三味麋搗篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓量大小加減溫服

治小兒肺經感寒語聲不出人參湯方

人參

甘草 炙

黃明膠 炙燥各壹分

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

麻黃

去根節

貝母

去心各半兩

右六味麤擣篩每服一錢匕水七分入糯

米少許同煎至四分不計時候去滓量

小加減溫服

治小兒欬嗽金黃散方

鬱金

壹兩入防風去叉阜莢各半兩巴豆拾肆枚用河水兩椀煮水盡不

用參味只取鬱金擣為末 甜消 研

雌黃 研各半兩

右三味擣研為散每服一字匕煎蟬蛻烏

梅湯調下

治小兒哽氣欬嗽痰熱益消丸方

益消

馬牙消

甜消

鉛白霜

丹砂

續隨子

青黛

白礬

燒汁盡

膩粉

各壹錢

龍腦

麝香

各壹字

右一十一味並細研為末粳米飯為丸三歲已上如雞頭實大二歲已下如梧桐子大三兩箇月兒如小豆大一丸並用茶湯化下

治小兒胃虛噦逆欬嗽吐乳食香枳散方

藿香

貳拾壹葉

枳殼

貳片濕紙裏焙

蚌粉

壹塊如枳殼大

石三味搗羅為散每服半錢匕米飲調下更量兒大小加減

治小兒欬嗽喘悶貝母散方

貝母

去心麩炒半兩

甘草

炙壹分

右二味搗羅為散如二三歲兒每一錢匕水七分煎至四分去滓入牛黃末少許食後溫分二服更量兒大小加減

治小兒欬嗽三灰散方

巴豆

去殼

杏仁

去尖

半夏

等分

右三味用瓷合盛以赤石脂閉口炭火煨

令透赤取出放冷細研二歲兒每服半錢
匕淡生薑湯下更量大小加減

治小兒一切欬嗽鬱鬱金散方

鬱鬱金 剉半兩

防風 去叉切

半夏 切各壹分

巴豆

去殼貳拾壹粒

皂莢

剉壹挺

右五味以水一升同於銀石器內煮令乾
去巴豆皂莢不用以溫湯洗餘三味焙乾
搗羅為末每服半錢匕生薑蜜熟水調下

更量兒大小加減

治小兒感寒欬嗽痰涎不利貝母散方

貝母

去心

皂莢子

炒焦色各半兩

葶藶子

隔紙炒壹分

甘草

炙剉半兩

右四味搗羅為散每服半錢匕米飲調下
乳食後服

治小兒痰嗽半夏丸方

半夏

茶枝圓大者湯洗染遍切生薑汁浸壹宿焙

定粉 研

白礬

燒令汁盡 各壹錢

右三味搗羅為末麪糊丸如麻子大濃煎
白茅根湯下三九五丸量見大小加減食
後服

治小兒欬嗽杏仁煎丸方

杏仁

去皮尖雙人生 研肆拾玖枚

阜莢

椎碎 半枚

栝樓

大者 壹枚

生百部

壹兩肆味並用水 按搗絞取濃汁後

同入銀石器內 慢火熬成膏

牽牛子

搗末 壹兩

木香

半分

右六味後二味搗為末入前四味膏內和
丸如菉豆大每服三九五丸糯米飲下量
兒大小加減

治小兒欬嗽蜂房灰散方

露蜂房

貳兩

右一味以快火燒為灰研細每服一字匕
飯飲調下

治小兒涎嗽不止注脣散方

防風

肥實者參握去義用半夏小枚鬱金壹枚並推碎豬牙皂莢叁條剉

用水壹椀同黃水盡為度只取防風切焙為末

滑石 碎

白殭蠶

炒貳味為末各壹錢

右三味同研勻每服一字匕用蜜調塗在

兒脣上令兒呷喫

治小兒涎嗽延胡索散方

延胡索

半兩

鉛白霜

研壹分

右二味搗研為散和勻每服一字匕塗乳

上令兒呷之

治小兒妳食衝脾傷風欬隊涎葶藶子丸方

葶藶子

紙上炒壹分

牽牛子

炒

防已

杏人

去皮尖雙入炒研各壹兩

右四味搗研為末煮棗肉丸如棗豆大每

服三丸至五丸量兒大小加減生薑湯下

日再

治小兒欬嗽桃花散方

蛤蚧

酥炙 壹錢

蛤粉

研貳 錢

芎藭

壹分

丹砂

研半 錢

右四味搗研為散每服半錢匕温薑汁調下量大小加減乳食後服

治嬰兒未滿百日欬嗽注脣疳方

白殭蠶

蜜炙拾伍枚

雄黃

研半 錢

杏仁

湯浸去皮尖雙

人炒 研

貝母

去心各 柒枚

龍腦

研壹 字

右五味搗研為末生蜜和為膏每用少許

注脣上令兒呷之

治小兒月內及百晬暴嗽吐乳嘔逆不得息

桔梗湯方

桔梗

炒

紫苑

去苗土 各叁分

麥門冬

去心 焙壹

兩叁 分

甘草

炙剉 壹分

右四味鹿搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓温服量兒大小加減

治小兒寒壅痰涎欬嗽不止潤肺湯方

麻黃

去根節煎
掠去沫焙

人參

各貳
兩

杏仁

湯浸去皮
尖雙入炒

貝母

去心各
貳兩半

甘草

及壹
兩

陳橘皮

去白焙
壹分

桔梗

炒

阿膠

炒令燥
各半兩

右八味麈擣篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓溫服不拘時候量兒大小加減

治小兒寒壅不調欬嗽痰涎半夏丸方

半夏

熱湯洗參柴
遍去滑焙

葶藶子

水淨
淘洗

別研
為膏

杏仁

湯浸去皮尖雙入麩
炒別研為膏各半兩

五靈脂

微
炒

丹砂

別研各
壹兩

右五味擣研為末生薑汁煮麩糊丸如黍

米大每服五丸至七丸食後淡生薑湯下

治小兒欬嗽白散子方

栝樓根

知母

焙

貝母

去
心

甘草

炙剉
等分

右四味擣羅為散每服半錢匕煎黃蠟米

飲調下

治小兒欬嗽貝母飲方

貝母

去心 麩炒

麻黃

去根節煎 掠去沫焙

紫苑

云 土

甘草

多各 壹分

杏仁

湯浸去皮尖 雙入炒叁分

麥門冬

去心焙 半兩

右六味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕水

七分煎至四分去滓溫服

治小兒肺感風寒呀呷欬嗽清膈丸方

半夏

湯浸洗過 去滑焙

白礬

熬 枯

鉛白霜

滑石

天竺黃

各等 分

右五味搗研為細末麩糊丸如菉豆大
服五丸量兒大小加減薄荷湯下

治小兒熱嗽消礬散方

馬牙消

白礬

各半 斤

鉛丹

壹分

右三味同研入合子固濟火燒合紅覆潤

地一夜加龍腦半錢匕同研每服一字匕

甘草湯下更量大小加減

治小兒呀呷不止方

豬腸一截 鬱金末

蚌粉 各壹兩

右三味將二味內腸中繫兩頭慢火炙乾
為末細羅每服半錢匕夜卧熟水調下立
服頓服盡永不發

大德重校聖濟總錄卷第一百七十五

大德重校聖濟總錄卷第一百八十三

乳石發動門

乳石將適失度

乳石發動寒熱

乳石發渴

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

乳石發動吐血衄血

乳石發目昏赤痛

乳石發癰疽發背瘡腫

乳石發身體生瘡

乳石發口舌瘡爛

乳石發動統論

論曰內經謂石藥性悍非緩心和人不可

夫聖人垂訓深矣世之服乳石者至於輕生
傷性恃毫髮所得不戒夫毒烈之過天於中
道十有七八夫豈知大治範形精全神固

論曰服食藥劑皆有常式戒慎將適每務

至引此石慄悍尤當謹畏鍊食之後宜如何

人服居處勞佚溫熱寒涼之度所當

無慮數十一失其度疾疢之孽速

影響音蓋精明非華佗審治非仲景輕信即

食棄是從非動發急難不知解救則有

息節度專意候察者亦庶幾免於困藥

治乳石發動咽痛鼻塞清涕出者此為衣

温近火方

右宜速脫衣當風取冷以冷石熨咽鼻即差
治乳石發動輒安卧不與人語者此爲
食少失其性方

右宜與熱酒冷洗冷食自勞即差

乳石發動耳鳴如風聲又有汗出者此爲
勞過度陽事不節氣上方

右宜數飲食補之節禁陽事即差

治乳石發動關節強直不可屈伸者此爲久
停息不自勞曳藥氣不散漸侵筋血方

右宜出力使温冷水洗之即差

治乳石發動身體痛楚無常處如遊風者此
犯熱所作方

右宜冷洗以冷石熨之即差

治乳石發動服藥心悶亂者此爲服温藥
疾爭力方

右當大吐或不吐病當困斃若吐不絕者
可冷食飲即差若絕不識人口不開者

當珍齒以熱酒灌之入咽吐出者更

之但得酒氣下通不半日即蘇

治乳石發動臂脚偏急痛苦者此爲久坐

溫熱不自移轉氣入肺脾胃方

勤以布巾浸冷水搨之覺溫則易三日即

治乳石發動似傷寒溫瘧者此爲犯熱方

