

朱山

禡凶

日

本草綱目拾遺果部下目錄

諸荔

殼

龍眼核

殼

蜜望

蒲桃樹

荸薺粉

野荸薺

櫻桃核

山櫻桃

栗殼

刺菱

沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓

猴闌子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

揚搖子

海梧子

木竹子

櫟罟子

橈子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

千歲子

侯騷子

仙掌子

酒杯藤子

藥果

蘭子

楸子

喂支

呂宋果

本草綱目拾遺卷八

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

果部下

諸荔

殼

陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有存者今錄之於左以備用

粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離枝亦曰麗枝麗離也文從兩日天地之數水一而

火二故麗從兩日日爲五行之華月爲六氣之精
日麗乎支猶之平日出於扶桑也麗枝乃震木之
大者震木以扶桑爲宗子而麗支其支子故曰麗
支日出於離離盡午中故麗支以夏至熟離爲坤
之中其色黃故曰黃離麗支之核外赤內黃則黃
離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少
酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華
夏至而翕然子赤生於木而成於火也皮紅肉白
而核復純丹火包其外復孕其中也肉白爲金金

爲內外火所煉故味醇和而甘其液乃金水之精
甘又屬土備五行之粹美而以火爲主者也粵以
火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太
陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支爲長火
爲母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲
蜜一杯卽解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒
過醉則以荔支殼浸水飲之又荔支多露有過食
者味爽就樹閒先吸其露次嚥其香使氤氳若醉
五內清涼則可以消肺氣滋真陰卻老還童○荔

支歲初而蕾二月而花發發時多電則花落實小
多雨則花腐少雨則花液相膠而不實估計者視
其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完
好者留蒂寸許蠟封之乃翦去蒂以蠟封翦口以
蜜水滿浸經數月味色不變

保和枝 產泉州北陳巖山蓮花峯實大色黃可
消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已
痢止腹痛

回春果 產漳郡康仙祠葉大如掌色翠與眾荔

殊其實味苦澀酸粹不可口采以浸酒能已風去
癟治癩如神葉亦然

以上閩產

紫玉環 產四川瀘洲曝乾啖一枚可除瘴癘卽
早行大霧中嵐氣不得侵也

以上川產

玉露霜 產廣東新會崖門山白殼丹肉不摘經
冬不落其味甘酸啖之止嗽降肺火療怯症

妃子笑 產佛山色如琥珀大如鷺卵核小如豆
漿滑如乳啖之能除口氣使齒牙經宿猶香

牟尼光 產潮州大浦山中味如乳飲之功同參

本草綱目拾遺 卷之四
斧以上廣東產

墨荔 產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭而苦粹不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁二邑山中多有之味臭有大毒誤食之必心腐腸爛而死

按荔支名品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療各異故類及之

殼 痘出無漿心不爽快以荔支殼煎湯飲

不藥良方

○王聖俞云荔殼能理血透發分標凡一切疹瘡不能透達痘出模糊一片者非此不能解表成漿

血崩 同壽錄用荔支殼燒灰存性研末好酒空心調服每服二錢輕者一服卽止至重者三服愈

龍眼核

殼附

綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣止載其能治胡臭他皆未之及又不及其殼今悉採他本補之

腦漏 黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒烟起將筒熏入患鼻孔內數次卽愈

本草綱目拾遺 卷之五
一切瘡疥 高只元傳世方用龍眼核煅存性麻油調敷卽愈

治癬 祝氏效方圓眼核二個去外黑皮搗碎雄黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共爲細末以生薑蘸擦患處卽愈○集聽方患癬用龍眼核去外黑殼用內核米醋磨搽

減斑生髮 張觀齋云桂圓核仁凡人家有小子女者不可不備遇面上或磕傷及金刃傷以此敷之定疼止血生肌愈後無瘢若傷鬚髮際愈後更

能生髮不比他藥愈後不長髮也

小腸疝氣 不藥良方荔支核龍眼核各七枚俱燒灰大茴二粒炒共爲末好酒調下外用生薑搗爛敷腎卽消○經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛神效荔支核炒龍眼核炒小茴香炒各等分爲細末空心服一錢以升麻一錢水酒煮送下

念珠丸 張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難忍乳香去油淨二錢圓眼核三錢黃蠟二兩和藥末成丸彈子大分爲一百零八丸蛤粉爲衣用線

穿起露一宿收貯遇症每服三丸乳香湯下
小便不通 用龍眼核去外黑殼打碎水煎服如
通後欲脫者以圓肉湯飲之

足指癢爛 藥鏡用桂圓核燒灰摻之立效

無名腫毒 黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱效能
止折傷出血療金瘡滅斑

烟筒傷喉 萬近蓬云凡烟管誤戳傷喉出血不
止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁焙擣爲極
細末看喉中傷處用筆管安末吹之卽定疼止血

而愈屢試果驗

治刀傷出血 殷仁趾傳方以龍眼核炒擣磨細敷之

刀斧傷 黃販翁醫抄桂圓核不拘多少用火燒枯存性研末摻患處卽愈

按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核末敷金刃傷昔在西秦及巴里坤軍營救愈多人查本草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計矣

龍眼殼○乃龍眼外裏肉之殼本黧黃色閩人恐其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也廣中桂圓多不用薑黃拌故今廣圓猶存本色入藥用殼須洗去外色黃者

敷湯泡傷 行篋檢祕用圓眼殼煅存性爲末桐油調塗患處卽止痛愈後又無斑痕真良方也

泉州府志龍眼最小者呼鬼眼龍眼是其中者今不復識別

蜜望

粵志其子五月色黃味甜酸颶洋者兼金購之有
天桃與相類六七月熟大如木瓜味甜酢以羹魚
尤善凡渡海者食之不嘔浪

肇慶志蜜望子一名莽果樹高數丈花開極繁蜜
蜂望之而喜故名交廣錄蜜望二月開花五月子
熟色黃一名望果其類有天桃正月開花六七月
子熟年歲荒則結實愈多粵謠云米價高食天桃
故廣人貴望果而賤天桃貴之故望之蜂望其花
人望其果也

止船暈

按船暈北人謂之苦船苦音庫此症多嘔吐不食登岸則已胃弱人多有之蜜望果甘酸能益胃氣故能止嘔暈

蒲桃樹

羅浮志蒲桃樹高三三丈其葉如桂四時有花叢鬚無瓣如翦出絲毬長寸許色兼黃綠結實如蘋果殼厚半指絕香甜核與殼不相連屬搖之作響羅浮瀾中多有之猿鳥含啄之餘隨流而出山人

阻水取之動盈數斛以之釀酒曰蒲桃春經歲香
不減作膏尤美

荸薺粉

童北硯食規出江西虔南土人如造藕粉法製成
貨於遠方作食品一名烏芋粉又名黑三稜粉

甘寒無毒毀銅銷堅除腹中痞積丹石蠱毒清心
開醫去肺周經溼熱過飲傷風失聲瘡毒乾紫可

以起發

北硯
食規

野荸薺

生山土中春有苗三葉似韭而細葉上有光其根如豆大年久則愈大入藥用根一名山蓼薺

磨粉水中瀘過曬乾點眼去翳障如神

取粉忌
鐵器

按山蓼薺喜燥其生必於高原乾土尤最易蕃衍有人移入園圃一經汙溼根卽朽爛然其生不易長百年纔如錢大耳昔客東甌聞馬氏點眼藥粉爲天下第一見其脩製乃用此磨粉合海鰓目珠粉加入藥中著效異常云其性能去面黤斑痣消痞去目星努內較產池澤者尤峻利也

磨光散 種福堂方點眼神藥用野荸薺粉洗淨
去皮石臼中搗爛密絹絞汁如做藕粉法再用清
井水飛曬乾爐甘石用黃連黃柏黃芩甘菊薄荷
煎水煅再用童便煅一次將藥水飛曬乾珍珠入
豆腐內煮過研細水飛每荸薺乾粉一兩配製過
甘石五錢珠末三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配
和加冰片少許點之

明目去翳祕方 種福堂方錦紋大黃一兩北細
辛四兩將二味用上高泉水一百二十兩將藥入

砂鍋煎至二十兩以細絹瀘去渣用大銀盃一個盛藥盃下以磚三塊放定盃底下將燈盞注麻油用燈草七根燃燈熏盃底內煎藥成膏滴水成珠每膏一兩用野荸薺粉五錢多些亦不妨冰片三分和勻作錠如多年厚翳每兩加水飛過蟬蛻末五分須要去頭足泥沙水洗曬乾爲末水飛三次用○又方野荸薺粉豬胰各等分搗和用雞子殼半個放藥在內臨臥合印堂上俟水流入目中醫隨淚出二十日卽愈并治田螺頭眼

櫻桃核

今人常用以洗瘡瘍服之亦發透瘡痘以其得春氣早而性熱善達表也綱目不載豈以發風熱故耶逢原云櫻桃核今人用以升發癥斑力能助火大非所宜春夏時尤忌入藥用山櫻桃核佳

發癩瘡瘍痘滅斑痕凍瘡

出痘喉啞 王永光方用甜櫻桃核二十枚砂鍋內焙黃色煎湯服

眼皮生瘤 醫學指南用櫻桃核磨水搽之其瘤

漸漸自消

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種

辛平味劣止瀉腸癖除熱調中

栗殼

綱目載其治反胃消渴瀉血此外無他不知其能
解參之力勝於萊菔故急錄之○楊春崖驗方解

人參栗子殼煎湯服之良

刺菱

沙角

乃小菱也生杭西湖裏六橋一帶多有之以其四
角尖如鍼芒刺手故名春盡時兒童採取入市貨
賣菱生水中根苗與大菱不殊其葉下有氣管故
其性通肝腎凡一切病多忌生冷惟此菱不忌最
能開胃生津其菱大者如蠶豆小者如黃豆味絕
鮮美雖至秋老亦不甚大蓋地土使然誠水仙佳
種也○陳淏花鏡一種最小而四角有刺者曰刺
菱野生非人所植花紫色人曝其實爲菱米可以

點茶

味甘鮮性平無毒生食補脾健胃止渴生津平肝氣通腎水益血消食老者煮食健脾止洩痢

根利水通淋

沙角

乃菱中一種小者止兩角臨平湖一帶多產之出嘉興者名餛飩青以其似餛飩也較他菱體小味甘沙角較餛飩菱尤小色紅味甘異常

味甘平大補脾土不滯氣 餛飩青性寒生食解積暑煩熱生津煮食健脾和胃益氣

花鏡云遲熟而甘肥者名

餛飩菱藥性考 餛飩沙角生熟俱得老
則甘香補中益氣生者解酒能壓丹石

烏欖仁

出廣東今果肆皆有市者皮黃黑色肉白有文層
疊如海螺蛸狀酒筵中以爲豆籩食品綱目集解
下云烏欖青黑肉爛而甘取肉搗碎放乾自有霜
如白鹽謂之欖醬其子仁肥大名欖仁而主治所
載悉言白欖卽今常食之青果又所載欖仁可治
吻燥者亦指青菓核中仁而言非指烏欖仁也今
採嶺南果錄中補其遺按粵志木語橄欖有青烏

二種閩人以白者名青果粵中止名白欖不曰青果也白欖利微人少種焉烏欖下番禺諸鄉皆種之種至二年其秧長八九尺必撻之乃結實撻至三年而子小收十年而大收矣其樹本高而端直多獨幹至頂乃布枝柯有雌有雄雄爲主雌爲客猶婦之歸於夫也子如棗大長寸許光無棱瓣先生者下向後生者上向八九月熟梯子擊以長竿或刻其幹東寸許納以紅鹽則其幹東子落刻其幹西或南北亦然古詩所云紛紛青子落紅鹽也

烏欖子大肉厚其性溫故味濶甘以溫水泡軟俟
紫脂浮起溢出乃可食水冷則生膠熱則肌膚反
實故必溫水之和乃醕其性亦有婉諫之道焉總
二欖論之白欖雄而烏欖雌白屬陽而烏屬陰陽
故色白而行氣陰故色紅而補血惟烏者陰故有
仁可食白者陽故仁小而不成此其別也

仁味甘淡潤肺下氣補血殺諸魚毒

刺梨

宦遊筆記刺梨形如棠梨多芒刺不可觸味甘而

酸澆漬其汁同蜜煎之可作膏正不減於楂梨也
花於夏實於秋花有單瓣重臺之別名爲送春歸
密萼繁英紅紫相間植之園林可供玩賞獨黔中
有之移於他境則不生殆亦類優曇花之獨見於

南滇耶

食之已悶消積滯

筆記

枇杷核

本經逢原云枇杷其核大寒伐肝脾以之同落蘇
入麌醬則色青翠同蠟入鍋則至熟不赤性寒走

肝可知敏按石頑所說以其核能駐色不變斷爲性寒不知枇杷獨具先天四時之氣其性溫平其核能化一切毛羽觀花圃人貯雞鶩毛水以灌花者患其難化輒擣枇杷核數枚投於缸水中不三日則雞鶩毛皆爛化知其直走厥陰更捷利也

治肝有餘諸症氣實者可用

敏按祝士校游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疎一合一

方草綱目辨述 卷之三
離正見互爲乘除之妙物理小識枇杷核能去徽垢故能化痰

羊桃

粵語其種來自大洋一曰洋桃高五六丈大者數圍花紅色一蒂數子七八月間熟色如蠟一名三斂子亦曰山斂斂棱也俗語誤棱爲斂也亦以其味酸能斂顏色也有五棱者名五斂以糯米水澆則甜名糯羊桃廣人以爲蔬綱目五斂子卽羊桃惟言其主治風熱生津止渴他功效皆未及今依

粵語補之○爾雅長楚跳蕘註今羊桃也或曰鬼
桃葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機疏云葉長
而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上鄭
氏曰藤生子赤狀如鼠糞故亦名鼠矢兒童食之
一名羊腸一名御弋蜀本圖經子細如棗核苗長
弱蔓生不能爲樹今呼爲細子根似牡丹羣芳譜
羊桃福州產其花五瓣色青黃詩檜風隱有蔓楚
猗儼其枝卽指此也

酸甘濶平無毒久食能辟嵐瘴之毒中蠱者搗自

然汁飲毒卽吐出脯之或白蜜漬之持至北方不服水土與瘧者皆可治○嶺南雜記有食豬肉咽喉腫痛食羊桃卽解

藥性考羊桃生時極酸不可食熟則帶甘過食寒中內熱者宜之多食冷脾胃動洩澼可曬乾歌曰獮猴桃寒酸甘止渴調中下氣解煩除熱骨節風痛能壓丹石通淋療痔癰可煎食

倒捻子

綱目都念子卽倒捻子僅言其治痰嗽噦氣暖腹

臟益肌肉而已時珍曰食之必倒捻其蒂故謂之
倒捻子訛爲都念子也味甚甘軟粵語都念子樸
櫟叢生花如芍藥而小春時開有紅白二種子如
軟柿外紫內赤亦小有四葉承之子汁可染若胭
脂花可爲酒葉可麴皮漬之得膠以代柿蘇子瞻
名爲海漆非漆而曰漆以其得乙木之液凝而爲
血可補人之血與漆同功功逾青麪故名以其爲
用甚眾食治皆需故名都念產羅浮者高丈許子
尤美嶺南酒有以花爲釀而雜以諸果者花則以

檳榔花爲最果則以倒捻子爲最倒捻子又名黏
子花於暮春實於盛夏諺曰六月六黏子熟熟以
爲酒色紅味甘人與猿猴爭食之所在皆然

東坡雜記吾謫居南海以五月出陸至滕州自滕
至儋野花夾道如芍藥而小紅鮮可愛樸櫟叢生
土人云倒黏子花也至儋則已結子爛紫可食殊
甘美中有細核嚼之瑟瑟有聲亦頗苦沁兒童食
之使大便難野人夏秋下痢食葉輒已
子活血補血研瀘爲膏餌之又止腸滑

甘蔗滓

皮

綱目甘蔗條瀨湖特補蔗滓言其治小兒白禿瘡
烟入目令目暗其他未能悉今復廣之

救生苦海收口長肉背疽惡瘡用之屢效收甘蔗
滓曬燥煅存性研極細以小竹管如瘡口大者一
箇以細夏布紮緊於上篩藥填滿瘡孔內膏藥蓋
住自能收口

醫鍵云對口一名梟疽用甘蔗滓焙燥爲末白色
狗屎焙末和勻將竹管一箇稀絹包竹管頭入藥

篩膏藥上貼之垂死者亦生

痘疔 經驗單方用甘蔗滓曬乾真香油點燈燒成灰以津液調勻銀簪挑破點上立效一方加珍珠油胭脂調塗更效○敏按蔗有數種紫皮者名崑崙蔗青皮者乃扶風蔗也黃海若云凡痘疹不出及悶痘不發毒盛脹滿者此痘屬急症宜青皮甘蔗榨汁與食不時頻進則痘立起其寒散解毒之功過於蚯蚓白鵠惜人不知其功用入藥如用滓亦宜以青皮蔗滓爲上

蔗皮 綱目止載治口瘡而不知其皮可入香料
海外三珠有四乘香餅乃用蔗皮又乾者墊臥可
去鬱熱本草匯有接氣沐龍湯亦用其皮故爲補
其說

臘梨初起 百草鏡紫甘蔗皮煅存性香油調搽
接氣沐龍湯 專治陽衰久痿滑精不用內服惟
主外治太約患此者或由稟弱或由縱慾或憂鬱
所致或心腎不交用此最妙紫稍花甘草甘遂良
薑文蛤母丁香巴戟天川烏附子吳茱萸川椒細

辛淫羊藿蛇牀子棟樹子甘松各一兩瑣陽蓯蓉
官桂羊皮紅蘿蔔皮滿山紅瞿粟殼水泡去筋各二
兩紅豆七十粒須擇酒藥內所用者白頸蚯蚓
七條炙倭鉛八兩切薄片勻七劑每日一劑瓦鍋
內煎湯先熏後洗以冷爲度晚重溫藥湯再洗如
此七日內禁房事

坐板瘡

甘蔗皮燒存性香油調塗

家寶方

竹衣乖

經驗廣集此藥治竹衣乖并無皮膚膿

血淋漓赤剝楊梅一切胎毒用爐甘石煅淬入黃

連汁三次童便四次一兩黃藥豬膽塗炙七次紫
甘蔗皮燒存性孩兒茶赤石脂各五錢菉豆粉炒
七分冰片五分爲末先用麻油將雞蛋黃煎黑去
黃候冷調塗卽愈

猴闔子

宦遊筆記出臨海深山茅草中土名仙茅果秋生
冬實樵人採食并可磨粉其性溫補然城市亦無
食之者綱目有猴騷子形與此別又臨海出猴總
子一名土柿每年九十月閒生形與紅柿同皆非

本草綱目指遺 卷八
一物臨海異物志猴闌子如指頭大味苦可食他處所無

性溫暖丹田益五臟健脾增氣力

瓜子殼

傳信方治腸紅不論新久三服全愈用地榆炒黑一錢白薇一錢五分蒲黃炒黑一錢桑白皮一錢五分瓜子殼二兩煎湯代水

不藥良方單用瓜子殼一味煎服治腸風

下血

吐血 不藥良方瓜子殼一茶鍾煎湯一盃喫下

血卽止

蒲桃殼

止呃忒如神

橙餅

同壽錄有製橙餅法方擇半黃無傷損橙子太青者性硬難酥將小刀划成棱入淨水浸去酸澀水一二天每日須換水待軟取起擠去核再浸一两天取起將簪腳插入每縫觸碎內瓢然後入鍋用清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白

洋糖須乘熱卽拌卽日曬之待糖喫進再摻再曬令糖喫足將乾糖再塞入橙肚內略壓扁入瓶貯用亦可點湯服

消頑痰降氣和中開胃寬膈健脾解魚鱗毒醒酒若氣虛瘰癧者勿服

津符子

產緬甸見千金方

味苦平性滑主益心血養肺金止渴生津液多食口爽失滋味安和五臟久食輕身明目治瀉痢不

止男女虛勞咳嗽吐膿血肺癰肺痿聲啞欲死者
每日啖十枚一月不間斷卽愈

必思答

產回回國地見忽必烈飲膳正要

味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人
三陰瘧百藥不效必思答三枚酒一盞煎半飲之
卽止

難產不下或子死腹中必思答七枚酒煎服之卽
下又治胞衣不下

黃皮果

廣志黃皮果狀如金彈六月熟其漿酸甘似蒲萄
與荔枝並進荔枝饜飮以黃皮果解之諺曰飢食
荔枝飽食黃皮綱目於果部附諸果條下僅引海
槎錄云出廣西橫州狀如棟子及小棗味酸至其
功用並未之及焉今依廣志補之

消食順氣除暑熱

廣志

酸平無毒主嘔逆痰水胸膈

滿痛蛇蟲上攻心下痛

食物本草

敏按廣東瑣語載果中有白蠟子與黃皮果絕相

似而味尤勝諺有云黃皮白蠟甜酸相雜想功效亦不甚遠也

廣東通志黃皮果大如龍眼又名黃彈子皮黃白有微毛瓢白如肪有青核數枚甚酸澀食荔支太多用黃皮果解之

甘劒子

狀如巴欖子仁附肉有白醫不可食能發人病北人呼爲海胡桃

味甘氣烈治脾胃虛寒食少洩痢不止形體尪羸

本草綱目拾遺 卷之三
洩下虛脫百方不效用甘劍子七枚連殼煅爲末
空心酒下三服卽止再服調理藥

揚搖子

生閩越其子生樹皮中體有脊形甚異長四五寸
味甘無毒通百脈強筋骨和中益氣潤肌膚好顏
色○花鏡此果長五寸色青無核臨海異物志揚
搖有七脊子生樹皮中其體雖異味則無奇長四
五寸色青黃味甘

海梧子

出林邑樹似梧桐色白葉似青桐子如栗肥甘可食○南方草木狀占城卽林邑產海梧子與中國松子同但結實肥大形如小栗三角肥甘樽俎閒佳果也

味平無毒利大腸小腸益智慧開心胸明耳目心下怔忡夜多惡夢健忘每日空心食海梧子十數枚月餘自愈

疝氣囊大如斗海梧子七箇燒灰服之卽愈

木竹子

出廣西皮色形狀如大枇杷肉味甘美秋冬實熟
味甘性平治吐逆不食關格閉拒不通脾虛下陷
肛門墜脫不收清熱涼大腸去積血利百脈通調
水臟止渴生津解暑消酒利耳目治欬嗽上逆

櫟罟子

桂陽虞衡志出廣西大如半升盤數十房攢聚成
球每房有縫冬生青至夏紅熟

味甘補脾胃固元氣制伏亢陽扶持衰土壯精神
益血寬痞消痰解酒毒止酒後發渴利頭目開心

婦人不孕用櫻罟子浸好酒內三日日飲之音
日有孕又目生翳障漸漸昏暗視物不明櫻罟子
浸白蜜內每日連蜜啖一枚一月卽退

櫻子

出九真交趾子如桃實長寸餘二月開花連著子
五月熟色黃鹽藏食之味酸如梅

性涼平清心潤肺止渴生津制亢極之陽光消炎
蒸之暑氣又降三焦實火治鼻中出血又牙宣牙

齶出血用榧子核連仁燒存性調水含咽卽止

羅晃子

出廣西夏熟味如栗狀如橄欖其皮七層出橫州者皮九層剝至九層方見肉故又名九層皮果

思恩府志羅晃子俗名九層皮形類蠶豆可茹味如煨栗外有黑殼連肉有皮九層故名產於山樹

中

味甘性溫治臟腑生蟲及小兒食泥土腹痛癰瘡積梗

養肝膽明目去翳止渴退熱解利風邪消頑降火
翻胃吐食或食下卽吐或朝食暮吐暮食朝吐用
羅晃子七枚煅存性每日酒調下方寸匕服完爲
度卽愈

腹中蛻蟲上攻心下痛欲死面有白斑用羅晃子
牽牛子各七枚水煎服蟲自下

夫編子

南方草木狀出交趾武平山谷中三月開花連著
子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味最美亦可鹽食

味甘性平主甯心志養血脈解暑渴利水道生津
液止逆氣喘急除煩清熱潤肺滋命門益元氣骨
蒸勞熱四肢瘦削如枯柴用夫編子同白鴨爛煮
不用鹽醬日日啖之喫鴨三頭見效

白綠子

出交趾樹高丈餘味甘美如胡桃

味甘平主潤肺止渴清熱消食祛風暑溼氣治疥
癬及山嵐瘴氣所侵變成癰瘡寒熱往來頭痛癢

逆

足膝屈弱難行寒溼邪氣所侵用白緣子一片春
爛浸酒日飲一次月餘全愈

繫彌子

廣志狀圓而細色赤如軟棗其味初苦後甘可食
味平無毒主益五臟悅澤人面去頭面諸風

產後癩疾不止用繫彌子一合酒水各一盞煎八
分空心服下片刻卽效

人面子

出海南又出廣中樹似含桃子如桃實春花夏實

至春方熟蜜煎甘酸可食其核兩邊俱似人面耳
目口鼻無不畢具

廣志人面子大如梅李其核類人面兩目口鼻皆
具肉甘酸宜爲蜜煎仁絕美以點茶如梅花片光
澤可愛茶之色香亦不變以增城水東所產爲佳
其核中仁搖之卽脫去他產則否此樹最宜沙土
沙土鬆易發數歲卽婆娑偃蓋山民植之以爲利
味甘性平無毒醒酒解毒治風毒著人遍身疙瘩
感瘡或痛或癢食之卽愈

難產不下產母手握人面子一箇單日右手握雙

日左手握卽下

嶺南雜記人面子煮肉及鴨必用搗爛熬膏甘酸

益津

四味果

出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木
刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止飢渴

味甘辛酸無毒明日養肝甯神定志和胃進食下

氣止欬

本草綱目拾遺
卷之二
腎虛腰痛不能反側用四味果同狗腰子煮熟並食每日一次一月愈

敏按東方朔神異經云南方大荒有樹名如何結子味如飴有核形如棗子長五尺圍如長金刀剖之則酸蘆刀剖之則辛食之者地仙不畏水火白刃又啟蒙記如何隨刀而改味或曰此卽仙經所謂火棗據此二說卽今四味果也

千歲子

南方草木狀出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加

如織一苞恆二百餘顆皮殼青黃色殼中有實如
粟味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲如肉荳蔻
○關涵嶺南隨筆千歲子多子根鬚乾則殼肉相
離撼之有聲

味甘平主和中益胃利肺除熱止渴醒酒解暑
小便閉塞千歲子十數枚打碎水煎清飲下卽通
利

發背惡瘡千歲子不拘多少搗爛如泥調塗三次

見效

侯騷子

蔓生大如雞卵味甘性冷消酒輕身王太僕曾獻之見酉陽雜俎

甘寒無毒食之不飢延年強健消酒除溼治黃疸小便不利溺如黃金色口渴煩熱齒痛牙宣出血不止

小兒重舌木舌侯騷子核燒灰擦之或用蜜調塗亦可

浮癬發背侯騷子煎湯飲之再搗塗之大效

仙掌子

乃仙人掌上所生子也粵語仙人掌多依石壁而生葉勁而長若齟齬狀開花儼如鳳形子生花下名曰鳳粟葉曰鳳尾笏發苞外類芋渠內攢瓣如珠各擎子珠於掌一枝一掌自下而上子自青赤而黃有重殼外厚內薄熟其仁食之味甜兼芡栗可以延年又名千歲子此草可辟火廣人多植之

掌側性宜沙土惡肥膩○明黃佐仙人掌賦序仙人掌奇草也多貼石壁而生惟羅浮黃龍金沙洞

有之葉勁而長若齟齬狀發苞時外類芋魁內攢
瓣如翠球各擎子珠如掌然青赤轉黃而有重殼
剖之厚者在外如小椰可爲匕勺薄者在裏如銀
杏衣而裏圓肉煨食之味兼芡栗可補諸虛久服
輕身延年俗呼爲千歲子此與蔓生者名同物異
也○雲南通志仙人掌葉肥厚如掌多刺相接成
枝花名玉英色紅黃實似山瓜可食

味甘性平補脾健胃益腳力除久瀉

敏按羣芳譜仙人掌出自閩粵非草非木亦非果

蔬無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層纍而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近日兩浙亦有據所載當另是一種與此全別或名同物異歟

酒杯藤子

出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映澈實大如指味如荳蔻食之消酒相傳張騫得其種於

大宛

甘辛平無毒消食下氣消酒止渴辟邪瘧消癰腫殺蛇蟲治尸疰勞瘵蟲蠱瘰癧癰結核癰疽潰爛食果成積用酒杯藤子燒灰糖拌服下五七錢自效

飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗

藥果

關涵嶺南隨筆藥果似橙而味酸可染紅

治嘔

蘭子

出交趾合浦藤緣樹木正月開花四五月熟如梨
赤如雞冠核如魚鱗

甘平無毒主中惡氣飛尸邪蠱心腹卒痛狂邪鬼
神鬼疫癘瘧夢寐邪恶氣心神顛倒不甯昏冒如
癲

治驚癲恍惚或言語不倫歌笑不休用蘭子核七
枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸匕自愈

楸子

食物考甘酸小於沙果色黃紅黑如櫻桃顆產於代北味頗清香作脯點茶俱可此與林檎同名異類本草未分故正之多食濁氣令人好睡子宜去盡食之煩心

隈支

益部方物略記生邳州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀如荔枝肉黃膚味甘味甘無毒治七種痴氣及一切瘡瘍疥癬

以上自津符子至隈支止諸果品綱目附錄諸果後

僅載其形狀不錄其主治而沈雲將食纂云諸果
都出外國及邊瘴地方雖不常見但俱屬異品不
惟可口兼可療治百病凡行歷遠方者卽當攜其
種流傳中土有功於世不小故附錄而兼細核其
主治予因取之以補李氏之遺至其形狀綱目已
詳載而復列之者亦欲覽者便於解悉後日遇物
能名故不厭重贅也

呂宋果

本草補呂宋島中產一果名加窩弄外肉而內核

味苦不堪食其初惟有一處深山峻嶺生此樹甚高大土人多不識旅人至島百年後始知其中果可用近三十年頗悉其療治各病極有奇驗遂攜至中國若果之皮肉其效尤捷有呼爲寶豆者豆言果之形狀寶言其貴重也

治中毒服毒將果或磨或刮以清冰或清油調服毒卽吐蛇蠍蜈蚣等傷磨清水服之并刮敷患處疫疾中風昏仆磨水服之腹痛鴉利磨水服瘧疾癩作時磨水服○刀斧傷血漏刮末敷患處卽止

血止痛○蛔蟲疳積磨水服蟲卽吐出○難產磨水服○頭瘡癢爛臘梨切碎此果以油煎之乘熱徧擦向火取暖隨以布向火取熱覆病人身而睡又以被蓋不見生風卽愈○潮熱磨水服漸減而愈

本草綱目拾遺諸穀部目錄

沙米

西國米

珠兒粉
竹米

陳倉米

朱公米

山穀

青稞黃稞

米油

鍋焦

陳久年糕

阿迷酒

酒釀

酒蕈

神黃豆

緬豆

回回豆

稽豆

葉附

蠶豆殼

醬油

糟油

腐乳

漿

乳沫

渣

泔水
麻腐

脂麻殼

諸穀部

沙米

延綏鎮志苗莖如麻葉類艾而稍圓有刺高尺許生子成房粒細如黍杆去皮用羊羹作食服之不飢邊外名黍喇棘○瀚海記沙蓬米凡沙地皆有之鄂爾多斯所產尤多枝葉叢生如蓬米似胡麻而小性暖益脾胃易於消化好吐者多食有益作爲粥滑膩可食或屑之可充餅餌茶食之需○人海記張家口內保安沙城一帶地產沙蓬實如蒺

本草綱目拾遺 卷八
藥中有米如稗子食之益人○藥性考云蓬蒿之實名曰沙米清熱消風饑荒食旨

味甘性溫通利大腸消宿食治噎膈反胃服之不

仇

西國米

珠兒粉
竹米

嶺南雜記出西洋西國煮不化而色紫柔滑者眞僞者以葛粉爲之○通雅今南楚兩粵專採葛根作粉食其粉可作丸曰葛粉丸廣人以假西國米能醒酒○朱排山柑園小識西國米來自閩廣洋

艘大如綠豆以色紫煮不化者真健脾運胃功最捷久病虛乏者煮粥食最宜

益胃和脾病起宜食

珠兒粉

洋舶帶來粵澳門杭甯波乍浦通舶市者皆有形絕細如蘇子勻圓而白云係外洋人採葛根及薇箕根或茹粉所造煮之須滾水沖泡粒粒分明如魚子樣極柔滑以糖霜和食或淡食

氣清香味甘滑明日運脾開胃解酒生津久服尤

能強腎

東西洋考大泥卽古淳泥今隸暹羅土產有西國米亦名沙孤米其樹名沙孤身如蕉空心取其裏皮削之以水搗過舂以爲粉細者爲王米最精粗者民家食之以此代穀今賈舶慮爲波濤所溼只攜其粉歸自和爲丸○庚申十月予在陳夔友家見有胡西菽盛以玻瓈小筆管瓶內菽白而細與珠兒粉無別云得自王撫軍署可入藥大能消痰其甥女一夕患肺風痰喘危極兒醫多言不救用

此一錢調薑汁灌下其效如神

竹米

物理小識竹結實斑文兩兩相比謂之竹米
下積如神

陳倉米

朱公米

嶺南記武昌漢陽門內舊爲陳友諒倉基甲子年
有掘得黑米者色如漆堅如石炒之卽鬆○秋燈
叢話康熙甲子武昌郡廣福坊掘得黑米數十斛
堅如石炒研爲末治膈症如神傳爲僞陳友諒積
堅如石炒研爲末治膈症如神傳爲僞陳友諒積

粟所又天門學宮前明改建北郭倉基地亦掘得
黑米治疾頗驗乾隆丙申黃州重修郡學疏濬泮
池池底積粟甚夥色如漆而堅治病效如前人爭
取之太守王公廷棟恐係前人鎮壓物禁而掩之
敏按酉陽雜俎乾陁國戶毗王倉庫昔爲火所燒
其中粳米燶者於今尚存服一粒永不患瘧

炒研治膈症如神 不藥良方陳年倉米治卒心
癲燒灰和蜜服之卽止

朱公米

南中紀聞靖州南二十里飛山砦相傳爲元末朱
都督屯兵之所牆礲時有米粒色微黑而不腐云
是朱公所遺兵糧游客謁神祠取輒得之至今尚
存

療脾疾

山穀

宦游筆記出塞外土人名烏爾格納莖長尺餘細
如草節如竹葉亦如竹每二節一葉秀穗類蓼花
結粒似穀而色紅採之曬乾去其皮煮粥粥如穀

香蒙古用以充饑兼碎麪合茶商民均雜粟食之
色紅豔可愛而味與穀無辨故名之曰山穀實生
於水濱或山溝爾

味甘香行氣利水清大小腸火亦補脾胃

根 蒙古人名墨克爾外皮微細內實粉白味甘
美蒙古生啖商民合肉煮食秋冬之際蒙古搜掘
鼠穴得食物盈筐內多此物長二三寸俱野鼠嚼
截運藏者

味甘生津滋潤血脈調營衛利水

青稞黃稞

藥性考青稞黃稞仁露於外川陝滇黔多種之味
鹹可釀糟弔酒形同大麥皮薄麪脆西南夷人倚
爲正食

下氣寬中壯筋益力性平涼除溼發汗止洩多食
脫髮損顏色

米油

此乃滾粥鍋內煎起沫醕滑如膏油者是也其力
能實毛竅最肥人用大鍋能煮五升米以上者其

油良越醫全丹若云黑瘦者食之百日卽肥白以其滋陰之功勝於熟地也每日能撇出一盃淡服最佳若近人以熟粥絞汁爲米油未免力薄矣

味甘性平滋陰長力肥五臟百竅利小便通淋

精清不孕 紫林單方用煮米粥滾鍋中面上米

沫浮面者取起加煉過食鹽少許空心服下其精自濃卽孕矣

鍋焦

陳久年糕

一名黃金粉乃人家煮飯鍋底焦也取僧寺中米

多焦厚者入藥良

味苦甘性平補氣運脾消食止泄瀉入珍粉用之
鍋焦丸 小兒常用健脾消食家寶方用鍋焦炒
黃三觔神麴炒四兩砂仁炒二兩山楂四兩蒸蓮
肉去心四兩雞肫皮一兩炒共爲細末加白糖米
粉和勻焙作餅用

老幼脾瀉久不愈 梁侯瀛集驗方鍋焦爲末四
兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共和勻每服三
五匙日三次食遠下

白瀉不止

種福堂方乾飯鍋耙二兩松花二兩

炒臘肉骨頭五錢烘脆共爲末砂糖調不拘時服

脾胃不健 祝氏效方鍋焦二觔蓮肉一觔白糖

半觔蜜一觔丸如桐子大每服數十丸空心白湯

下

玉露霜 治老人脾泄最效白朮炒二兩陳皮一

兩五錢蓮肉去心四兩薏苡仁四兩炒糯米一升

炒菉豆一升炒熟陳米鍋耙一升炒糖霜量加共

爲末每用二三錢滾水調勻服之

行
檢
祕

預稀痘疹 不藥良方銀花金者不用陰乾鍋粑每二升入銀花一兩共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

陳久年糕

燒灰治痢

阿迷酒

出東洋氣味香冽頗釀厚每服不過半盞大能助元氣驟長精神佑舶帶來凡督撫大員輒多備貯爲不時之需或遇要事疲憊一滴入口精神百倍

較鴉片尤速○物理小識吉利重酌以紅花芥胡桃入麴釀者醫溲數效

味甘辛竄達能捷通百脈益元生氣每日少飲一二滴理怯如神

酒釀

酒蕈

俗名酒窩又名浮蛆乃未放出酒之米醇也味釀厚多飲致腹瀉性善升透凡火上行者忌之

味甘辛性溫佐藥發痘漿行血益髓脈生津液赤眼淹纏祝氏效方杜仲厚朴桑白皮檳榔各

一錢取雄雞肝一個忌見水去紅筋入白酒釀六
兩隔湯蒸熟去渣以湯肝食下隔二日再服一次
全愈

小兒鼻風吹乳腫痛 劉起堂經驗方用酒釀和
菊花葉敷上立愈無葉用根甘菊葉尤佳搗汁沖
和服更效

吹乳方 周氏家寶用苎麻根嫩者炒和白酒釀
少許共搗爛敷患處一日夜卽消忌食發物

頭風 用蒼耳子白芷穀精草各五錢川芎三錢

甜酒釀四兩老酒二盃煎一盃服

妙淨方

夢遺白濁 酸梅草二錢孩兒菊二錢搗取汁加

不見水酒釀空心量服

救世青囊

難產 用酒釀麻油蜂蜜童便雞子白各半盞煎

溫服卽下

痘出不起 不藥良方用狗蠅七枚

冬日取蠅在狗耳內搗

爛和酒釀服卽日發起紅潤可觀

痘瘡不起 良方集要荸薺搗汁和白酒釀頓溫

服之但不可頓大熱大熱則反不妙慎之

保元丹 千金不易方此丹張氏家傳已五世矣
黃精一觔甘枸杞四兩酒釀五觔好黃酒五觔入
罐煮一炷香每飲一茶杯藥渣搗爲丸加胡桃肉
八兩大黑棗八兩青州柿餅一觔

酒蕈

生酒罇中不恆有凡藏酒之家千百罇酒閒有一
罇啟之中空無酒下有蕈結於中其蕈初結之時
酒上薄凝如衣膜久則漸厚一二寸便能滲酒將
酒中精華醕釀之氣盡攝於膜內膜乃漸厚酒亦

漸少久久則酒乾所存十不餘一啟視之其膜如
鮮海蜇濡潤而軟嗅之作酒香微帶徽蒸氣識者
取之焙乾乾者如瓜皮面青黑背作肉紅色溼軟
如棉可入藥蓋酒能生蕈必罇係新出窖未脫火
氣而置酒之地又爲溼熱所蒸致中變而成此故
造釀家用罇貴舊而不貴新也金御乘自慈谿歸
帶有酒蕈出以相示云彼土亦罕得聞有之然不
多見也

治一切酒傷酒勞酒疸因酒成病諸症服之立效

神黃豆

緬豆

回豆

真甯豆

池北偶譚產滇之南徼西南夷中形如槐角子視常豆稍巨用筒瓦火焙去其黑殼碾末白水下之可永除小兒痘毒服法以每月初二日十六日爲期半歲每服半粒一歲每服一粒一歲半每服一粒半遞至三歲服三粒則終身不出矣或曰按二十四氣服之以二十四粒爲度或云水畢閉日服之○珍異藥品云出雲南近西地方痘將發未發時用神黃豆連殼焙炒燥用豆研細水服○本經

逢原云神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用
之一陽日用清水磨服○痘學真傳云神黃豆出
雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服○甯陽張
琰種痘新書云凡痘自胸以上自臍以下俱有而
中閒一截全無者名兩頭痘此氣血不能貫通上
下而腰臍之間爲寒毒凝滯也若不急治七日之
後必變灰白之症矣見點時急用生芪當歸赤芍
桔梗防風荆芥厚朴續斷白芷山楂木通神黃豆
三十粒服此中閒方有痘乃可無虞

南詔備考普洱府及永昌府皆出神黃豆能稀痘
青花豆可治瘡有客帶滇產神黃豆來其形如細
竹筒長可三四寸搖之有聲其中如竹節片片相
疊剖出如棋子樣白色包裹中含一豆黃色光亮
形如瓠子中有線痕堅實而扁服之解痘毒

按神黃豆有二種百草鏡云出雲南普洱府又四
川亦產莢如連翹略短內有豆微紅色產雲南者
形如槐角子比蠶豆略大瓦上焙乾去外黑殼用
二種形狀不同係地土所產各別然其稀痘解毒

之性則一也○寶笈方痘將出時用神黃豆按一
歲一粒剝去外殼并內皮將瓦焙熟一半留生一
半芫荽湯調服毒重者稀毒輕者更稀十餘歲者
亦不過七粒倘未出痘者亦如法以水調服之竟
不出痘宜三月三五月五七月七九月九等日

綿豆

滇略綿豆如豆蔓生子大如栗斑文點點咀之傳
惡瘡良然性迅惡誤服之吐瀉致死五雜俎云滇
中有神黃豆似五倍子能令兒童稀痘然亦不甚

驗也

回回豆

五雜俎云出西域狀如椿子磨入麵中極香能解
麴毒

青花豆

宦遊筆記雲南永昌府有青花豆出於外地夷人
帶來易貨者治瘡

眞甯豆

出陝西慶陽眞甯地味甘平能解諸藥毒

稽豆 葉附

逢原云細黑豆一名稽豆俗名料豆今人以飼馬
故俗又呼馬料豆○杭州府志黑豆之細者曰稽
豆細而扁者曰零烏豆俗名馬料豆可肥馬○從
新云黑大豆之小者爲馬料豆不知料豆雖小而
形長微扁與黑豆形迥別當另是一種綱目稽豆
下僅載其能去賊風風痹治婦人產後冷血而已
其他一切功用全未之及今爲補之

味甘溫無毒壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精

入腎經血分同青鹽旱蓮草何首烏蒸熟但食黑豆則鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首烏取以引入腎經也炒焦淋酒治頭風腳氣以其直達腎經血分煮汁服解烏附丹石藥毒

藥性考本經黑大豆卽今之馬料豆也其色黑而形如人腰故入腎經益水明目多服令人身重一年後復原久服身輕非花豆中之黑大豆也凡服豆忌朮麻子厚朴豬肉歌云黑大豆甘腰子樣式所以補腎藥餌宜入卽是馬料煮寒炒熱調中下

氣止痢攣急利水除脹追風活血生研敷腫吞止
煩渴解一切毒甘草煎汁傷中淋露產後諸疾明
目悅顏製服有益○又云稽豆卽小黑豆因其粒
細稱驢豆別馬料也治產後血風冷痛其粒細不
及馬料歌云稽豆黑小甘逐邪風冷痹血滯浸酒
和融○雨蓑翁食記小黑豆入鹽煮久食大能補
腎○事親述見稽豆補五臟益中助十二經脈調
中緩腸胃殺鬼氣舒筋○紫虛子吞豆法黑料豆
淘淨曬乾以淨瓶裝之初服每日一粒以白湯生

吞之次日吞二粒每日加一粒至百日吞百粒從此每日吞百粒但初起服之腸胃未剛每遇大便須看豆化不化如豆化則漸加倘未化仍照舊勿加必待食之能化然後遞加至百粒爲度服之能益精補髓壯力潤肌髮白復黑久則轉老爲少終其身無痰病也

救生苦海有嫦娥奔月方與紫虛吞豆法同但其法按太陰盈虧之數初一日吞一粒逐日加一粒至望日十五粒而止十六日又逐日減一粒至晦

日一粒而止月初則又加起與紫虛之法微有不同并附以備用

煮料豆方 明太醫劉洛德有增補內經拾遺四卷其種子論後載有煮料豆藥方云老人服之能烏鬚黑髮固齒明目當歸四錢川芎甘草廣皮白朮白芍丹皮菊花各一錢杜仲炒黃芪各二錢牛膝生地熟地各四錢青鹽六錢首烏枸杞子各八錢同馬料豆煮透曬乾去藥服豆○又義復方馬料豆五升桑椹半觔枸杞子四兩肉蓯蓉半觔竹

刀切去筋青鹽龍骨各二兩同豆煮熟和藥同曬
乾貯罐用常食大有補益○又方呂逸儒傳方何
首烏一觔用馬料豆汁煮或老酒亦可要九蒸九
曬枸杞一觔酒蒸用乾藥末搗勻曬馬料豆一斗

再用料豆五升煮汁以汁煮豆曬乾九蒸九曬或
用好酒煮亦可菟絲子一觔酒煮曬焙補骨脂一
觔酒洗焙真川椒四兩曬烘青鹽二兩川牛膝一
觔酒煮焙煉蜜爲丸服之○又方何首烏二觔青
鹽一兩棗仁杜仲枸杞各二兩遠志小茴香陳皮

各一兩肉蓯蓉苡仁香附白茯苓川芎各二兩五味子牛膝補骨脂木瓜各一兩五錢歸身三兩肉桂五錢防己一兩二錢甘草八錢小黑豆一斗用
水煎藥數十滾瀝出渣以藥汁煮豆汁盡爲度曬乾每服百粒開水下

延齡廣嗣仙方 懷生地酒製何首烏酒煮旱蓮草鹿銜草真者絕少用仙靈脾代之以上各三兩按四時乾山藥乳拌白茯苓乳拌當歸身酒炒真青鹽以上各一兩按分至石菖蒲菟絲子肉蓯蓉

酒浸去膜補骨脂五加皮骨碎補淮牛膝白甘菊
原杜仲酒炒斷絲枸杞子蛇牀子槐角子金櫻子
覆盆子川黃連建澤瀉以上各五錢按十六節以
上二十四味俱合二十四氣除去青鹽鍋內煎汁
至半瀝渣再將渣煎過半瀝清沖和煎濃入馬料
豆三升七合女貞子一升七合按陰陽二氣二至
二分合年月日時週天度數餘一合半以置閨煮
數十滾將青鹽研細傾入同煎以汁盡爲度取豆
曬乾收貯磁瓶每晨四錢滾湯送下如遇出門飢

本草綱目指遺 卷八
餓卽可嚼食代點此豆謹按陰陽二十四氣合週天度數製法得中和補益之妙久服能令人鬚髮再黑齒落更生耳目聰明手足便利壯陽補腎固本還元多育子息多增年壽常服不斷可成地仙凡腎虛目暗上盛下虛者尤爲切合

四寶大神丹 家寶方能治五勞七傷服藥後忌腥臭發物房事馬料豆五升用混堂油製九次黃芪八兩人乳製七次白當歸酒洗四兩金櫻子二斗去內子與毛外去刺淘淨熬膏臨收時加童便

一二盞聽用右將前三味和金櫻膏丸如梧子大
每服三錢桂圓湯下

明目補腎兼治筋骨疼痛○不藥良方小紅棗十
二枚冷水洗淨去蒂甘州枸杞子三錢小馬料豆
四錢水二盞煎一盞早晨空心連湯共食之

絕瘧製首烏剩下黑料豆可以絕瘧凡四日兩頭
瘧用豆煎湯服卽愈○截三日瘧祝穆效方常山
雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒
水各二盞慢火煎二盞當晚先服一盞蓋暖而睡

留一盃至次日須將發前早兩個時辰服要熱服
蓋暖臥待瘧至至亦輕鬆亦有當日而愈愈後忌
房事戒食生冷勞碌風霜忌食雞羊牛蛋白扁豆
半月永截不發○又祕方集驗治瘧檳榔蘿蔔子
常山甘草各一錢紅棗四枚烏梅七枚馬料豆每
歲一粒水二盃煎一盃服忌三日葷油永不再發
痰喘氣急 同壽錄用梨剗空中心納小黑豆令
滿留蓋合住紮緊糠火煨熟搗作餅每日食之
中風口噤 文堂集驗方馬料豆一升煮濃汁如

飴含汁在口卽能言也

黑白丸治痞積開胃消食健脾補腎○百草鏡方
馬料豆白蒺藜去刺各一觔炒磨末蜜丸梧子大
每服二三錢開水送下

治陰症手足紫黑 集驗方黑料豆三合炒熟好
酒烹滾熱服加葱鬚同烹更妙

盜汗 文堂集驗方蓮子七粒黑棗七枚浮麥馬
料豆各一合水煎服三次愈

腎虛腰痛并治陰虧目昏 活人書用腰式烏豇

豆馬料豆各一兩煮湯入鹽少許五更時乘熱服
忌鐵器

陰虧目昏老眼失明 活人書馬料豆甘枸杞女
貞子各十兩陰虧目昏除女貞子爲末煉蜜丸梧子大早晚
服二三錢自效

赤白帶下 白果去皮煮熟蜜餳每日清晨喫七
枚再食炒馬料豆一兩白滾水送下數日愈

妊娠腰痛酸軟 產家要覽馬料黑豆二合炒焦
熟白酒一大盃煎至七分空心下

治產後中風口噤目瞪角弓反張 姚希周集驗
用黑料豆鍋內炒極焦沖入熱黃酒內服之立效
再服回生丹全愈

華真君三豆湯稀痘 楊春涯驗方菜豆赤飯豆
馬料豆等分每日煮湯與小兒喫出痘自稀如遇
痘毒亦用此湯飲之搗搽敷上其毒自消

痘風爛眼 集驗云風爛眼用醃白梅一個去核
入綠礬少許川椒三十粒以五銖錢二個夾之用
芒麻紮住無根水浸洗自愈若出痘得此症再加

馬料豆一歲一粒投水中

眼藥丸方 周氏家寶用馬料豆一升炒蟬蛻四兩酒洗去頭足木賊草四兩去節菟絲子一觔炒甘菊花四兩曬乾白蒺藜一觔各爲末水法爲丸每服二三錢晚服滾湯下如若年高桂圓湯下

各種癬

陳別駕彬曾任太醫院官有治各種癬

方用馬料豆以瓦罐不拘多少裝入罐內罐口以銅絲罩格定使豆不能倒出然後用大高邊火盆一個盆鑿一孔將罐倒合孔上四圍以乾馬糞壅

之火燃罐底盆底下用磚墊空安盃一個接油上
火煨罐內豆自焦有油從盆底滴入盃中色如膠
漆以此搽癬三次卽愈

解藥毒 凡服藥過多以致頭面浮腫唇裂流血
或心腹飽悶臍下撮痛者用馬料豆菜豆各四兩
合煎汁連豆服病好爲度

中附子川烏天雄斑蝥毒 不藥良方馬料豆葉
芥子煎汁服之卽解

稽豆葉治瘤 急救方頸後粉瘤馬料豆葉辟麝

香草同搗敷患處其瘤漸軟漸消破則手擠去粉
疣瘡不破聽其自消

蠶豆殼

治癰瘡 行篋檢祕用油鹽蠶豆殼一錘麻油浸
一週時取起將豆殼瓦上焙研爲末麻油調搽患
處立愈

膈食 指南云用蠶豆磨粉紅糖調食數次卽愈
小便日久不通難忍欲死 蔡航活人書蠶豆殼
三兩煎湯服之如無鮮殼取乾殼代之

黃水溜瘡 毛世洪經驗集云凡大人小兒頭面
黃水瘡流到卽生蔓延無休者用蠶豆殼炒成炭
研細加東丹少許和勻以真菜油調塗頻以油潤
之三日卽愈

治漏 種福堂方用炒熟蠶豆殼磨末每服三四
錢加沙糖少許調服

癰瘡 張卿子外科祕方用鮮蠶豆搗如泥塗瘡
上乾卽換之三五次卽愈如無鮮者用乾豆以水
泡胖搗敷亦效

吐血 張卿子方以新蠶豆殼四五年陳者妙煎湯飲之卽愈

天泡瘡 蠶豆黑殼燒灰存性研末加枯礬少許菜油調敷一次卽愈

藥性考云蠶豆苗能醒酒

醬油 糟油

以麵豆拌罨成黃鹽水漬成之伏造者味厚秋油則味薄陳久者入藥良

味鹹性冷殺一切魚肉菜蔬蕈毒塗湯火傷多食

發嗽作渴

解食荔作脹以陳年醬油飲少許卽消

中輕粉毒以三年陳醬油化水頻漱之

集簡方

糟油

藥性考摩風癩腰膝痛開胃暖臟止嘔噦解蔬菜

毒

腐漿
鍋巴
泔水
沫
渣
皮
腐乳
乳

瀕湖綱目於豆腐集解註腐皮堪入饌而漿乳皆遺之又胡麻亦可作腐綱目胡麻條亦遺之今悉

本草綱目拾遺
卷之六
爲補概名曰腐

腐漿 味甘微鹹性平清咽祛膩解鹽滷毒 藥性考云味甘微苦性涼清熱下氣利便通腸能止

淋濁銀杏研漿

傷寒十日不汗 張卿子妙方用未點豆腐漿一大盃調好白蜜熱服卽出汗愈神效

腳氣腫痛難走者熱豆腐漿加松香末搗勻敷過夜卽好行走永無後患

大便下血 古今良方荸薺一觔或半觔豆腐漿

不沖水者一大盃將腐漿頓極熱搗荸薺汁乘熱
沖入飲之

鹽哮 救生苦海用豆腐漿點糖少許日日早服
一盃不間斷過百日自愈

治黃疸 劉羽儀驗方每日空心冷喫生豆腐漿
一盞喫四五次自愈忌食生蘿蔔

痰火吼喘 經驗廣集飴糖二兩豆腐漿一盞煮
化頓服愈

治勞及自汗 回生集方用黑豆淘淨磨成腐漿

鍋內熬熟結成皮每食一張用熱黑豆漿送下卽效○凡人每日清晨喫黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患

肺癰肺痿 用芥菜滷陳年者每日將半酒杯沖豆腐漿服服後胸中一塊必塞上塞下塞至數次方能吐出惡膿日服至愈

血崩 不藥良方生豆腐漿一盃生韭菜汁半盞入漿內空心服一二次

五妙湯治產後并弱症 郁文虎傳方用頭鍋腐

漿一盃腐皮一張生雞蛋一個打碎沖入漿內再
加圓眼肉十四枚白糖一兩入漿內滾服五更空
心食

陳廷慶云豆腐漿入陰分瀉火通淋濁凡淋症用
六一散沖腐漿食最妙五更沖雞蛋白白糖點服甯
嗽補血粵人以腐漿煮粥食名甜漿粥大能補虛
羸

腐沫 卽豆腐泔水上結沫是也治鶯掌癬生手
掌及足掌層層剥皮血肉外露此沫熱洗卽愈

腐渣 此造豆腐所剩之渣人以飼豬入藥須用
生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥良方用豆腐渣
在砂鍋內焙熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷
卽更換以愈爲度

大便下血 古今良方用不見水豆腐渣炒黃清
茶調服卽愈

治臍瘡裙邊瘡爛臭起沿 養素園方生豆腐渣
捏成餅如瘡大小先用清茶洗淨絹帛拭乾然後

貼上以帛纏之一日一換其瘡漸小肉漸平此費
啟彰親試有效之方也又可敷腳蛀

腳上皮蛀生水孔而皮溼爛者 不藥良方豆腐
渣貼三日卽愈不要落生水

腸風下血 慈航活人書雪花菜卽豆腐渣用未
曾濾出漿者帶水鍋內炒燥爲末每服三錢紫血
塊者白糖湯下紅血塊者砂糖湯下自三次雖遠
年垂危者服之神效

腐皮 味甘性平養胃滑脂解毒

小兒遍身起羅網蜘蛛瘡膿癢難忍 仁惠編用

豆腐皮燒存性香油調搽自愈

落頭疽 慈惠小編用壁上蠟子五六隻腐皮包
好喫完卽愈

冷嗽 劉羽儀驗方乾豆腐衣燒灰存性爲末熱
陳酒調下喫四五十張卽愈

水臌脹 種福堂方陳芭蕉扇去筋燒灰存性五
分千金子去油殼二分五釐滑石二分共爲細末
以腐衣包滾水送下十服愈

腐乳 一名菽乳以豆腐醃過加酒糟或醬製者
味鹹甘性平養胃調中

腐巴 此卽腐漿鍋底所結焦巴也入藥曬焙研
末或生搗作丸皆可用藥性考名鍋炙開胃消滯
逐積

治淋濁補血 葛航活人書有五效丸用豆腐鍋
巴一兩加川連一錢同搗丸如桐子大每服五錢
赤帶蜜糖滾水吞下白帶砂糖湯下熱淋尿血白
湯下腸風下血陳酒下 血風瘡先將豆腐泔浸

洗去醫以布拭乾用前末藥
油調搽乾則再塗三四次自愈

翻胃 神方珍記用豆腐鍋巴黃色者佳炒研末
每服三錢沙糖湯調服白湯下

痢疾 神方珍記陳冬米炒豆腐鍋巴二味各等
分爲細末空心白湯調服二三錢服後宜餓半日
自愈

腐泔 卽豆腐所滲下之水也藥性考云豆腐有
鹽滷點者有石膏點者俱能清熱

性清涼能通便下痰通癰閉洗衣去垢膩

麻腐 乃胡麻小粉所造者味甘性平潤肌滑腸

解毒 蔣儀藥鏡滋生賦云麻腐豆粉清腸清胃

芝麻殼

此乃脂麻外殼也綱目載其苗曰青囊又有麻枯
餅麻花麻稽無麻殼因補之

湯火傷 楊春涯驗方芝麻殼燒存性研細遇火
傷者用麻油調搽卽愈倘溼爛乾摻之

半身不遂 千金不易方芝麻殼五錢酒煎服出

汗卽愈

本草綱目拾遺諸蔬部目錄

甘儲

梗粉
甘儲酒

山百合

石衣

石耳

野芋艿

青芋頭

土芋藤

野毛豆

野蘿蔔

地骷髏
三生蘿蔔

南瓜蒂

瓢附

薜茄

刀豆根

殼附

地腎

葛乳

鮮草果

眞珠菜

鷓鴣菜

葛仙米

黃矮菜

白茄

葉
蒂

天茄

牛心茄子

繩茄

醬茄

糟茄

玉瓜

節瓜

穿腸瓜

天骷體

鬼骷體

白鼓釘

三寶薑

彎薑

川薑

沙葱

風葱

番蒜

蒜梗

刺兒菜

波斯菜

乾冬菜

陳冬菜
陳芥菜
滷

滷
糞
金子

麒麟菜

諸筍

乾筍

紅淘粉

諸蔬部

甘儲

梗粉
酒

一作甘薯又名朱薯以其皮有紅者也一名金薯今俗通呼爲番薯或作番茹有紅皮白皮二色紅皮者心黃而味甜白皮者心白而味淡南方各省俱植之沿海及島中居民以此代穀其入藥之功用亦廣而諸家本草皆未載李瀕湖特補列綱目中惜其所言者惟補虛乏益氣力健脾胃強腎陰而已他皆未之及焉乾隆五十一年冬今

上特允閣學侍郎張若渟之請勅直省廣勸栽植甘薯以爲救荒之備陸中丞耀有甘薯錄之輯所載衛生一門實足補李氏所未及因擇錄之以補其遺陸公原序云甘薯卽薯蕷之屬見於陳祈暢異物志嵇含南方草木狀中土之有此物其來舊矣第不甚貴重栽植者少明季有閩人陳經綸復自呂宋移其種歸巡撫金公學曾勸民樹藝閩人德之號爲金薯然自是長樂謝肇浙黃州李時珍新城王象晉各有論述皆不及經綸事而其裔孫世

元父子復爲金薯傳習錄盛侈其先世傳自呂宋
之功一似中國素非所產者此考證之疎也夫以
一物之微足以備荒療疾而又不費功力其爲功
於民食實不淺渺前任布政使李公渭嘗舉以教
山東之民其性又喜沙土高地於山海之區尤屬
相宜五雜俎百穀之外有可以當穀者芋也薯蕷
也而閩中有番薯似山藥而肥白過之種沙地易
生而極蕃衍饑饉之民多賴全活此物北方亦可
種也羣芳譜宋薯一名番薯大者名玉枕薯形圓

而長本末皆銳皮紫肉白質理膩潤與芋及薯蕷自有各種氣香生時似桂花熟者似薔薇露撲地纏生一莖蔓延數十百莖節節生根一畝種數十石勝種穀二十倍閩廣人以當米穀有謂性冷者非二三月及七八月俱可種但卵有大小耳卵八九月始生冬至乃止生便可食若未大者勿頓掘令居土中日漸大到冬至須盡掘出不則敗爛金氏學會曰薯傳外番因名番薯形如王瓜藕臂如拳如指如卵如棗大小不一實同種別皮有紫有

白有深淺紅有濃淡黃肉亦如之蒸熟勻膩如脂
甘平益胃性同薯蕷海隅人以供饗飧蔓延極速
節節有根入地卽結每畝可得數千觔勝種五穀
幾倍徐氏元扈曰昔人謂蔓菁有六利補有七絕
予謂甘薯有十二勝收入多一也白色味甘諸土
種中特爲復絕二也益人與薯蕷同功三也徧地
傳生翦莖作種今歲一莖次年便可種數十畝四
也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當
米凶歲不能災六也可充籜實七也可釀酒八也可

乾久收藏屑之旋作餅餌勝用餉蜜丸也生熟皆可食十也用地少易於灌漑十一也春夏下種初冬收入枝葉極盛草穢不容但須壅培不用鋤耘不妨農十二也陸公薯錄有溉種藏製諸法雖無關於藥病而有濟於備荒故併錄之種薯宜高地沙地起脊尺餘種在脊上遇旱可汲井澆灌卽遇澇年若水退在七月中氣候旣不及藝五穀卽可翦藤種薯至於蝗蝻爲害草禾蕩盡惟薯根在地薦食不及縱令莖葉皆盡尙能發生若蝗信到時

急令人發土偏壅蝗去之後滋生更易是天災物
害皆不能爲之損人家凡有隙地但只數尺仰見
天日便可種得石許此救荒第一義也歲前深耕
以大糞壅之春分後下種若地非沙土先用柴灰
或牛馬糞和土中使土脈散緩與沙土同可行根
重耕起要極深將薯根每段截三四寸長覆土深
半寸許每株相去縱七八尺橫三尺俟蔓生旣
盛苗長一丈留二尺作老根餘翦三葉爲一段插
入土中每栽苗相去一尺大約二分入土一分在

外卽又生薯隨長隨翦隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽薯須順栽若倒栽則不生節在土上則生枝在土下則生卵約各節生根卽從其連綴處斷之令各成根苗每節可得卵三五枚凡藤蔓已遍地不能容者卽爲游藤宜翦去之及掘根時捲去藤蔓俱可飼牛羊豕或曬乾冬月喂皆能令肥脂二三月種者每株用地方二步有半而卵徧焉每官畝約用薯三十六株四五月種者地方二步而卵徧焉畝約六十株六月種者地方一步有半

而卵徧焉約一百六株有奇七月種者地方三尺
以內得卵細小矣畝約九百六十株種種疎密略
以此準之九月畦種生卵如箸如棗擬作種此松
江法也金氏曰薯苗天地卽活東西南北無地不
宜得沙土高地結尤多天時旱澇俱能有秋養苗
地宜鬆耕過須起町高四五寸春分後取薯種科
置町內發土薄蓋縱橫相去尺許半月卽發芽日
漸蔓延長一丈或五六尺割七八寸爲一莖勿割
盡留半寸許當割處復發生生不息若養蔓作苗

須用稍長尺許密密栽豎如養葱蒜法栽莖使牛耕畠寬二尺許高五六寸將莖斜插畠心約以七分在畠內三分在畠外畠內者結實畠外者滋蔓每莖相去一尺餘十餘日畠兩旁使牛耕開令曬又七八日以糞壅之仍使牛培土每畠可得薯三四觔若雨多須將蔓撥畠上毋令浮根圃地然實結地內蟲不能災葉如食盡亦能復發早栽宜稀晚栽宜密三四月栽者實粗大七八月栽者實細小秋末實始加大冬至前當掘盡不掘盡亦不能

大熟時須先割蔓置町下俟乾捲起冬月剉喂牲
畜若北地早寒則遲一個月栽早一個月掘宜遲
宜早亦看天氣寒暖耳甘薯疏云江南田汙下者
不宜薯若高仰之地平時種藍種豆者易以種薯
有數倍之獲大江以北土更高地更廣卽其利百
倍不啻矣倘慮天旱則此種畝收十石數自之家
止種一畝縱旱甚而汲井灌溉一至成熟終歲足
食又何不可取種之法羣芳譜云九月十月閒掘
薯卵近根先生者勿令損傷用輞草包裹掛通風

處陰乾一法於八月中揀近根老藤翦七八寸長每七八根作一小束耕地作畦將藤束栽如栽韭法過月餘每條下生小卵如蒜頭狀冬月畏寒稍用草蓋覆至來春分種一法霜降前取近根卵稍堅實者陰乾以輒草作襯另以輒草裹之置無風和暖不近霜雪不受冰凍處一法霜降前收取根藤曬令乾於竈下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以土蓋之一法七八月取老藤種入木筩或磁瓦器中至

霜降前置草箒中以稻糠襯置向陽近火處至春
勞後依前法種金氏曰存薯之法不一在人變通
或存木斛草匣瓷甕竹籠中俱可但性畏寒又畏
熱置避風和暖處用草浮蓋俾通氣若封固則發
熱壞爛敏前在東甌玉環見其島民少穀食多以
茹爲糧彼土有地率多種茹土人云其利十倍於
穀拟茹糧多者爲富其收茹之法多曝乾切條以
竹席圍如囷儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云
食之多力鮮病蓋其味甘能補脾土故也金氏曰

薯初結即可食味淡多汁及時則甜煨食煮食燂食蒸食亦可生食切片曬乾碾作餳粥磨作粉餌
擦冰灼可作丸拌麵可作酒香細水瀘去渣澄曬
城粉其葉可作蔬○范咸臺灣府志長而色白者
是舊種圓而黃赤者出自文來國金姓者攜回故
名金薯○諸羅縣志他物下種必用子用仁或原
物根芽獨薯不然取一條片片切之只留皮一面
種之發根生苗亦一異也

氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮

白肉者益肺氣生津中滿者不宜多食能壅氣煮時加生薑一片調中與薑棗同功紅花煮食可理脾血使不外洩敏按甘儲俗傳能發諸病患痔漏者愈後食之復發亦以性能下行而滯氣故也

痢疾下血 傳習錄云痢疾之起多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘溫之藥其有命門不暖欲實下焦者必宜純熱之藥至若溼熱所致煩熱口燥腹痛純紅小水黃赤以及下血者用此薯蒸熟以芍藥湯頻頻嚼服

本草綱目 打造 卷之三
或薯粉調冬蜜服亦愈

酒積熱瀉 傳習錄云泄瀉之症不一或水土相亂併歸大腸而瀉或土不制水清濁不分而瀉或小腸受傷氣化無權而瀉或真陰虧損元陽枯涸而瀉者此皆各從其類治之若酒溼入脾因而飧泄者用此薯煨熟食

溼熱黃疸 黃疸之症有四一曰陰黃由氣血敗也一曰表邪發黃卽傷寒症也一曰膽黃驚恐所致也更有陽黃二症或風溼外感或酒食內傷因

溼成熱因熱成黃者用此薯煮食其黃自退
遺精淋濁 遺精之與淋濁症有不同故治亦不
同然夫要責在心脾腎故凡遇此症無論有夢無
夢有火無火或氣淋血淋膏淋勞淋總宜調養心
脾每早晚用此粉調服大有奇功

血虛經亂 婦人血虛或遲或早經多不定故陽
虛補其陽陰虛補其陰氣滯順其氣其有不宜辛
燥寒涼而宜於清和者用此薯羹食頻服調養其
脾使脾健生化經期自定

本草綱目拾遺 卷三
小兒疳積 瘦者乾也在小兒爲五疳在大人爲五勞其病由於哺食乾燥之品嗜啖肥厚之物妄服峻利之藥以致津液乾涸延而成疳此薯最能潤燥生津安神養胃使常服之則舊積化而疳愈矣

甘薯穎 羣芳譜一造穎將糯米水浸五七日以米酸爲度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯米粉入生水和作團子如杯口大卽將薯根拭去皮洗淨沙石土徐徐磨作漿要極細勿攏水將糯團煮

熟撈入瓶中用木杖盡力攪作糜候熱得所大約
以可入手爲度將薯漿傾入每糯米三斗入薯漿
一觔攪極勻先將乾小粉篩平板上次將糜置粉
上又著乾粉捍薄曬半乾切如骰子樣曬極乾收
藏用時慢火燒鍋令熱下二合許慢火炒少刻漸
軟漸發成圓球子次下白糖芝麻或更加香料炒
勻候冷極浮脆每觔二升可炒一斗芋漿山藥漿
俱可作按此物食之厚腸胃健腳力縮痰涎解毒
活血甚妙

甘薯粉 功同甘薯造法用薯根粗布拭去皮水洗淨和水磨細入水中淘去浮渣取澄下細粉曬乾同豆粉用此粉水作丸與珍珠沙谷米無異按此粉余前在閩中及玉環俱有土人造以售客販行遠方近日甯波及乍浦多有販客市粉價賤於麵粉近日餅餌舖中率多買此攪和麥麵中作果餌以售其粉亦高低不同有曰淨粉則依前法所造者滾水沖之儼如藕粉故藕粉店中亦多買此攪和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣一切皆

磨細和入只可作餅餌用其色亦黃而不自然其
又有甜苦二種沙土細潔者則其茹作粉甜倘先
一年種烟其地次年種茹則苦澀人不售之惟堪
作粉味亦苦矣但以味甘有清香化開色如玉者
佳

甘薯酒 和脾暖胃止瀉益精造法用薯根不拘
多少寸截斷曬乾餽炊熟取出採爛入瓶中用酒
藥研細搜和按實中作小坎候漿到看老如法下
水用絹袋濾過或生或煮熟任用其入甌寒暖酒

本草綱目拾遺
卷之三
藥分兩下水升斗或用麴蘖或加藥物悉與米酒
同法若造燒酒卽用薯酒入鍋如法滴糟成頭子
燒酒卽用薯糟造當用燒酒亦與酒糟造燒酒同
此酒福建最多土人名土瓜酒燒酒曰土瓜燒其
酒味微帶苦峻烈不醋不善飲者食之頭目微有
昏眩亦無大害閩中紹酒價貴此酒值廉土人相
率飲此亦以餉客

山百合

此百合之野生者瓣狹長而味甘山人採貨之○

藥圃云百合有三種一名山百合花遲不香二名
檀香百合可食三名虎皮百合食之殺人○百草
鏡百合白花者入藥紅花者名山丹黃花者名夜
合今惟作盆玩不入藥百合以野生者良有甜苦
二種甜者可用取如荷花瓣無蒂無根者佳能利
二便氣虛下陷者忌之

逢原云余親見包山土鱗中蜊化百合有變化未
全者大略野生百合蜊化有之其清熱解毒散積
消瘀乃蜊之本性耳○應驗方癰疽無頭野百合

同鹽搗爛敷

甘入肺清痰火補虛損治肺癰救生苦海取白花者三兩搗爛白酒和絞取汁一盃不拘時服七服全愈

石衣

石耳

台州仙居有之生峻嶺絕壁海崖高處乃受陰陽雨露之氣漸漬石上年久則生衣鮮者翠碧可愛乾者面黝黑背白如雪土人以作羹餉客最爲珍品煮法用滾水一盞投鹽少許泡石衣於中用手

細細擺採去其細砂待軟如絲其細砂去淨色卽
變紫如玫瑰必得鹽水則所銜細砂始能吐盡再
過清水二三次以雞湯下食滑脆鮮美味最香甘
爲山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深
山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此爲
生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壑
人跡莫能躋攀者壁上始有此物其取之法人則
藤兜飛架衣籬毳躡鞋趨捷如猿猱取之則銛鈎
鋒鏟輪絇入山有祭買路有楮非仙土人莫能盡

其術也然結侶雖多其采取止許一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其值昂而貪利者且競趨之

味甘氣清性寒無毒清膈熱利小水化痰消癰結滯氣有補血明目之功婦人食之能潔子宮易於受胎男子食益精增髓

石耳

羣芳譜石耳一名靈芝生天台四明河南宣州黃山巴蜀邊徼諸山石巖上遠望如烟廬山亦有之

狀如地耳山僧採曝餽遠洗去沙土作茹勝於本
耳○粵志韶陽諸洞多石耳其生必於青石當大
雪後石滋潤微見日色則石生耳大者成片如苔
蘚碧色望之如烟亦微有蒂大小衆衆如花烹之
面青紫如芙蓉底黑而皺每當味爽擷取則肥厚
見日漸薄亦微化爲水凡香蕈感陰溼之氣而成
善發冷氣多和生薑食乃良藥石耳味甘腴性平
無毒多食飫人能潤肌童顏在木耳地耳之上○
南粵瑣記凡青石以烈日輒出汗汗凝結則成石

耳青爲木氣故生耳若白石則否或曰此亦蕈之
類厚者蕈薄者耳或曰凡乳牀必因石脈而出不
自頑石出其在陰洞者爲乳牀在陽巖者爲石耳
石耳之美見稱於伊尹其言曰漢上石耳蓋上古
已珍之矣

性寒或曰平味甘腴無毒○藥性考石耳寒平石
崖懸珥氣並靈芝久食色美益精悅神至老不毀
瀉血脫肛灰服愈矣○名勝志安吉州梅溪石門
中產石耳食之止熱

野芋芳

青芋頭
土芋藤
鬼芋

汜勝之農書芋有六種五野芋六青芋野芋有大
毒殺人凡芋三年不收卽成野芋性滑下石毒服
食皆忌之青芋亦有毒必須灰汁易水煮之堪食
只宜蒸啖之中野芋毒者令人戟喉音啞煩悶垂
死以大豆漿或糞汁解之薑汁亦可

葛祖遺方合麻藥治跌打損傷痔漏麻風敷腫毒
止痛治瘡癬搗敷腫傷

乳癰 野芋頭和香糟搗敷

青芋

療冷熱止渴

土芋藤

土芋卽黃獨俗名香芋肉白皮黃形如小芋一名
土卵與野芋不同綱目野芋附家芋內土芋另立
一條可知然所引僅據陳藏器一說不知其功能
稀痘小兒熟食大解痘毒其藤燒灰傅痘爛成瘡
可無瘢痕○羣芳譜土芋其根惟一顆而色黃故

名黃獨

野芋頭

文堂集驗 一名仙人掌 同野芋一種 但此種葉較小 略似茨菰葉 有尖此又與草本形如鞋底者不同
仙人掌形
如鞋底

治諸物食積已成痞塊者用野芋頭磨爛和糯米粉淡煮粥每早食一茶鍾不用油鹽十服後其積自消試驗無害

集驗

鬼芋

羅浮志深谷中產物如薯芋狀山人得之剖作四

片入砂盆磨作膠漿鍋煮成膏待冷則凝結如餅塊一復剖爲四片添水再煮成膏膏成照前三煮四煮乃可食令飽一芋所煮可充數十人之腹故稱鬼芋焉芋有四異初生不藉根苗葉上朝露著地卽成種子一異也採製不令婦人雞狗見之見卽化水二異也磨時煮時七須順旋逆之卽化水三異也一芋之成由一而四四而十六十六而六十有四如卦象之數四異也聞廬山衡嶽各有鬼芋採製又不同

野毛豆

野毛豆生園隙中蔓生枝細弱葉細尖兩兩排枝
對生清明後開淡紫細花結實如毛豆立夏後可
採初生苗絕似金鳳花花葉其莢儼似角蒿中有
子二圓如小菉豆小滿前後皆黑老便枯落矣○
生田塍閒莖葉及莢較家者細小一名勞豆

沈氏效方性微寒平肝火治瘡疾目疾○百草鏡
治黃白疸性能發汗○救生苦海治痘毒八九月
時田塍邊採連莖根用煅存性研單用其豆更妙

麻油和敷不問初起日久未潰已潰俱效

按通雅引焦弱侯曰野田小豆曰蹠音勞陳留耆舊傳云赤眉以荳豆與桓牧隋末子通攻江都夏侯端採荳豆食之身之曰野豆也魯刀切勞豆或蹠荳二字之訛也然考古今註荳豆一名治豆葉似葛而實長尺餘可蒸食一名荳菽綱目鹿藿一名荳豆又名鹿豆卽今野菜豆爾雅釋草菌鹿藿注今鹿豆也唐書夏侯端傳擗荳豆以食則似又非野毛豆之屬今野毛豆亦名荳豆豈名同而物

異歟並書之以俟考

肝疳初起 百草鏡野毛豆鮮者七錢乾者五錢
雞肝一具同煮食煎服亦可

野蘿蔔

地
三
生
蘿
蔔

一名紫金皮又名巴壁虎○百草鏡云野萊菔苗葉根形與家種者無二肉雖白而皮色帶黃爲異
○王氏博濟方以乾萊菔爲仙人骨俗又呼地骷

體

雁山志山蘿蔔性寒狀如圃種者土人用治癰疽

不草經日抄述

庚戌子來臨安署內有廢圃
多商陸士人呼爲山蘿蔔與

此名同物異

治肺癰 百草鏡以七枚搗汁服

地骷髏

按地骷髏乃刈萊菔時偶遺未盡者根入地瘦而無肉老而多筋如骷髏然故名能大通肺氣解煤炭熏人毒非乾萊菔也王禹中所言尙未明晰

痞塊

醫宗彙編陳年木瓜

一個

地骷髏

即蘿蔔種枯根

四兩

煎汁時常服一小盞數日除根氣痞食痞俱

治

萬應丹 海昌方治黃疸變爲臌脹氣喘翻胃胸
膈飽悶中脘疼痛并小兒疳疾結熱噤口痢疾結
胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用人中白以露
天不見糞者方佳火煅醋淬七次一兩神麴白蘿
子地鰓體卽土中蘿蔔各五錢砂仁二錢以上俱
炒陳香櫟一個共爲末蜜丸桐子大每服三五七
丸或燈草湯下或酒下

三生蘿蔔

此乃人工製造者唐正聲傳此法云得自祕授取
水蘿蔔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之
待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆
七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔
起陰乾收貯罐內遇臌脹者取一枚搗碎煎湯服
之極重者二枚立愈

南瓜蒂

瓢附

綱目南瓜主治止言補中益氣而已至其子食之
脫髮今人以爲蔬多食反壅氣滯膈昔人皆未知

也吳秀峯言凡瓜熟皆蒂落惟南瓜其蒂堅牢不可脫昔人曾用以入保胎藥中大妙蓋東方甲乙木屬肝生氣也其味酸胎必藉肝血滋養胎欲墮則腹酸肝氣離也南瓜色黃味甘中央脾土之精能生肝氣益肝血故保胎有效

神妙湯保胎用黃牛鼻一條煅灰存性南瓜蒂一兩煎湯服永不墮

油調塗立效

疔瘡 行篋檢祕用老南瓜蒂數個焙研爲末麻

本草綱目拾遺
卷之三
南瓜瓢

治湯火傷慈航活人書伏月收老南瓜瓢連子裝入瓶內愈久愈佳凡遇湯火傷者以此敷之卽定疼如神

辣茄

人家園圃多種之深秋山人挑入市貨賣取以熬 辣醬及洗凍瘡用之所用甚廣而綱目不載其功用陳景堯食物宜忌云食茱萸卽 辣茄陳者良其種類大小方圓黃紅不一惟一種尖長名象牙 辣

茄入藥用○又一種木本者名番薑范咸臺灣府
志番薑木本種自荷蘭開花白瓣綠實尖長熟時
朱紅奪目中有子辛 辛番人帶殼啖之內地名番
椒更有一種結實圓而微尖似柰種出咬嚼吧內
地所無也○藥檢云 辛茄一名臘茄臘月熟故名
亦入食料苗葉似茄葉而小莖高尺許至夏乃花
白色五出倒垂如茄花結實青色其實有如柿形
如秤錘形有小如豆者有大如橘者有仰生如頂
者有倒垂葉下者種種不一入藥惟取細長如象

牙又如人指者作食料皆可用

食物宜忌云性辛苦大熱溫中下氣散寒除溼開
鬱去痰消食殺蟲解毒治嘔逆療噎膈止瀉痢祛
腳氣食之走風動火病目發瘡痔凡血虛有火者
忌服○藥檢云味辛性大熱入口卽辯舌能祛風
行血散寒解鬱導滯止澼瀉擦癬

百草鏡熏壁虱洗凍瘃浴冷疥瀉大腸經寒澼
外痔 百草鏡以象牙薺茄紅熟者剉細甜醬拌
食

毒蛇傷 百草鏡用辯茄生嚼十二枚卽消腫定痛傷處起小泡出黃水而愈食此味反甘而不辯或嚼爛敷傷口亦消腫定痛

祛臭蟲方 經驗廣集用羊骨頭一個秦椒半觔共入火盆內同鋸木屑燒之門窗閉緊勿令出烟其蟲自死敏按木屑用樟木者佳

凍瘃 蔡雲白方剝辯茄皮貼上卽愈

痢積水瀉 醫宗彙編辯茄一個爲丸清晨熱豆腐皮裹吞下卽愈

敏按花鏡番椒一名海瘋藤俗呼辯茄本高一二尺叢生白花秋來結子儼如禿筆頭倒垂初綠後朱紅懸掛可觀其味最 辛人多採用研極細冬月以代胡椒蓋其性熱而散能入心脾二經亦能祛水溼癸亥子在臨安有小僕於暑月食冷水臥陰地至秋瘧發百藥罔效延至初冬偶食 辛醬頗適口每食需此又用以煎粥食未幾瘧自愈良由胸膈積水變爲冷痰得辛以散之故如湯沃雪耳又名秦椒李成裕遼載秦椒一名番椒形如馬乳色

似珊瑚非本草秦地之花椒卽中土薜荔也

龍柏藥性考秦地乃草本薜椒綱目諸註誤爲秦
地花椒不知卽今之薜荔又名薜虎性熱味辛溫
中散寒除風發汗去冷癬行痰逐溼多食眩旋動
火故也久食發痔令人齒痛咽腫

刀豆根

殼附

綱目穀部刀豆條發明下註刀豆本草失載惟近
時小書載其煖而補元陽近有人燒其子存性自
湯調服止呃逆有效故瀕湖特爲增入而不知其

用甚廣今悉補之

治頭風 集聽云刀豆根乃治頭風之神藥每用
須五錢酒煎服

治鼻淵 年希堯集驗方老刀豆文火焙乾爲末
酒服三錢重不過三服卽愈

殼 治腰痛萬氏家抄用刀豆殼化灰好酒調服
外以阜角燒烟熏之

牙根臭爛 洪氏一盤珠刀豆殼燒灰加冰片擦
涎出卽安

治久痢 種福堂方用刀豆莢飯上蒸熟洋糖蘸食一二日即愈

治婦女經閉腹脇脹痛欲死并消血癥 經驗廣集陳年刀豆殼焙燥爲末好酒服一錢加麝香五釐亦妙

喉癬 張氏必效方刀豆殼燒灰以二三釐吹之立效

楊梅瘡 萬氏濟世方當歸川芎苡仁木通木瓜生地熟地金銀花防己防風荆芥黃藥白芷知母

甘草阜莢豬苓去皮各二兩大參三錢山紅花刀豆殼各五錢硬飯團二兩水煎一鍋濃汁不拘時當茶服忌魚腥生冷四劑全愈

地腎

粵志羅浮多地腎一名松黃但松黃未落爲松實已落而英華未散爲地腎其狀若彈丸大者如雞卵紅黃相錯一一晶瑩熟之可入饌其生無根蒂散布松下土鬆石潤處有之或亦松蕈之類也乍浦九山補志松花蕈山之有松者皆產惟陳山東

麓爲多三月閒松花入土至四五月經雨後卽生至八九月又生鮮肥滑嫩素品之上味也

味甘性平生津消痰治洩濁不禁

葛乳

一名葛花菜名山皆有亦產高州粵志高州多種葛雷州人市之爲綿綿秋霜時有葛乳涌生地上如芝如菌赤色味甘脆微苦乃葛之精華也亦曰葛蕈瀕湖僅據太和山志載其醒酒與酒積成疾他皆未及故特補之

性涼解肌熱散風火及陽明風熱癰疹

鮮草果

粵志人多種之爲香料卽杜若非藥中草果也其苗似縮砂三月開花作穗色白微紅五六月結子其根勝於葉

味辛溫能除瘴氣久服益精明目令人不忘

眞珠菜

六安有眞珠菜如眞珠○益部方物略記眞珠菜戎瀘等州有之生水中石上翠縷纖蔓首貫珠蜀

人以蜜熬食之或以醯煮可致千里不壞○黃山
志眞珠菜藤本蔓生暮春發芽每芽端綴一二蕊心
圓白如珠葉翠綠如茶連蕊葉腊之香甘鮮滑他
蔬讓美

利水通淋結消腹脹下氣癰閑

鷓鴣菜

連江志生海石上色微黑○漳州府志鷄鴣菜散
碎花微黑出漳浦

療小兒腹中蟲積食之卽下如神

葛仙米

生湖廣沿溪山穴中石上遇大雨衝開穴口此米隨流而出土人撈取初取時如小鮮木耳紫綠色以醋拌之肥脆可食土名天仙菜乾則名天仙米亦名葛仙米以水浸之與肉同煮作木耳味大約山洞內石髓滴石所成性寒不宜多食四川亦有之必遇水衝乃得歲不常有他如深山背陰處大雨後石上亦閒生然形質甚薄見日卽化或乾如紙不可食矣○梧州府志葛仙米出北流縣勾漏

洞石上爲水所漬而成石耳類也采得曝乾仍清以水如米狀以酒泛之清爽襲人此原非穀屬而名爲米傳云晉葛洪隱此乏糧采以爲食故名○

嶺南雜記韶州仁化縣丹霞山產仙米徧地所生粒如粟而色綠煮熟大如米其味清腴大抵南方深山中皆有之○宦遊筆記出粵東葛仙洞外有流泉噴薄石上遂生苔菌之類其狀如米粒青色筆以爲羹味極鮮美土人呼爲葛仙米有未識者疑是青螺按韶州府志丹霞出仙米頗與此相類

但一生沙土一生水石爲異耳 ○ 陸祚蕃粵西偶
記道書寶圭洞天卽今北流縣勾漏山洞口前後
產葛仙米采而乾之粒圓如黍採麴釀酒極芳香
性寒味甘爽解熱清臟利腸胃

按葛仙米本屬石耳之類憶庚子歲曾於劉明府
席間食之時以爲羹儼如青螺狀翠碧可愛味極
甘鮮滑脆適口入蔬爲宜藥性考云清神解熱疾
火能療或云久服延年蓋亦能清臟熱者

黃矮菜

一名黃芽菜咸淳臨安志冬閒取巨菜覆以草積久而去其腐葉黃白鮮瑩故名黃芽萬歷杭州府志杭人訛爲黃雅菜戒庵慢筆黃矮菜杭州呼爲花交菜○羣芳譜燕京圃人以馬糞入窖壅培菘菜令不見風日長生苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之黃芽菜乃白菜別種莖葉皆扁

甘溫無毒利腸胃除胸煩解酒渴利大小便和中止嗽冬汁尤佳○食物宜忌味甘性溫滑利竅○

陳堯士云補虛羸

按黃矮菜有南北二種南產者惟杭城太平門外沙地產者爲最他處悉高大粗鬆絕無捲心密葉味亦較遜北產糧艘帶來者味更美質更細且無粗筋有重至十餘觔一顆者南中亦不易得也陳確齋云食之潤肌膚利五臟且能降氣清音聲惟性滑洩患痢人勿服

白茄

葉蒂

汪連仕方一名玉盤茄有大小二種大者如雞卵小者如指頭初生色白老則皮黃能入骨追風治

一切癰瘍根名白風藤合酒蒸服茄實蘸硫黃擦
白癩風除大麻風東粵茄園產者良名茄丸

葉 治腸紅大便下血劉羽儀驗方用白茄子葉
經霜方採刷淨毛去焦黃葉陰乾取莖葉煎濃
湯如此喫三四次其血卽止永不復發此方曾經
邪犬咬過之人勿服

蒂 治發背及一切毒癰初起殊水軒雜記用白
茄蒂七個生首烏等分酒煎服卽消

天茄

出廣中如大拇指其形如茄而有棱黑色堅如石
擊之不得碎其蒂黃黑如醬色一種牽牛花嫩子
蘇人采爲蜜餞入食品者亦名天茄大能破氣與
此迥別

胃脘痛 救生苦海水磨服之每服一枚見效
蠍毒 五雜俎記關中有天茄可治蠍毒

牛心茄子

產瓊州一核者入口立死兩核者可以糞清解之
入外科膏藥用麻藥用此藥只可外敷不宜內服

緬茄

高濂珍異藥品云緬茄一作洒茄形如大栗上有
罩帽如畫皮樣出滇南緬甸地方堅如石○滇略
緬茄枝葉皆類家茄結實似荔枝核而有蒂土人
雕刻其上而繫之拭眼去翳亦解瘡毒○滇南雜
記緬茄出緬甸大而色紫蒂圓整蠟色者佳○粵
志廣東高州府出木茄上有方蒂拭眼去昏障卽
緬茄也

水磨塗治牙疼抹眼眶去火毒又能解百藥毒

治疗瘡走黃 良朋彙集此方出寶坻張相公百
發百中真神效方凡疗瘡走黃毒攻入內不知人
事但有氣者可救用緬茄一枚椒礮盤盛黃酒將
茄放盤內磨得下磨不下只管於酒內磨一鍾約
熟茶時將酒裝入長頸錫壺內再入蓮鬚葱二根
牙咬不令斷白豇豆七粒如蕎麥開花時加蕎麥
七粒別時不用又用小麥冷眾人嚼成麪筋封
固壺口放水鍋內煮一炷香取出熱服出汗卽愈

醬茄

糟茄

此卽人家醬中食茄入藥宜陳年者佳

治耳癢出膿 妙藥方醬茄擠汁滴之

治牙疼 周氏家寶方醬茄燒灰存性爲末掩患處

腹內鱉瘕 壽域方陳年醬茄燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之

糟茄

山海草函燒灰存性治齧口瘡

玉瓜

卽廣昌土瓜出江西常中丞宦遊筆記廣昌土瓜
本草不載形甚拙圓者如瓠或磊砌如贅疣無瓣
無瓢長沙土中外汙內潔細肌密理剖之白如冰
玉入口清甘無滓消煩釋滯或熟食之亦佳殆瓜
中異品也其性蔓生春種而秋成冬初始入市無
種春深後切瓜連皮成小塊用沙土覆於室內久
之芽生於是就沙地爲窖令深而寬藉以茅欲其
中通而根可旁達旣長密葉蔓生纍纍插竹引之
上行培以雞糞乃繁碩土人又名玉瓜抱朴子云

五原蔡誕入山而還語家人曰予至崑崙得玉瓜
以玉瓜井水洗之乃軟可食是豈其遺種耶江西
他縣亦有產者然小而渣多惟廣昌附郭五里內
爲佳予食於元宵後喜其味美至郡覓之東風送
暖瓜卽不可留矣

味甘性平調中益氣舒鬱化滯消食清大小腸火
生津滋血和營衛熟食補脾健胃

節瓜

粵草志節瓜乃冬瓜中一種小者白皮蔓地生一

節生一瓜得水氣最多故解暑毒

止渴生津驅暑健脾利大小腸

穿腸瓜

吉雲旅鈔穿腸瓜乃大便解出甜瓜子生苗結實土人名糞甜瓜不拘大小皆可入藥採來曬乾新瓦焙焦爲末乳鉢研極細攤匙上出火毒數粒聽用但此瓜不易有須以人力製造其法將爛熟甜瓜與七八歲小兒空心帶子食之令其勿嚼碎子次日解出大便子裏糞內帶糞曝乾時擗卽於本

年下出倘時晚不及生瓜花亦可用否則藏於次
年下種更好大人便出者子亦可種此瓜生在夏
秋若春秋冬要用必須預備

胎痔漏

古雲旅鈔有秘授消痔神方不論遠年

近日痔漏三服除根用穿腸瓜焙存性爲末每末

一兩加蟬蛻末三錢五分以金銀花五錢浸酒一

二日煎數滾調藥末每服二錢七分空心金銀花

酒下外以白海南花並根葉煎湯不時先熏後洗

三日卽愈海南花春秋冬無鮮者預收陰乾備用蓋

痔漏乃大腸鬱火臟腑積熱發而爲腫爲痛爲瘡
久而成管今用此藥以散火消毒去積除壅其管
自退不問新久屢試屢驗忌房事惱怒煎炒辛軟
熱物並發氣之類百日永不再發此方傳自西洋
僧有洋客患痔漏痛甚不能上海船其僧出此藥
與服三日卽愈求其方送洋布十匹黃金五兩始
得此方用無不效

天骷體

此乃鄉野村中桑樹汲屋籬上所掛霜打絲瓜也

其子名烏牛子

治婦人白帶血淋臌脹積聚一切筋骨疼痛並宜

服之

汪連仕方

鬼骷髏

汪連仕云乃殘老之向日葵其子性烈通氣透膿合麝香急性子搗爛爲膏貼臍能落胎

敏按冬日桃園中有樹上乾枯殘桃亦名鬼骷髏與此名同物異

白鼓釘

宦遊筆記口外白鼓針卽內地蒲公英葉有鋸齒
婆娑鋪地與內地生者迥殊內地者花早開單瓣
生沙漠者花開於夏至前宛似黃菊一望燦然滿
地其蕊瓣重疊顏色嬌媚暮春草蒲萌芽口外啖
此味用之不竭不啻春韭秋菘也採食之清火亦
爲通淋妙品其莖中折斷有白汁諸蟲盛夏孕育
人手觸之成疾百藥難效取汁厚塗卽愈鄭方升
云一莖兩花高尺餘者掘下數尺根大如拳旁有
人形拱抱搗汁酒服治噎膈如神按上所載皆綱

目未及言者且口外所產又與內地異繩目蒲公英入柔滑類歸草部今沙漠所產人以作菜茹故入菜部亦各從其類也

清火毒鬱熱通乳通淋消腫治膈噎療一切毒蟲蛇傷

三寶薑

香祖筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

彎薑

滇南記產雲南百夷中餉一刀圭終其世斷絕人
道士人以飼牛馬不之宦也

川薑

出川中屈曲如枯枝味最辛辣絕不類薑形亦可
入食料用○包汝楫南中紀聞云扶叢鄉猺人攜
木薑土茶餉余受其木薑作羹味如茱萸醬卽此
物也

味辛性熱治胃寒散冷積寒滯痰氣

沙葱

西北遊記曰外沙石中生野葱一名楞葱一名沙
葱石楞中所產故名楞沙磧中所產故名沙其葉
與家葱同大更過之味辛辣於家葱根絕似蒜頭大
更過之味亦辛辣於蒜善食辛辣者不能罄一枚雖
細如草莖攢生於沙磧甚密醃之調羹勝如韭雉
羹兔羹尤宜又有沙葱草與沙葱相似人食之心
迷亂馬食之腹隱痛惟宜於橐駝採者折以辨之
沙葱本脆折易斷此草柔韌難折入藥取根○西
域聞見錄不雅斯類野蒜頭大如雞子葉如葱而

不申空味辛甘肅人呼爲沙葱回人嗜之

寬中下氣消食解肌活血發汗表風寒滌宿滯

風葱

臺志出臺灣 療風疾

番蒜

徐昆柳崖外編番蒜出臺灣番地外形似木瓜中似柿有浮山張氏宦於閩一婢食鱉肉後誤食竟遂病面黃腹脹硯礎欲死者數矣半載後有饋番蒜者婢偶食之遂大瀉有物如小鱉者數十少頃

突然疾若失方知番蒜可治蟹覓毒也

治蟹瘕解食毒水毒

蒜梗

此大蒜近瓣處中心短梗也乾者入藥用

治瘡成管 年希堯集驗方用大蒜梗燒灰存性

搽患處其管自消

坐板瘡 黃氏醫抄用蒜梗燒灰爲末先洗淨去

麝將藥末搽上

洗漏立驗 良朋彙集云夏應遴試效過防風荆

芥地骨皮川椒蘚艾瓦松各五錢槐條一兩陳蒜
梗二兩共入麻布袋內熬滾熱盪止疼神效

熏痔瘡 救生苦海蒜梗陰乾以火盆置微火將
梗投入移火盆於木桶中令患者坐熏之四圍以
衣被塞緊勿走洩烟三次自愈

凍瘡 種福堂方大蒜煎湯洗之

刺兒菜

西北遊記卽內地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如
柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起

蔓內地在有之生野外沙漠者花開於夏至後
大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際
挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆菔烹
調適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其
清火之功勝於金銀花解毒之用更捷於山茨茹
一物而兼二物之用如此

清火疎風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神

波斯菜

卽今紅菜一名洋菜汪連仕云生長海陽者佳根

本紅豔色鮮麗

止血治刑杖瘀血攻心搗汁沖酒服卽散可理跌打

乾冬菜

陳冬菜滷

陳芥

菜滷

糞金子

冬菜乃白菜杭俗小雪前後居人率市白菜以鹽醃之作齧藏爲禦冬及春時所食名曰冬菜頗利膈下氣其滷汁煮豆及豆腐食能清火益肺誠食中佳品也至春分後天漸暖菜亦漸變黑色味苦不堪食以之曬作乾飯鍋上蒸黑再曬再蒸如此

數次乃曝之極燥貯金器中可久藏不壞名曰徽
乾菜卽乾冬菜也年久者出之頗香烈開胃噤口
痢及產蓐以之下粥大有補益蓋白菜本能和中
下氣利三焦通二便含土德之精有生金之用乾
之則苦返其初而從母化也久蒸久曬則味反甘
全其德故有中和之運功與參耆等惜乎世多忽
而不知余故特爲表之瀕湖綱目菘下無乾菜之
用殊爲缺略近日筭橋人所市者乃蘿蔔莢所乾
與芥菜乾蒸曬成者皆不入藥須人家冬白菜醃

作蒸曬年久者爲佳 ○ 羣芳譜有造黑醃薺法用
白薺如法醃透取出挂於桁上曬極乾上甑蒸熟
再曬乾收之極耐久藏夏月以此薺和肉炒可以
久留不臭卽今乾冬菜也

開胃下氣益血生津補虛勞已痰嗽年久者泡湯
飲治聲音不出和酒搗爛塗湯火傷

白火丹 黃氏傳方此症形如水脹肢體俱腫皮
膚色白飽脹不食畏見燈火用冬菜勿落水陰乾
陳三年者可用愈陳愈妙煎湯洗浴并煎服之立

消如神

陳冬菜滷汁

清肺火痰嗽解咽喉腫毒

物理小識
鹽乾菜水滴蜈蚣卽死以鹽菜炒雞蜈蚣亦不食

陳芥菜滷汁

味鹹性涼治肺癰喘脹用陳久色如泉水緩呷之下痰清熱定嗽真能起死回生○作法以芥滷貯甕中埋行人處三五年取用

糞金子

凡油白菜收子作種者其中心老根內必有一子
枯時搖之有聲剖出名糞金子以其得糞力而花
實幹中子又得菜之生氣大能益人曰金子重之
也田種者其子更佳○王聖俞云糞金子在收菜
種子時其中幹內剖出形如鼠糞而黑色如麥粒
大小千百幹中不過數十粒蓋有生不生之別不
能每幹皆產也

治血症取三錢炒研白湯調服立愈

治慢驚神效

王聖俞

麒麟菜

出海濱石上亦如瑞枝菜之類瓊州府海濱亦產

周海山

煌

琉璃國志載雞腳菜麒麟菜皆生海邊

沙地上又名鹿角菜今人蔬食中多用之煮食亦

酥脆又可煮化爲膏切片食綱目鹿角菜云甘大

寒滑陳芝山食物宜忌云微鹹性平大有消痰功

用瀕湖反引孟說一說以爲有微毒不可久食能

發痼疾且其主治止帶下食風氣小兒骨蒸治丹

石熱結解麴毒何味其功用乃爾耶茲特表之○

朱排山柑園小識石花菜生海中沙石閒高二三寸狀如珊瑚有紅白二種洗去沙土煮化凝成膏糟醬俱佳又有細如牛毛者呼牛毛石花味稍劣郭璞海賦所謂土肉石華是也

味鹹性平消痰如神能化一切痰結痞積痔毒○
敏按盛京志龍鬚菜生於東南海濱石上叢生狀
如柳根長者至尺餘白色以醋浸食亦佳蔬也土
人呼爲麒麟菜出金州海邊鹿角菜生東南海中
大如鐵線分丫如鹿角紫黃色乾之爲海錯水洗

醋拌則如新味今金州海邊有之據志則似一類
二種也

石花膏 毛世洪養生集治辛苦勞碌之人或嗜
酒多慾忽生外痔發作疼痛步履難移服此或大
便瀉一遍或不瀉亦卽止痛可以行走再用搽洗
等藥自能斷根用麒麟菜洗去灰一兩用天泉水
煮爛和白糖五錢食之此方乃李治運臬司傳靈
隱寺僧杭人蕭成子患此症僧往候授以此方服
之隨愈予記之後治數人多效

本草綱目拾遺
諸筍

乾筍

綱目竹入苞木類以筍附菜部所載亦止苦竹筆
竹淡竹冬竹諸筍且於義類多未詳盡不知春冬
所出性皆各別鮮乾諸品味亦迥殊則入經絡主
治目不能合一陳芝山食品真一筍譜及食纂所
載較詳頗近時尙卽取以補之

春筍 筍譜其佳者曰豬蹄紅冬月卽生埋頭土
中以鋤掘之可三寸許其味極鮮甲於他筍未出
土名豬蹄紅若長尺許則其籜圓故人名圓筍亦

名蚤筍蓋冠諸筍而先出者

味甘辛微寒下氣養血利膈消痰化熱爽胃解渴
利水療風邪止喘嗽

毛筍 卽茅竹筍筍之大者筍譜毛筍爲諸筍之
王其籜有毛故名俗呼爲貓筍者非也大者重幾
二十餘觔猶未出土肉白如霜墮地卽碎以指掐
之其軟嫩如腐嗅之作蘭花香毛筍大者清明後
方有其出於臘月及正月者形短小籜亦有毛土
人名貓兒頭食之多嘈心然消痰之力較勝他筍

味甘性平利九竅通血脈化痰涎消食脹多食令人易饑

鞭筍

卽發於竹邊者夏秋有之其生於四月者

曰梅邊蓋感梅雨溼蒸之氣而生頗早味淡肉硬

不如秋生者筍譜邊筍卽毛筍之旁出者方筍盛

時生氣上升筍皆豎生氣既衰根既橫生盡其力

可橫宣十餘丈至地之邊際與竹之長短相稱謂

之竹邊故名邊筍其狀類鞭亦名鞭筍地肥者軟

嫩長尺許其籜紫色而兼白其味恬淡而鮮其氣

醣而有蘊藉不類毛筍之精英盡發洩於外也

味甘性寒開胃利腸消痰渴

冬筍卽潭筍沈雲將食纂貓竹冬生筍不出土

者名冬筍又名潭筍

味甘溫

陳芝山宜忌云味甘性寒

利九竅通血脈治吐血衄血

及產後心腹痛一切血症食之肥白人

食纂消痰滑

腸透毒解醒發痘疹中諸筍毒者生薑麻油解小

兒及脾虛者多食難化

食物宜忌

痘疹不出採未出土

冬筍煮粥食卽有生發之意

不藥良方

青筍 卽青竹筍竹細小故出筍色青山閒遍地

有之係野竹所生筍也卽時下俗呼水竹者是也

胡承謀湖州府志天目出筍乾其色綠聞其
煮法旋湯使急轉下筍再不犯器卽綠矣

味甘止肺癆吐血鼻衄治五痔并妊娠食

纂

青筍乾 卽青竹筍鹽湯煮曬乾者出杭臨安天

目者最佳色如鸚哥綠有尖上尖毬子二尖等名
味鹹甘性平爽胃消痰

鹽筍乾 以春筍鹽湯煮曬而成有泥黃烏尖直

腳等名

味鹹甘性平行氣清痰

衢筍乾 以筍用鹽湯煮熟熏乾而成

味鹹甘性平利膈化痰

羊尾筍乾 主治同

處筍片 俗名素火腿以毛筍微微醃湯煮熏乾而成

味甘微鹹性平利血消痰

菜筍片 卽玉版筍以毛筍淡煮曬乾者浙閩江西多有有草鞋底蝴蝶尖玉版等名湖州府志菜

筍丸者謂之闊繖有名泥裏黃者尤美

味甘性平治實喘消痰張石頑云乾筍淡片利水豁痰水腫夢魘丸用之

紅海粉

蟲語海珠生嶺南狀如蛤蝓大如臂所茹海菜於海瀨淺水吐絲是爲海粉鮮時或紅或綠隨海菜之色而成或曬晾不得法則黃有五色者可治痰或曰此物名海珠母如墨魚大三四寸海人冬養於家春種之瀕湖田中遍插竹枝其母上竹枝吐

出是爲薄粉乘溼舒展之始不成結以點羹湯佳
治赤痢風疾

疳積壞眼 慈航活人書穀精草小青草俱炒青
黛水飛海粉刺蒺藜使君子肉各一兩爲末早用
羊肝七片拌藥三錢蒸熟食