

太素心法便覽

(京) 新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

**图书在版编目(CIP)数据**

太素心法便览/(明)宋培编. - 影印本. - 北京:中医古籍出版社, 1994. 12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-610-8

I. 太… II. 宋… III. 中医学临床-中国-明代  
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01580 号

中医古籍孤本大全

太素心法便览

(明) 宋培编

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN 7-80013-610-8/R·606

定价:叁佰捌拾元

太素心法便覽目錄

卷之四

調經

經閉

經漏

帶症

胎前

惡阻

半產

子煩

子癇

子懸

子淋

子腫

催生

產後

乳病

雜症

癰疾

疝疾

驚風

臍風

風痰

湯火

化食

痘症

疹症

大素山...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

太素心法便覽卷之肆

古蒲後學太素宋 培編著

社友射斗王永光刪証

調經

婦人經水過期而來者血虛血熱有滯治宜活血導滯古人用四物湯是不知白芍補氣熟地補血氣血得補則愈滯滯久則熱熱久則壅闕不行危亡立至予立一導滯清火涼血方血涼自生

主方當歸尾 伍分  
川芎 伍分  
生地黃 伍分  
赤

芍 伍分

黃芩 柒分

梔子 柒分

連翹 柒分

薄荷 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

檳榔 柒分

麥門冬

去心 柒分

香附 伍分

青皮 柒分

胡黃蓮

伍分

乾姜

燒灰不存 性壹分

桔梗 伍分

知母 伍分

木通

柒分

黃栢

伍分

水壹碗紅花壹錢煎至捌分溫服以上用當歸尾

川芎生地赤芍梔子破滯血而又生血涼血黃芩

連翹薄荷清散其結燥之火邪枳殼厚朴檳榔木

通開道其醬即滯之血氣麥門冬生津液又能引生

地所生所補之地香附青皮胡黃連開鬱血行滯  
氣乾姜灰引血歸經桔梗載諸藥行五臟六腑知  
母黃柏清腎中之虛火

經水不及期而來者氣血俱熱治宜涼血清火丹溪  
用柴胡黃芩赤芍生地香附清火涼血用的是惟不  
宜用當歸生血生血則血愈熱白芍生氣則氣愈熱  
予用減是方立一清火涼血引血歸經血涼自生月  
信自然不爽

主方柴胡壹錢

黃芩柒分

赤芍柒分

施子柒分

川芎 伍分

生地黄 柒分

當歸尾 伍分

麥門

冬 去心 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

阿膠 柒分

胡黃連 伍分

香附 伍分

知母 伍分

黃栢 伍分

乾姜 燒灰 壹分

桔梗 伍分

水壹碗 酸梅壹箇煎至捌分 溫服 以上用柴胡黃

芩赤芍 梔子 枳殼 厚朴 清火 順氣 生地 門冬 涼血

乾姜 灰 引血 歸經 胡黃連 香附 阿膠 鮮薑 知母 黃

栢清腎水

經水或過或不及 黑紫成塊 色淡少而白多 滿腹疼



暗下沉痛名色雖多摠之經脉不調摠之氣血濕熱  
壅鬱成塊鬱熱久則血耗而色淡白多治宜清火涼  
血滲濕開鬱行氣古人用四物菴仁紅花玄胡三稜  
木香是惟用白芍熟地補氣血氣血愈盛愈熱愈鬱  
予加減是方立一清火順氣開鬱方

主方柴胡一錢

葛根一錢

黃芩茶分

赤芍茶分

生地黃茶分

麥門冬去心茶分

梔子茶分

連翹

茶分

薄荷茶分

枳殼茶分

厚朴茶分

檀

榔茶分

山查茶分

玄胡一錢

青皮茶分

官桂 一分

香附 伍分

川芎 伍分

當歸尾 伍分

知母 伍分

黃柏 伍分

乾姜 燒灰 一分

胡黃連 伍分

桔梗 伍分

茜根 三錢

水壹碗 姜皮一撮 桃仁一箇 煎至捌分 溫服以上

用柴<sup>胡</sup>黃芩赤芍梔子連翹薄荷清火枳殼厚朴檀

榔順氣生地黃麥門冬涼血血涼自生山查玄胡

官桂青皮行小腹止疼香附胡黃連開鬱乾姜灰

引經知母黃柏清腎水茜根開滯血下行

婦女經閉有時發熱有時而寒戰咳嗽膈脹瀉利吐

血吐痰先治的。別症俱無方可開經。古人用四物四君二陳八物升氣養血。總治的不是。予立一清火順氣寬中進食方。

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

黃芩茶分

赤芍茶分

梔子茶分

連翹茶分

薄荷茶分

枳殼茶分

厚朴茶分

香附伍分

胡黃連伍分

桔梗伍分

桑白皮茶分

馬兜鈴茶分

款冬

花茶分

茜根三錢

青黛二錢

瀉痢加蒼木

一分

赤茯苓伍分

猪苓伍分

澤瀉伍分

車前子 伍分

瞿麥 伍分

萹竹 伍分

水壹碗姜皮一撮前至捌温服以用柴胡葛根黃  
芩赤芍梔子連翹薄荷清解虛火枳殼厚朴開膈  
順氣香附胡黃連開鬱桑白皮馬兜鈴款冬花青  
黛止嗽化痰猪苓澤瀉車前子瞿麥萹竹蒼朮赤  
茯苓滲濕利小水

經閉雜症俱無予又立一開經方

主方三稜 壹錢

莪朮 一錢

山查 一錢

玄胡 三錢

茜根 伍錢

紅花 伍錢

枳殼 一錢

厚朴 一錢

檳榔壹錢

熟大黃柒分

香附柒分

胡黃連

柒分

黃芩一錢

赤芍一錢

官桂一分

青

皮柒分

水壹碗 棗仁五箇 煎至捌分 空心溫服 以上用三

稜 莪木 山查 玄胡 破滯 茜根 紅花 開經 枳殼 厚朴

檳榔 熟大黃 開導其經絡 香附 胡黃連 開鬱行氣

青皮 克肝火 官桂 走下元

婦人崩漏 血虛血熱 中氣下陷 錯經妄行 治宜清火

涼血 升氣 引血 歸經 古人用四物 參芪二陳 生起氣

血來下愈不止人若無血危亡立至予見倍醫尊右

方治死多少人遂立一清火升氣涼血引血歸經方

主方槐角去子錢 金銀花二錢 三七錢 五

靈脂一錢 蒲黃二錢 地榆二錢 椿根白皮

蜜錢 飛白礬一錢 酸梅一箇 升麻一分 乾

姜二分 黃芩一錢 赤芍一錢 劉寄奴一錢

梔子一錢

水二碗蜜一鍾煎至一碗半辰刻空心服半碗午

刻空心服半碗尚服自好

赤白帶

帶者胃中濕熱清濁不分濁氣下陷滲入于膀胱氣熱則白血熱則紅氣血俱熱紅白相間治宜清火滲濕分清濁利小便其症自除古人用二陳二朮雖能滲濕却不能清熱火得滲而愈燥帶何由而止予立清火滲濕分清濁利小便治好數百人

主方柴胡

一錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

滑石

一錢

生甘草

一分

猪苓

柒分

澤瀉

柒分

椿根白皮

蜜炒一錢

蒼朮 一分

赤茯苓 伍分

車

前子 柒分

瞿麥 柒分

藟竹 柒分

桔梗 伍分

水壹碗酸梅一箇煎至捌分空心温服以上用柴

胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷枳殼厚朴清火順氣

滑石生甘草分清濁猪苓澤瀉蒼朮赤茯苓車

前子瞿麥藟竹滲濕利小便椿根酸梅收斂氣血

不下降

胎前

經脉不行已經三月疑是胎又恐是經滯服驗胎散



川芎一錢 爲末空心艾葉湯調下覺腹內熱而微動者胎也服一日不動非胎即經滯也

惡阻

婦人有胎謂之惡阻惡心阻其飲食也胃中痰水嘔溢宜用芩連二陳湯

主方霍香一錢 陳皮柒分 半夏伍分 薑汁白礬

赤茯苓伍分 條黃芩錢 白木土炒 黃連伍分

柒分 柴胡一錢 赤芍柒分 梔子柒分 連

翹柒分 薄荷柒分 枳殼伍分 桔梗伍分

水壹碗竹茹子合姜一片陳倉米一合土一撮煎  
至捌分徐徐溫服以上用霍香陳皮止嘔半夏茯苓  
苓滲濕白朮條黃芩安胎黃連梔子赤芍連翹薄荷  
荷柴胡枳殼清火順氣

半產

婦人有胎三月腰疼小腹痛而落者血虛血熱榮衛  
不和致傷胃氣胎無所附而自落并有胎三月前不  
論胎動不動即服涼血養胃湯數劑胃壯血涼胎有  
所附麗而自安胎附于胃猶鍾懸于梁梁折鍾落猶

胃傷胎落也古人用參芪四物養氣生血氣血原熱因生養而愈熱胃因血氣蒸熱而傷胃傷而胎自落予立一清火涼血養胃方保人之胎不記其數

主方條黃芩 一錢

白朮 柒分土炒

當歸 伍分

川芎

伍分 砂仁 一錢炒

阿膠 柒分炒成珠

黃連 伍分

梔子

一錢 香附 伍分

桔梗 伍分

生地黃 柒分 麥門冬

去心 赤芍 柒分

水壹碗小黃米二合煎至捌分溫服見紅加三七

三錢

蒲黃 二錢

五靈脂 二錢

乾姜 燒灰一分

梔子灰 一錢 以上用條芩白朮安胎之聖藥當歸

川芎赤芍養血梔子涼血砂仁阿膠固胎

懷胎瀉痢乃脾胃濕熱治宜清火保胎利小水滲濕

古人用二陳四物生血燥濕脾胃愈熱而胎不能保

予立一清火保胎滲濕利小水方

主方條黃芩 一錢 白朮 土炒 柒分 柴胡 柒分 赤芍

柒分 梔子 柒分 連翹 柒分 薄荷 柒分 枳

殼 伍分 厚朴 伍分 猪苓 柒分 澤瀉 柒分

滑石 一錢 生甘草 一分 車前子 柒分 瞿麥

柒分

篇竹 柒分

蒼朮 一分

赤茯苓 伍分

桔梗 伍分

水壹碗茶一撮姜一片煎至捌分温服以上用條  
黃芩白朮養胃清火保胎赤芍梔子連翹柴胡薄  
荷解散邪火猪苓澤瀉蒼朮赤茯苓車前子瞿麥  
篇竹滑石生甘草滲濕利小水

懷胎紅白痢烏鷄蛋一個開孔去白留黃用水飛過

炒黃丹 伍錢

爲末入蛋內攪勻鹽泥裹住燒乾去泥

爲末一服二錢白水送下一服止是男二服止是女

此方數用數効

懷胎感風寒頭疼發熱混身沉困膈脹惡食治宜保胎解散邪熱右人用參蘇飲補氣補血邪火不散為害不淺予立保胎解散邪火胎自安

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

條黃芩

一錢

白朮

土炒 柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄

荷

柒分

赤芍

柒分

枳殼

伍分

厚朴

伍分

桂枝

一分

桔梗

伍分

茵陳

柒分

紫蘇

柒分

水壹碗姜皮一撮蔥胡三個煎至捌分溫服以上

用柴胡葛根槐花紫蘇薄荷鮮散風寒白朮條芩  
保胎赤芍梔子連翹茵陳清邪火

子煩

懷胎心驚膽怯終日煩亂心神不寧治宜清火寧神  
保胎古人用白茯苓防風滲濕補氣則熱愈盛不寧  
胎將動搖不安予立清火寧心保胎方

主方條黃芩一錢白朮土炒赤芍茶分梔子

茶分連翹茶分薄荷茶分枳殼茶分厚

朴茶分茯神伍分遠志去心酸棗仁炒茶

桔梗 伍分

乾姜 燒灰 一分

水壹碗 竹葉一撮 煎至捌分 溫服 以上用條芩白

木保胎赤芍 梔子連翹 薄荷清火 枳殼厚朴 降氣

茯神遠志 酸棗仁 寧神

子癰

懷胎火盛中風頭項強直筋骨拘急脚弓反張語言

蹇澁痰涎壅塞時發潮搐不省人事治宜解散邪火

涼心血寧心神古人用四物防風獨活治的血熱邪

火盛何時可安予立解散邪火清心寧心諸症俱除



主方條黃芩一錢 白米土炒 柴胡一錢 葛根

一錢 槐花一合 赤芍茶分 梔子茶分 連

翹茶分 薄荷茶分 枳殼伍分 厚朴伍分

羌活茶分 獨活茶分 防風伍分 茯神伍分

遠志去心 酸棗仁炒 乾姜燒灰 五加皮

茶分 白芷茶分 桔梗伍分

水壹碗姜皮一撮煎中入犀角磨水五分羚羊角

磨水伍分温服以上用條芩白米先安住胎柴胡

葛根槐花赤芍梔子連翹薄荷五加皮白芷羌活

獨活解散邪火風熱茯神遠志酸棗仁寧心神乾  
姜灰引心經犀角羚羊角解心肺之火

子懸

懷胎心膈脹滿胎氣不和癸上心腹疼脹難忍治宜  
清火降氣右人用四物人參又用的不是了予立清  
火順氣保胎方

主方條黃芩 一錢

白朮 土炒 茶分

柴胡 一錢

赤芍

茶分

梔子 茶分

連翹 茶分

薄荷 茶分

枳

殼 茶分

厚朴 茶分

木通 茶分

大腹皮 茶分

香附 伍分

胡黃連 伍分

桔梗 伍分

水壹碗竹葉一撮前至捌分温服以上用柴胡赤

芍梔子連翹薄荷清火枳殼厚朴木通降氣胡黃

連香附解鬱散火條黃芩白朮保胎

子淋

懷胎小便澁淋頻煩疼痛治宜清火利小水古人用

當歸茯苓生血滲濕淋何時而止予立清火清胎利

小水方

主方條黃芩 一錢

白米 土炒 伍分

梔子 柒分

連翹

茱分

赤芍 茱分

薄荷 茱分

厚朴 茱分

猪

苓 茱分

澤瀉 茱分

滑石 一錢

生甘草 一分

車前子 茱分

瞿麥 茱分

萹竹 茱分

石蓄 去毛

一錢

桔梗 伍分

水壹碗竹葉一撮煎至捌分温服以上用條黃芩

白水清胎梔子連翹赤芍薄荷清火猪苓澤瀉車

前子瞿麥萹竹石蓄利小水

子腫

懷胎而目遍身浮腫胎熱氣熱動蒸脾胃不能制水

散氣水氣傍溢于皮腹為腫為脹治宜涼胎清火順氣而腫脹自消古人用四物四君二陳氣血愈熱腫脹何時可消予立清火順氣涼血清胎消腫方

主方條黃芩一錢 白朮上炒五分 柴胡一錢 葛根

一錢 牛旁子一錢 赤芍茶分 梔子茶分

連翹茶分 薄荷茶分 枳殼茶分 厚朴茶分

猪苓茶分 澤瀉茶分 車前子茶分 萹竹茶分

桔梗伍分

水壹碗姜皮一撮煎捌分溫服以上用條芩白朮

清胎柴胡葛根牛旁子赤芍梔子連翹薄荷散火  
消腫枳殼厚朴散氣

懷胎八九個月當服枳殼紫蘇湯清火寬中順氣滋  
潤下元臨時好生

主方柴胡一錢葛根一錢黃芩茶分赤芍茶分

枳殼茶分厚朴茶分紫蘇茶分梔子茶分

連翹茶分薄荷茶分桔梗伍分

水壹碗竹葉一撮姜皮一撮煎至稠分溫服以上  
用柴胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷清火枳殼厚朴

紫蘇寬中順氣葛根生津液臨產時再加火麻仁  
柒分山查柒分服

產婦腹痛至急用黃緜一條瀉本縣知縣某人名催  
生無根水一大鍾對產婦面前將黃緜燒灰落在水  
鍾內一口燕下即時就生予用是法催生百余人亦  
曾催下死胎數十人

產後

婦人產後發熱心疼腹痛小腹悶痛左右膈內塊脹  
及惡露不盡傷寒傷風心腹脹滿飲食不下噉喘晝

夜無眠心神慌忽不定馮痢等症卅溪東垣河間俱云氣血兩虛大補氣血俱用四物四君二陳當時治人不知何如惟見今世庸醫遵方治死人不記其數予為天下後世慮立一積食積氣積血積火積飲方名爲五積湯治好數千人此方盛傳于四境

主方柴胡一錢 葛根一錢 黃芩柒分 赤芍柒分

白芷柒分 當歸尾伍分 川芎伍分 枳殼柒分

厚朴柒分 青皮柒分 半夏伍分  
皂角黃交心 姜汁白礬

赤茯苓伍分 蒼朮一分 官桂一分 山楂



柒分

香附

童便浸 伍分

乾姜

燒灰 二分

益母草

柒分

桔梗

伍分

兕枕

疼倍加

山查

渴倍加

葛根

瀉痢加

猪苓

柒分

澤瀉

柒分

車前子

柒分

瞿麥

柒分

篇竹

柒分

心慌

加茯神

柒分

遠志

去心 柒分

酸

棗仁

炒一 錢

崩加

三七 三錢

蒲黃

二錢

五靈

脂

二錢

阿膠

炒成珠 柒分

槐角

去子蜜 炒伍錢

金銀花

二錢

升麻

一分

酸梅

一個

惡露

不盡成塊

加三稜

柒分

莪朮

柒分

朮仁

二個

紅花

二錢

水壹碗

姜皮一撮

煎至捌分

温服

以上用柴胡

葛

根黃芩赤芍解散虛火白芷當歸尾川芎養血枳  
殼厚朴順氣半夏茯苓蒼朮解濕火官桂山查走  
小腹破兕枕乾姜灰引血歸經益母草生新去舊  
產後敗血入胎衣內不下血迷心竅不能言語血暈  
眼黑起坐不得敗血入心煩燥發狂眼見鬼神血凝  
聚疼痛難忍血溢流肢節間遍身疼痛血冲上喉中  
氣急發喘血滯脾胃腹脹滿嘔吐似翻胃等症古人  
用當歸熟地白芍炙甘草生血生氣甘草又恋膈敗  
血不散不下危亡立至予立散血散氣引血歸經方

主方當歸尾

柒分

川芎

柒分

赤芍

一錢

枳殼

柒分

厚朴

柒分

沉香

伍分

棕灰

一錢

三

七三錢

蒲黃

二錢

五靈脂

二錢

沒藥

伍分

乳香

伍分

三稜

伍分

莪朮

伍分

乾姜灰

二分

山查

二錢

官桂

二分

共為末

每服

二錢

熱

淡黃酒半鍾童便半鍾送下以上用川芎赤芍枳

殼厚朴沉香引血氣下行當歸尾三七蒲黃五靈

脂棕灰乳香沒藥破血散血三稜莪朮化塊山查

官桂走小腹破見枕姜灰引血歸經

產後風治宜散風庸醫用八物湯助起氣血未風氣血相搏而危亡立至不咎其治之不是反曰產後風原是難治的予立一散風順氣活血方

主方威靈仙 三錢 漢防已 一錢 防風 一錢 白

芷 一錢 羌活 一錢 獨活 一錢 葛根 一錢

槐花 一合 香附 伍分 當歸尾 伍分 川芎 伍分

枳殼 柒分 厚朴 柒分 天麻 柒分 葶解 柒分

秦艽 柒分 蒼朮 一分 赤茯苓 伍分 木瓜 柒分

薏以仁 柒分 桂枝 二分 牛膝 一錢 黃芩 一錢

赤芍 一錢

水壹碗 姜皮一撮 菴仁三個 煎中入乳香沒藥丸  
一錢 溫服 以上用威靈仙 通經絡 防已 防風 白芷  
羌活 獨活 散風 當歸 川芎 活血 枳殼 厚朴 順氣 天  
麻 秦艽 蕪荊 散筋 骨節 風熱 蒼朮 赤茯苓 木瓜 薏  
以仁 解散 風濕 桂枝 引諸藥 上行 牛膝 引諸藥 下  
行 香附 開鬱 行氣 沒藥 乳香 破鬱 血

乳病

乳乃少陽經氣血熱鬱竅閉不通急用通少陽乳經

藥少遲二日發熱腫起成瘡出膿苦不可言予立  
一方通經絡破氣血乳通而諸病俱除

主方柴胡二錢 通草二錢 生川山甲柒分 王

不留一錢 天花粉一錢 生地黄伍分 黃芩

柒分 赤芍柒分 桔梗伍分

水壹碗酒半鍾前至捌分食後溫服以上用柴胡  
引入少陽乳經通草川山甲通乳房王不留天花  
粉生地黄生乳汁黃芩赤芍清火破滯  
乳已腫疼恐成瘡急用散毒湯

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

黃芩

一分

赤芍一分

金銀花一錢

小地丁一錢

大靛

根一錢

牛旁子一分

乳香伍錢

沒藥伍分

桔梗伍分

水壹碗 棗仁三個 紅花壹錢 煎至八分 溫服以上

用柴胡引 少陽乳經 葛根槐花 金銀花小地丁牛

旁子大靛根 沒藥乳香 消腫止疼 黃芩赤芍清火

桂梗載藥味上行

婦人雜症

婦人心風心火盛而多喜肝火盛而多怒言語癲狂  
見神見鬼此乃怒氣迷心與肝竅治宜清肝火寧心  
神散滯氣古人用硃砂安神內有地黄當歸生血生  
火又用天王補心丹內又有人參生氣生火常見里  
中士大夫家服是方心慌頭暈此乃生氣生血之所  
致也予立一方清心火克肝熱解散鬱結之氣

主方柴胡一分 錢

黃芩一分

赤芍一分

梔子一分

連翹一分

薄荷一分

枳殼一分

厚朴一分

青皮一分

大腹皮一分

茯神一分

遠志



去心  
柴分

酸棗仁

錢炒一

香附

伍分

硃砂

伍錢未為

火

桔梗

伍分

乾姜灰

一分

水壹碗姜皮一撮煎至捌分温服以上用硃砂茯苓

神遠志酸棗仁寧心神青皮大腹皮克肝火柴胡

黃芩赤芍梔子連翹薄荷散邪火香附散鬱氣枳

殼厚朴破滯氣婦人五勞七傷脾胃虛泄瀉治宜

健脾胃養血脉定心神止泄瀉開鬱氣止盜汗除

骨蒸利胸膈予立一方

主方柴胡

一錢

黃芩

伍分

赤芍

伍分

當歸

伍分

川芎 伍分

赤茯苓 伍分

白朮 伍分

知母 伍分

陳皮 伍分

貝母 伍分

香附 伍分

地骨皮 伍分

麥門冬 去心 伍分

薄荷 伍分

生甘草 一分

水壹碗元眼肉伍個前至捌分温服以上用柴胡

黃芩赤芍清火當歸川芎生血白朮茯苓養胃知

母瀉虛火貝母潤肺香附開鬱地骨皮散骨蒸門

冬生津液甘草和中

有一人素說他妻淋痛不可言予立一利水方服二劑其痛愈甚細問伊治淋不効必非淋症方言陰中

下墜疼痛難忍此婦人小腸氣方書所不載惟本草條目上有之遂二日來取方遍閱本草立一克肝清火提氣止疼治好此婦外又治好數人此症甚少數十年方遇數人

主方玄胡索二錢 山查一錢 官桂一分 青皮

柒分 蛇床子柒分 槐角子柒分 卷栢柒分

白歛柒分 葶藶柒分 藁本柒分 海藻柒分

升麻一分 茴香柒分

水壹碗大枝子五個打破煎至捌分空心温服以

上用玄胡索青皮山查官桂走小腹止疼蛇床子  
槐角子卷栢白欵萆解藁本茴香解散疝痛并麻  
提下陷之氣

有一呂銀匠妻陰症小腹悶疼至手是指甲黑此症  
也是方書所不載予立一散寒止疼方即時救好

主方玄胡三錢 山查一錢 青皮柒分 官桂一分

乾姜燒灰三分 黑豆炒胡一茶鍾為末淡黃酒一碗

煎至捌分空心熱服外用食鹽一大茶鍾炒極熱  
入鍾內手帕包任放在臍下潤混身出汗其症自

除以上用玄胡索山查青皮官桂散小腹寒氣炒  
黑豆末乾姜灰解腹寒結血炒鹽能散墜寒

婦人口舌生瘡心脾火盛外感風寒寒包住熱治宜  
解散邪火古三子俱用清胃散當歸生血生地生血  
生出血末火愈盛又用升麻提起熱氣熱血于口內  
牙床上下疼痛難忍倍醫用是方治的人滿口并咽  
喉腫痛水漿不下問予立一解散邪火方二服  
遂愈

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

薄荷一錢

黃芩 柒分

赤芍 柒分

梔子 柒分

連翹 柒分

山豆根 伍分

玄參 伍分

大龍根 一錢

牛旁

子 一錢

紫蘇 一錢

桔梗 一錢

枳殼 柒分

厚朴 柒分

檳榔 柒分

水壹碗 姜皮一撮 葱胡一個 煎至捌分 食後温服

以上用柴胡 葛根 槐花 紫蘇 薄荷 解散 風寒 黃芩

赤芍 梔子 連翹 解散 邪火 山豆根 玄參 大龍根 牛

旁子 消腫 止疼 枳殼 厚朴 檳榔 降熱 氣 桔梗 載藥

味上行

有一王童生婦陽毒發斑熱極斑叔向一濶醫者說  
彼以血虛用四物一劑辰刻飲完又向予說陽毒傷  
寒純血純火又服四物湯生血生火化爲純毒此命  
難救午後即頭暈眼黑不省天地予立一散解邪火  
發表斑毒加大黃伍錢青黛伍錢一大劑飲二碗外  
用菟豆熱湯令病人解衣數女人各執布一片滾豆  
水濕了徃身上洒數百次一更後方惺又用大解毒  
藥二劑滿身斑出如搽珠一樣此症方愈

主方柴胡

二錢

葛根

二錢

槐花

二合

薄荷

二錢

枳殼一錢 厚朴一錢 檳榔一錢 熟大黃一錢

青黛二錢 梔子一錢 連翹一錢 香附伍分

胡黃連伍分 桂枝一分 桔梗柒分 黃芩柒分

水壹碗 棗仁三個 紅花壹錢 煎至捌分 溫服以上

用柴胡 葛根 槐花 薄荷 解散 邪火 枳殼 厚朴 檳榔

熟大黃 泄下 藥毒 青黛 黃芩 赤芍 梔子 連翹 清解

火氣 香附 胡黃連 解散 鬱火

封丘生員趙冲斗妻不語傷寒口閉俗醫以為死症

看送終衣置靈床上又向予說彼以死症不治我以



爲此症易治此症終始惟傳少陰一經心火上而逼  
肺肺竅閉而不能言予立一犀角解毒湯箸啟口灌  
進後混身汗流而愈

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

玄參柒分

黃芩柒分

赤芍柒分

梔子柒分

連翹柒分

薄荷柒分

枳殼柒分

厚朴柒分

麥門冬柒分

知母柒分

茯神柒分

遠志去心 柒分

酸棗仁柒分

青黛一錢

黃連伍分

桔梗伍分

乾姜灰一分

水壹碗竹葉一撮煎中入犀角磨水一錢温服以

上用柴胡葛根槐花玄參犀角解散心經邪火黃  
芩赤芍梔子連翹解散胸膈邪火枳殼厚朴降熱  
氣茯苓遠志酸棗仁硃砂青黛寧心神散心火姜  
灰引心經

趙邦女十四歲傷寒十二日倍醫不敢下火鬱不省  
人事向予說予以爲此症失下立一加味大柴胡湯  
通表裏治之移時即下汗出如雨而愈

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

黃芩柒分

赤芍柒分

梔子柒分

連翹柒分

薄荷柒分

石膏 一錢

茵陳 一錢

枳殼 柒分

厚朴 柒分

檳榔 柒分

熟大黃 伍分

火麻仁 柒分

桔梗

伍分

水壹碗 棗仁伍個 煎至捌分 溫服 以上用柴胡葛根 槐花 解散 和火 黃芩 赤芍 梔子 連翹 薄荷 石膏 茵陳 解散 胸膈 脾胃 邪火 枳殼 厚朴 檳榔 熟大黃 寬中 下氣 火麻仁 滋潤 大腸

張師傳夫人傷寒汗下後煩燥清火解毒自好吾垣庸醫照冊溪東垣河間諸公說汗下後不可汗不可

當用小柴胡湯利小便張素通醫就用此方脹二劑  
邪火愈盛渴飲水不止晝夜無眠煩燥棄衣而走彼  
以為治尊古方無可柰何當備後事張師親耒問予  
予云古人立方悞人以至于斯人參補氣生火半夏  
茯苓燥濕生火炙甘草甘而恋膈治成是症予立一  
清火解毒寧心生津方一服而愈

主方柴胡 二錢

葛根 伍錢

石膏 伍錢  
為末

青黛 伍錢

塊花 伍錢

黃芩 二錢

赤芍 二錢

梔子 二錢

連翹 二錢

薄荷 二錢

茵陳 二錢

枳殼 一錢

厚朴 一錢

檳榔 一錢

茯神 一錢

遠志 去心 一錢

伍分

酸棗仁 炒 二錢

桔梗 一錢

水壹碗半 硃砂末二錢 煎至一碗 溫服 以上用柴

胡葛根 石膏 槐花生津液 解熱毒 黃芩 赤芍 梔子

連翹 薄荷 茵陳 散火 消黃 枳殼 厚朴 檳榔 降火 順

氣 茯神 遠志 酸棗仁 硃砂 寧心安神 一服 火散

臥安而愈 小柴胡湯 不惟此症 用不的 凡症 俱不

敢用 慎之 慎之

成女間 孫婦 產後三日 血暈不省 人事 倍醫 以為氣

血兩虛大補氣血又向予求救予以爲敗血上冲鬱  
迷心竅一大補氣血此命難保立一破血順氣方一  
服氣順血散而愈

主方三七 三錢

蒲黃 炒二錢

五靈脂 炒二錢

梔子

燒灰二錢

地榆 一錢

乾姜灰 二分

枳殼 茶分

厚朴 茶分

檳榔 茶分

香附 伍分

胡黃連 伍分

桔梗 伍分

益母草 錢

石菖蒲 一錢

細辛

水壹碗 菝仁三個 紅花一錢 煎中入童便一鍾 溫

服以上用三七蒲黃五靈脂梔子燒灰地榆散敗  
血乾姜灰引血歸經枳殼厚朴檳榔降火順氣益  
母草生新去舊香附胡黃連開鬱行氣桔梗載藥  
味上行

孔生員女王生員男婦三鼓氣閉不省人事倍醫視  
脉曰無脉難救復向予求救予以爲無病脉定必氣  
血鬱滯予立大解散血氣方一眼而愈

主方柴胡 一錢 葛根 一錢 槐花 一合 枳殼 一錢

厚朴 一錢 石菖蒲 一錢 木通 茶分 香附 伍分

胡黃連 伍分

細辛 一分

桂枝 一分

桔梗 伍分

三七 三錢

蒲黃 二錢

五靈脂 二錢

乾姜 燒

一分

水一碗姜皮一撮菴仁三個煎至捌分入童便一

鍾溫服以上用柴胡葛根槐花解散邪火枳殼厚

朴檳榔木通解散鬱氣三七蒲黃五靈脂解散鬱

血香附胡黃連解散鬱結之火菖蒲細辛開竅乾

姜灰引氣血歸經趙老師嗣子婦忽然氣閉不省

人事亦用是方而愈



小兒癰疾

癰疾者驚氣包血而成塊積食熱久而成塊此癰之所由名也癰內有血孔外有血筋其筋直通脊背之下與臍相對有動處乃癰之根一身之血脉隨經絡入筋內由筋桶入癰孔內癰得血脉津貫則漸長漸熱熱極見元氣盡消而危亡立至予見佻醫無法可治予憐而立一琥珀膏方治好自家小兒三五個因而施方施藥數十年治好數千小兒方盛傳于四方

琥珀膏方

主方當歸尾

水紅花子

各一兩 伍錢

急性子

南星

蒼朮

牙皂

川蔞

草蔞

川芎

獨活

木鱉子

萹解

川山

甲

三稜

莪朮

枳仁

各一兩

木香

沉香

白芷

官桂

各伍錢

丁香

三錢

以上切片用真香油三斤浸藥片一宿炭火熬諸

藥片槐條撓至枯黑色瀘去渣再熬下水飛過黃

丹斤炒紫色徐徐入熬至滴水成珠退火下細藥浸

藥

乳香

血竭

雄黃

各伍錢

琥珀

三錢

蘆會 三錢

五靈脂 一兩

阿魏 一兩

麝香 伍分

共為末徐徐入攪勻碗內盛藥入涼水內浸一宿  
去火毒照疾大小裁狗皮攤貼有貼藥鼻口出血  
下痢濃血勿惧此乃癖塊消化而然也

克肝破塊止熱

主方蘆會 一錢

青皮 一錢

三稜 一錢

莪朮 一錢

枳殼 柒分

厚朴 柒分

檳榔 柒分

葛根 二錢

黃芩 柒分

赤芍 柒分

香附 伍分

胡黃連 伍分

桂枝 一分

桔梗 柒分

山查 一錢

水壹碗桃仁伍個紅花二錢煎至捌分臨卧温服  
 以上用蘆會青皮克肝火三稜莪朮檳榔山查破  
 積塊枳殼厚朴降熱氣葛根解散内外熱黃芩赤  
 芍清火破血香附胡黃連開鬱桂枝引藥味行膈  
 桔梗載藥味上行

痺疾

痺之為疾飲食過多損傷脾胃脾胃濕熱蒸肝而成  
 疾身熱体瘦面黃肚大青筋髮上鼻紅目昏泄瀉在  
 人立肥兒等方用人參白朮茯苓等熱燥之藥倍醫

尊古方不知治死多少小兒予甚憐而立一羊肝散  
治好自已小兒三伍個因而施方施藥治好數百小  
兒此方盛傳于四方

主方大茴香伍錢 小茴香伍錢 官桂三錢 桂

枝三錢 蒼朮三錢 青皮伍錢 蘆會伍錢 熟

大黃伍錢 麻黃三錢

共爲末每用二錢羊肝一個竹刀利開去白系沫  
片片入藥末內用連葉一個包住外用青布包繩  
捆砂鍋內蒸熟竹刀切塊沙鍋內炒用香油鹽姜

葱醋小兒任意吃見諸症不日自好

治急慢驚風併臍風傷風痰嗽

主方硃砂一錢 蟬退一錢 薄荷一錢 有痰加

青黛一錢

共為末薄荷蟬退燒水送下臍風乳汁送下以上

主用硃砂寧心神蟬退薄荷散風青黛化痰治自家

孫子伍柒個凡取方去治小兒無有不愈

禿瘡

主方真香油一鍾 槐條寸長十根 炭火滾油槐

條枯黑瀝出入黃香 二錢

化開取出鍾內盛壓

土窰中過一宿搽禿瘡上甲落再搽三五次自好  
亦上生髮如舊治好自家孩子兩三個凡有禿瘡  
者取方去依法製油搽瘡無有不愈以上用香油  
破血涼血槐條除濕散熱黃香解瘡毒散血生肌  
肉長頭髮此方不惟治禿瘡治黃水瘡尤効

湯火神効方

主方直香油 半瓶

黃葵花 二十

入香油瓶內封

住口凡遇湯火大人小兒搽上即時極涼紅腫自消

以上用香油散血止疼黃葵解火毒予曾火燒熱  
疹難忍搽上即涼而愈又治好自己孩子伍柒個  
凡耒取油取方無有不愈

小兒水瀉米谷不化服青火利水藥不効予立一蒼  
防湯

主方蒼朮

一錢米  
泔浸

防風

一錢

水壹鍾酸梅

一個

煎至捌分溫服

食積江南邵醫者化食方試之果然神効直勝白王  
餅



主方黃丹

一兩

杏仁

一兩去  
皮尖

芭豆

一兩  
去皮

黃臘

二兩

化開入上藥末攪勻小兒每用黃米大伍  
丸白水送下大人十九腹內响三伍聲食化而不

瀉

小兒痘症最忌用升麻湯異攻散保元湯

吳子楊治痘症始終解毒清火真治痘之神醫也但  
治法條目浩繁觀之者不馭省目予摘急用者叅以  
已意定爲一書便于觀覽調理痘乃胎毒隨時氣歲  
運而生不論城市郊野大小齊出胎毒輕者不待治

心法便覽 四卷  
記日而愈胎毒少重者出雖有險逸不同看症施治  
解毒發表十好六七胎毒太重者百無一愈古方發  
表用升麻升麻有毒舉胃升陽最速自胃上升由心  
肝肺至頭面心慌肺喘面紅頭疼眩暈痘出陽分者  
甚多毒上升壞目麻面頂癩不計其數輕者及重重  
者危亡不能救予屢見倍醫治到危地予心甚憐惜  
馬去升麻加柴胡槐花葛根赤芍黃芩治好自家數  
十小兒向予求救者十好八九發熱將出時

主方柴胡 一錢

葛根 一錢

槐花 一合

麻黃 伍分

黃芩

柒分

赤芍

柒分

薄荷

柒分

紫蘇

柒分

連翹

柒分

枳殼

柒分

水壹碗煎至捌分溫服脹加枳殼

伍分

厚朴

伍分

腹疼加赤芍

黃芩

以上用柴胡葛根槐花

麻黃薄荷紫蘇解毒發表黃芩清火赤芍散鬱血

止腹痛枳殼降火順氣

吳子治痘發熱首用升麻湯升毒與解毒論不合後

人忌用蔡氏異攻散陳氏保元湯古三子首用升麻

湯次用四物二陳四君湯後人尊右方一用治痘症

定至危亡蔡氏陳氏諸公立此方不知治死多少小兒諸公其無後乎天下後世治痘者斷不可用

發熱三日順症

發熱和緩三四日不變或熱或退二三日後方出能食二便如常無雜症者吉不服藥自愈忌產婦孝堂惡氣

發熱時或驚搖者吉或吐瀉不甚者吉用一劑加味柴胡湯再不瀕用藥又有一等硃砂瘡子終始通紅明透即靨亦不必服藥

發熱三日險症

發熱壯盛暴烈不能食發狂譫語煩燥腹疼者其症必重急服柴胡葛根麻黃黃芩赤芍薄荷敗毒湯內症甚者大柴胡湯下之

發熱身痛頭痛者加味柴胡湯發表

發熱時聲遂變者清肺解毒散

發熱時驚搖甚不止者服加味柴胡湯加辰砂一元

散

發熱時吐瀉不止身熱口渴者四苓散加黃連淡竹

勿忌涼水

大凡一切雜症皆由毒氣欲出不能出故也故發熱之初多用解毒發表必至出齊熱退身涼爲佳內症重者下之以泄其毒表裏症俱重則一汗一下

發熱三日逆症

發熱時頸面一片紅如胭脂者不治或各處有紅塊者不治

發熱時腰痛腹痛身痛甚不泄或治之不効者凶發熱時遂見紫黑斑者不治

發熱時唇紫黑破裂者不治

吳子揚所列熱標長膿靨五逆固皆不治之症然亦有不盡然者如熱三日逆症頸面通身如蕎麥皮者何其惡也予有一使女如上症倍醫崔傳許俱云不治予用大解毒藥一劑遂變紅活貫膿時頭如斗大身腫甚不分個將靨時咬牙寒戰癢抓破身白如帛又用大解毒藥一劑移時紅活半時靨痂落如手片大忽然見鬼棄衣而走又用大解毒藥一劑而愈然則諉之不治可乎

放標三日順症

自發熱一日二日三日已後身涼放標稀踈起頂摸之堅硬碍手色微紅光活根窠紅暈痘與肉色紅白分明作二三次出齊大小不等從面上出起胞腔或少或無飲食二便如常無別症者大吉不服藥自愈  
放標三日險症

初出色灰白頂陷不起或起亦軟不碍手根窠不紅活身涼內毒不出血不華色急用加味柴胡湯表之初出色紅紫焦黑根窠成片大便秘小便赤澁身熱



渴飲煩燥此實熱症也急宜解毒湯加紅花紫草蟬  
退甚則利大小便必待白轉紅活紫轉淡紅根窠紅  
潤能食大小便如常則起脹貫膿收靨一路無餘患  
矣

熱未退毒在內尚有未出者急服葛根湯加麻黃石  
膏黃芩薑蔥之類務毒解出盡方不服藥黃芩苦小  
兒有不吃止用三味更好

放標三日逆症

初出不起如蚊咬燈刺之點者不治

初出頂陷中有黑點或如針眼者不治

初出痘與肉色一片紅紫不退者不治或白與肉色  
一般久不變紅色者不治

起長三日順症

痘至四日五日六日漸漸長先出者先起後出者後  
起尖圓厚實微紅光澤根窠明潤面目漸腫能食無  
雜症者吉不必服藥

起長三日險症

痘症不能起長而頂陷者俗乎爲茱萸痘謂不足慮

此最悞人急宜用解毒發表藥使頂起不如茱萸  
狀者爲佳亦有如茱萸後能貫膿而獲吉者但稀  
見耳

痘至起長時但眼漸開潤頂漸平陷形如豆殼急服  
解毒發表藥有泄瀉者止之

紅紫陷頂不起或有黑痘如釘此皆火盛急用針將  
痘根皮穿過二針如十字或紫黑色或黃色口啼  
出血吐在水碗內色黑者再啼必至紅活外用雄  
黃末搽針口方止內用解毒發表散

起長三日逆症

痘色灰白不起漸成倒塌慘黯不明膨脹不食神氣

昏者不治

痘色紫黑不起欲成乾枯陷伏慘黯不明者不治

痘不起遍身都是黑點或紅紫點又腰腹痛者不治

平塌如蛇皮者不治

大抵痘長一分則毒出一分至六七日不盡長又黑

色者急用解毒發表或者猶有回生之理不可就

委之不治

貫膿三日順症

自初出至七日貫膿八日九日肥滿光澤皮厚不破  
成黃蠟色根窠紅活飲食二便如常無內症者吉  
貫膿三日險症

痘未起頂但眼濶至七八日乾燥疹皮皺起悞認結  
痂收靨者非也此宜明辨早治庶可回生宜用涼  
血解毒之藥

痘色灰白漿不滿足欲成倒塌皮薄易破者芎歸芍  
藥柴胡葛根黃芩湯涼血解毒自然膿起

痘色紅紫漿不足欲成乾枯黑陷者急用柴胡解毒湯加紫草紅花以花其色

凡貫膿肥滿則易結痂若痘雖長滿光澤可觀然摸過軟而皮皺者中雖有膿不甚滿足後必不能散靨或痘皆貫膿中間尚有不貫膿者急用活血排膿之藥有內症者去其內症

貫膿三日逆症

痘不貫膿灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治

貫膿時痘色白皮薄成水泡抓破止有清水隨乾者

疮成紫泡刺破出黑血者不治

收靨三日順症

痘至十三日膿色回漿如蒼蠟色或如葡萄色從口  
鼻兩邊收起漸收兩腿却額上和脚一齊盡收結  
痂逐漸剝落內症全無身漸輕快飲食二便如常  
者吉或手足心先收者亦吉

收靨三日險症

卅溪云將成就之際却色淡者宜養血藥用當歸尾  
川芎酒洗芍藥或加紅花却色紫者極熱用涼藥

以解其毒柴胡葛根酒洗黃芩黃連連翹甚者犀  
角赤小豆水煎服

收靨時失解利一靨至足心慌大渴大熱不寧涼解  
不効者急服滾白水入黃土半塊澄清再入沙糖  
二錢神礮一錢令小兒服之其心自寧有餘毒未  
發急宜服清熱活血之劑緩則悞事

將靨時如豆殼者俗呼爲倒靨宜服發表華色之劑  
如大便秘者下之小便赤澁者利之

當靨不靨泄瀉不渴寒戰咬牙發痒者外燒乳香薰



大凡內服熱藥以致熱毒猖狂氣血彌盛痘爛不靨者急服加味柴胡解毒湯外用敗草散傳之

收靨三日逆症

痘不收靨氣促上痰聲啞目閉無神者凶

收靨時遍身臭爛如餅搭不可近目中無神氣不治

收靨時遍身發痒抓破無膿水皮捲如豆殼乾者不

治

收靨時寒戰手足顫搖咬牙噤口者不治

收靨時目閉腹脹足冷過膝者不治

靨後餘症論

靨後諸疾皆由熱毒未盡以致纏綿無已也然痘後血氣已損虛火易熾甚不可以痘後餘症無害因循不治坐俟其危殆大抵痘後止宜清涼不宜補益蓋餘毒尚在故也

靨後煩渴益元散加葛根二錢石膏二錢天花一錢門冬一錢水一碗日進二服自止

靨後癍白有雜症者四物湯加知母黃芩有表熱者合葛根湯有裏熱者解毒湯

厲後身熱不退或寒熱往來或咬牙寒戰或朝搖可  
用解毒散火寧心愈風湯

主方柴胡一錢 葛根一錢 槐花一合 黃芩柒分

赤芍柒分 梔子柒分 連翹柒分 薄荷柒分

枳殼柒分 檳榔柒分 茯神柒分 遠志柒分

酸棗仁柒分 蟬退一錢 桔梗柒分

水壹碗煎中入神砂末一錢犀角末五分溫服

厲後遍身肢節上有癰瘡內服解毒湯外用傍瘡藥

貼自愈

瀉後瀉痢數十次毒氣盡解不防若久瀉痢不止用

解毒清利湯

主方猪苓

柒分

澤瀉

柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

滑石 一錢

生甘草

一分

車前子

柒分

瞿麥

柒分

藟竹

柒分

桔梗

柒分

水壹碗竹葉一撮煎至捌分温

瀉後喉痛聲啞解毒清肺散

主方甘草

一分

桔梗

伍分

玄參

伍分

牛旁子

伍分

山豆根

伍分

黃芩

柒分

赤芍

柒分

桔梗 伍分

水壹碗竹葉一撮煎至捌分温服

曆後發熱眼目云翳瘡痛急用解毒化云醫藥

主方柴胡 一錢

葛根 一錢

槐花 一合

黃芩 柒分

赤芍 柒分

梔子 柒分

連翹 柒分

薄荷 柒分

枳殼 柒分

檳榔 柒分

木賊 一錢

谷精草 一錢

草决明 一錢  
為末

牛蒡子 一錢  
為末

桔梗 柒分

白止

柒分

水壹碗桃仁三個煎至捌分温服

小兒疹症忌用程夢山高如山補陰抑陽湯爲害不  
淺

疹雖非痘症毒大之比亦由胎毒藏于脾肺二經必  
待外邪而後發于皮膚始出類傷寒咳嗽目赤頰紅  
頭疼吐瀉交作者順乾霍亂者逆盛熱一二日即出  
爲輕若多日不出傳三陰經則重急用清火解毒發  
表藥但當謹避風寒初出紅影在皮膚一見風寒即  
變白不發熱而毒反攻內危亡立至程夢山高如山  
張子揚等見此症不去解毒發表就去補陰抑揚不

知治死多少小兒又立論刻書吾垣庸醫看論尊方  
眼見治死士大夫家小兒不記其數予爲天下後世  
慮立一清火解毒發表方治好自家小兒三五個向  
予求救者治好數百小兒

主方柴胡一錢 葛根一錢 槐花一合 薄荷一錢

麻黃伍分 黃芩柒分 赤芍柒分 枳殼柒分

厚朴柒分 桂枝一分 桔梗伍分

水壹碗姜皮一撮煎至捌分溫服斷不可用升麻

提氣令兒氣喘心慌頭疼頭眩目紅耳聾

疹出一二日忽然大瀉嗽多者急用解表分利藥

主方柴胡一錢 槐花一合 黃芩柒分 赤芍柒分

梔子柒分 滑石一錢 生甘草一分 車前子

柒分 瞿麥柒分 桔梗伍分

水壹碗竹葉一撮前至捌分温服

疹出喘盛搖頭悶亂熱極毒盛風將出矣急用神砂

二錢

主方薄荷二錢 蝉退二錢 麻黃柒分 青黛一錢

水壹碗萹一片前至捌分入硃砂末二錢温服



疹四日出齊屬至心者即當鮮利徐徐屬去自然無別症若當屬不屬發熱嗽渴喘喉中痰响急用鮮毒湯散之

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

黃芩柒分

赤芍柒分

牛旁子一錢

紫草一錢

枳殼柒分

檳榔柒分

青黛二錢

桂枝一分

桔梗伍分

水壹碗桃仁三個煎至捌分溫服

凡疹後多嗽此頃出頃入之勢也凡有餘毒須假嗽多而散旬日之內尚宜有嗽急服清肺散毒湯

蓋痘疹

此症痘將收畢數日之後身稍熱一二日遍身即出

紅癍作痒

起愈

愈盛先出大小不一如粟米之狀漸

漸長大如雲成片此是收痂大愈之後放心縱欲  
飲食過傷脾胃又兼風熱而成也服解毒湯自愈

眼疹

兒初生未及滿月週身發出紅點如粟米之類其形  
似疹此症乃見在胎胞之內乳母胎熱見爲陰血  
之氣薰蒸已久生下忽遇陽風遂發出此疹故以

胎疹名不須治而自愈

痲疹

此症天行疫疠小兒大便結熱毒流入胃中故發痲  
不可與疹同治切不宜發表妄下若身熱作渴時  
白虎湯加大青玄參一劑而愈

大人有此症謂之陽毒發痲斷不可下惟用清火解毒湯候下者死

胎疹

婦人妊娠三五月忽然發熱出疹一日三次有形有

色真疹症也先要保胎為主急用條黃芩一錢白  
朮土炒七分

主方柴胡一錢 葛根一錢 槐花一合 梔子柒分

連翹柒分 桔梗伍分 條黃芩一錢 白朮土炒柒分

水壹碗姜皮一撮煎至捌分溫服自愈

騷疹

凡小兒痘未出之先時行疫病乳母為瘟氣所染見  
食病乳亦感熱病或週身發出紅點乃乳中熱毒  
入兒肌膚之間然毒氣不出自臟腑何畏之有故

名曰騷疹謂之母病子亦病也善治者先治其母  
見疹自愈矣

痢疹

見疹後未及半月父母溺愛不明隨其所欲而與之  
食令見疹後作瀉痢口久不已遂成休息瀉痢此  
餘毒在大腸急用清火解毒分利小水

主方柴胡 一錢

黃芩 柒分

梔子 柒分

薄荷 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

生甘草 一分

猪苓 柒分

澤

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

其... 卷...

顾问(以姓氏笔划为序)

于生龙 马继兴 王雪苔 王绵之 邓铁涛 田景福 龙致贤  
朱 杰 刘渡舟 李辅仁 李明富 李任先 余瀛鳌 张瑞祥  
张灿珮 施 杞 祝湛予 高辉远 唐绍明 唐由之 顾廷龙  
盛国荣 董建华 傅世垣 焦树德 裘沛然

编选· 薛清录 陈贵廷 傅景华 赵 璐 刘国正 毕俊英 李世勤  
刘振远 徐金香 巴恩荣 魏菊仙

印制· 蒋放年