



易寒論國字辨

五

ヤ 9
1159
4



傷寒論國字辨卷之六

尾張

淺野微之甫 著



大陽病篇第四下

問曰。病有結胸者。其狀如何。答曰。按之痛。寸脈浮。關脈沈。名曰結胸也。何謂臟結。答曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈浮。關脈小細沈緊。名曰臟結。舌上白胎滑者。難治。

結胸。脈症名。寸下見。多。此舉。所屬。畧。最。是。臟結。本編。下。後。邪。腹。中。結。陰。症。ト。云。似。然。在。病症。全體。ラ。ア。テ。論。セ。サ。レ。學。者。益。レ。且。脈。三。部。ラ。以。論。ス。本。編。ノ。例。非。ス。後。人。ノ。加。ル。所。也。

臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻。



也。
 無陽症即陰症也陰症ハ不往来寒熱其人静其其ツイ也
 然ルニ反下云通セ也舌上胎滑ハ舌胎黄黑ニテモ滑ハ陰症也故
 ニセ下スヘカサル也滑ハウルライニマクトシ名也總テ舌胎黄ニテモ黒クテ
 モ乾燥ス實熱也ウルライハ陰症也故ニ白虎湯ノ症ニ舌上乾燥ト
 云イ大承氣湯ノ症ニ口燥咽乾ト云フ是腹中實熱スノ症也故ニ黄
 黒胎ニテモウルラテハ實熱ニ非ス必慎テ寒藥ヲ与フヘカラス此章後人
 ノ加ル所トシモ其症ヲ察スルコトシキコト貴重スヘシ
 病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之
 因作痞所以成結胸者以下之太早故也。
 風ハ陽也衛モ陽也風衛ヲゾララ中風トス是ヲ發於陽也寒ハ陰也榮
 モ陰也寒榮ヲゾララ傷寒トス是ヲ發於陰也反下之ヲトハ表ヲ

解セシ先下也熱入ルト下因テ表熱裏入ル也下之ヲ太早キト
 中風傷寒ニ表ヲ解セズ早下ニ因テ結胸ト痞ト也是後人ノ加所故ニ
 風寒ニ宋衛ヲ以テ陰陽ヲ別ツ本編ノ例ハ三陽三陰ヲ以テ陰陽ヲ別ツ故ニ
 病陰ニ發スル陰症也故ニ誤テ下スル死症トナル其例合サレテ如此
 結胸者項亦強如柔瘥狀下之則和宜大陷胸丸
 項也柔瘥ハ瘥也汗アルヲ柔瘥トシ汗ナキ剛瘥トス其症ノ角弓反
 張ス病也結胸ノ症胸中ニ熱毒滿リテ首モウラス柔瘥ノ引リテ
 引ルヤウニシ也如此者下之和也然レ諸症脉狀ヲアテ取ルニ是ラ
 大陷胸丸

大黃半升 芒硝半升 杏仁半升
 右四味搗篩二味内杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸
 一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升温

頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法
擣臼三ツ也節師ハ絹フルイニテフルウ也合研ハ四味ヲ合セテヤケンニテスル也
彈丸ハ八キキ弓ノ玉ノヲニテ鉄炮ノ玉ノ類也一枚ハツ也頓服ハ一度ニ皆
服ス也

結胸證其脉浮大者不可下下之則死
結胸證悉具煩躁者亦死

結胸熱毒胸中引腹中鞭滿其病裏ヲリ故其脉沈實也
然レ浮大ナル脉症ハ是故ニ下セバ死ス煩躁ス者ハ其症深故ニ亦死

大陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為
虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也臣及下之動
數變遲膈内拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣
陽氣内陷心下因鞅則為結胸大陷胸湯主之若不結胸但

頭汗出餘處無汗劑頭而還小便不利身必發黃也

浮則為風ヨリ數則為虛ニテ文上下ゾカラス愆大也脉浮而動數
浮表症ノ脉動數表水脉也動脉々々上下ゾク氣味ナキ脉也頭
痛發熱ニ症ハ表症也微盜汗出胃中實アル症也及テ惡寒ス者ハ表
未解也頭頭痛發熱脉浮トハ表症トイヒ微盜汗出ト動數ノ脉ハ
表已ニ解スルニ似リ然ルモ今惡寒アリ故ニ反テ惡寒スルハ表未解也云也
膈内ハ胸中也拒痛ハ手モサテテホド痛也胃中空虛客氣動膈ハ法語
也法語其見ヘカラス知ヘカラスヲヲ説クヲラレテ病因ヲ知ラシムル也胃中
空虛ハ下スニ因テ胃中空虛ニ在也客氣ハ胃中空虛在ニ因テ氣發
メ膈中ヘキ上ル也短氣ハ息ツギノセロキ也躁煩ハ苦ミアカキテ煩モン
ス也心中ハ胸中也懊懣ハ胸中云々イワレタ苦也陽氣内陷ハ表陽ノ氣
内ニ落入レ也言ハ大陽病脉浮ラ動數頭痛發熱微盜汗出テ而

九者八是陰症似多然在是結胸熱實症陰症非イカトナ
心下痛按之石鞭ナルヲ以テ也故大陷胸湯ノ主ル所疑ナ若陰
症ナ心下及腹候比ヨワカ力ナ其脉沈微立者也此脉沈實
ニ緊ナ者ト大異也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無
大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之
熱結在裏表熱裏ニテ結スル也是大柴胡湯ノ法語也凡法語
ハ其病因ヲ明ス也水結ハ水氣聚結スル也言ハ傷寒十餘日表症已ニ
マ身熱綿ト止サレ者熱結在裏症見ストイエ疑ラハ是熱
結在裏故ナルヘシ然今マ往來寒熱ノ果ハ是熱結在裏
スル所也大柴胡湯ヲ与ヘシ然往來寒熱ノ症ノ心下急鬱
ト微煩スル症具サハ的然ト大柴胡湯症トスカラス故云テ

後症ヲ見ル辭ヲス也若大柴胡湯ヲ与ル後心下滿按之痛
結胸ノ如ク寒熱往來ナク又但身熱アリテハハトス大熱ナキ者此為
水結在胸脇也是結胸ノ本症非ストイエ亦類症也水結アル故
身熱解セサル也故大陷胸湯ヲ以テ水結ヲ去ル諸症皆治ル
也若心下鞭滿按之痛ハ結胸ノ如ク往來寒熱ナク又大熱ナク但身
熱アリテ又頭微汗出者ハ的然ハ結胸ノ症疑ナシは大陷胸湯ノ主
所也此章大柴胡大陷胸ニ湯ノ分別ヲ舉ル也
右正文三章始ノ一章ハ表症仍在テ誤下結胸ト九者ヲアケテ結
胸本因ヲ明ス中ノ一章ハ誤下ヲ經テ結胸ト九者ヲアケテ其位地ヲ明ス
終ノ一章ハ熱結ト水結トアケテ益結胸ノ症ヲ明ス
大陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡
所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯

主之

舌上燥而渴燥熱多乾也渴湯茶ヲ多ク飲也水熱
 心下聚結之症也大柴胡湯之症嘔而渴大陷胸湯之症ハ
 舌上乾燥而渴大承氣湯之症口燥咽乾而渴也三湯別也
 申時也所ツケ字テ意ナレ潮熱ハ潮ノサスカ如ク時ヲ多クサス
 熱也大承氣大柴胡等ノ症ハ甚ク潮熱アリ大陷胸湯之症ハ
 少潮熱也言ハ大陽病一モ汗ヲ發解又重テ汗ヲ發解ス此
 解者裏症アルカ故ニ解セト復下之遂ニ不大便五六日舌上
 燥而渴日晡ノ時少潮熱アリテ從心下至少腹鞅滿而
 痛手モ近クカサレ者下之因テ胃中空虛より表熱裏ニ入リ胃氣運
 多是ヲ以大便通セリ五六日水熱心下ヨリ少腹ニテ充満ノスル所是
 結胸ノ本症疑ナレ大陷胸湯主之也

大柴胡大承氣大陷胸三湯ニテ者其位地同其病因ハ各
 同カラス其症疑似ス者其位地モユカニ分テ同カラス大柴胡湯位
 地胃中ニ在テ上心下ヨリ胸脇及フ者也大承氣湯位地正胃中在
 湯病
 胸三
 大陷
 承氣
 胡大
 大柴

者也大陷胸湯ノ位地ハ亦胃中ニ在テ上心下及ヒ下少腹及フ者也是
 三湯位地ノ別也其病因ハ各同シカラス大柴胡湯ノ病因ハ熱實ヲ以
 主シ其胃中實物アル傍症也亦胃中實強ニ實症病也大承氣
 湯ノ病因ハ胃中實物アル傍症也亦胃中實強
 實熱病也大陷胸湯ノ病因ハ本是胃中虛弱ヲ邪アリ邪氣因テ
 主シ其熱ト水ト結胃中ニアリ是陽病實症ニ胃中虛弱ナル者也
 故ニ大陷胸湯ノ症一時熱實結胸ノエニ必ス熱ト水ト集結スル者止
 其胃中實物アル傍症也三湯ノ病因也然ニ大陷胸湯ノ胃中虛
 邪アル特ニ陽症實病中ノ虛邪ヲ陰症虛寒ノ病ト大ニ同カラス故ニ虛

邪アリトイヘテ猶是實症病也

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之此症結胸輕症故小結胸云此症其鞞滿在心下カレテ膈内カ腹トニ及ス且按之則痛テ按サレハ痛ニス又結胸ノ脉ハ沈ラ緊ラ其病甚ク裏ニシテ脉也此脉浮滑ナレ其病表アルノ脉也其症ノ輕重ハ異也畢竟痰熱心下ニ集結スル症ニ心下痞鞞ノ類也又凡小大ニ對スル名也大ニ對スル小ト云フハキト也今大陷胸湯アル小陷胸湯アルヘシ然レハ大結胸ナレハ小結胸ハ有カラス是ラ皆カリンカ名ニテ本編チキト也

小陷胸湯

黃連一两

半夏半

枳實大者一箇

右三味以水六升先煮枳實取三升去滓内諸藥煮取二

升去滓分温三服

此方位地胸中心下ヲ主リ其症ハ痰ト熱ト集結ノ痞鞞スルヲ主也大陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也及下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

協熱利下ス因テ表熱虛ニ乘ン裏又裏虛ト相協合ノ利ヲナス也不能卧但欲起心下結聚ス故ニ息苦キ故也故ニ心下必結云此症ニ脉微弱ナルモト寒アルト云心下結イヘ脉微弱者ハ寒アリテ陰症也然レ及テ下之若利止ス結胸トナリ若未止者ラ四日ニ又下之表熱裏入リ裏虛相合ノ協熱利ト也然レ結胸ハ陽病熱實症ナレ陰症ヲ下セ益虛寒ノ症ナリテ熱實ノ結胸ニナルヘキ理ナレ此等ハ偽章ノ内ニテモ殊ニタワイモノキ章也分ノ字ハ疑ラズテ

大陽病下之其脉促不結胸者此為欲解也。脉浮者必結胸也。脉緊者必咽痛。脉弦者必兩脇拘急。脉細數者頭痛未止。脉沈緊者必欲嘔。脉沈滑者協熱利。脉浮滑者必下血。

此章脉以症斷之。不經大者。凡醫療之法。古聖人問切。以陰陽表裏決斷。治法處之者。古聖人大法。古今通法也。望顏色。望也。聞聲。聞也。問。問也。病始末。病人苦痛。飲食二便。其外。ヤウス。問也。切。脉。トル也。此四者。ツカキテモ治療。ナス。カラス。且此四ツ内。脉ヲ三ツ下ニ置タル深意アル也。イカニトナルハ。凡萬病。脉症相應スレハ吉シ。全快ス。脉症相及スハ凶シ。危多。病表アリテ。脉浮。病裏アリテ。脉沈。其脉症相應。吉也。病熱アリテ。脉遲。病熱ナク。脉數。脫血。脉大。煩躁。脉微。其脉症相及。凶也。凡萬病。

其脉症相應スルト相及ス。以陰陽表裏斷之。治法處之者也。然レ先ツ顔色ヲ望。聲音ヲ聞。病ノ諸症ヲ問。而後。脉ヲ診。其方。處ヘシ。然レ此章。脉ヲ以症ヲ斷。古聖人ノ法ヲ廢シ。医法ヲ潰乱ス。此ヨリ。大ナル。然レ本編列ノ仲景氏ノ法。後世。欺。其罪。誅。猶餘アリ。凡教ヲ立法。垂者。嚴正ナル。貴若一ツモ。正レカナル。後世。其害。限リナシ。學者。亦トテ。正キ者ヲ選。テ学ヲ。肝要トス。若シ誤テ。始。正レカサル者ヲ。學子。先入者。主トナテ。一生ヲ。誤ル。多ク。ヘテ。新奇ノヲ。好。平常ノ事ヲ。イト。井。遠。貴。近。イ。レ。人情也。初學。慎テ。奇怪ノ術ニ。惑フ。ナク。トメテ。古來傳ル。可。正。大ノ道ヲ。学ス。レ。病家。亦。新奇ノ術ニ。惑フ。ナキ。第一ノ心得也。

傷寒論卷之六 八 出未二成

一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不詳欲引衣自覆者若以水濕之洗之益令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

此方寒水心下結也效モアルキ方ナレ後人ノ偽方ナレ初学ニ用ルナカレ又身熱以下文理正シカラス取足サレ也

大陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門

大陽少陽二部症一同併ヲユラ併病ト云此症頭項強痛大陽也眩目イ冒上氣物ヲカリタルヲ云此症心下痞鞭結胸ノ奴ハ

少陽也此症大陽ノトイモ亦少陽ア守ハ汗ヲ發スカラス汗ヲ發ス熱イヨクサカニナリテ譫語脉弦也大椎肺俞大陽ヲ治ス肝俞期門

少陽ヲ治ス脉弦肝脉也鍼家ノ論後人ノ加ル所本編ノ義ニ非ス婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

血室衝脉也表症惡寒發熱者經水適來血室空虛也故表熱虛乘入也經水適斷表熱血搏結也熱除而脉遲身涼表症裏入也故也胸脇下滿如結胸狀譫語者表熱裏入也結也刺期門其實ヲ瀉也隨其實而取之ト何ノ經

三テモ 其邪ノ實スル所ヲ刺ス云又經水道斷テ瘡狀ノ如キ者ハ胸脇ノ下滿ル症ナシ故ニ小柴胡ニテ主治スル也又經水道未讀語如見鬼狀ハ熱ト血ト相搏故也胸脇滿ノ症及ヒ寒熱如瘡狀症トケル期門ヲサレ小柴胡湯ヲ主トスルヲモナレ但經水通ス手ハ熱亦血隨テ自然ニ解ル也犯胃氣ハ下スラ云上焦ヲ犯ス汗ヲ發ル也中焦ヲ犯ス期門ヲサス也衛氣ハ上焦ニ出テ榮氣ハ中焦ニ出故也此三章皆後人ノ說本編ト異也

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之
支肢同四肢也故支節煩疼手足ノシラシク痛氣味也心下支結支持也サエテ也表熱心下入テ結聚左右ハサエ引ルキミ也微嘔ハ嘔セトスル氣味アル也言傷寒六七日其表症大半マシ但發

熱惡寒ハ少アリテ手足多ク痛嘔セトスルキミアリテ心下結聚ノ左右ハサエ引ルキミニテ鞭滿ノ痛ニ非ル者ハ表裏兩症トイヒ表ハ少ク裏ハ多ク故ニ小柴胡ヲ以裏ヲ治シ桂枝ヲ加テ表ヲ和ス也此章古來小柴胡加桂枝ト静齋先生ヲモラク心下支結ハ胸脇苦滿ヨリ深レ故ニ大柴胡ヲ以桂枝ヲ加者ト然レモ微惡寒支節煩疼ノ表症仍在トシ小柴胡ヲ以桂枝ヲ加者ナルレ學者病人ニクニ表裏症ノ多少ニ因テ通用スレ

柴胡加桂枝湯

小柴胡湯加桂枝三兩餘同本方

此方宋叔成本ト小柴胡湯桂枝湯ニ方合方也然レモ加桂枝ト云テハ桂枝一味ヲ加ルヲ審也且持解ハ大柴胡ヲ以桂枝ヲ加其說上ニアリ

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

傷寒五六日已發汗而復下之。傷寒表症已汗發解。醫者モ之。此表症解セサル。裏症アル。故也。下之。於是表熱虛ニ乘。裏入リ。今ノ症ナル也。胸脇滿微結。熱裏入胸中。脇下。滿テ。少レ結聚ス也。小便不利。胸脇微結。因テ水氣下降セ也。渴スハ。水熱上ル也。心煩ハ。邪熱胸中ニ入ル也。以上ノ症皆下ス。因テ表熱裏入テスル所也。頭汗出。汗ヲ發ス。因テ表ノ陽氣虛ス也。往來寒熱。其邪半表半裏ニ入レ也。故ニ小柴胡湯ヲ以其本ノ症ヲ解。乾姜桂枝牡蠣ヲ加テ陽虛ヲ治スル也。其半夏ヲ去ルハ。嘔セサル故也。枳實根ヲ加ルハ。渴スル以也。此症多ク小柴胡湯ノ症ト同ク。而其乾姜桂枝牡蠣ヲ加ルハ。大

異ナ。何ソヤ。曰小柴胡湯症ト同キ者多ク。イニ其已ニ汗ヲ發シ。而復下之者。其本大同カ。且頭汗出。ハ已ニ汗ヲ發ス。因テ表ノ陽氣虛ス也。又胸脇滿微結。イニ胸脇苦滿。或ハ脇下痞鞭ス。ト裏症ノ微甚モ亦異也。是其乾姜桂枝牡蠣ヲ加ルエ也。學者熟思ス。今世間傷寒。汗ヲ發シ。後小柴胡湯ノ場ニ至リ。其症往來寒熱。或寒。少熱多。或寒ナク。獨熱往來。或頭汗。或盜汗。或ハ渴。或ハ渴セ。小柴胡ノ裏症備ラサル者。小柴胡ヲ用テ解ス。遂ニ變症ヲ生スル者多ク。其症モト陽虛ヲ帶ル。故也。學者此方ヲ試用ス。其說小柴胡ノ下ニ出ツ。

柴胡桂枝乾薑湯

- 柴胡 半斤
 - 桂枝 兩三
 - 乾姜 兩三
 - 黃芩 兩三
 - 枳實 兩四
 - 牡蠣 兩三
 - 甘草 兩二
- 右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一

升日三服初服微煩復服汗出便愈。初服以下後人加所也。傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此為陽微結必有表復有裏也。脈沈亦在裏也。汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也。脈雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得尿而解。

本編沈緊小柴胡湯之脈也而此章少陰之脈又陽結陰結云者本編義大異也且議論混雜取不足焉

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振起發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯

湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡湯不中與之宜半夏瀉心湯

傷寒五六日大柴胡之位地也而嘔發熱是柴胡湯之症也其上又往來寒熱或胸脇苦滿上之柴胡湯之症具也而醫察之他藥以下之是誤治也然幸壞病下之柴胡湯之症仍在其脈症審之小柴胡或大柴胡復与之是已下之其後汗後通治下之其人必蒸熱出且振其後汗出解若醫誤下之後柴胡湯之症心下滿石如者是後柴痛者下之因結胸大陷胸湯主之也若醫誤下之後柴胡湯之症心下但滿濡痛者此為痞莫上之為痞莫上之宜半夏瀉心湯也中與宜半夏瀉心湯之症心下急者半夏瀉心湯心下時宜之也柴胡湯之症心下急者半夏瀉心湯心下

痞似多者也又大陷胸湯心下結鞭ノ始モ亦疑似者也故時宜ラカツテ先ツ半夏瀉心湯ヲ与テ而其後症ニ隨テ其治法ヲ處スヘシ凡大陷胸湯心下痞滿ノ鞭ハ腹皮トモ石ノ如クニ鞭者也半夏瀉心湯ノ心下痞滿ノ鞭ハ腹皮マワラカシ内鞭者也而大陷胸湯ノ石鞭ニ比スハ大濡ナル者也大柴胡湯ノ心下滿テ急スハ半夏瀉心湯ノ痞鞭ニ比スハ亦輕症也

半夏瀉心湯

半夏斤半 黄芩二兩 乾薑三兩 人参三兩
黄連二兩 大棗十二枚 甘草三兩
右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

此方其位地ハ大陽ヲ主リ其症ハ下ニ因テ熱ト飲ト心下アリテ痞

中用スル目アテトス也故ニ下利ノ症表症ヤニテ心下ツカヘ食進ムス或ハ嘔吐スルヨシ又積聚ニツカレ者ニ世間通用ストイエ凡テ後世ノ大七氣湯ナトノ類ホト效ヲ見ス方意ニアカラヌ故也トカク熱ト飲ト本トシタレ方也故ニ痢疾ナドハ症ニ隨テ与フヘシ

右正文四章始ニ五章ハ結胸ノ正症ヲアケテ上節ヲ照シ大陷胸湯ノ位地ヲ明ス第二章内外両症ノ者舉第三章ハ外症直ニ上ニ入ル者ヲアケテ相比シ兩章ノ異同ヲ明ス終ノ四章ハ大小柴胡湯ノ症ヲアケテ結胸ト痞トヲ辨シ前ヲ結シ後ヲ起ス也

大陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不下其人煩

此章症ヲムテ其要ヲアケス且治法ヲ具セス取ルニ足ラス
脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

脉浮而緊ナル傷寒ノ表症也然レ汗ヲ發セテ下セ其熱裏ニ入
テ痞トナル故ニ緊及テ裏ニ入ル云然レ脉ヲ以論ス者本編ノ例ニ非ス且
痞症ハ熱入リ水飲ト相搏テ在者也然レ但氣痞耳ト云ハ病因ヲ知
ラサル也

大陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出^テ作
有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者
此表解裏未和也十棗湯主之

大陽中風ハ中風大陽ノ地ノ病也且中風純陽ノ症ノ故ニ大陽中
風ト云也下利嘔逆表解ス者乃可攻之ハ嘔逆ハコシクテ也言中風ノ
症ニテ下利嘔逆アル先ツ表症ヲ解シ而後ニ其下利嘔逆ヲ攻ヘシ大小
柴胡湯柴胡加桂枝湯ナド表裏兩症カ子治ス者ト異也イカトナハ
中風表症ニミテ裏ニ入ルナレ故ニ中風ニ表裏兩症アル者ハ其病本

ニ也大小柴胡湯柴胡加桂枝湯ナド表症裏ニテ表裏本ツル者
異ナル故也故其治法先ツ其表ヲ解シ而後ニ其裏ヲ攻ル也熱々ハ小雨ノ
フル白汗ノ出ラ云發作ハ熱ノヲヨリサレ也心下痞鞭滿此痞鞭滿大陷胸湯
ノ石鞭ニ比スレ甚マラカ也半夏瀉心湯ノ痞鞭而滿ニ比スレ甚カシ是ニ
症ノ中間ニアリ其輕重ヲ分クシテス故ニ痞鞭而滿ト云スノ痞鞭滿ト
云也短氣ハ息ツキノセワレキ也言大陽中風表症アリテ又下利嘔逆
ノ裏症アル者ハ是表ハ中風ノ症ヲ裏ハ水氣ノ症表裏其本別ナル者也
故ニ先ツ其表症ヲ解シ而後ニ其裏症ノ水氣ヲ攻下スレ是治法也若其
人熱々ト小雨ノ潤^ス如ク汗出テ其熱ノ發作ス^ル時刻アリ又頭痛ノ心
下痞鞭滿是ヲ大陷胸湯結胸ノ石鞭ニ比スレ甚マラカ也半夏瀉
心湯ノ痞症ニ比スレ甚カシ且其痛脇下ニ引^ル而ノ乾嘔或ハ短氣ニ
汗出惡寒セサル者ハ是中風ノ表症已ニ解シ諸症皆水氣ノ所也

故二十東湯主之疑ナシ

十棗湯

芫花

甘遂

大戟

大東

右上三味等分。各別搗為散。以水一斗半。先煮大東肥者十枚。取八合。去滓。內藥。未強人服一錢。贏人服半錢。温服之。平旦服。若下少。病不除者。明日更服。加半錢。得快利。後糜粥自養。

強人以下疑久誤脱アル本編ノ例ヨリ強人ハ一錢贏人ハ半錢平且温服スト云フヘレ糜粥ハヨク者テタルカユ也快利ハコロコク下ル也

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽氣並竭。無陽則陰獨。復加燒鍼。因胸煩。面色青黃。膚

暱者難治。今色微黃。手足温者易愈。

此章杜撰甚ク取ニ足ラズ然レ初学ノタメニラマシ論ス太陽病表症ノ者医其汗ヲ發シ解セズ遂ニ下シテ發熱惡寒ス因テ復下之也然レ汗ヲ發ストイテ發熱惡寒アルハ表症解キ昇亡陽等ノ危症生セサレ表イテ全ク虚セス因テ復下之トイテ但心下痞一症ヲアラワシ下利穀不化等ノ変症ナケル裏モ亦イマタ全ク虚セス然ルニ表裏俱ニ虚シ陰陽ノ氣並ニ竭ト云其杜撰一ツ也又上ニ陰陽氣並ニ竭ト云下ニ無陽則陰獨ト云夫既ニ陰陽ノ氣並ニ竭ト云陰何シ獨有且ハ陽氣ヲ以生存ス者也陽ナク陽獨チ即死症也其杜撰二ツ也又既ニ無陽則陰獨ト云イ又復加燒鍼ト云夫燒鍼ハ汗ヲ發スル也今無陽獨陰ノ危症ニ豈燒鍼ヲ加者アラヤ其杜撰三ツ也又面色青黃肝木脾土剋也膚暱ハ亡陽也故ニ難治云色微黃ハ脾土旺也

手足温^レハ陽氣復^ル也故^ニ易^ニ治^ス云然^レ上^ニ既^ニ死^ニ症^トナリ又^ニ燒
鍼^ヲ加^ス者豈^ハ又^ニ生理^ヲマ^シヤ其^レ杜撰^{四ツ}也且^ニ成^ニ無^ク忌^ク註^ニ竭^ニ陽^ヲ表^ニ虛^ト
竭^陰裏^ニ虛^ト無^ク陽^ヲ表^ニ症^マト^シ陰^ヲ裏^ニ痞^{アリ}ト^シ杜撰^ノ上^ノツ^セ也畢
竟^ニ通^ニ編^ニ皆^ニ正文^トシテ後^ノ人^ノ加^ス所^有ル^ヲ知^ス是^ヲ以^テ牽^キ強^ク註^解
ヲ^スル^故也字^者熟^ニ慮^スヘ^シ

心^下痞^ヲ按^之濡^シ其^レ脉^關上^浮者^ハ大^黄黃^連瀉^心湯^主之

心^下痞^ノ症^多ク^誤下^ス因^テ生^ス半^夏甘^草生^姜瀉^心湯^ノ症^然リ^然レ^ハ
再^ニ大^黄ヲ^以テ^下ス^ヘカ^キル^ヲ審^也若^ク表^ニ症^裏入^リ大^柴胡^湯ノ^症ノ^如キ^ハ表^ニ
裏^ヲカ^子治^スヘ^シ獨^ニ痞^症ヲ^セム^ヘカ^ラス^此章^モ亦^ツサ^シ甚^シ

大^黄黃^連瀉^心湯

大^黄 二^兩 黃^連 一^兩

右^ニ味^以麻^沸湯^二升^漬之^須更^絞去^滓分^温再^服ス

麻^沸湯^ハ三^湯也^須更^ハレ^シ也^ニ湯^ニヒ^タス^ヲレ^ボリ^テカ^スヲ
去^リ温^メ二^度服^ス倍^ニ云^フラ^ダレ^也金^匱此^方黃^芩二^兩加^ヘ三^黃湯^ト
名^ク吐^血衄^血治^ス又^上焦^積熱^ノ諸^症用^スレ^シ又^古方^家積^聚ニ^テ
心^下痞^鞭ノ^症多^ク用^スレ^バ熱^ナク^大便^秘結^セル^者ハ^害アリ^用ユ^ヘカ^ラス
又^癲狂^者通^用ス^レバ^是亦^陰陽^ニ症^{アリ}陰^症ニ^決シ^害アリ^トカ^シ
積^熱アリ^テ大^便秘^結ス^ルヲ^目ア^テト^スヘ^シ

心^下痞^而復^惡寒^汗出^者附^子瀉^心湯^主之

痞^症誤^下シ^テ胃^中不^和或^ハ胃^中虛^ス因^テナル^者也^故仲^景氏^ノ曰^ク
医^見心^下痞^謂病^不盡^復下^之其^痞益^甚然^レ痞^症不^可下^スト^モ已^ニ
明^カ也^且惡^寒汗^出亡^陽ナ^レ寒^ヲ用^ユカ^ラサル^ヲ勿^論也^故此^方
方^附子^二枚^煎汁^ヲ以^テ大^黄二^兩芩^連各^一兩^ノヲ^出シ^合セ^テ用^ル者^ハ
二^倍附^子ヲ^君ト^シ亡^陽ト^胃中^ノ虛^ト治^ス少^分大^黄芩^連ヲ^以テ^佐

心下ノ結熱ヲ治スルノ計也然レ痞疾ハ胃中ノ虚テ結熱ニ非ヌ又
顯然タル陽ノ症アルニ少分トイヘ大黃ヲ用ルハ仲景氏ノ法ニ非ラカトナレ
傷寒脈浮自汗出ルノ症サレタル陽虚ノ症ヲアラス然レ桂枝湯ヲ逆治
ト又桂枝附子湯ノ症ニ已ニ附子ヲ用テ見ルヘシテ九分ノ陽症
一分ノ陰症ノ者ニ寒茶ヲ与ル寸ハ勿シ大下或ハ大下ノ変ヲ生シ陰症ニナル
一手法及カス如シ陰症トナレ已ニ死地ニ入ル也故ニ九分ノ陽症一分ノ陰症
ニモ先ツ陰症ヲ治シ而後ニ陽症ヲ治ス仲景氏ノ秘法也古今ノ医書
但一通リ證治ヲシテ治法ノ細密ニ至テハ皆秘言故ニ此編徒
治法ヲ擧テ初学ニ示ス其重複ヲイトウナカレ

附子瀉心湯

大黃二

黃連一

黃芩一

附子二枚別

右四味切。三味以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。内附子

汁分温再服

麻沸湯ハニテツ湯也須臾ハ少クも也絞ハシボル也

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩

小便不利者五苓散主之

口燥煩ハ口中カキテ清爽ナラサル也

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞅乾噫食臭脇下有水
氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

胃中不積傷寒病中或ハ汗ヲ散ス或ハ下ス此ニツク者皆胃ニアル故其
症解ストモ胃中イマ調和ナラズ也此胃中不和法語也心下痞鞅以下
症ヲアラス別ノ病ニ非ス傷寒ノ本疾ニ已ニ解スモ其胃中不和故此症
ヲアラス云々也食臭ハ食物ノ臭也噫ハクハ也乾噫トハ食モ水モ吐ク
ナラ但食臭ガリ噫出ル也乾嘔ノ乾ト同シ義也若食ヲ吐ハ胃中ニ實

物也濁水吐胃中飲也此胃中不和症下同方又脇下有水氣ハ法語也又症候也言胃中不和者必脇下水氣也者也故心下痞鞭腹中雷鳴下利者其脇下水氣アルの見テナシトイエ凡苟モ其類症アル胃中不和ノ治也又其症脇下水氣ノ音也腹中雷鳴ハ腹中鳴也雷鳴トイエ大ニ鳴トハ非ス且腹中先鳴テ而後下利心下痞鞭者胃中不和也若先下利日數十行而後腹中鳴テ痛サレ者ハ胃中虚スル者也又腹中鳴テ腹痛テ下利者ハ寒アル者也言ハ傷寒ハ已解ス後心下痞鞭食臭ヲ乾噫ハ脇下水氣アリ腹中雷鳴下利者ハ是傷寒病中或ハ汗ヲ發或下ス因テ其症解ストイエ凡胃中和セサル故也生薑瀉心湯ノ主トル所也

生薑瀉心湯

生薑四兩 甘草三兩 人參三兩 乾薑二兩
 黃芩三兩 半夏半升 黃連一斤 大棗十二枚
 右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

此方半夏瀉心湯ニ生姜ヲ加ル者也痢疾泄瀉心下痞鞭嘔吐ノ症ニヨレ

傷寒中風医反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安医見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虚容氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

医反下之ト凡傷寒中風表症アル者先表ヲ解メ而後下スヘシ若表症解先下スハ表熱裏入リ種々變症生ス故反下之

ト云也穀不化ハ穀食消化セズ食不化ハ食ヲ下スル也然レ正色ハ黄色
 ニカワル也若色モカワラスニ下ハ生穀下利ト云虚寒ノ症ニ此症ト異也誤
 ルトカレハ心下痞鞭而滿ハ胸下ツカク一杯ニ充滿スル也乾嘔ハカラエキ
 也心煩胸中イキレ苦ム也不得安ハ乾嘔シテ心煩シテ安カズト云
 得カレ也客氣上逆ハ腹中ニ氣鼓ノ逆上ル也客氣ト云ハモト其所ニキ
 氣ノ鼓スル客ノイニ来ルヤウカモヲサレテ云也言ハ傷寒中風凡表
 症アル者ハ下スヘカサレテ定法ト云ニ医其法ヲ知ヌ反テ下之ヲ是ヲ以下
 利ト云日ニ數十行ハ其下ル所ノ穀食色ハカワレ消化セズ而胸下
 痞鞭充滿シユレニ因テ乾嘔シテ心煩シテ苦ミテ安カズト云ス於
 是医其胸下痞鞭而滿ヲ見テ下ス因テ表熱心下ニ結スル故也
 ト復下之而シ其痞鞭而滿ルト益甚ト是医誤リ也是症表熱入
 テ結スル故ニ非ス但下スヲ以テ下利日ニ數十行ナル因テ胃中ニ虚スル

故ニ其穀食モ化セズ腹中雷鳴ナル且ツ客氣腹中ニ鼓ノ逆上レ因テ
 餘熱ト水飲ト相集リテ心下痞鞭滿ル也然レ是医其胃中虚スル因テ諸
 症ヲ生スヲ知ラズト重テ下ス是誤リト上ノ誤也故ニ其痞鞭益甚
 也甘草瀉心湯ヲ以テ和スレ諸症皆愈

甘草瀉心湯

甘草 四兩

黄芩 三兩

乾姜 兩

半夏 半升

大棗 十二枚

黄連 兩

三服

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日
 此症心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安者頗ハケキ症也今古
 方家三黄湯ヲ用ニキコニ似ル然レ半夏瀉心湯ヲ以甘草ヲ君
 用ル者ハ内經ニ所謂塞因塞用法也近來攻撃ヲ用ル者ヲ豪傑

緩方ヲ用ル者ハ凡庸ト云ハ大ニ誤也其說總論ニアリ此方痢疾
泄瀉等嘔吐ノ症ニ他藥ヲ用テ效キ者ニ試ミレ其主意甘草ヲ
以テユメ和スル也

傷寒股湯藥下利不止心下痞鞭股瀉心湯已復以他藥下
之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下
焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

是傷寒表症下利並發者也然其表症解ス其下利モ亦ヤムヘキ
者也故表症ヲ解ス湯藥ヲ服シ表症解シ而其下利ヤス且又心下痞
鞭是痞鞭ハ其下利止セテ致ス所也然レ醫察セス痞鞭ヲ治セ下
利モ亦止ヘシト故瀉心湯ヲ与テ下利又止ス醫又此下利ハ表熱ノ入テ致
ス所ニテ下利ヲ治ス以下之ヲ而下利又止ス他藥トハ其主藥ニ非ラ云醫又此
下利或ハ中焦ニラテ理中湯ヲ与テ而其利益甚シイカントナレハ理中

湯ハ中焦ヲ治ス藥也而此利ハ表症ト通ラユルトイフ表症ハ外證非ス其人
下焦久寒アリテ偶表症ト同時ニラユル者也然レ今中焦ヲ治ス故愈
也是赤石脂禹餘糧湯ノ主ル所也然レ若又愈サレ下焦久寒ニ非ス
是傷寒協熱利ニ水穀分利セサル致ス所也故其小便ヲ利スレ愈
ヘシ然レ是果表症ノ致ス所テ其治法最初ニラレ然レ傷寒發病
ノ時裏ニ入テ下利スルハ變症ト常ニ非ス故其治法ヲ後ニ示ス也

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂 斤一

禹餘糧 斤一

已上二味以水六升煮取二升去滓三服

此方下焦久寒下利ヲ治ス洪藥也久瀉滑脫ノ症ヨシ

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛
氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

眩冒、眩運、昏冒也。經脈動惕、經脈之動也。瘧、十元也。手足十元、動也。此章治法ヲアケス無益ノ論也。

傷寒、或汗ヲ散シ或ハ吐シ或ハ下シ表症裏症皆解スレ後但心下痞鞭、噫氣不除者、旋覆花代赭石湯主之。

傷寒、或汗ヲ散シ或ハ吐シ或ハ下シ表症裏症皆解スレ後但心下痞鞭、噫氣不除者、是食臭アルニ非ス但ヲ吞出ルニナレハ胃中不和者ニ非ス腹中少シ虚寒ノ氣味アリテ痰飲ヲカ子タル者也。旋覆代赭石湯主之。所也。噫氣ハクゴ也。噦トスルハ誤リ也。

旋覆代赭石湯

旋覆花 三兩
代赭石 一兩
人参 二兩
生薑 五兩
半夏 半斤
大棗 十二枚
甘草 三兩
右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升

日三服。

此方脾胃虚弱人痰飲上逆之心下痞、飲食進ニサル者ヨシ代赭石ハ逆氣ヲ下シ旋覆花ハ痰水ヲ治スル者也。

右正文五章始ノ一章大陽中風表症裏症併發テ下利心下痞鞭表解、裏和セサレ者ヲ明ス第二章傷寒表解ニ後下利食臭ヲ乾噫心下痞鞭胃中不和言者、明第三章傷寒中風誤下ノ後下利穀不化心下痞鞭胃中虚ニヨル者ヲ第四章傷寒下利不止心下痞鞭其本下焦ニアル者ヲク終章傷寒汗吐下ノ後心下痞鞭噫氣不除者陽虚ヲマ、腹中虚ニヨル者ヲクル也。

下、後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黄杏仁甘草石膏湯。

此章前已出ツ但下後ヲ發汗後ニ作ルミ且下後發汗後ニ不可更

行桂枝湯ト云フ大ニ非也汗下ノ後トイテ其症アルハ其方ヲ行フヘシ
仲景氏ノ法皆然リ是方ヲツカウノ变化アルニ也故曰救表宜桂枝
湯是清穀下利ノ症回逆湯ヲ用イシ後也然レハ下後トイテ其症
ア守ハ桂枝湯ヲ用ク明カ也豈タ桂枝湯ノミナラニヤ諸方皆然
且下後ノミニ非ス発汗ノ後モ皆然リ凡偽章ノ杜撰多キ此類也字
者察セヨ

傷寒論國字辨卷之六

傷寒論國字辨卷之七

尾張

淺野微元甫 著

大陽病篇第五

大陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞
鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

大陽病ハ頭痛項強惡寒發熱等ノ症也外證未除而數下
之トハ外證頭痛惡寒發熱等也凡外證アル者先外症ヲ解シ而後
裏症アル者ハ下之ヲ是一定ノ治法也然レニ医其法ヲ知ラス外症イテ除キ去
數下ス是逆治也遂ニ協熱而利スハ協合也表症ノ解スヘキ者ハ解
裏下スヘカサル者ハバク下之故表熱ハ重ニ入其裏ハ虚トナリ表熱裏
虚ト相合トナリ其熱ニク甚ク其利益甚キ也言大陽病頭痛項強惡
寒發熱等ノ外症アル者先外症ヲ解シテ數下之是以裏虚ト

ナリ外症ハ裏ニ入遂ニ外熱ト裏虚ト相協合シテ下利下ノヤニス故ニ下
病毒逆上ノ痞鞭ス是表裏両症解セザル者桂枝人參湯ノ主レ所也
桂枝人參湯

桂枝 兩四

甘草 兩四

白朮 兩三

人參 兩三

乾薑 兩三

右五味以水九升先煎四味取五升内桂更煮取三升温服
一升日再夜一服。

此方位地ハ大陽ヲ主リ症ハ表裏両症ヲ主ル凡外症頭痛項強惡寒
發熱裏症下利腹痛之症アル者其脉或浮弱或小弱或平脉
之者皆用之或ハ夏月ノ寐冷ニテ水瀉腹痛或冷物ヲ食シ泄瀉腹
痛或冬月微寒ヲウケテ泄瀉腹痛其下物多カスル氣味アル者
ヨレ若表症惡寒甚ク手足冷下利腹痛脉沈微ノ類ハ此方附

子ヲ等分加テ用ユレ實ハ四逆湯ヲ用ユキ場キレハ初学ノ人或ハ病家
医ノ来ラ待テイダ用ユレ然レハ病症急ナク四逆湯ヲ用ユレ又外症頭
痛項強惡寒發熱下利之者ハ大陽ト陽明ト合病葛根湯ノ症也
然レ此症ハ純陽實症ヲ表症九分ホドニ裏症二分ホト也桂枝人參
湯ノ症ハ表症二分裏症八分ホトニ而陰症多キ者ナリ其位地ヲ云
ハ大陽ト大陰ト合病也然レ本編ノ例ニ非テ左ハ云フカラス初学ノ
タメニ其氣味合ラ示ス也畢竟葛根湯合病ノ下利桂枝人參湯協
熱ノ下利表裏スレモ心得ヘレ又葛根湯ノ症ノ如ク表症多ク裏症少
其脉小弱ヲ陰症ヲ帶ル者ハ此方ニ麻黄ト葛根トヲ加テ与フヘシ又
右ノ如ク表症アリテ其脉小弱者或ハ火ニシテモ下利ニ或ハ火ニシテモ腹痛
ス者モ先ツ右ノ加味ノ方ヲ与フヘシ弟子曰先生ノ陰症ヲ慎重スルハ
仲景氏ノ秘訣ヲ敢テ議スキナレ然レハ外人或ハ先生温補ヲ好ムト云

フハイカニ答曰凡百ノ技藝人ノ好尚スル所アリ詩ヲ学ニハ或ハ李太白カ俊逸ヲ好ミ或ハ杜子美カ雄渾ヲ好ミ書ハ二王ヲ好ミ或ハ松雪枝山ヲ好カ如シ但医術ハ然ラズ方症の中ノ其病ノ愈ルヲ願フク豈他好尚アリヤ然レレ古人ニモ或ハ温補ヲ好ミ或ハ攻撃ヲ好ム是其人ノ手名ニテ短ナル所ナリ吾豈是ヲ願シヤ但禹病純陽ノ病ハ脉症見エ名通ニ別隠微ノ事ナレ故ニ方症相對スル即愈テ過ラナシ但帶陰症ハ脉症隱微多ク至テギレヤスレ逆治ヲトル皆クニアリ且陽症ハト死症ナク陰症アリ其人ハ死地ニ入ル也慎サレケヤ而古今方書鹿畧ニ細カニ論セズ故ニ予諄々ト是ヲ云テ自ラ止ムヲ知ス外人ノ誹謗トモモ憂ルニ暇アラス名古屋玄医ハ近代ノ名医也其学明ノ喻嘉言カ傷寒尚論篇医門法律ヨリ来リ仲景氏ノ堂ヲ窺フ者也其製スル所ノ逆挽湯桂枝麻黄人参乾姜蒼朮茯苓甘草生薑

也是ヲ以發散ノ通用トス然レレ玄医豈仲景氏ノ方ヲ以足ラズトノ自製セヤ世間能仲景氏ノ法則ヲ学フ者多クテ故此方ヲ製シ通用發散ノ方トイイ帶陰ノ症誤テ用ルモ大ナル過ナルトス計也實老
 婆深切止ムヲ得サル也予カ諄々トモ亦此意也但クレモ医家病家帶陰ノ症ヲ慎重セシヲ願フノミ

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

此本草編救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯ノ文做者也然レ本編ハ陰陽ヲ分テ治ス者也此ハ則大下後復發汗心下痞惡寒者是誤テ下ス因テ表症裏入リ表裏モト一病也故ニ表裏ヲ合セテ治スキ者大小柴胡柴胡加桂枝湯桂枝人参湯例是也然レ今表裏

ラ分テ治スルニ倣ス虎ヲ画テ猫ニモ似サル者也
傷寒發熱汗出不解。心下痞鞭。嘔吐而下利者。大柴胡湯
主之。

大柴胡湯ノ症ハ熱結在裏。心下急ヲ主スル者也。此症ハ熱心胸中
ニ在ル者。黄芩加半夏生姜湯ノ症也。

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中痞鞭。氣上衝
咽喉。不得息者。此為胸有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。

有寒ハ寒痰アル也。此症痰飲外邪ヲ帶ル也。痰飲ハ故外邪發散
セズ吐法ヲ以痰ヲ治スル外邪モ亦散ル也。然レ小青龍湯ノ例ニヨテ茶ヲ

用シレカズ又古来汗吐下ヲ以テ仲景氏ノ三法トスル者大ニ誤リ也。仲
景氏ノ治法豈ニ三法ノミナシマ且吐法淡小汗下ノトキモ非ス其

類ヲトテアラヌ也。又此方瓜蒂用シタズ但越前ノ産苦味ヲ用

ル足ルト云

瓜蒂散

瓜蒂一分 赤小豆一分

右二味各別搗篩為散已合治之。取一錢匕以香豉一
合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散温頓服之不吐

者少少加得快吐乃止。諸亡血虛家不可與瓜蒂散。
病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者。此名臧結。

死ス。此章ノ症ノ如キハ尋常ノ症モ多キ也。而臧結ノ死症ト云テ

冒首ト脉狀ト治方トアラサレハ其陰陽逆順ヲ知ルヘキナシ諸註家
牽強ノ義理ヲ附キ其實益ナシ

傷寒病若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時

惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之。
 熱結在裏ト表熱ノ裏ニ結スル也此句法語也白虎湯諸症皆
 熱結在裏ヨリ生ス少云表裏俱熱ト熱結在裏有其症種
 アリトイヒ白虎湯熱結在裏ノ症ハ表裏俱熱也時ハ惡風ト
 惡風ハ表症解セルノ症ト其表症解セルノ惡風ハ常アリテハ時モ之
 時ナシ白虎湯ノ惡風ハ時々暫ツアリテ常ナシ是表症ノ惡風非言
 傷寒若ハ吐レ若ク下レ後七八日解ス其症表裏俱熱レ但表時
 時暫ツ惡風アリテ常ハナシ裏大渴シ舌上乾燥テ煩悶シ水數升
 ヲ飲ト欲ス者ハ是熱結在裏ノ故也白虎加人參湯主之所也
 白虎加人參湯

白虎湯方中加人參二兩餘同本方



傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之
 無大熱ト表症ノ翕々大熱トキラ云前章表裏ト熱ス其表
 熱タル身熱テ表熱ノハト大熱ニ非ラ云心煩ハ胸中煩悶也背
 微惡寒ハ背ハ背カ也微ハ至テ也表症ハ總身皆惡寒也此症背
 分リ少シ惡寒外所ハ惡寒ス前章時ハ惡風ト云ハ此症背微
 惡寒ト云フ畢竟惡寒主惡風モ暫ツ火シ也言ハ傷寒其表大
 熱ト其裏ハ燥テ渴シ胸中煩シ其背時々暫ツ火シ惡寒ス者是
 熱結在裏ノ症也亦白虎加人參主之所也
 傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水
 無表證者白虎加人參湯主之
 脉浮ハ邪表ナル也發熱ハ表熱也無汗ハ表熱解セ也惡
 寒ハ邪表ト事也渴シ欲飲水ハ裏熱甚也言ハ傷寒七八日至其日

數ハ白虎湯ノ位地多トイエ其脉浮ヲ發熱ノ無汗者皆是表症解セサル者也多トイ舌上燥渴心煩等ノ裏症アリト不可與白虎湯但大渴ノ欲飲水而脉浮等ノ表症ナキ者白虎加人參湯ノ症也疑ナレ可キ也

此方位地大陽ヲ主ト其症熱結在裏諸症ヲ生スル目アニス右三章ニクワシク見エタリ贅説ニ及ハス

右正文四章始一章大陽病協熱下利表裏解セサル者合ノ一病トシテ治ス者ヲ明ス第二章傷寒熱結在裏者独リ其裏ヲ治スルヲ明ス第三章背微惡寒トイエ其實表解ス者ヲ明ス終章裏症アリトイエ其表解セサル者ハ白虎湯ヲ與フヘカラサルヲ明ス

大陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

心下鞭頸項コワルハ大陽也眩スルハ少陽也大椎肺俞ハ大陽肝俞ハ少陽治大陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

合病ニ部ノ病症混合ト下也頭痛項強惡寒發熱等ハ大陽ノ症也往來寒熱脇下鞭滿乾嘔口苦咽乾目眩等ハ少陽也故始メ發病ニ大陽ノ症アリテ其症イマダ又少陽ノ症ヨリテ二部ノ症混合ノヤムヲ合病云自下利スルハ大陽少陽ノ合病ニ自然ト下利ノ別ニ下利スルノ因ナキヲ云自利ト云病入ホエス下ルト云ハ誤リ也言始メ大陽ノ頭痛項強惡寒發熱等アリテ後又少陽ノ脇胸滿或ハ口苦咽乾目眩等ノ症ヲヨリテ下利ス者ハ是大陽少陽ノ合病ト下利ス者也其治法ニ於テ其大表ヲ治セヌ又其下利ヲ治セヌ但其心中ノ熱ヲ治ス者ハ諸症皆愈與黃芩湯トハ先ハ此湯ヲ与テ其後症ヲ見ル辭也言先ハ此湯ヲ与テ其下利

止^ス別^ニ其下利ヲ去^ス因^ル否^ヤ審^{カラ}其症^ニ隨^テ治^法處^ス也
故^ニ云^フ也若嘔^ス者^ハ黃芩加半夏生姜湯主^之ト大陽^ト少
陽^ト合病^ハ其氣上逆^ス故^ニ嘔吐^スル^ハモトヨリ其症^ニ疑^フ所^ナ因^テ
半夏生姜^ヲ加^テ主治^ス也故^ニ主^之ト云

黃芩湯

黃芩^三兩

甘草^二兩

芍藥^二兩

大棗^{十二}枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服

此方位地^ハ大陽少陽^ヲ主^リ其症^ハ裏^ヲ熱^シ和^ス者也凡泄瀉痢
疾^熱ツヨキ者^ニヨシ又上焦^熱リテ吐血^衄血^ノ者^ニヨシ

黃芩加半夏生姜湯

黃芩湯方中加半夏半升生姜三兩餘同本方

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主^之

胸中有熱嘔吐^セト欲^スノ法語也胸中煩悶嘔吐^セト欲^ス是胸中
熱^シ故也胃中有邪氣腹中痛ノ法語也胃中^ハ和^ク以常^ト然^ル今
邪氣^リ故^ニ痛也言^ハ傷寒表症已^ニ解^シ其内^モ亦大半^和シ^テ得^テ
腹中痛^テ嘔吐^セト欲^ス者^ハ是腹中邪氣^リ故^ニ痛胸中熱^シ故^ニ
嘔吐^セト欲^ス也上下兩症寒熱^異者^也是黃連湯主^之所^也

黃連湯

黃連^三兩

甘草^三兩

乾姜^三兩

桂枝^三兩

人參^二兩

半夏^半升

大棗^{十二}枚

右七味以水一斗煮取六升去滓温服一升日三服夜二服
傷寒八九日風濕相搏身體^疼煩不能^自轉^側不嘔^不渴脉
浮虛而濡者桂枝附子湯主^之若其人大便^鞭小便^自利者
去桂枝加白朮湯主^之

風濕相搏、法語也。言風濕相搏者、見ハカラス其人、身疼煩、不能自轉側、乃是以風濕相搏、知也。相搏ハ表症ノ風寒、ト裏ニル所、寒、濕ト相搏、テツト也。疼煩ハタル痛也。轉側ハ轉、又側、テアキラコテラハ寐カテスル也。脉浮、表症也。虚、而溜、裏氣和利也。言ハ傷寒、八九日、身體疼煩、不能自轉側、者ハ表症ノ風寒、ト裏ニ蓄、所、寒、濕ト相搏、テツト也。此症ヲナス也。其不嘔、腹中別、病毒、不渴、裏ニ熱、チキ也。脉浮、虚、而溜、表、寒、濕、アリ、テ裏氣和利也。也是桂枝附子湯ノ主、也。若其人、大便鞅、小便自利、是風スル者、去桂枝加白朮湯主、之、ラ、ハ、太便鞅、小便自利、是風濕相搏、テ其裏益和、セ、シ、澁滯、ス、者也。故、桂枝ヲ去、テ白朮ヲ加、也。桂枝ヲ去、ハ白朮ノ一味和、シ、是、故、也。

桂枝附子湯

桂枝 兩_四

附子 枚_三

生姜 兩_三

甘草 兩_二

大棗 枚_{十二}

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

此方位地、太陽ヲ主、リ其症、風濕相搏、テ身體疼煩、轉側、ス、ラ、マ、ル、主、ト、後世、所謂痛風、テ熱症、チキ、者、ヨ、シ、其桂枝湯、ニ更、ニ、桂枝、一、兩、ヲ、加、ハ、又、附子、三、枚、ヲ、加、者、ハ、風濕ヲ強ク表ニ發ス、也、其芍藥ヲ去、ハ、緩和者強ク發、ハ、ル、ニ、宜カラサル、也、凡、附子ヲ用、ル、法、ハ、陰虛寒ノ症、四逆湯、ナ、ト、附子、一、枚、ヲ、用、ル、ニ、過、ス、是、附子ノ本治也。此方三枚ヲ用、ル、其人、虛寒、ナ、ス、故、ニ、多、ク、用、テ、強ク、セ、ル、也。

去桂枝加白朮湯

桂枝附子湯方中去桂枝加白朮四兩餘同本方

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短

陽表ハ大熱ヲ見_レトイ_テ猶熱アリ裏陰ハ其症ヲ見_ストイ_テ已_ニ陰寒_ノ位地_ニ至_ル者也故_ニ其症_トイ_テ萬殊_ト異_トイ_テ其脉_{浮滑}ヲ_アラス_トハ白虎湯_主之_ト云_フ也然_レ此章_ハ傷寒論_中ノ奧義_ヲ成_ル無_ク已_カ註_{以下}古人_ノ諸說明_カエ_ス表裏_ニ字誤_リト_レ表_ニ有_寒裏_ニ有_熱ト改_ムレ_ト云_說モアリ_幸先師_ノ說_ヲ得_テ其義_始テ明_カ也愉快_トイ_スレ_然レ_クレキ_ハ國字書_盡ス_{ヘキ}ト非_ス志_マシ_人ハ特解_ヲ見_ルヘ_スベ_テ註解_ハ人_ノ口上_ヲ傳_ルカ_如シ_イカ_ニテ寧_ニ云_イ述_ル本_人ノ言_ヲ所_ハ相違_{アリ}也况_マ國字_ノ解_ハ唐人_詞ヲ日本詞_ヲウ_スト_ハ六_十八_九解_スレ_意味_ノ深長_詞ノ緩急_ニ至_テ悉_ク漏_ルト_也故_ニ此編_ヲ見_ル人_ヲ多_ク解_シト_スカラス_厚志_ノ人_ハ此編_ヲ五_遍モ_十遍_モ熟讀_シ其_上特解_ヲ見_ルト_特解_ハ漢文_トハ唐人_ノ口上_ヲ唐人_カ傳_ルト_ハ大_ニ相違_ハキ_也然_レ其_本人_ニ直_ニ對_シテ_ハ層_ヲ隔_レト_シテ_ハ特解_ヲ及_覆熟讀_シ其_上本文_ヲ數_百遍_熟讀_シハ親_仲景_氏徒

テ字_ヲカ_如レ_而後_ニ年_月ヲ積_テ思慮_{工夫}ヲ_サハ_其人_ノ才質_ニ隨_テ神妙_ノ場_至ル_レ

白虎湯

知母_六 石膏_{一斤}

甘草_二

粳米_{六合}

右四味_以水_{一斗}煮_米熟_湯成_去滓_温服_{一升}日_三服_。

此方位地_ハ大陽_極深_處ヲ_主ト_リ其_症ハ_火熱_裏ニ_テ諸_症ヲ_生ス_大ニ_渴ノ_水ヲ_飲下_欲ス_ラ目_アテ_トス_此方_ヲ用_テ下_欲ス_者ハ_白虎_加人_參湯_ノ症_ニ後_ヲヘ_レ

右正文_四章_前ノ_二章_ハ合_病下_利ト_嘔ト_者其_胸中_ヲ治_スラ_明ス_ハ傷_寒下_後上_下ノ_症アル_者其_下ヲ_治ス_ラ明_ス後_ノ二_章ハ_風濕_相搏_ツ者_其表_ヲ治_スラ_明ス_其一_ハ陽_熱至_極ノ_者其_裏ヲ_治ス_ラ明_ス

傷寒_ノ脉_結代_心動_悸炙_{甘草}湯_主之_。

心動悸胸中ノ動氣也

炙甘草湯

甘草 四兩

生薑 三兩

桂枝 三兩

人參 二兩

阿膠 二兩

生地黃 一斤

麥門冬 半斤

麻子仁 半斤

大棗 十二枚

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠

烱消盡温服一升日三服一名復脉湯烱消ハ煮テトラス也

脉按之来緩而時止復来者名曰結又脉来動而中止更来小數中有還

者反動名曰結陰也脉来動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必

難治 此章前章ノ註文ノ誤テ本文ニ混シ入ル也動ハ脉ノ但ウキテ

上下ノツク勢ナキ也陰也ハ陰脉也

傷寒論國字辨卷之七

大陽篇終



