

證治準繩

六十六

染

六外科

薛氏分證主治大法 腋肋脹痛 腰脊痛 腹痛

小腹引陰莖作痛 肌肉間作痛 創口痛 瘀血作痛

血虛作痛 骨傷作痛 濕疹作痛 肝火作痛 青腫不消

腐肉不潰 新肉不生 出血 瘀血泛注 昏憤 眩暈

煩躁 發熱 陽氣脫陷 胃腹滿悶 作嘔 嘔吐黑血

喘咳 作渴 大便秘結 手足傷損 手足疼痛 破傷風

發瘰 行氣之非 下血之非 寒菜之非 不斂之非 不補之非

湯火瘡 灸瘡 諸蟲獸螫傷 毒蛇咬 蜈蚣咬 蠍虻傷 蠍螫 蜂螫 蜘蛛咬

刺毛虫傷 蚯蚓傷 蜈蚣咬 蠍虻咬 犬咬 癩犬咬 馬咬 鼠咬

人咬 虎咬 熊咬 駱涎馬汗瘡

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 ( 66 )
函號	301 60

內閣文庫	
三〇九	二九七一
函	冊
架	號
類	類



紅膏藥

治杖瘡及

腫瘡

黃丹

飛炒

見茶

樟腦

片腦

豬油

右末先

紙攤貼

白膏藥

丸粉

甘石

白石脂

水銀

黃蠟

乳香

沒藥

硃砂

麝香

水牛油

煨水淬

浸藥

硃砂

麝香

水牛油

煨水淬

白石脂

煨水淬

煨水淬

煨水淬

煨水淬

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

各壹

龍骨

乳香

沒藥

楓香

樟腦

水銀

麝香

片腦

黃蠟

柏蠟

豬油

黃蠟

右末先熔蠟次入油和勻候冷調末攪勻油紙攤

貼臙瘡作隔紙膏貼之

黑膏藥 治杖瘡及諸瘡神效

防風

荊芥

連翹

大黃

黃連

黃芩

黃礬

當歸

赤芍藥

玄參

紫金皮

木鼈子

白芷

杏仁

桃仁

生芋

地園菱

黃花苑

側柏葉

地薄荷

緒緝疇

乳香

沒藥

兒茶

大黃

當歸

杉皮炭

楓香

龍骨

赤石脂

血竭

樟腦

孩兒骨

硃砂

水銀

麝香

右將後十五味為末將前二十一味鋤碎以水煎

失藥傷員

外科六

九式

熬濃汁濾去滓再煎令汁如錫樣入豬油貳斤慢火熬令汁乾入光粉壹斤旋入攪至黑色成膏滴水中成珠可丸不粘手為度次入黃蠟貳兩熔化出火毒數日再微熬熔入乳香後十五味末攪勻油紙攤貼

秘傳杖瘡膏方 專治打傷又治金瘡及無名腫毒

臙瘡若跌傷及別樣瘡忌貼

香油 肆兩真者佳將穿山甲柘枝先入油中煎數沸去貳件查乘熱將薄綿濾淨油復入

柘枝 壹根已上貳件止取油煎汁不用查取法見前

穿山甲 壹片 柘枝 壹莖須易

不用大樹上者藥油用此類攪脚取細末壹兩作貳次入油

府丹 即飛丹淨水飛去標

血竭 沒藥 乳香

孩兒茶 已上肆件各參錢槌碎和勻共

新珍珠 新紅象牙 各麵包燒存性膠

面粉 炭火上燒 人指甲 炒黃 三七 晒乾取

石乳 銅鑊內炒 黃連 細末 黃芩 細末各

海螵蛸 伍分 半夏 大者拾枚為細末已上拾

加減止用肆分作肆次下法如左

樟冰 肆錢 黃蠟 貳錢 冰片 壹分

麝香 冬分

下攪極勻取  
出阿

阿魏 戊塊者伍分已上肆分待  
諸藥俱下盡臨起鍋時方

右藥先將細末藥分五分其四分以次下鍋如左  
其一分留看藥厚薄以為增減如四分已下盡藥  
尚薄亦將此分漸下如正好留此一分待貼膏藥  
時摻在患處尤妙

煎法用上好香油肆兩入銅鍋中炭火煎沸時  
入栢枝一莖穿山甲一片在內煎數沸去藥查  
將薄綿紙乘熱濾淨油指淨鍋復入油於鍋中煎  
沸下府丹五錢用槐條急攪不住手至成膏方止

候六七煎後用清水漱淨口噴清水少許於鍋內  
即取起鍋

一起鍋時於前四分中細末藥將一分漸漸逐一  
挑下急攪如前此分藥盡約均和了將槐條蘸藥  
滴水且未要成珠復置鍋火上急攪候沸起鍋  
二起鍋復將前末藥一分漸下鍋中急攪如前約  
均和滴水要成珠復置鍋炭火上急攪候沸起鍋  
三起鍋漸下藥攪如前約均和將藥滴水雖成珠  
尚要粘手復置鍋火上如前  
四起鍋漸下藥如前急攪約均和將藥滴水成珠

珠要將至不粘手了復置鍋炭火上候沸起鍋  
五起鍋卽下黃蠟貳錢府丹伍錢急攪如前將藥  
滴水成珠要須不粘手又不可太老了如尚粘手  
將前留下二分末藥漸下以不粘手為度如不粘  
手了卽下米花珠貳錢次下糯米末肆錢急攪方  
下麝參分阿魏伍分水片壹分急攪不住手量藥  
已均和了擦阿魏去之以藥入磁器內浸冷水  
中片時候凝將藥尋露天天陽淨地掘坎將磁器  
倒覆於坎中仍以土覆好候七日後方起  
一藏法用油紙及箬包好餅口以防洩氣

一攤膏藥時用湯中煎過淨油單紙攤上藥不用  
火烘止用熱湯入器中將油紙放器上以藥放上  
攤開又不用太厚須於紙上照得見為妙如以絹  
攤用湯頓焯藥攤上  
一貼時先將菜菔汁桑葉煎湯露中露過一宿用  
以洗患處方用貼之  
一既貼後每日洗一遍不要換膏藥至二三日後  
血散風去方換收口黑膏藥卽萬應膏也  
萬應膏方 專主杖瘡收口神效  
香油貳斤真者慮淨 黃連 黃蘗

跌撲傷員 外科六 百一

黃芩各伍兩

栢枝

槐枝各壹束已上俱咬破

去碎屑

府丹壹斤和飛去標脚晒乾

乳香

沒藥

血竭

孩兒茶

各叁錢已上肆件用槌打碎和勻入鍋中炭火炒沸為細末篩過

象皮灰

用砂炒過去取細末

海螵蛸各伍分細末

半夏壹錢細末

龍骨伍分已上捌味為極細末用極細篩篩過和勻漸入

後藥

阿魏伍分

右將真香油貳斤濾淨入銅鍋中煎沸入黃連黃檗黃芩槐條煎三四沸將細夏布及薄絹紙濾去香揩淨銅鍋仍入油於鍋中煎沸入前府丹用槐

條急攪煎至滴水成珠乘熱入磁器中即將前紙

末藥八味及阿魏漸入藥中急攪不停候和勻去

阿魏查藥冷為度七日後可用藏攤洗法並如前

凡人一杖後切不可用手拍之急用明淨松香水

龍骨炭火煨過須多年者佳一味俱為細末鷄子

清調敷惡血自出若能預調此藥以待杖過即敷

尤妙 滕松川不用松香而用大黃云亦有效

薛氏分證主治大法

脇肋脹痛若大便通和喘欬吐痰者肝火侮肺也用

小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大便不通

跌撲傷員

外科

卷二

喘欬吐血者，瘀血停滯也。用當歸導滯散通之。內經云：肝藏血，脾統血。蓋肝屬木，生火侮土，肝火既熾，肝血必傷，脾氣必虛。宜先清肝養血，則瘀血不致凝滯，肌肉不致偏潰。次壯脾健胃，則瘀肉易潰，新肉易生。若行尅伐，則虛者益虛，滯者益滯，倘不旋踵矣。有一患者，患處脹痛發熱，欲嘔兩脇熱脹，肝脈洪大，薛曰：肝火之症也。但令飲童便，并小柴胡湯加黃連、山梔、歸梢、紅花諸證果退。此證若左關脈浮而無力，以手按其腹反不脹者，此血虛而肝脹也。當以四物參苓、青皮、甘草之類治之。若左關脈洪而有力，胸脇脹

痛者按之亦痛，此怒氣傷肝之證也。以小柴胡芎歸、青皮芍藥、桔梗、枳殼主之。蓋此證不必論其受責之輕重，問其患處去血之曾否，但被人扭按甚重，努力悲怒以傷其氣，血瘀肝多，致前證甚，則胸脇脹滿，氣逆不通，或血溢口鼻，卒至不救。有一患者愈後口苦腰脇脹痛，服補腎行氣等藥不愈，薛按其肝脈浮而無力，此屬肝膽氣血虛而然耳。用參芪芎歸地黃白朮麥門五味治之而愈。李進士季夏傷手，出血不止發熱作渴，兩脇作脹，按之即止，此血虛也。用八珍加軟柴胡、天花粉治之頓愈，更用養氣血之

失業真易眉

卷四十一

百三



藥調理而痊

小柴胡湯 治一切撲傷等證因肝膽經火盛作痛

出血自汗寒熱往來日晡發熱或潮熱身熱欬嗽

發熱脇下作痛兩肘痞滿

柴胡 貳錢 黃芩 壹錢 半夏

人參 各壹錢 炙甘草 伍分

右薑水煎服

流稗洗

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其

疼痛楚不可轉側 羌活 防風 肉桂 各壹錢

水蛭 炒煙盡另研 當歸 另研

連翹 各貳錢 麝香 另研

右作壹服水壹鍾酒壹鍾煎至壹鍾去滓入水蛭

麝香末調勻不拘時溫熱服

腰脊痛地龍散 治腰脊痛或打撲損傷從高墜下

留在太陽經中令人腰脊或脛脇臂腰中痛不可

忍 地龍 官桂 蘇木 各貳分

麻黃 柒分 黃蘗 當歸稍

甘草 各壹錢 桃仁 玖箇

失業傷員

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

戴復菴云顛撲傷疼酒調琥珀散極佳再有烏藥順氣散用以治之風腰疼尤宜有顛撲人服藥并熏洗搽貼藥皆不效自若或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥等分為末和白酒調服隨即痛減其半  
**腹痛**或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胸脇反痛肝血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也

用四物參朮補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下而欲嘔胃氣傷也用六君當歸補之既下而泄瀉脾腎傷也用六君肉果破故紙補之若下後手足俱冷昏憤出汗陽氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞證也急投大劑參附湯多有得生者 有一患者杖後服四物紅花桃仁大黃等劑以逐瘀血腹反痛更服一劑痛益甚按其腹不痛薛曰此血虛也故喜按而

失笑傷員 卷之六 百五

不痛宜溫補之劑遂以歸身白朮參芪炙草二劑痛  
即止有一患者仲秋夜歸墜馬腹內作痛飲酒數  
杯翌早大便自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而  
行散也一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚  
大便不通血欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下  
而瘥此因元氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦金  
瘡者不宜食此一男子孟秋墜梯腹停瘀血用大  
黃等藥其血不下反加胸膈脹痛喘促短氣薛用肉  
桂木香末各貳錢熱酒調服即下黑血及前所服之  
藥而蘇此因寒藥凝滯而不行故用辛溫之劑散之

陳侍御墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胸腹脹痛按  
之即止惟倦怠少氣診其脉微細而澹予曰非瘀血  
也乃痛傷氣血復因藥損脾氣而然耳投養脾胃生  
氣血之藥而愈

加味承氣湯 治瘀血內停胸腹脹痛或大便不通  
等證

大黃

朴硝 各貳錢

枳實

厚朴

當歸

紅花 各壹錢

甘草 伍分

用酒水各壹鍾煎至壹鍾服仍量虛實加減病急

跌撲傷員

外科

百六

不用甘草

疝定痛乳香神應散

治從高墜下疼痛不可忍腹

中疼痛

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科栗子

當歸各壹兩

破故紙

水蛭

右為末每服伍錢醋壹盞砂石器內煎至六分入

麝香少許溫服

小腹引陰莖作痛有一患者瘀血失砒脹痛煩渴縱

飲涼童便渴脹頓止以蘿蔔細搗塗之瘀血漸散已

而患處作癢仍塗之癢止後口乾作渴小腹引陰莖

作痛小便如淋時出白津此肝經鬱火也遂以小柴

胡湯加大黃黃連山梔飲之諸證悉退再用養血等

藥而安夫小腹引陰莖作痛等證往往誤認為寒證

投以熱劑則諸竅出血或二便不通以及危殆輕亦

損其目矣

肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨作

痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血作痛脾

胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之

氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐

瀉不食脾胃之氣敗也苟預為調補脾胃則無此患矣

**創口痛**若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當生肝血補脾氣有一患者患腹脹痛悲哀忿怒此厥陽之火為七情激之而然耳遂破去瘀血以小柴胡湯加山梔黃連枯梗而安後用生肝血養脾氣之藥滄潰而斂戴給事墜馬腿腫痛而色黯食少倦怠此元氣虛弱不能運散瘀血而然耳遂用

**補中益氣**去升麻柴胡加木瓜茯苓芍藥白朮治之

**而痊**儒者王清之跌腰作痛用定痛等藥不愈氣血日衰面耳黛色薛曰腰為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致遂用杜仲補骨脂五味山茱萸蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神麴各貳錢食遠服不月而瘥一三歲兒閃腰作痛服流氣等藥半載不愈薛曰此稟腎氣不足不治之證也後果歿

**痰血作痛**有一患者腫痛發熱作渴汗出薛曰此陰血受傷也先破去惡穢以通壅塞後用四物柴胡黃芩山梔丹皮骨碎補以清肝火而愈有一患者傷

處揉散惟腫痛不消薛曰此瘀血在內宜急破之不  
從薛以蘿蔔自然汁調山梔末傅之破處以當歸膏  
貼之更服活血之劑而瘥數年之後但遇天陰仍作  
痒痛始知不破之失有一患者臀腿黑腫而皮不  
破但脹痛重墜皆以為內無瘀血惟補涼藥可以止  
痛薛診其尺脉澀而結此因體肥肉厚瘀血蓄深刺  
去即愈否則內潰有爛筋傷骨之患薛入針四寸漂  
黑血數升腫痛遂止是日發熱惡寒煩渴頭痛此氣  
血俱虛而然也以十全大補之劑遂瘥一男子門  
傷右腿壅腫作痛薛謂急破去滯血以補元氣庶無

後患不信乃外傳大黃等藥內服流氣飲後湧出穢  
膿數碗許其膿不止乃復請治視其腿細而脉大作  
渴發熱澀不治後果破窓友王汝道環跳穴處閃  
傷瘀血腫痛發熱作渴遂破去瘀血知其下焦素有  
虛火用八珍加黃芩知母牛膝骨碎補四劑頓止用  
十全大補湯少加黃芩知母麥門五味三十餘劑而  
斂

**血虛作痛**一婦人疏管出血滑痛熱渴煩悶頭暈日  
晡益甚此陰虛內熱之證用八珍加丹皮麥門五味  
骨碎補肉桂及地黃丸治之悉愈却去桂加牛膝續

生

十

九

斷二十餘劑而瘡愈

骨傷作瘡一小兒足傷作痛肉色不變傷在骨也類

用炒葱熨之五更用和血定痛丸日間用健脾胃生

氣血之劑數日後服地黃丸三月餘而瘡一小兒

臂骨出臼接入腫痛發熱服流氣等藥益其飲食少

思薛以葱熨之其痛即止以六君黃芪柴胡桔梗續

斷骨碎補治之飲食進而腫痛消又用補中益氣加

麥門五味治之氣血和而熱退愈矣

沒藥丸 治打撲內損筋骨疼痛

沒藥

乳香

川芎

川椒

去目及合口者

芍藥

當歸

各半兩

自然銅貳錢半火燒醋淬柒次

右為細末用黃蠟貳兩熔開入藥末不住手攪勻

丸如彈子大每服壹丸用好酒壹鍾化開煎至伍

分乘熱服之隨痛處貼連服二三丸立效

濕痰作痛大宗伯沈立齋孟冬閃腰作痛胸間痰氣

不利以枳殼青皮柴胡并麻木香茴香當歸川芎赤

芍神麴紅花四劑而瘡但飲食不甘微有潮熱以參

芪白木陳皮白芍各壹錢歸身貳錢川芎捌分軟柴

胡地骨炙草各伍分十餘劑而康 劉尚寶體肥臂

閃作痛服透骨丹反致肢節俱痛下體益甚以二陳  
南星羌活防風牛膝木瓜蒼朮黃芩黃蘗治之身痛  
遂安以前藥加歸尾赤芍桔梗治之而痊 鄭吏  
部素有濕痰孟冬墜馬服辛熱破血之藥偏身作痛  
發熱口乾脉大而滑此熱劑激動痰火為患耳治以  
清燥湯去人參當歸黃芪加黃芩山梔半夏黃蘗熱  
痛頓去患處少愈更用二陳羌活桔梗蒼朮黃蘗薑  
製生地當歸遂痊

**肝火作痛**楊司天骨已入曰患處仍痛服藥不應肝  
脉洪大而急薛曰此肝火盛而作痛也用小柴胡湯

加山梔黃連二劑痛止用四物山梔黃蘗知母調理  
而康 有一患者瘀血內脹焮痛發熱口乾作渴飲  
食不甘四肢倦怠薛曰此肝火熾盛脾土受制故患  
前證喜其稟實年壯第用降火清肝活血之劑而愈  
**青腫不消**青腫不消用補中益氣湯以補氣腫黯不  
消用加味逍遙散以散血若焮腫脹痛瘀血作膿也  
以八珍湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以  
十全大補湯補之若骨體接而復脫腎虛也用地  
黃丸腫不消青不退氣血虛也內用八珍湯外用葱  
熨法則瘀血自散腫痛自消若行血破血則脾胃愈

洪業真身員 卷之六 百一



虎運氣心滯若敷貼涼藥則瘀血益凝內腐益深致  
難收拾一婦人問臂腕腫大已三月手臂日細肌  
瘦惡寒食少短氣脉息微細屬形病俱虛也遂投補  
中益氣加肉桂引諸藥以行至臂再加具母香附以  
解久病之鬱間服和血定痛丸以葱熨之腫消二三  
因怒患處仍脹胸膈兩脇微痛以前湯更加木香山  
梔半夏桔梗服之少可復因驚不寐少食盜汗以歸  
脾湯加五味麥門二十餘劑而安腫消三四手臂漸  
肥但經水過期而少此心脾之血尚未充足而然也  
乃用八珍加五味麥門丹皮遠志香附貝母桔梗四

十餘劑諸證悉愈後因怒發熱譫語經水如湧此怒  
動肝火以小柴胡湯加生地黄貳錢一劑遂止以四  
物加柴胡調理而康州守陳克明子閃右臂腕腫  
痛肉色不變久服流氣等藥加寒熱少食舌乾作渴  
薛曰傷損等證腫不消色不變此運氣虛而不能愈  
當助脾胃壯氣血為主遂從薛法治之不二月形氣  
漸充腫熱漸消半載諸證悉退體臂如常一小兒  
閃腿腕壅腫形氣怯弱薛欲治以補氣血為主佐以  
行散之劑不信乃內服流氣飲外傳寒涼藥加寒熱  
體倦薛曰惡寒發熱脉息洪大氣血虛極也治之無  
失業易首

功後內潰瀝盡氣血而亡。李考功子十四歲脚腕閃傷腫而色天日出清膿少許肝脉微瀝此肝經受傷氣血虛而不能潰難治之證也急止尅伐之劑不信乃雜用流氣等藥後果出爛筋而歿。

**腐肉不潰**或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而不潰用八珍湯若因尅伐而不潰者用六君子湯加當歸其外皮黑堅硬不潰者內火蒸炙也內服八珍湯外塗當歸膏其歿肉不能潰或新肉不能生而致歿者皆失於不預補脾胃也。有一患者瘀血已去飲食少思歿肉不潰又用托裏之藥膿稍潰而清此血

氣虛也非大補不可彼不從薛強用大補之劑飲食進而歿肉潰但少寐以歸脾湯加山梔二劑而寐因勞心煩躁作渴脉浮洪大以當歸補血湯二劑而安。有一患者受刑太重外皮傷破瘀血如注內肉糜爛黯腫上胤胸背下至足指昏憤不食隨以黑羊皮熱貼患處灌以童便酒薄粥更以清肝活血調氣健脾之劑神思稍蘇始言徧身強痛又用大劑養血補氣之藥腫消食進時仲冬瘀血凝結不能潰膿又用大補之劑壯其陽氣其膿方熟遂斲去洞見其骨塗以當歸膏及服前藥百餘劑肌肉漸生。少宗伯劉

五清懸傷一塊微痛少食用六君子湯倍加當歸黃  
芪其痛漸止月餘瘀血內澗而不潰公以為痊予曰  
此陽氣虛極須用調補不從至來春頭暈痰涎壅塞  
服清氣化痰病勢愈盛脈洪大而微細欲以參芪歸  
朮附子之類補之不信至秋初因怒昏憤而厥

新肉不生若患處天白脾氣虛也用六君子歸患處  
緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血虛也  
用十全大補湯膿稀赤而不生者心脾血虛也用東垣聖  
中益氣湯膿稀赤而不生者心脾血虛也用東垣聖  
愈湯寒熱而不生肝火動也用加味道遙散肺熱而

不生肝血虛也用八珍牡丹皮食少體倦而不生脾  
胃氣虛也用六君子湯脹穢而不生者陰虛邪火也  
用六味地黃丸四肢困倦精神短少而不生者元氣  
內傷也用補中益氣湯如夏月用調中益氣湯作瀉  
用清暑益氣湯秋令作瀉用清燥湯有一患者潰  
而不斂以內有熱毒欲用寒涼之藥薛曰此血氣俱  
虛而不能斂耳非歸朮參芪之類培養脾土則肌肉  
何由而生豈可復用寒涼剋伐之藥重損氣血耶遂  
用前藥治之而愈

亞益若患處或諸竅出者肝火熾盛血熱錯經而妄

行也。用加味逍遙散清熱養血。若中氣虛弱，血無所附而妄行，用加味四君子湯補益中氣。或元氣內脫，不能攝血，用獨參湯加炮薑以回陽。如不應，急加附子。或血蘊於內而嘔血，用四物加柴胡、黃芩。凡傷損勞碌，怒氣肚腹脹悶，誤服大黃等藥，傷陽絡則為吐血，衄血便血尿血，傷陰絡則為血積血塊，肌肉青黯。此臟腑虧損，經隧失職，急補脾肺。亦有生者，但患者不悟此理，不用此法，惜哉。張地官墜馬傷腿，服草烏等藥，致衄血欬，臂痛目黃，口渴齒痛，小便短少。此因燥劑傷肺，與大腸而致。薛用生地、芩、連、黃、檗，知

母、山、梔、山、藥、甘、草，以潤肺之燥，而生腎水。小便頓長。諸證並止。以山藥、五味、麥門、參、芪、芎、歸、黃、檗、黃、芩，知母、炙、草，以滋陰血，養元氣，而瘡斂。俞進上折腿骨已接，三月尚發熱，出血不止。正體醫治不應。左關脈洪數，此肝火熾甚，血得熱而妄行也。遂投小柴胡湯，加山梔、芍藥、生地、防風，血止熱退。又用八珍、五味、麥門、治之，瘡口即愈。田宗伯姪仲秋，因怒跌仆，偏身作痛，發熱衄血，肝脈弦洪，薛曰：久衄脈弦，乃肝火盛而制金也。至春則肝木茂盛而自焚，或戕賊脾土，非易治之證。當滋腎水以生肝木，益脾土以生肺金。

乃雜用瀉肝火等藥，歿於仲春之月。大尹劉國信  
金瘡出血，發熱煩躁，屬陰虛為患。用聖愈湯治之，虛  
火息而血歸經矣。梁閣老姪金瘡腫痛，出血不止，  
寒熱口乾，此氣虛血無所附而血不歸經也。用補中  
益氣、五味、麥門、主之，陽氣復而愈。

**瘀血之治** 有一患者，瘀血流注腰脊，兩足俱黑，隨飲  
童便酒，破出瘀血糜肉，投以小柴胡湯，去半夏，加山  
梔、芩、連、骨、碎、補，以清肝火，用八珍、茯苓，以壯脾胃，然  
肉潰而新肉生，後瘡復潰，得靜調治年餘而痊。有  
一患者，瘀血攻注陰囊，潰而成漏，膿水清稀，所服皆

寒涼之劑，診其肝脉短澹，餘脉浮而無力，此肝木受  
肺金剋制，又元氣虛不能收斂，遂用壯脾胃、生氣血  
之方，元氣少復，後終歿於金旺之日。

**昏憤傷重** 昏憤者，急灌以獨參湯，雖內瘀血，切不可  
下。急用花蕊石散，內化之，恐因瀉而亡陰也。若元氣  
虛甚者，尤不可下，亦用以前散化之。凡瘀血在內，大  
小便不通用，大黃、朴硝、血凝而不下者，急用木香、肉  
桂、末、參、貳錢，以熱酒調灌，服血下乃生，如怯弱之人  
用硝黃，須加肉桂、木香，同煎，假其熱以行其寒也。  
一婦人孟冬傷足，亡血頭汗，內熱作渴，短氣煩躁，不

時昏憤其脉洪大按之微弱此陰血虛於下孤陽炎於上故發厥而頭出汗也以四物合小柴胡湯一劑汗即止以四物去川芎加參芪麥門五味炙草少用肉桂四劑諸證悉去又三十餘劑血氣復而愈一男子孟夏折腿出血過多其初眩暈眼花後則昏憤此陰血傷損陽火熾甚制金不能平木木旺生風所致急灌童便更用人參當歸各伍錢荆芥川芎柴胡芍藥白朮各貳錢山梔黃芩黃芩桔梗各壹錢甘草伍分服之隨爽又用四物參芪各叁錢生地柴胡各壹錢四劑煩躁悉去

有一患者腹脹嘔吐眩暈用柴胡黃芩山梔紫蘇杏仁枳殼桔梗川芎當歸赤芍紅花桃仁四劑而定後又出血過多昏憤目黑用十全大補等藥而蘇時肌肉潰爛膿水淋漓筋攣骨痛薛切其脉浮而瀉沉而弱此因氣血耗損不能養筋筋虛不能束骨遂用養氣血之藥治之而愈有一患者杖瘡愈後失於調理頭目不清服祛風化痰等藥反眩暈服半黃清心丸又肚腹疼痛杖痕腫痒發熱作渴飲食不思痰氣上升以為杖瘡餘毒復作診左尺脉洪大按之如無薛曰此腎經不足不能攝氣歸源遂用人參黃

芪茯苓陳皮當歸川芎熟地山藥山茱萸五味麥門  
炙草服之而尋愈後因勞熱渴頭痛倦怠少食用補  
中益氣湯加麥門五味而痊

煩躁有一患者兩脇脹悶欲欬不欬口覺血腥徧身  
腎腿脹痛倦怠不食煩渴脉大此血脫煩躁也與童  
便酒及破患處出灰血糜肉甚多忽發熱煩躁汗出  
投以獨參湯三劑少止又用補氣血清肝火之藥數  
劑飲食稍進後用獨參湯間服諸證悉退飲食頓加  
但不能多寐以歸脾湯加山梔竹茹四劑而熟睡因  
勞心遂煩渴自汗脉大無力以當歸補血湯二劑而

安又以十全大補去川芎加麥門五味牡丹地骨麻  
黃根炒浮麥數劑而汗止灰肉且潰又二十餘劑而  
新肉生有一患者煩躁面赤口乾作渴脉洪大按  
之如無薛曰此血虛發躁也遂以當歸補血湯二劑  
即止後日晡發熱更以四物加柴胡牡丹地骨黃蘗  
知母治之熱退而瘡斂東垣云發熱惡寒大渴不止  
其脉大而無力者非白虎湯證此血虛發躁也宜用  
當歸補血湯治之裴先生云肌熱躁熱目赤面紅其  
脉洪大而虛此血虛也若誤服白虎湯輕則危重則  
斃有一患者頭額出汗熱渴氣短煩躁骨痛瘀肉

不潰遂割去之出鮮血服芩連之藥益甚其脉洪大  
而微此氣血俱虛邪火熾盛所致以四物加參芪木  
炙草少用柴胡炒芩二劑頭汗頓止又加麥門五味  
肉桂二劑諸證悉退後用參芪歸木炒芍熟地麥門  
五味十餘劑瘀血潰而膿水稠矣但新肉不生以前  
藥倍用白朮而斂吳給事墜馬傷首出血過多發  
熱煩躁肉瞶筋惕或欲投破傷風藥予曰此血虛火  
動所致當峻補其血為善遂用聖愈湯二劑即安又  
養氣血而瘡瘡張進士季秋墜馬亡血過多出汗  
煩躁翌日其汗自止熱躁益甚口噤手顫此陰血虛

陽火乘之而汗出為寒氣收斂腠理故汗不得出火  
不得泄佛鬱內甚而益增他證也予用四物加柴胡  
黃芩山梔四劑少止又用四物參芪軟柴胡五味麥  
門治之而痊

發熱若出血過多或潰膿之夜脉洪大而虛重按全  
無此陰虛發熱也用當歸補血湯脉沉微按之軟弱  
此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁肉瞶筋惕  
亡血也用聖愈湯如汗不止血脫也用獨參湯其血  
脫脉實汗後脉躁者難治細小者易治外臺秘要云  
陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加葱白王太僕



先生云凡熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動者名曰無火此無根之虛火也。楊進士傷手指焮痛發熱服寒涼之藥致飲食頓減患處不潰薛用托裡養血之藥食進瘡潰後因勞每日晡發熱此陰虛而內熱也以四物軟柴胡地骨皮乃退更用養血氣之藥而瘡斂。一男子墜馬腹有瘀血服藥下之致發熱盜汗自汗脉浮濇薛以為重劑過傷氣血所致投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然也以前藥加炮附子伍分服之即睡覺來頓安再劑而痊。舉人余時正金瘡焮痛出血不止惡寒發熱

用敗毒等藥愈其此亡血過多氣無所附而然耳遂以四物黃檗知母軟柴胡玄參五味麥門治之即愈。一女子年十七閃右臂微腫作痛寅申時發熱薛決其膽經血虛火盛經水果先期而至先以四物合小柴胡湯四劑熱退更以加味四物湯加香附地骨皮山梔各伍分苓連炙草各叁分二十餘劑其腫亦消乃去黃連山梔又五十餘劑經水調而元氣充矣。湯氣脫墜梁閣老姪跌傷腿外敷大黃等藥內服破血之劑遂致內潰薛針出膿參碗許虛證悉具用大補之劑兩月餘少能步履因勞心手撒眼閉汗出

如冰或欲用祛風之劑薛曰此氣血尚未充足而然也急以艾炒熟熨臍肚臍并氣海穴處以人參肆兩炮附子伍錢煎灌良久臂少動又灌一劑眼開能言但氣不能接續乃以參芪歸朮四味共壹斤附子伍錢水煎徐徐服之元氣漸復飲食已進乃去附子服之而瘡愈

**胃腹痛悶** 跳躍掣胃閃挫舉步勞役恚怒而胃腹痛悶喜手摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸者肝經血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胸脇作痛發熱晡熱肝經血傷也用加味逍遙散若胸脇

作痛飲食少思肝脾氣傷也用四君芎歸柴梔丹皮若胸腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君加柴胡芎歸若胸腹不利食少無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳白朮芎歸梔子青皮若咬牙發搐肝旺脾虛也用小柴胡湯川芎山梔天麻釣藤鈎或用風藥則肝血益傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛肝火愈熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血少壯者必為痼疾老弱者多致不起

**作嘔** 若因痛甚或因尅伐而傷胃者用四君當歸半

夏生薑或因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加山梔芍  
苓若因痰火盛用二陳薑炒黃連山梔若因胃氣虛  
用補中益氣湯生薑半夏若山出血過多或因潰後用  
六君子湯加當歸有一患者痛甚發熱嘔吐少食  
胸膈痞滿用行氣破血之劑益甚口乾作渴大便不  
調患處色黯薛曰此痛傷胃氣所致遂以四君當歸  
炒芍軟柴藿香二劑諸證漸愈又用大補之劑潰之  
而瘳有一患者發熱熾痛服寒涼藥更加口乾作  
渴肚腹亦痛自以為瘀血欲下之薛按其肚腹不痛  
脉微細而遲飲食惡寒此涼藥傷胃而然也急用六

君加芍藥當歸炮附子各壹錢服之前證益甚反加  
譫語面赤薛意其藥力未至耳前藥再加附子伍分  
服之即睡覺來諸病頓退而安一膏梁之人跌腿  
青腫作痛服辛熱之藥反發熱作喘患處益痛口乾  
脣揭薛曰膏梁之人內多積熱更服辛熱之劑益其  
胃火而使然也頻飲童便以清胃散加山梔黃芩甘  
草治之頓止患處以葱熨之腫即消散一婦人傷  
指手背俱腫微嘔少食彼以為毒氣內攻診其脉沉  
細此痛傷胃氣所致也遂刺出膿碗許先以六君藿  
香當歸而食進繼以八珍黃芩白芷桔槔月餘而瘳

愈

嘔吐黑血如味芎藭湯

治打撲傷損敗血流入胃

腕嘔吐黑血如口汗

芎藭

當歸

白芍藥

百合

水浸壹日

荊芥

各壹錢

右作壹服水壹鍾半酒半鍾煎至捌分不拘時服

百合散

治打撲傷損敗血流入胃腕嘔吐黑血汁者

川芎

赤芍藥

當歸

百合

生地黄

側柏葉

荊芥

犀角

牡丹皮

黃芩

黃連

梔子

鬱金

大黃

右水煎加童便和服

大便利者去大黃

喘效若出血過多面黑胸脹或胸膈痛而發喘者乃

氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲若欬血衄血者

乃氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加山枕苳連

蘇木舉人杜克弘墜馬服下血藥反作喘日晡益

甚此血虛所致耳非瘀血為患遂以四物加參芪五

味麥門治之其喘頓止又用補中益氣加五味麥門

而愈此證果係瘀血蒸熏於肺而喘只宜活血行血

夫藥專員

亦不可下若面黑胸脹或膈痛作喘當用人參壹兩  
蘇木貳兩作一劑水煎急服緩則不治產婦多有此  
疾

二味參蘇飲 治出血過多瘀血入肺面黑喘促

人參 壹兩  
蘇木 貳兩

右水煎服

十味參蘇飲 治氣逆血蘊上焦發熱氣促或欬血

人參 半夏  
紫蘇 桔梗  
陳皮 枳殼

茯苓 炙甘草 伍分

前胡

葛根

枳殼 各壹錢

炙甘草 伍分

右薑水煎服

若因出血過多，用四物參朮，如不應，用人參黃芪以補氣，當歸熟地以養血。若因潰後，用八珍湯。若胃熱傷津液，用竹葉黃芪湯。胃虛津液不足，用補中益氣湯。胃火熾盛，竹葉石膏湯。若煩熱作渴，小便淋瀝，乃腎經虛熱，非地黃丸不能救。有一患者，瘀血雖去，飲食形氣如故，但熱渴厥痛，膈痞有痰，以小柴胡湯加天花粉、貝母、桔梗、山梔二劑，少愈，又加生地、

歸尾黃芩柴胡山禰花粉而愈詳治百餘人其杖後血氣不虛者惟此一人耳

大便秘結若大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸丸

或以豬膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黃丸腸

胃氣唐用補中益氣湯

手足傷損若元氣虛弱或不戒房勞或妄行攻伐致

或肉上死或腐而不痛黑而不脫者當大補元氣庶

可保生若手足節斷去者無妨骨斷筋連不急剪

去若侵及好肉則不治若預為調補脾氣則無此患

人凡膿瘀內焮者即針之而投托裏散或口噤遺尿

而似破傷風者急用十全大補湯加附子多有生者

手足疼痛有一患者愈後腿作痛薛意膿血過多瘡

雖愈肝經血氣尚未充實而濕熱乘虛也遂以八珍

加牛膝木瓜蒼木黃蘗防已炙草以祛濕熱養陰血

痛漸止乃去防已黃蘗服之遂瘳

應痛丸治折傷後為四氣所侵手足疼者

破故紙

骨碎補

蒼木

草烏各半斤

穿山甲

舶上茴香炒各陸兩

去膜桑柴灰炒泡起為度此灰亦可

右除草烏半斤用生薑壹斤搗爛同草烏一處淹

兩宿焙乾為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服

五十丸用酒或米湯送下忌熱物片時

乳香散 治打傷損手足疼痛不可忍

乳香

沒藥

白芷

肉桂 伍錢

白朮

當歸 各炒

粉草 各伍錢

右為細末研勻每服貳錢不拘時酒調下

破傷風 河間云風證善行數變入臟甚速死生在反

掌之間宜急分表裏虛實而治之邪在表者則筋脉

拘急時或寒熱筋惕搐搦脉浮弦用羌活防風湯散

之在半表半裏者則頭微汗身無汗用羌活湯和之

傳入裏者舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛

胸腹滿悶便溺閉赤時或汗出脉洪數而弦以大芎

黃湯導之既下而汗仍出表虛也以白朮防風湯補

之不時灌以粥飲為善前云乃氣虛未損之法也若

膿血太泄陽隨陰散氣血俱虛而類前證者悉宜大

補脾胃切忌祛風之藥 詳見雜病第五 有一患

者仲夏誤傷手腰背反張牙關緊急脉浮而散此表

證也遂用羌活防風湯一劑即解此證若在秋冬腠

理緻密之時須用麻黃之類以發汗此乃暴傷氣血

失美傷損

外

百

不損之治法也。有一患者杖處畧破而患此脉洪大而實此裏證也。用大芎黃湯一劑大便微行一次。悉退若投表藥必效。宜急分表裏虛實而治之。庶無誤矣。有一患者寒熱口乾用四物參芪白朮梔柴炒芩麥門五味四劑少退。薛欲去瘀血不從後。怵不寐飲食少思牙關牽緊頭日疼痛惡寒發熱此膿內厥也。遂破去之。即安。以八珍棗仁麥門五味二十劑前證漸愈。又用前藥及獨參湯瘀肉漸潰後因勞又少寐盜汗以歸脾湯麥門五味遠志而痊。後牙關脹悶面日厥赤又似破傷風仍以為虛用八珍等

藥亦安。有一患者腹痛喘促作渴寒熱臀腿糜爛與瘀血相和如皮囊盛糊用童便煎四物桃仁紅花柴胡黃芩麥門花粉服之頓退。彼用黑羊皮貼之益甚。後破去膿血甚多氣息奄奄唇口微動牙關緊急患處色黯或欲用破傷風藥薛曰此氣血虛而變證也。用參芪芎歸白朮并獨參湯人乳汁元氣復而諸證愈。乃用十全大補湯調理而安。此證若膿瘀內厥者宜針之。若潰後口噤遺尿而類破傷風等證者乃氣血虛極也。急用大補之劑。若素多痰患風證者宜清痰降火。若因怒而見風證者宜清肝降火。若人不



慎房勞而忽患前證此由腎水不足心火熾甚宜滋

陰補氣血為主若誤作風證治之即效

羌活防風湯治破傷風邪初在表者急服此藥以

解之稍遲則邪入於裏與藥不相合矣

羌活 防風 甘草

川芎 藁本 當歸

芍藥各肆兩 地榆 細辛各二兩

右每服伍錢水煎

防風湯治破傷風表證未傳入裏急宜服之

防風 羌活 獨活

川芎各肆分

右每服伍錢水煎調蜈蚣散服大效

蜈蚣散

蜈蚣 鯽魚各錢

右為細末用防風湯調下

羌活湯治破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪

入於裏不宜用

羌活 菊花 麻黃

川芎 石膏 防風

前胡 黃芩 細辛

跌撲傷員

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荆子

各壹兩

薄荷

白芷

各伍錢

右每服伍錢水煎

地榆防風散

治風在半表裏頭微汗身無汗不可

發汗無治表裏

地榆

防風

地丁草

馬齒莧

各等分

右為細末每服叁錢米湯調服

大芎黃湯

治風在裏宜踈導急服此湯

川芎

羌活

黃芩

大黃

各壹兩

右伍柒錢水煎溫服臟腑通和為度

白朮防風湯

治服表藥過多自汗者

白朮

黃芪

各壹兩

防風

貳兩

右每服伍柒錢水煎服臟腑和而自汗者可服若

臟腑秘小便赤者宜用大芎黃湯下之

白朮湯

治破傷風汗不止筋攣搐搦

白朮

葛根

升麻

黃芩

芍藥

各貳兩

甘草

貳錢伍分

右每服伍錢水煎無時服

蕭甫硃砂丸 治破傷風口噤不語手足搐搦

項筋強直不能轉側目不識人

硃砂 研

半夏 洗

川烏 各壹兩

雄黃 伍錢

鳳凰臺 叁錢

麝香 壹字

右為末棗肉丸桐子大每服壹丸或貳丸冷水下

以吐為度如不吐加壹丸或吐不住煎葱白湯止

之汗出為効

左龍丸 治直視在裏者

左盤龍 野鴿糞也

白殭蠶

鰮 各炒伍錢

雄黃 壹錢

右為末燒飯丸桐子大每服拾伍丸温酒下如

證不已當用前藥末一半加巴豆霜半錢燒飯丸

桐子大每服加入壹丸如此漸加以利為度利後

服和解藥

江鰮丸 治破傷風傳入裏證驚而發搐臟腑秘澀

江鰮 剉炒

野鴿糞 炒

白殭蠶 各半兩

雄黃 壹錢

蜈蚣 壹對

天麻 壹兩

右為末作叁分貳分燒飯丸桐子大硃砂為衣壹

分入巴豆霜壹錢亦用燒飯丸每服硃砂者貳拾

丸入巴豆者壹丸漸加至利為度後止服前丸

養血當歸地黃散

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各壹兩

細辛

伍錢

右依前煎服

廣利方 治破傷風發熱

括婁子

玖錢

滑石

叁錢

南星

蒼朮

赤芍藥

陳皮

炒檉

黃連

黃芩

白芷

甘草

各伍分

右薑水煎服

右二方用竹瀝括婁實輩治破傷風熱痰脉洪者

前方用南星半夏草烏川烏輩則治破傷風寒痰

脉無力者

白丸子 治一切風痰壅盛手足頑麻或牙關緊急

口眼歪斜半身不遂等證

半夏

柒兩

南星

貳兩

川烏

去皮臍伍錢各生用

右為末用生薑汁調糊丸桐子大每服壹貳拾丸

薑湯下

本事玉真散

治破傷風及打撲傷損項強口噤欲

天南星有以風製  
其毒不麻人

天南星

易泡

防風

等分

右為末先以熱童子小便洗淨瘡口拭乾摻之良久渾身作痒瘡口出赤水是効又以温酒調下壹錢如牙關緊急腰背反張用藥貳錢童子小便調一服至效心頭微温者急灌之亦可救累効累効治打撲傷損腫痛傷風者

天南星

半夏

地龍 各等分

右為末用生薑薄荷汁調搽患處

急風散 治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折

口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之

麝香

另研五分

硃砂

壹兩

生黑豆

貳錢半

草烏

叁兩半燒存性

右為細末研勻破傷風以酒調壹錢不拘時服如

出箭頭先用酒調壹錢就將此藥貼上箭瘡上

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮

陸兩

川烏

炮去

兩頭尖

炮各肆兩

草烏

炮去

防風

細辛

各貳兩半

白朮

川芎

白芷

各壹兩半

蝎稍微炒

雄黄各半

右為細末每服壹錢不拘時酒調下如損骨折乳香伍錢

字散 治破傷風

金頭蜈蚣壹條去頭足炙

草烏

天麻各半

全蝎壹錢

香白芷叁錢

右為細末每服半錢如發熱茶清調下發寒温酒調下不拘時服

發瘧仲景云諸瘧項強皆屬於温又云太陽病發汗太多致瘧風病下之則瘧復發汗則拘急瘡家發汗

則瘧是汗下重亡津液所致有汗而不惡寒曰柔瘧以風能散氣也宜白朮湯加桂心黃芪無汗而惡寒曰剛瘧以寒能澀血也宜葛根湯皆氣血內傷筋無所營而變非風也杖瘡及勞傷氣血而變者當補氣血未應用獨參湯手足冷加桂附緩則不救詳見雜病第五 有一患者內潰針出膿三五碗遂用大補之劑翌日熱甚汗出足冷口噤腰背反張眾欲投發散之劑薛曰此氣血虛極而變瘧也若認作風治則悞矣用十全大補等藥而愈此證多因傷寒汗下過度與產婦潰瘍氣血虧損所致但當調補氣血為

善若服尅伐之劑多致不救 有一患者兩月餘矣  
瘡口未完因怒發瘡口出血此怒動肝火而爲患  
耳用柴胡芩連山梔防風桔梗天麻釣藤鈎甘草治  
之頓愈劉宗厚先生云瘵有屬風火之熱內作者有  
因七情怒氣而作者亦有濕熱內盛痰涎壅遏經絡  
而作者惟宜補虛降火敦王平木清痰去濕  
**行氣之非**有一患者服行氣之劑胸痞氣促食少體  
倦色黯膿清此形氣俱虛之證也先用六君桔梗二  
劑胸膈氣和後用補中益氣去升麻加茯苓半夏五  
味麥門治之元氣漸復而愈若用前劑戕賊元氣多

至不救

**下血之非**有一患者去其患處瘀血用四物柴胡紅  
花治之焮痛頓止但寒熱口乾飲食少思用四物白  
朮茯苓柴胡黃芩花粉四劑寒熱即退用六君芎歸  
藿香而飲食進腐肉雖潰膿水清稀以前藥倍用參  
芪歸朮茯苓二十餘劑腐肉俱潰膿水漸稠悞服下  
藥壹鍾連瀉四次患處色黯喜其脉不洪數乃以十  
全大補倍加肉桂麥門五味數劑肉色紅活新肉漸  
生喜在壯年易於調理又月餘而愈否則不救凡杖  
瘡跌撲之證患處如有瘀血止宜砂去服壯元氣之

疾業集

外科

百信

劑蓋其氣血已損切不可再用行氣下血之藥復損脾胃則運氣愈難營達於下而反為敗證怯弱者多致天枉

**寒藥之非**有一患者腫痛敷寒涼之藥欲內消瘀血反致臀腿俱冷瘀血凝胸腹痞悶薛急去所敷之藥以熱童便酒洗患處服六君子木香當歸傳回陽膏腎腿漸溫又以前藥去木香加川芎藿香肉桂四劑瘀血解乃刺之更以壯脾胃養氣血得痊蓋氣血得溫則行得寒則凝寒極生熱熱變化為膿腐潰深大血氣既敗肌肉無由而生欲望其生難矣 雲間曹子本

為室人中風灌漑誤咬去指半節焮痛寒熱外敷大黃等藥內服清熱敗毒患處不痛不潰膿清寒熱愈甚薛曰此因涼藥遏絕隧道而然也遂敷王龍膏以散寒氣更服六君子湯以壯脾胃數日後患處微痛腫處漸消此陽氣運達患處也果出稠膿不數日半指潰脫更服托裏藥而斂 上舍王天爵傷足焮腫內熱作渴外敷內服皆寒涼敗毒患處益腫而不潰且惡寒少食欲作嘔吐薛曰此氣血俱虛又因寒藥凝結隧道損傷胃氣以致前證耳遂用香砂六君子芎歸炮薑外證悉退惟體倦補熱飲食不甘以補中



益氣湯加地骨皮五味麥門治之而愈  
州守王廷  
用傷指卽用帛裹之瘀血內潰焮腫至手薛謂宜解  
患處以出瘀血更用推陳致新之劑不信乃敷涼藥  
痛雖少止次日復作又敷之數日後手心背俱潰出  
瘀穢膿水尚眼敗毒之劑氣血益虛色黯膿清飲食  
少思仍請予治投以壯脾胃生氣血之劑由是膿水  
漸稠而愈

不疔之非有一患者發熱煩躁用四物黃芩紅花  
柴山梔花粉煩熱已清瘀血深蓄欲針出之不從忽  
牙關緊急患處作痛始針去膿血自安用托裏養血

新肉漸長忽患處瘙痒此風熱也用法風消毒之劑  
而痊

不補之非有一患者腎腿脹痛發熱煩躁刺去瘀血  
脹痛少寬熱躁愈甚此血脫邪火旺而然也急用獨  
參湯補之少愈又以健脾胃養氣血藥治之腐肉漸  
潰遂愈大抵此證宜預調補以顧收斂切不可伐其  
氣血不行補益以至不能收斂矣

廉血不升，漸益以厚，其血自升。  
 跌打傷損，大抵此症，宜用此法。  
 參茸兩之，心愈，又以我輩胃養血，血自升。  
 此法，心宜，其血自升，而然也。急用此。  
 而全。

湯火瘡 灸瘡

初反治  
 凡湯火傷急，向火灸，雖極痛，強忍一時，即不痛。慎勿  
 以冷物塌之。及井底泥傅之，使熱氣不出，爛入肌肉。  
 丹火燒，以好酒洗之。又以鹽傅其上。如皮塌者，以酒  
 熬牛皮膠傅之。如湯傷，以淋過。第二次灰杏傅立  
 安。熱酒傷，糯米粉炒黑末酒調傅之。治湯火灼  
 未成瘡者，用艾白根燒灰，雞子黃和傅之。如成瘡，用  
 白蜜封之。以竹中膜貼上。日二。  
 世治湯火瘡，麩皮炒黑灰為末，傅上神妙。此方有補  
 性，始終皆可用。治湯火瘡，取舊烹銀爐中燒過焦

治中正

黃土研細如粉以生薑調於帛上貼之痛止一方用

落銀鍋子細末油調傳佳

千治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已

成瘡燒白糖灰粉傳之燥即瘡用白糖葛氏方

治湯火燒方

右用蕎麥麩炒黃色蜜水調傳如神

保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切

犬齧損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少為極

細末調塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作

膿無分毫釐苦楚日近完復永無破傷風證

水霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石生

牡蠣煨

朴硝

青黛

輕粉各等分

右為細末新水或小油調塗立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

寒水石

大黃各等分

右為末以新汲水調塗傷處

治火燒

桐油

水銀各等分

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏

末和以牛皮膠八少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼之

綠白散治湯熨火燒疼痛用苦參不拘多少為細末每用以小油調搽

凡被傷熱油痛不可忍取廁下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老薑汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈以青黛傅之亦妙

治湯火傷

大黃

黃芩

黃連

山梔子

黃蘗

知母

貝母

蜜陀僧

乳香

沒藥

輕粉

甘草各等分

右為細末用鷄子清加蜜調不住手時時掃之

清涼膏 治湯發火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁

黃連去鬚

白芷名貳錢半

生地黄貳兩

葱白拾莖

黃蠟半兩

清麻油肆兩

右細剉於油鐺中煎地黄焦黑色綿濾去滓澄清却於鐺內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒內用時以鷄羽搵少許塗瘡上以瘥為度

易火倉

重七

麻子膏 治火燒人肉爛壞

麻子 壹合取 栢白皮

山梔子 仁碎 白芷

右剉細以猪脂壹斤煎三上三下去滓以塗瘡上

日三

黃檗散 治湯火傷

黃檗 大黃

朴硝

鷄子殼

寒水石 各等分

右為細末用水調塗極效

栢葉散 治湯火傷

栢葉

梔子仁

胡粉 研

右為細末以羊髓五大合熔化和藥以木椎研三

五百徧一日三次塗之瘡

蛤粉散 治湯火傷

右以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生

油調如膏傅之如永仍無痕一方以蜜水調傅之

疼立止不膿不痕吳內翰居鄉中隣家金翻一小

兒自頭至踵皆傷急以傅之啼立止遂無恙唯纒

傷隨手用即效少緩即不及當須先合以備用耳

治湯火燒瘡

湯火瘡

小

一

右以側栢葉入臼中濕搗令極爛如泥冷水調作膏傅傷處以帛子繫定三二日瘡當斂仍滅癩一方燒灰存性為末以鷄子清調傅如乾再上或蜜調亦可或搗末以脂調塗瘡上乾即易一方以山栢子葉爛搗塗傅

治人向火生火斑成瘡有汁及治火氣入瘡

右用黃壁薄荷為末乾摻之即愈一方用黃壁皮為末摻之立愈薄荷煎塗亦可

補

治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之

經治湯火瘡至妙用劉寄奴為末先以糯米漿雞翎

掃傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯傷先用鹽末摻之護肉不壞然後傅藥又方以榆白皮末猪脂油塗瘡愈

治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮為末香油調傅治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡為度放冷

搽患處驗

精治中熱油及火燒除外痛以丹參捌兩細剉以水微調取羊脂貳斤煎三上三下以傅瘡上愈

止痛膏 治灸瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅

癩

湯火瘡

卷六

百一

松脂

羊脂

豬膏

黃蠟

各壹

右取松脂破鉢中切脂嚼蠟着松明上少頃鉢內燒諸物皆消以杯盛汁傳之松明是肥松節也神効當歸膏治湯火瘡初起瘰癧熱毒侵展焮赤痛毒氣壅盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止痛

當歸

黃蠟

各壹

麻油

肆兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化放冷以磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白蠟

紫雪

治湯盪火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡

右用松樹皮燒灰貳錢還青壹分研為細末清油調傳濕則乾摻忌冷水洗日三一方不用瀝青以松樹皮陰乾為細末入輕粉少許生油調傳如傳不住絹帛縛定即生痂

治湯火傷

右用霜後芙蓉葉桑葉等分陰乾研為細末用蜜調塗傳之濕則乾摻

鷄黃油

治湯火傷

右用鷄子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒

直待都化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙  
為末香油調傅濕則乾摻之

炎瘡止痛生肌散 治炎瘡

牡蠣煨研

寒水石煨研

滑石研各

一分

右為細末凡用之時切護爪甲勿令中風仍須洗  
瘡令淨然後摻藥薄薄令遍以軟綿帛繫之候脫  
生漸用栢皮膏

栢皮膏 治炎瘡久不瘥

栢樹白皮

伏龍肝各

猪脂半斤煉

為油

右同熬成膏濾去滓入磁器中用時薄薄塗之

上以油紙隔軟帛裹

綠雲散 治炎瘡止痛

栢葉

芙蓉葉

並端午日午時採不拘多少陰乾

右為細末每遇炎瘡黑蓋子脫了即用水調少許  
如膏藥攤楮紙上貼之養膿更無痛楚

四時貼護方 治炎瘡未着痂及出膿久不合者

春以柳絮

夏以竹膜

秋以新綿

冬以兔毛

右各隨時貼瘡上

內托黃芪丸 治鍼灸傷經絡流膿不止

易火膏 炎瘡 外科

百三



海少...

黃芪 捌兩

當歸 洗卷

肉桂 去皮

木香

乳香 另研

沉香 各壹兩

菘豆粉 肆兩

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服伍

拾丸不拘時白湯送下

以膏藥... 更無... 藥

白為... 蓋... 水... 道

附葉

芙蓉葉 不... 並...

縣雲... 宜...

十... 飛...

諸蟲獸螫傷

之治聖惠治蛇咬蠍螫... 妙

雄黃 叁錢

信 壹錢

皂角子

巴豆 各肆拾

耳塞

麝香 各少

右五月五日不聞鷄犬婦人處不語搗為細末在

杏子核內封之銀挑出上痛處大有神効

世治一切蛇蟲傷貝母末酒調服効... 又方用

酥和鹽傅之... 又方用益母草搗爛厚盒傷處... 又

方用鵝糞傅之... 又方用獨

蒜酸漿草搗傷處... 又方用酒暖洗瘡上日三次

初... 周... 按...

又方紫蘇葉油浸塗傷處

山諸般惡蟲咬以油浸紫草塗之

丹治蛇咬蠶咬惡蟲咬猪膏搗汁傳藥藏器

治山溪中沙虱射工等毒用葱小蒜茱萸煮汁浸或

搗傅大効

治二十七穀蟲咬傷人及瘡腫者用麝香雄黃乳香

礪砂各貳錢土蜂窩露蜂窩燒灰存性研細以醋調

少許塗咬處或不能辨認疑是惡瘡三五日不瘡即

毒入心難瘥忌雞魚油膩物

治蛇傷犬咬一切蟲毒用試劍草搗爛貼之

治蛇犬及狂狗咬用蚯蚓糞和鹽研傅神効

海治蠍蜘蛛蛇毒雞卵輕敲一小孔合咬處即瘥

又方先問被傷人是甚蟲傷即默念火德星君黑殺

攝吹在傷處自然不痛又方用艾炷於傷處灸三

五壯拔去毒即愈

治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻

腹內成塊逡巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒

和灌之將滓厚罨所傷處

簡治毒蛇射工沙虱等物傷着人眼黑口噤手足強

直毒氣入腹用白礬甘草等分爲細末每服貳錢冷

毒入腹者

水調下

治諸蛇蟲傷毒用青黛雄黃等分新汲水調服貳錢  
又方用蒼耳嫩葉一握搗汁温酒和飲滓厚傳傷  
處口噤身強者灌之

治蛇犬咬卽破傷風用荔枝草一握約叁兩以好酒

貳碗煎至壹碗服卽睡出汗汗不止以温白粥補之

治惡蛇風犬傷用雄黃草撥細辛等分入麝少許爲

末每服貳錢好酒調下

毒此治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗

之又以牙逆封傷處傳而護之甚妙且不痛腫

毒解

人糞傳患

處亦佳

又方用好醋一二碗服令毒氣不隨血

之或飲清油一二盞亦可以頭繩扎定傷處兩頭

次用白芷末半兩白水調服頃刻咬處黃水出盡腫

消又方用白礬雄黃黃蠟等分丸如指頭大遇有

着傷燈上燒開滴傷處或以竹筒按上滴入則毒不

散

世路行卒被蛇咬當急扯裹脚帶孔縛傷處上下寸

許使毒氣不能快傷肌體又急用白礬安刀頭火上

溶汁沸滴於傷處待冷以長篦子速挑去腐則毒血

隨出黯腫尚未退更滴之以退爲度村居山僻及

途中夜行卒被蛇傷咬難求白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如腫尚未消釋當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人蜈蚣咬亦宜灸

**世治**一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調厚搽傷處水流出如涎痛腫即消一方以蔞苣汁和雄黃末作餅子候乾為末每用少許貼瘡口立效

**衍**有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥貳錢灌之遂甦及以藥滓塗患處良久復灌貳錢其苦皆去問之乃五靈脂壹兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之無不効驗 又方用乾薑雄黃等分

為末傅之兼辟蛇用絹袋盛較簪上男左女右蛇聞氣遠避

**世治毒蛇所傷**

細辛

香白芷

各伍錢

雄黃

貳錢

右為末加麝香少許每服貳錢溫酒調服効

**丹治**一切蛇咬用香白芷嚼碎傅患處又用溫酒調

**服効**水蓼搗汁飲滓傳傷處 櫻桃葉絞汁服滓

**傳傷處**

**世治**一切蛇蟲所傷用貝母為末酒調令病人盡量飲之頃久酒自傷處為末流出候水盡却以藥滓傅

諸虫獸毒傷

卷六

百四

瘡上即愈 治蛇咬腫毒悶欲死者用重臺陸分續  
隨子陸顯去皮同為細末以酒服方寸七又以唾調  
少許傳患處立安崔氏海上方 又方用白礬貳錢服之  
防毒氣攻心 又方金線重樓以水磨少許傳咬處  
又為細末酒服之 又方用和樹葉魚腥草地松節  
皺面草草尖明共一處研細傳傷處極佳 地榆生  
絞汁飲及濃煎漬之半日愈 治蛇傷用馬蘭草即  
皆前菊生搗傳傷處亦解酒疽止鼻衄合金瘡 治  
蛇咬瘡用蒜去皮壹升搗破以童便壹升煮三四沸  
熟漬損處壹兩時初咬未腫即嚼蒜封之六七易

又方用蒜壹升乳貳升煮爛空腹頓服以飯壓之次  
日依前再服

治諸惡蟲蛇螫用地菘搗傳之

海治蛇虺咬入以獨頭蒜酸漿草搗汁傳咬處佳

海治蛇咬男子陰毛口含二十莖蘸其津毒不入腹

世治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青

小青

青木香

烏柏葉

火炊草

山蕨菴

過山龍

地蜈蚣

天門冬

白芍藥

香薷

諸虫獸瘡

外科六

百八

右細末用白木香研細生白酒調服查罨咬處累

聖治蛇咬毒食茱萸壹兩為細末冷水調分為三服立瘥

丹治蛇毒喫菰蔣艸根灰取以封之其草即野茭白是也廣濟方蛇咬作瘡暖酒浸日二次絲瓜根搗

生酒飲醉立愈治蛇傷用小青一握細研入香白芷半兩酒調服却以手捻患處猴黃水出為效毒

蛇傷人目黑口噤毒氣入腹以甘草白礬等分末之冷水調下貳錢蒜壹升乳貳升煮食仍煮童便熱漬

麻油米醋並急飲貳盃毒即散大糞塗之

頭垢耳塞并泥蚯蚓糞和搗塗咬處黃水出愈一方加白丁香

蛇咬忌食酸物梅子犯之大痛

蛇入人口并七孔中者割猪母尾頭瀝血着口中并孔口上即出

聖治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇尾内生椒二三粒裹着即出

治卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之

蜈蚣咬治蜈蚣咬生雞血傅上立愈累效一男子為

人蛇繞

口蛇

此白只止人咬

小

言中曾書傷  
夕承六  
百四九

蜈蚣入咽喉中咬之垂危之際一醫令殺生雞血乘  
熱灌喉中蜈蚣即出而愈實良方也 又方用雞糞  
塗之 又方治蜈蚣諸毒蟲傷麻油點燈於瘡口上  
對口熏之登時愈 又法大油紙燃燒燈吹滅以餘  
煙焯之亦治蠍及諸毒傷 治蜈蚣咬竹葉清研汁  
傳之立愈 又方用南星磨汁傳之累效 蜈蚣草  
曬乾為末入鹽少許水調傳患處能解諸毒  
梅治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨螫處立愈  
聖治蜈蚣咬方用蝸牛揀取汁滴入咬處  
孫蜈蚣咬取蜘蛛壹枚安咬處當自飲毒如蜘蛛咬

而痛未止更易生者

丹蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之  
蜈蚣咬頭垢塞之不痛則痒 治蜈蚣咬及諸蟲咬毒  
先用鞋底土擦之用大蒜小蒜桑葉罨傷處如無用  
油鼓盪傷處或藍靛塗罨之亦效 治蜈蚣毒蟲咬  
用桑枝汁同鹽擦痛處或溶黃蠟滴患處肉黑為度  
又方用皂角於咬處上用艾炙熱去之效 用生  
薑汁調雄黃水傳 又方灰荳葉擦其痛即止 又  
方燈草蘸香油點煙熏之 又方凡被傷急以手指  
於地上乾處畫十字內撮土摻在咬處即愈 又方

者口火女傷  
小十一  
百五

用耳塞少許塗咬處疼即止 又方用茱萸嚼爛擦之 又方用生薑汁調蚌粉搽

蠖蝮傷治蠖蝮尿成瘡初如粟漸大如豆如火燒泡

大痛者速以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙

猪膏每搗汁傳之 草茶即茶茗也 治兩點蠖蝮瘡用百合搗爛入

鹽少許傳之效

千治蠖蝮尿人影着便令人病瘡如粟粒纍纍痛似

刺蟲所螫惡寒壯熱用犀角磨汁塗之則愈

世蠖蝮蟲又名八脚蟲隱壁間以尿射入徧身生瘡

如湯火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之 治小兒

蠖蝮咬透腹匝印外用梨葉研爛傳之

食蠖蝮尿瘡鹽參升水壹斗煮取陸升以綿浸湯瘡

瘡上

蠖蝮雄黃消毒膏 治蝎螫不可忍

雄黃 信 各半 巴豆 叁錢

白礬 生壹兩

右為細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻為錠子如棗子大用時將錠子簽於燈焰上炙開滴於螫着處其痛立止

潔一上散 治蝎螫痛

者虫狀螫傷



半夏

壹字生用

雄黃

壹字另研

巴豆

壹箇去皮研如泥

右三味同研和勻上之

治蝎毒用溶化白礬乘

熱滴傷處痛止毒出

廣治蝎螫人研蜘蛛汁傅之瘥

山蝎螫苦蕒汁塗之

世治蝎螫地磨生薑塗之

又方南星米醋調擦之

人參嚼封之

白礬半夏等分為末醋調貼痛止毒

出又方用葱白切壹片厚貳分置螫處灸三五

蜂螫治蜂螫薄荷貼之瘥

人參嚼封之以酥傅

之醋磨雄黃塗

蜂房末豬脂調傅亦得

黃

蜂螫熱酒洗之立効

又方清油搽之愈

蜘蛛咬張薦昔在劍南為張延賞判官忽被班蜘蛛

咬項上一宿咬處有二道赤色細如筋繞項上從胃

前至心經一宿頭面腫疼如數升益大壯漸腫幾至

不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財五百

千畚能療者忽一人應召云可治張相初不甚信欲

驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命

取遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投入藍汁良久方出

甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃利之更取

一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令

點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

海蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛

蚯蚓一條捏兩頭不令透氣搖動化為水點咬處瘡

治蜘蛛瘡用羊乳傅其上或用清油搽之即安

丹蜘蛛咬處嚼韭白傅之

山蜘蛛等諸般蟲咬用葛粉生薑汁調傅

經蜘蛛咬唾和山豆根末塗之狗咬虬蟬瘡蛇咬並

水研山豆根傅之火蠟也蠟即蟻又方蜘蛛咬一

身生絲半乳一件飲之 灰糞搗碎和油傅之

沈存中秦皮一味治天蛇毒此瘡似癩而非癩也天

蛇即草間黃花蜘蛛人被其螫仍為露所濡乃成此

疾以秦皮煮汁一斗飲之瘥

壁鏡大如蜘蛛而形扁翹色入足咬毒人必以用桑

柴燒灰水煎三四沸濾汁傅瘡上無治蛇毒 又方

雄黃醋磨搽妙 又方大黃研醋煮水塗妙

刺毛蟲春夏月樹下牆隙間有等雜色毛蟲極

毒凡人觸着者則放毛入人手足上自皮至肉自肉

至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛

在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之

憂此名中射工毒諸藥不効用好豆豉約一碗清油

半盞拌豉搗爛厚傅痛痒處經一時久豉氣透骨則引出蟲毛紛紛可見取下豉埋在土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸即烏賊魚骨為末傅之愈一方取蒲公英根莖白汁傅之立瘥又方用鍋底黃土為末以酸醋捏成團於痒痛處搓轉其毛皆出在土上痛痒立止神効無比黃土即伏龍肝也按治刺螫傷無如甘草妙口內細嚼傅之即時瘥今蘇州虎丘山下民家皆以種植樹木為生周十里內無刺螫乃時用甘草汁灑樹故也

**蚯蚓傷**治蝻蟥吹用老茶葉細末調傅

丹治蚯蚓咬如大風狀眉鬚皆落夜則蚯蚓鳴於身上膿作鹽湯浸數次安傳信方衍昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而瘥

**蝮蛇咬**治蝮蛇咬用榭葉燒灰細研以泔別浸榭葉取洗瘡拭乾納少許灰於瘡中又方治蝮蛇咬人用石灰醋和塗之

**蠶咬**用麝香研蜜調傅又方用苧根搗汁飲塗若以苧近蠶種則蠶不生

**犬咬**犬咬人屎傅之犬咬人以頭垢傅傷處又用

者只少入效且宜勿

小年六

頁五

熱牛糞塗於外肘後方

行犬傷人用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫繫

世治犬咬用杏仁去皮尖同馬藷根研細先以葱湯

洗後以此藥塗傷處效治犬咬傷用草麻子五十

粒去殼以井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏

傅貼一方用虎骨屑傅之治犬咬人不要洗用

紅炭火以物擊細待冷取塗咬處即愈治犬咬用

黃荊葉搗罨瘡上即安又方炙生薑乘熱擦之尤

妙又方甄青和牛糞三

丹狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之犬咬破傷風腫以

人參於桑柴火上燒成灰末傅之安

羅蟬花散治夏月犬傷及諸般損傷蛆蟲極盛臭

惡不可近者

蛇退皮一兩火燒存性蟬殼

青黛各半兩

細辛二錢

右為細末每服參錢酒調下如六畜損傷成瘡用

酒灌下如犬咬傷用醇子和喫蛆皆化為水蠅子

不敢再落又以寒水石末乾摻上

額犬咬定風散治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿

拭乾貼藥更不再發大有神効

天南星

風各等

右為細末乾上更不再發無膿効不可具述

丹治犬咬梔子皮燒灰石硫黃等分研細傅瘡

世治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆

皮蓋定罨於傷處又用艾於桃核上灸十四壯即愈

永不再發或用野犬糞又方艾灸傷處五七壯

山風狗咬即用犬糞塗仍拔去頂上紅髮

世癩狗咬方用蟹螯七枚去頭足翅以糯米少許於

新瓦上同炒以米黃香為度去米不用以蟹螯研碎

好酒調下能飲人再進酒一杯傷在上食後服在下

空腹服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未下

次日再進亦不下又進以毒物出為度若進至七服

雖不下毒亦不妨矣服藥後腹中必不安小便莖中

刺痛者不必慮此毒受攻將下耳痛甚者以蕪青一

匙煎甘草湯送下即止如無蕪青青黛亦可疾愈後

急以香白芷多雄黃少許為末搗韭根自然汁湯酒

調下去蟹螯毒以水淨漱口嚼生葱白罨傷處留小

竅子出毒氣不可用他草藥罨忌犬豬羊及發風毒

物小兒量歲數加減蟹螯食癩狗肉致病者治同即

愈或過一二年再發治如前 治癩狗所傷用蟹螯  
貳拾壹箇去頭翅并足用糯米壹勺先將柴箇入米  
內微火炒不令米赤去此蟹螯別用柴箇再於前米  
內炒令蟹螯色變復去之又別用柴箇如前法炒以  
米出青煙為度去蟹螯不用以米研為粉用冷水入  
清油少許空心調服頃又再進一服以小便利下惡  
物為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水  
調青龍服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可  
不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙 又方用  
米泔洗淨以沙糖塗之復用益元散肆兩蟹螯拾肆

箇去頭翅足同煎空心溫服 又方用雄黃伍錢麝  
香伍分研勻酒調貳錢服下去惡物再服得睡莫驚  
覺或經久復發亦宜服此  
世風狗咬取小兒胎髮炒香傅野菊花研細酒調服  
盡醉止效 又方韭菜根搗汁二三盞服 又方桃  
白皮一握水貳盞煎三盞服  
世治癩犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗  
雄黃色極明者伍錢 麝香伍分  
右研勻用酒調貳錢服如不肯服者則燃其鼻而  
灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利

者此其效驗易

五云

下惡物再進前藥則見効矣

丹癡犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈 又方者

地榆汁飲之魚細末傅瘡上服方寸七日忌酒若

瘡瘡者搗生韭汁飲一二升梅師肘風犬咬後毒

發如狗叫聲於他人壇拾頭頂骨燒末傅之 風狗

咬毒發如狗叫者百方不治以人骨燒末之水下方

寸七雖頑亂者亦治梅師膽礬為末貼瘡立愈

馬咬細嚼栗子傅傷處 又方用益母草細切和醋

炒封之 毒入心馬齒莧湯飲之瘡

風咬用貓兒毛燒灰傅之 貓糞填咬處 麝香末

傅包之

人咬龜甲或鼈甲燒為灰末之香油調傅

虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中滿不必換自然新

肉長出而愈曾有人被咬已死用此方治之

丹熊虎傷毒痛煮生鐵令有味以洗之用後虎傷

人瘡取青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏

入瘡口中佳梅師清油洗瘡口仍與清油壹碗

又方用乾葛濃煎湯洗 又方用沙糖水調塗仍服

沙糖水壹兩碗

世虎傷入瘡用莓子葉杵細塗之按本艸莓子葉

按本艸莓子葉能治虎傷

諸生醫藥錄

傷咬

熊咬熊傷人燒青布熏瘡中毒出仍者葛根濃汁以洗之日十次并搗葛根為散煮葛根汁方寸七日五服瘥

驢涎馬汗瘡驢涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則毒深不治以生烏頭末傅瘡口上良久黃水出立安世治驢涎馬汗入瘡用遠志去心為末酒調塗又方用冬瓜青皮陰乾為末貼瘡上又方馬汗入肉毒氣引入如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上一方用烏梅和核爛研用好醋和成膏先將瘡口針破

出盡紫紅血拭乾傅上以帛縛定 王氏治驢涎馬汗毒所傷白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相裹合以貼患處



孟馬齒莧又主馬毒瘡以水煎令服一升一半塗瘡上濕鮮白禿以馬齒膏和灰塗効

諸生醫藥錄

卷之十一

七





言  
書  
卷  
之  
目  
次  
和  
大

真

				漢書門
		二九	七一	
一〇	九二			
冊	架	函	號	類