WA 35
90

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』 請求記号 WA35-90

ガラス使用

WA35
90

国立国会
37.2.20
図書館

570646

外科發揮卷之三

薛氏醫按
吳郡薛　巳著
新都吳玄有校

鬢疽

焮痛或發熱者祛風清熱
焮痛發寒熱或拘急者發散表邪
作膿焮痛者托裏消毒
膿已成作痛者針之
不作膿或膿成而不潰者並以托裏
不斂或膿清者宜峻補

一男子患此焮腫作痛發熱以小柴胡湯加連翹銀花桔梗四劑而消

一男子因怒後髮際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉桔梗四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿成鍼之更以托裏消毒藥而愈

一男子頭面焮腫作痛時仲冬脉弦緊以托裏溫經湯汗之而消

一男子腫痛寒熱拘急脉浮數以荆防敗毒散二劑表證悉退更以托裏消毒散潰之而安

一男子膿熟不潰脹痛鍼之而止更以托裏消毒散而愈凡瘡膿熟不潰屬氣血虛也若不托裏必致難瘥

一男子作膿焮痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以六君子湯加當歸桔梗皁角刺潰而愈

一男子膿清不斂以托裏散加五味子麥門冬而斂

一老人腫痛發熱膿清作渴脉輭而濇此血氣俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而愈夫患者臟腑氣血上下各有虛實（詳見潰瘍作痛第十）

三條　況陰證似陽陽證似陰（治驗見外科心法）豈可以發熱作渴而槩用寒凉之劑常治患者正氣虛邪氣實以托裏爲主消毒佐之正氣實邪氣虛以攻毒爲主托裏佐之正氣虛邪氣實而專用攻毒則先損胃氣宜先用仙方活命飲托裏消毒散或用灸法俟邪氣退正氣復更酌量治之大抵正氣奪則虛邪氣勝則實蓋邪正不並立一勝則一負其虛不待損而自虛矣若發背腦疽疔毒及患在四肢必用灸法拔引臀毒以行瘀滯尤不可專於攻毒診其脉而辨之庶不有悞

○如禍泉黃吏部肩患毒發熱惡寒大渴煩躁似有餘之證其脉雖大而無力却屬不足用當歸補血湯治之○吾鄉周都憲兩腿作痛形體清癯肝脉弦數却屬有餘之證用親膽瀉肝湯治之並愈齊氏云瘡腫之證若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散邪又云脉洪大而數者實也細微而數者虛也河間云脉沉實者其邪在臟浮大者其邪在表觀此誠發前人之未發診候之道其可缺邪

一男子腫焮痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而實此表裏俱有邪也以荆防敗毒散加芩連大黃二劑少愈更以荆防敗毒散四劑而消大抵瘡瘍之

龍

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』　請求記号 WA35-90　ガラス使用

證腫焮痛甚寒熱往來或大便秘結小便淋心神憒悶恍惚不寧皆邪熱之實也豈可補哉東垣云瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危治重則死矣

附方

小柴胡湯 方見

荊防敗毒散 方見潰瘍發熱門

托裏消毒散 方見腫瘍門

仙方活命飲 方見發背門

托裏散 方見腫瘍門

六君子湯 方見作嘔門

托裏溫經湯 治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛焮甚更宜砭之

麻黃　升麻　防風

乾葛　白芷　當歸

蒼朮　人參　芍藥

甘草各一錢

作一劑水二鍾煎一鍾服卧於暖處得汗乃散

八珍湯方見潰瘍發熱門

龍膽瀉汗湯方見下痢門

十宣散方見腫瘍門

當歸補血湯方見潰瘍門

△時毒謂毒發於面鼻耳項

裏實而不利者下之

表實而不解者散之

表裏俱實而不解者解表攻裏

表裏俱解而不消者和之

腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒之劑

不作膿或不潰者托之

飢年普患者不宜用峻利當審而治之

一男子患此腫痛發熱作渴脉實便秘以五利大黃湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一男子表裏俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消

一男子腫痛發寒熱脉浮數以荆防敗毒散二劑少愈以人參敗毒散二劑勢減半又二劑而瘥

570646

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』　請求記号 WA35-90　ガラス使用

一男子耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆防敗毒散二劑勢退太半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一婦人表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃瘀血欲作膿也以托裏消毒散潰之而愈

一男子焮腫脹痛作渴煩熱便秘脉數按之尤實用防風通聖散一劑諸證頓退以荆防敗毒散加玄參牛蒡子黄芩二劑而痊

一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脉實此表裏俱實病也飲防風通聖散不應遂致患處出黑血仍

投前藥即應又以荆防敗毒散而瘥蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也恶血既去其藥自効或拘用寒遠寒及年高畏用硝黄而用托裏與夫尋常消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不危矣

一男子表裏俱解惟腫不消以托裏消毒散四劑膿成鍼之而愈

一婦人腫痛用硝黄之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退此瘀血欲作膿也用托裏消毒散潰之而愈

一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脉浮數邪在表尚未解用荆防敗毒散二劑勢退太半更以葛根牛蒡子湯四劑而痊內經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而爲腫此感四時不正之氣爲患與夫膏粱積熱之證不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不審其因不辨其虛實表裏槩用攻之必致有悞常見饑饉之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之爲患不可不察予常治邪在表者用葛根牛蒡子湯人參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裏者五利大黃湯梔子仁湯表裏俱不解者防風通聖散表裏俱解而腫不退者犀角升麻湯如腫甚者砭患處出惡血以泄其毒或用通氣散取嚏以泄其毒十日外自愈若嚏出膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此法最爲穩當五七日咽喉腫閉言語不出頭面不腫食不知味者不治

一男子服表散藥愈熾發熱便秘診其脉沉實此邪在裏也以大黃湯下之裏證悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈齊氏云時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也其候發

於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛或肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將爲傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始求瘡醫原夫此疾古無方論世俗通爲丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱恶毒所爲與夫時毒特不同耳蓋時毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣輭者五香連翹湯主之又於鼻内嚏通氣散取十餘嚏作効若嚏藥不嚏者不可治如嚏出膿血者治之必愈左右看病之人每日用嚏藥嚏之必不傳染其病人每日亦用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃耆散宜針鎌砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死治之無功矣然而

此疾有陰有陽有可汗有可下常見麄工但云熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

附方

五利大黃湯　治時毒焮腫赤痛煩渴便秘脉實數

大黃煨　黃芩　升麻各二錢　芒硝　梔子各一錢二分

作一劑水一鍾半煎六分空心熱服

梔子仁湯　治時毒腫痛大便秘結脉沉數

麝金　枳殼麩炒去穰　升麻　山梔仁炒　牛蒡子炒　大黃煨各等

右爲細末每服三錢蜜水調下

荆防敗毒散　治時毒腫痛發熱左手脉浮數

即人參敗毒散加防風荆芥方見潰瘍發熱門

葛根牛蒡子湯　治時毒腫痛脉數而少力者

葛根　管仲　甘草　江西豆豉　牛蒡子半生杵炒各二錢

作一劑水一鍾半煎八分食後服

防風通聖散　治時毒腫痛煩躁表裏脉證俱實方見瘡門

人參敗毒散方見潰瘍發熱門

托裏消毒散　治時毒表裏俱解腫尚不退欲其作膿方見腫瘍門

普濟消毒飲　治時毒疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫痛或咽喉不利舌乾口燥

黄芩　黄連各五錢　人參三錢
橘紅　玄參　甘草各二錢
柴胡　桔梗炒各二錢　連翹
鼠粘子　板藍根　馬勃各一錢
白殭蠶炒　升麻各七分

作一劑水二鍾煎一鍾去柤稍熱食後徐徐服之

如大便硬加酒煨大黄一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之去恶血

通氣散　治時毒焮腫咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索一錢五分　猪牙皁角　川芎各錢
藜蘆五分　羊躑躅花二分半

右爲細末用紙撚蘸少許紙於鼻内取嚏爲効

托裏散方見腫瘍門

△疔瘡

脉浮數者散之
脉沉實者下之

表裏俱實者解表攻裏

麻痺或大痛及不痛者並灸之更兼攻毒

一男子足患作痺惡心嘔吐時發昏亂脉浮數明灸二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荆防敗毒散而愈

一男子患之發熱煩躁脉實以清涼飲下之而愈

一男子胷患之遍身麻木脉數而實急針出惡血更明灸數壯始痛服防風通聖散得利而愈

一男子左手背患之是日一臂麻木次日半體皆然神思昏憒遂明灸至二十餘壯尚不知痛又三十餘壯始不麻至百壯始痛以奪命丹一服腫始起更用神異膏及荆防敗毒散而愈○一老婦足大指患之甚痛令灸之彼不從專服敗毒藥致真氣虛而邪氣愈實竟至不救蓋敗毒散雖能表散瘡毒然而感有表裏所發有輕重體段有上下所禀有虛實豈可一槩而用之耶且至陰之下藥力在所難到專假藥力則緩不及事不若灸之爲良故下部患瘡皆宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若灸之而不痛者宜明灸之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔内仍以膏藥貼之若針之不痛或無血者以

針燒赤頻烙患處以痛爲度或不痛眼黑如見火光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅絲攻心腹者就於絲盡處刺去惡血宜服荆防敗毒散若絲近心腹者宜挑破瘡頭去惡水亦以膏藥貼之如麻木者服奪命丹如牙關緊急或喉内患者並宜嚥一二丸凡人暴死多是疔毒用燈照看遍身若有小瘡即是宜急灸之俟醒更服敗毒藥或奪命丹人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎

附方

荆防敗毒散　即人參敗毒散加荆芥防風方見潰瘍發熱門

奪命丹　治疔瘡發背及惡證不痛或麻木或嘔吐重者昏憒此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止惛憒者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰有回生之功乃惡證之中至寶也

蟾酥乾者酒化　輕粉各半錢　白礬枯
寒水石煅　銅綠　乳香
沒藥　麝香各一錢　硃砂三錢
蝸牛二十箇另研無亦効

右爲細末將蝸牛別碾爛入藥末搗勻爲丸如菉

豆大如丸不就入酒糊些小每服一二丸用生葱白三五寸病者自嚼爛吐於手心男左女右包藥在內用熱酒和葱送下如人行五七里汗出爲効重者再服一二丸

清涼飲

隔蒜灸法 二方見發背門

神異膏 方見楊梅瘡門

△臀癰 附腿癰并腿痛脚氣

焮痛尺脉緊而無力者托之腫硬痛甚者隔蒜灸之更以解毒不作膿而痛者解毒爲主不作膿者托裏爲主不潰或潰而不斂者托裏爲主

一男子臀癰腫硬作痛尺脉浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑膿潰而愈

一男子臀癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裏消毒散加黃柏蒼朮羌活瘡頭潰之而愈

一男子臀癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裏消毒散膿潰而瘥

一男子臀癰不作膿飲食少思先用六君子湯加芎歸黄耆飲食漸進更以托裏消毒散膿潰而愈

一男子潰而膿清不斂以豆豉餅灸之更飲十全大補湯兩月餘而痊凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也虛實詳見潰瘍作痛門

一男子臀癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脉微弦以六君子湯加藿香當歸數劑飲食遂進飲以十全大補湯及豆豉餅灸之兩月餘而斂

一弱人臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十餘劑而愈夫臀居僻位氣血罕到老弱人患之尤宜補其氣血庶可保痊

一男子腿内側患癰未作膿而腫痛以内托黄芪柴胡湯二劑少愈又二劑而消

一男子臀漫腫色不變脉滑數而無力此臀癰也膿將成尚在内予欲治以托裏藥待發出而用針彼欲内消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其血氣使膿速成而針去不可論内消之法膿成又當辨其生熟淺深而針之若大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復

起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而輭者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉色不相變者發於骨髓也

一男子腿外側患癰漫腫大痛以內托黃芪酒煎湯二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一婦人腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀予以爲虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂起復求治令灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈凡瘡膿清及不斂者或陷下皆氣血虛極也最宜大補否則成敗證若更患他證尤難治療

一男子腿癰內潰針之膿出四五碗許惡寒畏食脉診如絲此陽氣微也以四君子湯加炮附子一錢服之寒少止又四劑而止以六君子湯加桂數劑飲食頓進乃以十全大補湯及附子餅兩月而愈

一老人腿患癰膿自潰忽發惛瞀脉細而微此氣血虛極也以大補之劑而蘇○一弱人流注內潰出敗膿五六碗是時眼口歪斜脉亦虛極乃虛甚也非真中風以獨參湯加附子一錢二劑少愈更以大補藥月餘而痊大抵膿血大泄當大補氣血爲先雖有他證以末治之凡癰大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若

左手脉不足者補血藥當多於補氣藥右手脉不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表

一婦人患腰痛脚弱弛長不能動履以人參敗毒散加蒼术黄柏澤瀉而愈

一婦人環跳穴作痛肉色不變脉緊數此附骨疽也膿未成用内托黄芪酒煎湯加青皮龍膽草山梔數劑而消

一男子患腿癰兼筋攣痛脉弦緊用五積散加黄柏柴胡蒼术治之而痊

一婦人患附骨疽久不愈膿水不絶皮膚瘙痒凶肢痿軟予以爲虚欲補之彼惑爲風疾遂服祛風藥竟致不起陳無擇云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形内則有心肝脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致内藏精血虚耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所因痿則内藏不足之所致也

一男子患附骨疽腫硬發熱骨痛筋攣脉數而沉用當歸拈痛湯而愈

一男子腿根近環跳穴患痛徹骨外皮如故脉數而帶滑此附骨疽膿將成用托裏藥六劑腫起作痛脉

滑數膿已成針之出碗許更加補劑月餘而瘳

一男子腿内患癰漫腫作痛四肢厥咽喉塞發寒熱諸治不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服大便行二次諸證悉退而愈

一婦人兩腿作痛不能伸展脉弦緊按之則濇先以五積散二劑痛少止又一劑而止更以神應養真而能伸屈

一男子患腿痛膝微腫輕診則浮按之弦緊此鶴膝風也與大防風湯二劑已退二三彼謂附子有毒乃服敗毒藥日漸消瘦復求治予謂今飲食不爲肌膚水穀不能運化精微灌溉臟腑週身百脉神將何依然故氣短而促真氣損也怠惰嗜卧脾氣衰也小便不禁胸胱不藏也時有躁熱心下虛痞胃氣不能上榮也恍惚健忘神明亂也不治後果然此證多患於不足之人故以加減小續命大防風二湯有効若用攻毒藥必誤

一婦人患脚氣或時腿腫筋攣腹作痛諸藥不應漸危篤諸書云八味丸治足少陰脚氣人腹疼痛上氣喘促欲死遂投一服頓退又服而愈腎經虛寒之人多有此患乃腎乘心水剋火死不旋踵宜急服

一男子腿痛兼筋攣骨痛脉弦緊以大防風湯二劑攣少愈又二劑而腫消但内一處尚作痛脉不弦緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿故痛不止也用托裏藥數劑腫發起脉滑數乃膿已成矣鍼之用十全大補湯月餘而安

一婦人膝腫痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脉弦緊此寒邪深伏於内也用大防風湯及火龍膏治之而消大抵此證雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱邪氣得以深襲若真氣壯實邪氣焉能爲患邪故附骨癰疽及鶴膝風證腎虛者多患之前人用附子者以温補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人秋夏露卧爲冷氣所襲寒熱伏結多成此證不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛少止須大防風湯及火龍膏治之若失治爲彎曲偏枯有堅硬如石謂之石疽若熱緩積日不潰肉色赤紫皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裏也

一男子右腿赤腫焮痛脉沉數用當歸拈痛湯四肢

反痛乃濕毒壅遏又况下部藥難達非藥不對症遂砭患處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消

一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除濕敗毒之劑不應診其脉滑而濇此濕痰濁血爲患以二陳湯加蒼术羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛温之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈

一男子腿痛每痛則痰盛或作嘈雜脉滑而數以二陳湯加升麻二术澤瀉羌活南星治之而安

一男子素有脚氣脇下作痛發熱頭暈嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脉緊右關脉弦此亦脚氣也以半夏左經湯治之而愈

一男子脚軟腫痛發熱飲冷大小便秘右關脉數乃足陽明經濕熱流注也以大黄左經湯治之而愈

一男子臁脛兼踝脚皆焮痛治以加味敗毒而愈

一男子兩腿痛脉滑而遲此濕痰所致以二陳湯加二术黄柏羌活澤瀉治之而消

一男子兩腿腫痛脉滑而緩此濕痰所致也先以五苓散加蒼术黄柏二劑少愈更以二陳二术檳榔紫蘇羌活濁活牛膝黄柏而瘥夫濕痰之證必先以行

氣利濕健中爲主若中氣和則痰自消而濕亦無所容矣

一婦人兩腿痛脉濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黄柏知母龍膽草茯苓防風防巳羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二朮黄柏牛膝木瓜月餘而愈

一男子肢節腫痛脉遲而數此濕熱之證以荆防敗毒散加麻黄二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦消更以四物湯加二朮牛膝木瓜數劑而愈

一婦人脚脛腫痛發寒熱脉浮數此三陽經濕熱下注爲患尚在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血乃用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊太受云脚氣是爲壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其重勢經云畜則腫熱砭射之後以藥治之

一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脉弦而緊此寒邪之證以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜牛膝枳殼月餘而愈

一男子腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應

甚苦先以活絡丹一丸頓退又服而瘳次年復痛仍服一丸亦退太半更以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨癰作痛服活絡丹一丸二證並瘥○上舍俞魯用素有疝不能愈因患腿痛亦用一丸不惟腿患有效而疝亦得愈矣○西蜀彭黄門太安人臂痛數年二丸而瘥○留都金二守女患驚風甚危諸醫皆勿救自用一丸即愈且不再作

夫病深伏在内非此藥莫能通達但近代始云此藥引風入骨如油麪之説故後人多不肯服大抵有是病宜用是藥豈可泥於此言以致難瘥

一婦人兩腿作痛時或走痛氣短自汗諸藥不應診之尺脉弦緩此寒濕流注於腎經也以附子六物湯治之而愈但人謂附子有毒多不肯服若用童便炮製何毒之有况不常服何足爲慮予中氣不足以補中益氣湯加附子服之三年何見其毒也經云有是病用是藥

一婦人肢節腫痛脛足尤甚時或自汗或頭痛此太陽經濕熱所致用麻黄左經湯二劑而愈

一婦人患血痔兼腿酸痛似痺此陰血虚不能養於筋而然也宜先養血爲主遂以加味四斤丸治之而

愈

一老人筋攣骨痛兩腿無力不能步履以局方換腿丸治之○一婦人筋攣痺緩兩腿無力不能步履以三因勝駿丸治之並愈河間云脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者乃因血海虛而七情所感遂成斯疾今婦人病此亦衆則知婦人以血海虛而得之與男子腎虛類也男女用藥固無異更當兼治七情无不効也

一婦人患腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脉弦緊此腎肝虛弱風濕内侵也以獨活寄生湯治之痛止更以神應養真丹而弗攣矣

一男子素有腿痛飲食過傷痛益甚倦怠脉弱以六君子湯加山查神麯蒼术芎歸升麻柴胡而愈

一老人素善飲腿常腫痛脉洪而緩先以當歸拈痛湯候濕熱少退後用六君子湯加蒼术黄柏澤瀉治之而痊

一男子每飲食少過胸膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸二服頓愈更以六君子湯加神麯麥芽蒼术二十餘劑遂不復作河間云若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎

之虛以致足腫加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷飲食脾胃之氣有虧不能上升則下注爲脚氣者宜用東垣開結導引化開導引水運化脾氣如脾氣虛濕氣壅遏不通致面目發腫或痛者宜用導滯通經湯以疎導之已上十九條乃脚氣證雖非瘡毒因治有驗故録之

附方

內托羌活湯　治尻臀患癰堅硬腫痛兩尺脉緊按之无力

羌活　黃柏各二錢　防風

當歸尾　藁本各一錢　肉桂一錢

連翹　甘草炙　蒼术米泔浸炒

陳皮各半錢　黃芪鹽水拌炒一錢半

作一劑水酒各一鍾煎至八分食前服

隔蒜灸法

槐花酒

仙方活命飲三方見發背

金銀花散方見作嘔門

托裏消毒散方見腫瘍門

六君子湯方見作嘔門

豆豉餅　治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑

瘡惡瘡用江西豆豉爲末唾津和作餅子如錢大厚如三文置患處以艾壯於餅上灸之餅若乾再用唾津和作如背瘡大用漱口水調作餅覆患處以艾鋪餅上燒之如未成者用之即消已成者雖不能全消其毒頓減前人俱稱有奇功不可忽之

十全大補湯 方見潰瘍發熱門

獨參湯 方見杖瘡門

內托黃耆柴胡湯　治濕熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起腫痛此太陰厥陰之分位也脉細而弦按之洪緩有力

黃芪 鹽水拌炒二錢　柴胡　土瓜根 各一錢

羌活 五分　連翹 一錢五分　肉桂

生地黃 各三分　當歸尾 八分　黃柏 五分

作一劑水酒各一鍾煎八分空心熱服

內托黃芪酒煎湯　治寒濕腿外側少陽經分患癰或附骨癰堅硬漫腫作痛或侵足陽明經亦治之

黃芪 鹽水拌炒一錢　柴胡 一錢半　連翹

肉桂 各一錢　黃柏 五分　大力子 炒一錢

當歸尾 二錢　升麻 七分　甘草 炒五分

作一劑水酒各一鍾煎八分食前服

附子餅　治潰瘍氣血虛不能收斂或風邪襲之以致氣血不能運於瘡所不能收斂用炮附子去皮脐研末以唾津和爲餅置瘡口處將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津和做以瘡口活潤爲度

四君子湯　治脾胃不健飲食少思肌肉不生肢體倦怠

人參　茯苓　白朮炒各二錢　甘草炙五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

人參敗毒散方見潰瘍發熱門

五積散　治風寒濕毒客於經絡致筋攣骨痛或腰脚酸疼或拘急或身重痛並治之

蒼朮半錢　桔梗炒一錢二分　陳皮去白六分　白芷三分　甘草炙　當歸酒拌　川芎　芍藥炒　半夏薑製

茯苓去皮各三分　麻黃去節六分　乾薑炮四分　枳殼麩炒六分　桂心一錢　厚朴薑製四分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾服

當歸拈痛湯　治濕熱下注腿脚生瘡或膿水不絕

或赤腫或痒痛或四肢遍身重痛

羌活五錢　人參　苦參酒製

升麻　葛根　蒼术各二炒

甘草炙　黄芩酒拌　茵陳葉酒炒各五錢

防風　當歸身　知母酒炒

澤瀉　猪苓各三錢　白术一錢半

作四劑水二鍾煎一鍾空心并臨睡服之

大防風湯　治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝大腿愈細因名曰鶴膝風乃敗證也非此方不能治又治痢後脚痛緩弱不能行歩或腿膝腫痛

附子一錢炮　白术炒　羌活

人参各二錢　川芎一錢五分　防風二錢

甘草炙一錢　牛膝酒浸二錢　當歸酒拌二錢

黄芪炙一錢　白芍藥炒二錢　杜仲薑製二錢

熟地黄用生者酒拌蒸半日忌鐵器二錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分空心服愈後尤宜謹調攝更服還少丹或加桂以行地黄之滯若脾胃虚寒之人宜服八味丸

補中益氣湯方見潰瘍發熱門

火龍膏　治風寒濕毒所襲筋攣骨痛或肢節疼痛及濕痰流注經絡作痛或不能行步治鶴膝風歷節風疼痛其効尤速

生薑八兩取汁　乳香爲末　沒藥爲末各五錢
麝香爲末一錢　真牛皮膠二兩切碎用廣東者

先將薑汁并膠溶化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香即成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

二陳湯　和中理氣健脾胃消痰進飲食

半夏薑製　陳皮炒　茯苓各一錢五分
甘草炙五分

作一劑水一鍾薑三片煎六分食遠服

半夏左經湯　治足少陽經爲四氣所乘以致發熱腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿痺緩

半夏薑製　乾葛　細辛
白术　麥門冬去心　茯苓
桂心去皮　防風　乾薑炮
黃芩　柴胡　甘草炙各一錢

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

大黃左經湯　治四氣流注足陽明經致腰脚去腫痛不可行大小便秘或食氣喘滿自汗

細辛　茯苓　羌活
大黃煨　甘草炙　前胡
枳殼　厚朴薑製　黃芩
杏仁去皮尖炒各一錢

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

加味敗毒散　治足三陽經受熱毒流於脚踝焮赤腫痛寒熱如瘧自汗短氣小便不利手足或無汗惡寒

羌活　獨活　前胡
柴胡　枳殼　桔梗
甘草　人參　茯苓
川芎　大黃　蒼朮各一錢

作二劑水二鍾薑三片煎八分服

附子六物湯　治四氣流注於足太陰經骨節煩痛四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子　防己各四錢　甘草炙二錢
白朮　茯苓各三錢　桂枝四錢

作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

八味丸　治命門火衰不能上生脾土致脾胃虛弱飲食少思或食不化日漸消瘦及虛勞渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利及腎氣虛寒脐腹作痛夜多旋溺脚膝无力肢體倦怠

即腎氣丸每料加肉桂一兩附子一兩其附子每日用新童便數碗浸五六日切作四塊再如前浸數日以草紙包裹將水濕紙炮半日去皮脐尖切作大片如有白星再用火炙以無白星爲度一兩凡用俱要照此法炮過方宜用方見脚癬門

每服五十丸空心鹽湯下

四物湯方見瘰癧門

交加散　治風寒濕毒所傷腿脚疼痛或筋攣骨痛及腰背攣痛或頭痛惡寒拘急遍身疼痛一切寒毒之證並効

即五積散方見前　對人參敗毒散方見潰瘍發熱門

荊防敗毒散方見潰瘍發熱門

檳蘇散　治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐不食

檳榔　木瓜各一錢　香附子　紫蘇各三分　陳皮　甘草炙各一錢

作一劑水一鍾半薑三片葱白三莖煎一鍾空心服

麻黃左經湯　治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛增寒發熱无汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃去節　乾葛　茯苓
蒼朮米泔浸炒　防己酒拌　桂心
羌活　防風　細辛
甘草炙各一錢二錢

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

加味四斤丸　治肝腎二經氣血不足足膝酸痛步履不隨如受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脛骨一兩酥炙　沒藥另研　乳香另研各五錢
川烏一兩炮去皮　肉蓯蓉　川牛膝一兩五錢
木瓜一兩去穰蒸　天麻一兩
餘爲末將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊知匀熟杵丸梧子大每服七八十丸空心温酒或塩湯任下

局方換腿丸　治足三陰經爲四氣所乘攣痺緩縱或上攻胸脇肩背或下注脚膝作痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁　南星湯泡　石楠葉
石斛　檳榔　萆薢炙
川牛膝　羌活　防風
木瓜各四兩　黃芪炙　當歸
天麻　續斷各一兩

爲末酒糊丸梧桐子大每服五十丸鹽湯送下

五香連翹散方見腫瘍門

三因勝駿丸　治元氣不足爲寒濕之氣所襲腰足攣拳或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子炮法見八味丸　當歸　天麻
牛膝　木香　酸棗仁炒
熟地黃用生者酒拌蒸半日忌鐵器杵膏　防風各二兩
木瓜四兩　羌活　乳香各五錢
廣香二錢　全蝎炒　沒藥
甘草炙各一兩

爲末用生地黃三斤用無灰酒四升煮乾再晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

大神效活絡丹方見奇効良方風門

南星川烏草烏地龍各五兩　乳香沒藥各二兩　酒麵糊丸

獨活寄生湯　治肝腎虛弱風濕內攻兩脛緩縱攣痛痺弱足膝攣重

獨活二錢　白茯苓　杜仲薑製　當歸酒洗　防風　芍藥炒　人參　細辛　桂心　芎藭　秦艽　牛膝酒拌　桑寄生眞者器一錢　甘草炙五分　地黃用生者酒拌蒸半日　忌鐵各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食前服

神應養眞丹　治厥陰經爲四氣所襲脚膝无力或生癰右瘓半身不遂手足頑麻語言蹇澀氣血凝滯遍身疼痛

當歸酒浸片時搗膏　川芎　熟地黃製如前方　芍藥　羌活　天麻　兎絲子酒製爲末　木瓜各等分

右爲末入地黃當歸二膏加蜜丸梧子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可

開結導引丸　治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

白朮炒　陳皮炒　澤瀉　茯苓　神麯炒　麥蘖炒

半夏薑製各一兩　枳實炒　巴豆霜各一錢五分

青皮　乾薑各五錢

爲末湯浸蒸餅丸如梧子大每服四五丸凡十丸温水下此内傷飲食脾胃營運之氣有虧不能上升則注爲脚氣故用此導引行水化脾氣也

導滯通經湯　治脾經濕熱壅遏不通面目手足作痛即五苓散内減諸苓宫桂加木香陳皮每服三錢滚湯下

猪

五苓散　治下部濕熱瘡毒或浮腫小便赤少

澤瀉　肉桂去粗皮　白术

猪苓　赤茯苓去皮各等分

爲細末每服一錢熱湯調服不拘時

托裏散方見腫瘍門

外科發揮卷之四

薛氏醫按
吳郡薛　巳著
新都吳玄有校

△脫疽謂丁生於足指或足潰而自脫改名脫疽亦有發於手指者名曰蛀節丁重者腐去本節連者筋攣

焮痛者除濕攻毒更以隔蒜灸至不痛

焮痛或不痛者隔蒜灸之更用解毒藥若色黑急割去速服補劑庶可救黑延上亦不治

色赤焮痛者托裏消毒更兼灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

一男子足指患之焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又十宣散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而痊

一男子足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘壯尚不知痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏藥潰脫而愈

一男子足指患之大痛色赤而腫令隔蒜灸至痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊此證形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒此證因膏粱厚味酒麵炙煿積毒所致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥致有先渴而後患者有先患而後渴者皆腎水涸不能制火故也初發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失辨其毒以致肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足必死此患不問腫潰惟隔蒜灸有効亦有色赤作痛而自潰者元氣未脫易治夫至陰之下血氣難到毒易腐肉藥力又不易達況所用皆攻痛之藥未免先于腸胃又不能攻敵其毒不若隔蒜灸并割去最爲良法故孫真人云在指則截在內則割即此意也

一男子脚背患此赤腫作痛令隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而潰更以托裏消毒藥而愈

一男子足指患之色黑焮痛作渴隔蒜灸數壯服仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸滑脫而愈

一男子足指患之色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救○一男子脚背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脉大而濇此精氣已絕不治後果然

附方

人參敗毒散 方見潰瘍發熱門

隔蒜灸法

仙方活命飲 二方見發背門

加減八味丸 方見作渴門

十宣散 方見腫瘍門

▲肺癰肺痿

喘嗽氣急胸滿者表散之

咳嗽發熱者和解之

咳而胸膈隱痛唾痰腥臭者宜排膿

喘急恍惚痰盛者宜平肺

人參敗毒散 方見潰瘍發熱門

隔蒜灸法

仙方活命飲 二方見發背門

加減八味丸 方見作渴門

十宣散 方見腫瘍門

▲肺癰肺痿

喘嗽氣急胸滿者表散之

咳嗽發熱者和解之

咳而胸膈隱痛唾痰腥臭者宜排膿

喘急恍惚痰盛者宜平肺

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』　請求記号 WA35-90
ガラス使用

唾膿脉短濇者宜補之

一男子喘咳脉緊數以小龍龍湯一劑表證已解更以葶藶大棗湯喘止乃以桔梗湯而愈

一男子咳嗽氣急胸膈脹滿睡卧不安以葶藶散二服少愈更以桔梗湯而瘥

一男子咳嗽項强氣促脉浮而緊以參蘇飲二劑少愈更以桔梗湯四劑而瘥

一男子咳嗽兩脇脹滿咽乾口燥咳唾腥臭以桔梗湯四劑而唾膿以挑膿散數服而止乃以補陰托裏之劑而瘥

一男子咳而膿不止脉不退諸藥不應甚危用栢黄丸一服少愈再服頓退數服而瘥

一婦人唾膿五心煩熱口乾胸悶以四順散三劑少止以挑膿散數服而安

一男子因勞咳嗽不止項强而痛脉微緊而數此肺癰也尚未成膿予欲用托裏益氣藥彼不信仍服發散藥以致血氣愈虛吐膿不止竟至不救經云肺内主氣外司皮毛若肺氣虛則腠理不密皮毛不澤肺受傷則皮毛錯縱故患肺癰痿腸癰者必致皮毛如此以其氣不能榮養而然也亦有服表藥見邪不

解仍又發表殊不知邪不解者非邪不能解多因腠理不密而邪復入也專用發表則腠理愈虛邪愈易入反爲敗症矣宜診其脉邪在表者止當和解而實腠理乘虛復入者亦當和解兼實腠理故用托裏益氣之藥若小便赤澀爲肺熱所傳短少爲肺氣虛蓋肺爲母腎爲子母虛不能生子故也亦有小便頻數者亦爲肺虛不能約制耳

一男子面白神勞咳而胸膈隱痛其脉滑數予以爲肺癰欲用桔梗湯不信仍服表藥致咳嗽愈甚唾痰腥臭始悟及服前湯四劑咳嗽少定又以四順散四劑而脉靜更以托裏藥數劑而愈大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏蘊結不散必致喘嗽若誤汗下過度則津液重亡遂成斯證若寸脉數而虛者爲肺痿數而實者爲肺疽脉微緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也嗽膿自止脉短而面白者易治膿不止脉洪大而面色赤者不治使其治早可救膿成則無及矣金匱方論熱在上焦者因咳爲肺痿得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又彼下藥快利重亡津液故寸口脉數其人燥欬胸中隱隱時痛脉反滑數此爲肺癰咳唾膿

血脉數虛者爲肺痿數實者爲肺癰

一童子氣禀不足患肺癰唾膿腥臭皮毛枯槁脉浮按之濇更無力用鍾乳粉湯治之○一男子患之形證皆同惟咽喉時或作痒痰多脇痛難於睡卧用紫菀茸湯治之並愈

一弱人咳膿日晡發熱夜間盜汗脉浮數而緊用人參五味子湯數劑頓退以紫菀茸湯月餘而痊

一男子腎氣素弱咳唾痰涎小便赤色服腎氣丸而愈

一僕年踰三十嗽久不愈氣壅不利睡卧不寧咯吐膿血甚虛可畏其主已棄矣予以寧肺散一服少食又服而止太半乃以寧肺湯數劑而痊所謂有是病必用是藥若泥前散性澀而不用何以得愈

一男子患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脉洪數用人參平肺散六劑及飲童子小便諸證悉退更以紫菀茸湯而愈童便雖云專治虛火常治瘡腫殃疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤効

一婦人患肺痿咳嗽吐痰腥臭日晡發熱脉數无力用地骨皮散治之熱止更用人參養肺湯月餘而安

一男子咳嗽喘急發熱煩燥面赤咽痛脉洪大用黄

連解毒湯二劑少退更以梔子湯四劑而安○一癧婦欬而无痰咽痛日晡發熱脉浮數先以甘桔湯少愈後以地骨皮散而熱退更以腎氣丸及八珍湯加柴胡地骨皮牡丹皮而愈丹溪云欬而无痰者此係火鬱之證及痰鬱火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑不已則成勞嗽此證不得志者多有之又原病式曰人瘦者腠理疎通而多汗血液衰少而爲燥故爲勞嗽之疾也

一男子年前病肺癰後又患咳嗽頭眩唾沫飲食少思小便頻數服解散化痰藥不應診之脾肺二脉虛甚弱謂眩運唾涎屬脾氣不能上升小便無度乃脉氣不得下制尚未成癰耳投以加味理中湯四劑諸證已退太半更用鍾乳粉湯而安河間曰金匱云肺痿屬熱如咳又肺癰聲啞聲嘶咯血此屬陰虛熱甚然也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾用灸甘草乾薑此屬寒也肺痿涎唾多心中溫液溫液者用灸甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治故肺痿又有寒熱之異也

附方

青龍湯　治肺經受寒咳嗽喘急

半夏湯炮七次二兩半　乾薑炮　細辛

麻黃去節　肉桂　芍藥

甘草炙各三兩　五味子二兩搗炒

每服五錢水一鍾薑三片煎七分食後服

葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰胸脹滿上氣喘急或

身面浮腫鼻塞聲重

葶藶炒令黃色研末每服三錢用水二鍾棗十

枚煎一鍾去棗入藥煎七分食後服

升麻湯　治肺癰胸乳間皆痛口吐膿腥臭

川升麻　苦梗炒　薏苡仁

地榆　黃芩炒　赤芍藥炒

牡丹皮去心　生甘草各一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

參蘇飲　治感冒風邪咳嗽涕唾稠粘或發熱頭痛

或頭目不清胸膈不利

木香　蘇葉　葛根薑製

前胡　半夏湯炮七次　人參

茯苓各七分　枳殼麩炒　桔梗炒

甘草炙　陳皮去白各五分

作一劑水二鍾薑一片煎八分食遠服加葱一莖

桔梗湯　治欬而胸膈隱痛兩胠腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭

桔梗炒　貝母去心　當歸酒浸
瓜蔞仁　枳殼麩炒　薏苡仁微炒
桑白皮炒　甘草節　防己去皮各一錢
黃芪鹽水拌炒　百合蒸各一錢半　五味子搗炒
甜葶藶炒　地骨皮　知母炒
杏仁各五分

作一劑水一鍾半生薑三片煎七分不拘時溫服

咳加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許小便澀甚加木通車前子煩燥加白茅根咳而痛甚加人參白芷

排膿散　治肺癰吐膿後宜服此挑膿補肺

嫩黃芪鹽水拌炒　白芷　五味子研炒
人參各等分

爲細末每服三錢食後蜜湯調下

四順散　治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心　紫菀去苗　桔梗炒各一錢半
甘草七分

作一劑水二鍾煎八分食遠服如咳嗽加杏仁亦可爲末白湯調服

如聖栢黃丸　治肺癰欬而腥臭或唾膿瘀不問膿成否並効肺家雖有方惟此方功効甚捷不可忽之

栢黃一兩爲末　百齒霜即梳垢二錢

用糊爲丸如梧子大每服三五丸米飲下栢黃乃栢樹所生者其色黃狀靈芝江南最多北方鮮有

葶藶散　治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不卧及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶　桔梗炒　瓜蔞仁

川升麻　薏苡仁　桑白皮炙

葛根各一錢　甘草炙五分

作一劑水一鍾半生薑三片煎八分食後服

鍾乳粉散　治肺氣虛久嗽皮毛枯槁唾血腥臭或喘之不已

鍾乳粉煅煉熟　桑白皮蜜炙　紫蘇

麥門冬去心各五分

作一劑水一鍾薑三片棗一枚煎六分食後服

紫苑葶湯　治飲食過度或煎煿傷肺咳嗽咽乾吐

痰唾血喘急脇痛不得安卧

紫菀茸去苗一錢　犀角鎊末　甘草炙

人參各五分　桑葉用經霜白　款冬花

百合蒸焙　杏仁去皮尖　阿膠蛤粉炒

貝母去心　半夏泡製　蒲黄炒各一錢

作一劑水一鍾半生薑三片煎八分入犀角末食後服

人參五味子湯　治氣血勞傷欬膿或咯血寒熱往來夜出盜汗羸瘦困乏一切虚損之證並治

人參　五味子搗炒　前胡　桔梗炒　白朮炒　白茯苓去皮

陳皮去白　甘草炙　熟地黄生者酒拌蒸半日

當歸酒拌炒各一錢　地骨皮　黄芪炙

桑白皮炒　枳殼去穰炒　柴胡各七分

作一劑水一鍾半生薑三片煎八分食後服

寧肺散一名寧神散　治久嗽漸咯膿血胸膈不利咳嗽痰盛坐卧不安語言不出

烏梅八錢　罌粟殼一斤去筋蜜炙

爲末每服二錢前烏梅湯調下不拘時　煎

寧肺湯　治榮衛俱虚發熱自汗或喘急咳嗽嚥膿

參人上　當歸　白朮炒
川芎　熟地黃製如前　白芍藥
五味子搗炒　麥門冬去心　桑白皮炒
白茯苓　阿膠蛤粉炒　甘草炙各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓　黃芩炒各二錢　甘草炙
知母炒　五味子搗炒　人參
桔梗　薄荷　半夏薑製
柴胡　白朮　麥門冬去心

款冬花各三錢　川芎　阿膠蛤粉炒各二錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾食後服

人參平肺散　治心火剋肺傳爲肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參　陳皮去白　甘草炙
地骨皮各五分　茯苓　知母炒各七分
五味子搗炒　青皮　天門冬去心各四分
桑白皮炒一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服

人參養肺湯　治肺痿咳嗽有痰午後熱并颯聲者

人參　五味子 搗炒　貝母 去心
柴胡 各四分　桔梗 炒　茯苓 各一錢五分
甘草 五分　桑白皮 二錢　枳實 麩炒一錢五分
杏仁 炒　阿膠 蛤粉炒各一錢
作一劑水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食後服

梔子仁湯　治肺痿發熱潮熱或發狂煩燥面赤咽痛

梔子仁　赤芍藥　大青葉
知母 炒各七分　黃芩 炒　石膏 煅
杏仁 去皮尖炒　升麻 各一錢半　柴胡 二錢
甘草 一錢　豆豉 百粒
作一劑水二鍾煎八分食遠服

黃連解毒湯 方見瘡瘍作嘔門

甘桔湯　治肺氣壅熱胸膈不利咽喉腫痛痰涎壅盛

甘草　苦梗 各五錢
作一劑水一鍾半煎八分食遠服

地骨皮散　治骨蒸潮熱自汗咳吐腥穢稠痰

人參　地骨皮　柴胡
黃芪　生地黃 各一錢半　白茯苓

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』　請求記号 WA35-90
ガラス使用

知母炒　石膏煆各一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

腎氣丸　治腎氣素虛不交于心津液不降敗濁爲

痰致欬逆

乾山藥四兩　山茱萸去核四兩酒拌　澤瀉蒸

牡丹皮白者佳　白茯苓各三兩　熟地黃用生者八兩酒

拌銅器蒸半日砂器亦可搗膏

餘爲末地黃茱萸杵膏加蜜丸如梧子大每服五

六十丸空心滚湯送下搨湯温酒皆可

八珍湯方見潰瘍發熱門

加味理中湯　治肺胃俱寒發熱不已

甘草炙　半夏薑製　茯苓

乾薑炮　白术炒　橘紅

細辛　五味子搗炒　人參各五分

作一劑水一鍾煎六分食遠服

腸癰

小腹硬痛脉遲緊者瘀血也宜下之

小腹燠痛脉洪數者膿成也宜托之

一男子小腹痛而堅硬小便數汗時出脉遲緊以大

黃湯一劑下瘀血合許以薏苡仁湯四劑而安

一產婦小腹疼痛小便不利以薏苡仁湯二劑痛止更以四物湯加桃仁紅花下瘀血升許而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脉洪數已有膿脉但數微有膿脉遲緊乃瘀血下之即愈若患甚者腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜宜以丸太乙膏及托裡藥

一婦人小腹腫痛小便如淋尺脉芤而遲以神効瓜蔞散二劑少愈更以薏苡仁湯二劑而痊

一男子膿已成用雲母膏一服下膿升許更以排膿托裡藥而愈後因不守禁忌以致不救

一男子裏急後重時或下膿脹痛脉滑數以排濃散乃蠟礬丸而愈

一婦人小腹作痛有塊脉芤而濇以四物湯加玄胡索紅花桃仁牛膝木香治之而愈

一婦人小腹隱痛大便秘澀腹脹轉側作水聲脉洪數以梅仁湯一劑諸證悉退以薏苡仁湯二劑而痊

一婦人腹脹　縱小便不利脉滑數以太乙膏一服膿下升許脹痛頓退以神効瓜蔞散二劑而全退更以蠟礬丸及托裏藥十餘劑而安

一婦人因經水多服澀藥止之致腹作痛以失笑散

二服而瘥

一婦人產後惡露不盡小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化爲膿最難治療若流注骨節則患骨疽失治多爲敗證

附方

大黃湯　治腸癰小腹堅腫如掌而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出增寒其脉遲緊者未成膿宜服之

朴硝　大黃炒各一錢　牡丹皮　瓜蔞仁研　桃仁去皮尖各三錢

作一劑水二鍾煎八分食前或空心溫服

牡丹皮散　治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮　人參　天麻　白茯苓　黃芪炒　薏苡仁　桃仁去皮尖　白芷　當歸酒拌　川芎各一錢　官桂　甘草炙各五分　木香三分

作一劑水二鍾煎八分食遠服

梅仁湯　治腸癰隱痛大便秘澀

梅核仁九箇去皮尖　大黃炒　牡丹皮

芒硝各一錢　犀角鎊末一錢　冬瓜仁研二錢

作一劑水二鍾煎八分入犀角末空心服

神効瓜蔞散方見乳癰門

薏苡仁湯　治腸癰腹中疞痛或脹滿不食小便澀婦人產後多有此病縱非癰服之尤効

薏苡仁　瓜蔞仁各三錢　牡丹皮　桃仁去皮尖各二錢

作一劑水二鍾煎八分空心服

雲母膏　治一切瘡疽及腸癰方見丹溪纂要

神仙太乙膏　治癰疽及一切瘡毒不問年月深淺已未成膿並治之如發背先之溫水洗淨軟帛拭乾用緋帛攤貼即用冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹置口中含化下一切風赤眼揑作小餅貼太陽穴以山梔子湯下打撲傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者患處貼之搨湯下唾血者桑白皮湯下以蛤粉為衣其膏可收十餘年不壞愈久愈烈

又治瘰癧並用塩湯洗貼酒下一丸婦人經脉不通耳草湯下一切疥別煉油少許和膏塗之虎犬并蛇蝎湯火刀斧傷皆可內服外貼

玄參　白芷　當歸
肉桂　大黃　赤芍藥
生地黃各一兩

爲咀用麻油二斤入銅鍋内煎至黑濾去柤入黃丹十二兩再煎滴水中捻軟硬得中即成膏矣予常用但治瘡毒　内癰有奇効忽一婦月經不行腹結塊作痛貼之經行痛止遂隨前云治證用之無不有効愈知此方之妙也

蠟礬丸 方見發背門

失笑散　治産後心腹絞痛欲死或血迷心竅不知人事及尋常腹内瘀血或積血作痛又婦人血氣痛之聖藥也及治疝氣疼痛

五靈脂　蒲黃俱炒等分

每服二三錢醋一合熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

四物湯 方見瘰癧門

排膿散　治腸癰少腹脹痛脉滑數或裏急後重或時時下膿

黃芪炒　當歸酒拌　金銀花
白芷　川山甲蛤粉拌炒　防風

連翹　瓜蔞各二錢

作一劑用水二鍾煎八分食前服或爲末每服二錢食後蜜湯調下亦可

瓜子仁湯　治産後惡露不盡或經後瘀血作痛或腸胃停滯痰血作痛或作癰患並効

薏苡仁四錢　桃仁去皮尖研　牡丹皮　瓜蔞仁各一錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

外科發揮卷之四

国立国会図書館　タイトル『立齋外科發揮8巻』　請求記号 WA35-90

ガラス使用