


工/2P93

長谷川泰纂譯

內科要略 卷四

行餘堂藏梓

33
84



內科要略卷四目次

消化器病

第一編 口腔病

第一	口腔加苔兒	一丁
第二	潰瘍性口腔加苔兒	九丁
第三	亞布苔	十五丁
第四	ツール(鵝口瘡)	十八丁
第五	舌炎	廿八丁
第六	水痘(頰壞疽)	卅三丁
第七	耳下腺炎	卅七丁
第八	流涎	四十六丁
第二編	咽頭之疾	
第一	加苔兒性頭炎	五十一丁

第二	咽頭格魯弗	六十一丁
第三	扁桃腺實質炎(蜂窠織炎性咽頭炎)	六十四丁
第四	口腔及咽頭之梅毒	七十二丁
第五	咽頭後壁膿瘡	七十八丁
第六	頸部蜂窠織炎(ルードウエヒ氏咽頭炎)	七十九丁
第三編 食道病		
第一	食道炎	八十一丁
第二	食道狹窄	八十五丁
第三	食道變廣及食道蹇	九十二丁
第四	食道新生物	九十七丁
第五	食道穿開及破裂	百一丁
第六	食道及咽頭之神經病	百四丁
第四編	胃病腸管病及腹膜病之症候論	

第一	理學診法	百十丁
第二	腸胃病ニ發スル最要ノ症候及ヒ其療法	
一	不消化	百三十七丁
附錄 病的食氣變常		
一	食氣減却	百四十五丁
二	病的食氣增盛	百四十八丁
三	性質的食氣變換	百五十丁
二	胃痛	百五十三丁
三	嘔吐	百六十丁
四	吐血	百八十六丁
五	下血	二百丁
六	疝痛	二百十七丁
七	便秘	二百廿七丁

八	下利	二百四十四丁
九	鼓腸	二百五十一丁
第五編 胃病		
第一	急性胃加苔兒	二百五十八丁
第二	慢性胃加苔兒	二百九十四丁
第三	蜂巢織性胃炎	三百二十九丁
第四	中毒性胃炎	三百三十丁
第五	慢性胃潰瘍(圓形胃潰瘍)	三百三十八丁
第六	胃癌	三百六十九丁
第六篇 腸病		
第一	腸炎腸加苔兒盲腸炎 蟲樣垂炎直腸炎	三百九十三丁
第二	圓形即十穿開性十二指腸潰瘍	四百三十丁
第三	腸管狹窄及其閉塞吐糞病	四百三十五丁

第四	腸管及腸間膜腺之腺病及結核	四百六十四丁
第五	腸癌	四百七十五丁
第六	盲腸及直腸周圍之結締織炎	四百八十二丁
第七	痔	四百八十七丁
第八	腸ノ寄生蟲	五百四丁
第七篇 腹膜諸病		
第一	腹膜炎	五百三十九丁
第二	腹水	五百七十九丁
第三	腹膜結核及腹膜癌	五百九十九丁

內科要略卷四目次終

內科要略卷四

長谷川 泰 譯纂

消化器病

第一編 口腔病

一 口腔加苔兒 *Stomatitis Catarrhalis.*

口腔加苔兒トハ口腔粘膜腫脹シテ赤色ヲ帶ヒ之ニ觸ルレハ楚痛シ其分泌増盛スル者ヲ云フ其經過ニ從ヒ急慢二性ニ區別シ其炎性ニ隨ヒ特發性及ヒ繼發性ニ區別ス又潰瘍ノ存否ハ辨別上ニ緊要ニシテ毫モ潰瘍ヲ挾マサル者ヲ口腔加苔兒ト名ケ潰瘍ヲ發スル者ヲ潰瘍性口腔炎ト名ク

原因特發性口腔加苔兒ノ原因ニ屬スル者ハ器械的刺戟物及ヒ化學的刺戟物ナリ例之乳兒ニ於ル齒牙發生齒石尖端及ヒ

隅角ノ銳利ナル齶齒過熱及ヒ過冷ナル食物辛辣料ノ過喫吸烟有機酸及ヒ鑛酸ノ過用酸味ヲ帶フル硬菓物ノ過食沃土貌魯謨汞劑加里那篤倫巴豆油及ヒ芫菁ノ多服格魯兒燐及ヒ硫酸ヲ孕ム腐敗空氣ノ吸入是レナリ其他荏苒タル口腔粘膜ノ充血例之連綿タル吸乳談話號泣等ヨリ起ル口腔粘膜ノ充血モ亦器械的原因ニ算ス可シ以上ノ直達障害ノ外足脚ノ胃寒衣服ノ透濕戸隙ノ風ヨリ口腔加苔兒ヲ起ス可キハ疑ヲ入レサル処ナリ以上論スル者ハ特發性口腔炎ノ原因ナリ其他繼發性口腔炎ノ原因ニ屬ス可キ者枚舉ニ違アラス例之口腔鼻腔及ヒ咽喉ノ潰瘍ハ其良性ナルト惡性ナルト特徴ヲ有スルト否ラサルトナ問ハス潰瘍ヲ起サル粘膜部ニ加苔兒性腫脹及ヒ赤色ヲ起ス者ナリ

渾テ急性傳染病ハ口腔ノ充血ヲ發ス痘瘡ハ廣汎ナル口腔潰瘍ヲ起ス麻疹ハ口腔咽頭及ヒ喉頭ノ後部ヲ侵シ顔面羅斯ニ於テ全口腔著ルシク赤色ヲ顯ハス酒客ニ於テハ口腔及ヒ咽喉ニ慢性加苔兒ヲ必發シ且ツ其病性頑固ナリ病体解剖及症候赤色及ヒ腫脹ハ汎發口腔加苔兒ニ於ルモ平等ニ發セス次粘膜組織ノ性質ノ殊ナルニ從ヒ相異ナルモノニシテ次粘膜組織ノ寬鬆ナル處ニハ其腫脹及ヒ赤色モ亦自ラ速カニ發ス硬口蓋ノ粘膜ハ變化ヲ起スコ少ナク頰部及ヒ軟口蓋ノ粘膜ハ著ルシク炎症ヲ呈ハス懸壺垂ハ著ルシク延長シ絶ヒス舌根ニ觸レ惡心及ヒ輕咳ヲ發シ且ツ其遊離端多クハ腫脹シテ圓大シ縱溝ニ由リテ破裂シ其粘膜著ルシク澄明ニシテ玻璃狀ヲナス又腫脹スル舌粘

膜上ニ齒牙ノ壓痕ヲ生シ且ツ頰ニ白色ノ隆起長線ヲ呈ハシ
 餘テ一二ノ橫線ヲ生ス此線ノ白色ハ上皮ノ甚シク増殖スル
 ニ由ルモノナリ
 其赤色ハ常ニ蔓延性ニシテ髮細管のナリ慢性加苔兒ニ於テハ
 大ナル血管モ亦膨脹ス且ツ粘液腺腫脹シテ粟粒大ノ小結節
 ナリ殊ニ軟口蓋ニ著ル
 病初ニハ粘膜炎乾燥シ是レ一時腺ノ排泄管壓迫セラルハニ由
 ル後ニハ粘液及ヒ唾液甚シク分泌シ是レ腺質ニ炎症刺激波
 及スルニ由ル且ツ粘液ノ化學及ヒ形狀的抱合變換シ舌軟口
 蓋及ヒ齒齦上ニ細胞及ヒ核ニ富ム處ノ粘膠ナル厚苔ヲ生ス
 蓋シ熱性諸患者ニ於テ殊ニ朝間齒齦ヨリ拭去セシメ且ツ單
 ニ脂化スル上皮崩壞物多量ノミヨロコッケシ及ヒバクテリ
 ノヨリ成ル者ハ此粘液苔ト自ラ相區別セサルヲ得ス此熱病

患者ニ見ル舌苔ハ体温亢進ノ爲メニ上皮ノ新生機及ヒ蒸發
 機ノ變調スルヨリ生スル者ニシテ蓋シ熱病患者ニ於テハ食
 氣缺亡シ殊ニ硬固乾性ノ食物ヲ喫ヒサルヲ以テ齒齦摩擦ヲ
 受ケサルカ故ニ此柔脆ナル苔ヲ生スルモノナリ
 舌粘膜炎モ亦均シク加苔兒ヲ起シ若クハ其加苔兒更ニ劇甚ナ
 ルヲ以テ味覺變狀ヲ起ス所謂糊味ハ味覺ニハ非スシテ一種
 ノ觸覺ナリ之ニ反シ何レノ物ヲ喫スルモ淡泊無味ナルハ舌
 苔ノ厚キニ關スルモノニシテ強烈ナル辛辣味ヲ嗜ム所以モ亦
 之ニアリ此味覺減却ノ外尙他ノ味覺障礙ヲ起シ茶咖啡及ヒ
 葡萄酒ノ味ハ嫌忌ス可キ香竄物ノ如ク新鮮ノ肉ヲ食フモ腐
 肉ノ味ヲナス
 口内苦味ヲ覺フルアルヲ以テ唾液ヲ試驗スルモ膽汁ヲ含
 ムトナシ其他腐敗ノ味ハ味覺ノ變調ニ由ラスシテ粘膜炎ノ厚

苔速カニ腐敗シ以テ惡臭ヲ放ツニ由ルコアリ是レ殊ニ朝間
 ニ見ル處ナリ
 患者初メニハ口腔ノ乾燥次テ粘膠ナル分泌物ノ増盛咀嚼ノ
 際ニ於ル疼痛及ヒ嚥下ノ困難ヲ訴ヒ熱性ノ飲液及ヒ熱性ノ
 含嗽劑ハ疼痛ヲ起シ寒冷ナル者ハ之ヲ輕快ス
 大人ノ特發性口腔加苔兒ニ於テハ全身症候極メテ輕微ナレ
 乳兒ニ於テハ之ニ反シ諸般ノ反射作用ヲ起ス若シ繼發性
 即チ腸胃症若クハ熱病ノ一症候ナル時ニハ其全身症候ハ固
 ヲリ其原因タル疾患ニ關ス又近接セル頸腺ノ腫脹ハ單純口
 腔加苔兒ニハ見サル處ニシテ常ニ口腔粘膜炎潰瘍ヲ存スル微ナ
 リ
經過及預後其原因ニ從ヒ經過頗ル相異ナリ特發性口腔炎
 ニ於テハ其原因ヲ除却スレハ自ラ治癒ニ趣ク諸般ノ潰瘍ニ

續發スル繼發性口腔加苔兒ハ其原因タル疾患ノ病性ニ從テ
 其經過及ヒ預後モ亦自ラ相異ナル者ニシテ單純梅毒性粘膜炎
 燕ヨリ來ル口腔加苔兒ハ粘膜炎深ク崩壞スル者ヨリモ預後
 佳良ナリ顔面羅斯ヨリ來ル口腔炎ハ劇性ノ胸室扶斯ニ發ス
 ル者ニ比スレハ其經過短シ酒客ノ慢性口腔加苔兒及ヒ咽腔
 加苔兒ハ不治ノ一症ナリ是レ常習ノ亞兒齒兒ヲ禁シ能ハサ
 ルヲ以テナリ
療法原因療法ヲ行ヒハ他策ヲ施サ、ルモ充分治癒ス可キモ
 シ多シ齒牙發生困難ニ於テ齒齦ヲ切開スルノ法ハ稱譽シ難
 シ其創傷時トシテ炎症ヲ發シ潰瘍ニ陥リ以テ加苔兒ヲ險惡
 セシムルモノナリ銳利ナル齒縁及ヒ齒石ハ注意シ之ヲ除却
 シ口腔ノ潰瘍及ヒ齒癭ハ之カ所置チナシ吸烟ノ爲メニ困苦
 ノ口腔加苔兒ヲ起ス者ハ之ヲ禁シ汞劑ノ爲メニ起ル口腔加

苔兒ハ潰瘍性口腔加答兒ノ條ニ論スル療法ヲ行フ可シ又繼發性口腔加答兒ハ羅斯咽頭炎胃加答兒ヲ治癒スレハ多クハ消散ス又傳染病ヨリ起ル口腔加答兒ハ宜シク其原因タル本患ヲ療ス可シ

病的療法トシテ局處療法ヲ行フ可シ然レモ急性口腔加答兒ハ此直達療法ヲ要セス蓋シ急性口腔加答兒ニ於テハ口腔ヲ清潔シ刺戟性ノ食物及ヒ飲料ヲ禁忌シ牛乳及ヒ粘液ノ如キ粘滑物ヲ以テ含嗽シ若クハ冷水ヲ以テ反復含嗽セシムルノ外他策ヲ要スルコトナシ頑固ナル慢性加答兒其誘因ヲ除クモ尙ホ依然タル時ニハ有力ノ局處藥ヲ投ス可シ乃チ炭酸曹達水ヲ以テ含嗽セシム(炭酸曹達水ノ効アル所以ハ粘液ノ粘膠ヲ減却シテ流動セシムルニアリ)若シ効ナキ時ニ昇汞水昇汞〇〇三乃至〇〇六蒸餾水一五〇〇若シハ硝酸銀水〇〇五蒸

餾水一五〇〇(水筆ニ蘸シテ塗擦ス可シ然レモ局處藥中殊ニ効ヲ奏スルハ格魯兒酸加里五〇乃至一〇〇水二〇〇)ノ含嗽水ナリ

潰瘍性口腔加答兒 Stomatitis ulcerosa, stom.

原因 此一種特異ナル炎症ノ病徵ハ發炎組織腐死シテ崩壞セリトスル傾キ著ク且ツ殊ニ齒齦線ニ起リ齒牙ノ未ク發生セザル嬰兒及ヒ老蓋ニハ之ヲ見ス齒牙既ニ發生スル者ニ於テモ眞齒ニ生スル齒齦ニ起ル者トス

潰瘍性口腔炎ハ小兒就中五歳乃至十歳ノ者加之不幸ノ生活ヲナス決人ニ一定ノ原因ナク起ルコト間々之レアリ蓋シ天行性ニ傳播シ殊ニ棄兒院孤兒院兵營等ニ在リテ傳染ニ由リテ蔓延スルモノヲ本來口腔腐敗ト名ツク然レモ汎稱スレザル

劑誤用、燐中毒、壞血病及ヒ密尿病ヨリ起ル者モ亦其中ニ算入
ス
症候及經過 汞劑ヨリ來ル潰瘍性口腔加答兒ノ輕性ナル
者ニ於テハ口腔ノ一定部(初メニハ齒齦緣後ニハ舌ノ側緣、齒
壓ヲ受クル頰部及ヒ唇部ニ於テ)ニ於テ黯赤色ヲ帶フル粘膜
上ニ白色ニシテ稍々汚色ヲ帶フル斑點ヲ生ス而シテ此白色ノ斑
點ハ粘膜上層ノ浸潤ヨリ來ルヲ以テ之ヲ拂拭シ去ルヲ能ハ
ズ既ニ二三日ヲ經レハ肥厚セル粘膜組織離脱シ其部ニ扁平
若クハ深凹ナル潰瘍ヲ生シ其形狀不規ニ汚色ヲ帶ヒ邊緣
ヨリ自ラ清刷シ終リニ癍痕ヲ結フ劇性ノ者ニ於テハ粘膜ノ
全厚ニ浸出物浸潤シテ崩壞ヲ起シ口内ノ大面變シテ白汚色
ノ痂皮トナリ其痂皮離脱スルノ後齒牙動搖シテ脱落シ加之
顎骨ノ一部剝露シテ腐死狀ニ陥リ潰瘍全ク清刷スルノ後肉

芽ヲ以テ失肉ヲ被フノ機寛餘ナリ且ツ崩壞スル粘膜再生セ
ス單ニ癍痕狀ヲ結締織ニ由リテ補償セラルルガ故ニ網狀ノ
癍痕加之癒着及ヒ假性アノキロシスヲ遺ス
汞毒ヨリ來ル潰瘍性口腔加答兒ニ於テハ痂皮離脱シ潰瘍ヲ
遺ス時ニハ殊ニ劇痛ヲ起シ咀嚼スレハ其疼痛増劇シ談話ス
ルモ尙ホ其痛楚ニ堪ヘ難シ汞性口腔加答兒ニ於テハ粘液腺
及ヒ唾腺ノ分泌増劇シ爲メニ患者眠ルヲ能ハス是レ絶ヒス
唾スルニ非ザレハ喉頭内ニ分泌物流入シテ咳嗽若クハ窒息
發作ヲ起ス患者若シ橫臥シ眼ニ就ケハ口腔ヨリ粘液ノ流出
スルト唾液ノ透濕スル枕子ノ濕潤スルトニ由リテ打起セラ
ル痂皮若クハ潰瘍ヲ生セサル粘膜部ニハ甚シキ赤色ト腫脹
トヲ起シ且ツ著ルシク腫脹スル舌ハ尙ホ齒齦緣ノ如ク非常
ニ厚キ黃色ノ汚苔ヲ生ス此汞毒病ノ將サニ起ラントスルハ

口内ニ一種ノ鑛味ヲ覺フ此下口内乾燥スル感覺ト咀嚼ノ際ニ起ル疼痛ト一種不快ナル惡臭ト齒牙ノ鈍ニ浮上スル感覺ト由リテ之ヲ徵知ス可シ是レ局處症候ノ變化尙ホ僅少ナルモ承劑ノ後服ヲ止ル可キ症候トス何トナレハ承劑ノ後服ヲ止ムルモ口腔加答兒尙ホ依然トシテ増盛シ加答兒輕性ナルモ此困難ナル症候緩解スルニ尙ホ八日間乃至十四日間ヲ要スレバナリ劇性入者ニ於テ其治癒スル更ニ寛慢ニ加之上ニ論スル如ク持久ノ障害ヲ起スルハ其治癒ニ於テ劇性ノ充血ニ由リテ齒齦黯赤色ヲ起シ甚シク腫脹ス齒齦ノ狀恰モ齒牙ト離ルカ如ク輕々之ヲ壓迫スルモ出血ス此時期ニ日乃至四日間持續スルノ後齒齦ノ上縁ニ灰白ナル膜狀ノ苔ヲ生ス仔細ニ之ヲ檢査スルハ此苔ハ粘膜ヲ被シ非ズシ

テ腐死スル齒齦組織ニ成リ其離脱スルニ後齒齦失肉ニ病機持續スルノ間齒齦ノ表面及ヒ周圍ニ反復失肉ヲ起シ劇性ノ者ニ於テハ齒齦以周圍全ク脱落シ齒牙剝露シテ寬鬆軟若クテ脱落ス且以近隣ノ水脈腺腫大シテ頗ル疼痛ヲ患部ニ對スル頰及ヒ唇浮腫シ口内ニ敗肉臭ヲ放チ口内ニ絶トス血様汚色ノ唾液流出シ咀嚼加之飲下スル毎ニ劇痛ヲ起ス口ヲ閉鎖セズ特リ唇ノミチクテ顎ヲ哆開シ以テ摩擦ヲ避ク全身ノ景況及ヒ食氣ニ空障碍ヲ起スニ甚ク少ク發熱輕微或ハ全ク發熱モズ且以口腔腐敗ニ於テ齒齦ノ崩壞ハ尙ホ淺出物ノ浸潤ノ如ク其前側ニ始リ劇性ノ者ニ於テハ齒齦ノ後側頰部唇及ヒ舌ハ崩壞ヲ起ス間々骨膜ニ炎症及ヒ崩壞波及シ以テ顎骨ノ腐死ヲ來ス其治療肯緊ニ當レハ本抵ニ三周ヲシテ僥倖ニ經過ヲ取リ腐死崩皮離脱シ其崩皮下ノ潰

瘍は肉芽ヲ生シ日ナラスシテ治癒ニ趣ク其治療ヲ怠リ或ハ治療其當ヲ得サレハ數月間持續スルヲアレハ死亡ヲ來スハ稀レニシテ蓋シ死亡ニ轉歸スルハ常ニ合併症ニ由ルモノナリ

療法 日々齒牙及ヒ口腔ヲ反復清潔ニシテ汚物ヲ去リ適宜ニ身体ヲ温保シ室内ノ空氣ヲ交換スレム特リ汞毒ヨリ來ル潰瘍性口腔炎ヲミナラス他ノ潰瘍性口腔炎ヲ防禦スルノ効アリ

此疾ヲ療スルガ爲メニ從來諸般ノ藥石ヲ用ヒタレハ格魯兒酸加里ノ爲メニ速カニ其聲價ヲ失フタリ格魯兒酸加里ハウエスト氏初メテ之ヲ稱用シ潰瘍性口腔加答兒ニ特效ヲ奏ズ此藥ヲ用フレハ齒齦ノ炎症速カニ減却シ潰瘍治癒ニ趣ク小兒ニハ一日一〇乃至二、五大人ニハ一日二、〇乃至五、〇水劑トシ

テ舍利別ヲ加ヒ且ツ五、〇乃至一、〇ヲ水二〇〇ニ溶解シテ含嗽セシム可シ又水銀塗療法ヲ行フノ際格魯兒酸加里水ヲ以テ含嗽セシメ兼テ二三瓦關膜ヲ内服セシムレハ預防法トシテ偉効ヲ奏ス

三 亞布苔 Stomatitis aphthosa, Aphthen.

原因 口腔粘膜ニ白色若クハ黃色ヲ帶ヒ赤線ヲ有スル斑點二三或ハ無數生シ其斑點日ナラスシテ剝離シ以テ扁平ナル潰瘍ヲ遺シ或ハ然ラズ

亞布苔ハ殊ニ小兒ニ見ル處ノ一患ニ初生ノ第一月ニ於テハ齒牙發生斯ニ比スレハ之ヲ發スルコト少ク榮養不良ナル虛弱兒ハ榮養佳良ナル強健兒ニ比スレハ之レニ罹リ易シ其誘因ニ算ス可キハ齒牙發生ナリ又亞布苔ハ急性發疹病ニ於ル皮膚ノ發疹ニ内疹ニテ發ス或ハ又時トシテ小天行病ト

ナリ乎發致若クハ病院内ニ地方病性ニ發スルヲアレハ其然
ル所以其原因詳カキヲ或ハ又他國口腔病殊ニ潰瘍性口腔
加蓋兒驚口瘡及ヒ腸胃障害ニ合併スルヲアリニ
大人ニ於テハ口腔粘膜ノ器械的若クハ化學的刺戟辛辣料吸
烟齒縁ノ突出等起ルヲアリ又熱發ハ此等ニ伴ヒテ起ル疹
其相伴テ發ス熱時ニハ一種ノ胃寒症ト看做ス可シ又時ト
シテ夫人ニ慢性胃病ニ頑固ナル傍發症ニ起リテ發スルヲア
リ婦人及ビ女子ニ於テハ月經時ニ來ルヲアリ間々其因ニ起
ル所以更ニ辨明シ難キヲアリ
病体解剖亞布苔ハ口腔粘膜ノ諸部ニ生スル者ニシテ或ハ舌
ニ生シ或ハ唇及ヒ頰ノ内面ニ生シ或ハ齒齦ニ生シ或ハ硬口
蓋ニ生ス其形ハ圓形其大ニハ粟粒大乃至扁豆大ニテ多ク
ハ其數少ナリ然レハ陸續發生ス而シテ灰白帶黃色ノ扁圓形

者其周圍ヨリ中心ニ向テ漸々ニ剝脫ス其滲出物全ク剝脫ス
ル時ニハ上皮ノ剝脫スル赤斑若クハ淺凹ナル失肉ヲ遺ス然
レモ多クハ癬痕ヲ生セスシテ速カニ治癒ニ趣ク又口腔ノ他
部ハ加蓋兒ヲ起シ夥シク細胞及ヒ粘液ヲ發生ス
症候亞布苔ノ夥シク發生シテ發熱スルハ實ニ例外ニシテ嬰兒
ニ於ルモ尙ホ然リ故ニ發熱スル者ハ他患ヲ挾ムノ徵ニシテ小
兒ニ於テハ胃加蓋兒若クハ腸加蓋兒ノ存スルノ徵ナリ局處
症トシテ口内ニ感觸過敏若クハ疼痛ヲ發シ之カ爲メニ小兒
ニ於テハ吸乳妨ケラレ大人ニ於テハ咀嚼及ヒ談話困難トナ
ル亞布苔ノ預後ハ佳良ナレモ反復續發スレハ頗ル不快ナル
者ナリ又亞布苔ハ粘膜潰瘍ノ炎症潰瘍ト誤診シ易シ然レモ
潰瘍ノ潰瘍ハ深部ニ波及シテ火山口狀ヲナシ速カニ治癒セ
サルヲ以テ自ラ相異ナリトス又ヘルペスラビアルス疹存

スレハ一見シテ亞布答ト診斷ス可シ
 亞布答ニ於テ格魯酸加里ヲ内外ニ應用シテ効ヲ奏ス可キヤ
 否レハ判決シ難シ何トナレハ此小潰瘍ハ刺戟ノ飲食料及ヒ
 吸烟等ニ由リテ之ヲ傷害スルニ非サレハ醫治ヲ加ヒサルモ
 自ラ治癒ニ趣クテ以テナリ然レモ潰瘍ノ治癒踟躕スル時ニ
 ハ口腔粘膜ノ刺戟ヲ避ケ且ツ勉メテ合嗽セシメ且ツ毛筆ヲ
 以テ稀磷酸鹽酸一分水三分ヲ潰瘍部ニ塗擦シ或ハ硝酸銀棍
 ナ以テ輕々抹擦ス可シ此法ヲ行フニ潰瘍尙ホ新生スル時ニ
 ハ其原因例之局所刺戟腸胃病等ノ有無ヲ探究シ之カ所置テ
 施サ、ルヲ得ル

四 ズール(鵝口瘡) Stomatomyces, Soor.

ズールハ炎症及ヒ潰瘍ニ關スル者ニアラスシテ顯微鏡的徴
 元所謂オイヂウムアルビカノス *Cidium albicans* ノ蕃殖ヨリ來

ル者ニシテ此徴元ハ上皮ト相結合シテ緻密ナル白膜トナリ以
 テ口腔ノ大部ヲ被フ而シテ此徴元ヨリ來ルヲ發明セシハ實ニ
 ストツクホルム府ノベルヒ氏ニシテ其以前ハ之ヲ一種ノ滲出
 性口腔炎ト看做セタリ

原因徴元ノ發生ハ酸性ノ醱酵ニ由リテ促サル、者ニシテ此酸
 性醱酵ヲ起ス傾キハズールニ罹リ易キ乳兒ノ口腔ニ於テ生
 理的ニ存スル者ナリ

口腔ノ分泌物ハ耳下腺、顎下腺、舌下腺及ヒ粘液腺ノ分泌物ノ
 相混スルモノニシテ純粹ノ唾腺分泌物ハ常ニ亞兒加里性ニ反
 應シ食後ニハ其亞兒加里性著クシク空腹ノ時ニハ著ルシカ
 ラス之ニ反シ獸類ニ唾液諸腺ノ排泄管ヲ結紮シテ得ル純粹
 ノ口腔粘液ハ常ニ酸性ニ反應シ空氣ニ觸ルレハ此酸性反應
 著ルシク増盛ス是レ直チニ酸性醱酵ヲ起スカ爲メナリ

唾液ノ分量增多スルカ若クハ粘液ノ分量增多スルニ從ヒ口腔ノ液汁或ハ頗ル唾液ノ性情ヲ有シ或ハ頗ル粘液ノ性質ヲ有スルアリビツテル氏及ヒヒスミツト氏初メテ乳兒ノ唾液ハ澱粉ヲ糖ニ變スルノ性質ナク且ツ腺質ハ澱粉ニ毫モ作用ヲ起スヲナキヲ唱ヒシ以來乳兒ノ唾液ノ性質ニ就テ諸說紛々タリ然レモ近時シツフイル氏及ヒツウワイフェル氏ハ試驗ニ據リ至ク之ニ反スル確手タル成績ヲ得タリ乃チシツフイル氏ハ澱粉糊ヲ盛ル清潔ナル嚢ヲ初生兒ニ尙ホ未ク他ノ榮養物ヲ與ヒサルノ前ニ於テ其口中ニ入レ五密扭篤間抛却シ次テトロンメル氏ノ試驗法ニ由リテ検査セシニ必ス澱粉中ニ糖分ヲ發見シタレモ純粹ナル唾液ハ決シテ此反應ヲ起スヲナカリシト云フ且ツシツフイル氏ノ說ニ據ルニ初生兒ノ唾液ハ澱粉ヲ糖化スルノ力大人ニ比スレハ頗ル寛慢ナリ

ト云フ凡テ乳兒ノ口腔ニ於テハ唾液ノ量ヨリモ粘液ノ量多キモノトス
乳頭ヲ吸ヒハ乳兒其唾腺ヨリ唾液ヲ吸ヒ兼テ母乳ヨリ乳汁ヲ吸フト雖モ今牛乳ヲ盛ル護謨嚢ヲ輕々吸引セシムルカ若クハ匙ヲ以テ牛乳ヲ與フレハ此唾腺ノ分泌ニ於ル刺激アルヲナシ
其他乳兒ノ口腔ニ於ル酸性醱酵ヲ促ス者ハ蒸餅砂糖及ヒ牛乳ヲ盛ル處ノ嚢ナリ是レ殊ニ貧家ニ於テ乳兒ノ號泣ヲ鎮靜セシカ爲メニ頗ル應用スル者ニシテ暫時ニノ醱酵ニ陷ル
産院及ヒ棄兒院ニ於テハ普通ノ乳母吸乳護謨嚢及ヒ飲器ニ由リテ甲兒ヨリ乙兒ニ傳染ヲ來スヲアリ蓋シテノ萌芽ハ覆載ノ間到處蔓延ニ唯其蕃殖ヲ助クル状態アル時ニシテ夥シク粘膜上ヲ被フ者ナリ曾テ試シニ林檎ノ切片ニ絶ヒ

ス濕温ヲ與ヒテツール膜ノ一小片ヲ貼セシニ四日乃至五日ノ後其切片ノ處々ヨ顯微鏡的黴元ノ一膜ヲ生シ其膜ノ形的成分ハツール膜ノ黴元種子及ヒ黴元絲ト毫モ殊ナルヲナカリシカツール膜ヲ貼セシテ二回同一ノ試験ヲ行ヒシヨ顯微鏡的黴元膜ヲ生セサリシハルリール氏ノ説ニ據ルニロビソ氏ノ發明スル「オイヂユムアルビカンス」ハ乳酸醱酵ノ醱酵黴元ナルオイヂユムラシキス *Oidium Jachis* ヨリ外ナラスト云フ蓋シ此黴元ハ酸性醱酵ノ醱酵素ニシテ其黴元發生ニ充分ナル窒素ヲ有シ且ツ充分ナル酸素ノ供給アル時ニハ水化炭素中ニ發生ス

乳兒ノツールニ於テハ以上ノ理ヲ以テ其辨解自ラ充分ナリ大人ニ於テハ經久ナル虛脫病殊ニ肺勞患者、蜜尿病患者及ヒ癌腫患者ノ外ツールヲ發スルヲナシ蓋シ此等ノ諸患ニ於テ

ツールノ發スル所以ハ口液ノ化學抱合ノ變化迅速ナル酸性ノ醱酵甚シキヤ上皮増殖及ヒ咀嚼運動ノ減却ニ由リテ辨明ス可シ

病体解剖唇類ノ内面舌及ヒ口蓋ニ初メニハ白小斑ヲ生シ

劇性ノ者ニ於テハ乾酪狀ノ汚塊ヲ生シ其狀恰モ凝固シタル牛乳ノ如シ此苔ハ口ヨリ軟口蓋及ヒ咽頭壁稀レニハ食道ニ蔓延シ間々食道ニツール塊填充スルヲアリ又ツールハ單ニ磚狀上皮ニ起リ決シテ圓柱狀上皮及ヒ頰毛上皮ニ蕃殖セサルヲ以テ腸胃ノ粘膜ニハ發生スルヲ能ハス若シ剖驗ノ際偶マ腸胃ニツール膜ヲ認ムルヲアルモ決シテ粘膜ニ發生スルヲ證スルニ足ラス蓋シ口腔及ヒ食道ニツール甚シク發スレハ剝脫スルツール膜ノ大部嚥下セラル、モノナリ鼻腔ハツールヲ發スルヲナシ是レ生來口蓋破裂ヲ起ス小兒ニ於テ明

カナル所ナリ之ニ反シ皮膚殊ニ口圍顯及ヒ頸部ノ皮膚剝脫
 シヅールヲ以テ被ハル、チ常トス其他兒屍ヲ剖驗スレハヅ
 ールニ兼テ多クハ劇性ノ瘦削及ヒ濾囊性腸炎ヲ認メ大人ニ
 於テハ結核、癌腫、廣汎ナル膿膿、膿毒症等ノ虛脫病ヲ認ム其他
 婦人ノ外陰部、男子生殖器及ヒ乳房ニモ亦ヅールヲ見ル所
 リハウスマン氏ノ説ニ從ヒハ、瘰ノヅール黴元ハ屢々見ル所
 ノ一症ニシテ大約妊婦ノ百分ノ十二於テ之ヲ認ム可シト云フ
 故ニ同氏ハ分娩ノ際小兒ニ傳播シ以テヅールヲ起スモノト
 看做セリ

試ニ顯微鏡ヲ以テヅール塊ヲ検査スルニ幼弱ナル上皮細
 胞陳久ナル上皮細胞、脂肪細球等ヨリ成リ其間ニ一種固有ナル
 圓細胞及ヒ長絲ノ存スルヲ認ム而シテ其細胞ハ圓形若クハ卵
 圓形ヲナスト其周圍ノ判然タルト其發育ノ微トシテ大サノ

異ナリトニ由リテ黴元ノ種子クルコト判然タリ又黴元絲ハ大
 小長短各相異ニシテ刻痕ヲ有シ其刻痕ノ所ニシテ枝別ヲ生シ其
 枝別ノ大サ幹ニ異ナラス此黴絲ハ樹枝形ヲナシ大量ナレハ
 密ナル毛氈狀ヲナスヅール黴元始メハ上皮ノ最上層ヲ占ム
 一雖ニ後コハ上皮間ニ侵入シ稀レニハ粘膜實質ニ荒蕪ス會
 テワグテル氏ハ食道ノヅールニ於テ其表面ノ血管中ニ黴元
 絲ノ侵入スルヲ認メシト云フ又チエンケル氏ノ實驗ニ據ル
 ニ口内ノヅールニ兼テ腦中ニ黴元ヲ含ム無數ノ小膿竈ヲ認
 メシチ以テ見ルニヅールのエンボリチ發シ以テ播擲ノ爲
 メニ死亡ヲ來ス者ナル可シト云フ

症候及經過 ヅールヲ患フル小兒ハ吸乳スレハ必ス疼痛ス
 又肺勞、癌腫等ニ由リテ斃ル、患者ヅールヲ發スレハ口内ニ灼
 痛ヲ發ス又ヅールヲ患フル小兒ハ下利ヲ發シテ腹痛ヲ起シ

酸性ニ反應スル綠汁ヲ下泄スルコト屢々之レアリ之カ爲ノコ
 肛門ノ周圍及ヒ内股ニ赤色ヲ起シ以テ輕性ノ皮膚剝脫ヲ來
 ス而シテ此等ノ症候ハ口内ニゾールヲ發セサルモ亦乳兒ニ見
 ル所ニシテ且ツゾールヲ患フル小兒ニ發セサルコトアルヲ以テ
 却テ偶發症ト看做サ、ルヲ得ズ然レモ佛醫ハ下痢ヲ以テゾ
 ールノ病候トナスヲ以テ其孰レカ是レナルカ孰レハ非ナル
 カ判決頗ル難シ下痢ハゾールノ發生ニ關セスノ起ルコト少ナ
 カラズ蓋シ小兒ノ下痢ハ大半食物ノ異常ナル腐敗ヨリ來リ
 且ツ微元ノ發生ニ由リテ異常ナル腐敗ヲ來スコトアルヲ以テ
 兒ルニ口内ニゾール微元ヲ發生シ其微元遂ニ胃腸ニ輸送セ
 ラレ以テ下利ヲ起シ之カ爲メニ間接ニ乳兒ノ發育ヲ妨クル
 者トラン間々ゾール栓子ノ爲メニ食道ヲ閉塞シ時機ヲ失ハ
 フ嘔吐ヲ發シテ其栓子ヲ排泄スルニ非サレハ死亡ヲ起サ、

ルヲ得ス

療法預防法トシテ虛弱ノ初生兒ニハ吸乳スル毎ニ濕麻布片
 ナ以テ口内ヲ拂拭シ以テ口内ニ乳分ノ殘遺シテ敗潰スルヲ
 防シ可シ水ニ赤葡萄酒ヲ加ヒ布片ニ蘸シテ拂拭スレハ更ニ
 佳良ナリ

ゾール既ニ發生スル時ニハ重炭酸曹達水(五〇水一〇〇)若ク
 ハ他ノ亞兒加里水例之炭酸加里及ヒ硼酸水ヲ布片ニ蘸シ口
 内ヲ拂拭スレハ微元ノ發生ヲ抑制スルノ効アリホーゲル氏
 曰クゾール膜ハ單水若クハ亞兒加里性ヲ有セサル他ノ溶水
 就中糖水中ニ於テハ二三日ヲ經ルノ後新微元絲ヲ生ス硼酸
 及ヒ磷酸那篤倫ノ如キ亞兒加里ノ稀釋水及ヒ硝酸銀昇汞及
 ヒ胆礬ノ如キ金屬鹽ノ溶解水中ニ於テハ毫モ微元發生セス
 又濃厚ナル亞兒加里水ニ於テハゾール膜初メ柔軟澄明トナ

リ終リニ全ク溶解シ雲片トナリ顯微鏡ヲ以テ雲片ヲ検査スルニ黴元絲ノ毛茸ヨリ成ルト云フ又産婆ニ硼酸ト玫瑰蜜ヨリ成ル者ヲ口腔粘膜ニ塗擦スレド却テツールノ蔓延ヲ促カス是レ酸性ナル玫瑰蜜ノ爲メニ硼酸其効ヲ逞フスルヲ能ハサレハナリ又ツールニ兼テ劇甚ナル口腔加苔兒ヲ起リハ稀薄ナル硝酸銀水ヲ口腔粘膜ニ塗擦ス可シ又榮養不良若クハ荏苒タル下利ノ爲メニ極メテ衰弱スル乳兒ニ於テハ適當ナル榮養物(佳良ナル婦人乳)ヲ與ヒ下利ニ適切ナル治法ヲ行フモ生命ヲ挽回スルノ効アルヲナシ

五 舌炎 Glossitis

舌炎ハ粘膜ニ起ルアリ實質ニ起ルアリ

舌粘膜炎ハ通常加苔兒性ニシテ口腔加苔兒ノ一症候ナリ乃チ其主症ハ上皮剝脱シテ以テ舌苔ヲ生シ充血ヲ起シ乳嘴

延長シテ舌上乳嘴狀ヲナス是レナリ舌ノ大サハ増大スルヲナシ而シテ舌加苔兒ノ原因ハ口腔加苔兒ノ原因ニ異ナラス烟草ヲ嗜ム者及ヒ齒尖ノ銳利ナル者ニ於テハ往々舌側ノ粘膜ヲ限局シ頑固ナル慢性刺戟ヲ起シ動モスレハ舌癌ト誤認セラル殊ニ荏苒癒ヒスニテ結締織肥厚及ヒ淺表ナル潰瘍ヲ起ス時ニ然リ然レハ刺棘カ如キ疼痛ナキト舌ノ容積著ク増大セサルトニ由リテ舌癌ニ非サルヲ知ル可シ然レハ其辨別往々判然タラス加之此ノ如キ上皮肥厚ノ癌腫ニ轉スト云フ説ヲ唱フル者多シ又格魯弗及ヒ實弗帝里質私ノ舌ニ發スル一稀レニ之レアリ然ル時ニハ咽頭格魯弗及ヒ咽頭實弗帝里質ノ一症候トナリテ發ス

實質舌炎ハ稀ナル一症ニ多クハ全舌ヲ侵シ殊ニ無血蟲ノ整刺、挫傷、創傷及ヒ汞毒性口腔加苔兒ニ起ルモノニシテ

速カニ著ルシク腫脹シ硬固ニシテ熱灼シ其表面黯赤色ヲ帶
 ヒ厚キ粘液ヲ以テ被ハレ徃々其粘液ニ血液ヲ混シテ赤色ヲ
 呈ハス試ミニ舌ノ切割面ヲ檢スルニ赤色散漫シ漿液性ノ滲
 出物浸潤シ筋纖維黯赤色ヲ帶ヒ後ニハ脫色シテ蒼白色ヲ帶
 ヒ質軟ニシテ破碎シ易シ舌縁ニハ齒牙ノ壓痕ヲ生ス而シテ其滲
 出物吸收シ或ハ醜膿シテ無數ノ小膿瘡ヲ生シ其膿瘡多クハ
 舌ノ基底ニ於テ外方ニ排泄シ或ハ炎症遂ニ慢性ニ轉シテ舌
 ノ大ヲ漸々常大ニ復シ若クハ間質結締組織増殖ノ爲メニ舌質
 ニ二三ノ硬結節ヲ生シ若クハ畢生間依然トシテ舌發大スル
 ヲアリ

急性實質舌炎ノ症候舌增大シ殆ント口腔内ニ容レラレ

ス以テ喉頭ヲ壓迫シ爲メニ呼吸困難加之窒息ヲ起シ口腔底
 ヲ壓下シ試ミニ舌下ニ觸ルニ口腔ノ著ルシク充積スルヲ

觸ル、アリ或ハ舌著ルシク腫大シテ齒間ニ突出スルヲアリ
 舌面ハ脂膏狀ノ滲出物ヲ以テ被ハレ或ハ滲出物乾燥シテ苔
 ヲ生シ硬クシテ破裂ス且ツ流涎多量ニシテ腐敗臭ヲ放テ患
 者極メテ苦悶シ唯喃々鼻聲ヲ放テ舌疼痛シテ其疼痛耳ニ放
 射スルヲ訴フ又咀嚼且ツ嚥下スルヲ能ハサルヲ以テ身体ノ
 榮養甚シク障礙セラレ顎下腺及ヒ頸部ノ水脈腺腫脹シ且ツ
 發熱スルヲ以テ其危險更ニ甚シ時トシテ呼吸障礙ノ爲メニ
 速カニ死亡ニ陥リ死亡ノ前ニハ嗜眠シ脈搏細數絲ノ如ク冷
 汗ヲ流ス又膿瘡破開スレハ危險ノ症候直チニ輕快ス然レモ
 膿瘡ノ破開スルハ稀レナリ蓋シ二三日ヲ經ルノ後炎症ノ漸
 々ニ退行スルヲ以テ尤モ多キ轉歸トナス

慢性實質舌炎ハ顯著ナル症候ヲ起スハ稀レナリ輕微ノ壓

迫及ヒ談話嚥下ノ困難ヲ訴フル者アレモ間々毫モ不快ノ症

候チ舌ニ起サス舌増大スルカ若クハ舌質ニ結節チ起スニ至
リ初メテ醫治チ請フ者アリ

療法急性舌炎ハ大ニ危險ナルヲ以テ直チニ有力ノ療法チ行
フヲ要ス舌面ニ深サ一リニ至リ乃至ニ二リニ至リノ切割チ行ヒ時
宜ク由リ之レヲ反復シ切割スルノ後濕温ノ海綿ヲ以テ拂拭
シ以テ出血チ助ク可シ頸部ニ水蛭チ貼シ項部ニ血角チ貼ス
ルノ法ハ切割法ニ比スレハ其効確實ナラス刺割法ニ由リテ
血液チ泄スノ外舌顎及ヒ顎ニ水捲法チ行ヒハ効アリ且ツ刺
戟灌腸チ行フテ其効チ助ク可シ又惡寒戰慄シ若シハ舌ノ
一部軟化スルニ由リテ膿瘡ノ發生チ徵スルヤ否ヤ頸部ニ糜
爛巴布チ貼シ温湯ヲ以テ舌チ洗滌シ以テ其成熟チ促カシ時
機來ラハ刀ヲ以テ之チ破開ス可シ壞疽ニ陥ラハ水瘻ノ條ニ
論スル治法チ行フ可シ患者嚥下シ得ルヤ否ヤ峻下劑チ與ヒ

一ハ以テ再感チ防キ一ハ以テ炎症ノ退行チ助ク可シ又經過
猛劇ニシテ窒息ニ陥ラントスルモノニハ氣管切開法チ行フ
可シ慢性舌炎ニ於テハ銳利ナル齒縁チ除却シ硝酸銀棍チ以
テ舌面チ塗擦シ沃土加里及ヒ沃土チ含ム鑽水チ内服セシム
可シハリ一氏ハ毎夕苜蓿越幾斯〇一二ヲ與ヒテ舌癌ニ轉歸
スルチ防クノ効アリシト云ヘリ

六 水瘻(頰壞疽) Zoma.

原因此疾ハ殊ニ一歳乃至十二歳ノ小兒ニ見ル所ノ一患ニシテ
大人ニ起ルハ例外ニ屬ス概シテ之チ論スルニ稀レナル一症
ナリ歐邏巴ノ南邦ニハ全ク此疾チ見スト雖ヒ和蘭ニハ多シ
又此疾ハ庶民ニ限り見ル所ノ一患ニシテ其患兒ハ惡液質チ帶
ヒ榮養不良液質不良ノ狀チ呈ハシ且ツ此疾ハ大抵麻疹猩紅
熱痘瘡室扶斯疲咳痢病等ニ續發シ大人ニ於テハ單ニ室扶斯

及ヒ産褥熱ニ之ヲ發スルノニ傳染性ヲ有セス又天行性ニ發スルヲナシ

病体解剖 水癌ハ單ニ偏顔面ニ起リ口角ニ近キ頬粘膜ヨリ發シ時トシテ唇ヨリ發シ極メテ稀レニハ皮膚ヨリ發ス又炎症ヲ見ルヲナク一種敗膿性ノ浸潤ノ爲メニ頬粘膜ノ一部ヲ局シテ硬結ヲ生シ其硬結スル所ノ上ニ壞疽的水泡ヲ生シ且ツ其頬浮腫シテ硬ク皮膚緊張シ蠟狀ノ光輝ヲ放ツ其硬結部ハ尙ホ脾脫疽ノ膿疱ニ於ルカ如ク頗ル速カニ黑色ナル壞疽的痂皮ニ變シ其痂皮ノ幅及ヒ深キ速カニ増盛シ次粘膜組織筋肉血管神經加之近接ノ骨質迅速ニ壞死ス壞疽若シ皮膚ニ達スレハ先ツ圓部變シテ青班トナリ終リニ此壞疽部變シテ帶黑色乳嘴狀ノ惡臭ヲ放ツ塊トナリ血液ヲ混スル稀薄ノ敗膿之ニ浸淫シ壞疽部脫離シ以テ頬ノ穿開ヲ來タス然レモ壞

疽癰ノ及ホス血管ハトロンボーシスヲ以テ填塞セラレハ故ニ顯著ナル出血ヲ來スハ稀レニハ唯屢々髮細管出血ヲ起スノミニ二三日ヲ過クルノ後齒齦頰唇及ヒ眼瞼變シテ壞疽的糜爛トナル又壞疽停止スレハ分界線ヲ生シ其膿ヲ釀シテ壞疽部脫離シ次テ癰痕ヲ生シテ諸般ノ癒着ヲ遺ス

症候 此疾ハ劇性ナルモ熱發セス且ツ毫モ疼痛ヲ訴ハス壞疽性ノ崩壞既ニ甚シキモ患兒尙ホ食氣ヲ有シテ飲食ヲ欲ス壞疽片ヲ混スル敗膿性ノ唾液腫脹スル唇ヨリ夥シク流出シ其惡臭鼻ヲ衝キ惡心ヲ起ス又轉移性肺炎ノ如キ偶發症ノ爲メニ疾ノ初期ニ於テ既ニ死亡ニ陥ルヲ屢々之レアリ或ハ又後期ニ至リ身体羸瘦四肢厥冷絲ノ如キ脈、謔言若クハ困睡ヲ起スノ後脫亡シテ死亡スル者アリ或ハ又癰痕ヲ結ヒ頬ト顎ト癒合シ以テ治癒ニ趣ク者アレモ實ニ例外ニシテ纔カニ百分

ノ五ニ過キス

療法 瘡生法トシテ濃厚ノ肉羹汁ニ蛋黃ヲ混シテ與ヒ葡萄酒
 ナ投シ新鮮ノ空氣ヲ吸ハシメ醫藥トシテ鐵劑及ヒ幾那ヲ投
 シ其他香蠟水及ヒ收斂水ヲ以テ含嗽セシム可シ
 局處療法トシテ濃厚ナル鑛酸及ヒ烙鐵ヲ以テ瘡痕ノ進勢ヲ
 挫折ス可シ濃厚ナル鑛酸ヲ用フルノ前先ツ瘡痕部ヲ刺割シ
 次テ鑛酸ニ浸ス海綿片若クハ毛筆ヲ以テ瘡痕部ニ塗布シ兼
 テ匙ヲ以テ齒牙ヲ防護シ舌ヲ健側ニ固定シ且ツ十二時ヲ經
 ルノ後反復腐蝕ス可シ腐蝕法ヲ行フノ後含嗽シ次テ格魯兒
 加兒基水ヲ注入シ以テ瘡痕部ノ脫離ヲ促カシ惡臭ヲ撲滅ス
 可シウエスト氏ハ殊ニ濃厚ナル硝酸ヲ稱用セリ
 コバルト氏等ハ通白ナル烙鐵ヲ稱用セリ又リルリト氏及
 ヒバルテツ氏ハ頰部ノ皮膚ニ瘡痕ヲ生スレハ先ツ刀ヲ以テ

其瘡痕部ヲ截除シ次テ烙鐵ヲ貼シ燒灼スル部ニ幾那末ヲ撒
 佈セリ瘡痕更ニ蔓延スル時ニハ更ニ之ヲ燒灼ス可シ痂皮剝
 離スルノ後尙ホ瘡痕片ノ存スル間ハ香蠟酒ニ浸ス綿撒絲ヲ
 貼シ或ハ其部ニ格魯兒加兒基末ヲ以テ塗擦ス可シ創面既ニ
 清刷スル時ニハ單純綑帶ヲ以テ足レリトス

七 耳下腺炎 Parotitis

耳下腺ニ二種アリ曰ク特發性曰ク繼發性之レアリ特發
 性ノ者ハ創傷、異物、胃寒殊ニ不明ナル天行性感動ヨリ起リ繼
 發性ノ者ハ口腔ノ炎症及ヒ潰瘍ステノニ氏管ノ砂石及ヒ病
 毒轉移ヨリ來ル今將サニ後條ニ於テハ單ニ天行性及ヒ病毒
 轉移性ノ者ヲ論セントス

天行性即チ特發性耳下腺炎ハ春秋寒濕ノ天氣ニ主ト
 シテ流行シ夏時乾温ノ候ニハ稀レナリ而シテ其流行ノ長短及

ヒ廣狹一様ナラス時トシテ唯一二ノ病院兵營及ヒ孤兒院ニ
書シテ流行スルコアリニ歳以下ノ小兒及ヒ老童ハ耳下腺炎
ヲ發スルコナク幼年ノ者及ヒ男子ハ殊ニ之ニ罹ル

病毒轉移性耳下腺炎ハ劇性ノ疾殊ニ奎扶斯ニ續發シ或

ル奎扶斯流行ニ於テハ之ヲ發スル者頗ル多キコアリ稀レニ
ハ虎列刺泰斐土、敗膿熱、麻疹、痘瘡、赤痢及ヒ劇性肺炎ニ繼發ス
ルコアリ蓋シ其耳下腺炎ヲ發スル所以ノ理未タ詳カナラス
腸室扶斯ニ於テハ必ス口腔粘膜加答兒ト相伴フヲ以テ奎扶
斯ニ起ル耳下腺炎ハ口腔ヨリ耳下腺排泄管ニ加答兒波及シ
テ起ルカ如シト雖ヒ奎扶斯ニ於テ耳下腺炎ヲ起スノ多寡ハ
口腔粘膜加答兒ノ輕重ト相關セサルト耳下腺炎ハ口腔粘膜
病ト相伴ハサル他患ニモ亦發スルコアルヲ以テ見ルニ然ラ
ス或ハ曰ク轉移性膿瘡ハ分利ノ關係ヲ有シ其原因タル疾患

ノ經過ヲノ佳良ナラシムト是レ實事ト相抵語スル應説トナ
サ、ルヲ得ス何トナレハ耳下腺炎ハ多少不快ナル合併症ナ
レハナリ

病体解剖天行性耳下腺炎ノ原基タル解剖的變化ハ詳カナ

ラス是レ此疾ハ經過常ニ佳良ナルヲ以テ直接ノ病理解剖的檢
査ヲ行フコトナキヲ以テナリ然レニ其腫瘍ノ軟ナルト疼痛ノ
少ナキト就中速カニ消散シテ痕迹ヲ遺サ、ルトニ由リ殊ニ
充血ト漿液滲潤ヨリ起ル者ト斷定ス可シ而シ其腫瘍ハ耳下
腺ノ區域ヲ超ヒテ彌蔓ス是レ耳下腺周圍ノ結締織ニ著ルシ
ク浮腫ヲ起スニ由ル者ニ蓋シ流行性耳下腺炎ニ於テハ纖
原ニ富ム滲出物及ヒ膿膿ヲ起スコト頗ル稀レナリ又流行性耳
下腺ニ於テハ兼テ顎下腺及ヒ舌下腺モ亦侵サル、モノナリ
ヒルシヤウ氏ノ説ニ從ヒハ轉移性膿瘡ハ間質結締織ノ滋潤

及ヒ腫脹ヲ以テ始マリ腺胞及ヒ其微細排泄管中ニ線ヲ引ク
 白色ノモノ直チニ起リ次ヲ此白色物膿狀トナル病機更ニ進
 ヲハ腺小葉其中心ヨリ擴張溶解シ終リニ固有膜消滅シ其間
 質ニ醗膿波及ス此間質醗膿ハ速カニ蔓延シ蔓延性蜂窠織炎
 ノ性ヲ取リ以テ大ナル耳下腺膿瘍ヲ生ス或ハ又單ニ腺ノ組
 織溶解シ之カ爲メニ無數ノ小膿瘡ヲ生シ其間質全ク連結ス
 ル者アリ此種ノ者ヲ多シトス間々夥シク腐死シ腺質及ヒ間
 質ニ敗膿ヲ來スヲアリ又轉移性耳下腺炎ハ或ハ分解シ或ハ
 結締織硬結ヲ來シ或ハ膿瘻ヲ生シ或ハ敗膿ヲ醗ヌアリ其醗
 膿ニ轉歸スル者ニ於テハ諸般ノ方位ニ向テ破開ス

症候及經過天行性耳下腺炎ハ通常輕微ノ前兆ト相伴フ者

ニノ或ル流行ニ於テハ數日間劇熱ヲ發シ其狀恰モ急性發疹
 病ノ前兆ニ均シキヲアリ然レモ間々前兆症全ク缺ケ直チニ

腫瘍ノ異常感覺ヲ起スヲアリ其腫瘍初メ腺ノ耳小葉ニ起リ
 之ヨリ頰及ヒ頸ノ上部ニ蔓延シ經界ノ判然タル皮膚浮腫ヲ
 起シ初メハ唯偏側ヲ侵ス其中央ハ堅ク其周圍ハ軟其皮膚蒼
 白色ヲ帶ヒテ浮腫シ若クハ少シク赤色ヲ帶フ此腫瘍ハ緊張
 シテ刺スカ如キ疼痛ト相伴ヒ外視開口嚙下及ヒ頭首廻轉ニ
 由リテ増劇ス唾液ノ分泌ハ増盛シ或ハ減却シ或ハ變化セス
 往々二三日ノ後健側ニ蔓延シ初メ他ノ偏側ニ起リシ腫脹既
 ニ減褪シ熱性輕快スレハ健側ノ腫脹頗ル顯著ナリ又前頰及
 ヒ下顎部ノ腫脹ハ顎下腺ニ炎症ノ波及スルノ徵ナリ第五六
 日ノ頃腫瘍消散シ或ハ其消散之ヨリ早ク或ハ之ヨリ遅キヲ
 アリ微熱解シ十日乃至十四日ノ後顔面再ヒ舊形ニ復スレモ
 間々耳下腺ノ部位ニ疼痛トキ限蓄性硬腫ヲ遺スヲアリ唯或
 ル流行ニ於テ疾ノ第五六日ニ至リ熱勢増劇シテ腫瘍疼痛シ

硬固ニシテ赤色ヲ帶ヒ大小ノ膿瘡ヲ生シ其膿瘡外方ニ破開
 シ或ハ聽道ニ破開ス其聽道ニ破開スル者ハ耳漏荏苒癒ヒス
 聽覺障礙ヲ被リ加之膿汁鬱積シテ以テ腐敗傳染ヲ來ス或ハ
 又ステノニ氏管ヨリ膿汁ノ排泄スルヲアリ
 大約疾ノ第六日乃至八日ニ至リ翠丸炎ヲ起スヲアリ乃チ疼
 痛ヲ起シ熱勢増盛シ翠丸ニ炎症腫脹ヲ起シ莢膜ニ漿液浸潤
 シ陰囊ニ浮腫ヲ起ス偏側ノ翠丸ニ起ルチ常トスレハ間々兩
 側ニ發スルヲアリ此翠丸炎ハ耳下腺炎ノ如ク其經過佳良ニ
 ノ六日乃至十二日ノ後分解ス稀レニハ翠丸炎發スレハ耳下
 腺炎消散シ耳下腺炎起レハ翠丸炎消散スルヲアリ蓋シ兩炎
 一齊ニ起リ或ハ相次テ發スルチ以テ見ルニ其由リテ起ル處
 ノ原因ハ兩患共ニ同一ニシテ決シテ甲炎症起ルチ以テ乙炎症
 ノ散スル者ト看做ス可ラサルカ如シ或ハ又婦人ノ大陰唇及

ニ乳房ニ聊カ疼痛ヲ帶フル炎症ヲ起シ尙ホ男子ニ在リテ翠
 丸炎ヲ起スカ如ク然レトアリ或ハ偏側若クハ兩側ノ卵巢部
 ニ疼痛ヲ起シ之ヲ壓按スレハ其痛増劇スルチ以テ見ルニ尙
 ホ男子ニ在リテ翠丸ニ炎症ヲ起スカ如ク卵巢ニ輕性ノ炎症
 ヲ起ス者ナラン然レハ特リ生殖器ノミナラス胃、咽頭、扁桃腺、
 鼻腔ノ粘膜及ヒ結膜ニモ亦天行性耳下腺炎ノ經過中顯著ナ
 ル炎症ヲ起スヲアリ然レハ其炎症ノ經過短シ曾テコーマイ
 ル氏ノ經驗セシ患者ハ劇性胃炎ノ症候即チ胃部ヲ壓迫スレ
 ハ疼痛堪ヒ難ク飲食スレハ劇吐ヲ起シ熱勢劇甚ナリシチ以
 テ仔細ニ之ヲ檢査セシコ此症ノ起ル大約八日前輕性ノ耳下
 腺炎ヲ起シ耳下腺炎散スルノ後翠丸炎ヲ起シ第四五日ニ至
 リ全ク治癒セリト云フ是ニ由リテ之ヲ觀ルニ耳下腺炎ハ一
 種ノ傳染病タルヲ自ラ明カナリ

傳染病ノ經過中所謂轉移性耳下腺炎ヲ起スヲアリ其症候ハ初メハ輕微ナレトモ特發性ノ者ヨリモ腺著シク硬ク且ツ皮膚ノ浮腫輕微ナルカ故ニ腺ノ經界自ラ判然タリ而シテ此耳下腺炎或ハ漸々ニ發シ或ハ速カニ發シ通常偏側ヲ局ス若シ室扶斯ノ如キ傳染病ノ初起若クハ極度ニ起レハ概シテ其病勢弛縱ノ際若クハ恢形期ニ起ル者ヨリモ危篤ナリ其原因タル劇患ノ爲メニ精神昏聩セサル者ニ於テハ膿膿ニ轉歸スルノ際著ルシク疼痛ノ増劇ヲ訴ヒ耳下腺上ノ皮膚甚シク緊張シテ赤色ヲ帶ヒ或ハ外方ニ破開シ或ハ時トシテ外聽道稀レコハ口腔若クハ咽頭ニ破開ス又ブロンヌ氏ノ經驗ニ據ルニ胸鎖乳頭筋食道及ヒ氣管ヲ傳フテ膿汁下垂シ頸ノ下部ニ下垂性膿瘻ヲ生シ若クハ腹腔内ニ膿汁進入セリト云フ若シ蔓延性腐死及ヒ敗膿膿成ニ轉歸スレハ腺上ノ皮膚黯青色トナリ之

ヨリ先キ多クハ硬固ナリシ腫瘍軟泥狀ニ化シ沈陷シ自然ニ破開スルカ若クハ刀ヲ以テ破開スレハ腺質ノ碎片ヲ混スル汚色ノ敗膿ヲ泄ラシ其惡臭鼻ヲ衝キ預後險惡ナリ
療法耳下腺炎ハ治療ヲ行ハサルモ自ラ治癒ニ趣クヲ以テ其經過間ニハ有害ノ事件ヲ避ケ消化及ヒ上圖ノ不規ヲ調節スルノ外他策ヲ要スルコトナシ患者ヲ臥褥ニアラシメ若クハ室中ニ籠居セシメ且ツ食餌ヲ幾許ク節減ス可キヤハ熱ノ存否及ヒ其劇易ニ關ス又腫瘍ニ緩性ノ油劑ヲ塗擦シ綿花ヲ以テ被フ可シ又多クハ緩下劑ヲ要スル者ナリ之ニ反シ吐劑ハ往時頓挫法トシテ稱用シタレトモ之ヲ投ス可キ症ハ甚ク稀レナリ又腫瘍ノ顯著ナル疼痛顯著ナル赤色顯著ナル硬固及ヒ熱勢亢進ハ化膿ニ轉歸ス可キ恐レアルヲ以テ疼痛部ニ冷濕法ヲ行ヒ或ハ水蛭ヲ貼ス可シ波動ヲ起サハ琶布ヲ貼シ速カニ

之ヲ切開シ以テ耳下腺ノ崩壞ヲ防キ且ツ外聽道ニ膿汁ノ破開若クハ其垂下ヲ防ク可シ硬結ヲ遺サハ沃土軟膏若クハ沃土ホルム軟膏ヲ塗擦シ發泡膏ヲ貼シ壓抵綳帶ヲ行フ可シ又罌丸炎ヲ起サハ終始仰臥セシメ陰囊ヲ支ヒ劇性ノ者ニ於テハ水蛭及ヒ罌布ヲ貼ス可シ

症候的耳下腺炎ニ於テハ其原因タル疾患危劇ナルヲ以テ多クハ局處瀉血適切セス腫瘍硬ク頗ル熱赤シ且ツ之ヲ壓迫スレハ痛楚堪ヒ難キ時ニハ冷湯法若クハ水罌法ヲ行フ可シ波動ヲ起サハ温罌布ヲ貼シ速カニ其膿瘡ヲ破開ス可シ

八 流涎 Salivation, Ptyalismus.

流涎ハ生理上ヨリ其病原ヲ判決ス可キ者多シト雖也或ハ其原因詳カナラサルモノアリ

〔一〕流涎ハ口腔粘膜ノ刺戟ヨリ起ルヲアリ故ニ

口腔ニ刺戟物ヲ送入スレハ流涎ヲ起スルードウエヒ氏ノ試驗ニ據ルニ鼓索神經ノ直接刺戟ニ由リテ顎下腺ノ分泌増盛シ舌咽頭神經ヲ刺戟スルモ亦反射的ニ其分泌増盛ス又舌神經及ヒ舌咽頭神經ヲ切斷シテ其中樞的末端ヲ刺戟スルモ尙其分泌増盛ス是レ唾液ノ分泌ヲ主ル神經纖維ニ斷切スル神經ノ刺戟傳達シ以テ反射的ニ其分泌ヲ増盛スル者ト看做サルヲ得ス又苛烈ノ食物、口腔炎及ヒ口腔潰瘍ノ刺戟ノ爲メニ起ル流涎モ亦反射症ト看做ス可シイツキハトド氏及ヒロイブ氏ノ說ニ據ルニ此反射的唾液分泌ノ中樞ハ延髓ニアリト云フ之ヲ要スルニ三又神經痛ニ見ル處ノ流涎モ亦反射的ニ來ル者ナラン

〔二〕或ル患者ニ於テハ胃ノ粘膜腸ノ粘膜及ヒ子宮等ノ刺戟ヨリ流涎ヲ來スヲアリ例之胃痛胃潰瘍

胃癌、腸蟲、妊娠、月經異常、子宮加答兒及ヒ腔加答ニ起ル流涎之ニ屬ス

〔三〕精神ノ感動ヨリ流涎ヲ來スヲアリ即チ精神病及ヒ腦病ニ於テハ唾液分泌ノ中樞刺激ヲ受クル者之レコソ彼ノ美味ヲ見テ流涎ヲ起スカ如キ亦之レニ算ス可シ

〔四〕窒扶斯間歇熱病ノ經過中ニ流涎ヲ見ルアリ或曰之レ分利性流涎ト看做ス可シ

症候流涎ハ極メテ困難ナル一患ナリ患者唾壺ヲ除却シ得ス唾液絶ヒス流出シテ睡ルコト能ハス又夥シク唾液ヲ嚥下スルヲ以テ胃部ノ壓重食氣缺亡及ヒ便秘ヲ起ス

口腔粘膜ノ刺激甚シキ者例之汞毒性流涎ニ於テハ夥シク上皮ヲ混スルヲ以テ流出スル唾液溷濁シ兼テ粘液腺ノ分泌增多スルヲ以テ粘液狀ヲナシ牽引スレハ絲狀ヲナシ口腔上皮

及ヒ組織成分敗壞脂化スルヲ以テ惡臭ヲ放ツ然レモ三又神經ノ神經痛、小兒ノ齒牙發生、胃痛、精神病及ヒ腦病ニ於ケル流

涎ノ如キ器質變化ナキ者ニ於テハ唾液稀薄、澄明ニシテ水狀ヲナシ臭氣ヲ帶フルトナシ

流涎若シ數週間持續スレハ必ス身體ノ營養ニ顯著ナル障礙ヲ來シ其流涎ノ度ニ從ヒ多少著ルシク羸瘦ス是レ一ハ下痢

ニ於ルカ如ク身體ノ液分ヲ失フニ由リ一ハ澱粉ノ糖質ニ變化スル作用ノ歇止スルニアリ間々唾液其亞兒加里性ヲ失ヒテ酸性トナルコアリ是レハ氏及ヒ氏ノ説ニ據レハ口腔粘膜ノ甚シキ刺激ニ於テ唾液ニ多少ノ粘液ヲ混

スルニ由ル者ナリ
流涎ノ經過ハ往々急性ナレバ數週乃至數月ニ達スルヲアリ其長短ハ原因タル疾ヲ關シ多クハ其原因タル疾ト共ニ流涎

止ム者ニシテ若シ其原因タル疾醫ヒハ胃痛ノ如ク間歇性ナレ
ハ其發作ト共ニ流涎反復ス又瘋癲人ニ於テハ死亡ニ至ルマ
テ流涎荏苒ス

療法原因療法ハ口腔ノ疾ヨリ流涎ヲ起ス者ニ於テ其口腔病
ニ適切スル治法ヲ行テ可シ汞毒性口腔加答兒ノ治法ハ既ニ
本條ニ於テ之ヲ論セリ宜シク參考ス可シ其他ノ諸患ヨリ來
ル流涎モ亦其原病ヲ治スレバ流涎自ラ止ム然レモ特リ原因
療法ノミチ以テ足レリトス可ラハルコトアリ

癩癆療法ハ誘導法トシテ温浴及ヒ蒸氣浴ヲ行ヒ頸部及ヒ項
部ニ芥子泥及ヒ發泡膏ヲ貼シ或ハ收斂藥トシテ明礬單礬
酸亞鉛ヲ合嗽劑トナシ沃土加里醋酸鉛及ヒ結列屋曹烏篤ヲ
内服セシム可シ又亞片及ヒ莫兒比涅ノ内服ヲ稱用ス蓋シ流
涎ハ神經ノ刺衝亢進ヨリ來ルヲ以テ唾液分泌過度ニ於テハ

麻醉藥ノ如キ神經ノ刺衝亢進ヲ沈靜ス可キ醫藥ヲ投スルヲ
適當トスアトロヒチハ鼓索神經ノ分泌纖維ヲ麻痺セシムル
ヲ以テ困難ナル流涎ニハ稱用ス可シエンスワイン氏ハ硫酸
アトコヒチ〇〇〇五ヲ一丸トナシ一日三四回與ヒ著ルシク
流涎ヲ抑止スルノ効ヲ奏シ其發服ヲ止ムレバ流涎再ヒ起リ
又顎下腺ノ部位ニアトコヒチ〇〇〇六ヲ皮下注入トシテ
用ヒシハ五密扭篤乃至七密扭篤ノ後流涎全ク止ミ又〇〇〇
一六ヲ頓服セシメシニ午後四時ヨリ翌朝六時マテ流涎全ク
止ミ次テ再ヒ取復セリト云フ

第二編

咽頭之疾

一 加答兒性咽頭炎

Angina Catarrhalis

加答兒性咽頭炎ニ於ル病因ニ就テ諸説紛々アリ或曰咽頭粘

膜ノ抗抵少ナキニ由ルト或曰腺病質ノモノ殊ニ此疾ヲ患フト然レモ體質強健ナル者モ亦之ヲ患フルコアルヲ以テ見ルニ必シモ腺病質ノ者之ニ罹ルトナシ難シ概シテ之ヲ論スルニ頻回加答兒性咽頭炎ニ罹レハ素因爲メニ増劇シ或ル人ニ於テハ少シク胃寒スルモ尙ホ直チニ嚥下ノ困難若クハ嚥下ノ際疼痛ヲ起スハ確然タル處ナリ又梅毒ニ罹リ若クハ經久ノ間汞劑ヲ服用セシ輩ハ急慢二性ノ喉頭加答兒ニ罹ル可キ素因ヲ抱ク而シテ加答兒性咽頭炎ハ妙齡ノ者及ヒ第一成年期ニハ尤モ多シト雖モ小兒ニモ亦屢々見ル處ナリ

〔一〕直達ノ刺戟物例之熱物腐蝕物尖銳ナル骨片等之ニ屬

ス蓋シ酒客ノ慢性加答兒ハ一ハ咽頭粘膜ニ酒精ノ直達ニ感入スルニ因リ一ハ酒客ニ見ル處ノ氣管枝加答兒ニ均シク酒精過飲ニ起ル惡液質ニ由ルナリ

〔二〕冒寒ヨリ起ル咽頭加答兒尤モ多シ

〔三〕近接臟器ノ加答兒咽頭ノ粘膜ニ波及ス汞毒性口腔粘膜加答兒ヨリ來ル加答兒性咽頭炎鼻加答兒及ヒ喉頭加答兒ノ經過中ニ起ル加答兒性咽頭炎顔面羅斯ノ患者ニ於テ鼻腔及ヒ口腔ヨリ炎症ノ波及スルヨリ起ル加答兒性咽頭炎之ニ屬ス

〔四〕血液變調ヨリ咽頭加答兒ヲ起スコトアリ猩紅熱痘瘡麻疹及ヒ室扶斯ニ發スル者之ニ屬ス又慢性傳染病ノ中梅毒ハ咽頭加答兒トナリテ顯ハル

病体解剖急性加答兒性咽頭炎ハ口瘻ノ近傍例之扁桃腺粘

膜軟口蓋粘膜及ヒ懸壅垂粘膜ヲ侵ス此等ノ諸部若クハ其一
部ヲ局シ多少甚ク赤色ヲ起シテ腫脹シ懸壅垂ハ時トシテ
肥厚シテ著ルシク浮腫シ且ツ延長シ其遊離縁ハ舌根ニ抵觸
ス時トシテ顎下腺若クハ近傍ノ水脈腺粗ク腫脹ス初起ニハ
粘膜乾燥シ終リニハ鮮明若クハ溷濁シテ細胞ニ富ム粘液ヲ
以テ被ハル

慢性加答兒性咽喉炎ハ扁桃腺實質炎ト相區別ス可シ扁桃腺
實質炎ハ妙齡ノ者ニ於テ胃寒ニ起因セル急性炎ヨリ發シ慢
性加答兒性咽喉炎ハ中年ノ男子ニ尤モ多ク見ル處ニシテ喫煙酒
精發聲器ノ過勞若クハ慢性心臟病慢性肺病ニ於ケル靜脈血
鬱積ヨリ來ル扁桃腺甚ク肥厚セス或ハ蒼白色ヲナシ或ハ
青赤色ヲ帶ヒ粘膜ノ一部ヲ局シテ腫脹シ或ハ全咽喉壁腫脹
ス其他炎症長ク持續スレハ靜脈細枝別怒脹シ粘膜及ヒ次粘

膜組織肥厚シ懸壅垂著ルシク肥厚延長シ肥厚セル粘液腺小
突起ヲ生シテ赤色若クハ灰白色ヲ帶ヒ且ツ稀シニハ小圓潰
瘍ヲ生ス所謂顆粒性咽喉炎

症候及經過 胃寒ヨリ來ル急性加答兒性咽喉炎ハ唯其輕

性ノ者ニ於テムニ熱ヲ帶ヒ不多クハ先ツ微熱ヲ發シテ局處
症ヲ起ス或ハ又咽喉炎ヲ發スルノ前若クハ咽喉炎ヲ發スル
ノ際若クハ咽喉炎ノ後均ク胃寒ニ起因セル局處症例之鼻
加答兒喉頭加答兒頭部關節ノ痠麻質斯痛若クハ神經痛口唇
ノヘルペス疹等ヲ發スル下アリ此等如キ者ニ於テハ其熱性
ト咽喉炎ノ症候ト權衡ヲ得サルヲ以テ單ニ其熱ヲ咽喉炎ニ
歸ス可キヤ否ヤ疑フ可キトアリ或ハ熱依然トシテ連綿シ胃
寒ノ發顯タル他ノ局處症ヲ起スモ輕微ナル咽喉症ハ消散ス

通常殊ニ嚥下ノ際頸部ノ不快ナル感覺若クハ疼痛ヲ訴フル
 ニ由リ醫士其咽頭ニ疾アルヲ注目スレトモ間々不注意ナル
 遲鈍ノ患者ニ於テハ咽頭ノ患苦ヲ訴フル或ハ尋問スルニ由
 リ始メテ咽頭ノ患苦ヲ訴フルアリ故ハ咽頭ニ疾患アルノ證
 ナキモ醫士自ら咽頭ヲ望診スルニ非ハレバ其發熱スルヲ抑
 々何事由ルカ終ニ分明ニ成ルルヲ期スルニ患者若クハ口
 ナ開カシメ舌ヲ壓下シテ咽腔ヲ望メテ病體解剖ノ條ニ論ス
 ル赤色ト腫脹トニ由リテ其咽頭炎タルヲ直チニ辨別ス可シ
 或ハ又炎症ヲ起ス粘膜炎被入處ノ上皮就中扁桃腺ノ上皮ニ
 化膿及ヒ軟化ヲ起シ之ガ爲メニ白膜ヲ生シ時ニシテ格魯弗
 及ヒ實布帝里亞ト誤診ス可キアリ
 加答兒性咽頭炎ハ咽頭ノ兩側ニ起ルル通規トナスト雖扁桃
 腺實質炎ハ屢々偏側ニ起ルルモノアリ

單純特發性咽頭炎ノ經過ハ佳良ニシ二三日ノ後既ニ局處症
 〔咽頭粘膜炎〕赤色腫脹嚥下ノ際ニ於ル疼痛及ヒ熱症消散ス或
 ハ又初起ニシテ加答兒性咽頭炎ト看做セシ症候翌日ニ至リ著
 ルシク増劇シ扁桃腺實質炎ノ症候ヲ呈スルコアリ
 慢性咽頭炎ニ於テハ疼痛及ヒ嚥下困難輕微ニシテ唯不明ナル
 障礙ノ爲メニ慢性加答兒增劇スル時ニ於テノニ其疼痛及ヒ
 嚥下困難稍々著ルシ又就中酒客ノ患フル輕微ノ慢性咽頭加
 答兒ハ唯早朝粘膜炎ニ粘膠物ヲ生スルカ若クハ粘膜炎夜間分
 泌スル粘液ヲ以テ被フ時ニシテ困苦ヲ起ス者ニシテ此ノ如キ
 酒客ハ連綿タル咽頭の發熱ヲ發シ且ツ睡シ以テ咽腔ノ粘液
 ヲ除カシカ爲メニ往々嘔氣及ヒ嘔吐ヲ發ス是レ所謂酒客
 早朝嘔吐ノ一原因ナリ又劇甚タル慢性咽頭加答兒殊ニ顆
 粒性咽頭加答兒ハ輕性或著クハ頗ル困難ニシ嚥下ハ其ニ

困難ナラスト雖モ患者頸部ニ一種ノ刺戟不快ノ熱灼乾燥ノ
 感覺アルカ爲メコ不隨意ノ嚥下運動ヲ起シ或ハ連綿タル咽
 頭の嚙咳ヲ起ス或ハ又喉頭粘膜ニモ兼テ慢性炎ヲ起セハ喉
 頭病ノ症候例之談話ノ際速カナル疲勞聲音啞嘶困苦ナル喉
 頭の輕咳加之速性ノ咳嗽發作ヲ發スル者アリ此ノ如キ者コ
 於テハ咽頭ヲ検査シ兼テ咽頭ニ加答兒ノ存スルヲ辨識ス可
 キノニ疹若シ咽頭ノ上部及ヒ後鼻孔ニ蔓延スレハ夜間ニハ
 鼻腔閉塞スルヲ以テ口ヲ開テ睡リ之カ爲メニ咽頭及ヒ舌根
 ノ分泌物空氣流通ニ由リ乾燥シ以テ帶黃色若クハ綠色ノ苔
 ナ生ス或ハ又此乾燥セシトスル傾キ具ニ分泌物ノ少ナキニ
 由ルコアリ此ノ如キ者ニ於テハ時々咽頭後壁恰モ薄キ假
 漆ヲ以テ被フカ如シレウエン氏ハ之ヲ乾性咽頭炎ト名ケタ
 リ又咽頭及ヒ舌根ノ乾燥スル者ニ於テハ患者朝間猛劇ニ嚙

咳ヲ發スレハ微細ナル破裂ヲ生シ輕微ノ出血ヲ起スコアリ
 概シテ之ヲ論スルニ此ノ如キ慢性咽頭加答兒ハ往々頗ル頑
 固ナルモ眞ニ危險ナラスト雖モ精神ニ甚シキ沈抑ノ感動ヲ
 起スモノ多ク依ト昆垚兒家ハ之カ爲メニ目ヲ大ニ警戒ヲ加
 フ是レ殊ニ梅毒ニ罹リ經久ノ間汞劑ヲ服セシ患者ニ發スル
 慢性加答兒ニ見ル處ナリ又扁桃腺ノ囊中ニ乾酪物蓄積シ時
 トシテ嚙咳ト共ニ咯出スレハ患者爲メニ自ラ警戒ヲ加ヒ乃
 チ帶黃綠色物ヲ捻碎スレハ惡臭ヲ放ツテ以テ自ラ肺結核ヲ
 患フル確徴トナス

療法急性加答兒性咽頭炎ハ劇甚ナラサレハ別ニ特異ノ治療
 ナ要スルコナシ他ノ輕性感胃ニ於ルカ如ク發汗劑ヲ投シ熱
 アル者ニハ襟中ニ在ラシメ頸部ニ溫毯布若クハプリースニ
 ツ氏捲法ヲ行ヒハ餘クアリ輕性ノ者ニ於テハ多クハ局處

療法ヲ要セス明礬水ノ如キ含嗽劑ノ効ヲ奏ス可キヤ否ヤハ
 尙ホ精細ナル試驗ヲ要スリニヨリ氏曰ク全患部ニ含嗽水ヲ
 觸シムルハ一難事ニ屬スト蓋シ硝酸銀水ヲ以テ患部ニ塗
 佈シ若クハ明礬末ヲ以テ患部ニ塗抹スレハ其効著ル
 慢性咽喉加答兒ニ於テハ濃硝酸銀水一〇乃至三〇水一五〇
 若クハ單寧水二五乃至五〇水二五〇ヲ以テ日々咽喉後壁ニ
 塗擦シ此法ヲ行フモ頑固ニ効ナキ時ニハ沃土虞利斯林沃
 頭〇三五沃土加里二〇虞利斯林一五〇ヲ時々塗布ス可シ又
 顆粒狀ノ突起ヲ生スル者ニハ硝酸水ヲ以テ強く塗布シ若ク
 ハ硝酸銀棍ヲ以テ摩擦ス可シ又顆粒性ノ者ニ於テハエムス
 泉ノイナール泉及ヒウワイルバツク泉ヲ稱用ス其他海水浴
 ヲ行フテ効ヲ奏スルコアリ往時腫脹スル懸壺垂ハ舌根ヲ刺
 戟スル者トナシ手術ヲ行ヒシト雖モ當今ハ之ヲ行フコト少ナ

シリユール氏曰ク懸壺垂延長スルモ頑固ナル惡心嘔吐咳嗽
 及ヒ噴嚏等ヲ起スコトナシト故ニ此等ノ症候アルモ直チニ之
 ナ懸壺垂ノ延長ニ歸スル勿レ

二 咽喉格魯弗 Baehneroup

咽喉格魯弗ハ極メテ稀レナル一患ナレモ尙ホ通常ノ咽喉炎
 ノ如ク梨園氣等ノ原因ヨリ特發病トナリテ起ルコアリ乃チ
 咽喉炎ニ於テ扁桃腺軟口蓋等ノ粘膜ニ格魯弗性滲出物ヨリ
 成ル大小ノ白點ヲ生スルコアリ此ノ如キ格魯弗性咽喉炎ハ
 通常ノ咽喉炎ヨリ危險ナル疾ニアラス時トシテ咽喉格魯弗
 ハ喉頭格魯弗ノ一症候トナリテ起ルコアリ或ハ又膿毒症、窒
 扶期、產褥熱、結核、急性發疹病ノ如キ重患ニ於テ腸管、生殖器ノ
 粘膜格魯弗ニ兼テ咽喉格魯弗ヲ發スルコアリ
 症候咽喉格魯弗ハ固有ナル他覺症ヲ呈ハサズ多クハ看過

ニラレ是レ殊ニ窒扶斯性全身病ニ發スル繼發性格魯弗ニ見
 ル處ニソ乃チ精神昏聩劇熱及ヒ衰弱顯著ニソ却テ咽頭ノ困
 苦ヲ訴フルコトナシ喉頭ヨリ咽頭ニ格魯弗ノ波及スル者ニ於
 テハ其聲音嘎嘶スルヲ以テ單ニ喉頭ニ注目シ咽頭ヲ検査ス
 ルニ至リ初メテ咽頭ニ格魯弗ノ存スルヲ知ル者トス蓋シ聲
 音嘎嘶及ヒ困難ナル笛響ノ吸氣ヲ發スル者ニ於ル咽頭格魯
 弗ノ存否ハ喉頭格魯弗ノ存否ヲ辨別ス可キ緊要ノ一徵ナル
 チ以テ此喉頭格魯弗ノ症候ヲ發スルモノニ於テハ咽頭ヲ檢
 査ヲ怠ルコト勿レ

特發性咽頭格魯弗ハ其經過中危險ヲ來スハ稀ナリ唯其喉
 頭ニ波及スル時ニ於テノ呼吸障礙ニ由リテ死亡ニ陥ルモ
 ノトス又繼發性格魯弗ハ聲門水腫及ヒ喉頭狹窄症ニ由リ時
 トシテ死亡ヲ來スコトアリ或ハ其渗出物敗壞シテ壞疽狀ト
 ナリ惡臭ヲ放ツコトアリ或ハ咽頭格魯弗ノ患者全身病ニ由リ
 テ斃ルコトアリ然レモ咽頭格魯弗ノ爲メニ全身病増劇スル
 ニ非ス

辨別 咽頭格魯弗ハ加苔兒性咽頭炎ヨリ起ル扁桃腺排泄管
 ノ乾酪物ト相區別スルヲ要ス乾酪物ハ多クハ容易ク壓出ス
 可キモ格魯弗膜ハ除却スルコト能ハス又ツール(鵝口瘡)ト誤診
 ス可キコトアリト雖モ顯微鏡検査ニ由リテ之ヲ區別ス可シ又
 亞布答ト誤診ス可キコトアリト雖モ亞布答ハ殊ニ舌尖ニ發シ
 格魯弗ハ然ラザルヲ以テ之ヲ區別ス可シ

療法 特發性格魯弗ニ於テハ硝酸銀棍ヲ以テ抹擦シ或ハ濃
 強硝酸銀水(〇、六水五、〇)若クハ格魯謨酸(五、〇水一、〇)ヲ塗布シ
 テ腐蝕シ再ヒ義膜ヲ起サハ反復腐蝕ス可シ其他冰水ヲ以テ
 含嗽セシメ頸圍ニ冷法湯ヲ行ヒ冰片ヲ與ヒテ口内ニ溶解セ

シメ兼テ複方旃那浸若クハ甘汞刺巴ヲ投シテ強ク腸ヲ誘導ス可シ

喉頭格魯弗ヲ起サハ本條ニ論スル治法ヲ行フ可シ繼發性咽喉格魯弗ニ於テハ格魯兒酸加里五〇水一〇〇〇若クハサルチール酸〔サルチール酸一精製酒製一〇〇〕虞利私林二〇〇〕チ塗布ス可シ又壞疽性格魯弗ニ於テハ宜ク實布希里亞ノ治法ヲ行フ可シ

三 扁桃腺實質炎 一名 蜂窠織炎性咽喉炎
Phlegmonöse Anginæ Anginosisillaris. Amygdalitis.

原因 咽喉粘膜炎ニ次粘膜組織殊ニ扁桃腺ノ實質ハ加答兒性炎及ヒ格魯弗性炎ニ於テ單ニ浮腫ヲ起スニ過キスト雖モ扁桃腺實質炎ニ於テハ固有炎症癥發生ニ織原性ノ滲出物ヲ起シ大ニ酸膿及ヒ膿瘻ニ陥ルノ傾キヲ有シ慢性ノ者ニ於テハ

硬結ヲ生ス

蓋シ其原因同一ナルモ感入ノ強弱ト其人ノ素因ノ異ナルコト從ヒ或ハ加答兒炎或ハ實質炎ヲ起スカ如シ且ツ其尤モ劇性ノモノハ猩紅熱及ヒ咽喉ノ湯火傷ニ見ル處ナレモ自發性ノ者モ亦極メテ劇甚ナルヲアリ

扁桃腺實質炎ハ尙ホ加答兒性咽喉炎ノ如ク再感ノ傾キヲ有ス

病体解剖 加答兒性咽喉炎ニ於テハ上皮細胞増殖シ粘膜炎ニ細胞分泌スト雖モ蜂窠織炎ニ於テハ**次粘膜結締織ニ膿ノ浸潤スル傾キ大ナリ**而シテ此蜂窠織炎ノ主トシテ占ムル部位ハ扁桃腺ノ腺小葉間結締織ニ劇性ノ者ニ於テハ其炎症扁桃腺ノ周圍懸垂垂軟口蓋加之硬口蓋ニ波及ス試ミニ外部ヨリ之ニ觸ルニ顎隅ノ下ニ腫脹セル扁桃腺ヲ覺

ヒ舌ヲ壓下スレハ初期ニ於テハ扁桃腺極メテ赤色ヲ帶ヒテ
 光輝アリ粘液ヲ以テ被ハレ突兀腫脹シ扁桃腺ノ周圍ハ急性
 加答兒ヲ發ス若シ兩扁桃腺ニ炎症ヲ起セハ其腫脹甚ク一
 點ノ水口峽ヲ通過スルヲ能ハス此時期ニ於テ扁桃腺ヲ切割
 スルニ腺小葉間結締織ニ纖維ニ富ム滲出物浸淫ス二三日ヲ
 經ルノ後膿瘡ヲ起シ腺速カニ萎縮シテ其表面ニ膿汁漏出シ
 腺ノ濾囊ハ變廣シ粘膠ナル粘液樣液ヲ充タス或ル患者ニ於
 テハ殊ニ濾囊侵サレ其粘液狀滲出物濃稠シテ終リニ乾酪狀
 若シクハ石灰狀ヲナシ呼吸ニ惡臭ヲ附與スル塊物所謂扁桃
 腺石トナリ腺ノ表面ニハ帶黃色若クハ白色ノ栓子濾囊口ヲ
 閉塞スルヲ認ム此ノ如キ栓子攪痰スレハ賈布帝里亞ト誤認
 セラレ易シ又此扁桃腺炎ハ頻回再感ヲ來シ會テ一回膿膿ニ
 轉歸スレハ再感ノ際再ニ膿膿ニ轉歸シ百方治療ヲ施スモ之

ヲ抑止スルヲ能ハス或ハ又膿浸潤ヲ來サス却テ腺小葉間結締
 織増殖シ以テ腺ノ硬結ヲ來シ口峽ニ大ナル結節突出シ連綿
 トシテ呼吸及ヒ榮養ヲ妨クルヲアリ會テズブイトン氏ハ慢
 性扁桃腺肥大ノ續症トシテ胸殼連綿狹窄セシテ目撃セリト
 云フ肥大セル扁桃腺ノ結締織増殖ヲ起ス傾キ多クハ劇甚且
 ヲ持續シ扁桃腺ヲ切去スルモ尙ホ更ニ肥大ヲ來ス

症候急性扁桃腺炎ハ大抵劇熱ヲ以テ始リ惡寒顯著ナル病
 的感冒頭痛及ヒ体温脈搏ノ甚シキ増盛ト相伴フ往々疾ノ第
 一日ニハ之ヲ徵知ス可キ局處症ナシ單ニ此諸症ヲ發スルヲ
 アリ殊ニ小兒ニ於テハ其熱症劇甚ニシテ輕微ナル頸部ノ症
 候ト其輕重和權衝セス脈硬クシ數頭熱灼シ嘔吐シ加之至
 身瘧搖ヲ發スルモ往々患兒嚔下困難ヲ訴ヒサルヲ以テ唯其
 咽頭ヲ仔細ニ検査シ顎隅ヲ注意抵觸シテ聊カ局處患恙アル

ヲ認ム可キノミ而シテ熱症ト共ニ若クハ熱症ヲ發スルノ後直
 ナニ頸部ニ刺痛及ヒ壓重ヲ起シ嚥下困難且ツ痛楚シ其刺痛
 ハ殊ニ嚥下ノ際ニ發シ炎症歐斯苔幾斯管ニ波及スルカ爲メ
 ニ往々其刺痛耳ニ波及シ且ツ舌上厚苔ヲ帶ヒ食氣缺亡シ唾
 液ノ分泌著シク増盛シ口臭鼻ヲ衝キ便秘シ終リニ少量ノ液
 汗ヲ嚥下スルヲ能ハス試ニ扁桃腺ヲ検査スルニ(病勢進ム
 者ニ於テハ)検査ヲ行フヲ能ハス[上記ノ變化ヲ認ム四五日時
 トシテ十日乃至十四日ノ後膿瘡破開シテ諸症速カニ寛解シ
 一兩日ニシテ健全ニ復ス時トシテ膿瘡反復破開シ若クハ
 軟口蓋及ヒ硬口蓋ニ蜂窠織炎波及シ諸症極メテ増劇シ惡寒
 反復シ譫言及ヒ不眠ヲ來スニアリ又險惡ナル轉歸ノ例トス
 可キハ頸動脈ノ侵蝕頸部蜂窠織若クハ胸腔ニ於ケル膿汁ノ
 下垂喉頭潰瘍及ヒ聲門水腫ナリ是レ稀有ナル轉歸ニ屬ス膿

瘡ヲ生セスノ分解ニ轉歸スレハ必ス幾許クカ扁桃腺肥大ヲ
 起ス劇甚ノ肥大ニ於テハ嚥下絶ヒス困難シ鼻音ヲ放チ歐私
 斯苔幾斯管閉塞スルカ爲メニ重聽ス又反復扁桃腺炎ヲ起セ
 ハ懸壅垂延長シテ舌根ニ觸レ以テ癩性ノ咳嗽發作ヲ來ス
 療法輕性ノ扁桃腺ニ於テハ頸部ニ蒸濕法ヲ行ヒ粘滑温煎
 劑ヲ以テ含嗽セシメ一日二回扁桃腺上ニ明礬末ヲ撒佈スレ
 ハ往々炎症ヲ抑退スルノ効ヲ奏ス劇性ノ者ニ於テハ此法ヲ
 行フモ奏効ナキヲ以テ其未タ毫モ醸膿セサルノ時ニ當リ頸
 部ニ冷濕包裹法ヲ行ヒ六時乃至八時間之ヲ除却セス以テ局
 處ノ發汗ヲ促カシ粘膠ナル粘液ヲ溶解スルコトハ左ノ方ヲ與
 フ

方

炭酸加里液

一〇〇

蒸餾水

一五〇〇

單舍利別

二〇〇

右混和毎一時一食匙ヲ與フ可シ

冷濕包裹ヲ除却スレハ著シク嚥下ノ輕快ヲ覺ヒ疼痛減却ス
此ノ如キ患者ニ吐劑ヲ投スレハ炎症速カニ退却スルヲアリ
ト雖モ頸部ノ冷濕包裹法ニ比スレハ其頓挫ノ効確實ナラス
往時ボーイルラウド氏ノ稱用セシ反復刺絡ヲ行フノ法ハ方
今扁桃腺炎ニ行フナシト雖モ身體強健ナル者著シク腦充
血ヲ起サハ一回刺絡ヲ要ス可キヲアリ又衆醫ハ頸部ニ水蛭
ヲ貼スト雖モ亦刺絡ニ均シク唯身體強健ニノ腦充血ヲ起ス
者ニ須要ナリ然レモ扁桃腺炎ヲ尅治スルノ効アルヲナシテ
ラルゲン氏ノ稱用セル扁桃腺ヲ刺割スルノ法ハ瀉血ヨリモ
稱用ス可キカ如シ又濾菌性扁桃腺炎ニ於テハ銳尖ナル硝酸

銀棍ヲ以テ強ク燒灼スレハ偉効アリ又便秘ニ注意シ充分ニ
腸ヲ疏滌スルヲ怠ルコ勿レ以上ノ法ヲ行フモ効ナク扁桃腺
周圍ニ著シキ蜂窠織炎ヲ起サハ絶ヒスヒ柄ヲ以テ炎部ニ冰
片ヲ推下セシノ頸部ニ冰捲法ヲ行フ可シ蓋シ冰ハ惡寒ニ由
リテ醜暖ヲ徵知ス可ク且ツ扁桃腺ノ周圍ノ蜂窠織ニ炎症更
ニ蔓延スル者ニ於ルモ尙ホ適切ス扁桃腺ノ一部ニ波動ヲ起
サハ絆癒膏ヲ以テ刀身ヲ包單ニ其尖端ヲ露ハス者若クハ指
爪ヲ以テ膿瘡ヲ破開シ次テ頸部ニ溫韃布ヲ貼シ以テ膿汁ヲ
充分ニ排泄ス可シ又刀若クハ爪ヲ以テ扁桃腺ニ達シ能ハサ
ル時ハ吐劑ヲ投シテ膿瘡ヲ破開ス可キヲ間々之レアリ
肥大ヲ貼ス者及ヒ頗ル慢性ナル者ニハ扁桃腺ノ諸部ヲ反復
硝酸銀ヲ以テ固歴シ小茄皮ヲ生セシメ或ハ沃顛丁幾ヲ塗布
シ或ハ格魯謨酸〔格魯謨酸一分水一分〕ヲ塗布スルノ法ハ其効

確實ナラス水銀膏塗擦法、沃土加里、肝油等モ亦奏効少ナシ又扁桃腺ノ肥厚經久且ツ顯著ナル時ニハ扁桃腺截去術ヲ行フノ外他策アルコトナシ

一回扁桃腺炎ヲ患フル者ハ勉メテ冷水ヲ以テ頸部ヲ洗滌シ氷水ヲ含嗽シ毎週二回濃強ニ過キサル硝酸銀水〔〇三蒸留水三〇〇〕ヲ以テ咽頭及ヒ扁桃腺ニ塗布シ以テ再感ヲ防シ可シ

四 口腔及咽頭之梅毒 *Dysphilitischen Affection der Mund- und Rachenhöle.*

口腔及ヒ咽頭粘膜ノ梅毒ハ軟下疳毒及ヒ眞ノ梅毒ノ直達傳染ヨリ來ルハ例外ニ屬ス而シテ其直達傳染或ハ梅毒ヲ患フル乳母ノ乳頭ヨリ乳兒ノ口腔粘膜ニ傳染スルニ由リ或ハ吸乳囊ニ由リ或ハ接吻ニ由ル蓋シ淋毒ハ眼結膜ニ附着シ易スシテ雖ヒ口腔、咽腔及ヒ鼻腔ノ諸粘膜ニハ感受性少ナキカ如シ

然レモ口腔及ヒ咽頭ノ梅毒ハ全身梅毒ヨリ來ルモノ多シ皮膚ニ次テ尤モ多ク梅毒ヲ發スル處ハ口腔粘膜及ヒ咽頭粘膜ナリ

全身梅毒ノ口腔及ヒ咽頭ノ粘膜ニ發スル其種類數般アリト雖ヒ其殊ニ多キハ**梅毒性加苔兒**、**梅毒性粘膜硬疹**、**梅毒性護謨腫**ナリ而シテ殊ニ顯著ナルハ硬疹及ヒ護謨腫ノ崩壞ヨリ來ル**梅毒性潰瘍**ナリ

梅毒性加苔兒 *Angina Syphilitica erythematosa* ハ或ハ特發シ或ハ増殖及ヒ潰瘍ノ一副症ナルコトアリ咽頭粘膜ノ局處刺戟加之胃寒ハ梅毒ニ傳染スル者ニ於テ梅毒性咽頭加苔兒ヲ誘起シ若クハ其再感ヲ來スカ如シ是ヲ以テ此ノ如キ加苔兒單ニ胃寒症ナルカ將テ潜伏スル梅毒ノ胃寒ノ爲メニ獎起セラレ、ニ由ルモノナルカ直チニ判決シ難キコト往々之レアリ兩

種共ニ口峽、口蓋弓、扁桃腺及ヒ軟口蓋ヲ侵ス故ニ梅毒性咽頭加苔兒ハ他ニ梅毒傳染ノ特徴アルニ非サレハ通常ノ咽頭加苔兒ト誤認ヒラレ易シ其預後ハ不良ナラスト雖モ梅毒諸症一旦治癒スルノ後反復シ來リ且ツ容易ナラサル咽頭病ト相伴フ

梅毒性粘膜炎硬疹ハ唇殊ニ口角ノ粘膜炎ニ生シ其他口蓋弓扁桃腺、懸壜垂、舌尖、舌緣、舌背、頰粘膜炎及ヒ咽頭後壁ニ生ス其形圓ク其大々扁豆大ナシ孤立シ或ハ撰簇シ多クハ扁平ニ隆起ス此梅毒性硬疹ハ治療宜シキヲ得レハ消散シ或ハ治療ヲ施サルモ自ラ消散ス或ハ又上皮溷濁スルカ爲メニ硬疹ニ乳白色被蓋ヲ起シ其被蓋剝脱スレハ黯赤色ノ侵蝕部ヲ遺シ其部ニ原子的崩壞ヲ起ス蓋シ此白色ノ被蓋ハ一見シテ咽頭實布帝里亞ト誤認シ易シ而シテ粘膜炎硬疹ニリ生スル扁平潰瘍ハ

治癒スルノ後毫モ著ルシキ瘡痕ヲ遺サス時トシテ粘膜炎硬疹ノ殊ニ懸壜垂及ヒ口角ニ發スル者ハ隆起シテ乳嘴狀ノ贅生物所謂尖形贅肉ヲナス又舌尖及ヒ唇等ニ於ル白色被蓋ハ梅毒ノ再發ヲ徵知ス可キ第一徵ナルト間々之レアリ又梅毒性硬疹ハ全ク疼痛ヲ挾ムトナク發生シ若シ硬疹變シテ潰瘍トナレハ嚥下ノ際疼痛ヲ發ス

粘膜炎ノ護膜腫ハ粘膜炎及ヒ次粘膜炎ニ位スル深在ノ潰瘍ニシテ或ハ豌豆大ナシ或ハ蠶豆大ナシ其殊ニ發スル處ハ扁桃腺、軟口蓋、懸壜垂、唇、硬口蓋、咽頭後壁及ヒ鼻腔ノ深部ナリ此結節ハ經界ノ判然タラサル隆起ヲ生シ著シク扁桃腺ノ肥厚ヲ來シ反應炎ノ爲メニ粘膜炎ノ赤色及ヒ腫脹ヲ來ス護膜腫ハ治療適切スレハ分解スレモ結節軟化シテ外部ニ破開シ以テ深キ潰瘍ヲ遺ス時トシテ軟口蓋ノ後壁ニ護膜腫ヲ生シ後

ヨリ前ニ向テ崩壞シ以テ軟口蓋ニ穿孔ヲ來スヲアリ若シ其崩壞懸垂ニ起レハ初メハ侵蝕ヲ被リ後ニハ唯細莖ヲ有ス又軟口蓋ヲ穿開シ若クハ其一部缺損スレハ嚥下ノ際食物ノ一半其孔ヨリ鼻腔ニ脫出ス且ツ鼻口腔ト咽腔ト相遮隔セラレサルヲ以テ談話ノ際鼻音ヲ放ツ又護謨腫若シ骨部ニ生スレハ深潰瘍遂ニ骨膜ヲ崩壞シテ骨潰瘍及ヒ腐骨ヲ生ス此ノ如キ崩壞作用ハ治癒スルモ尙ホ放線狀ノ變縮痕ヲ生シ其短縮ノ爲メ運動部變急シ或ハ附着ヲ失ヒ口峽咽頭及ヒ喉頭ノ狹窄ヲ起シ歐斯多斐斯管ヲ閉塞セシム護謨結節尙ホ未ク軟化及ヒ化膿セサルノ間ハ唯微痛及ヒ輕微ノ嚥下困難ヲ起スニ過キス凡テ梅毒ノ疑アル者ニ於テ咽頭ヲ望診シテ顯著ノ變化ヲ認メサルモ尙ホ示指ヲ刺入シ若クハ鼻鏡ヲ以テ軟口蓋ノ後面ヲ檢查スルヲ要ス

療法凡テ口腔及ヒ咽頭梅毒ニ於テハ汞劑ヲ内服セシメ潰瘍

速カニ蔓延スル時ニハ水銀塗擦法一日ニ灰白水銀膏二〇ヲ行ヒ極メテ頑固ナル者ニ於テハ塗擦法ヲ行フノ間尋中ニアリ減食セシメ此法ニ兼テ硝酸銀水硝酸銀水〇三蒸餾水三〇〇若クハ昇汞水〇二亞兒箇兒三〇〇ヲ一日一回毛筆ヲ以テ潰瘍ニ塗佈ス可シ舌ノ護謨腫ニハ沃土加里三〇水一二〇〇一口三四回一食匙ヲ與フ可シ梅毒性咽頭加答兒ニ於テハ尙ホ他ノ咽頭加答兒ニ於テハ如ク喫烟及ヒ麥酒葡萄酒ヲ禁ス可シ又梅毒性咽頭加答兒ニ於テハ以上ノ硝酸銀水ヲ塗佈シ或ハ一日二回硝酸銀棍ヲ以テ燒灼シ且ツ其間時ニ於テ昇汞〇一二ヲ水一磅土ニ溶解スル者ヲ以テ含嗽セシム可シ又乳白色被蓋舌背ノ乳嘴狀贅生及ヒ口角ノ贅肉ハ硝酸銀棍ヲ以テ強ク腐蝕スレハ自ラ消散ス

五 咽頭後壁膿瘡 Retropharyngeal abscess.

原因器械的原因例之尖体ノ侵入等ヨリ起ルハ稀レニ多クハ急性發疹病室扶斯產毒熱羅斯ニ發ス往々其原因詳カナラサルコアリ而シテ此疾ニ罹ル者ハ十歳未滿ノ者ニ多ク乳兒ニモ亦發スルコアリ

症候此疾ハ咽頭後壁膿瘡ヲ徵知ス可キ症候ナク徐々ニ發ス且ツ脊椎潰瘍ヨリ來ルコト尤モ多キカ故ニ一時ハ唯脊椎潰瘍ノ症候ヲ呈ハシ劍之棘狀突起ヲ壓迫シ頭首ヲ廻轉スレハ頸椎疼痛シ頸部強硬シ上肢ノ神經症指ノ刺痒麻痺狀衰弱ヲ發スルニ過キサルモノ多シ而シテ咽頭膿瘡ニ固有ナル第一徵ハ嚥下ノ困難ニシテ楚痛ヲ帯ヒ直ニ呼吸困難之ト相伴フ是ナリ乳兒ハ哺乳ノ際顔面ヲ邪斜シ吐乳シ大人ハ固形嚙片ノ嚥下困難ニシテ痛楚ヲ帯フ病勢増劇スレハ全然タル窒息發作

ヲ起シ瘧性ノ嘔噁性咳ヲ發シ吸氣笛響ヲ帯ヒ尙ホ格魯弗ニ於ルカ如シ大不安ヲ發シ小兒ニ於テハ往々全身ノ瘧變ヲ發ス

療法務メテ速カニ膿瘡ヲ破開ス可シ絆瘻膏ニテ包裹スル刀又ハ尖爪ヲ以テ破開ス可シ特發性ノ者ニ於テハ膿瘡ヲ破開スレハ病患直チニ一掃スト雖モ轉移性及ヒ充血性ノ者ニ於テハ膿囊再ヒ充積シ險症再ヒ蜂起シテ去ラス往々反復破開ヲ要ス脊椎潰瘍ニ於テハ務メテ刺割ヲ小ニシ何トナレハ病骨ニ空氣侵入スレハ骨潰瘍更ニ増劇スレハナリ且ツ生命ヲ殞ス可キ危險ノ症候ヲ起スマテ其刺割ヲ猶豫ス可シ其他原因タル疾患ノ處置ヲ怠ルコトナク鹽浴及ヒ滋養ノ食料ニ由リテ體質ヲ改良シ頸椎潰瘍ニ於テハ項部ニ串線法ヲ行フ可シ

六 頸部蜂窠織炎 一名ルードウヒ氏咽頭炎

此疾ハ本來外科ノ區域ニ屬スルヲ以テ茲ニ唯其原因ヲ畧論セントス蓋シ通常ノ蜂窠織炎ニ於テハ膿膿及ヒ膿瘡ヲ起スノ傾キアリト雖モ此疾ニ於テハ滲出物平等ニ組織ニ浸潤シ壞疽ヲ起スノ傾キヲ有シ膿瘡ヲ發セス設令膿瘡ヲ生スルモ極メテ稀レナリ此疾ハ粘膜ノ實布帝里質私ト疑フ可キヲアリ實布帝里質私ノ流行スル時ニハ殊ニ然リ

初メ頸ノ偏側殊ニ顎下腺ノ近傍ニ顯著ナル硬固ヲ起シ其皮膚緊張シテ光輝ヲ帯ヒ鉛色ヲナシ試ミニ其硬部ヲ切割スルニ其切割面豚肉狀ヲナシ僅少ノ液汁稀レニハ少許ノ膿汁ヲ泄ス多クハ速カニ呼吸困難(迷走神經ヲ障礙スルニ由ル)譫妄(頭部ノ血液還流妨ケラル、ニ由ル)時トシテ嚥下困難ヲ起シ嗜眠症若クハ聲門水腫ノ爲メニ暫時ニノ斃ル或ハ又炎症漸々ニ消散シ若クハ膿瘡外方ニ破開シ危險ノ症候速カニ輕快

スルヲアレモ固ヨリ破格ニ屬ス

此疾ハ嬰園氣ノ感動ヨリ起ルヲ尤モ多ク間々産褥室扶斯及ヒ急性發疹殊ニ猩紅熱ヨリ來ルヲアリ摺施氏曰ク予ハ曾テ分娩後第三月ノ小兒ニ之ヲ自擊セシヲアリト雖モ大人ニ於テハ小兒ヨリ多シト

療法大人ニ於テハ有力ノ消炎法例之頸部ニ水蛭十五條乃至三十條ヲ貼シ灰白水銀膏ヲ塗擦シ糜粥甚布ヲ貼シ峻下劑ヲ投ス可シ膿瘡ヲ起ス者ニ於テハ速カニ之ヲ破開シ以テ其下垂ヲ防キ聲門水腫ヲ起サハ氣管切開法ヲ行フ可シ

第三編

食道病

一 食道炎 Oesophagitis. Dysphagia inflammatoria.

加答兒性食道炎 ハ刺戟性及ヒ熱性ノ食物、尖体ノ嚥下腐

蝕物及ヒ消息子用法ノ拙劣ヨリ起リ或ハ胃若クハ咽頭加答
兒ノ蔓延ニ由リ或ハ慢性心肺病ノ爲メニ鬱血ヲ起スニ由ル
粘膜潮紅シ腫起シテ破碎シ易ク且ツ粘液性分泌物ヲ以テ被
ハレ慢性ノ者ニ於テハ粘膜肥厚シテ帶紅茶褐色若クハ灰白
色ヲナシ濃厚ナル粘液ヲ以テ被ハレ筋質肥厚シ以テ食道狹
窄ヲ起シ或ハ粘膜弛緩シ以テ食道變廣ヲ來ス

格魯弗性食道炎ハ粘膜黯赤色ヲ帶ヒ滲出物ノ層ヲ生シ
急性發疹病室扶斯虎列刺泰斐士ニ於テ喉頭及ヒ咽頭ヨリ波
及ス

膿疱性食道炎ハ痘毒及ヒ吐酒石ノ過用ヨリ來ル上皮膚
膿ノ爲メニ舉上シテ破裂シ以テ失肉ヲ生ス

食道潰瘍ハ淺表ナル剝脱ヲ起シ或ハ粘膜ノ全厚加之全筋層
及ヒ周圍ノ結締織ヲ崩壞ス其原因多クハ尖体及ヒ腐蝕物ニ

アトト雖モ慢性加答兒炎ノ經過中ニ起ルコアリ且ツ食道次
粘膜醜膿ハ其經過急性ナレハ膿瘡ヲ生シ慢性ナレハ食道肥
厚及ヒ及ヒ其狹窄ヲ起ス

症候其症候ハ判然タラス食道部即チ環狀軟骨下胸骨下肩
胛間心窩上部ニ多少楚痛ヲ訴フ殊ニ固形食物ヲ嚥下スルノ
際不快ノ感覺ヲ起ス時トシテ食道ニ痙攣ヲ發シ以テ胸窘迫
及ヒ呼吸不利ヲ起シ以テ食物ノ嚥送ヲ妨ケ或ハ之ヲ吐逆ス
其吐物ハ膿様粘液ヲ以テ被ハレ時トシテ血點ヲ混スアトベ
ルクロムビ一氏フランク氏等ハ曾チ義膜ノ吐逆ヲ目撃セシ
ト云フ又他病ヲ合併セザレハ發熱セス

慢性食道加答兒ノ毫モ狹窄ヲ挾マサル者ニ於テハ消息子ヲ
插入スルモ胃ニ至ルマテ抗抵ヲ見スト雖モ粘液及ヒ上皮其
消息子ヲ被ヒ且ツ食道ノ何レノ部痛楚ナルヤヲ辨識ス可シ

若シ食道ヨリ抽出スル消息子ニ血點アレハ食道ニ潰瘍アル
ノ徵ナリ其癌トノ辨別ハ宜シク食道癌ノ條ヲ參觀ス可
化學的食道腫壞ニ於テハ口腔状態ヲ以テ之ヲ辨別ス可シ乃
硫酸腐蝕ハ粘膜上ニ白膜ヲ帯ヒ其狀恰モ硝酸銀ヲ以テ腐蝕
スルカ如ク硝酸ハ黄膜ヲ生ス口内ノ腐蝕ニ兼テ頸部ニ疼痛
アレハ食道ニモ亦腐蝕アルヲ知ル可シ

療法食道ニ刺入スル異物ハ消息子ニ由リテ銜下ス可シ急
性加答兒ニ於テハ牛乳及ヒソツブノ如キ液性食料ヲ與ヒ
醫藥トシテ扁桃乳[方廿扁桃二〇〇苦扁桃二〇水一二〇〇ヲ
以テ乳劑トナシ單舍利別二〇〇ヲ加ヒ毎二時一食匙ヲ與フ]
ヲ與フ可シ温浴及ヒ刺戟脚湯モ亦適切ス誘導法トシテ寛性
下劑複方旃那浸ヲ投ス可シ又硫酸ヲ以テ腐蝕スル者ニ於テ
ハ直チニ炭酸蘇爾涅失亞一茶匙ヲ飲水ニ化シ務メテ多飲セ

シメ次テ冰水ヲ與ヒテ炎症ヲ減殺シ次テ粘滑藥及ヒ液性食
料ヲ與ヒ以テ腐死部ノ剝脱ヲ促カス可シ慢性加答兒ニ於
テハ潰瘍ノ有無ニ關セテ硝酸銀膏硝酸銀〇一家猪脂三〇ヲ
咽頭銜突器ノ海綿ニ塗佈シ一日ニ一二回痛楚部マテ挿入ス
可シ此法ヲ行ヒハ患者ノ困苦多クハ直チニ輕快ニ嚥下及ヒ
痛楚寛解ス曾テ招施氏ノ實驗セシニ患者ニ於テハ吞酸、嗜噉、
食道ノ壓迫、血點ヲ帶フル粘液ノ吐逆ヲ起セシモ此法ヲ行フ
テ五六週ノ後全治セリト云フ又心肺ノ疾ヨリ來ル慢性加答
兒ニ於テハ多クハ諸藥効ヲ奏セス

二 食道狹窄 Stenosis oesophagi.

原因食道ノ口徑ハ外部ヨリノ壓迫被膜ノ變化及ヒ異物ノ刺
入ニ由リテ狹窄セラレ

[天] 外壓ヨリ來ル食道狹窄ハ頸部ノ腫瘍、腺病性水脈腺腫瘍

及ヒ癌性水脈腺腫瘍頸部蜂窠織炎及ヒ其膿瘍甲狀腺肥大動脈瘤ヨリ發ス時トシテ右鎖骨下動脈異常ノ經過ヲ取リ喉頭及ヒ食道間若クハ食道及ヒ脊柱間ヲ通過シ以テ食道狹窄症ヲ起スヲアリ

〔地〕食道膜ノ疾患ヨリ來ル狹窄ハ癌腫硫酸嚥下及ヒ潰瘍後ノ痕痕ヨリ發スルヲ殊ニ多ク稀レコハ經久ナル慢性加答兒ノ經過中筋質及ヒ間質結締織ノ肥厚ヲ發スルヲアリ

〔人〕刺入スル異物ヨリ來ル狹窄ハ癌腫及ヒ硫酸ヨリ發スルモノニ次テ尤モ多シ貧血家及ヒ歇私帝里家ニ於テハ時々瘵性食道狹窄ヲ起スヲ往々之レアリ此狹窄ニ於テハ毫モ器質變化ナク通常其狹窄部ハ喉頭後ニ位ス

病体解剖食道ノ狹窄ニ數般アリ輕性ノ者ニ於テハ食道口徑ノ狹窄殆ント認メ難シト雖ヒ劇性及ヒ最劇性ノ者ニ於テ

ハ細測胞子ヲ插入スル能ハス其狹窄部ニ於テハ其原因ニ從ヒ或ハ食道膜健常ニ異ナラス或ハ硬結シ狹窄部上ハ多クハ變廣シ〔狹窄部〕ノ直上ハ肥大ス〔其粘膜炎ニ加答兒ヲ起シ狹窄部下ハ萎縮シテ狹窄ス狹窄部ノ長サ頗ル僅少コソ織カニ食道ノ一小部ヲ局シ或ハ殊ニ硫酸ヲ以テ腐蝕スルノ後ニ見ルカ如ク〕全食道狹窄ス尤モ多ク狹窄ヲ起ス處ハ噴門ノ近傍ニ多クハ唯一箇ノ狹窄ヲ見ルモノナリ

症候食道ノ狹窄ハ大抵漸々ニ發スルヲ以テ初メハ患苦不定コソ其狀危險ナラサルカ如シ病初ニハ食物ヲ嚥下スルノ際輕微ノ障礙ヲ發スルノ外他症ヲ起サス〔或ハ經久ノ間此症候ノミヲ起スヲアリ〕食後飲液ヲ取リ若クハ二三回嚥下運動ヲ試ムレハ此障礙自ラ去ルモノナリ實驗ニ據ルニ始メ嚥下スル食物停止スレモ次テ嚥下力快復ス是レ初メ食道ノ輪狀筋

瘰癧ヲ起セ且漸々々寛解スルニアリ此時ニ至リ患者自ラ注
 意シ食物ヲ極メテ細小ニ咬嚼シ唾液ヲ以テ甚シク潤スモ日
 ヲ逐ツテ固形食物ノ嚥下困難トナリ食道ニ食物ノ停刺スル
 ヲ覺ヒ食物ノ蓄積稍々多クレハ呼吸困難及ヒ苦惱ヲ起ス
 嚥下障礙大ニシテ食後飲液ヲ取り若クハ嚥下運動ヲ試ムル
 モ其障礙ヲ除キ得ルヲ少ナケレハ隨テ食物ノ逆行モ亦頻數
 ナリ此食物ノ逆行ハ眞ノ嘔吐ニ於ルカ如ク腹壓其力ヲ逞ク
 スルニ由ルニ非ス單ニ食道筋層ノ作用ニ出ルモノニシテ食
 後纔カニ二三分時ノ後起ルアリ或ハ數時ノ後發スルアリ乙
 種ノ者ニ於テハ狹窄部上ニ蠶狀變廣ヲ生シ輪狀筋層衰弱ス
 レハ其嚥甚シク食物ヲ以テ充タス時初メテ反逆ヲ起ス者ト
 ス然レモ此食物ノ逆行ハ食道ノ蠕動收縮反行スル起ルモノ
 ニ非スシテ蓋シ食道ノ下部閉塞スレハ設令食道ノ收縮健常

ノ如ク上ヨリ下ニ波及スルモ食道ノ口徑ヲ狹窄スルヲ以テ食
 物逆行ス食物直チニ吐逆セラルレハ變化セズ唯多量ノ粘液
 ヲ混スルニ過キス長ク停滯スレハ略ホ軟化スレモ尙ホ全然
 之ヲ認ム可シ其吐逆物食道ヨリ來ルカ將タ胃ヨリ來ルカ疑
 似決シ難キ者ニ於テハ其中性反應ヲ以テ之カ辨別チナス
 可シ若シ食物ニ膿若クハ血液ヲ混スレハ炎症若クハ潰瘍ノ
 存スル徵ナリ又嚥下作用ニ由リテ起ル疼痛ハ炎症及ヒ潰瘍
 ヨリ來ル狹窄ニ見ル所ニ癥痕及ヒ癌腫ヨリ來ル狹窄ニハ
 多クハ發スルヲナシ
 以上諸症ノ外食物攝取妨ケラル、カ爲メニ次第ニ羸瘦シ腸
 胃空虚ナルカ爲メニ肚腹木盤狀ヲナシ往々數週間上固セス
 患者飢餓ヲ訴フ
 食道消息子ヲ挿入シテ試ミサルモ既ニ固形食物送下ノ困難、

固形食物ノ停止及ヒ其逆行ニ由リテ往々狭窄ヲ確定ス可シト雖モ狭窄ノ部位、狭窄ノ度、狭窄部ノ硬軟及ヒ其廣狹ハ消息子ニ非サレハ辨識スルコト能ハス

嚥下ノ際食道ヲ聽診スルハ辨別上ニ緊要ナリハムボルゲル氏ハ頸部ノ食道ヲ聽診スルニ左頸側ニ聽胸器ヲ貼シ之ニ反シ胸部ノ食道ヲ聽診スルニハ第七頸椎ヨリ第八背椎ニ至ルマテ耳ヲ脊柱(棘狀突起)ノ少シク右ニ於テニ貼セリ其法患者ナシテ滿口ノ水ヲ飲下セシムレハ徒常ノ嚥下音此聽診部ノ下境ニ至ルマテ聽取セラレヌ既ニ上方ニ於テ忽然消散スルハ液汁若クハ食物ノ此部ヨリ更ニ進行セサルノ徵ニ其原因ハ狭窄、異物鉗在、食道破裂若クハ食道竇ニ歸セサル可ラス

療法 瘰癧ヨリ來ル食道狭窄ノ療法ハ外科ノ區域ニ屬ス手術ノ工ナルト堪忍力トニ由リテ驚ク可キ治効ヲ奏スルコト問々

之レアリ曾テグライフスワルドノ外科臨床講義ニ於テ一患者アリ(判然タル原因ナク)食道狭窄ヲ患ヒタリ(初ニハ唯通常ノ彈力測胞子ヲ挿入シ得ルニ過キサリシカ數週ノ後擴開シ最大ノ食道消息子ヲ挿入ス可キノミナラス通常ノ食物モ尙ホ容易ニ嚥下シ得ルニ至レリ然レモ此瘰癧ヲ擴開スルノ法ハ持久ノ効ヲ奏セス

狭窄スル食道ニハ必ス加答兒ヲ起スヲ以テ食物ノ送下更ニ困難トナレ故ニ食道狭窄ノ患者ニハ姑息法トシテ曹達水重炭酸曹達水ヲ食前數匕與フ可シ劇性ノ狭窄ニ於テハ濃厚ナル液性食料ヲ與ヒ其他滋養灌腸法殊ニロイベ氏ノ稱用スル腓肉灌腸法(脂肪ヲ脱シテ細挫スル牛肉一五〇乃至三〇〇細挫スル新鮮牛膾若クハ豚膾五〇乃至一〇〇微温一五〇センチメートルト立立方右混和糜粥狀トナス)ヲ行フ可シ

三 食道變廣及食道囊 Dilatatio oesophagi,

Divertikel.

原因全食道變廣及ヒ食道局部變廣ノ別アリ
 單ニ食道周圍ノ一局部變廣シテ嚕出シ或ハ大囊ヲ形成シ其
 囊食道ト交通スルヲアリ「狹窄部上ニ變廣ヲ起ス」尤モ多シ
 乃チ噴門ノ狹窄ニ於テハ全變廣ヲ起シ食道ノ狹窄ニ於テハ
 局部變廣ヲ來ス稀レコハ狹窄症ナク全變廣及ヒ局部變廣ヲ
 起ス「アリ恐クハ食道粘膜ノ慢性加答兒ニ繼發スル筋層弛
 緩若クハ特發性筋層病ヨリ起ルモノナラン慢性胃病ヲ患ヒ
 嘔吐ノ甚シキ者ニ見ル處ノ食道變廣ハ筋層弛緩ヨリ來ルモ
 ノナル可シロキタンスケー氏曰ク全食道ノ變廣ハ身体ノ靈
 盞ヨリ起ルトオツボルチエル氏曰ク全食道ノ變廣ハ痛風ノ
 患者ニ大量ノ水ヲ與フルヨリ來ルト兩説共ニ臆斷ニ屬ス

食道囊ノ起ル所以モ亦分明ナラス然レモ生來若クハ疾病ノ
 爲メニ食道筋層ノ一部抗抵力ヲ失ヒ嚕下ノ際食物其部ヲ壓
 迫シ膨脹ヲ來スチ以テ其常因トナサ、ルヲ得ス食道ノ一部
 一回膨出スレハ嚕下毎ニ食物ノ一部其囊中ニ入ルチ以テ益
 ヲ其膨大ヲ促カス稀レハ櫻實ノ如キ小固形物附着シ其壓
 迫ノ爲メニ食道囊ヲ來ス「アリ或ハ又氣管枝腺發炎腫脹シ
 以テ食道ト癒着シ再ヒ萎縮シ以テ食道ヲ牽引スルカ爲メニ
 食道囊ヲ來ス「アリ

病体解剖食道變廣ハ局部ナルアリ全部ナルアリ時トシテ
 下方ニ至ルニ從ヒ變廣増盛スルアリ殊ニ食道狹窄ニ於テハ
 狹窄部ニ接スル處尤モ變廣ス變廣スル食道ハ兼テ著シク
 延長スルチ以テ紆廻ス而シテ食道壁ハ通常硬結シ筋層肥大
 粘膜固ク時トシテ潰爛ス

食道囊 食道ノ氣管分岐部ニ當ル處ニ發スルヲアレモ頸部ノ
 食道ニ於テ環狀軟骨側ニ起ルコト多シ病初ニハ圓形後ニハ圓
 柱形若クハ圓錐形ヲナシテ食道ニ附屬シ食道ト脊柱ノ間ニ
 位シ其大々掌大ニ達ス此ノ如キ囊ハ唯狹小ナル口ニ由リテ
 食道ト相交通ス或ハ又之ニ反シ食道盲狀ニ延長シ食物其中
 ニ竄入シ食道ノ下部ハ空虚トナリ狹窄シテ萎縮シ以テ囊側
 ニ位ス從來ノ説ニ曰ク食道囊ハ筋層ノ腐敗ヨリ粘膜恰モ脱
 腸狀ニ脱出スルヨリ起ルト是レ輓近チエンケル氏痛ク駭擊
 スル處ニメクレーブ氏ノ説ニ據ルニ是レ極メテ稀有ニ屬シ
 且ツ小囊ニ於テハ多クハ諸膜依然トシテ存シ囊増大スルニ
 至リ初メテ筋層消滅スルモノナリト云フ

症候及經過 狹窄症ヨリ誘起セサル輕性ノ變廣ニ於テハ顯
 著ノ病症ヲ起スコトナク剖驗ノ際初メテ之ヲ認ム筋層ノ衰弱

ト相伴フ劇性ノ者ハ嚥下困難及ヒ食物ノ逆行ヲ起ス

狹窄部上ニ生スル變廣ハ其症候食道狹窄ニ同シク唯其殊ナ
 ル處ハ胃ニ達セザル食物其吐逆セラレ、ノ前長ク食道ニ停
 滯シ且ツ其量夥シキ是レナリ食物吐逆セラレハ頗ル軟化
 シ粘液ヲ混シ間々腐敗スレモ消化セス必ス中性ノ反應ヲ呈
 ハス蓋シ食物胃ヨリ來ルカ將ク食道ヨリ來ルカヲ辨別スル
 コハ此中性反應ヲ以テ緊要ナリトス

若シ食道囊發大シ之カ爲メニ食物胃ニ入ラスシテ囊中ニ來
 ル時ハ其症候食道狹窄ニ局處變廣ヲ續發スルモノニ殊ナラ
 ス食物間々僅カク變化シテ反逆シ次テ之ヲ咀嚼シテ再ヒ嚥
 下ス或ハ又食後一二時ノ後腐敗スル食物ヲ反逆シ口臭鼻ヲ
 突クアリ時トシテ食道消息子ヲ挿入シテ判然辨別ス可キコ
 アリ乃チ食道消息子ヲ挿入スレハ食道ノ或部ニ衝突極メ

キ細キブーギーヲモ通スルヲ能ハサルアリ或ハ殊ニ食物全ク
 嚢内ヨリ驅出セラル、ノ後最大ノ消息子自由ニ通過シテ胃
 ニ達スルヲアリ蓋若シ頸部ノ食道ニ生スレハ喉頭ノ後ロニ
 當リ頸部ノ偏側若クハ兩側ニ軟腫瘍ヲ起シ此腫瘍ハ飲食ス
 レハ發大シ外部ヨリ壓シ若クハ食物ヲ反逆スレハ甚小シ或
 ハ全ク消散ス蓋若シ更ニ下部ヲ占ムレハ間々氣管及ヒ大血
 管ヲ壓迫シテ呼吸不利及ヒ血行障礙ヲ生ス而シテ食道嚢ハ漸
 ヲ其大シ發大シ數年間依然トシテ存シ間々小兒ノ際ヨリ老
 蓋ニ達スルヲアリ蓋若シ小ナレハ生命ヲ殞スノ患ナシト雖
 且發大スレハ饑餓ニ由リテ斃レ或ハ早ク既ニ呼吸障礙及ヒ
 血行障礙ヲ起シ若クハ嚢壁ノ潰爛及ヒ穿開ニ由リテ斃ル
 療法狹窄ヨリ起ル變廣ニ於テハ其原患ノ治療ヲ行フ可シ
 特發性變廣ニ於テハ電氣ヲ施シテ食道筋層ノ衰弱ヲ奮起ス

可シ食道嚢ニ於テハ液性ノ食料ヲ與ヒ其頸部ニ位スル者ニ
 於テハ外部ヨリ壓迫シテ常ニ嚢内ヲ空虚ニス可シ又食道嚢
 ニ於テ胃ニ達シ得ル者ニ食道消息子ニ由リテ食物ヲ送入ス
 ルノ策ハ嚢中ニ食物ノ竄入スルヲ防クヲ以テ嚢ノ目ヲ甚小
 スルノ目的ニ出ルト雖且其効確實ナラス曾テワルデンボル
 グ氏ハ食道嚢ヲ患ラル一患者ニ電氣ヲ施シテ偉功ヲ奏セリ
 ト云フ近時ニ至リ食道嚢ニ外科手術ヲ行フ是レ外科ノ區域
 ニ屬スルヲ以テ茲ニ之ヲ論セヌ

四 食道新生物

食道ニ於テハ癌腫比較的特發症トナリテ起ルヲ多ク其近傍
 臟器ノ癌腫ヨリ續發スルハ極メテ稀レナリ食道癌ハ高齡ノ
 者ニノミ發シ殊ニ男子ニ多シ
 稀レニ食道壁ニ纖維瘤脂肪瘤嚢腫圓形ノ小腫瘍トナリ

テ發シ嚥下作用ヲ妨ケス生活間ニハ看過セラレ、コアリ或
 ハ有莖ノ大腫瘍殊ニ纖維性癌肉食道ノ口徑ヲ閉塞スルコト
 リ此癌肉ハ多クハ食道下部前壁ノ次粘膜中ニ起ルモノコト
 通常説ク如ク環狀軟骨膜ヨリ發スルコトナシ
 食道癌ハ磚狀上皮種ノ上皮癌ニシテ其質軟ナリ食道ノ大部ニ
 癌腫ノ及フハ稀レニシテ常ニ其一處ヲ局シ殊ニ其下部ニ發ス
 ナエシケル氏曰ク食道ヲ三部ニ區別スレハ下三分ノ一ノ處
 ニ癌腫ヲ生スル者尤モ多ク中三分ノ一ノ處ニ生スル者少ク
 ク上三分ノ一ノ處ニ生スル者尤モ少數ヲ占ムト云フ癌腫ハ
 孤立スル白色ノ結節トナリテ起リ或ハ蔓延性浸潤トナリテ
 起リ(蔓延性癌浸潤ハ扁平ナルアリ隆起シテ結節ヲナスアリ)
 食道ノ偏側ニ起ルハ稀レニシテ多クハ輪狀ニ食道ノ口徑ヲ圍
 繞シ之カ爲メニ狹窄ヲ起ス而シテ其變成ハ粘膜ヨリ筋層及ヒ

纖維膜ニ波及シ食道ノ内面ニ潰瘍ヲ起シ之カ爲メ間々食道
 ノ狹窄滅却シ誤リテ輕快ヲ期スルコトアリ食道ノ外膜ヨリ近
 接ノ臟器ニ癌腫蔓延シ其癌腫崩壞シテ氣管、氣管枝、肺、胸膜、心
 囊、大動脈及ヒ肺動脈ノ穿開ヲ來スコトアリ
 食道ノ纖維癌少ニシテ移動性ヲ有スレハ毫モ症候ヲ顯ハサス
 有莖ノ纖維癌肉ハ食道狹窄ノ症候ヲ顯ハシ出血ヲ來ス
食道癌ハ食道狹窄ヲ起ス四十歳乃至五十歳以上ノ患者殊
 ニ平常火酒ヲ嗜ム者ニ於テ他ニ顯著ナル原因ナキニ嚥下困
 難漸々増劇シ一時輕快スルモ終リニ食道狹窄ノ條ニ論セシ
 苦惱ノ症候ヲ起サハ食道癌ト疑察ス可シ蓋シ食道狹窄ノ原
 因中殊ニ多キハ癌腫ニシテ自他原因ヨリ來ル食道狹窄ハ稀有
 ニ屬ス例之茲ニ一患者アリ身体ノ諸部殊ニ肩胛間、頸部ニ刺
 痛ヲ起シ速カニ羸瘦シ癌腫患者ノ通徴ナル顔面ノ惡液色汚

黄色)ヲ顯ハサハ癌腫ヨリ來ル食道狹窄ト看做ス可シ若シ其吐逆シ若クハ食道消食子ヲ以テ抽出スル粘液樣敗膿狀及ヒ血樣物中ニ癌腫ノ碎片アル時ニハ確然之ヲ癌腫ト診定ス可シ將來ノ經過中癌腫崩壞スルハ狹窄症寛解スルモ羸瘦迅速ニ足跗腫脹シ往々股靜脈ニ凝血ヲ生シ終リニ脱亡シテ斃レ或ハ早ク既ニ出血ノ爲メニ死シ或ハ上記ノ或ル臟器ニ穿開テ來シテ死ス食道癌ノ經過ハ一年乃至二年ナリ從來ノ說ニ曰ク癌性食道狹窄ニ於テハ消食子ヲ以テ擴開スルハ危險ナリ何トナレハ消食子ヲ挿入スルハ癌腫ノ敗膿ニ陷ルヲ促カシ若クハ食道壁ノ穿開ヲ來セハナリトフオンチームセン氏ハ之ニ反シ曾テ食道癌ノ患者十七名ニ毎日乃至隔日消食子ヲ挿入シテ食道ヲ擴開セシニ食道疏通シ再ヒ肉ヲ食シ得ルヲ以テ体重ノ増盛迅速且ツ顯著ニシテ其一時寛

解スルノ効著クシカリント云フ然レニ此治効ハ消食子ヲ使用スルノ間ノミニニ二三日後既ニ嘔下作用再ヒ減却ノ極ニ達ス其他患苦甚シキ者ニ於テハ阿片ヲ投シ或ハ莫兒比涅ノ皮下注入法ヲ行ヒ液性食料ナルモ尙ホ嘔下シ能ハサル者ニ於テハ食道狹窄ノ條ニ論セシ隣肉灌腸法ヲ行フ可シ

五 食道穿開及破裂

食道穿開ハ特發食道病ニ發シ或ハ其近圍部ノ疾病ヨリ起ル甲種ノ者ニ於テハ内部ヨリ外方ニ穿開シ乙種ノ者ニ於テハ外部ヨリ内方ニ穿開ス
甲種ノ者バ多クハ食道癌ノ崩壞ヨリ起リ稀レニハ骨片魚骨及ヒ針ノ如キ尖形物ヲ嚥下シ爲メニ炎症ヲ發シテ膿瘍ヲ來スヨリ起リ或ハ深部ニ及フ潰瘍ヨリ來リ或ハ腐敗性ノ食物食道ノ狹窄部ニ蓄積シテ刺戟スルヨリ來ル而シテ食道穿開ノ

近因ハ嚥下作用、嘔吐、身体ノ勞動及ヒ消息子ノ挿入ナリ、外部ヨリ内方ニ發スル食道穿開ハ刺傷及ヒ銃創ヨリ來リ、或ハ腫瘍就中大動脈動脈瘤ノ壓迫ノ爲メニ食道壁薄化スルヨリ來リ、或ハ組織崩壞ヲ來ス疾病豫メ食道壁ト癒着スルノ後、食道壁ニ波及スル者、例之變成セル氣管枝腺ノ乾酪崩壞、殊ニ氣管ノ分岐部ヲ占ムル膿瘍、食道周圍膿瘍、及ヒ肺勞患者ニ於ル肺空洞トノ癒着ヨリ來ルヲアリ、

食道壁ノ破裂ハ健全家若クハ健全ナルカ如キ者ニ於テ、身体ノ勞動及ヒ劇吐ノ後起ル可シト雖、此ノ如キ者ニ於ルモ、尙ホ食道壁健全ナラサルモノト看做ス可シ、

食道壁穿開スレハ其含容物周圍ノ結締織ニ達シ、或ハ氣管、氣管枝、肺、胸膜腔、心嚢及ヒ大血管ト交通ス、

食道穿開スル時、忽然疼痛ヲ發シ、其穿開ヲ徵知ス可キヲアリ、

之ニ次テ發スル症候ハ患者ニ由リテ一様ナラス、乃チ氣道ト交通スル者ニ於テハ食物直チニ烈シク咯出セラレ、動脈瘤ノ破裂スル者ニ於テハ夥シク吐血シ、頸部ニ腫瘍ヲ起シ、是レ觸診ト一種ノ嗽音トニ由リテ腫瘍ノ含容物ハ空氣及ヒ液汁ヨリ成ルヲ知ル可シ、頸部ニ瘻口ヲ生シ、飲液流出スルカ如キ特徴ヲ呈ハスアリ、或ハ其症候食道穿開ヲ徵知ス可キ特徴ヲ有セスト、雖、此食道若クハ其近接部ニ疾患アルヲ徵知ス可ク、例之氣胸、心嚢氣腫、頸部ヨリ蔓延スル皮膚氣腫及ヒ忽然タル膿汁吐逆ヲ發スルヲアリ、又食道病ノ徵判然タル者、限畫性胸膜炎、肺炎、心嚢炎、頸部結締織炎、縱隔膜結締織炎ヲ起サハ、食道穿開ト疑察ス可シ、然レ此繼發炎症ハ食道穿開セサルモ刺戟ノ波及ヨリ起ルヲアリ、又食道穿開口小ナレハ全ク症候ヲ發セズ、加之治癒ニ趣ク然レハ食道穿開ハ通常死亡ニ轉期シ、其死

亡或ハ迅速加之卒然起リ或ハ數週若クハ數月ノ後食道ノ近部ニ發スル諸般ノ續發疾患ヨリ起ル
概シテ其治癒ヲ期ス可キ者ニ於テハ一時食物ヲ禁シ若クハ滋養灌腸法ヲ行フ可シ

六 食道及咽頭之神經病

甲 知覺神經病之ヲ要スルニ或ル神經家ノ嚥下困難ハ食道ノ痙攣ニ非スシテ食道粘膜炎知覺神經ノ刺衝機亢進ニ歸ス可シ此刺衝機亢進ノ爲メニ食道絞攢シ若クハ閉塞シ毫モ嚥下シ能ハサルカ如キ感覺ヲ起ス或曰 歇私帝里球ナル症候ハ食道痙攣ニ非スシテ知覺機亢進ト看做ス可シト
食道ノ知覺脱却ハチームセン氏ノ說ニ據ルニ實布帝里性痙攣ニ於テハ往々咽頭及ヒ喉頭ノ知覺脱却ニ兼テ發シ或ハ迷走神經ノ末梢若クハ其中樞ノ障礙ヨリ起ルモノナラント

云フ

乙 運動神經病

食道痙攣(嚥下痙攣)ハ屢々見ル處ノ一患ニシテ殊ニ神經家及ヒ歇私帝里家ニ多シ是レ尙ホ健体ノ嚥下作用ニ於テ食道粘膜炎ノ知覺神經刺戟セラレ其刺戟ヲ食道壁ノ神經節莖ニ傳ヒ次テ迷走神經ノ運動枝ニ傳ヒ以テ食道ノ收縮ヲ起スカ如ク咽頭及ヒ食道粘膜炎ノ知覺機過敏ク反射性ニ痙攣ヲ起スナラン時トシテ遠隔臟器殊ニ子宮胃腸腸蟲ノ疾患ニ於テ其病的刺戟ノ爲メニ反射性ニ食道痙攣ヲ起スカ如シ又特異ナル痙攣素質ヲ抱ク者ニ於テハ恐駭苦惱加之痙攣ノ反復ヲ怖ル、如キ精神ノ刺戟モ尙ホ食道痙攣ヲ起シ得ルモノナリ其他食道痙攣ハ咽頭及ヒ食道ノ創傷炎症及ヒ潰爛腦病脊髓病迷走神經病頸椎病ノ症候トナリテ起リ或ハ恐水病破傷風及ヒ

癩洞ノ一症候タルナリ
 嚥下痙攣ハ食道上部ノ尙ホ夥シク横紋筋纖維ヲ有スル處ヲ
 占メ或ハ單ニ平滑筋纖維ヲ有スル食道下部ニ起ルコトアリ甲
 種ノ者ニ於テハ隨意嚥下作用困難トナリ間々全ク障碍セラ
 レテ食物ヲ直チニ吐逆シ乙種ノ者ニ於テハ食道ノ深部ニ在
 リテ食物ノ送下困難及ヒ躊躇スルヲ覺ヒ或ハ暫クアリテ食
 物ヲ吐逆ス蓋シ筋ノ痙攣収縮ハ楚痛ノ絞搾ヲ起シ或ハ其痙
 攣部ニ異物ノ鉗在スルカ如キヲ覺フ間々顯著ナル食道痙攣
 ノ發作ト他ノ痙攣例之頸筋ノ痙攣聲門痙攣窒息發作全身神
 經刺衝機亢進ト相伴ツコトアリ而ノ通常咽頭痙攣及ヒ食道痙
 攣ハ發作シ其休憩時間ニハ嚥下障碍セラレズ然レモ痙攣依
 然トシテ連綿シ若クハ嚥下毎ニ突起セラル、コトアリ試ミニ
 消息子ヲ挿入スルニ痙攣狭窄ノ部ニ衝突スル消息子ノ尖端

ヲ稍々強ク此衝突部ニ衝入シ若クハ二三分時間消息子ヲ挿
 入シ之ヲ抽出セサレハ痙攣性縮ヲ起ス處ノ筋輪忽然若クハ
 漸々弛緩シ消息子ヲ更ニ衝入スルモ毫モ障碍ヲ見サレコト往
 々之レアリ蓋シ痙攣性食道狭窄ハ他ノ食道狭窄症ニ反シ其辨
 別難カラス乃チ一ハ歌私帝里子宮病等アリテ痙攣ヲ徴知ス
 ルト一ハ食道狭窄一過ニ消息子ヲ挿入スルノ際往々消散
 スルトニ由リテ之カ辨別ヲナス可シ

其療法ハ根治法ニ兼テ大量ノ臭素加里ヲ投シ頸部ニ平流
 電氣ヲ貼シ頻回食道消息子ヲ挿入シ以テ反射機ノ亢進ヲ漸
 々遲鈍ナラシメ甚シキ發作ノ際ニ莫兒比涅ノ皮下注入法ヲ
 行ヒハ治効ヲ奏ス

咽頭及食道麻痺(嚥下麻痺)ハ特發病トナリテ發スルハ極
 メテ稀ナリ或ハ又劇甚ナル身体震盪慢性鉛中毒梅毒胃寒及

ヒ驚駭ニ起ルコアリ又歌私帝里殊ニ實布帝里亞ノ後咽頭時
 トシテ食道ニ起ル麻痺ハ入ノ熟知スル處ナリ時トシテ食道
 筋層ノ器質病局處食道變廣全食道變廣食道囊ヲ起スノ後食
 道筋層ニ麻痺ヲ起スコアリ然レモ食道麻痺ノ誘因ハ中樞神
 經系即チ舌咽頭神經迷走神經及ヒ副行神經ノ起始部若クハ
 嚥下運動ノ共同中樞ノ變動ニ歸ス可キモノ尤モ多シ腦脊髓
 ノ諸患例之卒中進行性筋萎縮脊髓勞進行性延髓變成ニ起ル
 者之ニ屬ス蓋シ重患ノ末期ニ發スル嚥下麻痺ハ此神經中樞
 ノ機能弛緩シテ奮ハサルニアルモノナラン是レ民間ニ於テ
 モ亦險徴トナス處ナリ

此麻痺ノ症候ハ固形食物及ヒ液性食物ノ飲下ニ從ヒ其趣ヲ
 異ニス乃チ輕性ノ嚥下麻痺ニ於テハ固形食物殊ニ其大片ノ
 嚥下困難ニ且ツ脚躄スレモ全然タル麻痺ニ於テハ食物咽
 頭ニ停止シ或ハ蠕動性收縮減却ノ爲メニ食道中ニ留シ速
 カニ之ヲ翻逆スルカ若クハ液汁ヲ飲下シテ之ヲ送下スルニ
 非サレハ氣道ヲ壓迫レテ呼吸不利及ヒ苦悶ヲ起ス
 水液ハ輕性ノ麻痺ニ於テハ嚥下セラレ易シト雖モ其胃ニ達
 スルヤ受性ニシテ一種ノ響ヲ生ス嚥下ノ際直立スレハ殊ニ然
 リ

嚥下麻痺ハ他ノ病態ニ注目スレハ辨別シ易ク唯特發性麻痺
 ノ患者ニ於テ其嚥下困難ノ辨識困難ナルノミ然ル時ニハ食
 道消息子ヲ頻回挿入スレハ嚥下ニ於ル器械的障得ノ存否ヲ
 示スヲ以テ其辨別ニハ大ニ緊要ナリ
 其預後ハ特發性麻痺ニ於テ全ク佳良ナリ通常見ル處ノ繼發
 性麻痺ニ於テハ其原因タル疾病ノ異ナルニ從ヒ預後モ亦
 自ラ殊ナリ實布帝里亞梅毒歌私帝里若クハ鉛中毒ヨリ起ル

者ヲ除ケハ預後不良ナリ
 其原因ヲ除キ得キ一時トシ之レアリト雖モ根治法ヲ行ヒ難
 キ者ニ於テハ直チニ麻痺ヲ尅治スル藥方例之皮膚ノ反對刺
 戟法ヲ行ヒストリキニ一チノ皮下注入法ヲ行ヒ背部ニ冷水
 ナ灌注シ若クハ滴注シ食道消息子ヲ插入シテ食道粘膜炎ヲ刺
 戟シ就中電氣(感傳電及ヒ平流電氣)ヲ應用ス可シベキヤクト
 氏ハ銅極ヲ脊柱ニ貼シ亞鉛極ヲ以テ頸部ヲ摩擦シ之ニ由リ
 テ反射的嚥下運動ヲ挑起セリト云フ咽頭電氣導子ニ由リテ
 咽頭ヲ刺戟スレハ其効更ニ確實ナリ全然タル食道麻痺ニ於
 テハ食道管ニ由リテ滋養物ヲ送入スルヲ要ス

第四編 胃病腸管病及腹膜病之症候論

(一) 理學診法

下腹ノ理學診斷法ニ數般アリ曰ク望診曰ク觸診曰ク打診

曰ク聽診曰ク測診是レナリ而シテ聽診及ヒ測診ハ下腹病ノ
 辨別ニ緊要ナラス

下腹ノ理學診斷ハ其病狀ノ異ナルニ從ヒ患者ノ体位ヲ殊ニ
 シテ行ハサルヲ得スト雖モ概シテ之ヲ論スルニ水平ニ仰臥
 セシノ少シク頭首ヲ高クシ口ヲ開カシメ下肢ヲ粗ホ股關節
 及ヒ膝關節ニ於テ屈セシムルヲ以テ下腹ノ診察ニ尤モ適應
 スル位置トス又反對側ヲ診スルニハ側臥セシム可シ伏臥及
 ヒ膝肘位置ハ不便ニシ且ツ特異ノ利益ナシト雖モ腹腔内ニ
 積聚スル少量ノ液ヲ打診ニ由リテ發見シ或ハ肛門ヲ檢査ス
 ルニ適切ス又患者ヲ起立セシメテ診査スル法ハ觸診及ヒ打
 診ヲ行フニ多シハ頗ル不佳ナリト雖モ此法ニ由リテ腹腔内
 ノ硬固腫瘍及ヒ液汁蓄積ノ狀況ヲ探知スレハ間々好結果ヲ
 得ルコトアリ患者ヲノ上身ヲ前屈シ臍ヲ以テ固体ヲ支ヒシム

レハ起立診査ヲ行ヒ易シ或ハ又患者ヲシテ種々体位ヲ變セシメテ診査セサルヲ得サルヲ往々之アリ此法ハ特異ノ体位ニ非サレハ認メ能ハサル處ノ異常ヲ發見シ得ルノミナラス腹腔ノ健常若シハ病的含容物ノ動性及ヒ不動性ヲ辨別シ得ルモノナリ

〔甲〕 下腹ノ望診茲ニ先ツ論ス可キハ肚腹ノ發育肚腹ノ膨脹及ヒ其胸臍ノ發育ニ於ル比例ニ是レ健体ニ於ルモ尙ホ年齢雌雄人種生計ノ景況等ニ由リテ著ルシキ差異アルモノナリ概シテ之ヲ論スルニ小兒ニ於テハ其腹腔ハ胸腔ヨリモ大ナリ婦人〔殊ニ數回分娩スルノ後〕高齡肥胖人種及ヒ婦人ノ衣帶緊禁ノ過度ニ於テハ多少肚腹大ナル者ナリ
病的肚腹發大ハ全腹ナルアリ或ハ肚腹ノ一部ヲ占ルアリ全肚腹ノ膨大ニ於テハ〔以〕其膨大ノ形狀球形桶樽狀ニ

ノ側方ニ膨出スル形不規形等〔呂蓋起ノ最モ大ナル部〕臍上部臍下臍傍等〔波〕皮表ノ性質平滑不平凹凸光澤腹皮緊張甚シキ者ニ於テハ其光輝恰モ鏡面上ノ如シ如何ヲ辨定スルヲ要ス

局處膨大ニ於テハ其膨大ノ位置形狀及ヒ境界如何腹皮ノ目視ス可キ性質如何身体ノ位置ヲ變スレハ其膨大ノ狀況如何ニ注目スルヲ要ス

全下腹ノ膨大ハ左ノ原因ニ關ス

〔一〕腹皮ノ浮腫皮下蜂窠織ニ於ル脂肪蓄積過多ニ關ス

〔二〕胃及ヒ腸管ニ瓦斯ノ積聚スルニ關ス

〔三〕腹膜中ニ液汁若シハ空氣ノ蓄積スルニ關シ或ハ下腹腔ヲ充タス大腫瘍ニ關ス

觸診打診及ヒ他ノ他覺症及ヒ機能症ハ此腹腔膨大ノ性質如

何ヲ示スモノナリ
局處下腹膨大ハ左ノ原因ニ關ス

腹腔内ノ臟器即チ胃腸ノ各部肝脾子宮卵巢腎等ノ發大ニ關シ或ハ癌腫胞蟲包裹セラレタル滲出物ニ關シ或ハ鼠蹊脫腸股脫腸及ヒ臍部脫腸ニ關ス

病的下腹萎小ハ腹皮ノ陷沒トナリテ起ル其沈陷ノ度各相異ニシ甚シキハ前腹壁ト脊柱ト相接着スルカ如ク下腹ノ木鉢狀ヲナシ肋骨弓腸骨楯ボーパールト氏韌帶及ヒ耻骨ハ限界ノ判然タル舉上ヲナシ以テ沈陷ノ境界ヲ畫ス此沈陷ハ久シク飢餓スル者全身衰弱食道狹窄噴門狹窄幽門狹窄十二指腸狹窄經久下利慢性痢病鉛毒疝腦病殊ニ結核性腦膜炎ニ見ル處ナリ

腹腔ノ大小ニ兼テ呼吸運動ニ於ル腹筋ノ動作如何ヲ注目

ス可シ呼吸式ハ生理上ニ差異アルハ明カナル處ナリビヤ
氏及ヒマイノシアト氏曰ク男子ハ殊ニ腹式呼吸女子ハ殊ニ胸呼吸ヲナスト然レモ無數ノ破格アリ榮ソ之ヲ論スルニ間錯呼吸ヲ以テ常態トナサ、ルヲ得ズ横隔膜及ヒ腹筋全ク麻痺スル純粹ノ胸呼吸ハ腹膜炎瓦斯液汗若クハ腫瘍ニ由ル劇甚ノ腹腔膨大横隔膜ノ創傷ニ見ル處ニシテ胸殼運動セスシテ劇シキ腹呼吸ヲナスハ胸臟病ノ徵ナリ

此腹腔ノ概徵ヲ觀察スルノ後視神ノ達ス可キ腹皮變化ヲ認ム可シ乃チ腹皮ノ病的變化例之皮色異常發疹炎症膿瘡脫腸浮腫氣腫ハ單ニ觀察ニ由リ或ハ觸診ノ助ケヲ假リテ發見ス可シ脂肪過多及ヒ腹壁ノ腫瘍ニ於ルモ亦然リ蓋シ腹壁ノ腫瘍ハ故意ニ腹筋ヲ緊張セシムレバ判然露出スルヲ以テ筋層ノ後ロニ於テ腹膜ニ接シ或ハ腹腔腔内ニ發スル腫瘍ト區別

ス可シ腹膜ニ接シ或ハ腹膜腔内ニ位スル腫瘍ハ此運動ニ由リテ不明トナリ若クハ視診及ヒ觸診スルモ之ヲ認ムル能ハス

其他左ノ腹壁ニ發スル固有症ハ屢々見ル處ナルヲ以テ特別ニ論セサルヲ得ス

腹壁甚シク弛緩シ下垂囊ノ形ヲナシ耻骨部マテ垂下ス是レ多クハ老婦ニ見ル處ナレモ往々多婉ノ壯婦ニ於テモ亦往々之ヲ認ム稀レニハ液汁蓄積及ヒ腫瘍ニ由リテ下腹經久ノ間膨脹スルカ爲メニ男女共ニ之ヲ認ムルコトアリ**腹皮ノ肥脂過多モ亦腹壁ノ弛緩及ヒ下垂ヲ來ス**又皮下蜂窠織中ニ視認ス可キ白色若クハ白青色ノ瘰癧ニ類スル線條ハ殊ニ腹側ニ尤モ著ルシク多クハ曾テ妊娠セシ徵ト看做ス可シ臍ヨリ耻骨縫際ニ達スル蒼黃色茶褐色若クハ黒色ノ線(妊娠線)モ亦

同一關係ヲ有スハンベルグ氏曰ク予ハ曾テ男子小兒及ヒ未タ妊娠セサル婦人ニ此妊娠線ヲ目撃セシコトアレモ極メテ稀ナリト云フ

直腹筋ノ離開 Diastase ハ屢々見ル處ノ一症ニシテ之ヲ識ラ

サレハ誤診ヲ來スコトアリ是レ先天性ナルコト問々之レアリト雖モ多クハ肚腹ノ擴張殊ニ妊娠ヨリ起リ往々直筋頗ル離開シ其間ニ幅數ツオルノ虧隙ヲ生シ或ハ此虧隙殆ント全前腹面ヲ占メ兩直筋ハ最外側ニ排捷セラレ恰モ圓形ナル扁平ノ腫瘍ヲナシ熟達ノ醫士モ尙ホ誤診ヲ來ス而シテ兩直筋ノ虧隙ハ單ニ外皮斜腹筋鞘横腹筋鞘及ヒ腹膜ヨリ成リ抗抵極メテ少ナク且ツ極メテ薄ク試ミニ患者ヲ起坐シ直筋ヲ緊張セシムレハ腹中線ヲ占ムル弾力性ノ腫起ヲ生シ此腫起下方ニ至ルニ從ヒ減殺ス蓋シ此腫起ハ腸係蹄ノ前出スルヨリ起リ往々

腹面ヨリ一二ツオル高ク恰モ脱腸狀ヲナス直腹筋ノ往々著シク目視ス可キ横腱線 *Inscriptions tendineae* ハ唯未熟ノ醫士之ヲ腫瘍ト誤診スルコアル可キヲ以テ辨別上ニハ須要ナラス

腹皮ノ血管發生ハ往々異常ナルコアリ凡テ下大靜脈ノ血行障礙セラル、者ニ於テハ其障礙ノ度ニ從ヒ腹皮ノ皮下靜脈擴張シ下半身血液ノ一部多クハ上靜脈系統ニ屬スル靜脈(肋間靜脈、乳靜脈、腋下靜脈)内ニ達ス此血行ニ二般アリ幅サ數リニ一ナル數條ノ大ナル靜脈幹前腹壁若クハ側腹壁ヲ傳ヒ往々側枝ニ由リテ交通シ此靜脈幹ハ通常心窩肋間若クハ腋窩ニ於テ消散ス一ハ腹皮ニ密網狀ノ充血ヲ起シ目視ス可キ大血管ヲ有シ或ハ之ヲ有セス又下大靜脈ノ膜及ヒ其含容物變化ノ其狹窄及ヒ閉塞ヲ來シ之カ爲メニ起ル副血行ノ狀態ハ尤モ顯著ナルモノナレトモ下腹臟器ノ腫瘍及ヒ發大加之

腹水ニ於テハ腹腔ノ液汁大靜脈ヲ壓シ以テ下大靜脈ノ狹窄及ヒ閉塞ヲ來スコアリ其他肝臟病患者ニ於テ臍靜脈ノ通開ヨリ來ル副血行ハ全ク之ト相殊ナリ其詳悉ハ肝臟病篇ニ於テ之ヲ論セントス又腹皮ノ動脈變廣ハ稀レニ先天性大動脈狹窄ニ於テ之ヲ見ルノミ

目視ス可キ搏脈ハ零ホ屢々見ル處ノ一症ニシテ通常心窩ニ顯ハレ稀レニハ臍部ニ達ス臍下ニ發スルコト尤モ稀レナリ通常腹中線ニ起リ或ハ少シク左方ニ顯ハル又頗ル側方若クハ(右方例之大ナル動脈瘤ニ於テハ其位置ノ殊ナルニ從ヒ異常部加之右季肋ニ搏跳ヲ認ムルコトアリ)ニ之ヲ認ムルコトアレトモ頗ル稀有ニ屬ス此搏跳ヲ來ス原因左ノ如シ

〔天〕心尖ノ位置異常ニシ、心窩ニ位スルニ因ル

〔地〕心窩ニ位スル右心室前壁ノ一部ニ因ル

〔八〕固性臟器若クハ腫瘍ニ由リテ被ハレタル健常或ハ動脈瘤狀ニ變廣スル腹部大動脈若クハ其大枝別ニ因ル此三因ヨリ來ル搏跳ハ概シテ左則チ以テ區別ス可シ

〔一〕心下ニ於ル心尖搏跳ハ極メテ稀有ノ一症ニシテ唯左胸膜滲出物氣胸若クハ固性腫瘍ニ由リテ起ル

〔二〕心窩ノ搏跳若シ右心室ニ關スル時ハ打診スルニ心臓頗ル水平ノ位置ヲナシ且ツ横隔膜卑キヲアリ或ハ横隔膜ノ位置平常ニ異ナラザレモ右心室ノ作用旺盛シ其運動肝臟ノ左葉ニ波及シ心尖ノ常位ニ多クハ衝突若クハ判然タル震盪ヲ認メ其衝突及ヒ震盪ハ心窩ニ發スル者ト同時ニ起リ兩處共ニ二箇ノ心音若クハ二箇ノ雜音ヲ聽取ス

〔三〕搏跳若シ大動脈ニ關スル時ハ單ニ心窩ノミナラス腹大動脈ノ經過ヲ傳フテ脊椎体ノ左半時トシテ動脈瘤狀變廣ニ

於テハ尙ホ左方若クハ右方ニ目視ス可ク或ハ單ニ觸知ス可キヲアリ而シテ此搏跳ハ多クハ健常ノ位置若クハ他部ニ觸知ス可キ心尖ノ衝突ヨリ稍々遅ク大抵頸動脈若クハ橈骨動脈ノ脈搏ト同時ニ起リ試ミコ聽診スルニ唯一箇ノ音時トシテ一箇ノ雜音ヲ聽ク其音性ハ心臓ノ第一音ト相異ナリ

又此搏跳ノ症候ハ或ル下腹痛及ヒ神経系ノ癩依ト昆涇里歌私帝里ニ特異ノ關係ヲ有スル神經症ト看做ス可キヲアリヒルシウト氏曰ク動脈壁ノ筋纖維ハ神經ニ感動セラル、チ以テ觀ルニ神經的原因ヨリ此搏跳ヲ來スヲアルモノナラントハンベルゲル氏曰ク願フニ此ノ如キ動脈壁ノ弛緩ヲ來スル神經感動ノアル可キハ固ヨリ非議ス可ラスト雖モ予カ實驗ニ據ルニ動脈膜及ヒ其直隣毫モ異常ナキモ尙ホ其搏跳ハ單純器械的原因ニ歸セザルヲ得ス唯仔細ニ検査スルモ器械的原

因ナキ時ニノミ神經的原因ヨリ來ル者ト看做ス可シ予カ從來實驗セシ無數ノ患者ニ於テ此搏跳症ヲ發セシ者ハ必ス此器械的原因ヲ挾ミント同氏ノ實驗ニ據ルニ左ノ病態ハ肚腹搏跳ノ發起ヲ促スト云フ

〔以〕腹皮ノ弛緩及ヒ非薄腸壁緊張ノ微少及ヒ非薄此病狀ノ孰レカ顯著ナル人ニ於テハ腹部大動脈從全ナルト病的ナルトヲ問ハヌ其搏跳非常ニ著ルシキヲ屢々之レアリ蓋シ婦人ニ於テハ男子ヨリモ肚腹搏跳ノ頗ル多キ所以ノ原因ハ婦人ニ於テハ分娩後ニ殘留スル腹皮ノ弛緩ニアリ〔呂〕腹部脊柱ノ甚シク前方ニ彎曲シ之カ爲メニ腹壁ニ大動脈近接ス

〔波〕肝左葉ノ厚徑甚シク増盛ス之ニ由リテ依ト昆垓兒家ノ肚腹搏跳ヲ辨明ス可キヲ屢々之レアリ

〔仁〕一過ノ肚腹ノ搏跳ハ心臟及ヒ血管ノ作用亢進ヨリ來ルヲ屢々之レアリ殊ニ歌私帝里ノ婦人ニ於テ他ニ據證ス可キ原因ナキモ肚腹搏跳ヲ起ス時ニ然リ之ニ反シ左室ノ遠心肥大殊ニ大動脈瓣ノ不全閉鎖ヨリ來ル者ニ於テハ肚腹搏跳持續シ且ツ其搏跳ノ力著ルシク強盛ス

直達ノ神經感動ヨリ來ル肚腹搏跳ハ殊ニ慢性鉛中毒ニ於テ見ル所ナリ慢性中毒ノ患者ニ於テハ小動脈ノ搏跳モ亦強盛ス

胃及ヒ腸係蹄ノ目視ス可キ運動ハ頗ル緊要ノ一症コソ常ニ病的ニ屬ス二種ノ別アリ

其一ハ腹壁ニ忽然彈力性ノ隆起ヲ生シ其一ハ此隆起ニ目視ス可キ蟲狀若クハ波狀ノ運動ヲ起ス〔乙〕種ノ者ハ胃ノ幽門ノ狹窄及ヒ腸狹窄ノ條ニ於テ詳論セントス〔是〕レ諸般ノ疾病ニ

リ來ル胃及ヒ腸管ノ劇性攣縮ニ見ル所ニシテ殊ニ胃及ヒ腸管ノ狹窄ニ於テハ其狹窄部ノ上ニ起リ殆ント辨別ノ一確徵ナリバンベルゲル氏曰ク予曾テ腸管ノ健常ナル者ニ於テハ直腹筋ノ頗ル離開シ腹壁殆ント紙狀ニ非薄スル者ニ於テ縱カニ一回之ヲ目撃セリト云フ

〔乙〕觸診

觸診ハ下腹ノ診斷ニ尤モ緊要ニシテ多クハ下腹ノ打診ヨリモ一層大ナル聲價ヲ有ス下腹ヲ診スルノ際身体ノ位置如何ハ既ニ前條ニ之ヲ論セリ蓋シ觸診ノ際渾テ腸筋ノ緊張ヲ防キ得可キ体位ヲ取ラシムルヲ大ニ緊要トス然レモ是レ往々大困難ナキ一事ニ屬ス何トナレハ小兒及ヒ大人ニ於テ下腹ニ觸ルレハ腹壁ノ收縮ヲ起シ仔細ニ診査シ能ハサルヲ往々之レアリ殊ニ下腹ニ疼痛アル時ニ然リトス故ニ此ノ如キ患

者ニ於テハ談話セシメ若クハ他ノ事故ニ由リテ其精神ヲ醫士ノ診察ニ注カサラシメ口ヲ開キ深吸氣ヲ營マシメ最緊要部ヲ診査スルニハ一時肚腹ヲ弛緩セシムルヲ要ス肚腹ノ診査ハ偏手若クハ兩手ノ指端ヲ斜角ニ貼シテ行フ可シ而シテ病狀ニ由リ或ハ鉛直壓ヲ行ヒ或ハ側壓ヲ行ヒ或ハ表壓ヲ行ヒ或ハ深壓ヲ行フヲ要ス凡テ壓ノ強サハ次第ニ増盛シ深部ノ壓入ハ徐々ニセスンハアル可ラス何トナレハ徒ラニ腹筋ノ疼痛及ヒ收縮ヲ起スノ患アルヲ以テナリ

其他腹部ヲ診スルノ法ハ或ル部ヨリ他部ニ至リ式ニ從ヒ自ラ順序ナクソハアル可ラス此法ニ由リテ腹壁ノ性状ヲ檢査スレハ兼テ其温度ノ増進其彈力ノ度其異常ノ肥厚及ヒ非薄一種軟泥狀ノ觸覺及ヒ疼痛等凡テ觸診ニ由リテ據證ス可キ變化如何ニ注目スルヲ以テ望診ニ由リテ得ル處ノ考察更ニ

完全ス之ニ次テ肚腹ノ膨脹緊張充滿ノ度及ヒ胃腸管ノ膜ノ性狀ニ變常アルヤ否ヤ其位置ノ關係如何ヲ辨識スレハ兼テ腹膜囊内ノ含容物ニ異常ノ有無ヲ辨識シ得ル者ナリ又深ク壓入スレハ腸間膜脊柱ノ前面ヲ占ムル腫瘍加之脊柱及ヒ腹大動脈ヲ判然觸知シ得可シ

肚腹ニ腫瘍ヲ起サハ先ツ其腫瘍ノ位置、性質、腫瘍ノ起、臟器若クハ腫瘍之レト特別ノ關係ヲ有スル臟器ヲ辨定ス可シ此目的ニハ腫瘍ノ理學性狀例之其位置、境界、形狀、表面、硬軟、動靜、疼痛ノ有無、打診、按壓、体位ノ變換及ヒ呼吸運動ニ於ル狀態、腫瘍周圍ノ性狀及ヒ他ノ顯著ナル理學證候(波動、搏跳、自動等)ヲ仔細ニ檢查セスンハアル可ラス

下腹腫瘍ノ占ムル位置ハ概シテ左ノ如シ

〔一〕腹壁ニ起ル腫瘍

炎症及ヒ膿瘍之レニ屬ス其腹壁ニ位スル者ハ多クハ望診及ヒ觸診スレハ容易ニ辨別ス可シ乃チ腹壁ヲ舉上スレハ腫瘍其下ニ位スル内臟ト相離隔シ且ツ腹壁ヲ緊張セシムレハ腫瘍著ルシク露出ス又腹壁孔(股輪、鼠蹊輪及ヒ臍輪)ニ腸若クハ固性臟器脱出スルヨリ起ル腫瘍ハ特別ノ注目ヲ要ス

〔二〕腹腔ノ腺肉臟器例之肝、脾、腎、腸間膜腺、腹膜後水脈腺及ヒ後腹壁、骨盤壁、子宮、卵巢、膀胱、大動脈、大動脈、及其枝別、大靜脈、骨盤ノ骨質、脊柱ニ位スル腫瘍

此腫瘍ノ原因タル病機數般アリ概シテ之ヲ論スルニ此腫瘍何臟器ニ發生スルカハ其腫瘍ノ位置、形狀、大小、境界及ヒ機能障礙ニ由リテ辨識ス可シ

〔三〕腸管膜及ヒ腸管腔ニ位スル腫瘍

炎症硬結、新生物、硬尿、異物之レナリ、胃及ヒ腸管ノ腫瘍ノ部位ハ其位置、腸胃ノ盈虚及ヒ膨縮ノ度、体位ノ變換、泄便ノ腫瘍ニ起ス感動、機能障礙ノ診査、打診ノ成績ニ由リテ之ヲ辨別ス可シ、然レモ大腸ノ蓄尿ハ滲出物若クハ惡性腫瘍ト誤認セラルハナリ

〔四〕腹膜腔及ヒ腹膜壁ニ位スル腫瘍 例之包裹セ

ラレタル滲出物成形シタル炎症性產物、新生物、胞蟲囊之ニ屬ス觸診、打診、内診斷、腫及ヒ直腸ヨリ行フ者腫瘍ノ腸ニ於ル位置ノ關係、既往症、機能障礙ヲ以テ之ヲ辨別ス可シ

腹腔内ノ液汁蓄積ハ強劇ナル震盪若クハ打拍ニ於ル感

觸ニ由リテ之ヲ察知ス可シ其法、偏手ノ掌ヲ將サニ診査セシムル、肚腹ノ或ル部ニ貼シ他手ノ一指頭若クハ數指頭ヲ以テ診査部ニ力可及的直徑ニ相對スル部ヲ驟カニ衝突ス可シ

然ル時ハ其衝突作用、腹膜腔内ニ波及シ以テ肚腹ニ貼スル手掌ニ衝突若クハ波動ヲ覺フル者ナリ

液汁ノ量若シ顯著ナル時ハ輕打スレハ方向及ヒ体位ノ如何ニ關セズ此症ヲ發スト雖モ其液量小ニシテ唯腹腔ノ最下部ニ蓄積スル時ニハ單ニ此部ニ於テ一小處ヲ局シ波動ヲ觸知スルヲ以テ之ヲ認ムルニハ幾許クカ熟練ヲ要ス此ノ如キ患者

ニ於テハ起立セシメテ診査スルハ適切セス何トナレハ一ハ其液汁骨盤腔中ニ沈下シ一ハ腹筋緊張スルヲ以テ判然液汁ノ存否ヲ認メ難キヲ屢々之レアレハナリ故ニ此ノ如キ患者

ニ於テハ少シク薦骨部ヲ高クシ一側ニ臥セシム可シ其液汁腸骨部及ヒ腰部ニ沈陷ス

然ルト雖モ大量ノ液汁存スルモ腸係蹄間ノ小空間ニ包裹セラレ若クハ瓦斯集積シテ腸緊張シ若クハ腹壁甚シク弛緩ス

レハ波動缺ク設令之ヲ認ムルモ分明ナラス又ピオリー氏ノ所謂胞蟲震顫 Hydatidenschwirmen ハ顯著ナル波動ヨリ外ナラス
 毫モ胞蟲ト緊密ノ關係ヲ有スル者ニ非ス渾テ緊張セル彈力
 壁ヲ以テ運動シ易キ液汁ヲ包裹スル者ニハ之ヲ認メ腹水及
 ヒ卵巢水腫ニ於テハ胞蟲ヨリモ震顫ヲ起ス者多シ
 觸診ニ由リテ疼痛ノ度ヲ識得スルハ往々辨別上ニ缺ク可
 ラス乃チ自發性疼痛ハ按壓ニ由リテ極メテ増劇シ或ハ又接
 壓ニ由リテ疼痛初メテ起リ按壓セサレハ之ヲ覺ヒス或ル患
 者ニ於テハ疼痛既ニ輕微ノ表壓ニ由リテ起リ或ル患者ニ於
 テハ劇甚ノ深壓ニ由リテ初メテ起ルコトアリ又按壓スレハ減
 却ヲシ表壓スレハ増劇シ深壓スレハ緩解スルアリ又肚腹ノ
 一部ヲ扪スルアリ或ハ全肚腹ニ及ホスアリ又按壓シテ覺
 ル處ノ疼痛ノ性自發性ノ者ト異ナルコト往々之レアリ

按壓シテ唯不快ヲ感觸スルモ患者之ヲ疼痛トナスアリ此ノ
 如キ者ニ於テハ肚腹ヲ診査スルノ際談話シ患者ノ精神ヲ他
 ニ注カシメ以テ其面貌如何ヲ觀察スルヲ要ス
 概シテ之ヲ論スルニ按壓スレハ炎性疼痛ハ増劇シ神經性疼
 痛ハ減却スト雖モ兩種共ニ破格少ナカラス又疼痛ヲ獎起ス
 ル按壓ノ深淺ニ由リテ其疼痛ヲ起ス臟器ノ深淺ヲ判決シ得
 可シ又按壓ニ由リテ起ル疼痛ノ廣狹ニ從ヒ患部ノ廣狹ヲ判
 決スルハ確實ナラス何トナレハ限畫性ノ疾患ニ於テ疼痛ヲ
 覺フル區域廣汎ナルコトアルヲ以テナリ
 疼痛ノ性狀モ亦注意スルニ非サレハ辨別ノ徵トナシ難シ概
 シテ之ヲ論スルニ腹膜及ヒ腺肉臟器ヲ包被スル腹膜ノ炎症
 ハ刺スカ如ク若クハ切ルカ如キ疼痛ヲ起シ腺肉臟器腸管ノ
 粘膜ニ於テハ多クハ唯鈍痛若クハ壓痛ヲ覺ヒ且ツ劇甚ナラ

ス若クハ一種名狀シ難キ不快ノ感覺ヲ起スト雖モ破格少ナ
ラス又或ル臟器ヲ按壓スレハ其臟器ニ固有ナル特異ノ感覺
ヲ來シ以テ辨別ノ一助トナルコアリ例之胃ヲ按壓スレハ惡
心嘔吐嗜睡ヲ起シ大腸ノ下部ヲ按壓スレハ上圍ヲ促カシ膨
脹スル膀胱ヲ按壓スレハ尿意ヲ起スカ如キ是レナリ

〔丙〕打診

打診ヲ行フノ際患者ノ體位ハ肚腹診法ノ通則ニ論スルカ如
ク患者ヲ起立セシメテ打診スレハ腹筋緊張シ以テ甚シキ濁
音ヲ起ス又患者ノ體位ヲ變換シテ打診ス可キヲ往々之レア
リ
胃ヲ打診スルニハ先ツ其位置ノ關係ヲ記憶スルヲ要ス胃ノ
打響ハ其膨脹ト其合容物ノ度ニ從テ頗ル相異ナリ胃ノ打響
ハ多クハ清亮ナル鼓音ヲ發シ其音性自ラ他ノ腸管ノ音ト相

異ナルモノニ殊ニ胃底ハ打診ニ由リテ容易ニ判定ス可シ
胃ノ上方ハ一側ハ肺ノ無鼓音ニ由リ他ノ一側ハ第六左肋若
クハ第七左肋ノ部ニ於テ心臟ノ鈍音ニ由リ左外方ハ腋下線
ニ於テ脾臟ノ鈍音ニ由リテ境界セラレ其下境界ハ左肋骨弓
ニ近接シ且ツ結腸橫行部ノ打響性狀ノ胃ト殊ナルニ由リテ
之ヲ定ム可シ又胃幽門部ハ小彎ニ接シ其大半若クハ全部肝
ノ左葉ニ由リテ隱蔽セラル、ヲ以テ之ヲ判定スルコト頗ル難
シ而シテ肝臟ノ左葉ノ大々頗ル差異アルヲ以テ或ル患者ニ於
テハ胃底及ヒ大彎ノ一小部ヲ除キ胃ノ最大部ハ肝臟ヲ以テ
被ハレ他ノ患者ニ於テハ胃ノ全前面腹壁及ヒ胸壁ニ接スル
コトアルヲ以テ茲ニ詳細ノ據證ヲ示スコト能ハス且ツ此ノ如ク
差異アルヲ以テ胃ノ打響或ハ清亮ナル鼓音ヲ發シ或ハ濁鼓
音ヲ發シ或ハ肝ノ厚徑顯著ナル者ニ於テハ全然タル虛音ヲ

發シ唯強打スレハ不明ノ鼓音ヲ認ム蓋シ心窩ニ於テ胃ノ右
 半ト之ト相接スル結腸横行部ノ境界ハ唯其打響性狀ノ著ル
 シキ差異ニ由リテ辨別ス可キノニ胃若シ甚シク收縮スル時
 ニハ往々全ク肝臟若クハ結腸ニ由リテ被ハル、ヲ以テ打診
 スルモ其大サヲ定メ難ク或ハ全ク之ヲ定ムルヲ能ワス胃若
 シ夥シク糜爛若クハ液汗ヲ含ム時ハ其全區域ニ於テ虚音ヲ
 發シ肝及ヒ脾ト區別スルヲ能ワス
 胃腔ヲ發大シ若クハ狭小ナラシムル疾ハ隨テ其打響ノ虚實
 及ヒ廣狹ニ變化ヲ起ス胃若シ瓦斯ノ爲メニ大ニ膨脹スレハ
 其打響實ニシテ往々鏗響ヲ發シ第五左肋第四左肋若シハ之
 自リ以上ニ達シ加之心臓部ニ於テ多少著ルシク之ヲ認ム可
 ク且ツ健常ヨリモ左側ニ達シ脾臟ノ濁音部減却シ或ハ全ク
 消散ス胃若シ瓦斯ノ爲メニ極メテ甚シク膨脹スレハ鼓音判

然ララス終リニ全ク消散シ且ツ其打響胃ノ少シク緊張スル
 モノニ比スレハ實ナラス病的ニ變廣スル胃若シ液汗或ハ糜
 粥ヲ以テ充タサ、ル、時ハ虚音ヲ發スル區域甚ク廣ク且ツ
 抗抵大ナレハ胃底部ニ於テハ尙ホ鼓音ヲ認ム故ニ近接セル
 腺肉臟器ノ境界ハ胃ノ空虚ナル時頻回診査セスンハアル可
 ラス胃若シ一半充タサ、ルレハ胃ノ最下部ハ虚音ヲ發シ高
 部多クハ胃底ノ上部ハ清音ヲ發ス
 病的胃腔狭小ハ上ニ論スル如ク打診スルモ之ヲ辨定スル
 頗ル難シ故ニ胃ノ盈虚ノ殊ナルノ際反復診査シ周圍臟器ノ
 境界ヲ精細ニ辨定シ且ツ他ノ症候ニ注目スルニ非サレハ理
 學的鑑別ノ目的ヲ達スルヲ能ハス
 自他腸管ハ打診ニ於ルモ亦上記ノ通規ト異ナラス乃チ腸ノ
 一部空氣ヲ含ム、愈々多ケレハ隨テ其打響モ亦愈々清亮ナ

リ但シ腸ノ緊張過度ナル時ハ然ラス鼓音消散シ從テ打響ノ清亮モ亦消散ス又腸ノ大部唯固形物若クハ流動物ヲ含ミ若クハ外壓ノ爲メニ全ク其空氣ヲ失フ時ハ之ヲ打ツニ虚音ヲ發シ腸膜著ルシク肥厚シ若クハ腸ト腹壁ノ間ニ無氣體腫瘍液汁等存スレハ濁音ヲ發ス

打診ハ腹膜ノ疾ニ於テモ亦頂要ナリ乃チ蔓延性腹膜炎ニ於テハ腸壁甚ク擴張シ且ツ緊張スルヲ以テ往々鼓音消散ス而シ其液性滲出物ハ其分量ニ從ヒ或ハ濁音ヲ發シ或ハ虚音ヲ發ス又腹膜腔ニ漿液蓄積スル者腹水ニ於テハ虚音ヲ發シ患者体位ヲ變スレハ其鈍音ノ境界變換ス

〔丁〕聽診

聽診ハ下腹病診斷法ニ於テ聲價大ナラス或ル患者ニ於テハ聽診ニ由リテ呼吸響及ヒ心音ヲ認メ以テ下腹腔ノ境界ヲ定

ム可キヲアリ胃及ヒ腸内ニ於テ空氣ヲ混スル液汁運動スレバ種々ノ雜音ヲ生ス然レモ之ヲ辨定スルモ毫モ辨別上ニ緊要ナラス又水液ヲ飲下スルノ際胃及ヒ食道ニ起ル雜音ハ其一定ノ部ニ忽然止ミ胃中ニ流入スル響運キニ由リ以テ其水液ノ流通スル管及ヒ孔ノ狹窄ヲ辨別スル一助トナル

二 腸胃病ニ發スル最要ノ症候及ヒ其療法

一 不消化 Dyspepsia

不消化ハ管ニ胃病ノ續症トナリテ起ルノミナラス飲食消化ニ關係ヲ有セサル部ノ疾病ニモ亦發ス熱性諸患ニ於テハ大抵之レヲ發ス食物殊ニ角様物植物纖維彈力纖維ノ如キ不消化物ノ過啖ハ所謂飲食的不消化ヲ起シ易シ設令消食ニ易キ食物モ咀嚼シテ充分細小ナラシメサルカ若クハ其質緻

密ニ過キ消化液竄透シ難キ時ニハ消化シ難シ是ヲ以テ老獸
 ノ肉凝固スル蛋白質物過煮ノ硬肉過熟卵硬固大塊ノ乾酪、儘煮
 ノ澱粉ハ消化シ難シ其他新鮮ナル蒸餅及粗糲ナル澱粉性食
 物ノ消化シ難キ所以モ亦其性粘膠緻密ニ唾液ノ透入シ難
 キニアリ又脂肪ヲ多食シテ胃弱ヲ起ス所以ハ脂肪物ニ胃液
 ノ透入シ難キニアリ又食時ノ際少量ノ飲液ハ能ク食物ヲ
 消化液ト親密ニ混合セシムレモ多飲ハ之ニ反シ消化液ヲ稀
 薄ナラシムルヲ以テ却テ其作用ヲ減却ス
 其他消化力ハ健全家ニ於ルモ各人相異ニ固有ノ特性ヲ有
 ス乃チ或人ハ畢生渾テ消化シ難キ食物及ヒ飽食ヲ痛ク忌避
 シ以テ不消化ヲ防禦シ或人ハ消化力佳良ナリト雖モ一定ノ
 飲食會テ不消化物ニ屬セサモノニ堪ヒ難ク或人ハ飲食ノ度
 チ誤ルモ不消化ヲ起サハルコトアリ

萎黃病家、貧血家、衰弱患者及ヒ快復患者ニ於テ消化力ノ振ハ
 サルハ胃液及ヒ他ノ消化液ノ分泌不及ニ由ルモノナリボ
 モン氏ハ會テ心窩ニ胃瘕ヲ起ス患者ニ試験セシニ熱發ノ際
 ニハ胃液及ヒ他ノ消化液ノ分泌減却シ且ツ一時停止セリト
 云フ然レモウーヘルマン氏ハ會テトレンボルク氏ノ胃切開
 法ヲ行ヒシ一小兒ニ試験セシニ手術ヲ行フノ後數週間發熱
 セシト雖モ其劇熱消化ヲ害スルコト僅微ナリシト云フ又不消
 化ハ胃液ノ成分ニ缺クル處アルヨリ起ルコト屢々之レアルカ
 如シ會テマナスザイン氏ハ熱症ニ罹リ若クハ刺絡ノ爲メニ
 急性貧血ニ陥ル犬ニ試験セシニ其不消化ノ原因ハ胃酸ノ缺
 亡ニアリシト云フロイヘ氏曰ク胃液成分ノ比例障
 碍ニ於テハ胃酸ノ缺亡ヨリ消化異常ヲ起スモノ
 多キニ居ルト且ツ同氏ハ胃消息子ヲ以テ不消化ヲ患フ

ル患者ノ胃ヨリ含容物ヲ取り其單純ノ者若クハ中性胃液素
 水ヲ加ル者ノ中ニ煮タル纖維細片ヲ投スルモ纖維カニ變化スレ
 ば若シ鹽酸二三滴ヲ胃ノ含容物ニ加フレハ十二時乃至廿四
 時ノ後纖維細片全ク溶解ス之ニ由リテ之ヲ觀ルニ方今稱用
 スル胃液素ハ多クハ不消化ノ患者ニ要スルコトナク却テ酸ノ
 缺亡ヲ醫治セスンハアル可ヲサルコト據證セリ是ヲ以テ同
 氏ハ食後一時ヲ經ルノ後鹽酸八滴ヲ水半酒蓋ニ滴シテ投シ
 重症ノ者ニ於テハ食後每四分ノ一時反復與フ可シ又方今藥
 舖ニ醫ク胃液素酒ハ蛋白質ノ消化ニ缺ク可ヲサル物ヲ含ム
 チ以テ食後一茶匙乃至一食匙ヲ投ス可シ又食物長ク胃中ニ
 停滯シ爲メニ腐敗ヲ起ス胃病ニ於テハ防腐ノ目的ニ鹽酸ヲ
 用フ可シ
 又不消化ニ於テ胃酸過剩シ爲メニ胃部ノ腫重、疼痛、灼熱及ヒ

酸性不消化

呑酸嘔吐ヲ起ス者ヲ酸性不消化ト名ク此酸性不消化ノ
 原因ハ皆テツレリッキ氏ノ論セシ如ク異常ノ發酵作用ニアリ
 蓋シ胃中ノ水化炭素ハ一ハ酪酸發酵ヲ起シ其主タル產物ト
 シテ乳酸、酪酸、炭酸及ヒ水素ヲ化生シ一ハ酒精發酵ヲ起シ其
 主タル產物トシテ炭酸及酢酸ヲ化生ス而シテ此發酵作用ノ近
 因ハ詳カナラズ之ヲ要スルニ各人各異ノ状態ニ關スル者ナラ
 ン何トナレハ實驗ニ據ルニ某甲ニ在リテハ此食物某乙ニ在リ
 テ彼食物能ク胃ノ發酵ヲ起シ爲メニ風氣膨脹、壓迫及ヒ呑酸
 嘔吐ヲ來セハナリロイニ氏曰ク胃ノ含容物甚シク酸性ナルモ
 鹽酸缺乏スレハ發酵ノ原トナル(鹽酸缺亡スレハ消化作用停
 止ス)何トナレハ試驗ニ據ルニ鹽酸ノ消化力ハ醋酸ヨリモ十
 倍強盛ナルヲ以テ發酵ノ爲メニ化生スル醋酸ハ鹽酸缺亡ヲ
 償フコト能ハサルヲ以テナリト之ニ由リテ之ヲ觀ルニ通常制

酸劑ヲ投シ過剩ノ酸ヲ中化スルカ爲メニ酸ノ過剩ヨリ起ル患
 苦ハ直チニ沈靜スルモ寧ロ少量ノ鹽酸ヲ投スルノ効績ノ優
 ルニ如カス而シテ重炭酸曹達、曹達水、麻屈涅失亞等ハ異常ノ酸
 酵ヨリ起ル產物ヲ無害ナラシムルヲ以テ姑息ノ効ヲ奏ス
 ルモ異常酸酵ノ原因ヲ抑制スルノ効アルコトナシ
 神經作用障礙ノ能ク消化作用ヲ變換セシムルハ疑ヲ容レサ
 ル所ニシテ飲食消化ノ際非常ニ精神ヲ勞動シ若クハ七情ノ感
 動過甚ナレハ不消化症ヲ來ス此神經作用障礙ノ本性ニ至リ
 テハ吾人尙ホ未タ胃ノ分泌神經ヲ識ラサルヲ以テ之ヲ詳悉
 スルコト能ハス
 眞ノ胃病ニ起ル不消化ハ胃液腺ニモ亦患恙ヲ起シ以テ其機
 能障礙ヲ來スト看做シ難ク却テ他ノ狀態アリ以テ胃液ノ作
 用ヲ妨クルモノナル可シ蓋シ胃ノ筋層衰弱シ若クハ脂肪變

成若クハ膠質變成ヲ起シ加之萎縮ニ爲メニ胃ノ運動衰弱シ
 食物ノ糜爛胃ノ粘膜炎及ヒ胃液ト充分親密ニ相抵觸セサル
 コアリロイベ氏ハ此ノ如キ者ニ電氣ヲ應用セリ其他食物ノ
 停滯ハ胃ノ幽門狹窄ヨリ來ルト胃壁ノ吸收減却ヨリ來ルト
 ノ別ナク消化障礙ノ原因トナル何トナレハ吸收セラル可キ
 一ペプトンヲ長ク胃中ニ留マレハ蛋白質ノ更ニ變化スルノ機
 妨ケラルレハナリ胃ノ吸收機全ク減却スレハ時トシテ胃膨
 大ニ兼テ液性物夥シク蓄積スルコトアリ殊ニ幽門狹窄ヲ起ス
 者ニ然リ然ル時ニハ食物數日乃至數週間胃ニ停滯スルノ後
 纔カニ變化ヲ受ケ軟化シテ嘔吐セラレ或ハ腐敗瓦斯發生シ
 テ以テ腐敗ヲ來ス
 或ル分泌物ハ消化作用ヲ害スルノ力アリ殊ニ胃加答兒ニ於
 ル多量ノ粘液製造是レナリ蓋シ粘液製造過多ナレハ酸性胃

液ノ發生妨ケラレ且ツ粘液ヲ以テ包攝スル食物ニハ胃液透入シ難シ膽汁若シ胃中ニ達スレハ胃液素沈澱スルヲ以テ消化作用止ム

怠慢性不消化 Torpide dyspepsie ナル者アリ是レ胃液腺分泌作用異常ニ寛慢ナルヨリ來ル消化衰弱ノ謂ナリ蓋シ老人及ヒ辛辣料及ヒ酒精ノ過用ニ由リテ胃粘膜ノ刺衝機遲鈍ナル者ニ於テハ食物ノ刺戟ヲ受クルモ胃液ノ分泌充分活潑ナラス此ノ如キ者ニ於テハ胃液ヲ充分ニ分泌センカ爲メニ胃

ノ粘膜ヲ劇シク刺戟スルノ目的ヲ以テ衝動藥就中依的兒赤葡萄酒酒製大黃丁幾複方橙皮越里幾失兒番木甞越幾斯殊ニ酒製番木甞越幾斯ヲ丸劑若クハ水劑トシテ與フヲ與ヒ或ハ括失亞苦味丁幾及ヒ香煎丁幾寬性鉄劑ノ如キ強壯劑ヲ與ヒ冷水法及ヒ海水浴ヲ行フ可シ

附錄

病的食氣變常

〔一〕食氣減却 [Anorexia]

食氣減却ノ輕重一様ナラス或ハ微シク減却スルアリ或ハ全ク止ムアリ或ハ食物ヲ忌避シテ惡心ヲ起スアリ

其原由ハ左ノ如シ〔天〕必シモ病的ナラサル全身狀態ヨリ食氣減却ヲ來ス何トナレハ身體勞動ノ缺亡一事物

ニ於ル連綿タル精神ノ使役常習ノ禁食老人熱帶地方等ノ如キ幾許クカ物質ノ費耗減却スレハ設令病的ナラサルモ身體ハ或ル時日ノ間物質補給ノ需用減却ヲ呈ハセハナリ渾テ局處病及ヒ全身病ノ別ナク物質ノ變成機ヲ變換シ身體形器ノ需用ニ變調ヲ來スタ以テ食氣減却ヲ起ス是レ殊ニ熱性諸患ニ於テ見ル處ナリ然レモ危重ナル全身病ニシテ食氣減却ヲ來

サス却テ輕易ナル局處病ニシテ食氣全ク障碍セラレ加之同一ノ疾病ナルモ其人異ナレハ其狀況全ク相反スルコトアリ〔地〕神經感動ノ變化ヨリ食氣減却ヲ來タス蓋シ神經感動ノ食氣ニ變動ヲ起スハ惡心七情ノ感動疼痛ノ作用及ヒ麻醉藥ノ感動ニ由リテ明カナル處ニシテ曾テフツチエー氏ハ獸類ニ於テ大腦ノ半圓体ヲ截除シ迷走神經ヲ切斷セシニ多クハ食氣歇止セリト云フ

是ヲ以テ中樞神經系病的變換ハ其器質病原ノ詳カナルト〔炎症變成等〕詳ナラサルト〔精神病依ト昆瑤里、歇私帝里、歸心病、神經痛等〕ノ別ナク食氣缺亡ノ原因トナル然レモ疾ト症候ノ間ニ必定ノ關係アルコト非ス故ニ依ト昆瑤里、歇私帝里、家ニ於テハ或ハ食氣缺亡シ或ハ貪喰シ變化定リナシ精神病モ亦一回ハ食氣減却シ一回ハ貪喰シテ飽クコトヲ知ラス

〔人〕食氣減却ノ原因ハ消化器殊ニ胃病ニアリ胃病ハ少ナクモ食氣ニ障碍ヲ起スモノ多シ食氣缺亡ノ原因中殊ニ多キモノハ便秘ナリ

食氣缺亡ハ其原因ノ殊ナルニ從ヒ一過ナルアリ經久ナルアリ其經過中ニ寛快若クハ間歇ヲ呈ハシ或ハ食氣増盛ト相交換シテ起ルアリ

食氣缺亡ヨリ身体形器ニ起ス續症ハ食氣缺亡ノ輕重ト他ノ障碍ノ存否ニ從ヒ其關係一様ナラス蓋シ血液及ヒ諸組織ノ榮養缺亡ハ諸般ノ病症ヲ誘起ス脂肪組織及ヒ筋組織ノ消滅筋力ノ減却、忿恚、神經症ハ食氣缺亡ニ見ル處ノ常症ナリ劇甚ノ者ニ在リテハ血液變調〔血水狀、壞血病狀〕ノ諸症起リ衰弱及ヒ水腫ヲ發ス然レモ或ル神經病及ヒ精神病〔カクレンブシ、鬱憂病〕ニ於テハ食氣全ク缺亡スルモ經久ノ間身体形器ニ害ヲ

起ス。比較的ニ少ナシ
其原因ヲ除キ攝生ニ注意セシメ、尙ホ効ナキ時ハ強壯葉苦味
葉、香煎葉ヲ試用ス可シ

〔二〕病的食氣増盛 [Bulimia, Polyphagia, Fames Canina]

是レ上記ノ食氣減却ニ比スレハ稀レナル一患ニシテ形器ノ需
用ヨリモ食氣ヲ攝取スルヲ過多ナリ

此病患ハ惡習ニ由リテ起ル者多シ或ハ又諸般ノ病患例之胃
變廣、胃壁肥厚、胃癭、腸癭、腸粘膜及ヒ腸絨毛ノ病的變化、乳糜管
及ヒ腸間膜腺ノ病的變化、腸蟲ヨリ來ル腸管刺戟ヨリ發シ、其
他神經系ノ疾例之精神病、殊ニ癡呆、癲癩、依ト昆瑤兒、歇私帝里、
慢性腦水腫及ヒ他ノ慢性腦病ヨリ起ル其他食慾過度ハ妊婦、
結核、密尿病ニ於テモ亦發スルコトアリ然レモ劇甚ノ身体勞
動、重患ノ恢復期、顯著ナル脫血及ヒ脫液ノ後等ニ於テハ食物

過多ナルカ如キモ形器ノ需用増盛ニ由ルヲ以テ茲ニ論ス可
キニ非ス

病的食氣増盛ノ續症及ヒ之ニ兼發スル症候ハ其輕重及ヒ原
因ニ由リテ相異ナリ不良ノ常習ヨリ來ル者ハ經久ノ間特異
ノ障礙ヲ起スヲナシ要スルニ唯食物ノ一部吸收セラレ他ノ
殘餘ハ再ヒ排泄セラル、ニ由ルナラン然レモ動モスレハ胃
腸粘膜ノ急慢性ノ炎症、腸胃ノ變廣及ヒ肥大、肝脾ノ疾病ヲ
起スモノナリ或ル患者ハ肥胖シ或ル患者ハ貪食スルモ尙ホ
羸瘦ス

病的食氣増盛ハ婦人ヨリモ男子ニ多シ小兒ニ於テモ亦之ヲ
見ルコトアリ

療法多クハ困難ニシテ奏スルハ稀レナリ常習ノ過食ニ於
テハ險惡ノ續症ヲ起スヲ思慮シ精神及ヒ身体ヲ勞動シ以テ

克己厲精漸々其常習ヲ矯メシム可シクランス氏及ヒワステル氏ハ嘔吐ヲ挾ミ一患者ニ於テ數週間食禁ヲ嚴ニシ全治セシメタリト云フ病的食氣増盛若シ他患ノ一症候ナル時ニハ其原因タル疾病ヲ尅治スルノ策ヲ行フ可シ乃チ密尿病ノ患者ニ於テハ阿片ヲ與フレハ多クハ他症ト共ニ病的食氣増盛モ亦消散シ胃腸癢ニ於テハ手術ヲ行ヒ病的食氣増盛ノ症止ミ歌私帝里及ヒ依ト昆瑤里ニ於テハ適切ノ療法ヲ行ヒハ止ミ設令止マサルモ輕快ス又唯一過ノ症候ナル時ニハ別ニ治策ヲ要スルヲナシ

〔三〕性質的食氣變換 [Pica, Malacia, Citta, Pseudorexia]

是レ本來食物ニ屬セス唯或ル人民ノ食スル物例之諸般ノ木類、草木ノ葉、菓實、蜥蜴、鼠等ヲ喰フノ謂ナリ然レモ此等ノ食物ハ尙ホ生理區域ニ屬スルモノト看做サスハアル可ラス此

異常ナル食物ノ嗜好ハ婦人就中妊婦、歌私帝里、萎黃病、生殖器ノ疾、月經不整、及ヒ可婚期ニ起ル蓋シ不明ノ神經感動ヨリ來ルモノナル可シト雖モ胃ノ知覺神經ニアルカ將テ神經中樞ニアルカ尙ホ未ダ詳ナラス又或ル患者ニ於テハ不識不覺知天性ニ出ツルヲアリ例之胃酸過剩ナル者粘土、石灰、土、白堊等ヲ嗜シ之ト相反スル病態ニ於テハ醋及ヒ酸類ヲ嗜ムカ如キ之ニ屬ス或ハ又食物ニ適セサルノミナラス却テ害アル物ヲ嗜ムヲアリ是レ亦常習ヨリ起ルヲ屢々之レアリ又瘋癲人ハ食物ヲ辨別スル能ハサルヲ以テ惡心ス可キ物ヲ喰ヒ且ツ病的食氣増盛ト相伴フ或ル患者ニ於テハ兼テ胃痛及ヒ他臟ノ神經症ヲ呈ハスヲアリ

異常ナル嗜好物ノ中其尤モ普通ナル者ハ白堊、石灰、砂土、珈琲豆、木炭、紙、醋、酸類、蠅、蜘蛛、虱、蟾、除、蛇、玻璃、糞、尿等ナリ

此病患ハ妊婦及ヒ萎黃病ニ於ルガ如ク一過ナルアリ或ハ其時日定マラス加之畢生連綿スルアリ其身体ノ健全ニ於ル續症ハ往々備微或ハ全ク缺クルヲアレ他ノ患者ニ於テハ其食物有害ノ性質ヲ具フルヲ以テ便秘、消化器殊ニ食道及ヒ胃ニ器械的損傷、炎症、變廣、穿開ヲ來スヲアリ其療法ハ根治法ヲ行フ可シ乃チ萎黃病、歇私帝里、月經異常、生殖器病ヨリ來ル者ニハ之ニ適切スル治策ヲ行ヒハ大抵治癒ス又上記ノ如ク酸類、亞兒加里劑ヲ嗜ムカ如ク其嗜好却テ適切スル者ニ於テハ患者ノ嗜ム異常物ニ換フルニ醫用製劑ヲ與フ可シ有害物ヲ嗜マハ之ヲ禁止ス可シ若シ其原因判然クヲス若クハ常習ヨリ起ル者ニ於テハ嚴シク説諭ヲ加ヒ常習ノ食物ヲ奪ヒ時宜ニ由リ催嘔藥、吐藥及ヒ下劑ヲ與ヒテ効ヲ奏スルヲアリ

二 胃痛 Cardialgia, Gastralgia.

胃ニ分佈スル迷走神經ノ知覺枝別及ヒ交感神經ノ枝別ハ尙ホ他ノ知覺神經ノ如ク刺衝セラレ其刺衝ハ發作狀ニ來ル疼痛(往々劇痛)ニ由リテ徵知ス可シ此發作ニ次テ疼痛ノナキ間歇時ヲ來シ或ハ輕微ノ胃痛ヲ遺ス然レモ此輕微ノ胃痛ハ神經痛ノ性質ヲ帶ヒス知覺神經纖維ヲ刺戟シテ神經痛ヲ起ス處ノ病的刺戟ハ胃ヨリ起ルヲアリ素因ヲ抱ク者ニ於テハ食物ノ不消化、多量ノ胃酸及ヒ醫藥ハ能ク胃痛ヲ獎起ス其他圓形胃潰瘍ハ一時知覺神經ヲ刺戟シテ神經痛ヲ起シ其疼痛ノ發作ハ特發性胃痛ト區別スルヲ能ハス胃癌モ亦胃痛ヲ挾ニ慢性胃加答兒モ亦胃痛ヲ起ス然レモ慢性胃加答兒ヨリ胃痛ヲ起スハ例外ニ屬ス

胃瘧ヲ起ス處ノ刺戟ハ胃外ニアリテ迷走神經ノ經過ノ或部殊ニ其中樞末端ニ感入スルニ由ルヲアリ之ニ由リテ膈及ヒ脊髓ノ疾ニ於テ中樞刺戟ノ遠心症トシテ胃痛ヲ起ス所以ノ理ヲ辨明ス可シ知覺機過敏ニシテ胃痛ノ原因ヲ抱ク者ニ於テハ指端ノ刺戟及ヒ刺入ノ如キ楚痛ナル感格ノ起ス卒然タル恐怖ハ胃痛ヲ獎起ス或ハ又胃痛ノ原タル病的刺戟頗ル遠隔ノ臟器ヨリ感入スルヲアリ殊ニ婦人ニ於テハ月經子宮病卵巢病ヨリ來ル生殖器ノ刺戟ハ放射 Irradiation ニ由リテ胃ノ知覺神經ヲ刺戟シ以テ胃痛ヲ起スヲアリ醫士此交感性ノ胃痛ヲ誤リテ主患トナシ却テ疾ノ本源ニ注目セサルヲアリ

或ル全身障礙（神經系ノ障礙血液混合障礙全身營養障礙ヨリ胃痛ヲ起スヲアリ然レモ神經軌路ノ孰レノ部ニ刺戟作

用ヲ送クスルカ尙ホ未ク詳カナラス此種ノ胃瘧ハ女子ニ起ルヲ尤モ多ク殊ニ神經性歇私帝里性ノ少女及ヒ婦人ニ發ス萎黃病ヲ患フル者モ亦心窩ニ輕微ノ壓迫及ヒ楚痛ノ感觸ヲ起スザイツ氏ハ曾テ萎黃病患者ニ於テ顯著ナル胃痛發作ヲ目撃セリト云フ其他マリア性諸患痛風及ヒ他ノ惡液病ハ胃痛ヲ誘發ス或ハ胃痛ノ原因全ク詳カナラス死後剖驗スルモノヲ辨明シ能ハサルヲアリ又或ル血族ニ於テハ女子ニ胃痛ノ遺傳スルヲアリ

症候及經過 胃痛ノ發作ハ別ニ誘因ナク起ルヲアリ或ハ攝生不長七情ノ感動月經等ニ由リテ誘起セラル、ヲアリ或ハ又頭痛、惡寒、欠伸、唾液分泌増盛、貪食不知飽、惡心、嘔吐ノ如キ神經症ニ由リテ誘起セラレ若クハ之ト相伴フヲアリ又其發作ノ輕重ハ一樣ナラス其甚シキ者ハ卒然若クハ壓迫ヲ覺

フルノ後心窩ニ劇甚ノ絞痛ヲ起シ其痛背部ニ波及シ眩暈シ
 顔面萎衰シ手足厥冷シ脈細數ニシ間歇シ疼痛増劇シテ患者
 號泣ス胃壁ハ膨脹シテ球狀ニ隆起シ或ハ陷没シテ腹壁緊張
 シ往々上腹部ニ搏跳ヲ認ム試ミニ按壓スルニ患者之ニ堪ヒ
 或ハ患者自ラ心窩ヲ固体ニ衝當シ若クハ手ヲ以テ按壓ス
 此劇痛ハ二三分時乃至半時間持續シ次ヲ漸々ニ減却シ大衰
 脱ヲ遺シ或ハ屢氣嘔吐微汗若クハ赤尿ヲ以テ忽然歇ムトア
 リ
 然レモ胃痛ハ必シモ上記ノ如ク劇甚ナル特異症ヲ呈ハサス
 往々其疼痛劇甚ナラス且ツ發作毎ニ其劇易相異ナルトアリ
 而シテ胃痛ハ具ニ神經的疼痛ノ名ヲ下ス可キカ將々活潑トナ
 ル組織的疼痛之ヲ詳言スレハ炎性刺戟病的胃壁ノ壓迫若ク
 ハ風氣蓄積ニ由ル胃壁ノ緊張ヲ以テ辨明ス可キカ往々疑似

決シ難キトアリ此ノ如キ者ニ於テハ外壓ニ於ル疼痛ノ状態
 其辨別上ニ頗ル緊要ナリ乃チ組織的疼痛ニ於テハ按壓スレ
 ハ増劇シ神經的疼痛ハ之ニ反シ按壓スルモ其痛増劇セス却
 テ輕快ス蓋シ胃痛ノ患者ニ於テ輕々之ヲ按壓スルモ其痛増
 劇シ深壓スレハ甚シク増盛スルコトアリト雖モ是レ特發性
 胃痛ニ於テハ他ノ胃病ノ副症例之胃潰瘍ニ合併スル胃痛ニ
 比スレハ稀レニ見ル處ナリ概シテ胃痛ハ胃ノ器質病ニ關セ
 ズ所謂神經性胃痛ナルカ將々胃痛殊ニ胃潰瘍ヨリ來ルカチ
 辨別シ難キト往々之レアリ殊ニ婦人ニ然リトス蓋シ疼痛ノ
 性質背部胸部ニ放射スル状態等ハ毫モ診斷上ノ證トナヌコ
 足ラス此ノ如キ者ニ於テハ左件ニ由リテ之ヲ判別ス可シ
 胃潰瘍ニ於テハ外壓ニ由リテ疼痛増劇シ神經性胃痛ニ於テ
 ハ輕快ス
 (一)慢性胃潰瘍ニ於テハ間歇時ニ於テモ亦胃部ニ異

常ノ感觸ヲ起シ多少不消化症ヲ呈ハシ神經性胃痛ニ於テハ之ヲ見ス(三)胃痛ニ兼テ他ノ神經痛及ヒ歇私帝里症アレハ其疼痛發作ハ神經性ナルノ徵ナリ(四)胃潰瘍ニ於テハ食物及ヒ不攝生ノ爲メニ疼痛發作ヲ起ス(五)神經性疼痛ヨリ著ルシ經久ノ間疑似決シ難キ者一回ノ吐血ニ由リテ判然胃潰瘍タルヲ識ル可キヲアリ

胆石疝ノ劇痛ハ其部位及ヒ性質共ニ全ク胃痛ニ均シキヲ以テ胆石疝尙ホ未ク黃胆症ヲ呈ハサス大便ニ胆石ノ有無ヲ檢セス既症ヲ探クルモ曾テ胆石疝ノ發作ナキ時ニハ動モスレハ誤診スルノ患アリ

疝痛ハ往々上腹ニ蔓延スレモ其主タル部位ハ中腹部及ヒ下腹部ニアリ且ツ胃痛ニ於テハ嗜睡、惡心、及ヒ嘔吐ヲ起シ疝痛ニ於テハ往々上腹不規、便秘若クハ下利ヲ起ス

療法 根治法ハ萎黃病家及ヒ貧血家ニ於テハ猶豫セス寛性鎮劑ヲ投ス可シ或曰ク萎黃病ノ患者ニ於テハ不消化症及ヒ神經痛ノ發作消散スルヲ待チ鎮劑ヲ與フ可シト固ヨリ誤謬ニ屬ス蓋シ萎黃病ノ不消化症及ヒ胃痛ニ於テハ他藥ヲ與フルモ血質ヲ改良スル藥物ノ如ク速カニ輕快ノ効ヲ奏セスビロモント泉、ドリボルグ泉、ドウ泉ハ偉効ヲ奏ス鐵製劑ハ萎黃病ノ條ニ論スレハ宜シク參考ス可シ交感性胃痛ニ於テハ殊ニ其原因タル子宮病ヲ尅治シ痛風ヨリ來ル者ニハ痛風ニ適切スル攝生法ヲ行ハシメ不消化ヨリ來ル者ニハ胃中ノ有害物ヲ除キ胃酸ヲ製スルノ法ヲ行ヒ時日ヲ定メテ來ル者ニハ規尼涅ヲ與フレハ効アリ歇私帝里家ニ於テハ根治法ノ目的ヲ達ス可キヲ少ナシ

病的療法 トシテ麻醉藥殊ニ莫兒比涅ハ偉効ヲ奏ス甚シク

疼痛ノ發作ニ於テハ心窩ニ皮下注入法トシテ行ヒハ其効最モ確實ナリ歇私帝里家ニ於テハ莫兒比涅ニ阿魏、續草及ヒ葛私篤、僕謨ヲ伍シテ與フ可シ或ハ又番木鱉丁幾ニ等分ノ葛私篤、僕謨丁幾ヲ伍シテ發作間ニ十二滴與レハ其効ヲ奏ス金屬藥中殊ニ次硝酸毘私密篤〇、一乃至〇、三ヲ試用スレモ其効續疑ハシ其他頑固ナル者ニハ硝酸銀、靑酸亞鉛ヲ與ヒ單純胃痛ニ於テハホーレンル氏水ヲ試用ス可シ又ロイベ氏ハ平流電氣ヲ稱用シ積極ヲ心窩ノ疼痛部ニ貼シ消極ヲ左腋下ニ貼シ五分時間乃至十分時間十元乃至五十元ヲ流通セシメタリピアルド氏ハ中樞瓦兒華尼法消極ヲ心窩ニ貼シ積極ヲ以テ頭部、交感神經及ヒ脊柱ニ摩擦スルノ法ヲ行フテ他ノ神經痛ヨリモ其効ヲ奏セリト云フ

三 嘔吐 Vomitus

原因 嘔吐ノ原因ハ嘔吐ノ際殊ニ侵襲セラル、臟器例之胃、橫隔膜、食道及ヒ咽頭ノ知覺神經及ヒ運動神經即チ迷走神經及ヒ橫隔膜神經ヲ侵ス處ノ刺戟ニアリ此刺戟ノ感入スル部或ハ此神經ノ末梢ニアリ或ハ腦及ヒ脊髓ノ中樞末端ニアリ而シ此刺戟ノ作用直達ナルアリ或ハ介達性ニシテ近傍ノ神經纖維ヨリ中樞神經系ニ刺戟ノ傳達スルアリ〔放射〕故ニ嘔吐ノ原因ヲ概シテ左ノ三種ニ區別ス〔一〕嚥下器、胃及ヒ橫隔膜ノ知覺神經及ヒ運動神經ノ末梢ニ刺戟ヲ感入スルヨリ起ル嘔吐〔二〕此諸器ノ知覺神經及ヒ運動神經ノ腦及ヒ脊髓ノ中樞末端ノ刺戟神經幹及ヒ神經軌路ノ或ル點ニ於ル變化モ亦之ニ算ス可シヨリ起ル嘔吐〔三〕放射ヨリ起ル嘔吐是レナリ

〔一〕末梢刺戟ヨリ來ル嘔吐 此末梢刺戟ニ屬スル者ハ咽頭後部ヲ搔痒シ〔初〕ハ惡心後ニハ具ノ嘔吐ヲ起ス〔繼〕

垂ニ粘液固着シテ其延長ヲ來シ以テ咽頭後部ヲ刺戟シ酒客ノ朝間嘔吐ハ半ハ之ニ因ル異物ノ刺入器械的及ヒ化學的刺戟物炎症潰瘍瘰肉及ヒ他ノ新生物ニ由リテ咽頭後部ヲ刺戟スルカ如キ之レナリ

其他尤モ多キハ胃自家ヨリ起ル末梢刺戟ナリ乃チ飲食夥多、飲食物質ノ異常若クハ不真一定ノ食物ニ於ル特異性異物ノ嚥下、藥物毒物〔就中吐酒石胃液ノ性質異常殊ニ胃酸過剩瓦斯、粘液、嚥下ノ唾液、逆流スル胆汁、血液、膿若クハ他ノ病的產物夥シク胃中ニ蓄積スレハ反射運動ノ爲メニ甚シク胃ノ運動ヲ起シ以テ嘔吐ヲ來ス

胃ノ器質變化ノ嘔吐ヲ起ス所以ハ知覺胃神經ニ起ス所ノ刺戟ノミナラス尙オ他ノ副症及ヒ續症殊ニ胃變廣、胃壁肥厚、食物ノ久滯、及ヒ胃分泌ノ變化等ヲ來スニ由ルモノトス蓋シ胃

病ハ嘔吐ヲ來サ、ル者殆ント之レナシト雖モ胃粘膜炎、胃潰瘍、胃癌、幽門狹窄、噴門狹窄、胃變廣及ヒ胃肥厚ハ殊ニ嘔吐ヲ起ス其他外部若クハ近傍ノ腫瘍胃ヲ壓迫スルモ亦均シク嘔吐ヲ起ス又劇咳、嗤笑、吃逆ノ如キ劇甚ナル橫隔膜ノ收縮モ亦胃ヲ壓迫シテ嘔吐ヲ起スモノナリ胃ノ漿膜ノ炎症ニ於テハ近接臟器ト胃癒着シ以テ胃ノ狹窄及ヒ其器械的障礙ヲ起シ爲メニ往々嘔吐ヲ來スヲアリ

〔二〕中樞刺戟ヨリ來ル嘔吐

ブツチエー氏及ヒフアールンチー氏ノ發見ニ據ルニ視神經床、線狀體及ヒ其近傍ノ腦部ヲ刺戟スレハ著ルシキ胃ノ運動殊ニ其膨脹ヲ起セリト云フ〔ブツチエー氏ハ右視神經床ヲ刺戟シテ殊ニ之ヲ目撃セリト云フ〕ホルメック氏曰ク四疊體及ヒ小腦ノ疾病ニ於テモ亦往々嘔吐ヲ起ス之レアリト

蓋シ嘔吐ハ殆ント腦ノ諸患ニ於テ往々見ル處ノ一症ナルハ
 實驗ニ據リ確定スル處ナリ然レモ孰レノ腦部刺戟セラレレ
 ハ殊ニ嘔吐ヲ起ス可キカ之ヲ辨明ス可キ充分ノ實驗アルコ
 ナシブツチエリ氏ノ說ニ據ルニ腦膜炎ニ於テ嘔吐ヲ起ス所以
 ハ視神經床及ヒ線條体ニ水樣軟化ヲ起スニアリト然レモハ
 ノベトゲル氏曰ク腦膜ノ炎症及ヒ滲出物ヨリ來ル迷走神經
 頭腔部ノ刺戟ニ嘔吐ノ歸ス可ラサルハ抑モ何ニ由ルカ予ハ
 其理由ヲ發見スルコト能ハス且ツ腦膜炎ニ於ル嘔吐ハ病初ノ
 一徵候ニシテ將來ノ經過ニ至リ多クハ缺クルヲ以テ觀ルニ嘔
 吐ハ多クハ將來ニ至リ發スル腦質ノ漿液濕潤ニ歸スルヨリ
 寧ロ腦質ニ起ル充血及ヒ滲出物ヲ以テ辨明シ易ク他ノ腦神
 經ノ區域ニ於ル病症モ亦充血及ヒ滲出物ヲ以テ辨明シ易シ
 實驗ニ據ルニ滲出物殊ニ腦底ニ起ル腦膜炎ニ於テ他ノ腦神

經區域ニ於ル病症ヲ起スコトハ殊ニ屢々見ル處ニシテ其他予カ
 見ル處ニ據ルニ視神經床及ヒ線狀體ノ嘔吐ニ真ノ關係ヲ有
 セサルノ證ハ卒中竈及ヒ腦炎竈ハ此部ニ起ルコト尤モ多シト
 雖モ嘔吐ハ決シテ腦膜炎ニ於ルカ如ク頻數ノ一症候ヲサ
 ルヲ以テ明カナリ
 且ツ慢性腦水腫ニ於テハ腦ノ側室ニ起ル液汁ニ由リテ視神
 經床及ヒ線狀體壓迫セラレモ亦均シク嘔吐ヲ起スコト比較
 的ニ稀レナリ之ニ反シ墮落打撲衝突ニ由ル全腦震盪腦ノ刺
 創頭蓋破裂卒然起ル處ノ腦充血若クハ腦貧血(卒倒)腦腫瘍ニ
 於テハ嘔吐ヲ起スコト尤モ多シト
 辨別ニ關シテ之ヲ論スルニ據證ス可キ原因ナキニ反復嘔吐
 ナ起スハ設令腦症頭痛頭眩五官ノ障礙輕微若クハ一過ナル
 モ必ス腦ノ器質病ト疑察ス可シ殊ニ嘔吐容易ニシテ大ナル惡

心ナク起ル時ニ於テ然リトス又眼病劇甚ナル眼刺戟運動體ノ視諦渡航大海ニ於ル船ノ運動海病ニ於テモ亦屢々嘔吐ヲ起ス、ブツチエー氏ハ視神經床及ヒ線狀體ノ刺戟ヲ以テ之ヲ辨明セリ其他七情ノ感動精神ノ勞動依ト昆垓里、歌私帝里、嘔氣ヲ起ス可キ臭氣、嘔氣ヲ起ス可キ物ノ想像、嘔吐人ノ目擊、偏頭痛、顏面痛ノ如キ亦均ク嘔吐ヲ起ス

脊髓病ニ於テハ嘔吐ヲ起スハ頗ル稀レナリ而シテ其嘔吐ヲ起ス者ニ於テハ兼テ腦病若クハ胃患ヲ挾ムニ由ルカ將々然ラサルカ疑團尙ホ未タ冰釋セス曾テバンベングル氏ノ目擊セシ脊髓勞ノ患者ニ於テハ時日ヲ期シテ胆汁様ノ者ヲ嘔吐セシト云フ又迷走神經幹ニ於ル變化モ亦嘔吐ノ原因ト看做ス可キカ判然之ヲ決スルヲ能ハス交感神經ニ於ルモ亦然リ蓋交感神經ハ胃ノ運動作用ニ關係ヲ有スル者ナリ曾テヒルト

ル氏ハ腐蝕加里ヲ以テ胃ノ大陽葉ヲ刺戟シ以テ著ルシク胃ノ運動ヲ増盛セリト云フ

血液混合不良ヨリ嘔吐ヲ起スハ屢々之レアリ然レモ其嘔吐ヲ起スヤ中樞神經系ヲ刺戟スルニ由ルカ將々未梢神經ヲ刺戟スルニ由ルカ尙ホ未タ詳カナラス、バンベルグ氏ハ曾テ犬ノ血管内ニ注射セシニ其注射物ノ毫モ催嘔ノ性質ヲ有セサルモ多クハ嘔吐ヲ起セリト云フ

病的血液變化中殊ニ嘔吐ヲ起スハ尿素及ヒ尿素ノ崩壞產物即チ尿酸、諸謨尼亞夥シク血中ニ蓄積シ以テ其不潔ヲ來スモノ所謂尿毒症是レナリ此症ニ於テハ嘔吐ヲ以テ其一常症トス分泌及ヒ排泄異常ヲ挾ム處ノ肝臟病及ヒ胆道病ニ於テ血中ニ胆汁成分蓄積スル者所謂胆毒症ニ於テモ亦嘔吐ヲ起ス然レモ尿毒症ノ如ク甚シカラス蓋シ此兩患ニ於テ排泄物ノ

血中ニ蓄積スルハ毫モ疑ヲ容ル可ラサル處ナレヒ之ニ由リテ嘔吐ヲ起ス所以ノ方法ニ至リテハ二様ノ關係ヲ有ズ例之尿毒症ニ於テハ病床上ノ觀察ニ由ルニ腦質侵襲セラレ以テ嘔吐ヲ起スハ充分明カナルカ如シト雖モ吐物中ニ尿素及ヒ炭酸諸談尼亞ノ存スルヲ以テ觀ルニ此異物ノ爲メニ胃粘膜直達ニ刺戟セラレ以テ嘔吐ヲ起スモノト辨明ス可シ其他膿毒症、烏病、麻醉藥、金屬藥、依的兒類依的兒、コロルホルム及ヒ瓦斯類、石炭蒸氣ノ吸入、蛇咬ニ由ル血液中毒ニ於テ嘔吐ヲ起スモ亦其理同一ナリ又諸般ノ急性病多クハ其前兆期ニ於テ殊ニ肺炎、室扶斯、急性發疹病ニ發スル嘔吐ハ一ハ血液變調ニ由リ一ハ胃ノ分泌變常ニ由リテ辨明ス可シ或ハ又前徵ノ迅速ナル者ニ於テハ少シク先キニ喰フ食物消化セラレス異常ノ刺戟物トナリ以テ嘔吐ヲ起スナリ

〔三〕交感性嘔吐

迷走神經枝別ノ分佈スル臟器例之外聽道、肺肝ノ疾病ニ於テ嘔吐ヲ起ス所以ハ此神經ノ軌路ニ沿フテ刺戟ノ傳達スルニ由リテ辨明ス可シ其他直達ノ神經連結ナキモ他ノ臟器ヨリ胃ニ交感ヲ來スナリ尙才胃痛ニ於ルカ如シ例之脾、腎、尿毒性血液中毒判然ヲラサルモ殊ニ子宮及ヒ卵巢ノ生理的及ヒ病理的狀態ニ於テ往々嘔吐ヲ起スハ之カ爲メナリ是ヲ以テ嘔吐ニ由リ受胎ヲ徵知ス可キハ屢々之レアリ其他妊娠ノ將來ノ經過中殊ニ妊娠ノ第一月ニ於テ子宮ハ器械的ニ胃ヲ壓迫ス可キ理由毫モ之レナキニ嘔吐ヲ來スナリ又月經異常及ヒ子宮、卵巢ノ器質病モ亦均シク嘔吐ヲ起ス又腸患ニ於ル嘔吐ハ交感性ト看做サスンハアル可ラスト雖モ腸ノ運動亢盛シテ胃ニ波及シ以テ嘔吐ヲ來スナリ例之腸ノ一部ニ狹窄、鉸頓、閉塞、麻痺ヲ起シ他部ニハ運動亢盛

スルカ如キ之レナリ或ハ又腸患ニ胃病ノ合併スルアリ又十
 二指腸ノ疾病粘膜炎潰瘍癌ニ於テハ往々嘔吐ヲ來スコト尙オ
 胃粘膜炎胃潰瘍及ヒ胃癌ニ於ルカ如シ又胃病ヲ除ケハ腹膜
 病殊ニ腹膜炎ノ如ク嘔吐ヲ起ス者アラズ蓋シ其然ル所以ハ
 腹膜ハ胃ニ連續スルヲ以テ腹膜ノ或ル部ニ於ル刺激ハ腹膜
 ノ胃部ニ波及シ直チニ胃漿膜下ニ位スル迷走神經ノ前胃叢
 及ヒ後胃叢ノ枝別ニ運動刺激ノ力ヲ逞フシ以テ嘔吐ヲ來ス
 可シト謂フノ外他ニ辨解スル能ハス
 又嘔吐ノ度数及ヒ其難易ハ各人及ヒ年齢ニ從テ異ナリ極メ
 テ大量ノ吐酒石ヲ與ルモ嘔吐ヲ起サル者アリ劇甚ニ身体ヲ
 勞動シ徒ヲニ長ク嘔吐ヲ試ルニ非サレハ嘔吐モサルモノア
 リト雖モ容易ニ嘔吐シ且ツ速カニ嘔吐シ了ル者多シ小兒ハ
 殊ニ嘔吐ノ傾キアリ乳兒ニ於テハ屢々見ル處ノ一症ニ非

常ニ頻數ナルニ非サレハ病症ト看做シ難シルチエ氏曰ク乳
 兒ノ嘔吐ヲ起ス所以ハ乳兒ノ胃ハ尙オ胎兒ニ類スル固有ノ
 状態ヲ有シ乃チ其本原ナル鉛直ノ位置ヨリ尙オ未タ全ク横
 位ニ變セス胃底ノ發育尙オ極メテ少ナク食道殆ント直接ニ
 左胃端ニ吻合シ胃強ク收縮スレハ其合内容物ノ食道ニ驅出セ
 ラレ易キコト尙オ幽門ヨリ驅出セラル、カ如ク然リト

症候 嘔吐ニハ通常嘔氣惡心胃部ノ充實膨脹及ヒ壓迫ノ感
 覺ノ如キ前兆症前驅シ直チニ唾液混流シ頻回唾ヲ吐キ嘈雜
 シ食道狹窄シ胃部震盪シ横隔膜ノ收縮ニ由ル次テ一頓ニ嘔
 吐シ或ハ快吐スル能ハス數回斷續シ額上ニ冷汗ヲ帶ヒ關節
 震顫シ涙涕ヲ流シ劇甚ナル發作ニ於テハ顔面藍赤色ヲ帶ヒ
 頸靜脈怒脹シ眼球突出シ結膜ニ充血ヲ起シ加之血液滲漏ヲ
 起シ頭痛眩暈耳聾五神錯亂大小便失禁ヲ發シ加之腦出血若

クハ大血管破裂ノ爲メニ忽然人事不省若クハ搖擗ヲ以テ死
亡ニ陥ル發作終ルノ後ニハ通常倦怠、頭痛、頭部昏曠、口内ノ惡
味、唾液分泌増盛、大渴引飲、食道ノ灼熱、腹筋及ヒ横隔膜附着部
ニ於ル疼痛ヲ遺ス

腦患、或ル胃病殊ニ顯著ナル胃變廣ニ起ル嘔吐ハ惡心、嘔氣等
ノ前兆諸徴アルコトナシ又消化不良、幽門狹窄、胃變廣及ヒ他患ニ
於ルカ如ク不消化物若クハ胃ヲ困難ナラシムルモノ吐出セ
ラルレハ却テ爽快ヲ覺ルコト往々之レアリ
劇甚ナル嘔吐ニ於テハ血管破裝ノ外尙オ脱腸ヲ來シ之ヨリ
先キ脱腸ヲ起セシ者疝頓ヲ來シ或ハ内部ノ腸管頓若クハ腸
軸轉戻ヲ起シ或ハ子宮脱ヲ來シ妊婦ニ於テハ墮胎若クハ早
産ヲ來シ胃若クハ食道ニ於テ既ニ潰瘍ヲ起セシ者ニアリテ
ハ其破裂若クハ穿開ヲ來ス又嘔吐反復スレハ胃壁ノ弛緩、胃

粘膜ノ疾患、食氣缺亡、經久ノ便秘、營養障礙及ヒ衰弱ヲ誘起ス
是レ殊ニ小兒及ヒ老人ニ於テ見ル處ナリ

吐物ノ分量、外狀、化學的性質及ヒ顯微鏡的性質頗ル相異ナリ
今左ニ之ヲ概論セントス

〔一〕食物殘片ノ嘔吐 其分量頗ル相異ナル者ニノ胃腔

ノ膨脹ニ於テハ一頓ニ異常ノ多量ヲ吐出ス吐物ノ觀狀ハ胃
中ニ停滯スル時間ノ長短ト消化ノ多少ト粘液若クハ他ノ病
的產物ヲ混スルノ有無トニ由リテ各相異ナリ是ヲ以テ食物
ノ成分尙オ肉眼ヲ以テ認ム可キコトアリ或ハ其全塊形無〔其色
一様ナラス〕糜粥ニ化成シ酸臭若クハ特異ノ臭氣ヲ放ツコトア
リ顯微鏡ヲ以テ之ヲ檢査スルニ肉纖維、結締織、彈力組織、血管
及ヒ神經ノ細片、大小ノ脂肪球、植物纖維、植物細胞、コロロヒ
ル、澱粉球等ヲ認メ時トシテ病的產物例之血球、膿球、胃粘膜及

ヒ食道粘膜組織ノ腐死片ヲ視ルコトアリ其他顯微鏡検査上ニ殊ニ注目ヲ要ス可キハ「サリシナ」ノ存否是レナリ是レグレードシル氏ノ發明セル小体ニシテ其單一ナル者ニ於テハ四箇相集合シ散子形ヲナス處ノ圓細胞其直徑〇、〇〇四ミルリメートル乃至〇、〇〇五ミルリメートルヨリ成ル或ハ此小体二箇以上聚合シテ大ナル聚合体ヲナスコトアリ然ル時ニハ八箇乃至六十四箇若クハ之ヨリ以上ノ細胞ヨリ成ル而シテ「サリシナ」ノ關係ニ就キ諸説紛々尙オ未ダ一定セス多クハ之ヲ病症ト看做スト雖モ或ハ之ヲ非駁スルモノアリ殊ニヒルシヤツ氏ヲ以テ然リトスハンベルグ氏曰ク予カ從來ノ觀察ニ據ルニ多量ノサリシナハ通常酸性ノ反應ヲ呈ハス糜粥ニ混シ殆ソト唯危重ナル胃患殊ニ幽門狹窄、胃腔變廣ノ如キ食物長ク胃中ニ停滯スル者ニ於テノミ其吐物中ニ之ヲ認メタリ然レモ

胃ノ合容器中ニ一二ノサリシナアルモ病的關係ヲ有セスト云フニ至リテハ非議ス可ラスト稀レニハ吐物中ニ他ノ微元例之ツール微元若クハ「トリユラ、セルツキシエ」ニ類似スル者ヲ見ルコトアリ

食物ノ嘔吐ハ關係一様ナラス或ハ胃病ニ發シ或ハ中樞刺激及ヒ交感ニ關スル嘔吐ニ發スルコトアレモ胃病ニ發スル者多シ故ニ反復食物ヲ嘔吐スル者ハ胃病ト疑察ス可シ上記ノ方法ニ由リテ吐物ヲ検査スレハ其原因タル疾患ノ病性及ヒ其療法ヲ正シク判決スルコト得可シ是レ吐物ノ検査ヲ忽セニス可トナル所以ナリ

〔二〕粘液嘔吐 粘液ノ硬軟ニ多少ノ差アリ單純ナルアリ他物ヲ混スルアリ故ニ其觀狀ハ多少粘膠ナルアリ膠狀ヲナスアリ澄明ナルアリ溷濁ナルアリ且ツ其色一様ナラス多ク

ハ胆汁ノ爲メニ綠色ヲ帶フ反復多量ノ粘液ヲ吐物スルハ胃
粘膜炎分泌増盛ノ徵ニノ通常炎症ニ基ク粘膠ニシテ引ク者
ヲ夥シク吐出スルコトアリ胃粘液ト誤ル勿レシレフベリク
氏ノ説ニ據ルニ抱水炭素ヨリ成ル者ニシテ化學的及ヒ顯微鏡
的検査ヲ行ヒハ此誤錯ノ患ヲ免ル可シ

〔三〕水様液嘔吐是レ或ハ胃ヨリ來ルコトアリ然ル時ニハ
多クハ病的ニ變成スル甚シク酸性ヲ帶フ胃分泌物ヨリ成ル
者ナリ或ハツレリックス氏ノ據證セシ如ク嚥下ノ唾液夥シク
吐出セラレ、ヨリ外ナラサルコトアリ乙種ノ者ニ於テハ少シ
ク酸性ヲ帶ヒ或ハ全ク酸性ヲ帶ヒス往々ニ物相混合スルコ
トアリ化學的検査ヲ行フニ甲種ノ者ニ於テハ胃酸ヲ認メ乙種
ノ者ニ於テハ唾液ノ特異成分所謂ロダモン加留母（硫磺酸加
留母）ヲ發見ス

水様液嘔吐ハ單ニ胃ノ神經的若クハ交感的患恙ノ一症候タ
ルコト屢之レアリト雖モ胃ノ器質病殊ニ胃加答兒ノ初起、胃癌
ノ初起及ヒ圓形潰瘍ニ起ルコト屢々之レアリ

〔四〕胆汁嘔吐純粹ノ胆汁ヲ吐クハ稀レニシテ多クハ食物
液汁、粘液等ト混合シ其吐物ニ綠色若クハ黃色及ヒ苦味ヲ附與
ス或ハ又食物ノ成分ニ由リ胆汁ノ如キ色ヲ吐物ニ賦與スル
コトアリト雖モ化學試驗法ヲ以テ胆汁色素及ヒ胆汁華爾兒斯酸
ノ存否ヲ検査スレハ誤錯スルノ患ナシ胆汁嘔吐ハ胆嚢若クハ
胆道ト胃ノ間ニ癭ヲ生シテ相交通スル者ニ於ルノ外毫モ胃
ニ於テ特異ノ關係ヲ有セス或ハ胃ノ器質病ニ起ルコトアリ或
ハ他臟ノ疾ニ起ルコトアリ之ニ反シ顯著ナル幽門狹窄ニ於テ
必ス其吐物中ニ全ク胆汁ヲ見サルヲ以テ他症ト参照スレハ
幽門狹窄ノ辨別ニ必須ノ一徵ト看做ス可シ其他胆汁ノ胃ニ

達スル原因ニ至リテハ尙オ未タ充分詳明ナラズト雖モ胆汁ヲ嘔吐スルノ屢々之レアルヲ以テ觀ルニ蓋シ胆汁ハ頗ル嘔吐セラレ易キカ如シ是ヲ以テ設令多量ノ胆汁ヲ反復嘔吐スルモ他ノ理由アリテ微知ス可キニ非サレハ肝臟及ヒ胆道ノ疾病ト看做ス可ラス或ハ又十二指腸ニ於テ胆道吻合部ノ下ニ狹窄ヲ起シ以テ胆汁嘔吐ヲ起スヲアリ然レモ稀レナル一症ニ屬ス

〔五〕吐血 宜シク胃血及ヒ腸血ノ條ヲ參考スヘシ
 〔六〕吐膿 胃ノ粘膜ハ嘔吐ヲ起ス可キ多量ノ膿ヲ分泌シ能ハサルカ如シ故ニ吐出物膿性ヲ帶ヒ且ツ大量ナレハ必ス胃近圍膿窠ノ胃中ニ穿開スルモノト疑察セズンハアル可ラス
 〔七〕吐糞 此種ノ嘔吐ニ於テハ其吐物糞臭及ヒ糞質ヲ帶ヒ固形ヨリモ液性ノ者多シ其原因多クハ腸ノ下部ノ器械的狹

窄結腸ト胃ノ交通腹膜炎及ヒ室扶斯ニ於ルカ如ク腸ノ一部麻痺シ其上部ノ運動増盛スルニアリバンベルグ氏曰ク予カ曾テ實驗セシ腹膜炎及ヒ室扶斯ノ患者吐糞ヲ起シタレモ死後剖驗セシニ毫モ障碍ヲ發見セザリシ是レ腸ノ一部麻痺シ其上部ノ運動増盛ヲ以テ辨解ス可シト蓋シ眞ノ吐糞病ハ稀レナル一症ナリ而シテ此症ヲ起スニハ注入試験及ヒ眞ニ吐糞ノ發スルニ由リテ明カナルカ如ク廻腸盲腸瓣ノ抗抵ヲ破ラズンハアル可ラス然レモ此抗抵ヲ破ルハ極メテ稀有ニ屬ス
 〔八〕異物嘔吐 諸般ノ嚥下物體腸蟲(蛔蟲及ヒ絛蟲ノ一片胞蟲ノ胞)多クハ肝ヨリ來ル等之レナリ
 〔九〕偽詐嘔吐 故意ニ或ル目的ヲ達センカ爲メ或ハ人ヲ驚嚇セシメシメカ爲メ或ハ精神病殊ニ歇私帝里家ニ見ル者ノ爲メニ詐リテ嘔吐スル者アリ而シテ其吐物ハ頗ル相異ニシ血

液、蟬蛉、生活動物等ヲ吐ス此偽詐嘔吐、ハ往々發見シ難シ
預後 嘔吐ハ却テ僥倖ナル一症ナルヲアリ例之嚙下セラレ
 タル害物不消化ノ食物胃中ニ蓄積スル血液及ヒ胆汁ノ類ヲ
 吐出スルカ如キ之ニ屬ス凡テ胃ノ器質崩壞病ノ一症ナル嘔
 吐ハ危險ナラサルヲ得ス又妊婦小兒老人虛脫家心臟病大血
 管病若クハ脱腸ヲ患フル者ニ於ル劇甚經久ノ嘔吐ハ常ニ警
 戒ス可キ一症ナリ又血液、糞汁、サルシナヲ含ムモノ、尿樣ノ者
 ヲ嘔吐スルハ早晚危險ナリ

療法 有害ノ異物過食ニ過キ消化セサル食物病的ニ變質ス
 ル胃中ニ停滯スル食物及ヒ他ノ有害物ヲ吐出スル者ニ於テ
 ハ之ヲ止ムレハ却テ害アリ是ヲ以テ此ノ如キ者ニ於テハ温
 湯、加密兒列泡劑、温油ヲ與ヒ懸壅垂ヲ搔探シ或ハ吐酒石ヲ投
 シテ嘔吐ヲ助ケ且ツ之ヲ反復セシム可シ害物ヲ吐スルノ後

嘔吐尙ホ連綿スル時ニノミ固有ノ治療ヲ要シ概シ之ヲ論ス
 ルニ嘔吐ハ其原因如何ヲ問ハス(胃血ハ此限ニ非ス)或ハ頻回
 反復シ或ハ力ヲ勞スルニ非サレハ吐スルヲ能ハス或ハ危險
 ニ陥ルノ患アル時ニノミ治療ヲ施スヲ通規トス

嘔吐ノ近因ハ胃自家迷走神經軌路ノ某處若クハ中樞神經器
 ノ知覺刺戟ヨリ來ル胃ノ異常收縮ニアルヲ以テ此刺戟ヲ直
 チニ除却スレハ從テ異常ナル胃收縮ノ原因モ亦自ラ止ム故
 ニ胃ノ内面ヲ刺戟スル有害ノ異物ヲ除却スレハ嘔吐自ラ治癒
 ス且ツ懸壅垂ニ於ル粘液蓄積瘰肉及ヒ延長咽頭及ヒ食道ノ
 異物ハ胃ニ收縮ヲ波及シテ嘔吐ヲ來シ且ツ嘔吐ヲ持續セシ
 ムルヲ以テ器械的療法ニ由リテ除却スルヲ要ス然レモ此ノ如
 キ直達療法ヲ行フ可キ者實ニ僅少ナルヲ以テ概シテ神經系
 統殊ニ胃神經ノ知覺過敏及ヒ之ニ起因スル反射運動ヲ適切

ノ醫藥ヲ與ヒテ減却抑止セスツハアル可ラス實驗ニ據ルニ此目的ニハ左ノ藥方尤モ其効ヲ奏ス

〔一〕炭酸ヲ含ム藥物 例之沸騰散、里歇里飲、曹達水セルテル水、ピリチル水及ヒ他ノ炭酸泉、三鞭酒

〔二〕寒冷冷水、冰水、氷ヲ以テ冷却スル酸性飲料、里謨那埜ノ類ヲ與ヒ或ハ冰片ヲ嚥下セシム可シ胃部ノ冷湯法及ヒ冰罨法ハ適切セス

〔三〕麻醉藥 就中効ヲ奏スルハ老烏利兒水、青酸、莫兒比涅及ヒ他ノ阿片製劑、莨菪木籃ナリ

〔四〕外用藥 麻醉藥ノ皮下用法、香竄藥、衝動藥及ヒ酒精劑、忽布滿氏長壽拔留撒謨揮發塗擦膏、オポデルドフ、捲埜兒精等ヲ胃部ニ塗擦シ硬膏、香竄硬膏、失鳩苔膏、非沃斯硬膏、亞片硬膏等ヲ貼シ經久ノ者ニ於テハ強劇ノ反對刺戟例之乾角法發泡

法ヲ行ヒ巴豆油、吐酒、石膏ヲ擦入スレハ偉効ヲ奏ス、其他單純ハ或刺戟灌腸ヲ行フテ腸ヲ誘導シ或ハ温浴、刺戟脚湯ヲ行ヒ手足ヲ摩擦ス可シ

〔五〕貧血家、歇私帝里家、依卜昆埜兒家及ヒ妊婦ノ嘔吐ハ苦味劑、強壯劑、及ヒ鎮痙劑ヲ與フレハ胃器質病ヲ挾マサル者ニ於テ往々速カニ鎮嘔ノ効ヲ奏ス、乃チ此種ノ患者ニ於テハ橙花、益智、纈草、獸栗、薩薄荷、阿魏、麝香、依的兒類、依的兒油ヲ内服セシメ或ハ灌腸法トシテ行フ可シ或ハ又陳久ナル赤葡萄酒、リキール酒、黑咖啡ノ如キ揮發香竄藥ヲ頻回少量ニ與フレハ効ヲ奏ス、ルコトアリ然レハ劇甚ナル者ニ於テハ麻醉藥ヲ與フ可シ、フルライキス氏ハ神經性嘔吐ニ於テ阿片内服法、灌腸法及ヒ皮下法トシテ用フ、炭酸水、寒冷ノ飲量ヲ與ヒ頑固ナル妊婦ノ嘔吐ニハ麻醉藥ノ外尙オ沃頓丁幾氏ヲ與ヒヘンニヒ氏

ハ冰片鎮劑重炭酸曹達ニ兼テ一日數回番木甞丁幾二滴乃至五滴ヲ與ヒテ効ヲ奏セリト云フバンベゲル氏ハ一婦人胃ノ分泌物甚シク酸性トナリ以テ嘔吐ヲ起セシ者ニ製酸劑ヲ與ヒテ偉効ヲ奏セリト云フ百方治策ヲ行フモ鎮嘔ノ効ナク妊婦之カ爲ノニ危險ニ陷ルノ患アル時ニハ人工分娩法ヲ行フ可シ

〔六〕經久頑固ノ者ニ於テハ或ル藥物ヲ與ヒテ効ヲ奏スルコトアリ然レモ其効ヲ奏スル所以ノ方法詳カナラズ結列屋曹篤〔殊ニ醱酵作用ヲ起シテサリシト發生スル者ニ効ヲ奏スルバンベルゲル氏ハ劇甚ナル尿毒症ノ患者ニ之ヲ與ヒテ効ヲ奏シタレモ他ノ患者ニハ奏効ナカリシト云フ〕沃士丁幾、硝酸銀、少量ノ吐根等之ニ屬ス
嘔吐ノ原因殊ナルニ從ヒ多少其療法ヲ取捨スルヲ要ス是ヲ

以テ吐物殊ニ酸性ナル者ニ於テハ鎮嘔ノ藥物ニ吸收製酸ノ効アル者ヲ伍シ醫藥及ヒ毒物ヨリ來ル嘔吐ニ於テハ姑息藥ニ兼テ特異ノ消毒藥ヲ與ヒ吐血ニ於テハ收斂藥及ヒ止血藥ヲ投ス可シ

嘔吐ノ遠因ヲ除クノ法ハ慢性嘔吐ニ於テハ主策ニノ兼テ上記ノ姑息法ヲ行フ可シ是ヲ以テ胃病ノ療法ヲ行フテ治スル者アリ製酸劑ヲ與ヒテ治スル者アリ下腹痛殊ニ婦人生殖器ノ疾癒ヲ治スル者アリ血液變調癒テ治スル者アリ神経系ノ刺衝過敏減却シテ治スル者アリ其他慢性嘔吐ニ於テ殊ニ注意ス可キハ飲食攝生ナリ

他ノ攝生法ニモ亦注意スルヲ要ス乃チ身体ヲ運動スレハ害アリ唯全然タル安靜ニ由リテ治癒スルアリ或ハ適宜ニ身体ヲ運動シテ効アルアリ或ハ毛布ヲ襲ヒ腹帶セシメ硬膏ヲ貼

以テ胃部ヲ温保シテ効アルコトアリ或ハ冷水ヲ以テ胃部ヲ
 洗ヒ滴浴法ヲ行ヒ冷水浴若クハ海水浴ヲ行フテ効アルコトア
 リ
 上圖ヲ適宜ニシ時宜ニ由リ瀉腸若クハ緩下劑ヲ投シ且ツ患
 者ヲ獎勵シテ精神ヲ慰ム可シ又婦人ニ於テハ殊ニ月經及ヒ
 生殖器ノ異常ニ注目スルヲ要ス又頑固ナル妊婦ノ嘔吐ハ其
 治療頗ル困難ナリ又乳兒ノ嘔吐ハ多クハ食物ノ小兒ノ消化
 力ニ適切セサルカ爲メニ胃腸加答兒ヲ起スヨリ來ルヲ以テ
 殊ニ適切ノ榮養法ヲ行フヲ要ス

四 吐血 Haematemesis.

原因 胃血ノ原因ハ概シテ出血ノ原因ノ如ク理解シ易キア
 リ充分明カナラサルアリ或ハ全ク理解シ難キアリ蓋シ胃損
 傷若クハ震盪鋭尖トハ異物ノ嚥下腐蝕物ノ嚥下ヨリ來ル外

傷性胃血ハ其因テ起ル所以辨解セサルモ亦自ラ明カナリ又
 胃ノ或ル部ニ於テ血行障礙セラレ之カ爲メニ胃液其崩壞作
 用ヲ胃壁及ヒ血管ニ逞クシ〔圓形胃潰瘍、癌腫、荒蕪〕以テ出血ヲ
 起スコトアリ

所謂自發性胃血ハ二原因ヨリ來ル〔一〕血壓増劇〔二〕血管壁
 ノ抵抗力減却是レナリ而シテ此二原因中特リ其一原因力
 ヲ逞クシ或ハ兩因相合併スルアリ然レモ其兩原因相連合ス
 ル者ニ於テハ其一原因殊ニ著ルシキヲ常トス
 血管破裂ノ主原タル血壓増盛殊ニ胃粘膜ノ顯著ナル鬱積性
 充血ニ見ル處ニシテ其鬱積性充血ハ門脈ノトロノボトセ若ク
 ハ壓迫ヨリ來リ或ハ肝臟腫瘍、肝臟硬結 Lebercirrhose ニ於ル結
 締、萎縮、肝管若クハ總管ノ閉塞ヨリ發スル胆道ノ擴張、惡性
 麻刺利亞熱ニ於ル肝鬚細管ノ色素塊填塞ヨリ來ル者ナリ稀

レニハ心肺ノ疾ニ於テ血液胸臟ヲ通過スルノ際障碍ヲ受ケ
 胃粘膜ノ鬱積性充血ヲ起シ以テ其血管ノ破裂ヲ來スアリ
 時トシテ初生兒ニ於テ初生ノ第一日若クハ第一週ニ起ル胃
 血モ亦此種ニ屬ス蓋シ肺ノ膨脹充分ナラサルカ爲メニ胃ヨ
 リ血液還流スルノ機妨ケラル、ヨリ起ル者ナラン然レトモ
 腕近ノ説ニ據ルニ初生兒ノ吐血ハ胃及ヒ十二指腸ノ潰瘍ヨ
 リ起ルト云フ

血管壁ノ抗抵減却シ以テ胃血ヲ誘起スル血管壁ノ變化ニ屬ス
 ル者ハ胃靜脈ノ怒脹、近接セル動脈ノ動脈瘤、預メ胃壁ト癒着
 シ終ニ胃壁ヲ穿開ス、胃血管ノ脂化及ヒ糜爛變成等是レナリ
 其他血液變調ヨリ來ル疾ハ特リ胃血ノミナラス他ノ諸器及
 ヒ組織ニ出血ヲ來スノ傾キヲ有ス、出血質然レモ血管壁ノ變
 化甚ク微細ナルヲ以テ異常ナル血管破裂性ヨリ出血ヲ來ス

カ將ク其出血ハ血液滲漏機ノ亢盛ヨリ來ルカ判然之ヲ辨別
 スルヲ能ハス失荷兒陪苦、血斑病及ヒ白血病ニ發スル出血及
 ヒ劇性傳染病ニ偶發スル出血ノ如キ之ニ屬ス時トシテ月經
 閉止スル者ニ來ル代償的胃血數年間月經時毎ニ發スルヲア
 リ蓋シ胃血ノ殊ニ婦人ニ多キ所以ハ圓形胃潰瘍ノ就中婦人
 多キカ爲メナリ

病体解剖 純粹ナル髮細管的胃粘膜出血ニ於テハ剖驗スル
 モ出血ノ濫觴詳カナラス試ミニ胃血ノ爲メニ斃ル、者ニ於
 テ胃中ノ血液ヲ洗滌シテ其粘膜ヲ檢スルニ尙ホ他ノ身体諸
 部ノ如ク蒼白色ヲナス

胃粘膜ノ充血殊ニ胃加答兒及ヒ胃粘膜鬱血ハ動モスレハ其
 粘膜組織内ニ小ナル髮細管出血ヲ來シ爲メニ圓形ナル斑點
 狀ノ溢血 *Echinosen* ヲ起セモ多クハ全ク障碍ヲ來スヲナシ

然レ此實質出血顯著ナレハ胃液ノ作用ノ爲メニ失肉ヲ起
 ス乃チ茶褐赤色ノ浸潤塊次第ニ細片ニ崩壊シ帽子針大乃至
 麻質大ニノ經界ノ判然タル圓形ノ失肉ヲ遺スト雖ニ淺表ニ
 ノ治癒スルモ多クハ瘢痕ヲ遺スナシ
 所謂出血性侵蝕ハ其數僅少ナルアリ或ハ夥多ナルアリ
 殊ニ幽門部ニ發シ就中粘膜皺襞ノ頂ヲ占ム間々數箇ノ潰瘍
 相混融シ長形若クハ不規形ノ大失肉ヲ起スナリロキタン
 スケー氏及ヒリンドンフライス氏ハ出血性侵蝕ト圓形潰瘍ノ
 發起スル方法ハ同一ナリト云フ説ヲ主張セリ
 圓形胃潰瘍若クハ胃癌ノ爲メニ大血管侵蝕セラレ或ハ靜脈
 怒脹若クハ動脈瘤破裂スルヨリ來ル胃血ニ於テハ血管口徑
 ノ裂口ニ凝血附着スルコアリ
 穿洞胃潰瘍ニ於テハ動脈破裂スルノ前ニ當リ失肉ノ側方ニ

變廣シテ動脈瘤狀ヲナスコト尙ホ空洞ニ於ルカ如クナルコトアリ

患者胃血ノ後暫時ニシテ斃レ出血頗ル多量且ツ迅速ナレハ
 胃中ノ血液赤塊ヲナス出血若シ徐々ニ起リ且ツ血液長ク胃
 中ニ停滯スレハ胃酸ノ爲メニ多少茶褐色若クハ黒色ヲナス
 症候及經過 胃血極メテ少量ナレハ溢血毫モ嘔吐ヲ來サ
 ス故ニ他ノ原因ニ由リ偶然嘔吐ヲ起スニ非サレハ胃血アル
 モ之ヲ知ルコト能ハス血液線狀若クハ斑點狀ヲナシテ少シク
 吐物ニ混シ若クハ吐物平等ニ微血色ヲ帶フルハ出血性侵蝕
 ヲ辨別ス可キ要徴ナリ多量ノ鮮血ヲ嘔吐スルハ出血性侵蝕
 ノ徴ナラス
 出血ノ量顯著ナレハ直チニ嘔吐スルヲ常トス乃チ圓形胃潰
 瘍ノ疑アリシ患者胃部ニ充實及ヒ壓迫ヲ覺ヒ身體軟弱ヲ覺