

臨證指南醫案（五）

臨證指南醫案目

卷五

風

寒

風溫

溫熱

暑

濕

燥

疫

癰癧疹瘻

痰

痰飲

臨證指南醫案卷五

滸關李大瞻翰圃

古吳葉 桂天士先生著

錫山鄒錦曉滋九全較

邵 銘新甫

風

風傷衛

某一風傷衛寒熱頭痛脘悶。

蘇梗一錢 淡豆豉一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

厚朴半錢 連翹半錢

通草一錢

滑石三錢

某一風邪外襲肺衛畏風發熱咳嗽脘悶當用兩和表裏。

此方甚平妥有
先民之風

風傷營
衛誤治

淡豆豉一錢半 蘇梗一錢 杏仁三錢 桔梗一錢半

連翹一錢半 通草一錢

體虛感
風

江五勞倦過月氣弱加外感頭痛惡風營衛二氣皆怯嗽則閃爍筋掣而痛大凡先治表後治裡世間未有先投黃連清裏後用桂枝和表此非醫藥當歸建中湯

沈虛人得感微寒熱參歸桂枝湯加廣皮

經云風爲百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣如兼寒則風寒兼暑則曰暑風兼濕曰風濕兼燥曰風燥兼火曰風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人故曰百病之長也其餘五氣則不能互相全兼如寒不

所列諸案卽俗所謂傷風輕症也


能兼暑與火。暑亦不兼寒。濕不兼燥。燥不兼濕。火不兼寒。由此觀之。病之因乎風而起者自多也。然風能兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。卽密室重帷之中。人若裸體而臥。必犯傷寒之病。此本無風氣侵入。乃但傷於寒而不兼風者也。風能兼寒者。因

熱風是風亦不兼寒

風中本有寒氣。蓋巽爲風。風之性本寒。卽巽卦之初爻屬陰是也。因風能流動鼓盪。其用屬陽。是合乎巽之二爻三爻。皆陽爻也。如炎歎溽暑之時。若使數人搊一人。其人必致汗孔閉。頭痛惡寒。骨節疼等。傷寒之病作矣。斯時天地間。固毫無一些寒氣。實因所搊

之風。風中却有寒氣。故令人受之。寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風而或兼風溫。風濕。風燥。風火等症。更有暑濕燥火四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者。卽屬傷寒。亦有無汗脈緊。骨節疼諸症。此柯氏之書。所以能獨開仲景生面也。至仲景所著傷寒書。本以寒爲主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書。不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當

詳考。華岫雲



寒

寒邪客
肺

某二客邪外侵。頭脹。當用辛散。

當用桔梗

蘇梗

杏仁

桔梗

桑皮

橘紅

連翹

某寒熱頭痛。腕悶。

淡豆豉

嫩蘇梗

杏仁

桔梗

厚朴

枳殼

某五復受寒邪。背寒。頭痛。鼻塞。

桂枝湯加杏仁。

風寒傷
衛
寒邪兼
濕

某十九時邪外襲。衛痺發熱。頭痛。先散表邪。

卷之四

淡豆豉

蘇梗

杏仁

厚朴

木防已

茯苓皮

寒客太
陽膀胱
經氣逆

楊四太陽脈行。由背抵腰。外來風寒。先傷陽經。雲霧自下。及上。經氣逆而病發。致嘔痰涎。頭痛。小洩數行。病解。膀胱氣通。斯逆者轉順矣。當通太陽之裡。用五苓散。倘外感病發。再議。

勞倦陽
虛感寒

某二勞傷陽氣。形寒身熱。頭疼。脘悶。身痛。

杏仁三錢

川桂枝八分

生薑一錢

厚朴一錢

廣皮一錢

茯苓皮三錢

傷寒症。仲景立法於前。諸賢註釋於後。先生雖天資

此卽俗名著生
之症偶爾受寒
之小疾不入經
絡之病也。何以
牽引傷寒、大症
發諸議論及細
問此編竟無治
傷寒一門。卽此
數方爲傷寒之
法。不禁失笑。夫
醫者之學問全
在明傷寒之理。
則萬病皆通。故
仲景之書只有
二種傷寒論。治
傷寒之法也。今
而金匱之方。則
又半從傷寒。而
論中來。則傷寒

穎敏。若擬其治法。恐亦不能出仲景範圍。其所以異
於庸醫者。在乎能辨症耳。不以冬溫春溫風溫溫熱
濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症。誤認爲傷寒。其治溫
熱暑濕諸症。專辨邪之在衛在營。或傷氣分。或傷血
分。更專究三焦。故能述前人溫邪忌汗。濕寒忌汗。當
用手經之方。不必用足經之藥等明訓。垂示後人。此
乃先生獨擅見長之處也。若夫傷寒之書。自成無已
註解以後。凡註疏者。不啻數百家。其尤著者。如嘉言
三書。景岳書傷寒三註。四註等篇。近有柯韻伯來蘇
集。傷寒論翼。方翼。王晉三古方選註中。所解一百十

乃病中之第
症而學醫者之
第一功夫也。今
此編獨闢此
門則平日所習
何書所治何症
耶此者數十年
醫道大行豈無年
數千百大症經
于乃竟祇錄此
數方以了局
非此老之過失
編書之人胸
茫無定見耳

三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景
之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參
究庶乎臨症可無誤矣。華岫雲

傷寒一症。內經云熱病者皆傷寒之類也。又曰。凡病
傷寒而成溫者。无夏至日者爲病溫。後夏至日者爲
病暑。又曰。冬傷於寒。春必病溫。其症有六經相傳。併
病合病。兩感。直中。難經。又言傷寒有五。有中風。有傷
寒。有濕溫。有熱病。有溫病。其所苦各不同。再加以六
淫之邪。有隨時互相兼感而發之病。且其一切現症。
則又皆有頭痛發熱。或有汗無汗。或惡風惡寒。不食。

倦臥煩渴等。則又大略相同。故其症愈多。其理愈晦。
毋怪乎醫者臨症時。不能灼然分辨。卽其所讀之書。
前人亦並無至當不易之論。將靈素難經之言。及一
切外感之症。逐一分晰辨明。使人有所遵循。故千百
年來。欲求一鑒垣之士。察六淫之邪。毫不紊亂者。竟
未見其人。幸賴有仲景之書。以六經分症。治以汗吐
下和寒溫諸法。故古人云。仲景之法。不但治傷寒。苟
能悉明其理。卽治一切六氣之病。與諸雜症皆可融
會貫通。無所不宜。此誠屬高論。固深知仲景者也。然
余謂六淫之邪。頭緒甚繁。其理甚奧。卽彙集河間東

垣丹溪及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。
若沾沾焉必欲但拘仲景之法而施治。此乃見聞不
廣。膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。傷寒之
法。固屬無多。然其辨明冬溫春溫。風溫溫熱濕溫之
治。實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。觀者
幸毋忽諸。華玉堂

肺 風溫傷

風溫

僧五二近日風溫上受寸口脈獨大肺受熱灼聲出不揚先與辛涼清上當薄味調養旬日。

牛蒡子

薄荷

象貝母

杏仁

冬桑葉

大沙參

南花粉

黑山梔皮

楊 樣 脈左實大頭目如蒙清竅不爽此風溫仍在上焦擬

升降法

乾荷葉

薄荷

象貝

連翹

鈎藤

生石膏末

某風溫從上而入。風屬陽。溫化熱。上焦近肺。肺氣不得舒轉。周行氣阻。致身痛。腕悶。不飢。宜微苦以清降。微辛以宣通。醫謂六經輒投羌防。泄陽氣。劫胃汁。溫邪忌汗。何遽忘之。

杏仁

香豉

鬱金

山梔

瓜蔞皮

蜜炒橘紅

葉
風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔頭脹咳嗽。發
疹。心中懊憹。脘中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結痺。宿有
痰飲。不欲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮

豆豉

杏仁

黃芩

瓜蔞皮

枳實汁

郭

風溫入肺氣不肯降形寒內熱胸痞皆贍鬱之象辛

涼佐以微苦手太陰主治

黑山梔

香豉

杏仁

桑葉

瓜蔞皮

鬱金

風溫化
燥熱

秦

六、三體質血虛風溫上受滋清不應氣分燥也議清其上

石膏

生甘草

薄荷

桑葉

杏仁

連翹

又 照前方去連翹薄荷加陳蔞皮鬱金梔皮

某 風火上鬱耳後結核目眶痛

少陽風

陰
風溫傷

薄荷

牛蒡子

前胡

象貝

連翹

黑梔皮

赤芍

生甘草

某

風溫熱伏，更劫其陰。日輕夜重，煩擾不寧。

生地

阿膠

麥冬

白芍

炙草

麋漿

馬三五風溫、熱灼之後，津液未復，陽明脈絡不旺，骨酸背楚。
治以和補。

生黃芪

鮮生地

北沙參

玉竹

麥冬

歸身

蜜丸

某

陰虛風溫，氣從左升。

桂枝湯加花粉杏仁

風爲天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。先傷上焦。
種種變幻情狀。不外乎三陰爲病。數頭、眼、汗出、身熱、
咳嗽必然並見。當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫。
消散劫燥清津。太陰無肅化之權。救逆則有蔗沖蘆
根、玉竹門冬之類也。苦寒沉降。損傷胃口。陽明頓失
循序之司。救逆則有復脈建中之類。大凡此症驟變
則爲痙厥。緩變則爲虛勞。則主治之方。總以甘藥爲
要。或兼寒。或兼溫。在人通變可也。

邵新甫

卷之三

三

溫熱

肺溫邪入

某十二脈數暮熱。頭痛腰疼。口燥。此屬溫邪。

連翹

淡豆豉

淡黃芩

黑山梔

杏仁

桔梗

某溫邪化熱。肺痺喘急。消渴胸滿。便溺不爽。肺與大腸見症。

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝積勞傷陽。衛疎溫邪上受。內入乎肺。肺主周身之氣。

氣窒不化外寒似戰慄其溫邪內鬱必從熱化今氣短
胸滿病邪在上大便瀉出稀水肺與大腸表裏相應亦
由熱迫下泄耳用辛涼輕劑爲穩

杏仁

桔梗

香豉

橘紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

龔

襁褓吸入溫邪釀爲肺脹危症

蘆根

桃仁

苡仁

冬瓜子

施久患虛損原寢食安舒自服陰柔膩補不但減食不
寐院中常悶渴欲飲涼此口鼻吸入溫邪先干於肺悶
補則邪愈熾氣機阻塞弱質不敢開泄援引輕揚肅上
此者造日無人能知

兼以威喜丸。淡以和氣。止焦得行。可進養胃法。

白沙參

苡仁

天花粉

桑葉

鬱金

兼服威喜丸

王

溫邪發熱。津傷。口糜。氣穢。

捲心竹葉

嘉定花粉

知母

麥冬

金石斛

連翹

宜再加氣分藥

某春溫身熱。六日不解。邪陷劫津。舌絳骨節痛。以甘寒

熄邪。

竹葉心

知母

花粉

滑石

生甘草

梨皮

津
溫邪劫

丁 口鼻吸人熱穢。肺先受邪。氣痺不主宣通。其邪熱由中及於幕原。布散營衛。遂爲寒熱。既爲邪踞。自然痞悶。不飢。雖邪輕。未爲深害。留連不已。熱蒸形消。所謂病傷漸至於損而後已。桂枝白虎湯。

又 氣分之熱。稍平。日久胃津消乏。不飢不欲納食。大忌香燥破氣之藥。以景岳玉女煎。多進可效。忌食辛辣肥膩。自安。竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮。

楊 息邪發熱。煩渴。知飢無寐。乃胃津受傷所致。擬進竹

葉石膏湯加花粉。

葉 熱傷氣分。用甘寒方。白虎湯加竹葉。

某右脈未和。熱多口渴。若再劫胃汁。怕有腕痞不飫之
事。當清熱生津。仍佐理痰。俟邪減便可再商。

麥冬

人參

石膏

知母

粳米

竹葉

半夏

葉二八仲景云。陰氣先傷。陽氣獨發。不寒癰熱。令人消爍。肌肉條例下不註方。但曰以飲食消息之。後賢謂甘寒生津。解煩熱是矣。今脈數舌紫渴。飲氣分熱。邪未去。漸次轉入血分。斯甘寒清氣熱中。必佐存陰爲法中之法。

生地

石膏

生甘草

知母

粳米

白芍

竹葉心

宣肺加桂枝或他風藥三味

熱入心
營

毛十六溫邪熱入營中。心熱悶脇肋痛。平素痰火與邪膠結。
致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

生地

麥冬

杏仁

鬱金汁

炒川貝

橘紅

馬少陰伏邪津液不騰。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解。
血中伏氣莫使液涸。

犀角

生地

丹皮

竹葉

元參

連翹

陳姬熱人。膻中夜煩無寐。心悸怔舌。絳而乾。不嗜湯飲。乃
營中之熱。治在手經。

犀角

鮮生地

黑元參

連翹

石菖蒲

炒遠志

又 鮮生地

元參

天冬

麥冬

竹葉

茯神

金箔

又 腸升風動治以鹹寒。

生地

阿膠

天冬

人參

川斛

茯神

麥冬

張 營絡熱心震動復脈湯去薑桂參加白芍

心胞入
熱邪

陸 六九年熱病八九日舌燥煩渴譫語邪入心胞絡中深。
怕液涸神昏當滋清去邪兼進牛黃丸驅熱利竅。

竹葉心

鮮生地

連翹心

元參

犀角

石菖蒲

胡

脈數舌赤耳聾胸悶素有痰火近日冬溫引動宿病
加以勞復小溲不利議治胞絡之熱

鮮生地

五錢

竹葉心

一錢

丹參

一錢半

元參

一錢半

石菖蒲根

六分

陳膽星

六分

顧

溫邪悞表劫津邪入胞絡內閉

至寶丹

王

吸入溫邪鼻通肺絡逆傳心胞絡中震動君主神明
欲迷瀉漫之邪攻之不解清竅既蒙絡內亦痺幼科不
解投以豁痰降火理氣毫無一効憶平脈篇清邪中上

肺位最高。既入胞絡。氣血交阻。逐穢利竅。須藉芳香。議用局方至寶丹。

施溫邪如瘧。陰氣先傷。苦辛再傷陽及胃。內風肆橫。肢掣癲癇。邪閉心胞絡中。痰潮神昏。乃熱氣蒸灼。無形無質。此消痰消食清火。竟走腸胃。與病情隔離。搔癰速速。與至寶丹三分冷開水調服。若得神清。再商治法。

顧

飲酒又能納穀。是內風主乎消爍。當春盡夏初。陽氣弛張。遂致偏中於右。診脈左弦且堅。肌腠隱約斑點。面色光亮而赤。舌胎灰黃。其中必來伏溫邪。所怕內閉神昏。治法以清絡宣竅。勿以攻風劫痰。扶助溫邪。平定廓

此是類中風。可
以入溫熱門

清糞其帶病久延而已。

犀角

生地

元參

連翹心

鬱金

小青葉

竹葉心

石菖蒲

又

目瞑舌縮神昏如醉邪入心胞絡中心神爲蒙謂之內閉前案已經論及溫邪鬱蒸乃無形質而醫藥都是形質氣味正如隔籜搔癢近代喻嘉言議謂芳香逐穢宣竅頗爲合理絕症難挽天機用意聊盡人工。

至寶丹 四丸勻四服涼開水調化

熱邪閉
竅神昏

句

老年下虛春溫上受痰潮昏譫舌絳黃苔面赤微瘡

先清上焦

天竺黃

金銀花

竹葉心

連翹

竹瀝

張

溫邪自裏而發。喉腫口渴。舌心灰滯。上焦熱蒙。最怕

竊閉昏瘡。苦寒直降。攻其腸胃。與溫邪上鬱無涉。

連翹

黑梔皮

牛蒡子

杏仁

花粉

馬勃

瓜蔞皮

夏枯草

金汁

銀花露

張

遇歲內未得穀味精華。溫邪吸入。上焦先受。頭面頤

領腫浮。邪與氣血混處。刀針破傷。經絡溫邪內閉熱壅。

蔓延三焦。昏寐痰潮。舌刺卷縮。小溲點滴。渾濁熱氣結

錮在裏。但膏連芩梔之屬。藥性直降。竟由胃達腸而熱

氣如烟如霧。原非形質可蕩可掃。故牛蒡產自牛腹。原

從氣血而成混處氣血之邪藉此破其蘊結是得效之
因由也夫溫熱時癘上行氣分而漸及於血分非如傷
寒足六經順傳經絡者大抵熱氣鴟張必薰塞經絡內
竅故昏躁皆裏竅之欲閉欲宣內閉須得芳香氣血久
鬱必致瘍毒內攻謹陳大意叅末議用紫雪丹三分微
溫開水調服

褚溫邪中自口鼻始而入肺爲咳喘繼傳膻中則嘔血
乃心營肺衛受邪然邪在上焦壅遏阻氣必聚爲熱痰
臭嗆渴是欲內閉惜不以河間三焦立法或謂傷寒主
六經或謂肺癰專泄氣血致熱無出路胸突腹大危期

至速矣。卽有對病藥餌。氣湧沸騰。勢必湧吐無餘。焉望有濟。夫溫熱穢濁。填塞內竅。神識昏迷。脹悶欲絕者。須以芳香宣竅。佐牛黃金箔深入臟絡。以搜錮閉之邪。今危篤若此。百中圖一而已。紫雪丹。

陳 溫邪逆傳。膻中熱痰蔽阻。空竅所進寒涼消導。徒攻腸胃。毫無一效。痰乃熱薰津液所化。膻中乃空靈之所。是用藥之最難。至寶丹芳香通其神明之竅。以驅熱痰之結極。是但稛年受溫邪。最易陰虧津耗。必兼滋清以理。久伏溫邪爲正。

犀角

鮮生地

元參

連翹心

丹皮 石菖蒲 化服至寶丹

某濕爲漸熱之氣，迷霧鬲間，神機不發。三焦皆被邪侵，
豈是小恙？視其舌伸縮如強痰涎粘著，內閉之象已見。
宣通膻中，望其少甦，無暇清至陰之熱。

至寶丹四分大、多、分 石菖蒲金銀花湯送下

王十八夜熱早涼，熱退無汗，其熱從陰而來，故能食形瘦脈
數，左盛，兩月不解，治在血分。

生龍甲 細生地

知母

丹皮 淡竹葉

許溫邪已入血分，舌赤音低，神呆潮熱，即發斑疹，亦是

熱陷血分

血中熱邪，悞汗消食，必變昏厥。

犀角

細生地

元參

丹皮

鬱金

石菖蒲

陰入厥

張

舌絳裂紋，面色枯槁，全無淖澤，形象畏冷，心中熱焚。

邪深竟入厥陰，正氣已經虛極，勉擬仲景復脈湯，合乎

邪少虛多治法，復脈去人參生薑加甘蔗汁代水煎

又 热病悞投表散消導，正氣受傷，神昏舌強，勢如燎原。

前進復脈法略有轉機，宜遵前方去桂加參以扶正氣

爲主。復脈湯去桂加人參甘蔗汁代水煎藥。

又 進甘藥頗安，奈陰液已涸，舌強音縮，撫之乾板，較諸

已前齶肉映血有閼。小便欲解掣痛。猶是陰氣欲絕。欲寐昏沉。午間煩燥。熱深入陰之徵。未能穩許愈期也。

生白芍

炙甘草

阿膠

雞子黃

人參

生地

麥冬

炒麻仁

悞下熱
陷成結
胸

某

悞下熱陷於裏而成結胸。所以身不大熱。但短氣。胸滿。煩躁。此皆邪熱內燔擾亂神明。內閉之象。棘手重恙。倣仲景瀉心法備參末議。再候明眼定裁。

川連

黃芩

半夏

炮淡乾薑

生薑

枳實

悞治傷
胃津液

吳

神氣如迷。不飢不食。乃苦辛消導發散。劫奪胃津所

致蓋溫邪手經爲病。今世多以足六經主治。故致此。

細生地

竹葉心

麥冬

元參心

連翹心

鬱金

王嫗溫熱十三日舌黃心中悶痛初病手經不當用足經方老人怕其液涸甘寒醒胃卻熱

鮮生地

竹葉心

麥冬

鬱金

川斛

菖蒲根

冬溫傷
液

吳十五近日天未寒冷病虛氣不收藏所感之邪謂冬溫參苓益氣薄荷桔梗杏仁泄氣已屬背謬加補骨脂溫滯腎臟尤不通之極自述夜寐深更黎黎有汗穉年陰不

充陽易泄。論體質可卻病。

桑葉

大沙參

玉竹

苡仁

生甘草

糯米湯煎藥

陳成半冬溫入肺。膠痰化熱。因未納穀之身。不可重藥消痰。
通利。

炒麥冬 桑葉

大沙參

甜杏仁 地骨皮

某 脈數右大。煩渴舌絳。溫邪氣血兩傷。與玉女煎。

生地

竹葉

石膏

知母

丹皮

甘草

溫邪
陰虛感
傷氣血兩

陳成三陰虛溫邪。甘寒清上。

白沙參

甜杏仁

玉竹

冬桑葉

南花粉

生甘草

關

陰虛

挾溫邪，寒熱不止。雖不宜發散消食，徒補亦屬

無益。擬進復脈湯法。

炙甘草

阿膠

生白芍

麥冬

炒生地

炒丹皮

青甘蔗汁煎

黃體虛溫邪內伏，頭汗淋漓，心腹窒塞，上熱下冷，舌白煩渴。春陽升舉爲病，猶是冬令少藏所致。色脈參視極

當謹慎。

阿膠

生地

麥冬

生牡蠣

卷五
生白芍

茯苓

勞倦感
溫陰液
燥

張五

勞倦內傷。溫邪外受。兩月不愈。心中溫。溫液液津液。

無以上供。夜臥喉乾燥。與復脈湯去薑桂參三服後可。

加參。

汪

勞倦更感溫邪。陽升頭痛。寒熱戰慄。冷汗。邪雖外達。

陽氣亦泄。致神倦欲眠。舌赤黃。胎口不知味。當以育陰除熱爲主。辛散苦降非宜。

復脈湯去參薑桂麻加青甘蔗漿

曹

脈促。數舌白不飢。寒熱汗出。初起腹痛。臍右有形。乃久傷勞倦。復感溫邪。今病兩旬。又六微咳。有痰。並不渴。

虛
勞倦感
溫營衛

胃陽兼

飲寒來微微齒痙此營衛一氣大衰恐延虛脫議固衛

陽冀寒熱得平

黃芪

桂枝

白芍

炙甘草

牡蠣

南棗

病退胃
不和

陳

熱病後不飢能食不寐此胃氣不和

香豉

黑山梔

半夏

枳實

廣皮白

華

五

口鼻受寒暄不正之氣過募原擾胃系寒熱已罷猶

不飽不飢舌邊赤中心黃餘邪未清食入變酸乃邪熱
不勝穀以溫膽和之半鹽溫膽去甘草茯苓枳實加鬱

金黑山梔

熱毒壅
結上焦

林氏

腹滿已久。非是暴症。近日面頸腫脹。牙關緊閉。先有

寒熱隨現。是象診脈右搏數。左小。乃溫邪觸自口鼻。上焦先受。氣血與熱膠固。致清竅不利。條有痺塞之變。理當先治新邪。况頭面咽喉結邪。必辛涼輕劑以宣通。若藥味重濁。徒攻腸胃矣。倣東垣普濟消毒意。

連翹

牛蒡子

馬勃

射干

滑石

夏枯草

金銀花露

金汁

席 陰虛邪
伏 气
脈左數。右緩弱。陽根未固。陰滯癱涸。舌赤微渴。喘促。自利洩數。晡刻自熱。神煩囁語。夫溫邪久伏少陰。古人立法全以育陰祛熱。但今見症。陰分固有伏邪。真陽亦

不肯收納。議倣劉河間濁藥輕投。不爲上焦熱阻。下焦根蒂自立。冀其煩躁熱蒸漸緩。

熟地炭

茯苓

淡蓬蓉

遠志炭

川石斛

五味子

飲子煎法

又

晚診陰中伏邪。晡時而升。目赤羞明。舌絳而渴。與育

陰清邪法。

生地炭

元參心

川石斛

炒麥冬

犀角

石菖蒲

又 脈左數右軟。舌乾苔白。小溲淋瀝。吸氣喘促。煩汗腎陰不承。心神熱灼。蒙閉。議以三才湯滋水制熱。三才加

苗神黃柏金箔，晚進周少川牛黃清心丸一服。

又 昨黃昏後診脈較諸早上左手數疾頓減惟尺中垂而仍動囁語不已若有妄見因思腎熱乘心膻中微閉神明爲蒙自屬昏亂隨進周少川牛黃丸一服俾迷漫無質之熱暫可泄降服後頗安辰刻診脈濡小形質大衰舌邊色淡下利稀水夫救陰是要旨讀仲景少陰下利篇上下交征此症恐不治關間欲撒必以揩塞陽明爲治以陽明司閩有開無闔下焦之陰仍從走泄矣議用桃花湯。

人參

赤石脂

炮薑

白粳米

又 晚服照方加茯苓

又脈左沉數。右小數。暮熱微汗時煩。辰刻神清虛邪仍留陰分。議用清補。

人參

茯苓

川石斛

炙甘草

黑穧豆皮

糯米根鬚

又金匱麥門冬湯

細詳諸案俱是
少
熱邪誤治入臟
之壞症居多時
邪溫熱之症絕

陰
酒熱兼
熱傷

程二溫熱病已集少陰之陰。少壯陰未易復者。恰當夏令發泄。百益酒釀造有灰辛熱劫陰泄氣致形體頽然藥難見效。每日餌雞距子生用其湯飲用馬料豆湯。

冬傷於寒春必病溫者重在冬不藏精也蓋煩勞多慾之人陰精久耗入春則裏氣大泄木火內燃強陽

無制燔燎之勢。直從裏發。始見必壯熱煩冤。口乾舌燥之候矣。故主治以存津液爲第一。黃芩湯堅陰卻邪。卽此義也。再者在內之溫邪欲發在外之新邪。又加葱豉湯最爲捷徑。表分可以肅清。至於因循貽悞。豈止一端。或因氣燥津枯。或致陰傷液涸。先生用挽救諸法。如人參白虎湯。黃連阿膠湯。玉女煎。復脈法。申明條例甚詳。餘則治癰厥以甘藥緩肝。昏閉用幽芳開竅。熱痰之溫膽蓄血而論通瘀。井井有條。法真。

周到
邵新甫

暑

暑傷氣
分上焦
閉鬱

某

大凡暑與熱乃地中之氣吸受到病亦必傷人氣分。
氣結則上焦不行下脘不通不飢不欲食不大便皆氣
分有阻如天地不交遂若否卦之義然無形無質所以
清之攻之不效。

杏仁

通草

象貝

栝蔞皮

鬱金汁

白蔻

姚奔走氣亂復飲燒酒酒氣辛熱有升無降肺氣贖鬱
上下不通舌自消渴氣結自胸及腹澼澼自利不爽周

身膚腠皆痛。汗大出不解。無非暑濕熱氣。始由肺受。漫布三焦。羣醫消導苦藥。但攻腸胃。在上痞結仍然。議淡滲佐以微辛。合乎軒岐上病治上之方。

此方無著落
西瓜翠衣

川白通草

大豆黃卷

馬兜鈴

射干

苡仁

范

伏暑阻其氣分。煩渴。咳。嘔。喘急。二便不爽。宜治上焦。

杏仁

石膏

炒半夏

黑梔皮

厚朴

竹茹

痰多咳嗽。是暑鬱在上。醫家亂投沉降。所以無效。

石膏

杏仁

炒半夏

鬱金

香豉

黑山梔

王舌白煩渴心中長悶熱邪內迫氣分阻閉當治肺經。
倘逆傳膻中必致昏厥。

杏仁

鬱金

滑石

黃芩

半夏

橘紅

枯萎皮

陳因暑濕傷氣肺先受病諸氣皆痺當午後陽升煩喘更
加天無形氣病醫以重藥推消多見不效。

西瓜翠衣

活水蘆根

杏仁

苡仁

又酒客中虛重鎮攻消清氣愈傷夫暑邪皆著氣分苟
肺司清肅則其邪不攻自罷議仍以廓清爲法若雨露

從天下降。炎燄自蕩掃無餘。威喜丸二錢十服。

某二身熱。頭脹悶。咳嗆。此暑邪外襲於肺衛。當清上焦。

絲瓜葉

三錢

大杏仁

三錢

香薷

七分

通草

一錢半

飛滑石

三錢

白蔻仁

五分

陳 脈左勁右濡。頭痛。腕悶。麻痺。欲厥舌白。此暑邪內中。

蒙閉清空成瘧之象。平昔陰虛勿犯。中下二焦。

嫩竹葉

連翹

飛滑石

野鬱金汁

大杏仁

川貝母

龔二脈寸大頭暈。脘中食不多下。暑熱氣從上受。治以苦

辛寒方。

竹葉

杏仁

鬱金

滑石

香豉

山梔

張四七三瘧之邪在陰未經向愈春季洞利不食想春雨外濕水穀內聚亦濕卽濕多成五泄之謂瘡痍僅泄經隧濕邪而裏之濕邪未驅長夏吸受暑邪上蒙清空諸竅咳嗽耳聾的係新邪非得與宿病同日而語

連翹

飛滑石

嫩竹葉

荷葉邊汁

桑葉

杏仁

象貝

黑山梔

程三暑風必挾濕。濕必傷於氣分。斷瘧瘡發。卽濕邪內發之徵。濕伏熱蘊。致氣壅塞咽底脘中。及至進穀無礙。二

便通調中下無病顯然。

白通草、西瓜翠衣、活水蘆根、苡仁、

吳連朝驟熱必有暑氣內侵頭熱目暝吸短神迷此正虛邪癥清補兩難先與益元散三四錢用嫩竹葉心二錢煎湯涼用三四小杯常用菜豆煎湯服

龔六暑必挾濕二者皆傷氣分從鼻吸而受必先犯肺乃上焦病治法以辛涼微苦氣分上焦廓清則愈惜乎專以陶書六經看病仍是與風寒先表後裏之藥致邪之上漫延結錮四十餘日不解非初受六經不須再辨其謬經云病自上受者治其上援引經義以論治病非

邪僻也。宗河間法。

杏仁

桔梗皮
半夏

薑片

白蔻仁

石膏

知母

竹瀝

秋露水煎

不入膏藥

又脈神頗安。昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當此無汗。肌腠氣窒。至膚間皮脫如皴。猶未能全泄其邪。風疹再發。乃濕因戰慄爲解。一月以來。病魔而肌無膏澤。瘦削枯槁。古謂瘦人之病。慮涸其陰。陰液不充。補之以味。然腥擅濁味。徒助生焦熱痰。無益培陰養液。况宿滯未去。腸胃氣尙窒鈍。必淡薄調理。上氣清爽。痰熱不至復聚。從來三時熱病。怕反覆於病後之復。當此九仞。

幸如意留神爲上。

元參心 細生地 銀花 知母 生甘草

川貝 丹皮 橘紅鹽水炒 竹瀝

此煎藥方只用二劑可停。未大便時用地冬汁膏。大便後可用三才湯。

池 伏暑至深秋而發頭痛煩渴少寐。

薄荷 淡竹葉 杏仁 連翹

黃芩 石膏 赤芍 木通

張 痘幾一月。猶然耳聾。神識不慧。嗽甚痰粘。呼吸喉間有音。此非傷寒暴感。皆夏秋間暑濕熱氣內鬱。新涼引

動內伏之邪。當以輕劑清解三焦。奈何醫者不曉。伏氣爲病。但以發散消食寒涼清火爲事。致胃汁消亡。真陰盡爍。舌邊赤齒板燥裂血邪。畱營中有內閉。瘛瘲厥逆之變。況右脈小數。左脈濇弱。執固在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從來頭面都是清竅。旣爲邪蒙。精華氣血不肯流行。諸竅失司。聰明矣。此輕清清解。斷斷然也。議清上焦氣血之壅爲先。不投重劑苦寒。正倣古人肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心

元參

犀角

鬱金

橘紅

蜜水
炒

黑梔皮

川貝

鮮菖蒲根

加竹瀝

又 昨進清上焦法。諸症雖然略減。而神識猶未清爽。總由病久陰液內耗。陽津外傷。聰明智慧之氣。俱被濁氣蒙蔽。所以子後午前稍清。他時皆不清明。以陽盛時人身應之也。擬進局方至寶丹。藉其芳香。足以護陽逐邪。庶無內閉外脫之虞。

至寶丹每服三分。燈心嫩竹葉湯送。

又 脈右緩大。左弱。面垢色已減。痰嗽不爽。良由胃中津液爲辛散溫燥所傷。心營肺衛悉受熱焰蒸迫。致神呆喘急耳聾。清陽阻滯。九竅不利。首方宜解氣血。繼方芳香通竅。無形令其轉旋。三焦自有專司。豈與俗醫但曉

邪滯攻擊而已。今已獲效。當與清養胃陰肺氣。體素豐盛。陽弱不耐沉寒。然深秋冬交。天氣降。則上焦先受。試觀霜露下垂。草木皆改容色。人在氣交。法乎天地。兼參體質施治。

枇杷葉

炒黃川貝

橘紅

鬱金

茯苓

苡仁

橘紅

鬱金

王暑風熱氣入肺上熱痰喘嗽

石膏

連翹

竹葉

杏仁

桑皮

苡仁

橘紅

生甘草

又肺氣壅遏。身熱喘咳。渴少。葦莖、合葦莖、大棗湯。

某^五暑風外襲。肺衛氣阻。頭脹咳嗽。畏風微熱。防作肺瘡。

絲瓜葉

大杏仁

香薷

桔梗

連翹
六一散

某舌灰黃。頭痛咳嗽。左肢掣痛。此煩勞陽動。暑風乘虛襲入。最慮風動中厥。

鮮荷葉

三錢

鮮蓮子

五錢

茯神

半錢

益元散

三錢

川貝母

半錢

橘紅

一錢

楊^女暑熱穢濁。阻塞肺部。氣滯腹滿。宜以輕可去實。

西瓜翠衣

白通草

活水蘆根

生苡仁

臨好加入石膏末二錢

周三暑風熱神呆

鮮荷葉 苦丁茶 滑石 木通

杏仁 厚朴 廣皮 白蔻仁

郁六暑熱頭脹咳嗽痛

鮮荷葉 杏仁 射干

桑皮 桔梗 木通

滑石 橘紅

胡 不飢不食不便此屬胃病乃暑熱傷氣所致味變酸
濁熱痰聚脘苦辛自能泄降非無據也。

半夏瀉心湯去甘草乾薑加杏仁枳實

王 身熱自汗腹痛大小便不利脈虛右大左小暑熱內

暑熱阻氣中不適

閉擬和表裏法

薄荷

枳實

黃芩

生白芍

竹葉心

黑山梔

通草

甘草

杏仁

半夏

厚朴

橘紅

竹葉

黃芩

滑石

又 脈虛舌赤消渴。伏暑熱氣過衛入營。治在手厥陰。

竹葉

犀角

生地

麥冬

元參

某六舌黃、腕悶、頭脹、口渴、溺短。此吸受穢氣所致。

飛滑石

三錢

白蔻仁

七分

杏仁

三錢

厚朴

一錢半

通草

半錢

廣皮白

半錢

某三穢暑吸人，內結募原，脘悶腹痛，便泄不爽。法宜芳香逐穢，以疏中焦爲主。

藿香梗

杏仁

厚朴

茯苓皮

半夏麴

廣皮

香附

麥芽

楊秋暑內爍，煩渴喜得冷飲，脈右小弱者，暑傷氣分，脈必芤虛也。此非結胸症，宜辛寒以徹裏邪。

石膏

知母

厚朴

杏仁

半夏

薑汁

沈二脈小色白，氣分不足，兼之胃弱少食，聞穢濁，要刮痧。
陰柔之藥妨胃助濁，常以猪肚丸養胃。入夏令熱，更傷
氣，每食遠進生脈四君子湯一劑，恪守日服，可杜夏季
客暑之侵。生脈四君子湯 長服猪肚丸。

卜二十八春、夏必吞酸肢痠麻木，此體虛不耐陽氣升泄，乃熱
傷氣分爲病。宗東垣清暑益氣之議。

人參 黃芪 白朮 甘草 麥冬
五味 青皮 陳皮 澤鴉 葛根
升麻 黃柏 鹿茸 神麪

任六十沖年真陰未長，逢長夏濕熱交迫，斯氣泄煩倦，當靜

坐涼爽過月涼颻至炎蒸去乃卻病之期與清暑益氣之屬清暑益氣法

徐十
四長夏濕熱令行肢起曬窓煩倦不嗜食此體質才怯而濕與熱邪皆傷氣分當以注夏同參用清暑益氣法方用葛根升麻葛根無氣不足法也

人參

白朮

廣皮

五味

麥冬

川連

黃柏

升麻

葛根

神麃

麥芽

穀芽

乾荷葉汁泛丸

煩勞傷
暑胃虛

施七以煩勞傷陽交長夏發泄令加見症都是氣弱亦熱傷氣也煩渴有痰先治其胃蓋陽明經脈主平束筋骨

以流利機關耳

金匱麥門冬湯

吳 診脈肝膽獨大尺中動數。先天素弱水虧木少滋榮。

當春深長夏、天地氣機泄越、身中煩倦食減、皆熱傷元

氣所致、進以甘酸充養胃陰、少俟秋肅天降、培植下焦。

固納爲宜。

炒麥冬 木瓜 北沙參 生甘草 烏梅

程 暑久入營、夜寐不安、不飢微痞、陰虛體質、議理心用。

鮮生地 元參 川連 銀花

連翹

丹參

顧十 三陰虛遺熱、小便淋瀝、近日冒暑、初起寒熱頭痛汗出不解、肌肉麻木、手足牽強、神昏如寐、成瘧則輕、瘞厥則

暑入心營

重。

犀角

元參

小生地

連翹心 竹葉心

石菖蒲

滑石

化牛黃丸二服

某初病伏暑傷於氣分。微熱渴飲邪犯肺也。失治邪張逆走膻中。遂舌絳縮小便忽閉。鼻燥裂血口瘡耳聾神呆。由氣分之邪熱漫延於血分矣。夫肺主衛心主營。營衛二氣晝夜行於經絡之間。與邪相遇或涼或熱。今則入於絡津液被劫必漸昏寐所謂內閉外脫。

鮮生地

連翹

元參

犀角

石菖蒲

金銀花

汪

暑風久入營絡。微熱忽涼。議用玉女煎。

玉女煎去麥冬牛膝。加丹皮竹葉。

暑病久延傷液

金熱。止津津汗出。伏暑已解。只因病魔日久。平素積勞。

形色脈象虛衰。深慮變病。今飲食未進。寤寐未寧。議以
斂液補虛。

人參

茯神

麥冬

五味

炒白芍

塊辰砂一兩。綿裹同煎。

又熱久。胃汁被劫。不飢不便。亦病後常事耳。古人論病。

必究寢食。今食未加餐。難寐。神識未清。爲病傷元氣而。

熱病必消爍真陰。議用三才湯意。

暑熱深
天氣陰

顧

人參

天冬

生地

麥冬

五味子

右脈空大左脈小芤寒熱麻痺腰痛冷汗平素積勞內虛秋暑客邪遂干臟陰致神迷心熱煩躁刮痧似乎略爽病不肯解此非經絡間病頗慮熱深劫陰而爲瘡厥張司農集諸賢論暑病謂入肝則麻痺入腎爲消渴此其明徵議清陰分之邪仍以養正輔之

阿膠

小生地

麥冬

人參

小川連

烏梅肉

暑濕熱
漫三焦

某暑濕熱氣觸入上焦孔竅頭脹悶不飢腹痛惡心延久不清有瘧痢之憂醫者不明三焦治法混投發散

消食宜乎無效。

杏仁

香豉

橘紅

黑山梔

半夏

厚朴

滑石

黃芩

張

舌白罩灰黑，胸脘痞悶，潮熱嘔惡，煩渴汗出，自利，伏

暑內發，三焦均受，然清理上中爲要。

杏仁

滑石

黃芩

半夏

厚朴

橘紅

黃連

鬱金

通草

某二暑熱鬱遏頭脹，脘痛口渴，溺短當清三焦。

絲瓜葉

飛滑石

淡竹葉

茯苓皮

厚朴

藿香

廣皮

通草

何

暑濕皆客邪也。原無質故初起頭脹胸滿但傷上焦氣分耳。酒家少穀胃氣素薄一派消導雜以辛散苦寒。胃再傷殘在上。濕熱延及中下遂協熱自利三焦邪蒸氣衝塞填胸躁亂口渴瓜菓下院格拒相鬪此中宮大傷况進熱飲略受其爲胃陽殘憊而邪結內踞可知矣。

考暑門時風煩躁清濁交亂者昔賢每以來復丹五十粒轉運清濁爲先攻補難施之際望其效靈耳。

來復丹

吳目黃腕悶咽中不爽嘔逆寒少熱多暑濕客氣之傷。三焦不通非風寒之症。

大竹葉 黃芩

杏仁

滑石

陳皮

厚朴 半夏

薑汁

又暑濕熱皆氣也。竝釀蓄濁痰於胃。遂口甜膩滯不飢。

議以宣氣理痰。

川貝母 桔梗皮 杏仁

黑山梔 澤瀉

另用二賢散

某一診脈弦。午後惡寒似熱。不飢渴。濇短赤。暑熱炎蒸。外襲肺衛。遊行三焦。致氣分窒痺而然。當用和法。宜薄滋
味。庶杜瘧患。

杏仁

香薷

木通

飛滑石

茯苓

厚朴

白蔻仁

淡竹葉

又

照前方去香薷加半夏。

楊

二暑熱必挾濕吸氣而受先傷於上故仲景傷寒先分

八經河間溫熱須究三焦大凡暑熱傷氣濕著阻氣肺

六經主一身周行之氣位高爲手太陰經據述病樣面赤足

冷上脘痞塞其爲上焦受病顯著緣平素善飲胃中濕

熱久伏辛溫燥烈不但肺病不合而胃中濕熱得燥熱

錮閉下利稀水卽協熱下利故黃連苦寒每進必利甚

者苦寒以勝其辛熱藥味尙留於胃底也然與初受之

肺邪無當此石膏辛寒辛先入肺知母爲味清涼爲肺

之母氣然不明肺邪徒曰生津焉是至理昔孫真人未
診先問最不悞事再據主家說及病起兩旬從無汗泄
經云暑當汗出勿止氣分窒塞日久熱侵入血中咯痰
帶血舌紅赤不甚渴飲上焦不解漫延中下此皆急清
三焦是第一章旨故熱病之瘀熱留絡而爲遺毒注腑
腸而爲洞利便爲束手無策再論濕乃重濁之邪熱爲
薰蒸之氣熱處濕中蒸淫之氣上迫清竅耳爲失聰不
與少陽耳聾同例青蒿減柴胡一等亦是少陽本藥且
大病如大敵選藥若選將苟非慎重鮮克有濟議三焦

分清治從河間法初三日

飛滑石 生石膏

寒水石

大杏仁

炒黃竹茹 川通草

瑩白金汁

金銀花露

又

暮診。診脈後。腹胸肌腠。發現癰瘍。氣分濕熱。原有暗泄之機。早間所談。餘邪遺熱。必兼解毒者。爲此下午進藥。後診脈較大於早晨。神識亦如前。但舌赤中心甚乾燥。身體捫之。熱甚於早間。此陰分亦被熱氣蒸傷。瘦人慮其液涸。然痰咯不清。養陰藥無往而非膩滯。議得早進清膈一劑。而三焦熱穢之蓄。當用紫雪丹二三匙。藉其芳香宣竅。逐穢斯錮。熱可解。濁痰不粘。繼此調理之方。清營分滋胃汁。始可瞻顧。其宿垢欲去。猶在旬日之。

外。古人謂下不嫌遲，非臆說也。

紫雪丹一錢六分

知母 竹葉心 連翹心 炒川貝 竹瀝

犀角 元參 金汁 銀花露

又 一劑後用

竹葉心 知母 菟豆皮 元參

鮮生地 金銀花

又 一劑後去銀花葉豆皮加人參麥冬

又 初十申刻診經月時邪脈形小數。小爲病退數爲餘熱。故皮腠慄蛻氣血有流行之義。思食欲餐胃中有醒豁之機。皆佳兆也。第舌赤而中心黃苔熱蒸既久。胃津

陰液俱傷致嚥物咽中若阻溺溲尿管猶痛咯痰濃厚宿垢未下若急遽攻奪恐真陰更涸矣此存陰爲主而清腑兼之故亂進食物便是助熱惟清淡之味與病不悖自來熱病最怕食復勞復舉世共聞非臆說也

細生地

元參心

知母

炒川貝

麥冬

地骨皮

銀花露

竹瀝

又 脹症如昨仍議滋清陰分餘熱佐清上脘熱痰

照昨日方去地骨皮銀花露加鹽水炒橘紅

某 脹虛傷暑頭重脘悶跗痠

絲瓜葉

三錢

大杏仁

三錢

六一散

三錢

茯苓皮

三錢

漢防已

一錢半

綿茵陳

一錢

細木通

一錢

白蔻仁

五分

暑瘡
暑瘻

某

中惡暑厥。

蒼朮白虎湯加滑石

王

暑邪寒熱舌白不渴吐血此名暑瘻重症。

西瓜翠衣

竹葉心

青荷葉汁

杏仁

飛滑石

苡仁

暑邪入
厥陰

萬

暑邪不解陷入厥陰舌灰消渴心下板實嘔惡止歟。

寒熱下利血水最危之症

川連

黃芩

乾薑

生白芍

川椒

烏梅

人參

枳實

江

暑邪深入厥陰舌縮少腹堅滿聲音不出自利上下

此症總有蘊熱
在內立此等方
胎候後人不少
此老偶一爲之
近人則一概用
此法矣

格拒。危期至速。勉擬暑門酸苦泄熱。輔正驅邪一法。

黃連

淡乾薑

烏梅

生白芍

半夏

人參

枳實

暑兼血
症

某十
八勞傷挾暑。肺氣受戕。咳血口乾。先清暑熱。

鮮荷葉

白扁豆

大沙參

茯神

苡仁

朱三
三伏中陰氣不生。陽氣不潛。其頭脹身痛。是暑邪初受。暑濕熱必先傷氣分。故舌白口渴。身痛。早晨清爽。午夜煩蒸。狀如溫瘡。沐浴繞動。血絡宿病得時邪而來。仲景云。先治新病。後理宿病。是亦陰氣先傷。陽氣獨發也。

鮮生地

知母

元參

此說甚通

連翹

竹葉心

荷葉汁

王九雖是欬痰失血。然強能食。不知飢。目黃。晡熱。舌心黃。
已現暑熱客邪症象。此先宜清理肺胃。莫因久恙而投
膩補。

杏仁

象貝母

鬱金

川通草

桑葉

石膏

橘紅

苡仁

又 晚服枇杷葉膏。早六味加阿膠麥冬。

又 阿膠

雞子黃

小生地

麥冬

桑葉

炒黑丹皮

徐勞傷挾暑。咳血不飢。

鮮荷葉汁

油

大沙參

生苡仁

六一散

菜豆皮

杏仁

橘紅

白蔻仁

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在蒸淫熱迫之中。若正氣設或有隙。則邪從口鼻吸入。氣分先阻。上焦清肅不行。輸化之機失於常度。水穀之精微亦蘊結而爲濕也。人身一小天地。內外相應。故暑病必挾濕者。卽此義耳。前人有因動因靜之分。或傷或中之候。以及入心入肝爲癱。爲痢。中痧霍亂。暴厥卒死。種種傳變之原。各有精義可參。茲不重悉。想大江以南地卑氣薄。濕勝熱蒸。當此時候更須防患於先。昔李笠

翁記中所謂使天只有三時而無夏則人之病也必稀此語最確。蓋暑濕之傷。驟者在當時爲患緩者於秋後爲伏氣之疾。其候也脈色必滯。口舌必膩。或有微寒。或單發熱。熱時脘痞氣窒。渴悶煩冤。每至午後則甚。入暮更劇。熱至天明得汗則諸恙稍緩。日日如是。必要兩三候外。日減一日。方得全解。倘如元氣不支。或調理非法。不治者甚多。然是病比之傷寒。其勢覺緩。比之瘧疾寒熱。又不分明。其變幻與傷寒無二。其愈期反覺纏綿。若表之汗不易徹。攻之便易溏瀉。過清則肢冷嘔惡。過燥則唇齒燥裂。每遇秋來。最多

是症求之古訓不載者多獨已任編名之曰秋時晚
發感症似瘧總當以症之法治之要知伏氣爲病。
四時皆有但不比風寒之邪。汗而解溫熱之氣投
涼卽安夫暑與濕爲蒸粘膩之邪也最難驟危若
治不中竅暑熱從陽上薰而傷陰化燥濕邪從陰
沉而傷陽變濁以致神昏耳聾舌乾齦血脫瘡嘔惡
洞泄肢冷棘手之候叢生竟至潰敗莫救矣叢先生
用意宗劉河間三焦論立法認明暑濕二氣何者爲
重再究其病實在營氣何分大凡六氣傷人因人而
化陰虛者火旺邪歸營分爲多陽虛者濕勝邪傷氣

分爲多一則耐清一則耐溫。臟性之陰陽從此可知也。於是在上者以辛涼微苦如竹葉連翹杏仁薄荷之類。在中者以苦辛宣通如半夏瀉心之類。在下者以溫行寒性質重開下如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之大意也。或有所夾又須通變。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法及天水散。意溫者從乎二陳湯及正氣散。法理營分知清補之宜。清者如犀角地黃加人心之品。補者有三才復脈等方。又如濕熱沉澱之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女法。開閉逐穢與牛黃及至寶紫雪等劑。扶虛進參附及兩儀諸

法隨其變幻審其陰陽運用之妙存乎心也附驥蕪
詞高明教正邵新甫

所列諸案皆平素伏暑之症爲多其卒然受暑之病絕少
若卒受之症則當以香茹飲爲主不可不知也

此老治暑邪能用輕清涼潤之品以和肺是其所長但暑
邪深入必有悶亂煩躁等症近於霍亂此則更有治法至
於病重症危屬熱邪橫逆不但人參不可輕用而桂附乾
薑服之無不立斃乃亦倣仲景傷寒壞症治法輕於一試
當時不知有害與否而耳食之徒竟以爲必用之藥訖名
本於此老我見死者甚多傷心慘目不得不歸咎於作俑

之人也

濕

濕阻上
焦肺不
肅降

三言白頭脹身痛肢疼胸悶不食溺阻當開氣分除濕。

飛滑石

杏仁

白蔻仁

大竹葉

炒半夏

白通草

王十二酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣化也

杏仁

枯萎皮

白蔻仁

飛滑石

半夏

厚朴

吳五酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆

吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫

大杏仁 金石斛 飛滑石 紫厚朴 活水蘆根

孔心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩 連翹 炒杏仁 白通草

滑石 野赤豆皮

某二濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕走氣自和

肺濕溫阻

飛滑石 竹葉心 連翹 桔梗

射干

周

病起創日，猶然頭脹漸至耳聾。正如內經病能篇所云，因於濕，首如裹。此呃忒鼻衄皆邪混氣之象。况舌色帶白，咽喉欲閉，邪阻上竅空虛之所，諒非苦寒直入胃中可以治病。病名濕溫，不能自解，卽有昏瘡之變，醫莫泛稱時氣而已。

連翹

牛蒡子

銀花

馬勃

射干

金汁

馬勃

濕熱穢
氣阻竅

李三時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道，遂致清肅不行，不飢不食。但溫乃化熱之漸，致機竅不爲靈動，與形質滯濁有別。此清熱開鬱必佐芳香以逐穢爲法。

桔梗皮

桔梗

黑山梔

香豉

枳殼

鬱金

降香末

某。吸受穢邪。募原先病。樞逆邪氣分布。營衛皆受。遂熱蒸頭脹身。痛經旬。神識昏迷。小水不通。上中下三焦交病。舌白渴不多飲。是氣分窒塞。當以芳香通神。淡滲宣竅。俾穢濕濁氣。由此可以分消。

苡仁

茯苓皮

猪苓

大腹皮

通草

淡竹葉

牛黃丸二丸

胃津
濕熱傷

吳。濕邪中傷之後。脾胃不醒。不飢口渴。議清養胃津爲穩。

濕溫邪
入心胞

鮮省頭草

知母 川斛 茵仁

炒麥冬

葛根

張 媚體壯有濕近長夏陰雨潮濕著於經絡身痛自利發

熱仲景云濕家大忌發散汗之則變痙厥脈來小弱而

緩濕邪凝遏陽氣病名濕溫濕中熱氣橫沖心胞絡以致神昏四肢不緩亦手厥陰見症非與傷寒同法也。

犀角

連翹心

元參

石菖蒲

金銀花

野赤豆皮

煎送至寶丹

陷

濕熱內
蔡 陽虛挾濕邪熱內陷所以神識如蒙議用瀉心法。

人參

生乾薑

黃芩

川連

枳實

生白芍

張六此濕蘊氣中。足太陰之氣不爲鼓動運行。試以痞結

胸滿。仲景列於太陰篇中。概可推求其理矣。

半夏醋炒 茯苓

川連

厚朴

通草湯煎

周濕傷脾陽。腹膨小溲不利。

茅朮

厚朴

茯苓

澤瀉

猪苓

秦皮

又

五苓散

又二朮膏

范四肢乍冷。自利未已。目黃精退。而神倦不語。濕邪內伏。足太陰之氣不運。經言脾竅在舌。邪滯竅必少靈。以致語言欲蹇。必當分利。佐辛香以默運坤陽。是太陰裏。

症之法。

生於朮

三錢

厚朴

五分

茯苓

三錢

草菓仁

七分

木瓜

五分

澤瀉

五分

又

身體稍稍轉動語蹇神呆猶是氣機未爲靈轉色脈

此等症多由風痰盤踞上焦所

致概以清濕之

生於朮

茯苓

苡仁

鬱金

炒遠志

石菖蒲汁

又

脾胃不醒皆從前濕蒸之累氣升咳痰參藥緩進

炒黃川貝

茯苓

苡仁

鬱金

地骨皮

淡竹葉

當

又濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口數白瘡仍不渴飲開上鬱佐中運利腸間亦是宣通三焦也

生於朮五錢

苡仁三錢

寒水石一錢半

桔梗七分

猪苓一錢

澤瀉一錢

廣皮白一錢半

濕陽中
焦陽氣

曹十三腸胃屬腑濕久生熱氣阻不爽仍以通爲法

生於朮川黃連

厚朴

淡生薑渣

廣皮白

酒煨大黃

水法丸服三錢

李四

脈小濇痰多上湧食入脘阻大便不爽上秋至今夏

不愈自述飢飽失和曾病黃疽以濕傷氣痺主治

大杏仁

苡仁

半夏

薑汁

茯苓

橘紅

鬱金

香豉

俞五酒濕鬱傷腕中食阻而痛治以辛苦寒。

小川連

半夏

薑汁

枳實

茯苓

香豉

某五舌白目黃口渴溺赤脈象呆鈍此屬濕鬱。

綿茵陳

生白朮

寒水石

飛滑石

桂枝木

茯苓皮

木猪苓

澤瀉

李

酒客中虛粵地潮濕長夏涉水外受之濕下起水穀

不運中焦之濕內聚治法不以宣通經腑致濕阻氣分
鬱而爲熱自脾胃不主運通水濕橫漬於脈腠之間二

便不爽。濕熱濁氣交扭混亂。前輩治中滿必曰分消。此分字明明謂分解之義。但亂藥既多。不能去病。就是脾胃受傷於藥。蔓延腿肢。腫極且痛。病深路遠。藥必從喉入胃。然後四布。病所未得藥益。清陽先已受傷。此湯藥難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢。專以疎利腸中。取其不致流散諸經。亦一理也。小溫中丸八服。
某_{三六}陽微體質。濕痰內聚。便溏脫悶。肌麻舌乾。清理濕邪。氣機升降自安。

金石斛
鉤藤
茯苓
白蒺藜
半夏
廣皮白

張 脈右緩。濕著阻氣。

厚朴

廣皮

煨草藥

炒查肉

藿香梗

炒神麴

某不耐煩勞是本虛院悶便泄屬濕邪先治濕後治本。

藿香梗

廣皮

茯苓

大腹皮

厚朴

穀芽

陸 滯滯如痞。

山茵陳

草果仁

茯苓皮

大腹皮絨

厚朴

廣皮

猪苓

澤瀉

汪三舌黃脫悶。穢濕內著。氣機不宣。如久釀蒸。必化熱氣。

即有身熱之累

杏仁

藿香

茯苓皮

滑石

厚朴

廣皮白

綿茵陳

某

閱病源皆濕熱內停之象當走濕清熱爲主至於藥

酒蘊濕助熱尤當永戒亦有宜者

生白朮

赤小豆皮

綿茵陳

黃柏

茯苓

澤瀉

某

脈濡頭脹胸身重著而痛寒熱微嘔此濕阻氣分

厚朴

杏仁

白蔻仁

木通

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

某

長夏外受暑濕與水穀之氣相併。上焦不行。下脘不

通。氣阻熱從下蒸逼。不飢不食。目黃舌白。氣分之結。

厚朴

杏仁

廣皮

茯苓

半夏

薑汁

某 脈緩身痛。汗出熱解。繼而復熱。此水穀之氣不運。濕復阻氣。鬱而成病。仍議宣通氣分。熱自濕中而來。徒進清熱不應。

黃芩

滑石

茯苓皮

大腹皮

白蔻仁

通草

猪苓

方四 形質頹然。脈遲小澀。不食不寐。腹痛大便窒滯。平昔

嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰鳩聚爲痛。

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 葱白

調入猪膽汁一枚

王五 冷濕損陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致。

桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫上 今年夏四月寒熱不飢是時令潮滲氣蒸內應脾胃。

夫濕屬陰晦必傷陽氣吞酸形寒乏陽運行議鼓運轉

旋脾胃一法 苓薑朮桂湯

某六 地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易復畏寒筋骨。

猶牽強無力以金匱苓薑朮桂湯

陳一濁凝氣結有形。酒肉挾濕。

五

草撥

生香附汁 木香

草果

茯苓

廣皮白

江

脈緩。臍上痛。腹微膨。便稀。溺短不爽。此乃濕鬱脾胃之陽。致氣滯裏急。宗古人導濕分消。用桂苓散方。

生茅朮

官桂

茯苓

厚朴

廣皮白

飛滑石

猪苓

澤瀉

炒查肉

林

五中年清陽日薄。忽然脘中痞悶。乃清陽不自轉旋。酒肉濕濁之氣。得以凝聚矣。過飲塘瀉。濕傷脾胃。胃陽微。

仲景法。以輕劑宣通其陽。若投破氣開降。最傷陽氣。有

格拒之害。芩桂朮甘湯。

嚴三一胸滿不飢。是陽不運行。嗜酒必挾濕凝阻其氣。久則

三焦皆閉。用半硫丸。二便已通。議治上焦之陽。

芩桂朮甘湯

王二病人述病中厚味無忌。腸胃滯雖下而留濕未解。濕重濁令氣下墜於肛。肛墜痛不已。胃不喜食。陽明失闇。舌上有白腐形色。議劫腸胃之濕。大腸有熱不得正肝痛不宜燥補之劑

生茅朮

人參

厚朴

廣皮

炮薑灰

生炒黑附子

胡二受濕患瘡。久瘡陽乏氣泄。半年淹淹無力。食少。噯噫。

難化。此脾胃病法以運中陽爲要。

茯苓

桂枝

生於朮

炙草

苡仁

生薑

汪

夏令脾胃司氣兼以久雨泛潮地中濕氣上干食味重濁少運所謂濕勝成五泄也古云寒傷形熱傷氣芒種夏至天漸熱宜益氣分以充脾胃此夏三月必有康健之理補中益氣湯

濕邪瀕
漫三焦

某五十穢濕邪吸收由募原分布三焦升降失司脘腹脹悶。

大便不爽當用正氣散法。

藿香梗

厚朴

杏仁

廣皮白

茯苓皮

神麴

麥芽

綿茵陳

蔡仲景云。小便不利者爲無血也。小便利者血症諦也。
此症是暑濕氣蒸三焦瀰漫以致神昏乃諸竅阻塞之兆至小腹硬滿大便不下全是濕鬱氣結。彼芬醫猶然以滋味呆鈍滯藥與氣分結邪相反極矣。議用甘露飲法。

猪苓

浙茯苓

寒水石

晚蠶沙

阜莢子

去皮

某十四腕悶便溏身痛脹象模糊此屬濕蘊三焦。

厚朴

廣皮

藿香梗

茯苓皮

大豆黃卷

木防已

川通草

苡仁

牛向年積聚悞服燥熱諸藥。頻與清奪推陳致新乃安。
身處江南濕熱之鄉。飲啖仍用山右濃重之味。留執由
腸升膈。三焦不清。議攻無形之熱。

清心涼膈去芒硝加菖蒲

韓一冷酒水濕傷中上嘔食下泄脂液陽氣傷極再加浮
腫作脹則危。

人參

茯苓

熟附子

生於朮

生白芍

生薑

又酒濕類聚。例以分利。診脈微陽氣已敗。濕壅生熱。至
胃癰膿。清熱則陽亡。卽死。朮苓運中祛濕。佐附迅走氣

酒濕傷
陽鬱生
胃癰

分亦治濕一法。

茯苓

熟附子

生白朮

左牡蠣

澤瀉

車前子

陽衰濕
傷脾腎

龐四濕久脾陽消乏。中年未育子。腎真亦憊。倣安腎丸法。

鹿茸

胡蘆巴附子

韭子

赤石脂

補骨脂

真茅朮附子

免絲子

大茴香

張五陽傷瘦弱。有濕麻痺痔血。

生白朮

附子

乾薑

茯苓

某八舌白身痛。足跗浮腫。從太谿穴水流如注。此濕邪伏於足少陰。當用溫蒸陽氣爲主。

肝胃濕
熱

楊

鹿茸

淡附子

草果

免絲子

茯苓

厥陰爲病必錯雜不一瘧痢之後肝臟必虛發症左
脇有痞腹中塊礪外堅脇下每常汨汨有聲惡虛就實
常有寒熱胃中不知飢而又嘈雜吞酸脈長而數顯然
厥陰陽明濕熱下滲前陰陽縮而爲濕熱症也議用升
發陽明胃氣滲泄厥陰濕熱其症自愈

蒼朮

半夏

茯苓

橘紅

通草

當歸

柏子仁

沙蒺藜

川棟子

茴香

即丸方

浦氏胸膈迷漫胃痛嘔食肢節屈曲處冷痛經落後來時
節冷痛

周身腰脊不舒。脈弦沉。痛卽便溏。此濕鬱阻閉。氣血不行。用藥先須斷酒。

生茅木

炮黑川烏

薑汁

白芥子

厚朴

廣皮

草撥

茯苓

濕熱入
經絡爲
痺

徐

溫瘧初愈。驟進濁膩食物。濕聚熱蒸。蘊於經絡。寒戰熱熾。骨骱煩疼。舌起灰滯之形。面目痿黃色。顯然濕熱爲痺。仲景謂濕家忌投發汗者。恐陽傷變病。蓋濕邪重著。汗之不却是苦味辛通爲要耳。

防已

杏仁

滑石

醋炒半夏

連翹

山梔

苡仁

野赤豆皮

某四七風暑濕渾雜氣不主宣咳嗽頭脹不飢右肢若廢法

當通陽驅邪。

杏仁二錢

苡仁三錢

桂枝五分

生薑七分

半夏一錢

半夏一錢

漢防已一錢

半夏一錢

白蒺藜二錢

某汗多身痛自利小溲全無胸腹白疹此風濕傷於氣分醫用血分涼藥希冀熱緩殊不知濕鬱在脈爲痛濕家本有汗不解。

方案重複今附
脈痛
濕鬱經
者生厭編書
意欲何爲

苡仁

竹葉

白蔻仁

滑石

茯苓

川通草

濕爲重濁有質之邪若從外而受者皆由地中之氣

治濕不用燥
之品。皆以芳
淡滌之藥。味
氣而和。膀胱
爲是。法惟健
消。疾培土之
未備。則於固
之法。尚有缺

升騰從內而生者。皆由脾陽之不運。雖云霧露雨濕。
上先受之。地中潮濕。下先受之。然霧露雨濕。亦必由
地氣上升而致。若地氣不升。則天氣不降。皆成燥症
矣。何濕之有。其傷人也。或從上。或從下。或遍體皆受。
此論外感之濕邪。著於肌軀者也。此雖未必卽入於
臟腑。治法原宜於表散。但不可大汗耳。更當察其兼
症。若兼風者。微微散之。兼寒者。佐以溫藥。兼熱者。佐
以清藥。此言外受之濕也。然水流濕。火就燥。有同氣
相感之理。如其人飲食不節。脾家有濕。脾主肌肉四
肢。則外感肌軀之濕。亦漸次入於臟腑矣。亦有外不

受濕而但濕從內生者必其人膏粱酒醴過度或嗜飲茶湯太多或食生冷瓜菓及甜膩之物治法總宜辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之治若其人色蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易於化熱若內生濕邪多因膏粱酒醴必患濕熱濕火之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外感濕邪不易化熱若內生之濕多因茶湯生冷太過必患寒濕之症人身若一小天地今觀先生治法若濕阻上焦者用開肺氣佐淡滲通膀胱是卽啟上闢開支河導水勢下行之理也若脾陽不運濕滯中焦

者用术朴薑半之屬以溫運之以芩澤腹皮滑石等滲泄之亦猶低窪濕處必得烈日曬之或以剛燥之土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以苦辛寒治濕熱以苦辛潤活寒濕。槩以淡滲佐之或再加風藥甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃疽泄瀉淋閉癥飲等類俱於名門兼參之可也。

華岫雲

燥

氣分熱

某

脈右數大，議清氣分中燥熱。

桑葉

杏仁

大沙參

象貝母

香鼓

黑梔皮

肺胃津液虛

下

夏熱秋燥致傷，都因陰分不足。

冬桑葉

玉竹

生甘草

白沙參

生扁豆

地骨皮

麥冬

花粉

某 燥火上鬱，齦脹咽痛，當辛涼清上。

火鬱上
焦

薄荷梗

連翹殼

生甘草

黑梔皮

桔梗

菉豆皮

心陽過動傷液

王六七

老人舌腐肉消肌枯心事繁冗陽氣過動致五液皆

涸而爲燥冬月無妨夏月深處林壑心境凝然可以延

年每早服牛乳一杯

胃陰虛

陳秋燥復傷宿恙再發未可補濶姑與甘藥養胃。

麥冬

玉竹

北沙參

生甘草

茯神

糯稻根鬚

某

上燥治氣下燥治血此爲定評今陽明胃腑之虛因

久病嘔逆投以辛耗破氣津液劫傷胃氣不主下行致腸中傳送失司經云六腑以通爲補半月小效全在一

通補工夫，豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。

鮮生地

天冬

人參

甜梨肉

生白蜜

液
熱劫陰

張

脈數虛舌紅口渴上齶乾涸腹熱不飢此津液被劫

陰不上承心下溫溫液液用炙甘草湯。

炙甘草

阿膠

生地

麥冬

人參

麻仁

某氏心中煩熱正值經來而熱渴不已若清肺氣大謬用復脈法。

炙甘草

生地

阿膠

麥冬

棗仁

麻漿

某陽津陰液重傷。餘熱淹畱不解。臨晚潮熱舌色若赭。
頻飲救亢陽焚燎。究未能解渴。形脈俱虛。難投白虎。議
以仲景復脈一法爲邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰
少甦。冀得胃關復振。因左關尺空數不藏。非久延所宜。
耳。

人參

生地

阿膠

麥冬

炙草

桂枝

生薑

大棗

燥爲乾濇不通之疾。內傷外感宜分。外感者由於天
時風熱過勝。或因深秋偏亢之邪。始必傷人上焦氣
分。其法以辛涼甘潤肺胃爲先。喻氏清燥救肺湯及

先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也。內傷者乃人之本病。精血下奪而成。或因偏餌燥劑所致。病從下焦陰分先起。其法以純陰靜藥柔養肝腎爲宜。大補地黃丸六味丸之類是也。要知是症大忌者苦澀最喜者甘柔。若氣分失治。則延及於血。下病失治。則槁及乎上。喘咳痿厥三消噫膈之萌。總由此致。大凡津液結而爲患者。必佐辛通之氣味。精血竭而爲患者。必藉血肉之滋填。在表佐風藥而成功。在腑以緩通爲要務。古之滋燥養營湯潤腸丸五仁湯。瓊玉膏一炁丹。牛羊乳汁等法各有耑焉也。邵新甫

有因風而燥當兼治風案中未備

妙論

瘡邪入
膾漸于
心胞

疫

朱 疫瘡穢邪從口鼻吸受分布三焦瀰漫神識不是風寒客邪亦非停滯裏症故發散消導卽犯劫津之戒與傷寒六經大不相同今喉痛丹疹舌如硃神躁暮昏上受穢邪逆走膾中當清血絡以防結閉然必大用解毒以驅其穢必九日外不致昏憒冀其邪去正復

犀角

連翹

生地

玄參

菖蒲

鬱金

銀花

金汁

姚

疫毒口糜丹疹喉啞治在上焦

犀角

鮮生地

玄參

連翹

石菖蒲

銀花

金汁

至寶丹

譚口鼻吸入穢濁自肺系漸干心胞絡初病喉痛舌燥最怕竅閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯同法。

玄參

連翹

鬱金

銀花

石菖蒲

旋葉

射干

半芳

冲入眞白金汁一杯

楊吸入疫癘三焦皆受久則血分漸瘀愈結愈熱當以
鹹苦之製仍是輕揚理上微古大製小用之意

玄參

西瓜翠衣

金銀花露

瑩白金汁

金

氏

人靜則神昏。癘邪竟入膻。王先生方甚妙。愚意兼以

芳香宣竅逐穢。至寶丹。

亦不盡然

疫癘一症。都從口鼻而入。直行中道。流布三焦。非比傷寒六經可表可下。夫疫爲穢濁之氣。古人所以飲芳香採蘭草。以襲芬芳之氣者。重滌穢也。及其傳變。上行極而下。下行極而上。是以邪在上焦者爲喉啞。爲口糜。若逆傳膻中者。爲神昏舌絳。爲喉痛丹疹。今觀先生立方清解之中。必佐芳香宣竅逐穢。如犀角菖蒲銀花鬱金等類。兼進至寶丹。從表透裏。以有靈之物。內通心竅。搜剔幽隱。通者通鎮者鎮。若邪入營

治時疫不外此
等方若癘疫即
一時傳染惡毒
非用通靈金石
之品虔製數種
隨症施用不能
奏效也

中三焦相涵。熱愈結。邪愈深者。理宜鹹苦大製之法。仍恐性速直走在下。故用玄參金銀花露金汁瓜蔞皮輕揚理上。所謂倣古法而不泥其法者也。考是症惟張景岳喻嘉言吳又可論之最詳。然宗張喻二氏。恐有遺邪。畱患若宗吳氏。又恐邪去正傷。惟在臨症權衡。無盛盛無虛虛。而遣人天殃。方不愧爲司命矣。

鄒滋九

三焦伏
熱

癰癧瘍瘻

張

伏氣熱蘊三焦。心凜熱發煩渴遍體赤癰夜躁不寐。

兩脈數搏

羚羊角

犀角

連翹心

玄參心

鮮生地

金銀花

花粉

石菖蒲

又

寒熱必有形象攻觸及於胃脘之下口渴喜飲緩湯

癰已發現病不肯退此邪氣久伏厥陰之界矣。
真火包經可也

桂枝

川連

黃芩

花粉

牡蠣

枳實

濕溫

嚴 濕溫雜受。身發斑疹。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中強食。反助邪威。議用涼膈疎斑方法。

連翹

薄荷

杏仁

鬱金

枳實汁

炒牛蒡

山梔

石膏

又 舌邊赤昏譖。早輕夜重。斑疹隱約。是溫濕已入血絡。夫心主血。邪干膻中。漸至結閉。爲昏症之危。苦味沉寒。竟入中焦。消導辛溫。徒劫胃汁。皆溫邪大禁。議清疎血分。輕劑以透斑。更參入芳香。逐穢以開內竅。近代喻嘉言申明戒律。宜遵也。

犀角

玄參

連翹

銀花

石菖蒲

先煎至六分後和入雪白金汁一杯臨

服研入周少川牛黃丸一丸

江溫邪發疹濕熱內蘊便閉不通先開上焦

杏仁

蘇子

桔梗皮

紫苑

山梔

某

風溫發疹

薄荷
桔梗

連翹
桑皮

杏仁
甘草

牛蒡子
山梔

某

風溫發疹

薄荷

赤芍
桑皮

連翹
甘草

牛蒡子
山梔

桔梗

桑皮
甘草

牛蒡子
山梔

風溫

熱邪入
胞絡

費

暴寒驟加伏熱更熾邪鬱則氣血壅遏癥疹不肯外達痰氣交阻神迷喘促漸入心胞絡中有內閉外脫之憂熱注下迫自利粘膩不爽法當開其結閉消毒解其膻中之壅必得神清方保無變

連翹心

飛滑石

石菖蒲

炒金銀花

射干

通草

煎化牛黃丸一丸

肺濕熱鬱

朱二十

癥後痰多咳嗽氣急

蘆根

一兩

杏仁一錢

桔梗一錢

飛滑石一錢

半錢

桑皮

八分

通草一錢

傷後陰

某

癥後伏火未清內熱身痛

玉竹

白沙參

地骨皮

川斛

麥冬

生甘草

某 痘後熱不止陰傷

生白芍

炙甘草

生扁豆

炒麥冬

川斛

穀芽

外寒內
熱

章

涼風外襲伏熱內蒸秋金主令內應乎肺喘咳身熱始而晝熱繼而暮熱自氣分漸及血分齷肉紫而肌壘發疹辛寒清散爲是

薄荷

連翹

石膏

淡竹葉

杏仁

桑皮

苡仁

吳 滂在暴冷而發。肌表頭面不透。是外蘊爲寒。內伏爲熱。肺病主衛。衛氣分兩解爲是。

麻黃

石膏

牛蒡子

枳殼汁

杏仁

射干

桔梗

生甘草

陽明血
熱

尹

環口燥裂而痛。頭面身半以上發出癰疹赤紋。乃陽明血熱久蘊成毒。瘦人偏熱頗有是症。何謂醫人不識。

犀角地黃湯

再加風藥尤妙

溫邪內
陷

江

溫邪自利。癰疹。

黃芩

連翹

牛蒡子

桔梗

香鼓

薄荷

杏仁

橘紅

通草

胆火胃
濕鬱蒸

此症乃血中有
熱毒須於未發
之前服藥爲妙

李二發癆熱腫獨現正面每遇九十月大發五六月漸愈。
七八年來如是。因思夏令陽氣宣越營衛流行無間。秋
冬氣凍外薄氣血凝滯。此濕熱漫無發泄。乃少陽木火
之鬱及陽明分鬱熱得疏庶幾發作勢緩。
苦寒俾陽分鬱熱得疏庶幾發作勢緩。

夏枯草

鮮菊葉

苦丁茶

鮮荷葉邊

羚羊角

黑梔皮

鬱金

苡仁

唐四麻木忽高腫發癆必有風濕襲入皮膜乃軀殼病昔

人每以宣行通劑

此防變瘋症

片薑黃

羚羊角

川桂枝

撫芎

風濕

周易 南醫卷五
半夏 白芥子

某十風塊瘡癰。咳嗽腹痛。邪著表裏。當用雙和。

牛蒡子 杏仁 連翹 桔梗

桑枝 象貝母 煎藥送通聖丸

癰者。有觸目之色。而無礙手之質。卽稠如錦紋稀如
蚊跡之象也。或佈於胸腹。或見於四肢。總以鮮紅起
發者爲吉。色紫成片者爲重。色黑者爲凶。色青者爲
不治。蓋有諸內而形諸外。可決其臟腑之安危。邪正
之勝負也。殆傷寒瘟疫諸症。失於宣解。邪蘊於胃腑。
而走入營中。每有是患耳。考方書之治。其法不一大。

抵由失表而致者。當求之汗失下而致者。必取乎攻。
火甚清之。毒甚化之。營氣不足者。助其虛而和之託
之。至於陰癰一說。見象甚微。若必指定些些之癰點
爲陰。猶恐不能無誤。想前人此例。無非覺後人勿執
見癰爲實熱之義也。吾故曰。必參之脈象及兼證方
妥。瘳者。疹之通稱。有頭粒而如粟象。癰者。卽疹之屬。
腫而易痒。須知出要周。匀沒宜徐緩。不外乎太陰陽
明之患。故繆氏。耑以肺胃論治爲精也。若先生之法
本乎四氣。隨其時令之勝復。酌以辛涼辛勝。及甘寒
苦寒鹹寒淡滲等法而治之。凡吾幼科諸友。於此尤

當究心焉。邵新甫

痰火

痰

汪五宿哮久矣不發心悸震動似乎懊憹之象此屬痰火治以宣通鬱遏勿徒呆補。

半夏

川連

石菖蒲

蛤粉

枳實

茯苓

川鬱金

橘紅

竹瀝薑汁法丸

劉

痰火鬱遏氣滯吸煙上熱助壅是酒肉皆不相宜古

稱痰因氣滯熱鬱治當清熱理氣爲先

川連

白术

枳實

厚朴

茯苓

半夏

淡薑湯泛丸

沈三痰火久嗽。

海蛤丸

天冬

水姜

海浮石

蛤粉

風化硝

桔梗

橘紅

香附

竹立

姜汁

張嫗痰火風眩暈，防仆跌。

桔梗

橘紅

香附

竹立

姜汁

明天麻 炒半夏

茯苓

橘紅

羚羊角 鈎藤

竹瀝

陳嫗老年痰火咳逆，痰有穢氣。

蘆根 茯苓

桃仁

絲瓜子

葶苈

大棗

卽兼肺癰治法

又下虛不納，渴泛嘔逆，痰穢氣。

熟地炭

紫衣胡桃肉

炒杞子

炒牛膝

川斛

茯神

某 痰火上逆蒙竅耳鳴頭暉。二陳加天麻鈎藤甘菊
羚羊黃皮

某 夏至節兩關脈弦長五火燔燎而肝陽胃陽尤甚動怒抽掣爲肝病食辛香厚味卽病至胃病使然痰火根深非頃刻可掃除惟靜養勿憲忿薄味以清裏此病發之勢必緩由鄉加功議藥乃近理治法

羚羊角

犀角

川連

鬱金

山梔

北秦皮

牛黃

膽星

橘紅

生石膏

寒水石

金箔

方諸水法丸

竹葉燈心湯

送

何 姮 診脈右關弦滑痰多舌乾微強語言似蹇蓋因痰火

上蒙津液不得上承。高年頗慮風癥。宜清上宣通。勿進
剛燥及膩滯之藥。

半夏

金石斛 橘紅

黑山梔

茯苓

鬱金

生甘草

石菖蒲

竹瀝

薑汁

痰熱內
閉神昏

張

昏昏如寐。神憤如迷。痰熱內閉。勢非輕渺。

半夏

石菖蒲

桔梗

枳實

鬱金

橘紅

竹瀝

薑汁

鬱痰

某

半夏麴

鬱金

石菖蒲

明天麻

白蒺藜

橘紅

茯苓

鈎藤

陶 脈左弦堅搏。痰多食不易運。此鬱慮已甚。肝侮脾胃。
有年最宜開懷。不致延及噎膈。

半夏

薑汁

茯苓

杏仁

鬱金

橘紅

又

脈如前。痰氣未降。前方去杏仁加白芥子。

濕熱蒸
痰

金四六濕熱內蒸。痰火日夥。根本漸怯。陽泄爲汗。陰泄遺濁。
酒客喜於爽口食物。醫藥中滋膩補方。決不適用也。

豬肚九方

葉 久寓南土。水穀之濕。蒸熱聚痰。脈沉弦。目黃。肢末易
有瘡疾。皆濕熱盛。致氣隧不得流暢。法當苦辛寒清裏。

通肌倣前輩痰因熱起清熱爲要。

生茅术 黃柏 瓜薺實 山梔 萊菔子

川連 半夏 厚朴 橘紅 竹沥薑汁丸

某病後厚味蒸痰。

風化硝 瓜薺仁霜 枳實 鬱金

生茯苓 薑汁炒山梔 竹沥法丸

汗脈脹濕阻熱痰。

半夏 茯苓 黑山梔

製蒺藜 遠志 降香

木火犯中冒虛
徐陽動內風用滋養肝腎陰藥壯水和陽亦屬近理。夏

季脾胃主司。肝胆火風易於貫膈犯中。中土受木火之侮。陽明脈衰。痰多經脈不利矣。議清少陽鬱熱。使中宮自安。若畏虛滋膩。上中愈實。下焦愈虛。二陳去甘草。加金斛桑葉丹皮。

又 脈左浮弦數。痰多。脘中不爽。煩則火升。眩暉靜坐神識安舒。議少陽陽明同治。

羚羊角

連翹

廣皮

炒半夏麴

黑山梔皮

香或

炒半夏麴

又 脈兩手已和。惟煩動恍惚。欲量議用靜藥。益陰和陽。

人參

熟地

天冬

金箔

汪

痰火上盛。腎氣少攝。朝用通攝下焦。暮服清肅上焦。

方法。

羚羊角

半夏

茯苓

橘紅

黑梔皮

鬱金

苦丁茶煎湯法丸。暮服

熟地

淡蕪蓉

杞子

五味

牛膝

茯苓

遠志

線膠

蜜丸早服

曹五色鮮明屬上。有痰飲。蓋上實則下虛。半百年歲未得種玉。診得脈左小不靜。右部弦滑。法當清肺胃之熱痰。益腎肝之精血。倣曼倩衛生方法。

燕窩膠

甜梨膏

人參

黃芪

麥冬

山藥

茯苓

於太

黃節

黑節

腎虛痰
多

鹿尾膠

羊內腎

淡蓀蓉

故紙

胡桃

青鹽

商 洞來痰多食少而參术服餌未合此稟質爲陽不受溫熱剛燥之劑。上年冬季溫緩入春痰愈多體中微倦。由乎藏聚未固春氣自地升舉之徵法當攝腎固真。乃治痰之本方爲有益。

熟地

茯苓

補骨脂

胡桃肉

杞子

五味

牛膝

遠志

車前

蜜丸

痰症之情狀變幻不一古人不究標本每著消痰之方立消痰之論者甚多後人遵其法而用之治之不

驗，遂有稱痰爲怪病者矣。不知痰乃病之標，非病之本也。善治者，治其所以生痰之源，則不消痰而痰自無矣。余詳考之，夫痰乃飲食所化。有因外感六氣之邪，則肺脾升降之機失度，致飲食輸化不清而生者。有因多食甘膩肥腥茶酒而生者。有因本質脾胃陽虛，濕濁凝滯而生者。有因鬱則氣火不舒，而蒸變者。又有腎虛水泛爲痰者。此亦因土衰不能制水，則腎中陰濁上逆耳。非腎中真有痰水上泛也。更有陰虛勞症，龍相之火，上炎爍肺，以致痰嗽者。此痰乃津液所化，必不濃厚。若欲消之，不惟無益，而徒傷津液。

其餘一切諸痰。初起皆由濕而生。雖有風火燥痰之者。亦皆因氣而化。非風火燥自能生痰也。其主治之法。惟痰與氣一時壅閉咽喉者。不得不暫用豁痰降氣之劑以開之。餘皆當治其本。故古人有見痰休治痰之論。此誠千古之明訓。蓋痰本飲食濕濁所化。人豈能禁絕飲食。若耑欲消之。由於外邪者。邪散則痰或可清。如寒痰溫之。熱痰清之。濕痰燥之。燥痰潤之。風痰散之是也。若涉本原者。必旋消旋生。有至死而痰仍未清者矣。此乃不知治本之故耳。今觀案中治法。有因鬱因火者。必用開鬱清火爲君。以消痰佐之。

有因濕因熱者。則用燥濕清熱。略佐化痰之品。若因肝腎虛而生痰者。則純乎鎮攝固補。此真知治痰之本者矣。若因寒因濕者。更當於痰飲門兼參而治之。

華岫雲

所列方案皆治肺胃浮痰之藥。若透經入絡盤踞臟腑及三焦陰處之老痰。尚為峻厲製煉之方。此等方不能奏效也。

痰飲

外寒引動宿飲上逆

某高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆咳嗽形寒仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之。

杏仁三錢 粗桂枝一錢 淡乾薑一錢 茶芩三錢
苡仁三錢 炙草四分

周

向有耳聾鳴响是水虧木火蒙竅冬陽不潛亦屬下元之虛但今咳嗽喉下有痰音脇痛臥着氣衝乃衝陽升而痰飲泛脈浮當此躁冷恐有外寒引動內飲議開

太陽以肅上

問

醫

方

卷三

二味同用是古法

雲茯苓

粗桂枝

乾薑

五味

同薑
托

白芍

炙草

當午時服

某二新涼外束。肺受寒冷氣。餒不降。宿飲上干。而病發矣。
法當暖護背心。宿病可卻。

淡生薑粉

半夏

蛤蜊粉

茯苓

桂枝木

苡仁煎湯

某十背寒咳逆。此屬飲象。先當辛通飲邪。以降肺氣。

鮮枇杷葉

杏仁

茯苓

橘紅

生薑

半夏

某二脈右大弦氣喘。咳嗽。濁沫不能着枕。喜飲湯水。遇寒

飲上逆
肺氣不
降

病發此屬飲邪留於肺衛。如見咳。投以清潤。愈投愈劇矣。
葶藶子 山東大棗

徐氏痰飲上吐喘不得臥。乃溫邪阻蔽肺氣。氣不下降。壅滯不能着右。議用宣通開氣分方法。

小青龍去細辛麻黃加苡仁白糖炒石膏

沈姪
冬溫陽不潛伏。伏飲上泛。仲景云。脈沉屬飲。面色鮮明爲飲。飲家咳甚。當治其飲。不當治咳。緣高年下焦根蒂已虛。因溫緩氣泄。不主收藏。飲邪上擾。乘肺。肺氣下降。一身之氣交阻。絡血上沸。經云。不得臥。臥則喘甚。痺塞。乃肺氣之逆亂也。若以見病圖病。昧於色

診候氣必致由咳變幻。腹腫脹滿漸不可挽。明眼醫者勿得忽爲泛泛可也。茲就管見畧述大意。議開太陽。以使飲濁下趨。仍無礙於冬溫。從仲景小青龍越婢合法。

杏仁

茯苓

苡仁

炒半夏

桂枝木

石膏

白芍

炙草

方

氏

治暖失和。飲泛氣逆。爲浮腫喘咳。腹脹臥則衝嗆。議

用越婢方。

石膏

杏仁

桂枝

炒半夏

茯苓

炙草

不斤麻黃不成越婢

施四
勞煩太甚。胃陽受傷。外衛單薄。怯寒畏冷。食物少運。

痰飲內起氣阻濁凝胸背皆痛辛甘理陽已效當此長
夏脾胃主令崇其生氣體旺病可全好

六君子加益智木香

黃三身居沿海氣障霧露客邪侵入清陽陽傷畏寒久嗽

病人不知卻病護身猶然用力承辦裏結飲邪沉痼不
卻病 茯苓桂枝湯

胡四脈沉而微微則陽氣不足沉乃寒水陰凝心痛怔忡

漸及兩脇下墜由陽氣不主運行痰飲聚氣欲阻致痛
之來其心震之謂亦如波撼岳陽之義議用外臺茯苓

飲合桂苓方

人參

茯苓

半夏

枳實

桂枝

薑汁

白六脈沉小弦爲陰濁飲邪稟質陽不充旺。胸中清氣不得舒展曠達偶觸入寒冷或悞進寒物飲邪暴冷凝結胸痞當平日食物忌用酒肉腥濁便清陽流行常服仲景苓桂术甘湯百劑若病來因冷卽服大順散。

戴 痘去神已爽慧但本脈帶弦平素有飲爲陽氣不足之體年紀漸多昉有風痺此酒肉宜少用勞怒當深戒矣議外臺茯苓飲方。

人參

茯苓

廣皮

枳實

半夏 金石斛

朱九煩勞大過陽傷痰飲日聚陽蹻脈空寤不成寐衛陽失護毛髮自墜乃日就其衰奪矣初進通飲濁以甦陽

接服外臺茯苓飲

吳氏脈弦背中冷左偏微痛食少欲嘔四肢牽強此飲邪內結議通陽氣

桂枝

茯苓

半夏

薑汁

炙草

大棗

某眩暈惡心胸脘不爽脈右弦左弱面色紅亮此乃痰飲上泛有厥中之事

炒半夏

製茱萸

橘紅

煨天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

尤

口中味淡

是胃陽虛

夫濁飲下降

痛緩向有飲濕爲

患若乘急進溫通理陽濁飲必致復聚議大半夏湯法

人參

半夏

茯苓

枳實

薑汁

脾陽不

張七酒客穀少中虛常進疏散表藥外衛之陽亦傷其痰

飲發時胸中痞塞自述或飢遇冷病來其爲陽氣受病
何疑不必見痰搜逐但護中焦脾胃使陽氣健運不息

陰濁痰涎焉有竊踞之理

生於木

川桂枝

茯苓

淡薑渣

苡仁

澤瀉

薑棗湯法丸

王三脈沉爲痰飲。是陽氣不足。濁陰欲蔽。當以理脾爲先。

俾中陽默運。卽仲景外飲治脾之意。

苓桂术甘加半夏陳皮水法丸

某三舌白。咳逆不渴。非飲象而何。宜宣溫藥和之。

杏仁

苡仁

半夏

乾薑

粗桂枝

茯苓

厚朴

炙草

某食後脘中痞阻。按之漉漉有聲。手麻脇痛。心煩耳目昏眩。是氣不流行。痰飲內聚。中焦用桂苓丸。竹瀝薑汁。

法丸

又

桂枝

人參

茯苓

半夏

廣皮

炙草

黃味過甘膩。中氣緩。不主運。延綿百天。聚氣結飲。束垣
類。故不渴飲。仲景五飲互異。其要言不繁。當以溫藥和
之。通陽方法。固無容疑惑。大意外飲。宜治脾內飲。治腎
是規矩準繩矣。議用苓桂术甘湯。

某形體似平壯實。陽氣外泄。畏風怯冷。脾陽消乏。不司
健運。水穀悍氣蒸變痰飲。墜道日壅。上實下虛。仲景謂
飲邪當以溫藥和之。苓桂术甘得效。從外飲立方。

人參

淡附子

生於术

枳實

茯苓

澤瀉

荆瀝薑汁法丸

脾腎陽虛

茱萸

老人久嗽妨食議以外飲治脾、芩桂术甘湯

王三

脈沉

背寒

心悸如墜

形盛氣衰

漸有痰飲

內聚當溫

通補陽方復辟斯飲濁自解

人參

淡附子

乾薑

蕤苓

生於术

生白芍

陽虛則形寒汗出痰飲痞聚都是陰濁成形乘陽氣衰微致上干竊踞古人法則必通其陽以掃陰氣但宿病無急攻方况平素憂鬱氣滯血濁久耗之體不敢純

剛防刦液耳。

人參

熟附子

淡乾薑

炒川椒

川桂枝

烏梅肉

生白芍

另真武丸三兩

程

八

左脈沉靜。右脈微弦。四旬清陽日薄。脾臟鼓運漸遲。

加以煩心。繁思。水穀悍氣。蘊蒸痰飲。仲景謂外飲當治脾陽。况中年常有遺泄之患。按脈非龍相之動搏。議固下益腎。轉旋運脾二方。分早晚服。早服從還少聚精七寶。參用丸方。

熟地

蕤蓉

枸杞

五味

萸肉

茯神

山藥

菟絲

覆盆

魚膠

菖蒲

遠志

龍骨 青鹽 熟蜜同棗肉搗丸早服五七錢

茅术 於术 半夏 茯苓 廣皮 生益智

白蒺 鈎藤 薑棗湯泛丸晚服三錢開水下

徐

清陽未展濁陰欲踞久延必結痰飲議用真武丸二
錢五分人參一錢煎湯送胃陽得震濁當退避矣十服

某 脈沉弦飲泛嗰咳乃下虛無以制上議早服腎氣丸
此古法也攝納下焦散失以治水泛之飲午服外臺茯苓飲轉旋
中焦使食不致釀痰茯苓飲去术

某 七高年久嗽脈象弦大寤不成寐乃陽氣微滯濁飲上
泛仲景云進溫藥和之

脾胃陽虛飲逆
咳嘔

杏仁三錢

茯苓三錢

川桂枝一錢

生薑一錢

苡仁三錢

炙草四分

大棗二枚

顧

咳嗽數月，嘔出涎沫，建中不應，已非營衛損傷，視其

面色鮮明，飲食仍進，倣飲邪主治。

小半夏湯加桂枝杏仁薑汁。

李

三勞傷陽氣，內起痰飲，臥着氣鈍，飲阻其欬爲多痰，出

八八，稍通勢緩，且體常汗泄，非風寒表邪不解，並不熱渴，亦

非火炎爍金，仲景云：飲家而欬，當治飲，不當治欬。

茯苓

桂枝木

苡仁

炙草

薑汁

陳脈濇，小舌白，不渴，身動，嘔痰，身如在舟車中，此寒熱

攻胃致傷。逆氣痰飲互結。通補陽明爲正。白朮甘草守中。未能去濕。宜緩商。

人參汁

半夏

枳實汁

茯苓

竹瀝

薑汁

馬三肌肉豐溢。脈來沉緩。始發右季脇痛。湯飲下咽。汨汨有聲。吐痰涎頭痛。此皆脾胃陽微寒。濕滯聚年。方壯盛不必介懷。溫中佐其條達。運通爲宜。

茅朮

厚朴

半夏

茯苓

陳皮

淡薑渣

葫蘆巴

炙草

薑汁泛丸

馬四甘緩頗安。辛泄不受。此陽分氣衰。將來飲邪日聚。然

臥着歎多。清氣失施。先用苓桂术甘湯。繼進外臺茯苓
飲。

曹七則中年陽氣日薄。痰飲皆屬陰濁。上千清道。爲衝逆咳嗽。仲景治法。外飲治脾。內飲治腎。分晰甚明。昔年曾用桂苓澤木。得效。是治支飲治法。數年真氣更衰。古人謂飲邪當以溫藥和之。須忌治嗽肺藥。

先用小青龍去麻辛。接服外臺茯苓飲

程五昔肥今瘦爲飲。仲景云。脈沉而弦。是爲飲家。男子向老。下元先虧。氣不收攝。則痰飲上泛。飲與氣湧。斯爲歎矣。今醫見嗽。輒以清肺降氣消痰。久而不效。更與滋陰。

脾腎陽虛飲逆咳

明達之論不愧
爲名家矣

不明痰飲皆屬濁陰之化滋則堆砌助濁滯氣試述着枕欬瘈一端知身體臥着上氣不下必下衝上逆其痰飲伏於至陰之界腎臟絡病無疑形寒畏風陽氣微弱而籜籬疎撤仲景有要言不煩曰飲邪必用溫藥和之更分外飲治脾內飲治腎不讀聖經焉知此理

桂苓甘味湯

熟附都氣加胡桃

陳 痛久氣亂陽微水穀不運蘊釀聚濕胃中之陽日薄痰飲水濕必傾囊上湧而新進水穀之氣與宿邪再聚復出致永無痊期仲景云飲邪當以溫藥和之又云不渴者此爲飲邪未去故也則知理陽通陽誠有合於聖

訓，斷斷然矣。真武湯。

張四一痰飲喘咳，肌肉麻痺，痞脹不堪納穀。冬寒日甚，春暖

日減，全は陽氣已衰。陰濁逆于犯上，肺藥治嗽無非辛泄滋潤，蓋辛散則耗陽，滋清助陰濁，濁阻在陽分，氣不

肅，爲夜不得臥。小青龍意主乎由上以泄水寒，直從太陽之裏以通膀胱，表中裏藥也。仲景謂飲邪當以溫藥和之，驅陰邪以復陽，一定成法。早腎氣去，更換白芍

炒查炭水法丸 晚外臺茯苓飲薑棗湯法丸

程六腎虛不納氣，五液變痰上泛，冬藏失職，此病爲甚。不可以肺咳消痰，常用八味丸收納陰中之陽，暫時撤飲。

用仲景桂苓味甘湯

孫未交冬至，一陽來復，老人下虛不主固納，飲從下泛，氣阻升降而爲喘嗽。發散寒涼苦瀉諸藥，焉得中病？仲景云：飲家而咳，當治飲；不當治咳。後賢每每以老人喘嗽，從脾胃溫養定論，是恪遵聖訓也。

桂枝 茯苓 五味子 甘草湯代水加淡薑棗
李 腸紅久病不必攻治。今者氣衝喘嗽，脘脇痞阻，是飲濁上僭，最宜究悉。

川桂枝分 茯苓三錢 乾薑一錢 五味子同薑合一錢
杏仁半錢 白芍一錢 炙草五分 生左牡蠣三錢

腎陽虛
飲逆喘

咳喘

吳二壯年下元久虛，收納氣泄，每交秋冬受冷，冷氣深入絡中也。蓋精血少壯不旺，難以搜逐。病根不去，謂此絕慾一年，小暑艾灸，靜養一百二十天可愈。附都氣加車前。

潘九勞力喘甚，肩背惡寒，飲泛上逆，皆係下元虛損。以喘用瀉肺等藥，薛氏八味丸。

王秋深天氣收肅，背寒喘咳，飲濁上泛，緣體中陽氣少，振不耐風寒所致，最宜緩護背部，進通陽以治飲。

茯苓

桂枝

半夏

薑汁

苡仁 灸草

又 早腎氣丸 夜真武丸

陳 脈虛微春陽地升濁陰上干喘不得臥治在少陰

人參

淡熟附子 猪膽汁

此非急症不得用此以傷胃氣

又 照前方加淡乾薑一錢半

又

脈弦暮夜濁陰衝逆通陽得效議真武法以撤其飲

人參

本無參此亦不必加

淡附子 生白芍 茯苓

薑汁

又

真武泄濁膀通思食能寐昨宵已有渴欲飲水之狀

考金匱云渴者飲邪欲去也當健補中陽以資納穀

人參

非渴者所宜

生於术 淡附子 茯苓

澤瀉

又早服腎氣丸四五錢。晚用大半夏湯。

人參

半夏

茯苓

薑汁

董脈弦右濡陽微惡寒飲濁上干咳嗽吐涎沫且食減胃衰寒痼竊踞陰濁見症豈止一端。喻嘉言謂濁陰上加於天非離照當空氣霧焉得退避反以地黃五味陰藥附和其陰，陰霾冲逆肆虛飲邪滔天莫制。議以仲景熟附配生薑法掃羣陰以驅飲邪維陽氣以立基本况尊年尤宜急護真陽爲主。

人參

茯苓

熟附子

生薑汁

南棗

戴

十二月間診得陽微濁飲上干爲咳不能臥曾用小

青龍湯減去麻黃細辛服後已得瘡枕而臥想更醫接
用不明治飲方法交驚蟄陽氣發泄病勢再熾頃診脈
來羸弱無神痰飲咳逆未已諒非前法可效宗仲景真
武湯法以熟附配生薑通陽逐飲立法

真武湯去白朮加人參

腎陽虛
膀胱氣化不順

計

不臥嗆喘泛起白沫都是腎病議通太陽膀胱

茯苓

川桂枝

淡乾薑

五味子

百合

炙草

顧

臥則喘咳不得息肺主出氣腎主納氣二臟失司出納
飲邪泛溢喘嗽督損頭垂身動喘甚食則脘中痞悶。

失職議用早進腎氣丸三錢。以納少陰。晚用小青龍法。
滌飲以通太陽經腑。此皆聖人內飲治法。與亂投膩補
有間矣。小青龍去麻辛甘芍。加茯苓杏仁大棗。

某形盛面亮。脈沉弦。此屬痰飲內聚。暮夜屬陰。喘不得
臥。仲景謂飲家而咳。當治其飲。不當治咳。今胸滿腹脹。
小水不利。當開太陽以導飲逆。小青龍去麻辛合越婢。

桂枝

半夏

乾薑

五味

杏仁

石膏

茯苓

白芍

某服三拗湯。音出喘緩。可見苦寒沉降之謬。素多嘔逆。
下血中焦必虛。而痰飲留伏。顯然議治其飲。

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓苡仁糖炒石膏

某

太陽經氣不開小水不利下肢腫浮漸上着枕氣塞欲坐濁飲上干竟有坐臥不安之象醫者但以肺病刻治於理未合急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙濁飲痰氣自無逆冲之患矣。

桂枝

杏仁

乾薑

五味

半夏

茯苓

章 伏飲陰濁上干因春地氣主升而發嘔吐不飢自然脾胃受傷六君子宣補方法未嘗不妙今診得吸氣甚微小溲晨通暮癃足跗浮腫其腑中之氣開闔失司最

慮中滿。夫太陽司開。陽明司闔。濁陰瀰漫。通腑即是通
陽。倣仲景開太陽一法。

牡蠣

澤瀉

防已

茯苓

五味

乾薑

寒飲濁
邪上冲
膻中
張七喎喘哮。坐不得臥。神迷如呆。氣降則清。水寒飲邪。上
冲膻中。用逐飲開濁法。

薑汁炒南星

薑汁炙白附子

茯苓

桂枝

炙草

石菖蒲

肺胃濕痰

某三咳緩，痰少，脘中不爽，肌膚癰癧，皆濕邪未盡，痰飲竊

踞之象，當用六安法。

中虛濕
熱

王

當年陽虛濁飲上泛喘急用真武湯丸而效因平素嗜酒少穀中虛濕聚熱蘊蒸痰目黃齶血未可爲實熱論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦清滲理其濕熱以酒客忌甜故也。

杏仁

白芥子

炒半夏

炒

橘紅

茯苓

茯苓

四兩

人參

二兩

杏仁

四兩

枳實

一兩

半夏

二兩

廣皮

二兩

金石斛

八兩

煮汁爲丸

汪 中焦痰
熱 暫緩參术務清中焦熱痰

杏仁

枳實汁

橘紅

瓜蔞皮

鬱金

半夏麴

桔梗

黑梔皮

痰飲挾
燥

張氏痰飲挾燥，喉中癢。

杏仁

花粉

茯苓

象貝母

氣火不
降

陳姫痰飲挾氣火上踞，脘痞、脹不爽，宜理氣熱。

半夏

茯苓

瓜蔞皮

黑梔皮

橘紅

鬱金

某脈弦右濶，面亮舌白，口乾不喜飲，頭重岑岑然，胸脘痺塞而痛，得噯氣稍舒。酒客穀少，中虛痰飲聚蓄，當此

夏令地氣上升飲邪挾氣上阻清空遂令前症之來。金匱云脈弦爲飲色鮮明者爲留飲口乾不欲飲水者此爲飲邪未去故也。况熱汗出豈是風寒春夏溫邪辛溫發散爲大禁。自云身體空飄年已六旬又四辛散再泄其陽不亦左乎。

半夏

薑汁

川連

吳萸

茯苓

枳實

竹瀝

生喘伏飲

潘三八遠客路途風寒外受熱氣內蒸痰飲日聚於臟之外絡脈之中凡遇風冷或曝烈日或勞碌形體心事不寧擾動絡中宿飲飲泛氣逆咳嗽氣塞喉底胸膈不思食

絡 飲伏經

物着枕、喰吐、稠痰。氣降自愈。病名哮、喘、伏飲。治之得宜。
除根不速。到老年歲。仍受其累耳。小青龍湯去細辛。
童五背寒短氣。背痛。映心貫脇。入腰食粥。噫氣。院痞。瀉出
黃沫。飲邪伏濕。乃陽傷竊發。此溫經通絡爲要。緩用大
參。

川桂枝 生白术 炒黑蜀漆 炮黑川烏

厚朴

茯苓

胸次清
陽少旋
飲支脈結

葉四脈右弦舌黃不渴當心似阻昔形壯今漸瘦咳久不
已。臥着則咳痰出稍安。此清陽少旋支脈結飲議通上
焦之陽。

鮮薤白

爪薤皮

半夏

茯苓

川桂枝

薑汁

楊

頭中冷痛。食入不消。筋脈中常似掣痛。此皆陽微不
主流。痰飲日多。氣隧日結。致四末時冷。先以微通胸
中之陽。

乾薤白

桂枝

半夏

茯苓

爪薤皮

薑汁

半夏

茯苓

又微通其陽已效。痰飲阻氣。用茯苓飲去廣皮加薑汁。
程子支脈聚飲寒。月喘甚。初因寒濕而得。故食辛稍安。

支脈結
飲

杏仁

半夏

厚朴

苡仁

茯苓

薑汁法丸

趙

支飲。腸痛咳逆。

小青龍去麻辛

汪

氏支脈結飲。阻氣喘張。入腸則痛。厥逆爲眩。

茯苓

桂枝

半夏

杏仁

鬱金

糖炒石膏

黃

支脈結飲。發必喘急。病發用。

桂枝

茯苓

五味

炙草

懸飲

馮驅飲。
懸飲流於胃中。令人酸痛。湧噫酸水。當辛通其陽。以

桂枝木

半夏

茯苓

炒黑川椒

薑汁

脇痛五六年此必有瘀血頑痰積而不散病屬有形非僅氣血

又 照前方加淡附子

施 診脈右虛左小弦面色黃少華采左脇肋痛五六年未愈凡久惡必入絡絡主血藥不宜剛病屬內傷勿事膩補錄仲景旋覆花湯加柏子仁歸鬚桃仁

又 初服旋覆花湯未應另更醫謂是營虛用參歸熟地桂芍炙草服後大痛醫又轉方用金鈴半夏桃仁延胡茯苓服之大吐大痛復延余治余再議方謂肝絡久病懸飲流入胃絡致痛不已議太陽陽明開闔方法

人參

茯苓

炙草

桂枝

煨薑

南棗

服苦藥痛嘔。可知胃虛。以參苓鬪陽明。用草桂開太陽。并辛香入絡。用薑棗通營衛。生薑恐伐肝。故取煨以護元氣。而微開飲氣也。

又前方服之痛止。議丸方。

雖止必發

人參 半夏

川椒

茯苓

桂枝

煨薑南棗湯丸

某夏季陽氣大升。痰多嗰咳。甚至夜不得臥。穀味皆變。大便或溏或秘。診脈右大而弦。議以懸飲流入胃絡。用

開闔導飲法

人參

茯苓

桂枝

炙草

燬薑

南棗

又 早診脈。兩手皆弦。右偏大。凡痰氣上湧。咳逆愈甚。日來小溲少。下焦微腫。議通太陽以攝飲邪。

人參

茯苓

桂枝

炙草

五味

乾薑

以上治痰飲諸案深得古人治法最爲卓識。然當時見此老治飲症竟有不用此等法而悞治者。不知何故。至于案中重複竟成逐日號簿。此書每門無不如是。此編集之人真不校集之法者也。惜哉。

又 脈弦畧數。不渴不思飲。此飲濁未去。清陽不主運行。前方甘溫。主乎開闔。能令胃喜。次法開太陽以攝飲邪。亦主陽通。據自述心下胃口。若物阻滯。呆滯其濁。錮陽微大。著其治咳澁陰。適爲陰濁橫熾矣。議用大半夏湯法。大半夏湯加炒黑川椒。

內經止有積飲之說。本無痰飲之名。兩漢以前謂之淡飲。仲景始分痰飲。因有痰飲懸飲溢飲支飲之義。而立大小青龍半夏杏桂术甘腎氣等湯。以及內飲外飲諸法。可謂闡發前賢獨超千古。與後人所立風痰濕痰熱痰酒痰食痰之法迥異。總之痰飲之作必由元氣虧乏及陰盛陽衰而起。以致津液凝滯。不能輸布。留於胸中。水之溝者。悉變爲濁。水積陰則爲飲。飲凝陽則爲痰。若果真元充足。胃強脾健。則飲食不失其度。運行不停其機。何痰飲之有。故仲景云。病痰飲者。當以溫藥和之。乃後人不知痰飲之義。妄用滾

實有此等分別詳聖不遺指此無名耳

痰丸。茯苓丸。消痰破氣。或滋填膩補等法。大傷脾胃。
堆砌助濁。其於仲景痰飲之法。豈不大相乖謬乎。然
痰與飲雖爲同類。而實有陰陽之別。陽盛陰虛。則水
氣凝而爲痰。陰盛陽虛。則水氣溢而爲飲。故王晉三
先生取仲景之小半夏。茯苓。及外臺飲三湯。從脾胃
二經分痰飲立治法。而先生又取仲景之苓桂术甘。
外臺茯苓飲。腎氣丸。真武湯。分內飲外飲治法。而於
痰飲之症。無遺蘊矣。愚歷考先生治痰飲之法。則又
有不止於此者。然而病變有不同。治法亦有異。如脾
腎陽虛。膀胱氣化不通者。取仲景之苓桂术甘湯。茯

苓飲、腎氣真武等法。以理陽通陽及固下益腎轉旋運脾爲主。如外寒引動宿飲上逆。及膀胱氣化不通。飲逆肺氣不降者。以小青龍合越婢等法。開太陽膀胱爲主。如飲邪伏於經絡。及中虛溼熱成痰者。則有川烏蜀漆之溫經通絡。外臺茯苓飲去甘草少佐苦辛清滲理濕之法。其飲邪上冲膻中。及懸飲流入胃中而爲病者。又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等驅飲。開濁辛通陽氣等法。絲絲入籠。一以貫之。病情治法。胸有成竹矣。非深於得道者。其孰能之。

鄒滋九