



臨江府
卷之二

國氏
書

高橋
書

炮炙全書敘

先正曰一艸一木亦皆有

可察夫以物理之學亦大乎

哉其粗者正名稱藥其細者

辨其性味是知其質也其精

者通其理是分別其良毒也

察其用之其效驗可以安世

高橋
書

國氏
書

門中武
第
卷

齊氏
齋

同書

炮炙全書



心遠堂藏版

心遠堂藏



炮炙全書敘

先正曰一艸一木亦皆有理不可不察夫以物理之學亦大乎哉其粗者正名稱辨真假而多識鳥獸艸木是知其質也其精者通曉其功能分別其良毒洞察資用之方其效驗可以安危

起_テ死_ニ而療_ス民瘼_ヲ乃人生日用之
急務_ニ而化育之所不及者亦賴_テ
之以贊助_ス然則晏子良醫與良
相埒_キ之語_ニ豈有_レ以哉蓋謂其與
燮理_ニ同功_ニ而已其學焉者當以
本艸_ヲ爲要_ト而後該覽_ス於羣書_ニ然
本艸亦不易_ニ讀_ニ何也群品之殊

質_ヲ衆物之異性_ニ非鹵莽滅裂之
學所能精詳也吾夙好_シ此學_ヲ其
志甚懇然_ニ本邦精斯學者幾
希且吾僻在_ニ遐陬_ニ恨難逢_ニ其識
者都人稻若水業經_フ之餘暇好_シ
窮物理善讀_ニ本艸_ヲ且旁搜_ク廣訪_シ
多識_ニ於艸木蟲魚者亦孔精詳

吾頃客於中州與之討論咨詢而辨是非決嫌疑品物得其實者不可選記可謂得其人也觀其所著炮炙全書訂正於世暨之譌謬旌別於藥舖之贗因而窮究古人修製之法兼辨真假審採用又編錄采藥獨斷食物

傳信等書俱可爲時師法繩焉庶乎有裨于生養矣豈與世之夸詡無用之辨藻飾浮靡之言可同日而談耶予嘆賞之餘聊述其所識以弁其首諗諸觀者云

元祿己巳端午日

筑前州後學貝原篤信書



炮炙全書

凡例

一凡藥品見於古今本艸者殆二千種矣善用藥者當多多益善今此不能殫述第選擇醫方常用之藥究極古法製治之宜兼辨真假又審採取此即療者之必不可缺者分以其屬從焉餘非必用之藥及世之所罕識與力之難能致者存而不論

一夫物之難識者為其名之難明也名之難明者五方之名既不同而古今之言亦自別矣至其名齊

實異者則愈益淆亂似之而非者復易相紊苟非
詳著形狀細譚名謂則其有不因名迷實者鮮矣
徧觀近時所行于世釋艸木昆蟲之書妄造其名
駕以孟浪之說皆非耳目見聞之實論如白羊鮮
則曰羊草劉寄奴則曰唐帝草尤不足以考信也
凡如此之類一皆削去不載惟物之傳譌者市肆
飾偽者備書以質於世之周知者
一良忌制使物性自然非可以意求者俱考諸家本
艸併所聞採入俾得遵守

一次序不悉從本艸今就所見稍加移正尚未確認
者一仍其舊不革
一本艸一書民命所繫凡學之者務在識真不比他
書惟求其說而可也時獲古今名物之書閱之率
多陳妄其傳譌襲非久矣夫藥品稱謂一違則力
用全乖若有誤服遺害非淺余竊嘆焉乃於治經
餘暇又有志于鳥獸艸木之學不問飛潛動植皆
欲究其性情於是翩然自往攀緣上下于溪山窮
谷荒陂野艸之間擷林卉拾澗實洪纖細大無物

不察至其生於遠地遐方而余之足迹所未及者
 則必得訪之四方達觀博物之客以殫究其靈艸
 神木所在矣竟不自揣博采眾書及獻民之說斷
 以己意頗能撰次題曰采藥獨斷狀其形質疏其
 花實珍寶奇物皆有所紀而旁及方俗所呼庶幾
 名實不爽可為來者之鏡矣其就緒又當嗣刻以
 問世

元祿己巳二月初一日稻某識



炮炙全書總目

第壹卷

艸之屬

人參	參蘆	黃耆	甘艸	沙參
薺芩	桔梗	葳蕤	黃精	知母
肉蓯蓉	鎖陽	天麻	白朮	蒼朮
狗脊	貫眾	巴戟天	遠志	淫羊藿
仙茅	玄參	地榆	丹參	紫艸
白頭翁	白及	三七	黃連	胡黃連
黃芩	秦艸	柴胡	前胡	防風
防葵	獨活	羌活	升麻	苦參
白鮮皮	延胡索	貝母	山慈姑	茅根
龍膽州	細辛	白薇	當歸	芎藭

蛇牀子	藁本	白芷	芍藥	牡丹
木香	高良薑	紅豆蔻	艸豆蔻	艸果
白豆蔻	縮砂	益智	華荑	肉豆蔻
補骨脂	薑黃	鬱金	蓬莪朮	荆三稜
香附子	藿香	蘭葉	零陵香	蘭艸
澤蘭	馬蘭	香薷	薄荷	小懷香
大懷香	積雪艸	水蘇	菊花	艾葉
茵陳蒿	青蒿	白蒿	菴蒿子	芫薺
芫薺子	夏枯艸	劉寄奴	旋覆花	青葙子
雞冠子	紅花	大薊	小薊	續斷
漏蘆	飛廉	苧根	大青	豨薟
蒼耳	蒼耳實	天名精	鶴虱	豨薟
芭蕉油	麻黃	麻黃節	水賊	豨薟

第貳卷

艸之屬

地黃	熟地黃	牛膝	紫苑	麥門冬
萱艸根	淡竹葉	黃蜀葵	敗醬	款冬花
鼠麴艸	決明子	瞿麥	王不留	葶藶子
車前子	馬鞭艸	龍牙艸	蛇銜	燈籠艸
葫蘆	青黛	虎杖根	蒺藜	沙苑藜
蒹蓄	紫花地	威靈仙	牛扁	大黃
羊蹄根	商陸	蘭茹	大戟	澤漆
甘遂	續隨子	蓖麻子	藜蘆	黑附子
川烏頭	天雄	艸烏頭	白附子	天南星
半夏	蚤休	射干	菟絲子	五味子
覆盆子	使君子	木鱉子	馬兜鈴	牽牛子

抱天全書

卷五

二

紫葳	天門冬	上茯苓	海金沙	忍冬	穀精	石菖蒲	昆布	金星	粳米	浮小麥	菽之屬
栝樓實	百部	白斂	木通	金銀花	鱈腸	蒲黃	鷓鴣菜	石胡荽	糯米	薏苡仁	
天花粉	何首烏	山豆根	絡石	赤地利	燈心	水萍	石斛	胡麻	胡麻	罌粟殼	
乾葛	萆薢	茜根	木蓮葉	白前	蘆根	海藻	骨碎補	麻油	阿片	麻仁	
葛花	菝葜	防己	釣藤	石龍子	澤瀉	海帶	石韋				

黑豆	赤小豆	菽豆	白藟豆	胡盧巴
造釀之屬	神麩	紅麩	麥芽	飴糖
苦酒	酒			
蔬之屬	葱莖白	大蔬	白芥子	藜蘆子
韭子	生薑	乾薑	胡荽	山藥
萊菔子	冬葵子	藜	紫蘇	蘇子
百合	牛蒡子	蒲公英	地膚子	
荊芥	果之屬			
杏仁	烏梅	白梅	桃仁	大棗
雪梨	木瓜	山楂	柿餅	柿蒂
石榴皮	橘皮	橘核	青皮	柑皮

枇杷葉	胡椒	椽斗子	荔枝核	龍眼肉
椒欖	榧子	松子	檳榔	大腹皮
郁李仁	川椒	胡椒	葶澄茄	吳茱萸
茶葉	孩兒茶	甜瓜蒂	石蜜	蓮子
蓮鬚	荷葉	芡實		
第參卷				
木之屬				
柏子仁	側柏葉	松脂	桂心	桂枝
辛夷	沈香	丁香	檀香	降真香
烏藥	乳香	沒藥	白膠香	騏驎竭
安息香	蘇合香	龍腦香	樟腦	阿魏
蘆會	胡桐淚	黃藥	厚朴	杜仲
椿白皮	樗白皮	乾漆	桐實	桐子油

海桐皮	金鈴子	槐花	槐實	秦皮
合歡皮	皂莢	皂莢子	皂莢刺	沒石子
訶黎勒	柳	水楊	榆白皮	蕪荑
蘇方木	櫻櫚皮	烏白皮	巴豆	大風子
桑白皮	楮實	枳實	枳殼	山梔子
酸棗仁	玃核仁	山茱萸	金櫻子	連翹
枸杞子	地骨皮	五加皮	衛矛	石南葉
荆瀝	蔓荊子	紫荊	木槿	木芙蓉
密蒙花	賣子木	接骨木	冬青	枸骨
女貞	常山	芫花	白茯苓	赤茯苓
茯神	豬苓	雷丸	桑寄生	松寄生
竹葉	竹茹	竹瀝	天竹黃	箬葉
竹之屬				

包天全書

第肆卷

鱗之屬

龍骨 紫稍花
白花蛇 烏稍蛇

鮫鯉甲 青魚膽

蛤蚧 海螵蛸

蛇蛻

介之屬

龜甲 鱉甲
海蛤 蛤蜊粉

牡蠣

真珠

石決明

羽之屬

白丁香 夜明砂
毛之屬

五靈脂

豬脂

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

虎骨

犀角

熊膽

麝茸角

鹿茸

麝香

鹿角

白膠

麋茸

麋角

明月沙 臘臍臍

蟲之屬

蜂蜜 黃白蠟
百藥煎 桑螵蛸
蟬蛻 蟾蜍

露蜂房 白僵蠶
蟾酥

蟲白蠟 原蠶蛾
蜈蚣

五倍子 蜘蛛
蝟牛

金石之屬

金薄 自然銅
黃丹 密陀僧
爐甘石 琥珀
雄黃 石膏
石鍾乳 浮石
花蕊石 膽礬
蓬砂 硫黃

銅青 水銀
雲母 滑石
石灰 食鹽
白礬

黑錫 輕粉
紫石英 赤石脂
代赭石 青鹽
綠礬

粉錫 銀朱
硃砂 無名異
青礬石 芒消

水之屬

地漿 漿水

火之屬

艾火 雷火神鍼

土之屬

伏龍肝 百艸霜 墨

附錄

髮髮 童便

通計肆佰柒拾壹種

炮炙全書總目終

炮炙全書

參考書目

圖經本本 證類本本 本本經綱目 本本經疏 本本經全 藥性要略 本本約言 日本洞詮 日本用本 食物本本 本本選選 藥性解記 廣筆記

桐君藥錄 張元素珍珠囊 本本行義補遺 本本蒙筌增輯 本本新本原始 本本新本原始 食物本本 補註藥性大綱全 仁壽堂藥鏡全 藥性賦大藥全 救荒本本 仙製本本 和劑局方 局方發揮

素問啟玄子註
素問馬玄臺註
靈樞馬玄臺註
張介賓類經註
傷寒論成無已註
證治準繩
古今醫統
醫宗綱目
傷寒六書纂要

周禮註疏
禮記註疏
詩經註疏
爾雅註疏
史記評林
前漢書評林

格致餘論
衛宗粹言
鑿宗救正錄
軒岐醫述
奇效齋醫案
薛立齋醫案
三玄入門書
東醫寶鑑
訂補易簡驗方
傷寒補註辨疑

詩經大全
詩經說約
詩經備考
詩經世本古義
毛詩名物疏
六家詩名物疏
通志方略
楊子方古要論
新增格古要論
太平廣記
農政全書
彙苑詳註
典籍便覽
事文類聚
圓機活法
群書纂要
字彙
續字彙
爾雅翼
小爾雅
逸雅
廣雅
埤雅

文選六臣註
文選纂註
西京雜記
淮南子
山海經
水經
呂氏春秋
抱朴子
三才圖會
月令廣義
潛確類書
齊民要術
酉陽雜俎
酉陽雜俎續集
焦氏類林
焦氏筆乘
焦氏筆乘續集
洪容齋五筆

毛詩陸疏廣要
陸疏廣要
通志方略
楊子方古要論
新增格古要論
太平廣記
農政全書
彙苑詳註
典籍便覽
事文類聚
圓機活法
群書纂要
字彙
續字彙
爾雅翼
小爾雅
逸雅
廣雅
埤雅

博物志

李肇國史補
輟耕錄
齊東野語
琅邪代醉
閩中記
居家用
桂海志
臨海志
真臘風土記
洛陽異物志
魏王花木志
南園花木志
楚辭芳艸木狀
益部方物略記
宛委餘篇
墨客揮犀

博物志
續博物志
夢溪筆談
五雜俎
段公路北戶錄
程羽文小名錄
屠本峻野菜箋
王鴻漸野菜譜
高濂野品譜
戴凱之竹譜
劉之美續竹譜
僧贊寧筍譜
柳貫打棗譜
郭橐駝種樹書
俞宗本種樹書
郭義恭廣志
沈懷遠南越志
物類感志

金漳蘭譜
王氏蘭譜
劉蒙志菊譜
史正志菊譜
菊譜百詠圖
陳翥大梅譜
范成大海棠譜
陳思海棠譜
荔枝譜
龍眼譜
香譜
名香譜
禽經
獸經
古玩品
珍珠船
陸羽茶經
顧元慶茶譜

歐陽公洛陽牡丹記
周氏洛陽牡丹記
壯丹八書
楊州芍藥譜
韓彥直橘錄
俞宗本種藥疏
王仲遵花史
高濂珍異藥
學圃雜疏
嶺表錄異
溪蠻叢笑
葑園同春
海味清隱
山家供魚
遊園居士
盛弘之荆州記
顧微廣州記
劉欣期交州記

博物志

七

寧波府志 汝南府志 嚴州府志 真定府志 南昌府志 松江府志 邵武府志 汀州府志 河間府志 衢州府志 萊州府志 廣西府志 廣東府志 浙東府志 衡州府志 補陀山志 仙遊志 福清志 續畧

通安府志 吉安府志 袁州府志 淮南府志 鎮江府志 漳州府志 福州府志 常熟縣志 餘姚縣志 宜興縣志 江陰縣志 嘉興縣志 惠安縣志 南安縣志 赤城縣志 羅山縣志 海鹽縣志 八閩通志

馮時可茶錄 許次仔茶疏 羅順茶解 陸樹聲茶寮記 徐獻忠水品 田藝蘅煮泉小品 泉南雜志 居山雜志 八種畫譜 蠡海集 楚辭集 楚辭辨證 柳子厚集 吳艸蘆集 閩書 大明一統志 興化府志 泉州府志

永嘉郡記 大業雜記 四時宜忌 歸田錄 清暇錄 資暇錄 異魚圖贊 黃衷海語 姚寬叢語 古錄 丹鉛總錄 何首烏錄 彰明附錄 中華古今錄 退齋雅聞 金華志 大原府志 平陽府志

火錄 書

八

秦州記
北堂書鈔
白孔六帖
相牛經
草木子
鄭夾際爾雅註
通雅
正字通
群芳譜
湧幢小品
癸辛雜識續集
癸辛雜識別集
揮塵錄
老學庵筆記

藝文類聚
天中記
事玄要言
留青日札
周南林類書纂要
古學彙纂
說文解字
少補韻會
茅亭客話
避暑錄話
柳環記
鶴林玉露
增訂廣輿記

參考書目終

炮炙全書卷第一

○○ 平安 稻義宣義 纂

艸之屬

人參 甘微苦溫要肥大塊如雞腿併似人形黃色者
去蘆頭用茯苓馬蘭為使惡鹵鹹阜莢黑豆反
藜蘆畏五靈脂動紫石英
人參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉其
似人形者謂之孩兒參尤多贗偽頻見風日則易

蛙惟納瓦罐雜細辛密封可留經年市之貨者隨
品立名曰土佐向單般人參也世醫土佐道壽藥
物必要上好人參非單股不使故坊間以好參
名土佐向走道壽之義也日北雖大皆用數片
合而成之其功反不及小者日碎皆人參頭
條及揀出於蘆參鬚之中者日參鬚其根碎
細毛也日浮以人參完浸煎取汁晒乾復售者
又名之服木州所謂湯參也浮者輕匏之謂服者
取汁而服之義也又有實鉛假重者俱不任用日
小人參始生薩摩州今處處有之三極五葉花有
紫白二色結子生青熟赤根大如小棗有鬚轉相
延生味甚苦其鬚嚼之甘苦氣味微與人參相近
又名之三枝五葉州其苗葉花實雖與圖經三極
五葉之說相合然根形迥然不同凡物有似之而
非者此物決非真人參也人多有以甘州湯浸煮
代人參用者尤為不可也天和二年朝鮮國來聘
時有人以此州問之彼國醫者曰此百濟人參也
按東醫寶鑑云人參中心生一莖與桔梗相似又

不言別有此種朝鮮來人言多謬妄不可為信也
日唐人參自清來貨者味其微苦惟要透明似肉
近蘆有橫紋者則假參自不得奈之凡用宜擇重
實者此皆藏於市肆者也又人間有薩摩人參者
二種一其葉微似蕨根如人參而有鬚氣味薄一
苗高三四尺葉似七頭結小房子此即漏蘆也又
別有名人參者相傳加藤清正征朝鮮得其種以
歸氣味似胡蘿蔔苗葉嫩時可作蔬食又加賀州
白山產一種州土人謂之人參其根大如指許氣
味如當歸俱雖非人參蓋亦州中之佳品也此外
蘆名者多有之近人又種防葵以為人參也采其
根蒸造足以混真也或又有以白芷根造作者亦
能易紊之凡此類若令誤服遺害非淺故詳辨種
類以正其謬人參本不言忌鐵器李子郁始著之
蓋亦因金耐木之義而
為之說爾不必在忌列
參蘆近時人參值隆人多以參
蘆代用不誦本州之過矣

抱朴子書 卷之二 二

黃耆

甘微溫選單股不岐色潤柔軟肉心黃甘甜近
炒之茯苓為使
惡龜甲白鮮皮
近時有富士黃耆即生富士山者甲斐州地方山
皆有之亦佳但須選肥潤味甘者折之堅脆及多
岐俱不
堪用

甘艸

甘平生寒炙溫選壯大緊紋者刮去皮補中宜
炙用瀉火宜生用梢節頭三者皆生用白朮苦
參乾漆為使惡遠志反大
戟芫花甘遂海藻忌豬肉
甘艸今甲斐州
地方山皆有之

沙參

淡甘微寒去頭到
今之縣鐘人參是也市中誤當薺芫別采蔓參根
充沙參用者宜審又有唐沙參乃蒸造者謂之拳

薺芫

沙參人多焙用代人參然其氣味功力殊異乎人
參以此代用誠為不勝其任矣況拳沙參細視之
有心恐非
真種耳
薺芫
甘寒去
蘆頭用
肆中以沙參充薺芫非是真薺芫丹
後州鹿崎山多有之具采藥獨斷中

桔梗

苦辛平去蘆微炒良白
及龍膽艸伏砒忌豬肉
甘平洗剉微炒或以竹刀刮去
節皮蜜水浸蒸焙用良鹵鹹

葳蕤

市人每名之葳蕤黃耆者是也
夏月采者不堪用按葳蕤增長陽氣與人參同力
一切不足之證可以代人參
但不可與五味子同用耳

黃精

甘平九蒸九曬味甚甘美
服食黃精者忌食梅實

知母

苗葉與葳蕤相似根如白及多生北方山中者苗高五六尺根如拳
辛苦寒揀肥潤裏白者竹刀去毛切勿令犯鐵
酒引經上行用酒浸焙下行鹽水潤焙得黃藥
鹽蓬砂

肉苁蓉

甘酸鹹溫皮如松稍有鱗甲形柔軟如肉酒
浸一宿刷去浮甲劈破中心太白膜一重焙
乾用或酥炙得所
李中立曰肉苁蓉肥大柔軟者佳乾枯瘦小者劣
今人多以金蓮根州苁蓉嫩松梢鹽潤充之賈利
用者空審

鎖陽

甘鹹溫酒潤焙
陶九成較耕錄云鎖陽生鞞鞞田地發起如笋上
豐下儉鱗甲櫛比筋脈聯絡絕類男陽即肉苁蓉

天麻

乾以充藥貨功百倍於苁蓉
甘辛平洗淨以酒浸一日夜溼紙包糠火中
煨熟取出切片焙用破開明亮堅實者佳
苦甘辛溫去蘆炒用防風地榆

白朮

為使忌桃李菘菜青魚雀肉
辛烈苦溫焙用
二朮雷皮者當以米泔水浸半日去粗皮肆中售
者多削淨不可水浸更泄性味凡用不拘州土惟
白為勝市人每誤認代名用宜自分辦之二朮雖
是一類然根苗氣味微有不同故各自施用又二
朮俱有清來者其剖開暴乾

蒼朮

者謂之削朮片朮亦可用
蒼朮苗高二三尺其葉抱莖而生稍間葉似棠梨
葉其腳下葉有三五又皆有鋸齒小刺根如老薑
之狀蒼黑色肉白有油膏味苦辛氣烈白朮葉稍
大而毛根如指大狀如鼓槌亦有大如拳者味

苦甘氣和俱處山多者之今人誤謂二朮於一物之中以根老嫩分蒼白或又以爲諸州皆產蒼朮而白朮所無也實爲不善識矣

狗脊

苦甘微溫選金毛者火燎去鬚細剉酒浸蒸晒用葶藶爲使惡敗醬莎艸

貫衆

苦微寒去皮毛剉焙藿菌赤小豆爲使伏石鍾乳

巴戟天

甘辛微溫以酒浸去心剉焙若急用以滾水浸軟去心覆盆爲使惡雷丸丹參朝生巴戟天本有心乾縮時偶自落或抽去故中心或空非自有小孔也以肉厚者爲勝方家誤以爲其根嫩白老紫多要紫色者爲良故致使售者以黑豆汁沃之欲其色紫殊失氣味

巴戟葉似茗開黃花其根白狀如連珠都無紫色者二月八月采根陰乾其氣味與藥中紫色者亦不同也圖經云有一種山律根正似巴戟但色白土人采得以醋水煮之乃以雜巴戟其能辨也但擊破視之中紫而鮮潔者僞也其中雖紫又有微白者亦有粉色而理小暗者真也真巴戟嫩時亦白乾時亦煮治使紫力劣弱耳此說謬矣

遠志

苦溫以甘艸湯浸一宿去骨焙乾用良珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤得茯苓冬葵子龍骨良苗名小艸細莖如線葉似黃楊本艸云似麻黃者失之詳審處處多有之人莫之能識或以小桔梗花爲遠志非是

淫羊藿

甘辛溫山藥紫芝爲使得酒良淫羊藿今之碗艸也山谷多有之自清來貨者皆陳久之物殊乏氣味不堪用五六月采之陰乾色

青味

仙茅

甘辛微溫有小毒以清水洗竹刀刮去皮米泔浸去赤汁酒拌蒸之暴乾用犯鐵罍牛乳斑人

髮

玄參

鹹苦選黑潤者用蒲州重重相隔蒸晒勿犯銅罍反藜蘆

黃反

地榆

甘酸苦寒宜生用見火無功惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃

此艸名也

丹參

苦平微溫酒潤微煨良鹽水反藜蘆

紫艸

甘苦鹹寒嫩而紫色染手者佳去根取茸用

白頭翁

苦溫得酒良花子莖葉同

白及

使苦辛微寒微火略煨紫石英為花名箬蘭貴重可喜今之紫蘭是也

三七

有花白者或以獨頭蘭為白及誤矣甘微苦溫色黃黑狀略似白及長者如乾老地黃有節味頗似人參試法以末摻猪血中血化為水者

乃真

按李瀕湖曰近傳一種艸春生苗夏高二三尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛花乾則絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是根三七而根如牛蒡與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍此艸今人間徧有之其南中來者不備著苗狀又別無考也其艸或亦有之而未睹矣

黃連

苦寒去蘆及鬚治本臟之火生用治肝膽之實
上焦之火以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火以醋浸炒
湯浸炒以鹽水或朴硝炒中焦之火以薑汁炒下焦
火以黃土炒不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒
鹹寒能制其燥性在者詳酌之黃芩龍骨理石
為使惡菊花玄參白鮮皮芫花白僵蠶良款冬牛
膝解巴豆輕粉附子
毒大忌猪肉冷水

胡黃連

苦大寒外黃心黑乾如楊柳枯枝折之塵出
者乃為真也惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒
忌猪肉冷

當藥州人或用人漏精

充胡黃連非是

黃芩

苦寒破爛者名宿芩乃舊根多中空外黃內黑
即今所謂片芩也圓者名子芩乃新根多內實

堅即今所謂條芩也淡色堅實者佳刮去外衣內
朽切片酒炒上升山茱萸龍骨為使惡蔥實畏牡
丹皮藜蘆丹砂

蘆商多以南天竹撒沙翁起
州根假偽亂真用者宜辨認
苦平以左文者為良破開除土去蘆以
溼布拭淨日乾用苣蒲為使畏牛乳

秦艽

人或取貓艽根
當秦艽非是

柴胡

苦平微寒去蘆及鬚以水洗淨剉用勿令犯火
欲上升用根酒浸欲下降用梢半夏為使惡皂
莢蜀葵良
本艽云苗有如韭葉者竹葉者以竹葉者為勝即
今之鎌倉柴胡乃此種也但初生苗如韭後葉似
竹耳非有二種也市中有名沙柴胡者即雞腿兒
艽也又有犛牛柴胡即貓艽根也亦名沙柴胡俱



與柴胡大別也皆物之傳譌者不空入劑又有銀柴胡根形類沙參而大皮皺色黃白肉有黃紋李東璧所謂市人以偽充銀柴胡殊無氣味者也又按李念菴云治勞瘵與疝證乃銀州柴胡別為一種郭章宜云產銀夏者獨勝微白而軟者為銀柴胡用以治勞弱骨蒸其說不同當更考之

前胡

甘辛平微寒去蘆用半

前胡艸狀屢改觀註本州者誤謂有三四種究其實即是一物也生下溼地其根白色但藥中取貯者俱夏月采之且下極洗淨故體不實而色亦淡黑香味都不佳其云葉如野菊根皮黑肉白者皆說謬

防風

甘辛溫水洗去蘆以黃色而潤者為佳又頭者發狂又尾者發痲疾禁之畏葶藶殺附子毒惡藜蘆白斂乾薑芫花

市賣有筆防風入藥宜用之又有削防風濱防風俱非是真防風初苗似附子與此二種大別也削防風即防葵類見食物傳信中亦防葵類

防葵

辛甘

今人謂之木防風用以為防風非是

獨活

甘苦辛微溫去皮或焙用

羌活者去黑皮腐爛用羌活與獨活種自不同也今人多以獨活紫牙充羌活誤矣市中有唐羌活其色不紫者蓋水白芷也水白芷解

羌活

散亦或用之

升麻

甘辛苦平微寒形細而黑極堅實削去皮青綠色者謂之鷄骨升麻外黑裏白而緊實者謂之

鬼臉升麻去

今人以春雪花或水引花為升麻俱非

苦參

是升麻在處有之詳載采藥獨斷中
上苦寒用糯米泔浸一宿其腥穢氣並浮在水面
浸酒治腸風炒至煙起為末玄

白鮮皮

參為使惡貝母兔絲子反藜蘆
苦寒去粗皮惡蠟
白鮮花艷可愛世多無有知者市人乃剝
木槿及木芙蓉花根皮以假偽宜審之

延胡索

酒炒中辛溫如半夏色黃上部
苦炒下部鹽水炒
貝母 苦辛平寒黃白輕鬆者為良油黑重硬者勿用
去心糯米拌炒米熟為度厚朴為使惡桃花良
秦艽莽艸舉
石反烏頭

山慈姑

獨顆非兩片者名丹龍眼不可入藥誤服令
人筋脈永不收用黃精小藍汁合服立愈
甘微辛有小毒根苗絕類老鴉蒜但蒜根無
毛慈姑有毛殼包裹為異用去毛殼煨苗枯

難尋矣忌甘艸
今多以鐵色箭及石蒜為山慈姑俱非是又藥舖
有自清來山慈姑其形與李中立郭章宜所圖相
合然無毛殼不辨解

茅根

益非真也用宜審之
甘寒洗去衣皮忌
鐵器花亦入藥
龍膽艸 苦澁大寒甘艸湯浸一宿晒乾
用貫眾小豆為使惡地黃防葵

細辛

大辛溫曾青棗根為使惡黃耆狼毒山
菜蕒忌生菜狸肉良消石滑石反藜蘆
細辛葉如葵柔莖細根色紫味極辛嚼之習習如
椒而更甚於椒人家園亭多以益植名之葵俗家

白微 謂植之不憂乃此也葉似馬蹄莖粗根曲色黃白味微辛者杜衡也今誤呼為細辛

當歸 甘辛溫凡用去頭尖硬處併塵土以水洗淨切片微焙行表酒洗行上酒浸頭止血而上行身

養血而中守稍破血而下流全活血而不走惡菌茹溼莖良莖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃按當歸以紫色者為勝聞此種產越中州山中而人多不知采為時用甚為可恨也今太和山州諸處多栽蒔為貨其色白且為較利采時沸湯略煮過日曬乾而甘香宜用之納

芎藭 辛苦溫白芷為使
之瓦罐密封可免蛙壞
 晒乾潤而甘香宜用之納
 過日曬乾而甘香宜用之納
 處多栽蒔為貨其色白且為較利采時沸湯略煮
 人不知采為時用甚為可恨也今太和山州諸
 按當歸以紫色者為勝聞此種產越中州山中而
 惡菌茹溼莖良莖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃
 養血而中守稍破血而下流全活血而不走
 當歸 甘辛溫凡用去頭尖硬處併塵土以水洗淨
 切片微焙行表酒洗行上酒浸頭止血而上行身
 白微 謂植之不憂乃此也葉似馬蹄莖粗根曲色黃
 白味微辛者杜衡也今誤呼為細辛

蛇牀子 苦平甘辛去塵土淨用惡

藁本 苦辛微溫惡菌

者乃真餘非是

白芷 辛溫市人寸截或片削以石灰拌勻晒收用

芍藥 苦酸寒多生用避其寒酒炒入血藥醋炒血虛

藥而微異即草芍藥也
 貨于四方花葉如單辨芍
 絕白開信濃州產二品藥中又謂之土鴉結皮掘木
 木芍藥草芍藥二品藥中又謂之土鴉結皮掘木
 其品滋多入藥空單辨之根赤白隨花之色也有
 山產者力洪人家種植者根雖肥大而香味不佳
 類石一名別本雷丸代
 薊反藜蘆須丸為使惡石斛芒硝良消石蠶甲小

牡丹

苦辛微寒赤者利血白者補人以銅刀劈破去

木香

苦辛溫形如枯骨味苦粘牙者良凡入理氣

李瀕湖曰昔人謂之青木香後人因呼馬兜鈴根

又呼一種薔薇為

按寇宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛

葉如牛蒡但狹長莖高二三尺花黃一如金錢其

高良薑

炒用

紅豆蔻

即高良薑子苦

肆中名伊豆縮

砂售者乃此也

艸豆蔻

瀉辛熱剉裹

艸果

雖為一物治微有不長大如龍眼而形微長皮

稜密子粗而稜峭其仁大如縮砂而辛香氣和也

白豆蔻

辛大溫去皮研細

縮砂

辛溫先和皮慢

益智

辛溫去殼鹽

萹菱

辛熱去稜用頭以醋浸一宿焙乾刮

肉豆蔻

苦辛溫形類彈丸油色肥實者佳以糯米

補骨脂

苦辛大溫微炒用惡甘草忌芸薑及諸血得胡桃

良麻

薑黃

苦辛溫色比鬱金甚黃形較

今市名軸鬱金者即薑黃也其名薑黃

鬱金

狀辛苦寒色外黃內赤體圓有橫紋如蟬腹

蓬莪朮

透苦辛溫極堅難擣須熱灰中煨令

荊三稜

苦溫黃白體重者佳麪包火炮加

香附子

甘苦辛瀉微寒狀如棗核周而有毛曝乾火

童便醋諸法皆從本方得

藿香

水甘辛微溫

肆中有名埋藿香者非真其名青葉者可用自種
五六月盛時采陰乾甚芳郁最為佳凡采葉藥
須視葉陰有蛛繭者去
乏其葉乾後頗難揀淨

蘭葉

辛平甘寒

凡用宜建蘭葉朱震亨所謂能散久積陳鬱之氣

甚有力者乃此也又別一種藥品不解何故李東

零陵香

甘平溫水洗淨

蘭艸

辛甘

澤蘭

防已為使

蘭草與澤蘭同類而種有殊俱生水旁下溼之地
但以莖圓節長而葉光有岐者為蘭草雷斅所謂

大澤蘭也莖方節短而葉有毛者為澤蘭所謂小澤蘭也俱四五月盛時采之陰乾

馬蘭

辛平根

即今緝

香薷

辛微溫忌火亦忌

薄荷

辛溫去

按薄荷水蘇俱名之龍腦薄荷二物同名也今俗中薄荷有二種其名為龍腦薄荷者真也山薄荷考之本艸臭蘇即此是也人或用當薄荷大謬

小蘘香

辛甘平溫形如

大蘘香

形如柏實裂成八瓣性熱不宜入食料得酒良炒黃用得鹽則入腎經

藥肆所賣者多將鼠莽實中截雜大蘘香飾偽似真鼠莽有大毒其實殺人用空子細辨之

積雪艸

苦辛寒三月

水蘇

辛微溫五六月

水蘇方莖中虛葉似藿香而微長密齒面皺色青對節生氣甚辛烈六七月開花成穗青紫色多生水岸菊苗高七八尺今人以麝香艸為水蘇非是

菊花

甘微苦平忌火去蒂白

李瀕湖曰本經言菊花味甘苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者為菊惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有

甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕒者爾

艾葉

苦辛溫揀取淨葉揚去塵屑入石臼杵搗熟去渣滓搗至如綿細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人肌脈用時焙燥則灸火得力若入丸散須用糯米濃飲揉艾葉成餅晒乾或瓦炕乾一碾成粉附為使

按容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾即時可成細末亦異也然恐是艾見制於茯苓不空入劑

茵陳蒿 苦微寒去 莖葉俱白至夏色綠即今人呼為濱艾者

青蒿

苦寒用葉童便浸一日夜晒乾用根莖子

茵陳蒿

茵陳蒿經冬不凋更因舊苗而生冬春間莖葉俱白至夏色綠即今人呼為濱艾者

凡蒿淡青此蒿青翠至秋餘蒿並黃此蒿獨青謂之青蒿其氣芬芳故謂之香蒿黃花蒿與此相似惟色不淡青其氣亦薄沈括所謂一種黃色者蓋是也藥肆中多采充青蒿非是

白蒿

甘平四月五月采

白蒿葉似牛尾蒿而不對莖葉俱白四時皤皤至秋開細白花如小菊多生沙磧上今人稱濱毛耳

菴藷子

苦辛微溫陰乾用 荆實蕒苽為使

菴藷

制即益母草辛微苦 硫磺雌黃砒石

菴藷子

甘辛微溫微炒 香灰制硫磺

夏枯艸

苦辛寒土瓜 為使伏汞砂

今人誤指，非是。

劉寄奴 苦溫，莖葉花子皆可用。酒蒸晒乾。

旋覆花 鹹甘，微溫。有小毒。去皮及蒂，微焙。

青箱子 苦微寒。用時先燒。鐵杵臼，乃搗用之。

雞冠子 甘涼。炒用。花焙，用忌魚腥猪肉。

紅花 辛甘溫。入酒良。

大薊 苦甘溫。酒洗或童便拌，微炒。

小薊 苦甘溫。製同大薊。

續斷 苦辛微溫。酒浸焙乾。地黃為使。惡雷丸。

李淵湖曰：續斷之說不一。桐君言是蔓生葉似荏李當之。范汪並言是虎薊。日華子言是大薊一名山午。菊蘇恭蘇頌皆言葉似苧麻。根似大薊而名醫別錄復出大薊小薊條。頗難依據。但自漢以來皆以大薊為續斷。相承久矣。究其實則二蘇所云似與桐君相符。當以為正。今人所用以州中來色赤而瘦折之有煙塵起者為良。焉鄭樵通志謂范汪所說者乃南續斷。不知何據。蓋以別川續斷耳。續斷今俗謂之舞列草。此也。秋冬間生。苗幹四稜。葉似藿香。又類苧麻。兩兩相對。而生至春開花。其花及子似益母草。紫莖者花紅。白莖者花白。根如大薊。在在有之。藥肆所賣者皆大小薊根也。非是。

漏蘆 苦鹹寒。根苗皆可用。連翹為使。

諸本草說漏蘆紛紛不一。當以莖大如筋子似油麻房而小者為正。今多有之人亦罕識之者。市中

以他物偽充
用須辨之

飛廉 苦平用根及花得
烏頭良惡麻黃

今鸞花木者名之
鬼薊花即此也

芋根 甘滑冷○葉
五月收陰乾

大青 甘微鹹大寒三月四
月采莖葉陰乾用

豕鬚 甘平凡入藥炒過用
治痢則以醋拌炒之

蒼耳 苦辛微寒有小毒五月五日采陰
乾忌猪肉馬肉米泔害人伏砒砂

蒼耳實 甘溫有小毒炒熟搗去
刺酒拌蒸用忌同莖葉

天名精 辛甘寒有小毒五月採陰
乾用垣衣地黃為使

鶴虱 即天名精之子苦辛
涼有小毒微炒用

豨薟 苦溫有小毒五六七月採收淨洗暴乾
入甑中層層酒與蜜九蒸九晒用

芭蕉油 甘冷以竹筒挿入
皮中取出瓶盛之

麻黃 甘辛苦溫宜用陳久者去根節煮數沸抹去上
沫焙乾用黃芩為佐厚朴白微為使惡辛夷石
黃

麻黃根節 甘平水
洗剉用

木賊 甘微溫
去節用

炮炙全書卷之一

炮炙全書卷第二

○○

平安

稻義宜義

纂

艸之屬

地黃

甘苦寒選沈水者用酒浸則上行外行薑汁浸
則不膩膈忌銅鐵器令人腎消髮白男損營女
損衛得清酒麥門冬良惡貝母良蕪黃忌蔥蒜菜
蕪採得卽用者爲生曬乾收者爲乾以法制過者

爲熟

熟地黃

甘苦微溫用砂鍋柳甑以荷葉將生地黃
酒潤用縮砂仁粗末拌蒸蓋覆極密文武火

蒸半日取起晒極乾如前又蒸九次為度令中心透熟純黑乃佳一法地黃堅實者晒乾以手擊之有聲為度好酒拌勻置瓷甕內包固重湯煮一晝夜名熟地黃然終不及前法地黃根出洗淨肥大沈水者正堪簡用宜用新根其宿根當年朽腐雖肥大而生氣將盡之物不宜入藥市人掘采裏之草席中或置之鍋內沃熱水復以灰拌晒惟較增秤兩不顧藥性之有傷也其不犯鐵和灰者皮肉俱黃白色市中名之白乾然不必是選沈水者也地黃乾後皆能沈水但鮮時有沈水者極為不多易獲

牛膝

補酸平用長大柔潤者去蘆頭欲下行生用滋補焙用或酒拌蒸過用惡熒火龜甲陸英良白

紫苑

苦辛溫去頭鬚洗淨焙用或酒洗款冬花為使惡天雄瞿麥蘘木雷丸遠志畏茵陳

麥門冬

甘平以涼水潤溼少頃抽心或以砂鍋焙軟乘熱去心不爾令人煩若以水浸多時去心柔則柔矣然氣味都盡用之不效天門冬亦然其寒者以酒浸用地黃車前為使惡款冬苦瓠苦芙蓉耳伏石鍾乳

萱艸根

甘涼去心用者如建蘭多縱紋且堅韌長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚在根如連珠四月開淡紅花如紅蓼實圓碧如珠

淡竹葉

甘寒處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如冬水竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小長穗淡竹葉異類而同名者有四物用者宜詳審

黃蜀葵子

甘寒滑水
淘淨用

敗醬

平苦
疑即今女
郎花是也

款冬花

辛溫擇未舒嫩蕊去向外裏殼甘草水浸晒
乾用杏仁為使得紫苑良惡早莢消石玄參
良貝母辛夷麻黃黃耆黃芩連翹青葙然雖良貝
母得此反良物有相制故也如半夏良生薑得之
則制其毒而愈能奏功也

鼠麴艸

甘平款冬
花為使
藥肆中取此花
以當芫花大繆

款冬花以生于山中者為良圃產不堪用藥肆中
有唐款冬花乃以枇杷花假偽者不可不細認也

決明子

甘平炒熟研細著
實為使惡大麻子

瞿麥

甘寒炒用蓑草牡丹
為使惡螻蛄伏丹砂

王不留行

甘苦平
焙用

葶藶子

辛寒炒用榆皮為使得酒良
惡白蠶蠶石龍芮宜大棗

葶藶高五六寸葉莖及花都似小薺三月開花微
黃色結莢扁而圓不復如薺有三角惟此為異耳

車前子

甘寒淘淨晒干入湯液炒過用常山為使
一夜蒸熟研爛作餅晒干焙用

馬鞭艸

苦微寒七月八月采苗
葉陰乾伏丹砂硫黃

龍牙艸

辛寒春夏生
葉採無時

按閩書曰治痢最神本
草謂即馬鞭草非也

蛇銜 苦微寒 採無時

生下溼地一莖五葉或七葉開黃花此與紫背龍牙全別今人謂之雄蛇蕪也

燈籠艸 苦寒

葫蘆 酸溫

青黛 鹹甘寒外國藍靛之英華也波斯國者不可得也今惟以乾靛充用售者復以乾澱充之然內多石灰不可輕用須淘之數次取浮標用或用青布浸汁代之

虎杖根 甘苦微溫刮去上皮用

蒺藜 苦辛甘溫揀淨炒去刺烏頭為使

沙苑蒺藜 甘溫綠色嚼之有菘豆氣者良

出同州沙苑牧馬草地故謂之沙苑蒺藜苗狀似杜蒺藜子成顆粒褐綠色故名之黑蒺藜以別其有刺芒者本艸綱目中以此為白蒺藜殊為不當疑字譌耳

篇蓄 甘濇四五月採苗陰乾

紫花地丁 寒苦辛

紫花地丁今俗謂之須密列又謂之牽躡草其花有數色一種溝壑邊生者起蔓

威靈仙 苦溫一類根數百條長者二尺許初時黃或黃或白者皆不可用忌茶茗及麩麩湯

威靈仙今名九蓋草者即此是也人多以徐長卿及仙人草為威靈仙俱非是仙人草有毒勿誤用

牛扁 苦微寒 六月采

大黃

苦寒凡用有生有熟有蒸不得一槩用欲下行者生用邪氣在上者必須酒浸引上至高驅熱而酒入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒黃芩為使惡乾漆忌冷水肆中有片者穿眼者俱清來者也片者潤而堅硬穿眼者輕燥不實采時皆以火石煨乾貨實更無生者用之亦不須更多炮炙蒸今大和山城丹後諸州皆有之以紫地錦文者為佳售者多以羊蹄草根假之不

半蹄根

辛苦寒有小毒能制三黃砒

商陸

酸辛苦寒取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿同黑豆拌蒸晒用得大蒜良忌太肉赤者有毒能伏砒

商如

酸鹹辛寒有毒似蘿蔔根斷則流汁黑凝如漆甘草為使惡門冬

大戟

小豆為使反甘草畏菖蒲蘆葦鼠屎惡薯蕷大戟近道多有之生平澤最多春生紅牙如芍藥漸長叢似初生楊柳高二三尺中空折之有白汁三四月開黃花結子人不知其為藥視以為無用之草藥肆中以他物假充可恨也

澤漆

苦微寒三月采莖葉陰乾小豆為使惡薯蕷

甘遂

苦寒有毒作連珠大如指頭赤皮者佳白者性劣用水淘去黑汁水清為度麩裏煨熟以去其毒瓜蒂為使惡遠志反甘草

續隨子

辛溫有毒去殼取色白者研爛紙包壓去油取霜用服後瀉多以醋同粥吃或酸漿水即止

蓖麻子

甘辛平有毒凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用服蓖麻者一生不得食炒豆犯之脹成

其油能伏丹砂粉霜

取蓖麻油法研爛入水煮之有沫撇起

藜蘆

辛苦寒有毒宜用蔥管者去頭用糯米汁煮之

丹參苦參又與酒相反同用殺人惡大黃畏蔥白服之吐不止飲蔥湯即止

今人以穩沒兔為藜蘆非是

黑附子

辛溫有毒重一兩以上矮而孔節稀者佳生

用則發散熟用則峻補生用去皮臍熟用以水浸過炮令皺拆去皮臍切片炒黃色去火毒用或童便浸一日去皮切作四片童便及濃甘草湯同煮汁盡為度烘乾地膽為使畏防風黑豆甘草人參黃耆綠豆烏韭童便犀角惡蜈蚣忌酸汁李中立曰市肆售者有以鹽水浸之取其潤溼體重買者當以體乾堅實頂圓正底平者為良

楊天惠附子記曰附子之品有七實本同而未異其初種之小者為烏頭附子為頭而傍生者為附子又左右附而偶生者為附子又附而長者為附子又附而散者為漏藍子皆脈絡連貫如子附母而附子以貴故獨專附名自餘不得與焉凡種一而子六七以上則其實皆小種一而子二三則其實稍大種一而子特其實則其大此其凡也附子之形以躡而坐正節角少為上其節氣多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下附子之佳以花白為上鐵色次之青綠為下天雄烏頭天佳以豐實過握為勝而漏藍側子園人以乞役夫不足數也大率蜀人而餌附子者少惟陝輔閩浙宜之陝輔之買纒市其下者閩浙之賈纒市其中者其上品則皆士大夫求之蓋貴人金多喜奇故非得大者不厭然土人有知藥者云小者固難用要之半兩以上皆良不必兩乃可此言近之

李灝湖曰別有草烏頭白附子故俗呼此為黑附子川烏頭以別之

川烏頭

辛熱有毒形如魁芋頂未

烏頭其形似鳥之首故以鳥名兩岐如鳥開口者曰鳥喙亦取其似也皆因象命名生子多者一年種之即有此數物也其元種之母莖枯則朽腐子在土中於冬初其苗已萌生故收采當在八月間不爾雖有造得者全不堪用本艸云附子之月日烏頭如芋魁又云春采為烏頭冬采為附子殊為謬誤

天雄

辛熱有大毒形大而長少

艸烏頭

辛熱有大毒形如鳥頭即野生者無釀造之法外黑內白皴而枯燥或生用或炮用或以

黑大豆同煮熟去其毒用黑豆冷水能解其毒茶草遠志為使反半真栝樓貝母白斂白及惡藜

畏節糖忌豉汁
伏丹砂砒石

白附子

辛大溫有毒
炮去皮臍用

白附子所在有之人不識用或以白花雙鸞菊當之誤矣

天南星

辛溫有毒去涎暴乾用或火炮裂用或以皂

莢白礬生薑水煮過用蜀漆為使惡莽草
畏附子乾薑生薑生能伏雄黃丹砂焰硝
造南星麴法以薑汁釀湯和南星末作小餅
子安籃內楮葉包蓋待上臘月取黃牯牛膽汁和
造膽星法以南星末研末臘月取黃牯牛膽汁和
納入膽中繫懸風處乾之牛膽南星即此是也若倉
妙剉碎炒用方書謂之牛膽南星即此是也若倉
卒不能得此以生薑湯多泡六七次殺去毒堪用
但其性
猶烈耳

半夏

辛平有毒揀肥大而白者洗去皮垢以水浸五日每換水去其苦味

干為使惡阜莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭忌羊血海藻飴糖

造半夏麴法以半夏洗淨湯泡去衣垢研細以薑汁礬湯和作餅楮葉包裹待生黃衣去葉曬乾用

治溼痰以薑汁白礬湯和之薑汁竹瀝或荆瀝和之治寒痰以薑汁礬湯入

蚤休

即金線重樓苦微寒有毒伏雄黃丹砂蓬砂及鹽

射干

苦平有毒採根以米泔水浸一宿漉出以籠竹葉煮之日乾用

菟絲子

辛甘平以溫水淘去沙泥酒浸一二宿蒸晒焙乾研末得溫酒良薯蕷松枝為使惡藿菌

五味子

酸甘辛苦鹹溫入補藥蜜蒸熟再以泔水浸焙乾用入嗽藥生用連核入藥有南北之分

南者乾枯北者溼潤從蓉為使惡葳蕤勝烏頭五味子以朝鮮國來者為勝

覆盆子

甘辛微熱以水淘淨去皮蒂酒浸一宿蒸焙用

使君子

甘溫去殼取仁不堪仁用油黑不堪

李中立曰去殼取仁然仁絕難得今醫家或兼用殼

木鱉子

甘溫有小毒形扁礪砢大如圍碁子去殼取仁或去油用老者殼色蒼黑嫩者殼色黃白

仁皮綠肉白者佳多油及瘦薄者不堪用

馬兜鈴

苦微辛寒去葉蔓劈開去革膜取淨子焙用根為青木香

馬兜鈴春生苗作蔓葉似蘿藦而澀開黃紫花結實如鈴作四五瓣根微有香氣故有青木香之名

關東多有小兒折其苗生食之此間山中亦有之今人誤別指一種草以為青木香不復採焉
鈴根考之本草殊為乖刺按興化府志云麝香弱蔓如山藥碎花穗生淺黃色香酷烈如麝今俗名不獨於此也好生君子其有慎而辨之者多

牽牛子

去苦辛熱有毒水淘去浮者晒乾碾取頭末丑白者名白丑味苦得青木香乾薑良

紫葳

即陵香花酸微寒花根俱入藥花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏朦良鹵鹹

栝樓實

甘微寒去殼皮革膜及油亦有不去油微炒者藥舖栝樓者即栝樓也如螳螂頭者王瓜也王瓜亦入

天花粉

即栝樓根甘苦微寒秋冬采根去皮切片水浸三日逐日換水搗如泥絹濾澄粉晒乾用

乾葛

去皮用乾葛即葛根非生根也今俗取葛蔓為乾葛誤矣

葛花

甘平七月采之

天門冬

甘微苦平去心酒拌蒸用忌食鯉魚誤食中

百部

苦甘微溫去心酒浸焙用

何首烏

甘苦瀋微溫用竹刀切米泔浸一宿木杵搗一法用竹刀刮去黑皮米泔浸二日切片每

抱朴子 卷之二

赤白各一筋用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水浸過飯內鋪豆一層藥一層重鋪盡砂鍋上蒸之豆熟為度去豆用九蒸九晒為佳白者入氣赤者入血茯苓為使忌蘿蔔蔥蒜諸血無鱗魚鐵器同于地黃能伏砂

今俗以苦蕒當何首烏非是詳載食物傳信中

葶藶 苦甘平削去上皮切片鹽水拌炒酒潤烘蕒

菝葜 甘平溫削去上皮用

土茯苓 甘淡平色白者良削去皮用忌茶茗及牛羊雞鵞魚肉燒酒麪

白斂 甘苦平微寒代同而主治之功不相遠豈亦一類數種乎

山豆根 寒苦

茜根 併苦寒入藥炒用忌鐵器併鈴畏鼠姑汁制雄黃

防己 苦辛寒漢防己是根外白內黃破之有黑紋如車輻解者良木防己是苗色黃腥皮皺上有

海金沙 甘寒其蔓引于竹木上線莖細葉可愛也至為使惡細辛畏草薺女菀鹵鹹伏消石殺雄黃毒

蒲黃 沙落紙上其有皺文葉晒乾以紙襯承其

木通 甘辛淡微寒去粗皮

絡石 苦甘微酸寒入藥擇附石者良用粗布揩去毛惡鐵落畏貝母

菖蒲殺殷孽毒

絡石其類頗多葉似木蓮而小
四月開白花氣甚芬芳者是也

木蓮葉

木蓮今名一咀毗者是也葉似木犀實如無花果
黃緣樹木四時不凋折之有白汁世俗相傳以馬
察吉藤為木蓮大謬

釣藤

純用嫩寒選紫色去梗
甘微寒其功十倍

忍冬

沈內翰曰如無生者只用乾
者然力終不及生者効速

赤地利

平酸

金銀花

即忍冬藤花四
月采之陰乾

今俗謂之夷失
密鹽是也

白前

甘微溫甘草水浸一伏時
去頭鬚焙乾用忌羊肉

石龍芮子

苦平大戟為使
良藥莢蛇蛻皮

穀精艸

產遠江州者花絕白莖
高至尺餘最勝他處

鱧腸艸

甘酸平六月採棟青嫩無泥
土者不用洗摘去黃葉用

燈心艸

淡平蒸熟待乾折其蘗是謂熟草可然燈不
粉漿染過晒乾研末入水澄
之浮者是燈心也晒乾用

蘆根

甘寒取肥者去鬚并赤黃皮用
其露出及浮水中者並不堪

澤瀉

甘鹹微寒色白實重者佳去毛

石菖蒲

辛溫山中生水石間根鬚絡石略無少泥土

刮去毛微炒用秦皮秦朮為使惡地膽

麻黃忌節糖羊肉犯鐵器令人吐逆

菖蒲有數種生于池澤蒲葉肥根高三四尺者泥

蒲也名白菖又有花菖蒲類燕于花嬌艷可愛自

有數色紫者所謂紫菖蒲也生于溪澗蒲葉瘦根

高一二尺其葩與花菖蒲相肖而小者水蒲也名

溪蓀生于水石之間有劍脊瘦根密節高尺餘二

三月間抽莖開小黃花成穗者石菖蒲也惟以此

種入藥餘皆不堪其養以沙石愈剪則愈細愈久

則愈密高四五寸葉如韭甚則根長二三寸葉長

寸許置之几案用供清賞者謂之錢蒲性氣有傷

不可用也又山中泉石間自有根苗纖細一寸不

啻九節或至於二十節者方枝家獨貴之然不必

拘也但當以溪山窮谷水磧上生者為佳人家栽

于園亭者不可用耳

蒲黃

甘淡平市者多以黃柏末假之極害人松黃黃

用血炒

水萍

辛酸寒棟紫背浮萍以竹篩攤

海藻

鹹寒洗淨鹹味

海帶

鹹寒形似紙條薄而長

昆布

鹹寒滑洗淨

鷓鴣菜

鹹甘用之略洗過不盡鹹味

鷓鴣菜為妙莖葉如石松而小色青按漳州府志去鷓鴣

鷓鴣菜生海石上散碎色微黑小兒腹中有蟲食之

下

石斛

甘淡微鹹。宜入湯酒。不宜入丸。使者勿用木斛。損人。去根頭。酒洗。蒸用。陸英為。使惡。凝水。石。巴。豆。畏。雷。丸。僵。蠶。

骨碎補

苦溫。銅刀刮去。黃黑毛。焙用。

石韋

苦平。去黃毛。微炙。用滑石杏仁射。干為使。得。首。蒲。良。制。丹。砂。礬。石。

金星艸

苦寒。制。三。黃。砂。礬。石。

石胡荽

辛溫。生石縫。及陰溼處。其氣辛薰。夏開細花。黃色。汁制。砒。石。雄。黃。

穀之屬

粳米

甘平。入藥。以極精者。洗用。不可同馬肉食。發。痼。疾。不可和蒼耳食。令人卒心痛。急。燒。陳。倉。米。灰。

和蜜漿服之。不爾。即。灰。也。

汪穎曰。粳有蚤中晚三收。以晚白米為第一。各處所產。種類甚多。氣味不能無少異。而亦不大相遠。也。天生五穀。所以養人。得之則生。不得則死。惟此穀。得天地中和之氣。同造化生育之功。故非他物可比。入藥之功。可在所略。爾。

糯米

甘溫。以精鑿米。洗過。入藥。解。芫。青。斑。蝥。毒。

胡麻

甘平。有黑白赤三種。取黑者。水淘。去浮者。以酒拌。蒸。晒。乾。炒。用。

麻油

甘微寒。以白者為勝。生者性溫。而補人。炒者性熱。而發病。蒸者性溫。而治疾。

陶弘景曰生榨者良若蒸炒者止可供食及燃燈耳不入藥用

麻仁 甘平微寒極難去殼用絹包置沸湯中至冷取出懸井中一夜勿著水晒乾新瓦上按去殼簸

揚取仁畏牡蠣白薇茯苓

浮小麥 甘鹹寒即小麥水淘淨浮起無肉之麥殼也焙用

薏苡仁 甘淡微寒淘晒炒用有二種一種粘牙者尖而殼厚堅硬者即菩提子其米白色如糯米一種圓

而殼厚堅硬者即菩提子也其米少亦名為念珠

罌粟殼 酸澆微寒取殼水洗潤去蒂及筋膜取外薄皮米醋炒或蜜炙用得醋烏梅橘皮良

阿片 罌粟結青苞時午後以大針刺其外面青皮勿損裏面硬皮或三五處次早精出以竹刀刮盛磁器陰乾用之

菽之屬

黑大豆 甘平惡五參龍膽嬰兒十歲以下者炒豆與猪肉同食壅氣致死有八九凡服葶麻子

忌之服厚朴者亦忌之古方稱此解百藥毒大不然又加甘草其驗乃奇也

赤小豆 甘平不可同魚鮮食成消渴作醬同飯食成口瘡

菘豆 甘寒連皮用反槌子散害人合鯉魚鮮食久則令人肝黃成渴病

白扁豆 甘平硬殼者溫平連皮炒熟入藥亦有水浸去皮及生用者從本方其軟殼及粟色者微

涼但可供食不堪入藥

胡盧巴 苦大溫淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

淡豆豉 苦澁甘寒 豆豉有鹹
造淡豆豉法用黑豆一斗六月間水浸一宿瀝乾蒸
熟攤蘆蓆上候微溫蒿覆五六日候黃衣徧滿為
度不可太過取晒簸淨水拌得中築實甕中桑葉
蓋覆厚三寸泥固晒七日又以水拌入甕如是七
次甕收築封即成矣

造釀之屬

淡豆豉

苦澁甘寒 豆豉有鹹
造淡豆豉法用黑豆一斗六月間水浸一宿瀝乾蒸
熟攤蘆蓆上候微溫蒿覆五六日候黃衣徧滿為
度不可太過取晒簸淨水拌得中築實甕中桑葉
蓋覆厚三寸泥固晒七日又以水拌入甕如是七
次甕收築封即成矣

神麩

甘辛溫
造神麩法五月五日或六月六日用白麩百斤青
蒿自然汁三升赤小豆末杏仁泥各三升蒼耳自
然汁野蓼自然汁各三升以配白虎青龍朱雀玄
武句陳騰蛇自然汁和麩豆杏仁作餅麻葉或
楮葉包罽如造醬黃法待生黃衣晒收臨用炒之
陳久者良一法用青蒿蒼耳野蓼自然汁及赤小

紅麴

甘溫

豆末杏仁泥各三盞和勻于堯器內次第下白麴搜和得所作餅如上生黃晒收之尤為簡便也

造紅麴法白粳米一石五斗水淘浸一宿作飯分

作十五處入麴母三斤揉令勻併作一處以帛

密覆熱即去帛攤開覺溫急堆起又密覆次日

中又作三堆過一時分作五堆再一時合作一

又過一時分作十五堆稍溫又作一

第三日用大桶盛新液水以竹籬盛麴作五六分

蘸溼完又作一堆如前法作一次第四日如前

則成矣取出日乾收之其米過心者謂之生黃入

酒及鮮醢中鮮紅可愛未過心者不甚佳入藥以

陳久者良

麥芽

鹹甘溫即大麥水浸生芽者去鬚取其中米炒

研麴用今惟炒用豆蔻縮砂仁烏梅木瓜芍藥

五味子為使

飴糖

甘大溫惟以糯米作

苦酒

即米醋甘酸苦溫服茯苓丹參者不可食

酒

苦甘辛大熱凡酒忌諸甜物酒漿照人無影不可

飲祭酒自耗不可飲酒合乳飲令人氣結同牛肉

食令人生蟲畏枳椇

葛花赤豆花綠豆粉

蔬之屬

韭子

辛甘溫爆乾簸去黑皮炒黃用
韭葉不可與蜜及牛肉同食

蔥莖白

辛平同蜜食殺人
服地黃常山忌食

大蒜

辛溫有毒不可
同蜜食殺人

白芥子

辛熱微焙擊碎用生絹袋盛
入煮勿煎太過則味苦辣

薑薑子

即油菜
辛溫

萊菔子

甘平
辛溫

生薑

辛溫去皮則熱留皮則冷秦椒為使
殺半夏菴菔毒惡黃芩黃連天鼠糞

繆仲醇曰生薑不安使熟宜搗絞汁待藥煎成
傾方不失生字之義如入藥煎乃熟薑非生薑

乾薑 苦辛大熱微炒用若治產後血虛發熱及止嘔使
惡殺同 生薑

生薑

造乾薑法以母薑水浸三日去皮又置流水中六
日更刮去皮然後晒乾置瓷缸中釀三日乃成也
藥肆中以母薑略煮過然後
暴之令乾名之乾薑售非是

胡荽 辛溫有小毒凡服一切補藥有白
赤牡丹皮者咸忌之伏石鍾乳

山藥 即山薯甘
平惡甘遂

山薯形長者是一種形如手掌名佛掌薯又有
番薯即紅山薯其根如薑而大皮薄而紫異物志
謂之甘薯一名朱薯此二種俱可供饌惟山薯
藥要山中生經十年以上者洗去土雷皮竹節盛
置簷風處候完乾收之或置焙籠中微火烘乾亦
佳臨用削去皮藥肆所賣者大率係家園種者皆

削去皮以米粉石灰拌使乾之用
須水洗色白者為佳青黑者不堪

百合 甘平花白
者入藥

冬葵子 甘寒滑黃芩
為使伏硫黃

葵今處處有之古人種為常食今之種者頗鮮苗
高三四尺莖葉似蜀葵而差小花極微細有紫莖
白莖二種以白莖為勝以秋種覆養經冬至春作
子者謂之冬葵子入藥世俗相承以錢葵當葵菜

藜 甘平有二種凡使高二尺五六寸為妙若長
若短皆不中用也生牆下樹下者不可用

紫蘇 辛溫不可同鯉
魚食生毒瘡

蘇子 辛溫炒
香研用

荆芥 辛苦溫去枝莖生用治下焦血炒黑用與河豚
黃頰魚鱸肉相反若同日食之多致喪命不可
戒也

牛蒡子 苦辛棟淨以酒拌蒸待有白
霜以布拭去焙乾搗粉用

蒲公英 苦甘寒三四
月採陰乾

地膚子 甘寒棟
淨用

果之屬

杏仁 甘苦溫湯浸去皮尖炒黃研細風寒肺病藥中
連皮尖用取其發散也作湯如白沫不解者食
之氣壅湯經宿者動冷氣惡黃

烏梅 酸澁溫平去核微炒若過而齒齲者嚼胡桃肉
解之忌猪肉取大青梅藍盛於突上熏黑用

白梅 酸鹹平取大青梅以鹽汁漬之
日曬夜漬十日成矣久乃上霜

桃仁 苦辛甘溫行血連皮尖生用活血潤燥湯
浸去皮尖炒用雙仁有毒不用香附為使

大棗 甘溫六七月上霜
蔥魚同食殺烏頭附子毒入藥去核

棗有大而核小者止可充果食入藥惟用大棗
形大而核小多膏味甘美者為良其雖大而肉
厚堅燥少
脂者不堪

雪梨

甘寒雪梨綿梨香水梨俱為上品可以治病餘梨不去病

木瓜

酸澁溫形如小瓜而有鼻皮薄色赤黃香而甘酸不澀去硬皮及子曰中杵碎晒乾陳久者良

器忌

李瀕湖曰木瓜可種可接可以枝壓其葉光而厚

其實如小瓜而有鼻津潤味不木者為木瓜圓小

於木瓜味木而酢澇者為木桃似木瓜而無鼻大

子也鼻乃花脫為木李亦曰木梨即榧榧及和圓

處非臍蒂也

木瓜木葉花實酷類榧榧俱是係一類其實如瓜

但看花脫處有鼻者為木瓜無者為榧榧也處處

編有之今人罕知是為木瓜而誤於用

者也誤以關地錦實為木瓜殊非是

山檀

酸微溫核有功力不可去也

柿餅

甘寒其霜謂之柿霜甘冷反杜鵑花誤併食殺入

柿蒂

其苦溫大者如楪八稜而扁其次如拳以核少者為佳

柿今園圃種接者甚繁惟方柿蒂宜入藥

石榴皮

酸澇溫勿犯鐵器漿水浸一夜取出用其水如黑汁

橘皮

苦辛溫水洗潤透刮去筋膜晒乾用

橘今俗謂之香子者即此也

薛立齋曰陳皮隔年者方可用

李瀕湖曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脈其味苦

辛相皮紋粗色黃而厚內多白膜其味辛甘柚皮

最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味甘多辛

少但以此別之即不差矣今天下多以廣中來者

為勝江西者次之然亦多以柑皮雜之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣

橘核

苦溫炒

青皮

即橘之未熟而色青者苦烈辛溫以湯浸去瓢切片醋拌瓦炒過用

青皮酒洗晒乾用

李中立曰頭破裂者俗呼四花青皮凡用以此為勝今人多以小柑小柚小橙偽為之不可不辨

柑皮

紅者入藥製同橘皮

別今人與橘雖形體相類而其種實有別今人槩收柑皮充橘皮非矣

枇杷葉

苦甘辛平溼葉重一兩乾者三葉重一兩者為氣足堪用以粗布拭去毛或以粟杆作刷

炙用

胡桃

甘熱

今有唐胡桃姬胡桃鬼胡桃三種以唐胡桃為勝姬胡桃次之鬼胡桃不佳

椽斗子

苦溫去粗皮用入藥宜擣細炒焦或燒存性研用木皮根皮

去粗皮用

荔枝核

甘溫

龍眼肉

甘溫

橄欖

兩頭以其性熱也

榧子

反菘豆能殺人

松子

甘小溫今名為海山松子甲斐州山中多有之

檳榔

苦辛濇微溫去空心中者

大腹皮

汁辛微溫其樹多集鳩鳥宜先以黑豆洗後以水再洗過晒乾火焙切用

郁李仁

尖辛苦酸平湯浸去皮

郁李即今尼歪橄窠刺也條生作叢高五六尺其葉如李更尖長其花有千葉單葉紅白色單葉者則結實若櫻桃而小赤色味甘酸可食亦有大小二種核中仁入藥

川椒

辛熱有毒去核及閉口者微炒出汗乘熱入竹筒中搗去裏面黃散取紅用杏仁為使畏款冬

花防風附子雄黃可收水銀中其毒者涼水麻仁漿解之五月勿食椒李瀕湖曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳人故謂之椒自他椒子雖光黑亦不似之若土椒則子無光彩矣

胡椒

辛熱

萹澄茄

去柄及皺皮蒸杵細晒乾

吳茱萸

辛苦大熱有毒鹽湯洗去苦烈汁焙乾用閉口者有毒蓼實為使惡丹參消石白堊畏紫

茶葉

苦甘微寒以新芽一發便長三四分許其粗如針味甘氣芳最為上品堪入藥中惡榷子服威靈仙土茯苓

孩兒茶

苦甘濇平出南番係細茶末入竹筒中際塞兩頭埋汗泥溝中日久取出搗汁熬製而成

消瘦之說此皆語其粗惡苦澀者耳故入藥須擇上品方有利益

李念菘曰茶葉以味甘不澀氣芳如蘭色白如玉者為良管人多言其苦寒不利脾胃及多食發黃

三十一

其塊小而潤澤者為上塊大焦枯者為次番人呼為烏參泥又呼為烏壘泥俗因搽小兒諸瘡效每呼為兒茶又呼為孩兒茶

甜瓜蒂 苦寒

石蜜 甘溫即白沙糖今人名為冰糖

蓮子 甘平瀋不去心令人作吐凡使須去心蒸焙用亦入得茯苓山藥白朮枸杞子良青心名蓮慈苦寒

蓮鬚 藥 藕實至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子今肆中別又有二種石蓮子散光黑堅硬如石兩頭停勻有有節者若無節者更黑味極苦此物經百年不壞纏仲醇曰產廣中出樹上木實不空入藥甘瀋溫花開時采取乾忌地黃蔥蒜

荷葉 苦平畏桐油伏白銀硫黃

芡實 甘平凡用蒸熟烈日晒裂取仁亦可春取粉用入澀精藥連散亦可

炮炙全書卷第二

煇彙全書
卷之三
[Faint, mostly illegible text within a rectangular border]

