

醫方大成論

863
41

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

国立国会図書館　　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

醫方大成論

863
41

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

863-41

弔嘗謂人生一身六氣所干七情所感不能無
疾賴前賢辨脉論證處方施治然后養生者得
以自衛厥功大矣非如地理之術相面之言可
以富貴禍福告人而求其驗否每未即見性醫
之得劫神速近乎自衛遠可濟人諸藝之中當
以為甲首人以與良相並言蓋有以也今之學
醫固不能神聖而工巧政自罕見余雖非專子
每觀其書所謂脉證治固不過以五行之造化
合一身之理得其理則脉證俱在是矣因諸
書所載之方令人所用者無一絶而其中固有者

醫所未嘗試者況於常人
一書所能盡載而諸書又非
江孫氏集諸方取切要者以類編名為大成
名類首又取二圖及歌氏諸家之說右而為論
庶觀者得其說而求其方瞭然在目矣編成求
席毅梓以廣其傳使閱方者一覽而盡得之可
省書方之繁而行遠者亦可挾以自便或可為
衛生之一助云

皆幸甫至治初九　文江　王九福　序

醫方大成論目錄

卷之一　風　寒　暑　濕　傷寒
卷之二　痲　痢　嘔吐　泄瀉　霍乱
秘結　咳嗽
卷之三　痰氣　附
膀胱　腎氣　脾胃
卷之四　翻胃　附　五噎　五膈　諸虛
癆瘵
卷之五　咳逆　頭痛　心痛　眩暈

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

腰脚痛　脚氣　五痺
卷之六　五疸　蠱毒
赤白濁　水腫　脹滿
自汗　虛煩
卷之七　健忘　癲癎
積聚　吐血　下血
遺尿　失禁　咽喉
卷之八　五藏內外所因
折傷　諸救急方
諸淋　消湯
積聚　宿食
脹癪　痢冷
疼漏　脫肛
眼目
癰疽　瘡瘍
卷之九　婦人諸疾
卷之十　胎前　產後
小兒論　灸豆
總論

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

醫方大成略抄巻之一

風

素問曰凡治百病長之先治其本不非偏治其中也醫方大成略抄巻之一醫方集成者先祖竜湫明公撰述復齋主人附益之論醫之大小居上大成也

軍氣論曰風為百病之長至其變化乃為他病廣韻曰天地之使大塊之噫氣之王者之聲教之後之先之處之ハツテコトハツテヘル

風為百病之長故諸方首論之汝伯所謂大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痱於身無痛四肢不収三曰風懿者奄忽不知人也四曰風痺者諸痺類風收此特言其大槩而又有卒然而中者皆由氣体虚弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致真氣耗散腠理不密非氣乗虚入及其中也重則半身不遂口眼喎斜肌肉疼痛疾涎壅盛或癱瘓不仁古諺不語精神恍惚

驚惕恐怖治療之法當詳其脉證推其所感之
原若中於肝者人迎與左關上脉浮而弦面目
多青惡風自汗左脇偏痛中於心者人迎與左
寸口脉洪而浮面赤翕熱(翕氣之所聚也)嘈不能言
中於脾者人迎與右關上脉浮微而遲四肢怠
惰皮肉瞤動身体通黄中於肺者人迎與右寸
口脉浮濇(渋也)而短面浮色白口燥多喘中於腎者
人迎與左尺脉浮而滑面耳黑色腰脊痛厥小
腹隱曲不利中於胃者兩關脉並浮而大額上
多汗膈塞不通食寒則泄凡此風證或挾寒則
脉帶浮遲按濕則脉帶浮濇二證俱有則從偏
勝者治之用藥更宜詳審若風寒歴歳不愈
者當先調氣而後治風乖此歴歳厳(厳)至當之論也
倉卒之際救此急證宜先以皂角細辛擂入鼻
內通其關竅次以藠合香圓擦牙連進以生姜
自然汁并三生飲候其甦醒然后次第進以順
氣之類排風續命之類所中在経絡脉微細者
生入于臓腑口開手散眼合遺尿(膀胱絶也)髮直吐沫(胃絶也)
頭直視(同見脹)声如鼾睡者難治又有中之輕者在皮
膚之間言語微塞(塞)宜用辛(辛)汗遍身瘡癖(癖)状如虫

(経(天)立節之絡横絡不入)

行月旋耳鳴又當陰證治之

寒 猪曰有天寒在表一切傷物毒八陰之從脈布腎豚之說統括殺之

寒為天地殺厉之氣故見於冬則為氷為霜牛木田之而摧敗鳥獸各巢穴以自居気体虚弱之人或調護失宜衝冇道途一時為寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢厥冷直挺急疼痛或洒洒惡寒翕發熱面赤若有汗五藏之虚者皆能有所中也其脉多遲而緊按尺則脉帶浮弦暈不仁煩湿則脉濡而肢腫腰痛治療之法只宜以姜附之类温散寒気切不可妄有吐下如

右类傷寒者難治

暑 淨土應貞十二居子 夏令気化万物蕃秀之時暑者火之気也炎熱之甚也

暑中暑之動而得之為中熱中暑者陰証中暑者中熱証辨潔古カ静而得之為

暑之為気在天為熱在地為火在人藏為心是以暑之中人先着於心凡中之者身熱頭疼煩渴口燥甚則昏不知人手足微冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痰壅入腎則消渴其脉多沈伏一時昏中着切不可便与冷水并卧湿地古法當以熱湯先灌及用布衣醮熱湯熨腎下及気海續之以湯淋布上令煖気透徹腎脉候其甦蓄進以

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

黄連香薷散五苓散若休虚者冷香飲子霍乱
吐瀉来復丹二気丹挟食則用胃冷湯若挟風
則其脉沈而浮證有擣擣當於黄連香薷散内
加羌活煎服切不可作驚癇治之多致不救此
方乃叢氏累用之而有験者若旅逢中卒然暈
倒急扶在陰涼処掬道上熱土於臍上撥開作
竅令人尿於其中以待求熱湯并生姜或大蒜
各一塊嚼爛湯送下立醒

濕 南人有食法濕之味之衣也北人有衣濕之病也
湿之為気冲淫天地之間流注四時之内体虚

之人或為風雨所襲或臥卑湿之地遠行涉水
或感山澤蒸気或汗出衣裡冷則浸漬脾腎皆
能有所中傷着腎者腰痛身重如坐水中小便
不利着脾則四肢浮腫不得屈伸若挟風則眩
暈吧噦心間煩熱煮寒則拳攣痛無汗悪寒
帯暑則煩渇引飲心脇疼痛面垢悪寒允感湿
之證其脉多沈緩而微其證多四肢猶怠不挙
法當疎利小便為先汝不可輕易汗下并用大
攻若有泄瀉等證又當扶右類求也

傷寒 春温病 雑病中不発血汗漏者 暑暑病之證之漏者

天賊之自天後指差腹作從

素問論有五月夏至前濕溽率相似者然多是体虚労汗出熱病之後尽ゞ如夏至以作汗有ども汗不出ゞ者秋ゝ云ゝ冬感寒春發温者是也其為證有陽有陰有陽ハ熱帯表有裡又當知変病不同傳変不一其發也未陰ハ朝発有不自頭疼發熱自汗悪寒而始若發於大一時定疼久陽臥而悪寒發於太陰止悪寒而不發臥也

傳陽則潮臥狂言如有所見其脈多長浮変陰則古強不語手足厥冷多有自利其脈多沉細

五

傷寒為治雖曰有法又須問證以察於外一切脈以審於内故在表宜汗之在上宜吐之在裏宜下之在半表半裏者和解之此固一定之法然又須考得病之日傳変之論也不可不謹四三日病在皮膚者為表宜麻黄桂枝之類驅散寒非得汗ゝ後脈靜為愈有汗不得服麻黄無汗不得服桂枝仲景至切之日五日之間病在胸膈疾気緊滿於上當以瓜蒂吐之而愈六日七日之間其病入腹傳胃藏府結燥狂言潮熱須大黄芒硝之類

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

下之而愈古今治法抵曰如此（六段）（七段）
日便四肢厥冷名為陰厥欲絶者（脇下二寸）
灸之（八段）又有経日微厥而后發熱者為欲厥熱甚
古黒皐燥者今久多以水漬布裹搭之於
胸頬（九段）更換以拔去熱氣亦良法也又有不厥
而即変陽證或胸脇懣悶牽引疼痛坐臥不安
胃気喘息則又不可拘以日数即宜下之（十段）又有
六七日大腑結燥上不能食其脉細緊皆曰當
下（十一段）却有頭痛悪寒項上有汗或小便清利（不渇下条）
證未除仍宜汗之（十二段）或裏寒表熱表熱或裏熱表寒皆
當先救其裏后治其表應汗而汗之而反下之則変壅
於裏或為痰血發而為狂證者有之結而為癰
為結胸者有之結胸者心下緊滿而痛按之如
石手不可近（十三段）癌者但緊滿而不痛證雖相類用
藥却有不同若應下而反汗之則津液枯竭又（十四段）
有七（別名陽厥）陽證語者為實鄭声為虚若應譫語吐而
反温之則毒氣壽結於胃發而為斑其色如錦
紋者生黒者即死臨證用藥若不弁其陰陽親
其傳変審而行之則必致錯乱怪證百出流而
為壊證傷寒甚至不救以此傷寒一證不可不

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

謹病愈之後切不可輕用神薬若忌房室労傷
飲食過度倘因循再作未易治也致有脚気疾
飲食積虚煩甲證与傷寒相類更宜審之但脚
氣則脚膝軟痛牽起即倒疾飲者則頭不痛項
不強食積則身不痛左手脈平和虚煩則不悪
寒身不痛為異法不可有誤作傷寒治之其中
変易非止一端茲畧挙其説以備参考其詳又
當於仲景論中千金百問内求之但感冒本軽
傷寒治證一同但有軽重之分耳故重者為傷
軽者為感大旨之中有風有寒又須詳別之感
寒則必悪寒面色黯慘項背拘急亦或頭痛発
熱其脈沉遅當以五積散藿香正気散養胃湯
表之感風則必悪風面色光浮身体発熱如瘧
鼻塞声重時打清涕或咳嗽痺痛其脈多浮数
當以十神湯敗毒散治之或風寒兼之又當用
和解薬体虚之人不可過於発散恐致危疾并
述于後審之

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

濕胃鬱而濕行出汗浴得之汗重脈前煩疼元熱但熱不寒亦裏實不泄陽氣壅盛寒自感寒而得元汗悉寒信寒痛而悸先寒後熱

瘴 良方云瘴氣牡微陽氣衰但熱不寒亦裏實不泄陽氣壅盛寒自感寒而得元汗悉寒信寒痛而悸先寒後熱

瘧

牝夫瘧之為疾名狀不一有所謂瘴瘧寒瘧溫瘧濕瘧飲食不節飢飽勞逸有傷表裏俱虛致使邪氣客多熱少之氣與衛氣相搏而后成之雖經曰夏傷於暑秋必痎瘧然四時有感觸積之情飢飽失時致邪氣交爭陰陽二令脾胃不和疾留中腠皆成瘧疾其初發也次於氣血勝負邪正勢作伸展寒戰慄頭痛或先寒后熱或先熱后寒或單寒單熱或寒多熱少寒少一日一發者易治二日三日一發者難愈瘧脉自弦之數者多熱陰虛不能制陽陽氣獨盛緊者宜下法遲者寒多

不然氣虛邪世博悚振振之良言可驟用截神之藥若截早則神佳非氣其證變異或成浮腫不已即愈致成勞瘵者有之發散心肌有令人忽甚致得須臾反寒多熱之藥熱多者宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類發散不退然后以常肝瘧者寒多者宜養胃湯四獸飲發散山飲勝金圓截之截而不愈久則脾氣虛敗唯豆多進養脾驅疾之藥脾氣一盛自然平復此證既愈宜當節飲食謹勞傷防其再作如烟瘴之地居人常患瘧疾又當隨其方土所宜藥性施以治法寒熱往來瘴地常服平胃散草藥

十二

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

飲先以防之

腸癖類下膿血者癖癖也

痢 絞腹

唯痢二濟大惡 濟二濟大吉

診脉見濇大若弦急者死

令人患痢者古方謂之滯下是也得病之由多因脾胃不和飲食過度停積于腸胃之間不得尅化而又爲風寒暑濕之氣干之故爲此疾傷于下如豆羹汁冷熱交併赤白並下又有如膿腥髓者治法當先用通利之茶調治熱赤者清之若辣以冷熱風濕之證用茶調治熱赤者清之冷白者温之風濕者分利之冷熱相兼者温凉以調之仍須先調助胃氣切不可驟用鴉栗殼訶子石榴皮肉豆蔻之茶止渋之便停滯不能疏泄未有不致危者凡下痢之脉宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急身寒則生身熱則死間有癒痢兼作者惟當分利陰陽理脾助胃因毒物致痢者宜解之不可一槩而論

嘔吐

人身以胃爲主賴之以容受五穀但有所傷非其所中或爲暑氣所干或爲飲食所傷或氣結而不能食且有嘔吐之患故胃虚之人或爲寒氣

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

疾聚皆已令人嘔吐又有痰血停積胃口嘔吐之間雜以涎血當辨其脉證施以治法中寒則脉沉緊四肢厥冷飲食不下當以温煖之若投暑則脉洪数煩躁而渇又當清涼之傷食則消化之疾聚則煩氣温胃停積者多由憂思過度損傷経絡其脉実大者難治虚細者易愈嘔吐之證若脚気内攻婦人懐妊中毒困酒俱有嘔吐又須看其類以求之此證候不一至若脚腹滿脚脹視其何部不利然后利之三因詳論及此不可不審

泄瀉

泄瀉之證経中所謂飧泄（素問）水穀注下（水ト五穀トノ合ヒ下ス云）是也大腸為五穀傳（胃ニ請ケ）送之官脾胃虚弱飲食過度或為風寒暑濕（水ヲ下ニ流シ食ヲ不愛帝下）入泄瀉如傷於風其脉必浮下必帶血當以胃風湯木駆散之如寒気所傷脉必沉細腹肚切痛下必清黒當以附子理中湯治中湯木温煖之若傷於暑則脉沉微煩渇引飲其下如水當以五苓散来復丹以分利之或夾食則又當以胃苓湯下（腹ニ感ジ圓若）濕気所中其脉沈緩腰脚

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

泠痺小便自利不渴其下黃黑色當以溫濕湯
霍者正氣散調之因停食而泄者下必臭類抱
壞雞子或噫氣作酸先服感應圓推其食積而
后理脾氣体虛弱及年高之人脾氣虛敗而自
利者又當投以四柱散薏附圓若脾腎氣虛清
晨泄下一二次二神四神同主之又有腎氣虛
而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治泻之法
先理其中焦分利水穀然后斟下壅之大法如
此若脚氣泄泻者以求之證最忌五
虛之者脉細皮寒女氣前后泄利飲食不入者
是也若得糜粥入胃泄泻止則可治也

霍乱 吐瀉也吐上出瀉下出五穀泄瀉下出清穀又脾濕下注五臟俱病上下表裏之氣如斗陽陽不通攻之

霍乱之證多緣平吐泻皆由飲食不節或過飡
脾膽乳酪之物傷於五藏停積胃脘脾弱不運
化又為風寒氣所干陽陽隔絶揮霍變乱
而成此證輕則上吐下泻兩脚轉筋甚者遍体
轉筋脇肚疼痛手足厥冷若欲絶者舍車之際
宜於胸中灸艾及用葱一把煎湯炮洗次投以
姜附湯理中湯之類其脉洪大者易治脉微脯
結者難治又有霍乱而不吐泻者止其類

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

十二

不吐類利不利項刻之間便致悶絶書多灌
堀湯引其必吐宿食殆盡然後以厳氏加減理
中湯治中湯歇調之既愈之後煩熱多渇者
以麥門冬湯調之六月中暑亦能令人霍乱吐
瀉臨證審詳審ス乾霍乱篇ニ詳ナリ手方入可参考霍乱好ク

秘結

秘結之證不問気虚體實ヲ気渋運掉不行壅結於腸胃之間皆有秘縮之
客秋
気高患有風秘実秘気秘熱秘濕秘及因病發汗利
疾ノ故ニ不通ヲ陽實ニ疾カトニヲツテ手リテ濕ヲ得テ後ニ
表ニツイテ大腸カ
小便過多以致津液枯竭并婦人産后失血耗
養性 華 多毛

給
改
氣之餘皆成秘結但當審人氣体虚實脉息況
気秘
気高數若何然后用茶治療之法秘熱実者通利之寒
硫黄半夏二味之禁帝ヲ
不通ノ熱秘
虚者温行之気結而渋者潤滑之風濕而秘者
繋ル
実ノ濕秘
堅利之津液枯竭者神益之臨證更宜詳審虚
濕気積ル實用茶不可一槩而論ス
俗ニ云フ

咳嗽

疾ノ嗽ハ痰ノ肺病咳嗽ハ肝濕気ニ因ル

肺爲五藏之華蓋聲音之所從出皮毛賴之而
潤澤腎水由茲而生養勝理不密外爲風寒所
濕之気所干腎能令人咳嗽傷風則脉浮增寒
悪寒ヲ厭フ
肝苛令
身熱自汗煩燥鼻塞清涕欲語未竟而咳傷寒

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41
ガラス使用

則脈緊而無汗惡寒煩燥不渴過寒而咳傷於
則脈数而煩渇引飲咽膈乾燥咳唾稠粘傷濕
則脈細咳則四肢重着骨節煩疼又有七情之
氣傷于五藏六脈尅于肺經亦能致咳喜傷心
者咳而喉中如水鷄聲狀不能記則小腸受之咳
狀与気俱失溺傷肝者咳而両脇下痛不已則
膽受之吐苦汁思傷脾者咳而右脇下痛引
至肩背不已則胃受之吐吐痰沫憂傷肺者咳
而喘息有声甚則嗌乾大腸受之咳則遺
屎恐傷腎者数而腰背相引痛不已則膀胱受

天使発之又行度
之咳而遺溺咳而不已三焦受之咳則腑滿不
欲食治療之法宜詳審其脈證若外感邪氣止
當發散又須視病者之虚實用薬若内因七情
而得者又當隨其部経与気口脈相應脈浮緊為
虚寒沉数為実熱旋滿為サ血洪滑則多痰咳
嗽之脈浮大者易治沉微者難愈大藥以順気
為先下痰次之又有停飲而咳者又須消化之
不可軽用萬栗穀等薬攻之又有実邪未除
者亦不可便用神朱最忌憂思過度房室労傷
否則多成瘵疾之證證之

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

脾濕氣若多日逆流之水才一疾近才來亦包之也

疾氣附諸飲 龍四方南星三兩半夏二兩白朮五兩白薑蜜細半兩為末每服一兩生薑五片水煎服有大可減作二服

人身之疾如長流水貴乎順行又賴土焉之提防偶為風所逆或為物所壅滯則使有聲可以過額故疾之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為四氣七情所干氣壅疾聚發而為喘為咳又有水飲停滯胸膈亦能為喘為咳為嘔為泄為眩暈心嘈怔忡為寒熱為疼痛為腫滿為臂為攣閉痞膈皆疾所致古方所載四飲生十八病兼痛飲諸懸飲者飲水流在脇下咳唾引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身体疼重支飲者欬逆倚息短氣不得卧其形如腫疾飲者其人素盛今瘦腸間瀝瀝有聲留飲者背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆欬嗽轉甚伏飲者膈滿喘咳吐多則寒熱脾背引痛眼淚流出其人振振惡寒其脉皆弦微沈滑治法懸飲當下之溢飲當發其汗支飲則隨證汗下疾飲則用温葉徑小便利之此固定法而歲厳氏独以疾飲疾皆氣不順而致之當順氣疾為先分導次之氣順則津液流通疾飲自下亦

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

至當ニ論也亦有腎気虚寒不能摂養腎水使ノ非水溢上多吐痰唾又當温利之ハ味圓最得其宜或因酒石停飲而呃者二陳湯丁香煮散主之或脾胃為物所傷而停積痰飲五套圓破飲圓主之臨病之際更宜詳審（宜詳審）

喘急

（奇効良方喘息温寒悪ノ息ノ繋病之急サノミヤアラス急ナリ）

人之五藏皆有上気而肺為之総故経云諸気皆属於肺居五藏之上而為華蓋喜清虚而不欲擁閉調摂失宜或為風寒暑湿非気相干則肺氣膨滿發而為喘呼吸坐臥促迫不安又有因七情之気干於五藏爵而生疾或体弱之人脾腎俱虚不能摂養一身之疾皆能令人發喘治療之法當究其源如感非気則疑散之気爵則調順之脾腎虚者温理之又當於若類而求之

凡此證脉滑而手足温者生脉濇而四肢寒者死数者未死謂其散損故也此厳氏之説故再述于此

氣　附諸血膀胱小腸腎気

人稟天地陰陽之気以生精血肉以成其気

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

周流於其中以成其神欤神得俱備乃謂全体故
婦人冝耗其気以調其経男子息養其気以全
其神惟気得煖則行貴乎宣流調拆非冝致生
多證故内因七情而得之喜怒憂思悲恐驚者
是也喜傷於心者其気散怒得傷於肝者其気擊
憂傷於肺者其気聚思傷於脾者其気結悲傷
於心胞者其氣急恐傷於腎者其氣泄驚傷於
膽者其氣乱雖七證自殊無踰於気又有体虚
者外為風冷乗之入於腑中遂成諸痛發則小
腹疼痛上或繞臍或逆搶心甚則手足厥冷自
汗吐逆或大小便秘渋痛気証亦有七種厥
痛痰痛痛寒痛気痛鱉痛附痛狼痛者是也厥痛
心痛手冷食已則吐痰痛則腹中気積如臂寒
痛則飲食因寒牽然脱腹引痛気痛作滿作減
而痛鱉痛腹中痛引脇傍附痛則腹痛連脇下
有積聚狼痛小腹与陰相引而痛治療之法若
因七情所傷者當調其氣而安其五藏外非所
干者當温而散之倘治之非道内外之気走入
於腎者為腎気入于膀胱者為膀胱気入小腸
者為小腸気因寒而得者遇寒而發喜怒而得

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

者遇喜怒而發甚則結而爲積聚或於左右脇下有物如覆杯或長如扇或腫或脇大如盤令人
羸瘦少気面渋寒熱飲食不爲肌膚積聚之脉
厥而緊浮而牢亦弦急者生虚弱者死臨證審
而行之

脾胃

人身之脾胃專藉之以容納五穀而尅化脾
屬土而居五藏之中寄旺於四時之内以土能
容載万物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊
決数者即有病之脉也尋常理脾助胃之道當
以平和之薬又須時其飢飽不以生冷之物
傷之不爲寒暑所侵不爲七情所傷如是則気
体自然充実百病不生将理失宜或爲六淫七
情相干爲呃爲吐爲泄爲喘爲滿爲痞生諸證又當於
若類求之略述此以爲養生者之助

医方大成巻之四

翻胃　附五噎五膈

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者
五噎五膈喜怒不常憂思勞役致恐無時七情

傷於脾胃爵而生疾亡與氣搏外而不降飲食
不下蓋氣留於咽嗌者爲五噎結於胸膈者爲
五膈治療之法當順氣化痰温脾養胃久而不
治則氣体虚弱脾胃冷絶致成翻胃食噦即反
或一日二日而反至此亦甚危矣非砒砂墜疾
化積蕩以剛劑暖胃不足以療此證如水穀並
不能下方便集中一方用丁香附子爲末於掌
心哦喫亦一法也如吐陽脉緊而滿者爲難治
之證又有下虚之人氣上控膈令人心下緊滿
痞急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胸痞

真證類手五膈又當以嚴氏仇兼實圓治之臨
證又宜詳審

諸虚 死病法積皆虚弓痕

諸虚之与勞極雖曰皆由体気虚弱心腎有虧
水火不自升降而致此疾然若有其所因不可
不窮諸虚者或稟賦素弱又爲寒暑勞役所傷
或色欲過度俱能戕賊真気以致肌体羸瘦腰
膝無力小便頻数大便滑泄目暗耳聾遺精自
汗甚則虚矣上攻面紅發喘此皆諸虚之證勞
極者七情傷乎五蔵也然勞傷乎肝應

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

手筋極曲運神(人ノ如クスルヲヤマリ)極労傷手心應手脉極意外過
思労傷手脾應手肉極預妄而憂労傷手肺應
手氣極(人何ヲイフモノゾト)斜持志節労傷手腎應
應手五極者也労極精気変生諸證其脉多弦
治療之法虚者補煖之労極者温而精而安其
五蔵又隨其冷熱調之故素問云欬不已者温
之以氣精不足者補之以味(味薬ノ云ニ同シ)凡滋補之劑當用
平和不可驟用峻補縁腎水枯竭不足以當之
又恐愈甚上一矣之患慎之

癆瘵

癆瘵之證非止一端其始也未有不因氣体虚
弱労傷心腎而得之又有外感風寒暑湿之氣
先為痰疾以致咳嗽寒非入裏失調治又不能
保養過於房労傷於飲食久而成癆瘵之候其
為證者令人肥肉羸瘦皮毛乾枯喜熱盗汗遺
洩白濁或脇中有塊或脇后兩邊有小結核或
聚或散或咳嗽疾涎或咳唾膿血及傳変則為
二十四種或三十六種或九十九種又有所謂
五尸者曰畢尸遁尸寒尸疰尸注者是也其
名狀雖不同俱変虫不一其害所傷不過五臓

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

故傳於肝者而白目枯口苦自汗心煩驚怖於心者面黒舌乾口瘡喜忘大便或秘或洩傳於脾者面青唇黄舌強喉糗吐涎体瘦飲食無味傳於肺者面赤鼻白疾吐沫唾血喘咳毛枯傳於腎者面黄耳枯胸滿脈痛白濁遺瀝又有二十四種労蒸者亦可以因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必焦蒸在小腸也脈内需噦大腸黒或秘或洩蒸在肝也目瞀睛黄躁怒無時蒸在膽也耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚酸痛蒸在右腎也青意不定洩精白濇蒸

在肺也喘咳咯血声嗄嘶遠蒸在大腸也右臭乾疼大腸隠痛蒸在脾也唇口乾燥胵胵腹滿畏寒不食蒸在胃也臭口乾燥胵胵自汗睡卧不寧蒸在膀胱也小便黄赤凝渇如膏蒸在三焦也或寒或熱中脘膿中時見煩悶蒸在隔也心胸噎塞疼痛不舒蒸在筋也筋脉緩小胵隠痛陰囊自強蒸在肛腸之時裏急後重蒸在玉房也淫蒸在腦也眼紅眼頭疼口吐涎延蒸在脾也肌膚黧黒蒸在骨蝕齒黒燥大抵疲痛

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

蒸在髓也肩背疼痛蒸在筋也眼胴
脇痛似甲焦枯蒸在脉也心煩体熱痛刺如針
蒸在肉也自覺身熱多不索何四肢膕動蒸在
血也毛髮焦枯有時鼻衄或復尿血蒸傳及此
未易言治若病之浅者服藥之外惟有早矣膏
肓雀氏四花宛然生者可謂有命諸方所載皆
云此證有虫嚙心肺間治法先當去之然后調
養五藏致若傳尸一證名曰骨蒸殗殜復連屍疰
勞疰蟲疰毒疰热疰冷疰食疰鬼疰是也支疰
着注也自上注下病源無異是之謂傳尸此證類

大成卷之五

咳逆

咳逆之證古人以為噦者是也此證多因病后
未得調理或吐利之后胃中虚寒遂成此證亦
有胃膈膜噦至八九声相連收気不回者亦
有噦而心下緊痞眩悸此乃膈間有痰故也當

相傳滅門者有之素無治法但令人多於病者
未死之先逃於他所而辜免者謾述於此古今
有効之方開列于后

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41
ガラス使用

詳其脉證施以治法大率胃実則噫胃虚則噦年高気虚及婦人産后多有此證皆是病深之候也非易治也

頭痛

偏頭痛ハ半頭痛ノ偏正頭痛者ヲ云

頭圓象天故居人身之上為諸陽之會其疾非止一端如痛引脳癰隔至泥丸宮者是為真頭痛且發久死久發且死非薬物之可療今之体気虚弱者或為風寒之気所侵非正相搏伏而不散激為偏正頭痛其脉多浮緊有胸膈停痰厥而頭痛蓋歌者逆也逆甚而衝於頭也痰因風非則疑散之疾乗則漏利之腎虚則補腠之尋常感冒頭痛發熱又宜随證治之

心痛

心為五臓之主一身之所聽命也宜処安靜不可使有所傷犯之則痛若痛甚手足青過節者是名真心痛且發久死非薬物之所能療脉経云脉浮大弦長者死沉細者生凡心痛之病従経所載其種有九一曰蟲痛二曰疰

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

痛三曰風痛四曰悸痛五曰食痛六曰飲痛七
曰寒痛八曰熱痛九曰諸痛各雖不同其実
皆由外感邪気内傷生冷結聚痰飲停於心胞
傷於経絡重則心膈刓痛軽則怔忡而已蓋心
乃藏血之府憂思労役大過耗散真血心帝失
輔亦能令人怔忡以致膽気虚怯変生驚悸或
因支閉声率然戦慄又憂慮之中忽随層崖精
神恍惚如有所見治法宜詳其所因若内外之
気相搏則宜驅散邪気温利疾飲心血有所虧
損又當補益其栄衛寧其心志壮其膽気如此
調之痛無不愈矣

眩暈

眩暈之證發於卒然之間眼目昏花如屋旋轉
起則眩倒雖経曰諸眩掉皆属於肝又風上攻
而致眩暈然体虚之人或外為風寒暑湿之気
所干内為七情之気所結欝而生涎皆已令人
一時眩暈目瞤口噤頭痛項強臨病之際宜詳
以脈證并之風則脈浮而有汗熱則脈数而弦
痛暑則脈虚而煩悶湿則脈細而重着加以吐
逆如気欝生涎而暈者多令人眉棱痛眼不

可閉十脉多沉有此為異至若疲労過度上盛下虚金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈右随所因施治法

腰脇痛

夫腎受病則腰滞而痛故経云腰乃腎之府轉搖不能腎将憊矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑湿傷于腎経發為腰痛者又有墜墮閃挫地閉動腰脇気血凝滞而痛者其為痛也或引於項脊傍及両脇不可俛仰或腰下如有横木如坐氷中多令人面目黧黒脇脹滿大便

腰痛之脉皆沉弦又須明沉弦而浮者為風沉弦而緊者為寒沉弦而実者為凝滞若推其所因感邪気者駆散之凝滞者順其気而調其血如此治之病無不愈又有腎経虚憊心血耗散不能養其筋脉以致腰痛又當補其心腎筋骨自壮矣

脚氣

富士者至一月者之ヲ湿気寒気腫物ニ敗散ニ加大黄ヲ聖斉捷録曰是脉ニ多矣　脾気ト心脉気ト

脚氣之疾雖総之曰気而古今證治實為多端故千金論脚気皆由感風毒所致又経曰地之風寒暑湿皆作斯気是常候之遂成脚気古来

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

無脚氣之說黃帝時名爲厥（脚氣之宋齊之後）始謂之脚氣（宋齊之前）其名雖不同其實一也今之所感未有不由脾胃兩經虛弱坐卧行動之間爲風寒暑濕之氣所干流注而成此疾得病之始多不覺人便溺會因他病乃始發動或奄然大厥經三二日方覺之先從脚起或緩弱痺痛行起忽倒或兩脛腫滿足膝枯細或心中忪悸小腹不仁大小便秘泣或拳体轉筋骨節酸疼或惡聞食氣見飲汁逆或胸滿氣急壯勢增寒其爲候也不一治之須詳審力可否則誤以爲他疾治之若入腑攻心難不致危矣大抵脚氣之證發於外者入同而小異必須以脉并其風寒暑濕然后施以治法若寒氣中三陽經者患處必冷暑中三陰經者患處必熱又以其脉浮而弦者起於風濕而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於風者汗而愈濕者溫而愈熱者厭而愈又當順四時調理不可拘一春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須量人氣体虛實微加滋補防其過之（脛注焉）（厥又如無汗）（脛）（カンテン）（アヤカ）再作此皆歴氏詳論如此

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

風勝薬急制痛小為寒勝腫満重着為湿勝煩渇
（三四六字下急ニテ）
発遇為暑勝四気無中者但推其多者為勝分
其表裏施以治法亦王困至當ク説古人得脚
気ニ初多用針灸最忌用攻薬巣炮恐遍邪気
入于経絡為難治也今之治脚気者有一方偶
合於所患之証服之得愈便為秘方其后遇
病更不審其脈証所因又服以前薬之証既殊
非徒不能愈病適足以重病戒之

五痺

凡痺疾自有五種筋痺脈痺骨痺皮痺肌痺是
也多由体虚之人腠理空疎為風寒湿三気所
侵不能随時駆散流注経絡久而為痺其為病
也寒多則製痛風多則引注湿多則重着其病
在筋者則弧而不能伸應于肝其證夜卧多驚
飲食少小便数其病在脈者則血凝而不流應
于心其證令人痒黄心下懶気辛悉逆喘不通
噫乳善噫其病在骨者則重而不能挙應于腎
其證手足不遂而多痛心脈脘満其病在皮者
多寒遇寒則急逢熱則緩應于肺其證皮膚無
所知寒気奔喘満其病在肌肉者多不仁應于

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

脾其證四肢懶怠發咳吐涎其脉大而濇或
来急而緊俱為痺之脉也治當弁其所感風
寒濕三気注于何部分其表裏須從偏勝者主
以茶餌又有停畜支飲亦令人痺又當隨證治
之至如白虎歷節遍身痛者無非風寒湿三氣
乗之巣氏云飲酒多當風汗出入水遂成斯疾
久而不愈令人骨節疼疼恐為癲癎之病如有
比證治之宜早為貴

医方大成卷之六

五疸

黄疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過
五疸一曰黄汗二曰黄疸三曰穀疸四曰酒疸
五曰女労疸是也黄汗之證身体俱腫汗出不
渇狀如風水汗出染衣黄如蘗汁此由脾胃有
熱喜自汗出入水中洗浴故汗孔塞結其汗
黄也黄疸之證食已即飢遍身皮膚及凡甲面
目小便俱黄卧時身体又帯赤帯清者必發寒
熱此由酒食過度藏府壅塞極水穀相併積於胃
胃被為風湿所搏結帯不散壅気薫蒸所致若

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

發陽部其人必呕發於陽部心胸塞而后變
疸之證食畢即眩心中懊憹不安而遍体發
黃此由脾胃有熱大飢過為飲食所傷胃氣衝
逆所致也酒疸之證身目皆發黃發熱心中熱痛足脛
滿小便黃面發赤班此由飢中飲酒大醉當風
入水所致女勞疸者其證身目皆黃發熱惡寒
小腹滿急小便不利此由過於勞傷又於極熱
之中房事之后入水所致如多渴而脈肺者難
治大槩五種之病多是肝胃經有熱而后發黃
治法左當究其所因方利為先酖毒飲之又有

時氣傷寒傷風伏暑解散未尽亦令人發黃如
疸狀口淡悒悒耳鳴脈弱微者微熱小便白濁
又當作虛證治之不可妄投涼葉愈傷血氣臨
病之際辨之可也

蠱毒

蠱之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之
今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇
蜈蚣蝦蟇三物同器貯之驅其互相食啖俟
一物獨存者則謂之蠱欲害其人密取其毒於
酒食中啖之若中其毒者令人心腹紋痛如有

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41
ガラス使用

虫咬吐下血皆如爛肉若不即治令人五蔵即
死然此毒中人有後有急者十数日便死緩
者待以歳月気力羸敗食尽五蔵而后死人則
其毒流注於傍人亦成蠱注大抵試験蠱毒之
法令病人咳嗽水中沉者是毒浮者非也或令一
木豆其豆脹皮脱者蠱也豆不脹皮不脱者又
非也又以鵲皮至病人卧下勿令知竟病甚者
是也若則非也治療之法必須審而後行試而
后可令人凡有種類非蠱者便以
為蠱尤為非也世説閩廣深山之人專有以蠱
行毒於人者若欲知其姓名一呼喚将去其病自
愈又一説病者審能知元中毒者何物之中終
身不服此物其毒亦不復作雖相傳如此俱未
之見謹用載之以備捜覧

諸淋

淋閉之疾其證有五気石血膏労是也気淋為
病小便渋常有餘瀝石淋為病茎中痺尿不得
辛出膏淋為病尿似膏出労淋為病労倦即發
痛一気衝血淋為病遇労即發甚則溺血候其
黒赤色黄者小便難也大率此證多由心腎不

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

又積蘊埶毒或酒石房労或七情鬱結或飲冷
逐熱發散不動結于下焦小腸膀胱麥之則爲
癃閉淋閉其所爲病皆一類也又有温病後餘
埶不散當風取涼亦能令人淋閉故治法當以
清心爲先滑利次之臨證用采更須詳審

消渇

人身之有腎由樹木之有根也腎麥病先必形
体憔悴雖加以滋養不能潤澤故患消渇者皆
是腎經受病由壯盛之時不自保養快情恣慾
飲酒無度食肺炙及丹石等藥遂使腎水枯竭
心火熾盛三焦猛烈五藏乾燥由是渇利生焉
医經所載有消渇内消逆中三證消渇者多渇
而利内消者由埶中所作小便多於所進飲食
而反不渇屈極短氣逆中者虚陽旺大不支而
精気自泄大槩消渇之病上盛下虚心脉多浮
腎脉必弱故經云脉洪大陰不足陽有餘則爲
埶中即消中也又云腎実則消而不渇小便自
利名曰消腎即内消也其治宜抑損心火補養
腎水消渇之人津液枯竭服剤過多防發癰
疽之疾尤忌房事并飲酒醎食實麺之物切不

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

可用金石之藥臨證慎之

赤白濁

人之五藏六府俱若有精絲腎爲藏精之府而聽命於心貴於水大升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不交精元失守由是而爲赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有冷多因嗜慾而得之其狀旋面如油光粉不定旋脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛者當清心調氣腎寒者溫補下元仍須清上使水火既濟陰陽叶和精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故大便下渾濁史載之云蓋則土燥而水法冬則土堅而水清近多峻補其疾愈甚只宜以平和之藥療之水火既濟脾土自坐其流清矣

水腫

岐伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆衆水所致故人身以脾屬土五行論之雖曰赶制腎水然非土則又不能防其泛溢水腫之疾究其所因皆由脾土有虧不能防

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

制以致腎水浸漬脾土凝而不流遠成此疾其
為證也發見之始累裏微腫若卧蚕漸起之
扶徹而至大以手按之則隨手而起如累水其
内上則喘急咳嗽下則足膝腑腫面目虚浮外
腎或腫小便不利治療之法當并其陰陽脉證
若陰水為病者脉来沉遲色多青白不煩不渇
小便汲少而清大腑多泄陽水為病者脉来沉
数色多黄赤或煩或渇小便赤澁大腑多秘腰
已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便若
實其脾土七、盛自能損養腎水其腫自消虚弱

者又當温補下元右宜節飲食絶生冷戒房室
否則愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰皆腫流
水又若唇黒缺盆平脇凹背平足平五者皆是
五藏有損非可療之病又有内挾七情之氣停
滞涎飲脉滿脉沉及女血勞生瘡變
為腫痛名為染腫又當隨證施治不可一陳
而取要知此證脉浮大者生沉細者死臨證施
治宜詳審要

脹滿

自本散方出象訶利勒煨去核各三分 厚朴去皮 丁子 乾木瓜各二分
木元桂 元皮各一分 呉茱萸 中巨勝 木瓜沸湯一煮各秒

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也魚見之方

治而其論自三因嚴氏始詳大抵脾滿之證多
是脾胃素弱或病后失調外為風寒暑濕之氣
所侵內為憂思七情之氣所傷及過食生冷飲
漿之類并傷脾胃以致五藏傳尅陰陽之氣不
得升降疾飲結聚中焦遂成脾滿之疾其為證
也或腸鳴氣走痛或兩脇脾背痛連上
下或頭痛嘔逆胸滿不食大小便為之不利其
脉浮者易治脉虛小者為難治至如積聚之證
亦由膨脹而始又當以脉証并之但五積治法
更有水疸水氣腳氣及婦人血膨皆令人脾滿

又當各以類求之

積聚

五積六聚者五藏六府之有所積聚也其為病
諸書所載皆以內為喜怒憂思七情之氣尅制
五藏結而不散乃成積聚之證故憂傷肺者以
所勝傳之肝遇夏則脾土旺傳尅不行故成肝
積名曰肥氣其狀在左脇下大如覆盃似有頭
足診其脉弦而細其色青兩脇下痺引小腹男
子為積疝女子為瘕聚失志傷腎者以所勝傳
心遇秋則金肺旺傳尅不行故成心積名曰伏

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

梁其狀起於脐上大如臂循梁之橫架於胸膈
間診其脉沉細而苑其色赤脉勢心煩面赤咽
乾令人食少羸瘦甚則吐血想傷肝者以所勝
傳脾遇冬則腎水旺傳尅不行故成脾積名曰
痞氣其狀見於胃脘大如覆盂痞塞不通診其
脉浮大而長其色黄遇飢則減遇飽則見脉常
滿而足腫兼以噫泄久則肉削令人四肢不收
喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝木旺傳尅不
行故成肺積名曰息賁其狀震在右脇下大如
杯擣喘息奔溢診其脉浮毛其色白氣逆督

痛目喜閉而屬寒皮中時痛如刺或如風緣思
傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳尅不行
故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或湊心下
上下無時有若奔豚之狀診其脉沉而急其色
黒飢則見飽則減小腹裏急腰痛骨痿眼昏口
乾久則令人骨痿少氣至如六腑六府其六
痛上下亦無常處在上則梢在下則脾旁攻兩
脇如有杯壒易於轉動此其與五積為異耳蛊
曰氣之積聚而成此況余忖度之必是因氣結
聚痰飲或是積聚之物而后巨塊硬如比綴蒲

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

之初早能并其脉証投以菜餌或以導引之法
亡云庶幾若其見厭於皮膚之下菜入腸胃熏
蒸之所不及誠為難治之證凡積聚小脉實盛
者生沉小者死

宿食

人之有身藉五穀以生故胃以納之脾以消化
之脾胃喜暖不宜以生冷傷之体虚者不喜調
養飢飽失時或過食飲食并一切生冷之物脾
胃怯弱不能消化停畜胃脘遂成宿滞輕則泰
酸呕悪胸滿噎噫或泄或利其臭如抱壞雞子
或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之
須究其原又須量人気体虚実病證淺深投以
薬餌病淺者則清化之甚者必須推利而后調
神脾胃或有回扶者暑気而泄者又當以脉
證辨而料理之

自汗

心之所蔵在内者為血發於外者為汗蓋汗乃
心之液而自汗之證未有不由心胃俱虚而得
之者故陰虚陽必發熱而自汗陽虚陰必来
發厥而自汗此固陰陽偏勝所致又有傷風中

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

暑病湿煩以驚怖房室労極歴節腸癖疾飲産
厚等病亦能令人自汗如睡中不覚汗出者是
名盗汗亦心虚所致其脉多微而濡濡而虚沿
之宜飲心気益腎水使陰陽調和水火升降其
汗自止自汗之證若煩又當若類求之

虚煩

虚煩之疾非止一端究其大率多是体虚者摂
養有乖榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰
虚而陽盛或陰盛而陽虚素問云陽虚則外寒
陰虚則内熱陽盛則外熱陰盛則内寒此固不
易之論而今虚煩之病多是陰虚生内熱所致
如虚労之人腎水有虧心火内炎其煩心躁吐
瀉之后津液枯竭煩而有渇惟傷寒及大病後
虚煩之證却無霍乱臨病之際又宜審之治法
宜用以平和之茶清心実下未可峻用神菜又
若婦人産后去血過多虚煩參葵又當若類求

医方大成巻之七

健忘

健忘者陡然而忘其返也雖曰此證皆由憂思

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

過度損其心胞以致神舍不清遇(上ムネノ病)事多忘然過
思傷脾亦能令人健忘治之須(上ムネノ病)理心脾神凝
意定其證自除

癲癎

癲癎之疾諸方所載並作一證治之愚謂癲与
癎雖以一病而論故癲者全屬於心癎者帰洋
五藏所謂癎者神不守舍狂言幸語如有所見
動經年歲不得即愈若心經有損是為真病如
心經蓄熱則當清心除熱如疾速心竅使然又
當下痰而寧其心志婦人因血気迷心或因產
後悪露上衝而語言錯乱神志不守者若當隨
其證治所謂五癎者馬癎羊癎雞癎猪癎牛癎
是也其為證也卒然之際旋暈顛倒口眼相引
手足搐掷背脊強直口吐涎沫食項力甦氣其
所因五藏之間或為七情之氣鬱結或為六經
之邪気所傷閉塞諸經一時疾漸蘊伴心膈致
有此證馬癎作馬嘶者應乎心羊癎作羊叫者
應乎脾雞癎作雞声者應乎胃猪癎作猪叫者
應乎腎牛癎作牛吼者應乎肺比又以五行合
五藏而言須詳考其因施以治法大抵當以祛

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

疾順氣爲先然后并其有無風
可補其五藏又有在毋腸中痛
所感觸而成此證又當辨之

陰癪 痂気類 表六裏痰 真寒痂冷之

陰癪之證其種有四一曰腸癪二曰氣癪三曰
外腎浮胜四曰水癪是也究其所因皆是腎經
虛寒或爲勞役所傷或爲風濕之氣所侵結而
不散久則腎氣虛憊而成此證外腎腫胜者偏
有小大或堅硬如石或胯腹疼痛甚則膚囊腫
脹成瘡時出黃水病而至此未易治也腸癪亦
然惟氣癪水癪稍九矣之可愈又有小兒自生
不可依下二寸半二有此
以來外腎偏墜者此亦宿疾不必醫療可也

痼冷

人之一身貴平陰陽外降平和無偏若有偏勝
是即爲病痼冷之證皆以人身真陽耗散脾胃
虛弱加以飲食冷物有傷真脾腎痼結其冷於
藏府不散以致手足厥逆畏冷增食飲不化
吧吐泄洩或大府洞泄或小便數多治之須暖下元養理脾胃若又有脾虛而
畏寒者令人咳嗽又當扶助咳嗽門未

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

積熱

積熱者挾毒蘊積於其內或也或人固有体氣實一時感觸熱毒之氣或嚼積藏府之間或在心肺之內令人口苦咽乾涎唾相粘眼波多淚口舌生瘡大小便秘結又有陰盛血衰三焦已燥服餌酒炙之物并丹石之毒愈助其熱結滯於內不能令人變生諸證治之須詳其脉狀若在心膈者清之結于藏府者湯條之更量人氣体虛實輕重用之

吐血　附咳血衄血尿血

豐適ノ脉ハ弱ナレバ生ニナイヤウナルガ如シ手負ノ脉ノ

人身之血猶水行地中百川脉理則無窒塞之患一身之間榮衛失調七情四氣相干氣血逆亂然后變生吐血咳血諸證皆血妄行固由積染所致然其證候端難以一槩而論有由飲食過飽負重傷胃而吐者有思慮傷心并積熱而吐血衄血者有勞傷心肺又為七情所干而咳血吐血者心主血肝藏之而脾為之統過思傷脾亦能令人吐血治之須究其因傷胃者調胃安血勞心者神益其心志則清之氣爵則順之傷脾則安之吐血之脉宜沉細不宜浮數吐

四三

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

不咳者易治嗽中帶紅線者難治為其有所損
也病之淺者惟有早矣喜育而已致若肺生痈
瘡從高墜下應傷折者能吐血傷寒汗后不解
結絡隨氣湧泄吐血衄血又當從若類求之

下血

人之滋養一身惟氣与血為榮氣為衛榮行
脉中衛行脉外故心主血肝藏血而脾為之統
貴於氣順則血調若内因七情并酒食所傷外
為於氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人
下血若風入腸胃者其脉浮下血必在糞前是
名近血停積于大腸者其脉沉滯血在糞后又
名遠血藏寒者其脉沉微下血無痛積熱者其
脉洪数純下鮮血甚則煎痛傷濕者脉沉而遲
下血如豆汁又有因氣爵結酒食過度并過飲
房膽因毒生蟲亦能令人下血又當以五藏所
傷并其證治風濕則祛之寒則温之熱則清之
停滯則疎滌之氣則調之有毒者解利之下血
之證非止一端大藥血得下塊而行過涼而止用
茶當審之

痔漏

痔之疾五種牡痔腸痔（細書十下之腸曾有之云外二不見）血痔牝痔脬痔是也究其所因皆是素蘊熱毒或過食炙煿或飲酒
血脉不流或因七情之氣鬱結于藏府之間其毒不能消散發而為痔或藏於肛門之內或突出於外大者如蓮花鷄冠核桃之狀小者如牛乳鷄心鼠尾櫻桃之類名狀更多其實皆由藏毒所致故蘊毒深者其狀大蘊毒小者其狀小或流濃水或流鮮血行坐之間病者殊為苦久而不治血氣衰弱必致成漏今之治法多以刀線割剔其痔雖有未可以封固慾其毒在內無由而去必有再作之理否則成漏轉而為難治之證諸方多有服食敷貼之藥今人用之甘見有劾揆疫其理其病既有愈必須用去毒消痔之藥点之俟其毒盡痔消方可為愈切不可用砒霜木鼈外非服業之能慎之又有與痔者肛門左右別有一竅流出濕血名為簫漏治之須用溫煖之藥補其內又以生肌肉之藥敷於外其竅在皮膚者易愈藏府有損而生竅者未易治

四五

脫肛

肺与大腸為表裏故肺藏蘊熱則肛門閉結肺藏虚寒則肛門脫出此三因之論又有婦人産育用力過多及小兒久痢后尚虚寒出治之必須温肺藏補腸胃久則自能收矣

遺尿失禁 遺屎小便ノシテアトモトルヤウナルモノ

人之溲尿藉心腎二気所傳送蓋心与小腸為表裏腎与膀胱為表裏若心腎気虚陽気衰冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故経云膀胱不利為癃不約為遺是也治宜補煖下元清心寡欲又有産薄不順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁又當隨證施治

咽喉 附重舌

咽喉者為一身之総要与胃相接呼吸之所從出若胸膈之間蘊積熱毒致生風疾壅滞不散發而為咽喉之病唯肉生瘡或狀如肉齲為腫為痛壅塞不通吐嚥不下甚則生虫重舌治之亡豆先去風疾以通咽膈然后解其熱毒遅則有不救之患又有熱毒衝于上膈而生瘡謂之懸癰及肺壊亦已令人咽閉吞吐不利臨病須詳審其證施以治法

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

眼目

人之有兩眼猶天之有兩曜視万物察纖毫何所不至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四気七情之為害也大抵眼目為五藏之精華一身之至要故五藏分五輪八卦分八廓五輪者肝屬木曰風輪在眼為烏睛心屬火曰血輪在眼為二眥脾屬土曰肉輪在眼為上下胞肺屬金曰気輪在眼為白睛腎屬水曰水輪在眼為瞳子至若八廓無位有名膽之府為天廓膀胱之府為地廓命門之府為水廓小腸之府為大廓腎之府為風廓脾胃之府為雷廓大腸之府為山廓三焦之府為澤廓此雖為眼目之本根而又藉血為之包絡五藏或蘊積風熱或有七情之気鬱結不散上攻眼目若随五藏之所屬而見或腫或痛遷延多淚或生障翳骨暗失明其證七十有二治之須究其所因風則駈散之熱則清涼之氣結則調順之切不可輕用針刀點劃偶得其愈出手僥倖儻或不然為終身之害又旦不可過用涼劑恐永其血脉凝而不流亦成固疾當量人老少気体

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

虛實閒未又有肖虛者立
生冷腎止當神煖下元溢真腎水北方之人患
眼尤多皆是日冒乳汁夜卧埃坑二氣交蒸使
然治之多用涼茶北方禀受与南方不同故也
疼亘心后毒氣欝於心肝二經不能自已發於
眼目瞤干瞳人者宜無治方

醫方大成卷之八

五藏内外所因證治　肝心脾肺腎

人身之有形於外者必有諸内故五藏之受病於
内而發於外者必見於眼耳鼻舌口牙之間心
經蘊熱則口舌生瘡唇口類於脾与胃相通故
受熱則喧氣臭穢腎受冷則耳不能聽或無風
則乎痛頷腫肺受風邪則皮毛瘙痒積毒則發
為癰疽肝受病則目不能視變乃血氷餘焦枯
者血不足也此皆病在内而應乎外也凡有真
證必須考其所自来并其冷熱虛實治之

癰疽瘡癤

凡瘡之痛痒自屬虛実寒熱故痛而實者為熱
虛而痒者為寒經云諸瘡痛痒皆生於心以心

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

主血而行気ヽ血凝滞而為癰疽癌大一
寸以上曰癰疽一寸以下曰疔瘡癌諸瘡之中惟
背疽丁瘡最為急證其初發也使身体或先焮
而后悪寒或先瘧而後痛先若其不痛最為悪
證且如背疽始生如粟粒大猶有覚時便用
火灸痛處灸之痛則灸至痛使毒
気隨大而散若失之於初瘡勢已成又當審真
虚實寒熱則温之后毒消膿潰
潰方為可治之證丁瘡者必灸手足之間生
黄泡其中或黒色有一條如紅線直上倉卒
之際急宜以針於紅線所至之處刺出毒血然
後以蟾酥乳香膏木於正瘡上塗之針時以病
者知痛出血為好否則紅線入腹攻心必致危
困至若瘰癧頸疽豚癰之類皆毒気鬱積於内
發而為此治之皆須辟毒潰膿若気血弱者又
須生之此一定之法瘡節疔癬之類隨其蔵府
所受冷熱調之所潰気血宣流自失其痛痒矣
如脚氣漏瘡久年不愈者多是腎水流注又有
脾水潰溢治若有方隨證選擇

折傷

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

折傷者謂其有所傷於身体者也或為打仆并
又或墜墮陳地打撲身体腎躰使血生不止又
恐瘀血停積于藏府結而不散去之不早恐有
入腹攻心之患治療之法須外用穀貼之茉散
其血止其痛内則用花茉石散之類化利瘀血
然后次ゝ調理生肌或固折傷而停爵真気又
當順之或固湯丸所傷并具一一二方以備搜討

醫方大成卷之九

婦人調経衆疾論

夫女子十四則月水行男子二十六則陽精溢此
皆合于陰陽之数若及其時故男子之精気宣
盛女子之月水宜調ゝ経之道遺于耗其気以
行其血ゝ盛気衰是謂之逆ゝ則百病不生孕
育無損矣且婦人之病四時所感六淫七情所
傷患与男子治法一同惟胎前産后七瘕八瘕
崩漏帯下之證為異故別貯方究其所因多由
月水不調変生諸證大率婦人之疾以経候如
期為安或有愆期當當其冬葵虚実而調之先
期而行者血熱故也法當清之過期而行者血

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

寒故也法當温之然又不可不察其藏邪外并
為之寒塞而后投藥旦經行之際与産后一般
將理失宜為病不淺若被驚則血気錯乱經脉
蹔然不行逆於上則從鼻口中出逆於身則為
血分労瘵之疾若其時當
為瘀痛之根若憙怒則気逆而血逆矣
脾腿心肢背脇之間遇經行時則痛而重着遇
期又安若怒極而傷於肝則有眼暈吧吐之証
加之経脉滲漏於其間遂成竅穴淋瀝不已凡
此之時中風則病気感冷則病冷久而不治崩

漏帶下七癥八瘕可立而待若能治病於未然
當以調経為先故首論之若倫諸方依次于後

胎前産後論

人之夫婦猶天地之道陰陽和而萬物
生焉夫婦之道陰陽和而男女生焉故婦人先
須調其経而百病不生矣
當知気盛血衰則無子血盛気衰乃有體須以
抑気生血為先若有胎腫則服安胎順気之剤
及善将理以候分足如胎前産后要生諸證皆
由不善調護所致茲詳具右方于後臨病之際

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

又當對證求某款之調之致若外感四氣内傷七情以成諸疾治法則与男子無異當求之但胎前治病損動胎氣不某忘當避忌臨證審之

小兒論

蓋小兒初生受胎氣之厚者疾病自少稟賦怯弱者又藉某力以扶植元氣何況養護不謹或受驚風或飲食過度衝冒寒暑以致變生諸証調治之法又須察脉觀證審而後投以某劑略倫數方于后以倫倉卒之

風

和劑方姜附湯　同方生料五積散　同方理中湯　同方正氣散

暑

和劑方五苓散　同方大順散　同方枇杷葉散　同方桂苓甘露飲　同方消暑圓　御藥院方益元散　同方桂苓炎　濟生方冷香飲子　和劑方解暑三白散　百一選方十味香薷飲

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

湿

和剤方滲湿湯　済生方羌附湯　本事方薏苡仁散　三因方葛术湯　三因方腎着湯　済生方滲湿湯　張子和方大橘皮湯　已黄耆湯

傷寒

活人方麻黄湯　和剤方桂枝湯　同方五積散　同方十神湯　活人方麻黄桂枝各半湯　同方柴胡桂枝湯　同方人参敗毒散　外麻葛根湯　柴胡升麻湯　和解散　滋寧方五積交加散　同方十味芎藭散

痛

和剤方五苓散　同方人参養胃湯　簡易方四歛飲　同方七寶飲　同方小柴胡湯　簡易方宣斉歛子　活人方柴胡加桂湯　活人方白虎加桂湯　済生方清脾湯　同方紅豆連香

痢

和剤方生料五苓散　同方黄連香薷散　同方敗毒散　同方胃風湯　同方香連丸

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

同方水煮木香㕮 同方訶梨勒散 三因方固
腸湯 濟生方當歸㕮 拔粹方胃風湯 張子和
方桂苓甘露散 宣明方阿膠梅連丸

嘔吐 和劑方理中湯 同方丁香柿蒂散
百一選方安脾散 治人方生姜橘皮湯 拔粹方四
君子湯 同方藿香半復散 同方丁香半
夏㕮 濟生方大藿香半夏散 同方旋覆花
湯 同方玉浮㕮

泄瀉 和劑方六和湯 同方理中湯

濟生方加味五苓散 同方火輪圓 百一選方厚
腸㕮 同方補脾㕮 同方大藿香散 濟
生方豆附㕮

霍乱 和劑方姜附湯 同方理中湯
濟生方通脈四逆湯 同方麦門冬湯 仁齋
直指方木瓜湯 和劑方正氣散 張子建
苓甘露散

秘結 和劑方三和散 同方半硫㕮
楊氏家蔵方滋腸五仁丸㕮 濟生方枳殻㕮

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

同方橘杏圓　簡易方順氣灸　濟生方枳殼

灸　咳嗽　和劑方華蓋散　同方敗毒散

同方參蘇飲　同方青龍湯　同方細辛五味

子湯　御業院方蠟前契散　三因方平氣飲

疾氣附諸飲　澹寮方須无散　蘇

子降氣湯　和劑方俞山人降氣湯　和劑方

丁香半夏灸　同方倍朮灸　同方枳實理

中灸　三因方參蘇飲　同方五苓散　同

方八味灸　校粹方海藏五飲湯

喘急　和劑方三拗湯　同方人參定喘

湯　同方紫子灸　同方神

濟生方五參飲

氣附諸疝膀胱小腸腎氣

和劑方蘇合香丸　同方三和散　同方

保灸　同方和氣散　同方異香散　同方

木香分氣丸

脾異　和劑方參苓白朮散　同方嘉

未散　同方四君子湯　同方人參丁香散

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

同方紅豆　同方養脾汤　楊氏家藏方洗
香磨脾散　本事方白朮湯　同方濕脾散
翻胃附五噎五膈　和劑方五膈寬
中散　同方膈氣散　御藥院方十膈氣散
三因方沈香散　和劑方撞氣阿魏汤　校粹
方百杯丸
諸虛　和劑方老建湯　同方十全大
補湯　同方黃耆建中湯　同方芫荽子汤
同方八味汤　同方鹿茸大補湯

痞瘀　三因方取痞出方　和劑方
美樂令建中湯　同方黃耆建中湯　同方芫荽子汤
濟生方黃耆飲子　百一選方猪膏煎
咳逆　三因方丁香散　活人方橘皮干
姜湯　同方半夏生姜湯　濟生方羌活附子散
同方橘皮湯　治人方橘皮升麻湯
頭痛　和劑方五七散　同方川芎茶
調散　同方如聖飲子　三因方霍香散　三因方
芎犀湯　同方芎辛湯　活人方人參順氣散

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

心痛　和劑方妙香散　同方降心丹
同方平補鎮心丹　同方十四友參　三因方茯苓
補心湯　簡易方葉氏十補湯　同方葉氏定
心湯

眩暈　本臺方羚羊角散　和劑方順氣散
濟生方芎歸湯　和劑方姜附湯　濟生方三五七散
腰脇痛　和劑方五積散　三因方独活寄
生湯　三因方牛膝酒　濟生方不附湯　本臺方
芎藭湯　濟生方枳芎散

腳氣　和劑方五積散　同方香蘇散
三因方加味敗毒散　和劑方黃耆湯
黃芪桂湯　同方大料神秘芎桂湯

五痺　和劑方五痺湯　三因方附子八物湯
本臺方芎附湯　濟生方蠲痺湯　同方防風湯
本臺方增損續斷湯

五痺　三因方白朮湯　同方當歸白朮散
濟生方加減五苓散

蟲毒　三因方解毒圓　同方膏煎雄

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

黃散　濟生方丹砂炙　同方礬灰散

諸淋　和劑方五淋散　同方八正散　同

方清心蓮子飲　同方五苓散　同方葦散　三

臣方生附散　濟生方地膚子湯　濟寮方五淋散

消渴　和劑方黃耆六一湯　同方五苓散

同方清心蓮子飲　三因方真珠丸　同方蒞

蓉圓　簡易方地黃飲子

赤白濁　和劑方道寺赤散　簡易方心

腎丸　三因方益志湯　同方安荒散　和劑方

茯苓丸　楊氏家藏方薑附分清飲　百一選方固真

丹

水腫　和劑方五皮散　同方五皮散　同方

神朮散　三因方消腫丸　濟生方實脾散　同方

踈鑿飲子　直指方蘿蔔子飲　同方

脹滿　和劑方沈香降氣散　三因方大

半复湯　濟生方平肝飲子　同方紫蘇子湯

三因方是齋氣湯　簡易方桃溪氣室丸

積聚　和劑方丁香脾積丸　同方

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

温白丸　楊氏家蔵方木香檳榔煎三日方
散聚湯同方伏梁炙　木妛方枳殻散　濟生方
大七氣湯
宿食　和劑方丁香脾積炙　同方
紅炙子　三因方五百圓　濟生方黒炙子
同方如意炙　同方阿魏炙
自汗　和劑方三建湯　同方牡蠣
散　同方防己湯　同方正元散　同方橘皮
同方麦煎散　濟生方黄蓍湯　同方者附湯

竹茹湯
健忘
同方壽星炙　濟生方飯脾湯　百一選方
朱雀圓
癲癎　和劑方牛黄清心炙　楊氏
家蔵方　五癇炙　濟生方椶灰丹　百一
皈神炙　和劑方　金露炙　三因方椶灰丹

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

濟生方八珍散　同方黑龍丹　和劑方碧露丹

咳癇　和劑方茱萸内消湯　同方射香大戟湯　濟生方牡丹散　治人書笈湯　百一選方三茱丸　濟生方橘橫湯

痰冷　和劑方姜附湯　同方沈香畫澄茄散　澹寮方紫沈煎湯　百一選方雄朱丹

積塊　和劑方三黃湯　同方沈心散　同方涼膈散　同方八正散　和劑方龍腦飲　同方

月露飲　同方消毒犀角飲

吐血附咳血衄血　和劑方大阿膠湯　同方龍腦薄荷湯　同方勝散　同方枇杷葉散　三因方龍骨散　簡易方易是齊白术散

下血　和劑方敗毒散　同方胃風湯　同方黃連香薷散　本事方槐角散　楊氏家藏方聚金丸　校粹方外陽去濕和血湯

疼痛　和劑方槐角丸　寬腸丸　宣

明方　香蘇丸　同方黄耆葛花丸　拈痙方蒲黄散　経験方黒炙子　三因方五厥散

脫肛　和劑方鈎腸炙　同方乳香炙　三

同方蝟皮散　三因方香荊散

遺尿失禁　和劑方二氣丹　御薬院方

秘元丹　三因方家韭子炙　同方聚散子

雜内

咽喉附重舌　同方茯苓炙　同方

同方荊黄湯　同方五香散　御薬院方碧玉炙

同方射香朱砂炙

眼目　和劑方明目流氣飲

同方蝉花散　同方明眼地黄炙

簡易方加減駐景炙

五臟内外所因證治　和劑方内補十宜散

同方黄耆建中湯　同方五香連翹湯　同方外麻和氣飲

折傷耳鼻口舌牙歯瘭瘡瘡疥急救諸方　和劑方大温経湯

婦人調経衆疾論　同方

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

四物湯　同方内補當皈矣

同方皈血矣

拔和方　疹豆

東垣先生試効方論

一小兒瘢疹始出之證紫光兒面燥腮赤目胞赤呵欠頭閉作寒作熱咳嗽嘔吐稍冷多睡驚跳並疹疹之證或生膿胞或生癮疹此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起右腎之下一竅熬煎水夾脊逆流上頭下額逆手太陽而不得前進故於面是生寒水逆剋而下熱故也小兒疹疹之證始生之時嘔吐一發口中所含乳汁隨吸而下還於右腎包絡之胞中其瘡之發下焦猶大熾也三焦瘡皆出於太陽寒水之經外為太陽內為二火攻化血肉為膿寒為發寒非可令內瀉二火又令逆上歸本位三服瘢疹即愈已後再元二來面瘢出之患損生命者矣

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用

12379

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41
ガラス使用

862
41

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』 請求記号 863-41

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『醫方大成略抄10巻』　請求記号 863-41

ガラス使用