

大德重校聖濟總錄卷第一百四十

痔瘻門

脉痔

血痔

腸痔

氣痔



脉痔

論曰脉痔者藏府蘊積風熱不得宜通也風熱之氣乘虛流注下部故肛邊生瘡痒痛血出也蓋實為痛虛為痒今實熱乘虛下攻肛腸故痒且痛又脉者血之府得熱則妄行故血乃出也

治脉痔生瘡下血痒痛槐莢煎丸方

槐莢

壹斤淨洗并子爛研入水半升同研振取汁

白蜜

貳兩與槐莢汁同熬成膏

枳殼

去瓢燻兩

黃耆

剉

防風

去叉各半兩

杏人

湯去皮尖雙燻炒研入

皂莢子

炮去皮各參分

右七味除前膏并杏人外搗羅為末與杏人和勻以

槐葉膏再和杵二三百下丸如梧桐子大每服二十丸清米飲下早晚食前服

治脉痔下血大腸腫痒大聖散方

枳殼

拾肆枚

胡桃

拾枚

荆芥穗

木賊

炒各兩

延胡索

兩半

右五味將枳殼胡桃同入藏瓶內用泥固濟燒存性搗後三味爲細末再同研勻每服二錢匕米飲調下

治脉痔有蟲時或痒痛血不止薑附湯方

生薑

艾葉

各半兩

附子

炮裂去皮臍

枳殼

去麩炒各半分

生地黄

壹兩半

右五味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓早晚食前溫服

治脉痔下部痒痛生瘡血出阿膠湯方

阿膠

炒

艾葉

當歸

切焙

青葙子

各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓早晚食前溫服

治脉痔痒痛下血不止檇根散方

檇根皮

洗切

枳殼

去麩炒各參兩

皂莢子

取人炒

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫米飲調下早晚食

前服

治脉痔肛邊生瘡痒痛殺蟲散方

獺皮

右一味燒灰細研空心米飲調下二錢匕日晚再服

治脉痔下部痒痛成瘡塗痔槐白皮膏方

槐白皮伍兩

赤小豆伍合

棟實

槐實各伍拾枚

當歸切焙參兩

白芷

甘草各貳兩

豬脂參斤

右八味剉細七味先熬脂令沸下諸藥同煎候白芷

黃赤色綿絞去滓瓷合盛每用塗摩瘡上日三五次

治脉痔生瘡痒痛下部如蟲齧熏痔湯方

苦桃皮

李株皮

萹蓄

苦參各壹兩

右四味剉碎以水六升煎至四升去滓乘熱熏洗日

三五次

治脉痔下部痒痛四泄腫起出血搗痔大豆帛方

大豆參升

甘草壹兩

槐白皮參兩

右三味除豆外細剉先以水一斗入豆煎汁至二升

去豆次下甘草槐皮同煎至一升去滓浸故帛三四

重搗下部冷即再煖日三五次

治脉痔下部如蟲齧內下部露蜂房散方

露蜂房

生螺靨各壹兩

右二味燒灰細研為末以綿裹二錢匕內下部中日
晚再易

治脉痔有蟲或下膿血熏痔槐白皮湯方

槐白皮貳斤

右一味細剉以水一斛五升煎至一斛去滓傾盆中
坐熏冷即再煖蟲當隨便利自出更擣槐白皮末綿
裹一錢內下部中

治脉痔下部如蟲齧出蟲方

桃葉壹斤

右一味蒸令熱內小口器中布覆熏之蟲即出

治脉痔下部如蟲齧痒痛出血滌痔散方

白礬末半兩

右一味取小便三升入礬末乘熱洗之

治脉痔下部如蟲齧傅痔蝟皮散方

蝟皮

右一味燒灰研為末每用少許生油調傅之

血痔

論曰血痔者肺熱流毒也肺與大腸為表裏今肺藏蘊

熱毒氣流滲入於大腸血性得熱則流散故因便而肛腸重痛清血隨出也

治血痔蝟皮散方

蝟皮燒灰存性

黃耆剉

熟乾地黄焙

續斷

柏葉

地榆剉

白芷

黃連去須各等分

右八味搗羅為散每服二錢匕食前溫湯調下

治血痔清血隨大便出雷九九方

雷丸參兩

紫參

秦艽去苗土

藥本去苗土

石南葉

白芷

廣蟲炒

厚朴去蟲皮薑汁炙

亂髮燒灰

貫衆

紫苑

蝨蟲去翅足炒各半兩

豬後懸蹄殼炙令焦拾肆枚

右一十三味搗羅為末鍊羊髓為丸如梧桐子大空

心米飲下十五丸至二十九日晚再服以差為度

治血痔因便清血隨出者槐英子丸方

槐英子炒

枳殼去瓤炒

威靈仙去土各壹兩

乾薑炮

白礬燒令汁盡各半兩

熟乾地黄焙

連翹

當歸切

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

附子炮裂去皮臍

續斷各半兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大陳米飲下十九至二十九食前服

治痔下血地榆湯方

地榆

艾葉

枳殼去瓢

黃耆剉

防風去

龍骨

桑耳各壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生地黃一分

拍碎同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治諸痔下血虛損甚者黃耆湯方

黃耆剉壹兩

當歸切

芎藭各壹兩半

龍骨兩半

芍藥

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

甘草炙各壹兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入沙糖半

分煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治諸痔下血蒲黃湯方

蒲黃

當歸切

白芷

白石脂

黃連去須

芎藭

生乾地黄焙

甘草炙各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心溫服日晚再服

治血痔出膿血及腸風痔瘻比金丸方

蜜陀僧

白礬

槐實炒為末

皂莢燒灰研各壹兩

右四味將蜜陀僧白礬搗碎入瓷罐內燒通赤放冷

取出搗細為末次入槐實末皂莢灰和勻用糯米飯

丸如梧桐子大每服十五丸空心食前米飲下

治血痔下血至多赤石脂丸方

赤石脂

白礬燒令汁盡

龍骨各壹兩半

杏人湯浸去皮尖雙人炒研壹佰枚

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心棗湯下

二十九日再以差為度

治血痔下血黃耆散方

黃耆剉

枳殼去瓢麩炒各參兩

防風去叉壹兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚

再服

治痔疾下血枳實散方

枳實炒

槐實炒

木賊各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕煎皂莢子湯調下不

計時候

治血痔何首烏丸方

何首烏

去黑皮

威靈仙

去苗土

枳殼

去瓢麩炒等分

右三味搗羅為末浸蒸餅丸如梧桐子大每服二十

丸溫水下早晚食前服

治痔疾下血鹿角丸方

鹿角

壹兩燒紅候冷研

芸薹子

炒研半兩

右二味搗研為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十

五丸飯飲下溫酒亦得食前服

治痔疾下血荆芥散方

荆芥穗

陳者

狗脊

去毛剉各壹兩

右二味搗羅為末每服二錢匕濃煎木賊湯調下若

瀉血甚者加醋石榴皮等分為散以淡醋湯調下不

拘時服

治痔下血香連散方

黃連

去須

麩麩

各兩

右二味搗羅為散每服二錢匕用蜜湯空心調下晚

再服

治血痔地榆散方

地榆

剉

右一味搗羅為散每服二錢匕飯飲調下日三服

治血痔便清血熏痔方

蝟皮細切 雄黃

熟艾各半兩

右三味畧搗碎先掘地作一坑內藥以炭火燒煙出當上坐熏患處以衣被圍身勿令煙出煙盡即止將息三日再熏不過三五度差

治血痔坐痔橘皮散方

陳橘皮貳斤參伍年者細搗炒令熟

右一味乘熱用絹袋二枚盛橘皮縛定更互坐上冷即易取差為度

治血痔淋洗桃根湯方

桃根半斤

右一味細剉用水一斗煎至五升去滓溫洗日三五

度

治血痔風冷積年難差洗痔稻葉洗方

稻葉

右一味燒灰以湯淋汁洗下部日三五遍取差為度

治五痔大腸下血烏蛇散方

烏蛇酒浸去皮骨炙令黃 枳殼去穢炒

天麻

槐實炒

黃耆炙

桑黃酒浸炙令赤各壹兩

桂皮去麩

當歸切

附子炮裂去皮臍

赤芍藥各參分

白礬燒過

蝟皮炙令焦各半兩

麝香細研

右一十三味搗羅十二味為散入麝香研令勻每服

二錢匕空心用陳米飲調下日再溫酒亦得

腸痔

論曰腸痔者以腸胃有風挾熱二者乘虛入於腸間衝發下部故令肛邊生核腫痛不消病始作令人寒熱時有血出也

治腸痔生核腫痛時下膿血蝟皮散方

蝟皮炙焦壹枚

管實薔薇根是也

枳殼去瓤炒

古黃耆剉

槐豆炒

桑耳微炙各壹兩

人參

地榆剉

當歸切

烏賊魚骨炙去甲各壹兩半

右一十味搗羅為散空心煎木賊湯調下三錢匕日晚再服以差為度

治腸痔腫痛生核或發寒熱枳殼湯方

枳殼去瓤炒壹兩

黃耆剉貳兩

芎藭

丹參

當歸切

檳榔剉各壹兩半

芍藥

黃芩去黑心各壹兩壹分

右八味搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心食前溫服

治腸痔鼈甲散方

鼈甲醋炙去

蝟皮炙

蛇蛻皮剉炒

露蜂房剉炒

豬懸蹄殼炙魚各

右五味搗羅為散每服二錢匕空心以井華水調下

日晚再服兼取少許傅瘡上以差為度

治腸痔每大便常有血礬附丸方

白礬熬令

附子炮裂去皮

右二味搗研為末鍊蜜和丸梧桐子大每服五丸溫

酒下日三服稍增至十九數日永差

治腸痔發痛消腫威靈仙散方

威靈仙去土

防風去叉

枳殼去穢炒

黃耆剉各

右四味搗羅為散每服二錢匕麝香熱米飲調下日

可二服不拘時候常服祛風氣辟溫疫消腫滿除五

痔等患

治腸痔有血方

白薔薇根

枸杞根暴乾各

右二味搗羅為散每服二錢匕溫水調下日三服

治腸痔下部腫痛便血後重坐臥不安楛藤子丸方

楛藤子半

威靈仙揀淨剉碎水

大黃煨過各 貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲下空心食前服

治腸痔腫痛時有膿血柏葉丸方

柏葉

烏梅肉暴乾各壹兩 皂莢壹挺去皮并子水浸透搗

研取

右三味除皂莢外搗為末將皂莢汁和丸如梧桐子大每服十九丸溫熱水下食前服之

治腸痔肛邊腫痛生核下血龍參丸方

地龍乾者壹兩

苦參壹兩

烏頭去皮臍半兩半生半炮

右三味為末以醋糊為丸菴豆大每服七丸至十九食前米飲下日三

治腸痔下部生核腫痛發寒熱出血地榆散方

地榆

甘草半炙半生

陳槐花半炒半生各壹兩

右三味為散每服二錢匕濃煎枳殼桑根白皮湯調下空心食前服

治腸痔下血栝樓散方

栝樓實

大好者壹箇

烏梅肉拾箇

右二味先將栝樓切下蓋少取瓢以烏梅肉實其中却蓋定用黃泥固濟候泥乾以火煨存性取出去泥

細研為散每服二錢匕空心溫酒調下

治腸痔下血枳實丸方

枳實伍兩去瓤麩炒搗為末 皂莢刺燒存性為末參酒

右二味每服以水一盞用藥一丸皂莢刺末一錢半

同煎至七分入麝香少許放溫服

治腸痔生核腫痛發歇不定又名風痔者水梅丸方

白殭蠶剉炒微黃貳兩

右一味為末用水梅肉和丸如梧桐子大每服蜜湯

下五丸空心食前服

治腸痔肛邊有核痛發寒熱生瘡妙應膏方

豬懸蹄殼伍枚 生梧相白皮兩龍膽貳兩

生桑根白皮兩半 蛇蛻皮 雄黃研各壹兩

生青竹皮 生柏皮各貳兩 露蜂房壹兩

蜀椒去目并合口者炒出汗參分 蝟皮

附子各壹兩 杏人去皮尖雙核拾枚 豬脂壹斤

右一十四味除雄黃脂外剉碎以醋一升拌一宿先

熬脂令沸卽下諸藥候桑皮赤黑色以綿絞去滓再

煎下雄黃以柳篋攪令勻於瓷合內盛每日空心溫

酒調服一棗許日晚再服更取棗核大用綿裏內下

部日再換以差為度

治腸痔淋洗二皮湯方

桃皮

李皮

篇蓄

苦參

各壹

右四味剉碎以水一斗煮取五升去滓熏洗候冷即止日再用

治腸痔生核腫痛熏洗方

荆芥穗

黑狗脊

鯪鯉甲

枳殼

去瓤
燻炒

右四味等分爲麤末每用一兩以水二升煎數沸去滓乘熱熏候通手淋洗

治腸痔腫核疼痛不可忍熨痔枳殼散方

枳殼

去瓤
燻炒

訶梨勒皮

貳

右二味搗羅爲散銚子內炒令熱以帛裹熱熨冷即再炒

治腸痔腫痛初覺生核熏之方

荆芥穗

甘草

剉

右二味等分爲麤末每用兩大匙水一升半煎取一升去滓乘熱熏之候通手淋洗避風蓋覆

治腸痔方

胡粉

水銀

各壹分

右二味同研勻以棗肉和得所綿裏內下部中

治久積虛冷腸風痔瘻面色萎黃日漸羸瘦虛劣等疾

白木丸方

白木

厚朴去鹽皮生薑汁炙各參兩

陳橘皮

湯浸去白焙乾薑炮

黃耆剉各壹兩

人參

甘草炙

當歸切焙各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲

下十五丸至二十九

治腸風痔疾及風秘疼痛等積年不差黃耆地黃丸方

黃耆剉

生乾地黃焙

厚朴去鹽皮生薑汁炙各壹兩

乾薑炮

當歸焙各壹兩

大黃壹兩

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心米飲下

治腸痔下血如注水久不差方

右用市河水每遇更衣罷便冷沃之久沃爲佳久患

者皆差無河水井水亦得

氣痔

論曰氣痔者因便下血或肛頭腫凸良久乃收風也此

由邪毒氣蘊積腸間及患怒不節酒食過傷令下部氣

澀壅結而成

治腸風下血及脫肛等疾久不差者梧樓丸方

梧樓大者貳枚 蝟皮大者貳枚以上 燒令存性

白礬貳味各於火上 綠礬貳味各於火上 研細

訶梨勒皮炮 枳殼去麩炒 白附子

半夏湯洗去滑生薑同 附子炮裂去皮

雞冠花伍兩 胡桃去皮大者壹拾伍

天南星炮壹兩 右一十二味搗羅為末以米醋煮麩糊和丸梧桐子

大每服二十九米飲下日三

治氣痔大便秘泄下血脫肛烏蛇黃耆丸方

烏蛇酒浸炙取肉伍兩 黃耆壹兩 大黃炒

大麻子人貳兩各 獨活去蘆 枳殼去麩炒

人參 地骨皮各壹兩 訶梨勒皮分壹

檳榔剉壹兩半 羚羊角兩 郁李人去皮

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸小豆大空心溫酒

下二十九以利為度未快利即加丸數

治氣痔下部腫痛生瘡脫肛不收蝟皮丸方

蝟皮燒 續斷 槐實燒

黃耆切 白礬熟令 連翹各參

生乾地黃焙 當歸切焙各 乾薑炮

附子炮裂去皮

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十

丸陳米飲下日三五服

治大腸熱結成氣痔黃耆散方

黃耆剉二兩

苦參

玄參

附子

炮裂去皮

大黃

剉炒壹兩半

乾薑

炮壹兩

蝟皮

燒焦

黃連

去須各貳兩

槐子

炒參合

豬蹄

壹具燒焦

右一十味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日

晚再服

治腸風五痔下鮮血多秘結疼痛成氣痔者槐豆散方

槐豆

炒貳兩

木皂莢

子人參分

枳殼

去瓤炒

一十枚

防風

去

桑耳

各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕煎梲根湯調下日三

治氣痔大便澁威靈仙丸方

威靈仙

去土

乳香

研

枳殼

去瓤炒

各壹兩

右三味搗羅為末以粟米飯和丸梧桐子大每服十

五丸米飲下日三

治因氣成痔瘻卷柏散方

卷柏

去

枳殼

去瓤炒

豬牙皂

各壹兩

各壹兩

枳殼去瓤炒

防風去叉各壹兩

白礬熬令汁枯壹分研

右三味除白礬外搗為麤末入白礬拌勻水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗治氣痔脫肛良久乃收摻藥方

海螵蛸研

染燕脂研各半兩

右二味各為末仍同研身先以溫湯洗略拭乾摻藥少許

治大腸風壅積滯不通變成氣痔疼痛黃耆湯方

黃耆剉半兩

當歸切焙 大黃剉焙

檳榔剉各壹兩 枳實炒

防已

木香去黑心 黃芩去黑心

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第一百四十二

大德重校聖濟總錄卷第一百四十三

痔瘻門

久痔

痔瘻

痔瘻疼痛不可忍

腸風下血

久痔

論曰久痔者以藏府夙有風冷加之飢飽不常將攝垂
宜或緣憂思恚怒致陰陽不和氣血凝滯故風毒乘虛
時作時歇攻注肛腸痔孔有膿與血間下腫痒疼悶故
謂之久痔

治五痔瘻血日久衆藥不差者雷丸丸方

雷丸

各貳兩

紫芝

白芷

紫苑

各貳兩

貫衆

兩

秦艽

去苗土

厚朴

去麩皮生薑汁炙各壹兩

藥本

去苗土

亂髮灰

兩

麝香

炒

石南

炙各半兩

豬懸蹄

炙焦拾枚

右一十二味搗羅爲末鍊羊脂和丸如梧桐子大每服二十九空心煎米飲下日晚再服

治久患腸風痔瘻諸疾安息香丸方

安息香壹分

阿魏半分

乳香壹錢參味壹處研

丹砂壹分

雄黃

龍腦

麝香各貳錢肆味壹處研

砒霜壹分研細更入某豆末貳錢同研

蜜陀僧壹錢

巴豆參粒去皮心膜水壹大碗浸一日陸度換出細研出油

右一十味先將安息香等三味一處入瓷器內用重

湯煮或於飯飯上蒸一次再入淨鉢內爛研成膏入

諸藥一處揆和丸如菉豆大每服一丸空心服腸風

瀉血五痔漏膿血不止或生鼠乳並以好茶下卒心

痛生薑湯食積陳麴湯心腹諸氣溫酒婦人心痛血

氣當歸酒水瀉冷水諸痢飯飲瘡疾桃心湯下

治十年痔如鼠乳膿出下血劇者白欬散方

白欬貳兩

赤小豆壹兩

黃耆劉貳兩

芍藥參兩

黃芩去黑心壹兩

桂去麤皮貳兩

附子炮裂去皮臍

牡蠣煨各半兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕空心溫酒調下日晚

再服以差爲度

治五痔連年不止兼痔瘻龍骨丸方

龍骨

螺皮炙令焦各壹兩

黃耆剉

當歸切焙

枳殼去瓢麩炒

乾薑炮各參分

熟艾葉兩半

附子炮裂去皮臍壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心以黃耆

湯下四十九日晚再服

治五痔十年不差槐子丸方

槐實微炒壹斤

龍骨參兩

白礬燒灰

硫黃研各伍兩

沙糖拾兩

大黃剉炒參兩

乾漆炒煙出參兩

右七味除槐子沙糖外搗羅為末先將糖和槐子瓷器盛於飯甑上蒸一炊久以綿布絞取汁和前藥末丸如梧桐子大陰乾每服二十九空心溫水下日晚再服

治數十年五痔下血如雞肝肛邊結核鼠乳肛中疼痛
大黃湯方

大黃剉炒伍兩

滑石參兩半

芒消研

桑根白皮剉

黃芩去黑心

杏仁湯浸去皮尖雙人炒各壹兩

右六味麤搗篩每服六錢匕以酒一盞水一盞棗二

校壁破同煎至一盞去滓空心溫服微利一兩行爲度未利再服

治丈夫婦人五痔年久不差蝟皮散方

蝟皮

曾箇燒灰研

雄鼈頭

參箇燒灰研

酸石榴皮

地榆

枳殼

槐花

各壹兩

右六味除二味燒灰外各細剉一處炒令黑色搗羅爲末與灰研勻每服二錢匕溫酒調下食前服

治腸風痔瘻久不差貫衆散方

貫衆

參兩

雞冠花

伍兩

甘草

貳壹兩

烏梅

去核炒

黃連

炒各貳兩

麝香

當門子細研

右六味搗研爲末每服二錢匕米飲調下更分一半藥末以麩糊丸如菉豆大每服二十九丸米飲下相間

食前服之

治腸風五痔久不差楤藤散方

楤藤子

燒存性

芫蔚子

炒各半兩

地榆

白礬

燒令汁盡

臭椿根

蜜炙焦色各壹兩

右五味搗羅爲末每服二錢匕溫酒一小盞入麝香一字同調下空心食前服

治腸風痔瘻久不差芍藥丸方

芍藥

地龍

去土炒

大黃

剉

威靈仙

各壹兩

木鼈子

去殼研 貳兩

右五味搗研爲末三分中減一分末用醋一盞熬成膏和丸二分如梧桐子大每服五丸茶清下空心食前服一日二服

治久患痔疾萬金散方

椿根皮

剉壹兩

棟實

去核 燒炒

胡粉

炒各半兩

藥本

去苗土 壹分

臭橘皮

炒貳兩

右五味搗羅爲散每服一錢匕熱酒調下半夜時服至天明再服後用續隨子不計多少搗爲末煎湯淋洗三五上

治痔疾積年不差或腸風瀉血黃連丸方

黃連

去須 貳兩

蕪菁

去子 槿藤子

白礬灰

各壹兩

皂莢

炙去皮子 壹兩半

右五味搗羅爲末以粟米糊研丸如梧桐子大空心米飲下二十九日晚再服以差爲度

治腸風痔瘻瀉血久不痊不換金散方

槐實

及時 採炒

臭椿根皮

剉暴 乾

荆芥穗

各壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕用粟米飲調下年深者服二錢匕日三

治腸風痔瘻久不差槐白丸方

槐白皮脾兩用煮棗肉脾兩火上旋塗慢火炙乾脆爲度

槐花炒 白礬燒令汁盡各貳兩

右三味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

米飲下空心服日三

治五痔連年不差及瘦下膿血不止白礬丸方

白礬燒灰 赤石脂各壹兩 附子炮裂去皮

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

空心煎乾薑湯下晚食前再服

治痔疾久不差大效丸方

附子炮裂去皮臍 白礬燒令汁盡各壹兩

右二味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

早晚食前溫酒下以差爲度

治五痔年深不差乳香散方

乳香貳錢 沒藥壹錢 味同研

右二味細研用烏雞子一枚打開去黃以清拌藥再

入雞子殼中以紙封飯甑中蒸熟空心服盡一枚如

年深者服十數枚全安

治久痔及腸風下血疼痛諸藥不差者金鍼散方

皂莢刺赤紅者不少矣

右一味搗羅爲散每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服一方用破故紙打碎紙上炒與皂莢刺等分
爲散每服三錢匕溫酒調下

治年深痔疾不差獨聖散方

黃土如石者半兩燒令紫色細研爲末

右一味以膩粉一錢匕藥末二錢半拌勻臨臥溫酒

調下蟲出是効

治久痔比金散方

蜀葵葉夏月收者焙乾

右一味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下五服効

治腸風痔瘻一二十年不差面色萎黃飲食無味及患

藏府傷積泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴

婦人月候不調赤白帶下多年不差應是藏府諸疾皆

主之石燕散方

石燕不拘多少淨洗

右一味每日空心取一枚於堅鉢內溫水磨盡分三

服晚食前再服欲作散搗研爲細末水飛每服半錢

至一錢匕清飯飲調下溫水亦得久年腸風等疾須

常服及一月勿歇卽愈

治冷痔瘡久不差者追風毒去疼痛天雄膏方

天雄去皮臍壹枚

天南星壹枚

天麻半兩

丹砂研壹錢 黃蠟兩半

右五味並生為末先用生油少許鎔黃蠟次入諸藥熬成膏每使時用舊帛攤藥貼瘡甚驗

治痔瘻久不差者熏痔立効方

蟬蛻肆兩細碎 白礬生研壹兩

皂莢貳挺為末

右四味拌勻分為六貼每用一貼菴碗內如燒香法

主盛入桶內燒令烟就上坐熏之烟盡即止

治痔瘻久不差者熏痔必效散方

黃牛角肆兩細切 鯪魚肆兩細切 鉛丹壹兩

乳香壹分

右四味搗研為末拌勻每用三五錢匕如燒香法安

盆器內用版蓋上開竅坐就瘡熏之煙盡即止

治痔瘻累經熏洗未較者蜂窠膏方

蜂窠燒灰研半兩 蚰蜒壹箇大者研作膏 水銀粉秤壹錢研

鉛丹秤壹錢研

右四味將三味研者和入膏內更入麝香半錢匕同

研勻每用小許傅瘡上

治痔瘻久不差除瘡口黑紙撚方

蜜陀僧煨 黃連去須 瀝清等分

右三味搗羅為末用紙作撚子以津唾蘸藥末撚入竅內覺微微痒即住不可盡撚也

治久痔不差熏痔方

臭椿皮

暴乾 貳兩

枳殼

去瓤 參兩

蛇蛻

兩半

右三味麤搗篩用一小罐子盛以厚紙一張蓋口繫定上剪一小眼子文武火煨熱氣從眼子內出便騎

罐子熏之如熏得熱痛以燈盞內油塗如此熏三五

度立效

治久患痔瘡疼痛不可忍烏金散方

烏驢乳

屋上塵煤 是也 細研

陳臘茶末

各壹分

膩粉

壹字

右三味同研細傅痔上乾者以油調塗之一兩上即

銷

治遠年痔疾有膿血出不可行坐麝香散方

麝香

半錢 研

田螺

壹箇 燒 研

右二味細研為末先用葱湯洗次用藥傅之

治痔瘻久不愈榼藤散方

榼藤子

不以 多少

右一味為散先以蜜調少許塗痔瘻瘡上次用溫酒

調下一錢匕食前服

痔瘻

論曰五痔之疾或出鼠乳或發寒熱或生瘡或痒痛或下血其證不一治之不早勞傷過度則毒氣浸漬肌肉穿穴瘡口不合時有膿血故成痔瘻經曰痔久不差變為瘻是也

治痔瘻傍穿數穴膿血不止并腸風脫肛等疾二礬丸方

白礬燒令汁盡

綠礬燒過

稻樓燒存性

蝟皮蟬存性

訶梨勒煨去核

枳殼去穢妙

白附子炮

天南星薑汁浸一宿焙 半夏薑汁浸一宿焙

附子炮裂去皮臍各貳兩 雞冠花伍兩

胡桃燒灰拾伍箇

右一十二味搗羅為末以醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九空心臨臥溫酒下

治痔瘻久不差肛邊穿穴時出膿血紫金丸方

龍腦

麝香

乳香

雄黃

蜜陀僧並研各壹兩 砒霜分

丹砂

阿魏

安息香各壹分

右九味先將乳香安息香阿魏以熱水浸令通軟研如膏次將龍腦麝香丹砂蜜陀僧雄黃合研為末砒霜入菜豆粉二錢同研細更用巴豆三粒去皮心膜

壓出油亦研細與前藥一處研勻却入前乳香等膏
和丸如菉豆大每服一丸空心茶清下兼治腸風等
疾

治一切痔瘻反花瘡等疾乳香丸方

乳香研半兩

生乾地黃瓦上煨醋浸焙乾

雄黃研

黃蠟各壹兩

麝香研

龍腦研

丹砂研

沒藥研各壹錢半

右八味搗研為末鎔蠟為丸如梧桐子大每服十九
麥門冬熟水下留少藥末貼欲貼時先用橘葉葱湯
洗之

治痔瘻膿血不止六神丸方

鯪鯉甲燒研

皂莢刺燒研

蝟皮燒研

雄黃研

硫黃研

鶴虱為末

右六味再一處研勻用麝香水煮麩糊丸如梧桐子
大每服十五丸空心煎餚酒或湯下加至二十九
治痔瘻膿血不止積年不差鶴虱丸方

鶴虱炒

雷丸

白礬灰各壹兩

皂莢刺

硫黃研各半兩

右五味搗研為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大研雄
黃為衣每服二十九麝香溫酒下空心食前服

治痔瘻及藏毒下血如聖餅方

寒食麩

餅丹

白礬

輕粉

硫黃

白礬

右五味同研令勻用倒流水拌和作餅如錢大每發

時以慢火炙黃熟一餅分四服用溫熱水嚼下日午

夜臥時服

治痔瘻麝香散方

麝香

槐花

荊芥穗

千鍼草

硝砂

荊芥穗

右五味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下臨臥時服

治痔瘻消腫疼當歸湯方

當歸

大黃

赤芍藥

甘草

大黃

赤芍藥

右四味搗羅爲麩末每服二錢匕水一盞煎至八分

去滓稍熱服微利一行為効一方用乳香

半錢訶梨勒皮半兩同搗研爲末以大棗一枚去核

入藥末二錢匕棗肉內紙裏煨熟分作兩服茶清煎

下與前藥相間服亦得

治諸痔瘻膿血不絕羸瘦楹藤散方

楹藤子

楹藤子

楹藤子

雞冠花炒

烏賊魚骨去甲炙

各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日晚

再服

治痔瘻不限年月深淺腫痛穿穴膿血不止蜀椒槿藤

子九方

蜀椒

去目并閉口炒出汗木杵輕搗取紅肆兩

一

槿藤子

大者壹箇擘破炙

右二味搗羅為末棗肉和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九空心溫酒下

治諸痔疾有頭因穿破後成瘻膿水經年不乾麝香散

方

麝香研半兩

鵝糞升

右二味先將鵝糞於淨地上火煨煙盡候冷與麝香

同研為散每服二錢匕空心米飲調下晚再服

治諸痔瘻有瘡膿出痛楚鯨鯉甲散方

鯨鯉甲炙焦伍兩

麝香研壹分

右二味搗例為散每服二錢匕空心煎黃耆湯調下

日晚再服

治諸痔瘻出膿水疼痛不止韭根湯洗方

韭根暴乾

蜀椒

去目并閉口炒出汗

牀子煎生二升

續斷

蕪黃人

野李根

身茱白皮

松脂各壹兩

白礬半兩

右九味細剉和勻每度以二兩用水三椀煎至二椀

濾去滓乘熱於盆內先熏後洗日三

治痔瘻有瘡成竅膿血不止丹粉散方

鉛丹

鹽豉各壹兩

膩粉半兩

大蒜壹顆去皮切

右四味先搗蒜令爛後入餘藥同搗作薄餅焙乾爲

細散每以少許貼之日三五次

治諸痔瘻疽瘡丹砂塗傳方

丹砂

麝香

蛇蛻燒灰各壹分

右二味同研令細洗以鹽湯洗瘡拭乾後塗傳日三

五度

治痔瘻有頭或如鼠孔如聖膏方治痔瘻昔人能製羅

芫花根不計多少

右一味洗淨陰乾木臼內搗入少許絞取汁於銀

石器內慢火煎成膏將絲線就膏內度過以線繫痔

頭初時微痛心燥候落以紙擦子膏藥於竅內永除

根本未落不得使水

治五痔連年不差漸成痔瘻螺皮丸方

螺皮鯨魚

龍骨各貳兩

黃耆細半斤

當歸剉

枳殼去穢

乾薑地各壹兩半

艾葉參

附子炮裂去皮臍

右八味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九食前煎黃耆湯下

痔瘻疼痛不可忍

論曰痔瘻蓋緣寒濕與夫房室醉飽間得之其作也肛邊腫痒甚則疼痛不可忍或蔓生數處或似螺蛳膿血與肌汁綿綿而下有孔不合故謂之痔瘻昔人論燒蟲居腸間多則爲痔方論有用熏法及化蟲之藥者不可不察

治腸風痔疾遠年不差疼痛不可忍者萬金丸方

安息香

乳香

丁香

木香

沉香剉

無食子

肉豆蔻去殼

當歸剉

麒麟竭

沒藥

蜜陀僧煨

阿魏各半兩

巴豆去皮心膜醋煮

砒霜入菴豆半兩同研各參分

右一十四味先將乳香安息香阿魏麒麟竭沒藥等

細剉水少許浸一宿來日細研如膏餘藥搗羅爲末

與膏同研丸如黃米大每服一九空心冷茶嚥下

治痔疾疼痛不可忍及下血比金丸方

楹藤子

附子炮裂去皮

硫黃研

白礬燒令汁盡

螺皮炙焦

枳殼去穢炒

豬牙皂莢酥炙各半兩

右七味搗羅爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十

丸米飲或酒下不拘時候

治痔疾疼痛如錐刀刺不可忍能消丸方

威靈仙去苗土肆兩壹名能消

卷栢去根

防風去

蝟皮燒灰存性

阿膠乘燥各半兩

糯米炒壹合

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九加

至二十九人參湯下日三不拘時

治痔瘻疼痛行履不得栝樓散方

大栝樓壹枚開口

豬牙皂莢

白礬各半兩

鯉魚皮

鼈甲去穢

刺蝟鍼各壹分

右六味除栝樓外同爲蠶末入在栝樓內用鹽泥固

濟候乾用炭五斤煨令通赤放冷取出搗羅爲散每

服二錢匕研胡桃酒調下

治痔疾疼痛不可忍及腸風下血祛痛散方

皂莢子

不燥者壹斤枚燹貳升同炒燹焦黑去燹

薄荷乾者叁兩剉

右二味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下空心服

治五痔痛不可忍淋瀝湯方

黃芩去黑心

木通剉

梔子人

甘草炙

太陰玄精石

篇蓄各貳兩

朴消壹兩

右七味麤搗篩每用七錢匕水三碗煎沸傾盆內先

坐熏之候通手即淋瀝冷即止熏時令密覆勿泄藥

氣

治五痔痛不可忍荆蘭湯淋瀝方

荆芥穗

貫衆

甘草

蜀椒去目

澤蘭

芍藥各貳兩

右六味麤搗篩每用三大匙水二碗煎沸傾盆內先

坐熏之覆令密勿泄出藥氣通手即淋瀝

治五痔痛甚試蟲散方

臭椿根

地骨皮

景天

蔭乾各貳兩護大草是也

馬牙消壹兩

右四味搗為細散用精豬肉一大片糝藥三錢匕在肉上就上坐一二時起看有蟲即去無即已

治諸痔有頭疼痛不可忍熏洗方

地菘壹斤

槐皮貳兩

葱根壹握

韭根壹握

右四味細剉以水五升煎至三升盆內盛先坐乘熱
熏通手即淋洗日三次用

治五痔疼痛連陰濕痒荆芥湯洗方

荆芥穗

臭橘

厚朴去蘊皮
各半斤

右三味麤擣篩每用二兩水五升煎取三升避風處

淋泔

治諸痔有頭疼痛不可忍枳殼散熨方

枳殼兩

訶梨勒皮兩

右二味麤擣篩同炒令熱以綿裹熨之冷即再炒

治痔疼痛煙熏方

白鱧魚骨

熟艾分等

右二味剉碎同和勻用新盆子一箇盛藥在內以火

燒藥候烟出盆上坐熏之烟盡即止效驗如神

治痔瘻出膿血疼痛不可忍白礬散方

白礬

飛研
半兩

木香煨壹分
為末

右二味研勻每用少許以雞子白調塗痔瘻上

治湯風痔瘻有頭下膿血疼痛不可忍止痛膏方效驗如神

苘荳子

壹分

牛皮膠兩

壹分

右二味先研苘荳子為末次用膠清調成膏攤紙上

貼之有頭者自消

治腸風痔瘻肛邊鼠乳疼痛不可忍威靈仙丸方

威靈仙淨洗焙乾貳兩木香壹兩

右二味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九加至三十九不拘時候煎荊芥湯下服藥後忌

茶半日恐冷即腹痛男子婦人皆可服

治大腸痔瘻脫肛疼痛方

虎脚指兩節

右一味以蜜二兩炙冷赤搗羅為末炊餅丸如梧桐

子大每服空心溫酒下二十九

腸風下血

論曰腸風下血者腸胃有風氣虛挾熱血得熱則妄行
滲入腸間故令下血昔人謂先血後便為近血先便後
血為遠血遠近之別不可不辨也

治腸風瀉血不止腹內疼痛阿膠丸方

阿膠炒

地榆

黃耆剉

黃牛角觔各貳兩

槐實炒

刺蝟皮炙

龍骨碎

赤石脂研各壹兩

惡實炒

當歸焙

訶梨勒煨去核

枳殼去瓤炒

右一十二味搗羅為末用輓飯丸如梧桐子大每服

三十九米飲下空心食前服

治腸風七妙散方

枳殼生去

椿木皮

雷丸

天麻

白及

豬牙皂莢各半

赤石脂壹兩

右七味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下空心臨臥

服

治腸風病年深不較玉壺丸方

青嫩皂莢入採半斤拍破用河水伍升浸

入砂石器中煮去肆升存壹升又入

蕪汁半升白蜜壹兩再用慢火熬成膏稀稠得所去盡火放冷

枳殼

壹兩鹹割於燈上燒存性入酒中浸過

胡桃人

拾箇依法

沒藥貳錢

陰地椿根白皮

貳兩焙乾取壹兩末用

乳香貳錢

然醋炒過二錢了煎味實微酒下空心

右六味除前膏外後五味同搗羅為末入在前膏內

為丸如梧桐子大每服二十九腸風煎末賊湯下痔

疾荆芥湯下常時瀉血米飲下空心日三服

治腸風瀉血及藏毒久不止玉屑丸方

槐根白皮

去麤皮

苦棟根白皮

去麤皮各參兩

椿根白皮

去麤皮以上參味採時春宜早秋宜晚取嫩新潤者為妙細剉同搗令爛極細

更用後藥壹處拌令勻

天南星生末

半夏生末各半兩

威靈仙

去土末

寒食白麩兩

右七味拌令勻滴水爲丸如梧桐子大每服三十九先用水一盞煎令極熱次下藥煮令浮上爲度用煮藥湯下藥不嚼食前服

治積年腸風瀉血穀食不化肌體黃瘦椿皮散方

殞椿木白皮

炙乾薑

甘草

各一分

雞冠花

附子炮裂去皮

槐鶯各一分

右六味搗羅爲散每服二錢匕煎枳實湯調下空心食前服

治腸風及一切血痢脾毒藏毒下血不止琥珀散方

琥珀屑

鹿角霜

赤小豆

槐花

枳殼

白芷

右六味除琥珀外並剉碎同炒令焦黑將爲散入琥珀研令勻每服二錢匕米飲調下空心食前各一服

治腸風瀉血防風餅方

防風

雞冠花

續斷

甘草

天麻

人參

右六味搗羅爲末以油餅劑三箇入藥三錢七分做三箇油餅早晨日午近晚以淡粥下之

治腸風不問年深日近末香丸方

木香

白芷

乾嗽去土炒

阿魏各壹兩

當歸各半兩

漏蘆去蘆頭

右六味各別搗以童子小便一升煎阿魏三十沸後

下木香又煎三十沸後又下乾嗽當歸再煎如飴人

白芷漏蘆末再和丸如梧桐子大每服五丸至十九

空心溫酒下

治腸風瀉血不止疼痛釣腸丸方

附子壹箇炮裂去皮臍 石硫黃新 雜冠花炒 婦人

鯪鯉甲炒 皂莢刺各壹兩炒 蝟皮燒灰

右六味搗羅爲末麵糊爲丸梧桐子大槐花湯下二

十九日二服空心

治瀉血不定貫衆五物散方

貫衆去毛

槐花

地榆

黃連去 甘草各半兩

右五味並生搗羅爲散每服一錢匕米飲調下

治腸風黑虎丸方

白礬研

雞冠花乾者

屋龍尾屋下烟煤

青橘皮洗去白焙 五靈脂炒各

黃蘗炒

右五味搗羅爲末分一半末用米醋二升慢火熬成

膏候冷和一半末爲丸如梧桐子大每服三十九空

心陳米飲下

治腸風下血貫衆散方一斗 大麥溫三十式空

貫衆

雞冠花煨

黃連去須炒

烏梅肉炒各壹兩

甘草參分兩炙

芫花吳半兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕溫米飲調下日三服

不以時候

治腸風下血抵聖散方草兩

椿根白皮煨

蒺藜子炒

枳殼去麩炒

防風去叉各壹兩

右四味搗羅爲散每服一錢匕白湯點服

治腸風四金散方

貫衆

荆芥穗

白礬飛

豬牙皂莢醋炙各壹兩

右四味同燒存性爲散每服一錢匕溫米飲調下空

心食前日三服

治腸風槐實散方

槐實酥炒

防風去叉

枳殼去麩炒 魚鱗爲度各半

兩

黃耆剉炒

右四味搗羅爲細散每服一錢匕茶清調下

治腸風經久不差瀉血疼痛神應丸方

水牛角燒灰 蕞耳頭貳兩

槐耳壹兩

乾漆酒浸壹宿炒令斷

右四味搗羅為末鍊蜜和為丸如梧桐子大每空心

熱酒下三十九

治腸風枳實丸方

枳實製炒

槐莢製炒

皂莢豬牙者

大黃炒令焦黃

右四味搗羅為末用麵糊和丸如梧桐子大每服二

十九荆芥臘茶下空心食前服

治腸風下血久不止下部腫痛礬石丸方

白礬貳兩飛過 皂莢貳挺去皮塗

附子參度炮不去皮臍 乾薑炮各

右四味搗羅為末用河水煮麵糊為丸如梧桐子大

每服十九鹽湯下空心食前服

治腸風多年不差下血不止木賊散方

木賊剉

枳殼去麩炒 乾薑炮剉

大黃剉壹

右四味同於銚子內炒黑色存三分性搗羅為散每

服二錢匕溫粟米飲調下食前服

治腸風烏魚骨丸方

烏賊魚骨罐子內燒赤

肉苁蓉酒浸焙各半斤

桑根白皮炒各半兩

燕蕒各半兩

右四味搗羅爲末醋煮乾飯丸如梧桐子大空心米飲下五丸不嚼甚者不過五服

治腸風瀉血如痢腹中疔痛面色萎黃黃連飲方

黃連去須壹兩

乾薑炮壹分

甘草炙半兩

右三味搗爲塵末每服三錢匕以水一盞生薑二片棗一枚擘同煎至五分去滓溫服

治腸風防風散方

防風去叉炙今黃

黃耆炙劉各壹兩

甘草炙劉

人參各半兩

右四味搗羅爲細散每服二錢匕食前粟米飲調下治腸風行步艱難黃耆九方

黃耆劉

枳殼去瓢雙炒各壹兩

葳靈仙去土貳兩

右三味搗羅爲細末用爛飯爲丸如小豆大每服三十丸至五十九丸用溫水下並不損氣

治瀉血烏梅丸方

烏梅貳拾箇醋煮去核

白礬貳兩飛過

訶梨勒拾壹箇醋過去核

右三味將礬石訶梨勒爲末與梅肉同搗爲丸如梧桐子大每服七丸米飲下

治腸風下血令不入食神驗膏方

背蔭臭椿根

為根不見日者微利
取嫩處皮壹斤到

黑豆半升

槐花貳兩

右三味用水五升於銀石器內慢火熬令豆熟為度
續入蜜二兩再煎候蜜熟傾出用淨瓷石器內盛遇
夜露兩宿每日食後臨臥各一服每服約半盞許用
重湯盪溫熱得所旋旋服食

治腸風瀉血大効丸方

大薊根

柴載各長壹
十又名刺芥

白礬壹兩
細研

麝香當門子

柴豆
許

右三味用不露土大栝樓一箇割下蓋子並不去瓢
入大薊根并礬當門子在內用篋子左攪七遭却安
蓋子在上以鹽一合和土為泥固濟陰乾用炭火煨
候透亦便住直候冷打去泥細碾為末取一半為散
一半以糯米粥為丸如梧桐子大每日空心將大薊
苗煎湯調下半錢匕至日午臨臥又煎大薊苗酒下
十九服三兩日便住須是喫得三五箇栝樓永去根

本

治腸風瀉血不止獨活丸方

獨活

去蘆頭為
末半兩黃蠟伍兩於銀器
中銜成汁

生薑半斤取自然汁

右三味旋以薑汁入蠟中同熬候薑汁盡為度次入獨活末令勻衆手丸如梧桐子每服四十九丸以濃陳米飲下空心臨臥服

治腸風下血疼痛不可忍榮順散方

枳殼去穢炒

荆芥穗各壹兩

槐鶯半兩炒黃

右三味搗羅為細散每服二錢匕溫米飲調下不拘

時候服如未効再服

治腸風瀉血龍肝散方

伏龍肝

鉛丹

牡蠣各半兩

右三味各研為散再同研細每服陳米飲調下二錢

治不拘時候服

治腸風藏毒下血不止方

枳殼去穢炒 無紋炭各壹兩

右二味搗為細散每服一錢匕用荆芥米飲調下

治腸風下血烏金散方

豬牙皂莢兩并皂子剉

胡桃參拾枚并皮碎剉

右二味同拌和勻以藏瓶一隻於頂上敲一圓竅入

前項藥以元瓦蓋之後用鹽泥固濟可厚一指許暴

乾用炭火五斤煨候碧煙出絕即去火畧存性冷即

出藥細研每服二錢匕入麝香少許溫酒或米飲調下食前服之

治腸風瀉血礬附丸方

綠礬肆兩用餅子盛蓋之火斷食頃候冷取入鹽合硫黃壹兩同礬研依前入瓶子內燒食

頃候冷取出細研附子壹兩炮去皮臍杵為末

右二味一處研令勻粟米粥為丸如梧桐子大空心

用生地黄汁下三十九當日止一月除根亦可久服

助下元除風氣補益藏府

治腸風下血方

赤小豆各半木樓青箇燒為灰

右二味杵羅為末空心酒調下一錢匕

治腸風下血不止變成痔疾胡荽子散方

胡荽子各半補骨脂兩

右二味搗羅為散每服二錢匕陳米飲調下食前服

治腸風瀉血櫻艾散方將同炒合香葉去雜同炒羅為

櫻欄灰兩熟艾搗羅成者壹兩

右二味用熟雞子兩箇同研得所別炮附子去皮臍

為末每服用水一盞附子末一錢煎數沸放溫調前

藥二錢匕空心食前服

治腸風瀉血二黃丸方

黃耆炙二黃去須各黃連壹兩

右二味搗羅為末以麩糊為丸如赤小豆大每服二十九米飲下加至三十九

治腸風神効散方

槐實

皂莢子

右二味各一兩以穀糠同炒令香熟去糠同搗羅為散每服一錢匕煎陳粟米飲調下空心食前服

治腸風荆芥散方

荆芥

去蘗各壹兩炒

右二味各搗羅為末每服逐味抄末一錢匕拌勻入

臘茶末一錢以熱湯點服不計時候

治腸風下血不止檇根散方

檇根皮

剉暴乾炒

右二味搗羅為散每服一錢匕煎皂莢子湯調下米

飲調亦得

治腸風槐荆散方

槐花

輕炒壹兩

荆芥穗壹兩

右二味搗羅為散每服一錢匕煎糯米粥飲調下血甚者一兩服効單使槐花亦妙食前服之

治腸風病甚不差靈仙散方

威靈仙去

雞冠花

各貳兩

右三味剉擘碎以米醋二升煮乾更炒過搗為末以生雞子清和作小餅子炙乾再為細末每服二錢匕空心陳米飲調下午後更一服

治腸風瀉血絮灰散方

破絮燒

枳殼

去瓤炒各半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕入麝香少許同陳米飲調下空心食前服

治腸風下血久不差經効散方

貫衆

貳兩去蘆頭燒為灰存性地上用柳合少頃去火毒研為細末

右一味入麝香一字同研前藥令勻每服二錢匕米飲調下空心食前日三服

治腸風下血不止如神丸方

人糲根皮洗淨

右一味於臘月內日未出時取背陰地北引者不以多少用東流水淨洗剉碎於透風處掛令乾拌羅為細末每秤二兩人寒食麪一兩攪拌令勻再羅過新汲水和丸如梧桐子大陰乾每服二十九先以水濕藥丸令潤後於椽子內用白麪滾過水煮五七沸傾出用煮藥水放溫下不拘時候服忌見日色見即無

效此藥兼醫血痢如急要使不待臘月隨時依法採
合亦得

治飲酒過度腸風瀉血及風熱瀉血出如紅線立効散

方

揀新山梔子不拘多少去殼

右一味焙乾搗破再焙又研細如油出成團擊開猛

火焙乾手擦細羅取散瓷器盛之發時以新汲水調

下二錢匕

治腸風瀉血椿莢散方三

椿莢不以多少將壹半生用餘壹半燒存性

右一味搗羅為散每服一錢匕溫米飲調下不拘時候

治腸風瀉血諸藥不効保應丸方

天南星不計多少用石灰炒令焦黃色

右一味搗羅為細末煮酒麩糊為丸如梧桐子大每

服二十九丸溫酒下食前服

治腸風下血久不止茄帶灰散方

茄帶燒存性壹兩

右一味研為細散每服三錢匕米飲調下空心食前

各一服

治腸風瀉血烏金散方

木鼈子

右一味不拘多少用桑柴燒過微存性使用碗器合之候冷碾為散每服一錢匕用煨葱白酒調下空心服

治瀉血不止决効方

巴豆壹枚去皮

右一味以雞子開一小竅內巴豆一枚入雞子竅中以紙塞定別以濕紙裏用火煨熟透去殼并巴豆只一味喫盡雞子其病即止不得稍生氣虛人分作二服

治腸風下血黃耆湯方

黃耆兩參

槐實

小薊

桑耳

乾地黄焙

當歸炙

黃連去須

白芷各壹兩半

草豆蔻貳枚去皮

芍藥

赤石脂

天雄炮裂去皮

龍骨各壹兩

黃芩去黑心半兩

紅藍花

訶梨勒皮

延胡索

厚朴去麤皮生薑汁炙

桂去麤皮各壹兩

右一十九味咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑一分拍碎煎取八分去滓溫服食前日二

治大便秘下血并多年腸風食飲不得乾地黃湯方

熟乾地黃

焙

赤石脂

各二兩

延胡索

牡蒙

桔梗

黃耆

龍骨

各半

當歸

切

黃連

去須

白芷

地榆

木香

紅藍花

炒各二兩

桂

去粗皮

乾薑

炮

黃芩

去黑心各半兩

右一十六味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎八分

去滓溫服不拘時候

治腸風下血積年不差黃耆丸方

黃耆

剉

附子

炮裂去皮臍

白礬

燒灰各二兩

硫黃

通明者生用

蝟皮

酥炙

虎杖皮

炙黃各二兩

楸藤子

兩枚破開以酥塗炙

皂莢

兩挺去皮子蒸曬乾酥蜜

灸塗

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下如久瀉血加栝樓根一兩燒灰入極

妙

治腸風瀉血面色萎黃累服藥不差食鹽丸方

食鹽

研

杏仁

湯浸去皮尖

乾薑

炮

當歸

切

乾薑

炮

皂莢

去皮子酥炙各二兩

附子炮裂去皮
鹽壹兩

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸空心陳米飲下

治腸風下血痔瘻不止車螯散方

車螯壹

皂莢刺肆拾
以枚 硃砂

丹砂

乳香各壹分
味同研 參

右五味以四味末同於車螯合子內以地龍泥固濟

用炭六斤燉火盡爲度取出研爲散空心溫酒調一

錢匕服

治腸風瀉血等側柏散方

側柏葉

貳斤
蒸玖暴 黑豆緊小者
壹升

甘草炙到
參兩

白木炒

桂去麤皮
各壹兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕熱湯調下日三不拘

時

治久患腸風瀉血大安散方

礬石灰研貳
兩

硫黃爲末

乳香研

黃連

去須妙爲
末各壹兩
蠟壹錢
細切

右五味用大鯽魚一枚不去鱗只除腸肚入諸藥末

於腹內以濕紙裹著鹽泥固濟入煨火煨熟取出印

以慢火炙焦搗羅爲散每服三錢匕空心米飲調下

或以糊爲丸如梧桐子大每服七丸米飲下極妙

治大腸風熱下血不止黃芩飲方

黃芩去黑心

黃蘗去蘗皮

黃連去須

檳榔炙各壹兩半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分入地

黃汁半合去滓溫服不拘時

治腸風痔瘻脫肛瀉血面色萎黃積年不差香木丸方

白朮壹斤糯米泔浸參日

右一味細剉以慢火炒焦爲末取乾地黃半斤淨洗

用椀盛於甑上蒸爛細研入白朮末和搗一二千杵

如鞭滴好酒少許相和再搗舉手爲丸如梧桐子大
焙乾每服十五丸空心粥飲下加至二十九

治久患腸風瀉血茄子酒方

茄子種大者

右一味先將一枚濕紙裹於煆火內熟煨取出入瓷

罐子乘熱以無灰酒一升半沃之便以蠟紙封閉經

三宿去茄子煖酒空心分服如是更作不過三度差

又方

黑豆小者參升淨

右一味生搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九空心陳米飲下

治腸風下血不止及脫肛蛇黃散方

蛇黃

兩顆煨醋
泮柴編

右一味搗研如麩每服三錢匕陳米飲調下瀉血并

脫肛甚者不過一兩服神驗食前服之

又方

牡蠣

大者壹枚煨
醋泮柴編

右一味細研每服三錢匕陳米飲調下日再

大德重校聖濟總錄卷第一百四十三

大德重校聖濟總錄卷第一百四十四

傷折門

從高墜下傷損腫痛

傷折惡血不散

筋骨傷折疼痛

傷折腹中瘀血

傷折風腫

傷折統論

論曰諸脉從肉諸筋從骨骨三百六十有五聯續纏固
手所以能攝足所以能步凡厥運動罔不順從若乃倉
卒之際墜墮倒仆折傷蹉跌患生不測詎可彈舉究圖
療治小則消腫而伸攣大則接筋而續骨各有方劑存
焉

從高墜下傷損腫痛

論曰凡墜墮傷損腫痛輕者在外塗傅可已重者在內
當導瘀血養肌血宜察淺深以治之
治墜墮損傷筋骨皮肉發熱疼痛沒藥散方

沒藥剉 澤瀉 當歸焙切

桂去鹽 檳榔剉 甘草剉

白芷 蜀椒去目并閉口者炒出汗

附子炮裂去皮臍 芎藭各壹兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下不拘時

治從高墜墮傷損筋骨發熱腫痛續斷散方

續斷剉 生乾地黃焙 當歸焙切

芎藭時氣風 附子炮裂去皮臍 桂去鹽皮

澤蘭葉 蜀椒去目并閉口者炒出汗 甘草剉

右九味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下不拘時

治從高墜墮傷損肢體發熱疼痛當歸湯方

當歸切焙 大黃生剉 生乾地黃焙伍兩

右三味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓

溫服不拘時微利為効水一盞煎至五分去滓

治墜墮損煩悶荆芥湯方

荆芥穗 淡竹葉切 當歸切焙

右三味搗篩水一椀都煎取半椀去滓入地黃汁

一盞再煎三五沸分溫三服連服

治墜墮傷損氣血瘀滯疼痛阿膠湯方

阿膠炙 艾葉各貳兩 乾薑炮

芍藥兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治從高墜墮傷折肢體瘀血不行發熱腫痛消石湯方

消石研

桃人去皮尖
雙入研

大黃生

甘草炙到各
兩

蒲黃壹兩

大棗拾枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服利瘀血為効

治從高墜墮傷折手足疼痛阿膠湯方

阿膠炙燥

芍藥各壹兩半
當歸各壹兩半
生乾地黄焙

芎藭

當歸切

艾葉各壹兩

乾薑炮

甘草炙到各
半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治一切傷折及驢馬墜墮打撲閃肭疼痛不可忍者五

傷接骨丸方

沒藥研壹兩

乳香研

蜀椒去目并閉
口炒出汗

芍藥

芎藭不切
當歸切

自然銅煨醋淬
兩半

右七味搗研為末用黃蠟三兩半銕為汁次入藥末

不住手攪令勻丸如彈子大每服一丸用好酒一盞煎藥化溫服就疼處臥少時

治從高墜下傷折有瘀血不散脇肋疼痛牽牛子散方

牽牛子

生取末

當歸切焙各壹兩

檳榔剉

桂去麝皮

木香炮各半兩

郁李人湯浸去皮細研

青橘皮

湯浸去白焙各壹兩

右七味搗羅為散和勻每服一錢匕溫酒調下空心

服取下次血為効外以敗龜膏貼蓋前至小合去藥

敗龜膏方

敗龜醋浸炙貳兩半

大黃生剉壹兩

木鼈子

去殼研貳兩

當歸切焙壹兩

桂去麝皮貳兩

右五味搗羅為末先用好酒一升煎至半升住火酒

稍冷入藥末半兩以匙不住手攪成膏紙上攤貼損

處

治驢傷馬墜他物傷折痛楚不可忍當歸散方

當歸切焙參分

芎藭壹兩半

桂去麝皮半兩

甘草炙剉參分

附子炮裂去皮臍

澤蘭葉

蜀椒去目并閉口炒出汗各壹分

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治墜墮撲損筋肉疼痛瘀血凝滯腫熱不消地黃精裏

方

生地黄洗切 酒糟各壹斤

右二味拌和令勻隨腫處用藥逐旋以大椀盛餽上蒸熱用布絹之類裏腫處日一易

治一切打撲驢傷馬墜脫臼損折兼定疼痛接骨膏方

續斷兩

桂去毒

附子炮裂去皮

白及

白歛

當歸切

桑根白皮剉

獨活去蘆頭

黑狗脊骨燒作灰用各半

兩

黃米炒參合

右一十味搗羅為末或打撲閃疔及骨折碎用藥末

三錢匕酒半盞白麵二錢匕生薑自然汁少許同以慢火熬成膏攤帛上貼之三日一換冬月用沙木篦子綿繩夾縛夏月柳枝子五條夾縛雖緊不妨

治男子婦人內外損傷止諸疼痛接骨和血一切傷折毒蟲咬陰氣入腹消諸水腫血脉不通左右攤緩熱疾等欲死及腹中有瘀血刺兩脇痛氣築心悶亂婦人乳癰產後敗血灌注四肢積年痔瘻但是疼痛並宜服之極痛者只一丸輕可者只半丸用無灰酒半升乳香一皂子大先磨乳香盡次磨活血丸同入銚子內煎五六沸臨臥時溫服服了就痛處臥如要出汗衣被蓋之即

汗出若婦人諸疾服時更用當歸末一錢七候前法用乳香酒煎之此藥神驗不可言有孕婦人不可服活血丸方

花桑枝

於五月五日正南採南枝如臂膊端可拾枝以炭燒烟盡旋旋投入礬醋中取出焙

末

乾為

雄黑豆

淘浸去皮暴乾參升用袋子盛

生栗屑

栗包中間壹片子号曰栗屑雙者不用不拘多少去皮取肉暴乾用袋子盛

乳香

斤旋

墨

半斤旋

研入

每料用藥如後

花桑枝

末壹兩半

黑豆

末壹兩

栗屑

末壹兩半

墨

末半兩

乳香

末兩

右五味於五月五日合忌雞犬婦人見先研乳香以

醖醋調與四味相和稀稠得所拌和成劑於淨白中

搗三五百杵可丸即丸如小彈子大焙乾以紗葛袋

盛入瓷合內封夜間面北極燒香禱祝云若男若女

諸疾服之病悉除愈本法合成輕乾後水上浮為妙應傷折已損猶

有敗血宜服之服畢次服敗血散

大黃

以生薑自然汁貳兩塗炙汁盡焙乾搗末壹兩

杏仁

湯浸去皮尖

兩壹

右三味和勻分作八服每服用童子小便二盞煎三

五沸臨臥時去滓溫服其敗血一時取下從大小腸

中出

續骨丸方

臘月豬脂兩

蠟錄通半斤

鉛丹鍾

自然銅煨醋淬

研

蜜陀僧研細各

白礬搗末

乳香各

麒麟竭

沒藥

乳香

丹砂各壹

兩研

右一十味新罌中先鎔脂冷下蠟出罌於冷處入蜜陀僧鉛丹自然銅緩火再煎滴入水中不散更出罌於冷處下諸藥用柳篋攪勻瀉入瓷盆內不佳手攪至凝丸如彈子大且用笮皮之類襯之極冷收凡折

傷用一九入少油火上化開塗傷痛處以油單護之甚者以燈心裹木夾之更取一九分作小丸熱蒸酒下痛即止如藥力盡再覺痛更一服痛止即已骨折者兩上便安牙疼甚者貼之即止蓋半煎至一盞去治傷折疼痛黃耆散方黃耆半斤

黃耆剉

赤芍藥

乾薑煨

大黃剉

附子炮裂去皮臍

當歸切

續斷剉

桂皮去

木通剉

蜀椒去目并合口炒出汗壹分

烏頭炮半

白熟乾地黃兩搗末 二錢搗末 不

右一十二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘

時

治傷折疼痛筋骨未合肌肉未生延胡索飲方

延胡索

鹿藥

黃耆

熟乾地黄

各壹兩半桂去

當歸

白欬

桑寄生

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

傷折惡血不散

論曰脉者血之府血行脉中貫於肉理環周於身因其

肌體外固經隧內通乃能流注不失其常若因傷折內
動經絡血行之道不得宣通瘀積不散則為腫為痛治
宜除去惡瘀使氣血流通則可以復完也
治傷折惡血凝滯腫痛黃耆湯方

黃耆

芍藥

生乾地黄

附子

當歸

續斷

桂

乾薑

椒

大黃

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治傷折惡血瘀結不散芎藭湯方

芎藭

大黃生

桂去麤皮

菴藷子

朴消各壹兩

荷葉燒灰

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治傷折血瘀不散虎杖散方

虎杖兩

赤芍藥兩

右二味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下不拘時候

治傷折瘀血留結不散腫痛桃人散方

桃人去皮尖雙

芒消別研各壹兩

桂去麤皮

當歸切焙各參分

甘草炙兩

蠶蟲足炒

水蛭拾枚

右八味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治傷折惡血不散腫痛不消芍藥湯方

赤芍藥

黃耆

附子炮裂去皮

當歸切

續斷

桂去麤皮

羌活去蘆

蜀椒去目并閉口者炒出汗各壹兩

右八味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治傷折血瘀不散大黃湯方

大黃生

桂去麝皮

桃人去皮尖雙人炒各半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服

治傷折惡血瘀滯腫痛塗傅方

生地黃研切

藏瓜葶糟

生薑洗研各壹斤

右三味和研隨所患處多少旋炒塗傅日三易

治傷折惡血不散蠶沙膏方

原蠶沙貳升炒研

麥麩參

右二味和勻米醋四升煮稠菴器盛量損處多少塗
傅以絹帛裹之日再易

治傷折惡血不散疼痛糟米塗方

酒糟貳

糯米貳

右二味相和酒煮稀稠得所取出乘溫塗患處外封
裹之日再易

治傷折惡血結滯不散腫痛草烏頭膏方

草烏頭

細辛去苗葉

蛇牀子

獨活去蘆頭

吳茱萸各半兩

葱切研重

生薑切研

右七味除薑葱別研外搗羅為末和勻再研量患處
多少熱酒調為膏塗之以帛裹日再易

治傷折惡血不散煨葱方

葱青白俱用去根
不切參拾莖

右一味灰火中煨透衆手乘熱木椎推碎裏患處以

軟帛縛之冷即易

治傷折惡血結滯腫痛地黃膏方

生地黃細切
參介烏雞青隻去毛腸肚
并足和骨細剉

右二味相和搗一二千杵量患處多少攤帛上縛之

日再易

治傷折惡血瘀滯不散外塗膏方

鼠尿參兩燒
存性生地黃手搗
切焙

右二味搗羅爲末豬脂油和塗患處日三易搗研

治傷損腹內瘀血不散不欲聞人聲胸中氣塞便利出

血等蒲黃散方

蒲黃燒
當歸切
桂皮去
薑汁煮宜

續斷
白芷各壹
甘草半兩
不炒

生乾地黃兩
焙貳
煎膏
其藥
四指
兩匙

右七味搗羅爲散空心溫酒調服一錢匕日再服

治一切墜落打撲及腫毒疼痛白膏方

柳白皮兩
切半
白蠟
鉛丹
錢
分
大匙

胡粉參
以熟油
肆
白文
商陸根
切
分
大匙

右六味先以熱油入柳白皮商陸根煎候變色去滓入諸藥數攪良久膏成每用看腫大小以故帛或紙攤貼

筋骨傷折疼痛

論曰人之一身血榮氣衛循環無窮或筋肉骨節誤致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間夫於調理所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀白挫脫治法宜先整其骨裨其所折後施貼燻封裹之劑

治筋骨損傷疼痛麒麟竭散方

麒麟竭

沒藥

自然銅煨醋淬

赤芍藥

當歸

白芷

蒲黃

大黃生用各半兩

桂去粗皮

細辛

去苗葉各壹兩

骨碎補

去毛炒

乾荷葉分

右一十二味搗研為散每服一錢匕溫酒調下不拘

時入和針蒜煮醋罈頭二錢匕煎酒臨下不許和

治傷折定痛敗龜散方

敗龜

酥炙去裙壹兩

沒藥

桂去粗皮

自然銅

煨醋淬

骨碎補

去毛炒

當歸

白芷去粗皮 防風去粗皮

右八味搗研為散每服二錢匕溫酒調下不拘時日

二八水製海狗油二錢以酒調下不吐

治傷折腫痛氣血不散芎藭散方

芎藭

家制得
度醋研

甘草

多
入酒

蜀椒

去目及閉口
炒出汁

澤蘭

家制得
度醋研

附子

炮裂去
皮晒

桂

去粗皮
各壹兩

當歸

家制得
度醋研

大黃

醋炒各
半兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治閃肭打撲傷損疼痛不可忍附子散方

附子

炮裂去
皮晒

敗龜

醋炙去
殼

虎腦

骨
各

栗椶

家制得
度醋研

千金藤

炒
各

補骨脂

炒
各

白芷

家制得
度醋研

骨碎

去毛
炒

自然銅

煨參
醋研

續斷

家制得
度醋研

赤芍藥

家制得
度醋研

當歸

切米
炒

桂皮

家制得
度醋研

牛膝

酒浸壹
宿焙

烏藥

各半
兩

沒藥

研
壹分

乳香

研各
壹分

右一十七味搗研爲細散每服二錢匕蘇枋木酒調

下日進三五服

治傷折筋骨接骨散方

自然銅

壹兩火燒
度醋研

木炭

半斤火燒
醋煎貳度

白絲

參兩
燒及

右三味搗研爲細散每服一錢匕煎蘇木酒調下病

甚損傷折骨者服訖裨裹了次服沒藥丸

沒藥丸方

沒藥 研

丹砂 研

牛膝 酒浸焙搗羅為末各壹兩

右三味研勻麵糊為丸如梧桐子大每服二十九丸瓜湯下日一服午間服之服五日後漸減丸數

治傷折筋骨痛沒藥散方

沒藥 研

虎骨 酒浸炙

當歸 炒切

白芷

補骨脂

敗龜 酒炙各半兩

自然銅 火燒醋洗炭內實者火燒壹次酒淬取參分

驢驘 竭研各壹分

右九味搗為細散每服一錢匕溫酒調下不計時

治打撲傷折筋骨損痛牛膝散方

牛膝 去苗酒浸壹宿烘肆兩

黃耆

續斷

當歸 切焙各壹兩

滴乳香 研別

沒藥 研別

琥珀 各半兩

右七味搗研為細末用黃米粥微熱攤紙上將藥末兩匙糝在粥上裹之已減痛更將此藥每服溫酒調

下一錢匕日三五服

治傷折筋骨五仙丸方

自然銅 肆兩火燒醋淬貳柒遍

大粟 壹佰枚去皮生用

黑豆 壹升湯浸去皮

白桑柴 貳斤

接骨木 灰壹升

右五味一處大白內搗一千下取細入鍊蜜再搗丸如彈子大每服一丸溫酒嚙下不拘時

治傷折疼痛黑豆散方

雄黑豆壹兩

桑條東枝壹兩

剉碎兩兩栗楔剉碎兩兩

拌於瓷器內炒存性

楓香脂壹兩

研壹兩龍骨壹兩

虎骨兩

右六味搗研為散每服一錢匕麝香熱酒調下連進

三服後用八骨散裹之

治筋骨損折入骨散方

虎骨兩

牛骨兩

龍骨兩

雞骨兩

狗骨兩

兔骨兩

豬骨兩

羊骨兩

楓香脂兩

自然銅兩

火燒兩

碎一日一丸

右一十味等分搗研為散每有傷折處糝藥在瘡上

用黃米粥勻攤帛上裹瘡口用帛裏輾繩縛之

治墜折傷損疼痛不可忍者沒藥散方

沒藥兩

乳香兩

延胡索兩

當歸兩

甜瓜子兩

丹砂兩

右六味搗研為細散拌勻每服一錢匕熱酒調下又

取藥散二三錢以黃米作粥攤作餅子糝藥散在上

粥攤在紙上候溫糝藥末在粥上封裏所傷處疼痛
立止隔日換貼之

治傷折內外損神授散方

當歸淨洗切微

鉛粉洛粉佳研各半兩

蓬砂研成

右三味搗研爲散再同研勻每服二錢匕濃煎蘇枋
木汁調下若損在腰以上先喫淡麪半椀然後服藥
在腰以下卽先服藥後方喫麪仍不佳呷蘇枋汁更
以糯米爲粥入藥末三錢拌和攤在紙上或絹上封
裏損處如骨碎則更須用竹木夾定外以紙或衣物
包之

治落馬墮車蹺折骨碎筋傷壓損疼痛不正五骨散方

鯪鯉項骨兩壹

獼猴項骨兩壹

虎項骨兩壹

黃犬項骨兩壹

野猫項骨兩壹

天雄半兩炮裂去皮臍

肉苳蓉

半兩酒浸壹宿去莖皮炙乾

右五味骨細剉用酒醋各半升浸一宿漉出炙令黃
色候冷入二味藥同搗羅爲細散每服二錢以溫酒
調下不計時候又將黃米半升作糊入散藥一分調
令勻塗貼骨折筋傷處疼痛立止

傷折腹中瘀血

論曰傷折腹中瘀血者因高墜下倒仆擗撲氣血離經

不得流散瘀在腹中速宜下之遲即日漸瘀滯使人枯燥色不潤澤久則變痿痺血瘦之病

治因墜墮內損血結不行蒲黃散方

蒲黃去塵皮 當歸切

芍藥剉

桂去塵皮

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治傷折腹中瘀血通滯散方

蒲黃剉

當歸切

乾薑炮

桂去塵皮

蠶蟲去足翅

大黃剉

右六味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日再

治因打撲內傷瘀血在腹大黃散方

大黃剉

當歸切

芎藭剉

右三味搗羅為散每服二錢匕空心日午臨臥溫酒

調下

治墮撲腹中瘀血桃人湯方

桃人拾肆枚 去皮

大黃剉

消石研

甘草炙

蒲黃剉

大棗拾枚

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓溫服

治諸傷損惡血積滯腹中甘草湯方

甘草炙

白茯苓

去黑皮

桂皮去粗皮

杏人

去皮尖雙人炒各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治打損瘀血在腹中久不消二黃丸方

大黃剉炒

生乾地黄

焙各貳兩

右二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫

酒下

治傷損瘀血在腹地黄酒方

生地黄汁半升

酒壹升

黃連貳兩

桃人

去皮尖雙人炒

牡丹心去

桂去粗皮各壹兩

右五味以後三味搗羅為細末與前二味一處煎熟

每去滓溫飲一盞不拘時

治打損瘀血在藏攻心煩悶麻布飲方

麻布壹尺

燒灰

牡丹皮六

菴藟子

各壹兩半

桂皮去麤皮

當歸剉

如之

鬼箭羽

不洗

敗蒲燒灰

赤芍藥

各壹兩

蒲黃

半兩

大黃剉炒

兩

中不

右十味麤搗篩每服五錢匕酒一盞半煎至八分

入芒消半錢匕更煎一沸去滓空心溫服煎至八合

治損傷後瘀血腹中不行虎杖散方

虎杖參兩

赤芍藥兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治傷損滯血在腹中桂心湯方

桂去麤皮

當歸切

蒲黃各兩

大黃蒸焙壹兩半

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時得血利為度

治因攢撲墜墮內損瘀血黃耆湯方

黃耆剉

芍藥

甘草炙

當歸切

芍藥

生薑切

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治因打撲傷損瘀血在腹內大黃飲方

大黃剉

芍藥

荊芥穗各壹兩

廬蘞炒

蒲黃

當歸切

桂去麤皮

甘草炙

桃人去皮尖

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治因墜墮內損大小便下血經久不盡地黃湯方

生地黄汁伍合 甘草炙 柏葉兩

黃芩去黑心壹兩 阿膠炒燥參分

右五味除地黃汁外搗羅為末每服三錢匕水一盞

地黃汁三分同煎三五沸去滓通口服不拘時

治因墜墮內損瘀血在腹使人瘦瘁牡丹湯方

牡丹皮 大黃焙切 桂皮去麤

鬼箭羽 朴消碎 蒲黃

芍藥 當歸切炒各壹兩

右入味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分空心

日午臥時去滓溫服

治因傷損瘀血不行積在心腹桂芎湯方

桂皮去麤 芎藭兩 荷葉帶燒

菴藷子 大黃炒 朴消別研各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心日午臨臥各一

治因諸傷損血積在內香豉散方

豉半升略炒 蘇枋木細切壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治撲損筋骨惡血不散迷悶疼痛小便血下當歸散方

當歸焙切

芍藥

續斷

生乾地黄焙

白芷

黃芩去黑心

甘草炙剉

牛膝酒浸切焙

右八味搗羅為散每日空心以酒調下二錢匕日再服

治傷損瘀血在內攻注刺痛活血散方前至小公法

蝙蝠炙乾壹枚

當歸焙切

骨碎補去毛

桂去麤皮

補骨脂微炒各半兩

大黃剉炒

右六味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下薄荷醋湯下亦得

治墜馬撲損內傷吐血又治暴熱背上煩熱心中欲吐

喉內先覺血腥氣雞蘇湯方

雞蘇貳兩

地黄汁伍合

桑根白皮剉壹兩

生薑汁伍合

葛根剉

小薊根切

淡竹筍各貳兩

右七味除地黄生薑汁外麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓入地黄汁生薑汁各半合更煎三五沸去滓溫服每食後一服

治墜撲腕折瘀血疼痛敗蒲湯方

敗蒲燒灰

當歸各貳兩

牡丹皮

芎藭

赤芍藥各壹

豉心壹

桃人湯浸去皮尖
雙人半兩

陳橘皮去白皮
壹兩

蒲黃紙上炒
半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入地黃汁一合朴消一錢匕溫服日三

傷折風腫

論曰凡肢節傷折皮肉破裂久而未合爲外風所觸則令肌肉受寒既不得收斂又與血氣相搏不得消散故爲風腫風腫不散卽變膿血敗壞之疾

治傷折風腫荆芥散方

荆芥穗

當歸切

續斷

芎藭剉各
壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時候
治因傷折風冷所傷發爲風腫疼痛續斷湯方

續斷

熟乾地黄焙

澤蘭葉

當歸切

芎藭

烏頭炮裂去
脂

桂去蟲皮
各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治傷折風寒所侵風腫不消沒藥散方

沒藥研別

當歸焙切

芎藭

白芷

甘草炙

椒去目并閉口炒出汗

桂去蠶皮

附子炮裂去皮臍

檳榔生剉各半兩

右九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治傷折為風冷所侵皮肉不合腫痛地黃散方

熟乾地黄焙

當歸焙切

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭各壹兩

右四味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治傷折皮肉破裂風毒攻腫痛不消當歸湯方

當歸焙切

大黃剉

白芷

防風去

烏頭炮裂去皮臍各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治傷折風腫杏仁膏方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒參兩

右一味細研如膏塗腫處外以帛搏之頻易

治傷折皮肉破裂風傷成腫大豆膏方

大豆畧炒去皮不拘多少

右一味搗羅為細末生薑汁調如膏塗腫處頻易之

治傷折風腫疼痛黃蠟膏方

黃蠟伍兩

桂去麤皮

吳茱萸炒為末各壹兩

鹽壹分
火燒

右四味搗羅三味為細末鎔黃蠟于麻油五兩與藥末同煎數沸攪勻傾出蕘合收每用看所傷大小攤貼頻易之

治傷折皮肉破裂風腫痛芥子塗方

芥子細研不拘多少

右一味醱醋調塗腫處頻易之

大德重校聖濟總錄卷第一百四十四