

緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥流入竅
中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消化丸一百丸吞
下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡 服前七
藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有余
暇煮此服之 亦可續煮白鳳膏食之固其根源完其
根本 病可之後方可合十珍丸服之此為收功起身
之妙用也

甲字號十灰散 治勞証嘔血吐血咯血嗽血先用此藥
止之

大薊

小薊

栢葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚皮

各等分

右各燒灰存性研極細用紙包碗蓋於地上一夕出火
毒用時先將白藕搗絞汁或蘿蔔汁磨京墨半碗調服
五錢食後下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用
後藥止之

乙字號花蓋石散 五內崩損湧噴出血斗升用此止之

花蓋石

火煨存性研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下
如男用酒一半女用醋一半與小便一處和藥服使瘀

血化為黃水服此訖以後藥補之

丙字號獨參湯 止血後服此藥補之

大人參 去芦二兩

右以咀水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之服後宜熱
睡一覺後服諸藥除根

丁字號保和丸 治勞嗽肺成痿者服之决效

知母 貝母 天門冬 欵冬花 各三

麥門冬 去心 天花粉 薏苡仁 杏仁

五味 各二錢 粉草 炙 馬兜鈴 紫苑

百合 桔梗 阿膠 炒 當歸

生芩 紫蘇 薄荷 各半錢

一方無地黃有百部

右以水煎生姜三片入饒礬一匙入藥內服之每日三
服食後進加減于後

○血盛加蒲黃茜根 節大薊小薊茅花

○痰盛加南星半夏 紅茯苓枳殼枳實括萎甯貝 炒

○喘盛加桑皮陳皮 大腹皮羅蔔子葶藶蘇子

○熱盛加山梔子 黃連黃芩黃柏連翹

○風盛加防風荆芥 蘇薄荷甘草菊細辛香附子

○寒盛加人參芍藥桂皮五味蠟片

戊字號保真湯 治勞証躄虛骨蒸服之决補

當歸 生苧 白朮 黃芪

人參 各三錢 蓮心 赤茯苓 白茯苓 各五分

天門 麥明 陳皮 白芍藥

知母 黃坦 炒 五味 柴胡

地骨皮 熟棗 各一錢 赤芍藥 甘草 各二錢半

右以水煎生姜三片棗一枚食後服

○驚悸加茯苓遠志柏子仁酸棗仁

○淋濁加草薢合白蠟藥猪苓澤瀉

○便溺加木通石菖蒲蓄

○遺精加龍骨牡蠣蓮瀝蓮子

○燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲

○盜汗加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

巳字號太平丸 治勞証久嗽肺痿肺癰並皆噲服

天門冬 麥門冬 知母 貝母

款冬花 杏仁 各二兩 當歸 生地黃

熟地黃 黃連 阿膠珠 各一兩 蒲黃

京墨 桔梗 薄荷 各一兩 白蜜 四兩

麝香 少許

右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末

丹溪心法附錄卷之九

攪勻再上火入麝香略熬二三沸丸如彈子大每日三服食後細嚼一九煎薄荷湯緩化下次嚼一九臨卧時如痰盛先用錫糖拌消化丸吞下却嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日病痊凡一切咳嗽只服此藥立愈

庚字號沉香消化丸 治熱痰壅盛

青礞石煨黃色明礬飛研細猪牙皂角 南星火炮

半夏生製 白茯苓 陳皮各二兩 枳殼一兩半

枳實一兩半 薄荷一兩 沉香 黃芩

右為細末和勻姜汁浸神麩攪糊為丸如梧桐子大每

服一百丸每夜臨卧錫糖拌吞次嚼嚼大平丸二藥相攻痰嗽除根

辛字號潤肺膏 治久嗽肺燥肺痿

羊肺一具 杏仁一兩 柿霜 真酥

真粉各一兩 白蜜二兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中白水煮熟如常服食前與七藥相間服之亦佳

壬字號白鳳膏 治一切久怯弱極虛倦咳嗽吐痰嗽血發熱

黑嘴白鴨一隻 大京棗二升

參苓平胃散 一升

陳煮酒 一瓶

右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量以酒盪溫將鴨項割開滴血入酒攪勻飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾去毛於脇邊開一孔取其腸雜拭乾次將棗子去核每斤中定納參苓平胃散填入鴨肚中用麻札定以沙瓮一箇置鴨在內四圍用火慢煨將陳煮乾作三次添入煮乾為度然後食其棗子陰乾隨意食用參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

癸字號補髓丹

一名十歌丸

治久勞虛敗髓乾精竭血枯

氣少服前藥愈後服此藥

猪脊脊一條

羊脊脊一條

團魚一枚

烏雞一隻

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙瓮內煮熱搗細再入後藥

大山藥

五條

蓮肉半斤

京棗

一百枚

新柿十枚

四味條製淨用井花水一大瓶於沙瓮內煮熱搗細與前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠

四兩

真黃蠟

三兩

右二味逐漸下與前八味和一處搗成膏子和平胃散末四君子湯末知母黃柏末各一兩共一十兩攪和成劑如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木搥打

如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候棗湯下

辛集

補損 九十一 附諸虛

丹溪心法

大補丸 去腎經火燥下焦濕滯筋骨軟氣虛以補氣藥
下血虛以宜血藥下並不單用

川黃栢 炒褐色

右以水丸服

龍虎丸 補下焦

白芍

陳皮 各二兩

瑣陽

當歸 各一兩半

虎骨

酒浸醋炙各一兩

知母 酒炒

熟芋 各三兩

黃栢 半斤

鹽炒

龜板 四兩 酒浸酥炙

右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加乾姜半兩

補腎丸 治痿厥重者湯使與大補丸同此冬令之正藥

春夏去乾姜

乾姜 二錢

黃栢 炒

龜板

酒炙 兩半 牛膝 一兩

陳皮 半兩

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十丸白湯下

補天丸 治氣血俱虛甚者以此補之多與補腎丸並行

若治虛勞發熱者又當以骨蒸藥佐之

紫河車淨洗用布繳乾同前補腎丸搗細焙碾末酒

米糊丸夏加五味子半兩

虎潛丸 治痿與補腎丸同

黃柏半斤酒炒 龜板酒炙 知母酒炒 熟苧

陳皮各二兩 瑣陽一兩半 虎骨一兩炙 乾姜半兩

白芍二兩

右為末酒糊丸或粥丸 一方加金箔一片、一方用

生地黄懶言語加山藥 加炒黃柏知母炙龜板各等

分乾姜三分之一酒糊丸名補血丸 一方無乾姜冬

月方加有當歸一兩半熟苧比前多一兩餘同

補虛丸

人參

白朮

山藥

枸杞

瑣陽

右為末麩糊丸服

湯藥 補心肝脾腎

蓮肉去心

枸杞

山藥炒

瑣陽各等分

右為細末沸湯調服若加酥油芡小尤妙

補陰丸

側柏

黃柏

烏藥葉各二兩

龜板酒炙

本草綱目卷之九

丹溪心法附錄補攝卷十六

苦參 三兩 黃連 半兩 冬加乾姜夏加縮砂

右為末地黃膏丸梧子大

又方

黃柏 半斤 知母 酒浸 熟地 各三兩 龜板 四兩 酒浸炒

白芍 炒 陳皮 牛膝 各二兩 瑣陽

當歸 各一兩 虎骨 一兩 酒浸 酥炙

右為末酒煮羊肉為丸每服五十丸鹽湯下冬加乾姜

半兩

又方

下甲 二兩 黃柏 炒 牛膝 人參 各半兩

香附 白芍 各一兩 甘草 二錢

右為末酒糊丸

砂仁 三錢 春不用

又方

下甲 二兩 黃柏 一兩

右細切地黃酒蒸熟搗細丸

又方

龜板 二兩 酒炙 黃柏 半兩 知母 三錢 五味 二錢

右為末酒糊丸

又方

白朮 白芍 人參 蓮肉

丹溪心法附錄補攝卷十六

丹溪心法附錄補損卷十九
知母

黃栢各等分

右為末糊丸朱砂為衣空心服一百丸鹽湯下

又方 治抑結不散

下甲 五兩

側栢 一兩半 香附 三兩

右為末姜汁浸地黃膏為丸空心服

加城補陰丸

熟苜 八兩

兔絲子 四兩

鹽酒浸一宿

當歸 三兩

酒浸

白芍 三兩

瑣陽 三兩

杜仲 二兩

炒

牛膝 四兩

酒浸

破故紙 一兩半

枸杞 一兩半

虎骨 二兩

酥炙

龜板 三兩

酥炙

黃栢 二兩 炒 山藥 人參

黃芪 二兩

炙

冬加乾姜一兩

右為末猪骨髓入蜜丸梧子大空心服一百丸鹽湯下

三補丸 治上焦積熱泄五臟火

黃芩

黃栢

黃連 各等分

右為末蒸餅丸

一方 治酒色過傷少陰

黃栢 炒 一兩

黃連 炒 一兩

條芩 炒 半兩

龜板 酒炒 黑

色 五兩

冬加乾姜炒黑色三錢 夏加砂仁三錢 五珠五錢

右用蒸餅丸每三十九丸食前白湯下

一方 治陰虛

人參一錢 白朮三錢 麥門冬半兩 陳皮二錢

右作一服水煎吞補陰丸

一方 治躄弱肌肥壯血虛脉大

龜板三司 側柏七錢半 生苳一兩半 白芍一兩

鳥藥葉酒浸七錢半

右除生苳細切熬膏餘皆作末同搗為丸以白朮四升

香附一錢半焦湯心

一方 益少陰經血解五臟結氣

山梔子煨令十分有二分煎黑

右為末以姜汁入湯煎飲之此方甚驗於他也

五補丸

枸杞 瓊陽各半兩 續斷 蛇床微炒各一兩

兩頭尖二錢半

右為末糊丸每服三十九淡鹽湯下

瓊陽丸

龜板炙 知母酒炒 黃柏酒炒各一兩 虎骨炙

牛膝酒炙 杜仲薑炒 瓊陽酒浸五錢 破故紙

續斷酒浸各三錢半 當歸 地黃

右為末酒糊丸梧子大每服五十九

○諸補命門藥須入血藥則能補精陽生陰長故也陽

藥若多則散火

補心丸

硃砂二分

瓜蒌五分

黃連三錢

歸身尾三分

右為末猪心血為丸

又方 寧心益智

人參

茯苓

茯神

牡蠣

酸棗仁

遠志

益智各半

辰砂二錢半

右為末棗肉丸

大補丸 降陰火補腎水

黃柏炒為色

知母酒浸炒 熟地酒蒸

龜板炙各

右為末猪脊髓和蜜丸每服七十九空心鹽白湯下

濟陰丸

黃柏二兩七錢

龜板炙一分三

陳皮七錢

當歸酒浸

知母酒浸

虎骨炙

瓊陽一兩

牛膝酒浸

山藥

白芍

砂仁

杜仲絲

黃耆鹽水拌炒各七錢

熟地七錢

柯杞五錢

故紙三錢半炒

兔絲子酒浸一兩三錢半

右為末以地黃膏為丸如梧子大每服七十九

充按丹溪書並無補損專條諸補陰藥兼見于各症

之下楊氏類集于此又取燥熱與陽諸方混於其間殊不知丹溪之補乃滋陰益血之藥與燥烈壯陽之劑其意天壤懸隔今故去之不復錄也

附諸賢論

王節齋先生曰男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經云壯火食氣譬如人在夏暑而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱火而有此症令服黃柏知母清火堅腎之藥而效故須審察不可偏認作火衰也

附諸方

用溫酒

愚按乾姜宜換作肉桂蓋肉桂引諸藥入腎又和知母黃柏為從治法也

若有夢遺精滑病者加牡蠣童便煨七次白朮各一兩

山茱萸云核楮根白皮炒過各七錢

若有赤白濁病者加白朮白茯苓各二兩半

山梔仁黃連各炒各五錢

若有軟弱無力者加牛膝酒洗二兩虎脛骨酥炙二兩

防己酒浸洗木瓜各五錢

若有疝氣病加蒼朮蓋炒一兩半黃連生薑汁炒

山梔子仁炒各六錢川芎一兩吳茱萸炒

青皮 去穢各五錢

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白朮三兩陳皮一兩

乾姜 炒加至七錢

若眼目昏暗者加當歸酒洗川芎菊花各一兩

柴胡黃連 酒炒 烏犀 各五錢

蔓荊子防風 各三錢

若煎氣虛之人加人參黃耆 蜜炙各二兩

若左尺既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加黑附子

小便浸炮去皮 肉桂 去皮各十錢 沉香 五錢

金匱腎氣丸 即六味地黃丸

補陰丸 明醫雜著 論曰人之一身陰常不足陽常有餘况

筋慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈

消而勞瘵咳嗽吐血等証作矣故宜常補其陰使

與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先

生發明補陰之說謂專補左尺腎水也古云滋補藥皆

兼補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補

依舊火勝於水補其左制其右庶得水火俱平也右

尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人

火旺而致病者十居八九火衰成疾者百無二三且人

在少年腎水正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至

於中年慾心雖減然少年斷喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少以至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正千載之訛其功甚哉今立補陰丸方備加減法于後

黃柏去皮酒拌炒褐色 知母去皮毛酒拌炒忌鐵各

敗龜板酥炙透三兩 熟地黃酒拌蒸忌鐵五兩

瑣陽酥炙乾二兩 五味子兩 枸杞子并州者 天門冬去心

白芍藥酒炒各二兩 乾姜炒紫色三錢寒

右為極細末煉淨蜜和入猪骨髓二條和藥末杵極勻丸如梧子大每服九十九丸空心鹽湯送下寒月可治

形體瘦弱無力多困腎氣久虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損遺精便血消渴淋濁等証 婦人血氣虛無子者服之有效

乾山藥 山茱萸肉各四兩 澤瀉去毛

牡丹皮去心 白茯苓去皮各三兩 熟羊八兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心白湯下寒月溫酒下如腎虛有飲作痰唾生薑湯下

○廣按腎惡燥而脾惡濕前補陰藥中多是濕藥若只腎虛而脾胃壯實者宜服苟脾胃兩虛則不可服也惟此六味地黃丸及八味丸八物腎氣丸雖專補腎

虛又兼理脾胃不濕不燥而於脾胃兩虛者甚得其宜也矣

八味丸 治腎氣虛乏下元冷憊脰腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或顴黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟地 八兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三兩

山茱萸肉

山藥

各四兩 附子炮

桂心

各一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九丸溫酒送下或淡薑湯送下婦人淡醋湯送

○廣按六味地黃丸專補尺腎水之藥八味丸既補左

尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服六味地黃丸老年水火俱虧宜服八味丸况老年腎臟真水既虛和水乘之而為濕熱以作腰痛足痿併痰唾消渴小便不禁淋閉等証非桂附之溫散而能治之乎

八物腎氣丸 平補腎氣堅齒駐顏

熟葦 半斤

山茱萸肉

山藥

各四兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三兩

五味子

桂 各二兩

右為末蜜丸服

三一腎氣丸

古葦方

補心腎諸臟精血瀉心腎諸臟火濕

丹參心共村餘補真

卷一

廣稜人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古方如腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸胃滿有痰者忌之補陰丸脾虛有濕者忌之惟腎氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最為功當但品味數少不足以盡其變今廣將三方合而為一略用加減名曰三一腎氣丸其間補瀉兼施庶乎可也

熟地黄 生地黃 山藥 俱懷慶者 山茱萸肉 各兩

牡丹皮 赤白茯苓 澤瀉 瑣陽

龜板各三兩 牛膝川者 枸杞子甘州 人參各

麥門冬 各二兩 天門冬 各二兩 知母 黃柏

五味子 各一兩 肉桂 各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九漸加至六七十九空心淡薑湯下或溫酒下 虛甚加鹿茸一兩 虎脛骨一兩

此藥其間有補有瀉其故何哉夫五臟藏精血者也精血一虛邪水乘之而為濕熱補者所以補其精血也瀉者所以瀉其濕熱也世人徒知五臟精血虛而生火殊不知五臟精血虛而邪水得以乘之此方既用知母黃柏以瀉火又用茯苓澤瀉以滲濕尤為備也

補腎丸 有效無燥

熟苧 八兩

兔絲子

酒浸 八兩 歸身 三兩半

肉苁蓉

酒浸 五兩

破故紙

酒炒 半兩

山茱萸肉

三兩半

黃柏

酒炒 色一兩

知母

酒浸 炒去毛 一兩

右為末酒糊丸梧子大每服五十九

滋血百補丸

芩 半斤

酒蒸

兔絲子

半斤

當歸

酒浸

杜仲

酒炒 各四兩

知母

酒浸

黃柏

酒炒 各二兩

沉香

一兩

右為末酒糊丸

沉香百補丸

熟地 六兩

兔絲子

四兩

杜仲

少三兩

知母

炒二兩

黃柏

酒炒 二兩

人參

一兩

山藥

當歸

茯苓

各三兩

沉香

一兩

右為末酒糊丸

滋腎百補丸

當歸

酒浸 四兩

知母

酒浸 二兩

沉香

五錢

黃柏

酒炒 色

山藥

菊花

楮實

各二兩

青蘘

炒一兩

桑絲

酒炒 四兩

杜仲

炒二兩

熟地

八兩

右為末酒糊丸或煉蜜丸

○廣按已上三方兼補右尺之藥也

丹溪心法附錄卷之九

三

人參固本丸 簡易方 夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚髮不白顏貌不衰延年益壽其天閱者多由服性熱之藥不能滋生精血也而藥之滋補精血者無出於生熟二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相為用本草又以人參為通心氣之主故宜加焉

生地黃

熟地黃

各酒洗

天門冬

去酒浸

麥門冬

去酒浸

各二人參兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心溫酒送

一搥湯任下 如有痰者生熟地黃各用姜汁炒過忍濕隔故也

鹿栢固本丸

鹿角霜

半斤以角之新者寸截入布囊置瓦水中七日五生煎水每角一斤入黃蜡半斤金口用

露酒一盞掩之別沸流水煖添勿令一竭桑柴火足十二時共角軟矣用竹刀切去黑皮

取白者細為細霜

黃栢

三斤

製酒湯

製乳三製

天門冬

四酒浸

麥門冬

四兩

同上

生地黃

四兩酒洗

熟地黃

四兩酒洗

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九溫酒送下不飲酒白湯下

玄兔固本丸

生地黄 酒浸 熟地黄 酒浸 蒸俱 不犯鐵器 天門冬 去心

麥門冬 去心 五味子 去枝 茯神 去皮木 各四兩

乾山藥 三兩 白 者微炒 蓮肉 人參 去蘆

枸杞子 二兩 甘 州者佳 兔絲子 一斤 酒煮 數沸 搗爛 作餅子 晒乾 淨稱 八兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九漸加至八九十丸空心滾白湯下或淡鹽湯下溫酒下俱可

冷補丸 濟生方 治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳

聾腰痛腿弱小便赤澀大便或秘

天門冬 去心 麥門冬 去心 熟乾地黄 酒蒸 生地黄 酒蒸

川牛膝 去蘆 白芍藥 地骨皮 石斛 去根

玄參 沉香 另研不 見穴 磁石 火焙七次 飛時各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九空心鹽湯酒下
○廣按此方云冷補丸者蓋因當時不明心屬火而惡

熱腎屬水而惡燥反用熱燥之藥見傷之意也

明目益腎丸

枸杞 州 當歸 兔絲子 生苜 各一兩 俱酒浸 五味 半兩

知母 黃柏 各七錢 酒炒 茯神 一兩 山藥 巴戟 去心

人參 甘菊 天門冬 去心 各五錢

右為末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十九

丹溪心法附錄卷之十九
三才封髓丹 降心火益腎水

天門冬去心 熟地黄酒洗 人參各五錢 黃柏炒 兩

砂仁一兩半 甘草七錢半 一方無

右為末水糊丸如梧子大每服五十九丸用菘菹半兩切
作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心送

古菴心腎丸

論曰予嘗見年高之人有患其無子者有惡其髮白者
予謂之曰無子責乎腎髮白責乎心何則腎主精精勝
則孕成心主血血勝則髮黑今也嗜慾無窮而虧其本
然之真憂慮太過而損其天然之性心若火也腎相火

也若火動而相火翕然從之相火動而天君亦翳亂而
不寧矣是二者有相須之道焉夫髮白者古方皆責之
於心蓋以心之所藏者神神之所附者血血之所動者
火也心火動則血沸騰血沸騰則神不安神不安則憂
昧紛紜而髮髮漸白矣雖然天地間不過陰陽五行而
已五行有相生者有相制者今心火上炎由乎腎水虧
之不能制耳是髮白不獨由於心也夫無子者古方皆
責之於腎蓋以腎之所藏者精精盈則有子精虧則乏
嗣耳今腎精之妄洩由乎心火所逼而使之然無子
不獨由於腎也予雖不敏粗具一方補血生精寧神降

火庶乎燕治

熟地

生苧

俱懷慶者酒浸竹刀切

山藥

茯神

去木各三兩

山茱萸肉

酒浸去核

枸杞子

其州者酒洗

龜板

去木各三兩

牛膝

去蘆各一斤

牡丹皮

去心

鹿茸

火去毛一兩

當歸

去蘆酒洗

澤瀉

去毛

黃柏

炒褐色

辰砂

為衣

黃連

去毛酒洗

各一兩

生甘草

半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九漸加至一百九空心溫酒或淡鹽湯任下辰砂為衣不遍再加一兩

法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎

之聖藥也不獨施於髮白無子二者其驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痿諸症無不治也

五精丸

澹寮方

治腎虛痿弱大補元氣

秋石

剛硬者

鹿角霜

茯苓

去皮

陽起石

山藥 各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九須要常近火邊使乾燥庶幾服之無戀隔之患

鹿鯨丸

鹿稟純陽一名斑龍鯨者天地初分之氣牝牡

相感之精也醫書稱鹿茸角血髓大補益于人此鯨則入神矣其法用初生牝鹿三五隻苑囿馴養每日以

人參煎湯同一切料草任其飲食久之以砥黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣勝陽極別以牝鹿隔苑誘之欲交不得或洩精于外或令其一交即設法取其精置磁器內香粘如饒是鮫也 隨人所宜補藥古方如六味地黃丸八味丸補陰丸固本丸之類以此鮫加煉蜜三分之一同和丸劑或和鹿角霜一味為丸空心鹽酒送下用起虛瘵危疾尤捷予之軀羸賴此再造願與人人共之 異類有情丸 此方并前方四川雜飛霞作也

鹿角霜 製法見前鹿相固本丸下 鹿茸 新如紫茹者薰乾洗數次炙炭火令冷為細末

龜板 八字文見前醇酒浸七日酥炙透黃為末 虎脛骨 新而真者長在浸七日酥和炙令透為末 右霜板末各三兩六錢茸脛末各二兩四錢重羅極細火煉白蜜入豬脊春髓九條同春刺為丸每空心鹽湯下五七八十九周而復始丈夫中年虛衰者便可服餌此方鹿純陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木例也如厚味善飲之人可以豬膽汁一二合于和劑中以寓降火之義

○廣按丹溪補損條中多主滋心血而補腎精為事夫心惡熱而腎惡燥故凡熱燥之藥皆損心腎而虧精血也今附已上諸方皆是補精益血清熱潤燥之劑

專補腎或兼補心或補腎左尺或兼補腎右尺在人
分而用之

○諸虛 新增

附脈理

脈理提綱曰氣虛脈細或緩而無力右手弱血虛脈大或
數而無力左手弱陽虛脈遲陰虛脈弦真氣虛脈紫指男
子久病氣口脈弱則死強則生女人久病人迎脈強則
生弱則死

附諸方

四君子湯 和劑方 補氣和胃進食

白朮

人參

茯苓

甘草 各等分

右以咀水煎服

○廣按四君子湯用白朮人參茯苓甘草者白朮則健
脾燥濕人參則補肺扶脾茯苓則降氣滲濕甘草則
補胃和中譬如寬厚和平之君子而不為奸檢卒暴
之行也和劑云等分愚以為藥之君臣劑之大小又
人之所處何如也

四物湯 和劑方 補血和血調經

當歸

白芍藥

地黃

婦人用生
男子用熟

芍藥 各等分

右以咀水煎服

丹溪心法附錄卷之九

○廣按四物湯用當歸芍藥地黃芩者當歸則和血
經芍藥則涼血補脾生芩則生血寧心熟芩則補血
滋腎芩窮則行血通汗其性不同所治亦異和劑云
等分愚以為隨其所在而輕重之庶得變通之道也
○王節齋曰氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物
湯虛甚者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之
劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱藥本
不可輕用但當病則在暑熱時月亦可用也予嘗治
一僕人五月間病熱口渴唇乾讖語診其脉虛細而
遲用四君子湯加黃耆當歸芍藥熟附子進一服愈

甚狂言狂走或曰附子差矣脉之如櫓仍增附子進
一大服遂汗出而熱退脉遂凹至矣又嘗治一婦人
亦夏月間病熱初用和調氣血蕪清熱和解之劑服
三二服不應熱愈盛舌上焦黑膈間如火漱水不熱
診其兩手脉皆虛而遲右手微甚六七日內譫語撮
空循衣摸床諸惡証俱用四物湯加黃芩人參白朮
陳皮麥門冬知母母熱時一服之一二時汗出而熱退
次日復熱再進一服又退又次日復發知其虛極也
遂連進十服皆加附子脉復始而病安
八物湯 平補氣血調和陰陽

白木 人參 茯苓 甘草 當歸

白芍 地黃 川芎 右咬咀水煎服

十全大補湯和劑方治男子婦人諸虛不足五勞七傷此

藥性溫平補常服生血氣壯脾胃

白木去梗人參去蘆茯苓去皮甘草炙 當歸酒洗

白芍酒浸地黃酒洗川芎 黃耆去蘆肉桂去皮

右為粗末每服五錢水一盞半生姜三片棗二枚煎至

八分溫服之

雙和湯和劑方治男子婦人五勞七傷血氣不足面色痿

黃四肢倦乏將為虛勞之証常服養氣益血

白芍七兩當歸酒浸熟地黃酒洗黃耆去蘆川芎去蘆

甘草炙 肉桂

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎空心溫服

雙和散拔萃方補益血氣治虛勞少力

黃耆去蘆熟地黃 當歸去蘆川芎各一兩官桂去皮

白芍去蘆甘草七分人參二錢

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分

去滓溫服大病之後虛勞氣乏者宜此

太真丸御藥院方治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱

飲食不進腸胃澹泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐

顏

羊肉

七斤精者為妙洗去筋膜去脂皮扯開入藥末

肉蓯蓉

一兩 濕山藥

當歸

十二兩去蘆酒洗

天門冬

去心焙乾一斤

右四味為末置之羊肉內裹定以麻縷纏縛用無灰好酒四瓶煮令酒盡再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮二兩熟糯米飯焙乾為末將前後藥末同劑為丸如梧子大一日二次服三百粒温酒送下須以漸而進如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾為末同入臼杵千百下丸之

養血當歸地黃湯 按辛方治病久氣血漸虛邪氣入腎全

氣養血

芍藥

當歸

川芎

地黃

藜蘆

防風

白芷

各一細辛

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後温服

黃耆建中湯 和劑方 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此

藥大生血氣補益榮衛

黃耆

去蘆肉桂三兩

白芍

六兩

甘草

炙二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜三片棗一枚同煎八分服

一法用炒浮小麥煎去滓入飭少許再煎令溶稍熱

服虛甚加熟附子

十四味建中湯和劑方治榮衛失調血氣不足積勞虛損
形體羸弱短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸酒去蘆焙 白芍藥 白朮 麥門冬 黃耆炙

甘草 肉蓯蓉酒浸 人參去蘆 川芎 肉桂去皮

附子炮去皮臍 半夏湯洗 熟地黄酒浸焙 茯苓去皮

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚煎至八分
空心溫服

未病蓮心散簡易方治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺
精

人參 茯苓 蓮肉各一兩 白朮 甘草

白扁豆炒 薏苡仁炒 北桔梗炒 乾葛炒 黃耆炒

當歸各半兩 桑白皮 百合 半夏麩 乾姜炮

山藥炒 五朱子 木香 丁香 杏仁去皮

白芷 神麩炒各兩

右咬咀每服五錢水一盞姜棗同煎空心溫服
黃耆益損湯直指方治諸虛勞倦

官桂 熟地黄 半夏製 甘草炙各三錢 石斛酒浸

當歸 川芎 黃耆炙 白朮各一兩 白芍半兩

北五味兩半 木香三錢

右咬咀每服一兩水二盞姜五片棗二枚有熱加柴胡

煎至一盞通口服

○已上諸方治氣血新虛之劑

鹿茸大補湯 和劑方 治男子諸虛不足 婦人亡血一切虛損

鹿茸

酒洗數遍酥塗炭灰炙令透為細末

當歸 酒浸洗

白茯苓

熟地黄 各一兩

白芍

白朮

附子 炮

人參

肉桂

半夏

白朮 各一兩半

五味子

一兩半 甘草 半兩

肉蓯蓉

酒浸焙杜仲炒斷絲各二兩

右吹咀每服四錢姜三片棗一枚煎七分去滓空心熱

服

究原雙補丸 簡易方 治一切虛損五勞七傷面色黧黑唇

口乾燥目昏耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗

鹿角霜

三兩

熟地黄 酒洗

沉香

鬼絲子

酒浸蒸焙

覆盆子

去核

白茯苓

去皮人參去蘆

宣木瓜

薏苡仁

黃耆 多

菴蓉 酒浸

五味子

去枝

石斛

去根

當歸 酒浸

澤瀉 切細再蒸

麝香

一錢

硃砂 半兩

研為衣

右為末煉蜜丸梧子大每服五十九空心鹽湯鹽酒任

下

究原心腎丸 簡易方 理水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精

丹溪心法附錄補遺卷十九

目暗耳鳴腰膝緩弱常服調陰陽補心腎

牛膝酒浸 熟地黄酒蒸 菴蓉酒浸各一兩

鹿茸火去毛酒塗炙 附子炮去皮 人參去蘆 遠志去苗甘草水煮去骨

白茯苓去木 黃耆蜜炙 山藥炒 當歸去蘆酒浸

龍骨煅各一兩 兔絲子酒浸蒸燥成餅三兩

右為末用浸藥酒煮麩糊丸如梧桐子大每服七十九

空心棗湯下

○廣按此方補虛溫寒燥濕益為虛中有寒者設也然

虛中有熱者又當以古菴心腎丸治之

瑞蓮丸經驗方 定心煖腎生血化痰

蒼木主脾二斤內酒浸四兩醋炙 枸杞子主肝二斤

北五味主麻二斤 蓮肉主心一斤去心皮酒浸軟入

熟地黄主血二兩 破故紙主腎二兩

右為末煮猪肚膏同酒糊丸如梧桐子空心溫酒下四

五十九

誅書菴蓉丸簡易方 治丈夫稟受氣血有偏勝者氣勝

血則陽盛宜服此藥和陽助陰

熟地黄酒浸洗蒸一兩 紫巴戟 嫩鹿茸酥炙

龍齒各一兩 川當歸酒好一兩半 人參去蘆

石蓮肉 肉菴蓉洗 北五子 嫩黃耆蜜炙

白茯苓 各一兩

兔絲子 蒸二次 研一兩半

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸温酒鹽湯任下

鹿茸四斤丸 和劑方 治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不

能自持起居無力足膝酸疼肌體瘦悴氣血不生

因茯苓 酒浸 天麻 酒浸 兔絲子 酒浸 牛膝 酒浸

熟地黄 酒浸 杜仲 酒浸 鹿茸 去毛 乾木瓜 等分

右為末蜜丸如梧子大每服五十九丸米湯或酒空心下

五味子丸 本草方 理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁 炒 肉苁蓉 酒浸 川巴戟 去心

人參 去蘆 五味子 去枝 骨碎補 去毛 土茴香

白木 碧益子 白龍骨 熟地黄

牡蠣 童便煨 東絲子 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米湯下

板萃方名巴戟丸

○廣按此方專為遺精盜汗已久虛脫者設也

金櫻丹 御藥院方 治男子去血失精婦人半產漏下五癆

七傷衰憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾

金櫻 取汁 仙木 取汁 生地黄 取汁 仙靈皮 取汁

木香 肉苁蓉 酒浸 兔絲子 酒浸 牛膝 酒浸

生雞頭肉 乾 丁香 生蓮子肉 乾 乾山藥

麝香別研後入 栢子仁別研 甘草炒 人參

茯苓去皮 陳皮去白 葛蒲各一兩

右將兔絲子已下同為細末入栢子仁并白砂蜜入銀石器中於爐內置熟火五斤煉蜜微解入兒孩乳母汁二升以篋攪次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處熬攪至火消續續緩添熟火勿令火緊熬至膏成取出就於銀石器中候稍溫入麝末一處攪和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十九丸每服一丸空心細嚼酒下

無比山藥丸和劑方 治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳

聾目暗常腹壯筋骨 益腎水

赤石脂 扶神去歲本 巴戟去心 澤瀉

乾熟地黃酒蒸 山茱萸肉各兩 山藥 牛膝一兩去蘆酒浸

杜仲去皮炒 兔絲子酒浸各兩 茯苓酒浸四兩 五味揀六兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸空心溫酒下還少丸楊氏方 大補真氣虛損肌體瘦悴目暗耳鳴氣血

凝滯脾胃怯弱飲食無味

乾山藥 牛膝酒浸一宿焙乾各一兩半 白茯苓去皮

山茱萸肉 楮實 杜仲去皮姜汁和酒炙 五味子

肉蓯蓉酒浸 巴戟去心 遠志去心 茴香炒各一兩

石菖蒲

枸杞子

熟苧

煨培各半兩

右為末煉蜜為丸入蒸熟棗肉和勻丸如梧子大每服五十丸空心温酒鹽湯下

是齊雙補丸

簡易方

平補氣血不燥不熱

熟地黄

半斤補血

兔絲子

半斤補氣

右為末酒糊丸如梧子大每服七十九人參湯任下

氣不順沉香湯下

心氣虛茯苓湯下

心氣煩燥不

得睡酸棗仁湯下

腎氣動苗香湯下

小便少車前

子湯下

小便多益智湯下

小兒絲丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

又云心腹脹滿脚膝酸痿小便滑數股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之

石蓮肉

二兩

兔絲子

酒浸五兩

白茯苓

一兩

山藥

二兩七錢半打糊上

右為末山藥打糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下脚無力木瓜湯下

葉氏十補湯

簡易方

治諸虛不足安益心腎

沉香

不見火

木香

煨

半夏

湯泡七次 白芍藥

當歸

酒浸一宿

黃耆

蜜炙

生乾地黄

洗 茯神

肉桂

去皮四錢

北五味

醋棗仁

炒

陳皮

天台烏藥

麥門冬

去心

人參

白朮

丹溪心法卷之十九

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗二枚煎七分每服
返本丸 補諸虛百損

黃犍牛肉

不拘多少去筋膜切片以河水洗數遍令血水盡仍浸一宿次日再洗一二遍水清為度用無灰好酒入磁器內重泥封固系柴文武火一晝夜取出如黃沙為佳焦黑無用焙乾為末每用末半斤用後藥末一斤為則

山藥

葱搗碎去葱鹽 蓮肉 去心葱鹽 白茯苓 去皮 小茴香 微炒各四兩

右為細末和勻用好紅棗不拘多少蒸之大爛剥去皮核研為膏加好酒入前藥和劑為丸如梧子大晒乾空心溫酒下五十九日進三服久服止一服切忌用麪糊米飲之類為丸不效

海藏大五補丸 補諸虛不足

天門冬 去心 麥門冬 去心 茯苓 去木 菖蒲

人參 益智 枸杞 地骨皮

遠志 熟洗各等分

右為末煉蜜丸梧子大空心酒下三十丸

茸珠丸 唐鑑方 昔西蜀藥市中嘗有黑髮朱顏道人每大

醉高歌厲聲曰龍闕不禁浴浪竭九轉靈丹都謾說惟

有斑龍頂上珠能補玉堂闕下血即貨此藥也朝野遍

傳一名斑龍丸

鹿角膠

鹿茸或鹽酒炒或濁酒炙 鹿角霜

陽起石煨熟 六附子別研 當歸 地黃蒸九焙

辰砂別研 肉蓯蓉 醋棗仁去殼 黃耆蜜炙

栢子仁去殼同棗 右為細末酒煮麩為丸如栢子六每服五十九空心温

酒盞湯送下 養氣丹 治諸虛百損真陽不固氣不升降或發端欠

○廣按古人補虛方中多是燥熱之藥蓋為虛中生寒

者設也然虛中生熱者十常八九而虛中生寒者百

無一二世俗好温而惡寒好甘而惡苦用藥處十

至於斯不可盡棄謹錄可用者於方中間有用附子

者此又甚焉然肥白人陽虛氣虛脾虛有濕衰老人

命門火衰陽事不舉脉沉細而遲者又不可舍附子

也 降心丹和劑方 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上

盛下虛小便赤白濁氣常厥鎖心益血 熟地酒洗 天門冬去心 麥門冬去心

人參 遠志共煎者去蒸 當歸去蘆 肉桂去皮各

朱砂半兩別研為衣 右為末煉蜜丸如栢子六每服三十九人參湯下

平補鎮心丹 和劑方 治心血不足時或怔忡夜多異夢如

墮層崖常服心腎益榮衛

白茯苓 去皮 五珠子 去殼 車前子 茯苓 去皮

肉桂 一兩 麥門冬 去心各一兩 遠志 去心北草

天門冬 山藥 洗姜製 熟苧 酒蒸各一兩半 酸棗仁 去皮炒

人參 去蘆 龍齒 二兩半 朱砂 半兩別研為末

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心米飲溫酒任下

十四友丸 和劑方 治心腎虛損神志不寧

白茯苓 白茯神 去木 酸棗仁 炒 人參 各一兩

龍齒 別研 阿膠 炒 黃耆 遠志 去心

當歸 酒洗 熟地黃 柏子仁 別研 肉桂

紫石英 別研 辰砂 別研

右為末同別研四味細末煉蜜如梧桐子大每服三十九食後棗湯下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘

清三焦化痰涎去煩熱除驚悸瘵咽乾育養心神

熟地黃 白茯苓 人參 遠志 去心

石菖蒲 玄參 柏子仁 桔梗

天門冬 去心 丹參 酸棗仁 炒 麥門冬 去心

甘草炙

百部

五味子

茯神

當歸

杜仲姜汁浸炒斷絲

右各等分為細末煑蜜丸如彈子大每兩作十九金箔為衣每服一九用燈心棗湯化下食遠館服或作小丸亦可

○廣按已上四方蒸治心腎二經之藥已下諸方獨治心經之藥也

妙香散 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神方見發熱類
寧志膏和劑方治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健

忘睡卍不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香

五錢坐水盆中研

辰砂研細水飛半兩

酸棗仁

炒去皮取末一兩

人參取末一兩

右和勻煉蜜丸如彈子大每服一九溫酒棗湯下

茯苓補心湯

治心虛耗不藏能血以致面色黃悴五心

煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦服之方見

靈砂寧志丸

楊氏方

治男婦大病後傷損榮衛失血過多

精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂

二兩不夾石者用夾細袋盛懸於銀石器中用
椒紅三兩取井水調椒紅入於器內可八分別
用銅子注水置外砂器內重湯煮令魚眼沸三
晝夜為度取出辰砂細研水飛

丹溪心法

卷之九

七

白朮

鹿茸

去毛 炙 黃耆 蜜炙

茯神 桑

人參

去蘆 各

石菖蒲

一兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵一二千下丸如梧
桐子大每服三十九溫酒米飲空心任下

葉氏鎮心爽神湯 簡易方 治心腎不交上盛下虛心神恍

惚睡多驚悸小便頻數遺精濁常服鎮心安神

石菖蒲

去毛 半兩

甘草

炙 四錢

人參

去蘆

赤茯苓

去皮 各三錢

酸棗仁

湯浸去殼 一錢半

常歸

酒浸焙 二錢

南星

二錢半

陳皮

去白

乾山藥

細辛

去苗

紫菀

去蘆

半夏

湯泡七次

川芎

不焙

五朱子

各二錢

通草

麥門冬

去心

覆盆子

各一錢

栝子仁

炒

枸杞子

各一錢

右以咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓取藥汁
入麝香少許再煎一二沸溫服不拘時

辰砂遠志丸 本事方 安神鎮心消風化痰

石菖蒲

去毛 遠志 去心

人參

茯苓

去木 各

辰砂

半兩

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

去心 各一兩

細辛

半兩

天麻

半夏

麩

南星

炒黃

白附子

生 各一兩

右為末用生姜五兩取汁入水煮糊丸如菽豆大別以
朱砂為末每服二十九夜卧生姜湯下

丹溪心法附錄卷之九

心丹 濟生方 治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾

並皆治之

遠志 甘草煮 去心 熟地黃 酒洗 蒸焙 新羅人參 木鱉子 炒 去

白朮 各五兩 麥門冬 去心 當歸 去蘆 酒浸 焙 石菖蒲

石蓮肉 炒 去心 黃耆 去蘆 茯神 去木 栢子仁 揀淨

茯苓 去皮 益智仁 各三兩 朱砂 五十兩

右將人參等十四味各如法脩製剉碎拌勻次將朱砂衮和以夾生絹袋盛貯用麻線繫緊袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀罐一箇於鍋內入白沙蜜十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒

令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去絮藥洗淨朱砂令乾入牛心內入白沙蜜於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸九七次其砂已熟即用湯水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分米糝為丸如豌豆大陰乾每服二十九食後參湯棗湯麥門冬湯任下
○廣按本草云此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒少有不作疾者以此觀之反不如生使之為愈也

一方 治心氣虛損 百一 漢方

猪腰子一枚用水二碗煮至一碗半將腰子細切入人

丹 心 去 寸 餘 有 藥 卷 一 七

參半兩當歸身半兩同煎至八分將腰子契以汁送下
久服為妙也

補心神効丸 百一選方

黃耆蜜炙焙 茯苓去皮各 人參去蘆 生乾地黄四兩

栝子仁 酸棗仁炮七次去殼 五味子各二兩

遠志去心

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸米飲溫酒任下

盜汗不止麥麩湯下 亂夢失精人參龍骨湯下

卒暴心痛乳香湯下 虛煩發熱麥門湯下 吐血人

參湯下 大便下血當歸地榆湯下 小便出血茯苓

車前子湯下 中風不語薄荷生薑湯下 風癩涎潮

防風湯下

八物定志丸 按華方 補益心神安定魂魄去邪熱治痰

人參一兩半 石菖蒲 遠志去心 茯苓去皮

茯神去木各一兩 朱砂一錢 麥門冬去心 白朮各半兩

牛黃二錢別研

右為細末煉蜜為丸如梧子大米飲下五十九無時

大歸神丹 安鎮心神固濟元氣

顆瑰硃砂入猪心內 酸棗仁去壳 當歸 人參

白茯苓去木各二兩 龍齒 遠志炒 琥珀碎

丹溪心法附錄卷之六

金箔

銀箔各二十箇

右為末酒煮稀糊丸如梧桐子大每服二十九至三十丸麥門冬湯下 如寢不寐亂夢炒酸棗仁湯下

又方

石菖蒲三分 茯神

人參各二分 遠志七分

右為細末白湯調服方寸已

○已上諸方治臟腑久損之劑

○廣按古方滋補虛損之劑多不清切夫心腎主陰血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉肺脾也肺脾主陽氣則惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕

之藥是補脾肺而瀉心腎也今一方而能通補之乎五臟豈有齊損之乎如袖珍方中三建湯兔絲子丸安腎丸麝香鹿茸丸散附丸菝葜大補丸橘皮煎丸起痿丸正元散固真丸丹溪心法附方中價寶丹延齡丹添精補髓丹巨勝子丸如意丸延生護寶丹延壽丹等劑皆是類聚辛香燥熱之藥補陽而消陰助氣而耗血殊不知人身中陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足用此藥損不足而益有餘實實虛虛之禍誰任其咎今將此等偏方不錄外止錄簡當中和之劑以便後人也抑嘗論之局方用辛香燥熱之

劑而不齊其非者蓋以其能健脾燥濕多進飲食也
雖然則陰血潛消而心腎暗損容顏日改而壽算日
偷矣可不畏哉可不謹哉

或問曰長營集一少年素好風月今孟夏清和之時
赴宴笑談間而卒其故何也予曰此陰竭而陽暴絕
也何以明之蓋人之陰血爲陽氣之依附此少年平
日色慾過度陰血已竭一旦赴宴馬上勞役心中隱
忿不無動火火性炎上陽無依附遂隨火而發越也
譬如樹木賴土培養平日土虧根露一旦天地作變
則樹木亦隨風而傾倒矣夫陽爲陰之先導陰爲陽
之依附天先乎地夫先乎婦氣先乎血先導之義也
天倚乎地夫倚乎婦氣倚乎血依附之義也不曰陽
陰而曰陰陽蓋以陰有形爲陽無形之依附也知此
理者可不以陰血爲至寶乎哉

丹溪心法附錄卷之十九

丹溪心法附錄卷之十九

餘



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之二十

辛集

婦人門上

經病 九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也四物加參朮帶痰加兩星半夏
陳皮之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃連

丹溪心法附餘卷之二十

頁

過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過
期淡色來者痰多也二陳加川芎當歸 過期而來是血
虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是
氣血俱熱宜涼氣血柴胡黃芩當歸白芍生芩香附之屬
經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白芍腹
痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而作痛者乃虛中有熱
所以作疼 經水將來作疼者血實也一云四物加桃仁
黃連香附 臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物
加紅花桃仁莪朮玄胡索香附木香發熱加黃芩柴胡
紫色成塊者熱也四物加黃連柴胡之類 痰多占住血

海地位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼朮川
芎香附作丸子服之 肥人不及日數而多者痰多血虛
有熱亦用前丸藥中更加黃連白朮丸服 血枯經閉者
四物加桃仁紅花軀脂滿經閉者以導痰湯加黃連川芎
不可服地黃泥膈故也如用以姜汁炒 肥胖飲食過
度之人而經水不調者乃是濕痰宜蒼朮半夏滑石茯苓
白朮香附川芎當歸臨經來時肚痛者四物湯加陳皮玄
胡索牡丹甘草痛甚者豆淋酒痛緩者童便煮莎人炒條
芩末為丸 經水去多不能住者以三補丸加莎根龜板
金毛狗脊 陰虛經脈久不通小便澀身躄疼痛四物加

蒼木牛膠陳皮生甘草又用蒼沙丸加蒼耳酒芍藥為丸
就煎前藥吞下入方 治經水過多

黃芩炒 白芍炒 龜板炙各 黃柏炒三

椿根白皮七錢半 香附子二錢半

右為末酒糊丸空心温酒或白湯下五十丸

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子一兩 黃連半兩 吳茱萸十粒 桃仁五十

紅麴二錢 砂仁三兩 麻祖木

右為末生姜汁化炊餅為丸梧子大服一百丸空心

又方 治一切瘀血為痛

香附醋煮 瓦礫子煨 桃仁二兩

牡丹皮 大黃蒸熟 當歸各一兩 川芎

紅花各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大空心温酒下三五十九

導痰湯 見痰類

三補丸 見補損

蒼沙丸 見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疝痛

丹溪公法附錄

當歸

川芎

芍藥

熟芩 等分

右以水煎服加減于後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數
 本方去地黄川芎加澤蘭葉三倍甘草半分 經候過
 多本方去熟芩加生芩或只加黃芩白朮 經行身熱
 脉數頭昏本方加柴胡芍 經行數少或脹或痛四肢
 疼痛加延胡沒藥白芷與本方等淡醋湯調下末子
 經候不調心腹疼痛只用芍歸二味名君臣散 氣冲
 經脉故月事頻併脐下多痛加芍藥 經欲行脐腹絞
 痛加玄胡楨郎苦練炒木香減半 經水澁少加蘇花

紅花

經水適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡

湯後以四物和之

經後過而作痛血氣俱虛也宜本

方對四君子湯服之

大溫經湯

和劑方

治衝任虛損月候不調或來多不已或

過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹
 急痛五心煩熱

阿膠

芍藥

當歸

人參

肉桂

甘草

芍藥

牡丹皮

半夏

吳茱萸

麥門冬

去心五

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹和劑方治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸証

秦艽 二兩 京墨 煨醋淬 糯米 炒一斗 川芎 一兩半

熟地黃 酒蒸 四兩 茯苓 去皮 三兩 人參 去芦 二兩 石斛 夫根 酒浸 二兩

蒼朮 米泔浸去 八兩 香附 炒去毛 四兩 木香 炮一

藁本 去芦 一兩 當歸 夫芦 酒浸 五錢 肉桂 去粗皮 一兩半

乾姜 炮 兩半 山藥 七錢 澤蘭葉 四兩 川椒 去目 炒 七錢半

細辛 去苗葉 一兩半 桔梗 炒 二兩 桃仁 去皮尖 炒 一兩

大豆黃卷 炒半 苴草 炙 二兩 蚕布 燒灰 二兩

牡丹皮 半兩

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生芩 一斤 老生姜 一斤 玄胡索 當歸

川芎 白芍藥 各二兩 沒藥 木香 各一兩

桃仁 去皮尖 人參 各一兩 香附子 半斤

右將將地黃生姜各搗汁以生姜汁浸地黃祖地黃汁浸生姜祖皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾同為末醋糊丸如梧桐子大空心服五十九丸姜湯下內多散 和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或

凝積血塊腰腹刺痛九月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟乾地黄洗肉桂去皮各一兩半

甘草炙 當歸去芦洗 白朮 山藥

白芷各兩 茴香半兩 藁朮去芦 乾姜炮

川芎 黃芪去苗各兩 木香一兩

陳皮去白四兩 白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不

快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生姜煎

活血散 御藥院方 治衝任經虛經事不調不以多少前後

並皆治之

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索各兩

肉桂去皮一兩

右吹咀每四錢水一盞煎至七分食後熱服

溫經湯大全良方 治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心

牡丹皮 義朮各半兩 人參 甘草

牛膝各一兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸澹寮方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨

醋煮香附丸澹寮方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨

丹溪心法附錄經病卷三
脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附 砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦甌慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子日乾每服五十九淡醋湯

下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法治

証一同名艾附丸

如聖丹 聖惠方 治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬 四兩 蛇床子 二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中

用熱極再換

增損四物湯 宣明方 治月經不調心腹疼痛補血藏溫經

注類

川芎 芍藥 當歸 熟地黃

白朮 牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右以咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服食前

丹參散 大全良方 治婦人經脉不調或前或後或多或少

產前胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊

痛骨節煩疼

丹參 去芦不以多

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散 大全良方 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復

丹溪心法附錄卷之三
百八
來狀如瀉水四肢虛翕不能飲食復中堅痛不可行動
月水或前或後或月水不來卒躄沉重惟欲眠多思酸
物

桃仁 甘草 半夏各一 赤芍藥

生地黃各二 澤蘭 牛膝 當歸

桂心 牡丹皮 人參 蒲黃

川芎各兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分空心服

四製醋附丸 喘竹堂方 治婦人女子經候不調

香附子 去毛一斤 作四分

一分好酒浸七日 一分小便浸七日

一分鹽水浸七日 一分米醋浸七日 各焙乾

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心食前鹽

酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各一兩

○庶按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟芋 各半兩

牡丹皮 玄胡 各二錢半 人參 黃芪 各一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食前湯送下

○廣按月信積前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜
用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之
○月經不通

王節齋曰婦人女子經脈不行多有脾胃損傷而致者不
可便認作經閉血凝輕用通經破血之藥遇有此證便
須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食
泄瀉疼痛或因誤服汗下攻劫藥傷其中氣以致血少
而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣
佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則
能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜

補續補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經
紅花當歸散和劑方治婦人血臟虛竭經候不調或斷續
不來或積聚塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草五兩當歸去芦牛膝酒浸各兩肉桂去芦

紅花各一兩白芷各一兩甘草炙二兩赤芍藥一兩

紫葳即麥蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒
調下

通經丸濟生方治婦人室女經候不通脘腹疼痛或成

川椒炒去蓬朮炒去乾漆炒去當歸去芦

丹溪心法附錄卷之三

青皮去白 乾姜炒 大黃炒 桃仁炒

紅花 桂心各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑臼中杵之丸如梧桐子陰乾每服五十九丸醋湯溫酒空心下

千金桃仁煎簡易方 治婦人血積癥瘕月水不行等疾

桃仁去皮尖 炒 朴硝 大黃各二兩 蜜虫半兩炒 令黑色

右和勻以酢醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃末入內不住手撓度可圓時却下朴硝更不住撓良久出再丸如梧桐子五更初溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁鷄肝蝦蟆各樣以盡為度

六合湯濟生方 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂去皮 熟地黃酒洗

川芎 蓬朮炮各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散醫方 治婦人月水不行發熱腹脹

當歸酒浸 凌霄花 劉寄奴 官桂去皮

紅花酒浸 候乾 一二沸 牡丹皮酒洗 川白芷

赤芍藥 延胡索各等分

右吹咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散

張子和方

四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服四物湯見補遺承氣

湯見傷寒

三和湯張子和方

四物湯涼膈散當歸各中停水煎服涼膈散見溫熱

一方治室女月經不通

紫葳一兩

乾漆炒二錢半

芍藥

蓬莪朮

當歸稍各半兩

右為末每服二錢空心酒調下

一方療月經不通腹中痛

牛膝六錢

大黃

細辛

桃仁去皮尖雙仁伍錢炒

川芎

當歸

水蛭三錢糯米炒

右為末煉蜜丸梧子大每服二十九空心酒下

通經散聖惠方治室女月水不通

椎鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸聖惠方治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

甘草炒

官桂

桃仁炒一兩

大黃二兩

血竭二錢半

紅花少許

地膽二十箇去起足

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒下量虛

丹溪心法附錄卷之二十一

實加減服之

溫經湯 大全良方 若經道不行 繞臍寒疝痛 徹其脉沉紫 此由寒氣客於血室 血凝不行 又為氣所衝 新氣與故 血相搏 所以作痛 宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮

各半 人參

甘草

牛膝

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯 大全良方

官桂

芍藥

生地黄 各二兩 甘草 一兩

桃仁

去皮尖 五十箇

右咬咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓溫服

當歸散 大全良方 治血脉不通

當歸

川山甲

天焙

蒲黃

炒各五錢

辰砂 一錢

麝香 少許

右為末研停每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散 經驗方 治心膈迷悶腹臍撮痛氣急痞塞月信不通等疾

烏藥 二兩

當歸

蓬莪朮 各一兩

丹溪心法附錄卷二十一

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生
冷油膩等物產後諸疾用炒姜湯調下

萬病丸 按萃方 治女人月經淋閉月候不來遠勝寒疝痛

徹及產後血氣不調腹中生瘕結而散等疾

乾漆 并碎炒令烟盡淨 牛膝 去苗酒浸一宿

右為細末生地黄汁一升入二味銀石器慢火熬候可

丸如梧桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

通經散 楊氏方 治衝任下調經脉閉塞久而不通漸成堅

瘦服尋常通經藥不効者正宜服之

班蝥 去翅足炒 黃虫 水蛭 去土炒黑各杜牛膝半兩

千金散 治經候不調

篇蓄 瞿麥 各四錢 楨榔 麥蘖

小茴香 各三錢 大黃 錦文者六錢

右為細末每服三錢臨臥溫酒調下

○經病疼痛

大烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育

不成崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食無味身疼羸

瘦面目痿黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮髮黃落

喜臥倦起產後惡血上行心腹刺痛敗血不止及子宮

一切惡疾

大艾葉

當歸醋炒

破故紙炒

茴香炒

熟地黃醋炒 南木香不見火

吳茱萸

三稜

莪木各二兩 川芎醋炒

芍藥醋炒各三兩

香附子六兩

延胡索一兩 紫荊皮四兩

右先將艾二兩香附六兩米醋一升浸一日一夜冬月

三晝夜煮乾炒令赤黑色入夜十二味同為末米醋煮

糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒湯

任下日二服如崩中下血不止加棕灰一兩綿灰五錢

蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯濟生方治婦人室女七情所感血氣相併心腹

疼痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調皆治有效

當歸去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥

片子姜黃

官桂不見火各半兩 乳香

木香不見火各三錢

甘草一錢半 沒藥三錢

右吹咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服

吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散濟生方治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆

攻心眩暈不省並皆治之

劉寄奴去槲 牡丹皮去木 熟地黃酒浸 玄胡索炒去皮

烏藥

赤芍藥

蓬莪木

京三稜

當歸去芦酒浸

官桂不見火各一兩

一方有菊花蒲黃炒各一兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮

豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心温酒

送下

三神丸濟生方治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

橘紅二兩

玄胡索

去皮醋煮當歸去芦酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心艾

醋湯下

當歸煎丸大全良方治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦之

力月候不調

當歸三兩別研末

枳椇

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子每服二十九

温酒下

姜黃散大全良方治血藏久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃四兩

蓬莪木

紅花

官桂

川芎各一兩

玄胡索

牡丹皮

當歸各二兩

白芍藥三兩

右咬咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口

服食前

獨痛散 大全良方 治婦人血氣刺痛

荔枝核 煨存性 五錢

香附子 炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散 按萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川黃連 炒各一兩 赤茯苓 生地黄

桃仁 當歸 官桂 赤芍藥

白木 石帶 去皮 木香 各半兩

右吹咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通口食前服

牛膝散 按萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝 一兩 官桂 赤芍藥 桃仁

玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎

木香 各七錢半

右為細末每服三錢溫酒調下食前

替灸丸 秘方 治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不通

面色痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息此藥常服溫

中暖勝調經有子服藥未盡即時有效

茯苓 艾葉 各八分 香附子 當歸 各四兩

吳茱萸 炒三兩 川芎 白芍藥 各二兩

丹溪心法附錄卷之二十一

右用酸醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子每服五十九丸空心午前日二服用淡醋湯送下

大延胡索散 宜明方 治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平心胃急痛尤宜服之

玄胡索 當歸 赤芍藥 京三稜煨

川練子去核 蓬朮煨 官桂去皮 厚朴製

木香 川芎各二錢半 桔梗 黃芩

大黃各五錢 甘草一兩 枳榔二錢

石為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三

服如惡物多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各錢五

延胡索散 大全良方 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 川芎 官桂各七錢半

木香 枳殼 赤芍藥 桃仁各五錢

熟地黃一兩

右咬咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓通口食前服

當歸散 大全良方 治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能食

當歸 酒炒 赤芍藥 劉寄奴 沒藥

枳殼

玄胡索

右等分為末熱酒調下二錢不拘時候

失笑散和劑方治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂

蒲黃各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七

分熱服

異方濟陰丹秘方治婦人內有血積經水不調腰腹痛

香附子

三稜

莪朮

陳皮去白

青皮

敗姜各一兩

右用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋

打糊

官桂

當歸

赤芍藥

白芍藥

生地黃

熟地黃

澤瀉

片姜黃

牡丹皮

乾姜

川芎

劉寄奴

澤蘭

人參

蒲黃經炒

木香

白朮

玄胡索

右各一两焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九丸炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯下或酒下

○經病發熱

丹溪心法附錄卷之五

百

逍遙散 和劑方 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

熟

甘草 炙半兩 當歸 去芦炒 茯苓 去皮 芍藥

白朮 去苗各一兩 柴胡 去苗各一兩

右咬咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎至七分温服

人參荆芥散 和劑方 治婦人血風發熱身麻疼痛頭昏目

澁煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛疝塊硬等症

赤芍藥 五兩 柴胡 去苗七兩半 牡丹皮 五兩 荆芥穗

鱉甲 醋浸去 羊角 炙 酸棗仁 去穢炒

生乾地黄 人參 去芦 白朮 去皮各一兩

防風 去芦 當歸 去苗 芍藥 去苗 甘草 各五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分温服不拘時

油煎散 和劑方 治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澀

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸 去芦各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入前項

藥同煎七分煎不得撓喫不得吹常服此藥能肥婦人

滋血湯 和劑方 治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或

為浮腫肌麻發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荆芥穗 各四兩 牡丹皮 一兩 赤芍藥

積殼去白 炒 肉桂去皮 當歸去芦 炒 川芎各二兩

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一箇煎服以經調為度

牡丹散和劑方 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌

躄羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索炒

沒藥別研 陳皮去白 各一兩 真蓬莪朮 鬼箭各二錢半

紅花 當歸去芦 各二錢 乾漆炒 兩 蘇木二錢半

甘草 烏藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘵狀

當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

柴胡半兩 黃芩二錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯濟療方 治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生姜五片煎八分

溫服

四物湯見前 參蘇湯見胃寒

麥前散聖惠方 治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心

胃煩壅

鱉甲醋炙 大黃煨 常山 赤茯苓

柴胡

白芍藥

當歸

乾漆炒烟

生地黄

石膏各一兩

甘草半兩

右咬咀每服一兩水一鍾小麥五十粒煎至一鍾去滓

温服食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭

肌熱盜汗

黃芪散大全良方治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾

不欲飲食

人參

黃芩

當歸各七錢半

柴胡一兩半

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥

各一兩二錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

麥門冬散大全良方治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不

下

麥門冬

前胡

赤茯苓各一兩

羚羊角

赤芍藥

桑白皮

黃芪各七錢半

生地黄

甘草各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎一鍾通口服

犀角散長葶方治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草各五錢

柴胡

黃芪一兩半

麥門冬

人參 枳殼 赤茯苓各七錢半

右咬咀每服五錢水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓通口服不拘時候一方有生 地黃七錢半

地骨皮散 大全良方 治婦人血風氣腫虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮各一兩 桑白皮 枳殼

前胡 黃芪各七錢半 雲白茯苓 五加皮

人參 甘草 官桂 白芍藥各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾通口服 柴胡散 大全良方 治婦人寒熱麻瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃芪 赤茯苓 白朮各一兩

人參 地骨皮 枳殼制 生地黃

桔梗 桑白皮 赤芍藥各七錢半 梔子醋炙

麥門冬三兩 甘草五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至七分溫服

小柴胡湯 大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作

有時經水適斷此為熱入血室其血必結故如癰狀

柴胡八錢 半夏二錢 人參 甘草

黃芩 生地黃各三錢 麥門冬二錢

右咬咀每服八錢水一鍾半姜五片棗二枚煎至八分

去滓温服

柴胡飲子宣明方治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來
肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡

人參

黃芩

甘草

當歸

芍藥

大黃

各一錢

喘嗽者加半夏桔梗五味子

各五分

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去渣温服食後

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脉沉而菽

川芎

熟地黄

當歸

芍藥

各一兩半

柴胡八錢

人參

黃芩

甘草

半夏各三錢

右每服一兩水一盞半生姜三片煎八分温服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不
調不通之中有熱疼痛者有熱發熱者此分而為四
也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退
後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者
有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常
時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛
為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有
經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱

也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒
外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒
所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則
惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也調
其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱
治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治
血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝
結故治血病以執藥為佐肉桂之類是也

崩漏九十三

辛集

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜尋思之
急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者用棕櫚灰
後用四物湯加炒乾姜調理因勞者用參芪帶升補藥
因寒者用乾姜因熱者黃芩崩過多者先用五靈
脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止紫色成塊者
熱以四物湯加黃連之類婦人血崩用香附白芷丸服
氣虛血虛者皆以四物湯加參芪漏下乃熱而虛四物
湯加黃連崩中白帶用椒目末又用白芷石灰炒

去灰為末茵草少許粥丸服 一方用生狗頭骨燒灰存
 性或酒調服或入藥服 一方五靈脂半生半炒為末酒
 調服 經血逆行或血腥或吐血或血用韭汁服効 夫
 婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉
 為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適
 經下依時若勞傷過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制
 其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之
 藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自
 止矣

附諸方

膠艾湯 和劑方 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不
 斷及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜
 服之

阿膠 外 艾葉 炒各二兩

熟乾地黄 各四兩 當歸 去芦炒二兩

右以咀每服三錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

伏龍肝散 和劑方 治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下

或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

川芎 三兩 肉桂 去皮五錢 當歸 去芦炒 乾姜 炮各七錢

半赤石脂 兩 艾葉 炒三兩 熟地黄 甘草 炙半兩

麥門冬一兩 伏龍肝一兩即

右以咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前溫服

神仙聚寶丹 和劑方 治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不

散積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶

下並宜服之

沒藥 琥珀各別研 辰砂別研 木香煨末

乳香別研 當歸洗焙取 射香別研

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一九溫

酒磨下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入

童子小便

艾煎丸 治崩傷淋歷不已小腹滿痛常服益榮調經

食茱萸湯洗 當歸各七錢半 熟地黃 白芍藥各一兩半

石菖蒲剉 川芎 人參 熟艾四兩熟

作餅 焙

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸酒飲任下

鎮宮丸 濟生方 治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或

狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈目眩

代赭石 紫石英煨 禹餘糧煨 蒲黃炒

川芎 陽起石炒 鹿茸去毛 蒲黃炒

香附子醋炙各 當歸去芦 酒浸

丹溪心法附錄卷之三

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

栝子仁湯濟生方治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血

遂致崩中下血不止

鹿茸火去毛栝子仁煨各芎藭一兩

香附子炒去毛當歸一兩甘草炙半

川續斷一兩茯神去木小草一兩阿膠一兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分空心溫服

一方治婦人血崩屢驗

當歸 白芍藥 棕櫚 乾姜

右等分各燒存性為末醋湯調以有節米筋左攪四十丸轉食前服

一方治月水不止

用阿膠炒枯為末用好酒空心調服艾湯亦可

一方

艾葉如鷄子大阿膠半兩乾姜一錢

右為粗末用水五鍾先煮艾姜後入膠洋消分作二服空心

鹿茸丸大金方治衝任虛損以致經候過多又為風冷所乘尺脈微細甚者可灸開元百壯

丹溪心法附錄卷之三

鹿茸火去毛 赤石脂 禹餘糧各兩 艾葉

柏葉 附子炮去皮兩 熟地黄洗焙

當歸 酒浸 續斷各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九丸空心温酒下

○廣按此方用附子的係虛寒者方可然崩症多屬虛

熱其虛寒者容或有之或當老年崩久與夫寒冷所

乘不可一槩作虛熱論也

○已上數方補虛温寒之劑

凉血地黄湯 按萃方治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守

包絡相火故血走而崩也

生地黄 當歸各五分 黃連 黃蘗

知母 蒿木 川芎 升麻各二分

柴胡 羌活 防風各三錢 茜草

甘草多 細辛 荆芥 蔓荊子各二分

紅花少許

吹咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

金華散簡易方 治婦人經血得熱崩漏不止

延胡索 當歸 瞿麥 牡丹皮

歲靈仙各七錢半 乾葛五錢 蒲黃五錢 石膏二兩

桂心三分

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎七分食前溫服

黃芩湯簡湯方治崩中下血今人多用止血補血之藥少

能見効此是陽乘陰則經水沸溢宜清之為愈

黃芩研為細末燒秤鍾淬酒調下三錢食前服

一方治婦人血崩不止

槐花一兩 棕毛灰 五錢

右為末水二鍾鹽少許煎至七分去滓溫服

如神散聖惠方治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥

右等分為末鹽一捻水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

當歸龍骨丸 宣明方治月事失常經水過多及帶下淋瀝

無問久新赤白諸証并產後惡物不止或孕婦胎動不

安疼痛漏下及大人小兒下痢並宜服之

當歸 芍藥 黃連 染槐子

艾葉炒 茯苓各五錢 龍骨 黃柏各一兩

木香 二錢半

右為末滴水丸如小豆大每服五十九食前米飲送下

解毒四物湯 治婦人經脈不住或如豆汁五色相雜面

色痿黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止並宜服之

黃連 黃柏 黃芩 山梔子

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各一

用水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

栝黃散永類鈔方療經血不止

黃芩

一兩一錢半

當歸

栝葉

蒲黃

各一兩

生姜

半兩

艾葉

二錢五分

生地黃

六兩

伏龍肝

二兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

芩心丸

瑞竹

治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行

或過多不止

黃芩

新法條者二兩重以米醋浸七日乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如梧子大每服七十九空心溫酒下日

三服

黃藥子散宣明方治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體

困倦不美飲食

黃藥子

當歸

芍藥

生地黃

人參

白朮

知母

石膏各一錢

川芎

桔梗

甘草

紫葳

柴胡

槐花子

各二分半

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

小蘇湯 治崩中不止

小蘇葶葉

研取汁

生芫汁一盞 白朮半兩

右三件入水一鍾煎溫服

奇效四物湯 聖惠方治血崩

四物湯

艾葉

阿膠炒

黃芩

右等分水二盞生姜三片煎至一鍾去滓空心食前溫服

○廣按此方與膠艾湯少異在膠艾湯純於補虛而此方補虛中又兼退熱也崩証虛而有熱者用此方與黃藥子散最當

○已上數方涼血清熱之劑

如聖散經驗方治婦人血崩

棕櫚

烏梅各一兩

乾姜半兩並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅湯酒空心調下久患三服愈十灰丸 濟生方治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮蓬灰

油髮灰

棕櫚灰

赤松皮灰

綿灰各等分

右為末用醋煮糯米丸如梧桐子每服一百丸飲下

荆芥散

大金良方治婦人崩中連日不止

用荆芥穗以燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荆芥焦色為末每服三錢童子小便調下

獨聖散 大全良方 治婦人血崩不止

用防風去芦義隨多少為末酒煮麩清調下二錢空心日二服更以麩作糊酒投之極驗

當歸散 聖惠方 治婦人血崩不止

當歸 龍骨燒赤 香附子炒各一兩 棕毛灰五錢

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚鷄等物

一方 大全良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方 大全良方

用棕櫚燒存性為末湯泡酒令淡調下三錢空心服

一方 大全良方

用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

必効散 保真集方 治婦人月水經不調及崩漏不止

棕皮燒 木賊去節燒灰存性各二兩 射香一錢研

右為末酒調二錢空心服

備金散 治婦人血崩不止

香附子炒四兩 當歸二錢 五靈脂一兩

右為細末每服五錢空心濃醋湯調下立効

蓮蓬散 經血不止

用蓮蓬燒灰存性為細末每服二錢調下

一方治血崩

當歸

乾姜

烏梅

青木綿

棕櫚各等分

右並燒灰存性為末燒秤釀酒空心調服日三次

已上數方止血作崩之劑

廣按血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋今之七情過極則動五志之火五志之火亢甚則經血暴下失期而來久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流

帶下九十四

辛集

丹溪心法

帶下

赤屬血

白屬氣

主治燥濕為先

漏與帶

俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮仍用九子一本作并龍子又云赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分肥人多是濕痰海石半夏南星炒栝蒼朮川芎椿皮一方無椿皮有青黛瘦人白帶少如有者多熱以炒黃栝滑石椿皮川芎海石如無海石以蛤粉亦可一方有青黛作丸

子服 赤白帶下炒黃荊子為末酒調下二錢或米湯亦可
可又治心痛羅先生法或十棗湯或神佑丸或玉燭散皆
可服實者可行虛者不可峻攻 血虛者加減四物湯
氣虛者參朮陳皮間與之 濕勝者用固腸丸 相火動
者於諸藥中少加黃栢 滑者加龍骨赤石脂 滯者加
葵花 葵花白者治白性燥者加黃連 痰氣帶下者蒼朮
帶赤者治赤帶 香附滑石蛤粉半夏茯苓丸服寒月少加乾姜臨機應變
必須斷厚味

入方

良姜

芍藥

黃栢 各二錢俱炒成灰

椿白皮 一兩半

右為末粥丸梧子大每服四五十九空心

一方 一婦人白帶兼風痛

半夏

茯苓

川芎

陳皮

甘草

蒼朮

黃栢 酒炒

南星

牛膝 酒洗

治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星

蒼朮

栢皮 炒

滑石

半夏

川芎

辛荑

牡蠣粉 炒

酒芩

右吹咀水前去粗食前服

又方 治白帶

龜板炙

枳子各二兩

黃柏炒一兩

白芍藥七錢半

香附半兩

乾姜炒二錢半

山茱萸

苦參

椿根皮各半兩

右為末酒糊丸梧桐子大空心米湯下五十九

又方 治赤白帶下或時腹痛

龜板酒炙

黃柏炒一兩

乾姜炒一錢

枳子二錢半

右為末酒糊丸梧子大每服七十九日服二次

又方 治婦人有孕白帶

蒼朮三錢

白芷二錢

黃連炒二錢

黃芩炒三錢

黃柏炒一錢半

白芍二錢

椿根皮炒一錢半

山茱萸二錢半

右為末糊丸空心温酒下五十九

治結痰白帶 先以小胃丹半飢半飽津液下數丸候齋

積開却宜服補藥

白朮二兩

黃芩半兩

紅白葵花二錢半

白芍七錢半

右為末蒸餅丸空心煎四物湯三五十九

固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾

用此以燥其濕亦不可單用須看病作湯使

椿根白皮

性燥而燥須炒用

右為末酒糊丸服

又方 椿根皮兩四滑石兩二右為末粥丸梧子大空心下湯百丸

又方 治白帶因七情所傷而數黃連炒匾栢酒黃炒各

香附醋白芍 白木各椿根皮兩白芷燒存性

右為末粥丸梧子大每服七十九食前米飲下

又方 治赤白帶濕勝而下者 蒼木炒白芍 滑石炒各

甘草各三枳殼炒椿根皮兩乾姜錢二地榆兩

右為末粥丸空心米飲下一百丸

附諸方

補宮丸 楊氏方 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸弱

當歸

紅花各三

滑石一錢

右為細末每服一錢用桃仁七箇研細末温酒調下食前服

○廣按此方善能通然月候不通有血滯者有血枯者

此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶求

千金於乞丐也

瑞金散 大 全 良 方

治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐

疼痛

片姜黃四兩牡丹皮

蓬莪朮

紅花

當歸

赤芍藥

川芎

延胡索

官桂 各一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服
一方 治經候閉塞赤治乾血氣

斑蝥 二十箇 糯米炒 桃仁 五十箇 炒 大黃 錦文者 半兩

右為細末酒糊丸如梧子大空心溫酒服五丸甚者十丸 如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣

用錦文大黃酒浸乾四兩為末以醋好一升熬成膏戶如鷄彈大每服一丸熱酒化開待溫臨臥服大便利一二行紅脉自下此藥調經水之仙藥也 又方加香附艾

葉 伐赭石 醋煨 七次 桑寄生 當歸 去芦 酒

地榆 各一兩 木香 不見火 龍骨 各半兩 乾姜 七錢

右為末醋煑糯米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

威喜丸 和劑方 治婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常濕小便如米泔或無子息

白茯苓 去皮 四兩 黃蠟 四兩 猪苓 二錢 半 去皮 同茯苓 於磁器內煮二

十餘沸 出日 乾不用猪苓

右取茯苓為末溶蠟丸彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服忌米醋及使性氣

白芷散 大全良方 治婦人赤白帶下

白芷 一兩 海螵蛸 二箇 胎髮 一箇

右為末空心酒調服二錢

麝香丸 御葉院方 治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷

久無子息

零陵香 藿香 各二錢 蛇床子 五錢 吳茱萸

枯礬 木香 各三錢 射香 二分 丁香

韶腦 半錢 不灰木 白芷 二錢 龍骨 五錢

右為末煉蜜為丸每兩作四十九丸每用一丸綿裹納陰

中

大效拱辰丸 秘方 治婦人血海虛冷白帶時下臍腹刺痛

久服令人延年精神實多子嗣

琥珀 二錢 當歸 酒浸 沉香 木香

官桂 各不 人參 黃芪 鹿茸 酥炙

乳香 沒藥 各一 酸棗仁 兩半 鹿角霜

乾姜 延胡索 栝子仁 各半

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸溫酒化下空心

暖宮妙應丸 秘方 治婦人赤白帶下

艾葉 龍骨 當歸 川芎

牡蠣 白芍藥 牡丹皮 茯苓

赤石脂

熟地黄

右等分為末，麵糊丸。如梧桐子大，每服五十丸，空心艾醋湯下。

艾煎丸 經驗方 治婦人諸疾，腹痛，赤白帶下。

香附子 淨

艾葉 各一兩

蔓荊子

神曲

枳殼 去穰

當歸 各二兩

吳茱萸

蓬莪朮 各一兩

右用醋一大碗，慢火煮香附、艾葉，以醋盡為度。棟去艾葉，入糯米糊，捻作餅子，日乾。同前藥為末，醋糊丸。如梧桐子大，每服二十丸，食前米飲下。醋湯亦可。

○已上數方，辛溫去濕寒之劑。

戴人玉燭散

當歸

芍藥

川芎

熟芩

大黃

甘草

右吹咀，生姜三片煎服。

十棗湯 見臍疝類

神佑丸 見中濕類

○已上三方，苦寒除濕熱之劑。

○廣按：婦人赤白帶下之症，多是怒氣傷肝，夫肝屬木，脾屬土，肝邪乘脾，木氣尅土，則脾受傷而有濕濕而生。熱熱則流通，所以滑瀉之物，滲入膀胱，從小便而

出也古人作濕寒而用辛溫之藥治之者非而丹溪
作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾用
辛溫之藥治之而愈者殊不知用苦寒之藥是正治
之法也用辛溫之藥是從治之法也蓋濕熱拂鬱於
內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥從治而能開散
之乎然濕熱未盡拂鬱但止赤白帶下而無腹痛之
症不若用苦寒之藥並治之為當也

丹溪心法附餘卷之二十終

丹溪心法附餘卷之二十一

壬集



婦人門下

產前九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血 產婦因火動胎逆上作喘急者急
用條芩香附之類為末調下條芩水中取沉者為佳 墮

丹溪心法附餘卷之二十一



胎乃氣虛血虛血熱 黃芩安胎乃上中二焦藥能降火
 下行 益母草即菟蔚子治產前產後諸病能行血養血
 難產可煎作膏地黃膏牛膝膏皆可用 懷姙愛物乃一
 臟之虛假如肝臟虛其肝氣止能生胎死餘用也又云不
 能榮其肝肝虛故愛酸物 產前安胎白朮黃芩為妙藥
 也條芩安胎聖藥也俗人不知以為害而不敢用反為溫
 熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱令血循經而不妄行
 故能養胎 胎熱將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥
 蒸餅丸服 抑熱以三補丸用地黃膏丸 有孕八九箇
 月必用順氣須用枳殼紫蘇梗 凡姙婦脉細勻易產大

浮緩火氣散難產 生產如抱船過坦一般

入方 固胎

地黃半錢 婦身 人參 白芍各一錢 白朮半錢

川芎五分 陳皮一錢 黃芩一錢 甘草三分 黃連少許

黃柏少許 桑上牛兒藤七葉者 一本无荖

右吹咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用

阿膠 煎者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩夏一兩 春秋七錢半 冬五錢 白朮二兩 不見火 茯苓七錢半 不見火

陳皮 三兩

丹溪心法并余方卷二十一

右為末粥丸服

達生散 又名東胎散

大腹皮 三錢 人參

陳皮 各半 白木

芍藥 錢

紫蘇 莖葉半錢 甘草 炙二錢 歸身尾 一錢

右作一服入青葱五葉黃楊腦七箇此即黃楊樹葉稍

兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十

數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有

別証以意消息于后

○氣虛加參朮 氣實倍香附陳皮 血虛倍當歸加

地黃 形實倍紫蘇 性急加黃連 有熱加黃芩

濕痰加滑石半夏 食積加山楂 食後易飢倍楊黃

腦 有痰加半夏 腹痛加木香桂

又方 第九箇月服

黃芩 一兩酒炒不宜涼 白朮 一兩 枳殼 錢半

滑石 七錢半臨月十日煎

右為末粥丸梧子大每服五十九丸空心熱湯下多則恐

損元氣氣實人宜服

又方 安胎

白朮 黃芩 炒麴

右為末粥丸服 一本云用條芩一二兩為末每一錢

丹溪心法中餘症前卷二十一

或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰度者有熱須用二陳湯

入方

白朮 不以多

右為末水丸隨所好或湯或水下

子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子 炒用

右為末米飲吞下或丸服

二因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮 五兩 茯苓 四兩 當歸 各二兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去渣空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲 治妊娠轉胞

參朮飲 治妊娠轉胞

四物湯加 人參 白朮 半夏製 陳皮 甘草

右吹咀入生姜煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉 阿膠 當歸 川芎各三兩 甘草一兩

右每服五錢水煎次下膠令洋溫服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時服野天麻散膏白湯調下油蜜小便和極勻治難產入方

砂仁 香附醋煮 枳殼 甘草

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末

催生

白芷灰 百草霜 滑石

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服

天麻丸 易產

天麻即益母草六月間連根採陰乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在三四箇月五箇及七箇月除跌撲損傷不拘外若前次三四箇月而墮則下次必如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也遇有半產者產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇半月後即服固胎藥十數服以防三月之墮至四箇半月後再服八九服防過五月又至六箇半月後再服五七服以防七月及至九箇月內服丹溪達生散十數服可保無虞其有連墮數次胎元損甚者服藥須多久則可以留方用四物湯加人參白朮陳皮

茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂白朮加黃製半夏調理妊娠在於清熱養血條芩實黃芩為安胎聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬猶鍾懸於梁梁軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因氣腦致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂少佐木香以行氣

附脉理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實在左浮大在右右女左男可以預剖離經六至沉細而滑陣痛連腰胎即時脫血瘦弦急而大者生虛小弱

者即是死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危
附諸方

驗胎方 經脉不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微
動則有胎也否則經滯

○胎動不安

安胎散 濟生方 治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎
氣腹痛下血縮砂不拘多少於熨斗內炒令熱却去皮
研為細末每服二錢熱酒調服艾塩湯亦可

川芎散 簡易方 治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹

癰瘕痛

南川芎為末每服二錢温酒調下

佛手散 大全良方 治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸 去芦酒浸

芎藭 各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸温服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉

阿膠

右二味水煎服

膠艾湯 濟生方 治妊娠或因墮仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黄 洗

艾葉 炒

白芍藥

川芎

黃芪去芦

阿膠蛤粉炒

當歸酒浸

甘草炙各一兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚同煎去滓空

心溫服

杜仲丸濟生方治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜

服之

杜仲去皮剉姜汁炒去絲

川續斷酒浸各二兩

右為末棗肉煮爛折和為丸如梧桐子大每服三十九

米飲下

安胎當歸湯大全良方妊娠五月舉動驚悸胎動不安

下墜小腹引腰脇小便疼痛下血

當歸

阿膠

川芎

人參各一兩棗子二枚

艾一虎口

右細切酒水各三升合煮至三升內膠令烊分二服復

中當安小便當安也一方有甘草無參棗

旋覆花湯大全良方療妊娠六七月間胎不安常處亦名

阻病

旋覆花一兩

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各三兩

半夏炒一兩

芍藥

生姜各二兩

右以咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去渣溫服食前忌

羊肉錫醋桃李雀肉

考藥湯

大全良方

治妊娠八月中風寒有所犯觸身寒盡

疼乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒特特小

便白如米泔或青黃寒慄腰背苦冷痛面目視茫茫

芍藥 一兩

人參

當歸

甘草 各二兩

厚朴 二兩

薤白 升

生薑 兩

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海

藻菰菜桃李雀肉等物

二香散 聖惠方 療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重宜服

香附子 一兩

藿香葉

甘草 各二錢

右為細末每服二錢塩沸湯調下

當歸湯 大全良方

治妊娠胎動盪心煩燥悶絕口乾橫生

倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安

飲

當歸 人參

各一兩

阿膠 炒

甘草 二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一握煎至八分

去滓温服一方無甘草有川芎厚朴產保方有川芎

阿膠散 大全良方 治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎

阿膠 炒

當歸 炒

陳皮 各一兩

甘草 二錢

生薑 三片

棗二枚

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分食前溫服

龍骨散 大 全 良 方 因藥損胎下惡血不止

龍骨 當歸 地黃各八分 艾葉炒四分 地榆

阿膠 芍藥 乾姜各六分 蒲黃五分 牛角腮炙焦三分

右為末食前米飲調二錢服

當歸散 大 全 良 方 療婦人經被驚惱胎向不安小腹痛連

腰下血

當歸 川芎各八分 阿膠炒 人參各六分 艾葉四分

大棗 二枚 茯苓 十分

右咬咀每服八錢生薑文三片水一鍾半煎至八分去滓食前溫服

一方 治胎動出血產門痛

用黃連為末酒調一錢日三服

立聖散 胎動不安下血不止

用雞肝二具好酒一斤煮熟共酒食之大効

金匱當歸散 妊婦宜常服之

當歸 川芎 白芍 黃芩各一兩 白朮半兩

右五味為末酒飲調服方寸七日二次 或用酒糊為

丸如梧桐子大每服五十九丸茶湯任下空心食前服日

丹溪心法附錄卷之二十一

三次

此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有姙娠則碍脾運化遲而生溫溫而生熱古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥溫黃芩清熱故也况姙娠賴血以養此方又加當歸川芎白芍以補血尤為備也服此劑之後名為易產所生男女無無胎毒則痘疹稀少無病易育而聰明智慧不假言矣此端本澄源之事也累試累驗

安胎飲 未類錄方治懷胎三四月至九月惡阻病者心中

清悶頭重目昏眩四肢沉重懈墮不欲動作惡聞食氣欲吃酸酸睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腹腸疼痛或時下血及姙娠一切病疾並皆治之

甘草

茯苓

去

當歸

去

川芎

熟羊

酒蒸

白朮

黃芪

去

白芍藥

半夏

湯洗七次

阿膠

始粉

地榆等分

右咬咀每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分去滓溫服不拘時候 一方無半夏地榆有人參桑寄生 一方無白朮黃芪半夏地榆有艾是膠艾湯加白茯苓

安胎和氣飲

濟生方

治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大

便虛滑

訶子去核炒 白木各一兩 陳皮去白 高良姜炒 木香不見

陳米炒 甘草各半兩

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎服忌食生冷之物
大聖散濟生方 治妊娠忪悸睡裏多驚腹脇膨脹坐卧不寧

白茯苓去皮 川芎 麥門冬去心 當歸去芦酒浸

黃芪去芦 木香不見 人參 甘草各半兩

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去滓温服
芎藭補中湯濟生方 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致致

月而墮

乾姜炮 阿膠炒 芎藭 五味子各一兩

黃芪去芦 當歸去芦 白木 赤芍藥各一兩

木香不見 人參 杜仲去皮 甘草各半兩

右吹咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

益母丸醫方大全 專治產難橫逆併安胎順氣

用益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不是五月
五日採其葉莖陰乾不見日忌鉄器以石磨為末練蜜
丸如彈子大每服一丸臨產時以童子小便温酒送下
若氣不順木香人參湯或艾醋湯下

積實栝榔丸 宣明方 安養胎氣和調經候破癥瘕癖塊有

似姪孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

積實生栝榔 黃連 黃蘗 黃芩 當歸

阿膠及炒研 木香各半兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十九日進三服

黃芩湯 宣明方 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩各等分

右為末水和二三錢水二鍾入當歸一根同煎至一鍾

溫服

黃芪散 大全良方 療姪娠胎不長宜服安胎和氣思食利

四肢

川芎 甘草各五錢 黃芪 白朮 陳皮

麥門冬 白茯苓 前胡 人參各二錢

右咬咀每服八錢生姜三片棗二枚水一鍾半煎至八

分食前服

知母丸 聖惠方 治月日未足而似欲產腹痛者

用知母為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九溫酒爵下日

一服一方如梧桐子大每服二十九粥飲送下

槐子丸 大全良方 治姪娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃等分

右為末用煉蜜丸如梧子大温酒下三十九以痛止為度

○胎漏

如聖湯 濟生方 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸酒去芦 熟地黄酒蒸 白芍藥 川芎

阿膠蛤粉炒 川續斷酒浸 甘草炙各等分

右吹咀每服四錢水一鍾葶根少許姜五片同煎温下

桑寄生散濟生方 治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸酒去芦 桑寄生 川續斷酒浸 川芎 白木

香附子炒去毛 阿膠蛤粉炒 人參 茯神去木各一兩 甘草炙

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去渣不拘時

温服

二黃散 拔萃方 治婦人胎漏下血

生地黄 熟地黄 各等分

右為細末煎白木枳殼湯調下二錢食前服

枳殼湯 拔萃方 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼去穢炒 黃芩各半 白木 一兩

右為末水煎食前温服

秘傳當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血

當歸 川芎 艾葉 白木各一 人參

桑寄生 續斷 熟地黃各二

用水二鍾煎至一鍾去滓空心溫服

厚朴散 無故卒下血

阿膠二兩給粉炒 生地黃半斤搗

右以清酒三升將二味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨 一兩 蒲黃 半兩

右為末酒調每服二錢日三服

一方胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石菖蒲根搗汁三升以之

一方 用檉柳一兩為末葱白湯調下一錢

榆白皮散簡易方 治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮 葵根 大麻仁去殼 瞿麥各一兩 木通半兩

牛膝七錢半去

右以咀每服四錢水一鍾煎八分溫服

地黃當歸湯 治胎痛

當歸 一兩 熟地黃 二兩

右為末每半兩水煎良方等分為末蜜丸名內補允許

學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多

然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼

所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若不服為愈

○惡阻

半夏茯苓湯 和劑方 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

旋覆花

陳皮

去白

桔梗

白芍藥

人參

去芦

甘草

川芎

各半

半夏

炮二兩

赤茯苓

熟艾

各七錢半

右以咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熱服

茯苓丸 和劑方 治妊娠惡阻停飲憂聞食氣當與茯苓湯

煎送

赤茯苓

皮去

人參

去芦

肉桂

去皮

乾姜

炮

陳皮

各一兩

白木

葛根

甘草

枳實

去白

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

竹茹湯 和劑方 治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅

去白

人參

一兩

甘草

二錢

麥門冬

去心

厚朴

姜製各半

白茯苓

半兩

右以咀每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子

大同煎至八分溫服不拘時

小地黃丸 和劑方 治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參 去芦 乾姜 炮各等分

右為末用生地黃汁丸如梧桐子每服五十九丸白木湯下食前

參橘散 和劑方 治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓 去白各兩 橘皮 去白各兩 麥門冬 去心 白木

厚朴 姜製 甘草 炙各五錢

右以咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許煎七分去滓溫服

白木散 簡易方 治妊娠胎氣不和不進飲食

白木炒 紫蘇 各一兩 白芷炒 人參 各一兩 訶子

青皮 去白 川芎 各七錢半 甘草 二錢

右以咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分不拘時服旋覆半夏湯 濟生方 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

吐少起

旋覆花 川芎 細辛 洗去土 人參 甘草 炙各半兩

半夏 湯洗七次 赤茯苓 去皮 當歸 去芦酒浸 乾生薑 陳皮 各一兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去渣溫服人參半夏丸 濟生方 治妊娠惡阻醋心胸腹冷痛吐逆不食

半夏湯治人參 乾生薑各半

右為末以生地黃汁浸蒸餅丸如梧桐子每服四十九米飲下

白朮散大全良方治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮一兩 人參五錢 丁香二錢半 甘草一錢

右咬咀每服一兩生姜五片水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

人參橘皮湯聖惠方治阻病嘔吐痰水

人參去芦橘皮 白朮 麥門冬 甘草三錢

厚朴製 白茯苓各半

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片竹茹一彈煎至一鍾去滓食前溫服集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散大全良方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參五錢 丁香 藿香各半

右父咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯大全良方治婦人經候不調或不行身無病以病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞

食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿

作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎

人參 甘草各二錢半 白朮 香附子 烏藥

橘紅各五錢

右吹咀每服一兩水一鍾半生薑三片煎七分去滓溫服不拘時服或為末調服亦可子能令母盡

○子煩

竹葉湯簡易方 治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩 防風 麥門冬去心 黃芩各三兩

右吹咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

知母飲簡易方 治妊娠心脾壅熱咽隔渴舌煩悶多驚

赤茯苓 黃芩 黃芪各三兩 知母 麥門冬

片草各兩

右吹咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹歷同服

竹茹湯 大全良方 療妊娠煩躁或胎不動

淡青竹茹一兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散濟生方 治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬去心 防風 白茯苓各一兩 人參半兩

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分

温服

歸涼接命散 濟生方 治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎 苧根 白芍藥 麥門冬去心

當歸酒浸 白木各一兩 糯米半合 甘草錢五

右吹咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾去渣温服

麥門冬散聖惠方 療妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣

頭眩四肢沉重百節疼痛多用少起

麥門冬 子芩 赤茯苓 柴胡 赤芍藥

陳皮 人參 桑寄生 桔梗 甘草

旋覆花葶 生地黄二兩

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

食前温服

柴胡散聖惠方 治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡半一兩 赤茯苓 麥門冬各二兩 枳實去毛

人參 橘皮 甘草各三錢

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

温服無時

人參散聖惠方 治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅

乾口舌乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家耆根

黃芩

犀角屑各七錢半

甘草五錢

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服

○子癇

羚羊角散

未鎮鈔方

治妊娠中風頭項強直筋脉挛急言

語蹇澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角鎊川獨活

酸棗仁炒五加皮鎊薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

各四分

木香

甘草

各二分半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服

防風湯大金良方治妊娠中風卒倒心神悶辟口禁不能

言四肢強急

防風

寄生

葛根

各一两

菊花

防己

細辛

秦艽

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角

各半两

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

加竹瀝半合溫服不拘時候

葛根湯

聖惠方

療妊娠臨月因發風瘕忽悶憤不識人吐

逆眩倒少醒復發名曰子癇

葛根

貝母

牡丹皮

去心

防風

防己

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草各二兩 石膏 獨活 人參各三兩

右以咀每服八錢水二鍾煎至八分去滓溫服無時

防風葛根湯 妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生地黄各二兩 杏仁製

麻黃去節各二兩半 桂心少許 獨活 甘草 防已各一兩

右每服八錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

一考 妊娠中風角弓反張口禁語澀調之風痙亦名子

痙

麻黃去節 防風 獨活各二兩 桂心少許 羚羊角

升麻 甘草 酸棗仁 秦艽各半兩 川芎

當歸 杏仁製各七錢

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分加竹瀝一合

溫服

○子腫

全生白朮散簡易方 治妊娠面目虛浮肢腫如水氣名

曰子腫

白朮一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓皮各二兩

右為末每服二錢米飲調下不拘時

五皮散大全良方 治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 陳皮 生姜皮等分

右咬咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八分去滓溫服不拘時一方空心服

防已湯 脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢 木香二錢 赤茯苓 桑白皮

紫蘇葉各一兩

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服

如大便不通加枳殼枳榔

○子氣

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣

至於脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤洗署 香附子炒 陳皮 甘草 烏藥三分

右為末每服三錢水煎入姜三片紫蘇三葉木瓜三片

同煎空心食前服日三次腫消止藥

腎著湯大全良方治妊娠腰脚腫

茯苓 白木各四錢 杏仁 甘草各三錢

右咬咀每服八錢水一鍾煎至一鍾去滓通口食前服

○子淋

安榮散濟生方治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬去心 通草 滑石銹 當歸醋 燈心

丹溪心法附錄前卷一
甘草各半 人參 細辛各一

右為細末煎麥門冬湯調下不拘時

大腹皮散 濟生方 治妊娠大小便赤澁

枳殼去白 大腹皮 甘草炙 赤茯苓去皮

右為末每服一錢煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散 濟生方 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈

欲倒

冬葵子 三錢 赤茯苓去皮

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是

轉胞加髮灰少許極妙

○轉胞

八味丸 治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋方見補

全生茯苓散 簡易方 治妊娠小便不通

赤茯苓 葵子各等分

右吹咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方

加髮灰少許同服極効

○子懸

紫蘇飲 濟生方 治胎氣不和湊上心腹脹痛疼謂之子

懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去白 紫蘇葉

丹溪心法附錄前卷一

當歸 去芦酒浸 人參 甘草 各半兩

右吹咀每服四錢水一鍾生姜五片葱白七寸煎至七分空心温服

香木散 大全良方治妊娠五箇月已後常常胃腹間氣刺滿痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王師復處此方三服而愈

莪朮 煨一兩 丁香 五錢 甘草 半錢

右為細末每服一錢空心塩湯調吞胃如物推下之狀
○廣按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胃腹之間

氣刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物忤不能自決而憂思忿怒沉鬱于中丹溪云氣鬱便成火火載胎上榮衛不通則心腹之間脹滿痛俱作也宜矣
○兒在腹中哭 經驗方

用多年空屋下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止
又方 經驗方

用川黃連濃煎令母哈之

○鬼胎
斬鬼丹 鬼胎如抱一瓮

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 白殭蚕

丹溪心法附錄卷二十一

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出惡物愈

○風寒熱病

表虛六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯 四桂枝

地骨皮 各七錢

表實六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊惡寒太陽經病宜合

四物湯 四麻黃

細辛 各半兩

風濕六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼

脉浮而漻頭痛太陽標病也宜服

四物湯 四防風

蒼朮 製各七錢

升麻六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發

斑如錦文宜服

四物湯 四升麻

連翹 各七錢

柴胡六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽頭昏項強宜服

四物湯 四柴胡

黃芩 各七錢

大黃六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本病也急下之宜服

四物湯

四日

大黃 五錢

桃仁

十箇 去皮

人參六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯

四日

五味子 各五錢

厚朴六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯

四日

枳實 各五錢

梔子六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯

四日

黃芩 各五錢

石膏六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉

長而大者宜服

四物湯

四日

知母 各五錢

茯苓六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒小便不利太陽本病也宜服

四物湯

四日

澤瀉 各五錢

琥珀六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜服

四物湯

四日

茯苓 各五錢

膠艾六合湯 聖惠方 若妊娘傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜服

四物湯 四兩 阿膠

艾葉 各半

一方如甘草同上一方加乾姜甘草黃耆

附子六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹

中痛脉沉而遲少陰病也宜服

四物湯

四兩 附子

炮去皮桂各半兩

四物大黃湯

聖惠方

若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下

宜服

四物湯

四兩 生地黃

大黃酒浸各五錢

芎蘇散

治生方

治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心

胃煩悶

紫蘇葉

川芎

白芍藥

白朮

麥門冬 去心

陳皮

去白

乾薑

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白三寸煎服

白朮散

後萃方

治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐

逆不下食

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

赤茯苓

各一兩

甘草

半夏

湯炮七次姜汁炒各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎去渣溫服

無時

升麻散

後萃方

治妊娠傷寒頭痛身體熱

升麻散 後萃方

三

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃

去節各一兩

黃芩

大青

各半兩

石膏

二兩

右為粗末每服四錢生姜四片竹葉二七片水同煎一

芍藥湯

按萃方

治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下

脈沉者太陰也宜服此藥

芍藥

白朮

各一兩

甘草

茯苓

各五錢

黃芪

二兩

右剉細每服一兩水煎服

麻黃散

聖惠方

治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩

右咬咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓

通口服

前胡湯

全良方

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏

十二分

前胡

六分

甜竹葉

三分

黃芩

一分

大青

各五分

知母

梔子

各三分

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓

溫服不拘時外甚無甜竹葉

黃龍湯

聖惠方

治婦人妊娠寒熱頭痛黑黑不欲食脇下

痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水

適來適斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡

去蘆一兩

黃芩

人參

甘草

各三錢

七分半

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時
枳實散 聖惠方 治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹
上氣渴不止飲食不多腰疼躄重

枳實炒一錢 陳皮半錢 麥門冬去心半兩

右吹咀每服一兩水一盞半生姜半錢葱白七寸煎至
八分溫服

麥門冬湯 聖惠方 治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食

胎動不安

人參 石膏各一兩 前胡 黃芩各七錢半 家葛根

麥門冬 各五錢

右吹咀每服一兩水二盞生姜三片棗二枚竹茹一錢
半煎至一盞去滓溫服不拘時

秦艽散 傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語嘔逆

秦艽 柴胡 石膏 前胡 赤茯苓

甘草節 葛根 犀角屑 升麻 各等分

右每服八錢水二盞姜三片竹茹三錢煎至八分溫服

○廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語
吐逆此即溫熱病之證候也古方溫熱病皆謂之傷寒
多不分也用者審之

黃芪解肌湯 聖惠方 治妊婦傷風自汗

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草各半兩

芍藥六錢

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時加蒼朮生地黃亦可

柴胡散聖惠方治妊娠熱病骨節煩痛頭痛壯熱者熱不

治則損胎

柴胡

葛根

知母

梔子

甘草各五錢

石膏三兩大青

茯苓

升麻各七錢半

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三十煎至八分去滓通口服不拘時候一方有黃芩無茯苓

梔子仁欬子大全良方治妊娠熱病斑出黑色小便如血

氣急絕胎欲落

梔子仁 升麻

石膏

地黃各二兩黃芩

大青各一兩豆豉十四粒

救急方有杏仁死地黃石膏

右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去滓溫

服死時一方加青黛无大青又方以陳艾如雞子大酒

煮服救妊婦危困

大黃欬子聖惠方治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便

秘澁煩熱

大黃微炒 石膏各一兩 知母 前胡 赤茯苓

施子仁 甘草 黃芩各五錢

右吹咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去滓溫服食前

柴胡石膏湯聖惠方治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶亂四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服

柴胡四兩 甘草二兩 石膏八兩

右吹咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服死時若氣虛身冷加人參四兩

傷寒熱病護胎法

一方 用白藥子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上如碗大貼臍下胎存處乾以溫水潤之

一方 以竈心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢

一方 牡熱甚井底泥敷心下令胎不傷

○雜病

消風散濟生方治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩日暈腮項腫核脅膈涎壅

石膏煨 甘菊花去枝 防風去芦 荆芥穗 川羌活去芦

川芎 羚羊角錫 大豆黃卷如 當歸去芦 白芷各一兩

甘草炙半兩

右咳咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去滓
食後溫服

天門冬飲子 齊生方 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊明

天門冬去心知母 荒蔚子各一兩防風去半兩五味子

茯苓去皮川羌活去人參各半

右咳咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去滓食後
溫服

百合散 齊生方 治妊娠風寒咳嗽痰喘滿悶

百合蒸紫苑茸洗只母去心白芍藥 前胡去

赤茯苓去皮桔梗各一兩甘草炙五錢

右咳咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分去渣溫服
不拘時

百合散 聖惠方 治妊娠咳嗽心胃不利煩滿不食

川百合 紫苑 麥門冬 桔梗 桑白皮各二兩

甘草半兩竹茹一團

右咳咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙
再煎一二沸去滓食後溫服

紫苑湯 永刻鈔方 治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草 杏仁 桑白皮各二錢紫苑 天門冬去心

桔梗半兩

右吹咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓
入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散 大全良方 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢

陳皮 大腹皮 紫蘇 桑白皮 各兩五 五味子 七錢

右吹咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓
食後溫服

平安散 濟生方 治妊娠上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴 生薑 各二錢 乾姜 炮 陳皮 去白各一錢 川芎 半錢

木香 二錢 乾地黃 洗一錢 甘草 炙四錢

右吹咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

驅邪散 濟生方 治妊娠停食感冷發為瘧疾

高良姜 炒 白朮 草果仁 橘紅 藿香葉

縮砂仁 白茯苓 去皮各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

柴胡散 治妊娠瘧疾

黃芩 半錢 甘草 一錢 柴胡 生大黃 各二錢

右作一服水前臨發日五更溫服取利為度如胎上逼
心可服枳殼散忌油麪辛酸之物

一方 治瘧疾發熱口乾渴飲無度

生地黃二兩 黃芩

麥門冬心 人參

知母

乾葛各一兩

石膏二兩 甘草半兩

右每服一兩水一鍾半烏梅半箇煎至一鍾溫服

一方 治瘧疾

常山

石膏各一兩 甘草炙

黃芩各半 烏梅七箇

右作二服每服酒水各一碗浸一宿平旦煎服

蒙姜黃連丸 濟生方治姙娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆

可服之

乾姜炮

黃連去須 縮砂仁炒

川芎

阿膠蛤粉

白木略一

乳香三錢 枳殼去白

右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子

每服四十九丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯下 赤白痢乾

姜甘草湯下

當歸芍藥湯

濟生方治姙娠腹中疝痛下痢

白芍藥

白茯苓 當歸酒浸 澤瀉

川芎各一兩

白木半一兩

右為末每服三錢空心溫酒米飲任下

白木湯 治孕婦下痢膿血

白木

黃芩

當歸各一兩

用水二盞煎至一盞去渣溫服食前

大龍散 長萃方 治妊娠氣痛

艾葉末 鹽炒一兩半

茴香

川練子 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服

白木湯 千金方 治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木 三兩去黑心

赤芍藥 二兩

黃芩 二兩去黑心

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘

時忌桃李雀肉

當歸散 全良方 治妊娠中惡心腹疔痛

當歸

丁香

川芎

青皮

吳茱萸

各三兩

二兩

半兩

去梗湯泡三次

右為末 無時溫酒調一錢服

芎歸湯 按萃方 治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸

當歸

各三兩

厚朴

各三兩

白芍藥

各二兩

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

候一方有桔梗無官桂

○廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈

甚則此方與前白木湯中皆犯藥禁未知果乎否乎

食公下氣湯 大全良方 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下

飲食四肢無力

羌活 赤芍藥 甘草 枳殼 青皮

大腹皮 陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

官桂各五錢 紫蘇二兩

右以咀每服八錢生姜五片棗一枚水一盞半煎至八分去滓溫服食前

勝金散 濟生方治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸酒浸炒 陳皮去白 生姜 乾姜炮 川芎

厚朴去皮 縮砂仁炒 甘草各等分

右為末每服二錢塩湯調服不拘時

通氣散 大全良方治妊娠腰痛然不可忍此藥神妙

破故紙不以多少上炒令香熟

右為末嚼胡桃肉半箇空心温酒調下二錢

消熱飲子 聖惠方治妊娠時氣六七日熱甚大小便不利

最宜服之

川芒硝研一兩細 葵子搗三兩

右為末每服五錢温水調下死時一方水二大盞煎至

一盞三分去滓不計時温服

一方 治孕婦大便秘澀 大全良方

枳殼煨炒 防風法切 針草炙一兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散 濟生方 治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇炙為細末每服二錢空心米飲調下

白薇散 濟生方 治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥 各等分

右為末每服三錢食前溫酒調服

○瘦胎

瘦胎枳殼散 簡易方 治妊娠七八月常宜服滑胎易產

枳殼 粉甘草 一兩半 商州枳殼 五兩 去白

右為末每服一錢空心白湯點服一方加香附子尤佳

○廣按前人云枳殼散性寒若單服之恐有胎寒胎

痛之疾以地黃當歸湯蜜丸 佐之可也 說見前

地黃當歸湯 補血養胎方 枳殼散間服蓋枳殼散破氣

有餘而地黃當歸湯補血不足也方見前

救生散 濟生方 治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益

氣易產

人參 訶子 煨去 白朮 神麩 陳皮 各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

○催生

催生如聖散

黃葵花 不以多少焙乾

子與心去寸餘有赤二一

右為末熱湯調下二錢神効 或有漏血胎臟乾澀難
產扁刺者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下
如死花只以蜀葵子研爛小半合以酒調尤妙 亦治
打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下 經驗方用
子四十九粒或三十粒歌曰黃金內子三十粒細研酒
調能備急命若懸係在須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散 濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神妙佛手散 大全良方治婦人妊娠五七月因事築

壅着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此

藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸六錢 川芎四錢

用水一盞半煎令泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓

溫服口禁灌之如人行五里再服不過二三服便生

催生如意散 聖惠方臨產惡疼方可服

人參 為末 一錢 乳香 一錢 辰砂 五分

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用

姜汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安

催生神効七寶散 大全良方臨產腰痛方可服

玄胡索 沒藥 白礬 香白芷 焙姜黃 焙

當歸

桂心 等分

右為細末每服三錢燒犁頭令紅淬酒調下臨陣疼時服一一服立產

催生如神散 聖惠方 治逆產橫生瘦胎煎產前產後虛損月脉不調崩漏等証一名催生黑散子一名烏金散一名二神散

百草霜 白芷 不見火為末

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用童子便酒各半盞煎沸即調停熱服甚者不過再服

催生丹

簡易方 治產婦生理不順臨辱艱難

十二月兔腦髓去皮膜研乳香研如粉母丁香末錢一分

射香細研

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾油紙各封貼每一丸破水後溫水下即時產下隨男左女右手握藥出是驗

催生鉛丹

濟生方 治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔投水銀一錢急攪結成砂子傾出以熟絹衣角紐作丸子如棗豆大臨產時射香水吞下二丸立下

催生散 懷孕不會行動舒伸忍痛曲身不卧故子在腹中不能轉動致有橫逆難產甚則子死腹中

蛇退 一條 蟬退 二七人退 即男子面髮一團如雞冠

右俱燒為末酒調下分作三服

一方

用蛇退一條全者燒灰入荆香一字酒調二錢面東服如橫生逆產以餘渣塗所出手足即順也

一方

用草鞋鼻繩路上者洗淨燒灰末童便和酒調服一名馬

滑胎散聖惠方催生神効

益元散 一兩方見

男子亂髮 香油一兩 蟬退全者五箇

穿山甲 一片燒灰存性

右為細末用藥水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷

定服之立下

○產難

無憂散 濟生方 治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難產

當歸 川芎 白芍藥 各二兩 枳殼 兩 炒半 乳香 三錢

木香 甘草 各一錢半 血餘灰 三錢

右為末每服二錢水一盞煎至八分溫服不拘時

金液丸

濟生方

治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛

火燒如灰下

血餘灰

無病女人髮

硃砂別研

公母羊糞

燒灰各半

竈心土一錢

黑鉛二錢用鐵子火上鎔投水銀半錢急攪結成砂

右為末用粽子角為丸如菘豆大遇難產以倒流水吞

五丸

乘甦散

濟生方

治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭

眩目暈口噤面青髮直不省人事

木香

神麩炒

陳皮

麥蘖

黃芪

去苦

生姜

切炒

阿膠

白芍

各一錢

苧根

三錢

甘草

三錢

糯米

一合

右用水三盞煎至一盞半幹開口灌之連進為妙

二退散

治產難

蛇退

全條

蚕退紙

一方

以

右二燒存性為細末酒調服

雲母散

橫生逆產

用雲母石按成粉每服一錢酒調下

救生散 橫生逆產

用桂心為末童便酒調一錢服之神効

一方 治產難

用腦月兔頭一枚燒灰為末葱白湯調二錢立生 又
或吞雞子黃三箇并少苦酒服之立生 又或用赤小
豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一两同煎
少時一服五合 又用槐子十四枚即下 又方當歸
為末酒調方寸七服之

一方 治難產三日不下

用伏龍肝細研每服一錢酒調服之

方 治胞衣不下

取皂屋黑塵研為細末酒調方寸七

黑龍丹 濟生方 治姪娠臨產難生或胎衣不下產後血暈

不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血帶淨
腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛
或類癰疾胎前產後一切聲急狼狽垂死以此藥灌三
四丸無不救活者

五靈脂 當歸 酒浸 生地黃 川芎 良姜 各三兩

右剉入砂鍋內紙筋塩泥固濟炭火煨通紅候火滅冷
取出研細入後藥

百草霜 乳香 生硫黃 琥珀 花藥石

右五味計一两一錢細末同前藥和勻米醋煮麪糊為
丸如彈子大每要服用炭火煨藥通紅投入生姜自然

汁浸碎之以無灰酒併合童便頓服神効不可盡述
內灸散 和濟方 治婦人產前產後一切血疾血崩虛備腹
脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下
五色腹中虛鳴氣滿墜脹瀝血腰疼口吐清水頻產血
衰顏色青黃勞傷勞弱月經不調下血墮胎血迷血暈
血痕時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不
乾躰虛多汗手足逆冷並宜服之 方見前經病類下

○死胎

香桂散 大全良方 下死胎

射香 半錢 官桂 三錢

右共和勻用溫酒一盞調服須臾如手推下

一方 治胎死腹中或半產不下 產寶方

官桂 五錢 牡丹皮 川芎 葵子 各一錢

右為細末每服三錢前葱白湯下

一字神散 大全良方 治子死腹中胎不下胞破不生此方

累有効驗

鬼白 不拘多少黃色者去毛

右研為末以手指撚之如粉極細為度此藥不用羅每
服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神
一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝為末每服二錢順流水調下甚者溫童子小便
調服胎下母活亦治胎衣不下

霹靂奪命丹 濟生方 治臨產驀然氣痿目翻口禁面黑唇

青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿
令婦妾雞犬見之

蛇退 一條入瓦罏 金銀箔 各七片 丁香 半錢

髮灰 一錢 馬鳴 即蚕退燒 黑鉛 二錢

水銀 七分半依前 千金馬 略上左吻舊草鞋一隻

右為末以饋猪心血丸如梧桐子倒流水灌下二九如
灌不下研開亦得

如聖膏 大金良方 治難產兼治胞衣不下無治死胎

用草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速洗
去不洗腸出却用此膏塗頂上腸出縮入如聖之妙
一方用四十九粒

廣按產前諸証皆因胎氣所致夫胎動胎漏皆下血
而胎動有腹痛胎漏無腹痛為異稱故胎動宜行氣
胎漏宜清熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者
煩躁而悶亂心神也子癩者痰涎潮搐目吊口禁也
子腫者面目虛浮肢腫滿也子氣者兩足浮腫也
子淋者小便澁少也轉胞者小便不通也子懸者心

胃脹痛也蓋脾主運化水穀婦人有胎則脾運化水穀不利而生濕濕則生痰痰生熱熱生風也子腫子氣者濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也子癩者風也子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消之熱則清之風則平之氣則散之虛則補之何為而不愈哉外有風寒熱病雜病之條者用藥要去邪保胎之並行有催生難產死胎之目者治法有緩急輕重之少異業醫者其可忽乎

產後

九十六

壬集

○產後無得令虛當大補氣血為先雖有雜証以末治之一切病多是血虛皆不可發表 產後不可用芍藥以其酸寒伐生發之氣故也 產後血暈因虛火載血上行漸漸暈來方用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同童便唯下一呷即醒行血極快 又方以韭菜細切盛於有紫瓶中以熟醋沃之急封其口以紫塞產婦鼻中可愈眩冒之 產後中風切不可作風治必大補氣血為主然後治痰當以左右手之脈分其血氣多少而治 產後中風口眼喎斜切不可服小續命湯 產後水腫必用大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利 產後大發熱必用乾姜輕

者用茯苓淡滲其熱一應寒苦并發表之藥皆不可用
產後發熱惡寒皆屬血虛 左手脉不足補血藥多於補
氣藥 惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是 產後
發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥蘖二兩炒研細末
清湯調下作四服 有子者用木通通草猪蹄煎服 凡
產後有病先固血氣 前條云產後大熱必用乾姜或曰
用姜者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以
補陰藥大劑服之且乾姜能入肺和肺氣入肝分引血藥
生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非
天下之至神孰能與於此乎 產後脉洪數產前脉細小

澁弱多死懷孕者脉主洪數已產而洪數不改者多主死
之

入方 產後補虛

人參 白朮 一錢 茯苓 歸身尾 陳皮

川芎 各半錢 甘草 各三分 有熱加黃芩一錢

生姜三片水煎服

產後消血塊方

滑石 三錢 沒藥 二錢 血竭 二錢 如無以
壯丹皮代之

右為末醋糊丸 如惡露不下以五靈脂為末神麩丸

白朮陳皮湯下 瓦礫子能消血塊

又方

血竭

五靈脂

右為末消產後血塊極好

又方 治產後泄瀉

黃芩

白朮

川芎

茯苓

乾姜

滑石

陳皮

炒芍藥

甘草

右吹咀水前服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂

香附

一方加蛤粉

右為末醋糊丸甚者入棗仁不去尖用

獨行丸

有孕者忌服

治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛

五靈脂

去土半炒半生

右為末水丸彈子大每一丸或酒或姜化下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參

二錢

白朮

二錢

桃仁

陳皮

各一錢

黃芪

茯苓

一錢

甘草

炙半錢

右吹咀水前褚羊胞後入藥作一服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故

丹溪心法附餘產後卷二

四

多發執浴法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從
治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲
食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱
者須審問服何飲食有無傷積胃膈飽悶愛氣惡食泄
瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補
血正法

附諸方

花藥石散 治產後胎衣不下極有神効

方用前跌藥
損傷類

奪命丹 濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或

去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急
取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子 炮去皮臍
半兩

牡丹皮 去心乾
一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如
梧桐子每服五十九溫酒送下

一方 產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

甲錦紋大黃一兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐
子大以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方 治產後生腸不收

用枳殼二兩去穢煎湯溫浸良久即入

一方 治婦人子宮不收

荊芥穗

藿香葉

臭椿皮

右等分吹咀煎湯薰洗子宮即入

一方 治婦人子宮太痛不可忍

五倍子

白礬

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方 治下胎或產後血上心已死

用鬱金燒灰存性為末每服二錢米醋一甲調灌之立

活

芎歸湯和劑方 治產後去血過多暈煩不省一切去血並

宜服之

芎藭

當歸

去芦酒洗 焙各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘時

腹中刺痛加白芍藥

口乾煩渴加烏梅麥門冬

發

寒熱加乾姜白芍藥

水停心下微有嘔逆加茯苓生

姜 虛煩不得眠加人參竹葉

大便秘澀加生地黃

橘紅杏仁

小便不利加車前子

腹脇膨脹加厚朴

血崩不止加香附子

咳嗽痰多加紫苑半夏生姜

腰疼膝痛加牛膝

心下疼痛加玄胡索

惡血不

下腰腹重痛加牡丹皮

子溪公去付余產後卷二十一

返魂丹 治生產一十六証 一名益母丸

野天麻 一名益母草方梗四五月節間 木香 五錢

赤芍藥 六錢 當歸 七錢

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青黑重便酒和勻煎沸化下

產後惡血不及脐腹刺痛重便和酒化下

產時面垢頰赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生不

順心悶欲死童便酒薄荷自然汁和勻化下鹽酒亦

可

○產後三四日起卧不得眼暗生花口乾煩躁心亂見

鬼狂言不省人事童便酒薄荷汁下

○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼溫米飲下

○產後浮腫氣喘小便澁咳嗽惡心口吐酸水脇痛無

力酒下

○產後寒熱如瘧臍腸作痛米湯下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便和酒

下

○產後大便秘心煩口渴童便酒化下薄荷自然汁亦

可

○產後痢疾月未滿食冷物與血相擊或有積聚湯化下

○產後身軀百節疼痛溫米飲下

○產後崩中漏下蓋是傷酸物狀如雞肝脊背悶倦糯米秦朮湯下桂枝湯下亦可

○產後食熱麩糲結成塊四肢無力睡後汗出不止月水不調又成骨蒸勞童便和酒下

○產後嘔逆虛脹酒下

○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下

○產後赤白帶下秦朮同糯米煎湯下

○廣按返魂丹功效不可具述其於產前清熱養血產後推陳致新無不可也有事之家理宜預備

黑神散和劑方治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心眩暈等証

黑豆炒半斤 熟地黄當歸酒洗 肉桂去皮 乾姜炮

甘草炙 芍藥 蒲黃各兩

濟生方除蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳

○廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用已足熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世

俗好溫惡寒之弊於此見之也

黑龍丹 治姙娠臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服之 方見前產

四味湯 聖惠方 療產後一切諸疾 纒方分 媿宜服

當歸 玄胡索 血竭 沒藥 各五分

右共二錢為細末用童子小便一盞煎六分通口服
如心膈煩加當歸五分 如氣悶喘急加玄胡索五分
如惡露不快加血竭五分 如心腹撮痛加沒藥五分

神仙索 金散 醫方大成 治婦人產後血暈血虛積血不散

寒熱往來自膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 金藤

川牛膝 麻黃 玄胡索 官桂 神麴

荊芥 粉甘草 雄黑豆 各一兩

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下不拘時候

方 治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作二服酒二盞前取一盞併

服如口噤幹開口灌之

血竭破棺散秘方治婦人產後血閉血迷血暈血勞吐血
男子傷力勞嗽吐血

乳香 血竭 箭頭砂各一錢

右為末巴豆仁研泥為膏磁器盛之如用丸如雞頭子
大婦人狗膽冷酒下男子冷酒下

清魂散濟生方治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或

漆器燒烟鼻中薰之須置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉 人參去 荆芥穗四錢 甘草各八錢 川芎二錢

右為末每服二錢熱酒溫酒各半盞調勻灌下

奪命散大全良方治產後血暈血入心經語言顛倒健忘

失志及產後百病

沒藥 血竭

右等分為末才產下便用童便與細酒各半盞煎一二
沸調下二錢良久再服其惡血自此下行更不衝上免
生百病專治婦人方只用白湯調下

七珍散大全良方論曰產後不語者何答曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明
了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如
此但服此藥

川芎 人參 石菖蒲 生乾地黄 各一

細辛 一錢 防風 辰砂 另研各

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散 大全良方 治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

○廣按產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心竅者前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥人多為熱痰瘦人多為熱血

卷荷散 按料方 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛也

露不快並皆治之

初出卷荷 一兩

紅花 二兩 當歸 一兩 蒲黃 經炒

牡丹皮 各一兩

右為細末每服三錢空心鹽酒送下二臍內用童子小便調下

大嚴密湯 濟生方 治產後血氣衝心時發痰痛甚者宜進

玄胡索湯 方見經病類

熟地黄 酒蒸焙

當歸 去芦 酒浸 川獨活 去芦 白芍藥

細辛 洗

吳茱萸 炒 桂心 不見火 小草

乾姜 各兩

甘草 炙半兩

丹溪公去付余能後朱二一

右吹咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

當歸血竭丸 聖惠方 治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胃痞悶及臍下堅痛

當歸 少 血竭 蓬朮 芍藥 各一兩 五靈脂 四兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸溫酒送下

或粥清下空心食前

荷葉散 聖惠方 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉 二兩 桃仁 半兩 去皮 劉寄奴 蒲黃 各

右吹咀每服四錢半童子小便一大盞生姜三片生地

黃一分煎至六分去渣熟服不拘時

失笑散 治產後心腹絞痛欲死者 方見經病類

紫金丸 大全良方 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作

寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不

思飲食亦療心痛與失笑散同

五靈脂 木剉去石 真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末

搜和在如櫻桃大每服一九水與童子小便各半盞煎

七分令藥化溫服少頃再服惡露即下久有瘀血成

塊月信不利者並用酒磨下

一方 治產後血塊腹痛

荆芥炒 川當歸炒 乾地黄洗 芍藥各半兩

蒲黃二錢半 紙炒赤

右同為細末每服三錢空心温酒調服

地黄散後萃方 治產後惡物不盡腹中疴痛

生乾地黄

當歸並炒各二兩

生姜半兩 細切如繩頭大 新瓦上炒令焦黑

右為細末姜酒調下二錢服

四神散和劑方 治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾姜炮 川芎 赤芍藥各等分

右為細末每服二錢温酒調下

當歸養血丸和劑方 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者

並皆治之

肉桂一兩 當歸去芦 牡丹皮 玄胡索各一兩

赤芍藥二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心用温酒米飲下

天仙藤散聖惠方 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤炒焦五兩

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下常患氣血用温酒調下

玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛時發寒熱

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 大黃

甘草 朴硝各一錢

右作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○廣授諸方治敗血心痛皆是溫劑熱則流通之理惟

此一方却是涼劑益為敗血凝滯發熱大便燥結者

誤也非大便燥結者慎不可用

一方 治產後敗血不止

生乾地黃 一兩

用石器內搗為末每服二錢食前熱酒調服連進三服

瑞蓮散 聖惠方 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 一百枚燒 棕櫚燒 灰存性 當歸各一兩 官桂二兩

檳榔 二枚 鯉魚鱗各七錢 川芎半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服或

時血崩此藥可治但進三服即止

紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花 蒲黃各等分

右為細末每服一錢酒調溫服 若胞衣不下以榆白

皮煎湯調服半兩立効

琥珀散 聖惠方 治產後經脈不調四肢煩疼飲食減少日

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生地黄

當歸各一
桃仁

赤芍藥

各五錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片煎至八分去滓無時溫服一方加桂心半兩

調經散 濟生方 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮

腫不可作水氣治之但調其經而腫自消又有去血過

多心虛易驚加生龍腦一握煎服

沒藥

研

肉桂

不見火各

赤芍藥

細辛

洗半錢

琥珀

別研

射香

半錢

當歸

各一兩

同芍藥

甘

草 錢 二

右為末每服二錢生姜汁溫酒任意調下

趁痛散

濟生方

治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼

痛

當歸

酒去

官桂

不見火

白朮

川牛膝

去芦酒浸

各半兩

甘草

錢 三

黃芪

去芦

獨活

去芦

生姜

各半兩

薤白 三錢

右咬咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半兩尤佳

愈風散

聖惠方

療產後中風不省人事口禁牙緊手足瘳

瘳如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心眼

倒吐瀉欲死

荆芥穗 焙 當歸身尾 各等分

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神口禁者幹開灌之或吹鼻中皆効 一方用蜜丸或麩糊丸如梧子大每服五十九丸空心米湯下

血風湯 產後諸風學急或痿弱無力

川芎 芍藥 當歸 熟地黄 秦艽

羌活 防風 白芷 白木 茯苓

右為細末一半煉蜜為丸如梧桐子大一半末温酒調下九千五七十丸

交加散 濟生方 治產後中風脇不得轉動

生地黄 五兩研取汁 生薑 五兩研取汁

右交互以汁浸渣一夕次日漬取盡汁各炒黃焙為末酒調服

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸 和劑方 治新產血氣俱傷脾胃不調百日内

宜常服

甘草 各二兩 人參 去芦 乾姜 炮 白木 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下千金散 治產後虛勞不能食

白木 茯苓 黃芪 各二兩 人參 川芎

芍藥

熟地黄

當歸

各一兩

肉桂

半兩

甘草

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片棗三枚同煎至一盞空心溫服

人參當歸散

和劑方

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱其証心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參

去芦

當歸

去芦

肉桂

去皮

白芍藥

二兩

麥門冬

去心各一兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入棗三枚煎溫服血熱甚老加

生地黄

當歸苗著湯

和劑方

治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

汗

當歸

去芦

黃芪

白芍藥

各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時增損四物湯濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡

露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸

去芦

白芍藥

川芎

乾姜

人參

各一兩

甘草

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

當歸羊肉湯 濟生方 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰羸勞

當歸去芦 人參各七錢 黃芪去芦 生薑半兩

右次咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去滓作六服早晚頻進

猪腰子粥 濟生方 治產後羸勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟粥蓋之如作盒生粥狀空心服之

熟地黃湯 濟察方 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食

無味

熟地黃酒一兩半洗 人參去芦 麥門冬去心各二兩

甘草炙半兩 栝樓根四兩

右次咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗二枚煎八分不拘時服

人參湯 宋類鈔方 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身 人參去芦

右等分為末猪腰子一隻去膜切作片子以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

大調經散 聖惠方 治產後血虛惡露未消氣未敗濁凝滯
柴衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣未
平之所為也

大豆 一兩半炒

茯神 皮一兩去琥珀一錢

右為末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

白茯苓散 聖惠方 治產後羸勞蓋因生產日淺久坐多語
運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘡狀

白茯苓 兩 當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黃 各半兩

右咬咀先用水二盞入猪腎一雙去脂膜細研生姜三

片棗子二箇同煎至一盞去腎姜棗入末藥五錢煮取
七分去滓食前分二服溫服

佛手散 大金良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽
有痰

當歸

川芎

黃耆 各一兩 柴胡

前胡 各二錢半

右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅
各一枚生姜一片煎至六分去滓溫服如有痰去烏梅
蓄龍湯 大金良方 治婦人寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛
嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘡并經水適
來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡四分 黃芩

人參

甘草各一錢八分

右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時服

增損柴胡湯 聖惠方 治產後經水適斷感于異證手足搐

一 搐交牙昏冒係屬上焦

柴胡八錢 黃芩四分

人參三錢

甘草四錢

石膏四錢

知母二錢 黃芪五錢 半夏三錢

右以咀每服八錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓溫服無時

增損柴胡湯 濟生方 治產後血羸發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分以咀每服八錢水一盞半生薑五片棗二枚煎

至八分去滓不拘時通口服

三之一湯 濟生方 治產後虛勞雖日久而脈浮盛疾

柴胡八錢 黃芩

人參

半夏洗

甘草炙

川芎

芍藥

熟地黃

當歸各三錢

右以咀每服八錢水二盞生薑三片棗一枚煎至八分

去滓溫服

三聖散 濟生方 治產後日久虛勞針服藥俱不效者

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

白朮

白茯苓 黃芪各一兩 柴胡 人參各一兩六錢

黃芩 半夏 甘草各六錢

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分去滓通口食前服一方無姜棗

○廣按已上五方小柴胡湯加減法也率者對證而用則中肯綮矣

○已上諸方補虛退熱之劑

蒼朮理中丸 產後元氣虛弱脘腹疼痛泄瀉不止又治男子脾胃虛弱久泄不止

人參一兩 白朮二兩 乾姜一兩 甘草炙各五錢

肉豆蔻七錢累炒

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九空心米湯下酒煮麪糊為丸亦可

調中湯濟生方治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞泄不止

良姜炒 當歸酒浸 肉桂不見火 白芍藥 附子炮去

川芎各一兩 甘草炙 人參各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

白朮散 聖惠方治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘皮 麥門冬 人參 乾姜炮各一兩

丹溪心法附錄卷之二十一

甘草炙半兩

右吹咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓服無時

枳實芍藥湯 聖惠方治產後腹痛煩滿不得卧

枳實燒存性芍藥

右吹咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時 一方為末服方寸七日三

抵聖湯 濟生方治產後血氣傷干脾胃腹痛悶嘔逆惡心

赤芍藥 半夏湯泡 澤瀉 蘭葉 陳皮去白 人參略二

甘草炙一兩

右吹咀每服四錢生姜七片煎服不拘時

觀脫丸 濟生方治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛

高良姜炮 姜黃洗 葶澄茄 陳皮去白 蓬朮炮

人參 京三稜炮 各一兩

右為末用蘿蔔熯火煖令極熟研爛將餘汁煮麩糊丸如梧桐子每服五十丸就用蘿蔔湯送下

○廣按已上六方皆為產後脾胃虛弱飲食過傷遂成諸疾而作也

旋覆湯和濟方 產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞

舌重

麻黃去節柴胡 杏仁去皮尖 五味子去梗

旋覆花 甘草炙 茯苓 赤芍藥 荆芥去梗

半夏各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分温服

芎烏散 治產後頭痛

天台烏藥 川芎莖

右為末等分每服三錢酒和鍾淬酒服

二母散 聖惠方 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風

痰嗽用尋常傷風藥不效宜服

知母 貝母 白茯苓 人參各五錢 桃仁去皮尖

杏仁去皮尖

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後温服

參蘇飲 聖惠方 治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參一兩 蘇木二兩 隨碎

右用水二碗煮取一碗去滓調人參末隨時加減服

丁香散 聖惠方 治產後心煩咳噫不止脾胃虛寒衛氣厥

逆

白芷

丁香

各五錢

伏龍肝一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散

聖惠方

治氣吃噎又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮石一兩半

白茯苓一兩

丁香半兩

右為細末每服三錢米飲調下不拘時

漢防已散 大全良方 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮各一兩

商陸

甘草各七錢半

右次咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓

溫服無時一方空心服

調導散 聖惠方

治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼各四錢製 甘草錢一

右次咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎去一

盞去滓溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 濟生方 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大

便閉澁

麻子仁另研

枳殼去白炒

人參

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒米飲任

下

橘杏丸 治產後體弱大便虛秘 一方見燥結類

一方 產後小便數及遺尿

龍骨 一两 桑螵蛸 半两炙

右為細末米飲調下二錢空心服

漏芦散 濟生方 治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏芦 半两 蛇蛻 炙十爪 薑十箇 急火燒存性

右為細末每服二錢温酒調下不拘時候仍吃熱羹助之

猪蹄湯 瘡寮方 治妳婦氣少力衰脉溢不行絕乳汁

猪蹄一隻 通草 五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁飲之

玉露散 大全良方 治產後乳脉不行身體壯熱痰痛頭目

昏痛大便澁滯悉能治之凉膈厭熱下乳

人參 白茯苓 耳草 各半 桔梗 炒 川芎

白芷 各一 當歸 二錢 芍藥 七錢半

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至分七分去滓温服食後如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁少

瞿麥 穗 麥門冬 去心 王不留行 紫龍骨

丹溪心法附錄卷之二十一

川山甲 炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以
木梳左右乳上梳三十餘下日三服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳意何如

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盃調八字

頂更揉散笑呵呵

一方 治產後陰腫痛

用桃仁去皮尖細研四五次抹之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入尤骨末少許空心連進二服用麻油
和湯薰洗

一方 治婦人陰冷

用吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎
高裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜證之劑

○廣按產後諸證其源有三曰血虛火動曰敗血妄行
曰飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽
虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動
而為煩燥發熱之類一也血猶水也水之就下性也

孟子云今夫水搏而躍之可使過顛激而行之可使在山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗血妄行而為頭暈腹痛之類二也經云少火生氣壯火食氣東垣云火為元氣之賊火與元氣不兩立一勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血氣火動則補之敗血妄行則散之飲食過傷則消之何患乎不愈哉雖然人之元氣有虛實疾病有淺深治療有難易又不可一槩論也

子嗣

九十七

附諸虛

斷子法

丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之類 若是怯瘦性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣宜涼血降火或四物加香附黃芩柴胡養血養陰等藥可宜 東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕出試効方

附脉理

脉訣萃要曰陰搏於下陽別於上血氣和調有子之象手

丹溪心法附錄卷之三

三

之少陰其脉動甚尺按不絕此為有孕少陰屬心心主
血脉腎為胞門脉應於尺或寸脉微閑滑尺數往來流
利如雀之啄或診三部浮沉一止或平而虛當問月水
婦人有病而無邪脉此孕非病所以不月

附諸方

六味地黄丸 見補損

女金丹 韓飛霞方

白芍藥 當歸 川芎不見 赤石脂白亦 藁本

人參 白薇 牡丹皮 桂心 白芷

白朮 白茯苓 玄胡 沒藥 甘草

十五味除石脂沒藥另研外其餘皆以醇酒浸三口烘
乾為細末足敷一十五兩

香附子 十五兩以水醋浸二日
畧炒為細末足十五兩

右十六味和合重羅數過煉蜜丸如彈子大滋銀器封
收每取七丸空心雞未鳴時服一丸先以薄荷湯或茶
濯漱咽喉後細嚼以温酒或白湯送下醎物乾果壓之
服至四十九丸為一劑以癸水調平受胎為度胎中三日
一丸產後二日一丸百日止及人事而不育焉天矣人
為鹵莽諉曰天命予每于世之嗣者惜焉

洗洗丸 和劑方 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉 一两半

肉桂 去錢皮 當歸 燒熟 地黄 洗焙各

白朮 半一两 川芎

石斛 酒浸炒各 乾姜 炮半两

白芍藥 牡丹皮 延胡索 各一两

右為末醋糊丸如梧桐子大每五十九空心温酒下

烏雞丸 治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨

蒸等疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許閉死去毛腸淨

用艾四两青蒿四两剉碎納一半在雞腸用酒壘一

隻納雞并餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二寸

許煖絕乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為

細末

南香附去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便

浸一分醋浸一分酒浸一分春秋一夏一冬四日取

出晒乾

熟地黄 四两 生地黄 三兩 當歸 酒浸洗三

川芎 三兩 白芍藥 三兩 遼人參 三兩 白朮 二兩 黃耆

川牛膝 去蘆二兩 柴胡 去蘆二兩 黃連 炒一兩 牡丹皮 二兩

白茯苓 去白二兩半 秦艽 半一兩 鱉甲 三兩 醋浸

知母 二兩 貝母 二兩 地骨皮 一兩 乾姜 一兩 玄胡索 一兩

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大

每服五六十丸漸加至七八十九溫酒下或米飲下亦得忌煎炒辛辣之物及菹菜

○補血新增

附諸方

當歸建中湯和劑方治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸去蘆肉桂去皮甘草炙白芍藥六兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心熱服

人參養血丸和劑方治女人血虛受素弱血氣虛損常服補衝任調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩熟地黃五兩當歸去芦人參去芦

赤芍藥 川芎 蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九溫酒米飲任下

六神湯御華院方治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩 地骨皮 黃芪各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

補中丸聖惠方治婦人虛損諸疾宜常服

丹溪心法附錄卷之二十一

川芎 白芍藥 黃芪 當歸 人參

陳皮各五錢 白朮 地黃各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九丸溫水下
八珍散瑞竹堂方調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲

食

四物湯 四君子湯

右等分姜三片棗一枚水二盞煎至一盞去滓溫服食
前

滋血湯御藥院方治婦人皮聚色落心肺俱損血脈虛弱
月水過期益氣養血調進飲食

人參 白茯苓皮去 川芎 當歸 白芍藥

山藥 黃耆 熟地黃各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

滋血湯大全良方滋養榮血補婦人諸虛治血氣久冷

當歸 川芎 芍藥 人參 麥門冬

牡丹皮 阿膠各二兩 琥珀七錢 半另研 酸棗仁炒

官桂 甘草各一兩 半夏麩一兩半

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去滓通

口服食前日三服

烏雞煎丸秘方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸

黃芪

各六兩

生熟地黃

香附子

各四兩

茯苓

三兩

人參

官桂

地骨皮

各二兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和炒麩丸雞頭子大喂雞服生膠吊死腸肚洗淨掃毛撻碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯研共為細末用汁打糊丸如梧桐子大每服五十九粒湯下

○斷子法用白麩麩一升無灰酒五升作糊糞至二升半瀝去滓可分作三服候經前一日晚次早五更及天明各喫一服經即不一不字行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病或交不時四者而已調其經而補其血去其病而節其慾夫如是則經調血足無病而交有時豈有不妊娠者乎雖然人之後嗣係乎天命亦或人事未之盡者可不究其心歟

諸病

九十八

新傳

壬集

加減四物湯 治婦人諸病

熟地黃

川芎

芍藥

當歸 各等分

右咬咀每服六錢用水一鍾半煎八分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中去血過多加艾葉阿膠

○血崩加生地黃蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩

○血虛腹疼微汗惡風加義木官桂

○風虛眩暈加秦艽羌活

○氣虛無力加厚朴陳皮

○發熱心煩不得卧加黃連梔子

○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜附子

○中溫身重無力身涼微汗加白木茯苓

○筋骨肢節疼及頭疼腦寒加羌活防風藁本細辛

○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川練子

○經水過多加黃芩白朮

○經水澁少加葵花紅花

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實麩炒

○經水暴下加黃芩

○血積塊痛加義木三稜官桂乾漆炒

○赤白帶下加香附官桂

○血痢加阿膠艾葉黃連

○產後血痢腹痛加槐花黃連罌粟殼

○血熱相搏舌乾口渴加栝蒌根麥門冬

○大渴引飲加知母石膏

○臟腑秘澀加大黃桃仁

○嘔吐加白朮人參藿香生姜

○虛寒滑泄加官桂附子炮

○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁

○目暴赤作翳疼加防風羌活防已酒浸龍膽草

加減四物湯大全良方治妊娠產前腹痛及治月事或多

或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多

或惡露不下宜服

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃各一兩

右咬咀每服一兩水二盞前至一盞去滓食前溫服

○妊娠下血神效艾葉六七片阿膠末一錢同煎病勢甚

大散藥不及以四味各半兩用水四盞煎至二盞半

去滓分四服食前熱服一日中令盡以止為度

○產乳服至三服止

○如虛弱血藏不調至一月止

○因虛致熱熱血搏口舌乾渴欲飲水者加天花粉一

兩麥門冬七錢半

○腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各二錢半

○血崩加生地黄蒲黃各一兩

○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢

○身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩桃仁二錢半炒

○如大黃滑泄加桂心熟附子各二錢半

○發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半

○嘔者加白朮人參各半兩

○腹脹加厚朴枳實各貳錢半

○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半

○煩躁大渴加知母石膏各五錢

○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各二錢半

○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各七錢半

經驗加減四物湯醫方大成治婦人諸虛不足

當歸酒浸一宿用身 熟地黃 白芍藥 川芎各一兩

右咬咀為散看病證加減後藥煎服

○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩

○胎動下血加熟艾一塊阿膠末一錢

○補下元加乾姜半兩芍藥七錢

○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩

○便血及帶下加荆芥地椒

○血氣滯澁內刺痛加桂

○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩

○血風勞加荆芥柴胡

○潮熱加前胡乾葛人參黃芩

○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢

○產後虛憊血熱煩悶加生地黄

○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

○產後寒熱往來加柴胡明冬各半兩

○經血淋瀝不斷加乾薑蓮房炒入藥

○血滯不通加紅花桃仁各二錢半

○產後悶亂加茯苓遠志各半兩

○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

○妊娠心腹煩加竹茹一塊

○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黄以生者易之

○大便閉加大黃桃仁各二錢半

八物湯聖惠方若經事欲行腹臍絞痛者血遊也宜服

丹溪心法十餘卷卷之二上

四物湯四錢玄胡索苦練碎炒黑檀榔木香各一兩

○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯

四物湯四兩黃芩白朮各一兩

○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯

四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少面色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加京三稜桂磨茂乾漆各二兩

八物湯聖惠方若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜

服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩

○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物身參蘇飲相合名補心湯主之

○若四肢腫痛不能奉動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯身調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎氣令人有子四物湯加縮砂四君子湯各半

名八珍湯

○若熱身血相搏口舌乾渴飲水加括麥麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臟秘結澁者加大黃桃仁

○若頭昏項強者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡薄荷

○若嘔者加白朮人參生姜

○若發寒熱者加乾生薑牡丹皮芍藥柴胡

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

○若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

○若產婦諸証各隨六經以四物身仲景藥各半服之

其效如神

○若婦人或因傷酒或因生產去血或虛勞五心煩熱者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黄黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黄加乾姜名

四神湯

○若諸痛有濕者四物身白朮相半加天麻茯苓川山

甲酒煎

○黃按婦人外感內傷一切疾病身丈夫同治惟月候

孕產崩漏滯下數證身丈夫異治也夫婦人以血為

海婦人伏於人者凡事不得專行每多憂思忿怒也

醫書云氣行則血行氣止則血止蓋婦人憂思過度

則氣結氣結而血亦結矣又云氣順則血順氣逆則

血逆蓋婦人忿怒過度則氣逆氣逆則血亦逆矣氣

血結逆於臟腑經絡之間所以婦人多腹脇諸痛內

外煩熱也然疼痛煩熱二者不可不分疼痛者血滯

也煩熱者氣滯也血滯以辛溫之劑治之氣滯以辛

涼之劑治之氣血俱滯而疼痛煩熱齊作者又當以

辛平之劑治之大抵婦人血用事氣行則無病而古

人治婦人之病多用香附縮砂木香檳榔青皮枳殼

者行氣故也抑嘗論之凡治婦人之病先問月候緊

要以月候如期為安先期而來者血熱也過期而來

者血虛也或疼痛或發熱者氣血鬱結也凡婦人之
病多是血氣鬱結故治婦人之病以開鬱行氣為主
鬱開氣行而諸病自瘥矣煩熱是二意煩者內煩也
熱者外熱也

丹溪心法附餘卷之二十二

壬集

小兒門

小兒諸病九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只

丹溪心法附餘卷之二十二

國家圖書館 NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞熬去三分之一去滓用新綿蘸滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知露無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽喘喘此類証並用湧法吐之重刺瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須蝦蟇汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服以平其氣驚有二証一者熱痰三急驚當吐瀉之一者脾虛乃為慢驚所以多死當養

脾急驚只用降火下痰益養血慢驚者先實脾吐後散風和只用硃砂安神丸更入於血藥中求之

○小兒驚然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣故也

入方黑龍丸治小兒急慢驚風

牛膽南星 一兩 青礞石 煨 兩等分 天竺黃 兩半
青黛 半兩 蘆薈 會 二錢 辰砂 三錢 殭蚕 半錢 蜈蚣 一錢半
燒存性

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚煎姜蜜薄荷湯下慢驚煎栝梗白木湯下

治驚而有熱者

人參 茯苓 白芍 酒炒 白朮

右咬咀姜煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散 見斑疹類

朱砂安神丸 見驚悸類

瓜蒂散 見痘類

○疳病或肚大筋青

胡黃連丸 治疳病腹大

胡黃連 半錢去 果積 去 呵魏 一錢半醋浸 神麩 二錢去

射香 四粒 炒黃連 二錢去 熟積 去

右為末猪膽汁丸和黍米大每服二三十丸白朮湯送

下 又云胡黃連丸十二粒白朮湯下

五積丸 治小兒諸般疳積

丑頭末 兩 黃連 半兩 陳皮 一兩 青皮 半兩 山柰 半兩

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半錢前藥末半錢宿蒸

餅丸麻子大小兒二歲十九五更姜湯下至天明大便

泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏屋丸

丑頭末 兩 青皮 三兩 史君子肉 七錢半 白蕪荑 二錢半

鷓鴣 五錢 蘆薈 一錢燒 苦練根皮 五錢

右炒令焦黑色為末麩丸麻子大每三五丸米飲送

下食前量小兒大小加減

黃龍丸

三稜 三兩 黑角義木 三兩 青皮 半兩 山查肉 七錢半
乾姜 七錢半

右用麩丸麻子大日曬乾食後姜湯下量兒大小加減

○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈 另研 切黃連 三錢 炒麩 四錢 黃連 白木

山查 炒半 蕪荑 炒二錢

右為末蘆薈和勻豬膽汁 粟米大每六十九食前米

飲下

疳黃食積

白木 黃連 苦參 山查

右為末麩糊丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸

白木 一兩 半夏 黃連 半兩 平胃散

右用粥丸食後白湯下二十九

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷
乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不調
其肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則

丹溪心法附錄卷三十一

痺之根生延及歲月五痺病成甚者胸陷帶歲乳食直
瀉腫滿下利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫痺勞
渴瀉面稿色天骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此
等類盧扁復生難施其巧

○子熱

炒芍藥 香附 滑石 一兩 甘草 三錢 黃連 二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星 一兩 切用白礬末半兩水 白附子 二錢

右為末飛白麪糊丸如芡實大每服一二十九丸姜蜜薄

荷湯化下

白附丸

牛膽南星 一兩 頂用黃粘牛胆臘月粉南星親手修

大陳半夏 半兩 粉白南星 一兩 切作片用臘月

乾枯白礬 二錢半

右為末宿蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加
薄荷葉

紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合

黑椒 四十九粒 浸透去 人言 一錢 鵝管石 一錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大

一、小兒空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲所傷

白朮 陳皮 青皮 山查 神麩炒

砂仁 麥蘖 甘草

受寒痛者加藿香吳茱萸有熱加黃芩

○小兒腹脹

蘿蔔子 蒸紫蘇 乾葛 陳皮等分 甘草減半

食減者加白朮煎服

小兒好喫糕成腹脹用白酒麩末同黃連末為丸服之

愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮 陳皮 赤小豆 蘿蔔子炒 木通各半

木香二分 甘草少

右咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜 莪朮 青皮 陳皮 神麩炒

茯苓 麥蘖 黃連 甘草 白朮

右為末調服 傷乳食吐瀉加山查 時氣吐瀉加滑

石 發熱加薄荷

丹溪心法卷之二十一

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名万安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連

黃芩

陳皮

甘草

右以水煎服

赤痢加紅花桃仁

白痢加滑石末

又方 治小兒食積痢

炒神麩

蒼朮

滑石

白芍

黃芩

白朮

甘草炙

陳皮

右吹咀水煎下保和丸一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青擣汁每服半錢與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡疥癩疹並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口瘡

戴云謂滿口生瘡者便是

江茶

粉草

右為末敷之一方用黃丹

又方

苦參

黃丹

五倍子

青黛

伊濟心法附錄諸病卷三十一
右等分為末敷之

又方

青黛 芒硝

右為末敷口中

又方

黃柏 細辛 青鹽

右等分為末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

○龜胸

蒼朮 酒栢 酒芍藥 陳皮 防風

威靈仙 山查 當歸

痢後加生芋

○小兒夜啼此是和熱乘心

黃連 姜汁炒一錢半 甘草

右用竹葉二十片煎服 又方加人參二錢半作二服入姜一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

丹溪心法附錄諸病卷三十一

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說 或云潰爛
陰丸脫出

入方

木通

甘草

黃連妙

當歸

黃芩

右以水煎服

又方 治脫肛

用東北方陳壁上洶湯先熏後洗

又方 治脫囊

紫蘇葉莖為末乾傳如爛用香油調鵝翎刷 又用
青荷葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二
者皆是熱病

入方

百草霜 芒硝

滑石

右為末酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血

入方

丹溪心法附錄卷之三

黑豆

甘草

陳皮

右煎服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方

軟石膏

黃芩

陳皮

茯苓

白朮

耳草

右用水煎服

又方

臧粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出土

○小兒解顛乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

四君子與四物子母皆可服 有熱加酒炒黃芩連生甘草煎服外用帛束緊用白斂末傅之

○小兒吐蛭虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛭多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香

丹溪心法附錄卷之二

二粒

錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參

各一錢

乾葛

二錢

右為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口瘡

治法用搗鼻

鬱金

藜蘆

瓜蒂

右為末水調搗之

○小兒禿頭

用白炭燒紅碎長流水令熟沸之內又取酒製通聖散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌乾每服一錢水煎頓服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁塵黃連白礬為末油調傳

又方

松樹厚皮

燒灰二兩

黃丹

二兩

寒水石

一兩細研

白礬

黃連

大黃

各半兩

白膠香

煑飛頓石上二兩

輕粉

四分或四分

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡如傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証

丹溪心法附錄卷之二

松皮虎灰 白膠香 枯礬 大黃 黃柏

右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡

臘猪油 半生半熟 雄黃 水銀 等分

右研和勻洗淨傳瘡上

又方

川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮 半兩 酒白木
酒當歸 一兩半 酒天麻 蒼朮 蒼耳 半錢
黃柏 酒粉草 四錢 防風 三錢

右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡

松樹皮 厚者燒灰二兩 白膠香 熬沸傾石上二兩 黃丹 一兩
白礬 火飛兩 黃芩 黃連 大黃 各二錢 蛇床子
寒水石 三錢 白芷 無名異 炒少許 木香 少許
用輕粉

右為極細末熬熟油調敷瘡上須洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡

猪牙皂角 去皮 胡椒 些小 枯礬 輕粉

右為末樟腦燭油搽七日如櫻桃膿窠去椒

○小兒臍腫汁出

升麻 小兒臍腫汁出

用枯白礬末付或黃箱為末付之。又小兒疳不乾
伏龍肝塗。或用枯礬煨過白龍骨等分付之。
○小兒天火丹臍腹起者赤溜不妨

蚯蚓泥炒調付

○小兒赤溜 主熱傷血

用生芋木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患
處芒硝濃煎汁洗之。又方雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡

黃連 枯白礬

右為末傳之

○小兒鼻赤

雄黃 黃丹

右同為末沅根水調傳之。又蒼耳葉酒蒸焙乾為末
調服最解食毒。又鼻下一道赤者名曰鑿以黃連末
付之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉 淨洗

杏仁 研如泥

木香 半兩

細辛

木通

白芷 各半

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和
勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦

丹溪心法卷之二

麝香一錢拌勻塗額門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒瘡疾痞塊

川芎二錢

生芩

白芍一錢

陳皮

半夏

炒芩一錢 甘草二分

右作一服姜三片就煎下甲末半錢

○胎熱胎寒

新增

附諸方

酸乳方 楊氏方 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉半兩

西芩

赤茯苓

天花粉

茵陳

甘草

各一兩

生地黃

二兩

右吹咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母埋去宿乳却服

生地黄湯

楊氏方

治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上

紅熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與此兒服

生乾地黄

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉

各半分

右吹咀每服五錢水一盞煎服

當歸散 楊氏方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼極腸內吊病並皆治之

當歸 剉微炒 黃耆 蜜炙 細辛 黃芩 龍骨 細研

桂心 赤芍藥 各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

釣藤膏 楊氏方 治內吊腹疼

沒藥 乳香 各三錢 木香 姜黃 各四錢 木鱉 十一

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑投沙

罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散

魏香散 錢氏方

蓬萊木 半兩 古六阿魏 一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬萊木一晝夜焙乾為末每服

一字煎紫蘇米飲空心調下

胎寒傷氣痛 楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨

水一盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散 宣明方 治小兒盤腸氣痛

茴香 炒 木香 黑附子 金鈴子 去核用

蘿藦子炒 檳榔

破故紙 白豆蔻各等分

右吹咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散經濟方治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼

斗尿如米泔

川練子

二箇去皮核用已豆一十五粒 去皮同炒令豆黃去豆不用

木香

黃史君子肉

延胡索

茴香各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調

脾胃進飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻仁各四錢

藿香

甘草各八錢

砂仁

沉香二錢 陳皮四錢

右為細末用鹽湯調不拘時候

○臍風撮口新增

附諸方

宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

全獨

一十一箇明尾全者去 毒用好酒浸炙為末

麝香一字別研

右同和為細末用半字金銀煎湯調下

辰砂殭蚕散 治小兒臍風撮口

辰砂

白殭蚕

直者去絲 甯炒一錢

蛇蛻皮一錢炒

麝香

半分別研

右為細末少許用蜜調傳唇口

治撮口 張氏方 治小兒斷臍為風濕所乘或尿在抱裙之

內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之已

赤脚金頭蜈蚣一枚 蝎梢四尾 姜蚕七箇 瞿麥半錢

右為末先將鴉毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方 治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣 半條酒炙 川烏頭 三箇生 麝香 少許研

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 湯氏方

用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥 白姜蚕要自死者

治撮口 聖惠方

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

一方

取活蝎虎一箇 江南名蟹虎 裝內硃砂細末瓶內封口食砂

月餘取出其身赤色陰乾為細末每服一二分酒下大效

一方

用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎梢七箇共為極

細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾
小兒冷汗出愈

一方

小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直
者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入射香
末少許灸三壯後無臍風

又方 同前

玕珠四十九粒

白礬飛過 蛤粉

黃丹

血竭各五

棗核兒

飛五青灰色棗子大頭上有兩角棗
上有之陰乾三枚無此味亦可

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚三六

寸處先用軟線繒住却於線外將臍咬斷片時去線待

血流盡用鵝翎管送藥一二分入臍大孔內

所此處臍
有三孔一

大孔以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作紇絡軟帛腰

裹切勿可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失

一方 又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方

兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却
生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速
照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上
截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方

小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知之凡兒患此者齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥

○鵝口口瘡新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口

白礬錢一 馬牙硝五錢 朱砂水飛一錢

右為細末每用一字取白鵝糞以水撓取汁調塗舌上

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

又方

用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙覆貼眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞臍黃皮不以多少油燈上燒存性研細末入黃柏枯礬射香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前

青黛 黃柏末 白礬煨 五倍子末各一錢

右為細末用米泔水攪口內貼

牙疳散

珍珠七箇 銅青一分 白礬煨三錢 千里沉石灰半錢

右為細末米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳

用白礬裝於五倍子內合燒過為末貼之

○重舌木舌 新增

附諸方

膏液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛一錢 龍腦一字 朴硝一錢

右為細末用蜜調稠少許付上

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌 楊氏方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌 千金方

用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有有用真蒲黃塗亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者

用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼 新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚 湯氏方

丹溪心法附錄口疳卷二

用硃砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入射香當門子尤妙

治胎癇驚風 湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以綿扎定火上炙燥研為末入射香硃砂少許麥門冬湯下

真珠散 湯氏方 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤澁或吐黃沫

真珠末 海蝶蛸 滑石 各一錢 茯苓 人參

白附子 各二錢 甘草 全蝎 各半 朱砂 一錢

腦子 射香 各半 金銀箔 五片

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下

金箔鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥止啼

全蝎 上箇用薄荷煎 天麻 防風 去芦 羌活 去芦

牛黃 赤茯苓 皮去 犀角 甘草 各一錢 射香

辰砂 水飛一錢 金箔 二十片

右為細末煉蜜丸如皂角子大薄荷煎湯不拘時候服治小兒夜啼

用蟬蛻二七枚全者超足為末入硃砂一字蜜調為丸使吃之

燈花散

三四方

治和熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆研為末燈心煎湯調末口中以乳汁送

下日二服

龍齒散

澹寮方

治小兒夜啼不住

蟬蛻

去翅足洗泥土

釣藤

有釣者去皮

人參

各等分

右為末每服一錢水半鍾煎服

乳頭散

湯氏方

治夜啼不止腹中疼痛

黃芪

當歸

甘草

炙

赤芍藥

木香

各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

○變蒸發熱新增

附諸方

惺惺散

湯氏方

治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲

重相似傷寒者此藥宜服

人參

去芦

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗

去芦各半兩

細辛

二錢半去葉只用根

右為末每服二錢水半盞姜三片薄荷一葉煎服

神仙黑散

陳氏方

治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其

証若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃

大黃

杏仁

和皮各一錢

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖處連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩熱

生犀剉末地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛各一錢甘草各二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服

○丹毒溫熱新增

附諸方

四順清涼飲子和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉

方見火門

牛黃散和劑方治五種丹毒

鬱金 桔梗去芦 天花粉 甘草 葛粉各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散錢氏方治赤游丹腫

白芷一兩 寒水石二兩

右為末米醋調付患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯湯氏方治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸去芦此本方防風續加各

等黃芩減半

丹毒心法附錄卷之三

三

右吹咀每服三錢水一盞煎服

防已散湯氏方治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎切防其殺人

漢防已兩半朴硝

犀角

黃芩

黃耆

川升麻各二錢

右吹咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏蘆散湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癰

漏蘆

麻黃去根連翹

川升麻

川芒硝

黃芩錢二

白欬七錢

甘草二錢

川大黃一兩

右吹咀每服二錢水一盞煎服

一方治丹毒發作恐其入腹一時無藥

急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

一方治走馬火丹

用景天一名慎火草一名仙指甲不拘多少搗爛取汁

塗之即効

土黃散治赤流丹毒

先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硝一兩大黃末一劑

右二件相合新汲水調拌胸雞翎蘸時時塗搽

伏龍肝散唐方治赤腫赤毒火毒走注

伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大効

升麻飲 經方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻 黃芩 大黃 各一錢 麥門冬 去心

葛根 朴硝

右為末和勻熱水調下半錢或吹咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥頰赤咽

乾口舌出瘡夜卧不寧譾語煩渴頭面身熱多生瘡癩

玄參 水洗 桔梗 各二錢 白茯苓 二錢半

人參 去芦 牙硝 各一錢 甘草 炙七分半

麝香 二厘半

右為末煉蜜丸如雞頭大金銀箔為衣薄荷湯化下
九

消毒犀角飲 和劑方 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰

涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹癩毒

赤癩及瘡疹已出未出不能快透並皆治察小兒疹痘

欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒應手

神効

鼠粘子 四錢微炒 荆芥 甘草 各一錢 防風 去芦半錢

一方加黃芩 一錢 犀角 以升麻代之

右用水一鍾煎至半鍾服

丹溪心法附錄卷之三

牛黃丸 聖惠方 治小兒心經積熱兩頰紅如金胭脂手足

常熱口乾燥

○上焦熱壅

牛黃一錢 天竺黃二錢 鬱金三錢 大梔子四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸一周兒黃米大服三十九乳下三歲小兒菜豆大服三十九薄荷湯下

導小赤散

錢氏方

治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥

悶亂傳流下部小便赤澁淋閉臍下滿痛

生地黃 木通 甘草 各一 方加黃芩 二錢

右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲

活幼方

治小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水

竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澁盛則淋平涼心火三焦自順不舒疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺溫熱客熱寒邪風邪冒入肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澁或赤或白淋瀝不通蒸衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏俱得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛旁子

赤芍藥 各八分 山梔子 木通 川當歸

防風 各四分 黃芩 一分 柴胡 甘草 各一分 錢六分

荆芥穗 一錢二分 蟬退 半錢

右用水一鍾半竹葉十片燈心十莖煎至一鍾服無時

天一丸 韓飛霞方 治小兒百病

燈心 用十斤以米粉漿洗曬乾研末入水澄之浮者

赤茯苓 去後煎用茯神去木 滑石 水飛過五兩

猪苓 去皮五兩 澤瀉 去鬚三兩 人參 一斤去芦切片煮濃湯去

以入

一方人參六兩白朮六兩甘草四兩同熬膏亦妙

右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如

圓眼大珠砂為衣貼金箔任病換引大段小兒生理本

天一生水之妙九治病以水道通利為捷徑也

○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故九疾作皆屬

火韓先生定此方清心而利小便正所以散火也九小

兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之症用此最當而嘔

吐瀉痢諸症無不治也

人參生犀散 解時氣寒壅咳嗽痰喘心忪驚悸臟腑或

秘或瀉及一切風熱

丹溪心法附錄卷之三

前胡七錢 杏仁去皮尖 桔梗各二錢 人參三錢

甘草炙二錢

右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服

天竺黃散 涼膈退潮熱

天竺黃七分 大黃 蟬蛻各三分 白殭蠶二分 去絲

川羌活 全蝎去毒 甘草各五分

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

辰砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱

白芍藥 人參 甘草炙各一錢 茯苓一錢 硃砂五分

石蓮肉五錢

右為末次入硃砂研勻每服五分薄荷湯調服

井露飲 解五毒治煩熱

寒水石 石膏各一兩 井草半兩

右為末如解諸毒氣用生姜自然汁調服傷寒時氣作

熱發狂新汲水滴薑汁調服

瀉青丸治小兒肝經風熱目赤腫痛

當歸 龍膽草 川芎 山梔子 大黃溫經

羌活 防風各二錢半

右為末煉蜜如雞頭大竹葉沙糖湯化下一丸

三黃丸全嬰方 治小兒諸熱煎治身黃黃疸血便血

丹溪心法附錄卷之三十一

丹... 黃連去鬚 黃芩 大黃各一錢半

石為末滴水為丸茶清下三五十九

地膚子湯千金方 治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通

欲便則澀痛不出出少疼血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩 枳實

升麻 葵子 猪苓各六分 海藻 橘皮

通草各三分 大黃一分

右用水一盞煎至半盞去渣溫服

石薺散活外方 治小兒熱淋沙淋石淋

石薺 海金砂 木通 滑石各一錢

右川水一盞煎至半盞去滓不拘時溫服

八正散 治小兒心經溫熱臟腑秘結小便淋澀方見火

梔子仁散湯氏方 治小兒不睡心神煩熱

梔子仁五枚 茅根 冬葵花各半兩 甘草炙一錢半

右為末每服二錢煎服

勻氣散傷寒院方 治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮青膈痞悶

小便不利

桑白皮二兩 陳皮去白一兩 桔梗炒一兩 甘草炙一兩

藿香葉兩 木通四兩 赤茯苓去皮一兩

右以咀每服三錢水一盞姜二片煎半盞溫服

中惡天吊 新增

附諸方

蘇合香丸 和濟方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛 方見氣滯

辟邪膏 楊氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡

腹大而滿診其脈緊細而微者生緊大而浮則死急服

蘇合香丸再以皂角末搗鼻吹服沉香降氣湯加人參

茯苓不愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼臼

龍膽草 人參 茯苓 各半

右為末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜為丸乳香湯化下

及令兒帶燒卧內尤妙

元香降氣湯 方見氣滯

九龍控涎散 楊氏方 治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名

為天吊

滴乳香 一錢別 天竺黃 二錢半 雄黃 別所

鵝茶 二錢 白礬 一錢 甘草 二錢 荊芥穗 一錢炒

菘豆 半 赤脚蜈蚣 一條酒浸

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

釣藤散 湯氏方 治小兒天吊潮熱

釣藤 人參 去蘆 犀角屑 各半兩 全蝎 二錢

丹溪心法附錄卷之三十一

甘草

炙一錢一分半

天麻 二錢半

右為末每服一錢煎至半盞溫服

牛黃膏 治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽南星

依前製

全蝎

去毒炒

蟬蛻

去足各二錢

白附子

防風

天麻

各一錢

右為細末蒸棗去皮核取肉研為丸如小豆大用荆芥

生薑同煎湯研化食後遠服

斷癇丹 楊氏方 治癇即愈而復作者

黃耆 蜜塗 釣藤 釣子

細辛

去苗葉 甘草 多各半

蛇退 酒炙 蟬殼 四箇 牛黃 一兩別研

右為末棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲十九大

小加減用

細辛大黃湯 湯氏方 治風癇熱癇

細辛 去苗 大黃 炮

防風 去蘆各一兩

甘草 炙二錢半

右咬咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服

竹瀝膏 湯氏方 治小兒諸癇

白朮

蜜炒二錢半

大附子

去皮臍

犀角

鎊末各一錢

厚朴

甘草水炙 焙乾二錢

半全蝎 七箇 麻黃 一分 定慢火炙黃色

右為末取竹瀝為膏丸黑豆大每服用金錢薄荷湯化

下一丸隨兒大小加減

至寶丹 蘇氏方 治諸癩急驚卒中客忤並宜服之

安息香 一兩半為末無灰酒飛過瀉過沙石

琥珀 研 硃砂 雄黃 各一兩研 銀箔 五十片

龍腦 射香 各二錢半 牛黃 各兩 生烏犀角

生玳瑁 硝 各一兩 金箔 五十片一

右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以

重湯煮凝成搜和劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子大

二歲服二丸人參湯化下大小量意加減

一方 醫方集成 治小兒癩癩及婦人心風諸疾

用其遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和其遂末

將猪心批作兩片以藥入在內用綿縛定以皮紙包裹

水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂

末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服

別取猪心煎湯此方神効

龍腦地黃膏 宣明方 治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天

吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神効如病

不愈與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃 別搗 葶草 各半兩 雄黃 水冠者一 麝香 別研

生腦子

右五味各製了再入乳鉢內研細煉蜜為膏油單裹如

有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如小兒大人
睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水下大
鮮暑母如孕婦人常服永生男女永無疾病如有大人
陽毒傷寒加輕粉二匣龍腦水化下一丸杏核大小
兒看年紀大小加減服立効

分肢散宣明方治小兒卒風大人眼喎針風涎裹心驚
痲天吊走馬疳閉急驚一切風熱等疾

巴豆半兩不出油 川大黃一兩 朴硝半兩

右大黃為末後入巴豆霜朴硝一處細研用油單貼起
如有前患每服半錢煎茶下吐下煩涎

猴驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下
時上吐下瀉微瀉以吐利得快為效大人半錢小兒一
字看虛實加減只是一二服見効不宜頻服如吐瀉不
定以葱白湯立効

○急慢驚風新增

附諸方

牛黃清心丸 治小兒諸病狂亂驚痲痰涎壅塞精神昏
憤見中風

一方 治小兒口禁牙關不開諸病不効者
用天南星末一錢腦子少許研勻用紙蘸生姜自然汁

溫藥於左右大牙根上搽之便開

金箔鎮心丸 和劑方 治風痰壅熱心神恍惚急驚搐弱

紫河車 黑豆未煮 二錢半 山藥 一兩 甘草 五錢 牙硝 一錢

人參 五錢 射香 研半錢 金箔 十二片 龍腦 一錢

茯苓 五錢 朱砂 研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十九以金箔為衣每服一

九薄荷湯下常服安心止驚散邪涼膈

抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍

木水生火謂我生者父母也肝為母心為子母安則子

安況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸

理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱以致煩燥不寧痰嗽氣急

瘡疹欲出發搐並宜投此其藥性溫平不僭不燥常服

驅風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

琥珀 人參 天竺黃 檀香 白茯苓 各二錢半

甘草 炙一兩 枳殼 炙炒 枳實 炙炒各五錢 辰砂 水飛二兩半

白山藥 八兩 牛膽南星 炒五錢 金箔 五十片

右各味為細末和勻取新汲水丸如芡實大陰乾用葱

白煎湯或薄荷湯痰重者甚姜湯調化服

南星膏 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭常服去

風退熱消痰鎮心除百病

丹溪心法

牛膽南星 臘月黃牛膽將南星研和汁盛 人參

白木 山藥 白茯苓 扶神去木 羌活

甘草 炙各三錢 白殭蠶 去毒薄荷湯 辰砂 水飛

研別 射香 一字

一右為細末入辰砂麝香研勻煉蜜丸如芡實大金箔為

衣薄荷湯調化食後服

天麻丸 湯氏方 治急驚風四肢拘急壯熱口噤

天麻 雄黃 烏蛇肉 蟬殼 乾蝎

射香 細研 天竺黃 細研 桂心 天南星

白附子 膩粉 白芷 半夏 湯泡七次

右為末者棗肉丸如棗豆大每服三五丸薄荷酒送下

珍珠丸 全嬰方 治小兒急驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽壅

塞肚腹脹硬

白附子 一錢泡 滑石 一錢 巴豆 十五粒

輕粉 一錢 天南星 一錢製

右為末麪糊丸如棗豆大三歲一二丸葱白湯送下

一方加蝎尾 半錢炒

牛黃奪命散 移方 治小兒肺脹喘滿胃高氣急兩脇扇

動陷下作坑兩鼻竅張亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞

谷云馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛半生半熟

黑牽牛各半生半熟

川大黃二錢

檳榔半兩 廣木香三錢

右為一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜水或

漿水調下不拘時候微利為度

驅風膏全嬰方 治小兒肝風筋脉拘急面赤目青服驚搐

連翹及胎風

辰砂 蝎尾炒 當歸 草龍膽 川芎

山梔子 川大黃 羌活 防風去芦 甘草各一錢

右為末入射香少許煉沙糖丸如雞頭子大三歲一丸

薄荷竹葉蜜湯化下

瀉青丸聖惠方 治小兒肝臟實熱手足尋衣頰亂捻物目直視

不搐得心熱則搐身反所強直目連翹或目內青或臟

腑殮泄諸藥不止脾虛肝盛者見丹毒

○廣按已上二方皆瀉肝經風熱之劑也夫小兒肝常

有餘脾常不足故急驚風乃肝氣有餘宜用瀉青丸之

類瀉之慢驚風乃脾氣不足宜用醒脾散之類補之

大效疎風散活幼方 治嬰孩小驚熱痰風回證聚結於胸

臆之間令兒昏困沉重闔竅不通諸脉氣閉所以默默

欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐利

宜與服之立見甦省

錦文大黃 一錢半 鷄心檳榔 一錢 朴硝

黑牽牛 七分半炒 陳橘皮 去白一錢

右為末二歲兒服半錢蜜少許薄荷湯調下看大小加減服之

紅綿散 湯氏方 治夾驚傷寒

麻黃 去節 全蝎 炒 北草 炙 天麻 大黃 溫酒

白附子 蘇木 炒各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

全蝎觀音散 治慢驚慢驚者因久吐瀉而脾胃先虛脾

胃與肝叶子也母虛亦令子衰二經俱虛則生頑涎頑

涎者脾肺所出也涎則溢流在於咽喉如水雞之聲時

復瘳瘳是也此方主之

全蝎 去毒十箇炒 天麻 煨 防風 白芷

黃芪 蜜炙 甘草 茯苓 各二錢半 人參 二錢 白扁豆 汁

去皮炒

右為細末用棗肉煎湯調勻不拘時候

高蝎四君子湯 治小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參 白朮 茯苓 甘草 川烏 去皮

全蝎 去毒炒各等分

右咬咀姜三片棗一枚去噓同煎食前服

理中湯 治小兒吐瀉手足厥冷加附子名附子理中湯

回陽方見中寒

八仙散 湯氏方 治慢驚虛風

天麻 白附子 花蛇肉 防風去蘆 南星

半夏麴 冬瓜子 全蝎各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜棗薄荷煎服加川烏尤妙

妙

釀乳法 湯氏方 治慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治

人參 木香 藿香 沉香 陳皮

神麴 麥蘖各等分 丁香減半

一右咬咀每服四錢水一碗姜十片紫蘇十葉棗三枚砂

一瓶內煮至半碗乳母食後埋妳汁服之即便卧霎時令

藥入乳之絡次令兒吃不可過飽亦良法也

吉州醒脾散 湯氏方

人參去芦 橘紅 甘草炙 白朮 白茯苓

全蝎各半 木香 半夏麴各二錢 白附子

陳倉米二百粒 南星一箇

右為末每服一錢水半盞姜三片棗三枚煎服

木附湯 知知方 治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

大附子 一箇炮 白朮 一两煨 木香 半兩

丹溪心法附錄卷之三十一

肉豆蔻 一箇 麩煨 甘草 半兩

右以咀每服二錢水半盞姜三片棗二枚煎服

○廣按此方用附子不必疑蓋小兒慢驚風皆由吐瀉

後脾氣大虛時作瘵瘵非若急驚搐搦之緊猛也此

方溫寒燥溢行氣健脾適合其宜

神效萬金丹 瑞竹堂方 治小兒慢驚風急驚風十無一失

硃砂 研細末 真輕粉 研細末

右二味各等分不以多少用青蒿內虫兒取出於淨磁

盞內將硃砂輕粉以虫汁就成托如黃米大量兒大小

加減服之半歲一歲小兒服一丸乳汁送下如取虫時

法止於七月初五日取蒿虫則靈驗

一方 治急慢驚風神効

硃砂 一分 輕粉 一分 姜蚕 七箇 全蠋 三箇去毒

右為細末用人乳汁調服 詩曰七箇姜蚕三箇蠋一

粗硃砂一片雪不論急風與慢風用時須用生人血

天麻防風丸 和劑方 治一切驚風壯熱痰厥驚怖

姜蚕 自死者去絲用 天麻 煨 防風 人參 各一

牛黃 一錢 全蠋 去毒炒半 硃砂 雄黃

射香 各一錢半 甘草 炙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三九薄荷湯化下

大天南星丸 和劑方 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上

視

天南星 牛膽制 半兩 硃砂 三錢 別研 腦子 人參

乳香 各半兩 別研 全蝎 十四箇 去毒 炒 射香 一錢 半

牛黃 天麻 防風 各二錢 半

右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九荊芥薄荷湯下

奪命散 湯氏方 治急慢驚風痰潮壅盛滯塞於咽喉間命

在須臾服此藥者無有不愈

青礞石 一兩 入沙鍋內同煨肯一兩用白炭火煨令

通紅須消盡為灰候藥冷如金色取去研為末

右為末急驚風痰發熱者薄荷自然汁入蜜調服慢驚

脾疔者以青州白丸子再礞煎稀糊入熱蜜調下神効

青州白丸子 方見中風

抱龍丸 治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星 一兩 天竺黃 半兩 辰砂

雄黃 各半兩 別研 射香 一錢 別研

右為末煉蜜丸如芡實大其草薄荷湯化下一丸

生珠膏 幼幼方 治急慢驚風

天麻 二錢 半 硃砂 二錢 姜蚕 二錢 白附子 煨 二錢

全蝎 二十箇 黑附子 二錢 煨 射香 半兩 蜈蚣 一箇 酒浸

下...

南星 一錢 半煨 花蛇 二錢 酒浸炙乾

右為末和勻煉蜜丸如鷄頭大每服一九金銀箔薄荷湯化下

○廣按用附子者熟則流通痰火之理也

大青膏 錢氏方

全蝎尾 去毒生 半字

硃砂 研一錢 青黛 研一錢

天麻 一錢

天竺黃 一字

白附子 生一錢

射香 一字

烏梢蛇肉 酒浸焙乾取 末半錢

右為末蜜和成膏每服一九如皂角子大同牛黃膏温

薄荷湯化一處服之五歲以上同甘露散服 方見中卷

牛黃膏 聖惠方 治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳欬止煩熱

甘草末 二錢

雄黃 研一錢

川甜硝 二錢

藜豆粉 兩半

寒水石 生一錢 別研

片腦 二錢

鬱金末 一錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂角子大食後

辰砂保命丹 秘方

射香 一錢 南星 炒

白附子 炮

硃砂 各半兩

蛇含石 四兩 煨七次 用米醋淬後用瓦焙

右件為末用端午粽尖為定用金箔點覆若急驚薄荷

湯下慢驚荊芥湯化下熱驚薄荷湯下風驚荊芥湯下

丹溪心法附錄卷之三十一

下

備急丸 應驗方 治急慢驚風

右以五月五日取地龍數條用竹刀分中截作兩段看地龍跳得急者慢者各另一處研爛用硃砂末同研和勻得所丸如小菘豆大急驚用急跳者慢驚用慢跳者用金錢薄荷湯送下量大小加丸數如合藥後分明寫記急慢各另包裹收類

愈風丹 儒門事親方 治大人小兒一切諸風

芍藥 川芎 白僵蚕 炒 桔梗 細辛 去葉
羌活 各半 麻黃 去節 防風 去芦 白芷 天麻

全蝎 各一 甘草 三錢 天南星 半兩 姜 兩 砂砂 半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼茶酒任下

全蝎散 有指方 治小兒驚風

人參 陳皮 各一錢 全蝎 各一錢 甘草 各半錢 南星 溫經

右吹咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有熱加防風

硃砂丸 宣明方 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽候不利

取礬為積

硃砂

天南星

芭豆霜各半

右為末麩糊丸黍粒大看病虛實大小每服二丸或天
吊戴上每服四五丸薄荷水下立愈

珍珠丸宣明方治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜

膩粉二錢滑石三錢

天南星

粉霜各二錢半

蝎梢

續隨子去皮各二十

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小小兒二歲以
下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十九丸茶湯下
荊芥湯亦得量虛實加減

祛風羌活散 散風邪止驚搐退肌熱

羌活

粉草

天麻

茯苓

川芎二錢

荆芥穗

白礬炒白朮

白附子炮各一錢

桔梗二錢防風一錢

全蝎半錢硃砂五分

天南星一字

右為細末薄荷湯調下 如傷風鼻塞流涕忽白湯下

喘嗽氣促桑白皮湯調下 若常服白湯亦可

真珠天麻丸 驚風痰熱壅盛及撮口

南星炮

天麻炮

白附子炮各一錢

巴豆霜十錢

油粒去

全蝎炮

滑石二錢

防風

半夏美汁炒

右為細末麩糊丸如小豆大百草霜為衣每服五六十

九凌姜湯下

至聖保命丹 胎驚吊腹目上視手足抽掣角弓反張痰

盛急慢驚風

全蝎十四枚

防風五錢

白附子炮

南星炮

蝉蛻去土

僵蚕直者各一兩

天麻五錢

硃砂

射香各一錢

金箔十片

右為末後入硃砂射香和勻以粳米餅為丸如芡實大每服一丸金錢薄荷煎湯化下急者二丸

青珠丸 急慢驚風痰熱往來

天麻

半夏

南星

白附子

川烏各一錢

乾蝎頭尾全七枚

姜玉七枚

青黛一錢

硃砂一錢為衣

右用研入巴豆七粒去油研勻麩糊為丸如黍米大每服五丸金錢薄荷湯下如驚睡瀉得青色是驚積白色是疳積赤色是熱積

安神散 治搐搦

用全蝎四箇塘水浸一宿南星大者一箇開一穴入蝎在內以南星末蓋其口用麩裹火煨令赤色取出放地坑土宿去南星用蝎為末每服一字磨刀水調下
犀角散 虛風有涎胃氣弱或吐乳喉中作聲

酸棗仁 麥門冬 去心 人參 白附子 茯苓 各二錢 硃砂 一錢

右為細末每服半錢磨犀角湯下日二服此藥壓驚退熱安心定神

睡驚丸 和劑方 治心蘊和熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅盛

茯苓 去皮 鈇粉 蛇黃 殿醋 南星 炮 史君子 去核各半兩

腦子 半兩 別研 右為末糯米糊丸如皂莢子大硃砂為衣薄荷湯調下 安神丹 御藥院方治小兒心神不寧困卧多驚痰涎壅盛

硃砂 二錢 人參 二錢 乳香 半兩 各 醋棗仁 兩 炒去灰

遠志 去心 二錢 右為 蜜丸如榛子大金箔為衣每服一九人參湯化

寧眠散 御藥院方治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星 炮 製 人參 去 白附子 炮 各 乾蝎 二十箇 生用 乾赤頭蜈蚣 一條 酒浸 酥 乳香 血竭 各

右為末每服一字用水酒少許浸薄荷酒下 寧心膏 全嬰方 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如

人將捕眠睡驚壓常服鎮心除百病

人參去芦白朮 白茯苓去皮茯神 山藥

羌活 甘草各一錢 硃砂二錢 腦麝各一字

右為末煉蜜丸如鷄頭大一歲一丸薄荷湯化下
五疳五軟新增

附諸方

蘆薈丸湯氏方治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

黃連去鬚 龍膽草 蕪荑各一兩去皮先炒黃色次入前藥一處炒赤色

右各件為末別入蘆薈末二錢半和勻飯飲丸如黍米
大隨大人加減空心米湯下

鱉甲散湯氏方治疳勞骨蒸

鱉甲九肋者沸湯浸洗 黃芪蜜炙 白芍藥各一兩

生熟地黃 當歸去芦洗 人參去芦各半

地骨皮半兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸湯氏方治骨蒸疳瘕肌體黃瘦

木香半兩 宣黃連 生地黃 銀州柴胡

鱉甲九肋者沸湯浸洗令淨次用童子小便塗炙 青皮各一兩

右為末猪肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鍋內
煮熟取出細研 為丸如麻子大米飲下大小加減

不拘時

丹溪心法附錄卷之三

丸 湯氏方 治驚疳腹脹虫動多睡肌躄黃瘦五

心煩熱

胡黃連 黃連 苦練子各一兩 白蕪荑去皮半兩

乾蟾頭二錢半燒存性 蘆薈二錢半 射香二錢

青黛二兩

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆

一枚在內却用油單紙一層裹之蒸熟 又入後四

味麩糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後即

時日三服

龍膽丸 和劑方 治小兒疳發熱

龍膽草去芦 黃連 青皮 史君子去核各一錢

右為末猪膽汁丸如蘿蔔子大每服二十九以意加減

臨卧温水下

胡黃連丸 直指方 治小兒熱疳

胡黃連 川黃連各半兩 硃砂二錢半另研

右為末入猪膽內繫定虛懸於銚中煮 時又取出入

蘆薈青黛各二錢半去足蝦蟇灰二錢射香少許粳米

飲丸如麻子大每服十九米飲湯下

蘆薈丸 陳氏方 治小兒疳

蘆薈 蕪荑去皮 青黛各二錢半 真射香少許 枳榔

宣連各二錢半胡黃連半兩續豬膽一箇蟬殼二十箇

右為末豬膽丸如麻子大每服五十九飯飲吞下

肥兒丸和劑方治小兒疳病夫小兒疳病者多因闕乳喫

食太早以致脾胃受傷虛而生溫溫而生熱溫熱太甚

所以生虫日漸羸瘦復大髮豎不能行步面黃口臭發

熱面無精米此藥殺虫退熱進食

神麩炒黃連各一兩麥藥炒肉豆蔻煨史君子肉

各半檳榔各二錢木香各二錢

右為細末豬膽汁并麩糊為丸如粟米大每服四五十

丸用米湯送下食前

獨九子瑞竹堂方治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消

心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癢

乳癖痰氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳

食及察五種疳疾八種痢疾肌肉消瘦氣麓腹大神氣

昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑進飲食生肌

肉悅顏色功效非常不能盡述

蘿蔔子微炒陳皮去白青皮去白三稜炮蓬朮炮各

黑牽牛七錢半胡椒二錢木香一錢半

右為末麩糊和丸如菉豆大空心用蘿蔔子煎湯送下

或生姜湯亦可量兒大小加減丸數

○廣按此藥緊峻去病有功病退則已不可過服恐傷

正氣

蘆薈和劑方治疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭髮作

穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澁口臭

齒斷黑爛常服長肌肉吐黃殺疳虫進食

大皂角

乾蝦蟆

已上等分同燒存性為末一兩入下項藥

青黛二錢半

蘆薈

硃砂

射香

各一錢

右研勻湯浸蒸餅和丸如麻子大每三歲兒服二十九
不計時米湯下量大小加減服

史君子丸和劑方治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復

疳痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

史君子

去皮一兩

厚朴

制陳皮

去白

川芎

各二錢半

右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸陳米飲化下

○廣按此方用藥平和可以久服

六神丸金匱方治小兒疳氣消瘦臟腑怯弱泄瀉虛滑乳

食減少飲食無度心腹脹滿

木香

丁香

肉豆蔻

麩裹

訶子

炮去核

史君子

炮去皮各半兩

蘆薈

一兩

右為末棗肉和丸如棗豆大三歲三十九米湯下

○廣按此本溫熱宜用苦寒藥今此方用苦溫藥何也

殊不知疳久泄瀉震滑則為溫寒宜用苦溫藥本草云苦寒去溫熱苦溫去溫寒是也

大蘆薈丸 發明 治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 蘆薈 研木香 白蕪荑

雷丸 青皮 去白 鶴虱 微炒各半兩

右為細末粟米飯和丸如菉豆大米湯送下二十九無時

微聖丸 小兒疳病通用

芳薈 五靈脂 好夜明砂 磨 砂仁 陳皮

青皮 莪朮 煨 木香 史君子 煨各二錢

黃連 蝦蟇 日灸焦各三分

右為末用雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲送下

大蘆薈丸 治諸疳

蘆薈 蕪荑 木香 青黛 檳榔

黃連 炒各二錢半 蟬殼 二十枚 胡黃連 兩半 射香 少許

右為末豬膽汁二枚取汁浸糕為丸麻子大每服二十丸米飲下

黃連丸 治疳疾

黃連 半兩 蕪荑 去皮 史君子 去殼半兩洗淨研

丹溪心法附錄卷五疳積

右為末用椎豬膽丸如菘豆大每服二十九米飲空心送下

盧薈丸 治疳殺虫

盧薈 半兩 史君子 焙三稜 生 石榴皮 焙 草龍膽 生各五分

若練根 焙少

右為細末麵糊丸如蘿蔔子大每服五丸量大小加減米飲送下疳熱麥門冬湯下

布袋丸 治諸疳疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明砂 煉淨 蕪荑 皮炒去 史君子 肥白者微炒去皮各二兩

白茯苓 去皮 白朮 無油者 人參 去芦 甘草 炙 蒼朮 去皮

右為細末湯浸蒸餅和丸如彈子大每用一九以生絹袋盛之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提取藥於當風處懸掛將所煮肉并汁令小兒食之所懸之藥第二日仍依前法煮食只待藥盡為度

六神丸 治諸疳

木香 煨 黃連 神麩 川練子肉 蕪荑 麥蘖 炒

右為細末以椎豬膽蒸熟為丸如麻子大每服三四十丸量大小加減米飲送下

肥兒丸 疳病蒸熱腹脇脹滿面色萎黃飲食遲滯

麥蘖 炒 川黃連 大蕪荑 神麩 炒 胡黃連 各半兩

右為末以雄豬膽汁丸如麻子大每服三十丸食前米飲送下乳母忌食酒麪生冷

如聖丸 冷熱疳瀉

胡黃連 川黃連

蕪荑

史君子

各二兩 去皮

射香

五分 研

乾蝦蟆

五箇剉碎酒熬成膏

右為末以蝦蟆膏子丸如麻子大每服三十九人參

肉棗丸 肉疳而瘡侵入口鼻

用肉棗二枚去核入青礬如核大在內以火煨存性為末入射香少許清油調塗

養肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

穀精草各兩

右為末每服一錢五七歲以上二錢用雄豬膽如匙大一片批開糝藥在內以麻紫定米泔水半碗煮肝熟撈出肝傾湯碗內蓋眼分肝作三次嚼食仍用肝湯蒸下日三服不拘時如大人雀目空心服至夜便見物如患日久不効日作二服見効

小茸丸 勿勿方 治胎熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

肉蓯蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸

熟地黃

天麻

青蘊

各等分

右為末用煉蜜為丸如棗豆大鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散 幼幼方 治小兒面紅唇白肌熱項軟

熟地黄 酒浸 白茯苓 羚羊角 酸棗仁 炒 虎胓骨 酒

肉桂 防風 甘草 各分

右為末 溫酒 鹽湯 化下 皆可

羚羊角丸 揚氏方 治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行者

羚羊角屑 白茯苓 去皮 防風 去 虎胓骨 塗醋炙

酸棗仁 炒 生苾 各半 黃芪 桂心 當歸 炒 二

右為末 煉蜜丸 如菉豆大 食前以溫酒研破 三五丸服 之一月 漸漸即可行也

○吐瀉痢瘕 新增

附諸方

觀音散 和劑方 治小兒外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進乳食

石蓮肉 二錢 去心 白扁豆 一錢 茯苓 半 人參 一兩 去芦

神麩 炒 二 白芷 綿黃芪 木香 甘草 各錢

全蝎觀音散 和劑方 治小兒外感風冷內傷飲食脾胃受傷嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸瘦大抵脾胃虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進飲食及治吐瀉致虛將成驚風

丹溪心法附錄五瀉卷三

石蓮肉 人參去芦 白匾豆各一錢二分半 全蝎炒

天麻 木香 甘草炙 羌活 防風去芦

白芷 黃芪各半錢 神麴一錢 白茯苓去皮七分半

右為末每服二錢乳汁調服或咬咀每服五錢用水一

盞棗子煎服

人參白朮散錢氏方 治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不

止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困

矢治變成風癰不問陰陽虛實並宜服之

人參去芦 白朮 白茯苓去皮 木香 藿香去土

甘草炙 乾薑一錢

右咬咀用水一盞煎至半盞去滓溫服

異功散錢氏方 溫中和氣治吐瀉不思食凡治小兒虛冷

病先於數服以正其氣

人參 白朮 白茯苓去皮 甘草炙 橘紅各錢

右用水二盞生薑三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

醒脾散集心 治小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉默默

不食

木香 天麻 人參去芦 白茯苓去皮 白朮

甘草炒 白僵蚕炒 白附子各半錢 全蝎二分半炒

右用水一盞生薑三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

辰砂益元散應驗方 治小兒中暑吐瀉小便赤少夜卧不寧心煩作渴常服寧心解熱

益元散 一兩 辰砂 一錢

右研勻每服五錢用燈心竹葉湯調服如嘔吐生姜湯

調服

黃連香薷飲 全嬰方 治小兒陰陽不順清濁相干霍亂吐

瀉體熱煩燥昏冒多渴

厚朴 夫皮姜制 一錢五分

黃連 二味與生姜汁拌炒作紫色七分半

香薷 三錢

右吹吐一服用水一盞一酒半盞煎至七分去滓水中頓

冷服

一方加白匾豆 炒七分

黃龍丸 全嬰方 治小兒中暑吐瀉胃悶煩渴昏迷身熱有痰

半夏 二兩米醋 半升黃乾

白茯苓

甘草 各半兩

右為末生姜汁煮麩糊為丸如小豆大每服二十九煎

生姜灯心湯送下量大小加減丸數

五苓散 全嬰方 治大人小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍

亂吐瀉小便赤少心神恍惚

澤瀉 一錢

白朮 一錢五分

猪苓 一錢半

肉桂 一錢

赤茯苓 一錢

半

丹溪心法附錄卷之二十一

右為細末每服一錢熱湯調下不拘時服如辰砂名辰砂五苓散去辰砂加生料平胃散用蒼朮橘皮甘草厚朴二方共一處生姜棗子同煎名胃苓散

香朴飲子集成治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚壯

人參去芦 白茯苓皮去 甘草炙去 紫蘇 木瓜

澤瀉 香薷 半夏麩 白匾豆 陳皮去白

烏梅 厚朴各四兩

右用水一盞煎至七分去滓溫服

玉露散 一各甘露飲治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥

熱頭疼或伏熱吐瀉亦作傷風熱熱煩渴

石膏 寒水石各一兩 甘草半兩

右為細末每服五錢灯心湯調下暑熱冷水下吐不止

生薑湯下

人參散宣明方治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參半兩 茯苓二兩 生犀 桔梗各半 甘草

乾薑各半兩

右為末每服用二大錢水一鍾加入灯心五莖同煎至

六分溫服無時煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減服

內救散 調氣進食止瀉嘔

木香 人參 白朮 茯苓 甘草

扶神各等藿香

右為末每服一錢米飲調下

益黃散錢氏方治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並皆

治之

丁香

四錢見火

訶子

炮去核

青皮

去白各一兩

甘草

炙

陳皮

去白二兩

右為末每服二錢水半盞煎食前服

藿香散蘇方治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

藿香

一錢

丁香

一錢

人參

一錢

白朮

一錢

茯苓

神麩

匾豆

各半錢

右為末每服半錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下

硃沉煎

按率方

治小兒嘔吐不止

硃砂

二錢飛過

沉香

二錢

藿香

二錢

滑石

半兩

丁香

十四箇

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花子

炒藥在上須臾墜湯去水却用煎水送下

助胃膏湯氏方治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻

十四箇

木香

二錢

縮砂仁

四十箇

乾山藥

一兩

肉豆蔻

四箇炮

人參

去芦

白朮

一兩

白茯苓

一兩

甘草

炙各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為

丸如芡實大一歲一丸米湯調下

訶子湯湯氏方治臟寒泄瀉

訶子炮取 人參去芦 白茯苓去皮 白朮各一兩 木香炮

陳皮去白 甘草炙 肉豆蔻各半兩

右為末每服二錢水一盞姜三片煎半盞溫服寒甚者

加附子

白朮丁香丸 水瀉脾虛飲食不進水穀不化

白朮不油者二錢半 丁香半錢 半夏一錢半 湯

白朮水浸半日切焙

右為細末用生姜自然汁煮糊為丸如梧桐子大十歲

上下可服二十五九七八歲二十九五六歲十四五九

二三歲十九週歲五七九用姜湯或米湯無時送下一

服不止日進二服新洩一服見効舊洩三服即止

乳豆丸 應驗方治小兒傷冷泄瀉滑腸不禁面青腹痛

肉豆蔻麵裹煨 乳香二錢

右為末麵糊為丸如菉豆大米湯下三十九

紫霜丸 治宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢當以藥推利

杏仁五十箇去皮 磁石火煨醋淬

芭豆去皮心膜炒 赤石脂末

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以上服三九以乳

丹溪心法卷之十餘可重朱

汁或米飲下

玉餅子 吐瀉驚疳乳食不消肚脹潮熱咳嗽急慢驚風

及痢疾

半夏 大者十
二箇

巴豆 五十粒去
殼另研

滑石

寒食麵 各一兩

右為末滴水丸如菉豆大捏作餅每服五七餅或八九餅或十一二餅姜湯送下看大小加減一方加輕粉

木香按柳丸 治小兒初得痢疾赤白相雜裏急後重方痢疾

○廣按小兒痢疾皆因感寒停積飲食所致初得一二

日間元氣未虛宜用此丸與玉餅子分寒熱利之日

子既久涉虛宜用香連丸木香散之類和之雜用豆

寇香連丸水者木香丸之數服之

香連丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重方是痢疾

胃風湯 治風冷乘虛客干腸胃水穀不化泄瀉不利腸

鳴疔痛或下如豆汁或頻下紫血方是胃風

木香散 經方治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白木 用麩炒 麥芽 木香 人參 當歸

陳紅麩 名一錢同
白木炒 茯苓 神麩 甘草

青皮 名二錢

丹溪心法附錄卷之三十一

右為末每服半錢或二錢白湯調下一方用紫蘇木瓜

湯調下

豈寇香連丸

和劑方

治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之

氣客於腸間下痢赤白腹內疴痛日夜頻併不欲飲食

黃連

錢五分

肉寇二箇煨

木香半兩

丁香

半錢

訶子

炮去核半兩

右為細末粟米粥和丸黍米大每服三十九米湯下大

小加減丸數

水煮木香丸

治下痢赤白裏急後重

真人養臟湯

治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏

急後重臍腹絞痛並皆治之

並見痢疾

木香散

湯氏方

治冷痢腹痛不食

木香

錢半

厚朴

半兩

白朮

半錢

龍骨

當歸

半兩

乾姜

錢半

訶子肉

各二錢半

右為末水半盞姜三片煎服隨大小加減

一方治休息痢及痔瀉日久不能安者

湯氏方

用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以鷄子

拌和炒熟空心食之

赤石脂散

錢氏方

治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂

副去

伏龍肝

各等分

右為末每用半錢傳腸頭上頻用

又方 治瀉痢後脫肛

用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下

養胃湯 治內傷生冷外感風寒增寒壯熱或發寒熱

方見瘡類

草菓飲 張氏方 治發瘡寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴 青皮去白 草菓 藿香 半夏麩

甘草炙 丁香皮 神麩炒 良姜各等分

右父咀每服二錢水一盞姜三片棗一枚空心煎服

○廣按以上二方治小兒瘡疾寒多熱少無汗者

清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱方見瘡類

常山飲 張氏方 治一切瘡疾

常山 人參 草菓 知母 甘草

厚朴姜汁制一宿炒 貝母 半夏麩 茯苓

右父咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚空心煎服忌

雞肉牛肉諸般毒食

○廣按已上二方治小兒瘡疾熱多寒少有汗者

鬼哭飲湯氏方治瘡疾久未愈者

常山 大腹皮 茯苓 鱉甲醋炙 甘草炙 等分

右為末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之略吐出涎

不妨

露星飲湯氏方治久癯成勞

秦艽去芦 白朮 柴胡去芦 茯苓去皮 半夏麩

檳榔 黃芩 常山 甘草 官桂各等分

右吹咀每服三錢酒醋各一盞姜三片煎露一宿次早服

○感冒四氣新增

附諸方

麻黃湯錢氏方 治傷寒發熱喘急

麻黃去根節剉 二錢 水棗 肉桂去粗皮 一錢 甘草一錢

杏仁四錢去皮尖炒

右吹咀每服四錢水一盞煎服有汗不宜服

人參羌活散和劑方

羌活 白獨活 柴胡去芦 川芎 人參

甘草炙 白茯苓各一兩 前胡 桔梗去芦 地骨皮

天麻酒浸焙各半兩 枳殼去穢炒

右吹咀每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉棗半枚煎服 瘡疹未發亦可服

解肌湯湯氏方 治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩或用人參 芍藥 獨活各半兩

川芎 前胡各二錢

右咳嗽每服二錢薄荷一葉姜一片水半盞煎服

七寶散 湯氏方 治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉 香附子炒去毛 橘皮 甘草

桔梗 白芷 川芎各一兩 加麻黃半兩

右咳嗽每二錢水一盞姜一片棗半枚煎服

參蘇飲 和劑方 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結為熱此

藥解肌退熱寬中快膈止嘔吐開胃進食

紫蘇葉 乾葛 半夏製 前胡去苗 人參去苗

白茯苓各六分 枳殼炒 甘草炙 桔梗去芦

陳皮各四分

一方加木香少許

右用水一盞生姜三片棗一枚煎溫服

不換金王氣散 和劑方 治四時傷寒感冒風濕瘴疫時氣

頭疼壯熱或霍亂吐瀉臍腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴制 藿香去土 甘草炙 半夏製 蒼朮制

陳皮各八分

用水一盞姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

黃連香薷散 治伏暑發渴或作癰痢並宜服之 方見中

紅綿散 治夾驚傷寒 方見驚風

丹溪心法附錄卷之三
金沸草散 和劑方 治風化痰除頭目昏痛項頸強急往來

寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠
粘及時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 去梗前胡各七分半 荆芥 一錢 麻黃 七分半 甘草 一分
半夏 制赤芍藥各二分半

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至八分温服
薄荷散 湯氏方 治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉 兩半 羌活 全蝎 麻黃 去節 甘草 一錢二分
姜蚕 天竺黃 白附子 炮各二錢半

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙
華蓋散 治肺感寒邪咳嗽鼻塞聲重 方見咳節

潤肺散 和劑方 治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕
貝母 去心炒 杏仁 去皮炒 麻黃 去節 人參 各二兩

阿膠 炒半兩 陳皮 二錢 甘草 一兩 桔梗 半兩
右咬咀每服二錢水一盞食後煎服

人參散 經濟方 治咳嗽發熱氣喘吐紅
人參 天花粉

右為末每服半錢蜜水調下
百部丸 湯氏方 治小兒感寒咳嗽

百部 焙乾 麻黃 去節各二錢半 杏仁 四十箇去皮尖微炒

右為末煉蜜丸如芡實大熱水化下

一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸噲化尤妙

瀉肝散 錢氏方 治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮 地骨皮各一兩 甘草 各二錢半

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

補肺散 錢氏方 治肺氣不足咳嗽喘急

呵膠 妙一兩半 牛蒡子 甘草 各半錢 馬兜鈴 半兩 杏仁 七箇去皮尖

糯米 四兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

流金丸 全嬰方 治小兒咳嗽痰盛

半夏 制二錢 白礬 二錢 寒水石 一錢六分 硃砂 一錢

雄黃 一錢

右為末麵糊為丸茅豆大生姜湯下每服二十九大小

加減丸數

雄黃丸 治小兒諸般咳嗽鹽醋等哮無治大人

雄黃 五錢 半夏 一兩 人言 明者 白礬 巴豆 另研二錢

右用明礬火化開入信石礬枯乾再研為末再炒成砂

同前藥為末和勻麵糊為丸如梧桐每服三十九大小

加減臨睡桑白皮湯冷送下或冷茶湯下亦可

升麻葛根湯 錢氏方 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢

體煩疼及瘡疹末發疑似之間並宜服之

升麻 白芍 甘草各一錢 葛根二錢

右用水一盞煎至半盞去粗稍熱服日二三服

柴胡升麻湯 和劑方治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼口燥咽乾心胃煩滿寒熱往來咳嗽痰盛涕唾稠粘

柴胡 去苗 前胡 去苗 乾葛 石膏 赤芍藥各

升麻 三分 桑白皮 微炒 黃芩 各四分 荆芥 五分

人參前胡湯 湯氏方治小兒感冒發熱

前胡 去苗 一錢四分 柴胡 去苗 半夏 湯泡七次 黃芩

人參 去苗 桔梗 去苗 甘草 各七分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至半盞溫服治瘧

加地骨皮去土半錢

柴苓散 湯氏方治腹中伏熱候如溫狀

柴胡 去苗 麥門冬 去心 人參 去苗 赤茯苓 去皮 甘草 各

黃芩 四分

右用水一盞入小麥二十粒青竹葉七片煎服

地骨皮散 集成治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母 柴胡 去苗 甘草 炙去 人參 去苗 地骨皮 去

赤茯苓 去皮 半夏 製各七次

右用水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

加減建中湯 湯氏方 治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黄 甘草 人参 各半 黃耆 二兩 白芍藥 三兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服

田方導赤散 按碎方 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色面赤

生地黄 木通 甘草 各等分

右為末每服四錢水一小匙竹葉三五片同煎溫服

益黃散 按萃方 治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散

次服此藥 方見小兒吐瀉

柴苓湯 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色可赤

柴胡 一錢去苗 半夏 一錢 人参 黃芩 甘草

白朮 茯苓 澤瀉 猪苓 各五分 桂 三分

右吹咀水一盞生姜三片煎至半盞去粗溫服無時

三黃犀角散 湯氏方 治臟腑熱秘

犀角屑 大黃 酒蒸 鉉藤 梔子仁 甘草

黃芩 各半

右為末看兒大小加減熱湯調服

○廣按小兒多有鬱熱因外感風寒內傷乳食而鬱熱發於外鼻塞者是因外感而發以麻黃湯人參羌活湯以後之類治之鼻塞者是因內傷而發宜升麻

葛根湯柴胡升麻湯以後之類治之

○蟲痛疝氣 新增

附諸方

化蟲散 治嬰孩小兒蛔蟲腹痛 幼幼方曰蛔厥多似
慢驚但唇口紫者是蛔厥 湯氏曰每月初五日已煎
蟲頭向上可取以後可安

雷丸 三錢

史君子 十六歲
十箇

鶴虱 二錢 甘草

大黃 各三錢

右為細末用猪肉煮汁調空心服

檳榔遣虫散 治嬰孩蛔虫咬心吐涎疼痛惡哭不止

檳榔 炒有性

鶴虱

貝貝

乾漆 炒有性

蕪荑

川練子

史君子 肉

雷丸

雄黃

黃丹 炒

錫灰 炒不見星
如灰

木香 各二分 巴豆 去皮心
油十箇

輕粉 一錢

右為細末酒煮糊丸如黍子大五更早用猪肉葱油煎
將肉細嚼莫吞引虫頭向上吐去肉用猪肉汁調化虫
散送服檳榔丸至巳時取下虫積可進食五歲可服七
分十歲服一錢大人亦可服

化虫圓丸 和劑方 治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已斗哭
合服

胡椒炒鶴虱

枳榔

苦楝皮各五錢

白礬枯一分 錢二分

右為末麵糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下

靈礬散錢氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五灵脂末二錢

白礬火枯半錢

右為末每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散錢氏方凡虫不可盡去宜安之

枳榔

胡粉炒苦

川練子去皮枝科鶴虱炒黃各二兩

白礬

枯一分 錢二分

右為末每服一錢温米飲調下

川練丸錢氏方治上中二焦虛或冒寒虫動作痛

乾漆

五錢 碎

雄黃

二錢

巴豆霜

一錢

右為末麩糊丸如黍米大看兒大小與服取東向石榴

根煎湯下痛者煎有子者練根湯下或蕪荑湯下亦可

蕪荑散錢氏方治諸虫作痛

白蕪荑

去身

乾漆

炒令烟盡

等分

右為末每服一錢米飲調下臨發時服

化虫丸湯氏方治因疳生虫五心煩熱

蕪荑

黃連

神麩炒

麥蘖

炒各等分

右為末麩糊丸如黍米大空心米飲下

丹溪心法附錄
三稜散湯氏方 治積氣肚痛

縮砂仁 甘草炙 益智炒去殼 三稜 莪朮

青皮去穢炒 各等分

右為末白湯點下

治疝氣方 湯氏方

芫花醃浸 木香 枳榔 三稜炒各兩 附子炮

茯苓去皮 青皮去白 全蝎 肉桂 硃砂各二錢

右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糠醋打麩糊丸如菉豆大每服三十九空心溫酒下未刻再服

一方

小兒心痛欲絕一時無藥可療急用艾炙足大拇指中男左女右

小兒疝痛可灸足大拇指甲後以韭菜聚毛間名大敦穴男左女右

○精聚癰疽新增

附諸方

快膈消食丸 集成 消食積

縮砂仁 橘皮 京三稜 莪朮

神麩 麥芽各半 香附子一兩

丹溪心法附錄

右為末麪糊丸如麻子大食後白湯下隨大小加減
 紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便
 利不調乳食減少又治傷寒傳裏大便酸臭乳食不消
 或已得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成癩
 先寒後熱並宜服之方見吐瀉痢瘕

十全丹 湯氏方 治小兒乳哺不調傷於脾胃丁奚哺露
 枳殼炒 白 檳榔 青皮 陳皮各半 木香二錢
 蓬朮 三稜 砂仁各半 丁香二錢 香附子炒
 右為末神麪打麪糊和丸如黍米大空心米湯送下五
 十九

異香散 治小兒疳積腫脹調理脾胃
 三稜 莪朮 青皮 陳皮 半夏麪
 藿香 桔梗 益智仁 枳殼 香附子
 砂仁 丁香 甘草
 右劉散生姜三片棗一枚同煎食遠服
 香稜丸 治小兒積氣發熱肚腹膨脹肢體瘦弱飲食不
 為肌膚

木香 丁香 檳榔去穢 枳殼去穢 枳朮
 史君子殼 神麪炒 麥芽炒各二錢 三稜煨
 莪朮煨 青皮 陳皮 香附炒各五錢 胡黃連一

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲送下食遠服
三稜散

三稜 莪朮 甘草 益智去殼 青皮

陳皮 神麩 麥芽各二錢

右為細末白湯調化下不拘時候

七聖丸 湯氏方 消積滯調脾胃

芫花先用醋浸一宿炒漸乾一入三稜莪朮同炒令赤色入陳皮川練同炒微焦出用

蓬朮 陳皮去白 京三稜 川練取肉 青皮去白

杏仁去皮尖

右件為細末入巴豆二十粒去油膜和白醋搗丸如粟

米大每歲常服二丸臨卧熱水送下常服宜去巴豆

六味三稜丸 五六箇月小兒未與穀食有癖積者

莪朮煨 三稜煨 神麩炒 麥蘖炒 青皮

陳皮各等分

右為細末稀麵糊丸如菉豆大每服三十九白湯下

三稜煎丸 飲食過多癖悶疼痛食不消化久而成癖又

治婦人血積血塊乾血氣經閉

莪朮黑角者 三稜各一兩二錢 大黃去皮八兩

方為末先以大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬微乾入二味為丸如菉豆大每服十九至二十九食後温白

明濟心法附錄卷之三十一
湯送下虛實加減服大人如梧桐子大每服四十九

升蟾丸 秘方治小兒脾癥瘕痕

木香 人參 黃芪 當歸 桔梗

黃連 三稜炮 蓬木 鱉甲酥炙 夜明沙

綠礬 枳實 史君子 苦練根皮訶子各一兩

蝦蟆燒存性七錢半

右件為末如菽豆大每服三四十九食前米飲下忌生冷雜果子發脾之物大人癥瘕丸如梧桐子大空心服減夜明沙蝦蟆黃連服五七十九

一方 治小兒癩積膏藥

用水紅花子炒二錢大黃朴硝山梔子予石灰各一錢酒醱鷄旦大一塊共搗和為膏用青綿布攤貼再用湯瓶熱熨用手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其効也

一方 治小兒癩積丸藥

用三稜莪朮阿魏薑薑白木陳皮各二錢水紅花子炒三錢大黃三錢為細末棗肉搗為丸如菽豆大每服三十丸空心米飲下

其遂散 湯氏方治胸膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣

一 結脹滿

其遂散 青皮去白 黃芩 大黃炒各等分

右吹咀每服二錢水半盞煎服以和為度

取水方湯氏方積水疝水並皆治之

其遂 青皮去白 陳皮去白 木香炮各一兩 栝榔生用一箇

右為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草

退腫消毒散湯氏方治積水驚水或飲水過多停積於脾

或四肢腫而身熱宜用藥內消之其腫自退

蘿蔔子 赤小豆 甘草炙 陳皮各半兩 木香半錢

右吹咀每服二錢水一小盞姜棗煎服

勻氣散簡齋院方治脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶小便

不利

桑白皮二兩 陳皮去白半兩 桔梗一兩 甘草炙一兩 藿香葉半兩

木通四兩 赤茯苓去皮一兩

右吹咀每服二錢水一小盞姜二片煎服

木香散湯氏方治心經伏熱小使不通

木通一兩 亭牛半兩 滑石一兩

右為末灯心葱白煎服

○調理脾胃

附諸方

參苓白朮散治小兒脾胃虛弱不進飲食方見調補脾胃

四君子湯 調脾胃進飲食見補損

溫脾散 和劑方 治脾胃不和腹脇虛脹不進飲食困倦無力

訶子 炮去核 人參 各七錢半 白朮 木香 桔梗 各半兩

茯苓 藿香 陳皮 黃芪 各半兩 甘草 二錢半

右吹咀每服二錢水半盞姜棗煎服不拘時

丁香散 和劑方 治胃虛氣逆嘔乳不食

人參 半兩 丁香 藿香葉 各二錢半

右吹咀每服二錢水半盞煎熱入乳汁少許煎服

和中散 和劑方 治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴 六兩製 乾姜 炮 甘草 各二兩 白朮 三兩

一右吹咀每服四錢水一小盞姜二片煎空心熱服

調中散 湯氏方 治脾胃不和

人參 去芦 白朮 去皮 木香 白朮 甘草 炙

乾姜 炮 藿香葉 宿砂仁 香附子 炒去巳

丁香 等分

右為末每服一錢姜棗煎湯下如肚疼以白湯點下

醒脾散 湯氏方 治小兒脾胃怯弱為風冷所乘體熱頭眩

霍亂

天南星 二箇重八錢者 人參 去芦 丁香 四十粒 白茯苓

藿香葉 白朮 甘草 炙各半兩

右為末生姜冬瓜子煎服

加減觀音散 湯氏方 調理脾胃宜常服之

白木炒 人參去芦 白匾豆蒸 白茯苓去皮 麥蘖炒

黃芪蜜水炙 甘草 乾山藥 神麴 香附子炮去毛

右為末每服一錢空心米湯調下

五胃散 經濟方 治吐逆頻併手足心熱不進飲食

紅麴三錢半 甘草炙 白木半錢

右為末每服半錢煎棗子米飲下

銀白散 簡易方 治小兒百病

霍香去土 天麻炒 糯米炒 姜蚕炒

川升麻 甘草炒 白附子半錢

木香一錢半 白一錢 香不用豆

山藥 黃芪炒 白茯苓半

白匾豆一兩

右為末隨証加減常服泔湯或米飲調下慢驚搐搦射
香鼓飲下 急驚定後吐不止陳米飲下 夾驚傷寒

發搐薄荷葱白湯下 壯熱面赤乾葛金錢薄荷湯下

天柱倒行步脚軟濃米飲下 疳氣腹急多渴百合

湯下 飲食不知飽肌不生肌肉炒麥芽生薑煎湯下

神氣脫語言不正及吐瀉霍香湯下 暴瀉紫蘇

木瓜湯下 白赤痢不進飲食米飲煎罌粟殼湯下

稟受怯弱每日服常服調理脾胃姜棗湯下 和劑

去木香黃芪白附子姜蚕糯米藿香加知母共味各等

分

瀉黃散 長萃方 瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香 七錢 山梔子 二兩 甘草 半兩 石膏 半兩 防風 兩

右判用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞

同煎清汁服

異功散 按萃方 溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷

病先與數服以正其氣 方見吐瀉痢瘕

進食散 進食神效

白扁豆 微炒 石蓮肉 炒去心 人參 焙各二錢 茯苓 一錢

神麴 二錢 甘草 炙 白芷 木香

黃芪 實水浸炙 各一錢

右為細末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢

水半鍾生姜一片棗子半枚煎十數沸調末服之

人參沉香散 治脾氣虛

人參 木香 白木 沉香 各伍錢 茯苓 兩

甘草 白芷 各三錢

右為末每服一錢米飲調下嘔吐藿香湯下

○小兒雜方 新增

附諸方

小兒初生回氣法 保生聖方

小兒初生氣欲絕不能啼哭者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶急燃大紙撚蘸油點燈於臍帶上往來遍帶薰燒之蓋臍帶連兒腹待火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗浴洗了方斷臍帶

通小兒大小便法 保生聖方

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先嗽了口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不爾無生蓋有此證知此法可得再生

煉臍法

嘗聞子在母腹中胞胎十月止於臍中與母通氣初降生之時雖曰胎胞已破始於兒口鼻中接天地之氣而呼吸之其臍中所通之氣猶未盡絕况收生之母不明通氣之大理不知斷臍之細功粗心妄意以致斷臍之初因所通之氣招風入內者有之其法祈生小兒綿裹臍帶離肚五六寸處先用軟綿繒住脚於線外將臍咬

斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭三五
炷結作紇絡軟帛腰裹切不可常時揭看待臍根落去
自然無事 一法小兒降生之後即將軟線貼臍根續
住待第三日離肚二脂將臍剪斷用生姜自然汁或香
油和麵裹臍四圍將臍頭鋪艾炙三炷謂之薰臍後不
招風

對顛法 醫方集成

射香 蜈蚣 牛黃未 青黛未各 薄荷半字

蝎尾去尾毒為末半錢

右為末熟棗內和成膏新綿上塗勻貼於顛上四方可

出一指許火上炙火頻熨百日裏外小兒可用此塗并

浴法

浴體法 錢氏方

天麻 二錢 蝎尾去毒 硃砂各半 烏蝎肉 酒浸焙

青黛 白礬各三 射香一字

右為末每用三錢水一碗桃枝一握同煎溫熱浴兒勿

浴背上

雄黃解毒丸 治小兒痰熱上攻 疔纏喉風喉痺雙鵝
腫痛湯藥不下咽痛頰腫等症 此藥止之

雄黃 一兩 巴豆去油 麝香 一錢

右為末醋糊丸如黍米大熱茶清下七丸至十九吐出
頑涎即甦太効如口噤以物幹開灌之下咽無不活者
吐風散 治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎一箇 瓜蒂十箇 赤小豆三十粒

右為末一歲一字温米飲調下未出再服

○廣按丹溪云小兒急慢驚風發熱口噤手心伏執痰
熱咳嗽痰喘此類証並宜湧法吐之別此方可以通
用

救生散

猪牙皂角炮 天南星生 半夏生 荆芥穗

川烏 天麻 防風 細辛去此用

全蝎去毒 草烏炒 薄荷各五分 雄黃五分

右為末入射香一字藥少許研勻用竹管盛藥吹入鼻
中開闕再用生薑汁調藥搽牙根上

疎風散 治小兒五臟中風身體不能自收冒悶不知疼
痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風 犀角 麻黃去節 人參

當歸 川芎 羌活 遠志去心

茯神去木 甘草各等分

右吹咀用水煎食前服末除病根不成痲疾

白餅子錢氏方治小兒停乳以致嘔吐泄瀉腹脹潮熱驚
疳喘嗽等証用此藥下之

巴豆二十四分去皮用水 天南星炮 半夏湯炮七次

輕粉 滑石各一錢

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小豆大捻作餅
子煎葱湯下。廣按人乳味甘懸膈易於停積所以小
兒之病多繫於此此方用南星半夏以豁痰飲用輕粉
滑石以瀉濕熱用巴豆以通利積滯推陳致新之妙用
也

三稜煎丸 治小兒飲食過多痞悶疼痛宿食不化

久而成癖

廣木黑角 荆三稜二味濕熱最 大黃去皮八兩

右將大黃為末銀石器內以好醋浸令透慢火熬成膏
和二藥為丸麻子大或棗且大每一二十九食前溫水
下

廣木化癖丸 治乳食不消心腹飽脹壯熱喘急嘔吐痰

涎食積乳癖

代赭石醋濟 當歸炒 硃砂研 枳殼炒

廣木炮 荆三稜炮各 木香一兩 射香

巴豆去油各

右為末研勻麩糊丸如麻子大每一歲兒二九米飲下
○廣按已上二方消導之劑也但有寒熱輕重之分宜
選用為妙

一方治小兒外腎腫硬及陰瘡

用乾地龍為末先葱椒湯於避風處洗次用津唾調傳
其上

三白散和劑方治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹以
致大小便不利皆治

白牽牛二兩
桑白皮
木通去節
白朮
陳皮各五錢

右為末每服二錢姜湯調下空心服

疳丹散濟生方治小兒外腎偏墜
防風去芦
牡丹皮去木各等分

右為末每服二錢溫酒調服如不欲酒鹽湯點服亦可

疳瘡方
白礬煨
五倍子各一錢

右為末蒸水洗淨貼患處

金華散蘇氏方治小兒一切溫瘡疔癩等瘡
黃蘗
黃連各半兩
黃丹一兩
輕粉一錢

右同研勻先以溫水洗然後貼之

一方湯氏方治濕癬瘡

用蛇床子為末先以葦根煎湯洗次用臘月猪脂調藥傳之

羊蹄散 小兒頭癬久不瘥者

白礬 半兩 羊蹄根 四兩 黃丹 少許

右搗爛入米醋半盞調均候癬極痒搽之至疼即止隔日洗去再搽

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨 訶子肉 各一 沒石子 二枚 瞿粟殼 去穢

右為末白湯點服仍用葱湯蒸洗令軟欸欸以手托上

又用靴一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數層壓

定使熱氣上透不可過熱令病者坐布上如覺布濕

逐旋減之常得溫熱之度非常服前藥

治鼻衄湯氏方 用生蘿菔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血

妄行取汁飲之立効

白飲散湯氏方 治小兒凍耳成瘡或癢或痛

黃蘗 白飲 各等分

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生附散湯氏方 治凍爛脚成瘡

用生附子為末麩水調貼之即愈

香薰煎 湯氏方 治小兒 生發燥痛

陳皮齋 二兩 胡粉 一兩 猪脂 半兩

右用水一大盞煎香薰取汁三分去滓入胡粉

和令勻塗冷頭上日日頻用之

芎黃散 湯氏方 治小兒齒不生

大芎藭 乾地黄 各半兩 山薯蕷 當歸

芍藥 甘草 各二分

右為末熱湯調服用搽齒脚

黃連散 張子和方 治頭瘡

川黃連 黃柏 去粗皮 真輕粉 草決明 各等分

右為末用生小油調藥搽瘡上塗立効

一方 治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名曰蝕痒瘡 幼幼方

黃丹 棗豆粉 一錢 白礬 一錢飛過

右研細乾付瘡上頓調亦可

軟青膏 治一切風熱及小兒頭瘡

巴豆 七箇 瀝青 黃蠟 香油 各五兩

膩粉 一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

大烏散 治小兒癰腫

南星 赤小豆 草烏 黃栢各等分

右為末生薑自然汁調貼患處或用米醋調尤佳

櫛皮散 治嬰孩小兒解癩癰作疼痛

櫛皮 去粗皮此樹在取處有印包鹽樹葉也

右不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芨散 治小兒癩癰膿汁不乾

白芨 貝母 去心各 輕粉 二錢

右為末先櫛皮散洗過後用清油調付

龍骨散 治小兒停耳

白礬 煨一錢 龍骨 煨一錢 黃丹 炒一錢 乾胭脂 半錢

射香一字

右為末以綿杖子展却耳中膿水用藥末一字搽在耳中勿令風入

耳瘡方

黃連 云須 蛇床子 各一錢 輕粉 一字

右為末搗毛管吹藥入耳內

連床散 治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器

層囊瘡則搗爛黃水汁淋 滴燥痛

黃連 去鬚五錢 蛇床子 去土二錢五分 五倍子 二分

輕粉 二十帖

右為末先以荊芥蔥煎湯洗拭乾後用清油調傳

金銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名煉銀瘡

煨金銀鍋 一箇
輕粉 五分

右為末用麻油調傳

澤瀉散 治小兒鼻下兩膀瘡溫痒爛

澤瀉 攪余 甘草炙 山梔子 各

右為末用甘草煎湯調後服

地黃湯 治小兒鼻衄

川芎 生地黃 赤芍藥 當歸 各等分

蒲黃 少許

右吹咀用水煎不拘時

蒲黃散 治初生小兒大小便下血

生蒲黃 油頭髮 燒灰各一錢

右為末用生地黃汁或米飲調乳前服

立効散 治小兒瀉血

蒲黃 生地黃 生甘草 赤茯苓 去皮各等分

右吹咀用水煎入髮灰調勻食前服

聖惠方 治小兒龜背

大黃 錢三 天門冬 去心 百合 木通

杏仁 去皮尖 枳殼 炒 桑白皮 蜜 葶藶 隔紙炒

朴硝 各五錢

右為末煉蜜丸如芡實大用溫湯調化食後仍用灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

枳殼丸 治小兒龜背

枳殼

炒

防風

去芦

獨活

去芦

大黃

煨

前胡

去芦

當歸

麻黃

去節各三錢

右為末麩糊丸如黍米大用米飲食後服仍用灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴五椎下兩傍各一寸半膈俞穴七椎下兩傍各一寸各灸三壯

芎黃散 治小兒蟲運

川芎

山梔

當歸

芍藥

甘草

炙各二錢半

右為末用白湯調化食後服將乾藥末搽齒根

驚風丸 治小兒語連

人參

石菖蒲

麥門冬

去心

遠志

去心

川芎

當歸

乳香

硃砂

各二錢

右為末煉蜜丸如黍米大用米飲食遠服三十九

虎骨丸 治小兒行遲

虎脛骨

酥油

生地黄

酒洗

白茯苓

去皮

酸棗仁

炒

肉桂去粗 防風 當歸 酒洗 川芎 牛膝酒洗各五錢

石為末煉密丸如黍米大用三十九木瓜湯食前服

牡蠣散 治小兒盜汗

牡蠣煨二錢 黃芪蜜炙兩 生地黄一兩

右以酒分作三服水煎不拘時

○廣按小兒如草頭之露水。上泡用藥不可不謹也。

夫小兒之病多因脾胃嬌嫩。乳食傷積。痰火結滯。而然其証不一。且舉其尤者而言。乳食傷胃則為嘔吐。乳食傷脾則為泄瀉。吐瀉既久則成慢驚。或為疳積。乳食停積則生濕痰。痰則生火。痰火交作則為急驚。

或成喉痺。痰火結滯則成癩。吊或為喘嗽。胎熱胎寒者。稟受有病也。胎風撮口者。胎元有毒也。鵝口口瘡者。胃中有濕熱也。車舌木舌者。脾經有實火也。胎驚夜啼者。和熱乘心也。變蒸發熱者。胎毒將散也。丹毒者。火行於外也。溫熱者。火積於中也。中惡者。外和乘也。睡驚者。內火動也。疳積者。腹中食積也。癰者。膈上痰結也。外感發熱者。鼻塞聲重也。內傷發熱者。口苦口乾也。心痛者。虫所齧也。疝痛者。寒所鬱也。積有常所。有形之血也。聚無定位。無形之氣也。胃者主納受也。脾者主運化也。脾胃壯實則四體安康。脾胃虛弱則

丹波人江戶醫學博士著
有病蜂起崇童科者可不以調理脾胃為切要哉



丹溪心法附餘卷之二十三

癸集

小兒門

痘瘡 一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加解毒藥
血虛者四物湯中加解毒藥 酒炒黃芩黃連名解毒藥

凡痘疹初出之時色白者便用大補氣血人參白朮黃耆

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥 若大便瀉加訶子肉豆蔻 但見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

吐瀉食少為裏虛 不吐瀉能食為裏實裏實而補則結 癰毒 陷伏倒靨為表虛灰白者亦表虛或用燒人屎紅活縱凸為表實表實而更復用實表之藥則要潰爛不結痂

吐瀉陷伏二者俱見為表裏俱虛 黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服 出子和方 瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少重

者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌乾喫入味砂末尤妙

痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯 黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃耆酒紫草人參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸川芎酒洗芍藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃連黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大解痘毒 爐灰白色靜者怯者作寒者

勇者燥者煇發者作熱者

痘瘡鼠粘子連翹山查甘草此四味始終必用之藥

全白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊

俗呼倒靨不好但服食表之劑消息他大小便如大便

秘通大便小便秘通小便

有初起煩燥譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以

涼藥解其標如益元散之類亦可服

痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無

力氣怯 輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上

虛痒者以實表之劑加涼血藥

實痒如大便不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結

糞

疎則無毒蜜則有毒宜涼藥解之雖數十貼亦不妨無害

眼之患

瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火只用輕劑荆芥升麻葛

根之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如痘瘡傷眼必用山柘决明赤芍藥當歸尾黃連防風連

翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣

復自明

痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩已成

膿必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗 上引用升麻
 葛根 下引用檳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蒌
 之類 大便燥用大黃發寒熱用黃柏黃芩
 痘瘡黑屬血熱涼血為主 白屬氣虛補氣為主 中黑
 陷而外白起得遲者則相兼而治
 初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而汗收也
 痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則黃
 耆生血活血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍為君
 黃芩亦為君佐 以白芷連翹續斷之類
 若屬寒陳氏方亦可用

入方 鮮痘瘡毒

絲瓜 升麻 酒炒藥 生甘草 黑豆

山查 赤小豆 犀角 寺分

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治痘瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜水調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母 南星 殭蚕 天花粉 白芷

寒水石 最多 草烏 大黃 猪牙皂角

右為末醋調傳之

附諸方

○補虛

黃耆紫草人參湯 治痘瘡表虛黑陷

即前丹溪方

黃耆 酒炒

紫草 酒炒

人參 各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散

治痘瘡裏虛吐瀉及和胃助氣

楊氏方

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮

木香 各等分

右為末每服五錢水一大盞姜棗同煎六分服

白朮散

治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘無顏色

首尾可服

人參

白朮

茯苓

甘草

木香

藿香 各七分

乾葛 一錢四分

一方作乾姜止泄瀉用

右為粗末水一大盞姜棗同煎至六分溫服

大補湯

實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

人參

白朮

甘草

白茯苓

黃耆

官桂

各等分

右咬咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

丹溪心法附錄卷之三

痘瘡治例

心法附錄曰小兒九覺身熱証似傷寒若未經瘡痘疑似未明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散

熱甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通湯或快斑散

出太甚者人參敗毒散犀角地黄湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四

順清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠黏子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胃腹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下痢嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若隱入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚綿益之若猶未也獨聖散入射香老

酒調或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便
自利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化
毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則腸胃
壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉墮然
不旋踵而告變矣

○發熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓 細辛 桔梗 瓜蒌根 人參

甘草 白木 川芎 各等分

右為末每二錢水煎入薄荷三葉同煎服

參蘇飲 治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘

症是與不是疑似之間此藥甚為穩當

楊氏調解散即是此方

前胡 人參 紫蘇葉 乾葛

半夏 湯泡七次 姜汁製 茯苓 各三分 枳殼

陳皮 甘草 桔梗 各二分

右以咀姜棗煎微熱服

人參羌活散

羌活 獨活 柴胡 人參 川芎

枳殼 茯苓 各三分 前胡 北梗

天麻 地骨皮 耳草 各一分半

加麻黃薄荷葱白煎服 汗後尚熱宜服此去麻黃加

紫草 如已見三五點加紫草陳皮赤芍使熱退瘡出

亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒

消毒救苦散 按萃方治斑疹悉具消化便令不出如已出

稀者再不生斑

麻黃 羌活 防風 各五錢 川芎 藁本

葛根 蒼朮 酒黃芩 生黃芩

柴胡 各二錢 細辛 橘皮 紅花 蘇木

生地黃 酒黃柏 連翹 各五錢 黃連 三分

生甘草 一分 吳茱萸 半分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去渣熱服

三豆湯 治天行豆瘡但覺有此證即服之

赤小豆 黑豆 藜豆 各一兩 甘草 節 五錢

右淘淨水煮熟任意食豆飲十七日自不發

惡實膏

用惡實子為末蜜調貼顙門上免有患眼之疾

熱甚者

升麻葛根湯 加山查大力子其瘡稀疎而易愈

川升麻 甘草 白芍藥 各一錢 葛根 半錢

升麻湯 去升麻 甘草 白芍藥 各一錢 葛根 半錢

丹溪心法附錄卷之三
右吹咀作一服水一盞半煎八分溫服

人參敗毒散

方見前

涼膈散 治小兒瘡疹未出三焦積熱煩燥多渴及面赤

面熱頭昏咽喉喉腫痛口瘡便溺赤澁狂言譫妄睡卧

不安並宜服之

大黃 朴硝 甘草 梔子仁 黃芩

薄荷葉 各一兩 連翹 四兩

右爲末每服二錢竹葉五片蜜麥小水一盞煎六分溫

服

若瘡疹已出發熱作渴脈實亂便實者亦宜服此便

不實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱溫涼不同形氣盛虛之異虛寒

者用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之效若以

實熱爲虛寒用異功散虛寒爲實熱用涼膈散死生在

反掌之間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡疽已發以此消毒

紫草茸 牛兩 升麻 甘草 各二錢半

右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散 簡易方 治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸 木通 去節 甘草 枳殼 去白 炒

右吹咀每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草 木通 黃耆 川芎 木香

甘草 炙 減半

右為粗末水煎服 大便閉加枳殼 大便如常加糯

米百粒 楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯 治瘡出不快大便泄利

紫草 木香 茯苓 白木 等分 甘草 炙 少

入糯米煎服 楊氏云紫草能利大便白木木香佐之

紫草木通湯

紫草 人參 木通 茯苓 糯米 等分

甘草 減半

右剉煎二錢溫服 內虛大便利者可入南木香去紫

草

快斑散

紫草 蟬殼 人參 白芍 各半 木通 一錢

甘草 炙 半

右剉散煎二錢溫服

又方

紫草茸 五錢 陳皮 二錢 黃耆 三錢 赤芍 五錢

甘草 炙三錢

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後
瘡遍勻四肢住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調 楊氏云發豆瘡最妙或
加甘草紫草

消毒散 和劑方 治毒飲壅遏壯熱心煩瘡疹難出未能勻
透

牛蒡子 炒六兩 荆芥 穗一兩 甘草 炙二兩 防風

升麻 各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出太甚者

人參敗毒散 方見前

犀角地黄湯

犀角 一兩 生薑 二兩 赤芍 七錢半 牡丹皮 一兩

右咬咀三歲兒三錢水煎

○稠密者

加味犀角消毒散

丹溪心法十餘卷卷之三

惡實

四兩炒甘草

防風 半兩

荆芥穗 二兩

宜加山查酒黃芩酒洗紫草減食加人參

右為末煎紫草糯米芫荽湯調服食後臨卧日三一

黍粘子湯 按華方 治癰子已出稠密身表熱急與此藥以

防已後青乾黑陷

鼠粘子 炒香

當歸 各一錢

酒洗 甘草 各一錢

柴胡

連翹

黃芩

黃耆 各一錢

地骨皮 二錢

右為粗末每服二錢水煎去滓温服空心藥進且休與

乳食

○小便赤澀者

大連翹湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前

當歸

防風

柴胡

赤芍

滑石

蟬蛻

甘草 各一錢

黃芩

山梔子 各半錢

甘露飲子

生苜

熟苜

天門冬 去心

麥門冬 去心

石斛

枇杷葉 去毛

山茵陳

甘草

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

右剉每二錢水一盞煎八分食後服

五苓散

丹溪心法附錄卷之三

加麥門冬煎服 方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服 方見溫熱類

四順清涼飲子

當歸 赤芍 大黃 虛者煨實者生 甘草 各等分

一方加陳皮梗米煎

○咽喉痛者

如聖飲子

桔梗 鼠粘子 炒各二錢 麥門冬 三錢

右為末竹葉同煎二三錢 一方加荊芥防風重者竹

瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子 炒 荊芥穗 二錢 甘草 一錢 防風 半錢

右為細末沸湯點服 去防風名消毒散

○喘滿氣壅者

麻黃苦杏仁湯

麻黃 三錢 赤芍 黃芩 各二錢 甘草 炙

桂枝 各半錢

○胃腹脹滿者

甘遂心失付餘

桔梗枳殼湯

枳殼

桔梗各二兩 甘草炙半兩

右劉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

加枳殼

右劉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草

瓜蒌根 等分

右為末每一錢煎服

烏梅湯

小黑豆

菴豆各一合 烏梅二箇

右咬咀新汲水一盞煎取清汁旋服

人參麥門冬散

集驗方

治發熱煩渴

麥門冬

一兩 去心

人參

甘草

陳皮

白朮

厚朴

姜製各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎六分去渣溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜

方見中寒

○陷入者

加味四聖散

方見前

胡荽酒

以芫荽煎酒薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚

綿蓋之

獨聖散

牛旁子

炒五錢

白殭蚕

二錢半

右末入紫草三莖同煎連進三服 前條云獨聖散入射香老酒調劑如不用酒則木香煎湯調服

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑陷者

宣風散

檳榔二箇 陳皮

甘草

各半兩

黑丑

四兩半

生半熟

右為末每一錢量大小與蜜湯調下

無價散

御藥院方

治斑痧不出黑陷於死者

人猫猪犬膈晨燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難消

右將前四物於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭

火煨令烟盡白色為度但是瘡發不快倒靨黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜湯調服其效如神

一說人糞用九歲以下無疾童子者猪猫犬糞用未破陽雄者先於重九日各置於淨處飼之以飯勿令雜食過旬日換盡腸之宿垢方收其糞陰乾候臘八日日未出時燒

百祥丸

紅芽大戟不以多少陰乾槳水煮極軟去骨日中曝乾復納元汁中煮汁盡焙為末水丸如粟米大每服一二十九丸研赤芝麻湯下

又湯氏方 治小兒豆疹黑陷者

羌活 一兩

川山甲 醋炒

生人骨 火煨存性各半兩即人牙

麝香 少許

右四味為細末麻黃薄荷煎湯調一錢只用一服便起萬不失

乳香散 治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急煎乳香散服之

乳香 半錢或一二

右用水一盞煎服 一方加沒藥赤芍藥當歸同煎

○疔毒

丹溪心法附錄卷之三十三

四聖丹 治痘瘡中有長大紫色者為疔毒把住痘瘡不起發急用簪尖挑破紙入此丹

珍珠

三五顆淨火鐵器上煇微黃色研

碗豆

四十九粒煇灰存性

頭髮

煇灰存性

右為細末用搽面油臘脂調成膏于將兒在温燠處安存忌風寒穢氣先用簪尖平撥開疔口將藥紙入疔內即時變為紅白色餘瘡皆起 又嘗見有疔豆者但挑破出其黑血即愈或挑開用口啞去黑血或用綿裹指甲插其黑血展去亦可蓋目疔豆破而毒氣得散也

○愈後諸疾

五福化毒散

湯氏方

治疹痘餘毒未解并上焦熱壅口齒

出血

玄參

一兩

桔梗

去鹽

赤茯苓

人參

牙硝

別研各半兩

青黛

二錢

甘草

一錢

麝香

半錢別研

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化下 齒血臭氣用生地黄汁化下

人參白朮散

蘇氏方

治痘已靨身熱不退此藥清神生津

除煩止渴

人參

白朮

藿香葉

木香

甘草

白茯苓

各一兩

乾葛

二兩

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散 集驗方 治小兒因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

雄黃一兩 銅綠二錢

右同研極細末量瘡大小乾摻其上

綿重散 陳氏方 治因痘瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不

絕

用出城綿重不拘多少以生白礬搥碎置其內炭火

燒令礬汁盡取細研乾摻瘡上

穀精草散 陳氏方 治痘已靨眼目翳膜或癰澁多淚

穀精草一兩 生蛤粉一兩

無他疾不宜服藥

凡療瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏

俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難

靨也

凡初發痘瘡可用胡荽酒透房噴之以辟穢濁之氣則痘

瘡易收又急乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則痘瘡不入

眼內

若痘疹已出未出之時或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛

速與十一味木香散治之以和五臟之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂

丹溪心法附錄卷之二十三
之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣
若瘡疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或
腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻
散送下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣
若總寬傷風身熱未明是與不是瘡疹便宜發散可服四
味升麻葛根湯

若瘡疹始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷
者或身熱泄瀉者或身熱驚悸腹脹者或身熱汗出者
皆不宜服升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香散
治之

若瘡疹始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱
實也其瘡必光澤起發肥滿易靨而不致損傷也

若痘瘡已出發熱口乾煩渴不止者切不可飲冷水亦不
可食蜜及紅柿西瓜等冷物又不可妄投清涼飲消毒
散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則脹腹喘悶寒戰咬牙
則難治咬牙者齒橋也乃血氣不榮不可妄作熱治之
若痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解
散致令臟腑受冷榮衛滯則血氣不能衝貫皮膚肌
肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多
痒塌煩燥喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生

而必罕矣

若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送下七味肉豆蔻丸治之如瀉止住服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨也如身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪腰一塊以淡白水浸火煑軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑滋潤便瘡易落百無滯碍切不可妄投宣藥恐內虛

瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七日身壯熱不大便其脈盛與三味消毒散微得利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩三日至十三日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散

若痘瘡欲靨已靨之間或不能靨腹脹煩渴者不可與水蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者

不可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之
若十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧臥則
噁氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以
救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之即死

若十二日十三日瘡痂已落其瘡癩猶黯或凹或凸肌肉
尚嫩不可澡浴亦不宜食炙博物又不宜食五辛五疔
并有毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生醫障若不依
此禁忌必為小兒終身之患用兩疔穀精草散治之

若豆瘡已靨其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西
瓜红柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或
腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散救
之即瘥

若身壯熱經日不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治
之熱退住服如不愈只服七味人參白朮散治之

若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘
毒未盡以四味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味
人參白朮散主之

若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不
愈者以七味人參白朮散主之

若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤以十六味人
參白朮散治之

參清膈散治之如不愈只服七味人參白朮散立效
若痰實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急以五味前胡
枳殼湯治之

凡痘瘡首尾不宜與水喫少與冷熱湯則可若悞與之瘡
靨之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成疔蝕瘡血水
不絕甚則面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外
主身之肌肉祗緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾
胃肌肉虛則津液衰少津液衰少則榮衛澁滯榮衛澁
滯氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也
若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服

七味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服十
一味木香散治之

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身
溫渴者或身熱面皸白色渴者或寒戰渴不止者或氣
急咬牙渴者或飲水轉渴不止者以上九證即非熱也
乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治
之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發
表其表裏俱實而瘡不致於瘳塌喘渴死矣

若痘疹已靨未愈之間五臟未實肌肉常虛血氣未得平

復忽被風和搏於膚腠之間則津液澁滯故成疔蝕瘡也宜用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

凡斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤疹遍體也凡發赤斑者十生一死發黑斑者十死一生難治葛根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪癩疹豆疹各立病目所治不同而陳氏疹疹混同立論豈不悞哉夫豆疹出於脾其間有熱燥者有寒熱者而癩疹出於心肺心脾屬陽多是風熱

兼痰而作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是肺胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散活之方合病情可見瘡疹不可一途而治也明矣

凡痘瘡或悞抓成瘡膿血淋漓緣血氣衰肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草散治之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲食陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香

散加丁香官桂治之陰盛則補陽虛用異攻散加木香
當歸每一兩藥共加一錢異攻散能除風寒濕痺調和
陰陽滋養氣血使豆瘡易出易靨不致痒塌木香散性
溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也
善治小兒腹脹瀉渴其效如神不能盡述大抵天地萬
物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者
也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易靨
蓋因外常和煖內無冷氣之所由也

凡痘疹五不治一痒塌寒戰不止者二紫黑色喘渴不寧
者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水
者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若豆瘡已出七日之間其瘡不紫澤不起發根窠不紅痒
塌抓搔謂之表虛也可隨證服藥蓋脾主身之肌肉肺
主身之皮毛今痘瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先
當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏沖和
其瘡自然易出易靨也故經云表病裏和不治而自愈
也

今將痘疹輕重開具于后

輕者 作三次出 大小不一等 頭面稀少

眼中無 根窠紅 肥滿光澤

重者

一齊并出

如黍種

稠密

瀉渴

灰白色

頭溫足冷

身溫腹脹

輕變重

犯房事

不忌口

先曾瀉

飲冷水

餌涼藥

重變輕

避風寒

常和煖

大便稠

今將痘疹方開其于后

胡荽酒

以荽荑煎酒透房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則痘瘡不入眼內

升麻葛根湯

木香散十一味

木香

大腹皮

人參

桂心

青皮

赤茯苓

前胡

訶梨勒

半夏

丁香

甘草

右吹咀每服二錢水一盞姜三片同煎空心溫服量兒

大小加減 一方去桂心丁香加桂枝藿香

異攻散 十二味

木香

當歸

官桂

茯苓

升麻 心去 木香 各半

白木各二錢 人參 厚朴姜炒 肉豆蔻 丁香

陳皮各二錢半 半夏姜製 附子炮去皮各一錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗三枚同煎空心

溫服量大小加減一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻七味

木香 縮砂仁各三錢 訶子肉

肉豆蔻各半 赤石脂 枯白礬各七錢

右為細末麪糊丸如黍米大一歲服三五丸三歲服

百丸米飲湯下瀉甚者煎異攻散吞下瀉不止多服或

瀉水穀白色淡黃色木香散送

消毒散 出後身壯熱不大便其脈緊盛用此微利

牛旁子四兩 荆芥穗 牡草各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

人參麥門冬散六味 出後身反發熱煩渴者 方見前

人參白朮散七味 出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉 方見前

柴胡麥門冬散六味 出後身壯熱經日不除

柴胡 甘草炙 人參去蘆 黑參各二錢半

龍膽草一錢半 麥門冬去心三錢

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯四味 壯熱便實口舌生瘡咽喉腫痛

鼠粘子炒四兩 升麻 射干各一兩

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減

桔梗甘草防風湯三味 治風熱咳嗽咽膈不利

桔梗 甘草各 防風各等分

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減

人參清膈散十六味 治涕唾稠粘身熱鼻乾

人參 柴胡 當歸 芍藥 知母

桑白皮 白朮 黃耆 紫苑 地骨皮

茯苓 甘草 桔梗各一兩 黃芩半兩 石膏

滑石各一兩半

右每服二錢水一盞姜三片同煎溫服量大小加減

前胡枳殼湯五味 疾實壯熱胸中煩悶大便堅實

前胡一兩 枳殼 赤茯苓 大黃

甘草各半兩

右吹咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫

脈微并瀉者不可服

雄黃散 因痘瘡牙齦生疳蝕瘡 方見前

綿繭散 因痘瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不絕者

方見前

敗草散 用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可其草經霜

丹溪心法卷之三

露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐卧可用二三升攤於席上令兒坐卧其效如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉一兩 輕粉一錢

右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄村瘡上如痘瘡欲落不落當滅癩痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以瓷盒盛之塗瘡上如痘瘡甚俱極成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂落亦無紫黑癩痕

穀精草散 治熱毒薰於肝膈眼目多生翳障

蒼木散 治疔瘡入眼

蒼木 乾葛各一兩 槐花 藁本 蛇蛻

防風 枸杞 白蒺藜各三錢 黃芩

川芎各半兩 白菊花 木賊

甘草各二兩 蟬蛻四錢 乳香

沒藥各半錢 硬石膏

穀精草 三錢

右為末每二錢白水煎食後服

菊花散 治痘瘡入眼

白菊花 三兩 葉豆殼

蜜蒙花

旋覆花

穀精草

甘草 各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米泔一盞煎乾為度

取乾柿食後服之

蟬菊散

豆豉入目或病後生翳障

蟬蛻 去土淨洗

白菊花 各等分

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後溫服

豈兒大小加減

葛根麥門冬散

治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根

麥門冬

三錢 去心各人參 去蘆 二錢

石膏 半兩

川升麻 錢 甘草

茯苓 各二錢

赤芍藥 一錢

石每服二錢水一盞煎溫服看兒大小加減

生地黄散 治斑駁疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黄 半兩

麥門冬 七

去心杏仁 湯泡 去皮 欵冬花

陳皮 各三錢 甘草 三錢 牛夕

石每服二錢水一盞煎服量大小加減

麥湯散 治水痘 方見前

丹溪心法附錄卷之三

廣按瘡疹之源蓋由母妊娠之時飲食煎炒多傳厚味醇酒兒在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒為疔毒肺之毒為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿泡瘡小兒稟厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易靨苟或稟弱毒盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生前輩明醫錢仲陽氏出究其病源是熱是燥故用辛涼之藥以清熱潤燥及陳文中氏出又見病源之中有寒濕者故用辛溫之劑以溫寒散濕此二

先生兩得之後之宗益氏者惟知辛涼之是務而寒濕者不宜宗陳氏者惟以辛溫之是從而熱燥者不可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰痘疹看氣血虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是濕宜瀉濕又曰爛灰白色滯者怯者作寒看勇者燥者燥發者作熱看先生之言可謂活潑潑地矣以此觀之小兒痘疹表裏充實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補虛及痘疹治例具之於前使小兒痘疹屬熱燥者宗

之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘疹屬寒濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色脉證寒濕熱燥及天府寒暄而分治之嬰孩之幸也又按王節齋論曰丹痧痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若痘瘡伏淡白色及內瀉渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方若勇盛稠密紅紫色及大便燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救且是胎毒古人治只解毒然吐瀉裏虛則送毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千

千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方一丸屬毒盛轉紫色者不過七八日蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發於表七八九日成膿而結痂矣若毒氣盛不能一出過六日毒反內入臟腑故須於六日以前毒氣一出之時急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日

久而後死此虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣
多便先宜解毒然則則恐氣血周貫不足故隨後亦
宜無補藥以助成膿血

丹溪心法附餘卷之二十三 終

丹溪心法附餘卷之二十四

雜治門

論倒倉法

丹溪心法

○倒倉法治癱勞蠱癩等證推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤順取長流急水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉爛成担為度瀝去滓用肉湯再煮如琥珀色隔宿不喫晚飯大

丹溪心法附錄卷三十四
便秘者隔宿進神芎丸不秘者不用五更於密室不通風
處溫服一鍾伺膈間藥行又續續服至七八鍾病人不欲
服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯溫
之病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其不納病在
下欲利多者須疎服又不可太疎恐其不達臨時消息大
抵先見下方可使吐須極吐下伺其上下積俱出盡在大
便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐利後或渴不得與湯
其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二椀非惟可
以止渴抑者可以滌濯餘垢睡一二日覺饑甚乃與粥淡
食之待三日後始與少菜羹自養半月覺精神煥發形躰

輕健沉痾悉安矣 大槩中間飲至七八鍾時藥力經涉
經絡骨節搜逐宿垢正和寧不牴牾悉有急悶似痛非痛
自有惡况此婚消息和勝正將就擒耳尤須寧耐忍受
又於欲吐未吐欲泄未泄交作皆有惱括意思皆須歡喜
樂受一以靜處之此等有大大半日景象不先說知使方寸
瞭然鮮有不張皇者矣 未行此法前一月不可近婦
人已行此法半年不可近婦人五年不可喫牛肉性急好
淫不守禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起三鍾慢飲
最緊要能行經隧中去

法曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉倉

積穀之室也倒者傾去積舊而滌滌使之潔淨也經曰
胃為受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散積聚
既久致傷冲和諸病生焉今用黃牯牛肉其義至矣夫
牛坤土也黃土之色也以順為德而效法乎健以為功
者壯之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也橫
散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲無不入也積
聚久則形質成依附腸胃回薄曲折處以為栖泊之窠
白阻礙津液氣血熏蒸燔灼成病自非剖腸刮骨之神
妙熟能去之又豈合勺銖兩之九散所能窺犯其藩牆
戶牖乎夫牛因全重厚和順之性潤粘澤槁豈有損也

其方出於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾
養壽之一助也

附諸方

霞天膏

韓飛霞方

此方即倒倉古法傳自西域有人指予

投煎劑治疾而遂推廣之

黃牯牛一具

選純黃肥澤無病才一二歲者

右洗淨取四腿項脊去筋膜將精肉切成塊子大栗大
秤三十斤或四五十斤於煑室以大銅鍋無則用新鐵鍋加長
流水煮之不時攪動另以一新鍋煮沸湯旋加常使水
淹肉五六寸掠去浮沫直煮至肉爛如泥盡去滓却將

肉汁以細布漉入小銅鍋用一色桑柴文武火候不住
手攪不加熟水只以汁漸加如稀錫滴水不散色如琥
珀其膏成矣此節火候最要大段每肉十二斤可煉膏
一斤為度磁器盛之是名霞天膏也 用調煎劑初少
漸多沸熱自然溶化 用和丸劑則每三分攪白麩一
分同煮成糊或用煉蜜寒天久收若生黴用重湯煮過
熱天冷水罈之可留三日

○廣按治痰之藥用南星半夏者所以燥之也用橘紅
枳殼者所以散之也用茯苓猪苓者所以滲之也用
黃芩黃連者所以降之也用巴豆附子者流通之義
也用竹瀝瓜蒌者潤下之義也雖然實痰新痰之為
病宜此而虛痰老痰之為病所不宜也夫老痰稠粘
膠固於胃臆之間依附盤薄於腸胃之處苟非霞天
膏之浸潤流動而能從上從下以出之乎夫用霞天
膏吐瀉以去痰積則不致虛損元氣所以為美也前
條云倒倉法瀰癱勞鼓噎夫癱勞鼓噎之症乃虛中
中有痰積也愚意治此四證於補虛藥中加霞天膏
以去痰積必然安愈無人知此之妙訣也

論吐法

百有二

丹溪心法

○凡藥能升動其氣者皆能吐 如防風山梔川芎桔梗
 芽茶以生姜汁少許醋少許入薑汁搗服以鵝翎勾引
 之 附子尖桔梗蘆八參蘆瓜蒂藜蘆砒 不甚用 艾葉
 末茶此皆自吐之法不用手探但藥但湯皆可吐吐時
 先以布搭膊勒腰腹於不通風處行此法 一法用蘆
 荀子五合搗入漿水漚過入清油白蜜少許旋半湯用

帛緊束肚皮然後服以鵝翎探吐其鵝翎平時用桐油
 浸皂角水洗晒乾待用 又法用鰕帶殼半斤入醬蔥
 姜等料物煮汁先喫鰕後飲汁以一翎勾引即吐必須
 緊勒肚腹 又法苦參末赤小豆末各一錢薑汁調重
 則宜用三錢吐法取逆流水 益元散吐濕痰 白湯
 入鹽方可吐 人參蘆煎湯吐虛癆凡吐先飲二椀隔
 宿枳椇半兩陳皮二錢甘草二錢煎湯凡吐不止麝香
 解藜蘆瓜蒂 葱白湯亦解瓜蒂 甘草搗解諸藥白
 水搗解

充按三法中惟湧劑為難用有輕重卷舒之機汗下則

一定法也故特註吐為詳者恐人不深造其理徒倉皇顛倒反有害於病耳今總列諸法于此使臨病隨機應變披卷瞭然不必搜檢而便施於治也

附諸方

獨聖散 治中風痰迷心竅顛狂痰亂人事昏沉痰涎壅盛及治五癩心風等證

瓜蒂 不拘多少

右為細末每服一錢以薑汁調

二神散 治證同前

常山 一兩

葱管熬薑 半兩

右為粗末用水一鍾煎三錢至七分食後溫服

三仙散 治證同前

防風 去蘆

瓜蒂 微火烘之剉研為細末各五錢

葱管熬薑 一兩

右為粗末每服三五錢以薑水一鍾煎七八沸去粗將粗又用薑水一鍾煎至半鍾却將先二鍾藥汁合作一處再熬五七沸去粗澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

四靈散 治證同前

瓜蒂 一錢

人參 薑 二錢

赤小豆

甘草各一錢半

右為細末每服一二錢或少至半錢量情與之食後不
汁調下

五玄散 治證同前

猪牙皂角

不難者去皮弦炙

綠礬各一錢

明礬二錢

赤小豆一錢

葱管熬薑五錢

右為細末每服半錢或一二錢漿水調下如牙關緊閉
幹開灌之

六應散 治證同前

欒石

滑石

川芎各等分

右為細末每服一二錢量虛實加減以薑汁調空心服
○凡服吐藥不須盡劑服藥後約人行十里未吐以温
茶一鍾入香油數點投之良久以鵝翎喉內徐徐牽引
得吐即止未吐再投吐藥如服吐藥嘔吐不止者以麝
香少許研水飲之即解

救急諸方

一百有三

丹溪心法

魚骨鯁用沙糖白炭皮末紫蘇葉滑石末和丸含口中津液嚥下骨自隨下

薑毒用木香青皮等分作湯飲之

製藥毒用五倍子二兩重研細用無灰酒調服毒在上即吐在下即瀉解一切毒

用粉甘草五兩重細切微炒搗細量病人喫得多少酒無灰酒一盞研去粗溫服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十分渴不可飲水飲水難救

解九里蜂用皂角鑽孔貼在蜂叮處就皂莢孔上用艾灸三五壯即安

天蛇頭 用落蘇即念慈草金銀花藤五葉蔥蔥天蒼麥切碎用十分好醋濃煎先熏後洗

又方 用人糞雜黃泥搗之裹在患處即安

又方 用撲蛇燒為灰存性地上出火毒研為細末用香油調傳如澆只用斗花水

天火帶 用白鮮泥炒研細香油傳之

丹溪心法

又方 雉雞毛及鵝毛燒灰傳之

治蜈蚣全蝎傷 方同九里蜂灸法

治一切蛇咬 用金絲重樓水磨少許傳咬處又為細末

酒調飲

又方 柏樹葉魚腥草嫩面草草决明一處研細傳咬處

佳

中牛馬肉毒 方同解一功毒法

狗咬 以紫蘇口嚼碎塗之

風狗咬 取小兒胎髮炒新香附野菊花研細酒調服盡

醉

附諸方

救自縊法 三四方

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧
之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩
縱一人以手按掇胸上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸
之若已強直目漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣
從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清
灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此
法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰
氣盛為救難爾

又法以一人兩手掩其口勿令透氣一人用手摩其頸
痕兩時氣急則活

半夏散 三四方 治魘寐卒死諸暴絕證

用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中
心頭溫者可沿倉卒無藥急於人中穴及兩脚大姆指
內離甲一雞葉各灸二五壯即活

救凍死法 經驗方 四肢直口噤只有微氣者

用大釜炒灰煖以囊盛熨心上冷即換之自開氣出然
後以粥清稍稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣
與火爭必死

蘇真人救落水法 醫方大成

急解去死人衣帶艾灸臍中即活

救溺水法 經驗方

凡人溺水者救上岸即將牛一頭却將溺水之人將肚
橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹
中之水如醒以蘇合香丸之類或老薑擦牙若無牛以
活人於長板凳上仰卧即令溺水人如前法將肚相抵
活人身上水出即活 蘇合香丸見中風

治絞腸沙証 手足厥冷腹痛不可忍者 醫方大成

以手旋溫水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺

去惡黑紫血即愈

治骨鯁 醫方大成

以野苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞羹化下如被魚骨所傷以魚汁湯化下

治一切骨鯁 醫方大成

用金鳳花子嚼爛嚥下無子用根亦可

治魚骨入喉 百一選方

縮砂

甘草

右為末以綿裹少許嚥之旋旋嚥津久之隨痰吐出

金鎖釣食丸 治諸鯁

用葳靈仙根不拘多少以好米醋浸一二日晒乾為末醋糊為丸如梧桐子大每服一九或二九半茶半湯下如愛吐轉用沙糖銅青為末半匙滴油一二點同茶湯調服即吐出原物如藥性來遲令人兩手伏地用清水一盆以鵝翎口中撿探即吐出於盆內

又方 治魚刺并骨鯁在喉內

用山查獨根向下者與玉簪花根同搗取自然汁用匙或竹筒盛汁送入口內不可着牙着牙皆化

太乙神丹 一名追毒丹 又名紫金丹

雄黃一兩

文蛤

一名五倍子 捷

山茨菰

去皮洗淨

升藥心法付餘

紅芽大戟去皮洗淨焙 千金子一名續隨子去殼

硃砂五錢 麝香三錢

右除雄黃硃砂千金子麝香另研外其餘三味為細末却入前四味再研勻以糯米糊和劑杵千餘下作餅于四十箇如錢大陰乾治一切醫所不療之疾毒藥毒瘡氣狐狸鼠莽惡苗河魴等毒喫死牛馬肉毒蛇火惡虫所傷中惡瘟疫傷寒結胃發狂纏喉諸風癰癤赤腫丹瘤生薑薄荷汁入井花水磨服 大人中風諸癰用酒磨服 小兒急慢驚風五疳八痢一餅作五服入薄荷一葉同井花水磨服牙關緊者塗之即開 癰疽發

背疔腫一切惡瘡用井花水磨服及塗患處未潰者竟瘳立消 頭疼用酒入薄荷同研爛以紙花貼太陽穴上立效 体實者一餅作二服体虛者一餅作三服凡服此丹但得通利一二行其效尤速如不要行以米粥補之 若用塗瘡立消 孕婦不可服

解毒丸三四方 治誤食諸毒草并百物毒救人於必死

板藍根乾者四兩 貫衆夫上一兩 青黛別研 生甘草各二兩

右為末蜜丸如梧桐子以青黛別為衣如稍竟精神恍惚患心即是誤中諸毒急取藥十五丸爛嚼新汲水下青黛雄黃散三四方 凡中毒及蛇虫咬傷即服此藥乃令

毒氣不得聚

上好青黛

雄黃 各等分

右為末新汲水調服二錢

礬茶散 濟生方 治中諸物毒

晉礬 建茶 各等分

右為末每服二錢新汲水調下得吐即效未吐再服

丹砂丸 濟生方 治蠱毒

雄黃 別研 硃砂 別研 各一兩 藜蘆 各一兩 鬼白

巴豆 去殼心膜油 各一錢半

右為末蜜丸如大豆每服三丸空心乾姜湯下當轉下

惡物并蠱等如煩悶後以鴨為美食之

雄麝散 濟生方 治五種蠱毒

雄黃 末 麝香 末 各等分

右取生羊肺如指大以刀開內裹藥吞之

又方 治蠱毒

用升麻末三錢溪水調服

又方 治中毒下血者

用蝟皮燒為灰細研以水調下二錢日進三服立愈

又方 治五種蠱毒

以馬兜鈴根三兩搗篩分為三貼用一貼以水一大盞

煎至五分去滓空心頻服當此吐盡出未快再服之以快爲度

○神珍方云蠱之爲毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蝦蟇三物同器貯之聽其自相食啖俟一物獨存者則謂之毒欲害其人窺取其毒於酒食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆如爛肉若不即治食人五臟即死然此毒中人有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於傍人亦成蠱注大抵驗試二毒之法

冷病人咳嗽水中沉者是毒淨者非也或含一大豆其豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫又非也又以鴉皮至病人卧下勿令知覺病甚者是否則非也治療之法必須審而後行試而後可今人凡有積聚脹滿之病類乎蠱者便以爲蠱尤爲非也世說閩廣深山之人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名呼喚將云其病自愈又一說病者善能知元中毒是何物終身不服此物其毒亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

解砒毒 百一還方

漢椒四十九粒 黑豆十四粒 烏梅二箇 甘草節二寸

右吹咀用水一碗煎至七分温服

又方百一買方解砒毒

曰扁豆

青黛

甘草

各等分巴豆

不去油

右吹咀為末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒
隨利去却服五苓散之類五苓散見中暑類

中砒毒 醫方大成

以地漿調鉛粉服之立效豆汁亦佳

解砒毒 經驗方

用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹帛濾過冷服一椀毒從

利下即安

又方用花水調水粉吞之或草豆據水服皆可

解砒毒鼠莽毒

醫方大成

用旋刺下羊血或鷄鴨血熱服効 又有用烏桕根搗

水亦好

解鼠莽草毒

用大黑江豆羹汁服之如欲試其驗先用鼠莽草葉以

豆汁澆其根從此茂爛不復生矣

又方 解鼠莽毒

用枯樹明礬同極等好茶末少許新汲冷水調服令人

用之累効

解諸毒 醫方大成

用玉簪花根搗水服

又方 解諸毒 醫方大成

用黃連甘草煎水一椀煎服

治食河豚魚中毒 醫方大成

一時用治念卒無藥急以清油多灌之使毒物盡吐為愈

中烏頭天雄附子毒 醫方大成

用大豆汁解 遠志防風裏肉飴糖並能解

皇巴豆毒 醫方大成

以黃連大豆菖蒲汁並煎之

解砒毒及巴豆毒 經方

用藍根沙糖二味相和搗水服之或更入薄荷汁尤妙

治中諸毒 白一異方

生甘草 黑豆 淡竹葉 各等分

右次咀用水一椀濃煎連服

解一切毒 醫方

掘新地窠以冷水於內撻之令澄清取飲之即解謂之地漿

又方 解食野菌中毒

用甘草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其毒即解

治毒蛇惡犬蜈蚣蝎子咬傷

細辛 白芷各二錢 雄黃一錢 麝香少許

右為末以好酒調一錢

治一切蛇虫作傷 百一選方

用貝母為末酒調令病者盡量飲之少頃酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傅瘡上即愈

治蛇虺蜈蚣咬傷 百一選方

用艾於傷處灸三五壯去毒即愈

治蜈蚣諸毒虫所傷 經驗方

用清油澄心點燈以傷處於煙上熏之其痛即愈
又方用雞糞塗之

一方 治蛇傷

雄黃 五靈脂 貝母 香白芷 各等分

右為末每服二錢熱酒調服 又方用白礬以滾水泡洗其傷處

治惡蛇所傷 秘方

用青木香不拘多少煎服其痛即止

治蜈蚣咬 秘方

用香附子嚼搽患處立效

一方 治候吞馬蝗腹痛即水煙

用田中泥為丸水吞下其虫必隨吐瀉出
狗交 百一農方

用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗然後以此
塗傷處

治犬咬傷 經驗方

用草薺子五十粒去殼以井花水研成膏先以鹽湯洗
傷處後以此膏敷貼 一方用虎骨屑博

一方 治顛犬咬傷及經久復發者

雄黃 黃明者五錢 射香

右研勻以酒調服二錢服後得睡為佳俟其自醒利下
惡物再進一服即見效

定風散 治風狗咬傷

南星 生 防風 各等分

右為末先以口嚼漿水洗淨傷處用綿拭乾以藥糝上
更不發無膿易瘥

又方 治風狗咬傷風 經驗方

此病雖為小可乃九死一生之病可急用班豬七箇去
翅足為末酒調服於小便盆內見衣味似狗形者為效
如無再服七次無狗形亦不再發也此方累試經驗

又方 治風狗咬傷秘方

用狸貓七箇去翅以糯米一撮炒黃去米不用將班貓研為細末麪糊丸如菉豆大每服七丸溫酒下

又方 治顛犬所傷醫方大成

用班貓大者二十一隻去頭翅足用糯米一勺先將班貓七隻入米內炒久上炒不令米赤去此班貓別以七隻再於前米內炒令班貓色變復去之又別用七隻如前法炒以米出青烟為度去班貓不用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服須臾又再進一服以小便利下惡毒為度如不利再進一服利後肚腹疼痛急

用冷水調青龍服之以解其毒否則有傷或前黃連水亦可不宜便食熱物

又方 治風犬傷 証驗方

隨用蝦蟆後兩腿搗爛酒調服或醋亦可先於頭頂上拔血髮三二根小便內見衣沫

又方 治風狗咬傷 秘方

用葱白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調和用溫筒兒盛放用紙封一七日如狗被傷用此膏貼其傷處瘡口上七日又用葱白皮封着如瘡口大再換膏子貼共二七日如忌諸般葷腥一百日外用消風散一錢用

執犍猪肉七片葱白七華蜜一小匙和撲再入原煮猪肉汁泡使葱白執方可患人熱食小兒用肉七小片消風散一錢蜜半匙煮服消風散方見頭風類

十危病方 一百有四 新增

附諸方

華陀十件危病方 經驗方

漢神醫華陀字元化嘗云人有危病急如風雨命醫不及須臾不救觀其橫夭實可哀憐予因暇日選十件危

病處三十妙方以救橫夭詳錄于後不可不知

霍亂吐瀉

其證始因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐吐不止令人下瀉吐瀉并作遂成霍亂頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥應緩須臾不救

吳茱萸 木瓜 食鹽 各五錢

右三味同炒焦用磁罐盛水三升煮令百沸却入前藥同煎至一二升已下傾一盞隨病人意冷熱服之藥入即醒 如倉卒無藥用枯白礬末每服一錢用百沸湯點服 如無白礬只用鹽一撮醋一盞同煎八分溫服

或鹽梅酸皆可煮服

二 纏喉風喉閉

其證先兩日胸膈氣脹出氣短促暮然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

巴豆此粒三生四熟生者去殼生研熟者去殼炒去

雄黃息下大明者研 鬱金一箇蟬吐者研為末

右三味研每服半字茶調細呷如口噤咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒 如無前藥用川升麻四兩剉碎水四椀前一椀灌服 又無升麻用皂角三錠剉碎接水一盞灌服或吐或不吐即安

吐血下血

其証皆因內損或因酒色勞損或心肺脈破血氣妄行血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉蒸乾

人參結乾各一兩

右二味為末每服二錢入飛羅麩二錢新水調和如稀糊服 如無前藥用荆芥一握燒過蓋地上要出火毒碾如粉陳米飲調下三錢不過二服 如無荆芥用釜底墨研如粉服三錢米飲下連進三服

四 中疝霜毒

其證煩燥如狂心腹絞痛頭旋欲吐不吐面口青黑四

厥厥冷命在頃刻

用黑鉛四兩磨水一椀灌之 如無前藥青藍兩握

研并水調一椀灌之 如無藍用清油二升許灌服

其毒即解 又無油掘地用水作漿濃與一二碗土

用黃色者佳

五尸厥

其証奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣出如雷鳴

煇石五錢

硫黃二兩

右研如粉作三服每服用好舊酒一大盞煎盡煇石起

傾於盞內蓋着服如人行五里又一服不過三服即醒

無灸百會穴四十九壯脐下氣海丹田三百壯身温止

如無前藥用附子七錢重炮熟去皮脐為末作二服

用酒三盞煎一盞服 又無附子用生姜自然汁半盞

酒一盞同煎令百沸併灌二服仍照前灸

六中忤中惡鬼氣

其証暮夜或登廁或出郊野或遊冷屋或行人所不至

之地忽然眼見鬼物鼻口咬着惡鬼氣暴然倒地四肢

厥冷兩手握拳鼻口出清血性命危急須臾不救此証

與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖凡中惡暴然倒地切勿

移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒火或燒麝香安

息香蘇合香樟木之類直候醒記人事方可移歸

犀角末可錢麝香珠砂各二錢半

右為末每服二錢井水調下 如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝葉湯調灌 又無雄黃用故汗衣或觸衣汗衣者着在身上多時久遺汗者佳觸衣者久着內衣襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調下

毛脫陽

其証多因大吐大瀉之極四肢逆冷元氣不接不省人事或傷寒新瘥誤與婦人交其証小腹脹痛外腎腐縮

面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救先以葱白數莖炒令熟熨臍下次用

附子一枚重一两白朮乾姜各半木香二錢

右四味各研末用水二椀煎八分枕放令冷灌服須臾又進一服合滓併服 如無前藥用桂皮二兩好酒二升煎一升分作二服灌之 又無桂皮用葱白連鬚三七根細剉沙盆內研細用酒五升煮至二升分作二服灌之陽氣即回先川炒熨臍下氣海勿令氣冷 又無葱白用生姜二七片亦好依前法服

八鬼魘鬼打

行...

其証初到客舍館驛及久無人居冷房中竟鬼物壓打但其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魔也不救即死

牛黃一錢 雄黃一錢 硃砂半錢

右研為末和勻每挑一錢末下燒次挑一錢酒調灌之如無前藥用桃柳枝東邊者各折七寸煎湯灌下又無桃柳枝用竈心土批碎末服二錢并水調灌更桃半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩脚大拇指內離甲一莖葉各灸七壯

九藥婦逆生

其証孕婦欲產時遇腹痛不肯舒伸行動多曲腰眠卧忍痛其兒在腹中不得轉動故脚先出謂之逆生須臾不救子母俱亡

烏蛇尾一條 蟬退十四箇 血餘胎髮一匙

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服仰卧霎時見即順生 如無前藥用槐子二七粒并井花水吞下 又無槐子用小絹針於兒脚心刺三五針急用鹽少許塗脚心刺處即時順生子母俱全 十胎衣不下惡血湊心

其証心頭迷悶胎衣上逆衝心須臾不救子母俱亡

乾漆 五錢為末

大附子 一枚炮去皮臍為末

已上用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味為丸梧桐子大每服三十丸淡醋湯天下酒更又進二服胎衣立下此藥可預先合下妙 如無前藥用赤小豆一升沙過用水三升煮二升去豆取汁溫服其胎衣立下 又無豆用婦人自己手足指甲燒灰酒調須臾又進一服更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下妙

備用要方

一百有五

新增 癸集

出明醫雜著

附錄方

夏月腸暑發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也服後方

人參 一錢 黃連 一錢 麥門冬 一錢 黃連 五分

黃柏 三分 白朮 一錢 白芍藥 一錢 甘草 五分

陳皮 一錢 白茯苓 一錢 香薷 七分

知母 七分

右用水一鍾半生姜三片煎七分食前溫服

夏秋暑熱因熱過飲食冷物茶水傷其內又過取涼風傷其外以致惡寒發熱胃膈飽悶飲食不進或熱嘔吐泄

瀉此內外俱傷寒也

人參一錢 白朮一錢 乾姜一錢炒 甘草五分炙

厚朴二錢水炒 陳皮一錢 羌活一錢

枳實一錢 白茯苓一錢

右用水二盞生姜三片煎至八分食前溫服

夏者若在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑瘧

亂泄瀉痢疾等證

人參一錢 麥門冬一錢 去心 五味子十粒 白朮一錢半

白芍藥一錢 甘草五分炙 知母十分炒

白茯苓一錢 黃芩二分炒 陳皮七分

香薷七分

右用水一盞半生姜煎至七分食前溫服

人遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發

熱之病此方主於補氣

黃芪一錢半 人參一錢 甘草五分炙 五味子二十粒

麥門冬半錢 陳皮一錢 白朮一錢

勞倦甚加熟附子四五分 煎法同上

人遇勞心思慮損傷精神頭目眩昏心虛氣短驚怪煩熱

即服後方補血為主

人參一錢 五味子五粒 當歸一錢 麥門冬一錢

白芍藥 一錢

山梔子 五分

茯神 一錢

酸棗仁 一錢

生地黄 五分

甘草 五分

陳皮 五分

川芎 五分

右用水一盞半生姜三片煎至七分食前溫服

體氣 一百有六 新增

癸集

丹氣心法

○狐臭用研砂蜜陀僧可鑿銅青白附子辰砂為末先以皂角水洗二三次後傳上不過三次全好 又方如黃

丹水銀用白梅肉為丸擦之 又方飛黃丹蜜陀僧枯礬以葱餅蘸藥擦之

附諸方

田螺散 治體氣 患此疾者耳內有油溫是

用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒去殼將針挑巴豆放在內取去拭乾仰損蓋內夏月一宿冬月五七宿自然成水取搽腋下絕根 一方先用煎脂搽腋下其出狐臭之處黃色就將前說巴豆田螺去靨掩於狐臭之上緝帛勒緊其狐臭從大便出則絕根矣 一方用熱蒸餅一箇擘開作兩邊搽蜜陀僧細末一錢

急夾在腋下畧睡少時候冷棄之除根

汗癥

一百有七斷增

癸集

附諸方

一方 治汗癥紫白色者

右用白附子硫黃各等分為細末以茄帶蘸醋粘末擦之

又方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥皂丸方 去白癥黑點白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷

白附子

白殭蚕

白芨

衛生皂角用

白茯苓

白欬

草烏 山柰

牛松

白丁香

杏仁

豆粉各一兩

輕粉

蜜陀僧各半兩

孩兒茶三

肥皂

去裏外皮筋并子
只要淨肉一茶匙

樟腦半兩

右先將淨肥皂肉搗爛用鷄清和晒去氣息將各藥為末同肥皂鷄清和為丸

一方 點疔塗癩去疔

人言 一錢雄黃一錢

巴豆一箇

蟾酥二分

右為細末將瘡口用針撥開以藥點上如貼瘰癧瘡去
膽酥用輕粉

癸集

烏髭髮一百有八 新增

附諸方

犀皮膏 御藥院方 治髭髮乾燥能令潤澤

小麥麩 半斤 半夏 湯洗沉香 半兩 生姜 一兩 和皮

右用水一椀生姜一兩和皮細切同煎去滓取清汁入
腦射少許攪勻洗髭髮自然潤澤

花散

早蓮

蔓荊子

乾栢葉

川芎

細辛

去苗

桑白皮

去黃粗皮生用

早蓮

根並花葉各一兩

右以咀每用藥二兩漿水三椀煎至二椀去滓洗髮
聖膏 梅葉院方 治髭髮脫落能令再生

黑附子

蔓荊子

栢子仁

各半兩

右為末烏鷄脂和搗研乾置瓦合內封固百日取出冷
在髭髮脫處三五日即生自然少壯不脫

生雲散 御藥院方 治髮髮黃白不黑

膽礬 五倍子 百藥煎 青胡桃皮

酸石榴皮 訶子皮 木瓜皮

猪牙皂角 何首烏 細辛 各等分

右為末煉蜜丸如錢大常於木炭內培養勿得雜灰如要烏髮時用熱酒化開塗髮上熱醋亦可

一方

生姜 半斤 生地黄 半斤 各花華研自

右用不蛀皂角十莖去黑皮并筋將前藥汁蘸皂角慢火炙黃用藥汁盡為度煎藥滓同入罐內用火煨存性為末用鐵器盛藥末三錢湯調停二日臨睡將藥蘸汁

鬚髮即黑

烏鬚方

針砂 一錢 一分 漆淨者 用好醋 浸週一七 湯起 即乾

訶子皮 五分 百藥煎 五分 白芨 五分

皂礬 三分 半

右各搗為末用好醋調勻如爛泥為節至晚調塗鬚上勻濟却用青菜葉預先用火烘軟包鬚上再加油紙護包却用手帕或用絹包裹令緊勿令透風延過一夜至清晨解脫用肥皂角洗去即黑極妙用核桃肉油潤之如凍肌肉黑了用無漿粉白布一擦即去

齊心法附錄卷之三十一

黑髮散 延生至寶

官粉 真蛤粉 黃丹 蜜陀僧 各三錢
石灰 一錢二分

右為細末水調搽上如乾水洗去藥核桃油潤之

華山處士摘鬚髮白日 每日辰時面東摘

正月初四 十七 二月初八 二十

二月初八 初十 十二

三月初三 十六 十八 十九

月十一 十六 六月初四 十四 十七

月初三 初四 十八

八月十五 十九 二十

九月初二 初四 十五

十月初七 十一 二十二

十一月十五 十七 二十

十二月初七 十六 三十

旱蓮花 沒石子 荷葉 活衛髮

各等分先將猪鬃鐵銚內炒次將餘藥並炒令焦黑存性為末以柳枝自然汁調少許投白即蘸入藥以柳枝
誰藥妙不可言

烏髮髮方

丹溪心法卷之十一

用大水蛭二箇放磁碗中餓一七將水蛭洗淨用白毛
 烏骨雄雞血以好清煙京墨磨濃傾尿胞內任水蛭吃
 飽將針刺破流血汁搽髮髮留根二分其汁浸清久
 肉髭髮一年茂黑不脫且柔軟不損極妙

一方

五倍子 炒黑色青綿布包裹
脚眼結成餅子三錢 銅末 銀鍋內煨
成灰六分

白礬 枯三分 訶子皮 三分 硃砂 三分

細辛 三分

右各為細末對和一處次用石榴皮一箇烏梅三箇細
 茶一撮水二盞煎至七分去渣用磁茶盞盛將前末藥

汁納放鍋內重湯蒸藥至皴面取起至晚間用抵子蘸
 藥刷上次早溫水洗臉鬚髮如漆

又方

五倍子 用桿杖在板上新砂拌為菜豆大小鬼吹棟去虫
窠粗滓用新砂細內炒黑色成稀粥白烟出

時為度用青布一塊水溫了包倍子稀粥搗
住用脚跟踏良久於定取出成餅穿破看香
純黑色好問黃色不好雜漆亦不上色每次
用三錢二分為極細末五倍子餅取為末
如柳為末放二
三日亦不上色

銅末 五五分用打銅器上起薄皮研為細末用水研淘
五六次澄去泥滓只用淨末如畫匠海顏色酸

白礬 五分 硃砂 四分 沒石子 一分半

共為極細末用煮烏梅水調和如稠糊搽時臨晚先將

鬚髮用菘豆粉和水洗再用減水洗如無減水用淋灰水洗只要洗去油膩仍將白鬚用礬水洗過然後搽前藥勻遍方纔上色

已上諸方外傳之劑

駐顏小丹煉方

韓飛霞方

此有古方主烏鬚不驗方外一

衲報一煉法

茯神

四兩

赤石

脂

紅潤五色者炒

火煨存性四兩

辰砂

者掛水飛二兩

滴乳香

二兩

研

研

川椒

置椒干上以瓦釜蓋之冷為出好

炭燒黃玉地通紅掃淨

右五味為細末以人乳和稀劑入鵝鴨彈報內糊紙封

固加以絳袋令懸婦人帶于胸乳之間四十九日且夕不離取出乾透則成否則壞再研用棗肉和丸如棗豆大每日空心人乳送下或人參麥門冬湯代之卧時酒下亦可 凡心血不足怔忡健忘等疾皆宜

一方 前藥五味各 兩川雞彈二箇去清黃只將辰砂乳香各裝一彈內用紙糊七層以青絹袋盛之令精壯婦人懷於肚上辰日懷三十五日乳香懷四十九日取出名為細末棗肉丸用庚申甲子之夜幽靜處修合忌婦人雞犬見之血日清晨空心好酒服三十九至一月外加至四十九至十次鬚髮自然發黑石日通

稍發黑

詩曰返童萬壽丹服食魂魄安養藥維抱卵日期要
全修合宜深空一切人觀甲子庚申夜為丸不見天
一返增六十二返百廿午服藥非凡骨壽同天地間秘
之深秘之玄之又更玄
秤金

熟地黃 二兩 甘州枸杞

蓮蕊

槐角子

去黑皮俱用酒浸曬乾各三兩

沒石子

一兩

人參

木香

各五錢

薄荷

三兩一十八入藥一半為衣

右為細末煉蜜為餅鑿棋子大每日空心噙化一餅且

進三餅久之鬚髮皆黑此酒浸者春秋三日夏一日冬
六日

七仙丹 此藥補心腎注酒必容黑鬚髮之聖藥

何首烏

甜瓜瓣者九蒸九晒四兩

人參

去芦二兩

生地黃

酒洗二兩

熟地黃

酒洗二兩

麥門冬

去心二兩

天門冬

去皮心二兩

小茴香

二兩炒黃色秋冬用

白茯苓

去皮二兩春夏用

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九嚼爛好黃酒
送下塩湯亦可或丸如梧子大每服五十九空心酒送
下亦可忌三白房事人時勿犯鐵器有奇効三白者房

詩與羅面也

古巷心腎丸 補心腎而髮 方見補損

○已上諸方內服之劑

癸集

駐容顏 一百有九 新增

附諸方

養香湯 百一選方

木香 丁香 檀香 沉香 人參

甘草 兩各一 枳實 五錢 白茯苓 去皮一兩

右日乾為末沸湯點服 此藥香能散氣不可久服

橙子湯 百一選方

橙子 十斤 乾山藥 一兩 鹽 四兩 妙 甘草 二兩

鹽白梅 仁四兩 碎去核

右先用五味一處爛研作餅子焙乾再碾為末百沸湯

調

撒攪湯 百一選方

百藥煎 三兩 甘草 二錢 檀香

白芷 各五錢

右為細末沸湯點服

桂香湯 百一選方

桂花

旋摘三升揀去蒂細研
磁罐成覆罐口累蒸

乾姜

甘草

右為末同桂花拌勻入炒塩少許磁器盛貯沸湯點服
洞庭湯 百一選方

用薄皮黃柑子二斤於盆內薄去核留汁生姜去皮半
斤其草四兩塩三兩炒神曲麥芽各四兩拌和卷一宿
以橘汁盡為度取出焙乾碾為細末沸湯點服

楊梅煎

醫方大成

取熟楊梅於瓦器內卷一宿即爛用綸袋搗出汁慢火
熬成膏瓦罐貯每用入蜜少許沸湯點服

金櫻煎

醫方大成

能活血駐顏

霜時取金櫻子先擦去刺洗淨然後去穰搗爛川酒下
取汁縮帛漚過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐
收貯沸湯點服酒調

木瓜煎

醫方大成

用木瓜去穰子蒸過爛研如泥入塩少許用瓦罐盛貯
每用入蜜少許沸湯點服

梅花湯

醫方大成

旋摘梅花半開者落蠟封花口投蜜罐子過時用之以
匙挑花一二朵連蜜一匙沸湯斟服

集香湯 秘方

白芷 薤 兩 剉一兩 縮砂 五錢 剉一兩 白檀 一兩 不見火 人參 一兩 切

胡椒 半兩 泡過乾 甘草 三兩 剉

右六味除檀香人參胡椒泡乾外將白芷薤甘草白鹽四兩相合盪一宿次日就慢火上鐵器內炒乾不可火急恐作火氣與檀香三味共碾細用磁器收湯點

分氣丸 秘方

糖毬子 查 即山 甘草 二斤 香附 半斤 藿香葉

甘松 各一兩

右為末炒麵糊丸如梧桐子大每服四五丸嚼茶清下

豆不拘時服

補真丹

蜜 半斤 煉熟以 酥油 四兩 煎 牛髓 四兩 杏仁 四兩 去皮

核桃仁 四兩 湯 白藥 四兩 各 白茯苓 各四兩 為末

先煉蜜酥并隨勻後下諸藥拌勻或丸或散空心湯點服之

白砂丹

茯苓 三五斤 去黑皮為細末須要堅實者共赤節最損目亦宜去之

用水淘三五遍去筋膜用白砂蜜對分拌勻固封鑊口鍋內懸煮一晝夜土埋三日去火毒白湯調服補虛補心

瓊玉膏

生地黄 一百六十斤 取汁重羅過

人參 三斤 去頭

白茯苓 四斤 去皮

白沙蜜 十斤 重湯煉

右四味共入一處攪勻重羅濾過納磁罈內用蜜燻打

成綿紙固封罈口七八層懸於大罈內用桑柴火煮三

晝夜如水涸旋添熱水煮畢取出沉於井中水浸一晝

夜出火毒取出又煮一時出水氣如遇夏熱放陰涼所

在或埋地中其制不時要靜處不開雞犬婦人方妙藥成

先用此祭過天地方可自用每日用黃酒納藥一二匙

攪勻飲之不用酒白湯下日進二三服有能服過一劑

者活百餘歲白髮變黑老返童類妙不可言矣

地黃煎

生地黄 不拘多少 取汁熬成煎

生麥門 不拘多少 取汁熬成煎

右二煎入作一處煎過入砂鍋內同熬一時四分入蜜

一分再熬一時取出納磁罈內收之亦照前服瓊玉膏

法服之

人參膏

治傷寒汗吐下後壞証及行創倉法吐下後用此補之
韓飛霞曰人參煉膏回元氣壯無何有之卿王道也又
肺虛款亦宜人參膏補之如肺虛兼有火邪者人參膏
與天門冬膏對服之妙

人參去蘆剉細如煎常藥法量水於銀石器內煎至
一半渣重煎兩度去渣通以所煎汁文武火熬稠而
止諸藥煎膏倣此

地黃膏

男婦血虛者用之

牛膝膏

男子腎虛及腰膝疼痛或痿弱者用之女人血虛及有
血病者用之

八仙茶 韓飛霞方

粳米 黃粟米 赤小豆 黃豆

藟豆 五者炒香 熟各一斤 細茶 一斤 芝麻 淨五合

花椒 淨一合 小茴香 淨 乾白姜 兩一

白鹽 炒一兩

已上十一味俱為極細末和合一處外用小麥麩炒黃
熟與前藥等分拌勻磁罐收之胡桃併肉棗松子仁瓜
仁白砂糖之類隨意加入每用二三匙白湯點服

長松酒 韓飛霞方

長松

此酒中之聖藥產大行西北皮諸山似獨活而香用一兩伍錢

黃芪

酒製七錢

熟地黃

酒浸八錢

生地黃

酒浸七錢

蒼朮

米泔浸去粗皮三錢

陳皮

去白七錢

枳殼

去穢四錢

當歸身

五錢

白芍

煨四錢

天門

五錢

半夏

姜制三錢

厚朴

姜制半兩

甘菊花

五錢

麥門

三錢

砂仁

三錢

木香

三錢

人參

四錢

點椒

二錢

酥

七錢

黃柏

五錢

黃連

三錢

小紅棗

去核八箇

胡桃仁

去衣二錢

老米

一撮

燈草五十長一百二十根

一料分十劑縮袋盛之凡米五升造酒五罇煮一袋罇

久用之

枸杞酒

韓飛霞方

治火症酒性熱三藥制之

枸杞

五錢

黃連

炒五錢

葶藶

一錢

右作一劑縮袋盛之用米五升造酒五罇用前藥煮罇

久用之

固本酒

古菴方

生地黃

懷慶新肥者竹刀切

麥門冬

二味各一斤半用淡酒浸二日去心

熟地黃

懷慶肥者竹刀切

天門冬

二味各一斤半用淡酒浸二日去心膜并皮

十藥公夫十餘頁卷二下

遼人參 四兩去芦頭

川牛膝 去芦酒浸四兩

甘州枸杞 二兩

川黃柏 去粗皮剉酒炒褐色三兩

席木香 半兩

縮砂仁 半兩

一料分作十劑縮袋盛之每劑用糯米一斗擠醇酒納瓦罐壘中納藥於內煮熟密又用之每次冷飲一二盃或三五盃為止

仙家酒 大能益心氣補腦髓治消渴勞怯及風火症老人尤宜

揀潔淨婦人乳每用一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相和然後以鼻內引上吸使氣由明堂入

腦方可徐徐嚥下凡五六七次為一度不嫩而服者何異飲酪止於胃腸爾

班龍宴 韓承襲方

養壯鹿一二隻每日煎人參一兩湯飲之渣和草料飼之每用預夜減食次日早工心以布縛鹿於床首低尾高用三稜針刺眼大背前三孔名天地穴銀管三寸許插向鼻梁吮共血和以藥酒 相意或八兩散加酒香者 盡量月可一鹿無恙若有瘡刺鹿血乘熱和酒一醉亦妙

小刀圭 此方所授與古方小異 韓承襲方 用黃牛犢一隻未知陰陽者肥嫩純黃色先期辨後開

藥料至臘月初八月或本月戊己日宰取血掃毛留皮
碎切臍腑分寸不遺用長流水大鍋煮至半熟下後項
藥斤為限每肉十斤入

人參

茯苓

綿黃芪

良姜

肉桂

各半兩陳皮

甘草

花椒

白塩

酌入分酌酒

右各件同牛肉煮文武火旋添熱水常以八分為節牛
肉爛如泥搗骨之髓煎化入汁中漉去渣但存稠汁
如稀餒待冷入窰壘掘土坑埋齊甕口封固凡早冷
不拘何樣飲食加此每飯調和人事勞若并房慾之後

凡補中氣藥必多服而効切藥必速効如汗下之法

白芍藥酒浸炒與白朮同用則補脾與用芎同用則瀉肝

與參朮同用則補氣能治血虛腹痛餘腹痛皆不可用

凡面黑不可多服黃芪以其氣實而又補之也 面白

人不可多發散以其氣虛而又虧之也 面白人不可

飲酒耗血故也 氣實人因服黃芪過多喘者用三拗

湯以瀉其氣

用椒葉升起胃氣之後胃中滿悶舊有痰之故以二陳加

白朮香附炒麩

二陳湯治濁加升提之藥能使大便潤而小便長

丹溪心法附錄卷二十一

腰曲不能伸者針人中妙一作度
惡寒久病亦可解鬱

中焦有食積與痰而生病者胃氣不虛卒不便死
人有病面皮上忽見紅點者多死

凡治病必先問平日起居飲食如何

氣屬陽無寒之理上升之氣必覺惡寒者亢則害承乃制故
一也

人卧則氣浮於肺

凡治病必先固正氣

升降浮沉即春夏秋冬

以醇酒調服造酒至醇來之日加此甚嘉

癸集

拾遺雜論

二百一十

丹溪心法

小便黃用黃柏澀者數者或加澤瀉又云小便不利黃柏

知母為君茯苓澤瀉為使 若溫熱流注下焦小便赤

黃蕪以澀滯用黃柏澤瀉甚當 若稟受甚壯酒食過

度寡慾無慮之人小便澀滯不利中痛甚却不宜用

寒涼藥并滲利之藥只宜升麻柴胡羌活甘草稍服後

却用鵝翎探而人嘔吐數十聲其小便自通 若是下
焦無血小便澀數而赤宜四物如黃柏知母牛膝甘草
稍

凡用引經藥正藥六兩引經藥只可用半兩

白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛
接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉膏藥用之神
効

凡制玄明粉朴硝一斤蘿蔔一斤同煮蘿蔔熟為度取出
用白皮紙濾在瓦器中露一宿收之冬月可制

凡治上升之氣大槩用香附黃連黃芩山梔

升降浮沉即順之此必先歲氣毋伐天和

寒熱溫涼則逆之以寒治熱之法

凡看脉如得惡脉當覆手取如與正取同乃元氣絕必難
治矣如與正取不同者乃陰陽錯綜未必死

弦堅之脉雖是有積亦帶陰虛脉無水不軟之意脉緊指
者真氣大虛多死峻補氣無水參朮地黃之類 形脫者
必補氣參朮 面白補氣肥人補氣

針法渾是瀉而無補妙在押死其血氣則不痛故下針隨
處皆可

灸法有補瀉火若補火艾炷至肉若瀉火不要至肉便掃

除之用力吹風主散

點三里穴隨意依古法點但跌陽脉不應即是穴蓋三里屬陽明經也

灸瘡不收口用黃連甘草節白芷黃丹香油煎膏貼

一婦人十九歲氣實多怒事不發一日忽大吐而欲厥蓋痰閉於上火起於下而上衝始用香附五錢生甘草三錢川芎七錢童便姜汁煎服又用青黛人中白香附末為丸稍愈不除後用大吐乃安吐後用導痰湯加姜炒黃連香附生薑前下龍會丸

金釵石斛每二錢沈中生姜一片搗細末盪起煎沸去粗

食前飲之補肺清肺甚妙

治赤時風用二蚕沙炒研細用剪刀草根自然汁調勻先塗腹了却塗患處須留一面出處患處移動為效剪刀草根即野茨菇

酒風多搗用白木半兩人參二錢半甘草三錢陳皮蒼朮天麻細切酒浸白芍一錢酒浸防風川芎二錢半若小便多加五味子右為細末作丸服

醫旨論

一百一十一

新增

癸集

附明醫雜著

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶學庸語孟為六經之階梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各發明一義耳仲景見內經載傷寒而其變遷反覆之詳未備也故著論立方以盡其變後人宗之傳用既久漸失其真用以通治溫暑內傷諸症遂致悞人故河間出而始發明治溫暑之法東垣出而始發明治內傷之法河間之論即內經五運六氣之旨東垣之說即內經飲食勞

倦之義仲景非不知溫暑與內傷也特其著書未之及河間東垣之於傷寒則遵用仲景而莫敢違矣至於丹溪出而又集諸醫之大成發明陰虛發熱類乎外感內傷及溫熱相火為病甚多隨證著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未備耳故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病丹溪一以貫之歸於內經斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘味丹溪云予每治病用藥垣之藥效仲景處方處品味數少則藥力專精丹溪何以不法東垣而效仲景耶曰明察

藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在東垣則可多
他人而效其多斯亂雜矣東垣如韓信將兵多多益善
丹溪不過能將十萬故不敢效其多

或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒須服溫藥然今
東南之俗胡椒姜桂人常食之不見生病而北京士夫
畏食胡椒辛熱之物何也曰東南雖熱然地卑多溫辛
熱食藥亦能劫溫西北雖寒然地高多燥辛熱食藥却
能助燥故耳治病用藥者亦識此意

凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胃膈飽悶或噯
氣蒸酸腹痛腸泄惡食小食便閉曾何飲食審知傷積

即便先調脾胃消導飲食然後用本病之藥或於本病
藥內加入消導飲食藥若不知審此則藥雖對證而不
效蓋人以脾胃為土脾胃自傷則不能運化藥味以成
功也亦有食後即嘔或藥後即嘔或服藥太多者謂之
傷藥要須識此吾妻常病胎漏忽一日血大崩盡暈去服
小便而醒少頃復暈急煎服煎芥隨醒隨暈服止血止
暈之藥不効忽然嘔吐予以其童便藥汁滿於胸膈也
即以手探吐之末後吐出來飯及藥菜概許詢問適方
午飯後若惱少頃即崩不止予悟曰因方飽食胃氣不
行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩暈

不止而血藥無效也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各二錢煎服之服未半而暈止再服而崩止遂專理脾胃服數十服胃氣始還然後加血藥服之而安若不審知食滯而專用血崩血暈之藥豈不悞哉著此以例其餘

飲食過傷變為異常急暴之證人多不識嘗有一壯年人忽得暴疾如中風口不能言目不能識人四肢不舉急投蘇合香丸不效予偶過聞之因詢其由曰適方陪客飲食後忽得此症遂飲以前生薑淡鹽湯多飲探吐之止出飲食數粒即時病愈又一婦人先傷飲食損胃後夜

飯早卧因事復起少穿衣服竟虛冷少頃忽得厥逆昏迷不省予曰此必有食也令煎姜鹽湯吐之止出夜飯遂醒後服白朮陳皮半夏麥芽湯調理而愈大抵此等證多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣惱而得飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作中風中氣證而用驅風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷死在旦夕嘗見人有卒暴病多作中風中氣用藥洵更不救莫知其由內經雖有暴病暴死之証但恐多有因於食者前輩不曾明言故人不識耳今後遇有此等急證須要審問明白若方飲食醉飽或屢湯飲食重復受傷但竟胸膈有食

滯者只作食治之

南方人稱發熱為勞發蓋謂勞苦而發熱即東垣內傷之
言也此病輕者一二發自愈重者用東垣法補之重其
者可加熟附子人若因勞力辛苦而發熱切不可誤作
外感輕易發汗也

內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰分而為內熱乃
陽虛也故其脈大而無力屬肺脾

陰虛發熱是陰血自傷不能制火陽氣升騰而為內熱乃
陽旺也故其脈數而無力屬心腎經曰脈大而無力為
陽虛脈數而無力為陰虛無力為虛有力為實

傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而為外熱陽氣主外
為寒所傷而失其職故為熱其脈緊而有力是外之寒
邪傷衛也治主外

傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而邪熱入客於中故發
為熱汗大泄無氣以動其脈虛遲而無力是外之熱邪
傷榮也治主內

病有感受傷有中感者在皮毛為輕傷者蒸肌肉稍重中
者入臟腑最重寒有感受寒傷寒中寒風有感受風傷風中
風暑有感受暑傷暑中暑當分輕重表裏治各不同又如
中溫中氣中毒皆云中中者中也謂邪直入於中也故

為重病

凡傷寒時氣大病熱退之後先服參芪甘溫之藥一二服以扶元氣隨後便服滋血生津潤燥之藥蓋大病後汗液外耗水穀內竭必有小便赤澀大便秘結等證須識此意預藥防之

丹溪云氣病則治氣血病則治血兼痰則行痰兼鬱則開鬱斯言盡之矣近世治病多不知分氣血但見虛病便用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛則助氣而反耗陰血耶是謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣俱虛者也故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆此第一

義也

凡泄瀉病慎服參芪等甘溫之藥則病不能愈而或變為黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而為疸矣惟用苦溫苦寒之藥以治之則愈苦寒瀉濕熱苦溫除濕寒也泄止後脾胃虛弱方可用參芪等藥以補之

凡酒色過度損傷肺腎真陽咳嗽吐痰衄血吐血咳血咯血等症慎服參芪等甘溫之藥則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消前項病證乃陰血虛而陽火旺宜服苦甘寒之藥以生血降火

世人不識往往服參芪以為補予見服此而死者多矣
東垣丹溪治病多自製方蓋二公深明本草藥性洞究內
經處方要法故能自製自宋以來局方盛行人皆遵用
不敢輕率自為局方論證治病雖多差謬丹溪曾論辨
之然方皆名醫所製其君臣佐使輕重緩急大小多寡
之法則不差也近因東垣丹溪之書大行世鑿見其不
用古方也率皆效顰治病輒自製方然藥性不明處方
之法莫究鹵莽亂雜反致無生甚有變證多端遂難識
治且夫藥之氣味厚薄不同如五味子之味厚故東垣
方少者五六粒多者十數粒今世鑿或用二三錢石膏

味淡薄故曰白虎湯用半兩今世鑿不取多用補上治
上劑宜輕少今不論上下率用大劑丸散湯液各有攸
宜今不論緩急率用湯煎如此類者多矣今之鑿者若
非熟讀本草深究內經而輕自製方鮮不悞人也
或問今人有言東垣之法宜用於北丹溪之法可行於南
如何曰東垣北鑿也羅謙甫傳其法以聞於江浙丹溪
南鑿也劉宗素傳其法以鳴於陝西果如其言則本草
內經若神農黃帝岐伯之說亦止宜施於北方耶夫五
方所生異病及治之異宜內經異法方宜論五常正大
論已詳言之矣又如北方多寒南方多熱江湖多溫嶺

南多瘴謂其得此氣多故亦多生此病非謂此病無熱
南病無寒也至其治寒以熱治熱以寒則五方皆同豈
有南北之異和仁人之藏腑火各居二天之六氣熱居
三分又半故天下之病熱多而寒少觀內經至貴大論
病機一篇可見又溫熱相火致病甚多自王太僕注文
湮沒以致局方偏用溫熱之藥故丹溪出而門內經之
旨辨局方之偏論溫熱相火之病以補前人之未備耳
後人不識見其多用苓連梔柏等苦寒之藥遂以為宜
用於南淺矣哉

若有人云我但卧病即於胸前不待手寫死字則百般思
慮俱息此心便得安靜勝於服藥此真無上妙方也蓋
病而不謹則死必至達此理者必能清心克己凡百謹
慎而病可獲痊否則雖有良藥無救也世人遇病而猶
恣情任性以自戕賊者是固不知畏死者矣又有一等
明知畏死而怕人知覺謂而不言或病已重而猶強作
輕淺態度以欺人者斯又知畏死而反以取死尤可笑
哉

癸集

用藥大畧

一百一十二

新增

附乾坤生意

○君臣佐使

論曰上藥為君中藥為臣下藥為佐使為君者主養命無毒多服皆能去病但其勢力和緩不為倉卒之效歲月悠久必獲大益為臣者主養性無毒縱有微毒斟酌得宜療病之功稍深輕身之說頗緩佐使者主治病有毒除寒熱和氣破積聚主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服病愈即止大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐使藥之法如朝廷之制若多君少臣小佐使則氣力不可周也藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君

二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也猶依本性所使自有定主詳用此者益當為善又恐上品君中猶有品列譬如春秋諸侯雖並得稱王然猶宗周臣佐之中亦當如此凡合和之藥不必偏用自隨人之聰明參而用之但君臣佐使務要配鍊得藥毋相反者若單一味服之不論凡藥合三百六十五種惡三百六十五度有單行者有相須者有相使者有相畏者有相殺者有相惡者有相反者藥單行者七十一種相須者一十二種相使者九十種相畏者七十一種相殺者三十六種相惡者六十種相反者十八種人參紫參玄參升參芍藥細辛並反藜蘆白芨白斂

半夏括萎貝母並反烏頭大戟芫花海藻甘遂並反甘草
○藥性反治

治病之法莫不以寒療熱以熱療寒寒則通之通則寒之
益所不勝損其勝氣平邪伏病反乃良也然疾勢有大小
藥力有輕重聖賢制立方論必求其所自以伏其所主譬
猶火也人間之火遇草燭得木而燔可以溫伏可以水滅
疾之小者似之疾之大者則如神龍之火得溫反燭得水
反燔寒與熱相扼熱與寒相遠不可以常法治之故經有
因寒用寒因熱用通因通用塞因塞用之法治熱者以
浸酒此因熱用寒者也治寒者以蜜浸烏頭此因寒

用執者也久痢通瀉必當先去其積中滿實塞必當峻補
其下經云寒積內凝久病泄瀉愈而復發連歷歲時以熱
下之結散劑止此因通治通之法也下虛中滿之病補虛
則滿甚於中宣導則虛弱轉甚故當疎其峻補其下
此因塞治塞之法也

○用藥增減

夫衆病積聚皆起於虛虛生百病積者五臟之所積聚者
六腑之所聚宣可以去寒薑橘之屬通可以去滯通草防
風之屬補可以去弱人參羊肉之屬瀉可以去閉葶藶大
黃之屬重可以去怯磁器鉄粉之屬輕可以去實麻黃芩

根之屬澁可以去脫牡蠣龍骨之屬滑可以去著冬葵榆皮之屬燥可以去溫桑白皮赤小豆之屬溫可以去枯白石英紫石英之屬

○藥象主治五臟

肝苦急甘以緩之甘草肝欲散以辛者川芎補以辛者細辛瀉以酸者白芍藥

心苦緩酸以收之五味子心欲奠以鹹者芒硝補以鹹者澤瀉以甘者人參甘草黃芪

脾苦溫苦以燥之白朮皮欲緩以甘者甘草補以甘者人參瀉以苦者黃連

肺苦氣上逆若以瀉之黃芩肺欲收以酸者白芍藥補以酸者五味子瀉以辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃蘗知母欲堅以苦者知母補以苦者黃蘗瀉以鹹者澤瀉

○用藥身指

凡根在土者中半以上氣脉上行也以生苗者為根中半以下氣脉下行也以入土者為梢病在中焦者用身在上焦者用根在下焦者用梢蓋根升而梢降也大凡用藥以頭身指分為上中下病在人身半已上者天之陽也用頭在中焦者用身在人身半已下者地之陰也用梢述類象

形者也

○用藥丸散

仲景云剉如麻豆大與吹咀同意夫吹咀者古之制也古者無鐵刀以口咬細令如麻豆為粗藥煎之使藥水清飲於腹中則易升易散也此所謂吹咀也今人以刀器剉如麻豆此吹咀之易成也若一藥為細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑是也吹咀之藥取汁清易循行經絡故也若治至高之病加酒煎如去濕加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎散者細末也不循經

絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者煎之和粗服丸者治下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小也稠麩糊丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星欲去濕者以生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸宿炊餅為丸者艾滴水為丸者皆取易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者瀉也去大病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病用藥舒緩而治之意也

○用藥分兩

為君者最多為臣者次之佐使者又次之藥之於證所主同者則各等分也主治病者為君佐君者為臣應臣者為佐使也非上中下三品之謂也

○古今方劑分兩

古今方劑銖分兩與今不同謂如吹咀者即今劉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞是也云銖者六銖為一分即今之二錢半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩也云二兩者即今之六錢半也料例大者只今三分之一足矣凡煎藥用銀石器微火煎不可大猛表汗下藥煎至八分對病藥煎至七分滋補藥煎至六分不可極熟亦不可猛火驟乾致傷藥力也

製方之法

一百一十三新會癸集

附湯液本草

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰

味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純
陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚
則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為
陽凡此之味各有所能然甘能散結潤燥若能燥溫堅軟
酸能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝
若急急食其以緩之心若緩急食酸以收之脾若溫急食
若以燥之肺若氣上逆急食苦以泄之腎若燥急食辛以
潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心
欲軟急食酸以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食
酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之

用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所
宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之
氣味隨其證而製其方也是故方其君臣佐使輕重緩急
君臣大小及正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣
應者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣
二齊之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君
二臣六偶之制也去咽嗑近者奇之遠者偶之汗者不奇
下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急者
氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而
頻食又當明五氣之鬱水鬱達之謂吐令條達也火鬱發

之謂汗令疎散也上鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之謂
解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治
病之大要也

癸集

製製造藥法

一百一十四

新增

議醫通纂要

○製香附法

香附主氣分之病香能竄苦能降推陳致新故諸書皆云
益氣而俗有耗氣之訛女科之專藥也治本病畧妙燕血

以酒煮痰以姜汁虛以童便浸實以塩水煮積以醋浸水
煮婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小
兒日克形乃曰固大凡有病則氣滯而餒故香附于氣分
為君藥世所罕知佐以木香散滯洩肺以沉香無不升降
以小茴香可行經絡而塩炒則補腎開元氣香附為君黃
蓼為臣甘草為佐治虛怯甚速佐以厚朴之類决壅用三
稜之類攻其甚者予嘗避諸香藥之熱而用檀香佐附流
動諸氣極妙

○製當歸法

當歸主血分之病川產力剛甘又秦產力柔宜補凡用本

子孫心去竹全藥集卷之二

病酒製而痰獨以姜汁浸透導血歸源之理熟地黄亦然
血虛以人參石脂為佐血熱以生地黄條芩不絕生化之
源血積配以大黃婦形肥血化為痰二味姜汁浸佐以利
水道藥要之血藥不能舍當歸故古方四物湯以為君之
藥為臣地黄分生熟為佐芩為使可與要云

○製半夏法

痰分之病半夏為主脾主濕每惡濕濕生痰而寒又生濕
故半夏之辛燥濕也然必造而為麩以生姜自然汁生白
礬湯等分共和造麩楮葉包裹風乾然後入藥風痰以猪
牙皂角煮汁去渣煉膏如鱈火痰黑色老痰膠以竹瀝或

荆瀝入姜汁濕痰白色寒痰清以老姜煎濃湯加煨白礬

三分之一如半夏三兩煨俱造麩如前法予又以霞天膏

加白芥子三分之一姜汁礬湯竹瀝造麩治痰積沉痾者

日能使腐敗隨大小便出或散而為瘡此半夏麩之妙也

古方二陳湯以此為君世醫因辛反減至少許而茯苓滲

濕陳皮行氣甘草醒脾皆臣佐使而反多其銖兩蓋不造

麩之過視法製半夏以姜礬制辛而能大嚼是也佐以南

星治風痰以姜汁酒炒及炒瓜蒌實香油拌麩畧炒

之類治火痰以麩炒枳殼和實姜汁浸蒸海粉之類治老

痰以蒼朮白朮俱米泔姜汁浸炒甚至乾姜烏頭皆治濕

痰而常有脾洩者以肉豆蔻半夏麩加麩藥作九九有奇效厚養之人酒後多此而苦濕為病者十常八九也方書謂天下無逆流之水身中有倒上之痰氣亂血餘化而為痰故治痰以行氣殺血為要霞天膏方見例倉法後

○製黃連法

火分之病黃連為主五臟皆有火平則治病則亂方書有君火相火邪火龍火之論其實一氣而已故丹溪云氣有餘便是火分為一類比治本病畧炒以從邪實火以朴硝湯假火酒虛火醋痰火姜汁俱浸透炒氣滯火以茱萸食積洩黃上血疾癥瘕痛乾漆俱水拌同炒去萸土漆下焦

伏水以鹽水浸透九日疾以人乳浸蒸或點或服生用為君佐官桂少許煎日沸入蜜空心服能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治遺遺以生姜酒蜜四炒者為君史君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳以茱萸炒者加木香時分生大黃倍之水九治五痢以姜汁酒煮者為末和蜜天膏治頭暈諸風眩暈瘡傷皆神效非彼但云瀉心火而與金聲諸君藥例稱者比也

○造神麩法

六月六日謂諸神集會之晨故名神麩如過此日造者非神麩也 或用此日辨藥料至上寅日踏麩亦是

白虎即白麩

勾陳即蒼耳白

騰蛇即野豸自

青龍即青蒿自

玄武即杏仁回升去

朱雀即赤小豆三升

右共修合三伏內用上寅日踏極實為度或甲寅戊寅庚寅日乃三奇也近時神麩只以麩為之入藥多不効也 一方如豨簽草自然汁尤妙

○造海粉法

擇取紫口蛤蜊不計多少三月取以炭火銀罐內煨成粉收貯候至秋深待瓜菱熟時摘取連皮帶子搗爛如泥和勻乾溫得宜團如雞彈大用篾穿之懸透風處陰乾次年

聽用入末藥丸藥研極細入湯藥不宜細

○廣按丹溪云海粉即海石熱痰能降溫痰能燥結痰能軟頑痰能消土節齋本草云海石即海蛤因蛤蜊殼在泥沙日久風波淘濯圓淨如石故名海石其味苦鹹故能軟堅化痰今以蛤蜊瓜菱造法雖妙恐不如原物之味鹹也宜加補硝方可

○煉蜜法

以白沙蜜一斤大磁碗盛重湯煮不住手撓文武火湯乾加水以蜜滴水不散為度大蜜一斤煉成半斤罐封埋土七日此和丸劑止以藥末一半入蜜春萬餘杵乾糝以

行包裹入籠蒸軟又加未盡之藥如此三次則丸劑可以
久救不回潤 一法治蜜丸不回潤用火一盆水一盆將
蜜丸舖盛先放火盆上烘溶即便放水盆上收乾如此數
番以乾為度磁罐盛之永不回潤切記不可烘焦了丸藥
此水火煉蜜之法熱則流通寒則收凝之理

癸集

醫畧 一百一十六 新增

附西川周氏論

○血榮氣衛論

人之身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血
取諸陰人生之初具此陰陽則亦具此血氣血氣者其人
身之根本乎血何以為榮榮行脉中滋榮之義也氣何以
為衛衛行脉外護衛之義也然則榮與衛豈獨無所自來
哉曰人受穀於胃胃為水穀之海灌溉經絡長養百骸而
五臟六腑皆取其氣故清者為榮濁者為衛榮衛二氣周
流不息一日一夜脉行五十度平旦以來復會於氣口所
謂陰陽相貫如環之無端則是二氣者常相隨而不相離
也夫惟血榮氣衛常相通則於人何病之有一窒礙焉
百病由此而生矣故氣之作恙發而為怒喜悲恐寒熱驚

思勞聚而為積痰癥瘕瘰癧上為頭旋中為五隔下為痞
間動氣或喘促或咳噫聚則中滿噎則足寒凡此者氣使
之然也血之為患其妄行則吐衄其衰涸則虛勞蓄之在
上其人忘蓄之在下其人狂逢寒則筋不帶而卒急挾熱
則毒內於而發苗在小便者為淋痛在大便者為腸風其
於婦人月事進退漏下崩中病猶不一凡此者血使之然
也夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉
蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑
氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出
於血調其氣猶可以道使病原於氣區區調血何如馬故
入之一身調氣為上調血次之是亦先陽後陰之義也若
夫血有敗瘀滯泥平諸証則氣之道路未免有所壅遏又
當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之又不可
不通矣變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑
以之調氣而乖張如木香如官桂如細辛如厚朴以至烏
藥香附莪朮三稜之類治氣可也治血亦可也若以當歸
地黃輩論之施之血證無以逾此然其性纏滯於胃氣有
虧焉胃氣既虧則五臟六腑之氣亦饒矣善用藥者其間
劑量而佐助之

○火溫分治

肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火
生燥故肥人多寒溫瘦人多熱燥也夫以人形分寒溫熱
燥此得之於外然其中臟腑各病亦有寒溫熱燥之殊不
可不知王聖金輪曰肝藏由來同火治三焦包絡都無異
脾胃常料溫處涼脾與大腸同溫類腎與膀胱心小腸寒
熱臨時旋商議惡寒表熱小腸溫發熱表寒心腎熾十二
經最端的四經屬火四經溫四經有熱有寒時攻裏解表
細消息裏熱表寒宜越竭表熱表寒宜汗釋溫同寒火同
熱寒熱到頭無兩說六分分來火熱寒寒熱中停真浪舌
執寒格拒病機深尤則害今果酒制緊寒數熱脈正相漂

本治之真妙訣休治風休治燥治得火時風燥了當解表
時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏如或兩可攻後先內外
分多少治溫無過似決川此管筌蹄最分曉感謝軒岐萬
世恩爭奈醯雞笑天小

○虛實分治

夫疾病之生也皆因外感內傷生火生溫溫而生熱火而
生痰四者而已審其為少壯新病是溫則燥之是火則瀉
之是溫而生熱則燥溫而煎清熱是火而生痰則瀉火而
煎豁痰無餘蘊矣審其為老衰久病又當半攻半補焉如
氣虛而有溫熱痰火則以四君子湯補氣而兼燥溫清

豁痰瀉火如血虛而有痰火溫熱則以四物湯補血而瀉
瀉火豁痰清熱燥溫如此則補攻兼施庶乎可也予故曰
少壯新病攻邪為主老衰久疾補虛為先古已上二條
補入

○雜論

大抵人之生也十六歲為春十六歲為夏十六歲為秋十
六歲為冬以至六十四歲以配六十四卦且如一年四季
之內豈無陰晦清明以人身方之豈無疾病蓋人之一身
血脉通貫如乾坤之旋轉江河之流注一有不通則滯而
成病雖聖人亦不能免但常人則自致之所以有賴於藥
之功也

○氣血偏勝而成疾藥者偏勝之氣以此之偏濟彼之偏
而使之平此用藥之功也藥優於伐病而不優於養生食
優於養生而不優於伐病

○治病之法先去病根然後可用收澁如澀衣然先法垢
膩然後可加粉飾也所以粟殼龍骨之藥不可輕用

○養病之人必得吾儒主一居敬之方仍知勿忘勿助之
戒則心火易平不忘生而徇欲疾不期愈而自愈矣

○聞之老壽者言人得元氣以生穀氣以養肉氣以輔
氣勝則滯穀氣衰氣勝則滯元氣元氣充行者壽此言深
得養生之要敢贅于此

東坡先生云予於平時細察醫之工拙至於有疾必先盡告以所患而後診視故中醫療疾常愈吾病予求疾愈而已豈以困醫為事哉今之人往往以脉試醫醫者亦不肩問孟浪一診以自挾其所長寧能免實實虛虛之禍哉蓋脉理精微必盡得其所患庶幾可以意求

○察脉之法先須六部齊診看何部異於衆者便是此部有病然後每部另診方可得其精微無病之人左手弱右手強是血虛右手弱左手強是氣虛有病之人左手大右手小是外感右手大左手小是內傷如邪氣盛脉大醫而使之小正氣虛脉小醫而使之大者皆効也此條古卷補入

○麻者幕也診脉者如幕外之人而欲知其幕內之事也考之字韻可見矣

○宋景瀛先生云扁鵲華陀天下固不常有使有之而值淺易之疾遇難語之人上之不足展吾術次之不能從吾所欲為法宜針而責我以發為病是實而究我以虛何以成其功哉此言深足為任醫者勸戒併及之

○大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎胃虛不食以致發熱若與涼劑退熱則胃氣愈虛熱愈不退惟先以助胃止吐為本其熱自退縱執不吐但得胃氣已正亦可旋與解熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼疎轉其熱仍前但用

和調胃氣自然無事

○大抵人之虛多是陰虛火動脾胃衰弱真陰者水也脾胃者土也土雖喜燥然大燥則草木枯槁水雖喜潤然大潤則草木溫爛是以補脾胃補腎之劑務在潤燥得宜隨病加減

○諺有之曰人無根本水食為命蓋脾胃屬土主納水穀人之根本也脾土雖曰惡溫然大乾何以生物是非惡溫惡太溫也土能尅水水大土崩理之必然甚而腫脹蓋由於斯醫用枳朮丸以理之宜矣然多服致燥恐忘津液用者審之理中湯去木加桂治奔豚動氣者可見矣

○經曰形不足者溫之以氣溫者養也溫之者所以調其飲食適其起居澄心息慮從容以待其真氣之復常也禮記所謂柔色以溫之此溫字正與彼同或以藥扶助之亦溫養也東垣乃以溫為溫涼之溫謂宜溫藥以補元氣而瀉火邪世人相循而用熱藥流弊尚未盡去也請因此而復舉前人之說以贅之蓋欲申明其義也

○溫藥之補元氣散火邪者亦惟氣溫而味甘者斯可矣蓋溫能益氣甘以助脾而緩火故元氣復而火和熄矣
○東垣補中益氣湯中加炒麩生苈名益胃升陽湯血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣陽生陰長

諸甘藥為之先務。幸世皆以為補氣。殊不知其能生血。此陽生陰長之理。故先調胃氣。人之身內水穀為寶。氣虛血弱。又當求長。沙血虛。以人參補之。之法。陽旺則生陰氣。旺則生血也。

○經云：腎氣動氣。五臟六腑之本。十二經脈之根。呼吸之門。生氣之原。不可不知也。

○凡腎虛血寒。氣逆而脹。脘腹走痛。中脘痞滿。兩眼多淚。此寒泣血也。須用官桂當歸。以溫其血。蓋寒傷榮官。桂當歸。溫血之上藥。古人所以致意於寒泣血者。以此然必察脈精。而問病。審方可用之。若血執輕用。為害匪輕。

○用者。脾之賊。木能勝土。古人慮之。經曰：肝腎氣虛。為病泄瀉。亦孰知腎者所守。司於下。而肝者。又門戶要束之。其束則不泄也。泄瀉而面色青慘者。古書謂肝經受寒所致。特設當歸厚朴湯主之。

○心為血之主。肝為血之藏。肺為氣之主。腎為氣之藏。誠哉是言也。幸者。惟知血之出於心。而不知血之納於肝。惟知氣之出於肺。而不知氣之納於腎。用藥摸稜。往往南轅而北轍矣。假如血痢作恙。以五苓門冬等劑。行其心。以巴豆大黃等劑。逐其積。而其痛獨存者。血之所藏。無以養也。必佐以用芎或芎歸湯。則其痛止。假如喘救氣鳴。以薑厚橘

枳梗蘇桂調其氣以南星半夏細辛豁其痰而終不下降者氣之所藏無以散也必佐以補骨脂或安腎丸輩則其氣歸元病有標本治有先後綱率而目斯張矣噫此傳心喫緊之法也耳目所接敢不與衛生之家共之

○氣血冲和萬病不生一有拂鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱蒼木用芍總解諸鬱越鞠丸解諸鬱如婦人并多憂慮者必加去心貝母蓋貝母開胃中鬱結之氣詩所謂言採其蠶者是也

○退熱之法全在清心必用麥門冬燈草白木茯苓蓋心者一身之主宰而萬事之本根高令從心心不清則妄動而執不退然熱人能傷血血滯則氣鬱而熱愈不退退熱之法所以又在調血法用川芎當歸若天陽浮於外則當歛而降之法用參苓白朮散姜棗煎服

○痰在人身非血非氣生於脾上謂之津液周流運用血氣由之如道路然不可無者但溫盛痰多加以外感固滯於中斯為患耳故風寒客之煽以相火則上攻心目而為暗風痰厥暑溫乘之血氣相著則附於筋骨而為腫毒癰瘰又有心風者何也蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中協氣上攻迷其心竅則為狂為癩所怒之事繆固於心輒自言談失其條序謂之心風與風何干也若痰不

盛者則有感亦輕初在皮膚以傳經絡若是治療依時或汗或下由是解矣凡有怪證莫不由茲丹溪十病九痰之論豈欺我哉故智者養其溫盛除以二陳之類亦非未病而治之理乎

○傷寒內實大熱通利之後已經得瘥且量進白粥兩三已未可遽與和胃之劑執氣得之又復作也經此旋以易簡溫膽湯入竹茹與之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒瘥後通用無執者只守本方世俗以四君子湯以貴細循習用之不思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥閉矣○寒疾人皆知用附子乾姜以溫氣而少知用肉桂當歸

以溫血

○治瘡之法全在去水飲清瘀血惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增寒熱寒熱不歇有根惟癖為瘡之母惟瘀血為暑熱之毒有汗以扶正氣為主無汗以散邪氣為主瘡在陰分者須用紅花方用二陳湯加枳殼枳實豬苓澤瀉柴胡黃芩蒼朮神麴麥芽山查香附木通川芎荆芥有癖加三棱無汗加青皮紫蘇有汗泄瀉俱加白朮暑毒加香薷人壯氣實者加常山草果若無內熱而有裏寒者加肉桂乾姜

○禁口痢之寒理胃膈而後可以及腸胃並痢久傷陰血

虛火上攻於胃腸之間故也

○酒雖與水同解然傷於腸胃則升之不散降之不下者斂於氣分無形之位蓋逐氣升降而半有消耗之矣今人飲醇酒則便少此其可驗故治法宜汗宜利小便東垣以為無形之物固不可後人以傷飲食同治亦不可

○酒醉宜熱湯漱口蓋其毒在齒大醉則以熱湯於密室洗面數次梳頭數十梳即醒

○四君子湯用人參白朮茯苓甘草四味固補氣之要藥然人參動肺火吐血久嗽面黑氣實血虛陰虛之人忌之以沙參代之可也蓋人參味甘補五臟之陽沙參味甘苦補

五臟之陰白朮補中燥濕動氣者不宜茯苓淡滲行水目病者不宜甘草緩中中滿者不宜須要識得監制

○四物湯用熟地黃當歸芍藥川芎四味固補血之要藥然地黃當歸總補引痰損胃氣芍藥酸寒血虛寒人禁用古人云咸芍藥以時中寒誠不可忽川芎能散真氣久服令人暴亡亦須識得監制

○二陳湯用半夏陳皮茯苓甘草四味固治痰之要藥然半夏能燥陰血燥津液消者棄用陳皮留白補胃和中去白消痰和氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃有甘草則補肺無甘草則瀉脾亦須要識得監制

○三補丸用番麥黃柏黃連三味固降人之要藥然黃連大忌豬肉黃柏峻下黃芩大寒皆能損胃氣用之宜斟酌亦要識得蓋制

○補中益氣湯內用柴胡升麻固善然天領西北地不滿東南東南人陰易升恐未為相宜

○補陰丸必以地黃為主然地黃見銅鐵服之令人腎消男子損榮女子損衛且大忌菜菔皆能白人鬢髮

○枳朮丸用荷葉包飯為丸恐不能盡荷葉之味不若以荷葉煮粥夏月則以米置荷筒中數日取出再以荷葉煮粥更妙蓋荷葉內虛中空襲震之舛震者動也人感之則

生少陽甲膽也傳曰獲端於始序則不愆

○理中湯腎氣動者去木加桂考之本書增補藥只復云動氣者去朮加桂以桂能泄奔豚也腎惡燥故去木也愚按奔豚因土克水而致去木者恐土旺克水腎氣虛不能安而愈動也若止曰腎惡燥故云去木則未明白耳蓋奔豚者腎之積也其人素有腎積因傷寒之邪衝下焦致其發動所以如江豚之奔騰或因汗吐之後心氣虛而攻動腎積也多用桂者以桂能泄奔豚謂夜苓者以其能伐腎邪也臍下有動氣亦曰奔豚若上下左右動氣者難治也若素無腎積之人則正宜服朮故枳朮丸為常用之藥也

東垣丹溪治病何常離木

仁齋直指傷寒證治奔豚動氣題有云動氣者臟氣不調
榮觸跳動隨臟所主而形見於病之左右上下也大抵真
氣內虛水結不散氣與之搏而發奔豚以其走痛衝突如
豚之奔雖有發表攻裏之証汗之下之皆不可也愚按仁
齋不言當臍動氣者何耶蓋胃為中州以主津液妄施汗
下必先動脾是以不言而喻也舉此動氣非問証何以知
之然則調理傷寒貴乎纖悉問証動氣通用理中湯去求
加桂蓋桂利小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣白木燥腎
閉氣是以去之本草云白木欬虛汗可見其為收斂之藥

也

○氣不歸元破故紙為主白木亦可者以其能和胃胃和
則氣歸先但惟內邪盡去實是陽浮於外方可用此以斂
之不然則白木能閉氣反成不美

○甘草炙乾姜炮各等分每服三錢者治男女諸虛出血
胃寒不能引氣歸元無以收斂其血虛極而壅氣不歸元
甚効也

○補脾胃藥內必用心經藥蓋火能生土故也古方用益
智仁是此意

腎氣痛用川椒引而歸經即安

○外科藥內須去白木白木能生膿

○治病藥內多用辛苦其之劑但能於三者中識得彼此相制氣味相濟之法便是良醫也

○凡人四時以胃氣為本然治病必須先診六脉皆有胃氣外證雖重病亦可治胃氣未絕則藥力運行而輸散於皮毛經絡故易治而生胃氣既絕則藥雖對證不能使其運用以輸精於皮毛經絡其臟獨見而藥不及矣遂成不治之證也東垣曰脉貴有神有神者有胃氣之謂也故諸經方論皆曰有病早治療不令邪氣深入所以聖人治未病不治已病正謂此也

○凡藥內用苦寒如黃柏之類必須以辛熱如姜桂之類佐之所以蘭室秘藏調中益氣湯後加減法云如夏月有此證為太熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以黃連酒洗黃柏酒浸知母酒浸已上各等分右為細末熱湯為丸如梧桐子大每服一百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之不令胃中停滯直至下元以瀉衝脉之邪也觀此立法皆是恐若寒之藥世其元氣損其脾胃脾胃虛則五臟六腑之氣皆緩而火愈盛矣所以山精膏山藥意效山精散為最妙之藥也

論藥

○梗米大能和胃胃和則血氣自生血氣足則調而能使真氣歸元但不能治痰和氣治病宜以陳皮為主以川芎補骨脂收其氣血之蕪用黃芩柴胡調行其熱血他藥宜以類而推然凡熱者出於心心血不可不清麥門冬不可缺也以燈草為引子

○柴胡治熱在半表半裏既不可汗又不可下非小柴胡一劑孰能內和而外解之

○升麻似落新婦根而彼亦解毒意者其一物乎

○獨活羌活療風宜用獨活蕪水宜用羌活

○栝忌取塚上者今出乾州者最佳則乾州栝茂大者皆

是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也

○胡黃連忌猪肉食之者漏精

○厚朴忌豆食之者動氣

○玄參犯銅錮之後喧人候喪人日

○神麴者六神之神也必六物備而後可以謂之神

○薄荷肯涼蕪芳用其汁與蕪涼和為膏

○牛膽南星用南星蕪末入牛膽內臘月釀成

○當歸珍云頭止血身和血尾破血雷公云若要破血即使頭一節硬實蕪末上血尾用尾若一時用不如不使

易老云用頭則破血用尾則止血若全用一破一止則和血也如此紛紛不定大抵無大補血之功惟使氣血各歸其經聖人正當端之名必因此矣

○桔梗與木梗真相似但木梗甚腥澁又與薺芩相亂而梗有心芩無心用頭去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子

○人參夏月多服發心瘡薺芩能亂人參薺芩雖似人參但其功專解百藥毒故味甚甜不若人參味甘而微若得其中和但恐賣人煮而淡之

○麥門冬遠志不去心令人煩遠志苗為小草

○內菓忌銅

○乾姜辛多用則耗散元氣是此火食氣故也須以生甘草緩之

○蒼白二朮忌麋李雀蛤及三白青魚鮮蠶菜胡荽

○薏苡仁凡使勿用糯米顆大無味其糲米時人呼為粳糲是也若薏苡仁粒小色青味甘交着粘人齒

○具母能治惡瘡江左有一人左膊上有瘡如人面亦無他若其人戲滴酒口中其面赤色以物食之亦能食食多則齋臍內肉脹起有善醫者教以歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至具母瘡乃聚眉閉口其人喜曰

此藥可治也。因以小簞筒毀其口數日成痂遂愈。然不知何疾也。具母中有獨顆團不作兩片無皺者誤服令人筋脈永不收。

○為藥稍有金木二芍不同。然救病止宜用金芍。金芍色白多脂木芍色紫多脈。

○茯苓搗令細於水盆中攪令獨浮者去之。是茯苓筋若誤服之令人眼中瞳子白黑睛點小翳盲目甚忌之。

○白芷凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤。燕勿用馬蘭並不入藥。

○牛膝忌牛肉

○天門冬忌鯉魚

○甘草桔梗忌猪肉

○香附知母苜蓿皆忌鐵

○甘草忌食菘菜食之令人病永不除

○山藥勿用平田生二三紀者或經十紀者山中生皮赤四面有鬚生者妙

○川芎大塊圓轉色白不油嚼之微辛甘者佳

○木香形如枯骨油重者良行中下二焦氣瀆用桤柳為使

○山梔子小而七稜者佳長大者亦可用但無力耳

天南星無疑但市人多以由跋小者似南星殊不知南星素柔膩肌細炮之易裂差可辨爾

○滑石白者佳餘色殺人

○天花粉即瓜蒌根必以人乳汁蒸竹瀝晒過能去上焦痰熱渴又能止嗽潤肺

秘方

○久嗽不已加百部為主則已

○久瀉不止加破故紙肉果山藥則止

○久汗不出加青皮紫蘇則出

○久患血證血不歸元及久服藥無効者以川芎為君則

効或服芎歸湯

○久患氣証氣不歸元及久服藥無効者以破故紙為君則効或服安腎丸

芎歸湯

川芎一錢二分

當歸一錢

水二盞姜三片棗一枚中滿者不加棗煎至七分食前熱服

安腎丸

破故紙

懷香子

乳香要真者不待真者則不

如不用以波藥代之

右為末煉蜜為丸空心白湯送下四十九或以前藥吞之最妙

○肝氣不達用青皮以疎通肝氣

○身熱不退加黃芩即退或煎柴胡

○遺精不止

山藥 四兩

烏藥 二兩

益智仁 一兩半

右為末蜜和丸空心白湯下四十九脾經濕熱脾精不收加蒼朮腎經濕熱腎精不收加黃柏

○敗膿不去加白芷則去

○經絡不通元脉不接孔竅不疎加木通以達之

○腎火不除無根之火加玄參以除之

○火妄動夏日加滑石甘草重墜之物以鎮之益元散亦好

益元散

滑石 六兩

甘草 半兩原方一兩今減夫一半

右為末每服二匙白湯調下

○水脹不除用香薷則除蓋香薷治水有微上微下之
○瘧疾久者須加白芷寇以寒藥佐之蓋白芷寇能治
磨流行三焦補上焦元氣馨香之氣味上行胃氣而
自愈矣

○吐血大作無可奈何究其還有實火則以大黃下從大腸去蓋果是正氣虛而全無邪則當不吐衄

○治心漏方

胃前有孔常出血水謂之心漏此病醫書少載人多不知又能去腰痛

嫩鹿茸去毛酥 附子炮去 鹽花

右三味等分為末棗子肉為丸每服三十九空心酒下

○治懸癰方

此瘡在穀道外腎之間醫書不載人所罕知初發甚小

狀如松子漸大如蓮實治醫若遲則破大小便皆從此出不可治矣服此有效 橫文大甘草截長三寸

右用山澗東流水河水不中用以甘草蘸澗水文武火慢炙之不可性急炙至表裏溫潤透徹每一兩用無灰酒二碗煮至半碗溫服一日一服至消盡為度

半夏丸 治痰盛中惡欲吐

半夏一味切黃香油炒黃

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服十九至三十九姜湯送下量痰輕重加減用之

治火眼方

丹溪心法卷之十一

臘月過羊膽 一枚

以蜂蜜三兩許陰乾用符取一粒磁盞內水化內開點之

○枳木丸用白木頭以紫蘇薄荷黃芩肉桂湯煮過東垣加陳皮名橘皮枳木丸加橘半名橘半枳木丸加麴葉名麴葉枳木丸

○二陳湯加枳殼桔梗名枳桔二陳湯開胃膈去痰更効加芩連名芩連二陳湯降熱痰更妙

○補陰丸方

黃柏炒三兩酒 天門冬去心三兩 牛膝去毛

杜仲去粗皮三兩 葛蒲去毛 山藥四兩

麥門冬去心三兩 知母去毛二兩 加甘草少許

冬月加乾姜少許

右為末天門冬煉膏為丸淡鹽湯下四十九

○十全補陰丸

人參半兩 桂枝二錢 山藥四兩 麥門冬去心一兩 破故紙一兩

黃芩五錢 當歸二錢 白朮三錢

若參二錢 當歸三錢 酸棗三錢

牛膝去毛 山藥更入 收龜板五錢

十卷心六片

五味子 三錢 川芎 三錢 陳皮 七錢

麋鹿角 三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大淡淡塩湯送下或加茴香乾姜

○人參湯 治吐血咯血

新羅人參慢火煎服人參又能益血 此方說見勞瘵類勞瘵治

例之

○桂枝酒 治打撲傷墜 血滯悶身麻疼痛

辣桂

右為末每二錢温酒下或未有藥倉卒且用米醋一

小盞亦散瘀血

○白朮散 治脾胃虛弱

白朮 八分 蓮肉 一錢 黃芩 二分 山藥 八分

神麩 一錢 陳皮 一錢 甘草 二分

右為末白湯調下二是或加菖蒲香木主山嵐瘴氣

○加減參苓白朮散 補脾胃進飲食

白朮 三錢 茯苓 三錢 山藥 一兩 甘草 一錢

薏苡仁 二兩 白扁豆 七錢 陳皮 七錢

麥門冬 三錢

右為末每服二是食前白湯調下一方加菖蒲

○加減二陳湯 能治痰火氣三者

陳皮一錢 蒼朮八分 茯苓一錢 甘草二分

白朮四分 枳殼七分 枳實三分 桔梗五錢

紫蘇三分 薄荷二分 香附七分 菖蒲一錢

荆芥六分 木通四分 川芎一錢 麥門冬五分

右用水二盞姜三片煎至八分服隨病加減藥味

○柔金丸 治脾與大腸為最解五臟結氣補少陰經血

用山梔子去皮炒焦黑為末麩糊為丸

○山精丸

用蒼朮米泔浸為末麩糊為丸或神麩糊為丸

○青金丸 治肺火降痰

用黃芩半枯半實炒黑色天門冬膏為丸

○調胃妙方

日間常用小茴香最妙脾腎俱虛破故紙肉菓妙

粳米太妙脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而

六腑為之發世也脾腎之氣交通則水穀自然乾

花

○降火妙方

用黃芩川芎能調血心血一調其熱自退心平

則血不妄行

○降火滋陰妙方

故紙心拖清晨五下一升一提其氣喘脰一降一燕水火相見天與地隔八萬四千里人心與腎隔八寸四分黃庭界於二者之間

○膏子藥補陰虛

天門冬二兩

麥門冬二兩

黃栢二兩

知母半兩

當歸身一兩

白芍藥一兩

白朮八錢

首蒲一兩

甘草半兩

大約藥一兩用水二大碗熬至一碗去粗再熬成膏食前白湯調下二匙中滿者去甘草

○浸酒方 熬膏亦用

黃栢一兩

牛膝一兩

當歸二錢

玄參一兩

沙參一兩

白芍一兩

山藥二兩

蜜一兩

甘草三錢

山梔子一兩

天門冬一兩

麥門半兩

黃芩一兩

天花粉一兩

葶藶二兩

用好酒燒酒浸皆可或加白朮

○散劑湯

茯苓一錢

蒼朮八分

陳皮一錢

甘草二分

白芍八分

川芎八分

枳殼七分

香附七分

山梔子八分

附錄... 卷之... 一... 八...

水二鍾姜三片煎七分食前熱服隨病加減

○法曰醫則胃熱醫散則三焦行下脘通水穀之陰自滋沛身中之陰氣自生矣何陽盛而陰衰乎何陰虛生內熱乎陰氣不復加沙參山梔黃柏一二帖後加白朮當歸久服用陰虛生內熱方

○陰虛生內熱方

當歸 八分

白芍

煨剉或酒浸
姜汁浸六分

川芎 八分

白朮 七分

蒼朮

八分

黃柏 三分

陳皮 八分

玄參

五分

甘草 二分

沙參 七分

麥門冬 七分夏多川

天花粉 六分半

梔子

煨用六分

或以山藥代參朮

水二中姜三片煎至七分食前熱服久服去川芎冬

月加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

○陰分生陽湯 此方與上陰虛生內熱方相為表裏

白朮 七分

白芍

同前

當歸

一分

蒼朮 五分

陳皮 八分

或加參苓或以山藥代參苓姜棗煎服入蜜亦可加

肉菓破故紙亦可冬三九宜用故紙蓋以三焦者乃

下焦元氣生發之根帶也

升陽益胃養榮湯 可常服正平人用的

當歸 全用隨參木大 白芍 妙隨白木大

人參 七分 山梔子 炒八分

甘草 如食藥以 木通 五分以

白朮 五分

水二盞姜三片帶皮米一撮棗二枚食前熱服

○蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故為脾
脾者土也執伏地中此病多因血虛而得之也又有胃
虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

○肉蓯補骨脂二物冬月可服

○八物湯

白朮 七分 白芍 五分 當歸 一錢 山藥 一錢

山茱萸 七分 牡丹皮 七分 五味子 四分 杜仲 八分

水二中姜帶皮三片棗二枚煎七分食前熱服

加遠志小草麥門冬生地黃牛膝

○八味丸

白芍 七錢 黃柏 六錢 當歸 二錢 山藥 三兩

山茱萸 八錢 牡丹皮 八錢 五味子 五錢 杜仲 一兩

右為末煉蜜丸如梧子大加遠志小草麥門冬生地

黃牛膝 其生地黃牛膝另用酒浸搗為膏入藥

○疥瘡方

用花椒硫黃為末以枳柳一箇連香油磨搽之一掃
光神効

○醫畧一書乃予師新淦周汝鳴先生舊日所言而予
私或雜記者中間皆切實理到之言人所當共理會
因附於此若夫先生之全書與其獨得之妙則既非
淺陋所能窺亦非草率所能悉記錄也方廣謹識

癸集

醫指一百一十六
新增

附右菴方氏賦

竊謂

醫維小道迺寄死生

最要變通不宜固執

明藥脉病治之理

藥性脉訣
病機治法

悉望聞問切之情

望色問舌
切脉

藥推寒無溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味升降浮沉
之性宣通瀉補之能

脉究浮沉遲數滑濇之形表裏寒熱實虛之應阿阿嫩柳
之和弦鈞毛石之順

子養心法附錄卷之五

八

藥用君臣佐使主病之謂君最多轉君之謂臣

脉分老幼瘦肥老人脉濡小兒脉數

藥迺天地之精藥宜切病藥不切病矣

脉者氣血之表脉貴有神神中有神也

病有外感內傷風寒暑濕燥火之機

治用宣通瀉補滑澀溫燥重輕之劑

外感異乎內傷外感乃有餘之病

寒證不同熱證傷寒直中之邪為寒

外感宜瀉而內傷宜補

寒證可溫而熱證可清

補瀉得宜須臾病癒

溫清失度頃刻人亡

外感風寒宜分經而解散外感風寒傳變不一

內傷飲食可調胃以消滯內傷飲食只在胃

胃陽主氣司納受陽常有餘

脾陰主血司運化陰常有不足

胃乃六腑之本脾為五臟之源

胃氣弱則百病生

脾陰足則萬事息

丹溪公云

調理胃脾為醫中之王道

節戒飲食更却病之良方

病多寒為壽氣氣舒發熱

寒謂風寒外感晝夜發熱
於開生冷內傷午後發熱

或出七情動火火動生痰

有因行藏動靜以傷暑邪

或是出入雨水而中濕氣

亦有飲食失調而生濕熱

倘或房勞過度以動相火

六條言病機

制伏相火要滋養其真陰

六條言治法

祛除濕熱煩燥補其脾胃

外溫宜表散內溫宜淡

陽暑可清熱陰暑可散寒

尋火尋痰分多分少而治

究表究裏或汗或下而施

是風寒則汗之謂溫散也
是生冷則下之謂溫利也

痰因火動治火為先

火因氣生理氣為本

治火輕者可隆重者從其性而升消

理氣微則宜調甚則究其源而發散

實火可瀉或瀉表而或瀉裏

指外也

虛火宜補或補陰而或補陽

指內也

暴病之謂火

怪病之謂痰

寒熱溫燥風五痰有異

溫清燥潤散五治不同寒痰溫之熱痰清之溫痰燥之燥痰潤之風痰散之

有因火而生痰有因痰而生火

或鬱久而成病或病久而成鬱

金木水火土五鬱當分

泄折達發奪五法宜審金鬱泄之水鬱折之木鬱

鬱則生火生痰而成病

病則耗氣耗血以致虛

病有微甚

治有逆從

微則逆治以寒藥治熱

甚則從攻以熱藥治寒

病有本標急則治標緩則治本

法分攻補虛而用補實而用攻

少壯新邪專攻是則

老衰久病兼補為規

久病兼補虛而兼解鬱

陳癥或蕩滌而或消溶

積在胃腸可下而愈

塊居經絡宜消而痊

女人氣滯於血宜開血而行氣

男子陽多乎陰可補陰以配陽

菝葜山藥男子之佳珍補陰故也

香附縮砂女人之至寶行氣故也

氣病血病二者宜分

陽虛陰虛兩般勿紊

陽虛氣病晝重而夜輕自子至巳為晝

血病陰虛晝輕而夜重自午至亥為夜

陽虛生寒寒生溫溫生熱陽為氣為真火

陰虛生火火生燥燥生風陰為血為真水

陽盛陰虛則生火火過血而錯經妄行

陰盛陽虛則生寒寒滯氣而周身浮腫

陽虛畏外寒陽氣虛不能禦外故畏外寒

陰虛生內熱陰血虛不能生內熱

補陽補氣用甘溫之品

滋陰滋血以苦寒之流

調氣貴用辛涼無形者也氣鬱則發熱故宜用辛涼之藥以散之

和血必須辛熱血屬陰有形者也血積則作痛故宜用辛熱之藥以開之

丹溪心法

陽氣為陰血之引導

陰血迺陽氣之依歸

陽虛補陽而陰虛滋陰

氣病調氣而血病和血

陰陽兩虛惟補其陽陽生而陰長

氣血俱病只調其氣氣行而血隨

藏冰癸水以節陽氣之燔

滋水養水以制心火之亢

火降水升斯人無病

陰平陽秘我身長壽

小兒純陽而無陰

老者多氣而少血

肥人氣虛有痰宜豁痰而補氣

瘦者血虛有火可瀉火以滋陰

膏梁無厭發癰疽熱燥所使

淡薄不堪生腫脹寒濕而然

北地從高宜清熱而潤燥

南方溽下可散溫以溫寒

病機既明

用藥勿惑

十卷八十六

麻黃湯發臘月寒傷榮

桂枝湯散冬風傷衛

九味羌活湯發三時之表

一時傷寒
夏秋也

六神尾解散三時之表

三月天行
謂之晚發

香蘇散十神湯參蘇飲

表調中
平和之藥外
感內傷兼治

葛根湯解肌湯小柴胡

解半表

大柴胡三承氣攻熱和

何裏

理中湯四逆湯散寒中陰經

已上治外感

補中益氣湯治飽飢勞役

升陽順氣湯療怒恐憂思

調中益氣湯調胃脾失協

參朮調中湯治脾肺俱傷

升陽散火湯升散熱邪

九言熱者
俱指外熱也

升陽益胃湯分消溫氣

已上治內傷

和解毒金沸草散治時行寒疫

神木散定風餅子蒸棗中風邪

人參敗毒散升麻葛根湯解溫疫而身熱

陽毒升麻湯雄黃解毒丸散天行而咽疼

宣明雙解散主溫熱始終之要藥

藿香正氣散治暑濕內外之良方

香薷飲清暑益氣湯人參白虎湯益原散縮脾飲能驅實

虛暑有氣

平胃散羌活湯溫湯升陽除濕湯五苓散木附湯善解外

內濕邪

生料五積散解溫溫寒

治表裏之寒溫

防風通聖散清熱潤燥

治表裏之熱燥

搜風順氣丸神言丸潤大腸燥症

黃連解毒湯三黃丸瀉三焦火邪凡言火者指內火也

當歸六黃湯瀉火滋陰

防風當歸飲補虛退熱

舟車丸三花神佑丸能除濕熱

濕則生熱

秦艽湯羌活愈風湯善解燥風

燥則生風

胃苓湯主傷暑泄瀉腹痛

柴苓湯治傷寒泄瀉身熱

桂苓白朮散燥霍亂而口渴渴

加減理中湯治吐瀉而咽不乾

蒼朮湯胃風湯治濕傷氣分白痢便膿

地黃湯芍藥湯主熱傷血分赤痢下血

萬安散七寶飲是瘧無汗而寒多熱少

清脾飲六和湯治瘧有汗而寒少熱多

華蓋散五物湯主喘嗽因寒外襲

洗肺散貝母散治咳嗽由火内生已上發表和中以治風寒暑溫燥火

白虎湯瀉胃火有餘

八珍湯補脾陰不足

白朮和胃丸能養胃脾

寬中進食丸善滋形氣

治中湯枳木丸和中丸大安丸保和丸健脾消食

香朮丸香稜丸積氣丹妙功丸消魄丸破積除癥

木香枳殼丸療食停久發黃

神妙列仙散治酒積陳成疸

木香枳木丸化滯湯調氣進食

七轉靈應丹萬應丸取積追虫

丁香脾積丸妙應丸治心腹諸疼

大黃備急丸三陽散主卒暴疔病

三稜消積丸治新傷生冷硬物內用

木香檳榔丸療久患氣食痞膨內用大黃

巴豆新開去毒新之冷積可伏

大黃破結推陳久之熱積可遵

氣病宜調氣用木香檳榔香附枳殼

血病宜和血用川芎當歸桃仁紅花

越鞠丸木香沉香散開鬱氣之無形

蟠葱散撞氣阿膠丸破積血之有質

神砂一粒丹透氣鬱而為心疼

神聖代針散治血積而作疝氣

獨活寄生湯開氣血結滯在腰

當歸拈痛湯散溫熱沉凝于足

控涎丹小胃丹治溫熱流注四腹作疼

金棗丹虎骨散療氣血拂鬱遍躰為病已上調胃消食并氣血溫熱

二陳湯以豁痰

三補丸而瀉火

六君湯豁痰補氣調胃

六物湯降火補血滋陰四物湯加黃柏知母是也

當歸龍會丸善降陰火兼治脇痛

人參養胃湯能開結痰併療久瘧

太平丸消化丸治痰嗽有功

左金丸香連丸除熱痰必効

洗心散洗肝散瀉心肝之火

漆痰丸化痰丸蠲熱燥之痰

四七湯黑錫丹罷痰結心胸

清空膏涼膈散除火升頭腦

石膏羌活散祛風明目

川芎石膏湯瀉火定眩

川芎赤調散治風熱上攻頭目

葛花解醒湯療溫痰中滿胃腸

龍腦雞蘇丸除肺心虛煩

人參瀉肺湯散胸膈實火

犀角地黄湯桃仁承氣湯茯苓補心湯阿膠丸小建中湯

治火載血而上出

當歸秉氣湯瑞竹蒲蓄散當歸和血散聚金丸伏龍肝散

療陽逼陰而下行

紅花當歸散千金桃仁煎六合湯理經脈不通

涼血地黄湯解毒四物湯膠艾湯治崩漏不止

金匱當歸散清熱安胎而易產

丹溪天麻丸活血保產而無驚

女金丹烏雞丸調氣血令老婦妊娠

天一丸連翹飲瀉火溫主小兒百病

醒脾散玉餅子肥兒丸香稜丸治嬰孩脾氣不足而致痰

瀉青丸奪命散追龍丸換即丸療童穉肝邪有餘而生痰

金箔鎮心丸金箔鎮心丹安神定驚

五福化毒丹犀角清毒散清熱解毒

丹
具功散補痘瘡之虛寒

通聖散瀉疰疹之實熱

內疎黃連湯千金漏蘆湯主陽癰腫掀何外

內托復煎散消然奪命丹治陰疽毒蘊于中

立馬回疔丹萬靈奪命丹療疔瘡而有殊功

神効太乙膏散腫潰堅湯治癰癧而收實効

紫金丹治藥食聚毒蕪癰疽疔腫主解利

如聖散療風溫諸邪及癰疽痛風散主發

香殼丸芎歸丸療疔而清熱涼血

槐角丸烏玉丸治漏而散溫補虛

清心蓮子飲八正散治小便淋濁有虛實之分

道滯通幽湯三和散療大腸燥結有血氣之異

海藏五飲湯散五等之飲

開結枳實丸消諸般之痰

導痰湯三生丸豁痰煉風

千緝湯四磨湯下氣定喘

蘇子降氣湯消痰利氣

三因七氣湯解鬱開心

瓜蒂散稀心散四靈散吐涎而祛風

蘇青丹星香湯療痰渴熱痰而順氣

丹
心
法
丹
卷
一
四
七

蘇合香丸烏藥順氣散白氣散善開結氣

小省風湯青州白丸子搜風丸能散風痰

牛黃清心丸治諸痰熱而類風

諸小續命湯療真中風而在脉

三化湯主風入腑推陳潤燥

至寶丹治邪入藏散熱消風

龍星丹疎風清熱豁痰

愈風丹潤燥祛風瀉火

換骨丹續命丹治風痰克塞經絡而為癱瘓

清燥湯健步丸療溫熱薰蒸筋骨而成痿瘓

南星治風痰蒼朮治濕痰天花粉治熱痰海石治燥痰半

夏治寒痰

柴胡瀉肝火黃連瀉心火白芍藥瀉脾火黃芩瀉肺火黃

柏瀉腎火

天門麥門知母石膏竹茹菴便玄明粉上清丸能散虛火

荆瀝竹瀝貝母瓜蒌蘆汁薑汁霰天膏二瀝湯善開虛痰

氣虛加以四君

血虛加以四物 ○已上治痰火氣風

四君補氣併益脾

四物補血兼滋腎

八物湯十全大補湯補氣血兩虛

固本丸杏菴心腎丸滋心腎不足

錢氏白朮散參苓白朮散竹葉石膏湯補脾胃諸虛

丹溪補陰丸金匱腎氣丸三一腎氣丸滋真陰久損

崔氏八味丸補陰興陽

天王補心丹寧神定志

朱砂安神丸涼血清心

八味定志丸補虛開竅

茯苓丸萹薢分清飲除濁止淋

固精丸固真太寶丸秘精收貯

保和湯知母茯苓湯黃芪鱉甲湯止嗽寧肺

保真湯十味人參散人參養榮湯除熱補虛

一秤金七仙丹烏髮駐顏

瓊玉膏固本酒延年益壽 ○已上補氣血臟腑

以方加減存乎人要審病而合宜

用藥補瀉在於味須隨時而換氣

奇偶復七方須知七方者奇偶復

初中末三治要察初則發中則

寒因熱用熱因寒用通因通用塞因塞用通因通用者通其積滯而下焦自然閉密也

高者抑之下者舉之外者發之內者奪之塞因塞用者塞其下流而上焦自然開豁也

丹溪心法附錄卷之二十一
寒則堅凝熱則開行

風能勝濕濕能潤燥

辛能散結甘能緩中淡能利竅

苦以泄逆鹹以收耗鹹以軟堅

升降浮沉則順之謂順其升降浮沉之性也

寒熱溫涼宜逆也謂以寒治熱以熱治寒也

病有淺深

治有難易

初感風寒乍傷飲食一深可愈

舊存痼疾久患虛勞萬方難瘳

履霜之疾亟瘳

无妄之藥勿試

病若挾虛宜半攻而半補

醫稱多術或用多而用針

針有劫病之功

灸獲而生之驗

針能去氣病而作痛

灸則消血癥以成形

臟寒虛奪者治以灸熯

脈病牽痺者療以針刺

丹溪心法附錄卷之二十一
針灸

血實畜結腫熱者宜從砭石

氣滯痿厥寒熱者當依導引

經絡不通病生於不仁者須覓醪醴

血氣凝泣病生於筋脉者可行熨藥

病慄悍者按而收之謂按也

乾霍亂者刮而行之謂刮也

醫業十三科宜精一派

病情千萬變仔細推評

姑撮碎言以陳管見

後之幸者庶遂迷津

論諸方

麻黃湯 見傷寒

桂枝湯 見傷寒

九味羌活湯 見傷寒

六神通解散 見傷寒

香蘇飲 見傷寒

十神湯 見傷寒

參蘇飲 見傷寒

葛根湯 見傷寒

解肌湯 見傷寒

小柴胡湯 見傷寒

大柴胡湯 見傷寒

調胃承氣湯 見傷寒

小承氣湯 見傷寒

太承氣湯 見傷寒

理中湯 見中寒

四逆湯 見中寒

補中益氣湯 見內傷

升陽順氣湯 見諸氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI

調中益氣湯 見調中

參朮調中湯 見內傷

升陽散火湯 見火類

升陽益胃湯 見內傷

和解毒 見傷寒

金沸草散 見傷風

神木散 見傷風

定風餅子 見傷風

人參敗毒散 見傷風

升麻葛根湯 見傷寒

陽毒升麻湯 見斑疹

雄黃解毒丸 見喉痺

宣明雙解散 見傷寒

藿香正氣散 見傷寒

香薷飲 見中暑

清暑益氣湯 見中暑

人參白虎湯 見中暑

益原散 見中暑

縮脾飲 見中暑

平胃散 見中溫

羌活勝濕湯 見中溫

升陽除濕湯 見中溫

五苓散 見傷寒

木附湯 見中溫

生料五積散 見中寒

防風通聖散 見中風

搜風順氣丸 見中風

神芎丸 見中溫

黃連解毒湯 見傷寒

三黃丸 見火類

當歸六黃湯 見盜汗

防風當歸飲子 見火類

舟車丸 見中溫

三花神佑丸 見中溫

大養元湯 見中風

羌活愈風湯 見中風

胃苓湯 見泄瀉

柴苓湯 見傷寒

桂苓白朮散 見中暑

加減理中湯 見霍亂

蒼木湯 見痢疾

胃風湯 見痢疾

地黃湯 見痢疾

芍藥湯 見痢疾

萬安散 見瘧類

七寶飲 見瘧類

清脾飲 見瘧類

六和湯 見瘧類

華蓋散 見咳

五物湯 見咳嗽

洗肺散 見咳

貝母散 見咳嗽

白虎湯 見傷寒

八珍湯 見調胃

白朮和胃丸 見調胃

寬中進食丸 見調胃

治中湯 見調胃

枳木丸 見痞類

大安丸 見傷食

和中丸 見調胃

保和丸 見積聚

消化香殼丸 見傷食

香稜丸 見積聚

積氣丹 見積聚

妙功丸 見積聚

消塊丸 見積聚

木香枳殼丸 見積聚

神妙列仙散 見傷食

木香枳木丸 見諸氣

木香化滯湯 見諸氣

七轉靈應丹 見積聚

萬應丸 見積聚

丁香脾積丸 見腹痛

妙應丸

大黃備急丸 見傷食

三陽散

三稜消積丸 見傷食

木香枳即丸 見鼓脹

越鞠丸 見六鬱

木香流氣飲 見諸氣

神效散 見諸氣

撞氣阿魏丸 見諸氣

神效一粒丹 見疝痛

神聖代針散 見疝痛

獨活寄生湯 見腰痛

當歸拈痛湯 見痺氣

控涎丹 見痛風

小胃丹 見痰類

金東丹 見痛風

虎骨散 見痛風

二陳湯 見痰類

三補丸 見補損

六君子湯 見調胃

六物湯 見勞瘵

當歸龍會丸 見脇痛

人參養胃湯 見傷寒

太平丸 見勞瘵

消化丸 見勞瘵

左金丸 見火類

香連丸 見痢疾

洗心散 見火類

洗肝散 見眼目

滾痰丸 見痰類

化痰丸 見痰類

四七湯 見痰類

黑錫丹 見痰類

清空膏 見頭痛

涼膈散 見傷寒

石膏羌活散 見眼目

川芎石膏湯 見中風

川芎茶調散 見傷風

蒼花解醒湯 見傷食

龍腦避瘟丸 見火類

人參瀉肺湯 見火類

犀角地黄湯 見吐血

桃仁承氣湯 見吐血

茯苓補心湯 見咳血

阿膠丸 見吐血

小建中湯 見吐血

當歸養氣湯 見弱血

瑞竹蒲黃散 見瀉血

當歸和血散 見下血

聚金丸 見下血

伏龍肝散 見下血

紅花當歸散 見經病

千金桃仁煎 見經病

六合湯 見經病

涼血地黃湯 見崩漏

解毒四物湯 見崩漏

膠艾湯 見崩漏

金匱當歸散 見產前

丹溪天麻丸 見產前

女金丹 見子嗣

烏雞丸 見子嗣

天一丸 見小兒

連翹飲 見小兒

醒脾散 見小兒

玉餓子 見小兒

肥兒丸 見小兒

香稜丸 見小兒

瀉青丸 見小兒

奪命散 見小兒

抱龍丸 見小兒

枳郎丸 見小兒

金箔鎮心丸 見小兒

金箔鎮心丹 見小兒

五福化毒丹 見小兒

犀角消毒飲 見小兒

異功散 見痘疹

通聖散 見痘疹

內疎黃連湯 見痘疹

千金漏芦湯 見痘疹

內托後煎散 見痘疹

淵然奪命丹 見痘疹

立馬回疔丹 見疔瘡

萬靈奪命丹 見疔瘡

神效太乙膏 見疔瘡

散腫清堅湯 見疔瘡

紫金丹 見急症

如聖丹 見中風

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

香殼丸 見痔瘡

芎歸丸 見痔瘡

加味槐角丸 見漏瘡

烏玉丸 見漏瘡

清心蓮子飲 見淋類

八正散 見淋類

導滯通幽湯 見燥結

三和散 見燥結

海藏五飲湯 見痰類

開結枳實丸 見痰類

導痰湯 見痰類

三生丸 見中風

千緝湯 見痰類

四磨湯 見喘類

蘇子降氣湯 見痰類

三因七氣湯 見諸氣

瓜蒂散 見傷寒

稀涎散 見中風

四靈散 見吐法

蘇青丹 見中風

星香湯 見中風

滌痰湯 見中風

蘇合香丸 見中風

烏藥順氣散 見中風

勻氣散 見中風

小省風湯 見中風

青州白丸子 見中風

搜風丸 見中風

牛黃清心丸 見中風

小續命湯 見中風

三化湯 見中風

至寶丹 見中風

龍星丹 見中風

愈風丹 見中風

換骨丹 見中風

續命丹 見中風

清燥湯 見痿類

健步丸 見痿類

玄明粉 見火類

上清丸 見風熱

霞天膏 見劉金

竹瀝湯

四君子湯 見補損

四物湯 見補損

八物湯 見補損

十全大補湯 見補損

人參固本丸 見補損

古養心腎丸 見補損

錢氏白朮散 見傷寒

參苓白朮散 見調胃

竹葉石膏湯 見補損

丹溪補陰丸 見補損

金匱腎氣丸 見補損

三一腎氣丸 見補損

崔氏八味丸 見補損

茯苓丸 見赤白濁

草薢分清飲 見赤白濁

固精丸 見夢遺

固直大寶丸

保和湯 見勞瘵

知母茯苓湯 見肺癆

黃芪散甲湯 見勞瘵

保真湯 見勞瘵

一味人參散

人參養榮湯

一神金 見烏龍

七仙丹 見烏龍

瓊玉膏 見睡顏

固本酒 見睡顏

廣既類集此書以為醫道玄奧高深苟非指引門路
 何由而升堂入室哉於是不揣疎庸輒將平生管見
 及采各證良方為賦一篇綱目悉具名曰醫指蓋欲
 初率先熟讀此而入醫不難矣吁知我者其惟此賦
 一異我者其惟此賦乎

有全本在廣家

附錄

故丹溪先生朱公石表辭

宋太史濂撰

丹溪先生既卒宗屬失其所倚藉井邑失其所依憑嗚呼
之士失其所承事莫不彷徨遺慕至於洒涕灑聞之中心
尤摧咽不自勝蓋自如布于首輒相親於几杖間訂義質
疑而求古人精神心術之所寓先生不以濂為不肖以忘
年交遇之必極言而無所隱故知先生之深者無踰於濂
也方欲聚厥事行為書以傳來世而先生之子玉汝從子
嗣汎忽踏灑門以先主從弟無恙所為快請為表以勒諸
墓上濂何敢辭先生諱濂字子彥諸姓朱氏其先出於漢

槐里令雲之後居平陵至晉末與中庶海太守沈始遷今
發之義焉子孫傳譽多矣聞於世烈志家乘載之為詳當
宋之季有東堂府君者諱良祐懿然君子人也蓋以六經
為教以弘其宗府君生其生迪功即柱迪功生鄉貢進
士環先生之大父也父諱元壽其氏先生受資爽朗讀書
即了大義為聲律之賦刻燭而成長老咸器之已而棄去
尚俠氣不肯出人下鄉之右族咸陵之必風怒電激求直
干有司上下搖手相戒莫或輕犯時鄉先生文懿許公講
道東陽八華山中公上承考亭朱子四傳之孝授受分明
契證真切擔簦而從之者亡慮數百人先生歎曰丈夫所

學不務聞道而唯俠是尚不亦惑乎乃樞衣往事焉先生
之年蓋已三十六矣公為開明天命人心之秘內聖外王
之微先生聞之自悔昔之沉疴顛濟汗下如雨由是日有
所悟心為融廓休膚如膏增長每宵披圖坐至四鼓潛驗
默察必欲見諸寶號抑其疎豪歸於粹夷理欲之閑誠偽
之限嚴辨確守不以一言初且自恕如是者數年而其學
堅定美成當賓與先生應書秋闈幸沾一命以驗其所施
再從再不利復歎曰不仕固無義然得失則有命焉苟推
一家之政以達於知黨州閭寧非是乎先是府君置祭田
三十餘畝合為一區闢人廨司穡事以陳時薦然有恒祭

而無恒所先生乃即適意亭遺址建祠堂若干楹以奉先
世神主歲時行事後考朱子家礼而損益其儀文少長咸
在執事有怪深衣大帶以序就列宴私治此不愆於禮適
意亭者府君所造以延徐文清公之地先生弗忍其廢改
創祠堂之南俾諸子姪肄習其中包銀之令下州縣承之
急如星火一里之間不下數十姓民莫敢與辨先生所居
里僅上富氓二人郡守召先生自臨之曰此非常法君不
愛頭乎先生笑曰守為官頭固當惜民不愛也此害將毒
子孫必欲多及民頭倍輸吾產當之守雖怒竟不能屈縣
有暴丞好誦瀆鬼神欲脩岱宗祠以徼福懼先生莫已與

以言嘗之曰人之死生嶽神實司之欽治其官孰敢干令
先生曰吾受命于天何庸媚土偶為生死計耶且嶽神無
知則已使其有知當此儉歲民食糠粃不飽能振吾民者
然後降之福耳幸蘇其事賦後無藝胥吏高下其手以為
民奸先生集同里之人謂曰有田則科徭隨之君等入胥
吏餌而獲田則非羨之上也宜相率以義聚其為之胸臆
而敷之衆翁然從每官書下相依如父子議事必先集若
苛斂之至先生即以身前辭氣懇款上官多聽為之損裁
縣大夫勸耕于鄉好有要於民先生照其臨境邪幅屏履
往迎于道在大夫驚曰先生何事乃尔耶先生曰民有役

于官禮固應尔大夫曰勸耕善乎先生曰私田不煩官勸
第公田生青芻耳是時圭田賦重種戶移徙亡故先生以
此為風大夫一哄而去鄉有罽墜塘周圍凡三千六百步
溉田至六千畝而歲堤壞而水竭數以旱告先生倡民興
築置坊庸鑿為三竇將其淺深而舒洩之民食其利後十
年山水暴至堤又壞先生命再從于漳力任其事以嗣其
成縣令長或問次微得失先生必盡心為之開道東陽郭
氏父子三人虐毆小民幾斃又買鍼鱗腹逼使吞之事移
義烏鞠問當其子父皆死先生曰原其故殺之情亦一人
可償尔二子從父之令宜從末減若皆殺之無乃已重乎

事止從先生議張甲行小徑中適孚乙荷在器來幾中甲
目甲怒拳其耳而死甲乙皆貧人甲又有九十之親先生
曰貴甲罪則廢法徇法甲必瘦死親無以養亦死乙屍暴
於道孰為藏之不若使竟其壘埋且慰其親徐來婦獄服
中刑耳或曰甲或逃奈何先生曰若以誠待之必不尔也
縣如先生言後會赦免細民有斬先生血水者先生訊之
民弗服先生聞於縣將逮之人文讓民曰汝奈何犯仁人
耶民曰計將安出入曰先生長者也急昇木還之當尔貸
民從之先生果實而不問先主客其妙湛院尼刻木作人
形以為厭蠱詔客陳庚得之欲發其事尼懼甚先生知之

以計給陳出碎其木刻陳歸怒且言先生徐曰君乃士人
獲此聲於吳楚聞甚非君利僮之金吾財可通用勿憂也
尼後輩金昂為謝先生北而去方嶽重臣及庶訪使者聞
先生名無不頭見死見無不欲文章為之先生皆力辭唯
民瘼吏弊必再三感頓告之不肖親受其病者單懷鄭公
持節浙東尤敬先生以尊各禮禮之衆或不樂競短其行
於公公笑曰朱聘君盛舉諸公之長而諸公顧及短之何
其量之懸隔耶皆漸不能退初先生北齡時以母夫人病
脾頗習醫後益研礪之且曰吾既窮而在下澤不能至遠
其可遠者非醫將安務乎時方盛行陳師女裴宗元所定

大觀一百九十七方先生獨疑之曰用藥如特齋隨物重
輕而為前却古方新証安能相值乎於是尋師而計其說
渡濤江走吳又走宛陵走建業以不能得復回武林有以
羅司徒知梯為告者知梯字子敬宋寶祐中寺人精於醫
得金士劉完素之學而旁參於李杲張從正二家然此偈
甚先生謂馬十往返不能通先生志益堅日拱立於其門
大風雨不易或告羅曰此朱彥脩也君居江南而失此士
人將議君後天羅遽脩容見之一見如故交為言學醫之
要必本於素問難經而溫熱相火為病最多人罕有知其
秘者薰之長沙之書詳於外感東垣之書詳於內傷兩書

之治疾方無所憾區區陳裴之學况之凡殺人先生問之
夙疑為之釋然學成而歸鄉之諸醫始皆大驚中而笑且
排卒乃大服相性尊頭為弟子四方以疾迎候者無虛日
先生無不即往雖雨雪數途亦不為止僕夫告痛先生諭
之曰疾者度刻如歲而欲自逸耶寔人求藥無不與不求
其償其困既無告者不待其招注藥往起之雖百里之遠
弗憚也江浙省臣往討閩寇深入瘴地遂以病還錢塘將
北歸先生脉之曰二十日死使道經三衢時召吾可使還
燕然亦不能生之也如期卒於姑蘇驛權貴人以微疾來
召危坐中庭列三品儀備於左右先生脉已不言而出或

追問之先生曰三月後當為鬼猶有驕氣耶及死其家神
先生之醫載粟為壽先生辭之一少年病熱兩額火赤不
能自禁躁走于庭將啗河先生曰此陰證也製附子湯飲
之衆為之吐舌歎心其疾如失先生治病如神若此甚多
門人類証有書茲不詳載先生孤高如鶴挺然不群雙目
有小大輪日出明雖毅然之色不可凌犯而清明坦夷不
事表操精神充滿接物和粹人皆樂親炙之語言有精魄
金鏘鏗鏗使人側耳聳聽有駭然興起之意而於天人感
應歿變類至之說尤竭力戒厲反覆不厭故其教人也人
既易知昏明強弱皆護其心老者則愛慈諍幼者則樂恭

順莫下皆知忠信之為美固未能一變至道去泰去甚有足觀者或有小過深掩密覆唯恐先生之知此先生杖屨所臨人隨而化浦陽鄭太和十世同居先生為之喜動顏面其家所講冠婚喪祭之禮每咨於先生而後定蓋先生之學稽諸載籍一以躬行為本以一心同天地之大以耳目為禮樂之源積養之久內外一致夜寐即平晝之為暗室即康衢之見汲汲孜孜毫而弗篤每見誇多鬪靡之士輒語之曰聖賢一言終身行之弗盡矣以為多至於括英摘豔之辭尤不樂顧且以吾道為賊目之及自為文率以理為宗非有關於綱常治化不輕論也居室垣庸敦尚儉

朴服御唯大布寬衣僅取蔽軀藜藿糗飯安之如八祿或在豪大姓家當其肆筵設席水陸之羞交錯於前先生正襟默坐未嘗下箸其清脩苦節能為人之所不能為而於世上所悅者澹然無所嗜惟欲聞人之善如恐失之隨聞隨錄用為世勸遇有不願聽則者必諱其敗事有難處者又導之以其方晚年識見尤卓嘗自括蒼還道過永康謂人曰青田之民器悍值此法弛今幸之時必依險阻肅聚為亂已而果然又嘗告親友曰吾足跡所及廣矣風俗澆漓甚垂髫之童無不緝探狡謀罔上天怒已極必假手戮之盡力善以延其胤乎特方彙平聞者咸笑先生之狂言未

發天下大亂空村無烟火動石餘里先生著書有宋論一
卷格致餘論若干卷局方發揮若干卷傷寒論辨若干卷
外科精要發揮若干卷本草衍義補遺若干卷風水問答
若干卷凡七種微文奧義多發前人之所未發先生嘗曰
義理精微禮樂制度吾門師友論著已悉吾可以無言矣
故其所述獨志於醫為多先生生於至元辛巳十一月二
十八日卒于至正戊戌六月二十四日瀕卒無他言獨呼
嗣泥謂曰醫學亦難矣汝謹識之言訖端坐而逝享年七
十有八娶戚氏道一書院山長象祖之女先三十五年卒
子男二嗣衍玉汝

女四適傅似翁蔣長源呂文忠張思忠孫男一椐女二
一適丁掄一尚幼其年十一月日始葬先生于某山之原
卒後之五月也先生所居曰丹溪學者尊之而不敢字故
因其地稱之曰丹溪先生云夫自學術不明于天下凡聖
賢防範人心維持世道之書往往割裂接拾組織成章流
為譁世取寵之其間有注意遺經似若可尚又膠於訓詁
之間異同紛拏有如聚訟其視身心皆藐然若不相聞此
其知識不出於不學庸人之下於戲秦漢以來則或然矣
然而靈豕不鳴一孤之妖弗息黃鍾不奏瓦缶之音日甚
天開文運濫洛奮興遠明九聖之緒流者過而止之膠者

釋而通之一期闡厥其昏翳挽回其精明而後已至其相傳唯考亭集厥大成而考亭之傳又唯金華之四賢續其世胤之正如印印泥不差毫末此所以輝煌景接而芳猷允著也先生少負任俠之氣不少撓屈及聞道德性命之說遽變之而為剛毅所以肩量弘而任載重寤寐先哲唯日不足民吾同胞之念湏臾莫忘雖其力或弗支苟遇惠利少足以濡物必委蛇周旋求盡其心應接之際又因人心感發之機而施仁義之訓觸類而長開物成化所謂風兩霜露無非君子之教者要亦不可誣也致思於醫亦能搜隱挾秘倡明南方之絕學嬰疾之家倚以為命先生一

布衣耳其澤物有如此者使其得位于朝以行其道則大明效大驗又將何如哉嗚呼先生已矣其山峙淵澄之色并潔石貞之操與其不可傳者弗能即矣徒因其遺行而誦言之見聞不博惡能得十一於千百之間哉雖然舍是又無足以求先生者敢濡狀之繫敘而為之銘曰

濂洛有作性學在明考亭承之集厥大成化覃荆楊以及閩粵時雨方行區前畢達世胤之正實歸金華縣延四葉益燁其葩辟諸上尊寘彼達路隨其志分不爽其度有美君子欲振其奇氣方剛疇能侮予七尺之軀忍令顛越壯齡已踰亟更其艱更之伊何我笈有書負而兼遊以祛

所疑非別非厲局圖局寔豈止惜陰夜亦為書昔離其量
今廓其襟始知人心與宇宙同出時用世時有不利乎惠
家邦庶亨厥志勤我祠事以帥其宗况有書詩以陶以礪
以暢其施斯壽六物苟躬可捐我豈違恤仁義之言繩繩
勿休昭朗道真釋除欲仇上帝有赫曰注吾目天人之交
間不容粟聽者聳然如聞巨鑄有聲鏗錡無耳不聰旁溢
予醫亦紹絕躅開闡玄微功利尤博歛具豪英變為毅弘
所以百為度越于人咕咕世儒出入口耳競蕩闢華柝門
殊軌以經為戲此孰甚焉不有躬行其失局鑄世塗方冥
正資揚燎夢夢者天使埋其耀精神上征定為長庚與造

化遊白光燁燁表德幽墟遵古之義余曰允哉是詞無愧

丹溪公傳

戴九靈良撰

丹溪公者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彥脩學者尊
之曰州溪公羽自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經
為舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山
復徃拜焉益聞道德性命之說宏深粹密遂為專門一日
文懿謂曰吾卧病久非精於醫者不能以起之子聰明異
常人其有游藝於醫乎翁以母病牌於醫亦粗習及聞女
懿之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於
時猶仕也乃悉心焚棄向所習舉子業一於醫致力焉時方

盛行東師文裴宗元所定大觀二百九十七方翁躬書夜
是習既而悟曰孫古方以治今病其勢不能以盡合苟將
起度量立規矩稱權衡必也素雖諸經乎然吾知諸醫鮮
克知之者遂治裝出將求他師而叩之乃渡浙河走吳中
出宛陵抵南徐建業皆無所遇及還武林忽有以其郡
羅氏告者羅名知悌字子敬世稱太無先生宋理宗朝寺
人學精於醫得全劉完素之再傳而夢通張從正李果二
家之說然性褊甚恃能厭事難得意翁往謁馬凡數往返
不與接已而求見愈篤羅乃進之曰子非朱彥脩乎時翁
已有醫名羅故知之翁既得見遂北面再拜以謁受其所

教羅遇翁亦甚惟即授以動張李之書為之敷揚三家之
旨而一斷於經且曰盡去而舊學非是也翁聞其言渙然
無少疑滯於胸臆居無何盡得其說字以歸鄉之諸醫泥陳
裴之學者聞翁言即大驚而笑且出拊文懿喜曰吾疾其
竟瘳矣平文懿得未疾醫不能瘳者餘餘年翁以其法治
之良驗於是諸醫之笑且拊者始皆心服口譽數年之間
聲聞頗著翁不自滿足益以三家之說推廣之謂劉張之
學其論臟腑氣化有六而於溫熱相火三氣致病為最多
遂以推陳致新瀉火之法療之此固高出前代矣然有陰
虛火動或陰陽兩虛濕熱自感者又當消息而用之謂李

之論說會旁卷內傷脾胃則胃院之陽不能以升舉并及
心肺之氣陷於中焦而用補中益氣之劑治之此亦前人
之所無也然而天不足於西北地不滿於東南天陽也地
陰也西北之人陽氣易於降東南之人陰火易於升苟不
知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於其升者亦從
而用之吾恐反增其病矣乃以三家之論去其短而用其
長又復參之以太極之理易禮記通書正蒙諸書之義貫
穿內經之言以尋其指歸而謂內經之言火蓋與太極動
而生陽五性感動之說有合其言陰道虛則又與禮記之
養陰意同因作相火及陽有餘陰不足二論以發擇之其

論相火有曰陽動而變陰靜而合而生水火木金土然火
有二焉曰君火曰相火君火者人火也相火者天火也火
內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質
相生配於五行故謂之君以直而言生於虛無守位寡命
故謂之相天生物恒於動人有此生亦恒於動然其所以
恒於動者皆相火助之也是於天者出於龍雷則水之氣
出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而
腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配
三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此
人不歸生人非此火不能以有生天之火雖出於木而皆

平也故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為相火者也肝腎之陰悉其相火人而同乎天也或曰相火天人所問東垣何以指為元氣之賊又謂火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動而萬事出五者之性為物所感不能謂之動者即內經五火也相火易動五性厥陽之火又從而扇之則妄動矣火既妄動則煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經暑與溫言之而相火之氣則以火言蓋表其暴悍酷烈有甚於君火也故曰相火元氣之賊周子曰聖人定之以中正

仁義而主靜朱子亦曰必使道心常為之主而人心每雖命焉此善處乎火者也人心聽命於道心而又能主之以靜彼五火將寂然不動而相火者惟有扶助造化而為生生不息之運用爾夫何元氣之賊哉或曰內經相火註言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰足太陽少陰東垣嘗言之治以炒栝取其味辛能瀉水中之火戴人亦言膽與三焦肝與胞絡皆從火治此歷指龍雷之火也余以天人之火皆生於地如上文所云者實廣二公之意耳或曰內經言火者非一往往於六氣中見之而曰鬱者未之有也二公豈他有所據耶曰經以百病皆

上於其寒暑溫燥火之動而為變者岐伯歷指病機一十九條而屬火者五此非相火為病之出於臟腑者乎考之內經諸執耆愚則屬之火諸狂躁越則屬之火諸病肘腫痛酸驚駭則屬之火又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣癘鬱病痿屬於肺火之升也諸溫腫滿屬於脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於心火之用也是皆火之為病出於臟腑者然也噫以陳無擇之通敏猶以暖熾論君火日用之火論相火是宜後人之能聾聵哉其論陽有餘陰不足有曰人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為血然氣常有餘而血常不足何為其然也天大也為陽而

運於地之外地居天之中為陰而天之大氣奉之日實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰而稟日之光以為明者也則是地之陰已不勝夫天之陽月之陰亦不敵於日之陽天地日月尚然而况於人乎故人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀之養而後陰可與陽配成乎人而為人之父母古人必近三十二十而後嫁娶者可見陰氣之難於成而古人之善於保養也錢仲陽於腎有補而無瀉其知此意者乎又按禮記註曰人惟五十然後養陰者有以如內經曰年四十陰氣自半而起居衰矣男子六十四歲而精絕女

四十九歲而經斷夫以陰氣之成止為三十年之運用而竟已先虧可不知所保養哉經曰陽者天也主外陰者地也主內故陽道實陰道虛斯言豈欺我哉或曰遠取諸天地日月近取諸男女之身曰有餘曰不足吾已知之矣人在氣交之中今欲順陰陽之理而為攝養之法如之何則可曰主閉藏者腎也司踈泄者肝也二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也為物所感則易於動心動則相火翕然而隨聖賢教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午為火火旺火為肺金之夫火旺則金衰六

月屬未為土火旺土為水之夫土旺則水衰况腎水管藉肺金為母以補助其不足古人於夏月必獨宿而淡味兢兢兢業業保養金水二臟正蠱火土之旺爾內經又曰冬不藏精者春必病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛伏閉藏以養其本然之真而為來春升動發生之本若於此時不恣欲以自戕至春升之際根本壯實氣不輕浮尚何病之可言哉於是翁之醫益聞四方以病來迎者遂輻輳於道翁感德起之其所治病凡幾病之狀何如施何良方飲何藥而愈自前至今驗者何人何縣里主名得諸見聞班可紙滿江鄭義士病濕下一夕忽昏仆目上視溲注而

馮公履之脈大無倫即告曰此陰虛陽暴絕也蓋得之病後酒且內然言能愈之急命治人參膏而且提炙其氣海頃之手動又頃而唇動及參膏成三飲之甦矣其後服參膏盡數斤病已天台周進士病惡寒雖暑亦必以綿蒙其首服附子數百增劇翁診之脈滑而數即告曰此熱甚而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升許而蒙首之綿咸半仍用防風通聖飲之愈周固喜甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殊不可拔彼不能然後告疽發背死浙省平章南征閩粵還病反胃醫以為可治翁診其脈告曰公之病不可言也即出

獨告其左右曰此病得之驚後而使內火本之耶相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化五臟皆無所禀去此十日死果如言鄭義士家一少年秋初病熱口渴而妄語兩額火赤醫作大熱治翁診之脈弱而遲告曰此作勞後病溫惟服補劑自己今六脉皆搏手必涼凜所致竟以附子湯發之應手而瘥浙東憲幕傅氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其脈告曰此病痰也然脈虛弦而沉數蓋得之當暑飲酸又大驚傳曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二升又重得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之里人陳時叔病脹腹如斗鑿用利藥轉加翁診之

潘氏曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後漫見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐堂中自如翁診其脉不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且鬼錄顧猶有驕氣耶後果如期死一老人病目無見使來求治翁診其脉微甚為製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一鑿在庭煉礬石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣太虛今不救其虛而反用礬石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通鑿治

以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉方以法大吐之吐已病如失一婦人病不知人稍蘇即號斗數四而復昏翁診之肝脉弦數而且滑曰此怒思所為蓋得之怒而強酒也詰之則不得於夫每遇夜引滿自酌解其懷翁治以流痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈一女子病不食面北卧者且半載鑿告術窮翁診之肝脉弦出左寸曰此思男子不得氣結於脾故耳叩之則許嫁夫入廣且五年又曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝

今第觸之使怒耳父以為不然翁入而掌其
面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進食翁復
潛謂其父曰思氣雖解然必得喜則庶不再結乃詐以夫
有書旦夕且歸後三月夫果歸而病不作一婦人產後有
物不上如衣裾鬢不能喻翁曰此子宮也氣血虛故墮子
而下即與黃芪當歸之劑而加升麻舉之仍用皮工之法
以五倍子作湯洗濯雖其皮少墮子宮上翁慰之曰三年
後可再生兒無憂也如之一貧婦寡居病癩翁見之惻然
乃曰是疾也號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味寡
面無欲庶幾可療也即自具藥療之病愈後復投四物湯

數百劑遂不發動翁之為醫皆此類也蓋其遇病施治不
膠於古方而所療皆中然於諸家方論則靡所不通他人
靳靳守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學者咸聲隨
影附翁教之豐豐忘疲一日門人趙良仁問太極之旨翁
以陰陽造化之精微與鑿道相出入者論之且曰吾於諸
生中未嘗論至於此今以吾子所問故偶及之是蓋以道
相告非徒以贅言也遺出語人曰翁之鑿其殆橐籥於此
乎羅成之自金陵來見自以為精仲景學翁曰仲景之書
收拾於殘篇斷簡之餘然其間或文有不備或意有未盡
或義之乖舛吾每觀之不能以無疑因

以示尚未悟又遇治一疾翁以陰虛
而用益陰補血之劑療之不三日而愈羅乃歎曰以某
之所見未免作傷寒治今翁治此猶以亨歸之性辛溫而
非陰虛者所宜服又况汗下之悞乎翁春秋既高乃詢張
翼等所請而著格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義
補遺外科精要新論諸書學者多誦習而取則焉翁簡潔
貞良剛嚴介特執心以正立身以誠而孝友之行實本平
天質奉時祀也訂其禮文而敬泣之事母夫人也時其節
宜以忠養之寧歎於己而必致豐於兄弟寧薄於己子而
必施厚於兄弟之子非其友不友非其道不道好論古今

得失慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁謂直
陳治道無所顧忌然但語及榮利事則拂衣而起與人交
一以三綱五紀為去就嘗曰天下有道則行有枝葉天下
無道則辭有枝葉夫行本也辭徒而生者也苟見枝葉之
辭去本而末是務輒怒溢顏面若將浼焉翁之卓卓如是
則鑿又特一事而已然翁講孝行事之大方已具吾友宋
太史灑所為翁墓誌茲故不錄而竊錄其鑿之可傳者為
列傳庶使後之君子得以為互考焉

昔公嚴君平博學無不通賣卜成都人有邪思非正

以為陳利害與人子言依於孝與人弟言

休 息 者 其 風 聲 氣 節 足 以 激 會 而
之 仁 道 寧 之 源 委 而 混 迹 於 鑿 或 以 鑿 來 見 者
以 保 精 毓 神 開 其 心 至 於 一 語 一 默 一 出 一 處 凡
有 關 於 倫 理 者 尤 諄 諄 訓 誨 使 人 奮 進 感 慨 激 厲 之 不 暇
左 丘 明 有 云 仁 人 之 言 其 利 博 哉 信 矣 若 翁 者 殆 古 所 謂
直 諒 多 聞 之 益 友 又 可 以 醫 師 少 之 哉

武陽中憲大夫吳國倫精校

丹溪心法附錄卷之二十四終