

研如糊和九桐子大每服三十九食後熱水下  
每日服病雖愈仍常服以消餘毒

神秘散 治瘰癧

班猫去頭足翅麵 二枚

黑丑微炒取末 各二錢

荆芥穗 直姜蚕炒去

右為細末每服一錢五更好酒調下日中當取  
下惡物如不下次日五更再進一服或更不下  
第三日五更先食秫米粥一碗次服此藥其毒  
決下如小便痛澁以葱茶解之或木通燈草煎

湯道之楊氏家藏方頭晚先將活石末一錢用

秘散看虛實或二三錢第三日仍以灯心湯調

琥珀末一錢如小便痛用青黛一錢甘草湯調

蝙蝠散 治瘰癧多年不瘥

蝙蝠筒一 猫頭筒一 右同燒作灰撒上黑豈其

骨灰化為細末濕即乾摻乾則油調敷之內服

五香連翹湯效

白谷蛇散 治九漏瘰癧發於項腋之間或痛或

不痛

白卷蛇酒浸去皮 生犀角二錢 牽牛半生半  
青皮五錢 右為末每服一錢入膩粉五分五更  
糯米飲調服已時下惡物乃瘰癧之根也更候  
十日再服一服忌發風熱毒物已成瘡者一日  
便見効

四聖散

瘰癧服白卷蛇散轉利後此藥調之永

去其根

海藻洗

石決明煨

羌活

瞿麥穗各等分

右為細末每服二錢米湯調下

清水盡為度

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至

缺盆中或至肩上或於脇下皆手足少陽經中  
及瘰癧遍於頰或至頰車堅而不潰在足陽明  
經中所出或二瘡已破乃流膿水並皆治之  
時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以意消息  
治之

昆布

桔梗各半兩

廣茂微炒

京三稜酒洗

連翹各三錢

升麻六分

黃連

白芍 葛根各三錢

歸尾

柴胡

甘草各五分

龍胆草酒洗炒



黃芩

酒洗一錢五分 生一錢五分 炒

右每服六錢先水浸半

日煎服于卧處伸足在高處頭微低每噙一

口作十次嚥至服畢依常安卧取藥在胸中停

留也 另配半料為細末煉蜜為丸荒苳大每

服一百丸或一百五十九丸就此藥送下

瞿麥飲子 治癩瘰馬力此方須久服乃効

瞿麥穗

斤半

連翹

斤一

每服一兩水煎食後服

海菜丸

治癩瘰生於頭項上交接名蛇盤瘰宜

當早治之

海藻菜

蒿麥 炒

白羌蚕

微炒去 系嘴

右等分為細末海藻菜旋炒研篩湯泡白蠶取

肉減半用所泡湯為丸如梧子大每服六七十

丸食後臨卧米飲送下其毒自大便泄出若与

淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦治此病

忌豆腐鷄羊酒麪日五六服

蜂房膏

治熱毒氣毒結成癩瘰

露蜂房

炙

蛇蛻

玄參

蛇床子

黃芪 各三錢

杏仁 二兩 半

亂髮

雞子 大

飛丹

黃蠟

各二兩

先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令

酒多用油半斤內杏仁亂髮煎髮消尽濾去渣  
再煎然後下丹蠟再熬成膏傾倒於磁盆中取  
貼瘡上一日一換

栝即散 治氣毒癰瘰心膈壅悶不下飲食

栝即 前胡 赤茯苓 牛蒡子炒各一兩 人參

只壳炒去白 沉香 防風錢各五 炙甘草錢二

每服五錢生姜一片水煎服

射干連翹湯 治癰瘰寒熱

射干 連翹 玄參 赤芍 木香 升麻

前胡 山梔仁 川芎 炙甘草各一兩 大黃炒二兩

每服五錢水煎服氣盛加芒硝少許服之

栝蒌子散 治癰瘰初腫疼痛寒熱四肢不寧

栝蒌子 連翹 何首烏 大力子炒微

大黃炒微 皂角子仁 白螺壳 梔子仁

牽牛炒微 甘草生各一兩

為細末食後溫酒下二錢

內消丸 瘡腫初生及癰瘰結核熱毒鬱滯服令

內消大効



青皮 陳皮 牽牛 取頭末 各二兩

薄荷葉 八兩

皂角 八兩 不蛀者 去粗皮 槌碎 水煮軟 搽汁 熬膏

右為末 以皂角

膏和為丸 荒島大 每服三十丸 食後荆芥湯下

皂角煎丸 治風毒瘰癧

皂角 不蛀者 三十條 內十條 泡黑 十條 酥灸 用十條 水煮軟 搽汁 用 何首烏

玄參 薄荷葉 各四兩 右為末 與前膏子同煉

蜜為丸 碗豆大 每服三四十九丸 食後白湯下

批胡通經湯 治小兒項側有瘡 堅而不潰 名曰

馬力

柴胡 歸尾 生甘草 連翹 黃芩

牛旁子 京三稜 桔梗 各一錢半 黃連 一錢

紅朮 少許 水二盞 煎服 此方亦治瘰癧 乃是攻

裡內消之劑

消腫瘡 治馬刀瘡 黃耆 括萎根 各一錢半

連翹 三錢 歸尾 紅朮 少許 甘草 各一錢

右分作二帖 水煎服

十香膏 治五發惡瘡 結核瘰癧 疥癩 疽痔

沉香 射香 各一錢 木香 丁香 乳香



甘松 霍香 零陵香 安息香 白芷 各五錢 為細末  
 川芎 川芎 黃耆 大通 芍藥 細辛  
 升麻 白歛 獨活 川椒 藁本 菖蒲  
 木別子 厚朴 商陸根 官桂 栢子仁  
 菴仁 松子仁 杏仁 各五錢 槐枝 桑枝  
 柳枝 各二 沒藥 輕粉 雄黃 硃砂  
 雲母石 犀角 血餘灰 枯礬 各二兩 另研末  
 真酥油 羊腎脂 猪脂 各二兩 飛丹 一斤  
 麻油 斤三 右如常法煎成膏藥以緋帛攤貼

如腸胃癰疽可作九子如梧子大每服七九空  
 心溫酒吞

救苦勝靈丹 治馬力挾瘦從耳下或耳後下頭

至肩或入缺盆中者乃手足少陽經之分野  
 其癰瘰在於頰下或至頰車乃足陽明經之分  
 野受心脾之邪而作也今將二証合治之

黃耆 一錢 護皮毛 實腠理 活血氣 真漏芦 五分

人參 三分 補肺氣 如氣短 升麻 一錢 歸身 三分

葛根 五分 此三味俱 甘草 五分 能調中和

示人五味 三十五卷 十六



連翹 無一錢此散血味乃十二經瘡中之藥不可  
 牡丹皮 中血生血也 滯宿血 生地 熟地 各三分  
 寒用証 肉桂 能散結聚如陰瘡用之此寒  
 勿用 柴胡 功同連翹如瘡不  
 煩燥者 勿去之 用無 昆布 二分 味鹹若堅硬  
 黍粘子 腫三分 用無 廣茂 三分 此硬者  
 京三稜 分炮 二 用無 廣茂 三分 此硬者  
 獨活 防風 各一錢 此二味 勻羌活 必開手足  
 辛溫如瘡在膈上雖無邪助黃芪立功也 黃連  
 用之為能散結去上焦風邪助黃芪立功也 黃連

炒三分 神曲 炒二分 食之不  
 益智仁 吐食胃中寒者 加之 無則勿用 厚朴  
 姜炒一錢二分 黃栢 炒三分 如煩燥欲去  
 如腹脹加之中伏 右為細末湯浸蒸餅捏作餅  
 衣者此更宜加用 子晒乾搗如米粒大每服三錢白湯下如氣不  
 大也 順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實消息  
 之毋令藥多妨其飲食此治之大法也如止在  
 陽明分者去柴胡黍粘子餘皆用之如在少陽  
 分為馬刀挾瘦獨活漏芦升麻葛根加瞿麥三

示人 三上 卷



分如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促不可因其平素宜作氣盛治之乃從病變治之權也加黃芩黃連黃柏知母防已視邪氣上中下擇而用之假令在上焦止用黃芩半酒洗在中焦加黃連如在下焦加酒製黃柏防已之類如太便不通滋其邪盛者加酒製大黃利之如太便燥者加棗仁泥大黃如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之如風澁而太便不行者加煨皂角仁大黃秦朮利之如脈澁

覺身亦氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥如陰寒症為寒結秘而太便不通以局方半硫丸或加炮附子乾姜煎冰冷服之太抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯弱者當去苦寒之劑多加人參黃耆甘草之類以瀉火而補元氣餘皆倣此

玉燭散 和血通經能使癰瘰自消及治室女經不行頸多結核

川歸 芍藥 大黃 甘草 熟地 芒硝



黃芩 川芎 各等分每服五錢姜三片水煎服日進一服七八日効

治瘰癧未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉 陰乾為末五分 人中白 煨為末二分半 蝙蝠 焙乾為末

二分 白花蛇蛻 煨存性二分半 蜜蜂 七枚焙為末

右將杏樹葉末用清水調再入四味末藥和勻敷患處却將皮帛一張以針刺孔貼藥上如乾用清Wat就帛上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數帖自退

敗毒瘰癧方神効

白膠香 海螵蛸 降真香 用中心無土乾者 右等

分為末搽患處外以濕帛揜之夕而退

已破者 蜜蜂 二枚 蛇退 七分 蜈蚣 二條端者

右用麻油四兩將前藥入油內以文武火熬成

入光粉二兩用棗枝七條如筋大者急攪候冷

出火氣七日方可用帛攤貼

已上二方乃鄭義門累驗者不須服藥貼此五

七日便消

海藏方 治頤後側少陽絛中疔瘡不辨肉色不

問大小及月日久遠或有赤硬腫痛

生山藥去皮 革麻子一枚右研勻攤貼之如神

丹溪云山藥生者能消腫硬極佳極佳

清涼餅子 生山慈姑 良姜 等分搗為餅

乏能散去寒熱 或以生慈姑磨調酒服大妙

此藥大能散瘰如神

本事方 治瘰癧鼠瘻

螭蛸皮瓦上炒研為末加輕粉乾敷

治頸上核塊動者 夏枯草末六錢 甘草末一錢

右和勻每服一錢至二錢茶清調下

肘後方 治頤下瘰癧如梅李大宜速消之

海藻片一升 酒升一浸數日稍飲之

文武膏 治瘰癧

柴樵黑熟者二斗以布袋絞取汁瓦器中熬成

膏白湯化下一匙一日三服紅者晒乾為末白

湯調服

結核 獨形而小核者



劉守真云結核者火氣熱甚則鬱結堅硬如菓中核也不須潰發但熱氣散則自消

丹溪云結核或在頸項在臂在身如腫毒者乃痰注於皮裡膜外之間結聚而不散也問其平日好食何物吐下後用藥散之

結核在頸項方 直羌蚕炒 大黃酒浸 青黛

膽星各等分 右為末蜜丸噉

結核在下頰 二陳湯加連翹防風川芎酒苓菴朮皂角刺羌蚕射香行太陰厥陰之積痰使結

核自消甚捷

濟世方 治頰下結核不消經驗方

大蜘蛛不拘幾枚以好酒浸之研爛同浸酌酒去渣臨卧温熱服之

海藏 生山藥草麻子方佳方在癰門

○瘦氣 氣結於項久留不去而項為脹大

丹溪曰瘦氣先須斷厚味 海藻洗一兩 黃連二兩

右為末以少許置掌上時時舌舐之津咽下如

消三之二須止後服

又方 黃栢二兩 海藻一兩 不用黃連亦佳

治癭氣結核磊腫硬 昆布一兩 洗去鹹為末

每用一錢綿裹於好醋中浸過食之咽津藥味盡再噙之

肘後方 治頸下卒結囊欲成癭 海藻一斤 洗過

酒浸飲之

破結散 治五癭極佳 麥麩四分 松蘿 半夏

貝母 海藻洗 龍胆草 海蛤 通草

昆布 枯礬各三分 右為末酒服一錢日三服

鯽魚猪肉五辛生菜毒物二十日愈

玉壺散 治三種癭 海藻洗 海帶洗 昆布

雷丸各一兩 青鹽 廣茂各五錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

人參化癭丹 海帶洗 海藻洗 海蛤 昆布

四味皆焙 澤瀉炒 連翹各一兩 猪鬃 羊鬃各十枚

右為末蜜丸芡實大臨睡噙化一二丸忌油膩

寶金散 治癭氣無不瘥

猪羊鬃十對 煖水洗去脂膜後晒乾為細末 海藻洗 海帶各三兩



丁香 木香 琥珀 射香 珍珠

右先將各味為細末配和勻再重羅過每服一

錢熱酒一盞調服夜睡時須垂頭而睡若童

男女十服効大人一日見効有孕者忌之

海帶丸 治瘰癧久不消 海藻 貝母 陳皮

青皮 分各等 右為末煉蜜丸彈子大食後噙化

一丸大効 治瘰癧氣神効方 海藻 海帶 昆布 蒲黃

猪鬃子 焙乾 右為末每服二錢半臨睡以酒

調服且不用枕頭三日

無擇曰瘰癧多着於肩項瘰癧則隨氣凝結此等皆年

數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘰癧皮

色不變者名曰肉瘰癧筋脉露結者名曰筋瘰癧赤

脉交結者名曰血瘰癧隨憂愁消長者名曰氣瘰癧

五瘰皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致

○瘰癧

瘰癧有六骨瘰癧脂瘰癧肉瘰癧膿瘰癧血瘰癧粉瘰癧膿瘰癧即膠

瘰癧也惟粉瘰癧與膿瘰癧可決餘皆不可決潰肉瘰癧



尤不可治治則殺人

點瘰癧方神驗

素炭灰

東木灰

黃荊灰

桐殼灰

各二升半

蕎麥灰

炒

右以沸湯淋汁五

碗許澄清入班猫四十箇川山甲五片乳香冰

片不拘多少後入煎作二碗以磁器盛之臨用

時入新石灰調成膏敷瘰癧上乾則以清水潤之

其効若神

丹溪治丹瘤

草麻子去殼研入麵一匙水調搽

之甚妙

消瘤方

用向陽槐枝於菜油燈盞火上以槐枝

薰熱浸油熨瘰癧上如法熨數次其瘤自消

○腸瘰癧門

○附胃脘瘰

夫腸瘰者乃陰陽偏勝喜怒無時伏於臟腑之中  
結在腸胃之內血凝氣滯回旋失度不能通行  
聚結成瘰致生腫痛孫真人云卒得腸瘰而不  
曉其病候錯則殺人其病初起覺腹中微痛小  
腹腫而強抑之則痛小便澁似淋時汗出復  
惡寒其身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀按之濡



或發熱無汗灑淅惡寒皆其候也其脉洪數者為有膿也可下脉遲緊者未有膿不可下也甚者腹脹轉側有水聲或透脐生瘡汁從脐出或大便下膿血或一足不能舉凡此皆為惡候胃腕瘡者經曰胃脉沉細沉細者氣逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃腕為瘡也治法亦與腸瘡頗同初以疎利之藥導其滯次以排膿消毒托裡之藥調之此其大法也

脉經問曰羽林婦何以知腸有膿師曰脉滑而數

滑則為實數則為熱滑則為滯數則為衛數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澀或自汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊則為瘀血血下即安

薏苡附子敗醬散 治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚身熱脉數者 附子炮二 敗醬分五 薏苡錢一 右為末每服一錢水煎頓服小便當下而愈

三因方 苡仁 附子同前 敗醬錢一兩二分



每用四錢水一盞半煎七分去渣空心服

千金大黃牡丹湯 治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱

出脉遲堅者未成膿可下之當有血脈數則膿

已成不復可下 大黃兩四 牡丹皮兩三 芒硝

二兩 冬瓜仁升一 菴仁五枚 右水五升煮下

升頓服當下膿血

無擇意以湯 腸癰腹中痛煩燥不安或脹滿不

食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但

疑是者便可與或有差亦無妨 冬瓜子兩四

薏苡兩五 牡丹皮 菴仁各三兩 如無冬瓜仁

以瓜蒌仁代之每服五錢水煎服 姚氏去菴

仁用杏仁 雀氏加芒硝二兩

醫案曰女子腹痛百方不治脉滑數時作熱腹微

急孫尚診曰腹痛脉當沉細今脉滑數此腸癰

也以雲母膏一兩作丸如梧桐子大用牛皮膠

溶化温酒調膠水吞九子下餉時服尽下膿血

一盞而安



晉一婦人腸中痛不可忍大便從小便中出楊吉  
老之壻李生診之曰夫乳脉見於寸部者乃積  
血在胸今乳見於關乃腸生瘰也乃出雲母膏  
作百十九煎黃耆湯吞下利膿血數升而安  
右腸瘰五方丹溪所集也前三方置於篇首者  
蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠黃耆煎湯吞  
藥者乃潰瘍補例也

四聖散一名神効 括萎散 治腸瘰之疽五發乳瘰便毒  
服之神應 大生瓜萎一枚 去皮 粉草研末 四錢

乳香研末 一錢 沒藥研末 三錢 右用好酒二大盃浸  
火煎至一盃分作二次兩日服盡大便順導惡  
物妙若乾瓜萎則用兩枚若疾甚者再服以  
退為度此方極佳 盃音碗

牡丹皮散 腸瘰冷症腹濡而痛時之利膿

丹皮 人參 天麻 白朮 黃耆 木香

川芎 菴仁去皮 川芎 官桂各三分 白芷

苡仁 甘草 右用水煎溫服

梅仁湯 腸瘰裡急隱痛大便閉澀

蟾同蠟

梅核仁四十九枚

去皮尖

大黃三兩

牡丹皮一兩七分

冬瓜仁四兩

芒硝二兩

犀角一兩半

每服七

錢水煎服下利膿血三兩行為度

神仙蟾礬丸

治腸癰神妙此藥不拘老幼皆可

服之無不取效最止疼痛不動臟腑乃內托之

藥也方見癰疽門

丹溪曰腸癰大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯

加連翹秦光近肛門破入風者難治用防風類

河間射干湯治胃脘癰人迎脉逆而盛嗽膿血

營衛不流熱聚胃口成癰

梔子仁

赤茯苓

射干去毛

升麻各一兩

赤芍一兩

白木五錢

每服五錢水煎將熟入生地黄汁一合蜜半合

再煎温服不拘時

復元通氣散治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無

頭止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三寸半

川山甲炒

瓜蒞根各二兩

金銀花一兩

連翹一兩

右為末熱酒調下



痔漏門

痔者肛門內外有癰脹疼者是也東垣謂濕熱風燥四氣相合而致也痔有五種謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔翻花痔鼠妳蟻結等痔之名不一究其所因亦不過久嗜辛熱炙博新酒及房勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門之外若蘊毒深者其狀大蘊毒淺者其狀小大者如蓮花鷄冠核莖之狀小者如牛妳鷄心櫻

莖之類久而不愈有妨行坐或出鮮血或流膿水則成漏矣治法在外者宜點之洗之在內者宜祛其風而除其濕消其熱而解其毒斯得治之法矣

東垣秦朮蒼朮湯 治痔疾若破謂之痔漏大便秘澁必作大病此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也變病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也



作大病者風也若大便燥結者主病兼受火邪  
 也熱結不通去燥屎者其西方肺主諸氣其體  
 收下亦助疾病為邪須當破氣兼蕪之治法全  
 矣服之其疾立愈不可作丸以剉湯與之効如  
 神 秦朮一錢 澤瀉三分 蒼朮製七分 防風根  
五分 菀仁去皮一錢 當歸根三分 酒洗第黃栢  
五分 洗大黃 少許雜大便 秘枳 即調服之 皂角  
仁 燒存性去皮一錢 右除枳即菀仁皂角仁  
 三味候煎成藥研勻調入外餘咬咀作一服水

三盞煎至一盞二分去渣入前三味丹上火煎  
 至一盞空心熱服待少時以美饌壓之不犯胃  
 氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜  
 之類犯之則藥無効如有白膿加五朶白葵花  
 須除蕪去心細剪入青皮五分不去白入上藥  
 同煎又用木香三分為細末同枳即等三味丹  
 上藥同煎依上法服餌古人以此疾多以歲月  
 除之此藥一服立愈若病久者再服必愈  
 秦朮白朮丸





秦艽去芦 歸稍酒洗 菘仁酒浸去皮尖 地榆錢三 澤瀉

皂角仁皮燒存性去 枳實炒 白木各半

右為細末和菘仁泥研勻煎熱沸湯麩糊丸鷄

豆大焙乾白湯下空心宿食消盡服之少時以

羹膳歷忌生冷硬物冷水菜并濕麩酒及五辣

辛熱大料物之類犯之則藥無驗十服必愈

蒼朮澤瀉丸

蒼朮四兩去皮 澤瀉 枳實 秦艽各二兩 地榆

皂角子燒存性 右為細末燒餅為丸如桐子

大每服三十九米飲湯或酒下

一婦人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或

紫血大便疼與黑神散又多食肉太飽此濕熱

在大腸 郁李仁去皮 麻仁 槐角各七錢 枳實

皂角仁五錢為末 蒼朮 歸尾 生地各三錢 大黃

炒一 右分六帖內三仁另研煎服

又方 治痔用鷄冠花不拘多少濃煎湯每服一

盞空心服 本草云鷄冠花性涼治瀉血

丹溪治番花痔頭向上是大腸熱甚收縮為主用

四物解毒加枳殼白朮槐角秦艽

治番花痔 荆芥 防風 朴硝 右煎藥湯洗之  
次用木鱉子鬱金研末龍腦些少水調塗上  
痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛病並  
用銀瀾篋蘸藥塗傳日一次重者五七次立愈  
先用藥水洗拭乾却傳此膏用真葉灰不拘多  
少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片  
各二錢再漫火熬至半碗入甘草一錢數沸下  
淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用絹丁

重花紙二重如絞漆狀瀝過再熬成膏候冷用  
真胆礬五分研極細末放入膏中用瓦器盛貯  
封之臨用入龍腦末和勻傳之

治腸痔 鱉甲丸 鱉甲 蝟皮 川山甲

白礬 附子 猪牙皂角 各半兩炙焦 存性二分

右細末研勻蒸餅丸如桐子大米飲下二十九  
食前日三服

又方 槐花 炒 白礬 各一兩 附子 五錢 右細末  
研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米飲下食



前日三服

丹溪治二十三年不愈者三服止用蓮花蕊散

蓮花蕊

黑牽牛頭末

各一兩半

當歸

半兩

礬紅

少許

右為末先忌食肉五七日空心食肉一頓就

取溫酒下三錢約兩時辰取下膿血或虫是効

海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊胆取瘥神効諸

方不及此

七聖丸 治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生

於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦濕

莫漫多方立紀綱

羌活

一兩

檳榔

木香

川芎

桂枝

去皮各半兩

大黃

八錢

郁李仁

去皮另研一兩

右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗

虛實臨時斟酌九數白湯下取大便微利一服

而愈切禁不得多利大便若大便大行其病甚

治鼠痔結核作渴疼痛方

皂角

川山甲

黃耆

荊芥

槐子

木香

蝟皮

鱉甲

醋炒

桔梗

露蜂房

焦炒



芍藥各一兩 大黃錢五

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九溫酒下食前日三服未止加至四五十丸

治痔疾下血疼痛不止以玩月沙不拘多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳香五分空心溫酒調下日三四服瘥

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂疙瘡不任其痒

升麻根 柴胡 甘草 麻黃根 秦艽錢各一 防風根分七 藁本分三 細辛炒

紅花少 羌活根一分錢 水煎服


治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煎汁安盆中坐薰之塞其穀道湯冷更煖之良久欲大便當虫出不過三度即愈如用末綿裹納下部

淋瀝藥 治下部痔腫大腸頭痒痛

葳靈仙 枳殼麩炒各一兩 右為粗末熬水薰洗

冷即再煖臨卧避風洗三次挹乾貼蒲黃散

丹溪治腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根





瞿麥斤半 猪牙皂角寸一

右為末入猪腰子一隻內用米泔煮空心食之少頃肚痛上攻虫皆隨出作地坑埋之薄粥補之

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下

垂多血苦痛不能忍 皂角仁另研細末調服 郁李仁

秦艽錢各一 麻子仁一錢半 當歸稍 生地黃

蒼朮分各五 澤瀉分三 枳實分七 大黃三錢煨

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻豆大水三大盞煎一盞去渣入皂角末調在內空心食前候

宿食消尽服之忌風寒處大小便如欲涼大腸

寬大腸則用枳殼去穢入巴豆鉄線纏煮透去

巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

治腸痔 每大便下血槐樹上木耳取末之飲服

方寸瘥日三服良

治腸痔多年不瘥下血不止木賊枳壳各二兩乾

姜一兩大黃一分四味並剉一處入銚子內炒

黑色存性三分搗羅温粟米湯調食前服二錢

七甚妙



治痔漏瘡方

鷄子

一個煮熟去黃取白切炒

明礬

如皂角子大匙

上枯過用三分

右為末用溫湯洗淨拭乾用紙撚點藥送入瘡孔內立効日三易

又方

川山甲

一兩燒存性

肉苳蔻仁

三筒同為末

米飲調二錢服治氣痔膿血甚者刺蝟皮一兩

燒服中病即已不必盡劑

治痔神應散

治五種腸風下血上廁糞前有血

名外痔糞後有血名內痔木腸不收名脫肛穀道四面有努肉名妳痔頭上有孔漏出名腸風

並治之

黃牛角

一枚酌中者槌碎

蛇蛻皮

白者

猪牙皂角

七莖

川山甲

七片

刺蝟皮

剉一兩

右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用小火燒令烟出後用天火煨令通赤為度取出攤開候冷搗羅為末服時先令患者臨卧時細嚼胡桃仁一個如糊用無灰好酒一盞送下不可言語便睡至五更時以溫酒調下藥末三錢至辰時更進一服雖年久不過三服立効

丹溪治腸風痔漏如神大樹木上寄生葉取乾為



禾酒水米飲任下或九桐子大服二十九亦可  
千金方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾  
為末水服方寸七或九桐子大服之立効  
洗痔疼 用荊芥朴硝素寄生定痛解毒去風涼  
大腸熱安胎如腫者加倍子木鱉子研極細調  
服而愈

又方 五倍子朴硝素寄生蓮房水煎洗一方  
加百藥煎洗

洗痔方 輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯薰

待溫却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一  
半同煎

丹溪治痔瘡用灰莧帶根煎濃湯先薰後洗

又方 取河水頻洗用蝸牛塗之

一方治痔 用雄雞胆片腦和勻貼之

一方 熊胆塗之神効

蒲黃散 治下部痔漏 蒲黃 血竭半兩

右為細末每用少許貼於患處

薰痔法 蝟皮切方三指大 雄黃東大研 熟艾大鷄子

右為采用瓦器以灰實一半如燒香法安長桶  
內坐其上薰之烟氣從口出為佳凡三度薰永  
瘡勿犯風冷忌鷄肉毒物

丹溪治痔瘡 大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭  
垢餅於痔頭上外安蒜片以灸灸之

本事方 治一判官乘驟入駱谷有痔疾因此大  
作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如瀉灰火至驛僵  
仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳枝  
濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五炷忽

覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出  
至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去

無擇云腸癖如痔如大澤中有小山突出為痔人  
於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門  
邊生有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出  
五種曰牡曰牝曰脉曰勝曰氣牝痔者肛邊生  
瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛邊發  
露肉珠狀如鼠妳時時滴瀝膿血脉痔者腸口  
顆發癩且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結



積有血寒熱往來登瀾脫肛氣痛者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又方有酒痔每遇飲酒發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清血隨下而不止宜解熱調血順氣為主若久不愈必至穿穴為漏矣

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物及乾姜之類犯之無効此東垣格言也  
秦艽防風湯 治痔漏每大便時疼痛

秦艽 防風 歸身 白朮 甘草

澤瀉分六 黃栢分五 大黃煨 陳皮各三 柴胡

升麻各三 桃仁卅箇去尖另研 紅花少許

右水煎空心熱服

烏金散 治痔漏

川山甲 蝟皮燒存性 黃牛角腮剉碎 牙皂角

槐子 皂莢刺 枳壳 貫衆 阿膠各等分

川山甲炒 黑右為細末每服錢半用胡桃肉爛研

併調酒食前服大腸熱荊芥湯下漏血不止川婦湯下

蝟皮丸 治諸痔出血裡急後重

川芎 白芍 枳壳各五錢 槐花炒三錢

艾葉炒 地榆 黃耆 白礬枯 貫衆各半兩

蝟皮一兩 灸焦 大皂角一條 灸 猪後蹄垂甲十箇 灸焦

蜂房炒焦五分 川山甲炒焦五分 皂角刺畧燒二分

一方有蟬退洗淨畧燒二錢 右為末醋糊丸

如桐子大每服七十九

逐瘀湯 治熱痔通利大小便取下黑物

川芎 赤芍 生地 白芷 五靈脂 枳殼

阿膠 蓬朮炮 茯苓 茯神 木通

生甘草各一分 大黃生 薤仁去皮各一分半

每服三錢姜三片蜜三匙煎服以利為度汚血作疼通用

釣腸丸 治久新諸痔肝邊腫疼或痒挾虛寒而

作者上 括萎二箇 燒存性 蝟皮剉碎確內燒存性二箇

白礬 綠礬枯 胡桃仁十五箇 燒存性 白附子生

半夏 南星 鷄冠花五兩 燒 枳殼 附子去皮

訶子去核各二兩 右為末醋麩糊丸梧子大每服



二十九空心臨卧温酒下

槐角丸 治諸痔出血及痔頭上有孔名瘻

槐角炒一兩 地榆兩八 川芎兩八 黃芩兩八

防風兩八 枳殼兩八 右為末酒糊丸如梧子大

每服五十九丸米飲下

乾葛湯 治酒痔

白乾葛 枳殼 半夏 茯苓 生地各半兩

黃芩 甘草各一分 杏仁五錢 每服三錢黑豆

百粒姜五片白梅一個水煎服

橘皮湯 治氣痔

陳皮 枳殼 川芎 槐花炒各半兩 枳郎

木香 菝仁 紫蘇莖葉 香附 甘草各錢半

每服三錢姜東煎服

黑玉丹 治腸風及痔漏頭疼不可忍用此去虫

拔根三五服見效 蝟皮劉八兩 猪懸蹄百隻

牛角腮兩八 槐角兩二 雷丸 脂麻各兩二

乱髮皂角煎湯洗焙 敗棕劉各兩二 苦練根劉兩半

右用磁罐內燒存性研細末入乳香一兩射香



四錢研合和勻酒糊丸如桐子大每服五十九先細嚼胡桃一枚以溫酒吞下日二服甚者日三服空心及食前服

又方 治同上

人參 黃耆 生地 川芎 川芎 条芩

升麻 枳殼 槐角各等分 右為細末麵糊丸

如桐子大每服三十九空心米湯下

敷藥蝸牛膏 蝸牛一枚 腦子 射香各少許

之用磁合盛次早取汁附之

一方 熊胆一錢 射香一分 片腦五厘 共為細末

點甲中大螺數枚碗盛候汁出取以點之

一方 寒水石 朴硝 共為末以津調手指點

藥附痔上

一方 蝟皮燒灰生酒油和附 治腸痔下部者

如虫蝕炙末用

一方 治諸痔用川山中甲自尾根盡處數除三鱗不用取第四五大鱗橫三行燒存性為末入射香少許臘茶一匙同調空心服以澄下濃者附



瘡上其冷如冰冷永不痛大效

肘後方 治漏 蜂房一枚炙黃赤色為末每用

一錢臍猪脂調附瘡上

一方 用兔系子炒黃黑色為末用少許和鷄子

黃調附亦治谷道中赤腫

一用木鬘子槌去油煎湯洗一用槐柳枝煎湯洗

又方 飲酒多之人 生痔三黃丸以生地黄汁為

瓦空心淡酒吞下三五十九立效

二八通玄丹 梅東先生方

宣連

八兩用茱萸四兩炒去茱萸

川歸

兩

烏梅肉

槐角

枳殼

各二兩

右為末以雄猪肚一箇洗

淨入藥在內外以韭菜四五斤包其肚用水醋

共數碗煮肚熟為度去韭菜并肚以藥爛搗丸

如桐子大每服空心白湯下五七十九

虫痔 用鰻魚乾燒爛薰之虫尽死而愈

治穀道邊生瘡久不愈者 用鷄內金燒灰存性

研細末乾貼患處如神

皂角煎丸

治內痔漏腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角

二挺去弦  
枳醋炙

白礬

煨  
刺蝟皮  
炙

薏苡仁

白芷  
各一  
西

菝葜

去皮  
炒

甜葶藶

炒

川芎

桔梗

各半  
西

猪後蹄

垂甲  
十枚  
存性  
燒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心用棗白皮煎湯送下

拔毒散 敷痔腫毒處

大黃

黃蘗

白芨

石羔

黃芩

黃連

白歛

梔子

朴硝

各等  
分

右為末用井花水調塗

○湯火門

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物塌之及井底泥傳之使熱氣不出爛入肌肉

火燒以好酒洗之再以塩傳其上如皮塌者以酒熬牛皮膠傳之

熱酒傷用糯米粉炒黑末酒調傳之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和傳之如成瘡用白蜜封之以竹中取膜貼上日三



治湯火瘡麩皮炒黑灰為末傳上神妙此方有補性始終皆可用

治湯火瘡取舊亭銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生薑調於帛上貼之痛止

一方用溶銀鍋子細末油調傳上佳保生救苦散 治火燒熱油損或至皮肉脫及一切狗咬損傷并刀斧傷用生寒水石不拘多少

為極細末調塗之或乾上然不如油調塗其痛立止並不作膿無分毫厘苦楚日近完復永無

破傷風症

冰霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石生 牡礪燒 朴硝 青黛 輕粉各等分

右為細末新水或小油調塗立止

治火燒 桐油 水銀各等分 右二件以柳條不

往手攪成膏丹入大黃石羔二末和以牛皮膠入少水溶開外用猫兒腓底毛細剪搽上貼之以青黛傳之妙

治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水



此少待爛成水傳上神妙

熱油燒外痛以蜜傳之立安 梅師方

治湯火瘡至妙 用劉寄奴為末先以粳米漿鷄

翎掃傷處後以藥末搽上不痛且無痕大凡湯

傷先用鹽末搽之護肉不壞然後傳藥

又方以榆白皮末猪脂油塗瘡愈

○顛撲損傷門

按發明經云夫從高墜下惡血留於內不分十二  
經絡聖人俱作風中肝經留於脇下以中風療

之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何  
之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有  
自汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬於肝木况  
敗血凝澁從其所屬入於肝也從高墜下逆其  
所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之  
內經云肝脈搏堅而長色不青當病墮若搏因血  
在脇下令人嘔逆金匱云寸口脈浮微而澁然  
當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧  
所傷亡血故也



○金瘡出血脉沉小者生浮大者死

○砍瘡出血一二石者脉大二十日死

○砍刺出血不止者其脉止脉来大者七日死滑細者生

○從高顛仆內有血腹脹滿脉弦者生小弱者死

○劉宗厚云按破傷有瘀血在內脉堅強實則生虛

小弱者死若亡血過多脉虛細小者生浮大數實者死皆為脉病不相應也

○子和云諸落馬墜井打撲傷損閃肭損折杖瘡腫

發焮痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜以通經散導水丸等藥或加湯劑瀉之後服和血消腫散毒之藥

○劉宗厚曰按子和於墮車落馬杖瘡閃肭者俱用峻下其有心恙牙關緊急者云是驚涎堵塞於上俱用三聖散先吐後下其法雖峻然果有驚涎瘀血停留於內焮痛腫脹發於外者亦奏捷功但於出血過多老弱之人脉虛大者亦當慎又曰謹按撲金刃損傷是不因動氣而病生於外



外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一症專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之症蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊惟宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不效也頃見圖

城中軍士被傷不問頭面手足胸背輕重治者例以<sup>三</sup>大黃<sup>三</sup>葶<sup>三</sup>藥利之後<sup>三</sup>大黃<sup>三</sup>缺<sup>三</sup>少<sup>三</sup>甚<sup>三</sup>者<sup>三</sup>遂<sup>三</sup>以<sup>三</sup>巴<sup>三</sup>豆<sup>三</sup>代<sup>三</sup>之<sup>三</sup>以<sup>三</sup>為<sup>三</sup>不<sup>三</sup>於<sup>三</sup>初<sup>三</sup>時<sup>三</sup>瀉<sup>三</sup>去<sup>三</sup>毒<sup>三</sup>氣<sup>三</sup>後<sup>三</sup>則<sup>三</sup>多<sup>三</sup>致<sup>三</sup>危<sup>三</sup>殆<sup>三</sup>至<sup>三</sup>於<sup>三</sup>略<sup>三</sup>人<sup>三</sup>手<sup>三</sup>指<sup>三</sup>亦<sup>三</sup>悉<sup>三</sup>以<sup>三</sup>藥<sup>三</sup>利<sup>三</sup>之<sup>三</sup>殊<sup>三</sup>不<sup>三</sup>知<sup>三</sup>大<sup>三</sup>黃<sup>三</sup>之<sup>三</sup>藥<sup>三</sup>惟<sup>三</sup>與<sup>三</sup>有<sup>三</sup>瘀<sup>三</sup>血<sup>三</sup>者<sup>三</sup>相<sup>三</sup>宜<sup>三</sup>其<sup>三</sup>有<sup>三</sup>亡<sup>三</sup>血<sup>三</sup>過<sup>三</sup>多<sup>三</sup>元<sup>三</sup>氣<sup>三</sup>胃<sup>三</sup>氣<sup>三</sup>虛<sup>三</sup>弱<sup>三</sup>之<sup>三</sup>人<sup>三</sup>不<sup>三</sup>可<sup>三</sup>服<sup>三</sup>也<sup>三</sup>其<sup>三</sup>巴<sup>三</sup>豆<sup>三</sup>大<sup>三</sup>熱<sup>三</sup>有<sup>三</sup>毒<sup>三</sup>止<sup>三</sup>能<sup>三</sup>破<sup>三</sup>堅<sup>三</sup>逐<sup>三</sup>積<sup>三</sup>用<sup>三</sup>於<sup>三</sup>此<sup>三</sup>疾<sup>三</sup>尤<sup>三</sup>非<sup>三</sup>切<sup>三</sup>當<sup>三</sup>所<sup>三</sup>以<sup>三</sup>有<sup>三</sup>服<sup>三</sup>下<sup>三</sup>藥<sup>三</sup>過<sup>三</sup>後<sup>三</sup>其<sup>三</sup>脉<sup>三</sup>愈<sup>三</sup>見<sup>三</sup>堅<sup>三</sup>大<sup>三</sup>治<sup>三</sup>者<sup>三</sup>不<sup>三</sup>察<sup>三</sup>又<sup>三</sup>以<sup>三</sup>為<sup>三</sup>瘀<sup>三</sup>血<sup>三</sup>未<sup>三</sup>盡<sup>三</sup>而<sup>三</sup>復<sup>三</sup>下<sup>三</sup>之<sup>三</sup>因<sup>三</sup>而<sup>三</sup>夭<sup>三</sup>折<sup>三</sup>人<sup>三</sup>命<sup>三</sup>可<sup>三</sup>不<sup>三</sup>慎<sup>三</sup>歟



凡損傷切不可食冷水血見寒則凝但一系血入

心即死攻下瘀血之劑治之

金櫃治馬墜及一切筋骨損方

大黃酒一兩 緋帛如手大 亂髮如鷄子大

煨單布一尺 敗蒲一把 桃仁四十九粒

甘草炙如中 七味以童便煎成入酒一大盞

次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎

湯浴衣被覆斯須通利痛楚立瘥

復元活血湯 從高墜下惡血留於脇下疼痛實

不可忍 柴胡錢五 當歸錢六 甘草 川山甲

炮各二錢 大黃酒一兩 莢仁五十枚 紅花

瓜蒌根各二錢 右件桃仁研爛剉如豆大每服

一兩水二中半酒半中煎至七分食前服以利

為度得利後痛或不尽服乳香神應散

靈樞云墜墮惡血留於脇下則傷肝膽之經行

於脇下屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以

當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能

生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萎根桃

仁紅花破血潤血為之佐太黃酒製以蕩滌敗血為之使下

當歸真滯散 治損傷瘀血大便不通紅腫暗青疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩 當歸三錢 射香少許 右二味為細末

入射香和勻每服三錢熱酒調下其瘀血自下若骨節傷折疼痛以定痛接骨紫金丹治之

定痛乳香神應散 東垣方 治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛 乳香 沒藥 雄黑豆

素白皮 獨科栗子各一兩 破故布炒二兩

當歸一兩 水蛭半兩 右為末每服五錢醋一盞

沙石器內煎至六分入射香少許溫服

定痛接骨紫金丹

麝香 沒藥 紅娘子各一錢半 烏藥二錢半

地龍去土二錢半 川烏 草烏炮各一兩 五靈脂半兩

木鱉子去壳半兩 茴香二錢半 黑丑五分 骨碎補

威靈仙 金毛狗脊 防風 自然銅醋淬七次

各五錢 禹餘糧四錢 陳皮 青皮各二錢五分



右為細末醋糊丸桐子大每服十九至二十九  
温酒送下

○三因鷄鳴散

從高墜下及木石所壓凡足損傷  
瘀血凝滯疼痛欲死兼以此藥推陳致新神効  
此方治血滯於肺部氣分也 大黃酒浸一兩  
杏仁三十粒去皮尖 右研細酒一碗煎至六分去滓  
鷄鳴時服至晚取下瘀血即愈若便覺氣絕取  
藥不及急劈開口以熱小便灌之

○玉海藏云若登高墜下撞打及傷心腹胸中積血

不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地  
黃湯桃仁承氣湯抵當湯九之類下之亦有以  
小便同煎治之者更有內加生地當歸煎服者  
亦有加大黃者惟智者擇之

潔古巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜

臥不能飲食此謂血閉臟腑不通 巴戟去心

大黃各半 當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

右水煎以利為度

嚴氏奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓

損瘀血凝滯心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌慢火炒令黃色半兩 黑丑二兩 右為末每服

二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑丑

未二錢催之須下惡血成塊以盡為度

破血止痛行經之劑

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血留於脇下

其痛苦楚不能轉側

羌活 防風 桂各一錢 柴胡 連翹各二錢

歸稍二錢 水蛭炒烟尽研二錢 射香少許另研

右分作二服每服二大錢酒水一盞除水蛭射

香外另研如泥煎餘藥一大盞調二味食前服

地龍散 治腰痛或打撲損傷從高墜下惡血

留於太陽經中令人腰脊或脛膕臂腰中痛不

可忍 中桂 地龍各四分 羌活二錢 黃柏

甘草各一錢 蘇木六分 麻黃五分 桃仁六枚

歸稍一分 每服五錢水煎服

三因加味芎藭湯 治打傷敗血入胃嘔吐黑血

川芎 當歸 白芍 百合浸半日 荆芥穗各等



右水酒各半煎服

元戎加味四物湯 治虛人損傷不禁下者

四物湯加川山甲水煎服

花蓋石散 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損

犬咬傷或至死血瘀傷處以藥搽之其血化為

黃水再搽藥便活不疼痛如內損血入臟腑煎

童子小便入酒少許調一大盞服之立效若牛

舐腸出不損者急納腸入用細系或紫白皮為

線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無紫白皮

用生麻縷亦可並不可封裏瘡口恐作膿血如

瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不

尽血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至

死者但心後覺煖急以童子小便調一盞取下

惡物如肝片終身不患血風血氣症若膈上有

血化為黃水即時吐出或隨大便出

石硫黃<sub>四兩</sub> 花蓋石<sub>二兩</sub> 右二味相拌合勻先

用帛筋和鹽坭固濟瓦罐子一箇內可容藥候

坭乾入藥在內再用坭封口候乾安在四方磚

赤丸玄珠 六三  
上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己  
午時從下着火漸上徹直至經宿火冷炭尽  
又經宿出確細研以絹羅子篩極細磁盆盛之  
依法使用

○雜方

本事方

治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙

散未展荷葉陰乾一味為末食前以熱葦便一  
盞調下三錢以利下惡物為度

經驗方

治打撲損筋傷骨折

黃栢

兩

半夏

半五

右為細末用生姜自然汁

調如稀糊敷以帛花貼如乾再敷如骨折先以

絹帛封縛次用杉樹皮夾定良久痛止即瘥竟

熱乃是血活筋骨復舊輕者三五日重者不過

旬日矣

本事方

治跌仆傷筋損骨痛不可忍此方乃神

生地

為末

藏瓜姜糟

各一斤

生地

四兩

龜相投

右都炒令勻熱以布裹傷折處冷則易之神

治打撲內損筋骨疼痛

本草綱目

本草綱目

本草綱目



乳香 沒藥 芍藥 川芎 川椒去子及閉口者

當歸各半 自然銅三錢 右為細末用黃蠟

四兩溶開入藥末不住手攪勻濕丸如彈子大每服一丸用好酒煎開消盡乘熱一服吃盡看何處痛向痛處卧霎時服三五丸立效

衍義云 沒藥通滯血打傷撲損疼痛皆以酒化服夫血滯道而行之則痛腫消焉

肘後方 治被打瘀血在骨節下出者 生鉄一斤 酒五升煎取一升飲之

丹溪治一人因上山惡血瘀入內損傷食少脉絃治宜活血和氣

川芎三錢 青皮二錢 芍藥 活石各一錢 丹皮五分

炙甘草一錢 桃仁七枚 水煎服之

綴耳鼻法 治擦落耳鼻用髮入礮子鹽坭固濟煨為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟帛縛定立效

肩穿法 凡負重擔肩破者前剪猫兒頭上毛不語唾粘之

遠行脚打泡 以生麪水調為糊貼過夜即乾不  
可擦破

又方用飯粘搗貼以帛覆之過夜次日平復効  
抵金用 跌撲傷損閃扭出骨竅等症

蚕沙黃炒

荒豆粉炒黃各

枯礬二兩

右為末 醞醋調敷患處厚帛貼之 絹帛綁扎換  
敷三四次即愈忌產婦

秘傳神効散 治跌撲損傷骨折骨碎筋斷疼痛  
不可忍者此藥極能理傷續斷累驗若神

用路上或墻脚下過往人便溺處經久碎瓦片  
取來洗淨火煨醋淬五七次瓦黃色為度以刀  
刮細末每服三錢好酒調服不可以藥微賤而  
輕忽其効也

一字散 治跌撲傷損功效同前

半兩錢

五枚火煨醋

甜瓜子仁錢五

珍珠錢二

右為末每服一字好酒調下

治跌撲傷損 用蟹二隻連殼搗爛好酒二碗濃  
煎去渣飲之留渣敷患處



治損傷神效 治跌傷骨折急取雄鷄一隻量患人酒量多少或一碗半碗將鷄刺血於酒中溫之令患人熱飲其痛立止驗甚

○癰風

內經云腠風成癰此疾非止肺腎二臟有之以其病發於鼻俗呼為肺風也鼻準赤而脹大乃血隨氣化也氣不施則血聚血聚則肉潰而生虫此屬厥陰當以藥疎之可用局方升麻湯下錢氏瀉青丸是也餘病各隨經而治之癰風成癩

樺皮散主之從少至多服五七月後灸承漿七壯瘡愈勿止藥丹灸同止 承漿一名懸漿在唇下宛宛中足陽明任脉之會療偏風口喎面腫消渴口齒疳蝕虫瘡灸之佳每灸七壯至十七壯止灸則血脉宣通其風應時而愈艾炷如小竹筋頭大不可灸破血肉但令當脉灸亦能愈疾

樺皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及癩疹癢痛

杏仁

泡去皮尖水一碗煮至五分取出晒乾另研末

荆芥穗

各二兩



枳殼去穰炭火燒存性

樺皮燒存性各四兩

炙甘草五錢

右五味為末每服二錢食後溫酒調下日進三次

### 凌霄散 治癰風神效

蟬退 地龍去土焙 白僵蚕 全蝎各七箇

凌霄花五錢 右為末每服二錢酒調下無時常

宜浴每浴坐於湯中浸一時久服藥神效

### 四聖保命丹

大黃五錢 黃栢八兩 苦參 荊芥各四兩 乾蟾

一隻 瓜蒌根 防風各五錢 輕粉二錢

右為末每服一錢茶清一盞調下空心日午臨卧各一服服五七日後先於牙縫內出臭黃涎渾身疼痛次後便利膿血病根悉去

加減何首烏散 治紫白癩風筋骨疼痛四肢少

力眼紅無白鼻梁崩壞皮膚瘡疥及手足皴裂

睡卧不安行步艱辛

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗

甘菊花 枸杞子 葳靈仙 苦參各五錢

右為末每服三錢蜜茶調下無時



參毛丸 治大麻風

苦參一斤 戴毛半斤 煨存性 為末陳米糊為丸梧

桐子大每服五十九酒送下一日二次

仙方鱖鯉散 此方治大麻風極妙絕勝他方

穿山甲活者大約重十觔為妙剖開肚不去腸

雜以真生漆一觔塗在肚內陰乾七日用坭

包火煨存性研極細末每服三分或五分水

酒調下用真青布被上下蓋之出汗臭不可

聞不得見風待汗乾被上俱是小虫服十日

眉毛復出身上膿水瘡皆愈一月即脫躰除根

愈風散 治一切惡風癩疾除鼻梁崩壞者不治

外其餘不問新久無不收功

淡荳豉 真輕粉 只壳 俱為末每

服一二錢五更空心糯米湯調下至早飯後稍

覺困倦欲睡不睡乃藥力搜風使然當逐下惡

物再服後鶴虱丸調理

鶴虱丸 治大麻風不拘年月以効為度

鶴虱二兩 防風一兩 地榆 麻黃去節 雄黃研  
天麻各半 右為細末醋糊為丸梧桐子大每  
服三十五丸酒下日三 忌雞猪魚蒜粘滑油  
膩燒炙胡椒房失能如此調養則萬全矣若初  
起三五年者十全八九如縱恣無忌憚者則不  
能收全功

癩瘡方

明礬末 黃蠟 新鮮土茯苓 過路珍珠草  
紫背天葵根子各一兩 右為末煉化黃蠟加生

蜜糖拌搗為丸梧子大每服三十九丸米飲下  
初服一日三次後只一日一次

又秘方 治天麻風癩疾

死人蛆虫洗淨鋼片上焙乾為末每用一二錢  
用皂角刺煎濃湯調下 若腫而有疔瘡者乃  
陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖  
然後再服此藥蓋此藥有補功以皂針為引故  
能達表能久服之極有神功非泛常草木可比  
倫也用遭橫死者於檢屍場中間作人買之極



多不難

大宮詹少溪吳馭閣校

萬治三年  
子庚季冬穀旦



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠孫君醫案序  
 世稱醫者意也曷以案為然非規  
 矩不出方負去舟筏茂繇濟渡  
 故善奕者不廢譜善陣者不釋  
 圖豈謂譜與圖能盡奕秋孫吳  
 之意哉意則在矣余觀司馬子長



陳承祚皆古所稱良史於扁鵲倉公  
華元化諸人載其所治症甚悉獨  
其為人不朽計乎夫亦欲後之人  
案之而知意也自是而下凡以醫  
知名於時者多有遺案然或傳或  
不傳其傳又或用或不用夫豈弋

獲之虫未必灼有定見推陸之舟  
不無異於古今與則遺案與用案  
者均失其意矣新安孫君東宿以  
醫著名既刻有赤水玄珠醫旨緒  
餘諸書其子濟孺復集君所常治  
症以為案余觀其書巧黠而奇中