

午 31

64

竹林寺古科要旨

感 豐 子 新 鐫

竹 林 寺 女 科 要 旨

光 緒 丙 申 桂 月 石
五 峰 氏 謹 鈔

是書者自出徽竹林寺安寂得師函友
人乃鈔試下序致御良方也嘗見人家
婦少偶染一病中張皇失措求子
其策甚乏漢唐醫者皆捨而歸
屈何者家置一快與症用方不效
西平安耶然則在書行世即以為
濟用扶危之良方也

雨梅神效

竹林寺女科秘方

婦人之症一百有十三

治法七十有二

第壹症

自月經前論其症血來如胆水五心作熱腰痛並小腹痛面色黃瘦不思飲食乃血氣虛也先用黃苓散次用調經丸黃苓散者先退其五心煩熱也煩熱退再投以調經丸則次月自然血勝而愈矣

黃苓散

黃苓六分 川芎八分 當歸一兩 白芍一兩 蒼朮一兩

炙草三分 知母七分 水煎溫服

調經丸

三稜 義朮 當歸 白芍 生地

熟地各一兩 元胡 黃芩各二兩 川芎 小茴各一兩

烏藥八分 砂仁五分 香附一兩二分

米糊為丸每服三分老酒送下

第二症

月經後論其症血來如漏水頭昏目暗小腹作痛更兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯後用內補當歸丸次月即愈

理經四物湯 當歸 川芎 生地 柴胡 白朮 香附

元胡各八分 白芍 黃芩 三稜各八分

內補當歸丸 當歸 續斷 白芷 阿膠 厚朴 白茯苓

肉蓯蓉 蒲黃炒黑 萸肉各二兩 川芎八分 熟地一兩五分

灸草 乾姜各五分 製附子三分

煉蜜為丸每服八丸空心酒下

第三症

月經或前或後論其症因脾土不勝不思飲食
由此血衰經水或前或後不用理血只須調脾
以紫金丸服之脾土勝氣血旺自然應期

紫金丸

陳皮 良姜 莪朮各二分 檳榔 砂仁 紅豆 各一分

枳壳 烏藥各二分 三稜二兩 飯後用米湯下百丸

第四症

血虛發熱論其症因婦人性急或行經時房
事觸傷腰中結一块如鷄子大左右兩肋痛月
水不行五心煩熱頭昏目眩咳嗽生痰先用逍

遙散止其熱次用紫苑湯止其嗽若半年一年

失醫肉瘦泄瀉百死無生

逍遙散加減 當歸炒 白朮炒 白芍 柴胡 花粉各八分

黃芩六分 地骨皮一分 石蓮肉一分 薄荷四分

胆草五分

紫苑湯 杏仁去皮尖 水煎卧時或空心服

紫苑湯 杏仁去皮尖 阿膠沖服 桑白皮 蜜炙 五味子 五分

知母炒一分 貝母去心 款冬花六分 紫苑花 桔梗

蘇子各八分 枳實一分

水煎臨卧服

第五症

經閉發熱論其症或行經時或產後多吃生冷并
水果等物蓋血見水則凝滯故也初起二三日生熱
寒作熱五心煩燥若脾土一勝自然經血流行
萬無一失倘半年不治變作骨蒸子午面熱肌
膚消瘦泄瀉不止百無一生急宜治之如病重者
用鴉片一二厘甘草湯服有起死回生之力亦用
逍遙散紫苑湯服之

第六症

行經血氣作痛論其症經來一半血未曾盡腹
中作痛發熱須用紅花散破其血熱心痛安

紅花散

枳壳六分

紅花一分
牛膝

當歸

蘇木各一分

赤芍

三稜

義朮各八分 川芎五分

水煎空心服

第七症

經來一月半月不止乃血妄流行當審此婦曾

吃熱物椒姜過度否是為熱症須用金狗散

金狗散

續斷

阿膠炒

地榆

當歸各一白芍八分

黃苓

金毛狗杞各一

川芎

白芷各八分 熟地二分

水煎空心服

第八症

經來如綠水全無血色乃大虛大寒不可用涼藥

要用烏雞丸服半年不但愈病兼能恆孕

烏雞丸

天雄

附子各三

鹿茸二兩 山藥

肉蓯蓉

蒲黃炒黑肉桂

當歸

山萸肉

白芍各二兩

烏鷄肉去皮油酒蒸三兩

熟地一兩五分

川芎八分

糊米為丸空心黃酒下百丸

第九症 此症人虛經來如黃水不可太涼務煖經血次月血

勝而愈須用加味四物湯則病自愈矣

加味四物湯

當歸

川芎

烏藥

元胡各一分

白芍八分

小茴八分熟地二分

引用姜三片棗二枚水煎空心服

補載

經水將來肚中渾痛乃氣血俱實也宜用清熱

調血湯飲之自無不效者

清熱調血湯

當歸

川芎

白芍

生地

香附

黃連

莪朮

元胡

丹皮

各七分

水煎服

第十症

經來全白色無血色五心煩熱小便作痛面色青黃乃血氣虛弱宜用烏雞丸服半月次月必孕方詳第八症

十一症

經來成塊如蔥白色又如死豬血黑色頭昏目眩唇麻此虛症也不可服涼藥急用內補當歸丸方詳第二症

十二症

經來臭如夏月之腐此乃血弱更兼吃熱物譬

如溝渠水涸天時無雨久則臭也身衰舊血新
血不接則臭宜用龍骨丸又服湯藥則安矣

龍骨丸

龍骨

鯁鱗

牡礪

生地各一

當歸

川芎

白芍

茯苓各一分黃芩六分

合為丸空心酒下百丸

湯藥方

當歸

三稜

莪朮

赤芍

丹皮

白朮

香附各一分陳皮

條芩

木通各七分

生姜一片水煎服

十三症

經來不止如魚腦雙足痛疼不能動履乃下元
虛冷更兼風邪所攻宜活血順氣須用疎風

止痛散

疎風止痛散

當歸

天麻

姜蚕

烏药

牛膝

獨活

石南藤

乳香

紫金花

骨碎補

各一分

川芎五分

姜三片葱白三根黄酒煎服

十四症

經來牛膜片此症經來不止兼下膜色一般昏

迷倒地乃血氣變而成雖驚無事宜用硃砂

丸服之立效

硃砂丸

硃砂一分茯苓一兩

研末水合為丸姜湯下五十丸

十五症 經來下血胞經水不止或下血胞三四個如卵大綿軟如絮刀割開內如石榴子其婦昏迷不知人事雖驚不妨宜用十全大補湯

十全大補湯

當歸一錢 白朮一錢 人參 川芎 白芍

茯苓各八分 生地 黃芪各二錢 炙草六分 肉桂一錢

十六症

姜一片 棗三枚 水煎空心服立效

十六症

經來小腹痛如刀割此乃血悶皆用八珍丸無

效宜用牛膝湯一劑有效

牛膝湯

土牛膝三錢 乳香一錢 麝香一分 水一鐘半煎牛膝又

一鐘磨乳香麝香入內空心服如係火症可用

硃砂六一散

十七症

經來吊陰痛不可忍此症筋兩條從陰中吊起
玉乳上疼痛身上發熱宜用川練湯

川練湯

川練子

猪苓

澤瀉

白朮

小茴

烏藥

元胡

乳香各一

木香五分

麻黃六分

檳榔八分

引用姜三片葱一莖水煎對酒服大
發汗二劑即愈

十八症

經來未盡潮熱氣痛此症經來一半又當口渴小
腹痛此因傷食生冷血滯不行有餘血在內不可
用補藥只宜用涼藥熱去經盡痛止宜用莪朮散

莪朮散 莪朮 三稜 紅朮 牛膝 蘇子各一兩

水煎空心服

十九症 經來已盡作痛此症手足麻痺乃腹中虛冷氣

血甚衰宜用人參四物湯

人參四物湯 人參 歸身 白芍 川芎各一兩

姜一片束三枚煎服

二十症 經來小腹結成一块如皂角一條橫逆痛不可忍

不思飲食面色青黃急宜用元胡散

元胡散 元胡四兩 髮灰三兩

共為末黃酒調服半月其块自消

二十一症 經來氣痛脇內一块如盃大其血淡黃色宜治

块為先須用四物元胡湯

四物元胡湯 當歸 川芎 白芍 各八分 元胡 一分 熟地 二分

姜三片黃酒煎服加沉香三分冲服

二十二症 經來遍身疼痛乃寒邪入骨或熱或不熱宜解

表須用烏药順氣湯

烏药順氣湯 烏药 疆蚕 白芷 陳皮 各八分 炙草 五分

麻黄 去節 四分

姜三片葱一莖水煎服發汗即愈

二十三症 能經傷寒經來忽能候食生冷過

身潮熱疾氣脈滿惡食四肢
冷急投五稜散

五稜散

陳皮

厚朴

枳殼

白芷

茯苓

枳殼

蒼朮

柴胡

各五分 川芎 乾薑 各五分 青皮 各

當歸 半反 未附 各半

薑 三片 葱 一莖 水 煎 熟 服 即 安

中風症

逆經 身 汗 經 後 口 鼻 亦 出 此 因 風

倉 椒 薑 熱 毒 之 物 其 血 亂 引

急 自 屏 角 黃 卷 湯

犀角黃卷湯

犀角 白芍 丹皮

枳實 為一錢

百味霜 正定

黃卷 摘紅 各分

生丹 二分

生地 主

水煎空心服 散刺立效

二十五症

經水後口鼻出咳嗽氣喘不往而下而

上行五心赤熱急宜守白下常用

紅花散一帖以用冬花散止嘔下

氣散散性皮熱去自安其效甚比

紅花散

紅花 正定 黃卷 蘇木 各一分 花粉 常

水煎空心服

冬花散

宗亮 壽康

枳殼

枳實

蘇子

紫苑

各花蕊丸分 桑叶皮 蜜炙 石膏板

杏仁各半 水煎服

共症 逐日经来此病来者身发点即止

遇身或十日又来数点一日三四次

面色青黄宜先服此艾汤三服

再自服金丸服一

艾汤 川芎 熟地 炒芍药 各半 艾叶

煮三枚水煎空心服紫金丸方

详第三症

艾症 经来短于如见鬼神此症或用家

事怒氣韻且逆宜攻心少知今事狂个
丸 易得先用麝香散教定心志次用茯神

麝香散

石砂

麝香

其外

木香

人參

桂枝

柴胡

白茯苓

遠志

水煎服

茯神丸

茯神

遠志

茯苓

石砂

枳实

芩芩

米

糊丸

用金銀

湯送下五十九丸即愈

廿八症

經來常嘔吐不思飲食冥用丁

此方常治胃氣痛等症效過

了無效

乾薑

丁香上等

白朮

半

若為米早夜米湯送下三匙

先症

經來飲食不化吐此症之疾在胸中

挂住米石不能下胃宜用烏梅丸

後用九仙奪命丹

烏梅丸

本丸 樵黃 桑葉 枳殼 乳香

皮黃 烏梅肉 烏梅子

大每日吞一丸化吞涎痰

九仙奪命丹

枳殼

黃芩

厚朴

茯苓 木 枳壳 木 山查 陈皮

苍术 木

若为未善汤以此方不拘妇人女子经

产即男人建 暖隔水若不能下先

用乌梅丸次用此丹音效甚比

世症

经来逾身浮腫此且脾土虚弱不

能克水安而可腫宜用木香调胃

木香调胃散

木香 甘草

陈皮

红花

木香

莪术

木通

山查

大腹皮

木香

木香

卷末

三片

此症

終來世河并終來時互互世河

孔見保此水唱重必必補牌可能理

中渴之五帖

理中渴

八考

白木

各分

五味子

甘什

乾姜

姜三片

此症

終來大少便俱出此名糖經因吃

熱過多積久而未去其熱毒并

調陰陽中安軍自白利五考教

分利五考教

賭考

博博

白木各日

阿膠 川芎 當歸 芍藥 赤芍藥 4

水煎一空心服

此症 婦人白帶 方用白槿花 益老後

眼目昏

可方治黃白果三升 去心膜 西乾為末

每服之 滾湯下

此症 經來常 咳嗽 此症 咽中出白

肺 竹枯燥 急止平 嗽 五除其根 先

用 茯苓 湯 止其嗽 次用 珍蔞丸

可除其根

茯苓湯 白朮 川芎 蘇叶 羌活

半夏 枳殼 枳實 陳皮 干薑 厚朴

人參 芍藥 桑寄生 甘草 三分

薑三片 水煎服

治癰疽 華蓋丸 川貝 杏仁

白朮 桑寄生 枳殼 枳實 陳皮 干薑 厚朴

五十九

此五症 治來腹大如鼓 此病月水不來 二三月

以已七八月 腹大如鼓 人以為孕 一日崩下

宜晚身物 如腹脹 膝下 少心 人常 此皆

速久唾新瘦共不此新水共急投十

全大補湯方得第十五症又婦吃

偏下血腹痛宜服安胎散

安胎散

湯身

白芍

桑寄生

白朮

熟地

川芎

熟地

阿膠

珍珠

蘇艾

研末

糯米

又經閉宜服通經散被積生成塊

供效方得錄遺論

此六症

經未少便身出如渴渴滿腹疼痛

便折重送方便止則其事平先用

建中丸次用建中丸

建中丸

續隨子

牽牛子

枳柳

大戟

各半

麝香

甘遂

芫花

研末末糊為丸每送下

建中丸

黃芪

肉桂

炙甘草

白芍

苦多末白滾湯送下

芫花

送來潮熱十日不思飲食此胃氣

不消之故宜向胃不須別治只服

芫花

芫花酒將老雄鴨頭頂上取血調陸黃

活飲之即效

此八症 各症因症如小自水初行不化保者
用冷水洗之身見冷水則凝不出血
海面毫青黃遍身作腫作水症
治之不效身自通經丸通血消腫

通經丸 三核 蘇木 川芎 赤芍 当归

紫苑 別寄奴 九公 穿山甲

若為赤白帶下丸每日服五粒

卅九症 血山崩以症初起宜用十灰丸若久
崩者乃血氣虛也宜用雞子湯為小

腹痛須用加味四物湯

十灰丸 阿膠 側柏叶 檫櫚 艾叶 各一斗

綿綿 一團 茅根 百草霜 白茅根 各

各燒灰存性為末白酒送下

雞子湯

雞脊肉 的 子 煮 三 並 姜 三 片 甘 六 搗

為泥用芝麻油同炒去渣調黃酒

熱服

加味四物湯方詳第九卷

四下症

經來吐烟也此症輕來寒極一四散

冷厥大汗吐舌痰氣壅滿身死無

生石治

胎前

四十一症

胎前嘔泄以病胎前吐逆不思飲食

身反腹中作痛乃胎氣不和因而惡

逆宜用和氣散

和氣散

紫皮桂枝厚朴小茴香 益母草

藜蘆香薷丁香香甘香各半 木香

砂仁各五分 蒼朮 芎

水煎飽服之即效

四十二症

胎前潮熱氣痛以乃受熱毒宜

用五苓散

五苓散

桂枝 赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

各八分

四十三症

胎前寒熱或瘧疾腹痛口燥舌

乾乃受熱多而又傷生冷陰陽不和也

宜服五苓散

五苓散

芍藥 一分

柴胡

青皮

黃芩 各八分

甘草 三分

水煎空心服即安

四十二症

婦人胎前心下不和身重此乃過食

椒姜猪肉增物熱毒積在腸胃

此六月至經被受熱以攻而之發動胎
母俱不安先用調中和氣散次用
勝江丸子母均安

調中和氣散 大黃 石膏各五 枳柳 枳壳

知母各八分 黃連 芍 黃柏 柴胡

空心服

勝江丸 巴豆去壳油 万叶霜 臨症博用

米糊丸如綠豆大白滾湯送下丸

此症危日子親受身氣逆之甚且而暈

厥若用紫蘇飲以子

紫蘇飲

當歸

川芎

紫蘇飲

厥州

人參

白芍

大腹皮

送水

善一以善白一子至很善且也

傷肝苦加柴胡牛且不括起

居共加白木礞石用脾氣

加木末此方乃但能治卒症兼保

生順產神效

一者子學 娠妊腹內自覺小兒笑也此症乃胎

上疝痞兒含口中因孕婦於孕奉

胃暖者中以此作弄令孕稀曲

胃就地如拾物狀一二刻恍惚仍入以中
其然自心不用中物湯以白朮茯苓
一二帳可安固胎氣

白朮湯 為婦 川芎 芍藥 熟地 白芍

水煎服

一若子氣 孕婦自安月來兩月睡大行

步氣難指尚有黃水出共此症

子氣多有不愛食吃玉產後其腫

自消甚早以茯苓湯云云

茯苓湯 白朮 茯苓 陳皮 桑附

烏龍多子 廿種 蘇什多子 木瓜三子

薑三片水為一服

一名子滿 乃係玉八九月胎氣動者大而不

腹外胎滿不墮 遲迫子戶生外不

安謂之小滿 其眼赤睛飲 宜之

束胎飲 芎朮 黃芩 蘇子 枳殼

腹皮各五片 砂仁連殼微 姜三片水煎服

姜三片水煎服

孕五胎 胎前氣血不旺 胎前因過食生

冷益者 凡寒中胃 肺經生痰也

先服紫蘇湯次服安胎飲

紫蘇湯 蘇汁 枳殼 枳實 芍藥皮 貝母

知母 當歸 桑寄生 白芍 五倍子

石膏 甘草 芍藥 水煎服

安胎飲 芍藥 枳殼 枳實 當歸 生地

炒黃芩 川芎 甘草 芍藥

水煎一服二服

四十六病 胎前咳嗽 此因多食生冷及食椒

薑中傷冷極 胃氣大勝 以作此疾宜

用三常湯

五虎湯

杏仁 石蓮

枳實

蘇子

附子

山子

枳殼 杏仁

麻黃

厚朴

附子

水煎服

曰之症

治多証之常法也鼻以末比甚傷

熱宜極亂引冲傷脈以用涼服之

骨印石不用可物湯宜用証之立效散

証之立效散

丹皮

黃卷

白芍

側柏叶

蒲黃

米糊丸中滾湯送下

曰六症

眩暈河傾吐水極甚難物難肉

等入脾大腸大燥變以痢及初起

言因甘遂湯中安如河久不婦抗

瘦精神短少知如之皆止其不能治也

甘遂湯

甘草

川連切之

乾姜

四九症

時氣滿口不厚血素如注行症

月一次此症痛時互用小烏金丸

小烏金丸

海金以煨之

鹽麩

側柏叶

山茵

百煉霜

川芎

蒼朮

防風

當歸

白朮米糊而丸白湯下五丸

五十症

時氣白帶乃時氣寒弱先用白朮

多病之黃海延眼必用田日丸

五十年

開日丸

龍骨

海鱗銷

牡蠣

赤石脂

共研末米糊為丸

五十一症

胎前赤帶漏血如猪血水日夜不止其掃

精神短少急用^例柏叶丸

側柏叶丸

側柏叶

黃卷各四兩

煉蜜為丸如桐子大白湯送下丸

五十二症

胎前氣緊咳嗽不止其紅血期而赤日

午心熱氣緊人皆尔勞症不效宜先用

直邊散以心其熱後用紫苑湯以口其嗽

二方俱詳第廿四症

五十三症 胎前動血因飲食跌傷惡血

素為水不止急用艾膠湯止血次用

安胎散固胎伴旺者三五帖即愈

醉弱者不治

艾膠湯

方詳第廿六症

安胎散

方詳第廿七症

五十四症 胎前小便不通此症名為轉脬急用車前八珍

散如不效即用八味丸

車前八珍散

車前八珍

炒研

白朮

茯苓

當歸

川芎各二分

白芍各五分

熟地一分

炙草

五分

八味丸 炙草 附子各三分 山萸肉 丹皮 澤瀉各八分

山药一分 肉桂五分

或湯或丸俱可本方有熟地一两八錢

五十五症 胎前小產懷孕或三五月或七八个月孕落

皆曰小產若不調治恐再孕後然宜用益母丸

并服安胎奇方

白

益母丸 益母草 歸身各四兩 煉蜜為丸空心酒下

安胎奇效方 當歸酒洗条參 白朮 白芍酒炒各一分 炙芪

茯苓七分 阿膠七分 蛤粉炒 杜仲鹽水炒 熟地各一分 砂仁

川芎各五分 甘草三分

酒水各一鐘煎八分空心服如痛急者銅鍋內煎服
如胸前作脹加蘇梗陳皮各一分如見紅加續斷一分糯米粳
如有赤白帶加阿膠一分艾七分地榆頭一個

再此方懷胎或三個月前後或經怒惱撲跌損傷胎氣腹
痛腰脹一服即愈雖見紅一日二日未離空者一
服自安倘先前四五個月曾經小產者將及前
次小產月分竟腰脹腹痛忙服一劑即萬全矣
此方原載錄遺編內

五十六症胎前白帶宜用椿蓮丸

椿蓮丸炒黃芩二分蒼朮三分黃連

白芷各二分白芍

椿根皮 黃栢各重錢五分 山萸肉二錢

共為末米糊為丸空心酒送五十九

五十七症胎前怔忡心常恍惚遍身煩熱乃血氣虛弱

受胎之故宜用硃砂湯

硃砂湯不落水猪心一个煎湯一鐘硃砂一錢 調服

五十八症胎前浮腫此血氣衰切忌通利之藥恐傷胎

也宜用大腹湯

大腹湯 大腹皮 麩皮泡 五加皮 青皮 姜皮 陳皮各二錢

去黑水

水煎空心服

五十九症

胎前遍身酸痛散懶此症面青黃瘦不能飲精神困倦形容憔悴因血少不能養胎宜用四物湯方詳四十四症

六十症

順氣散

胎前陰門腫乃不能連動所致宜用順氣散訶子一个水一鐘煎七分温服

六十一症

胎前血動胎若婦人壯盛者三五日内急以安胎散救之若形瘦有冷汗面如灰色四肢無氣力乃積久之病神色已去者不治安胎散方詳四十五症

六十二症

胎前脚痛此因氣血衰弱下元又虛更兼風

耶須用養血行氣之劑宜用烏藥順氣散方

詳二十二症

六十三症

胎前中風牙際閉痰氣壅滿不知人事因吃生

冷煎坐風前而致先用黃蠟膏次用排風湯

黃臘膏

黃蠟

苦礬

麻黃

各等分為末黃蠟鎔化擦牙

排風湯

麻黃四分

白朮

防風

當歸

川芎

白茯苓

白蘚皮

獨活各八分炙草六分

姜三片棗二枚煎服

六十四症胎前癱瘓此症手足不能動乃胃中有痰凝

住血氣不和所致宜用烏藥順氣湯方詳二十三

症

六十五症 胎前腰痛此因血去蔭胎不能養腎水不足所

致宜用猪腎丸

猪腎丸 猪腰子_{四錢} 酒青鹽_{四錢} 入腰子內蒸熟焙乾為末蜜

丸黃酒空心送下

六十六症 胎前頭痛此乃寒邪入腦陽氣散也宜服芎芷湯

芎芷湯 川芎 菊花 白芍 白芷 石膏

嵩本白茯苓各_{五分} 炙草_{五分} 姜三片煎服

如法不止加細辛_{五分}原有頭痛病者不能即止

六十七症 胎前泄瀉此症隨四時治之再宜臨症斟酌春宜

平胃散夏宜三和湯秋宜藿香正氣散冬宜理

中湯

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 炙草各一錢 茯苓

山藥各八分

水煎服

三和湯 生地 白芍 川芎 當歸 連翹 大朴硝

治熱結血閉

藿香正氣散 大腹皮 藿香 紫蘇 茯苓 白芷各一錢

白朮 厚朴 半夏 桔梗各二錢 甘草五分

姜朮為引水煎服

理中湯方詳三十一症

六十八症 胎前心痛不可忍此亦胎氣不順宜用順氣散

胎

順胎散 草果一個元胡八分五靈脂一分沒石子八分

六十九症

水煎半肌服

胎前忽然倒地此乃血不養兒胎母欠精神

承胎不住目花眼昏一時倒地不須服藥只用

飲食補之可也

七十症 胎前大便虛急此乃脾土燥大腸澀只宜理脾

通大腸不可用芒硝大黃下之宜用枳實湯

枳實湯

枳實 三兩 炒

水二鐘煎七分不拘時服

七十二症 胎前陰門癢甚此症因有孕房事不節陽精留蓄

所以作癢宜用川椒白芷湯

川芎

白芷

水煎服再煎渣以洗之

七十二症

胎前通身搔癢出風餅此症有風不可服藥

用獐腦与酒擦之即愈

七十三症

胎前乳腫此症兩乳腫痛作寒名曰内吹宜用

皂角散或用乳吹神效方

皂角一条燒灰存性黄酒送下立效

乳吹神效方

陳皮

湯漫去白
炒黃為末

麝香 少許

研勻調服二夕

此方神效未結即散既結即潰痛不可忍者藥下即愈

又方金銀花三分 貝母 陳皮去白炒黃各二分 當歸 木通 防風

王不留行各二分

水二鐘煎八分服其渣搗爛敷患神效

七十四症 胎前咽喉痛此乃寒攻下咽胃有痰涎宜去寒化

痰當服升麻桔梗湯

升麻 桔梗 甘草各五分 防風一分 元參一分五分

水煎服二帖即愈

七十五症 胎前消渴此乃血少三焦火熾而然宜用加減四物湯

或六味丸即愈

加減四物湯 生地 川黃柏 當歸 川芎各一分 熟地二分

白芍

八分並服
六味丸有成方

七十六症 胎前耳鳴此乃腎虛宜服猪腎丸方詳六十五症

七十七症 胎前不降生臨產水乾孩子不下可益母散用之生

水水至胎下若^肉而不生者死

益母草三升 滑石 白芷各一升 麝香一升 肉桂去皮八分並服

七十八症 秘傳難產奇方用高牆上蛇蜕一條要頭向下者

佳瓦上焙乾為末一錢加麝香三分乳調為膏

貼臍上即產產即速去不可久貼

七十九症 胎衣不下此症因身弱血少水乾故胎衣不下宜用

川歸湯衣在胸膈者難治若未小腹用破^露丹

婦人面青黃口舌黑指甲青此子死也當用朝
散打下死胎急救其母若面色青指甲紅色其
其猶生不可輕用

川歸湯 當歸 川芎 益母草 各二分

水和老酒煎服即下

破靈丹 紅花子 蘇木

黃連 黃芩

朝散散區云此方胎衣不下之方而必急傷
子死腹中打下等語不是只論胎衣不
下也歎有誤

產後

十症 產後血氣瘀此乃解血未盡後中

疼痛及遍身發熱惡止在後當去其

血則熱自退宜用紅花當歸散方

六症

八十二症 產後血虛作年血胸中虛

者身潮熱六星靈潮宜用加甲物

湯加減

甲物湯加減 膏湯 日苦多上 熱也

白芍 芍苗各一分 烏芍 上 乳

没药 五灵脂 十许

八十二症 产後急之未愈者 或为内偏外

或为 故说自生心汤

全当归 独活 羌活 炮姜 各半

方川芎 芍药 枳实 研末 土煎

引用干姜二片 西附反可眼补方

八十三症 产後咳嗽 乃产後心伤 风复而为咳

嗽 宜用少青 猪汤 甲纹

甘竹 干姜 各半 半夏 五味子

杏仁 甘草 各三片 水煎服

八十五症 產後子宮突出用銀魚炒灰存

性調法油搽之即愈

八十五症 產後子宮疲痕突出生用連

翹散內用黃芩煨膏

連翹 黃芩 茯苓 花粉 防風 槐子 各半

方抄 卡

黃芩散方詳 字三症

八十六症 產後一月身露重赤如流小皆

連例地石起今事法如生膏一月支

婦交痛動搖者常所以宜止崩且

多用金匱方注第七症

二十七症 產後氣急成此諸氣急者此

乃外實內虛之症必死也疑

二十八症 產後舌黑如墨口乾絕汗津液

此乃腎敗必死之症

二十九症 產後產後又水浮乃急宜攻心下

虛上或必死之症

三十症 產後即陰疼宜用川棟湯方注

三十一症

三十二症 產後脾虛平陰浮腫宜用不食

調胃散方注卅症

九十二症 難產丹方用礞石鼠肝一對如麝
 香三錢好辰砂為衣作三丸白湯送下
 丸男左女右子權如在死胎在胎子
 頭上頂出者此方屢試屢驗其丸以
 水洗淨者再服用一次即效此石
 可擇視
 又方金狗脊一個鉗碎用湯水炙一
 炷成一後用密布摺淨置瓶口
 俾其氣不耗淨其單用水煎一
 六子

訣九三
 九五

兩用綿裹曰蹄者其合最於後以也
本振於乳上振刷或水摩乳房即出
又方土底根卷而編虛二兩通竹管兩

水魚湯眼

九十六症 產必遍身疼百骨間張空脈
既走氣弱若創傷絡史肉之間與骨
不致骨節不利筋脈引急以致時
背不能轉動手足不能運轉身疼
頭疼此作傷風治之則汗出
筋脈搖動手足厥冷復生也病年

冥用趁痛教

牛膝

天甘韭白

常歸

桂心

黃芪

白朮 枳實 芍藥

薑三片 水一升 煎至五分 空心

熱服

九十七症

瘧疾心下壅中熱此因寒氣金

換陰陽不和以致敗血隨經流

閉決渾者寒閉決渾者熱榮

微射則休者榮刺不和敗血不

散新以桂議作瘧以刺非者但

苦熱不安，病后用至神效

黑神散

熟地

當歸

蒲葦

炮姜

桂心

白芍

身骨

王豆

三合李

得身細末，每服二錢，煮湯，量便為

半，若益補，服再陰陽，不合用，增

減，可物湯，但寒熱，而身，地，病者

乃陰陽，不和，用人參，四物湯，加減

加減，可物湯，當歸，川芎，芍藥

熟地，王豆，白芍

批在

益眼

人參，可物，加減，湯

當歸

人參

白朮

川芎 炮炙各五钱 羌活 一钱

姜三片 葱根

其散宜不致时有刺痒若散宜不致

日霹震奪命丹

霹震奪命丹 柁壳去毒入瓦 千里马印

路上所拾左脚踏鞋 金箔 银箔各七片

髮灰去 乌退各即卷退也 乳香研末

甲银卷 水银七分五厘

共搅炒研用俟如法熬成未用猪脂

心宜煉西丸用倒流下水流下二丸如

確石行化開諸般

又 雜產方 雜產橫逆 或立海乾調

以攻死孩石下 曾一 其 指急用皮硝

壯者之鑄或學天如附子三五分 煨在皮

肉臍用好海味 鑄產便寸能入奇

舊產一二沸眼之 冥匿石為乃也

保身產方 歸尾 苦參 牛膝 為

乃什霜 乃鑄之 細碎屑 言

水一碗 為一寸 碗眼 厚產 每保

安生

九不症 產後此症至用加減六君子湯

人參 白朮 芍藥 神曲 芩朮 茯苓

冬科 行 陳皮 七分 半夏 五分 厚朴

薑三片 水煎服

又胎前不具方 產後惡露不盡 胎衣不下

脾中宜快凝滯作痛急用 錦紋大黃

一二兩末用好酒三升同煎成膏丸

如桐子大每服五十丸溫酒下

心下

九不症 產後急二乳伸長細如腸垂下

真逼山吐瘡石可思危在旦夕名曰乳
鷄急用佛手散 當歸 川芎 各二斤
八兩剉作大塊於瓦石器內用清水
滾過石拘時候濕眼一斤 條一斤八
兩剉碎用毒爐慢火逐漸燒烟在
病人棹子下要烟氣在上石他个病
人低頭伏棹上將口鼻及病乳高
吸烟氣直候用此一料 案定看
病症如何如未全安乳畧短備再
用一料如前片並眼燒烟蓋吸用

此西料蒸完能之乳器短縮而不復舊
因冷水磨大麻子一匙於頭頂心上塗之
時必洗去則全愈矣

一百症 產後水逆年 垂出肉線一條約長

三尺許寸牽引小腹疼不可忍以手微

却之則疼欲墮此母婦人臨產眼

淚生乘受任太早大肉能任而用

心太過以膏膜有偏宜先服此帖被

教帖

五灵脂國說

蒲黃

隔紙燒

共為末醃

磁調二錢成膏入水一盞

食心熱眼如赤便本製并子必用老薑

三斤淨石去皮于石臼中搗搗用清油

二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾薑造

為佳用熟絹做包考五尺折法作盤

令粒重女人輕感起肉涼使厚作一

團納入水道中却用絹袋包裏候

油為稍過付在肉線上海者薑汁

冷又用熨火熨熱使常者薑氣

如薑氣已過除去又用新者為此著

糜一晝夜其肉線已端一六本再為可
法越二日肉線盡入腹中其病全愈
却真眼失矣教其將湯補切不可使
肉線而斷之則難治矣慎之慎之
產血氣不通用湯泉湯

湯泉湯 當歸 川芎 本通 通州

穿山甲 各五 王不留行 生七各五 麩各五

老龍骨 麩各五

不勞酒調下 真猪鬃

湯

一百一症 產後勞倦傷脾不思飲食宜自

加參生地湯

全當歸酒洗 大川芎 三本 炮姜 炙甘草各五分

桃仁去皮尖 十一粒 加人參 陳皮 升麻 各五分

水煎服 宜淨 再用黃芩 白朮 熟地 各五分

一百二症 產後腹痛身熱盜汗倦怠宜用生

化湯

當歸酒洗 大川芎 三本 炮姜 炙甘草 各五分

桃仁去皮尖 十一粒 加人參 生芪 白芷 防風 羌活 各五分

麻黃根 二本 地骨皮 二五分

水煎服

一乃之症 意必感冒風寒頭痛身熱咳嗽

聲重者有痰宜用加參此化湯

青歸酒洗八錢川芎炮薑炙甘草各等分

柳心去皮去加入參天冬杏仁花粉二麻

黃根地骨皮各一尺桔梗煎服

意及心肉不知入事用乾辛南燒灰以

東流水調服壹升

意及陰內腫痛用蛇床子西煎水頻洗腫

消痛心

意及陰內不可忍用柳心泡去皮去炙枯存此研

未塗之即安

一百之症 產後必欲痛身熱惡寒知非感冒

只服生肌湯 方詳口十二症

一百之症 產後乍寒乍熱或脚疼宜用

人參生肌湯方得一百之症

服二三帖必不好加肉桂五分木香三分

水煎服

又產後陰門之瘡極不可忍用花椒為粒食塩

生椒石壹分

同研為末糝上即止

又產後血枯陰門之瘡瘡不可忍用猪肝一具

白水煮熟照陰門之大小潤穿切片每片轉

杏仁末衣板末各子 白礬末 一分 用綿一

條穿入婦所內按入陰戶過一宿其虫死

於肉內其瘡即愈

一乃六症 產後感寒心痛肚痛白塊又痛皆

服生肌湯方詳八十二症

以肉桂三分吃之帽不好以吳茱萸

一錢半 煎水 薑三片煎服

產後大便不通氣急坐臥不安用麥

牙為末法一合調服即通

一五七症 產後失血心神不守 安方見鬼

宜用生化湯方得八十二症

加茯苓 杏仁 去皮尖 柏子仁 去油 遠志 九年

煎服

產後大便不通 急用熟地丹水煎服

立通或飲牛乳二三言即通

一五八症 產後痢疾宜服生化湯加減

八十二症

生化湯加木香 芍藥 炮姜 水煎服

產後之渴用蓮心研滾水煎服

其渴即解

一乃九疔 產後寒亂吐瀉宜生代湯方詳

八十二疔

加礪石三分 生二片 茯苓五個 寒束五下

產後枕兒作痛乃惡露凝結之故用

山查子 煎湯入黑砂糖五分

一百十疔 產後急抱口禁牙緊子豆 搽

搽類中凡若互眼生花湯

加大麻、羌活各五分 防風一分 生薑二片

婦人血崩用熟地五分 當歸荆芥穗

地榆五钱 白芍阿膠蛤粉各五钱 川芎四

水一碗 空心服

一石止疔 產後目疼 齒熱赤腫 宜用生化

湯化荆芥五分

一石止疔 產後生癰疽 宜服生化湯加連

翹花朴各五钱 生梓八分

一石止疔 產後生乳癰 或助生毒 用生化

湯加金銀花五分 連翹各钱 生梓八分

生薑三片 青皮三分 皂莢五分 荆芥

薄荷英各五

水二碗 煎八分 服

被瘋狗咬方 用萬年青葉搗碎
控汁一服二碗輕則自化重則由大
便打散血團而出效驗如神

新增雜症藥方

第一方 此症因婦人受孕必猶恐胎氣不
足血氣短少每日宜服保胎藥自覺
身發一劑臨產時叫其江水未引
急服一劑能易生下江水既引銀服
無益亦無損壞

保胎藥散 川貝母 干薑 歸 酒送

黄芪 公川芎 子下 荆芥 藜 尔

厚朴 汁炒 艾叶 子下 枳壳 汁炒 兔丝子 子下

羌活 子下 甘草 子下 白芍 子下 酒炒

水二杯 姜三片 煎二分 温服

第二方 夜夢遺精 宜用 燕菜 子 研末 燒

酒送下 即愈

第三方 吃鴉片烟

查沈完錄云 凡吃鴉片烟者 輕則心

中 萎燥 急時 四子 菜 搗 溼 泡 水 滾

下 即 愈

市四方 凡眼目疼痛宜服荆防湯

荆芥 下 蔓荆子 下 赤芍 川芎

防風 各 下 桑白子 下 菊花 下 甘草 下

貝母 下 桑葉 下 青相子 下 蟬蛻 下 下 下

毒一片之服

市五方 戒厚烟 煙時南瓜藤搗溫搗汁

一錢用烟膏一兩和入飲吸則之 煙自

絕再將以南瓜藤身擦收存陰乾

逢煮烟時每土兩以乾藤五寸搗碎

同煮吸之初效

方六方 九子燠瘰用全銀花 下松方干

地丁方干 合王

煎水服以渣搗爛包瘰處

方七方 牛皮瘰用人信石灰 研末調桐油擦

方八方 蟻虫吃鼻用滿天星 親啞蒸熟

薰鼻肉之虫出即愈

方九方 牙齒疼痛 宜用薑黃白芷細辛各等

為末擦患處須以鹽水漱以水過面

赤腫加川芎 芫荽

方十方 狗咬傷

用錫一快將刃剝為細末手中揉絨
先以菜油擦於傷口處然後將此錫洒
上設使筋斷無妨自能結筋長肉止痛
屢試應驗