

* In China ^{frequentia} (cultis, et in
Japonia in Japoniam in-
migrata.

2. S. babingtonia L. p. 1443. - e pluribus locis Japonica in herbariis
a Thunbergio ipso
vires (saepe tempore S. babingtonia Thbg. appellata) (communicatam videtur).
3. S. alba L. p. 1449. Thbg. fl. jap. p. 28.

Nullo specimen e Japonia unquam videtur; in herbario Thunbergiano non
adest, quare valde dubia.

4. S. subfragilis And. (?)

anthera (femina) brevissima, pedunculata, bracteis paucis subspathulatis in-
tegris, glabris suffulta, vix pollicem longa, recurvata, subsessiflora, obtusi-
uscula; rachis hirsuta; squamae concolores, pallide flavescentes, lanceolato-
lineares obtusae, glabrae, capsulas imbricatas ligulatas; capsula viridula
subsessilis, ovato-conica, glabra vel basi interdum pubescenti, stylo prodesto vix
tota, stigmatibus integris excavatis; folia (novella tantum vix) lanceolata,
glabra, vel subtus pilis adpressis hirsuta, margine integra ~~vix~~ venis ob-
scurosculis percursa.

Hab. ad Hakodadi Japonia Eleg. Williams & Morrow. (Hb. Asa Grayi)

Specimen nunciam Salicis nostrae fragili tam simile ut vix ab ea sit distinguendum.

5. S. purpurea L. p. 1444. - S. integra Thbg. fl. jap. p. 29. sec. specimen in herbario
proprio Thunbergii. - Capsula ^{valde} crassa, ^{adpressis} (albo-tomentosa); folia rotundato-
obtusata, subtus ad crebris albo-punctata.

Sub nomine S. integra Thbg. in herbario Hookeri specimen vix depauperatum,
de quo haec amator: "Salicis repente in Europa vulgarissima proxima vi-
ditur, praesertim varietate hujus maxime insigni arvensis; folia tamen ligulata,
basi valde contracta, margine ~~sub~~ apice revoluta acutissime et dense sed non pro-
funde serrulata vel potius denticulata, supra absque viridia, costa tamen
alba, subtus argenteo-saricea, costa et venis elevatis, ab nervis transversim
connexis pulchre reticulatae areolata". - Specimina mihi hodie non adveniunt,
quam ob rem de hac forma vix certe certiorare audeo.

6. Salix pedifolia And.

antheris sessilibus prodestibus, gracilibus, flexuosis, breviusculis; squamis concolores
glaberrimis; capsulis subcylindricis vel ovatis - conicis, glaberrimis, pedicello
nectarium ^{vix} basi terae superantibus, stylo parvo, stigmatibus integris breviter;
foliis ovato-lanceolatis, cuspido-acuminatis, utrinque glaberrimis, subtus
glaucescentibus, margine serrulatis.

Hab. ad Simoda Japonia, leg. Williams & Morrow (Hb. Asa Grayi).

Arbor videtur sal proceram. Ramis graciles, laeves, cortice castaneo glabro abducti.
Folia 2-3 pollices longa, ad medium 1-1/2 pol. lata, basi rotundata, nervis
subcordata, apice in cuspidem subobliquam abrupte producta, supra saturate
viridia, subtus opace glaucescentia, costa fulva percursa, margine plus minusve
sed non profunde serrulata; petiolus 2 lin. longus, planiusculus, glaber. Anthera
(femina tantum vix) anguste apiculata, arrecto-patentia, flexuosa, breviuscula,
densitatem, deplanata 5-3 1/2 pollices longa, 2-3 lin. crassa, subsessilia, bracteis
minutis 2-3 subtus hirsutis suffulta; capsula testaceo-viridula, 1 lin. longa,
omnino glabra, basi crassiores, ceterum subcylindricae, obtusiusculae, pedicellis
glabris, nectarium ortum sat crassum ter superans; styli pedicello duplo
brevior, glaber; stigmata brevissima, crassiuscula integra; squamae lingu-
latae, testaceae, glaberrimae, vix superant capsulas.

Obs. Haec species quoad habitum, formam, consistentiam et glabritiem folio-

rum ad S. amygdaliam ita proximae accipit ut vix, nisi antheris longi-
tudinis et gracilitatis, pedunculo nullo foliato infixis tute distinguatur! Folia tamen non subtus reticulata-
scaberrima!

7. S. viridula And. - anthera (mascula) breviter pedunculata, foliis paucis suffulta, arrecta,
subsessiflora, cylindrica, acutiuscula, ^{e basi} ~~subsessile~~ floribus; rachis caryocera hirsuta;
squamae oblongo-spathulatae, pallide testaceae angulosa, quovis glabrae, apice rotun-
datae; stamina gemina, filamentis liberis squamas duplo superantibus pallidis, an-
theris sal vixis, rotundis; folia fere pollicaria, 1/2 pollicem lata, subsessilia,
exade ovalis, basi subrotundata, apice nonnumquam parum producta, margine

integra vel ~~sub~~ serrulata, serraturis acutis glanduligeris adpressis, utriusque gla-
berrima ~~in~~ pallide virescentia, per venas anastomosentibus pulchre reticulato-
areolata, subtus parum pallidiora. \rightarrow ⁴⁾

Herb. ad Yokohama Japonia
leg. Williams & Morrow.

Si quidam nostratum sit comparanda *S. hartata* quoad habitum proxima.
Tanta ~~partem~~ ~~panem~~ ~~prope~~ ~~agnum~~ ~~el~~ ~~in~~ ~~capibus~~ ~~caeseris~~. ~~T~~ utriusque folia
ovalia brevissime petiolata, ~~in~~ ~~parte~~ ~~virescentia~~, ~~praesertim~~ ~~subtus~~ ~~pulchre~~ ~~reticulato-~~
~~venulosa~~; ~~an~~ ~~ta~~ ~~et~~ ~~etiam~~ ~~haud~~ ~~distin-~~ ~~ctis~~, ~~sed~~ ~~quam~~ ~~concolor~~, quare etiam
S. amygdalinarum nonnulli referunt.

8. *Salix Sieboldiana*, Mume. Bijdr. N. p. 517. Asa Gray: Plants collected in Japan
(Exposit. to Japan) p. 319.

amentis sessilibus, nudiusculis, erectiusculis, unisporis; squamis lanceolato-linearibus,
testaceis, concoloribus, utriusque folii conspersis; capsulis coriaceis cartilagineis, pediculis
rigidis albo-cinereis inferne dense hirsutis, apice glabrescentibus fuscis, periclyo
hirsuto nectarium duplo superante, stylo producto; stigmatibus integris; foliis
obovato-ovalibus, utriusque glaberrimis, subtus opacis, margine acute glanduloso-
serratis.

Loca apud Blossum?

Herb. ad Hakodadi Japonia ~~Asa Gray~~ leg. Williams & Morrow
(Herb. Asa Gray)

Arbor. Rami cortice fusco-glauco siccitate obsidite. Folia 1/2 pollicem longa,
superius medium vix pollicem lata, exacte obovata, apice recto nonnulli pro-
ducta, margine acute serrata, serraturis subaristatis glanduligeris utriusque gla-
berrime, superius obscure viridia, venis elevatisculis striata, subtus pallidiora
subpalescentia, costa et venis prominulis pulchre reticulato-venulosa,
petioli 1/2 pollicem longi, glaberrimi; Anthera (femina tantum vix) pallidiora,
cylindrica, acutiuscula, unispora, cinerascens; bracteis paucis et minutis
suffulta; rachis villosa-hirsuta; Squamae linear-lanceolatae obtusiusculae
^{concoloris}
ut videtur persistentes, capsulam fere dimidiam aequantibus; periclyo parvis

nectarium crassissimum duplo superante albo-hirtus; ^{inclinat longis} capsula (conico-striata, ventre
pilis rigidis albis condensatis hirta, rostro glabro fusco; stylus prodestus pedicelli
longitudine, etiam glaber et fuscus; sed stigmata sat crassa, fulvescentia, integra.

* linae ⁵ longiores

A specibus in Europa cognitis sat longis recedit, nec omnino certus sum
cui potissimum haec maxime affinem credam. Quoad formam antherarum et
etiam foliorum S. physicefolia quodammodo similis; capsulae autem ^{multo} brevius
pedicellata, (albo-striata) ^{beni} et repens concoloris!

9. S. vulpina And. - Diandra, antheris subsessilibus, bracteis; squamis acutis,
apice nigricantibus, utrinque pilosis pilis rufis intus hirtis; foliis obovatis,
oblique acutis, serratis, utrinque glabris, subtus pallidioribus.

Des. of 22 Yokohama Japoniae leg. Williams & Morros (Hb. Asa Gray).

Index videtur sat altus. Rami medio crassi, dense foliati, cortice
fusco-castaneo nitenti adnatis. Gemmae 1/2 lin. longae, etiam castaneae, glabre
nitentes. Folia subsessilia, petiolo brevissimo planis alba glabrescente in
dentia, juniora exacte obovata et minuta, praesentim subtus villosa tenui
rescente-pilosa et facile caduca obtecta, adulta fere ^{pollicem} longa, supra
mediam 3/4 pollicem lata, basi angustata, obovato-elliptica, apice parvo
nuncius producto saporitine obliquo acutata, margine sat distincta, et
profunde et aequaliter serrulata, supra obscure viridia, costa albescente-pubente,
ceterum glaberrima, venis regulariter arcuatis percursa, antheris pallidiora, costa
et venis distinctioribus pulchre venulatis, omnino glabra, exsiccatione subnigrescentia.

Amata (mascula tantum vis) 1 1/2 pollices longa, 2 1/2 lin. crassa, exacte
cylindrica, obtusa, subflexuosa, erecto-patentia, densiflora, basi foliis ^{paucis}
paucis 2-4 suffulta; squamae 1/2 lin. longae, et ovatae basi acutiusculae, apice
nigrescentis ^{et et} subcalvescentis ceterum utrinque pilis sat longis rufo-ferrugineis
hirsutis; staminibus geminis, filamentis squamis duplo superantibus pallide

flavescuntibus, foliis superne crassioribus, antheris lat. magnis rotundatis ~~foliis~~
~~liber~~ aurantiacis

A specibus omnibus mihi capitatis aperte recedit Japonis capsularum
 referentis. Quoad forma S. nigricanti, in Europa vulgarissimam, ^{certe} ~~certe~~
 proxima.

10. S. acutifolia Wied. Sp. 4. p. 688. - ?

Ad hanc speciem non ~~hinc~~ ^{hinc} multa hesitatione specimina quatuor parva
 et incompleta ad Hakodadi Japonis a Williams & Morrow lecta (1886.
 An (Graz?) referre coactus sum. - Rami cortice videri nitente cupreos
 obtundit. Gemmae maxime glabrae. Antherae ♂ fere tripliciter de 7-4 lin.
 crassa, dimissive de longe ^{causa} ~~causa~~ hirsuta, corollae adpressa, et gemmae
 magis erumpentibus nullis foliis suffulta sed omnino scabra; squamae
 acuta, atque pilis longis lucidis cinereis-flavirgantibus obtecta; stamina
 gemmae filamentis longis pilos squamarum superantibus albis, antheris
 minutis rotundatis; folia (novella tantum videntur) lanceolata, graciuscula
 et plana, integra vel absolute vixime serrulata, parte ad lucid viridia.

Holmeid d. 13 Febr. 1889.

N. J. Andersson.