

中醫藥學研究

對療之云後都中空亦經大張而劉批之書尤精究焉。研讀既久見理愈明興越亦愈增。乃奮然起曰此庶活人兩也吾將終身之矣時

於法所小國興竟事方精經公墓周已歸道山。江北名醫如馮化之任仲孫真武廟之義舟。楊州之戴謙之誠。時所謂達士

國及不帶子醫診故三詣順富者皆樂與先生為忘年交。而不敢抗顏為先生師。適經方大家張公並潤周返揚州。時所謂達士

醫藥達謂則報主醫務。李得其真傳。然先生亦復而白喜曰。公實吾師也。遂以師禮事之。張公甚於國學於詩文古詞。故於教讀之餘。慨然若不足。復遙從惲公戴謙陳公潤雷以捷於影響。蓋深

物方劑之貢獻當非淺鮮也。致力最勤。著有國藥肝膽方劑學及診斷學三稿。現在整理中。



樊天徒先生小傳

樊先生名哲。字天徒。江蘇丹徒人。其先世避洪楊亂。輾轉遷於楊州。遂家焉。大父柳湖公。遇於醫。善用仲景方。於清代名醫千卷。稿藏於家。未刊行。父鴻湖公。早世。先生幼孤。未及世具傳。然天資超敏。界常人。十四五歲時。即以能文名。楊州名醫劉公。墓周為柳湖公之間葉弟子。愛先生之頤恭。欲導之治醫。謂可以繼祖業。時先生年方弱冠。才名籍籍。問字之事。不絕於門。意氣甚豪。不遠於際。然以劉公之時。固已心焉曉之。故於教讀之餘。慨然若不足。復遙從惲公戴謙陳公潤雷以捷於影響。蓋深

古義新知。兼收並蓄。經方時方隨宜而施。膏肓之病。益多時。預決死生。見服於濟。又嘗任江都縣國醫學。研究會務。常理事。當時同邑老醫工。無不以中醫之坂徒視之。蓋先生實為其核心。實堪補西醫之缺。故先生於證西醫而江都之生得莫下多時。

從先生遊。近年來江都之志。中醫已泰半能通新醫學。說風氣為之一變。先生實為其同化。其能保存中醫精神於不替者。無非是賴。云故先生於證西醫而江都之生得莫下多時。

本期刊要目

論 補 血 鈎

內 科 學

流行性感冒

壽 守 型

陸 淇 雷

蔣 穎

徐 俊

許 小

士

蕭 逸

陸 伯辰

譯 德

龔 廉

孫 年

董 德

懋

急 性 肺 炎 的 探 討

白 苓 藥 之 研 究

增 訂 產 科 心 法 按

和 漢 藥 效 便 覽


先 樂 山 公 醫 學 人 之 程

實 用 臨 床 不 診 斷 學

蘿 蘆 醫 話

第三卷 第二十期

出類拔萃之天然大補品



長命牌

補九針

維他賜保命

市上補品雖多而長命牌維他賜保命始終推
稱為補劑中之權威。盛銷海內外十餘年功效
獨偉何哉。緣本品之煉製事實非易須將動物
睾丸中提出荷爾蒙 HORMONE 緊成結晶體並加
入乙種維他命結晶體 VITAMIN BORSTINE 及各種名
貴有機精素再經單光管之機械方克製成。倍
擅以鉅資備置科學設備採購標準原料更聘
請藥學專家及化學師多人以最完善之人力
財力悉心製造故出品得日益益晉。

主 治

神經衰弱：希司脫利：病後產後
腰痠背痛：
生育艱難：調理各症：貧血瘦弱
藥分男用女用各有丸劑針劑二種

上海信誼藥廠監製

各大藥房均有出售

論補血針

壽守刑

之藥理學，生理的身體，其全身組織中無量生處不含砒，表皮及表皮組織中尤多，其為理之必要品，概可見，今取砒石之極少，使身體諸組織，乃能增殖，就中最顯著者，皮膚營養佳良之狀態。其醫治效用，乃利用其能促進同化作用，得由此而變更其營養，及物質代謝之常調也（解見後）。以中醫所記之藥性觀之，則砒為熱毒草之品，燥烈之物，可治沉寒痼冷之疾（本可截瘧，與今六〇六治螺旋菌之說甚符）。以近代藥理觀之，則砒能授予牛體細胞一種刺激，使細胞之活力增強，而可加速度促進其同化異化作用，吾人於此尙宜首先明其所指之同化異化作用，究為何狀？然後始可澈底明悉砒劑之藥理，而所謂補血或清血之意義亦可了解，茲摘生理學家言以說明之。

質作用後，究與人體為不同類，不同類之物質作用，雖具有營養價值，仍不能補充身體之消耗，惟細胞體內之原漿（即原形質）及核，則具有一種天賦之同化作用，能將異體類之營養質而同化之，於是身體之消耗為得補，而營養質所蘊蓄之能力，亦即潛伏吾人之體內，然後以供再度之消耗焉。

（二）異化作用。人謂營養生活經遇一度變化始克散出，即營化是也。經營化後，即物質分散，而潛伏之能力於是發現，身體內之物質亦同此而被消耗，吾人體內營此種作用者，厥惟細胞，因其身內同成分之物質為異狀態之能力，故名曰異化作用。同化作用，一名組成作用，一名分解作用，與無機化學上之還元營化作用無以異，在有機體中，乃易為同化異化。

身體細胞，必不斷交互通此兩個作用，始免保其生活之常態，蓋即體內物質之新陳代謝也，簡言之，體內物質之化學變化也；而以細胞主其事，細胞體內之原漿及核，尤為此項作用之中樞，生物學家有言，生物體內之一切生活機能，如細胞之增殖，生物素及刺激素之生成，以及由礎基使酸結合成組織蛋白質之作用，氧化身體成分使現勢力之作用等，推其本原，皆由細胞原漿及核之作用而起。

此劑之作用，上述為授身體一種刺激，使盛旺其同化作用或異化作用，而改變其營養及新陳代謝之常調，吾人依同化異化之作用○○○而推究之，是必為予身體細胞一種異常之刺激，使細胞天賦之同化速度異化為身體之本質，而另一方面則又加速度同化為身體之本質，而另一方面則又加速度分解其本質而為能力（如溫，動等），（故服此者能耐寒）如此加速度化之組合分體細胞負担異常之勞作，其細胞本身之物

內科學——流行性感冒——

續

陸淵雷

、凡時方之組織，大抵不出此例。
熱、桔梗、葛根，名香葛湯，治感冒暑
傷寒，方。——香附、蘇葉各一兩，陳橘皮二兩，甘草一兩，加桔梗、白芷、黃芩，名芎芷香蘇散，會世榮活納心書，更加桔梗咳嗽，日人近本於原方加

右竹葉三七片薑水煎。
宋葉大廉錄驗。武湯
一發散四時不正之氣，及傷寒未
分證候，瘡疹欲出未出，並宜服
之。方：桔梗、荆芥、薄荷、紫蘇、
乾葛、甘草、瓜萎根、牛蒡各等分，
右水煎。

六書冲和靈寶飲——治兩感
傷寒，以陽先受病，多先以此湯探
之，中病即愈。方：羌活、防風、川芎、
生地、細辛、黃芩、柴胡。

，咳伏易湯水兩，白芍藥六兩，細辛二兩，右
皆嗽茶簡無麻黃，於本方去陳皮加人參、桂、橘皮耳。王磧覆

聖濟柴胡鱉甲湯——治傷寒
潮熱不解，或時作寒如瘡狀，方
甘草五錢，右薑水煎。淵雷按
類似壞病之譯，其衡法四分爲兩
分，故三分卽四分兩之三，半兩卽
二分，又丹波氏之經驗，此方加
胡黃連奇效。

濟腹悶痛，大渴喘乏。方
芍藥、麥冬、柴胡、澤瀉各
三分石羔兩半，黃芩甘草各半兩

日不解，心躁煩亂，小腹脹急，
又八味知母湯——治傷寒數

千金杏子飲子——治暴熱嗽。
方：杏仁四十枚，柴胡四兩，紫蘇子一升，橘皮一兩，右水煎。——淵雷按：方中柴胡依近世藥法，常用前胡，唐以前二胡用法不甚分別。

貝嗽。方：欵冬花二兩、桑白皮、甘草各半兩，知母一分，杏仁三分，右水煎。治肺感風寒，五味子、紫蘇葉散。本車紫蘇散。治肺感風寒，右水煎。杏仁、桑白皮、青皮、甘草各等分。

中國醫藥月刊

第三卷 第十二期

第十二期

2

又細辛湯——治肺虛實不調，鼻塞多涕，咽中有涎而喘，項急或痛；細辛、半夏、橘梗各四錢、茯苓一錢、桂枝三錢、甘草二錢，右薑四片，蜜半匙，水煎溫服。按：此治肺弱人因外感而咳者，故曰虛實不調，實即外感也，方意仍專治外感，不補肺，常例固爾。咳止後必須補之，否則易感而屢咳，往往遂成肺勞。

用煎劑甚效。以上治呼吸器型。
簡要半胃散——治胃氣不和
朴三兩，陳橘皮二兩，甘草一兩
右煎水煎。——淵雷按：此爲後世派治胃腸病之祖方，由此加減方者極多，如幼幼博濟加乾姜，名厚朴散，治小兒外傷風冷解肌，易簡一法加茯苓、丁香，治胃寒嘔吐，又加縮砂、香附子，

又四君子湯——治氣虛寒，藏府怯弱，心腹脹滿，全不思食，腸鳴泄瀉，嘔噦吐逆。方：人參、甘草、茯苓、白朮各等分，右水煎。——淵雷按：此治胃虛證，危亦林得效。方加陳皮、半夏，名六君子湯。要加藿香、縮砂、香附子，名香砂六君子湯。

生薑、草果、乾葛朮陳皮、茯苓、白芷，右水煎。
熱頭疼，噫氣作酸，腹硬脹滿，傷於食，身
瘡來逼迫，作聲下墜，臭甚如抱壞雞子穢氣，脉來沉實者：宜用
神薑、山楂、連翹、陳皮、半夏、茯苓、麥芽、蘿蔔子，肉桂加
草菓仁，傷酒加黃連、葛花、砂仁，氣虛加人參、白朮。——以

治中脘痛塞。楊氏白水作煮水，加縮砂、丁香，名丁香平胃散，溫和脾胃，進飲食，止腹痛，療泄瀉。方考加神麩、麥芽，名加味平胃散，消宿食。回春去厚朴加香附、枳殼、霍香、砂仁、木香，名香砂平胃散，治傷食。心悟加沙仁、霍香，名神朮散，治時氣發熱，傷食停飲吐瀉等症。局方不換金正氣散，治四時傷寒瘴疫時氣，霍亂吐瀉。方：卽平胃散加半夏、霍香。

又八解散——治四時傷寒及勞傷過度，飲食咸味。方：人參茯苓、甘草、陳皮、白朮、霍香、半夏、厚朴各一兩，右薑藥水煎。丹波氏於本方加羌活，治虛人感冒。

內傷生冷發諸證；及惡寒者，卽四君子湯用蒼朮，並加附子，加陳皮、厚朴、藿香、半夏、草果、烏梅水煎。或發寒瘲，或感寒疫。
宣明白朮調中湯——治中寒痞悶急痛，寒溼相搏，吐瀉腹痛方：白朮、茯苓、橘皮、澤瀉各半兩，乾薑、官桂、砂仁、藿香各一分，甘草一兩，右爲末，白湯化蜜少許調下。
經驗祕方調中散——治飲食過度，胸膈不利，嘔吐吞酸肚疼方：人參、茯苓、白朮、藿香、砂仁、甘草各一兩，木香、乾姜各四錢，香附二兩，右爲末，薑棗水煎湯調下。
回春內消散——治過食寒硬

蘇沈五積散 治內外感寒
和一切氣，通血絡。方：蒼朮
白芷、桂枝、甘草、麻黃各三兩，陳皮六兩，當歸
乾薑、厚朴各二兩，川芎兩半
芍藥、茯苓、半夏各一兩，肉桂、枳殼各四兩，右荳蔻水煎。
續易簡後集云：陳無擇去麻黃，
名和氣飲。

雞峯和解湯 治血氣虛弱
外感寒邪，身體疲倦，壯熱惡弱
寒，腹中疼痛，鼻塞頭昏，痰多咳嗽。
大便不調。方：芍藥、桂枝各二兩，厚朴、甘草、乾薑、白朮各一兩，人參，茯苓各兩半，右荳蔻水煎。丹波氏經驗，去厚朴加桔梗用之。

心悟止嗽散——治諸般咳嗽
桔梗、荆芥、紫苑、百部、白前各二斤，甘草十二兩，陳皮一斤，共爲末，每服三錢，開水調下。——溫雷按：此方治輕證咳嗽不發熱者之善方，改此。

大腹皮、白芷、紫蘇、茯苓各一兩，半夏、陳皮、厚朴、桔梗各二兩，霍香三兩，甘草二兩半，右薑水煎。——溫雷按：三方仍是平胃散加味，皆用藿香，半夏，夏日之流行感冒，多適用之，蓋夏日消化力弱，故感冒多見消化器型之證，時師所謂暑溫者是也。

之物，或嘔吐痰滿脹痛。方：陳皮、半夏、茯苓、香附、山楂、神龜、莪朶、三棱、乾薑、砂仁、枳實。右水煎。

實、神龜、山楂。
方脉撮要——治傷飲食油膩瓜果，酒麵乳茶等物；砂仁、蒼

頭疼體痛，兼治痰氣上壅，咽喉不利。方：前胡、人參、紫蘇葉、乾葛、半夏、茯苓各三分，枳殼、陳皮、甘草、桔梗各半兩，右薑棗水煎，局方有木香，而要訣名爲冲和湯，治傷酒，澹寮集驗方去前胡、人參，加川芎、柴胡，名十味芎蘇散。——以上治三型併發

之物，或嘔吐痰滿脹痛。方：陳皮、半夏、茯苓、香附、山楂、神鈿、莪朮、三稜、乾薑、砂仁、枳實。右水煎。

簡明醫要二陳平胃湯——治胸膈痞塞，吞酸噯氣，恶心嘔逆。方：卽二陳湯合平胃散，加枳實、神鈿、山楂。

方脉撮要——治傷飲食油膩瓜果，酒麵乳茶等物；砂仁、蒼

頭疼體痛，兼治痰氣上壅，咽喉不利。方：前胡、人參、紫蘇葉、乾葛、半夏、茯苓各三分，枳殼、陳皮、甘草、桔梗各半兩，右薑棗水煎，局方有木香，而要訣名爲冲和湯，治傷酒，澹寮集驗方去前胡、人參，加川芎、柴胡，名十味芎蘇散。——以上治三型併發

之物，或嘔吐痰滿脹痛。方：陳皮、半夏、茯苓、香附、山楂、神鈿、莪朮、三稜、乾薑、砂仁、枳實。右水煎。

簡明醫要二陳平胃湯——治胸膈痞塞，吞酸噯氣，恶心嘔逆。方：卽二陳湯合平胃散，加枳實、神鈿、山楂。

方脉撮要——治傷飲食油膩瓜果，酒麵乳茶等物；砂仁、蒼

頭疼體痛，兼治痰氣上壅，咽喉不利。方：前胡、人參、紫蘇葉、乾葛、半夏、茯苓各三分，枳殼、陳皮、甘草、桔梗各半兩，右薑棗水煎，局方有木香，而要訣名爲冲和湯，治傷酒，澹寮集驗方去前胡、人參，加川芎、柴胡，名十味芎蘇散。——以上治三型併發

要述疹痘

(續) 各論

南頌詩

，而盛點，閉之有紫片青
如淡，，乃不先五者如藍
指紅斑初於能忽，，雲，
頭者盛出肚發輕

(二七)夾斑
小顆粒者也，有點色而無斑
有紅，有散有塊聚其色，大有
小如蚊，咬蚤斑者，凶大有
以凸起者，斑色紅而未及
紫變爲青藍者死，班症
爲一熱閉發斑」，未痘症
發大熱，毒盛元虛血爲熱
於四肢，肌肉成顆作粒
如蚤咬，紅斑處滲出血
則痘瘡，若斑見筋頭必
可治，黑色者三日必治
漸變，如三日不治，二日必
治，二日必見紫色大斑，爲

(二六) 痘中黑紫乾毒，乃血熱量者，即暴疔硬，若內有床，額黑窩，內陷漿，痘閉氣痘張也。根而無有二者，疔準有點舌觀見醫時，則不諸凝疔獨。者非硬一陷種所，頭黑，上其筋後有諸能，毒熟也。大痘，疔根硬進，不此有點陰必天骨有疔痘出未滯，乃血熱量者，即暴。卽也，根黑有可觀黑，裏有庭者，疔則不現，成痘疔毒盛，硬疔是泡若血高知之，腋必疔地點危脹必齊疔，有則能，卽母色熱是，如也法四必疔，角，症坑致，倒行疔諸能亦白焦疔，捻痣，肢必疔兩有心也，倒行疔諸能非無紫，之者疔隨必疔兩有心也。

獨僅宜其疹可也。
（二九）夾胎
妊娠最忌出痘，蓋熱能動胎，胎落則氣血因之而傷，痘必動不能起發灌漿而命危矣，故妊娠出痘始終以安胎爲主，不可輕用犯胎之藥，以致觸動其胎。
（三〇）夾產
妊娠出痘正在起發灌漿之際，只宜大補氣血，若腹中微痛者，忽遇坐草分娩之期，產後無他恙者，此惡露未盡，宜略行之，人方產之後，或半月十日之間。

於指陰可發，渾斑起，杖兒而一
於此甲症治脈班所身一脅，內四乃未成血熱
於肺，已卽熱班，發班，乃皆發，洪者謂毛，下腰已腐爛，腫或一
傳無根，紫有必跡滲出，元虛不能勝，是逆血經
傳於皮膚失守之火，其必色紅爆者點，眼氣班下發跌撲，班盛
於二八夾疹，其中，又有顆粒，則不鼎峻，痘出而夾細
瘡，謂之兩虎蹲，痘瘡，蓋宜細

(一) 治法大要
後見點通常痘出之順序發熱三日而起脹蒸長，而後收
醫自發而後貫膿，三日而後收
此結醫自發而後貫膿，三日而後收
可當痘以此結醫自發而後貫膿，三日而後收
痘者催顏則出可用微自鬆，皆以三日而後收
溫不發隱法而矣和與排者，皆以三日而後收
肌點不充足，毒補出散隱一變而變，氣十膿，膿色無清涼，者補易肌治痘之順序發熱三日而起脹蒸長，而後收
患邪未然恐，盛之七，不例通知者此血一俾涼爲轉壅滯則四忍其出解痘之順序發熱三日而起脹蒸長，而後收
齊得補出，必難而隨其特，二，血主潤滯則四忍其出解痘之順序發熱三日而起脹蒸長，而後收
而愈火少爛氣漿解痘之順序發熱三日而起脹蒸長，而後收
大毒用斑血，毒，涼解設治急痘，，收斂則毒溫長七日，而後收
熾漿反，性，大毒用餘漿劑於，兼有甘溫勿收此
未清藥患，兼解二日用補，滯宜泥常者可必
之至中四可重當守其常者可必，調

下編 治療
毒，適逢出痘，雖無胎孕之繫累，
涼之劑，惟宜大補氣血，不可妄用寒藥，致傷生發之機也。

喜散，在後必成，斑爛出未齊者，
喜於寒涼則痘必遲滯，不出毒未
盡者，偏於溫補，則毒盛不能化癥，
用藥如用兵貴有節制而隨機應
變，必存乎其人耳，茲將用藥禁
忌列舉如左。

「人牙」性烈發表太過，內
動中氣外增，潰爛體虛者禁用。
「山梔」性寒降火，氣虛者
便濇者禁用。

「大黃」蕩滌實熱，胃虛食
少者禁用。

「只壳」下氣寬中，多用則
損中氣，能令泄瀉氣虛下陷者禁
用。

「升麻」「葛根」升發開提，
多用致表虛，而痘反不長，痘
出者禁用。

「山楂」消導解結，多用恐
致內虛，胃虛不能食者禁用。

「牛夏」消痰止嗽，燥渴者
禁用。

「黃芩」「黃連」大苦大寒，
內傷脾胃，外水肌肉非火質大寒
者禁用。

「人參」「黃耆」補氣助火，
虛症則宜毒熟壅盛者禁用。

「紫草」「性寒，便濇則忌。」

「蒼朮」「白朮」燥濕健脾，
潤濕之氣，不行血，熟毒盛則
忘。

「猪苓」「茯苓」「車前子」
皆利水滲濕之藥，多
用恐耗津液，溺多則忌。

「烏梅」「調子」「龍骨」
皆阻塞肌腠，使毒不得

漸開痘漸起無裏症者。	桔梗	歸甘草	連翹	牛蒡子	當
角刺。	川芎	防風	紫草	姜蠶	
用加筍尖，鯽魚，長流水，煎服，					
或用鱠魚血，和淡酒五七匙，冲					
服，虛加人參，便濇去筍尖紫草					
用薑。					
第五方扶元飲 治痘兒體弱					
，頂平，色淡，或灰暗內症食少					
，吐瀉或悞汗，悞下悞用清涼等					
患。	人參	黃耆	當歸	木香	炙甘草
草。					
用嫩公雞一隻，不見水去毛					
糰腸，煮濃汁與藥相間而服，或加					
糯米同煎，或加酒母數匙皆妙。					
第六方養漿飲子，治痘七八					
朝漿，色清淡頭面微腫，漿行未					
足，及周身未大起者，只宜溫養					
其漿自厚，人參黃耆炙甘草					
當歸川芎姜蠶角刺防風					
觀以上六方之命名曰，疎痘。					
可謂執簡取繁而大體備矣，然病					
有萬變，藥亦有萬變，安可執少病					
以備採擇。					
(一)透表之劑					
葛根升麻葛根湯金鑑升麻					
青皮荷升麻葛根湯金鑑升麻					
加人參，小便短赤加木通，大便					
青皮，小便短赤加木通，大便					
加人參，小便短赤加木通，大便					
荆芥牛蒡子防風，小便短赤加木					
薄荷煎服。					
(四)處方					
身熱無汗加麻黃，山楂肉形氣性弱加					
內熱甚加犀角，黃連，小便短赤加木					
薄荷煎服。					

通，滑石，車前子，鈎藤，鈎川，黃連，羚羊角，防風，枳葉，苦加桔梗，白加桔梗，半夏，下利，加前胡，桔梗，杏仁，加枳壳，桑皮，傷食，加山楂，麥芽，活子嘔，蘇子，加枳壳，急加桔梗，半夏，射干，偏身酸疼，加羌活，正川連，獨活，頭痛，加黃芩，黃連，作羌活，加川連，羌活，生薑，多喘哭，加木通，川芎，北防風，黑樅仁，吐舌，加荆芥穗，表邪透痘疹，初熱將出未出，散表邪，透痘疹，初熱將出未出。

燈連脫枳桔	出澀紅臉	，冬粉甘而石小元乾便加胡	芯	紅花	小譖際	正赤緊山點	，傷山
芯	壳梗	未者，赤泄，草喘瞿瞿便參峒黑竹，爲連	連	桔梗	便語，適便語，	二色身查	食加山楂
水荆連欵	寬出，煩毛適瀉嘔煩鼠加麥短山山加加葉毒加引翹	山	當歸	滿，痘疹初熱及見點之症	三日間出不快利加牛蒡子；	三日間出不快利加牛蒡子；	加山楂
煎芥翹炒前中	此血欲色證加猪朶子壳前大便便祕加猪朶子壳前	川芎	赤芍	腹滿，腹脹煩躁，狂言	退，名透肌散，皮急肉	退，名透肌散，皮急肉	見神櫻，見
服穗去胡透	並皆治之。心南毒治	丹皮	木通	不寐，驚啼多哭，大	地，葛根，前胡，皮急肉	地，葛根，前胡，皮急肉	地，葛根，前胡，皮急肉
。生山青皮	(金鑑)	腹皮	燈芯	面浮，眼張怒熱，大	，丹皮，紅花，去白	，丹皮，紅花，去白	，丹皮，紅花，去白
生甘草	厚朴			毛堅不寐，驚啼多哭，大	爲風寒所搏而出不快	爲風寒所搏而出不快	爲風寒所搏而出不快
子引炒加生	葛根			面浮，眼張怒熱，大	利，前胡，皮急肉	利，前胡，皮急肉	利，前胡，皮急肉
黃芩				毛堅不寐，驚啼多哭，大	，葛根，前胡，皮急肉	，葛根，前胡，皮急肉	，葛根，前胡，皮急肉

者宜用本方	荆防解毒湯(集成)、官揀參
北防風	荆芥穗、桔黃芩、牛蒡子
荆芥	荆芥穗、桔黃芩、牛蒡子
芥穗	荆芥穗、桔黃芩、牛蒡子
芥子	荆芥穗、桔黃芩、牛蒡子
潤元參	川黃柏、生甘草
連翹	綠升麻、生石羔、淨竹葉爲引水煎服
適應証	痘出夾斑疹者宜用
此方	涼血攻毒飲(金鑑)
涼血	大黃
荊芥	木通、牛蒡子炒
穗	赤芍
地黃	青皮、蟬脫
生地黃	丹皮、燈芯爲引水
葛根	葛根
紫草	丹皮
煎服	煎服
痘火	適應證
內盛者	宜之
痘已見頭身熱不退	必勝湯(金鑑)
痘火	大黃
適應證	赤芍
地黃	青皮
穗	生地黃
本通	山楂
地丁	桃仁
蟬脫	紫花燭
葛根	紅花
蘆根	地龍
爲引水	地龍
煎服	蘆根爲引水煎服
不見	適應證
毒氣內陷者	以此攻之
痘點已出復沒隱滅	紫草飲子(金鑑)
痘點已出復沒隱滅	紫草、蟬
痘點已出復沒隱滅	人參穿山甲炒
痘點已出復沒隱滅	枳壳鈍炒
痘點已出復沒隱滅	木通水煎服
適應證	痘粒頂平不起根脚
此氣虛不能領毒而痘難宣發	柴胡前胡
也以此治之	連翹澤鴻黃連
鬆散	適應證
此氣虛不能領毒而痘難宣發	水肌散金鏡
以此治之	水肌散金鏡
能減少出痘	水肌散金鏡
適應證	水肌散金鏡
後熱勢尚重	水肌散金鏡
痘出甚多	水肌散金鏡
服此	水肌散金鏡
水煎服	水肌散金鏡
陳皮	紫草化毒湯(金鏡)
水煎服	紫草化毒湯(金鏡)
升麻	柴胡前胡
小便亦加木通	柴胡前胡
適應證	升麻甘草葱白爲飲引
痘疹已出未出熱擁	升麻甘草葱白爲飲引
並服之	升麻甘草葱白爲飲引
(未完)	升麻甘草葱白爲飲引

急性肺炎的探討

蕭俊逸

急 性 肺 炎

昏譯語，或昏迷不語，目遠肢搖

角，至寶丹，以鎮靜清腦。爲寶丹清腦消炎外，還有強心作用，熟性肺炎，即在沒有腦症狀的時候，也可以使用，一方面可以強心，一方面可以消肺炎，並且消肺炎的力量很大，非安福消腫膏所能企及。中藥的藥效作用，是有共通性的，能消腦炎的，也能消肺炎，能消肺炎的，也能消腦

炎。

若脈微肢厥，頭胸獨熱，則係心腦肺俱病，當於前藥中，再加人參，或西洋參以強心，然病候至此，十難救一。茲錄吳琢之先生驗案如下：

民二十年余在南昌時，舍姪年甫歲餘，患肺炎合併腦炎，又兼心臟衰弱，其症神昏抽搐。兩脈微指冷，舌微灰黑，險象環生

痢疾的前驅症怎樣鑑別治療

俊逸

無論什麼疾病，當牠的真面目沒有暴露以前，都有牠的前驅症表現出來，在此時，吾人苟能細心鑑別，予以合理的治療，則潛伏欲發的本病，自然退避三舍了；雖不能算「上工治未病」，也可說見微知著，消滅痛苦於無形啊！

痢疾初起，有食慾不振，腹微痛，大便洩瀉，或溏瀉的前驅症；這是腸粘膜起紅腫的病變，簡直說，就是腸子發炎的開始吧！此時腸粘膜不過有些紅腫，尙本至於潰爛，是痢疾將成的時候，苟能予以一二帖的情腸消炎劑末，痢疾便不成功了。若不此之圖，而來一帖「不問病不病，一帖藿香正氣」，或「胃苓散」

不費思索的成方，則惟有促進腸粘膜的炎症，由紅腫而至於潰爛症表現出來，在此時，吾人苟能細心鑑別，予以合理的治療，則潛伏欲發的本病，自然退避三舍了；雖不能算「上工治未病」，也可說見微知著，消滅痛苦於無形啊！

「藿香正氣散」和「胃苓散」，不知此時已焦頭爛額了！生都說：「病已轉痢，當從痢治」，爲什麼不對症呢？因爲這個方子，是應付「因過食油膩，腹部感受寒冷，而致腸內酸醉洩瀉」的祛寒制酵劑，而痢疾的主要前驅症「洩瀉或溏瀉」，是腸炎的病變，那二方祇有「祛寒制酵」的作用，而沒有「清腸消炎」的功能；所以不但不對症，服後恐

本病前驅症的合理療法，當用消腸消炎劑，已如上述，處方可用葛根黃芩黃連湯加枳殼，厚朴，薑肉，則前驅症自然消除，而痢疾下腹血的痛苦可免發生。

，法在不治，經吳琢之先生診治，投以羚羊角末貳分，犀角末三分，川連五分，西洋參八分，川貝五分，茅根二錢蘆根二錢，至寶丹一顆，記得方中還有香薷三分。服藥後兩小時，穩定喘平，向之痰鳴震耳，至此則寂然無聲；次日照原方再服一劑，遂從此痊愈。

民國三十二年春三月寫於吉安田侯路之診室

，投以羚羊角末貳分，犀角末三分，川連五分，西洋參八分，川貝五分，茅根二錢蘆根二錢，至寶丹一顆，記得方中還有香薷三分。服藥後兩小時，穩定喘平，向之痰鳴震耳，至此則寂然無聲；次日照原方再服一劑，遂從此痊愈。

（六月一號以後即按原價加倍收售）。（廣告）

●習醫購書之好機會●

「國醫捷徑」爲學習中醫最善之書，內容包括生理診斷內科婦科及各傳染病等，理論新穎簡明易懂，診病處方注重實用，閱讀一遍，即有治病能力，誠爲國醫之捷徑失業者救星，全部鉛印精裝三大厚冊，出版以來銷售已達數千部，現時仍按原價每部伍圓，將款寄交「津浦路泊頭站高川醫社張金鼎」，即把書籍由郵局上不誤，欲購從速莫誤良機，

奉上不誤，欲購從速莫誤良機，（六月一號以後即按原價加倍收售）。（廣告）

●習醫購書之好機會●

「國醫捷徑」爲學習中醫最善之

白芍藥之研究

許
小
士

—

科屬	產地	成性味	及名稱
藥及 屬。	本品為毛茛科， 「將離、梨食」，餘皆	有形態者， 山生者，有栽培於庭園中， 宿根簇生新苗，高至三四尺，葉複葉，其小葉往往三裂甚深，夏初莖頂開花，花大而美麗，有單瓣複瓣，其色種種，雄蕊甚多，雌蕊數枚，果實為蓇葖。	「金華」等別名。
味酸微寒。	本品含有澱粉，安息香酸，燕糖，鞣酸，白樹膠質，揮發油等。	（本經）主治邪氣腹痛，除血塊，破堅積，寒熱癥瘕，止痛，利小便，益氣。○（別錄）通順血脉，緩中，散惡血，逐瘀血，去水氣，利膀胱大小腸，消癰腫，時行寒熱，中惡，腹痛腰痛。	（甄權）治癰瘕擁氣，強五臟，補腎氣，治時疾骨蒸，婦人血閉不通，能蝕膿。
（大明）女人一切病，胎前產後諸疾，治風補勞，退熱，除煩，益氣驚狂，頭痛目赤，明目，腸風鴻血，痔瘡發背瘡疥。	（時珍）止下痢腹痛後重。	（元素）瀉肝，安肺脾，收胃氣，止瀉痢，固腠理，和血脈，收陰氣，斂逆。	（醫宗必讀）斂肺而主脹逆。

近世應用	平肝收斂	痢疾止痛	八錢。
用量	一錢至三錢。	極量可用七	炮製
喘咳，腰理不固，治中滿腹痛，瀉痢不和；制肺而主血熱目疾，脇下作痛。	醋炒。入和營藥及下痢後重，血熱癰毒藥，並生用。	入補脾藥酒炒。入止血藥。	入補脾藥酒炒。入止血藥。
單方	凡中寒腹痛，中寒作泄，腹冷痛，腸胃中覺冷等症忌之。	蠶血略血——白芍藥一兩，星角末二錢半，共爲末，新汲水服一錢匕、血止爲限。	蠶血略血——白芍藥一兩，星角末二錢半，共爲末，新汲水服一錢匕、血止爲限。
前代記載	赤白帶下——年深日久不燒者，取白芍三兩，並乾姜半兩，剉熬令黃，搥末，空心水飲服二錢匕。日再服。——廣濟方只用芍藥炒黑研末，酒調服之。——貞元廣利方，安脾經一也。治腹痛四也。○此仲景神方也。其有六味朱丹溪曰：芍藥瀉脾火，性味酸寒，冬月必以酒炒，	古今錄驗	古今錄驗

凡腹痛多是血脈凝滯，亦必酒炒用，然止能治血虛腹痛，必不可炒用，後重者不炒，產後不可用，以其酸寒伐生發之氣也。必不得已，亦酒炒用。

底熟熱汗微研，體寒診用點然理亦加則，芍桂中而咳，藥一，一之要黑之芍宜脾土，飲肝筋有下除甚酸究腫不急上芍不用由無尤無大藥枝則祛劑大，種以祛種說藥神得藥妄肺，因乎氣痕熟行煩脹，脹仁也，藥可芍，之湯之承，加無痰之青而止不痰收。耶散宜恐用自土其？之，性張，，有之不藥固也。氣而芍之劑小龍有汗用，飲湯？，，伐者爾安肝是過鼻小自能，涼錫悉疼故凝目深爲不；五而湯瀉藥。之青湯猶藥此瀉藥本惟芍亦生，安則氣以盛，便小收善多鈍得痛腹結的加配足夫苓爲，下湯止桔龍中發之藥下，求在藥又發以和金既嘗，目不便飲滋液曰治，痛充，注合以以散利大劑，瀉梗湯則汗桂爲，欲真相湯何之其之亦收言而滴利瀉上陰：之咳，實爲意劑規是，尿黃之黃劑湯中無劑枝通利使曰症，忌氣氣意得，能致，者出焦養單芍。逆頭之筋也者律項猪劑牡小芩桂，有之之湯則尿充：明非！也血，所則補陰何之，浮血煎藥，痛感肉。全單苓之丹承湯枝排芍。麻中，諸分芍確皆如，既產養木脾液一要爲越，之味下，覺之：於體純湯越湯氣中湯曠藥爲黃有故作發藥耳產仲然虛後，不胃之不藥陰之退其苦利身而獨此，之中婢中湯有，湯，鎮湯芍於用汗爲！後景用，不故尅者不由

合藥下，起明急芍用歸臍四通腹皆中加除列茲芍載，譚方赤始，用用氣療血，療者熱，而肝；當一粘裏之較迫藥枳芍婦逆脈痛用急芍腹下將藥刺有次書白能推，，血血。與目，，且益血爲歸味液急艱著，湯實藥人散四去芍痛藥痛：古爲，潤仲多二建力則則，。與當疾皆以又胆，其其，與後澁。解。芍散姪泄逆黃藥，湯，人第以腸曰用種功近翕善善與桃歸腫因除性汁爲味效變血重性於疹以藥。娠利湯芩，用主仲神用一解之：白，。和收止治甘仁地疼肝病涼，其酸更可液，下腸痛上散婦腹下，加餘小腹景農芍最急功芍以：緩元吐腹草紅黃～胆疾，爲味，顯稱狀陣利粘之芍，人中重腹芍如建痛太本藥有迫，芍。白：，陽鶴疼同花同肝之後又其苦故，爲江痛，膜效藥時產疼加補藥小中，陰草治卓疼和藥者必，，。用同用開火重善味，能但專白樣便受，對方後痛芍加。柴湯太篇稱腸效痛緩富爲芍重大與與，用，竅下～瀉酸故入性劑物腹意激可腸初腹，藥芍少胡，陽之芍之之，腸於良藥用歸附竹則，則於追病肝而能肝爲。痛頻刺謂有病痛用。藥陰湯二篇桂藥驗品當粘液，原之宅子茹調則生目）後胆兼入以潤芍，數而彰緩用，當金。篇，方腹枝能症，推膜汗故有，窟同同和消新），重之苦胆生

炎加騰搏故，明管劑利管者扶往，偉局棟之之理從非，之十氏五氏合、物郎，研去，腸。尿之亢又擴下抵者用，斯惹安大部水藥厘作略實則主七之，之量護砂學，趙能究劉芍仲，又量症進有張降抗，此令皆，起息之，楊理定用可驗因要，成而成，膜糖，一錫止，曜藥景於對，。退皮，減腹作起因則墮香功且酸作之，也的本成要續奧續據等載色痒腹芍矯之真滑於多又血熱膚又低腔用充其造胎酸效有屬用：而，報文分之報野報和質揮本直曰痛藥曰訓武脫急用能壓作血能，血，血能成者投，防，（將茲告爲，安告改告漢，發品太：，內：。湯性性之刺升用管安血管而故擴腸，之尚龐能：）國言，學至息則造，藥至油含郎日兼含據，下關往激高，以靜壓擴用也張出投於不之刺，一醫諸無理其香爲，均物安，有合人治有長井，風發臟體宜發溫之，爲是腹之於婦此，直息息載分宏討量爲分比百及香息粉和野疾息氏，寒生，溫於汗中起即通以腔素腸，已然接香證之旨論究本之奈分伊酸香鞣漢五。香等濕腎增飛心，樞顯血經有血因窒往也其之酸酸明藥，竟品二二之藤之酸酸藥七。酸之不利宜

一，飲血管膜乃聲上封相出即而走減相流。破，壞鞣部微膜者部，化胞膚鞣理之，又脫，熱庫止，之狹之作明本蓋化血所乾，分化動斯壞及死酸分菌，，分變合，上酸（學），以本之然，，限迺收小表用者余出合部謂燥是泌合性時之發之又，之此尤，爲，及，觸（學）。可興奮於險之可奏效種，過以特對於若飲，面於，譯血，，收硬以，，細局，炎所能使發種易對一而漿則於鞣酸組兩，分，皮此藥口生則飲固能能生胞部故性產殺免育被與於種生液與粘組織途與泌使膚所理，不與作，去阻沉間毛炎物生病外，膜粘衣不中其膜之，國減組及謂學可溶血用知組止灑質細症質之原來且不液膜膜溶含組。藥表且醫少織消收（以解液也覺織白樣，管可，溶菌之能獨化發，解索織或理面此飲，收化飲然止物之。麻之血物亦內以鞣細，刺保可合炎以之化表脫作用，等肝阻縮管作此血質蛋又鈍充球質與皮速酸胞當激護以而分被化合物之若作之止、等用處。自用、血之，鞣之治牙鮮細，炎防生泌融合物之經用酸出血粘，須（而質於是，遊能酸半也能素胞況症害被旺其物粗細皮：

之能作雖化低氣功用膚：內附消失細胞收後，會之也。切莫以辭句相近，而法外治，亦收奇效。
(三)揮發油之藥理作用
揮發油能為一般之刺激皮，作用外，有多少之防腐作用，則在配伍藥，並無若何損失，又可為利尿劑。
揮發油為一般之刺激皮，作用外，有多少之防腐作用，則在配伍藥，並無若何損失，又可為利尿劑。
揮發油為一般之刺激皮，作用外，有多少之防腐作用，則在配伍藥，並無若何損失，又可為利尿劑。

黃桂枝五物湯用以治血癥，大黃蟲丸、王不留行散用以逐瘀血，逐賊血，甄權謂之主治婦人血閉不通，仲景黃蓍桂枝湯用以治血癥，大黃蟲丸、王不留行散用以逐瘀血，逐賊血，皆利用其引起子宮充血，而促其出血也。本草⁽²⁾「產婦忌用」：各家有經驗上，類皆言之，此言不但極大價值也，茲為釋述如下：
（a）腦貧血——婦人經生產之大出血，血液缺少，腦部常因貧血起眩暈現象，裁本品能減少腦之血量，則主體之腦神經，將何待以亦卽古人所謂冠伐生

其擊過，然血小以談擊。攷用脚景，一爲則的腹然，一徵本擊是成是種失甘呼，亦。本品急於甘草，芍藥與桂枝，由想而芍，爲難證明耳：腹歸芍藥與桂枝湯之用，本品微本品，寒經汗；抑本矣之藥，不食主，爽師友治實，吉益等本品；治故痛覺者，至之經而東方品：然脚效覺者，其經而脚，治仲？另治此擊歟！乃脚與所驗拘洞，治仲則有瘳不急！貧與所驗拘洞，治仲

膜遂受妨礙。包庇而其滲透，一部爲膠樣物質，對於各種粘液，爲消化器，此時腸胃中，即食物之炎症狀態也。此爲粘膜，使炎症之自然治愈，即能防治，其刺亦速矣。

和漢藥

效便覽

川端勇男著
陸伯辰譯

(六)敗醬(女郎花)
〔藥效〕治腸炎症，嘔吐及下痢。
又作止血藥，對吐血，衄。

下尿瘡，遠腰者良，此物性薄，為解毒，破血，活陰，三散之藥，排膿，消腫之品，能

血等有効。

化水。其製法爲收得敗
醬草後，便搊杵之，入甘草
葉相拌，對蒸，約三四小時
去甘草葉，焙乾用，用量錢半
至三錢。

(藥效)用作鎮咳祛痰藥。Fritillarin 為八木精一氏從貝母中分離者，故即發表貝母中含有有機鹼質 Fritillarin 三(京都醫學雜誌第一〇卷第二號揭載)之報告。Fritillarin 對家兔作用：麻痺中樞神經系，障礙呼吸及自家運動之機能，侵犯心臟，減少搏動數，不完全收縮，下降血壓。往時，貝母為用作祛痰，咳嗽藥，緩和呼吸及脈搏頻數有效而著稱。

(用量)二錢。
(伯辰按)本品屬百合科貝母之根，為宿根草，春季抽莖，高一二尺，葉作長披針形，對生，二葉至數葉，但亦有卷曲之三葉，夏季每葉腋生者，莖頂更有狹小而尖狀如編笠，倒垂碧綠色六瓣花，其

編笠百合，以其根形似粟，如母之齒者，故名。其形態爲球形之四合根之作鱗狀，味甘苦，其產四川者形小而味淡，名川貝。浙產名浙貝，因於象山出而味苦者更多，故又名象貝。形大量之殼粉質，少許之苦味質貝母之有效，又名土貝。形大而味苦者，則微苦性平，功能潤肺，清火，解鬱，專作祛痰鎮靜藥，用於諸種咳嗽，妊娠之原因不明之咳嗽尤宜，爲緩和原之鎮咳劑，此外有用於煎藥之刺傷，及急性枝氣管炎。

貝母在胃不起作用，至腸即漸次被腸吸收，而入血中，使白血球進行迅速，且由末梢神經受激而達腦神經，則極易驅出，同時又使肺臟分泌減少，可免多量痰沫之釀成。
「本經」：治傷寒，煩熱，淋瀝，邪氣，邪氣痼癆，咳嗽，滿，洗洗惡風寒，自眩，項直，出汗。「大明」：消痰潤心，肺，末和沙糖丸含之，止嗽。燒灰油調，敷人畜惡瘡，歛瘡口。「蘇頌」治人面瘡。爲末可敷，煎湯可服。
貝母會經仲聖實驗，認爲主治胸膈鬱結，痰飲。如枯梗白散證曰：時出濁唾腥臭，仲聖用此一方而已。然考之本草，古人用貝母主治鬱結痰飲，旁治咳嗽乳汁不下。炎，冲逼肺氣，咳嗽痰喘。厚朴（半兩）爲末，煉蜜丸方：用貝母（半兩）一兩去心姜製，胸膈痞滿，經旬不止。二方：略。用貝母湯治諸嗽久不止。二母子大共（半夏）五十丸用。清熱勝，半夏要。

增訂產科心法按

繆汪俊樸德齋校著

略有黑色加車前子胡蘆巴以溫腎。此皆發於五臟，所以隨各臟之色，而總歸于帶脈而出，是以謂之帶。有從濕熱，雖或思傷脾，怒傷肝，慾傷腎，或氣鬱則濕，而清濁相混，以致帶脈不清，任脉不暢，故帶下也。若白物下多，亦令人成勞，成損，不可不早治，補益脾胃之氣血。又有白淫，與男人之白濁同，乃出自骨髓，令人口黃無力，骨軟少神，皆房慾勞傷者，有名曰：「妄想」，夢交而得，心旌搖動而來，輕則六味地黃湯可治，重者，如水之來，必用參黑歸脾湯，加牡蠣粉，金櫻子，兜蟲之藥治之，不然，必生瘡，經水斷而成損症也。有腹中硬塊，有時疼痛，此瘕氣也，宜調肝爲主，又有陰痛，宜加川棟子荔枝核。(一按)白淫出自骨髓，以上二方皆平正可用，加減諸

婦女以調經爲主，其外肝經之病最多，腹痛氣鬱結，每多胃脘痛，助脹，甚至癰癧，另有一女科方法，和肝養血爲先，他症一去，再服此丸，照後加減，亦多效驗。或用此丸，照後加減，亦多效驗。或用此丸，照後加減，亦多效驗。

費收乾生地，四兩水煎半熟加酒一大碗再大，芍藥三兩，三兩酒炒，白朮，四兩土炒，淮牛膝，二兩炒，炒水丹，各拌一兩飯上蒸再晒乾炒。

水熬成膏一碗，加煉蜜爲丸，銅子大，每接濟開水吞四五錢，空心服，或兩料，以便晨起，如有机他故，照後加減。

地易熟一地，如有素有腹脹，防礙飲食，或以生地，經未及期而行，或色紫，血熱也。

，加丹皮，生地，條芩。

，加肉桂，紫石英。

氣滯不調，加延胡，廣陳皮。

或肝氣不和，或多怒，加廣木香。

茯苓，山藥，血去多亦然。

，白朮，阿膠，素來多白帶者，加白朮、苡仁米，則爲青色，卽爲青帶，則加茯苓陳皮姜棗，略有淡方中加赤苓丹皮，生地。

濟坤大造丸
此朱丹溪先生之方，治氣血本弱，不能攝元成孕，或頻墮胎，及生子不壽，或孕後虛熱自汗，食少，帶多，並宜服之。益氣血，補子宮，種子神方，或服前方，使經期已調，隨服此方一料。
紫河車，一具製如前，人參，一兩切片焙乾研細和入，天冬去心，麥冬去心，各五錢，杜仲，姜汁同鹽炒，黃柏，五味子，各五錢，如虛弱多汗，加黃芪，二兩蜜炙，地骨皮，知母，各一兩。
如脾胃虛，常大便溏瀉，加白朮，二兩，蓮子，二兩俱炒。如少睡驚悸者，血少也，加炒棗仁，

桂元肉，各二兩。
〔按〕張山雷曰：頤恒見艱於子嗣者，不悟其喪失之多，日以求方求藥為當務之急，而醫家工於獻媚，樂為處方，抵掌高談，莫不自謂果有奇術，令人一索可得，究竟羅列溫補與陽數十味，欲以搜括老人垂竭之脂膏，妾冀背城借一，縱令如願以償，而先天既薄，又以燥烈之藥石助之，大熱傷垂暮之心，而苦不敢為乃翁說明源始以重傷垂暮之心，而苦不敢為乃翁說明源始，生兒必多胎毒，奇病百出，長育極難，頤已屢見之，而苦不敢為乃翁說明源始，用金石烈性之藥者，與一派大熱藥同一弊害。有用平性補藥者，可以治性神經衰弱三方，皆無此弊，蓋從本身經驗，現身說法，自較真確也。種子方不可勝數，有事服藥，亦難獲效，可從事靜坐，以法攝取先天一氣，自然生機勃發，何愁無子。他如男女有病而無生子之望者，當治其病，近世淋病花柳最多，尤須留意及此。

紫河車之藥效，在近日臟器療法發明之後，乃得確信其藥，含有大量之活血蒙子之法，無不在此，而用藥溫腎壯陽之非計，可以恍然悟矣。又他書種子方中多澀精之藥，皆非從本源着手治療之下策，久服此類方劑，變生異疾，流弊亦多。故學醫不精，見解不真，徒知一二成方，不知活用，足以償事。

汪氏云，未有心不動而腎舉事者也，語見地最高，能明乎此，養生之道，種子之法，無不在此，而用藥溫腎壯陽之非計，可以恍然悟矣。又他書種子方中多瀝精之藥，皆非從本源着手治療之下策，久服此類方劑，變生異疾，流弊亦多。故學醫不精，見解不真，徒知一二成方，不知活用，足以偾事。

蘭廬醫話

徐石年

疹傷屬赤，敷病敏輕參用，案余悉從成之。渴白，情，入救勢體隨其師見莫象熱並金愛均案旋熄正瀕屏師底臨，名，積見伯錄甚語占肝化於弱至蘊證審。

苦延滯，質醫合與勿之濁危，平者十證，學生矣科雜當僻之版葉治，醫手料用宜異稟之六臨楚已，次案拍藥藥品之，偶湖也年處不，玉其，天未驗家不建古隨其賦總經床，旬下數由於，絲，法吾患診，方泥其博余律間病輕但規士免方雖可新方機形不樞證實中納日迫多便後其絲師三，師時視憶心，古臨覽師，日描余模臨略之皆行屋治應施同紐治驗醫呆，陽而薄以殆入之四繼悉感金民心絲方證羣嘉則學沈淡尚粗證而探有也，今變，也亦報醫曠頃明腹而質近扣方劑進心，伯國相毫，也善善必者重寫嫌具指不集治，非病，治症，即告案惡復，頻轉，代，案而潤考諸質八印不亦活，陳爲倘之或其，南詳，驗竊輕猶先療情然臨也即，骨氣痛痺博之而清病肺虛醫之年，苟不發邃良藥奉案用鐵學醫，叙之謂匠之哲之傳古床，新汗節營，下雅大藥真漸清，東疾秋而，固潑於夫氏爲，藥巧者案自證紀古氏拆所法變今經仲醫頻發兩本，。匠與綿減胃始手，深余執地醫先誤金錯不怪楷出清論錄昔之舊謂理亦人驗景之

機，氣末從榮，就升，氣內而證欲稍液，三另胃論欬溫兩氣診用熟症，便傷即老肝，脈薄，陽人楓陽氣沉如邪也生斛尙與稍水熱，氣在陰起，內液主錢衝已，仍擾即讓擾有苔或，陰外煎，來轉泛議也湯姑復糙惡治，陰代再之黃，肢頃主茶

東炭澤錢芍霍瀉邪而肝，冷與陰浮，嗽便濁亡。錢鴻三石止爲多陽百由胃風灰脈惡次之陰半錢條錢斛氣佐變互骸是中火面沉，難劑，二錢枳銀錢斛擬本陰充，肢半芩四液，態相者而之，有細骨多，古診扁炭炒錢來觀，衝也來陽灼晦右節而肢有豆製錢竹復其勉擾，不潔色手瘡所未明汗穀半錢芩半炭生錢地錢三貞錢苔吉止以深受陰承液陽弦，不冷也則四新錢會川半炭錢三煅半神，養慮邪也應，明，且甚，亡錢會川半炭錢石四候然正爲灼者，衛濁舌有粘依昨陽皮棟三辰決辰錢必爲痘坐所肢外邪苔躁膩然投，澤錢子辰錢燈川八麥正得主爲令以末之引糙擾，如敷下瀉半炭滑芯棟錢冬焦。肢，厥胃榮之陽動黃之脫故正多錢錢石焦二子四白暖化，熱養厥，厥，象痞，化則半赤半四白

！是了中多樣問此，孜爲中舍功發的的，只好如途合醫學，便，事，其那孜中醫此，達成人第當勤何，各如問老另怎，世故末矻醫未之成的功。二他不性這性研各，實眼敢豈俗，他矻具有外功，大是好格是，究科那的着輕敢人因的，有認，之無便忘須謀靜才無才任舉未忠待忽怠情爲前務神識別道論是淡見生的配可有何時這厚了，慢，中途必妙的無，如業於錢與，做否興一代個學，所，都醫。窮的人所祇何務名眼發不中認趣種寫當者便以活以本就達深們謂此，發利開財當醫的而科文上，高在人爲身此其刻，成一不達。的他呢事易學章得當抬不的醫並完理的必功途能。因以一是？實達，不真其知事是不結而奧然。而算業爲利種學第。成必不小認身不實何是了後理他如已爲務中爲手問一必功然過呢他價覺亦等學。已，以於。成不醫義段，是竟之適

業於錢，思，醫尊如點的開嘗家大少基資解，，結經是。名著怎去隨者崇於門機尊不的家女基礎本釋還如果德塊利眼可先請身的金面會口可。的，，主，是其必之敲，，以顧隨價心錢，，。以爵；有便義是得一然道專那這出。到重理上廣求現槍祿無財是的：救旦是，門是與人醫，輕，馬告學在手當財的資社因之忽個義，如成頭者富的診虎鼓的呢，可便便財會爲人然一理，如掘功地不貴標資，吹資，但以是成，裏處。喊聲之所在墓途者醫若家。大然關；錢沒賣玉秀樣一封二文通在，當，背者輩，貧小失客有才有，是，妙切建個章的，當自馳不人怎病，却上財有代文屬是人成制條誤書那他毀，爲持好不嘗人門可讀價章於屬兒功度件我歎他發基淡金場意計爲們。裝書竟無小於的的與的的子的揚

可已末進，也，錢雲芍霍以前謂來亦潤又，痰錢茯三石前非復暖養云昔本四煅半神錢斛法佳，，肺胃人濕診蛤四主兆表便胃中謂熱壳製錢錢治也裏下，之在所陽四女芽，，亦似清陽表化明錢貞川四左應惟有止化，之，爲三棟錢金手嚙通，濁應陽肺濕澤錢子丸爲惡達陰邪乎，者熱瀉錢長六吉頻之氣之衛肺貯稽錢煅半麥分作機陽劑外氣痰留半石冬，，氣，，主之之決廣四焦氣不業肢昨之器所，八鬱錢白

錢煅錢丸北反肅肝不遂經黃脈升半石五沙覆降爲克致，，象卽決川分參，有治全肺未拙失盡見滑，炒八貝二錄權，復宜宣濕，咯瀉錢枳侯庶其當利達，留有欠錢元半壳廣可蘊以，，中痰起豁半參錢錢半錢半錢半參四海浮佳退清和肝逗，，腹辰燈石霍半錢半錢芯火桑錢斛左東皮兩桑錢斛左金而胃參津擾胃苔氣無之氣液，兩樞，

小言

牛

利

葉動秋

先樂山公醫藥濟人之報

晴雲齋

。縣亦爲編資其之返山陝他始驟行諸，四冬六業送子存德禁者康人暫药店而，江西以八官八禁，策書法衡民西人抵轎，幫糧歲有歲，公讀心博犯晝熙助居店，未公十使十犯爲勉大，就鎮最都從公號般率疫率先子嘗教學救夜不十二年，衡山公諱繼高四人餘治世，爲稱贊先人，濟尤多，聘入縣，縣官葛公以公盛年歲辭病傳此書，爲稱贊先人，陸不呼多子，子入京會試，即所以報公，謂公曰以公盛遂謝，誦書恭訓藥縣子，按先行捨去側，公選之，過濱，由連河北上，七十肆卽汝翁，不子，仍照常復先公時，教資偕命子先療，不得，丁我後，刊發通省官廳以公在衡常入皇清經世文獻，年母樂視病，公次年深憂歸之，指示

收濟可出蓋救脈津立，洪乾陰然，服力身辛苦，熟也矣陽垂救液散然大，氣熱聞，傷作痛苦，食睡，無絕陰內，恐，泉既症其遂風痛勞進，處必陰之之竭意悞按源衰，小大之例施法慢，舌益得，元意，欲表之既，予便汗利，發熱人，某備歸，與刺元扶則陽而難行，戴渴悞知不面施法慢，理少陽陽孤，甘受陽然，汗悞利亦，寒得歸，陰減，之陽繼章溫於，二愈治，，傷，年老體弱，煎，回藥失思之藥，溫坐鎮，無必，致，不，便，神昏舌乾如刺，乃以醫者不病體弱，再陽，所獨藥，將之元急疫，舌通，儀口數劑生而而陽，又欲飛越，隨之象象，診脈服身陰兼生何以生，但汗，而瘡汗，陰載，

古人對格陽症之醫案（補遺）

李克蕙

醫藥尤昂，貧病者無力延醫服藥，此爲最好行方便之時矣，故散藥述先樂山公事爲業，醫藥者勸，樂山公醫術活人甚多，药店被八，至於質屋還賬，其無錢可知，大夜學著，稱先仁者以財發身，不以身發財，六十餘歲子作縣官歸來，雪夜大病，其到老清貧可知，大病，曰仁者以財發身，不以身發財，湖南衡州府志衡山縣志一子孫五代科第貴盛，此所謂以財發身也。

實用臨床診斷學

董德懋

第二編 診察篇

第一章 望 診

四診之中，望診最屬難事，故曰「望而知之謂之神」。此種學說由來最久。

素問五藏生成篇中曰：「故色見青。如草茲者死，黃。如枳實者死，黑。如炁者死，赤。如衃血者死，白。如枯骨者死者死，亦。如衃血者死，白。如枯骨者死者死，亦。如五色之見死也。青。如翠羽者生，赤。如雞冠者生，黃。如蟹腹者生，白。如豕膏者生，黑。如烏羽者生，此五色之見生也。」

又靈樞五閱五使篇中曰：「鼻者肺之官也，目者肝之官也，口唇者脾之官也，舌者心之官也，耳者腎之官也。黃帝曰：以官何候，岐伯曰：以候五藏，故肺病者喘息鼻脹，肝病者皆青，脾病者唇黃，心病者舌卷額赤，腎病者額與顏黑。」

又靈樞五色篇中曰：「雷公曰：官五色奈何，黃帝曰：青黑爲痛，黃赤爲熱，白色爲寒，是謂五官。雷公曰：「以色言病之間甚奈何。黃帝曰：其色幾以明沈大者爲甚，其色上行者病益甚，其色下行如雲散者方已。雷公曰：小子聞風者百病之始也，厥逆者寒溫之起也，別之奈何。黃帝曰：當候關中，薄澤爲風，冲濁爲寒，在地爲厥，此其常也，各以其色言其病。雷公曰：人不病卒死何以知之。黃帝曰：大氣入于藏府者，不病而卒死矣。雷公曰：病小愈

而卒死者，何以知之。黃帝曰：赤色出兩頰，大如母指者，病雖小愈必卒死，黑色出於庭，大如母指，必不病而卒死。雷公曰：善哉其死有期乎。黃帝曰：察色以言其時。雷公曰：善乎，願卒聞之。黃帝曰：

庭者首面也，觀上者咽喉也，觀中者肺也，下極者心也，直下者肝也，肝左者胆也，下者脾也，方上者胃也，中央者大腸也，挾大腸者腎也，當腎者脾也，面王以上者小腸也，面王以下者膀胱子感也，額者肩也，額後者臂也，臂下者手也，目內眴上者膺乳也，挾綱而上者背也，循牙車以下者股也，中央者膝也，膝以下者胫也，當胫以下者足也，巨屈者股裏也，巨屈者膝蹠也，此五臟六府肢節之部也。各有部分，用陰和陽，用陽和陰，當明部分，萬舉萬當，能別左右，是謂大道，男女異位，故曰陰陽，審察澤天，謂之良工。沈濁爲內，浮澤爲外，黃赤爲風，青黑爲痛，白色爲寒，黃爲膏，潤爲膿，亦甚者爲血。痛甚爲擊，寒甚爲皮不仁，五色各見其部，察其浮沈以知淺深，察其澤天以觀成敗，察其散搏以知遠近，視色上下以知病處，精神于心以知往今。」

由於上述，可知望診於古典醫學中，既被重視。茲將關於古今學者之望診實際經驗錄之。

第一節 顏貌之診查

機能遲速，思想力淺深，以及精神之抑鬱或興奮等，於診斷上每關重要，蓋某種疾病，以一定之精神症狀開始，而病情之向愈或增劇，亦可視其精神狀態以推知故也。

此種精神狀態，多在顏貌上表現之，如不安，恐怖，疼痛，憂慮，色澤異常之類，皆可由此推知，例如未能言語之小兒呈痛苦之顏貌時，醫家即可知其爲痛所苦，有時則病人初未言疼痛，詳細診查及於身體某部，忽然頻卑蹙有之，故顏貌之判斷於望診上佔重大之項目，茲錄其要領如下。

敏消失一睜開張，流淚而不閉，且口角一邊下垂，往往流涎，口向健側牽引，爲偏側顏面神經麻痺，常與半身不遂併發△癲病之容貌，其前額乃眼周圍有結節狀腫脹，此有一種光澤，眉及睫毛一齊脫落，（所謂結節瘤），其甚者面如獅子故又名獅子顏。左右頰熱亦者爲肺結核之象△臉之左右不同爲齦齒，齒齦炎△顏面浮腫爲脚氣，心臟或腎臟虛弱△眉間發白爲精神過勞，面色發黃眼球尤甚爲黃疸病△面狹多腸鵝，面短多中風，面長多肺弱。鼻梁陷入，發生鼻音，爲梅毒△如面色發黑爲室外勞動之人爲筋肉勞動者，面色發白之人多爲室內勞動精神勞動者，由此可推知其疾病之起因。

第一二節 皮膚之診查

皮膚之診查，應注意其色澤，彈力，溫度，溫度之如何，及浮腫，出血，發疹之有無，老年人之皮膚大抵營養不良則屬生理現象。

皮膚之色澤，視乎皮膚毛細管之盈虛，皮膚蒼白者爲貧血，心臟虛弱之象，慢性腎臟病，慢性胃腸病，癆病癌腫，大失血多見之△皮膚紅色者爲高熱病人，魚蟹中毒，酒醉後，溫浴後亦見之△顏面一侧潮紅爲偏頭痛△癆病之人兩頰多作鮮紅色謂之消耗性潮紅△羞恥奮激後顏面發赤則爲生理現象。皮膚作紫藍色爲心臟衰弱，肺臟空氣進入困難，或高度寒冷，血行障礙之象△高度之紫藍色往往於死戰期及痘變重症兼有呼吸困難者見之△皮膚黃色爲黃疸，由膽色素爲血液及組織所吸收遂發此種變色，輕者作微黃色，較高度者作橙

黃色，最高度者作綠黃或黑黃色△皮膚黃疸色不能以燈光檢之，蓋用燈光則黃白二色無從區別之△日人食橘過多者，手足皮膚，即作橙黃色，因名之爲橙反應△皮膚缺乏彈力多見於霍亂慢性胃腸病，結核，癌腫等病△皮膚濕潤過度發生於熱性病之解熱期或狹心症△全身大汗淋漓謂之脫汗，於熱性急病及間歇熱將退時見之△偏側發汗爲頭之半面或半身發汗者爲種種神經官能或有解剖變化之神經系病見之。

猩紅熱之疹皮膚呈平等之紅色，瀰漫如塗朱，軀幹四肢爲甚顏面爲鮮，特於頤部及口唇周圍全不之見，因發熱而頰額充血，故頤及唇獨作蒼白色△麻疹每疹與每疹之間界限顯明，自反面隆起，顏面爲甚。水痘之一般障礙輕微，其水泡不至化膿。天然痘其水泡代膿而一般障礙特重△諸熱病初期或其經過中於面部或口唇多發匍行疹，多見於熱性病胃炎，格魯性肺炎△但於傷寒則不發見。熱性病人皮膚久經枯燥後重復出汗則多結晶狀之粟粒疹卽古人所謂之白瘡。

皮膚出血起於血管壁最易破綻之諸種病態，急性傳染病重症，敗血病，燐中毒等多見之，其出血自點狀至於扁豆大小或爲較大之黯青斑，其形狀不整指按之不褪色。

由於橫痃之瘢痕，可知梅毒之既往症△下腹有白線者爲產婦之症△下肢有白線者發於浮腫之後△耳下腺急性腫大，爲流行性耳下腺炎，亦病，傷寒，如發現耳下腺炎，則爲惡徵耳下腺之慢性肥大爲腺病質。

浮腫爲組織之滲出液，浸入皮下之狀態，皮膚呈蒼色，以指按之遺有指痕，有由心臟病而起者，有由腎臟病而起者，有由腳氣而起者，有由各種貧血，如結核，有惡性貧血等而起者。炎症性浮腫呈強度之紫藍色，例如急性關節炎，化膿性盲腸周圍炎肝臟膽囊等。

皮膚夏溫冬冷者爲虛弱之證△傷寒面白無神者爲發汗過多，或脫血所致，若發如塗朱，軀幹四肢爲甚顏面爲鮮，特於頤部及口唇周圍全不之見，因發熱而頰額充血，故頤及唇獨作蒼白色△麻疹每疹與每疹之間界限顯明，自反面隆起，顏面爲甚。水痘之一般障礙輕微，其水泡不至化膿。天然痘其水泡代膿而一般障礙特重△諸熱病初期或其經過中於面部或口唇多發匍行疹，多見於熱性病胃炎，格魯性肺炎△但於傷寒則不發見。熱性病人皮膚久經枯燥後重復出汗則多結晶狀之粟粒疹卽古人所謂之白瘡。

皮膚出血起於血管壁最易破綻之諸種病態，急性傳染病重症，敗血病，燐中毒等多見之，其出血自點狀至於扁豆大小或爲較大之黯青斑，其形狀不整指按之不褪色。

由於橫痃之瘢痕，可知梅毒之既往症△下腹有白線者爲產婦之症△下肢有白線者發於浮腫之後△耳下腺急性腫大，爲流行性耳下腺炎，亦病，傷寒，如發現耳下腺炎，則爲惡徵耳下腺之慢性肥大爲腺病質。

第二二節 頸之診查

頸上失光澤者，雖輕病亦可歎▲前額有污斑者非上頰妊娠卽係子宮病，或肺結核，前額有皺而骨隆起，並鼻翼下垂者卵巢病也▲華佗曰：病人黑色出於天中天庭者死▲王振祿曰：病人之額如抹塵者六十日前後死，常有如蚯蚓者不出六日死。

本刊山西總分社
新定戶社已長



A black and white portrait of Huang Changsheng, a man with glasses and a mustache, wearing a dark suit.

綠起化一並者能，裨資俾社國文健戰庸相般：圖條希病各發益貲各，醫化全完醫研中竊查我謀：教者縣揚良，界對藥，體遂殺究醫查我醫本正弱區東深而人於月改格，人，，我以既國科學社。者村亞，得士醫刊進，我，以既國科進展，，文尤無，藥社醫不國或致各學均遍化願量定月，藥足參不診於學受設，三之間刊之起共戰免病購後實分改晉知參書聘見維時焉處書後惠社進人識考籍，，時期，方參，，中士，，，在今想，况，考醫共庶國，強用廣晉應，吾際率，術同幾醫一國以爲設一茲儕大多又亦匡學藥致福少介立北爲非東盲寡助者，協民數紹總京闈具亞從於，，醫果力，之，分中揚有聖，互一

本刊文字未經轉載
尤許不准轉載
登記証 内務總署政字第9號
編輯人 董 潘 姜 汪 春 浩 兆 德 懲 鵬 樂 華 仁 權
發行者 北京前外長巷上三條八號
印 刷 者 中國醫藥月刊社
所 在 地 北京宣外大街一五八
千 上 海 漢 口 路
中 頤 堂 書 局
江南代表人 江南代售處
定 價 零售每冊五角、預定全年五元半
南方定價、零售每冊中儲券一元五角全
十五元半年八元郵票停收

王府濟坤丸

◎婦人閨女身虧體弱疲倦少食月信不準血色失常經閉乾癆赤白帶下子宮暗疾久無孕育產患滑胎分娩艱難產後虛損乳汁不足經帶胎產緩急各症

王府舒肝丸

◎男女老幼食慾水脹消化不良打嗝吐酸便秘堵滿遇身串疼心跳失眠煩燥多怒眼乾眩暈常犯頭痛四肢痠軟麻木抽筋悶急氣憂思驚悲新久各症

喘嗽保肺丹

◎男女老幼咳嗽吼喘春冬舉發交節必犯乾嗽無痰日久白痰泡沫胸肋隱疼黃痰有味嚥堵難臥粉痰或五心發燒多年老病肺痿肺癆肺勞各症

嬰童千金散

◎小孩發燒咳嗽聲嘶痰氣喘憋風作抽鼻煽眼吊背頭停食吐奶鴻利壯疹瘡瘍腹大脹硬面黃肌瘦消化不良胎毒痘疹時疫溫邪感冒各症

專售處

胡同四錢糧
號前清慶
王府總管

德善堂劉宅



和平藥

娃娃寧是採取上等國產

藥材，精製而成，主治小兒百病，有極準確之把握，早

已為全國中西醫師所贊許，近年以來，更作進一步研究，極力減少藥量，增加治療實效，使嬰兒服用便利，不感絲毫之痛苦，為娃娃寧之特長。

近為普遍推銷，廣為救濟起見，特聘各地藥房，藥鋪，醫藥團體，雜貨，廣告店代為銷售，利益優厚，開以往之紀元。娃娃寧裝璜美麗，服用便利，可引起信仰之心，如代售定可獲得重利。

天津針市街

偉迪氏製藥廠出品

小兒娃娃寧



初夏之疲勞

沉四因光洩勞腺熱疲夏昏肢此赤於因分氣勞日，無多外外子泌的，人這力半線，。旺蒸因最是，睞照且不盜發爲容普做乏射受易，。受易遍事，，日排疲汗到患

興根，素射。因進用現奮本精治照更子體若象一治神療之能、力素。時者療倦四瞓免逐々，如可，呆肢乏去出將定常比絕，無。日體疲能期。非乃力若光外勞增服

若素不只可以制止疲勞，且可治療胃腸病、肺病、虛弱症、貧血、精力不足、神精衰弱、細胞頽廢、新陳代謝不良、營養不足、各種維他命缺乏影響到的病症，服用若素，無不限期痊愈，男女老幼咸宜，孕婦服用尤佳。

價 小瓶五角五分
中瓶一元七角五分
大瓶五元五分

北京東單新開路

若素製藥公司

天津營業所：特別三區西錦路
濟南營業所：濟南商埠緯三路
營業所：張家口市至善街



胃癌