


婦人木蠶良方



陸七

共八

新編婦人大全良方卷之六

婦人熱勞方論第一

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調
臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其
候心神煩躁頰赤頭疼眼淚唇乾四肢壯熱煩渴
不止口舌生瘡神思昏沉多卧少起飲食無味舉
體痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名
熱勞也

黃耆散

治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不

欲飲食

- 人參 各二兩
- 黃耆 各二兩
- 當歸 各三
- 地骨皮
- 北柴胡 兩
- 羊
- 黃耆 日



赤茯苓 各二兩

麥門冬 一分

生地黄 各三

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎六分去滓
溫服無時

半夏散

治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼

痛或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 一分

知母 一分

苦梗 一分

人參 一分

赤茯苓 一分

秦艽 一分

赤芍藥 一分

麥門冬 一分

烏梅肉 一分

鱉甲 醋炙 一分

北柴胡 一分

黃耆 一分

大腹皮 一分

甘草 一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎

至七分去滓溫服無時候

猪肚圓

治婦人熱勞羸瘦

北柴胡 一分

赤茯苓 一分

人參 一分

黃耆 一分

黃連 三兩

地骨皮 一分

木香 一分

桃仁 一分

鱉甲 一分

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪

肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏圓

夫如梧桐子大食前粥飲下三十圓年食前再服

秦艽散

治血經有熱月脉凝滯五心煩倦

麥門冬 一分

秦艽 一分

生地黄 一分

當歸 一分

地骨皮 一分

蘇木 一分

蘇木 一分

蘇木 一分

蘇木 一分

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎
至七分溫服若經脈調不用紅花忌酒與熱物
此方可服一年

秦氏婦人客熱方論 婦人客熱方論第二 凡婦人客熱者 夫婦人者氣血陰陽臟腑虛實則生熱虛則受邪邪熱加入陰陽冷熱自相乘也余去客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胸臍之間虛熱口躁心煩手足壯熱者是也

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食
麥門冬 北柴胡 赤茯苓 桑白皮
羚羊角屑 赤芍藥

黃耆 各三分 生乾地黄 甘草 各兩
右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎六分去滓
溫服無時候

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食
犀角屑 犀角 赤芍藥 地骨皮
紅花 甘草 麥門冬 北柴胡 人參

枳殼 各三分 赤茯苓 各三分
右吹咀每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓
溫服無時候

黃耆散 治婦人客熱心膈壅悶肢節煩疼不思飲食
黃耆 枳殼 赤茯苓 桑白皮 赤芍藥 麥門冬 北柴胡 人參

身右生乾地黄服一黃耆各一犀角屑許同

甘草各半瓜樓子各三黃芩各半

右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎

夫至七分温服無時候婦人寒熱方論第三凡四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫

婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令

寒熱如瘧也

地骨皮散治婦人血風氣體虛癸歌寒熱
北柴胡一兩地骨皮一兩桑白皮一兩黃耆各三

白茯苓各半五加皮各一人參各一

甘草各半桂心各半白芍藥各半

右吹咀每服三錢水一盞五生薑三片煎至七分

去滓温服無時候

生地黄散治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思

飲食

生乾地黄各一北柴胡各一桂心各一

羌活各半米香各半羚羊角屑各半

防風各半酸枣仁各半黃耆各半

白芍藥各半白朮各半當歸各半

川牛膝各半白茯苓各半

枳殼各三

右咳吐每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫服空心

柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不

欲飲食

北柴胡

黃耆

赤茯苓

白朮

人參

地骨皮

枳殼

生乾地黄

苦梗

桑白皮

赤芍藥

鱉甲

麥門冬

甘草

右咳吐每服四錢水盞半姜三片煎七分去滓

溫服無時候

荆芥散 療時氣風溫寒熱瘧瘧往來潮熱並宜服

之

陳皮

麻黃

香附子

甘草

荆芥穗

厚朴

草果仁

白芷

桂心

右咳吐每服二錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫服無時候

至七分去滓溫服無時候

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄

略而論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師

足喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以厭

懣成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬

物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不

物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不

遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類癰疾久則為勞又有經閉白淫痞逆頭風腦氣痞悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病診其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脈原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣與蘇生地黄圓許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此方治之愈

北柴胡
生地黄

秦艽
赤芍藥

黃芩
各半

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大烏梅煎湯下

三十圓無時候日三服許學士云嘗讀史記倉

女病曰腰痛乍寒乍熱

倉子而不可得之欲男子

論第十有婦人熱入血室寒熱如瘧一證在本卷

婦人惡寒方論第五 凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脈必浮數發於陰者宜溫裏脈必沉細又有汗後利後惡寒及皆惡寒已上疾證方治並載有問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪

故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣
寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去被
徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤
不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治
其

敗毒散

見局方

婦人血風煩悶方論第六凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪
乘之搏於血使氣不宣而否泄則生於熱或肢節
煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩劇也
川烏頭圓治婦人血風虛冷月候不調或即脚心
心煩熱或即頭面浮腫頑麻

當歸

川烏頭一斤用好清油各候裂者仍須於銚
或桑根色為度逐旋取出了於新瓦上
五靈脂淨去土石生揀者則去皮尖臍

右為細末更入白中或乳鉢內研令停後將燕
餅水浸後却瀝去水漸漸入白中杵直待元
夫得即圓如梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十
圓忌動風物丈夫風疾亦治
赤芍藥散治婦人氣血不和心曾煩悶不思飲食

四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥

白芷 甘草 柴胡 芍藥

右為細末每服錢水一盞生姜三片棗一枚

同煎至七分温服食後臨卧
酸枣仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁
喫食減少

酸枣仁 白茯苓 赤芍藥 當歸
羚羊角屑 防風 紅花 桂心
生地黄 各三分 赤茯苓 當歸
川牛膝 各三分 防風 桂心
川芎 地骨皮 甘草 各半

右咬咀每服四錢水盞半姜三片薄荷少許煎
七分温服

當歸散 治婦人血風潮熱

當歸 芍藥 延胡索

不灰木 熟地黄 大黃 各一分

桂心 甘草 各一分

右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎
至六分去滓如躁時故冷服細呷清者

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎

皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化
穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為

本也婦人血氣不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在
內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能摧伏五
穀故令不能食也

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃日嘔逆不納飲

食豆蔻

桂枝

白茯苓

白木

桂心

甘草

神曲

白木

訶子

木香

草豆蔻仁

桂枝

白茯苓

白木

桂心

甘草

神曲

白木

訶子

木香

附子

乾姜

良姜

麝香

白豆蔻仁

附子

乾姜

良姜

麝香

白豆蔻仁

陳皮

枳殼

人參

食茱萸

桂心

附子

乾姜

良姜

麝香

白豆蔻仁

神曲

白木

訶子

木香

甘草

神曲

白木

訶子

木香

甘草

夫右為粗末每服三錢水一大盞姜三片煎至半
分去滓溫服無時候下諸會方論
神曲圓治婦人血風攻脾胃腹脹氣滿不思飲食
白木 附子 枳殼 製 人參
訶子 桂心 食茱萸 泡 陳皮 各一
木香

苦梗

右為細末以酒煮神曲末二兩作糊為圓如梧

桐子大每服二十圓空心姜湯吞下

椒紅圓治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食

臍腹多痛體瘦無力

椒紅

我茂

白木

丁香

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大空心溫酒

下三十圓

進食散

李子潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人
沉香 附子 炮
訶子 當歸 煎至寸許
良姜 白豆蔻仁
麝香 一分
白木 各一
丁香 各半
我茂 各一
右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大空心溫酒
下三十圓

脾胃虛全不入食者只兩服能食出蘇氏據愚見此方既有川烏治血風攻脾不食豈無良驗

青皮

陳皮

粉草

良薑

桂心

川烏

草豆蔻仁

各三

訶子

五分

白芷

二

右為細末每服一錢水一盞姜二片煎至七分

溫服

婦人夢與鬼交方論第八凡三方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病

也其狀不欲見人如有對悞時獨言笑或時悲泣是也脉息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脉來綿綿不知度數而顏色不變此亦是此候也

伏神散

治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語

雜亂

茯苓

石菖蒲

赤小豆

石菖蒲

赤小豆

右咬咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食

前溫服

桃仁圓

治婦人與鬼魅交通

辰砂

檳榔

當歸

桃仁各三

水銀

研令星盡

十

麝香 阿魏 沉香 桃仁湯吞
右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心
此二下十圓入藥

辟温丹 治證同前

虎頭骨 西 朱砂 雄黃 雌黃 鬼白 皂莢 梨蘆 各一

右件生為末煉蜜為圓如彈子大囊盛一圓男
左女右繫臂上及用一圓當病人戶前燒之一
切邪鬼不救近

大乙神精丹

婦人傷寒傷風方論第九凡八方

蘇合香圓皆可用也

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調
其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相
刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人
左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和
津液自通淡然汗出而解仲景云婦人傷寒經水
適斷晝日明子暮則譫語如是鬼狀此為熱入血
室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也
○小柴胡湯主之若行湯遲則熱入胃令津燥中
焦上焦不榮成魚結胃狀須當針期門也五行相
尅以生相扶以出乎居之日水常養於木木相
生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積
則剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜

忘小腹痛滿此便利屬於當湯證也傷寒胃實證語
者不可下也雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣婦人先調血此大略之詞耳要知脉繫
無汗名傷寒脉緩有汗為傷風熱病脉洪大中暑
脉細弱其證二也假如中暈用白虎胃實用養氣
豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦
人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意
選用也○若妊婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝
半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊
婦而去也大抵產前必先安胎產後先補益次服傷
寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法○黃
帝問婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無

損也大積大聚其可犯衰其大半過其厄○男子
婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人
傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之序以法考
之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說
於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可
採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳並可
以百問中參用也

桂枝紅花湯治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口
燥舌乾經脉凝滯不得往來宜服

桂枝

芍藥

甘草

三兩

黃芩

紅花

西

人

散

因

不

右咬咀每服五錢水一盞半薑四片棗二介煎

至七分如澤溫服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 生乾地黄 白芍藥 白朮

右各一兩 呶咀 每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生姜

當歸湯治婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下

柴胡 三兩 白朮 二兩 人參 當歸 各一兩 甘草 五味子 木通 各半兩

右呶咀 每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩燥譫語目赤毒氣閉塞不得通宜瀉心三黃湯

川大黃 鼠尾黃芩 鷹爪黃連 等分

右為粗末 每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服取微利如利止即止

婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜黃芩

乾地黄湯

乾地黄 西 柴胡 白芍藥 黃連 黃芩

至 甫草 一西温服 漿時再服汗白

右吹咀每服四錢水一盞半前至七分去滓温服取澹利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名白陽易其證裏急腰膝及腹内痛身重宜 **燒棍散**

女用男子禪福燒灰為末以水調方寸匕服即愈婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘

急搐溺如中風狀宜 **香竹茹湯** 枯樓根 二兩 淡香竹茹 半升

右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢

不任舉動無力發熱者宜 **當歸白朮湯**

桂枝 每兩五錢 白朮 半斤 當歸 半斤 芍藥 半斤 甘草 半斤 黃耆 各一斤 生附子 一箇破作八片各一分

右吹咀水三升煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服温西復微汗差

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜

小柴胡湯 婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴

胡湯

此為熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴

胡湯替人血... 柴胡 八錢

生乾地黄 出鮮甘草 各三錢 半夏 二錢

右吹咀每服五錢水瓊羊姜五法棗二枚煎至

局方四物湯不用熟地黄只用生乾地黄加北柴

胡等分煎服亦療此證初斷寒熱如瘧症言見鬼宜

服乾姜柴胡湯 柴胡 四兩 桂枝 一兩 枳椇根 二兩 服

牡蠣 乾姜 甘草 各一兩 右吹咀每服五錢水盪羊煎七分去滓溫服初

服微煩再服汗出而愈 婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近宜海蛤散

婦人血結曾法當針期門仲景無藥方此方疑非 仲景然其言有理姑存焉

海蛤 滑石 甘草 各二兩 而右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則

中血不流行宜此方便利血數行更宜桂枝 紅花湯發其汗則愈

婦人傷風發熱惡寒經水通來得七晝時熱除脈 遲身涼和曾膜下滿如結胸狀謔語者此為熱入

十五

血室也當刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳
直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不
用行子午法恐縲藏膜引氣上但下針令病人吸
五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法也凡針期
門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也



婦人咳嗽方論第十一凡九方

夫婦又咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得
也肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛
若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外
皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息
辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪
而數者起於熱遲而淡者起於寒風者散之濕者
燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不妥者

也期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐縲藏膜引氣上但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也

非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也
 又曰熱在上焦因咳為肺痿又實則為肺癰虛則
 為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或
 因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發
 熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用
 溫藥如建中之屬今人但見發熱咳嗽率用柴胡
 驚甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非可為深
 戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯元委曲調治
 無為鹵莽致傷人命治虛中有熱咳嗽膿血口苦
 咽乾 **黃老日散**
 黃耆四兩 甘草二兩
 右為細末湯點一二錢服日三
 一方甘草一

西黃老日六兩 名黃耆六一湯只吹咀水煎服
蛤蚧圓 治婦人咳嗽不止漸成勞氣
 蛤蚧酥炙一對 紫苑 款冬花
 鱉甲炙 貝母 皂莢子仁各一

杏仁炒去皮尖 右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓淡
 姜湯吞下

含化圓 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成
 肺勞服此安寇宗奭方

貝母 枇杷葉 桑白皮 款冬花
 木通 紫苑 杏仁各等
 大黃 減半 圓

右為細末煉蜜圓如櫻桃大食後夜卧含化一

貝母湯治諸嗽久不差出本方

貝母生薑汁 陳皮各 受羊夏 北柴胡一 甘草各

乾姜減 羊者 桂心各 北柴胡一 甘草各

柔白皮之 木香各 北柴胡一 甘草各

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮

尖碎之生薑二片煎至七分去滓熱服黃師丈

云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之

一投而瘥以此治諸嗽悉皆愈

定喘湯治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘

急喉中涎聲耳曾滿氣逆坐卧不安飲食不下及治

肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治

之

羊夏麩炒 明阿膠炒 甘草各錢

鷲粟殼製 北五味子各 桑白皮

麻黃去 人參各 梅半箇煎至七

右吹咀每服三大錢姜三片烏梅半箇煎至七

分去滓漸漸溫服食後臨卧服方同劑有

滄州李官人宅補肺湯治狀同前又各清全湯

鷲粟殼製 人參各 粉草各

陳皮各 茯苓各 杏仁製

白木各 明阿膠炒 北五味子

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛
凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣
合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟
則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言
肺病難愈而善卒死者肺為嬌藏怕寒而惡熱故
邪氣易傷而難治以其湯散選過針灸不及故也
拾種欬嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳
支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽
鰥嗽飲嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒注漱者歷
代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經是
意其華佗所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病

蓋酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者哈唾膿
血輕者時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳注
得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸就沉羸此則
非持內損肺經又挾邪惡傳症之氣所以特甚病
之毒害無過此也真人治注嗽通氣圓方用蜈蚣
四節又云夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺
方四滿圓治五嗽亦用蜈蚣遇世名公能推原其
旨意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹砂雄黃安
息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣
又肺中有虫如蠶蟲令人喉痒而咳嗽湯散選過鍼
灸不及以藥含化虫死即嗽止 見張銳方
深師療五嗽一上氣嗽二飲嗽三鰥嗽四冷嗽五

邪嗽

四滿圓

乾姜

芎藭

蜈蚣一枚去足炙

鬼督郵

右十二味為細末煉蜜圓如大豆許每服五圓

米飲下日三未知加至七八圓服此藥無不差

忌羊肉錫生葱生菜海藻菘菜

古今錄驗

四滿圓

療五嗽一氣嗽二痺嗽三鯨嗽

四邪嗽五冷嗽悉療之方

蜈蚣二枚炙

芫花分根五熱

躑躅花炒

乾姜

芎藭

桂心分各四

人參

細辛分各二

右為末煉蜜圓如梧桐子大米飲下一十圓日

三服加至十五圓忌生葱生菜

喘滿方論第廿四

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出

於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有

所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎

與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而為病

也原疾之由雖曰皆本於肺與氣然感外邪則有

太陽證脈浮無汗而喘者宜麻黃湯陽明病汗出

不惡寒腹滿而喘者潮熱者宜承氣湯若表邪未

解誤服下利藥不止脈促喘而汗出者宜葛根黃連黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草湯若表邪未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龙湯去麻黃加杏仁並之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沉細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結硬或冷汗自出或夫便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是木氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主之已上方並見錄僕且以大槩而言之諸藏相乘而喘者以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心

散冷水調服若因氣字不調痰盛喘促者宜四七湯兼官局桔梗湯姜煎服若涎多而喘者宜十縵湯橘皮半夏湯若不得卧卧即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沉大宜神秘湯肺之積名曰息賁在右臑下大如杯令人洒淅寒熱喘咳發癰疽宜東膏圓若上氣喘者神授湯若上盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之梗槩不出於此矣若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又脊蒸勞喘自有專門不敢濫及**神秘湯**治水氣乘肺而喘兼療支飲而

下類
神效
紫蘇葉
檀香
天參
白油
香
陳橋皮
洗
紫蘇葉
檀香
天參
白油
香

右吹
桑白皮
每服
兩水
煎溫服
紫蘇葉
檀香
天參
白油
香

杏仁散
治諸
藏相
氣喘
急
紫蘇葉
檀香
天參
白油
香

右煎
橘皮
湯調
下二
錢無
時候
紫蘇葉
檀香
天參
白油
香

千緡湯
齊州
半夏
七枚
炮裂
而開
皂角
一寸
皮
炙
其

右同
以水
一椀
煮去
半頓
服沈
興宗
待制
嘗病

疾喘
不能
卧人
扶而
坐數
日客
有見
之曰
我曾

如此
得良
藥一
服差
我以
千緡
酬之
謂之
千緡
湯可
試為
之興
宗得
湯一
服而
差

東膏
圓療
息貴
葶藶
研細
陳皮
苦梗
各等

右後
二味
為末
入葶
藶令
停煮
肥束
肉研
為膏
和圓
如梧
子大
每服
五七
圓飲
下許
學士
云

予嘗
患停
飲水
積肺
經食
已必
嚏漸
喘覺
肺系
急服
此良
驗

神授
湯治
上氣
喘急
不得
卧
橘紅
苦梗
紫蘇
等分
煎至
六分
去滓
食後

右吹
咀每
服四
錢水
一錢
煎至
六分
去滓
食後

服如即每服四錢水一匙煎至六分去其苦味

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小

兒室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

紫蘇 大腹皮 洗

麻黃 各四錢 桑白皮 桂心

杏仁 去皮 陳橘皮 甘草 各二

右咬咀每服半兩水一錢半姜十片烏梅一箇

煎至六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病

喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差

後得臨平僧法本方服之遂差法本此病三十

年服此藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥

須久乃差

官局桔梗湯橘皮半夏湯洗心散華蓋散 並見為方不復

賀錄 四七湯 見木卷 僕嘗療羅安人年近六十遇秋

冬之交上气喘促不能坐卧六脉洪實服諸藥無

效問疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是

丹毒為害遂服洗心散皆無效僕以華蓋散數服

而愈謾記之

婦人風痰方論第十五 凡八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胃

膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者為患

但胸膈有痰飲漬於五臟則令眼暈赤令頭眩

頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪 五邪者寒內暑燥濕風

傷七氣憂七氣者喜怒因五邪而得者得風為風
痰得寒為寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑
為暑痰因七氣所傷者多因婦人情性執著不
能容忍而有此證豈持只因風冷而成哉所以
外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕
唾身中濕者敗濁寢而成痰乘間而為害也經
云清則運為精華濁則疑為痰飲此之謂也然
有痰涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風
而生痰者宜服三生飲星香飲青州白圓子化
痰圓方見因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹
養正丹並見因熱而得者宜服金沸草散柴胡
半夏湯因暑而得者消暑圓
並見因氣字不調

蔚結而成者宜服參蘇飲四七湯二陳湯痰在
上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖
曰可吐可下亦要觀人之勇怯察脈之虛實方
可投之切記不宜痛擊暴下所以初虞世有金

虎碧霞之戒者此也

三生飲星香飲參蘇飲方並見第一論第三

控涎丹方見第六論養正丹方見第四論卷

旋覆花湯治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花 枇杷葉 川芎

北細辛 藿香 桂心

枳殼 前胡 人參 去蘆

羌活 半夏 甘草

傷 羚羊角 每服 三錢 水一瓊 姜三片 煎至七分
去滓 溫服

天南星圓

治婦人風痰心腸壅滯

天南星

白附子

皂莢

炒黃

三

半夏 麩

晉礬

右為細末

以酒煮麩

糊圓如梧桐子

大每服十

圓 生薑薄荷湯吞下

又方

半夏

天南星

皂莢

批

生薑 三兩

右以水五升 一同煮火令水盡 去皂莢 生薑只用

半夏 南星 焙 乾為末 以酒煮麩 糊圓如梧桐子

大生薑薄荷湯下 七圓

柴胡半夏湯

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱

榮衛不調 肢節拘倦 身體疼痛 嗜卧少力 飲食無

味 兼治五嗽 痰癖

柴胡

半夏

人參

去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

白朮

右 咳 吐 每服 五錢 水盞半 姜五片 棗一枚 煎至

八分 去滓 服

金沸草散

治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋緊

急時 發寒熱 皆類傷風

急煎荆芥穗 甘草

地細辛 各二兩 赤茯苓 一兩 前胡 一兩

旋覆花 各三

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗一枚

煎至六分熱服未知再服藥局有細辛茯苓

瓜蒂散 療病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮

胸中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胸中有痰

也當吐之宜服此

瓜蒂炒黃 赤小豆 各半

右為細末取一錢匕豉一合湯七合先漬之須

臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少

加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之忌飲令人

吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑 各一

右吹咀作一服每遇膈間有寒疼以水二盞煎

至一盞去滓臨卧溫呷如有熱疼加炙甘草一

分如脾胃不和去甘草加陳橘皮一分同煎此

即二陳湯加減得理

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結或疼澁狀如

破絮或如梅枝在咽喉之間咯不出嚥不下此七

氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上

氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之婦

人情性執著不能寬解多被七氣所傷遂致氣填

胸臆或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤
多此證宜服此劑間以香附子藥久服取效切勿
可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱虛不肯多服用
之効驗不可具述

紫蘇葉 二兩 厚朴 三兩 茯苓 四兩 蘇子 四兩

半夏 五兩 右吹咀每服四錢水一盞半姜七片棗一箇煎

至六分去滓熱服無時候若因思慮過當小便

白濁用此藥吞香州白圓子極妙

婦人心膈嘈雜方論第十六凡三方

夫心膈嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也
皆血液淚汗變成或云是血嘈令人多用猪餘血

炒而食之則愈詳其此理是以血導血歸原爾恰
如以鹽梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治
心腹中脘痰水冷氣心下江洋嘈雜腸鳴多睡口
中清水自出脇助急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷
所致其脉沉遲弦細是其證也

旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅

桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏

赤茯苓 三分 右吹咀每服四錢水盞半姜七片煎至八分去

滓溫服

局方治惡阻半夏茯苓湯亦妙方是惡阻論婦人
新編婦人大全良方卷之六
如謂茯苓可共其性白芍藥
如謂茯苓可共其性白芍藥
如謂茯苓可共其性白芍藥

新編婦人大全良方卷之七

婦人嘔吐方論第一凡六方

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也

胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於

胃胃氣逆則令嘔吐也愚詳曰夫嘔吐之疾非

特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔吐者亦有胃

中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔吐者亦有血弱

而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥

如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中圓及

許仁則半夏圓人參七味圓如胃熱而嘔吐者

宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散如胃中

冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生薑

冬子煎沉冷服即止
如疼盛嘔吐者宜局方半

夏茯苓湯二陳湯
如惡阻兼服茯苓圓門自專

論卷第如血不歸原而嘔吐者宜用十全大補湯

加陳皮半夏霍香姜枣煎服
或有脚气而嘔者

自有專門不致濫及
益智子散治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不

下食四肢無力
附子炮

益智 附子炮 縮砂仁 黃耆

丁香 厚朴 陳皮

白朮 白茯苓 藿香葉

川芎 良薑 桂心 各半

當歸 各三分 人參

右咳吐每服三錢姜三片枣一枚水一盞煎至

七分去滓無時溫服

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水

穀不消

丁香

白朮

縮砂仁

草果仁 各三

人參 一兩

當歸

白豆蔻

藿香葉

甘草 各半

橘皮 三分

神麴

呵子 各半

右為細末每服二平錢煎姜枣湯調下

竹茹湯

治胃熱嘔吐

乾葛 三兩

半夏

湯洗七次姜汁半盞

用三分

甘草

水一升煮令耗半可取

右吹咀每服五錢水二盞姜三片竹茹一彈大
專一枚煎至一盞去滓溫服

許學士云胃熱者手足心熱 政和中一

宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與

飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等

藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃皖

草孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時

下愈

良方 槐花散亦相類方

丁香 皂莢

白礬

槐花 炒令黃色

甘草等分

右為細末白湯調下二錢

許仁則 半夏圓 療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏者洗去滑

小麥麩 一升

右搗半夏為散以水搜麩圓如彈子大以水煮

令麩熟則是藥成初吞四五圓日二服稍加至

十四五圓旋煮旋服服此覺病減欲更重合服

亦佳忌羊肉錫救急同 蘇頌云如昔有未期而

又依前 半夏圓 雖覺漸損然病根不除欲多合前

圓又慮藥毒不可久服欲不服又恐病滋蔓宜合

人參七味圓服

人參 吳茱萸 白朮 厚朴 炙

細辛 各四兩 半夏 生薑 枳實 橘皮 各兩

桂心 各兩 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼

右為細末煉蜜圓如梧桐子大飲下十圓漸加
至二十圓與半夏圓間服亦可忌桃李雀肉生
葱生菜吳昇同

婦人霍亂方論第二 凡六方

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃
虛冷飲食過度觸胃風冷使陰陽不和清濁相干
致令揮霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而
利者或吐利俱作者或頭痛身體壯熱而脈浮洪
者或陽氣暴絕而手足逆冷而脈息微絕者治之
當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈息熱者涼
之冷者溫之以平為期百問云凡霍亂吐利熱多
而渴者五苓散寒多不飲水者理中圓吐利已汗

出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加
猪膽汁湯夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷
汗出脚轉筋者香薷散濃煎沉冷服即效凡藿亂
者洪浮者易治微遲者難治

加減理中圓 主霍亂臨時方亦可治男子金出翼子

人參 白朮 乾薑

甘草 各一

右為細末煉蜜為圓每兩作五圓取湯和一圓
服之日十服吐多利少者取枳實三枚灸去穰
四破水三升煮取一升和一圓服之吐少利
多者加乾薑一累吐利乾嘔者取半夏羊西
泡洗去滑水二升煮取一升和一圓服之若體

疼痛不可堪者水三升煮麥三枚取升和
圓服若吐利大極轉筋者以韭汁洗腹腎從
曾至足踝勿逆即止若體冷微汗腹中寒取
附子一枚炮去皮四破以水三升煎取升和
一圓服未吐利悉止脉不出體猶冷者可服諸
湯補之
千金翼**四順湯**治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微
欲絕

附子 一片 破

乾薑 三兩

人參

右吹咀水煎服

四逆加猪膽汁湯治吐已下斷汗出而厥四肢拘

急不解脉微欲絕者

甘草 二兩

乾薑 三兩

附子 一枚

猪膽汁 半合

右三味吹咀每服五錢水三盞煮至二盞去滓
內猪膽汁分作兩次温服其脉即來

白朮散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膻生

冷過度或起居不節或露卧湿地或當風取涼而
風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消
化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食凌亂於
腸胃之間便至吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心
痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱發者有發
熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺

痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或
四肢逆冷脈微欲絕者或煩悶昏塞欲死者妊婦
霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉 四兩

白扁豆

厚朴 各二

右吹咀每服半兩水一大盞酒一分慢火濃煎
至六分去滓井中浸令冰冷頓服無時候連併
香薷散見神效蘇沉良方中名香薷散百問
同有黃連無扁豆

呵子散

治老幼霍亂吐利一服取效又治九種心痛
及心脾冷痛不可忍其功如神

呵子

甘草

厚朴

乾薑

草菓仁

陳皮

良薑

茯苓

神麩

麥牙 各等

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一

盞煎七分入鹽服急則鹽點

胡椒湯

治霍亂吐利甚妙

胡椒 四十九粒

菹豆 一百七十四粒

右為細末木瓜煎湯調下二錢

凡二方

白聖散

治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人

男子亦可服一升以上為妙

白礬土

以米醋一升

再煨

再煨

白礬土

以醋令赤

入醋內

研

乾薑

炮

此四

痛右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢

白芷散 治婦人翻胃吐食

右用白芷一兩切作片於瓦上炒令黃為細末

用猪血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥

喫七片如刺藥末留後次用

婦人血膈方論第四凡一方無二慢火濃煎

牡丹煎 治婦人血膈

牡丹皮 苦參 具母去心

玄胡索 白芍藥 右等分為細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五

二十圓米飲吞下無時候

婦人鼻衄方論第五凡七方

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和

則循環表裏絡澹則不散若勞傷損動因而生

熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見

衄者不可治有評曰凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦

不可治有評曰凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦

不可治有評曰凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦

不可治有評曰凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦

刺薊散 治婦人鼻衄血流不止

刺薊 二兩 桑耳 亂髮灰

艾葉 各一兩 生地黃 二兩 蒲黃 兩半

右為細末每服二錢無時粥飲調下

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆

治之

伏龍肝

芍藥

川芎

陳右咬咀水

一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取

三升分為三服

千金無桂

百問有茅花湯

以白茅花濃煎飲之立止

一方搗生白茅根取汁一合飲之止

又方取生葱心塞鼻中即定若因刺著并刀斧所傷血不止

並用之立定

又方取釜底墨細研入鼻中

又方取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中

立止

取龍骨末吹入鼻中立止

生地黄

當歸

桂心

黃芩

甘草

竹茹

一升

黃芩

甘草

各二

煎藥

末

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

治之

伏龍肝

芍藥

川芎

陳右咬咀水

一斗三升

煮竹茹減

三升內藥

煮取

三升

分為三服

千金無桂

百問有茅花湯

以白茅花濃煎

飲之立止

一方搗生白茅根

取汁一合飲之止

又方取生葱心

塞鼻中即定

若因刺著并刀斧

所傷血不止

並用之立定

又方取亂髮灰

細研以竹管吹入

鼻中立止

生地黄

當歸

桂心

黃芩

甘草

竹茹

一升

黃芩

甘草

各二

煎藥

末

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

葱

心

塞

鼻

中

即

定

若

因

刺

著

并

刀

斧

所

傷

血

不

止

又

方

取

生

治之

伏龍肝

芍藥

川芎

陳右咬咀水

一斗三升

煮竹茹減

三升內藥

煮取

三升

分為三服

千金無桂

百問有茅花湯

以白茅花濃煎

飲之立止

一方搗生白茅根

取汁一合飲之止

又方取生葱心

塞鼻中即定

若因刺著并刀斧

所傷血不止

並用之立定

又方取亂髮灰

細研以竹管吹入

鼻中立止

生地黄

當歸

桂心

黃芩

雞蘇散 治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 每兩四錢 黃芩 各兩二錢 當歸 各兩二錢

赤芍藥 各兩二錢 伏龍肝 各兩二錢 阿膠 各兩二錢

右為粗末每服四錢水一錢煎至六分去滓温服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁 半合 刺薊汁 各一合 生地黄汁 各三

生薑汁 半合 白蜜 一合 生地黄汁 各三

右和煎三兩沸無時以一小錢調炒麝香一錢

服

千金翼治吐血百方不差療十十差神驗不傳方

詳此藥性治熱毒吐血有效

地黃汁 半升

生大黃末 十一方

右煎地黃汁三兩沸調大黃末分為三服

又方 伏龍肝

右研令極細每服二錢新汲水調下頻服取效

又方 白茅根 一握長

右以水一大盞煎取七分去滓温服

又方 桂心末

右水調方寸匕日可二十服

又方 生地黄 三斤

阿膠 二兩 蒲黃 六分 合

右水五升者大取三分三服

圓服即效 養生必用 蘇合香圓 乾姜 蘇

柔脾湯

治虛勞吐血衄血下白汗出方必用養

甘草

白芍藥

黃老日各一兩

熟地黃

右為末每服四錢水酒各一盞已上煎至七分

去滓取六分清汁溫服食前

因丈不妄行而嘔血諸藥無效

用青餅子低頭安負重吐血諸藥無效

解於大陰血生即頭安負重吐血諸藥無效

柔之於大陰血生即頭安負重吐血諸藥無效

以陰來之於大陰血生即頭安負重吐血諸藥無效

無效煖之於大陰血生即頭安負重吐血諸藥無效

四生圓療

吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黄

右等分爛研圓如雞子大每服一圓水三盞煎

至一盞去滓溫服無時

僧不留飲食將竟侍者赴堂齋罷來侍立見阜子

肺也明極年再聲折報之舉首即嘔血者無急否

主僧答云得四生圓服之遂愈自得此方屢救

療熱甚嘔血者以犀角地黄湯局方小三黃圓以

白茅根煎濃湯吞之妙

犀角地黄湯治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

為藥

生地黄

牡丹皮

去心

犀角屑一兩 右吹咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩

香餅子 治咯血

杏仁炒各一兩 右一處同研成膏熔黃蠟和作三十餅子每服

一餅子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同

乾薑甘草湯 若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜

服

甘草兩各半 乾薑兩各半

右吹咀水煮頓服 局方理中湯亦妙方見和劑

婦人痲痺諸氣方論第七凡四方

夫婦人痲痺者本因邪氣積聚而生也痲者在腹
內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者
如指因氣而成如弦之狀名曰痲氣也痲者為僻
側在兩肋之間有時而痛故曰痲也夫痲之與痺
皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宜流邪冷
之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰痲痺者也
麝香圓 治婦人痲痺冷氣兼症氣心腹痛不可忍

麝香別研 阿魏一分 熟麝香

五靈脂別研 桃仁一分 三稜各三分

芫花醋炒 檀榔各一分 菽茂

桂心 沒藥九 木香

當歸 各半

右為細末入麝香令停用粳米軟飯為圓如梧
桐子大每服十圓無時淡醋湯下

治婦人瘕癥及血氣等神效方

右以攢猪肝一具可及十兩者用巴豆五十枚

去大皮剝在肝內用醞醋三椀慢火熬令肝爛

熟入砂鉢內研令極爛入京三稜末和就所得所

為圓如梧桐子大每服五圓食前熱酒下想熟去

肥不用○夫瘕癥血氣塊硬發歇一刺痛甚

則欲死而不可忍甚而所為僕嘗治一婦人

併治數年痛不愈僕以葱白散烏雞煎丸

一治婦人年痛不愈僕以葱白散烏雞煎丸

血氣用杖定方小氣止楚如葱白散烏雞煎丸

有奇效故此錄于后亦用此二藥而愈尋常小

烏雞煎丸

方見遺門十四

葱白散

專治一切冷氣不和及本臍膀胱氣攻衝

疼痛大治婦人產前後腹痛胎不安或血刺痛者

無能治血藏宿冷百節倦疼肌體怯弱帶傷帶癖

久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎 當歸 枳殼 乾姜

厚朴 桂心 舶上茴香 香皮

芍藥 木香 熟地黃

若練子 三稜 莪茂

麥牙 神麩 黃同煎 人參各等

存為細末每服三平錢水一盞連根葱白二寸

拍破鹽半錢煎至七分溫服內大黃呵子宜相
度病狀如大便不利入大黃同煎却不入鹽如
大便自利入呵子煎朱先生云此藥大治心
藥治浮腫立效陳宣人病血氣作楚痛不可忍
服諸藥無效漸成痲痺也此以脈沉弱為肝脈
差四明馬朝奉院亦病此用此二藥愈
羅安人每遇經脈行時則臍與小腹下痛不可忍
服藥無效僕以桂枝桃仁湯愈自後再發一投而
差

桂枝桃仁湯

方見第一卷十一論

治經候來時先腹痛續添六德局方七氣湯吞下

復丹

婦人疝瘕方論第八凡四方

夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒溫不調氣血
勞傷臟腑虛弱受於風冷冷入腹內與血相結所
生疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃
動也婦人之病有異於丈夫者或因產後血虛受
寒或因經水往來取冷過度非獨因飲食失節多
挾於血氣所成也診婦人疝瘕其脈弦急者生虛
弱小者死又尺脈瀦如浮牢為血實氣虛也其癸
腹痛逆氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久則
結成瘕也

乾漆湯

治婦人疝瘕久不消令人黃瘦疰高脚西眩

妨心腹疼痛

乾漆炒令烟盡

木香

芫花醋炒

赤芍藥

川芎

牛膝 三分

右為細末無時溫酒調下一錢

硃砂圓

治婦人疝瘕及積瘀血在臍時攻腹脹疼

痛

川芎

雄黃

三稜 各二

右為細末用米醋一

碗熬大黃末為膏次入餘

藥末和圓如梧桐子大空心溫酒吞十圓漸漸

加至二十圓以利下惡物為度

桂心

琥珀 各半

桃仁 一兩

當歸

當歸 二兩

硃砂

桂心

各一兩

各半兩

大黃 炮

大黃 炮

大黃 炮

巴豆圓

治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆

五靈脂

右為末煉蜜圓如菽豆大淡醋湯空心下五圓

熱酒亦可

良方黑神圓

神麩

便神椒

者黃漆

千右除椒

漆和圓

候外軋

茴香 各四

丁香 各半

檳榔 四枚

木香

桃仁 各三

大黃 炒 各一兩

膀胱痿癱及疝墜五臟血崩產後諸血漏下赤
者並一圓分四服死胎一圓皆繇灰酒下難產
炒葵子四十九枚擣碎酒煎下一圓諸疾不遇
三服瘥氣十服膈氣瘥癰五服血瘥三圓當差
予族子婦病腹中有大塊如杯每發痛不可忍
時子而貴京下若醫者悉常服有藥莫愈○
陳應之曰此血瘥也投黑神圓
三圓杯氣盡消終身不復作

婦人八瘥方論第九 凡一方

夫婦人八瘥者皆由胞胎生產月水性來血脉精
氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為
子戶主定月水生子之道胞門主於子精精神氣
所出入合於中黃門玉門四邊主持關禁閉子精
暗下三寸名曰開元主藏魂魄婦人之胞三焦之

府常所從止然婦人經脈俞絡合調則月水以時
來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通
邪氣便得往入合於其藏若生血未盡而合陰陽
即令婦人血脉牽急小腹重疼支滿胸膈腰背相
引四肢疼痛飲食不調結牢惡血月事不時或前
或後因生聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢
寒熱四肢不舉陰中生氣腫肉生風甚者害於小
便小腹菜痛淋瀝面色黃黑則不復生子其八瘥
者黃瘥青瘥燥瘥血瘥脂瘥狐瘥蛇瘥鱉瘥是也
千金外臺言之詳矣

桃仁煎治婦人血瘥血積經候不通 出本事方

桃仁 各一兩
大黃 各一兩
蝨虫 炒黑

川朴消一兩

右四味為末以醇醋二升羊銀石器中慢火煎

取一升五合下大黃桃仁蟲虫等不住午攪欲

下牛圓下朴消更不住午攪良久出之圓如梧

桐子大前一不用喫晚食五更初用温酒吞

下五圓日牛取下如赤豆汁或如鷄肝蝦蛛衣

狀未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥補

之此方出千金便項年在胎腹有不一貴官妻患小

作淋治如入正散之類數種皆治不可忍喪醫皆小

藥更初服至日血疲也非暝眩藥不痛愈甚

塊如奉者數枚小大便如黑豆汗一虛二升痛止得

血愈弱此藥更宜斟酌與之猛烈峻氣虛二升痛止得

婦人腹中瘀血方論第十凡二方

夫婦人腹中瘀血者由月經否澁不通或產後餘

穢未盡因而乘風取涼為風冷所乘血得冷則成

瘀血也血瘀在內則時時體熱面黃瘀久不消則

憂成積聚癥瘕也

桃仁散

當歸 鱗鱗燒灰 水蛭 烏賊骨

桂心 各半 赤芍藥

右為細末食前温酒調下一錢

桃仁圓治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來

心腹滿急

心脾 桃仁 水蛭 各四枚 炒焦 大黃 三炒 各 二兩 蝨虫 炒去 足

右為末 煉蜜圓如梧桐子大 每服五圓 熱酒吞 下 未加至八圓

婦人癥痞方論第十一 凡三方

夫婦人癥痞者由冷熱不調 飲食不節 積在腹內 或腸胃之間 與臟氣結搏 其牢強推之不移者 名曰癥 言其病形微可驗也 氣壅塞為痞 言其氣痞 澹不宜暢也 皆得冷則發 動刺痛 癥痞之病 其形 冷結 若冷氣入於子藏 則使無子 若冷氣入於胞 略搏於血 血得冷則澹 亦令月水不通也 川山甲散 治婦人癥痞及惡血氣攻心 腹疼痛 面

無顏色 四肢瘦弱

川山甲 炒 蟹甲 醋炙 赤芍藥 各一

大黃 炒 乾漆 烟炒 盡令 桂心 各一

川芎 荒花 醋炒 當歸 各半

麝香 一分 右為細末 入麝香 令停 每服一錢 無時 熱酒調

蓬莪圓 治婦人癥痞 腹脇妨痛 令人體瘦 不思

飲食

我茂 三分 當歸 炒 桂心 大每服

赤芍藥 檳榔 枳殼 琥珀 各半

木香 昆布 四十五

桃仁 大黃 各一
右為末煉蜜圓如梧桐子大食前粥飲下二十

丁香圓 治婦人癥痞結塊不散心腹疼痛

雄雀糞 炒黃
當歸 炒
荒花 醋炒
巴豆 皮一分
硃砂 一分
硃砂 一分
硃砂 一分

右為末同研令停醋煮麩糊圓如小豆大當歸酒下三圓

婦人食癥方論第十二凡二方

夫婦人食癥者由臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不能消化與藏氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥也

礪砂圓 治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礪砂 炒
三稜 炒
巴豆 心三枚
青礪石 穿山甲
乾漆 烟炒
硫黃 各兩

右為末用軟飯圓如小豆大每服五圓生姜橘皮湯下

礪石圓 治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

礪石 味苦
香礪石 味苦
巴豆 心去皮
朱砂 一分
硃砂 一分
硃砂 一分

右研令停以糯米軟飯和圓如菜豆大每服二圓空心溫酒下取下惡物為度
夫婦人積年血癥塊方論第十三凡七方

夫婦人積年血癥塊者由寒濕失節臟腑氣虛風冷在內飲食不消與血氣相結漸生顆塊盤牢不移動者是也皆因血氣勞傷用永往來經絡否滯惡血不除結聚所生也久而不差則心腹兩脹苦痛害於飲食肌膚高羸瘦

乾漆圓 治婦人積年血微塊或攻心腹疼痛四肢不和面少血色飲食全少

乾漆 烟炒盡
 硝石 研
 延胡索
 莪茂 各三
 桂心 各半
 巴豆 三十分
 油用
 水粒
 去皮
 煎心
 如研
 錫去

右為細末用束肉和圓如梧桐子大每服五圓

於日未出時煎蘇木湯吞下量患人輕重加減服之

琥珀圓 治婦人積年血癥塊不消狀若鬼胎之候

琥珀 研
 荒花 製
 生地黄
 驚甲
 三稜
 大黃
 乾漆
 牛膝
 桃仁
 當歸
 延胡索
 桂心
 梧桐子
 子大每服十圓空心温酒下

右為末醋煮礮砂為膏入藥末和搗三二百杵

石圍砂圓

治婦人積年癥塊不消

雄雀糞 雄黃 雄黃 雄黃

水銀

研以少星肥者

雄雀糞

分

巴豆

去十粒

右研停肉圓如菜豆大空心當歸酒下三

圓臨卧再服取不惡物為度

淡菜圓

理五積氣癖及驚悟血積癥癖血癥癸歇

攻刺疼痛嘔逆噎塞心中迷悶不醒入事及血鼓

癥瘕脹滿經脉不行者 靈苑方

荒花 升去枝梗取二兩用好好醋

入醋內煎成膏留元藥用 研

沒藥 別研成膏留元藥用 研

草撿 西各 檳榔 肉桂 木香 肉豆蔻

班猫 炒三枚去頭足翅糯附子 用去皮

右一十二味除班猫沒藥餘為細末與班猫沒

藥一處合研令停入前膏子內和擣千百杵圓

如赤豆大初服一圓用醋炒蘿白子令焦黑以

酒浸同煎一二沸放温吞下漸加至五圓七圓

即止如急卒血氣攻心脾以酒醋共一銀錢煎

沸吞下婦人血癥癥癖結塊攻心疼痛悶絕久

醫不効者入禹餘糧一兩火煨醋淬七次研細

和藥為圓每服五圓用蘇木節二兩細剉酒三

升煎至七合去滓分為三服吞藥併進三服當

汗出則癥隨大小腸遂下其病立差人弱者每

等疾即入丹砂六兩細研和停以生薑鹽湯吞
下三圓

五靈脂圓 治婦人積年癥塊及惡血氣久不除

五靈脂 乾漆 川烏 礞石 麝香 巴豆 醋 糊圓如棗豆大每服五圓

右為末研停醋煮麪糊圓如棗豆大每服五圓

三稜煎 治婦人血癥食積痞滯

三稜 莪茂 青橘皮 去白 麥牙 醋 糊圓如梧桐子

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊圓如梧桐子

水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹

中卒暴疼痛而有黥黥梨黑面癩瘡百病方
經癥花蕊石 木香 乾姜 班猫 縮砂仁 紅豆 生地黃汁 班猫

大每服三四十圓淡醋湯下痰積多姜湯下

水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹

中卒暴疼痛而有黥黥梨黑面癩瘡百病方

經癥花蕊石 木香 乾姜 班猫 縮砂仁 紅豆 生地黃汁 班猫

桂心 木香 乾姜 班猫 縮砂仁 紅豆 生地黃汁 班猫

臘月狗膽七枚 生地黄汁 班猫 乾姜 班猫

童子小便各一 班猫 乾姜 班猫

升同炒米黃 班猫 乾姜 班猫

若丸味為末同三汁熬為膏和上末圓如鷄頭

大朱砂為衣每服一圓溫酒嚼破食前服米飲

亦可孕婦莫服

婦人血氣心痛方論第十四 凡五方
夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪
氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疹者心
為諸臟之主而主於神共正經不可傷傷之而痛
者名為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡
為風冷所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成疹者
也

烏藥散

治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥

荜茇

桂心

當歸炒

桃仁

青皮

木香

右等分為末每服二錢熱酒調下

阿魏圓

治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸炒

桂心

青皮

附子炮

阿魏

白朮

川芎

吳茱萸

木香

乾薑

檳榔

肉豆蔻

延胡索

荜茇

朱砂

右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末搗三

百杵圓如梧桐子大每服二十圓食前熱酒下

雞古香散

治男子婦人九種心痛一切冷氣

良姜

桂心

赤芍藥

右為細末每服三錢水一錢入鹽木瓜三片同

煎七分溫服鹽湯點亦可血氣疝瘕痛用熱醋

湯調下忌生冷

又一方名應痛散

治心脾痛不可忍者婦人脾胃血氣作心脾痛尤

効方同只無桂心用醋煎醋湯點亦可

初飲不吐此保神 即飲作梗非局方九痛圓則不

吐飲不吐此保神 即飲作梗非局方九痛圓則不

吐飲不吐此保神 即飲作梗非局方九痛圓則不

陳氏二神圓治婦人血氣不和作痛不止及下血

無時日水不調

真蒲黃炒

草撓鹽炒

右等分為細末煉蜜團如梧桐子大無服三十

圓空心溫酒吞下如不能飲米飲下兩服即止

陳日華拙力散治婦人血風血氣等疾武與戒司

機宜候愷云見一道人用此方療病不一而是遂

以為獻真是奇妙

五靈指

菘茂

桂心

雲臺子半炒兩各

右為末每服二大錢酒半瓊水半盞煎至八分

疾作熱服

失笑散

見產後

呵子散

見霍亂

靈苑方治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂為細

末每服一錢酒一盞煎沸熱服

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

夫婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其

間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心

或下攻於腹故云血氣攻心腹疼痛也

延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 木香 枳殼 熟地黃 桃仁 各等分

夫右吹咀每服三錢水一錢姜三片煎至七分去滓熱服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止

琥珀 沒藥 牡丹皮 延胡索 當歸 赤芍藥 桂心 等分

右為末每服一錢溫酒調下

沒藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行

兒枕塊痛 沒藥 研並細 桂心 紅花 乾漆 炒

當歸 蒲黃 延胡索 赤芍藥 等分

右為細末每服二錢熱酒調下食前服

治血塊衝心叫噉其痛至危者如喫不得可灌下

右用真大順散三錢熱酒調服立止

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通

片子薑黃 牡丹皮 莪茂

或下紅花薑黃
赤芍藥
蘇州芎
延胡索
桂心
赤芍藥
延胡索

右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分温服

八僊散 治婦人血氣心腹疼痛立驗

當歸 厚朴 芍藥 甘草

枳殼 製 人參 各四分

琥珀 茯苓 各五分 肉豆蔻 二分

右為末水二升煎取八合空心分三服

八僊散 治婦人血氣心腹疼痛立驗 靈苑方

東林 棕櫚 當歸 靈苑方

麝香 細研 靈苑方

右同研令停每服一錢温酒調下

不換金散 治婦人血刺痛不可忍 靈苑方

三棱 莪朮 並細 巴豆 去殼各

右三味以醞醋一椀熬醋成膏為度先將糠固

濟一罐子陰乾後將藥并醋膏一處置罐子中

外用泥裹以平瓦子一片蓋之用炭火五七斤

煨當者守纜候煙急出即取出看通黑則止不

急得燒過了便入乳鉢內細研為末有患者炒生

大薑酒調一錢服 靈苑方

定奪散 治婦人急血氣 靈苑方

大生烏頭 去皮 牡丹皮 桂心 各二分

右為細末每服一錢酒半盞童子小便半盞煎

至七分温服如婦人血瘀血氣胎血積聚上衝
心膈須臾欲絕者用酒一盞生薑一片煎至七
五分去滓通只服此方一盞或五分温服

大効琥珀散 治婦人心膈迷悶腹藏拍撮疼痛氣
急氣悶月信不調等疾 靈苑方未古惠春秋生

烏藥 各一兩 當歸 一兩 五不
右並生為細末温酒調二錢服服後以食壓之
忌生冷油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調
下

治血氣不調脐下痛
桑耳 菴藷子 桂心 靈苑方
土瓜根 川芎 各四分 甘草 二分

牛膝 赤茯苓 各五分 大黃
白芍藥 各六分 乾地黄 八分
右為末煉蜜圓如梧桐子大醋湯吞下二十圓

蠲痛散 治婦人血氣刺痛
艾枝核 半燒存性
右為細末鹽湯米飲調下二錢不拘時候服

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者
紅花 沒藥 當歸
延胡索 炒

右等分為末每服二錢童子小便酒各半盞同
煎至六分熱服只用秤鏟淬過調亦可常服只
用温酒

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食生方

牡丹皮末各一兩 桂心各一兩 莪茂各一兩 延胡索各一兩 當歸各一兩 赤芍藥各一兩 荆三稜各一兩 牛膝各一兩 同

右為粗末每服三錢水一盞酒半盞煎七分温服

至聖湯 治婦人血氣產前產後百疾出全前

當歸各一兩 芍藥各一兩 桂心各一兩 乾薑各一兩 蒲黃各一兩 黑豆各一兩 地黃各一兩

右為細末空心熱酒調下二錢

天僊散

卷十論二

方見二論十卷第七

葱白散

方見本卷第十論中

琥珀散

方見一

治婦人腹脹刺痛以局方七氣湯加延胡索少許同煎服若胸膈不快惡心更間服局方烏沉湯兼治月水不調或前或後

菖蒲圓

治婦人脾血積氣及心脾疼男六德續漆

菖蒲九節者 吳茱萸泡 香附子炒去毛 各六兩

右三味並剉細以釀醋五升煮乾為度焙乾為細末以好神麩打糊為圓如梧桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五十圓日三服橘皮湯亦

延胡索散

治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月

水不調面色痿黃喫食減少及產後諸疾並皆治之

延胡索生香三棱生圓日當歸去蘆酒浸

蘇木醋浸少時各等分

右為末每服二錢空心温酒調如血氣發甚者

及月水不調並皆童子小便酒紅花同煎調下

當歸煎圓治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力

月候不調同前當歸別二兩檳榔要前赤芍藥

牡丹皮別二兩延胡索各一兩

右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和圓如

梧桐子文空心温酒下二十圓午食前再服

神聖北亭圓治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不

可忍者及多方醫療未差宜服靈苑方

北亭去石研沒藥木香

當歸各一分芫花各半

巴豆去皮膜心

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋三升同

煮為稀膏然後將餘四味為細末入於膏內搜

合成塊用新瓦合盛之臨時加減圓數用酒醋

各半煎數沸通口服不得嚼破仍須喫盡酒

醋立差或男子元氣亦依前方服食如急喉閉

昔男左女右以一圓鼻中嗅之立愈其中云臨

水菴也既有北亭荒花巴豆合當圓如菴豆大每服只五圓式以一圓鼻中臭之立愈其中

琥珀散治產前產後血氣不和及一切疾

當歸微炒 川芎各一兩 赤芍藥二兩

右為末每服二錢空心溫酒調下如腰腹痛加

陳皮去白羊兩乾薑炮半兩為末同和停如不

喫酒以水一盞煎至七分溫服

婦人血氣小腹疼痛方論第十六凡四方

夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有風冷搏

於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也

歲靈散治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

歲靈仙一兩 當歸各半 沒藥一兩

木香各半 桂心各半 右為細末無時熱酒調下一錢服忌茶

當歸散治婦人久積血氣疝刺小腹疼痛四肢無力不能飲食

當歸炒 赤芍藥 劉寄奴 延胡索等分

沒藥 右為細末熱酒調下一錢無時候

追氣圓治婦人血刺小腹疼痛不可忍

靈苑方 芸臺子微炒 桂心各一兩 良薑半兩

右為細末醋糊圓如梧桐子大每服五圓無時

淡醋湯下常服補血虛破氣塊甚有效

五十七

石灰散 治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方出經

右取猪貼瘡血半瓊於湯上煖用杖子攪停後

用石灰於火上燒令黃為末羅過入灰一錢同

血攪停放温服立愈一建無却新

婦人面眩脹痛方論第十七凡六方
夫婦人面眩脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷
之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞
不宜邪正交爭衝擊故令面眩脹痛也

草豆蔻散 治婦人脾胃虛氣攻面眩脹痛

草豆蔻 厚朴 各三
呵子肉 略一
桂心 一分
甘草 一分

川芎 當歸 乾薑

檳榔 各半兩

右為粗末每服四錢水一瓊煎七分去滓熱服

食前

菴蘭子散 治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻面眩脹痛

坐卧不安

菴蘭子 延胡索 桃仁
桂心 琥珀 當歸 各一兩
赤芍藥 木香 沒藥 各半兩

右為末每服二錢温酒調下無時候

人參紫金圓 治婦人榮衛不和心腹刺痛胸高脹

滿不進飲食饒武傳方

紫金皮 蒼朮 石菖蒲 香附子 人參 木香 三錢

右為末 米糊和圓 如梧桐子大 每服三十圓 食後薑湯下

氣針圓 治久積風壅 跣利滯氣 空胸馬止刺痛

木香 青皮 去白 大黃 炮

右為末 煉蜜圓 如梧桐子大 溫水下三十圓 安鄧
痛人年五神十忽然氣痛投神保圓愈不疾轉甚
亦再服神保然氣痛投神保圓愈不疾轉甚
則葉心要用沉香木香薑桂等藥而末假投定痛甚
問僕診聲微皆召僕診之六脈有沉伏之脈來乍去眾
日也僕以證脈辨貴痛也其腹必脹但以人按之痛數

三刻

甚午不可向通此大實也經云大滿大實者
在下金陵有氣針圓通五六百粒是夜即愈大實者
眾醫投僕木香家提香榿之百粒是夜即愈大實者
益甚時兩僕曰大凡火以六脈知其緊而痛和菜似桂
瘵醫僕曰大凡火以六脈知其緊而痛和菜似桂
兩醫曰然難經云虛則何痛不實則生風冷虛氣是也
有桂枝加芍藥湯云實者桂枝湯云是也瘵僕有
一婢按此之苦實熱無可疑者當用大柴胡湯呼
不可婢此實也熱無可疑者當用大柴胡湯呼
喚異眾僕曰此實也熱無可疑者當用大柴胡湯呼
治之眾僕曰此實也熱無可疑者當用大柴胡湯呼
狀而論助疼服木通散

木通散

出亦明理方男子

心下膈少腹疼痛皆素有積寒而溫煖湯散亦
可治甚者以溫菜下之心下與小腹痛諸書並
有方而助下痛鮮獲治法

水通散治腹助苦痛偏効併心下腹助并小腹卒

引痛者皆主之

木通去膜 青皮法 練子去核

已上三味用已豆不用煎 蘇羅蔔子炒

船上 茴香炒 莪茂 木香

右為細末煎葱白酒調三錢一服愈甚者不過

再服

三腕散治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大

便秘澁兼治脚氣

大腹皮 紫蘇 沉香

乾木瓜 獨活 白朮

川芎 木香 檳榔 甘草

皮陳 每服三錢水一盞煎至七分去滓空心

右吹咀 熱服日中服戊午秋 在京城有便秘澁六脉虛弱

更數醫服藥無效僕張 痛大便便秘澁六脉虛弱

婦人心腹脹滿方論第十八 凡三方

夫婦人心腹脹滿者由臟腑久冷氣血虛損而邪

氣客之乘於心脾故也 足大陰脾之經也脾虛則

脹足少陰腎之經也其脉起於小指之下斜趣足

心入跟中上股內後廉貫腎絡膀胱從腎上貫肝

鼻入肺中其支者從肺出絡於心藏虛邪氣客於

經與正氣相搏積聚在肉氣爭於脾脾虛有脹

故令心腹煩滿而脹也診其脉遲而滑者脹滿也

木香散治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四

肢少力

白木香各半 草菓仁各三 呵子肉各三

赤茯苓各半 檳榔各半 桂心各半

陳皮各半 厚朴各一兩 人參各一兩

甘草一分

右為粗末每服四錢姜三片棗一枚煎至七分

去滓食前熱服

檳榔散治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔 前胡 川芎

青皮三分 赤芍藥 桂心

大黃 苦梗 木香

枳殼各半 甘草一分

右為吹咀每服四錢姜三片煎至七分去滓溫

服無時

局方分心氣飲亦妙方見十三卷 散亦妙方見十七

論

木香散治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

木香 桂心 白木

乾姜炮 陳皮去白 草菓仁

訶梨勒各一 人參各一 神麴炒黃三

甘草各半

右為細末每服一錢如茶點熱服

故令 吐酸 噯滿 每頭 吐酸 噯滿 然 腫者 脹滿也

白散 海草 炮 研 胃氣 虛心 膈脹 滿不 欲飲食 四

肢少力 信柴 煨 草葉 輕皮 法白 軒峻 微黃 三

赤茯苓 檳榔 桂心 甘草 炙 木香 各 一分

木香 煨 研 人 難 由 是 通 今 心 朝 朝 黃 亦 為 煨 身

龍 牛 草 一 分

厚 朴 老 想 奈 齋 除 四 散 卷 十一 三 節 備 亦 為 煨 身 卷 十一


檳榔 法 研 和 四 散 研 四 散 煨 身 法 煨 身 法 煨 身

木香 煨 研 人 難 由 是 通 今 心 朝 朝 黃 亦 為 煨 身

檳榔 法 研 和 四 散 研 四 散 煨 身 法 煨 身 法 煨 身

木香 煨 研 人 難 由 是 通 今 心 朝 朝 黃 亦 為 煨 身

木香 煨 研 人 難 由 是 通 今 心 朝 朝 黃 亦 為 煨 身



程