


亥23  
18-441

# 六科準繩

外科  
卷一



外科準繩自序

周禮天官冢宰之屬有疾醫瘍醫內外科之分久矣疾醫中士八人瘍醫下士八人重內輕外自古已然然未有不  
精乎內而能治外者也疾醫之所不能生者於父母遺體猶得全而歸之而瘍醫不然至於爛筋骨潰肌肉見藏府  
而後終焉故疾病於人惟疔瘍最慘而世顧輕之何哉乃世之瘍醫明經絡諳方藥而不嗜利惟以活人為心者千  
百無一也其見輕固宜然不曰并自輕其命耶余童而習岐黃之術弱冠而治女弟之乳瘍虞翁之附骨瘍皆起白  
骨而肉之未嘗有所師受以為外科易易耳欲得聰明有志者指授之使為瘍醫而竟無有故集先代名醫方論融  
以獨得而成是編與世專科書圖人形列方藥說為祕傳者萬萬不侔能熟而玩神而明之可以名世矣余既以便  
差還故山例得支俸受之則不安辭之則立異乃以付梓人逾朞而後竣事於是諸科分證用藥之書略備夫孰使  
余竊祿於朝而又得優游編葺以行於世豈非聖主之賜也歟萬曆三十六年歲在戊申七夕微雨作涼金壇王肯  
堂奢懶軒下書

外科準繩目錄

卷一

癰疽之源一

癰疽之別二

脈法三

分經絡四

善惡五

虛實六

內消七

內托八

灸九

鍼烙十

砭鎌十一

敷貼十二

淋洗十三

將護十四

禁忌十五

腫瘍十六

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃耆湯

發表托裏榮衛湯

加味當歸飲子

人參敗毒散

郭氏神效烏金散

奪命丹

蟾酥丸

寸金丹

烏金散

勝金丹

奪命丹

內托羌活湯

淨脈湯

白芷升麻湯

托裏溫經湯

內托黃耆酒煎湯

內托黃耆柴胡湯

當歸拈痛湯

縮毒金粉散

復煎散

升麻和氣飲

金鍼散

十宣散

十六味流氣飲

千金托裏散

托毒散

攻裏聖濟射干湯

托裏散

破棺丹

瀉心湯

清涼飲

漏蘆湯

內消升麻湯

單煮大黃湯

宣毒散

內托散

車螯散

內消丸

神仙解毒萬病丸

郭氏瑞效丸

萬靈奪命丹

一粒金丹



威靈仙飲

表裏五香連翹湯

千金漏蘆湯

防風通聖散

升麻和氣飲

半表半裏中和湯

內內托散

國老膏

牛蒡粥

解毒散

清心內固金粉散

內追毒丹

獨勝散

遠志酒

越鞠丸

五香散

忍冬酒

金銀花湯

槐花酒

黃耆湯

生地黄散

阿膠飲子

牛膠飲

黃礬丸

托裏消毒散

托裏散

散毒飲子

神效托裏散

本事黃耆散

黃耆四物湯

內固黃耆丸

回陽湯

清熱消毒散

黃連消毒散

黃連解毒湯

清心湯

濟陰湯

元參散

仲景排膿湯

排膿散

本事托裏排膿生犀散

連翹飲

淵精要柞木飲子

車螯散 二方

內消散

化毒為水內托散

仙方活命飲

潔古保安湯

秘方托裏散

秘方拔毒散

歸耆湯

破毒無比散

消毒散

榮衛返魂湯

龍虎交加散

護心散

當歸連翹散

如神托裏散

生肌散

前鋒正將

引兵九鋒

加味十奇散 又名固墨元帥

蒜蒼散

敷沖和仙膏

神功散

圍藥

傅藥

將軍鐵箍膏

水黃散

外用清毒藥



圍腫方

雄黃散

烏龍膏

宣毒散

拔毒散

蠲毒散

退毒散

神功妙貼散

特異萬靈散

隔皮取膿法

雄黃散

萬應針頭丸

鐵頭散

萬槌青靈膏

四虎散

回陽玉龍膏

洪寶丹

乳香膏

金黃散

七寶丹

太白膏

天花青露散

消腫散

神護膏

水澄膏

五金膏

清涼膏

清水膏

水調膏

郭氏水澄膏

二黃膏

又方揭毒散

三消散

四面楚歌

水師晶明

點礪砂膏

六灰膏

拔生膏

灸法

神仙隔蒜灸法

神效葱熨法

神效桑枝灸

砭法

卷三

潰瘍

臍替鍼丸 二方

替鍼丁香丸

散 寒托裏溫中湯

內加味十全湯

補中益氣湯

人參養榮湯

四君子湯

六君子湯

異功散

四物湯

八珍湯

十全大補湯

歸脾湯

人參黃耆湯

托裏當歸湯

人參散

麥門冬湯

護壁都尉

六味丸

八味丸



東瀛疽用藥加減法

止痛人參內托散

退黃耆散

當歸補血湯

沉香散

加味逍遙散

栀子黃芩湯

追蝨六合回生方

驪龍散

麥飯石膏

解毒百用膏

劉氏逼毒散

青散子

雄黃解毒散

豬蹄湯

集香散

熏洗方

去死雄黃散

烏金膏

追毒丹

追毒烏金散

梧桐滂方

神異膏

止痛拔毒膏

郭氏青金錠子

翠霞錠子

信效錠子

紅玉錠子

時效鍼頭散

追毒餅

搜翠青錠子

搜膿錠子

麝香輕粉散

膏神效當歸膏

神異膏

熟瘡寒膏藥

寒瘡熱膏藥

神仙太乙膏

金絲萬應膏

善應膏

元武膏

金絲膏

貼膏法

長肌膏

生精要生肌散

平肌散

郭氏立應散

生肌散

紅玉散

完肌散

生肌散

神祕方

收木香檳榔散

治寒瘡斂瘡口藥

乳香散

聖效散

桃紅散

斂瘡口黃丹散

聖效散

久漏瘡

骨碎補丸

取朽骨方

附子散

大儂丸

桂附丸

陷脈散

取朽骨方

豬骨膏

附子散



雄黃散

黑靈散

馬齒見膏

神應膏

檳榔散

治漏外塞藥

烏金散

東垣截瘡散

應效散

癰疽所兼諸證

渴

托裏消毒散加減法

竹葉黃耆湯

托裏黃耆湯

托裏養榮湯

黃耆六一湯

七味白朮散

竹葉石膏湯

元參散

葛根散

乾葛飲

忍冬丸

桑枝方

五味子湯

加減八味地黃丸

嘔

橘半胃苓湯

托裏消毒散加減法

托裏健中湯

托裏益中湯

托裏抑青湯

托裏清中湯

托裏益黃湯

托裏越鞠湯

人參理中湯

痛

托裏消毒散加減法

黃耆人參湯

加味解毒湯

內補黃耆湯

當歸和血散

迴瘡金銀花散

郭氏定疼托裏散

乳香止痛散

乳香黃耆散

人參內托散

乳香丸

乳香定痛散

豆豉餅

乳香膏 二方



出血

東垣聖愈湯

濟生犀角地黃湯

獨參湯

托裏消毒散加減法

瘡僵肉

瘡學急牽陰入腹

咽喉口舌生瘡

精要犀角膏

大便祕結

潤腸丸

大便瀉利

加減托裏消毒散

和氣散

四神丸

二神丸

小便淋瀝頻數

托裏消毒散加減法

黃芩清肺飲

滋腎丸

五苓散

清心蓮子飲

五淋散

清肺飲

腎氣丸

琥珀散

瞿麥散

頭痛眩暈

煩躁

自汗盜汗

多痰

俱托裏消毒散加減法

喘急

人生平肺散

胸痞





托裏消毒散加減法

目斜視上

瀉青丸

四肢沉重

胃苓湯

寒熱往來

俱托裏消毒散加減法

面目浮腫

調胃白朮散

陽氣脫陷

附子理中湯

內癰

懷忠丹

肺癰

小青龍湯

加味消風散

仲景桔梗白散

四順湯

參苓白朮散

厥逆

薑附湯

參附湯

葶藶大棗瀉肺湯

黃耆湯

牡丹散

治肺癰方

桔梗湯

如聖丸

如金解毒散

瀉白散

葶藶湯

濟生桔梗湯

桔梗湯

濟生排膿湯



排膿散

寧肺湯

人參補肺湯

人生平肺散

參耆補脾湯

葶藶散

補肺散

理肺膏

五香白朮散

腸癰

薏苡附子散

牡丹湯

薏苡仁湯

牡丹散

梅仁湯

大黃湯

四聖散

雲母膏

排膿散

神仙蠟礬丸

胃脫癰

射干湯

復元通氣散

芍藥湯

心癰

涼血飲

內托散

腎癰

八味丸

加味十奇散

疥瘡

發表二活散

奪命丹

返魂丹 二方

飛龍奪命丹

走馬赴筵丹

救生丹

攻裏羅氏破棺丹 二方

內托連翹散

奪命丹

雄黃丸

追毒丸

奪命返魂散

立馬回疔奪命散

御史散

裏表加減通聖散

追疔奪命湯



加減追疔奪命湯

防風當歸湯

雄麝湯

消瘡解毒消瘡散

劫瘡消毒散

青黃消毒散

四神丹

七神散

萬全散

七聖紫金錠

朱墨丸

祛瘡散

天馬奪命丹

萬病解毒丸

刷瘡散

拔瘡散

洗瘡方

托羅氏托裏散

連翹黃耆湯

外羅氏保生錠子

滴滴金

疔瘡錠子

回瘡錠子

神聖膏藥

奪命散

郭氏寸金錠子

郭氏提丁錠子

郭氏守效散

麝香蟾酥丸

追毒丹

水沉香

海馬拔毒散

芫花根膏

治魚臍疔瘡

四聖旋疔散

拔毒散

保生餅子

濟生金砂散

鐵罐膏

蟾酥丹

鐵粉散

雄黃散

追毒丸

三因倉耳散

麻蟲膏

蛻螂膏

水沉膏

敷疔膏

灸法

鍼法

腹入百二散又名護心散

走馬拔黃散

破棺丹

立馬回疔丹

蟾酥走黃丸

危迴瘡蟾酥錠子

內疔化毒丸

霹靂火

卷三

癰疽部分

頭部



六科準繩

卷一 夕和目金

五

百會疽

頂門癰

額疽

太陽疽

髮疽

髮際瘡

癩頭瘡

腦疽

髮柴胡清肝散

癩頭松脂膏

貝母膏

加味平胃散

蟬蛻散

腦黃連消毒散

羌活當歸湯

面部二

發眉

鼻疽

發髭

顴瘍

頰瘍

發頰疔腮

面瘡

牙又發

承漿癰

癰犀角升麻湯

發連翹敗毒散

加味消毒飲子

內托消毒散

消毒救苦散

百合散

二金散

面洗藥方

面油摩風膏

瑩肌如玉散

白附丹

白附子散

祛風白芷散

耳部三

耳發

耳內瘡

耳根毒

耳後疽

月蝕水銀膏

胡粉散

耳內黍粘子湯

曾青散

黃連散

通當歸川芎散

梔子清肝散

加味地黃丸

口齒部四

口瘡

牙癰

骨槽風

上膠癰



層瘡

膏黃連升麻湯

綠袍散

蜜柏散

半夏散

甘黎散

乳香散

沒藥散

紅芍藥散

牙清胃散

東垣神功丸

瘡多效散

項部五

百脈疽

頸癰

項中疽

天柱疽

杼疽

夾喉疽

結喉癰

癰癤馬刀

東垣連翹散堅湯

升陽調經湯

散腫潰堅湯

救苦勝靈丹湯

柴胡通經湯

柴胡連翹湯

消腫湯

太乙膏

尅效散

玉燭散

羌活連翹湯

防風羌活湯

加味敗毒散

嚴氏三聖丸

保命連翹湯

三因必勝丸

白花蛇散

小犀角丸

是齋立應散

雌雄散

遇仙無比丸

射干連翹湯

括婁子散

枳殼丸

內消丸

必效散

雞鳴散

法製靈雞彈

妙靈散

內消連羌丸

薄荷丹

四聖散

瞿麥飲子

海棠丸

檳榔散

皂角煎丸

絳宮丸

治療癰結核丸藥

祛風丸

水紅花散

保命文武膏

破結散

益氣養榮湯

散腫潰堅丸



醫學

醫學大學圖書館版

補陰八珍湯

夏枯草湯

托裏救苦神應丸

化氣調經湯

追毒神異湯

蟾酥膏

綠雲膏

金寶膏

龍珠膏

蝸牛散

粉金散

東垣龍泉散

郭氏奇功散

蝙蝠散

螺反散

神聖換肌散

生肌乾膿散

如神散

三品錠子

紫霞錠子

三才絳雲錠子

碧玉錠子

清涼散餅

香附餅

荔枝膏

琥珀膏

蜂房膏

鐵筒拔毒膏

黑虎膏

十香膏

洗方拔毒湯

鍼灸法

肩部六

肩部

肩胛疽

左右串

缺盆疽

肩後疽

過肩疽

瘰癧癰

腋發

夾肢癰

臂部七

臂癰

肘癰

臑癰

白芷升麻湯

芙蓉膏

赤葛膏

泥油膏

二瓜散

手部八

手發背

手心毒

虎口疽

腕癰



手大指疽

天蛇頭

手指節發

代指

背柿根膏

心蜈蚣散

虎草靈散

落鴉槍散

脫紫金牛漆散

天蛇拔毒散

治蛇消腫散

除瘡消痛散

浸毒散

節手金雞舌散

指升麻湯

胸部九

井疽

甘疽

臃中疽

脾發疽

乳癰乳巖

內托升麻湯

神效瓜薑散

究原五物湯

連翹飲子

清肝解鬱湯

復元通氣散

消毒散

百菌霜丸

兵部手集方

張氏橘皮湯

獨勝散

皂角散

雲岐連翹湯

葛稚川方

敷乳方

卷四

脇部十

脇疽

內發丹毒

腹部十一

臍上疽

臍癰

小腹疽

背部十二

發背



腰部十三

腰疽

纏腰火丹

下部十四

便毒

毛際瘍

囊癰

陰瘡

婦人陰瘡

穿襠發

銳疽

湧泉疽

臀癰

懸癰

便毒初起

雙解散

已結成膿者

三物湯

四神散

止痛妙絕散

補骨脂散

消毒五聖湯

消毒飲

東垣青皮湯

復原通氣散

防風通聖散

蘇方散

加減龍胆瀉汗湯

退毒散

瓜蒞散

葦靈仙散

鐵圍散

癰加味瀉肝湯

立消散

敷藥方

烏金散

風藏三因四生散

加味小柴胡湯

石炭散

牡蠣散

浴毒湯

陰瘡膏

全蠍散

沐浴長春散

銅綠散

青黛散

小浴方

大蘆薈丸

八正散

洗毒湯

疝子和泄水丸

洗藥

敷藥

追膿錠子

七寶檳榔散

玉粉散

蚯蚓散

丹胞散





地理散

川連散

神妙方

麝香散

津調散

胭脂散

蝦蟆散

截疔散

甘石散

梔子散

銀粉散

博金散

勝金散

婦人洗搨散

甘瀝散

桃枝重法

蛇床子散

齧內托羌活湯

懸甘草膏

清心蓮子飲

加味托裏散

加味十全大補湯

雞內金散

股部 十五

股陰疽

股陽疽

附骨疽

腿游風

委中毒

骨附黃狗下頰方

三生散

內托黃耆柴胡湯

內托黃耆酒煎湯

嘗歸散

漏蘆湯

應痛丸

貫服湯

蜜陀僧散

膝部 十六

鶴膝風

加味小續命湯

羅氏伊祁丸

換骨丹

大防風湯

還少丹

脛部 十七

脛疽

脛陰癰

三里發

接骨發



騙馬墜

青蛇便

瓜藤纏

濕毒流注

下注瘡

內踝疽

外踝疽

多骨疽

腓脛發

臙瘡

風疽

乳香散

臙二妙丸

黃耆丸

翠玉膏

乳香散

輕粉散

隔紙膏

奇妙梔子散

腎風 蒺藜丸

驢蹄散

風防風湯

海桐皮散浸酒方

足部十八

脚發

脫疽

脚氣瘡

田疽 散甲

脚指縫爛瘡

足跗發

足跟瘡

足心癰

脫五神散

洗瘡方

脚氣 犀角散

漏蘆丸

鹿茸丸

甌礬散

龍骨散

痂蝦蟆散

豬蹄湯

白礬散

馬齒散

蘭茹膏

綠礬散

蛇黃散

乳香傳方

牡蠣散

烏梅散

華陀治嵌甲累效方

砂糖散

乳沒散

烏倍散

黃連散

香胭脂散

雄蟬散

陀僧散

黃耆方

蓋水駐軍丸

乳香散

詞子散

膽礬散

神應散

猓跗 牛黃金虎丹

牛膝散

百草膏

尺心 五靈散

敷藥



洗藥

刺松脂膏

無食膏

熏硫散

蟾酥膏

卷五

諸腫

兩面龜散

雞尿子散

退熱消毒散

天花刮毒散

退腫消核散

消腫切毒散

犀角散

熨風散

蠶沙熨方

水澄膏

石癰石疽

黃連散

大黃散

沉香湯

癰疽

射干散

丹砂膏

反花瘡

甘草塗傅方

惡實根塗傅方

多骨疽

時毒

托裏溫經湯

郭氏升麻牛蒡子散

芩連敗毒散

葛根牛蒡湯

返魂丹

漏蘆湯

五利大黃湯

加減解毒丸

羅氏漏蘆散

消毒丸

防風通聖散

通聖消毒散

六科雜覽

外科目錄



中和湯

芩連消毒飲

通氣散

流注

瘡科流氣飲

敗毒流氣飲

方脈流氣飲

去熱散

九金六馬散

散血消核湯

二馬散

立效散

浸酒方

續骨散

輕腳散

啣骨散

蠲脊散

蠲肌散

退創散

鈎藤鈎散

馬鞭散

妙草散

二妙散

楊梅瘡

萆解湯

換肌消毒散

蠲瘰消毒散

蠲毒換肌飲

丸藥

膏藥

發微瘡毒方

熏法

洗方

水銀膏

惡瘡

乳香消毒散

連翹

救苦黃耆散

托裏金銀地丁散

紫花地丁散

增益四物湯

碧霞挺子

蝕惡瘡方

拔毒散

桑螵蛸散

洗瘡藥

塗藥

萬寶代鍼膏

龍葵散

神效方

乳香散

熊膽膏

烏金膏

桃花散

丹毒



金花散

漏蘆湯

五香湯

鬼遺金花散

聖塗散

麻黃散

拔毒散

十二件單方

郭氏金黃散

赤白遊風

如冰散

紫白癩風

龍蛇散

何首烏散

當歸散

本事烏頭丸

塗藥

三黃膏

四神散

紫白蛇散

酸石榴丸

桑枝煎

硫黃膏

灰藿膏

白烏蛇散

防風湯

苦參散

摩風膏

玉粉膏

三聖膏

紫桂散

應癆烏蛇散

炊帚散

女萎膏

蜀水花膏

蒼耳丸

烏白癩

烏蝟皮丸

硫黃散

大黑神膏

蜂房釀酒

白蛇散

鯪鯉甲丸

天麻煎

苦參酒

癩疹

苦參丸

石南湯

加味羌活飲

羚羊角飲

樺皮散

犀角散

鬼箭羽散

漏蘆丸



南京中醫藥大學圖書館藏

楓香丸

加味烏荊丸

烏蛇膏

葫蘆膏

莽草膏

青羊脂膏

葫蘆煎

楓香湯

葫蘆根湯

地骨皮湯

卷柏散

丹參散

升麻膏

疥癬

升麻和氣飲

當歸飲子

除濕散

苦參丸

四生散

羌活散

神效散

八仙散

一上散

五龍膏

楓實膏

疥

麻黃飲

消毒散

升麻和氣飲

枳殼散

枳殼丸

苦參丸

赤小豆散

脂調散

掃疥散

秘傳一掃光

一上散

諸般疥瘡加減法

蘭如散

丹砂膏

巴豆膏

神異膏

白礬散

苦參散

苦參湯

一笑散

神捷散

殺疥藥

乾秦丸丸

皂角膏

一上散

濕烏頭散

黃連散

暴疥羅氏木香散

砂瘡漏蘆散

藜蘆膏

苦參湯洗方

癬



何首烏散

白蔞藜散

苦參丸

三神丸

胡粉散

銀粉散

八寶散

五倍子散

丁香散

水銀膏

定粉膏

黃連膏

半夏散

東坡家藏方

鯽魚膏

凌霄花散

柞葉荷草散

砒霜散

瘋烏蛇丸

白花蛇丸

宣風換肌散

雄黃膏

硫黃散

丹參湯

乾羅氏柏脂膏

一抹散

濕硫黃散

黃連散

螺殼散

荊芥散

祛濕散

浸淫瘡熱肝浸漬成瘡

升麻湯

香瓣瘡方

雞冠血塗方

天泡瘡

瘰

旋覆花丸

黑末子

熱瘡癩子

白疾藜散

蜜陀僧散

白金散

玉粉散

七寶散

赤石脂散

龍腦粉方

玉女英

棟花粉傳方

瘡癩



羚羊角散

秦光湯

當歸飲子

烏蛇散

荆芥散

防風散

牛膝散

蒺藜丸

黑龍丸

莽草膏

柳枝湯

丹參湯

垂柳湯

結核

海藻連翹湯

連翹丸

五香散

連翹散

獨活散

清肝益榮湯

癰瘡

海藻丸

守瘻丸

海藻酒

白頭翁丸

海藻散堅丸

五木通散

五瘻丸

昆布丸

藻藥散

二海丈

消瘻散

含化丸

通氣丸

黃藥酒

昆布散

三因破結散

玉壺散

人參化瘻丹

羅氏寶金散

海帶丸

鍼砂方

昆布散

神效開結散

六癰清上清鬱湯

解下除濕湯

南星散

枯瘤膏

井金散

造土黃法

黃龍膏

枯瘤方

點瘤贅方

龍骨散

麻藥

止血藥

桃紅散

脫

痣





手足皴裂

東垣潤肌膏

黃蠟膏

凍瘡

如神散

雄腦膏

柏葉膏

椒欖散

漆瘡

發癩

類破傷風

水入瘡

皂子散

鉛丹散

去水膏

馬汗入瘡

卷六

損傷門

跌打傷損

全瘡 杖瘡 箭頭入 竹木刺針入肉

瘀血停積論

亡血過多論

脈法

治法

頭目鼻耳傷

舌唇口喉齒腮傷

頸骨肩胛脇肋傷

手傷

胸腹傷

腰臀股膝傷

脚傷

背脊骨傷

陰囊陰門傷

筋骨傷

束縛敷貼用藥訣

十不治證

整骨麻藥

草烏散

外治方藥葱罨法

定痛膏

消毒定痛散

截血膏

散血膏

羊毛餅

接補消腫膏

活血散

一赤散

一黃散



一白散

萬全膏

洗藥荆葉散

接骨丹 二方

走馬散

乳香膏

白膠香散

紫金皮散

消腫膏

芙蓉膏

紫金膏

接骨膏

松葱膏

退腫膏

一紫散

一綠散

退熱散

澤蘭散

內服 疎風敗毒散

加味交加散

羌活乳香湯

仲景治損傷方

復元活血湯

已戟湯

當歸導滯散

導滯散

奪命散

雞鳴散

清上瘀血湯

消下破血湯

大紫金皮散

破血藥

花蕊石散

破血消痛湯

二十五味藥

沒藥降聖丹

清心藥

水仙散

止痛藥

散血定痛補損丹

定痛當歸散

四草定痛湯

聖靈丹

何首烏散

調經散

活血丹

大活血丸

黃末子

白末子

紅末子

黑末子

牡丹皮散

橘朮四物湯

黑神散

當歸補血湯

復元通氣散

接骨散

定痛接骨紫金丹

麥兜散

接骨仙方

金瘡

治金瘡白藥

太乙膏

理傷膏

金瘡神效方



封口藥

洗藥

麻藥

本事地黃散

百草散

灰彈散

潔古末藥散

生肌止血立效方

劉寄奴散

神仙刀箭藥

麒麟竭散

如神散

金傷散

定血散

五倍散

神奇散

軍中一捻金散

龍骨散

金傷散

完肌散

生肌膏

定血散

松皮散

藥蛆方

蒲黃方

艾葉方

內服仲景王不留行散

定痛乳香散

地榆絹煎

當歸散一名內補散  
一名從容散

內塞散

蒲黃散

神仙止血散

腸出磁石散

敗弩弦散

頰生乾地黃散

白薇散

琥珀散

瘞虎骨散

豆淋酒

必效酒

塗封方

葫蘆方

箭頭入肉

頭鐵膏

雄黃散

紅散子

牡丹散

瘡蟪丸

解骨丸

牛膝膏

鼠油膏

胡椒餅

萬全神應丹

藍汁飲

貝子散

竹木刺鍼入肉

綠礬散

牛蒡葉散

松脂方

桂蠟丸

神聖膏



杖瘡

鬼代丹

潔古沒藥散

圓藥

乳香膏

白膏藥

傷損科分證主治大法

脇肋脹痛

小柴胡湯

腰脊痛

地龍散

腹痛

加味承氣湯

小腹引陰莖作痛

血虛作動

沒藥丸

濕痰作痛

新肉不生

乳香散

乳香散

傅杖瘡妙方 六方

銀粉膏 二方

黑膏藥

破血散

雞鳴散

龍腦潤肌散

生肌桃花散

牛脂膏

秘傳杖瘡膏方

定痛乳香神應散

肌肉間作痛

骨傷作痛

肝火作痛

出血

五黃散

杖瘡丹

靈異膏

紅膏藥

創口痛

瘀血作痛

青腫不消

腐肉不潰

瘀血泛注

昏憤



薯

煩躁

發熱

陽氣脫陷

胸腹滿悶

作嘔

嘔吐黑血

加味芫荽湯

百合散

喘咳

二味參蘇飲

十味參蘇飲

作渴

大便秘結

手足傷損

手足疼痛

應痛丸

乳香散

破傷風

羌活防風湯

防風湯

蜈蚣散

羌活湯

地榆防風散

大芎黃湯

白朮防風湯

白朮湯

謙甫硃砂丸

左龍丸

江鱉丸

養血當歸地黃散

廣利方

白丸子

本事玉真散

急風散

如聖散

一字散

發瘧

行氣之非

下血之非

寒藥之非

不斂之非

不補之非

湯火瘡

保生救苦散

冰霜散

綠白散

清涼膏

麻子膏

黃柏散

柏葉散

蛤粉散



止痛膏

神效當歸膏

紫雪

雞黃油

灸瘡

止痛生肌散

柏皮膏

綠雲散

四時貼護方

內托黃耆丸

諸蟲獸螫傷

毒蛇咬

雄黃消毒膏

蜂螫

蜈蚣咬

定風散

馬咬

能咬

蜈蚣咬

一上散

蜘蛛咬

蠶咬

鼠咬

人咬

驢涎馬汗瘡

蠟螫傷

刺毛蟲傷

犬咬

虎咬

癩犬咬

蛇蝎傷

癩犬咬



癰疽之源一

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

方書敘癰疽之源有五 一天行時氣 二七情內鬱 三體虛外感 四身熱搏於風冷 五食炙博飲法酒服丹石等熱毒 總之不出於三因也

外因者運氣癰疽有四 一火熱助心為瘡經云少陰所至為瘡疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃太溫其病膚脹中瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘡發於中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所甚勝則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病痔瘡瘡疽癰疽瘡痔又云火太過曰赫曦其病瘡疽血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也 二曰寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫所勝血變於中發為癰瘍病本於心又云陽明司天之政四之氣寒兩降民病癰腫瘡瘍是也 三曰燥邪傷肝為瘡瘍經云木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘡瘍癰癰病本於肝是也 四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天濕氣變物甚則身後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外是也 此四條所謂天行時氣者也素問脉

要精微論帝曰諸癰腫筋學骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也靈樞經癰疽篇云血脉榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉腐肉則為膿膿不瀉則爛筋爛則傷骨骨傷

則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏靈於五藏藏傷故死矣又生氣通天論云勞汗當風寒薄為數鬱乃瘥又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是亦寒邪從勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙久客之為癰腫也所謂體虛外感及身熱搏於風冷者也治法則精要十宣散五香湯潔古蒼朮復煎散等發表之劑是也

內因者陳無擇云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿於經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也治之以遠志酒獨勝散兼以五志相勝之理如怒勝思之類是也

不內外因者經所謂膏粱之變足生大疔受如持虛又東方之域魚鹽之地其民食魚嗜鹹安其處美其食魚熱中鹹勝血故其民黑色疎理其病為癰疽又有服丹石法酒而致者亦膏粱之類也李東垣曰膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆於肉理榮氣者胃氣也飲食入胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行陽道下歸五藏六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅而先行陽道乃反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺熱濕既盛必來尅腎若不慎房事損其真水水乏則從濕氣之化而上行其瘡多出背上及腦此為大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其苦楚疼痛也如東垣治元好問丹溪治老婦腦疽皆因好酒故以三黃大黃酒製治之又如排膿散當歸散之類是也又有盡力房室精虛氣憊之所致者亦屬不內外因當以補虛內托為主亦忌用五香之藥耗真陰而助邪熱治之之藥如內因黃耆湯神效托裏散之類也 經云五藏菽熱癰發六腑又云六腑不和留結為癰又云諸痛癢瘡皆屬於心肺乘肝則為癰腎



移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋學此皆臧腑之變亦屬內因者也

東坦曰生氣通天論云榮氣不從逆於肉理乃生癰腫又云膏梁之變足生大疔受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則害人皮肉筋脉是言濕氣外傷則榮氣不行榮衛者皆榮氣之所經營也榮氣者胃氣也運氣也榮氣為本本逆不行為濕氣所壞而為瘡瘍也膏梁之變亦是言厚滋味過度而使榮氣逆行凝於經絡為瘡瘍也此邪不在表亦不在裏惟其在經中道病也以上內經所說俱言因榮氣逆而作也徧看諸瘡瘍論中多言二熱相搏熱化為膿者有口言熱化為膿者有言濕氣生瘡寒化為熱而為膿者此皆瘡疽之源也宜於所見部分用引經藥并兼見證中分陰證陽證先瀉榮氣是其本本逆助火濕熱相合敗壞肌肉而為膿血者此治次也宜速取諸物以比之一歲之中大熱無過夏當是時諸物皆不壞爛壞爛者又秋濕今天行之際也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以為上工矣

### 癰疽之別二

靈樞經云榮衛稽留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚骨髓不為焦枯五藏為不傷故命曰癰 熱氣瀉盛下陷肌膚筋體枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽 疽者上之皮天以堅宛如半領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也 鬼遺方云癰之痛只在皮膚之上其發如火焚茅初如黍米大三兩日如掌面大五七日如碗面大即易大如腫冷發瀉發逆治之難愈 疽發或如小癰觸則徹心痛四邊微起如橘皮孔色紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘息不止若始發腫高五七日忽平陷者此內攻之候也 又云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑毒氣沉深屬臟毒氣猛烈而行經絡或淺或深無定五臟六腑皆受五毒難為調理惟宜急切於癰發諸處不問虛實高腫起或光澤痠痛只在皮膚之上熱急脹滿或有癢疼別無惡候初用溫藥平氣次用排膿發穴

治癰所謂平氣者乃犀角飲之類其方用犀角連翹

漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所謂發穴者乃棘針之類用皂角刺為君甘  
草川芎乳香為佐使亦托裏之藥也報不若潔古東垣諸方發表托裏為穩當

疽發諸處不拘大小惟起在背

廣一尺二尺三尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶應四肢重痠前心亦痛餘處發猶可惟虛處及近

筋骨處若膿毒未潰即傷爛筋骨肉損為疽者屬五臟毒氣深沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須內實五臟外

透皮膚令輒勻和即膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不比癰之毒氣浮淺也母作一類治之凡一切

瘡腫始覺患起高腫五七日忽平陷者此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補填臟腑令實最怕透膜膿穿

十無一生矣 婁全善云癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脈之中而專攻於外故初發時自表便發熱患處便如碗

如盆高腫而痛甚者縱欲下陷緣正氣內固不肯受攻或便秘或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不

傷也疽之邪深其稽留壅遏內連五臟而不專攻於外故身體或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十

指腫黑如墨多死也治之之法癰之初發當以潔古法為主表者散之裏者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必

消膿已成者速潰也疽之初發當以鬼遺方為主補填臟腑令實勿令下陷之邪蔓延外以火灸引邪透出使有穴

歸著而不亂則可轉死回身變凶為吉今世外科不分癰疽一例宣熱拔毒外以五香耗其氣內以大黃竭其血終

不能自悟其藥之非惜哉 集驗云癰疽之名雖有二十餘證而其要有二陰陽而已發於陽者為癰為熱為實發

於陰者為疽為冷為虛故陽發則皮薄色赤腫高多有椒眼數十而痛陰發則皮厚色沒腫硬狀如牛頭之皮而不

痛又有陽中之陰似熱而非熱雖腫而實虛若赤而不燥欲痛而無膿既浮而復消外盛而肉腐陰中之陽似冷而

非冷不腫而實赤微而燥有膿而痛外雖不盛而內實煩悶陽中之陰其人多肥肉緊而內虛陰中之陽其人多瘦

肉緩而內實而又有陽變而為陰者草醫涼劑之過也陰變而為陽者大方熱藥之驟也然陽變陰者其證多猶可

返於陽故多生陰變為陽者其證少不能復為陰矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中得一耳 觀此則癰  
與疽但有陰陽深淺內外虛實之分而無大小之別精要乃謂二寸至五寸為癰五寸至一尺為疽者謬也

脈法三

沉實發熱煩躁外無嫩赤痛其邪深在裏宜先疎通以絕其源 浮大數焮腫在外當先托裏恐邪入內 脈不沉不浮內外證無知其所在經當和榮衛 脈數身無熱內有癰膿 脈數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰 若數脈不時見當生惡瘡

浮 腫瘍為虛為風 潰瘍為虛宜補

洪 腫瘍為虛為熱盛宜宣熱拔毒年壯形實宜下 潰瘍為邪氣盛服藥久不退者難治

滑 腫瘍為熱 潰瘍為熱為虛為邪氣未退

數 腫瘍為病進為熱數而洪者欲膿 潰瘍為難愈數甚者難治

散 腫瘍為氣不收斂 潰瘍為痛未退洪滑大散難治

芤 腫瘍為血虛 潰瘍為虛為脈病相應

長 腫瘍宜消退之法 潰瘍為易愈謂長則氣治也

牢 腫瘍為邪盛為欲膿 潰瘍為邪氣不退

實 腫瘍為邪氣太盛 潰瘍為邪不退為實緩訟大者為虛

弦 腫瘍為痛為欲膿弦洪相搏外緊內熱為疽發也 潰瘍為血虛為痛

緊 腫瘍浮而緊發熱惡寒或有痛處是為癰疽 潰瘍主氣血沉瀯為痛為有外寒

瀯 腫瘍為氣實為氣滯 潰瘍為血虛為病脈相應

短 腫瘍為元氣不足 潰瘍為大虛宜補

微 腫瘍為虛服藥漸充者佳 潰瘍若微而勻者為虛為病脈相應



遲 腫瘍為寒為虛尺遲為血少 潰瘍為虛為氣血不能滋榮於瘡為有外寒

緩 腫瘍為可治大而緩為虛 潰瘍緩而澀者愈以其病脉相應及胃氣充也

沉 腫瘍為邪氣深 潰瘍為遺毒在內寸沉為胸有痰

伏 腫瘍為陰中伏陽邪 潰瘍為陽伏陰中為內蝕為流注浸淫難治

虛 腫瘍便宜補而內托 潰瘍膿既泄宜大補氣血

弱 腫瘍為元氣不足宜內補托裏 潰瘍為病脉相應宜補

結 腫瘍為邪氣結 潰瘍漸勻則愈不調則危

促 腫瘍為熱為病進 潰瘍為熱不減漸進則死漸退即生

代 腫瘍為氣血敗壞元氣損傷 潰瘍為元氣竭絕

分經絡四

人身之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕賊不知界分其能無誅伐無過之咎乎况手足十二經絡有血氣多少之分如手少陽三焦少陰腎太陰脾多氣少血手厥陰心包絡太陽小腸足太陽膀胱多血少氣手陽明大腸足陽明胃多氣多血此其大較也多血少氣者易愈多氣少血者難瘉氣多之經可行其氣血多之經可破其血不可執一也 丹溪曰六陰經六陽經分布周身有多氣少血者有多血少氣者有多氣多血者不可一概論也 若夫要害處近虛處怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞也何則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其多氣少血也其血本少肌肉難長瘡久未合必成危證又云少陽經多氣少血與厥陰經同少陽有相火尤甚於厥陰經者其有不思本經少血遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側腫上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脉之俱浮大弦數而重



似瀉予曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變證以人參一斤作膏下以竹瀝病者各費招一外科以十宣五香散相間與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召予視之核稍高大似有膿於中起一紅線環於肩後斜走遠背脊過入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脉同前但弦多耳急作人參膏入膏亦生薑汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯如參朮陳皮甘草半夏生薑百餘貼而安此病若在春令雖神仙不治也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏驟補何得由免此証消子所補填皆由庸醫誤下之而死詳見後條或曰太陰經非多血少氣者乎何醫沮之生初無甚苦往往問有不救者吾子

其能治之乎予曰臀居小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年已後不可生癰纔有痛腫參之脉證但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌可不慎歟 東陽李兄年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過於色忽左腿外膝側上發一紅腫其大如栗一醫聞其大腑堅實與承氣陽二貼下之不效又一醫教與大黃硃砂生粉草麒麟竭又

二三貼半月後召予視之曰事去矣又一李兄四十餘面稍白神甚勞忽脇下生一紅腫如桃一人教用補劑眾笑且排於是以流氣飲十宣散雜進之旬餘後召予視之予曰非惟不與補劑抑且多得解利氣血俱憊難矣已而果然此二者皆由不預防本經少陽少血遠猛浪用大黃攻裏而死之者也一男子年近六十形素肥初夏於左膊外廉則生一核方圓二寸餘不甚

痛召予視診其脉息緩大而弱予曰此因憂門而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又看作何應病家召他外科以十宣散五六貼而瘡其平曰此太虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍以十宣散進之又五六貼瘡平陷出清水而死此可為因虛而生癰疽者之例 胡經歷女及笄性急而形實未許嫁厚味積毒已深髀骨中痛者

年餘醫以氣藥雜治之愈而復發至秋冬令忽大痛發熱醫者方悟髀樞穴上生附骨疽在外廉側少陽之分其厚味性急自若自首至尾悉是五香湯十宣散服至瘡潰猶與五香湯者月餘忽一日惡寒發熱膈滿醫者不悟升散

外科

太多陰血已絕孤陽狂越於上猶恨服五香飲欠多致膈間有滯大服以進一夕喘汗而死此二者由不預防本經之者也可不戒哉劉宗厚曰以上病例不係膏梁丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脉其瘡當

自消散蓋不待汗之下之而已也其不詳脉證經絡受病之異者下之先犯病禁經禁故致失手如此丹溪又曰纔

得腫痛參之脉證但有虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒及氣藥虛虛之禍不旋踵矣且夫

火熱為病亦有微其所謂君火相火是也瘡瘍所發有癰疽疔瘡輕重淺深不同或止發於一經或兼二經者止當

求責於一二經不可干擾餘經也若東垣處方用藥是已別有兼風兼濕兼痰兼氣兼血兼陰虛等證者病本不同

治當求責前論雖略比之世俗外科等書圖人形瘡樣而不分經絡者此則大有徑庭矣

頭部 巔足太陽 督脉 第三行足少陽 頭角直耳上冲是 中行前直鼻上巔後直 鬚中上巔督脉 第二行足太陽一寸五分各 開兩傍為頭第三行

面部 額足少陽 陽明 鼻手陽明太陽 足陽明督脉 人中督脉手 足陽明 唇內足厥 陰 上齒足陽 明 下齒手陽 明

唇內足厥 陰 承漿足陽明 任脉 目內眦手足陽明 太陽 目銳眦手足太陽 手 眉至額直鼻而上 督脉直目內 眦

舌足少陰 太陽 目系手足少陰 太陽 頰直目內眦而下足陽明頰車足少陽 陽明 耳手足少陽 太陽

子而上足少陽直鈺 皆而上手足少陽 頰直目內眦而下足陽明頰車足少陽 陽明 耳手足少陽 太陽

頸項部 項中間督脉 拔項大筋中足太 陽 當完骨下手少陽項大筋 之前耳之後也 當耳下足少 陽

當曲頰下手太 陽 曲頰前一寸手陽 明 披喉兩旁動脉足太陽 陽明 缺盆中任脉

咽手太陰少 陰足太陽 喉嚨足少陰 太陽 喉嚨後足厥 陰

肩部 前廉手陽 明 後廉手太 陽 上廉手少 陽

咽手太陰少 陰足太陽 喉嚨足少陰 太陽 喉嚨後足厥 陰

肩部 前廉手陽 明 後廉手太 陽 上廉手少 陽

背部 中行 督脉

第二行 足太陽

第三行 足太陽

膺輸部 中行 任脉

第二行 足少陰

第三行 足陽明

第四行 足太陽

腹部 中間行 任脉

第二行 足少陰

第三行 足陽明

第四行 足太陽

腋部 中間 手厥陰

前陽 手太陽

後陰 手太陰

脇部 腋直下 髀樞足少陽

臑部 肘曰臑 前廉 手陽明

後廉 手太陽

外廉 手太陽

內廉 手少陰

內前廉 手太陽

內後廉 手少陰

臂部 上廉 手陽明

下廉 手太陽

外廉 手少陰

內廉 手厥陰

內上廉 手太陽

內下廉 手少陰

股脛部 前廉 足陽明

後廉 足太陽

外廉 足少陰

內廉 足厥陰

內前廉 足太陽

諸經向導藥

太陽經 上羌活 下黃柏

陽明經 上白芷升麻 下石膏

少陽經 上柴胡 下青皮

太陽經 上桔梗 下白芍藥

少陰經 上獨活 下知母

厥陰經 上柴胡 下青皮



手太陰肺

南星 杏仁

款冬花 白茯苓

升麻 麻黃

桔梗 益智

山藥 丁香

檀香 桑白皮

五味子 知母

粳米 天門冬

阿膠 梔子

葱白 黃芥

麥門冬 石膏

白芷 薤白

砂仁 檀

香薷 為使

足太陰脾

芩莖 半夏

草薷 赤茯苓

砂仁 人參

益智 防風

蒼朮 白朮

代赭石 麻子仁

黃耆 益智

甘草 膠飴

通入手足太陰肺脾

元胡索 白芍藥

酒浸 升麻

砂仁 芍藥

木瓜 木瓜

手陽明大腸

升麻 肉苳菹

麻子仁 白石脂

秦芫 砂仁

薤白 石膏

白芷 白芷

足陽明胃

丁香 葛根

草薷 烏藥

砂仁 半夏

防風 升麻

葱白 蒼朮

知母 白朮

神翹

通入手足陽明

葛根 麻黃酒

連翹 升麻

白芷 檀香

佐以他藥

白朮 白芷

神翹

手少陽三焦

川芎 熟地黃

石膏 柴胡

青皮 附子

白朮 黃耆

足少陽膽

半夏 草龍膽

柴胡 連翹

神翹

通入手足少陽

青皮 柴胡

連翹 敗醬

沙參

手厥陰心包絡

牡丹皮 柴胡

白朮 熟地

敗醬

沙參

足厥陰肝

草龍膽 當歸

山茱萸 甘草

青皮 阿膠

瞿麥 桃仁

蔓荊子 代赭石

通入手足厥陰

青皮 兒角

熟地 茶苦

柴胡 桃仁

川芎

手太陽小腸

白朮 羌活

生地黃 赤茯苓

砂仁 赤石脂

為使

足太陽膀胱

滑石 茵陳

蔓荊子 白茯苓

黃柏 羌活

澤瀉 麻黃

桂枝 大黃酒炒

通入手足太陽

蔓荊子 黃柏

防風 羌活

澤瀉 防己

蔓木 茴香

足少陰腎

知母 猪苓

地骨皮 白茯苓

檀香 甘草

益智 天門冬

澤瀉 五味子

牡蠣 烏藥

山茱萸 枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼





通入手足少陰

五味子 細辛 熟地 澤瀉 地榆 附子 知母 白朮

命門 附子

沉香 黃耆 益智

善惡 五

瘡瘍舊分五善七惡 動息自盛飲食知味一善也 便利調勻二善也 膿清腫消不臭三善也 神采精明語

聲清爽四善也 體氣和平五善也 煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度小便利如淋一惡也 膿血大泄腫焮尤甚

膿色臭敗痛不可近二惡也 喘麤短氣恍惚嗜臥三惡也 目視不正黑睛緊小白睛青赤腫子上者四惡也

肩背不便四肢沉重五惡也 飲食不下服藥而嘔食不知味六惡也 聲嘶色敗鼻青赤面目四肢浮腫七惡也

五善見三則瘥 七惡見四則危 薛氏三善者屬腑證病微邪淺更能慎起居節飲食勿藥自愈惡者乃五臟

虧損之證多因元氣虛弱或因膿水出多氣血虧損或因汗下失宜榮衛消鑠或因寒涼剋伐血氣不足或因峻厲

之劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡遂棄而不治

若大渴發熱或泄瀉淋瀝者邪火內淫一惡也竹葉黃耆湯氣血俱虛八珍湯加黃耆麥門五味山茱萸如不應

佐以加減八味丸煎服 膿血既泄腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火熾二惡也人參黃耆湯如不應用十全大

補湯加麥門五味 目視不正黑睛緊小白睛青赤腫子上視者肝腎陰虛而目系急三惡也六味丸料加炒山梔

麥門五味如不應八珍湯加炒山梔麥門五味 喘麤短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也六君加大棗生薑如

不應用補中益氣湯加麥門五味心火刑剋肺金人參平肺散陰火傷肺六味丸加五味子煎服 肩背不便四肢

沉重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯加山茱萸山藥五味如不應十全大補湯加山茱萸山藥五味 不能下

食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁如不應急加附子 聲嘶色敗唇鼻青赤面目

六科 外科

四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大棗生薑如不應六君子湯加炮薑更不應急加附子或用十全大補湯加附子炮薑 腹痛泄瀉咳逆昏惰者陽氣虛寒氣內淫之惡證也急用托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂溫補 此七惡之治法也 此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脉洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脉浮大按之細微衣厚仍寒此血氣虛極傳變之惡證也若手足逆冷肚腹疼痛泄利腸鳴飲食不入呃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡證也若有汗而不惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項動強此血氣虛極變症之惡證也急用參耆歸朮附子救之間有可生者 大抵虛中見惡證者難治實證無惡候者易治宋時齊院令雖嘗纂其狀而未具其因迨後至陶節菴雖各立一方亦簡而未悉予故補其缺云

虛實六

夫瘡疽膿潰腫毒浸淫證候危惡者須辯虛實况夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實多端有瘡之虛實有臟腑虛實有血氣虛實又有上實下虛真虛邪實者不可不辯也 夫腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟漫膿稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脉弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也如膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不斂大便自利腰脚沉重睡臥而不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶聲敗四肢浮腫者真氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣盛則實又曰諸痛為實癢為虛也

陶節菴

又曰診其脉洪大而數者實也微細而顛者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣也內經謂血實則決之氣虛則掣引之元戎云若人氣血壅盛榮衛充滿抑遏不行腐化而為癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱榮衛短濇寒搏而為癰者當補之以接虛怯之氣此治虛實之大法也 瘡疽痛急自盛飲食知味脉證俱緩則治本故可以王道平和之藥徐而治之亦無不愈若脉實厥腫煩躁寒熱脉證俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰潰而膿水清稀或泄利腸鳴飲食不入嘔吐無時或手足並冷此脉證俱虛非大補之藥不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證者當辨表裏虛實隨宜治之庶得萬全 薛新甫曰瘡瘍之作皆由膏粱厚味醇酒炙煇房勞過度七情鬱火陰虛陽熱精虛氣節命門火衰不能生土學衛虛弱外邪所襲氣血受傷而為患當審其經絡受證標本緩急以治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣又虛者必先於治本而兼以治標大要腫高聳痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之尤難者也主治之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解之後用托裏消毒散漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍湯不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸者肉桂不生肌不收斂脾氣虛也四君加芍藥木香惡寒憎寒陽氣虛也十全大補加薑桂肺熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山茱山藥肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋秘肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸大凡怯弱之人不必分其腫潰惟當先補胃氣或疑參耆滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又有泥於氣質素實或有痰不服補劑者多致有誤殊不知瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈

虛豈有不宜補者哉故丹溪先生云但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉 又當捨時從證如腫赤煩躁發熱引令便秘作渴脈洪數實是為五實雖在嚴寒之時必用大苦寒之劑瀉其陽以救其陰若脈細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是為五虛雖在盛夏之時必用大辛熱之劑散其陰以回其陽內經曰用寒遠寒用熱遠熱有假者反之雖違其時必從其證若執泥常法則誤矣

內消

癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所形脈虛實如發於腦背腰項膺膈者皆太陽經也宜黃連羌活背連筋處為近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命飲形實脈實者宜漏蘆湯內疎黃連湯追毒丸等疎利之氣虛者參耆為主血虛者芍歸為主佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分野上有癰疽其五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟少陽一經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治與氣虛血虛同法凡瓜蒞射干穿山甲金銀花夏枯草蟾酥地丁黍粘子連翹木鼈子之類為內消之藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車釐散返魂丹消毒飲為內消之方眾皆知之殊不知補瀉虛實早治寒溫使氣血各得其常則可內消也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣血和平而腫熱消退也 薛新甫曰瘡瘍之證當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴大便便秘者邪在內也疎通之腫焮作痛寒熱頭疼者邪在表也發散之焮腫痛甚者邪在經絡也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色暗而微腫痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若泥其未潰而概用敗毒復損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之證蜂起多致不救丹溪先生云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃宜無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以托裏補接為主如欲用香散未免虛虛之失治者審之

內托八

癰疽已成血氣虛者邪氣深者邪氣散漫者不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不輒或雖得膿而根脚紅腫開大或毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿者皆氣血虛氣血既虛兼以六淫之邪而變生諸證必用內托令其毒熱出於肌表則可愈也凡內托之藥以補藥為主活血祛邪之藥佐之或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風寒大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆為要藥但用時加減耳如冬月并氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素不宜寒藥者小五香湯形脈實膿色稠不可用補藥者忍冬丸之類大膿出敗肉去紅腫消當用黃耆人參當歸白朮大劑補之令氣血滋茂新肉易長也 薛新甫有隨證加減用藥例以托裏消毒為主誠內托之良法今採入各證中不復贅敘於此

灸九

元戎云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也 凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯即換一片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸為上一日二日十灸十活三日四日六七活五六日三四活過七日則不可救矣若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚薄正安於瘡上著艾灸十四壯多至四十九壯 一法云灸乃開結破硬之法倘有一點白粒如粟米起四圍微腫如錢便當於米粒上著艾火十三四壯三日內灸者口成灸瘡而散三日外者其腫漸少宜多多灸之或灸火著處則結熱可伸灸處先潰則毒勢分減庶免展

開不致下陷及壞筋骨傷血氣也所謂灸至不痛者謂著皮肉未壞處則痛火至著毒處則不痛必令火氣至著毒處方止所謂灸至痛者謂初著毒處不痛至好肉則痛必令火氣至好肉方止畏灸者或用獨蒜瓣或用豆豉餅或用椒薑鹽爛搗捏作餅子如當三錢厚鋪艾灸之熱則易新餅亦可散也 灸乃從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若少陽分野尤不可灸灸之多至不救亦有因灸而死者蓋虛甚孤陽將絕其脈必浮數而大且鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也 又精要云腦為諸陽所會頸項近咽喉腎俞皆致命之所俱不可灼艾

河間灸刺法謂凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少腧穴遠近 從背出者當從太陽五穴選用至陰在足小指外側去爪甲角如韭 從腹出者當從少陽五穴選用

大通谷在足小指外側本節前陷中 束骨在足小指外側本節後陷中 崑崙在足外踝後委中在臍中央約 從暑出者當從少陽五穴選用

竅陰足小指次指端去爪甲如韭葉 交溪在足小指次指岐骨間本節前陷中 臨泣在足小指次指本節後陷中 陽輔前絕骨端如前三分 陽陵泉在膝下一寸

從髻出者當從陽明五穴選用厲兌在足大指次指去爪甲如韭葉 內庭在足大指次指指外間陷中 陷谷在足大指次指指間本節後陷中 冲陽在足跌上五寸骨間本節後陷中 冲陽在足跌上五寸骨間本節後陷中

寸解谷在冲陽後一寸五分腕上陷中 從腦出者則惟絕骨一穴在外踝上三動脈中 詳見癰疽灸經

騎竹馬灸法治一切瘡瘍無有不愈令病人以肘凭几豎臂腕要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷為則不量指甲却用竹杠一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不著地又令二人扶之勿令偃偻却將前所量臂篾從竹杠坐處尾骹骨盡處直貼脊背量至篾盡處為則用墨筆點

定此只是取中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫紋為則男左女右截為一則就前所點記處兩邊各量一則盡處即是灸穴兩穴各灸五七壯疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴心

脉所過之處凡癰疽皆心火留滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死回生之功屢試屢驗

劉宗厚曰此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉尤宜用附子浸透切

作大片厚三二分於瘡上著艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物

漸清根深者郭氏治用白麩硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一粒一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互換用之繼入瘡內歹肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理即瘥矣蓋不止宜灸於瘡之始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設反逆不惟不瘳恐致轉生他病之患也

### 鍼烙十

凡用鍼烙先察癰疽之淺深及膿未成已成高阜而輒者發於血脉腫平而堅者發於筋脉皮色不相辨者發於骨髓高阜而淺者用鍼鍼開之疽始生白粒便可消退漸長如蜂窠者尋初起白粒上烙及四圍烙四五處如牛頭之皮者疽頂平而淺者皆宜用火鍼烙之其鍼用圓鍼如筋如緯鋌大頭圓平長六七寸一樣一枚蘸香油於炭火中燒紅於瘡頭近下烙之宜斜入向輒處一烙不透再烙必得膿也瘡口烙者名曰熟瘡膿水常流下不假按抑用經藥使瘡口不合舊用紙熬及新取牛膝根如瘡口大小略刮去皮一頭繫線絛之不用翠青搜膿等錠子臨用以糯米飯和成輒條子看淺深絛之外用拔毒膏貼之瘡毒未成烙之可散潰而未破針之可消但要用得其宜耳若當用鍼烙而不用則毒無從而泄膿瘀蝕其膏膜爛筋壞骨難乎免矣若毒深鍼淺膿不得出毒淺烙深損傷良肉不當其所他處作頭此皆不能瘳疾反增痛且或癰癩潰久不瘳漏瘡經年或通或閉癰疽瘡口不收皆因冷滯不能收斂亦宜瘡口內外四畔烙之癰疽正發及膿見後紅腫焮開用鐵鍼燒赤四圍刺之則紅腫隨縮矣 薛新甫曰毒熱已成者宜用托裏以速其膿膿成者當驗其生熟深淺而鍼之膿生而用鍼氣血既泄膿反難成若膿熟而不鍼腐潰益深瘡口難斂若瘡深而鍼淺內膿不出外血反泄若瘡淺而鍼深內膿雖出良肉受傷若元氣虛弱必先補而後鍼其膿一出諸證自退若膿出而反痛或煩躁嘔逆皆由胃氣虧損宜急補之若背瘡熱毒熾甚中央肉黯內用托裏壯其脾胃外用烏金膏塗於黯處其赤處漸高黯處漸低至六七日間赤黯分界自有裂紋如刀劃然

黯肉漸潰矣當用鉗鉗利剪徐徐去之須使不知疼痛不見鮮血為妙雖有裂紋膿未流利及膿水雖出而仍痛者皆未通於內並用鉗於紋中引之患於背胛之間肉腐膿出腫痛仍作此內有毒筋間隔膿未通耳尤宜引之若元氣虛弱誤服尅伐患處不痛或肉將死急溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀鉗去肉出血則氣無所依附氣血愈虛元氣愈傷矣何以生肌收斂乎 又曰鉗灸之法有太乙人神周身血忌逐年虎神逐日人神而其穴有禁鉗禁灸之論犯之者其病難瘳理固然也但瘡瘍氣血已傷肌肉已壞宜迎而奪之順而取之非平人鉗灸之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀無從而泄反攻於內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便不通胸腹脹悶脣疔喉痺咽喉腫塞其禍尤速患者審之  
**蟻鉗法**治癰疽初作先以筆管一個入蟻蟻一條以管口對瘡頭使蟻吮瘡膿血其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蟻必死矣累試累效若血不止以藕節上泥塗之若瘡頭未明以井邊泥塗上先乾處即是 按此法可施於血實毒淺之證若積毒在臟腑者徒竭其血於外無益也 一人腦後患瘡焮發腫盛用此而瘡一小兒赤疹取七八大蟻吮其血疹消三日大熱而死

砭鍊十一

素問云血實宜決之扁鵲云病在血脉者治之以砭石但見腫起赤色遊走不定狀如丹瘤先以生油塗赤上以鍊鍊之法洩其毒不可太深內經謂刺皮無傷肉其法雖治瘡疽不可輕用也

敷貼十二

瘡腫初生似有頭而未起即當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也若瘡腫初生即高起四畔焮赤宜搗生寒藥貼煇折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也大抵敷貼之法欲消散腫毒疏通血脉寒熱錯綜皆期於不成膿也凡腫皮厚者以輭帛或綿紙塗藥貼煇之待其藥乾方換腫皮薄者用疎紗或薄紙塗藥貼煇之其藥未乾即當換之



至膿潰之後即貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼藥水調貼令血滯而難瘥蓋血脉喜溫而惡寒故也 集驗云癰疽無頭起者用神芴膏靈龜膏正鐵箍散貼拔毒膏即令消退潰膿者用靈龜膏貼之或用追毒膏去膿或用筒子收膿有頭瘡疽每於洗後視赤量開放用涼水調大鐵箍散成膏隆冬用溫水調如人肉溫貼之腫赤或用地黃自然汁調貼圍貼之法從四畔紅暈處圍貼用皮紙土掩瘡有旋生白粒散漫如米如豆者用銀篦尾撥去瘡眼用老皮散傳之再換新藥傳上凡熱多則赤焮腫散熱甚則紫黑外寒鬱之亦紫血虛兼寒則青白大鐵箍散正鐵箍散乃常用之藥或因風寒熱及穢氣厭觸等證四時寒熱不同又且從權設法熱者宜三黃散熱甚宜三消風者加羌活防風風氣滯者加木香寒鬱加桂枝散氣觸者宜加香藥重之腫處脆嫩者去白芨去貼藥時看毛下竅中當有汗珠此則血脉疎通熱毒消散亦暈漸縮膿潰痛止變逆為順皮毛潤活要作良肉但疽頂有些少腐開不用刀剪如藥下不生汗珠腐敗必闊必多也膿後圍貼則收散漫遺毒盡隨膿出瘡口貼拔毒膏藥如膿出不順用追毒膏惡肉不去用金寶膏敗肉去後圍貼則氣血活新肉易長瘡口用長肉膏敷貼之藥與淋洗藥並行同功 郭氏法如是有頭瘡疽就便用朱砂備急膏一九如黃豆大安於瘡頭上却用輒粘膏藥蓋護之其瘡必破如瘡暈紫黑色外用宣毒散周圍敷住毒氣如瘡暈赤紅色用水澄膏敷之次日用堅峻碧雲錠子開了瘡口次用緊緩碧霞錠子去其歹肉稍淨却用緩慢碧玉錠子生肌總名青金錠子不拘日數直待歹肉去淨單用膏藥貼之候膿水盡肌肉平方許貼生肌斂口之藥若依此法免教人受刀剪鍼烙之苦如是無頭癰腫待膿成用鍼刺破方依法收功也

淋洗十三

古人論瘡腫初生經一二日不退即須用湯水淋射之其在四肢者濡漬之其在腰腹及背者淋射之其在下部委曲者淹漬之無非疎導腠理通調血脈使無凝滯也集驗云淋洗之法每用藥二兩水三升煎取一升半去渣以淨

帛或新綿蘸之乘熱濕其患處漸覺喜濕仍淋裕之稍冷則急令再換慎勿冷用腫瘍宜紫葛湯一日五七次洗之  
每洗後拭乾視瘡頂上有白粒如米大者以五灰膏點破之瘡眼傅老皮散次用水調大鐵箍散圍貼四邊紅腫處  
用正鐵箍散水調貼瘡口再洗則先去舊藥每一次洗換新藥如前潰瘍用豬蹄湯一日一二次洗之仍用大鐵箍  
散如前圍貼瘡口上用追毒拔毒等貼之敗肉去後間二三日一洗之可換長肉膏貼之淋洗之功癰疽初發則宜  
拔邪氣可使消退已成洗之則疎導腠理調和血脉探引熱毒從內達外易深為淺縮大為小紅腫延蔓洗之則收  
殷紫黯黑洗之紅活逐惡氣祛風邪除舊生新如瘡口冷滯不收者濃煎北艾湯洗燒松香兔毛熏之淋洗之藥可  
與鐵箍散並行同功 大抵灸烙潰清各有所宜凡疽則宜灸灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜潰潰之腫皮  
光輒則鍼開之以洩其毒認是疽瘡速以艾炷如菜豆許大灸二百壯灸後覺似熾痛乃火氣下徹毒氣隨火而出  
若有瘡痒宜淡豆豉以椒薑鹽葱和搗捻作餅子如當三錢厚安瘡頭上灸之覺太熱即擡起又安其上餅乾再易  
新者若其瘡痛即須更灸壯數以多為妙已成膿者不可灸當鍼開之初覺背上有瘡疼痒略異認是發背即取淨  
土水和捻作餅子徑一寸厚二分貼瘡上作文炷灸之一炷一易其瘡粟米大時可灸七七壯如錢大者日夜不住  
灸以瘻為度其疔瘻惡瘡諸法不驗者取蟻螬剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者又  
法以乙火婆蟲同煎灸之累試累驗人皆祕之往往父子不傳

將護 十四

〔齊〕大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不以為急此蘊大患宜速辨之不可自忽若能防之於未  
形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危因矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命束手  
待斃悔之何及可不慎歟夫以不肖之軀託命庸醫任意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不可不  
擇辨之何難若能飽讀經書久諳證候湯藥熟閑洞明色脉性情仁善孝義忠信臨事不感處治有訣方為良醫委

用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼忿恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩為宜於  
患人左右止息煩雜切忌打觸器物諸惡音聲爭辯是非呪罵鬪毆及產婦淫男體氣不潔帶酒腥羶雞犬乳等  
畜禽獸並須遠離設或親友重意問疾者可以豫囑徐行低聲款曲伺候禮畢即退勿令嗟呀驚怪話舊引其遊宴  
宴樂遠別親戚壹恚情懷但恐病人心緒悽愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患人凝滯不決祇台方便首問不  
可久坐多言勞倦病人深不長便夫侍患者宜須壽近中年情性沈厚勤謹耐煩仁慈智惠全在調以粥藥無失時  
節勿令於患人左右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝騾  
猪狗牛羖羊等并雜魚龜鼈蝦蟹及淹浥臭陳自死病倒之類慎勿嘗咬飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷹雀鷓鴣鴛鴦鷓  
鳩鴿鴉鷄雉及能學人言者野獸之中忌食獐鹿狐兔虎豹豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬菜蔬  
之中忌食黃瓜茄子蘭香芸薹胡菜生菜麥芥茵荪蒜葱薤果木之中忌食桃李棗栗李李梨梅輒棗紅柿櫻桃  
胡桃榛松林檎及諸蟲蛀未熟之果若其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵝鷄蔓菁薑醬瓜薺蘿蔔及黃白  
糧米細米稀粥軟飯若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅壺粥羹湯熟溫軟和稀稠得中製造如法勿令太  
飽此時猶忌饅頭蒸餅餅餠餛飩肉角餅及炙煨燠煖煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口  
收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴登陟臺榭運動股體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待  
瘡癩平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯之

禁忌十五

〔薛〕仲景先生治傷寒有汗吐下三法東垣先生治瘡瘍有疎通托裏和榮衛三法用之得宜厥功煥矣  
腫硬木悶煩熱便祕脉沉而實其邪在內當先疎其內以下之焮腫作痛便利調和脉浮而洪其邪在表當先托其  
裏以汗之元戎云榮衛充滿抑遏而為癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅滯而為癰者當補之以接虛怯之

氣又東垣先生云瘡瘍雖面赤伏熱不得攻裏裏虛則下利仲景先生云瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發瘡苟不詳審妄為汗下以致血氣虧損毒反延陷少壯者難以潰斂老弱者多致不救

〔東垣〕瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脉風證只用發表風藥便可以通利大便若口乾燥祕瀆尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱冒昏迷是也慎不可下汗之則愈

〔丹溪〕精要云大黃治癰疽之要藥以其宣熱拔毒又云瘡始作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前用大黃恐因病體實而大腑祕結有積熱沉痼之積者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢乎若下利之後又與利藥恐非防微杜漸之意瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實堅之證自當行仲景發表之法借五香湯為例散之於外何必遽以峻下之藥以奪其裏自取其禍乎

精要云大凡癰疽不可舍五香湯此又不能無言者也開卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多大腑聖祕病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者若果有之亦當開陳時之先後證之可否庶乎後人不致孟浪殺人也或曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方已言之矣良甫祖述其說何吾子病之深也〔大黃除諸實熱而性峻急孫以威行奇術於公卿間時在晚宋民不知兵交游於富貴之家肉食之輩固皆捷效今良甫不分貧富苦樂勞逸一概用之寧無孟浪之患乎况有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪求而虛者強力動勞而虛者大醉過飽而虛者皆因氣弱而瀆血少而濁生疽固是難治之病若大腑祕而少安穀食肯守戒律甘心澹味者猶為可治但費補工夫耳苟因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以為實而行大黃些少寒熱不知其血氣不和也便以為有外感而行表散如此害人甚速

忌汗

十宣忌施  
於夏月與  
清癩

內托散忌  
施於老弱

熱內鬱忌  
服涼藥

仲景云滄家雖身疼痛不可發汗汗之則瘕發汗為大汗出非謂諸托裏之藥輕輕表散也

〔丹〕排膿內補十宣散若用之於些少癰疽與冬月儘可助內托之功若於冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參耆難為倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉 又云內補十宣散瀉衛燥血藥太多止可用於輕小證候虛之甚者恐難倚仗

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心散此方專為服丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老者病深者證僂者體重者菘豆雖補將有不勝重任之患矣

〔丹〕夫外施敷貼正與發表之意同經曰發表不遠熱大凡氣得熱則散冷則斂向見鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初在額絲竹空穴湧出一角長短大小如雞距稍堅求予治予曰此非膏粱所致而何宜斷厚味先解食毒鍼灸以開泄壅滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以憚煩召他醫以大黃朴硝腦子等冷藥審之一夕豁開如醬蚘徑三寸一二日後血自蚘中濺出高數尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也

李世英疽不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

〔薛〕內經云五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰又云形傷痛氣傷腫此則臟腑不和瘡發於外也明矣塗貼寒涼豈能調和臟腑宣通氣血耶設使腫痛熱渴脉滑數而有力屬純陽宜內用濟陰丹外用益陽散則熱毒自解瘀滯自散者似腫非腫似痛非痛似潰不潰似赤不赤脈洪數而無力屬半陽半陰宜內用沖和湯外用陰陽散則氣血自和瘀滯自消若微腫微痛或色黯不痛或堅硬不潰脉洪大按之微細軟弱屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散則脾胃自健陽氣自回丹溪先生云敷貼之劑應酬輕小熱證耳若不辨其陰證陽證之所由分而妄敷寒涼之劑遂塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣况運氣得寒而不健瘀血得寒而不散瘀肉得寒而不潰新肉得

寒而不生治者審焉

忌奪血

蝨蟻法謂開門放毒以為要捷恐可施於輕小證候耳愚謂蝨之所吮止膚間惡血若積毒於臟腑者徒竭之於外而不及於裏恐未為得往見張兄之子甫二歲偏身赤疹如霞片子向見其母久病疔謂毒熱在血所成者張曰誰不因母血所成何謂毒熱之血予曰其母雖疔食肉如平時肉性熱與宿痰之熱相搏非毒歟張不之信自取五六大蟻吮其血疹頓消乳食起居如舊予曰非其治也未可以為喜張怒越二三日大發熱而暴死非竭之於外血去而氣不能獨居乎

忌敗毒

薛氏論見前內消條

輕證忌重劑

〔薛〕用藥之法如執權衡當察病勢輕重邪畜表裏瘡毒腫潰元氣虛實若不詳究其因率爾投治實實虛虛之惡之禍不能免矣治者審之 吳序威原博掌後患疔紅絲至腕惡寒發熱熱屬表證與奪命丹一服紅絲頓消又用

和解之劑大勢已退彼別服敗毒藥發熱口乾紅絲仍見脉浮大而虛此氣血受傷而然以補中益氣湯主之而愈蓋奪命敗毒性尤猛烈瘡邪已散而復用之是誅伐太過失內經之旨矣 一儒者元氣素弱予補其氣血出膿而愈後因勞役瘡痕作癢乃別服敗毒藥一劑以致口噤舌強手足搐搦痰涎上涌自汗不止此氣血傷而發瘧也用

十全大補加附子一錢灌服而甦 一男子患疔服奪命丹汗不止而瘡不痛熱不止而便不利此汗多亡陽毒氣盛而真氣傷矣用參耆歸朮芍藥防風五味二劑諸證悉愈惟以小便利為憂予曰汗出不宜利小便汗既止陽

氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥門倍用當歸黃耆四劑便行瘡潰而愈 東坦曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃營氣而作今反補之自棄何異雖用藥治不能愈也 精要曰羊雞牛鵝魚麵煎煨炒炙酒等味犯之必發熱用梔子黃芩湯最效 丹溪曰梔芩苦參犀角佐輔人參固可解食毒之熱若寒月

食肉

與虛人宜無加減乎內經謂膏粱之變足生大疔此言瘡疽之因也禁戒厚味恐其引起宿火之熱此誠富貴養

口腹者所當謹若素貧者大不然矣子治一人背癰徑尺穴深而黑家貧得此急作參者歸水膏多肉餽飽與之而安多肉餽飽補氣之有益者也

腫瘍 十六

癰疽初發壅腫而未見膿者也

集驗論瘡瘍之法其名有三曰癰曰癰曰疽癰者初生突起浮赤而無根脚腫見

於皮膚間止闊一二寸有少疼痛數日後則微輒薄皮剝起始出清水後自破膿出如不破用替鍼灸拔毒膏貼之膿出即愈癰者初生紅腫突起無頭使用火鍼鍼之即散不散鍼侵根脚闊三四寸發熱惡寒煩渴或不發熱抽掣疼痛四五日後按之微輒此證毒氣浮淺春夏宜用防風敗毒散加葱頭薑棗煎服秋冬去薑棗葱頭加木香身半以上加栝蒌身半以下宜加射干治早者即散或用追毒丸返魂丹復元通氣散微利之膿成用鉞鍼破開或用替鍼丸咬開又一等皮色不變但略微腫肌肉內痛夜間痛甚發熱惡寒煩渴此熱毒深亦名為疽謂其能傷筋脈骨髓也日久按之心中微輒膿成後用火烙烙開以決大膿外貼拔毒乳香膏貼之宜服內托之藥初發急用大鍼於腫硬處鍼之則散疽者初生白粒如粟米大便覺癢痛觸著其痛應心此疽始發之兆也急用火鍼於白粒上鍼開或誤觸破或入湯便覺微赤腫痛三四日後不散根脚赤暈展關須詳着之方見其暈闊狹如闊四五寸左右渾身發壯熱微渴瘡上亦熱此疽也用火鍼於初起白粒上刺入一寸餘徑寸之間四邊刺四處便用四味紫葛湯淋洗一日夜共五六次洗之洗了以輒帛拭乾看疽上或有漸生白粒如黍米或多或少可用銀篋兒挑去勿令見血或有少血亦不妨不見血尤妙却用老皮散傳之用涼水調大鐵箍散圍貼却留瘡口瘡口處用水調正鐵箍散貼之未可用膏藥如再要洗須先去圍藥令淨然後洗之一次洗一次點檢疽上漸生白粒有則如前挑之六七日瘡頭無數如蜂房膿不肯出仍淋洗圍貼冬月用五香連翹湯大黃一味隨虛實加減夏秋用黃連羌活散春末夏初用防風敗毒散加葱白棗煎服秋去之加木香若形氣實脈洪滑有力痛腫熾開壯熱便閉於五利大黃湯漏蘆湯返

魂丹追毒丸復元通氣散選一藥以通利之若大便潤便其藥四十歲以前可用之虛弱年老之人雖有便閉之證須慎之勿令過也瘡熱暈赤焮開圍貼如赤暈收斂却再換鐵箍散不及用火鍼證七八日後中間初起白粒處此竅已潰通內大膿可用皮紙摵小紙紵摵入竅中令透漸漸流出可不用鍼砭如要膿透必以大鍼刺開或周圍四五處其竅四邊如蜂房處膿不肯出用正鐵箍散香油調貼一證初生白粒誤觸後便覺情懷不舒暢背上沉重如負五七斤米樣身體煩疼胸膈痞悶而躁飲食無味怕聞食氣所謂外如麻裏如瓜者疽毒深惡內連腑臟也三五日內皆可用烙於中間左右上下令毒氣通暢後膿從諸竅而出五六日不散疽頂生白粒如板者數日後漸生多間有大如蜂房蓮子者指捺有膿血而不流時有清水流出微腫不突根脚紅暈漸漸展開或痒痛或不痛或根脚暈紫赤焮開至七八寸疽不其熱此證甚重用紫葛湯加米醋一盞淋洗可使紅活如法去白粒傳老皮散圍大鐵箍散瘡口塗正鐵箍散每用前法如得根脚紅暈收疽突此藥力到變重為輕如起第一顆頂上白粒雖有膿而柱引不透接之猶硬或漸不疼便宜用火烙開透若根脚仍舊紫黑瘡反陷下如牛項之皮漸變黑色肌骨腐潰恍惚沉重用拔毒乳香膏貼四邊仍用大鐵箍散圍却用猪蹄湯洗此數項變證必多又宜隨證調理脈若虛弱便用大料人參當歸濃湯調解毒行經之藥凡癰疽必服萬全散夏月用桃紅散服以護心若見膿之後當以潰瘍法調理

按集驗治法未可盡據為準繩更當以後論為主參酌諸方用之 大法腫高焮痛脉浮者邪在表也宜亮之如內托復煎散 腫硬痛深脈沉者邪在內也宜下之如黃連內疎湯仙方活命飲苦參丸 外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衛如托裏榮衛湯白芷升麻輩 焮痛躁煩或咽乾作渴者宜降火如黃連解毒湯 焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之如荆防敗毒散人參敗毒散輩 大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒如仙方活命飲 煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之如清涼飲或金銀花散 惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之如十宣散 焮痛發熱汗多大渴便秘謔謔者結陽證也宜下之如黃連內疎湯破棺丹輩 不作膿或熟而不潰者虛



也宜補之如補中益氣湯八物湯十全大補湯輩 焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之 腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之如仙方活命飲 腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之如清心湯或防風通聖散加黃連 不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之如托裏消毒散

潔古云瘡瘍者火之屬須分內外若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內

外之中者邪氣至甚逼絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫此因先托裏及失疎通又失和榮衛

也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外

者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛甚邪氣深於內也故先疎通臟腑以絕其原內疎黃連湯外之內者其脉浮數焮腫

在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也內托復煎散內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其

在經當和榮衛也當歸黃者湯用此三法之後雖未瘥必無變證亦可使邪氣峻減而易痊也 東坦云瘡疽之發其受

之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者

法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之疾上徹皮毛表裏通瀆并為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危殆重

則死矣予聞潔古云瘡瘍之生也表裏不同或攻或發少有差舛變證隨之殺人甚於傷寒也鍼灸施治各隨其宜

所用之藥又當明入五臟君臣是其法也

內疎黃連湯 治嘔噦心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木悶而皮色不變其根係深大病遠在內臟腑祕澀當急疎

利之

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一錢

連翹二兩

右除檳榔木香為末外

並剉每服一兩水一盞半煎一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利為度如有熱證止服黃連湯

六斗

外科

七

大便祕澀加大黃如無執證止用復煎散時呻之如此內外皆通榮衛調和則經絡自不過絕矣

內托復煎散 治腫焮於外根盤不深形證在表其脉浮痛在皮內恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏

地骨皮

黃耆

防風各二兩

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

甘草

當歸

防己各一錢

桂五錢

右咬咀

先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又

煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱執使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便

祕及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃耆湯 治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸

黃耆

地黃

川芎

地骨皮

芍藥各半錢

右咬

咀水煎服 如發熱加黃芩 如煩躁不能睡臥者加梔子 如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮 右三方乃易水

師弟治瘡之三法今特列於篇首而以古今諸方臚列於後臨病之上詳審脉證而施用之庶乎可以無失矣

〔發表〕內經曰汗之則瘡已東坦云東南二方者在人則為丙小腸熱甲膽風小腸與膽皆居其下其性炎上其瘡

外有六經之形證內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疽瘡也止癰癤也小則為癰大則為癰其邪

所受於下風濕之地氣自外而來侵加於身者也經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫諸痛瘡皆屬心火此瘡自


外而入是丙小腸左遷入於膽作痛而非癢也此二方皆主血血為病必痛此元氣不足營氣逆行其瘡初出未有

傳變在於肌肉之上皮毛之間只於風熱六經所行纏絡地分矣宜瀉其風濕熱醫者只知陰覆其陽則汗也此

宜發汗者乃濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使榮衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赫赤而腫微

黯色東方青埋沒之色也風木之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色其瘡之形勢亦奮

表裏已行 且和榮衛



然高起結硬而作痛也其脉止在左手左手主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以托裏榮衛湯主之 劉宗厚曰前論大要三法即此瘡宜汗之及先托裏恐

邪氣入內言外因也宜先疏內以絕其源言內因也當和榮衛謂不內外因之證也故瘡之發於皮表者因大略言汗及汗下和之間然亦有外治之次第焉如郭氏治驗云一婦人五十九歲右耳下天容穴間患一疔瘡其頭黑膿四邊泡起黃水時流渾身麻木發熱譫語時時昏沉六脉浮洪用烏金散汗之就以鉍鍼先刺瘡心不痛周遭再刺十餘下紫黑血出方知疼痛就以寸金銀子絀入瘡內外用提丁鉍子放於瘡上膏藥貼護次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病即定其疔潰動後用守効散貼塗紅玉鉍子絀之八日其疔自出矣茲所謂審脉證汗下之間外治次第如此若不察脉證但見發熱譫語便投涼劑與下或兼以香鼠之藥遂致致悞人者遠矣

丹溪曰癰疽因積毒在臟腑非一朝夕今發於外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐參以經絡時今使毒氣外發此正仲景解表用麻黃桂枝之意施治之早可以內消此乃內托之本意也托裏榮衛湯 治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝 七分

人參

黃耆

紅花

蒼朮

柴胡

連翹

當歸

羌活

黃芩

防風

甘草

炙各

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一

鍾食前服

加味當歸飲子

治諸瘡瘍諸痛癢皆屬心火火鬱則發之

當歸

生地黃

升麻 各五分

防風 二分

荊芥穗

河首烏 各二分

柴胡

白芍藥

川芎

羌活

黃耆 各二分

紅花

蘇木

甘草 各一分

右吹咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分食遠服沐浴取微汗効速使血氣通和服之應効

人參敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗炒

羌活

枳殼麩炒

茯苓

川芎

前胡

甘草各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾服後服內托復煎散

郭氏神効烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽證惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢冷脈細或時昏昧謔語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡起

蒼耳頭端午日午時收 小草烏頭

火麻頭火日收

木賊去節

蝦蟆頭

樺皮節酥炙

麻黃去根節

右曬乾各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火內從早煨至申分如黑煤色為度碾為末每服二錢病重者三錢用

熱酒調下未汗再一服如汗乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天晴好日於靜室中勿令雞犬猫畜及陰

人見也又名首功元黑散

奪命丹 治諸般腫毒疔疽惡瘡

蟾酥

輕粉各五分

硃砂三錢

寒水石

白礬

銅綠各一錢

蝸牛三十一粒另研

乳香

沒藥

麝香一錢

右件為細末將蝸牛另碾一處丸如丸不就用好酒糊為丸如菜

豆大每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出為効重者再服

一二九

蟾酥丸 治疔黃一切惡瘡

川烏

蓮花蕊

硃砂各一錢半

乳香

沒藥各二錢

輕粉

蟾酥各一錢

麝香五分

右為細末糊為丸豌豆大每服一丸病重二丸依前法服取汗 右三方郭氏稱為首藥皆主乎

發散首出太陽例後二方出少陰例然皆切劑也智者當較輕重陰陽之分取擇用之

寸金丹 二名返魂丹三名再生圓四名追命丹五名延壽圓六名來甦圓七名知命圓八名得道圓非人勿示此

方若有人患瘡身未爛者與三圓服之嚙下便活如口噤但幹開牙關研化三圓灌下喉中立生此方治發背腦

疽癰腫偏身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香 一分

南乳香

烏金石

輕粉

雄黃

狗寶

蟾酥 二錢

粉霜

黃蠟 各三錢

礞砂 五錢

鯉魚膽

狗膽 各一個

沒藥 各一錢

頭胎男孩兒乳 一合

右件為細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菉豆大小兒丸如芥子大每服一

丸病重者加三丸白丁香七個研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出為度大段疼痛如無頭瘡腫

不過三服立效服藥後喫白粥瓜薑就睡大妙

烏金散 治疔毒腫痛

牙皂 四分

人言 製

蟾酥

麝香 各五

血餘 煨過

蛇蛻 煨過

蜂房 煨各一錢

蟬蛻 酒洗

血竭

乳香 炙

殭蠶 炒去絲 各二錢

辰砂 研水 飛

雄黃

穿山甲 炙黃各三錢五分

全蝎 三錢湯泡七次

天龍 四錢酒炙去頭足

川烏尖 二錢

沒藥 錢二

右各為細末稱準分兩和勻每服三分赤砂糖調

葱頭酒送下取汗為度

勝金丹 治症同前

麝香

白砒 製各五分

蟾酥 一錢

雄黃

辰砂

乳香

沒藥

血竭 各一錢五分

全蝎 泡炙

天龍 去頭足 炙

穿山甲 炙各三錢

殭蠶 炙去絲 伍錢

右為細末和勻服法同前

奪命丹 治證同前

輕粉

麝香


白砒 製各五分

白礬 煨

辰砂 為衣

血竭 各一錢

蟾酥 乾者二錢酒化入藥



銅綠

寒水石 煨

乳香

沒藥

雄黃 各二錢

蝸牛 二十一箇連殼

右為末先將蝸

牛研爛如泥勻和前藥為丸如菉豆大如丸不就加好酒打三五百下每服二三丸先用葱白三寸與病者嚼爛吐於男左女右手心將藥丸裹入葱白用無灰酒三四盞溫熱送下被蓋取汗為度重者不過三服 右自烏金散以下皆治毒瘡初發憎寒壯熱面赤身拘急疼痛者取汗之峻劑東垣雖左袒汗而托裏榮衛一丹則固丹溪所謂助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐者也與烏金奪命之取汗異矣當歸飲子亦同此意而微有氣血溫涼之分焉故與敗毒散同列為發表之方而後所列東垣分經諸方則正丹溪所云雖曰解表不以取汗為功尤可師法學者詳之

太陽分野藥

〔垣〕通父家翟梗於尻臀上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右脉俱緊按之無力內托羌活湯

羌活

黃柏 酒洗各二錢

防風

藁本

連翹

當歸 各一錢

肉桂 三分

甘草 炙

蒼朮

陳皮 各五分

黃耆 一錢五分

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去渣熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈

〔丹〕王姑丈七十餘患項疽脉實而稍大此因憂悶而生太陽經治之

歸頭 二錢

黃柏 一錢半酒炒

黃耆

羌活

地黃 酒炒

黃芩 酒炒

桔梗 一錢

黃連 酒炒

連翹

防風

甘草 生

人參

陳皮

防己

澤瀉 五分

白水煎服

淨腋湯 治皮膚痒腋下瘡背脊上瘡耳聾耳鳴

麻黃

草薺


防風

柴胡

黃芩 酒炒

蒼朮 各一錢

桂枝



羌活各二錢

桔梗

甘草

生地各五錢

當歸梢七分

紅花少許

升麻半分

連翹一錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去渣稍熱服

尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明經分出癰第四日忽腫幼有癩疔其臂外皆腫痛先腫在陽明左右寸皆短中  
得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脉斷之邪氣在表然其證大小便如故飲食如常腹中和口知味  
知不在裏也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裏既和知邪止在經脉之中凝滯為癰出身半以上風從上  
受之也故與却寒邪和經脉中氣血使無凝滯也

白芷升麻湯

白芷七分

升麻

桔梗各五錢

甘草炙

黃芩

歸梢

生地各一錢

酒黃芩

黃耆

連翹各二錢

中桂少許

紅花少許

右水酒各一盞同煎至一盞臨臥

熱服一服愈

此證雖曰經脉之中然得之自八風之變其藥制度皆發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

升麻

連翹

葛根各半錢

肉桂三分

黃耆

歸身

甘草各一錢

黍粘子五分

黃柏二錢

右作一服水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

〔羅〕汗之則瘡已

丁巳年季子從軍回住曹州有趙同知舅經歷病頭面赤腫耳前後尤其疼痛不可忍發熱惡

寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫腫上砭刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然予往

診視其脉浮緊按之洪緩此寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒地凍則水冰人氣在中皮膚綴腠

理閉汗不出血氣強內堅濡當是之時善行水者不能注冰善穿地者不能鑿凍善用鍼者亦不能取四厥必待天

溫冰釋凍解而水可行地可穿人脉亦猶是也又曰冬月閉藏水冰地折故用藥多而少鍼石也宜以苦溫之劑溫



經散寒則已所謂寒繳腠理以苦發之以辛散之也宜以托裏溫經湯麻黃苦溫發之者也防風辛溫散之者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以為臣血流行而不利者則痛以香白芷歸身辛溫以破血散濕熱刺腫蒼朮苦甘溫體輕浮力雄壯能泄皮膚腠間濕熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托裏之功故以為佐各到如麻豆大同秤水煮餌之以薄衣覆其身且臥於暖處則經血溫腠理開寒乃散陽氣伸大汗出腫減八九再服去麻黃防風加連翹麥粉子痛腫悉去經言汗出則瘡已信哉

托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢體疼

麻黃去根節

白芷

當歸各二錢

防風去虛

葛根各三錢

升麻四錢

甘草炙

白芍藥各半 人參

蒼朮各一錢

右到如麻豆大每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸去沫再下餘

藥同煎至一盞去渣大溫服訖臥於暖處即以綿衣覆之得汗而散

少陽厥陰分野藥

〔指〕蒲津王世祥年七十感寒濕地氣二月間得附骨癱於左腿外側足少陽之分少侵足陽明分闊六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛與藥下咽痲痛立止二日後柔輒而腫消矣

內托黃耆酒煎湯

柴胡

黍粘子各錢

連翹

肉桂各一錢

黃耆

當歸各二錢

黃柏

甘草各五分

升麻七分


作一貼好酒一盞半煎至一盞大溫空心食消盡服之少時以早膳壓之使不令

大熱上攻犯上中二焦也

賈德茂男十歲四月天氣大熱於左足大腿近膝股內足厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽不辨肉色

漫腫皮澤木硬痛熱甚其脈左三部細弦按之洪緩略有力

內托黃耆柴胡湯





黃耆 二錢 柴胡梢 一錢 羌活 五分 連翹 二錢 肉桂 三分 土瓜根 一錢 生地 一錢

黃柏 酒洗 三分 當歸尾 七分 右作一服酒一盞水三盞煎至一盞空心熱服一服愈 右方皆東垣及羅謙

甫丹溪隨癰疽所發分野制之也其方皆以發表為先不過一二服而愈如癰疽發在太陽經分野必用防風羌

活陽明經分野必用香白芷升麻少陽經分野必用柴胡太陽經分野必用芍藥升麻少陰經分野必用獨活履

陰經分野必用青皮柴胡皆以桂佐之身半以下者必用酒水多熟煎之空心服使藥下行半身以上者必用酒

水少帶生煎之臨臥服使藥上行脉細小無力必於本經藥中加辛熱劑脉洪大有力必於本經藥中加苦寒劑

隨證加減活潑潑地其效如神真良醫也

〔辛涼解表〕脉有力而數者春夏者宜之其藥則前條東垣謙甫丹溪諸方除托裏皆是也

〔丹〕呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥

白朮 川芎 三錢 赤芍藥 連翹 二錢 陳皮 黃芩 防風 二錢

木通 半錢 甘草 五分 分五貼水煎服

又治一好酒老嫗腦疽弦脉緊急且濇用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌炒人參入薑煎調一錢重過兩時再

與得睡而上半身汗睡覺病已亦辛涼解表之意

當歸拈痛湯 治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外腫瘡膿水不絕或痒或痛脉沉緊實數

動滑者並宜服之

羌活 人參 苦參 酒製 升麻 葛根 蒼朮 各二錢 甘草 炙

黃芩 酒製 茵陳葉 酒炒 防風 當歸身 澤瀉 知母 酒製 豬苓 各三錢

白朮 半錢 右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服之 按此足太陽陽明二經藥也東垣本處為治脚氣



濕熱之劑然世人用治以上諸瘡甚驗故錄之

縮毒金粉散 治但疼痛不急服

乾葛 甘草 鬱金 川芎

一錢溫酒入蜜調下不拘時此藥大散五臟積毒凝滯日三服

復煎散 治癰疽發背

黃柏 黃芩 黃連 知母 生地黃 防己

羌活 黃耆 麥門冬 甘草 獨活 人參

陳皮 防風梢 藁本 連翹 桔梗 蘇木 當歸身 五味子

豬苓 蔓本 連翹 桔梗 右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓隨證上

下食前後服

羌活當歸湯 腫疽 黃柏當歸湯 發背 黃連消毒飲 腫疽 內托升麻湯 乳癰

散腫清堅湯 升麻調經湯 並療癰 連羌散堅湯 消腫湯 並馬刀

柴胡通經湯 馬刀 郭氏升麻牛蒡子散 時毒 中和湯 時毒

〔辛平解表〕不寒不熱半陰半陽者宜之

良方升麻和氣飲 治瘡癰癰疥痒痛

甘草 陳皮 芍藥 大黃 乾葛 蒼朮 桔梗

升麻 當歸 茯苓 白芷 乾薑 枳殼 三因方有厚朴

半錢 右吹咀每服一兩水煎 按此手足太陰陽明經藥也五積散加減法世俗多用之故收入蓋欲燥脾



胃勝濕和氣為治瘡之劑然臨證而不通變恐未合宜也

當歸飲子見前

聖濟總錄金鍼散 治發背諸瘡腫

皂角鐵春取一半新 秋取一半黑者 右一味不拘多少晒乾為末食後酒調二三錢服 按丹溪曰此藥治癰疽已破未破

皆用直領到潰處謂當入屋隊中用也

〔辛溫解表〕脉無方而緩者秋冬者宜之

精要十宣散

人參 當歸 黃耆各二兩 川芎 防風 厚朴 桔梗

官桂 甘草 白芷略一 右為細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多為妙不

飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得于都下異人濟苦者不可勝數 陳無擇謂此

藥在第四節服者非也早服中病者必消散

衛生寶鑑曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡成形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而

權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨其宜治之可收十全之功矣故此方用之於癰疽初發或已發或內

托然瘡蓋脈緩澀或身倦惡寒熱少脉弦或緊細者宜用之散風寒助陽之劑也表裏氣血之藥若施之於積熱

燉毒更不分經絡時宜不能無誤也丹溪曰精要謂排膿內補十宣散治果成者速散已成者速潰誠哉是言也

若用之於些小癰瘡與冬月時令儘收內托之功若於冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺若潰瘍於夏月

用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參耆難為倚仗比見世人用此者不分癰疽冬夏無經絡無前後

如盲人騎瞎馬夜半臨深池危哉

六斗集 卷二 外科



十六味流氣飲 治無名惡腫癰疽等證

川芎 當歸 芍藥 防風 人參 木香 黃耆

官桂 桔梗 白芷 檳榔 厚朴 烏藥 甘草

紫蘇 枳殼 右咬咀水煎服 按此表裏氣血藥也復以疎風助陽之劑世俗多用之故收入非脈

之洪緩沉遲緊細者不宜用此每見外科諸家載此往往不分經絡脈證不具時宜但云化毒消腫有云不退者

加以補氣血之藥蓋又使人不能無疑也用者當觸類而通之 凡治瘡瘍不審元氣虛實病在表裏便服敗毒

流氣等藥必有失誤蓋敗毒散發表藥也果有表症止宜一二服多則元氣損毒愈感雖有人參亦莫能補添氣

飲耗血藥也果氣結胸滿只宜二三服多則血反致敗雖有芍歸亦倚仗丹溪曰此不係膏粱丹毒之變因虛勞

氣鬱所致也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔瘡

黃耆 厚朴 防風 桔梗 連翹 木香 沒藥

乳香 當歸 川芎 白芷 芍藥 官桂 人參

甘草 右為細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

辛熱解表 脈無力而遲者陰證者大寒之時黃耆之

托毒散 治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗

附子 當歸 麻黃 甘草 官桂 川芎 羌活

石葶 龍膽草 右九味等分為末每服二錢水一盞薑三片鹽少許同煎丹溪治一男子年五十餘

形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚脈數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附子括蕒子甘草

節羌活青皮人參黃耆半夏生薑六貼而消此非內托之意歟

〔攻裏〕

內疎黃連湯 方見前

聖濟射干湯 治癰疽發背諸瘡腫脈洪實數者

射干

犀角

升麻

元參

黃芩

麥門冬

大黃各一兩

山梔 半兩

右吹咀每服五錢加竹葉芒硝一錢以利為度 按此足陽明手太陰經藥也

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒脈洪弦實數腫甚欲作膿者三服消盡

大黃

牡蠣

瓜蒞根

皂角鍼

朴硝

連翹 各三

當歸

金銀花 各一

赤芍藥

黃芩 各二

為粗末每半兩水酒各半煎服 按此足厥陰太陰陽明經藥也

破棺丹 治諸熱腫一切風熱瘡疔發熱多汗大渴便秘譫語結陽之證

大黃 生半兩 熟半兩 芒硝

甘草 各二

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸疾重一九至二丸食後童便

入酒半盞化服或白湯合酒化服 按此仲景正陽陽明經藥也

瀉心湯 治瘡毒癰腫發躁煩渴脈實洪數者

大黃 四兩

黃連

山梔

漏蘆

澤蘭

連翹

黃芩

蘇木 各二兩

犀角 一兩

右吹咀每服三五錢水煎服 按此手少陰太陰少陽藥也出足陽明例

清涼飲 治瘡瘍煩躁飲冷熾痛脈實大便秘結小便赤澀

大黃 炒

赤芍藥

當歸

甘草 各二

右水煎服

精要漏蘆湯



生黃耆

連翹

沉香

漏蘆各一兩

粉草半兩

大黃一兩

右為細末每服二

錢薑薑湯調下

內消升麻湯

治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻

大黃各二兩

黃芩半兩

枳實麩炒

當歸

芍藥

甘草各一兩

右咬咀水煎食前服

孫真人單煮大黃湯

脈實沉而數實梁食肉之輩大腑秘者詳密用之

錦文大黃

酒洗去皮

右一味剉如麻豆大水煎服

宣毒散

治一切毒瘡其功不可盡述

大黃

白芷各五

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

薛按此方乃宣通攻毒之劑若脈沉實便秘

者乃毒在臟也宜服之以絕病源其功甚大或臟腑調和而脈不實恐不可用醫林集要方大黃一斤白芷六兩為末每服三錢熱酒調下更用茶清調搽患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送為丸今可服吳江申僉憲元背患瘡木悶堅硬脈沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消恐患者忽此二藥故以所嘗治驗者告之

者告之

治背瘡荆芥穗木鼈子肉大黃歸頭甘草節除荆芥穗為君外餘各等分酒水各一盞煎至七分空心向東飲即下積與粥便止若結成者用川楝子七枚燒灰酒下次與十四枚又次與廿一枚三貼後雖結亦消矣陶

內托散

治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃

牡蠣各半兩

瓜蒞二枚

甘草三錢

右剉每服三錢水一大碗煎七分去渣溫服

秘傳背瘡方



大黃 五錢 甘草節 一錢 木鱉仁 五枚 右先將甘草木鱉剉碎同酒水各半小碗砂銚肉文武火熬數

沸後下大黃煎至七分去渣盛磁器內以青布覆之明星下露一宿五更溫服打下膿血是驗却用生料四君子

湯煎服

漏蘆湯 見四卷服部 附骨疽條

車螯散 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒利下熱退為度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯 一雙鹽泥固濟火煨輕粉 通紅地上出火毒用

甘草 各二錢

大黃 五錢

黃芩

漏蘆 去須

瓜根 各半

右為末每服二錢薄荷湯下速利酒亦可

內消丸 治瘡腫初生及癰癤結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉

皂角 不蛀者水浸至軟 二味各半斤煎膏

牽牛 半斤取 頭末

青皮

陳皮 各一兩

沉香 半兩

廣著 炮

京三稜 炮各三錢

右為末入牽牛頭末用煎膏和丸如菜豆大每服三十九煎連翹湯送下食後

神仙解毒萬病丸 又名追毒丸 一名玉極丹

治一切毒及菘子鼠莽菌蘆金石或喫疫死牛馬河豚等毒或時行瘟疫山嵐瘴

瘴急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼及衝冒寒暑熱毒上攻或自縊或溺水或打撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇

蟲犬鼠所傷或中邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥直濟世衛生之寶毒藥如嶺南兩廣最多

若從宦於此纔覺意思不快服之即安彼湖有草曰胡蔓草又名斷腸草陰置水中飲之即死又有取毒蛇殺之

以草覆上以水灑之數日菌生其上取為末酒調以毒人始亦無患再飲酒即發立死其或淫婦多與北人配合

北人回密與藥置食中乃戒之曰子某年來若從其言婦乃以藥解之過期則必死矣名曰定年藥凡北人至彼

方亦宜知之若覺中毒四大不調即便服此况彼下藥時必於雞豚等肉投之後再食前物必發其毒急服此一

錠或吐或利隨手便差昔有一女子久患勞瘵為屍蟲所噬磨一錠服之一時吐下小蟲千餘條後只服蘇合香

大戟例

牽牛例



北京大學圖書館

丸半月遂如常如牛馬六畜中毒亦以此藥救之無不效者

文蛤 三兩淡紅黃色者越碎洗淨一名五倍子

山茨菇 二兩

續隨子 去殼研細以紙包壓去油再研一兩

紅芽大戟 洗淨一兩五錢麝香三錢研

右各另為細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如欲急用辰日

亦得勿令婦人孝服不具足人及雞犬之類見之合宜珍重否則無效 如癰疽發背未破用冷水磨塗痛處并

服良久覺痒立消 陰陽二毒傷寒心悶語狂胸膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉

同研下 急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下 自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿

者並冷水磨灌下 蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般瘧疾不問新久臨發時

煎桃柳枝湯下 小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下 牙關緊急磨一錠外塗內服量大小用之

牙痛酒磨塗及含少許吞下 湯火傷更流水磨塗傷處 打撲傷損炒松節酒下 年深日久頭痛太陽疼用

酒入薄荷末紙花貼太陽穴上并服之 諸般癩疾口眼歪斜眼目掣眩夜多唾涎言語塞澀卒中風口噤牙關

緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚痠痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服 〔薛〕治一婦人

腹內結塊久而不消又一婦人月經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不效服此並痊 一婦人苦頭風作

暈數年亦服之吐痰碗許遂不再發 一男子喉閉水漿難下 一男子纏喉風痰涎壅盛 一婦人中風牙關

緊急痰涎涌出隨服並愈 一男子便毒堅硬 一男子患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次痛即

止不日而消 一男子患發背瘡頭如粟重如負石內服外塗後去三四次每去肛門如炙即日而瘳 一男子

剝自死牛即日遍身患紫泡不計其數已而俱潰各灌一錠吐瀉而甦一藥不下者遂死 一小兒昏憤六日不

省一小兒驚風發搐諸藥不效它口灌之並蘇 一男子中風牙關緊急口出涎水亦灌之尋愈 一女子為邪

所文腹作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜更二三錠使烟氣盈屋遂不再至 一家患傳屍勞兒



第五人已死者三人有方士令服此藥遂各進一錠一下惡物如膿狀一下死蟲如蛾形俱獲生其人遂以此藥廣濟屍證無不驗者余當用治一切雜病及瘡疽等毒未成膿者甚效其已成膿者亦能殺大勢考其藥品雖不言補今羸瘦之人服之並效誠神劑也然以價計之用銀三錢藥有七十錠可救七十人有力之家當合之以濟人近人製此往往加以硃砂雄黃考之諸方並無此味余故不用恐亂真也識者當自知之

郭氏瑞效丸 治腸癰胃癰內積兼男子婦人積聚證

當歸 京三稜 檳榔 木鱉子 穿山甲炒各一兩 牡蠣為末炒山甲都用 連翹

枳殼炒各一兩半 礞砂焙 琥珀各一兩 巴豆粒封油 麝香少許 右為末酒糊為丸桐子大每服十

丸至二三十丸溫酒下臨臥再服如利動臟腑減丸數大小便有膿血出者却用別藥調治之

萬靈奪命丹郭氏延壽濟世膏又名 治一切瘡腫疔疽初起脉沉實及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之

硃砂 鹽花錢各半 雄黃 明礬生用 楓香錢各二 赤石脂 黃丹

琥珀 輕粉各半錢 麝香 片腦錢各一 巴豆去殼水 葶麻子另研各四 右為末用

巴豆葶麻子膏和藥為丸如和不就加煉蜜就成膏收磁器內如用時旋丸艾實大每服一丸并花水下或湯亦得忌熱物半日大人小兒以意加減與服

一粒金丹 治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香 木香 乳香各五分 巴豆霜一錢五分 各為細末照稱分數和勻用黑肥棗兩個半去

皮搗爛為丸如艾實大每服一丸量入虛實先呷一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水

一口送藥下行盡數次以米飲補之

威靈仙飲

威靈仙例

六斗佳麗 卷二 外科

生威靈仙 不拘多 少為末

每服一錢空心溫酒調服逐日微利為度 戴復菴治癰疽疔毒並威靈仙飲微利之

發表攻裏 五香連翹湯 治諸瘡腫初覺一二日便厥送咽喉塞發寒熱

沉香

木香

麝香

丁香 各一兩

乳香 二兩

連翹

射干

升麻

獨活

桑寄生

甘草 各一兩

大黃 半兩

木通 二兩

右咬咀每服五錢

水一盞半煎七分溫服取利 按丹溪曰精要第一論云不問癰疽瘡癤虛實冷熱先與內托散五香連翹湯沉

腐湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實冷熱多服為妙夫癰疽瘡癤臟腑陰陽有淺深虛實冷熱用藥

有補瀉溫涼老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損奈何欲以不冷不熱四五方而通治之又以多服

為妙此不能無疑也學者當審經絡察病機而處治豈可口伏此為通治之法乎

千金漏蘆湯 治癰疽丹疔惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆

連翹

黃芩

白斂

枳殼

升麻

粉草

麻黃

朴硝 各一兩

大黃 半兩

右除硝外每服二錢水一盞薑三片薄荷三葉同煎溫服取利為度

防風通聖散 治時毒熱毒便秘熱燥若時毒饑饉之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用

防風

當歸

川芎

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

桔梗

石膏

黃芩 各一兩

白朮

山梔

荆芥 各二錢

甘草 二兩

滑石 一兩

右水煎服或為末白湯調下仍量入虛實 按此表裏氣血之藥

也治一切風毒積熱瘡腫脉弦洪實數浮緊氣血實盛者不可缺此見近有祕傳外科家方以是藥加人參赤

茯苓黃耆蒼朮金銀花名消腫托裏散難以參者為主復云人參無亦可蓋使人不能無疑而難用也且臨證加

減須較表裏之法如表證多者當從此方以辛甘為主散之也裏證多者方可從變故此分辛溫辛平辛涼之異

升麻和氣飲 治瘡腫癩疥痒痛 此與前條方大黃有  
多少之異故兩列之

升麻 桔梗 蒼朮 乾葛 甘草 大黃 煨各一錢 陳皮 二錢

當歸 半夏 茯苓 白芷 乾薑 枳殼 各五分 芍藥 一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

〔半表半裏中和湯〕 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參 陳皮 各二錢 黃耆 白朮 當歸 白芷 各一錢 茯苓

川芎 皂角刺 炒 乳香 沒藥 金銀花 甘草節 各一錢 石水酒 各半煎服

〔內托〕內托散 一名護心散 一日至三日內宜連進十數服

真菜豆粉 一兩 明乳香 半兩 慢火于銀石器中炒手指 細研極細 右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時

細呷要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之證大宜服此 如有寒而嘔逆不  
宜服此當用辛熱 丹溪云此散菜豆解丹毒又治石

毒味甘入陽明胃性寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使此

方專為服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理

國老膏 治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述

甘草 大者 右搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熱成膏用器收之每服

一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之 本事方每甘草一斤分作三服溫  
酒調下今云一二匙恐力少也

牛蒡粥 治瘡腫 用牛蒡根三莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋膜汁中即下米煮粥鹹淡任性服一碗甚良

無忌

解毒散 治癰瘡始覺便宜服



犀角屑 川升麻 川朴硝 赤芍藥 木通各一兩 石膏二兩 元參

麥門冬去心 甘草生剉各半兩 右每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服無時

清心內固金粉散又名金花散

辰砂另研 白茯苓去皮 人參去蘆 甘草各七錢半 萊豆粉四兩 白豆蔻仁 朴硝另研各半兩

雄黃研 腦子 麝香并研各二錢半 右以參苓白豆蔻為末入研藥令勻每服一錢半鹽湯調下無

時候此藥專治惡瘡熱盛焮痛作渴煩躁此藥解毒

內追毒丹 清心解毒散

大硃砂 雄黃各五錢 生麝香一錢 生犀角 琥珀以上並別研細 黑角沉香各五錢 右為末煉蜜

丸梧桐子大每服二十九燈心薄荷湯下

精要云憤鬱不遂志欲之人多犯此疾 三因云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿于經絡與血

俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒哀思有所鬱而成也

獨勝散 治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子去毛令淨以生薑汁洗一宿焙乾研極細 右無時以白湯調二錢服之又云瘰疾多因怒氣得之若有此疾必多怒但服

香附進食寬氣自有效

丹溪云獨勝散治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施於體實氣鬱之人于見吳兄厚味氣鬱而形實性

重年近六十患背疽醫與諸藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰恃此以安然此等體實而又病實

乃瘥于自而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子薑黃香附子甘草三味而

以不老為名且引鐵瓮先生與劉君為証夫豈無其故哉蓋於行氣中有補之之理耳天之所以為天者健而有常



也因其不息所以生生無窮正如芫薺子活血行氣有補陰之妙故名益母胎前產後所恃者氣血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯草治瘰癧亦然

遠志酒 治一切癰疽發背癩毒惡候浸有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內執逼人手不可近傳之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈

遠志 不拘多少酒浸 槌去心乾為末 酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傳于患處

越鞠丸 治六鬱牙齦作痛口舌生瘡或胸膈痞滿嘔吐吞酸或腹脹腿酸等症

蒼朮 炒 神麩 炒 香附 山查 山梔 炒 撫芎

右為末水調麩糞麵為丸桐子大每服七十九白湯下

五香散 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香 乳香 各等分 右到散每服三錢水一盞半煎食

後溫服

補遺謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結三證有異耳予謂婦人海滿則行月閉一證固異然婦人情性執著比之男子十倍雖有虛證宜補亦當以執著為慮向見樓氏婦早寡善飲咬形肥偉性沉篤年六十六七月間生背疽近正瘡醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬱酒肉之毒執著之滯時令之熱卒至于平陷淹延兩三月而不救

忍冬酒 初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫野老百發百中

忍冬藤 生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和得所連傳 四圍中心留一口又取五兩用木槌搗碎不犯鐵器 甘草 生剉 一兩 右二味入砂瓶內用水二碗文武

六科集覽 卷二 外科 五



火煎至一碗入好酒一大碗煎十數沸去渣分為三服一日連夜進盡病勢重一日夜可二劑忍冬藤補血如氣虛及寒多人不宜

用是故田夫野老百發百中也

**金銀花湯** 治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等證金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者不過三五服可保無虞

**五服可保無虞**

**槐花酒** 治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮痛者並治之 用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服未成者二三服已成者一二服

**黃耆酒** 治諸瘡退風熱

**黃耆** 剉

**當歸** 切焙

**黃芩** 心黑

益羊竹葉七片煎至一盞去滓空心溫服日晚再服

**生地黄散** 治發癰腫熱毒皮痛心神煩悶

**生地黄** 二兩

**赤芍藥**

竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

**阿膠飲子** 精要

**明阿膠** 炒如珠

**牛膠飲** 截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于內

**牛膠** 通明者 用酒一碗入膠內重湯煮銕透攪勻傾出更浸酒隨意飲能飲者以醉為度此方活人甚多

麥門冬 焙 心

大黃 剉 炒

芫蕪

川升麻

地骨皮

元參

甘草 生各一兩

右吹咀分作三服以水一盞煎七分去滓溫服

粉草 各一兩

橘紅 半兩

**牛膠** 通明者

用酒一碗入膠內重湯煮銕透攪勻傾出更浸酒隨意飲能飲者以醉為度此方活人甚多



黃礬丸 服過一兩以上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數

白礬 一兩

黃蠟 半兩

右和丸如桐子大每服十九漸加至五十九溫酒送下如未破即消已破即合

日服百粒則其效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳治蛇咬溶化白礬乘熱滴傷處痛即止 一方用明礬飛過研細以雞子二个取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒放開服之膿未成者即消已成膿者從大小便出神效其功大勝黃礬丸

丹溪云阿膠飲牛膠飲黃礬丸以牛皮質金屬土補肺氣實大腸壯胃止泄黃礬丸以蠟味甘淡入大腸有補難化國老膏以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有補性歸心歸血用之頗切善用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛亦奏捷功

托裏消毒散 治胃氣虛弱或因剋伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新

肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒之劑

人參

黃耆 鹽水拌炒

當歸 酒洗

川芎

芍藥 炒

白朮 炒

茯苓 各一錢

金銀花

白芷 絡七

甘草 炙

連翹 絡五

右水煎服

托裏散 治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情及諸經錯雜之邪而

為患者當各審其因而參以主治之劑其屬胃氣虛弱者當以六君子湯為主

人參 氣虛者多用之

黃耆 炒各二錢

白朮 炒

陳皮

當歸

熟地黃 自製

芍藥 酒炒

茯苓 各一錢 右水煎服

治癰疽初覺腫結未成可以消散毒飲子

黃耆 二兩

甘草 炙

天羅 生

山藥 炒各一兩

鬼腰帶葉

半兩生竹籬陰濕石岸結石而生者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對

六斗

外科

二

形生 三角 右為粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎一二沸去渣溫服

神效托裏散精要 治癰疽發背腸癰癩癰無名腫毒焮赤疼痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之

黃耆 去蘆 忍冬藤葉各五兩 當歸一兩 粉草炙八錢

食後服在下食前服以頃再進留滓外傳

金銀花湯 迴瘡金銀花散見癰疽兼證痛條

本事黃耆散

綿黃耆 一兩 甘草 半兩 皂角刺揀紅紫者剉炒黃一兩 細末每服五錢酒一盞乳香一塊煎七分去滓服

海藏云黃耆湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補也

黃耆四物湯

人參 黃耆 白朮 茯苓 芍藥 甘草 生薑

當歸 地黃 川芎 右多加金銀花水煎服

內固黃耆丸本

綿黃耆 人參各半兩 右細末入真生龍腦一錢研細生藕汁和丸萊豆大每服三十九丸溫熟水下加至

四十九日三服

丹溪治五八婦年六十歲背上瘡脉洪大數千後惡寒發熱食少

連翹 黃耆生三錢 人參 二錢 陳皮 茯苓 五分 甘草 炙 白朮 各一錢

縮砂仁 三錢 分十貼煎服 右方皆以黃耆為君甘草歸參為佐乃實內補虛之中兼托裏也 右丹溪實內

補虛法皆以參朮歸耆又甚者獨參膏其法並見後分經條及散見潰瘍門虛實寒熱條真轉死回生之捷法也





〔元戎〕素問寒癰疽例 經云腎移寒於脾發為癰腫少氣脾移寒於肝發為癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脉聖濟云衣服過厚表易著寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不久則然後變色疼痛漸重而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口不合變為疔漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以骨碎補丸主之方觀久李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常冷脉沉微細或自汗出急用薑附之藥甚者於臍下關元著艾三五百壯待手足溫泄瀉止飲食知味方可為喜

回陽湯 治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等症

乾薑炮

附子炮各二錢

人參

白朮

黃耆各三錢

當歸

陳皮

甘草炙各二錢

柴胡

升麻各五分

右酒水煮服不應薑附倍之數藥用回陽玉龍膏

清熱消毒散 治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

黃連炒

山梔炒

連翹

當歸各一錢

川芎

芍藥炒

生地黄各一錢半

金銀花二錢

甘草一錢

右水煎服

黃連消毒散 治腦疽背疽腫焮疼痛或麻木

黃連製

羌活各一分

黃芩

黃柏各半錢

生地黄

知母製

獨活

防風

當歸尾

連翹各四分

藁木

防己

桔梗各半錢

黃耆

蘇木

陳皮

澤瀉各二分

人參

甘草各三錢

右水煎服

黃連解毒湯

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

黃芩

黃柏炒

黃連炒

山梔各五分

右水煎熱服

清心湯 治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧即防風通聖散每料加黃連五錢每劑一兩水煎服

濟陰湯 治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹

山梔炒

黃芩炒

黃連炒各一錢

芍藥一錢五分

金銀花三錢

牡丹皮二錢

甘草一錢

右水煎服大便祕量加大黃數藥用洪寶丹

元參散 治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢疼痛

元參

甘草生剉各半兩

石膏二兩

麥門冬去心七錢半

前胡去蘆

枳實麩炒

人參去蘆

赤芍藥

黃耆

赤茯苓

川芎

生乾地黄

黃芩各一兩

右吹咀每服四錢

水一中盞入竹葉二七片小麥一百粒煎六分去滓不拘時溫服

仲景排膿湯

甘草二兩

桔梗三兩

生薑一兩

大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

排膿散

枳實十六枚

芍藥半兩

桔梗五錢

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞子黃相等揉和煎如

薄粥溫服一升即瘥

本事托裏排膿生犀散

皂角刺粗大黑紫者不拘多少

右置瓶中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出研為細末每服一錢薄酒微溫調下暑月

陳米飲調下

連翹飲 治癰腫瘡癤排膿

連翹

防風去叉各三兩

薺芎

白芍藥

黃芩去黑心

元參各二兩

人參



白茯苓

去黑皮

桔梗

剉砂炒

前胡

去蘆

甘草

炙各一兩

黃耆

生四兩

桑根白皮

剉炒一兩半

搗篩每服

五錢水一盞半煎八分去滓溫服日二

或問腫瘍何膿可排曰家搜嘗言癰疽連患不已烏程凌藻湖謂針血海可以除根以長針刺之半日出鍼膿血相雜臭不可聞後果不復發當是時身無瘡也膿從何來哉

〔內消〕精要柞木飲子

乾柞木葉

四兩半

乾荷葉中心蒂

乾萱草根

甘草節

地榆

各一

右細剉每服半兩

水二碗煎一碗分作二服早晚各一服未成者自消清者自乾其荷蒂去惡血管根下水解毒利胸膈柞木有益

刺能驅逐地榆主下焦血病輕小證候或可倚仗

車螯散

車螯

一兩煨通赤本草云車螯消酒毒

生甘草

二錢半

輕粉

五分

為細末每服四錢濃煎括婁酒調五更服轉下惡

物為度未知再用效在五香之上

本草云車螯大蛤也一名蜃

又方

車螯

四個黃泥固濟火煨赤出火毒一宿

瓜萋

一枚去皮燈心三十瓦上炒香

甘草節

五分

右為粗末作一服酒二盞煎一

盞去滓入蜜一大匙和勻每用酒八分盞重螯末二錢膩粉少許調勻空心溫服取下惡物黃涎為效

內消散

治癰疽結硬疼痛

人參

去蘆

瞿麥

白斂

川升麻

當歸

微炒

黃芩

防風

黃耆

剉

沉香

甘草

生剉各一兩

赤小豆

煮熟一合

為細末每服二錢不拘時溫酒調服

丹溪云車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其散腫消毒下積安詳穩重輕小症候可以倚仗

化毒為水內托散 凡患癰疽發背對口惡疔瘡乳花百種無名無頭歹瘡此藥能令內消去毒化為黑水從小便



出萬不失一此方不可秘藏不可輕視寶之寶之

乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母 半夏 金銀花

皂角刺 天花粉各一錢 右吹咀用無灰酒一碗煎半碗去渣作一服溫進不宜加減將渣搗爛加秋過

芙蓉葉細末一兩以蜜水潤過一宿自消不必用第二服忌發物大效

仙方活命飲又名真人活命飲 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研 防風 白芷 貝母 赤芍藥 當歸尾 明沒藥研

皂角刺炒 天花粉 甘草節 穿山甲略各一錢 陳皮 金銀花各三錢 在背俞皂角刺

為君 在腹募白芷為君 在胸次加瓜蒌仁二錢 在四肢金銀花為君 如疔瘡加紫河車草根三錢如無亦可

右為粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嚼瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三

大鍾去渣作三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血

忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定回生神功浩大不可臆度

潔古保安湯 治瘡托裏或已成者速潰

瓜蒌新者一錢去皮火燉沒藥通明者一錢研 金銀花 甘草 生薑各半兩 右為細末用好無灰酒三升于銀

石器內煎至一升分作三蓋三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此 葦航紀談云戶

部尚書沈說為人仁厚一兵卒患瘡疽乞假親為合藥治之時早蝗當致齋園上猶丁盜料理藥內用酒恐市酤

不中用自取酒入藥服之即愈其法用瓜蒌子一枚乳香沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九蓋臨服嚼沒藥一塊

飲此酒極妙

秘方托裏散 治一應瘡毒始終常服不致內陷



瓜萋大者一

當歸酒拌

黃耆鹽水拌炒

甘草

白芍藥各一兩半

皂角刺炒

金銀花

天花粉

熟地黄用生者酒拌入磁器蒸半日四味各一兩

用無灰酒五茶鐘和藥五兩入磁器內厚紙封口再用油紙重

封置湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香取出分服直至瘡愈〔薛〕按此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷氣血不問陰陽腫潰屢用屢效誠仙方也常治發背腦疽勢盛者更隔蒜灸若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此其功甚捷若大毒已退不作膿或不潰者用托裏潰而不斂及膿清用峻補

祕方拔毒散 治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香

沒藥

穿山甲炮

當歸

木鱉子各一錢

瓜萋實八錢

甘草五分

忍冬藤二錢

牙皂角炒七分

大黃生熟各一錢半

連翹一錢

貝母七分

作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾

食前服 按此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若有膿或已潰者大黃不可用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實喜冷者火邪尚在又所宜用

歸耆湯 治癰疽無頭但腫痛

黃耆

當歸

瓜萋

甘草

皂角刺

金銀花各一錢

右吹咀水一鍾

半煎八分去滓入乳香酒再煎服

又方 貝母 穿山甲 天花粉 右為末每服三錢水二鍾煎半鍾一日四服其毒自在大小便下矣可與前方

合為一貼

破毒無比散 豬牙皂角去皮如法醋炙焦黃為末每服半錢加穿山甲全者看患人證在何處就取此一處甲用

以蛤粉炒為末一錢與皂角末相和溫酒調下症在上食後服在下食前服神效

消毒散 治一切無名腫毒瘡癤

六斗雀

外科

三

貝母一味去心切細一半生晒一半微炒和勻為末病在上食後服病在下食前服酒調一二錢

一男子肩患毒腫硬作痛惡症迭見用白礬末三錢糊丸以葱頭七莖煎湯調下腫痛悉退再服諸症亦退更以仙方活命飲二劑出水而消此秘方名千金化毒湯本礬末葱湯調服因末難服故易為丸一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效常治芻蕘之人用此即退不用托裏藥亦愈蓋止熱毒為患血氣不虧故也若金石毒藥發疽者尤效蓋礬又能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蠱犬所傷溶化執塗患處更以熱酒調末服皆效

榮衛返魂湯又名何首烏散

何首烏不犯鐵

當歸

木通去皮

赤芍藥炒

白芷不見火

茴香炒

土烏藥炒

陳枳殼凝炒若惡心如薑汁炒

甘草 右方止此丸味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加

獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服 此一藥流注癰疽發背傷折非此不能效至於救壞病活死肌弭患於未萌之前拔根於既愈之後中間君臣佐使如四時五行更相迭旺真神仙妙劑隨證加減其效無窮何則此藥大能順氣勻血故也夫氣陽也血陰也陽動則陰隨氣運則血行陽滯則陰凝氣弱則血死血死則肌死肌死則病未有不死者矣必調其陽和其陰然後氣血勻二者不可偏廢只調陽不和陰則氣耗而血凝肌必不活如五香連翹之類是已只和陰不調陽則血旺而氣弱矣疾必再作如內補十宣之類是然二藥亦須參用不可執一為妙此藥扶植肯本不傷元氣蕩滌邪穢自然順通不生變證真仙劑也用法列左 一發胃既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾既受傷飲食必減顏色痿痺肌肉不生血為脉絡血

一受冰則氣不旺肌肉糜爛故必理脾健脾肉自生宜於此方中去木通少用當歸倍加厚朴陳皮或則用家傳

對金飲子又盛則加白豆蔻之類為妙 一凡治流注可加獨活流注者氣血凝滯故氣流而滯則血注而凝加此藥者可以動蕩一身血脉血脉既動豈復有流注乎 一流注起於傷寒傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡滯於所滯而後為流注也如病尚有潮熱則裏有寒邪未盡散此方中可加升麻蘇葉如服此而熱不退可加乾薑如有頭疼加川芎並用薑水煎如無潮熱可用水酒相半煎酒大能行血生氣故也氣生血行病愈可必然流注須表者何也所以推其因究其源不忘病之根本也寒邪既盡表之太過則為冷流注尤為難治故宜略表為妙表後第二節宜服溫平之藥乃十宣內補是已如不效第三節宜加附子或服四柱散數服即止溫藥亦不可多用恐增痛苦反成膿血不乾第四節仍歸本方收效然表未盡則餘毒附骨而為骨癰夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注之敗證也流注非傷寒之罪乃醫者表之未盡也骨癰非流注之過又庸醫涼藥之過也庸醫無識心盲志聾妄稱明見雖知為骨癰而治之無法又復投之涼藥烈之毒刀則毒氣滯涼藥觸鐵器則愈附骨而不能愈矣不然則人之骨何以有癰骨而成癰非藥所治故名附骨疽又名白虎飛尸留連周期展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈其不愈者至於終身有之此皆失於初也其骨腐者多為副骨猶或可痊正骨腐則終身廢疾故膿白而清者碎骨初脫肉深難取膿黃而濃者碎骨將出肉淺可取宜以利刀取之詳在後章此不過治骨癰之概耳 又有病經數月傷於刀刃羸弱拳彎咳嗽膿血壞肉陰爛者此皆冷極陽弱陰盛不可以唾紅為熱宜以好附子加減治之 又有毒自手脚頭面而起疼痛偏身上至頸項經絡所係去處如瘍癰貫珠者此為風濕流氣之證宜以加減小續命湯及獨活寄生湯與此方參錯用之 又有兩膝痛起以至偏身骨節皆痛婦人類血風男子類軟風此名風濕痺又名歷節宜以附子八物湯加減用之 又有癰腫有項腋兩乳傍兩胯軟肉處名為瘰癧癰此冷證無熱宜以內補十宣散與此方參用小兒不可輕用附子恐生驚癇切不可更犯鍼刀薄血無膿努肉難合宜以濕熱藥貼散內消倘犯鍼刀生努肉亦以此藥收功倘用藥微疼略有驚癇宜用全蝎觀音散加

減用之驚定藥如故事又有小兒亦患宿痰失道者癰腫見於頸項臂膊胸背等處是為冷極全在熱藥敷貼之功留口病須再作為佳治法見後 又有流注大如匏瓠覆碗見於胸背其證類發而甚峻用藥之後形勢一有

微動即非發矣宜以內補十宣與此方隨證通變用之可以內消大抵諸證皆原於冷故為痛者骨痛也骨者腎之餘腎虛則骨冷骨冷所以痛所謂骨疽皆起腎者亦以其根於此也故補腎必須大附子方能作效腎實則骨

有生氣疽不附骨矣凡用藥不可執一貴乎通變 凡癰疽初萌必氣血凝滯所成為日既久則血積於所滯而後盛作故病人氣血盛者此方中減當歸多則生血發於他所再結癰疽生生不絕斯乃秘傳醫者少知也

凡癰疽生痰有二證一胃寒生痰此方中加半真健脾化痰二熱鬱而成風痰此方中加桔梗以化咽膈之痰並用生薑和水酒煎 一凡腦發背發在上者此方中可去木通恐導虛下元為上盛下虛之病難於用藥老人虛弱者尤宜去之

一凡病人有瀉者不可使用此方宜先用止瀉藥白礬生用為末溶開黃蠟為丸米飲下三十九丸俟瀉止方用此藥蓋人身以血氣為主病癰之人氣血潮聚一處為膿若臟腑不固必元氣泄而血愈寒難愈此藥大能順氣故也大抵氣順則血行氣耗則血寒氣寒則血死血死則肌肉不生投之熱藥則肌肉無元氣不足以當之徒增苦投之

涼藥則無是理是方雖仙授要在用之得當不然則有刻舟之患矣至於流注又不可一舉論也若涼藥耗散元氣虛敗有用三建取效者其疾多緣於冷故也尤當審其脈辨其證的出於冷然後用之亦不可過過亦有害但

陽脉回腫處紅活骨有生氣寒氣不能相附為疽即歸功本方以取效此萬全妙法 一此藥丸散末皆可水酒湯使臨時裁度用之貴人加木香為衣病者有熱痰咳嗽富沉香蘇薑湯皆可下丸用蜜劑 一此方非但治

癰疽發背傷折至於男子婦人疝氣血氣皆可用屢獲效矣有一婦人患氣疾五年發時只是塊痛嘔逆水漿不下一發便欲死用此藥為丸木香湯下一服嘔止再服氣順疾遂愈 一凡傷折皆不脫此方但加減有差詳見

傷折類中如尋常折破傷損或傷心胞並皆治之在頭上則去木通枳殼加川芎陳皮常用加丁皮蘇葉能活血



加破故紙五靈脂能破宿血水煎熟用濃一盞酒侵入候再沸却入大黃末空心服之如通順藥只四服先服中入大黃後二服不必用只是催發便下如不通只積殼湯一向催如苦不通即不可治不可坐視人死而不知也補血十宣散之類 一凡傷折常用此方可去木通名何首烏散蓋首烏能扶血故也如刀刃傷有潮熱面腫

氣喘乃破傷風證可服索血散葛根湯數服薑蔥煎發散或敗毒散三四服外用數貼藥依法治之無不愈者矣

一經年腰痛加草薺元胡索以酒煎服 一脚氣加檳榔木瓜穿山甲水煎服之 一宿痰失道非惟人不識

自仙授以來惟余一派知之人身有痰潤滑一身猶魚之有涎然痰居胃中不動則無病動則百病生或喘或咳

或嘔或暈頭痛睛疾偏身拘急骨節瘡疥皆外來新益之痰乃血氣敗濁凝結而成也何則臟腑氣逆鬱結生痰

當汗不汗蓄積生痰飲食過傷津液不行聚而生痰其常道則自胃脘達肺脘而出其失道自胃脘而流散於肌

內皮毛之間脾主肌肉肺主皮毛故凡胸背頭項腋胯腰腿手足結聚腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微

紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如乳汁又有壞肉如破絮又或如瘰癧在皮肉之間如雞

卵浮浴於水中可移動輕活不硬破之亦無膿血鍼口努肉突出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱即皆其證急於

此方中加南星半夏等藥以治其內外用玉龍熱藥以拔其毒便成膿破為良其輕無膿者必自內消如熱極痰

壅則用控涎丹紫大戟甘遂白芥子等分為末米糊為丸如遍身腫硬塊大如盂孟生於喉項要處者尤為難治夫血氣和暢自無他

病氣行不順血化為痰痰復失道則血氣衰敗不能為膿但能為腫硬理必然也此證陽少陰多隨證用藥回陽

生氣補血控涎外則用後法作起一身氣血引散冷塊萬一腫不消不作痛不為熱體氣實無他證肉塊與好肉

無異此又一證也切不可輕用鍼刀自戕如草醫曾用鍼灸陰爛其肉或用毒藥點脫使人憎寒壯熱法當通順

其氣血於此方中加升麻以除其寒邪用斂口結痂之藥以安之使為疣贅而已萬一病自作臭穢糜爛不免動

刀則有妙劑可以代刀不可輕泄即白礬枯朴硝二味為末數之 一肚腸內癰宜服十宣散與此方相間用之並加忍冬藤此

藥最治內癱但當審其虛實或通或補補須用附子通則用大黃如不明虛實則此方亦自能通順十宣自能內補可無他變至於肺癱初覺飲食有礙胸膈微痛即是此證急須察脈審其虛實虛則用此方加附子相出入用之若稍再作即用十宣散內補之即自消散實則用此方加大黃略通之使毒氣下宣為妙蓋肺與大腸相表裏故也如內癱已成宜以海上方與此方加減參用之喘咳膿血者肺癱也大便有膿自臍出者肚癱也忍冬藤甘草節煮酒妙

龍虎文加散 治發背癰疽發腦發鬢發髻又治腦虛頭暈風濕之症

製藥法

南木香 剉碎用紙墊鍋焙乾研為細末

罌粟殼 去頂瓢筋剉焙乾為細末

甘草 用濕紙裹煨焙乾為細末

吳白芷 剉裏煨去麩焙乾為細末

川芎 濕紙裹煨焙乾為細末

右件藥末各另包收者瘡加減用之

加減法

若瘡勢紅腫熱大先服如神托裏散一貼臥蓋取微汗如紅暈大腫高瘡頭有似碎米大白膿點者可進文加散一貼用木香四分罌粟殼二分甘草六分白芷四分川芎半錢共為一貼用水七分生白酒三分共一盃用銀器煎八分如無銀器新瓷器亦好不用銅鐵舊器於炭火邊先滾五七滾用細絹水濕扭乾濾去渣食後服以乾鹽菜壓之渣敷瘡四圍用襪絹帕包之如惡心嘔吐即服護心散一貼止嘔次服前藥若胸腹膨滿或大小便閉澀可服當歸連翹散一貼行五七次用溫米粥湯補止如瘡已成潰膿不寒不熱止是爛開疼痛木香在甘草在川芎在  
半白芷四分罌粟殼二分水五分酒五分合煎八分服若紅暈白者好也仍紅其瘡不退若紫黑稍可如紅暈不退每日於晚進藥一貼喫文加散四五貼可服當歸連翹散一貼要行加大黃只有熱腹不脹不用大黃如瘡患要將好腐肉不脫可用鐵刺破皮令隨膿出將水紅花根煎湯洗之用生肌散搽上每日洗一次依此法無不效有蛆



者難治最忌酸辣醬麵發氣并生冷之物

護心散 治證見前爰加散

甘草

錢一

萊豆粉

炒二錢 硃砂研水飛過一錢

右為細末作一服白湯調下

當歸連翹散 治證同前

當歸

連翹

梔子仁

芍藥

金銀藤

略一

黃芩

五錢

用水二盞煎至七分空心溫服要行加大黃二錢待藥熟入大黃煎一二沸去渣服

如神托裏散

治發背等瘡初起又治疔瘡并一切腫毒及發散傷寒

蒼耳根

兔耳草根

金銀藤

用花亦可

五味子根

右咬咀每服五錢用生白酒

二盞煎至七分去渣服臥蓋取微汗渣再煎

生肌散

水紅花葉

右為細末先用水紅花根剉碎煎湯洗淨却用葉末撒瘡上每日洗一次撒一次

前鋒正將

治一切癰疽不問發肩發背作瘻疼痛其效如神

荆芥

薄荷

山蜈蚣

老公鬚

天花粉

菇美

菇片

敗荷心

川白芷

猪牙皂角

切炒

赤芍藥

以上各等分

淮烏

大者一個

紅內消

倍其數

甜加

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調服效若服經日未見效恐是涼藥澀血可加當歸羌

活如熟重雄黃酒調乳癰加萱草根研汁調其餘候只用酒下不飲麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

引兵先鋒 凡用內消先用此藥退潮止渴解熱以升麻葛根湯表散後服此

木通

瞿麥

荆芥

薄荷

白芷

天花粉

甘草



赤芍藥

麥門冬去心

生乾地黄

山梔子

車前子

連翹各等分

右剉每服二錢燈

心生地黃煎熱潮加淡竹葉煎溫服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活

加味十奇散

主內護治癰發已成未成服內消三五日不效或年四十以上氣血衰弱成者速潰未成者速散服

至瘡口合而止內能固濟去舊生新又名固墨元師

當歸酒浸

桂心不見火

人參

土芎

香白芷

防風去蘆

桔梗

厚朴去粗皮薑汁炒

甘草五文

乳香

沒藥研別

右件藥各等分研為末每服二錢酒調日三服病

愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

一方治癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極效

槐花一兩炒焦色

胡桃十个新鮮不油者燻火燻去殼

右二味入砂盆內研爛如泥熱酒調和渣溫服如能飲酒人多飲愈

效一醉後而癰腫散矣

蒜發散 治癰疽發背及一切癰毒等證如神

蒜發草其葉長如牛舌其氣如豬臭者

小薊根

五瓜龍脚五

生大蒜

右四物各等分細研用酒和勻濾去

渣服一碗得大汗通身而愈

又方 治諸般癰腫神效

新掘天門冬三味約五兩

右洗淨入砂盆內研爛以好酒盪起濾去渣頓服未效再服一二服必愈

敷貼溫藥戴院使云發散諸般毒多碾白芙蓉葉入草烏末少許蜜調傅重者加入南星末凡諸毒用敷貼藥欲散

搓入麝香欲潰搓入雄黃

冲和仙膏一名黃雲膏

冷熱不明者用之茶酒隨證治之



川紫荊皮

五兩炒 紅肉又名內消

獨活

三兩炒 不用篩

赤芍藥

二兩 炒

白芷

不見火 一兩

右五味並為細末用法詳見于後

夫癰疽流注雜病莫非氣血凝滯所成遇溫即生遇涼即死生則散死則凝此藥是溫平紫荊皮木之精能破氣

逐血消腫獨活土之精能止風動血引氣拔骨中毒去痺濕氣更能與木臘破石腫堅硬赤芍藥火之精專能生

血住痛去風木臘水之精能生血住痛消腫破風散血白芷金之精能去風生肌止痛養血生則不死血動則流

通肌生則不爛痛止則不燥作風去則血自散氣破則硬可消毒自消五者交攻病安有不愈乎 一凡病有三

證治有三法如病極熱則此方中可倍加紫荊皮木臘少用三品亦能消散之但功稍遲耳如病極冷則此方微

加赤芍藥獨活亦能活血而消散之功亦稍遲而不壞病 一如病熱勢大盛切不可用酒調但可用葱泡湯調

此藥熱敷上蔥亦能散氣故也血得熱則行故熱敷也如疾稍減又須用酒調酒能生血遇熱則血愈生酒又能

行血溫則血愈行矣 一瘡面有血泡成小瘡不可用木臘恐性粘起藥時 受痛用四味先敷後用木臘蓋在

上面覆過四圍以截助攻之血路凡敷藥皆須熱敷乾則又以元湯濕透之使藥性濕蒸而行病自退矣 一如

用正方四面黑暈不退瘡口皆無血色者是人曾用冷藥太過不可使用玉龍蓋肌未死也恐藥力緊涸痛苦宜

於此方加肉桂當歸以喚起死血自然黑暈退見功效血回即除加藥只以正方取效 一如用正方痛不住可

取酒化乳香沒藥於火上使溶然後將此酒調藥熱塗痛止 一流注筋不伸者可於此方加乳香敷之其性能

伸筋故也 一如瘡口有赤肉突出者其證有三一是著水二著風三是刀破後刀口翻突宜以此方加少南星

以去風用薑汁酒調其不消者必是膚醫以手按出膿核太重又以涼藥涼了皮以致如此若投以熱藥則愈糜

爛此又有口訣馬宜用白礬枯朴硝二味為末敷之次用硫黃末投之外服藥衛加對金銀外貼中和 一若病勢熱盛者不可便用涼藥熱盛則氣血壅

會必多大涼則血退不徹返凝於涼故宜溫冷相半用之血得溫則動挾涼則散可用此方加對停洪寶丹用葱

...

湯調塗貼之 一此方乃發背流注之第一藥也學者當通變妙用表裏相應則病在掌握之中但發背盛者死  
 生所係惟此藥功最穩重終始可治決無變壞若發之輕者草醫亦能取效然有變証流弊之患此無他發於陰  
 則非草醫之可治矣豈如是劑兼陰陽而並治奪造化之神功哉至如流注一疾雖不能死人而十有九為廢疾  
 廢疾流連死亦隨之縱有醫之能愈者亦必半年周歲之後方見其效此乃百中之一然終為殘弱之身矣惟吾  
 此派仙方藥奇效速萬不失一端有起死回生之效非言所能盡述夫流注乃傷寒餘毒故有表未盡者餘毒客  
 於經絡氣血不勻則為熱流注所謂醫之能愈者熱也熱病少見有表散太過氣血衰者餘毒流入膝理膝理或  
 疎或密為冷流注所謂醫之難醫者冷也冷病常多故傷寒表未盡者非特為熱證而已其餘毒亦多為冷證皆  
 原於腎虛故作骨疽冷則氣愈滯而血愈積故但能為腫而不能為膿若醫者投之以涼劑則所謂冷其所冷而  
 陰死於陰惟有壞爛腐肉毒氣著骨而為骨癰流為廢疾故曰骨癰者流注之敗證也流者動也注者住也氣流  
 而滯則血住而凝氣為陽血為陰陽動則陰隨氣運則血行吾所以能移流注於他處而散之者取其能動故也  
 動則可移陽既移而動矣陰豈能獨住而不隨之者乎是故以獨活引之者以其性能動盪氣血也引之一動則  
 陰陽調和不能為膿而散之於所移之處勢必然矣 一流注在背膂腰腿緊要處當用此方厚敷患處却單用  
 獨活一味末之酒調熱塗一路其盡處以玉龍誘之此移法也使血氣趨於他所聚於無緊要處作膿又或消之  
 若已成膿則引不下急將此藥拔之出毒氣免作骨疽如庸醫用了涼藥犯了鍼刀使成骨癰非藥所愈又待其  
 碎骨出盡方愈若怯用鍼刀取之則用玉龍治法在後若止骨出無治法副骨出可安 一方用白芷紫荊皮酒  
 調以內消初生癰疽各一勝膏又方只用赤芍藥木臘紫荊皮作箍藥名三勝膏 一方治大人小兒偶合刀在  
 口割斷舌頭已垂落而未斷用雞白輭皮袋了舌頭用破血丹蜜調塗舌根斷血却以蜜調和蠟稀稠得所調此  
 正方敷在雞子皮上取其輭薄能透藥性故也如在口落散動動添敷三日舌接住方可去雞子白皮只用蜜蠟

調藥勤動數上七日全安學者觀此則知通變活法妙用不在師傳之功如無速效以金瘡藥參錯治之尤妙  
一治癰腫未成膿不可使用洪寶丹敷貼頭上恐為冷藥一水血凝不消不能成膿反能爛肉只用此方敷貼如  
不消欲其成膿却以玉龍貼癰頭以燥之次用此正方在玉龍之下四圍用洪寶丹搗住以截新潮之血又若病  
未甚冰於涼藥者玉龍下不必用此方上以洪寶丹圍之 一如救壞病未見可用玉龍只用此方自然穩當免  
病人苦 一發背初生未成單用紫荆皮末酒調搗住自然撮細不開服藥止用柞木飲子乃救貧良劑也 一  
此方加南星草烏二味三分之二熱酒調敷諸癰可以潰膿不痛若單玉龍要洪寶丹搗住實此法妙 一獾犬  
咬人單用紫荆皮沙塘塗留口金丹退腫嚼杏仁置口中去毒 一法加南星草烏二味與此方各一半熱酒調  
敷可治久損至妙 一小兒輕癰用此方加軍薑酒調敷若初發即用此方酒調敷成膿而止若初發時用紫荆  
皮木蠟酒調敷可以必消切不用洪寶丹 一癩疽心火熱毒也見於五心痛不可忍其狀如泡瘡而血赤外形  
雖小內有熱毒在心膈者難治在手足心者可療然治之須早稍遲或在心膈則腐肉粉碎神仙莫醫凡有此疾  
在手心則用洪寶於手心環圍敷之以截其血却用中和於手心留口收功在足心則用洪寶敷在脚脛交骨四  
圍一二寸長以冲和收功如前

神功散 專治發背癰疽一切疔毒并癰癢等瘡已未成患者效驗不可備述

川烏頭炮法 皮去 川黃柏粗皮 右二味為細末後各等分用小兒或大人唾津調成膏如唾少漱口水亦可發

背癰疽等瘡纔起者敷於患處留頭候藥乾用淘米水常潤濕每日換藥敷一次如瘡已成重患將潰爛者先將

槐枝艾葉煎湯燉溫將瘡洗淨用絹帛展去膿血以香油潤患處用綿紙仍照患處剪成圓錢留頭貼上後用藥

塗於紙如乾依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不可手擠如敷藥後病人覺瘡住疼減熱即愈如生肌

則腐肉自落腐而不落者剪割亦可最不宜用鍼發背不宜貼膏藥凡醫瘡屏去別醫止飲別藥方可治忌氣怒

房事勞役并孝服體氣飲酒之人飲食忌酒并羊雞肉瓜茄薑辣之物若因氣怒反復發腫者依前治之如治對口并腦疽不必洗去舊藥逐次添藥恐動瘡口惹風也

圍藥 南星 草烏頭 黃柏 白芨略二 五倍子砂一 右為細末調如糊隨血圍匝如牆壁可移險處於不

險處如神

敷藥 白欬 白芷 天南星 白芨 貝母各等 右為末水調傳外用圍藥束定內用傅藥提起制之有理

將軍鐵箍膏 治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓走疔毒氣

鹽霜白梅

南星

大黃

蒼耳根略一

白芨

白欬

防風

川烏頭各半

草烏頭

雄黃略三

右為細末先以蒼耳根霜搗爛和餘藥調成膏如乾入醋調得

所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以鷄羽蘸水掃之日換二三次大妙

又方 治一切癰疽腫毒

草烏

貝母

天花粉

南星

芙蓉葉各等分

右用醋調搽四圍中留頭出

毒如乾仍用醋潤之按此方藥性溫和常用不問陰陽腫潰並效

正鐵箍散

貝母去心

白芷

蒼耳草灰醋拌晒乾

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散

芙蓉

豬卷皮

木鱉子各四

白芷

黃柏

寒水石

赤豆

白欬

貝母各二

大黃

紫荆皮

白芨

真地青

羌活各一

防風半兩

右為細末涼水調圍癰四畔如肉脆去白芨白欬加生地黃榆用芭蕉油調傅熱甚者用三消散



水黃散 圍腫毒

犀角屑

大黃

白芨

草烏皮尖

白斂

麝香

朴硝各等

右為細末蜜醋調薄攤油紙上稍乾揭下再添潤濕貼之即消

外用潰毒藥 治諸腫毒堅硬不消

升麻

葛根

鼠黏子

地骨皮

金銀花

黃花地丁

甘草各等分

右為麤末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四畔熱用冷則再煖

圍腫方 草烏 白芨 白斂 黃柏 朴硝各等 右為末用蜜醋調圍腫外即便收起

神白膏 貼五發未破

南星

大黃

草烏

白斂各半

蚌粉

大柏皮各一

小赤豆一兩

加乳香沒藥尤妙 右為末取芭蕉頭研取油調角四畔

雄黃散 治癰疽發背紫暈疼痛不止

粟米小粉 炒三兩 草烏頭

南星

絡石

百合各一

白芨二兩

乳香

沒藥 雄黃 黃丹各半 右為極細末溫水調敷之

治無名腫毒或背疽 治法腫圍定名鐵井欄

芙蓉葉 重陽前 蒼耳 端午前收 研末 燒灰存性 右同研細以蜜水調敷之

烏龍膏 一名烏 治一切腫毒收赤暈

木鱉子 去殼 半夏 各二兩 小粉 四兩 草烏頭 半兩

右於鐵鉢內慢火炒令轉焦為細末出火毒再

研以水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣或用醋調亦得



宣毒散 初發或久後敷貼消腫收赤暈圍聚

露蜂房 三兩 炒焦 南星

赤小豆 各一兩

小米 一合

生草烏 二錢

生白礬 半錢

右為細末用酒

醋調塗四畔乾即再上

拔毒散 治癰疽腫毒結通用能散能潰

南星 上等大白者一兩 草烏頭

白芷 各半兩

木鱉子仁 一個 研

右為細末分兩次法醋入蜜調敷紗貼之

蠶毒散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

大南星 一兩 貝母 乾錢

白芷

赤小豆

直僵蠶 炒各半兩

雄黃 二錢

右為細末用醋調

敷後用蜜水調敷

退毒散 癰腫通用

木鱉子 去油 大南星

半夏 生

赤小豆

白芷

草烏 連皮大者等分

右為細末硬則

法醋調敷熱嫩則蜜水調敷

神功妙貼散 塗敷癰疽暈內使膿血化為水出收暈斂毒

大南星 圓白者 蓖麻子仁 各四錢 五倍子 淡紅者 半夏 生

白芨 各三錢 沒藥

乳香 各二錢

花蕊石散 二貼

右為細末夾和井水入蜜調敷瘡色黯晦薑

汁調敷從暈邊抹收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大全用紗攤藥以苗茶籠內白竹葉尾剪兩片如瘡勢

先貼藥上然後貼瘡久年蓬仰上竹葉亦得竹葉出水藉藥以行之凡敷藥須是細末則不痛

特異萬靈散 治癰疽發背腫毒等患神妙

輒石膏 燒通紅罈覆在泥地上一宿

大白南星

赤小豆

草烏 連皮大者半兩

乳香 二錢 別研

右為細末蜜水調



成膏從外抹收入留最高處如錢勿敷如瘡已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒敗膿不致潰爛屢效

治冷癰青硬無頭陰毒并瘡疥毒瘡皆效

生鐵銹

輕粉各二錢

白松香一兩半

麝香少許

先將鐵銹松香為細末入鉢內加麻油一兩慢火

煎數沸離火待熱少退入輕粉麝香未攪勻即為膏矣收貯重瘡大小攤貼患處

斂瘡內消方

黃明膠一兩水半升溶消了入黃丹一兩再煮三五沸又放溫冷以雞毛掃在瘡口上如未成即塗

腫處自消

凡癰不問已潰者未潰者以膠一片水浸令軟隨腫大小貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發之膿皆出

盡未有膿者腫當自消矣

治發背秘法李北海云此方神授極奇秘以甘草三天兩生搗別篩末大麥麩九兩於一盤中和攪令勻取上好

酥少許別捻入藥令勻百沸水搜和如餅劑方圓大于瘡一分熱傅腫上以油紙隔令通風冷則換之已成者膿

水自出未成者腫便內消

膈皮取膿法

治諸般腫毒

驢蹄

細切一兩

蕎麥麵一兩

白鹽半兩

草烏四錢

去皮

右為末水調作餅子慢火炙黃出火毒研米醋調

成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黃

細研

黃柏

檳榔

川大黃

麒麟竭各七錢

麝香研一錢

黃連一兩

白芷

木香

芫荽

桂心各半兩

當歸炒三錢

右為細末用臘豬脂調令勻塗於

絹上貼腫處候濃潰後用膏藥搜膿生肌



萬應鉞頭丸

生濟

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

麝香 二錢

血竭 如蠟者用散者不用非真也

輕粉

蟾酥 舌試辣者

硃砂 各三錢

片腦 一錢

蜈蚣 一對 全用

右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用鉞頭挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡肉上

用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈

如兩腋見無頭瘡即是暗疔即將兩手虎口內白土紋用鉞挑破

如前法用藥封蓋忌雞鵝酒濕麵一切發熱之物

鉞頭散 命

治瘡瘍焮腫木硬

右以乳香蟾酥各一錢同研勻細以兒乳汁和如泥入磁石盒收之乾不妨每用

以唾調撥少許點於腫處上以膏藥貼之毒氣自消縱然有瘡亦輕

萬槌青雲膏

治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿拔毒追膿腹中痞塊貼塊上

瘡疾貼大椎及身柱其效如神

白松香 一兩 木屑

去草麻子 三百粒

杏仁 三百枚

去皮

銅青 三兩

乳香

沒藥 各一兩

輕粉 二錢

右共作一處用鐵槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼 湯中既不

見

〔敷貼熱藥〕鬼遺方云凡癰疽外冷內疼者由陰氣外逼用熱物熨之大熱亦不覺者須用熱物熨令透隨手便用

緊急潰膿藥使膿外出盡腫平即用生肉煖瘡和正氣藥令進飲食不倦

治癰疽發背初腫時方

風化石灰 二兩

細辛 一兩

右為粗末用熱醋傳患處乾再傳三下其種即消

四虎散

治發背初生筋脉緊急不舒

附子 一兩 生去皮

天南星

半夏

狼毒 各半兩

一方無附子有草烏各等分

右四味為末熱

酒調成膏攤上腫處以熟絹緊定覺患處如火燒不妨

回陽玉龍膏

草烏頭三兩

南星一兩

軍薑二兩

白芷一兩

赤芍藥一兩

肉桂半兩

此方治陰發

冷流注鼓椎風久損痛冷痺風濕諸脚氣冷腫無紅赤者冷腫不痛者足頑麻痺婦人冷血風諸陰證之第一藥也

也用熱酒調塗用法詳具于後 夫雜病雖見於皮膚手足之間而因必本於五臟六腑蓋臟腑之血脉經絡一身晝夜運行周而復始一臟受病必見於本臟脉息所經之處即陰陽分手足之所屬也為病有冷有熱熱者易治冷者難療夫冷必由臟肺元陽虛弱然後風邪得以乘間而入血氣不勻遂自經絡而客於皮膚之間脉息不能周流遂澀於所滯愈冷則愈積而不散復加庸醫用涼劑而内外交攻則其為病鮮有不危者矣學者當觀其

外之為證而察其內之所屬表裏相應萬無一失此藥有軍薑肉桂足以熱血生血然既生既熱而不能散又反

為害故有草烏南星足以破惡氣驅風毒活死肌除骨痛消結塊喚陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦生

肌肉加以酒行藥性散氣血雖十分冷證未有不愈端如發寒灰之燄回枯木之春大抵病冷則肌肉陰爛不知痛痒其有痛者又多附骨之痛不除則寒根透髓非尋常之藥所能及惟此藥大能逐去陰毒迎回陽氣住骨中

痛且止肌肉皮膚之病從可知矣當斟酌用之不可太過則為全美 一發肯發於陰又為冷藥所誤又或發於陽而誤於藥冷陽變為陰滿背黑爛四圍好肉上用洪寶丹把住中間以此藥敷之一夜陽氣回黑者皆紅察其

紅活即住此藥却以冲和仙膏收功如不效欲作膿又以南星草烏加於冲和用之如陽已回黑已紅惟中間一點黑爛不能紅者蓋血已死可以朴硝明礬又云白丁香硫砂乳香用唾調勻於黑紅交處作一團上用冲和蓋

之至明早起藥自然去黑肉如割却以藥洗之投以生肉合口藥收功 一流注冷證多附骨內硬不消骨寒而痛筋縮不伸若輕用刀針並無膿血若止有乳汁清流或有瘀血宜用此藥敷之若稍緩止以軍薑白芷肉桂草烏等分熱酒調敷骨寒除而痛止則氣溫和而筋自伸肉硬自消矣然治流注不可無木蠟以其能破積滯之氣

消堅硬之腫最妙又不可多多則能解藥性蓋此證主於溫藥故也 一鼓椎風起於中濕或傷寒餘毒又或起於流注之壞證或起於風濕虛痺此證有三一是兩膝相搯行步振掉膝脛骨微腫二是膝脛脛骨交接處大如椎腿股肉消皮縮裏骨三是上腿腫大下股冷消蓋足膝屬肝肝經有風寒濕氣則血脉不流而作此遂為膝寒所澀凝流不動下股之血脉有去無返是以愈瘦愈冷而筋愈縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熱而肉愈瘦其原若起於流注則肉凝者為爛爛則冷毒腐骨腐骨一出神仙無術未破則肌肉尚未死急以此藥熱酒調敷膝脛骨上腿處以住骨痛回陽氣又以沖和塗下腿冷處引其血氣使流動而下通貫血脉又以此方敷脛骨交處以接所引之血脉以散所積之陰氣內用追風丸倍加乳香以伸筋如法服之無不愈者如人欲出方可用五積散加薑桂芷歸又加大川芎半膝積柳木瓜或茶或酒調之 一男子婦人久患冷痺血風手足頑麻或不能舉動可用綿子夾袋此藥在中心却作長片纏在痛處用絹袋繫定此藥能除骨痛附在肉上覺皮膚如蟻緣是其功也如痺可加丁皮吳茱萸沒藥大川烏等分然後全在追風丸表裏交攻去病如神 一風脚痛不可忍內用追風丸外用此方加生麵薑汁調敷數欲得立止可依法加乳香及藥化開酒調為妙 一久損入骨者蓋因墜壓跌撲傷折不曾通血以至死血在所患之處久則如雞肺之附肋輕者苔鮮之量石年少之時血氣溫和尤且不覺年老血衰遇風寒兩濕其病即發宜此方熱酒調敷內則用搜損尋痛丸表裏交攻為妙雖然血氣虛弱之人病在胸肋腰背之間者謂之脫垢不除變為血結勞不論老少遠年近歲大而偏身小而一拳半肘醫之則此一此等乃根蒂之病則非一劑可愈磨以歲月方可安未成勞者易已成勞者難 一法則用南星薑烏加少肉桂能去黑爛潰膿謂之小玉龍此法大致 一治石癰用此方熱酒調敷外却用洪寶搗住四圍待成膿後破 一婦人乳癰多因小兒斷乳之後不能回化又有婦人乳多孩兒飲少積滯凝結又為經候不調逆行失道又有邪氣內鬱而後結成癰腫初發之時切不可用涼藥冰之蓋乳者血化所成不能漏泄遂結實腫核其性

清寒若為冷藥一冰凝結不散聚久而外血不能化乳者方作熱痛蒸逼乳核而成膿其苦異常必爛盡而後用  
故病乳癰者既愈則失其乳矣蓋乳性最寒而又滯以涼劑則陰爛宜也然涼藥亦未嘗不用於既破之後則  
佳如初發之時宜於此方中用南星薑汁酒兩停調勻熱敷即可內消欲急則又佐以草烏此藥味性烈能破惡  
塊逐寒執遇冷即消遇熱即潰如已成癰腫則又從沖和依常法用之或如此草烏南星二味亦可破後觀其原  
原於冷用沖和收功原於熱用洪寶生肌且須用乳沒住痛以減其苦至於喫藥只用瓜蒌散隨入虛實參以通  
順散十宣相間服之多口者為乳發乳房堅硬者為乳石正在乳嘴處腫者為吹乳在乳兜囊下為乳痛以肉懸  
垂而血易滿故也故為難治一囊一口為乳癰五十歲老人無治法外有老人乳節又為可治蓋在垂囊肉上為  
癰若近胸則為節矣 一宿痰失道癰腫無膿者可用此藥點頭病必旁出再作為佳不然則元陽虛耗此為敗  
證如元陽虛耗敗證者急用全體玉龍敷之拔出成膿服藥則通順散加桔梗半夏當歸肉桂等藥若病紅活熱  
驟則當歸沖和為佳切不可誤投涼劑此方但能拔毒作膿病回即止不可過若能參用陷脈神劑尤妙出外科  
精要 一肚癰一證十有九死蓋胃屬陰外寒裏熱凡氣血潮聚趨熱避寒故多為內癰不能外現間有微影欲  
出則又為冷藥所觸及服涼劑雖有神仙莫施其功醫者可不慎乎凡有此證初覺腰痛且以手按之痛若走閃  
移動則為氣塊若根不動外面微有紅腫則為內癰急以此方拔出毒氣作成外癰然後收功沖和內則通用順  
散加忍冬藤治法如前若癰自能外現者不必用此方只用沖和為妙不可輕用鍼刀如犯鐵器口不能合只用  
玉龍貼癰頭上四面以沖和圍之依法自破若膿流不快依法用洪寶三分薑汁七分茶調敷之膿出皆盡內用  
十宣平補生肌外則依然收功沖和此證陰多陽少損人最其將安之際倍服內補以生氣血庶幾易愈否則消  
而復脹口不合既安之後尤宜多服內補加附子否則氣弱難平證冷者未破之先尤宜先服附子方好既破之  
後切不可用急澀斂口之藥恐食毒不散服藥力到自然合口至於內癰已成不能拔出只用沖和外貼使在外

溫和成膿自臍腑而出不至肉爛死生所係全在服藥之功治法見前最忌毒食食毒即發反復難療又有孕婦  
病此者又與此異內用紫蘇飲安胎勿輕與他藥若臨月則兒與膿俱下若尚遠則膿自大腑中下若初萌尸服  
藥可消若癰在外面其證必熱惟可用沖和收功亦須審輕重用之恐有誤也

〔敷貼涼藥〕鬼遺方云凡癰疽外熱內疼者是有客邪內有積毒欲作膿透之候

洪寶丹 又名金丹 寸金 四黃散

天花粉 三兩 薑黃

白芷 各一兩

赤芍藥 一兩

右為末茶酒湯使隨證執塗諸般熱證癰腫全

瘡此藥一涼而已能化血為水又能使血瘀積又能涼肌生肉去死肌爛肉又能破血退腫又能滯氣為浮能止  
痛又能為痛閉膿又能出膿一反一復此方藥性無他過涼效少過熱效多故非十分陽證不可輕用恐或凝寒  
治療費力若夫金瘡出血非此不可乃第一藥餘外但可為前二藥之佐使爾當審之審之 大抵此三藥可合

力同功者可獨將專權者可分司列職者可合圍交攻者可借援求救者可勇力相持者可正兵先鋒奇兵取勝  
者可奇兵先鋒正兵取勝者神聖工巧端與兵法無異然兵隨印轉將逐令行故立功取勝存乎其人苟非明理  
通變之士何足言哉用法如後 一若病勢大熱可用熱茶調敷如證稍溫則用酒調若用以撮膿可用三分薑

汁七分茶調可也此藥最涼能使血退薑汁性熱能引血潮故血退則被引血潮被逐進退相持而後成膿作破  
逼膿盡流也 一凡瘡口破處肉硬不消者瘡口被風所襲也此方中加獨活以去風用熱酒調如又不消則風  
毒已深肌肉結實又加紫荊皮有必消之理矣 一此方莫善去金瘡及諸熱證赤腫斷諸血根不使焮赤若癰

疽不可輕用恐帖處不散恰毒入內在骨則成骨癰在喉項則毒氣聚喉在胸背則陰爛臍腑在腹肚則為內癰

殺人不救可不慎哉只以沖和玉龍依法詳證用之為妙 一年少血壯之人衰老血敗之士如有濺血無藥可

止血盡人亡若在手足可用茶調敷手足上下尺餘遠若在腦背腰腹則全體敷之把住血路方能止却用斷血



藥五倍末方見或神效軍中方拔口方得安愈 一治金瘡重者筋斷脉絕血盡人亡如要斷血須用繩及絹袋

縛住人手臂却以此方從手臂上用茶調敷住血路然後却用斷血藥拔口却不可使內補及四物等藥却又能

令人發嘔吐甚則口眼喎邪少焉發煩發熱成破傷風只可下對金飲加川芎白芷薑裏煎自安却徐徐補血如

或有破傷風證又須用破傷風藥即葛根湯之類後方見瘡口用軍中方加九肋蟹甲酥炙碾 一凡金瘡在頭面

上者血不止急用此方茶調團敷頸上截血瘡口邊亦用此敷軍中方拔口重者十日輕者三日效 一凡金

瘡著水肉番花者可用薤汁調此方敷瘡口兩旁以火微炙之或燒早稻稈烟熏之瘡口水出即愈如無水出即

是風襲可用南星茶調敷之即愈然後以軍中方拔口妙 一治婦人產後或經絕血行逆上心不能主或吐血

鼻衄舌衄可用此方以井花水調敷頸上生艾汁調亦妙其血立止然後服藥以絕原如舌衄必有血泡破之復

脹可用線於舌根頸縛住勿除於頸項上截血內用黃芩荊芥涼心之藥以收其原舌上用蜜調結口之藥以治

之泡破除線血不脹矣服涼心藥四物湯加荊芥薄荷硃砂 一此方用藥調塗敷毒惡隨乾隨痛赤腫不退當

用雞子清調敷諸熱毒難乾妙湯火瘡同 一打破傷損在胸膈上者藥通血不下可用菘豆水調此藥末吞之

即吐出而安又有從高墜下用通血藥不下數日病人幾死此必天時寒凍服大黃等藥水之血凝片不行可用

熱酒調軍薑末飲之片時血通人得更生蓋借熱性以活死血則前藥方能行矣

治發背初發時小後五七日赤腫高即覆藥令內毒散滅疫免牽引乳香膏

乳香一兩 青薄荷葉四兩 右研勻厚覆患處以青絹蓋之如乾以新汲水潤之常令濕其熱毒自然消

散如熱毒攻結可用氣毒攻結不可用

金黃散 貼癰毒令內消

白芷 白芨 白斂 右等分為細末用新汲水調敷

外科

治陽證腫毒并金瘡 大粉草剉細用竹一段刮去青兩頭留節開一小竅入草在內滿後却用油及寒敷從冬至

日放真缸內待立春先一日取起豎在有風無日陰處二十一日驗兩竅好却破竹取草為細末用水調敷

藥性論甘蔗根搗敷一切癰腫上乾即更敷無不瘥者 梅師治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速

消方搗芒根敷之數易效 諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點并花水少許若不稠不須用水以

紙攤如膏藥貼之立效 又方芙蓉葉搗爛覆立效晒乾為末水調敷亦妙 治法背蝟牛百箇活者置淨瓶內新

汲水一盞浸瓶中封閉自晚至曉其水如涎取水將真蛤粉不拘多少調之刷瘡上效 治背癰與癩之年烟壁王

黃柏等分為細末生薑汁捏成膏敷之夏月以茅香湯下一二錢

七寶散 治癰疽止痛拔毒

乾荷葉心當中如錢片环煇 右為末每用三匙水二盞慢火煎至一盞半放溫淋洗乾以木白膏敷之

木白膏 寒水石研飛用臘月豬脂調成膏隨瘡大小薄紙攤貼之

天花青露散 覆圍一切腫毒

白芨

白薇

白芷

白鮮皮

朴硝

青黛

黃柏

老龍骨略一

天花粉

青露略三

大黃四兩

右為細末醋蜜調勻如疽毒未成

則當頭卷退若已成四面圍之中留頭用替鍼膏貼之

消腫散 圍覆腫毒一切瘡癤並治

大黃

水仙子

山藥

芒根

青露

小赤豆

寒水石

水薑

香蛤粉

花蕊石

右將前藥搗和如乾加醋蜜調勻如疽毒未成則當頭卷退若已成

四面圍之留一頭用替鍼膏貼之

神護膏 圍卷一切腫毒

小赤豆

黃皮

白斂

白芷

天花粉

南星各等分

右為末陰用米醋

與蜜水同陽用商陸根亦用芭蕉油此是卮色婆黃金散加黃皮為主

水澄膏 祕方圍敷腫毒

鬱金

白斂

白芨

五倍子各一兩

乳香

雄黃各五錢

右為細末水調敷

如熱極者用臘水尤妙

五金膏一名葵花散

黃芩花七朵

川連二錢去鬚

山梔三個肥者

黃柏五錢

川鬱金三錢

右為末并華水調成膏敷此藥

性急宜速打之

清涼膏 治初患癰腫瘡癤熱焮痲痛消腫毒

大黃不拘多少

右為細末用漿水調攤貼之醋磨亦得

治諸瘡腫不散者 右取白藥根搗爛敷貼乾則易之無生者用末新水調塗之亦得

治諸瘡腫馬毒瘡 右以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡上治濕癬白禿以馬齒莧膏和灰塗之效治緊唇面腫搗汁

塗交用乾末水調塗治丹毒發背腫搗傳之不住者以藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傳之尤良治三十六種

風結瘡取馬齒莧一石水二石一釜煮之澄清以蠟三兩重煎之成膏塗瘡上并服之

清水膏 治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔焮腫抽熱毒散腫氣

桃根

川大黃

黃芩

萊豆粉

黃柏各一兩

赤小豆

右為細末用芸薹菜

取自然汁入蜜少許相和調藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可厚一錢許貼之乾即易

六斗雀籠

外科

三九



水調膏 治癰疽毒熱赤焮疼痛

川大黃

研生用末

杏仁

去皮

鹽花

各三分

右為細末研令勻以新汲水和調稀稠得所旋即塗腫上乾即易之

水澄膏氏

治風熱腫毒赤紅色攻焮疼痛不止

白芨

白欬各四錢

鬱金一對

大黃

黃柏

黃藥子

榆皮各七錢半

乳香

沒藥

雄黃各半兩

右各細末用新汲水一碗藥末不拘多少澄於水內藥定去水敷

於腫處上用白紙封之用雞翎掠此水濕潤

二黃膏 治一切腫毒

黃柏

大黃各等

右為末用醋調搽如乾以水潤之

揭毒散

大黃一兩半

白芨一兩

朴硝二兩

右為末用井水調搽如乾再搽

〔薛〕按此二方乃寒涼之藥若

瘡瘍焮腫作痛屬陽之證宜用之或微腫而不焮赤者恐不宜用蓋氣血喜溫而惡寒若冷氣入裏反為難治之

證矣

三消散 退極熱證赤腫焮開者

朴硝

焰硝

大黃

梔子炒黑

寒水石

南星各等分

右為細末生地黃

汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

四面楚歌

敷諸般疽發腫赤痛不可忍未成角散已成角破至瘡口合而止

荆芥和根剉碎

赤芍藥

大柏皮

土當歸

山大黃

土白芷

天南星

赤小豆

商陸根剉片

白芨

赤欬

白欬

草烏

寒水石煨或炒各等分



右為末生地黃汁調角四畔或苦蕒根研汁末漬則滿塗上或有关起處則留出瘡口

水師晶明 治諸發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去故肉生新肉洗後淨乾再用角貼搽藥一日一次

大柏皮

澤蘭

莽草

荆芥

赤芍藥

山大黃

土白芷

土當歸

獨活各等

右剉細散用水一斗入葱白大椒橘葉同煎熏洗如已爛入豬蹄下膝爪骨同煎

可免乾痛淨洗為度

點藥癰疽有小白頭者初起即以膏子點之毒輕者自消毒重者出水甚至流黑汁而愈最甚者即未散亦夫殺其毒矣

硃砂膏

治癰疽腫毒并治瘰癧點落脫痣等

硃砂一錢

石礦灰一兩炒

白丁香三錢炒

黃丹半斤

生用 碱水一斤淋 前四味研為極細末次將碱水煎

作一碗成膏待冷以前末入膏子和勻藏磁器中一應毒物以此膏點之白丁香即麻雀兒屎用堅火者不用顛

類者

六灰膏

治發背疔瘡癰子腫毒癰瘡瘡癤子脫于其功用與硃砂膏同也

灰覓

桑木

棗木

蕎麥科

茄科各燒

石礦灰研細

石件多少不妨

和勻湯泡水淋淋下之水煎成膏如糊裝磁器中一應毒物以膏點之若點癰瘡瘡瘡待爛去少許再點之再爛

去如是漸漸點去

援生膏

治諸般惡瘡及瘰癧鼠瘡纒起者點破即愈

血竭一錢

蟾酥

輕粉各三

麝香五分

雄黃五錢

乳香


沒藥各一

以上藥俱為極細末 右用蕎麥稽皮或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗用粟柴或桑柴文武火煎作三碗取

六斗

外科

日



一碗收留將二碗盛於好磁器內候溫將藥末入灰湯內用鐵瓢或桑柳枝右攪又用好細石灰一升入藥灰湯攪勻取出候冷過宿或於小白磁罐內凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留灰湯和用

灸法 癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼其中心頭小艾炷灸之五壯而上若形狀稍大以黃得紙蘸酒全貼認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯止又法屈指從四圍尋按過痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之更於別處灸若或大腫即搗蒜為餅焙乾蘸法醋灸熱更換頻置或以熨斗火於蒜餅上熨之更換熱餅頻熨如覺患處走散即以絲帛覆蓋勿令氣泄候少間敷藥凡癰疽展大如龜之形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無走散又攻入裏也或辨認不明以

白芷 三分

漢椒

桑白皮 各一

連鬚葱白 十片

右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋

自現可以辨驗頭尾

神仙隔蒜灸法 治一切癰疽腫毒前論言之詳矣凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至痛其毒隨火而散此拔引鬱毒從治之法也信有回生之功其法用大蒜頭切三分厚安瘡頭上用艾炷於蒜上灸之五炷換蒜再灸未成即消已成殺其大勢瘡患大以蒜杵爛攤患處將艾鋪蒜上灸之蒜敗再換瘡色紫或白而不起發不作膿不大痛不問日期最宜多灸


神效葱熨法 治流注結核骨癰鶴膝等症腫硬或先已隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行滯滯其功

甚大又為跌撲傷損止痛散血消腫之良法用葱白頭搗爛炒熱頻熨患處冷再換

神效桑枝灸 治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃火著吹熄焰用火灸患處片時日三五次以助腫

潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡瘰癧流注腫瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法未潰則解熱毒  
止痠痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌骨其陽症腫痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消日久者  
用之雖潰亦淺且無苦處惜患者不知有此治者亦不肯用此也

砭法 治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線  
縛定兩手指輕撮動稍令磁芒正對患處懸寸許再用筋一根頻擊動頭令毒血遇刺皆出毒入腹臍脹者難治



# 外科

