


聖濟總錄

百廿八

庫文閣内	
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (128)
函號	300 212



大學東
校典
局印

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八
癰疽門


石癰

附骨癰

癰內虛

久癰

乳癰



總錄一百二十八

大醫重刊聖初醫藥卷一百二十八

癰疽論
久癰
癰疽論

癰疽統論

論曰周官瘍醫與疾醫分職而異治凡有瘍者受其藥
焉蓋非專門之學不足以深究博識故也人之氣血與
天地同流經絡常數與晝夜同度一或壅而不通沮而
不行則血老不作汗肉陳不脫垢烝氣不達癰疽內熱
甚於焚溺之患治之不可緩是以喜怒憂樂之不時飲
食居處之不節芳草石藥之發動內使陰陽不平而蘊
結外使榮衛凝澀而腐化輕者起於六府浮達而為癰
外潰膚肉經所謂榮衛稽留於經脉之中血澀不行衛
氣壅遏不通熱盛則肉腐為膿然不陷肌膚於骨髓骨



髓不爲焦枯五藏不爲傷損其皮薄以澤是也重者發於五藏蘊蓄而爲疽內消骨髓經所謂熱毒熾盛下陷肌膚骨髓焦枯五藏涸竭當其病下良肉無餘其皮夭以堅如牛領然是也夫瘡腫之患莫大於癰疽明乎二者則凡腫毒丹癰可以類推矣故證有淺深治有輕重若瘡發之初湯液疏其內鍼石疏其外內外之治不同也五藏內虛則平補內實則駛利補寫之法不同也瘡發於虛處則難差發於實處則易愈則其生有虛實之辨富貴體逸危殆者多貧賤形苦困篤者少則其形有苦樂之辨淺瘡欲在厚處攻之易平深瘡欲在薄處達

之易及則肌肉皮膚有厚薄之辨脉見洪滑麤散其病難治脉見微澀遲緩其病易治則脉之與病有應否之辨凡癰之類其氣浮達宜灸熇而不宜鍼烙凡疽之類其氣深沉宜鍼烙而不宜灸熇此灸熇鍼烙之異也淋射熇貼以消腫毒膏潤溫養以生肌肉此先後終始之序也昔人論癰疽病者惑於人神所在不可妄行鍼刺見血不知神之與形同爲休戚體旣不平神烏能定內經謂癰疽不得頃時回恐內爛筋骨穿通藏府豈有人神之忌耶

療疾所向吉凶方

三月七月十一月不得向西方治病

四月八月十二月不向南方治病

正月五月九月不向東方治病

二月六月十月不向北方治病

凡治病將患人行年本命筭與生氣天德福德合者往之必差仍須與生氣人看待患者吉占病色候上面法凡患人目中赤脉從上下貫瞳子者一脉一年死二脉二年死若脉下者藥之必差又曰患人面忽有赤色之多貫上下如脂有赤色從額上下至鼻又黑色出額上大如指及連鼻上至肩又有赤色垂者並為死候不可

藥其平世耳垂下車尖尖白中為壽短一穴當執下

論癰疽所生忌穴

背面九處不可患瘡

第一入髮際為玉枕亦為舌本

第二項頸節

第三為崇骨

第四大椎為五藏

第五脊骨兩邊肺俞穴

第六夾脊骨兩邊肝俞及脾俞

第七脊骨兩邊腎俞二穴

第八後心鳩穴

第九鳩尾骨穴

正面五處不可患瘡

第一喉骨為垂膺

第二當胸前為神舍

第三為心鳩尾

第四當兩乳穴

第五臍下二寸為腸屈之間

側面三處不可患瘡

耳下近耳後牙車尖中央陷中為喉脉一穴當膊下一

穴為肩骨

承山上三寸一穴為膈腸

辨癰疽證候美惡法

夫癰疽外發其理易明至於內癰內疽隱而不見目既
不接治之至難然五藏六府有俞募雖結固於中而自
形於外外察其部內審其源定藥投方若拔芒刺然則
癰疽之發有五善七惡之證不可不察也煩躁時嗽腹
痛渴甚或泄痢無度或小便如淋一惡也膿血大洩腫
焮尤盛膿色敗臭痛不可近二惡也喘麤短氣恍惚嗜
睡三惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者

四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色脫唇鼻青赤面目四肢浮腫七惡也動息自寧食飲知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣和平五善也然病有證合七惡皮急緊如善者病有證合五善皮緩虛如惡者非淺識之所知若五善併至則善無以加也若七惡併至則惡為劇矣今載證候并諸俞募以申明之凡五藏六府募中府隱隱而痛者肺疽也上肉微起者肺癰也中府在雲門下壹寸陸分乳肋間動脈應手陷是巨闕隱隱而痛者心疽也心上肉微起者心癰也

巨闕壹寸是在鳩尾下壹寸是期門隱隱而痛者肝疽也上肉微起者

肝癰也期門壹寸在第九肋傍壹寸半直上兩乳章門隱隱而痛者脾疽

也上肉微起者脾癰也章門貳穴在季肋端壹名長平壹名脅廓京門隱隱

而痛者腎疽也上肉微起者腎癰也京門貳穴在期門下伍分是中

管隱隱而痛者胃疽也上肉微起者胃癰也中管壹穴壹名太倉

在上管下壹寸天樞隱隱而痛者大腸疽也上肉微起者大

腸癰也天樞貳穴在臍兩傍各貳寸陷中是丹田隱隱而痛者三焦疽

也上肉微起者三焦癰也丹田壹名石門壹名精室壹名命門壹穴在臍下貳寸

關元隱隱而痛者小腸疽也上肉微起者小腸癰也關元

壹名液門在臍下參寸右驗其所募依據此審定癰疽淺深病

從何藏腑發先會食何乳石又驗其氣虛實參詳而療之

癰疽叙療諸法

凡癰疽癰初生皆只如粟黍粒許大微似有痛痒或觸破之卽焮展初覺有之卽須速服犀角湯丸及諸冷等藥取通利踈暢腑藏兼以湯水淋射滌其壅滯瘡頭塗石藥四畔貼熯藥折其毒勢如此將理覺不退是熱毒稍堅卽停用湯水淋射精意辨之定是癰癰便當上灸之若是疽則審按候其淺深燒針烙之於經上塗止痛引膿膏絛之兼以膏塗帛貼之常令開潤勿令燥也四

畔貼熯藥夫血脉喜溫而惡寒若着冷氣過理迫之卽血滯難差若已成大膿者兼瘡中有惡肉卽須用豬蹄湯洗之傅蘭茹散等蝕其惡肉候爛肉欲盡卽貼生肌膏藥及飲食慎忌寢臥居處觸事抑情克意將理辨癰疽宜灸不宜灸法凡癰疽發背初生如黍粟粒許或痒或痛覺似有卽用湯水淋射兼貼藥熯之經一兩日不退須當上灸之一二百壯如菘豆許大凡灸後却似焮痛經一宿乃定卽火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出也若能於瘡頭四邊相去各一寸已來更花灸尤妙其瘡若只痒卽

宜隔鼓餅灸之其鼓餅須以椒薑鹽葱相和爛搗捏作餅厚薄如三錢已來當瘡頭鼓餅上灸之若覺大熱即微取起少頃再安只灸七壯而已鼓餅若乾更換新者尤佳瘡若痛即須苦灸仍壯數唯多為妙若是疽即不宜灸夫疽初生形如痔癰頭白焦枯氣本深沉治者既不精辨亦便灸之或癰癤成膿之後亦令灸之皆能害人初灸三壯不覺痛者為上肉已天其下膿深及至數壯之後焮痛必倍為熱氣益盛膿伏內攻之火灼其外轉增毒甚不可不知也灸所忌穴具載於後

頭維 在額角髮際本神傍壹寸

承光 在頭上伍處穴後貳寸是

神庭 在髮際直鼻上

承泣 在目下柒分直瞳子陷中是

絲竹空 在肩後陷中

膺窻 在胸下壹寸陸分兩乳中

腦戶 在枕骨上強間後壹寸半

風府 在腦後髮際壹寸大筋傍

宛宛

瘖門 在項後髮際宛宛中 脊中 在第十壹推節下間

三陽絡 在臂上大脉溝上壹寸

下關 在耳前動脉是也

耳中耳門 禁不灸

人迎 在頸大脉應手俠結喉傍通五藏

石門 在臍下貳寸女子禁不灸

伏兔 在臍上陸寸

地五會 在足小指次指本節後間去俠谿傍壹寸伍分

右件穴據鍼經並禁不可灸或於上出瘡癰亦不得便灸且以諸方法及湯水注射并用諸藥燻之若已

成膿卽須鍼烙出之爲其內已有膿縱鍼烙出之卽
並無妨其經久瘦卽用硫黃灸之

灸法

右用硫黃一塊隨瘡口大小安之別取少許硫黃於
火上燒之以銀釵脚挑之取焰點硫黃上令著三兩
徧取膿水以瘡乾差爲度

辨癰疽宜鍼烙不宜鍼烙法

夫癰疽者頭少腫處多出膿不快者宜鍼烙膿未盛已
前不可不以諸藥貼熅救療以安病者之心膿成卽當
棄藥從鍼烙也旣至膿成卽當決意不可疑懼痛頃刻

之間以至內潰古今同斃斯疾十有八九深識之士當
斷去就夫患癰疽已成結腫須有出處療之無不鍼鍼
無不差未有不鍼不刺而差者未有鍼刺及時而不差
者夫痛之極也衆熱聚攻膏膜爲之腐爛肌肉爲之敗
潰內通貫藏府若不鍼烙決潰熱毒無從而解膿瘀無
從而洩或過時不鍼卽反攻於內內旣消敗欲望其生
豈可得乎則鍼烙取差實爲良法疑而不決爲必死之
患或隱諱此疾或懼痛不鍼此神奪其識死期將至癰
則皮薄宜鍼疽則皮厚宜烙古法無烙唯有鍼刺烙卽
火也亦謂之燔鍼却刺以其有却病之功也今用烙法

多差殊穩妙於鈹鍼法本用鈹鍼烙法當用火鍼如似
火筋磨頭令尖如棗核團滑用燈焰燒須更火作炬數
蘸油燒令赤皆須近下面烙之一烙不透卽再烙之令
透若其攻稍廣卽須散烙數處並令透則氣踈達膿水
易出不假按抑實者撚髮爲絛虛者以紙爲絛塗引膿
膏藥絛之兼以膏藥貼之常令開潤勿令急燥若其人
羸瘠勿頓出膿徐徐令出癰疽廣大膿潰肌者懼一時
之痛不肯四畔多下鍼烙唯開三兩處而已欲望早愈
不亦難乎常見有開腫者不審淺深所烙或當時無膿
經宿方潰或下鍼不出別處生頭或抑擦焮動益加損

疼真氣轉傷經云病淺鍼深則氣血伏沉若病深鍼淺
則毒氣不洩反爲大癰也如務求速差腫內餘膿及膿
根未盡便令瘡合後必再發諸發腫都輒而不痛者卽
並宜鍼烙若發於背者卽須用水角乃得痊愈
辨癰疽宜水角不宜水角法

凡癰疽發背腫高堅靱膿稠焮盛色赤者宜水角陷
下肉色不變輒慢稀者不用水角角法於寬靜室中不
當風處平實地掘一小坑口稍闊於瘡重深一尺已下
去此坑二尺外又爲一坑子口闊三四寸傍穿兩坑令
相通灌水並令去坑面二寸於地上腰背下先鋪油單

三兩重辟地氣卽以席薦東西鋪坑口兩畔令患者以
瘡合坑上無令偏側腰間布氈褥務令安穩則得久角
角口兩畔以繒帛遮擁兼蓋覆水坑口勿令通泄熱被
水引下滲地中臥一炊久爲度瘀滯膿血並洩角中熱
盛者日夜三四徧腫氣不侵每日或兩度亦得候其毒
解熱退水角方止中間以藥燻之熱毒及癰託命在醫
宜用意惻怛心機百變如愛己身始可濟人凡看疾之
人尤須安靜或有言中旁觸遂使患者驚疑至於庸醫
昧於深理就施鍼艾尤不能精用水角則太早以火攻
則稍遲何者疽之萌生而用水角則內熱毒畏冷逼之

却人腠理皮肉堅厚毒氣內堅肉變爲膿以致內潰深
可哀也疽之已成而乃火攻則火毒相擊令人煩悶加
其虛憊可不慎乎或富貴之人遭遇此疾多貯水銀以
爲水角尤妙用水銀角法右揀穩實地穿一坑口稍闊
於瘡腫處深可四五寸先於坑中布紙五六重襯水銀
諸餘鋪設一依前方其水銀多至一升已來如無只三
五合亦得

石癰

論曰人之氣血得熱則淖澤得寒則凝結石癰者寒氣
凝結致熱氣不得散故其腫毒鞭實如石之狀而謂之

石癰治宜溫調榮衛散其寒邪使氣得陽而外發則膿血出而腫鞭自消

治石癰久不差黃耆當歸散方

黃耆剉拾兩 當歸切焙兩

右二味為散每服三錢匕溫酒調下不計時候

治石癰結聚腫鞭熱痛藏府祕泄木香丸方

木香壹兩 檳榔剉參分 芎藭壹兩 附子炮裂去皮臍

羌活去蘆頭各半兩 大黃剉炒兩 牽牛子炒令香壹兩半

人參各半兩 枳殼去瓢麩炒參分 陳橘皮湯浸去白焙半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大貯以瓷合每服三十九空心粥飲下通利為度如未利加至四十九

治石癰皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者下之升麻湯方

升麻 連翹 大青各壹兩

生地黄焙貳兩 大黃剉炒壹兩 敗醬

絡石 白欽各半兩 玄參壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分更入芒消末半分去滓空心溫服微利為度

治石癰已服前升麻湯後用木香散塗貼方

木香

大黃剉

升麻煎至八合更

白欬

芒消

赤小豆各半

右六味搗羅為散以榆白皮汁入水少許調和如糊

塗故帛上貼日二

治石癰結實已壞未壞占斯散方

占斯

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙熟

生乾地黄焙

栝樓乾者去皮

敗醬

防風去

桔梗剉

人參

細辛

去苗葉各壹兩

桂去麤皮半兩

以散餅餅于大瓶以盛

右一十味搗羅為散每服食前以溫酒調下二錢匕

治石癰腫毒結鞭疼痛口乾煩熱四肢拘急不得臥沉

香湯方

沉香分

地骨皮

麥門冬去心焙

當歸

切焙各壹兩

大黃

剉炒貳兩

升麻

壹兩煎生六分

木香分

玄參

枳殼去瓤麩炒

羚羊角

鎊

獨活

去蘆頭

甘草

生剉

赤芍藥

各壹兩

防風

去叉參分

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不計時候溫服

治石癰熱毒氣盛腫鞭疼痛口乾煩悶犀角湯方

犀角鎊參

連翹

射干

梔子人

升麻

當歸

切焙各壹兩

大黃剉炒

木香參

枳殼

去瓤炒

赤芍藥

甘草生

玄參

各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不計時候溫服

治石癰地黃煎方

生地黄淨洗

右一味剉碎搗研絞取汁入銅器內盛安湯上煮柳

篋攪勻如糖以瓷合盛每日空心取如一彈子大溫

酒調服日午晚間再服

治癰疽堅如石核鹿角散塗方

鹿角燒過

白欬各貳兩

麤理黃石

伍兩燒令赤色投醋中再燒投醋凡柒遍

右三味搗羅極細以醞醋調如糊塗傅腫上乾即易

治癰疽結鞭未成膿凝水石散貼方

凝水石

黃藥

黃耆

剉

黃連去須

大黃

石膏

梔子人

各半兩

白欬

壹兩

右八味搗羅極細以漿水調如糊攤故帛上貼患處

乾即易

又塗鹿角泥方

鹿角

右於石上用水磨令如泥塗患處日三五次

又塗半夏方

半夏壹兩

右為末以新水調如糊塗患處日三五次

又塗葇荑子方

葇荑子貳兩

其右為末以醋調如糊塗患處乾即易

又塗葵莖灰方

葵莖灰

右二味為末以醋調如糊塗腫上日三兩次

又塗蛇蛻方

蛇蛻

右燒灰細研以醋調塗腫上乾即易亦可只以蛇皮

貼之經宿即差

又塗商陸根方

商陸根半斤

右爛擣攤故帛上貼之乾即易并治諸瘦瘡癬
又塗蜀漆方

蜀漆乾者半兩 桑根白皮貳兩

右二味為末每用量多少以鎔牛皮膠并酒調和傅
腫處日三五次

附骨癰

論曰凡身體盛熱不可當風蓋風冷之氣入於肌肉則
熱氣搏伏不得出故附着於骨而成癰也其狀無頭但
腫而闊皮膚薄澤者以毒氣伏留於內故也法宜外散
其寒內達蘊熱乃得本標之治

治附骨癰結核膿水腫痛心腹氣滿五香連翹湯方

木香 獨活去蘆頭 射干

連翹各參分 甘草炙 桑寄生剉炒

升麻剉 沉香剉 雞舌香

乳香研各半兩 大黃剉微炒壹兩半 麝香研壹分

右一十二味除研者外麝擣篩再入麝香乳香同研
拌勻每服五錢匕水一盞半煎至八分下竹瀝半合
瀘去滓空心溫服快利為度未利再服

治附骨癰生股上伏肉間淋煤貫衆湯方

貫衆 地骨皮剉 穀精草

枇杷葉

拭去毛炙

荆芥

去梗

蜀椒

去目并合口者各壹兩

右六味麤擣篩以水三升煮取二升和滓淋煤蘸布帛搨之速効

治附骨癰腫根在藏府蛇皮散方

蛇皮

露蜂房

亂髮

右三味並燒灰存性研細每服一錢匕温酒調下日

三服

治附骨癰金石凌法

梔子人

半斤

犀角屑

麝香

研各半兩

桔梗

剉炒貳兩半

石膏

推碎

寒水石

推碎各肆兩

木通

甘草

鬱金

剉各貳兩

青木香

剉壹分

朴消

研肆斤

金

貳拾兩

右十二味除朴消麝香外先將寒水石石膏金以水二斗於銀器內慢火煎至一斗次下前犀角等草藥七味再煎至五升以生絹濾去滓下朴消以柳木篋攪勿住手候稍凝卽住火入麝香拌令勻盛密器中每服一錢匕新水調下老小加減服

治附骨癰蜜陀僧散方

蜜陀僧

自然銅

各半兩

杏人

去皮尖雙人貳柒枚

右三味用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨

候竹筒黃色取出研極細看瘡腫大小用藥以新汲水調勻用雞翎掃藥塗癰上甚者不過二七日効

治附骨癰牛膠散方

牛皮膠黃明者慢炙令燥

甘草用水壹盞煎炙水盡到各

兩半

右二味搗羅為散每服二錢匕濃煎木賊湯調下空心服復取藥末以井水調膏看瘡大小攤紙貼之

治附骨癰槲皮散方

槲皮參兩燒令煙盡

右一味細研為散每服二錢匕空心米飲調下日晚

再服

治附骨癰方

新鼠皮壹張

右一味看瘡大小裁貼日二次若出膿已潰者用豬脊脂貼吮膿出盡即差

治附骨癰甘草湯方

甘草炙貳兩

露蜂房壹兩

右二味並剉以水五升煎至三升去滓以故帛二片浸湯中更互洗瘡上日三兩度即差

治附骨癰方

苧麻子去殼不拘多少

右一味研令細取塗癰上日三兩度即差

治附骨癰方此方本正代煎三升去滓以艾葉二升

生地黄取汁壹盞

右一味銀石器中煎如膏候冷塗傳腫上日三五度

即差

癰內虛

論曰癰內虛者榮衛腐為膿血經絡不足則五藏之氣虛乏也其證多生虛熱而心神為之驚悸以癰熱不散乘虛而入又心獨惡熱故驚悸不定也

治癰潰膿太多裏虛熱茯苓湯方

白茯苓去黑皮參分 黃耆剉壹兩半

桂去麤皮參分 麥門冬去心焙 五味子各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服晚

再服

治癰潰漏血脉空竭內塞黃耆散方

黃耆剉 芍藥 細辛去苗

瞿麥穗 白芷 薏苡人

人參 附子炮裂去皮臍 熟乾地黄焙各壹兩

赤小豆醋浸炒

右一十味搗羅為散每服二錢七空心溫酒調下晚

再服痛甚加芍藥口乾渴加薏苡人膿多加黃耆

治癰內虛不足膿水不絕四肢之弱不能飲食久不差

必為內漏黃耆散方

黃耆剉壹兩

山茱萸

五味子各半兩

白茯苓去黑皮

當歸切焙

附子炮裂去皮

石斛去根

遠志去心

巴戟天去心

肉蓯蓉酒浸切焙

人參參

菟絲子酒浸參日焙

乾搗末半兩

麥門冬去心焙

壹兩

石韋去毛

白芍藥參

芎藭半兩

熟乾地黄焙壹兩

甘草炙到

右一十八味搗羅為散每服二錢七荆芥湯調下日

三四服

治癰膿血至甚不生肌肉內補五香丸方

沉香

乳香

木香

藿香葉

丁香

續斷各壹兩

熟乾地黄焙貳兩

白芍藥

側子炮裂去皮

石長生各壹兩

厚朴去蠶皮薑汁

敗醬

人參

白茯苓去黑皮

各壹兩

鹿角屑 虎脛骨酥炙令黃 各貳兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸梧桐子

大每服三十九食前以黃耆湯下

治癰經年不差膿血過多補虛肉從蓉散方

肉從蓉酒浸切兩乾薑炮兩 菟絲子酒浸別搗參分

巴戟天去心 遠志去心 人參各壹兩

甘草炙 麥門冬去心焙兩 石葦去毛

白芍藥 桂去麤皮 芎藭各壹兩

熟乾地黄焙壹兩半 山茱萸 五味子

當歸切焙各兩 附子炮裂去皮臍半兩 白茯苓去黑皮壹兩半

右一十八味搗羅為散每服二錢匕荆芥湯調下空

心食前服

治癰內虛蜀椒散方

蜀椒去目并閉口炒出汗半兩 熟乾地黄焙

白欬 防風去叉 黃芩去黑心

人參 桂去麤皮 芎藭

附子炮裂去皮臍各壹兩 赤小豆壹合炒令熟 甘草炙兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下早晚

食前服以差為度

治癰疽內虛黃耆湯方

黃耆剉 人參 甘草炙

芍藥 當歸切焙各壹兩 熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮 桂去麤皮各參分 白朮

遠志去心各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分拍碎乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服

日晚再服

治癰內虛熱生地黄湯方

生乾地黄切焙兩 人參 甘草炙

芍藥 白茯苓去黑皮 芎藭

黃耆剉 黃芩去黑心各壹兩 木通剉

當歸切焙各參分

右一十味麤搗篩每服五錢七水一盞半竹葉七片乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

久癰

論曰人之肌肉皮膚待氣血以溫養癰久不差熱毒未盡風冷乘之客於瘡孔肌不得溫故腫結不消乍差乍發名曰久癰不治則變成瘻治一切癰疽及乳癰風毒留積疼痛不止或膿出不快

久不生肌木香湯方

木香不乳香

雞舌香各半兩

沉香射干

連翹

升麻

黃耆剉炒

木通剉

獨活去蘆頭

桑寄生剉

甘草炙剉

大黃剉炒各參分

右一十三味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞下芒消半錢匕麝香半字匕更煎一二沸濾去

滓空心溫服不利再服

治癰疽日月久遠膿水不盡心中煩悶白鮮皮湯方

白鮮皮

桑根白皮剉

玄參

漏蘆去蘆頭

升麻各壹兩

犀角屑半兩

敗醬參分

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞

入芒消半錢匕濾去滓空心溫服晚再服稍覺瘡痛

止即去芒消

治癰疽惡瘡久遠膿水不盡變為癰黃耆湯方

黃耆剉炒壹兩

升麻

犀角銹各半兩

紫葛

木通剉各參分

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞

下朴消半錢匕瀝去滓空心溫服取利三兩行為度
未利再服

治發背癰疽經年不差熱氣結聚山茱萸散方

山茱萸 五味子 白茯苓去黑皮各參分

當歸焙切 附子炮裂去皮臍 芎藭

芍藥 石韋去毛 桂去麤皮

人參 地脉草 石斛去根酒浸焙

菟絲子酒浸炙 甘草炙各半兩 巴戟天去心

遠志去心 麥門冬去心焙 肉蓯蓉酒浸去皴皮炙

生乾地黄炒各壹兩 乾薑炮壹分

右二十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下加至三

錢匕醋漿水調下亦得長服永不發瘡癩

治一切癰疽諸癭拔毒風生肌肉止膿血蝟皮散方

蝟皮半枚燒灰 杜仲剉炒 厚朴去麤皮薑汁炙透各壹兩

續斷 附子炮裂去皮臍 地榆

藁本去土 當歸焙切 桂去麤皮各半兩

小露蜂房半枚炙

右一十味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下晚再服

治癰疽潰後膿水不絕麥門冬湯方

麥門冬去心焙 黃耆剉炙 五味子炒

白茯苓去黑皮各壹兩芎藭

桂去麤皮各半兩

當歸切焙人參

甘草炙各參分

遠志去心焙壹兩

右十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎大棗二枚擘破同煎至一盞濾去滓空心溫服

晚再服生肌膏取差為度

治一切癰疽久不差黃連散方

黃連去須

滑石碎各壹兩

右二味搗羅為散先濃煎甘草湯溫洗瘡了拭乾爛

嚼胡麻子傅之後乾貼此散子日三度易良

治一切瘡腫癰疽瘰癧等疾經月不差將作冷癭蟾蜍

膏方

蟾蜍壹枚去頭用

石硫黃別研

乳香別研

木香

桂去麤皮各半兩

露蜂房壹枚燒灰用

又右六味搗羅為末用清油一兩調藥末入瓷碗盛於

銚子內重湯熬不住手攪令成膏絹上攤貼之候清

水出更換新藥瘡患甚者厚攤藥貼之

治瘡久不差時常痛痒皮縮肉消黃汁膿血不斷如神

散方

天南星炮壹枚

草烏頭炒壹兩

礬石煨半兩

右三味搗研為散先用熱湯洗次將散子生油調塗
紙上貼之

治久癰塗傅方

白楊葉乾者壹握

右一味搗羅為末傅瘡上日二度

又方

巴豆伍枚燒灰細研 斑猫伍枚燒灰細研

右二味研和為散傅瘡上以綿貼之日一次

又方

巴豆伍枚去心皮研令細 魚脂兩

右二味先熬脂令沸入巴豆煎攪令勻以瓷合盛塗
傅瘡上日三度

治久癰疽秦艸塗傅方

秦艸兩

右一味搗羅為末塗傅瘡上以帛裹縛之日二次

又方

飴糖壹分

右一味取火鎔灌瘡中日三度即差

又方

鶴骨兩

右一味搗羅為末以豬脂調如糊塗傅瘡上以故帛裹之須臾痒發當有蟲出即差

治諸癰腫熱毒蘊積或久出膿水煩熱疼痛瘡口不合排敗膿去死肌五香連翹丸方

又木香壹兩

沉香剉

人參

雞活香

乳香

芍藥

玄參

海藻洗去鹹汁

桂去麤皮

大黃剉

芒消研各壹兩

惡實貳兩

桃人去皮尖雙

當歸切焙

連翹各壹兩半

麝香研半兩

右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九至三十九空心酒下更量虛實加減

治癰瘍潰後膿不斷及諸物刺傷瘡不差方

硫黃粉貳兩

牛筋一片推碎

右二味以筋內硫黃中以刺瘡孔內取差為度

治久癰不差方

右以馬齒菜搗傅之差

治癰後瘡不合方

右燒鼠一枚作灰傅瘡孔中

又嚼大豆傅之

又以牛屎傳之乾即易

乳癰

論曰足陽明之脉自缺盆下於乳又衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散蓋婦人以衝任為本若失於將理衝任不和陽明經熱或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或鞭或腫疼痛有核皮膚焮赤寒熱往來謂之乳癰然風多則腫鞭色白熱多則腫焮色赤若不即治血不流通氣為留滯與乳內津液相搏腐化為膿然此病產後多有者以衝任之經上為乳汁下為月水新產之人乳脉正行若不自乳兒乳汁蓄結

氣血蘊積即為乳癰又有因乳子汗出露風邪氣外客入於乳內氣留不行傳而為熱則乳脉壅滯氣不踈通蓄結成膿疼痛不可忍世謂之吹爛速宜下其乳汁導其壅塞散其風熱則病可愈
治乳癰初有異於常則先用此藥散化毒氣麥門冬湯方

麥門冬

去心炒 貳兩

黃芩

去黑心 壹兩

桑上寄生

剉 壹兩半

甘草

炙 壹兩

木通

剉

防風

去 壹兩

芍藥

剉 壹兩

赤茯苓

去黑皮

黃耆

剉 各壹兩

人參

壹兩半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入乳糖一分
棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三早晨午時
至晚各一

治乳癰初覺赤腫有異於常服此黃芩飲方

黃芩去黑心

甘草炙令赤

桑上寄生炙

防風去叉

麥門冬去心

赤芍藥炒

黃耆剉炒各

木通剉半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗三枚擘破
同煎至七分去滓入乳糖一分再煎令消溫服日三
早晨午時至夜各一

治乳癰焮腫疼痛排膿鐵粉散方

鐵粉

肉苳蓉酒浸去麤皮炙

細辛去苗葉

芎藭

人參

防風去叉

乾薑炮裂

黃芩去黑心

芍藥剉炒

當歸焙令香剉

甘草炙剉各

右一十二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三
早晨午時至夜各一服藥十日後有血出多勿怪是
惡物除也

治乳癰堅韌如石當歸散方

當歸焙令香剉

芍藥剉炒

黃耆剉炒

人參

疾藜子微炒去角枳殼去瓤炒

附子炮裂去皮臍

雞骨炙各壹兩桂去麤皮壹兩半

薏苡人微炒半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下日三

早晨午時至晚各一

治乳癰大堅鞭赤紫色衣不得近痛不可忍大黃散方

大黃剉炒

芍藥剉炒

棟實

馬蹄炙令黃焦各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下衣蓋出

汗若睡若覺後腫散不痛經宿乃消百無一失次日

早晨再服無不差者

治乳癰堅鞭枳殼散方

枳殼去瓤炒

芍藥剉炒

人參各壹兩半

黃耆剉炒

雞骨炙

木通剉

當歸焙令香剉

桂去麤皮各壹兩

疾藜子微炒去角半兩

右九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

治乳癰疼痛蔓荆實散方

蔓荆實微炒壹兩

甘草壹寸半半熟半生

右二味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下日再服

治乳中結塞腫痛髮灰散方

亂髮灰

蛇蛻皮灰各半兩

蔓荆實微炒壹兩

右三味搗羅為散每服二錢七溫酒調下日三

治乳癰先用諸湯藥塗傅搨後服此麥門冬丸方

麥門冬去心焙貳兩木通剉

人參

五味子

黃耆剉

羌活去蘆頭

防風去

生乾地黄焙

黃芩去黑心

桑上寄生

茯神去木

天雄炮裂去皮臍去

升麻

澤蘭各半兩

枳殼去瓢麩炒令黃

大黃剉微炒各參分當歸切焙壹分

右一十七味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服空

心溫酒下二十九漸加至三十九以差為度

治乳癰排膿肉苳蓉散方

肉苳蓉微炙

鐵精

桂皮去麩

細辛去苗葉

黃芩去黑心

芍藥

芎藭

人參

防風去

乾薑炮裂

甘草炙令赤剉各半兩

當歸切焙參分

右一十二味搗羅為散每服二錢七空心溫酒調服

日晚再服

治乳癰防風散方

防風去叉壹兩半

牽牛子炒令香貳兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕空心用沸湯調下取
微利爲度未利再服漸減服之卽差

治乳癰疼痛結鞭不可忍鯪鯉甲散方

鯪鯉甲

燒灰壹兩

栝樓

壹枚燒灰

右二味研和爲散每服二錢匕空心用葱酒調下至

晚再服

治乳癰及一切腫毒車螯散方

車螯殼

燒灰拾兩

黃連

去須壹兩

蜆殼

多年白爛者以黃泥裏燒

伍兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕空心用甘草酒調下

日晚再服

治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服差牡蠣散方

牡蠣

取腦頭厚處生用

右一味細研爲散每服二錢匕研澱花冷酒調下如

癰盛已潰者以藥末傅之仍更服藥一日三服

治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服差樺皮散方

右以北來真樺皮燒灰酒服方寸匕就病乳處臥及

覺已差

治乳腫痛慮作癰毒但乳癰痛甚者甘草飲方

甘草

半炙令赤黃半生半兩

栝樓

壹枚去皮取瓤

右二味先以酒二盞煎甘草至一盞入栝樓瓢同絞和勻濾去滓放溫頓服未差更作服之

治乳癰疼痛丹參膏方

丹參去蘆

白芷

芍藥

炒各兩

右三味以苦酒浸經一宿又取豬脂半斤微火上同煎之令白芷黃其膏乃成去滓以膏塗癰腫處差

治乳癰黃明膠傅散方

黃明膠炙令燥

大黃剉炒

莽草

細辛去苗葉各半兩

右四味搗羅為散以雞子白調勻塗紙上貼腫處頻

易即差仍割穿紙如小錢大歇腫頭

治乳癰宜用黃連散傅方

黃連須去

大黃剉炒

鼠糞各壹分

右三味搗羅為散以黍米粥清調和看癰大小傅乳四邊其痛即止

治乳癰初得令消傅方

莽草

赤小豆各壹兩

右二味搗羅為散以苦酒和傅於乳上

治乳癰黃耆白芷膏塗方

黃耆

白芷

大黃

當歸

續斷各壹兩

薤白貳兩切

松脂貳兩

乳香兩半

蠟壹兩

豬脂貳斤

生地黄汁合參

右一十一味取前五味剉碎以地黄汁拌勻先熬脂

令沸下諸藥煎候白芷赤黑色漉出下薤白松脂香

蠟煎候鎔盡以綿布絞去滓瓷合內盛取塗傅乳上

日三四度卽差

治乳癰生地黄塗傅方

生地黄

伍兩切研

鼓

半升研

芒消

壹兩研

右三味細研令勻塗傅腫上日三五度卽差

治乳癰乳香塗傅方

乳香

壹兩爲末

丹砂

半兩研末

葱白

參兩切

右三味先研葱令細入二味末再研令勻塗傅乳上

乾卽易之

治乳癰腫未穴痛不可忍薰陸香塗傅方

薰陸香

壹分爲末

百合

半升

雄雀屎

貳柒枚

鹽

半兩

右四味細研令勻以醋調如糊塗傅患上乾卽再傅

以差爲度

治乳癰地黄湯搗方

生地黄汁壹

射干

升麻

黃連須去

芒消

白欬

梔子人

大黃各半

甘草

當歸各壹分

右一十味內九味碎剉以水五升煎至三升去滓下

地黄汁更煎三五沸以故帛三片浸藥汁中更互揭

腫上日一二十度再煖用即差

治乳癰結鞭疼痛方

和泥芥菜斤半

右一味剉碎以水四升煮取三升傾於瓷瓶內熏乳

腫處日三五度即差

治乳癰結鞭疼痛方

和泥葱斤半

右一味細剉以水四升煮十數沸於瓷瓶子內盛熏

乳腫處冷即再煖以差為度

治乳癰結鞭疼痛露蜂房熏方

露蜂房伍兩

右一味剉碎以醋五升煎至三升傾於瓷瓶子內乘

熱熏乳上冷即再煖以差為度

治乳癰腫疼宜熲貼方

鹽草根宜生蕩頭各半

右二味擣如泥貼之立効

治乳癰瘡散方

黃連去須

白欬

鼠糞

積雪草

大黃炒

甘草炙各半兩

右六味擣羅為散用漿冰調為膏貼之乾即易

治癰疽發背婦人發乳諸癰瘡已潰者令愈未潰不消

者令潰木占斯散方

木占斯

敗醬

細辛去苗

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙

甘草炙

治乳結顆塊膿水宿滯血脉壅閉惡血疼痛久不差者

無名異散方

無名異

牡丹皮

虎杖根

當歸焙切

白芷

白茯苓去黑皮各參分

沒藥研

麒麟竭研

木香

右一十味擣羅為散酒調方寸匕日七八服夜二三

服如長服去敗醬

治乳結顆塊膿水宿滯血脉壅閉惡血疼痛久不差者

無名異散方

無名異

牡丹皮

虎杖根

當歸焙切

白芷

白茯苓去黑皮各參分

沒藥研

麒麟竭研

木香

黃芩去黑心

黃耆炒

人參

桂皮去麤

熟乾地黄焙各半兩

右一十四味擣羅為散每服三錢匕空腹煎棗湯調

下日二服

治吹乳乳癰連翹湯方

連翹

瞿麥穗各壹兩

升麻

玄參

生乾地黄焙

芍藥各參分

甘草炙壹分

射干兩半

右八味細剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後

治乳癰疼痛方

車前子壹兩

右一味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下

治乳癰腫疼痛方

右打雞子一枚熱酒調為一服

總錄一百二十八

三十一

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

本行最上一效...

...

...



