

靈所附數欠伸甘麥大束湯主之 甘草三兩

小麥一升 大束十枚 水六升煮三升分三服亦

○補脾氣

許學士治一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱皆至終不應予忽憶金櫃有一証云婦人臆躁悲傷故哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大束湯予急令治藥及劑而愈古人識病制方種種絕妙如此
運氣云悲証皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明

伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

○姪娘善悲

綱目述管先生治一姪娘四五箇月臆躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大束湯一投而愈

○肺痿

金匱要畧千金方 脈經論同


論曰寸口脈數其人病咳口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從瘠渴小便利數或從便難被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澁三焦踈躄入而不出陰脈不澁身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欬欬不得咳咳出乾沫久久小便不利其脈平弱肺痿吐涎沫

而不咳者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欬飲者自愈自張口者短氣也

○王海藏曰此証初得可治久則難愈何者上枯水之源下竭水之本也

○又曰寸口脈虛小者為肺痿熱之所過初結為膿始萌可救微發渴者欬愈

○又曰凡傷風傷寒後咳嗽唾血者此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿當以小柴胡去人參大東



生姜加乾姜五味子

又曰肺痿肺癰其皮如麩糠○有胃脘成癰其皮緊如甲錯有腸癰裹大膿血于腸胃之間
又經云陽明司天唾出白血者其狀淺紅如肺色故曰白血

又曰無汗惡寒脈浮緊得自傷寒法從麻黃○有汗惡熱脈沉實得自傷酒法從葛根

至生子曰痿乾癘也即早發還先痿之痿

甘草乾姜湯 溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中

冷必眩不渴不咳上虛下不能制溲_{渴者屬消}

渴 甘草_{炙四兩} 乾姜_{二兩} 水三升者取一升半

分溫日二服 集驗肘後有大棗十二枚

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方

千金翼名_{溫液湯} 甘草二兩水三升煮取一升半分_{三服}

生姜甘草湯 治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生姜_{五兩} 甘草_{四兩} 人參_{三兩} 大棗_{十二枚}

右水七升煮取三升分三服

桂枝皂莢湯 治肺痿吐涎沫不止 桂枝

生姜

各三兩

甘草

二兩

皂莢

一兩

大棗

十五枚

水七升煮取三升分三服

千金方麻黃湯

仲景名小青龍加石膏湯

治肺脹咳而上氣

咽燥而喘脉浮心下有水

麻黃 芍藥

生姜

仲景用乾姜

細辛

桂心

各三兩

半夏

五味子

各半升

石膏

水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升強壯服一升羸者減之日三服

小青龍湯無石膏

知母茯苓湯

肺痿喘嗽不已徃來寒熱自汗

茯苓

炙甘草

各一兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

欵花

桔梗

麥冬

黃芩

各五錢

川芎

阿膠

炒各三錢

右每服一兩姜三片水煎服

久癆咳嗽肺痿見血

知母

貝母

天冬

麥冬

冬

欵花

各三分

川歸

地黃

苡仁

杏仁

天花粉

各五分

桔梗

甘草

馬兜鈴

紫苑

阿膠

白鰾

各一分

姜三片東一枚水煎連進

三服立愈

人參平肺散

治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔

痰涎壅盛胃膈痞滿咽嗑不利橘紅甘草

炙地骨皮茯苓青皮蘇葉半夏各五錢

桑白皮兩一知母錢七人參天門冬各四錢有

熟加黃芩錢四五味子粒三百每服五錢姜三片

水煎服或為末姜汁丸如彈子大噲化亦可

人參款花膏脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳

嗽痰涎嘔逆惡心腹脇滿脹腰背傷痛或虛勞

冷嗽及遠年近日一切咳嗽諸藥不効飲成肺

款花 人參 五味子 紫苑 桑白皮各一兩

右為末煉蜜丸芡實大每食後細嚼一丸淡

姜湯下噲化亦可

○肺癰

仲景王叔和論同

孫真人曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虛者

屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒

非肺痿若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛脉反滑

而數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知

為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何



類何以引之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過于營吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數跌陽脉緊寒熱相搏故振寒而咳跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈

也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也

生生子曰按金櫃要畧脉經元戎論肺痿肺癰皆無分別治亦相須以其俱為肺病也愚歷見今之病此者亦稍有分別不能不為之辯也肺痿近于虛怯故王海巖援內經勞風論証入之謂上枯水之源下竭水之本也何言乎內經五痿論皆以肺熱葉焦為本故今之病肺痿者多乾

咳聲啞无方緣肺主聲肺為火燥傷劇枯痿乾
癆故聲不充發也虛怯者多有之肺癰雖亦為
肺熱所致多有因于外感因于酒熱故間有吐
及膿血而愈者有瀉肺而愈者茲分肺痿肺癰
為二門祖千金也

王海藏曰寸口脉實大為肺癰血為凝滯化為五
色脉數為弱膿成難已不渴者難治

黃昏湯 治欬有微熱煩滿胃心甲錯是為肺癰
者方 黃昏手掌大一片是合昏皮也咬咀以

水三升煮取一升分二服

又方

薏苡仁

瓜瓣升半

薤仁

五十枚

葶藶

切二升水

二斗煮取五升去滓

右四味內葶汁中煮取二升服一升

當有所見吐膿血

王海藏加味葶藶大棗瀉肺湯

治脉緊數則膿

已成喘而不得卧

葶藶

二兩炒

右件并

成丸以水三升煮大棗二十個取二升去渣

內麻黃五味子各半兩取清飲頓服令三日

服一劑瘥

又一法 治一切欬唾膿血久欬及出不止好酥
三十勛三遍煉停取凝成膏醞服二合日三
服瘥

如聖丸 治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶
及肺癰噴嗽膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁
沫氣息腥臭久久咯膿狀如米粥 龍腦另研

牛黃研另 桔梗 甘草生用各一錢 右為細末煉

蜜丸每兩作二十九每服一丸噉化

嗽藥青龍散 石膏兩入 朴硝 甘草生用各一錢

青黛兩半 右為細末每服二三錢煎薄荷湯點熱

漱冷吐

衍義蛤蚧散 治肺虛欬久成瘡吐膿血 犀角

羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕腐盡 黃耆 白芍

藥 香白芷各等分 右為末乾上患處上用膏

藥敷貼一日一換

海藏云此方雖云上瘡吐膿血久不盡者亦宜用
此藥作湯散煎調服之又宜糊為丸桐子大白



湯下三五十九或乾糝細末咽津大妙

錢氏如聖散 桔梗 甘草 阿膠白炒

煎甘桔取清內膠化服

黃耆鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有

盜汗胸脇不利飲食多渴欬唾稠粘時有膿血

知母焙桑白皮去黃耆去甘草炙赤芍藥 紫

苑去蘆已上七秦艽洗去蘆白茯苓去皮焙一

焙別生地黃 柴胡去蘆地骨皮去骨已上五

有說味各五錢淨 今聽已上二味各一兩

分淨肉桂去皮不見火人參 苦桔梗已上三味各

鱉甲去頭用酥炙更佳天門冬湯洗去心焙一本忌火

半夏分五右為粗末每服二大錢水一盞煎至七

分去渣溫服食後 海葺云此方內闕黃耆

疑黃芩是黃耆也然內有黃芩有小柴胡今

治虛熱妙為有盜汗亦無妨也並加知母地

骨皮赤芍藥即錢氏地骨皮散也○治盜汗

亦妙內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也

○天門冬人參地黃即三才也○秦艽柴胡



甘草驚甲芍藥即黃龍湯也○紫苑桔梗甘草即紫苑散也○桂芍黃耆甘草即黃耆建中湯也又云此方治本無傷寒風而得○孫真人治唾膿血用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒而得也內多五味子皆祖仲景法無論傷寒傷風皆可加五味子又云桔梗一味有辛有苦辛以散之若以泄之當如上下之意

硃砂膏 鎮心神解熱除煩唾血等證

硃砂另研珍珠末 生犀角 人參 玳瑁末
 甘草各一兩金箔泥分輕粉二錢蘇合油分牛黃
 麝香另研龍腦另研南鵬砂 琥珀 遠志 羚羊角 赤茯苓已上各半兩安息香酒熬去石約半兩
 右為細末入研藥極細煉蜜丸蘇合油和諸藥為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服一皂角子大噙化人參湯下亦得並阿膠丸相雜服尤勝至室丹

定肺散 知母半兩 貝母二錢 人參二錢 枯礬半兩

烏梅肉兩半 御米殼兩 炒二 白木半 錢 為細末水

煎生姜湯點亦得蜜丸彈子大噲化亦得

定肺丸 欵冬花 紫苑 知母 貝母 人參

甘草炙 桑白皮 御米殼 麥門冬 百部

馬兜鈴 五味子 烏梅肉已上各等分

右為細末煉蜜丸彈子大噲化下丸

古方紫苑散 紫苑兩半 欵冬花兩半 百部二錢半

右為細末烏梅湯點服生姜亦得 如欵加

五味子喘加杏仁 渴加烏梅 氣逆加陳

皮 頭痛加細辛三錢 甘草二錢 氣脫者

加御米殼蜜炒粗末水煎

增損防風通聖散 治鼻塞不通肺氣不利

桔梗 桑白皮 紫苑 鼠粘子各半 荆芥穗

三甘草一兩已上 右為粗末防風通聖散各一

半和勻每服四錢水一盞半生姜五片煎至

七分去渣溫服食後

葶藶大棗瀉肺湯 肺癰胃滿脹一身面目浮腫

鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欵逆上氣喘鳴迫

塞先服小青龍湯一帖，葶藶炒研大棗十二錢，故先以水三升煮棗取二升去棗入葶藶煮取一升服。

外臺桔梗白散 咳而胃滿振寒脉數咽乾不渴

時出濁唾腥臭久又吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母各三兩 巴豆七分 右三味為散壯人服

五分弱者減之病在膈上吐膿血膈下者瀉出若下多不止者飲冷水一杯

欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久

又吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之亦治血癰

桔梗兩 甘草兩 右二味以水三升煮取

一升分溫再服則吐膿血而愈也

欬逆上氣時時濁唾但坐不得卧皂莢丸主之

皂莢刮去皮為細末蜜丸梧子大以棗膏和湯

服三九日三夜

孫真人治肺癰吐膿血用甘桔湯二十餘條加減

生甘草一兩桔梗二兩水煎服 咳逆氣者加

陳皮咳嗽者加知母貝母 欬而渴者加五味



吐膿血者加紫苑 肺痿者加阿膠 面目腫者加茯苓 嘔者加生姜半夏 少氣者加人參麥冬 膚疼者加黃耆 目赤者加梔子黃連 咽痛者加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝 疫毒頭腫者鼠粘子大黃芫硝 胸痛膈不利者加枳殼 心胃痞者加枳實 不得眠者加梔子 發狂者加防風荆芥 酒毒者加葛根陳皮

桔梗湯 治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶

咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌仁 只殼 苡仁

桑皮 防已 各一分 甘草節 杏仁 百合 各六分

黃耆 八分 錢 分二服 姜三片 水煎 溫服 木便秘

加大黃 小便秘加木通

升麻湯 肺癰吐膿血作臭氣 升麻 苦梗

苡仁 地榆 黃芩 牡丹皮 芍藥 各一分 錢

甘草 三分 錢 分二服 水煎 食後 溫服

紫苑湯 治咳嗽唾中有膿血虛勞癯痿

人參 紫苑 知母 桔梗 甘草 五味子
 茯苓 阿膠 貝母各一錢 姜三片水煎服
 排膿散 肺癰吐膿以此排膿補肺
 黃耆一兩 水二鍾煎一鍾食後溫服
 束膏丸 肺積在右脇下如杯發為癥 陳皮
 苦梗 葶藶 各等分束肉搗為丸梧子大每
 服五十九米飲下
 消濃飲 肺有癰膿腥氣上衝嘔而咳嗽
 天南星 半夏 知母 貝母 生地 阿膠

大宮詹少溪吳馭閱校

川芎 甘草 桑皮 防風 射干 桔梗
 天冬 薄荷 杏仁 白芷 紫蘇 白芨
 烏梅 各等分每服七錢姜三片水煎服

赤水玄珠九卷終


赤水玄珠第十卷目錄

瘡門

泄痢辨

泄瀉門

痢門



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠 目錄卷

赤水玄珠第十卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

新安生生子孫一奎著輯

○瘧門

內經黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴飲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也

赤水玄珠


二

巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故飲冷也此皆得之夏傷暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗空踈腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以田作帝曰其間日而作者何也岐伯

曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明日下二節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍晏也其出於風府日下二節二十五日下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之

中其氣日高故作曰益早也其間曰發者由邪
氣內薄於五臟橫連暮原也其道遠其氣深其
行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃也
帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發則邪
氣入則病作今衛氣日下一節其氣之始發
也不當風府其間作者柰何岐伯曰此邪氣客
於頭項循脊而下者也故虛實不同邪中異所
則不當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項
而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至

腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之
所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之
發必開其腠理邪氣之所舍則其府也
帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑
其汗大出腠理開發因遇夏氣淒倉之水寒藏
於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫者陰
氣也者風陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒
而後熱也病時作名曰瘧帝曰先熱而後寒
者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後



寒也亦以時作名曰溫瘧帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬傷於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓燥肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲

嘔名曰瘧瘧帝曰瘧瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消燄肌肉故名曰瘧瘧帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得

休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日發者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘡者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有

餘寒為不足夫瘡者之寒湯火不能溫也及其熱米水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脉無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也夫瘡之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逸極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘡氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝

則寒陽勝則熱瘧者風寒之不常也病極則復
至病之熱也如火之熱如風雨不可當也故經
言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之
謂也夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而
調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發
為其氣逆也帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯
曰瘧之起發也陰陽之相移也必從四未始也
陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不
得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血

者皆取之此真往而未得并者也經瘧論俱內
保命集云夏傷於暑秋必瘧瘧蓋傷之淺也近而
暴傷之重也遠而深瘧瘧者冬瘧也是之夏傷
於暑濕熱閉藏而不能發洩於外邪氣內行至
秋而發為瘧也初不知何經受病隨其受而取
之有中三陽者有中三陰者太抵經中邪氣其
症各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧
其治各別太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽
明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之

風熱瘡治多和之此三陽受病皆謂之暴瘡也
發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴
也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘡宜以太
陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重
者遠而深也瘡瘡者老瘡也故謂之老瘡
舟溪云風暑之瘡當發汗夏月多在風涼處歇遂
閉其汗而不泄故也惡飲食者必自飲食上
得之無汗者要有汗發散為主帶補有汗者
要無汗扶正氣為主帶散邪瘡病感虛者須

以人參白朮一二帖托住其氣不使下陷後使
他藥內傷挾外邪同發必內生痰外以汗解
散二陳湯加柴胡黃芩常山草菓煎服又瘡
不得汗者二陳湯加檳榔倍加蒼朮寸方加
柴胡葛根川芎一補一發不可直截○老瘡係
風暑入於陰分用血藥引出陽分則散當以當
歸紅花黃柏川芎白朮蒼朮甘草白芷水煎露
一宿空心服
按瘡在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟

傳出至府亂而失期也又當因其汗之多寡而為補券并發之下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎葛根蒼朮并麻苈胡之屬此丹溪治瘧之微旨也

心法附錄曰世用砒霜等毒藥截瘧差悞甚矣且俗名曰脚寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅為主

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒隨時變遷心法附錄曰有病又脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

生生子曰世俗皆視瘧為小病不分外感內傷勞倦虛弱在陽在陰之旨率以砒丹常山等毒劑劫之或以草藥膏之又或指為鬼祟而以符水巫咒禁之稟受厚邪輕者偶中僥倖稟弱邪重者愈劫而愈陷矣於是迂延歲月咳嗽潮熱飲

食減少，每每變虛怯之候，不思經曰邪之所湊，其氣必虛，輕病重治，必成重病，都緣不能脫俗，故耳，良可悲夫。

桂枝羌活湯 處暑前後頭痛項強脉浮惡風有汗 桂枝 羌活 防風 甘草 各等分

為粗末，每服五錢水一盞半煎至一盞，迎發日溫服，吐者加半夏麴。

麻黃羌活湯 頭痛項強脉浮惡風無汗 麻黃 羌活 防風 甘草 各等分煎法

如前如吐加半夏麴等分，三方皆太陽經

白芷湯 治瘧身熱目疼熱多寒少脉長睡卧不安，先以太柴胡湯下之，微利為度，如下後微邪未盡者，以此湯盡之。 白芷 知母 石膏 四服法同前 此陽明經

桂枝石膏湯 隔日一發，先寒後熱，寒少熱多。 桂枝 石膏 知母 黃芩 右分作三服，間日者邪氣所舍深也，如外邪已罷，內邪未已，再下之。 從卯至午發者，宜大柴胡湯。

下之 從午至酉者知邪在內也宜大承氣湯
下之 從酉至子或至寅發者知邪在血宜
仁承氣湯下之 前項下藥微利為度再以小
柴胡湯徹其微邪之氣

桂枝芍藥湯 與熱大作不拘先後此太陽陽明
合病也謂之大爭寒熱作則必戰動經曰熱勝
則動也發熱則必汗泄經云汗出不愈知為熱
也陽盛陰虛之症治當內實外虛不治忍久而
傳入陰經也宜桂枝芍藥湯主之

桂枝 錢二 黃芪 知母 芍藥 石膏 各五錢
右服七錢水煎服 如服前藥而寒熱轉大
者知太陽陽明少陽合病也宜桂枝黃芩湯
以和之

桂枝黃芩湯 治三陽合病 甘草 四錢 石膏 五錢
知母 五錢 桂枝 二錢 柴胡 一兩 黃芩 四錢 人參 四分
半夏 錢四 右水煎服服後如外邪已罷內邪未
已用大柴胡大承氣等湯下之
麻黃黃芩湯 治夜發者 薤仁承氣湯亦治夜

發者レ麻黃一兩 甘草二兩 薤仁三十枚

黃芩去芦 桂五分 服法同前

薤仁味苦甘辛肝為血海血受邪則肝氣燥經云肝苦急急食甘以緩之故薤仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此發散血中風寒之劑麻黃桂枝薤仁乃太陽經血藥非三陰經藥也

生生子曰已上皆劉守真分經治療法也與內經之旨皆相符合明其邪自外而來故治同傷寒

也予驗今之所發者除傷風所發外亦有多挾內傷者或從飲食所得或從勞倦所得此必先有所感而邪氣潛伏今為新傷所啟發也雖涉內傷而頭疼寒熱口渴等症亦不出前數法外矣予每用所挾症之藥加於前各經治方之內錯綜治之亦不失古人意也故所向輒有功濟世方治先熱後寒者以小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡姜桂湯

按此亦前分經法也但此以寒熱多少定治然寒多而但寒不熱脉洪實或滑多有熱極而似者為有餘治當下之若便以桂枝投之悞也或或多熱而但有熱者脉虛大或微弱當作虛治若便以白虎湯投之悞也故必須細心體認詳之以脉而以寒熱多少為治庶為穩當

仲景白虎加桂枝湯 治朝發暮解暮發朝解其如平但熱無寒骨節疼煩便難此治溫瘧
知母 兩六 甘草 兩二 石膏 斤一 粳米 合 桂

枝去皮 三兩 水煎服出汗愈

柴胡桂姜湯 治往來寒熱胸膈疼小便不利嘔

而不渴治瘧寒多熱少或寒不熱

柴胡 斤半 桂枝 三兩去皮 乾姜 兩二 括萎根 兩四

黃芩 兩二 甘草 兩二 牡蠣 兩二 水煎服初

服微煩再服得汗便愈

柴胡去半夏加栝萎湯 治瘧病後渴者亦治勞

瘧 柴胡 兩八 人參 兩三 黃芩 兩三 栝萎根 兩四

生姜 兩二 大棗 枚十二 甘草 兩三 水煎服下

赤火

表

三

日兩三服効

局方雙解飲子

治瘧疾辟瘴氣神効食瘧尤佳

肉苳蔻

草苳蔻

各二枚一用麵粉草二兩一

厚朴

二寸一用姜生薑二塊如東大一塊

右水煎空心服

東垣云秋暮暑氣衰病熱瘧也此方主之實治寒

也

人參養胃湯

治飲食傷脾及寒多而熱少者胃

膈痞悶不思飲食寒多者加姜桂熱多者加黃

芩黃連柴胡

方在寒門

清脾飲

治癰瘡脉來弦數或但熱不寒或熱多

寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮去白厚朴製

白朮

半夏泡

黃芩

草菓仁

柴胡

茯苓

苓

甘草炙各等分

右每服七八錢姜五片不拘時服

草菓飲

治內傷飲食作瘧胃腹飽悶

草菓

蒼朮

厚朴

陳皮

半夏

甘草

烏梅

核去

姜東同煎

寒多者加乾姜附子熱

多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

柴苓湯 寒熱汗後或大便作瀉 方出傷寒門

三聖飲 治胸膈飽悶口渴熱多寒少 蒼朮

枳殼 知母 各三錢 水煎服

四聖飲 治久瘧 何首烏 白芷 青皮

陳皮 水煎空心服

良方四將軍飲 治瘧作仆厥不知入手足俱冷

此雖一時救急之方用之有驗 大附子 炮去

枚 訶子 四枚 陳皮 四枚 甘草 炙四

分作四服水一鍾半姜七片棗七枚煎拆下

半熟灌下立甦

牙廣云瘧疾發作而僵仆不省人事者盖由頑痰

膠固於中營衛不行故也所以中風中暑而卒

倒不省人事亦由痰之所致也附子性太熱走

而不守本是治寒濕之藥今瘧僵仆而用之以

其性能開散頑痰營衛流通故耳乃是劫劑不

得已而用之也

澹寮露姜飲 胃中痰飲為瘧 下方加蜜治痰嗽

生薑四兩搗汁露一宿空心冷服大治脾胃聚

痰發為寒熱 方廣云生姜自然汁凡中風中
 暑中氣乾霍亂一應卒暴之疾與童便同用立
 可解散蓋生姜能開痰童便能降火故也
 截瘡溫脾飲 治脾虛痰涎上湧瘡發作則吐神
 効 白木錢五 生姜錢五 水煎空心服
 生生子曰按此亦丹溪白朮丸意也彼以白朮下
 味久服得汗乃愈此以生姜佐之故取汗速而
 効亦速也 已上五方皆禁方
 王節齋治瘡活套

柴胡 白木各一錢 蒼朮一錢已上三味 陳皮七分
 粉草各五分 乾葛一錢 若一日一發及午前
 發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢 熱甚
 頭疼再加川芎軟石膏各一錢 口渴加石膏知母
 麥冬各一錢
 若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川
 芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢 酒洗
 紅龍酒炒黃柏各四分 提起陽分可截之
 若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加

赤火區集 下卷

八物湯再加黃芪補之

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡
蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍熟地黃黃耆黃柏以斂
之無汗柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食
者加人參一錢半酒炒芍藥大麥芽各一錢

若傷食痞悶或有食積者加神麩麥芽枳實炒各二錢
若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢黃芩黃連各

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山錢各一烏梅肉三枚

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣
已無只用八物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋
補氣血

瘧母

濟生驚甲飲子 瘧久不愈脇下痞滿腹中結塊

名曰瘧母 草菓 驚甲醋炙 黃芪 白朮

白芍 厚朴姜製 枳榔 橘紅 川芎 甘草炙

各等分每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏

毒少許煎服

又方 治瘡母

鱉甲醋炙二兩

三稜

莪木香

附俱醋炒各一兩半

橘紅一兩

阿魏五兩

右醋糊為丸梧子大姜湯下三十九

瘡母丸 青皮 莢仁 紅花 神麴 麥芽

鱉甲醋炙 三稜 蓬木 海粉 香附俱用醋煮

右用神麴糊為丸梧桐子大每服五七十九

白湯下

十將軍丸 又瘡有瘡母不瘥或腹疼

三稜去毛土炒 蓬木生用 青皮去白 橘紅各一兩 草菓去壳

常山各二兩 砂仁 栝柳 烏梅 半夏泡各一兩

右先將常山草菓二味剉好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸至晚炭火煮乾取出晒如無日色用火焙乾為末酒醋各半打糊為丸如梧桐子大每服三四十九白湯吞下日進三服忌生冷魚腥醃酸油膩麪諸死毒物服四兩或八兩乃除根凡有積聚及行瘴濕地方並宜服

小兒瘧疾痞塊

生地 白芍錢各一 陳皮 川芎

黃芩 半夏錢各一 粉草分二 姜水煎調驚甲末服

瘧脹

秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少俗謂

瘧氣入腹宜蒼朮湯主之 蒼朮兩四 草烏頭錢二

杏仁個三十 右分作三服水煎一日服盡愈

產後瘧

草菓飲子 產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作天

法宜柴胡四物湯調之熱多者宜服此

半夏泡 赤茯苓 草菓煨去皮 甘草炙 陳皮 川

芎 白芷各一分 鐵紫蘇 良姜 青皮各六分

乾姜二錢四分 右分作二帖姜五片棗二枚

當發日空心連進三服無不愈者

生熟飲子 治寒多者 肉豆蔻 草菓仁 厚

朴 半夏 陳皮 甘草 大棗核去 生姜錢各二

右以一半以濕紙裹煨香熟和勻一半生用

和勻分作二帖水煎空心一服食後一服二

渣并煎午前服盡

○彭用光治瘧活套

如連日或間日惡寒發熱頭項腰背痛此太陽經

二陳加柴胡羌活藁本防風

如連日或間日先寒後熱或寒少熱多或但熱不

寒目痛鼻乾此陽明經二陳加葛根升麻石膏

知母白芷

如連日或間日先寒後熱或寒熱間作脇痛口苦

嘔惡此少陽經二陳加柴胡黃芩青皮

如子午卯酉日發寒熱嘔吐舌乾口燥此少陰瘧

二陳加當歸川芎黃柏黃連柴胡

如辰戌丑未日發寒熱嘔吐不嗜食或腹滿自利

此太陰瘧二陳加蒼朮白朮柴胡芍藥

如寅申巳亥日惡寒發熱寒多熱少或腹痛引陰

器如淋狀善恐此厥陰瘧二陳加桂枝附子乾

姜柴胡升麻

三陽之瘧宜汗宜吐麻黃葛根柴胡常山草菓烏

毒之屬

三陰之瘧宜下宜溫宜和木柴胡湯柴胡桂姜湯

柴胡四物湯附子理中湯加升麻柴胡之類

○泄痢

生生子曰仲景河澗東垣諸公多以泄痢混同論治究其源皆本之於難經五十七難五泄中來云小腸泄大瘕泄即是腸癰膿血也故治法亦多相須但初學之士未易尋繹故予不揣庸腐芟繁入簡以經文列之於前而諸賢次之以見古人著方立法之意然後發明泄痢形狀而以丹溪之見拆而衷之仍分泄痢為二門初不敢

遽分者以其有先痢而後泄有先泄而後痢有痢不因泄有泄不因痢治有次第症有輕重也以古論不可分者為綱以今之名症者為目使後學易以辨別而難治之症亦得以備參考也難經云有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重

○保命集曰胃泄者飲食不化色黃以承氣湯下之脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆建中理中湯主之大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛乾姜附子湯主之

腸泄者，澁而便膿血，少腹痛。承氣湯大瘕泄者，裏急後重，數至圜而不能便，莖中痛。胃大小腸涼，飲子主之，其泄自止。以陰症重，加大黃。滑伯仁曰：瘕結也，謂因有凝結而成者也。裏急，謂腹內急迫，後重，謂肛門下墜，惟其裏急後重，故數至圜而不能便，莖中痛者，小便亦不利也。

出難經本義

謝堅白曰：小腸大瘕，二泄。今所謂痢疾也。內經曰：腸澼，故下利赤白者，多小腸俞是也。穴在第十

六椎下兩傍各一寸五分，累驗。出難經本義

四明陳氏曰：胃泄，即飧泄也；脾泄，即濡泄也；大腸泄，即洞泄也；小腸泄，謂凡泄則小便先下而便血，即血泄也；大瘕泄，即腸澼也。

靈樞經曰：腸中寒，即腸鳴飧泄；腸中熱，即出黃如糜。脉要精微論曰：胃脉虛則泄。

仲景曰：大腸有寒者，多鶩溏；有熱者，便腸垢。有痢脉微弱數者，為欲自止，雖發熱不死。有痢脉數而渴，有微熱而渴，脉弱者，亦自愈。下痢脉數而渴。

者合自愈設不愈必清膿血以有熱故也
痢脉數有微熱汗出合自愈設脉緊為未解
下痢脉反弦身熱汗者自愈
下痢脉沉而遲
其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗
出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛
故也
下痢脉沉弦者下重
下痢寸口反浮
數尺中自瀉者必清膿
瘦病若腹大而泄者
脉當細微而瀉反緊大而實者死
下痢脉大
者為不止
下痢一日十餘行脉反實者死

素問云泄而脉大難治 病泄脉洪大是逆也
靈樞云飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足
溫易已 腹鳴而滿四肢清泄其脉大是逆也
如是者不過十五日死矣 腹大脹四末清脫
形泄甚是逆也如是者不及一時死矣
經云五虛者死脉細皮寒氣少泄痢前後飲食不
入此謂五虛其漿粥入胃泄注止則虛者活丹
溪嘗謂治數人在下則泄瀉不止上則吐痰不
已皆死蓋氣脫無所管攝故也若用參朮膏救

之早者十活二三

病機要云臟腑瀉痢其症亦多太抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久瀉非陽論曰春宜緩形動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則殮泄身熱脉洪穀不能化重則下利膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經云溲而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為

重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故曰春傷於風夏必殮泄此逆四時之氣人所自為也血下節謂熱泄而有自太陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法曰宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則訶子湯又則防變為膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後瀉謂之微邪故易安此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能逃口

食味真食氣從鼻而入留積於脾而為水泄也

此下節濕泄所謂泄瀉也

有厥陰經動下利不止其脉沉而遲手足厥逆涕

唾膿血此証難治宜麻黃小續命湯汗之法云

為有表邪縮於內當散之而自愈此下節風泄所謂冬泄也

有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難

布息脉遲嘔吐急以重藥溫之漿水散是也

此下節寒泄所謂暴泄也

故法云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉

弦則去風血膿稠粘以重藥竭之身冷自汗以

毒藥溫之風邪內縮汗之驚澹為痢溫之又云

在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者

竭之身表熱者內疎之小便瀉者分利之又曰

盛者和之去者送之過者止之兵法云避其來

銳擊其惰歸此之謂也

凡病泄而惡寒是太陰傳少陰是土來尅水也用

除濕白朮茯苓安脾白芍藥桂枝黃連破血也

火邪不能勝水太陰不能傳少陰而反火邪上

乘肺經而痢必白膿也加芍藥當歸之類
又裏急後重脉大而洪實為裏實痛甚者是有物
結墜也宜下之若脉浮大甚不宜下
雖裏急後重而脉沉細弱者謂寒邪在內而氣散
也可溫養而自愈 裏急後重閉者太腸經氣
不宜通也宜加枳榔木香宜通其氣 如痢或
泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生姜
橘皮中焦不和治以當歸茯苓桂下焦寒不和
治以輕熱藥甚者重熱藥 天使虛秘瀦久不

愈恐太陰傳少陰多傳變為痢太陰傳少陰是
為賊邪先以枳實厚朴湯以防其變若四肢懶
倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃
去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服以白朮之甘
能入胃而除脾胃之濕芍藥之酸瀦除胃中之
濕熱四肢沉困茯苓之淡泄能通水道走濕此
三味泄痢須用此 如發熱惡寒腹不痛加黃
芩為主如未見膿而惡寒乃太陰發傳少陰也
加黃連為主桂枝之如腹痛甚者加當歸倍芍

赤火六味

卷

二五

藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如煩躁
或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃芩不止
上部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不
能除下部血也如惡寒脈沉或腰痛或臍下
痛非黃連不除此中部血也如便膿血相雜
而脈浮大慎不可以大黃下之必死謂氣
下竭也而陽無所收凡陰陽不和惟以分陰陽
藥治之
又云暴泄非陰又泄非陽天使完穀下有熱者脈

疾身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脈沉而細
身困鼻息微薑附湯主之身重不樂木附湯主
之渴引飲者是熱在膈上水多入則自胃膈
入胃中胃本無熱因不勝其水名曰水恣胃受
水攻故水穀一時下此証當灸太椎三五壯立
已乃腎脈瀉也如用藥使車前子白朮茯苓之
類五苓散亦可
又有寒泄者大腹滿而泄又有驚漉瀉者是寒
泄也驚者鴨也大使如水其中有少結糞者是

也如此者當用天麻附子乾姜之類

又法曰泄有虛實寒熱虛則無力不及拈衣未便已泄出謂不能禁固也實則數至圓而不便俗云虛坐努責是也裏急後重皆依前法進退木承氣湯主之

按已上述泄利寒熱虛實脈証輕重治法極為詳悉最當深玩

○泄痢辨

丹溪云泄瀉之症水穀或化或不化並無努責惟

覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆無裏急後重逼迫惱久

○泄瀉門

生生子曰泄瀉要分新久時令寒熱虛實及飲食痰積數者

內經曰濕勝則濡泄甲乙經云氣客下焦傳為濡泄羅太無曰夫脾者五臟之至陰惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀

致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水
隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便治之以
對金飲子平胃散五錢五苓散二錢五分草
葶藶麩煨五錢右分二服姜東同煎
出濟世方名對金飲子

王叔和云濕多成五泄

生生子曰新泄瀉多是濕治濕瀉之法宜燥脾利
水胃苓湯五苓散之類胃中氣下快心不痞
氣加枳殼木香如有痰加半夏如惡心加

藿香砂仁如腫滿加桑白皮赤小豆有熱

加黃芩木通滑石之類減桂有寒加高良姜

乾姜桂心之類稍久不止者東垣升陽滲濕

湯或蒼朮防風湯用風藥者謂風能勝濕也若飲食所

傷以平胃散加消導之劑

久泄多是積劉河間云有太陰陽明二症當進退

大承氣湯主之既久泄矣而又以承氣湯下之非常法可效故用此推陳致新不可姑息也

太陰症不能食也當先補而後瀉乃進藥法也先

煎厚朴半兩俱依本方加減水一盞半煎七分服若三兩服後未已如稍加食尚有熱毒加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止謂腸胃有塵垢滑粘加芒硝三錢令宿垢去盡則愈也

陽明症能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣湯五錢水一盞半煎七分稍熱服如泄未止去芒硝後熱稍退減大黃一半煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃以枳實厚朴湯服三兩服如腹脹滿退泄亦自愈後服

厚朴湯數服則已

仲景云下痢已瘥至其月日又復發者以其積去不盡故也當下之以大承氣湯此熱積寒下也本方治痼冷在腸胃間頻年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不効宜先取去積滯然後調治不可畏藥以養病也

厚朴丸 厚朴 乾姜 甘草 桂心 附子
錢二 大黃 生細切水一盞浸 右水二碗煎八分後下大黃汁再煎六合溫服自夜至曉分

三服之盡止或更以乾姜九枚

乾姜九 乾姜 巴菝去心殼研 大黃 人參各

兩 右為末同巴菝研勻加煉蜜為丸如梧桐子

大食前用湯吞下一丸陳米飲吞亦可後服

白朮散

白朮散 推後以此溫補之 白朮 木香

附子 人參各等分 右為末每服二錢生姜三

片棗一枚煎六分溫服

痰積泄瀉 海石 青黛 黃芩 神麴 半夏

麴霞天膏造 右為丸每服三五十丸

君積滯泄瀉必腹中耕痛痛而泄泄而痛止者是

也或肚滿按之堅者亦是也受病淺者以保和

丸等消導之深而頑者必須推去陳積然後乃

實脾固腸丸 泄瀉月久不止及脾泄無度者

白朮陳土炒 粟殼去膜密 蒼朮米泔浸 厚朴姜製

陳皮各一兩 人參 炮乾姜 炙甘草 茯苓

各二兩 肉蓯煨 訶子去核各 砂仁一兩 酒糊為丸

梧桐子大每服七十丸空心米湯下虛寒加

附子一錢滑脫不禁加龍骨赤石脂俱煨

殄泄素問云清氣在下則生殄泄又云春傷於風

夏必殄泄又云久風為殄泄

劉河間曰殄泄者乃水穀不化而完出因水入胃

亦非前水恣症也先以宣風散導之出錢氏方中四味者

是也

後服蒼朮防風湯蒼朮 蒼朮去皮四兩 麻黃去根節四兩 防風

去聲 右為粗末每服一兩生薑七片水二盞前

至一盞溫服泄止後服椒朮丸

椒朮丸 蒼朮兩二 川椒一目炒 為極細末醋糊為

丸如梧桐子大每服三十九食前溫湯下

如惡痢久不愈者痛佳小兒亦佳

東垣曰殄泄是清氣在下乃胃氣不升上古聖人

皆以升浮藥扶持胃氣下服而愈知病在中焦

脾胃也脉訣曰濕多成泄病本在胃真氣弱真

氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕盛故也以此

論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絕不食

一二日使胃氣日勝泄不作也今已成木泄矣

經云治濕不利小便非其治也又云在下者引而竭之惟此症不然此病既得之於胃氣下流清氣不升陽道不行只宜升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一卦而認故曰胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風以勝尅之又是升陽氣助清氣上行之法也又一說中

焦元氣不足溲便為之變腸為之苦鳴亦緣胃氣不升故令甲氣上行又云風勝濕也木抵此症本謂氣弱不能化食奪食則一日而可止矣奪食之理為胃弱不能尅化食則為泄如食不下何以作泄更當以藥滋養元氣令和候泄止漸與食胃勝則安矣若食不化者於升陽風藥內加炒麩同煎煎食入頓至心頭者胃之止也必吐沫沫或食入反出皆胃土停寒其右手關脉中弦按之洪緩是風熱濕相合穀氣不行

清氣不升為弦脉之寒所隔故不下也麴之熱亦能去之若翻胃者更加半夏生姜入前風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑太則胃氣不勝藥泄亦不正當漸漸與之今病既久已至衰弱當以常法治之不可多服餌也入之肌肉如地之土豈可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦人有必死者八內經有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療之宜先奪食而益氣便與升陽先助

真氣次用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此治之上法也治用升陽除濕湯類車前子散 治水瀉不止以車前子炒為末米飲

調下二錢立止

若秋夏之間濕熱大行暴注水泄共以益元散治之或五苓散加木通口渴者加葛根黃芩芍藥若胸膈飽悶腹中作脹以胃苓湯治之 又瀉暴而不止者以止泄丸治之

止泄丸

肉苳菟

兩五

滑石 飛

右為末搗飯丸

惟滑石夏三兩五錢秋二兩春冬一兩二錢
升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食泄瀉無度
小便黃四肢困倦自下而上引而去之

升麻 防風 柴胡 羌活 神麩 澤瀉
猪苓 陳皮 各五分 甘草 炙麥芽 各三分 右水煎

食遠服 如胃寒腸鳴加益智半夏各五分
姜束同煎非腸鳴不用

白朮芍藥湯 潔古治太陰脾經受濕水瀉注下
躄重微滿困弱無力不飲食暴泄無數水穀不

化先宜白朮芍藥湯 白朮 芍藥 各一兩 粉草
錢五 俱要炒黃効速分作二服水煎溫服腹疼甚
者宜蒼朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯 治水瀉腹疼并治痢 蒼朮 芍
藥 各一兩 黃芩 錢五 桂 一分 分二服水煎溫服

脈弦頭疼者宜蒼朮防風湯
蒼朮防風湯 治水泄飧泄脈弦頭疼皆効

蒼朮 五錢 防風 五錢 水煎溫服
已上症如心下痞每服加枳實一錢 如小便