


調經門

婦人大全良方一



新編婦人大全良方卷之一

新編婦人大全良方卷之一

醫學臨川陳自明

良甫編註

調經門

凡醫婦人先須調經故以為初

月經序論第一



岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸
至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真之氣
降癸謂壬癸水名故云天癸也然衝為血海任主
胞胎腎氣全盛二脈流通經血漸盈應時而下所
以謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月
盈則虧也若遇經脈行時最宜謹於將理將理失
宜似產後一般受病輕為宿疾重可死矣蓋被驚
則血氣錯亂經脈斬然不行逆於身則為血分勞

瘵等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛之根若
患怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿則遇經行時
腰腿痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足
之間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有
眼暈脇痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於
其間遂成竅穴淋瀝無有已也凡此之時中風則
病風感冷則病冷久而不愈更證百出不可言者
所謂犯時微若秋毫感病重如山岳可不畏哉

精血篇第二

光祿大夫褚澄遺書

飲食五味養髓骨肉肌膚毛髮男子為陽陽中必
有陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精
溢女子為陰陰中必有陽陽中之數七故一七而

陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實秀也方
其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑筋弱者強
暨其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針芥之歷
無有不下凡子私肖父母者以其精血嘗於父母
之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖
其父母一目虧則子一目不肖其母然雌鳥牝獸
無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未
通而御女以通其精則五體有不满之處異日有
難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而
內敗小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小
便道牽疼愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天
癸既至踰十年無男子存則不調未踰十年思男

子宮亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而之腫或雖合而難子宮男子多則澀枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣
大率治病先論其所主是子宮調其氣女子調其血氣血入之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宜行其神自清而謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相刑月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調變之常其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食既不充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏冷熱久而勞

損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃瘀血涸不流而搏腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後夾期雖通而或多或少或寡或病之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於下

月水不調方論第五

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之

氣乘也若風冷之氣各於胞內傷於衝任之脈損
手太陽少陰之經衝任之脈皆起於胞內為經絡
之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經
為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡
之餘若冷熱調和則衝脈任脈氣盛太陽少陰可
平生之血宜流依時而下若寒溫乘適經脈則虛若
有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結
溫則血消故月水乍多乍少故為不調也

紫石英圓

出本
車方

治婦人病多是月經乍多乍少或

前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是
陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝
陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝

成冰故在乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散
溢經所謂天暑地熱經水沸溢故在乍多而在月
前當和陰陽調其氣血使不相勝以平為福

紫石英

禹餘糧

人參

龍骨

川烏

官桂

桑寄生

杜仲

五味子

遠志

澤瀉

當歸

石斛

茯苓

乾薑 各一兩

川椒

牡蛎

甘草 各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三五十圓
空心米飲吞下 指迷方同

加減吳茱萸湯

治衝任衰弱月候愆期或前或後

或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脈行時
頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之
張出

氏
治
白
茯苓
三
時
而
其
草
三
去
當
歸
半
兩

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

右
吹
咀
每
服
四
大
錢
水
一
盞
半
生
姜
三
片
棗
子

論
一
枚
煎
至
七
分
去
滓
空
心
溫
服

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

右
吹
咀
每
服
四
大
錢
水
一
盞
半
生
姜
三
片
棗
子

論
一
枚
煎
至
七
分
去
滓
空
心
溫
服

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

右
吹
咀
每
服
四
大
錢
水
一
盞
半
生
姜
三
片
棗
子

論
一
枚
煎
至
七
分
去
滓
空
心
溫
服

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

右
吹
咀
每
服
四
大
錢
水
一
盞
半
生
姜
三
片
棗
子

論
一
枚
煎
至
七
分
去
滓
空
心
溫
服

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

右
吹
咀
每
服
四
大
錢
水
一
盞
半
生
姜
三
片
棗
子

論
一
枚
煎
至
七
分
去
滓
空
心
溫
服

治
婦
人
室
女
經
脈
不
調
胸
腹
冷
痛
惡
心
腹
常
脹
滿

至
晚
則
增
至
服
小
烏
沉
湯
吞
下
艾
煎
圓
局
見
和
劑
方

薑黃湯

治血臟久冷月水不調臍腹刺痛婦人專治

川姜黃成四片 蓬莪朮 紅花

桂心 川芎各一兩 延胡索

牡丹皮 當歸各二兩 白芍藥三兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分

熱服

桃仁散

治婦人月水不調或淋瀝不斷後復來

狀如瀉水四體虛弱不能飲食腹中堅痛不可行

動月水或前或後或經月不來舉身沉重唯欲眠

睡多思酸物

桃仁 枳實

赤芍藥 生地黃各三兩 澤蘭葉

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎

各二兩

右為粗末每服五大錢水盞生姜五片煎七方

空心去滓溫服

月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令體虛受風
冷邪氣客於胞內傷損衝任之脈并手太陽少陰
之經致胞絡內血絕不通故也衝任之脈起於胞
內為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之
經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水風冷
傷其經血血性得溫則宣流得寒則澁閉既為風

冷所搏血結於內故令月水不通也又云腸中鳴

則月水不來病本在胃胃氣虛不能消化水穀使

津液不生血氣故也所以梅師方單用厚朴又云

醉後入房則內氣竭絕傷於肝使月水衰少不來

所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也

又先唾血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月

水不來也所以爾者津液耗故也但益津液其

經自下也診於腎脈微澁者是月水不通也又左

手關後尺內浮為陽絕無膀胱脈也月水則閉又

肝脈沉而急隱之亦然時小便難苦頭眩痛腰脊

痛足寒時疼月水不來時恐得之時有所墮墜也

月水不通久則血結於內生塊瘕為血瘕亦作血

水下恐脫水字

癥血水相并壅滯不通脾胃虛弱為水腫也所
以然者脾候身之肌肉象於土土主剋消於水
血既并脾氣衰弱不能剋消故水气流溢浸漬肌
肉故腫滿也

產寶方論

論曰經脈不通日久此非細事實為沉病若是室
女經脈不通初因貧食酸鹹之物遂致血脈乾涸
變成勞疾若因經脈正行誤食熱麪生冷房室遂
成此疾腹內顆塊誤認為胎時日稍深必見困篤

養生必用論經病第七

初虞世云女子十四天癸至任脈通月事以時下
故令有子天癸者物之自然月者以月至經者有

常也其未不可過與不及多與少及此皆謂之病
不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落
面黃身羸瘦血虛則發熱故身多熱水不足則燥
氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則為
肺癰肺痿必矣匠見經不行則用蠶虫水蛭等行
血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄意就中不行
以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋養其能
行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖挂楚並下不可
得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種
婦人盛實月經瘀閉利之則行自有證候學者宜
審焉

當歸散

治血脈不通

當歸

川山甲 灰炒

蒲黃

各半 兩炒

辰砂 一錢

麝香 少許

右為細末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒

薄苛醋湯亦可

琥珀散

治心膈迷悶腹臑痛氣急氣悶月信不

通等疾

天台烏藥 二兩

當歸

莪朮

各一

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之

大忌生冷油膩等物若產後諸疾用炒姜酒調

下已上出方婦

救急瘴婦人月經不調或一月不來或隔月不來

或多或少臍下絞痛面色痿黃四肢虛吸羸瘦不

能食方

當歸

川牛膝

牡丹皮

桃仁 各一 兩半

大黃

芍藥

土瓜根

芍藥

朴硝

桂心

蛭虫 足翅

水蛭 各半 兩炒

右吹咀以水九升煮取三升分溫五服忌如常

法

療月經不通腹中痛

見產室方

牛膝 六分

大黃

桃仁 雙皮尖

細辛 各五分

川芎

當歸 各四分

水蛭 三分 炒黃

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心

温酒下

梅下恐有師字治月水不通已出試梅方

厚朴香細切不以多少濃煎去滓空心温服

治婦人經候不來數月臍腹疼痛或有一塊上下

相柱飲食減少腸滿惡心大便如泣者宜服局方

北亭圓用石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十圓兩

服必通

萬病圓治女人月經瘀閉月候不來繞臍寒疝痛

微及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及瘕瘕

等病

乾漆杵碎炒令大相出相久相牛膝去苗酒浸一

右為末以生地黄汁一升入二味藥末銀石器

內慢火熬俟可圓即圓如梧桐子大空心未飲

或温酒下二圓日再勿妄加病去止藥

紅花當歸散

治婦人血藏虛竭或積瘀血經候不

行或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊

硬及室女月經不通並宜服之

紅花

當歸尾

牛膝

甘草

紫葳

白芷

桂心各半

蘇木槌碎細

劉寄奴去根

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服

若血久不行濃煎紅花酒調下孕婦休服一名

凌霄花散

驚甲圓 治婦人月經不調肌肉黃痺脇下積氣結
硬時發刺痛漸成勞狀 出博濟方

驚甲 醋去 桂心 三稜 醋煮

牡丹皮 去苗 訶子肉

琥珀 煨 土瓜根

桃仁 仁去 皮尖 雙

右各等分為細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁

湯送下十五圓破血癥氣塊尤妙 博濟方

桃仁煎 治月水不調阻滯不通 博濟方

大黃 炮 朴硝 桃仁 仁去 皮尖 雙

右二 右為末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏候

以溫酒吞下一圓至明日午際取下如赤豆汁

或似雞肝蝦蟇衣其病下了即一圓方作二服

未下再服候鮮紅即住服仍以調氣湯散補之

室女月水不通方論第八

論曰夫衝任之脈起於胞內為經脈之海手太陽

小腸之經手少陰心之經也二經為表裏心主於

血上為乳汁下為月水也女子十四而天癸至腎

氣全盛衝任流通經血既盈應時而下名之月水

常以三旬而一見謂之平和也若愆期者由勞傷

血氣壅結故令月水不通也

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃 煨

川椒 荻茂 川烏 皮地 去

乾漆 碎之炒 當歸 桃仁 仁殼 炒 雙

乾姜 各等 乾姜 各等

右為細末分為四方用一方以米醋熬成膏和

未餘分藥末成劑白中治之圓如梧桐子大眼乾

每服二十圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空

心食前服

治室女月水不通 魁方 雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下

一錢神效

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不

先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過

當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉

何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血

逆竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能

榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故痰嗽

既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦

筋痿候三臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一

種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期

藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如

此則可得九生一生舉此為例其餘諸勞可按脉

與證而治之 ○張氏云室女月水久不行切不可

九生之生恐死誤

用青蒿等涼藥醫家多以為室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脈微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火通水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥通之宜栝子仁圓澤蘭湯

栝子仁圓

栝子仁

炒研

牛膝

各二兩

卷柏

各二兩

煎服

澤蘭葉

續斷

熟地

黃

三兩

右為細末煉蜜圓

如栝子

大空心

飲

三十

丸

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

當歸

芍藥

各二兩

煎服

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水二觔煎至一觔去滓溫服

沉香釐甲散

博濟方

治室女弟衛不調經候凝滯

或時頭目昏悶上膈積涎肢體不利五心虛煩飲食進退多困少力

沉香

一兩

甘草

炙

檀榔

各三

水香

一兩

釐甲

半兩

常山

當歸

一兩

柴胡

一兩

人參

一兩

半夏

一兩

桂心

一兩

生地黃

一兩

白茯苓

青皮

陳皮各一

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分溫服空心日三服

金花散

治室女骨蒸熱勞

零陵香 延胡索

芍藥

白芷

川芎

當歸

桂心

蓮子心

晚蠶蛾

方一

右為細末溫酒調下一錢日二服

切勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰過夜發熱

熱過即有時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽

有噎唾中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黃

五味子

阿膠各二兩 炒

右吹咀每服三大錢水煎半生薑十二片棗三

箇煎至九分無時溫服日進三服○陳總領

羊云鄉人揚元鼎女及笄病證甚危一歲之間

百藥但試無有效者亦嘗從子求治法無有應

之者偶遇名醫得此方只一料遂除根專錄此

方傳人

資血湯

治婦人血熱氣虛絃候澁滯不通至使血
聚肢體麻木渾身疼痛煩倦或室女年及經脈未
行日漸黃瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等
藥它日為患也若是前證則增寒發熱五心煩躁
飲食減少宜服此藥滋養而通利之

馬鞭草

荆芥穗

挂心

枳殼

川芎

當歸

赤芍藥

牡丹皮

右為粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至

一盞去滓空心食前日四服有此證服至半月

經脈自通此方至妙不可輕視非一二服便見

持達之效而鄙之仍服後素存諸疾因此藥皆

去矣

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢心

胸煩壅

鳖甲

大黃

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆

生地黄

石膏

甘草

右為細末每服二錢水盞小麦五十粒煎至

六分食後臨卧時温服有虛汗加麻黃根一兩

此黃州吳判官方治骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗

極效麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍

其效可知

蟹煎圓

治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸尸注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無力肌肉不生婦人血蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣塊腹痛經脈不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等疾無不效驗

黃耆

知母

人參

升麻

杏仁

羌活

安息香

明者同胡

紫胡

白茯苓

附子

肉桂

當歸

京三稜

胡

枳殼

沉香

木香

胡黃連

常山

烏梅肉

右十九味俟製了各秤一兩為末用活蟹一箇

重十兩或半斤者以河水養七日須逐日換新

水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢

火熬百沸先更入挑柳枝東南土者各剉三合

烏梅五十箇拍破此三味用綿裹同蟹前煮至

一半去挑柳枝等三味蟹爛取去將肉研如膏

骨併殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入

酒少許在此臨時斟酌盛放瓷器中搜和前藥

入臼中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人十五

歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荊芥酒

下所煮膏子須喫動多少勿令剩却但少些子

不妨却別熬酒若膏剩恐蟹不全故也凡服此

藥恐熱三日更復服八僂飲子一服解之

八僂飲子

常山五斤白朮至白朮芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

或取洪州鬼印赤芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

或取紫蘇芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

右等分洗淨為粗末每服半兩水一盞烏梅肉

二介葱白薤白挑柳槐枝各七寸同煎至一盞

去滓溫服滓併煎陳皮一箇

茅香飲子治女子經脈不行胸膈滿悶身體麻木

或有寒熱證候陳皮一箇

厚朴芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

藿香芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

牡丹皮芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

生薑芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

蒼朮芍藥赤芍藥干姜甘草陳皮一箇

右吹咀每服半兩水一大盞薑三片煎服熱甚

加北柴胡三錢半陳皮一箇

血枯方論第十陳皮一箇

出胎竟吉方陳皮一箇

腹中論曰有病胃腸支滿者妨於食病至則先聞

腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血

病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入

房中氣竭肝傷故月事衰少不來也註云夫藏血

受天一之氣以為滋榮者也其經上貫膈布脇肋

今脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胃腸滿

以經給所貫然也妨於食則以肝病傳脾胃病至

則先聞腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之先唾
血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也
治婦人血枯胸膈四肢滿妨於食飲病至聞腥臊
臭氣先唾血出清液或前後泄血目眩轉月事衰
少不來

烏賊魚骨圓

烏賊魚骨

右為末以雀卵和成劑圓如小豆大每服五圓

從蓉圓

治婦人腎腸支滿聞腥臊氣唾血目眩不
能飲食泄血不已日久血枯

從蓉酒浸

熟地黄

白茯苓

鬼絲子

附子炮

當歸炒

白石英

五味子

烏餘糧

烏賊魚骨

參

參

右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二三十圓
米湯亦可空心日中臨卧各一服

乾地黄湯

治婦人先有巧脫血或醉入房勞傷故
月事衰少不來

乾地黄

澤蘭葉

白茯苓

人參

五味子

附子炮

烏餘糧

當歸

右等分為粗末每服三錢姜五片水一盞煎至
七分空心溫服

磁石圓

治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石 礬石 白茯苓 附子 地黃

右各一兩為細末煉蜜圓如梧桐子大酒三

少下十圓米湯亦可空心日中臨各百服

月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受

風冷客於胞內損傷衝任之脈午太陽少陰之經

故也衝任之脈為經脈之海皆起於胞內午太陽

小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下

為月水風冷客於經絡搏於血氣血得冷則壅滯

故令月水來不宜利也診其脈寸口弦若腹痛主

經水不利孔竅生瘡又肝脈沉是厥陰經也沉為

陰主月水不利腰腹痛名脈滑血氣實經絡不利

又尺脈來而斷絕者月水不利也寸關調如故而

尺脈絕不至者月水不利也當患小腹引腰痛氣

滯上攻胸膈也

白微圓 治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸

覺虛乏故令無子

白薇 栝子仁 白芍藥

當歸 桂心 附子

草薢 白朮 吳茱萸

木香 細辛 川芎

檳榔 熟地黃 牡丹皮

各半

兩

兩

兩

紫石英 兩各一

白茯苓

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓

空心晚食前溫酒吞下

療女人膝下慙逆氣脹滿月經不利血氣上攻欲

嘔不得睡

當歸 乾漆 三錢 炒 煙 盡

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十

五圓

牡丹散

治婦人月水不利膈腹疼痛不欲飲食而

蘇生 地黃 黃連 枳實 桃仁 黃芩 芍藥 當歸

桂心

赤芍藥

白朮 各三

右石菖蒲 去毛

木香 各半

右吹咀每服三大錢水一盞薑三片煎七分去

滓空心溫服

牛膝散

治婦人月水不利膈腹疼痛

牛膝 一兩

蟪桂心

赤芍藥

批仁

延胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香 各三

右為末每服方寸匕溫酒調下食前

月水行或不行心腹刺痛方論第十二

論曰夫婦人月經未腹痛者由勞傷氣血致令體虛風冷之氣客於胞絡損於衝任之脈手太陽少

陰之經衝脈任脈皆起於胞內為經脈之海也手
 太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏
 主下為月水其經血虛則受風冷故月水將行之
 際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也亦
 就第五論尋方
 若經道不通統膺寒疝痛微其脈沉緊此由寒氣
 容於血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故
 血相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝成冰宜溫
 經湯及桂枝桃仁湯萬病圓方見第一
 溫經湯

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 莪茂各兩

人參 甘草 牛膝各一
 右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝桃仁湯

桂枝 芍藥 生地黃各二
 桃仁製五 甘草一兩
 右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一箇煎至一盞去滓溫服

若經候頓然不行臍腹疼痛上攻心脇欲死或因
 不行結積漸漸成塊臍下如覆杯久成肉瘕不可
 復治由驚恐憂思意所不決氣鬱抑而不舒則乘
 於血血隨氣行滯則血結以氣主先之血主後之

宜服桂枝桃仁湯不瘥宜地黄通經圓已成塊者
宜萬病圓前見

地黄通經圓

熟地黄三兩 蜜三兩 桃仁十枚 杏仁十枚 水蛭炒用 糯米可

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下五

圓末知加至七圓此藥每發心腹臍疼痛不可

琥珀散治婦人月經壅滯每發心腹臍疼痛不可
忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕
欲死出本方

三稜 莪茂 牡丹皮 劉寄奴 赤芍藥 當歸

熟地黄 真蒲黃炒各一兩 桂心 其菊花

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片末醋四
升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每

服三錢空心食前溫酒調下○一方不用菊花
蒲黃却用烏藥延胡索亦佳予家之秘方也○

若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便
下常服尤佳前後救人急切不少此藥易合宜

多合以救人烏豆一升約用五兩

又一方 延胡索 當歸各等

右二味為粗末每服三錢姜三片水一大盞煎
至七分去滓稍熟服○陳氏方有桂名如神湯

最治腰痛○雷公炮灸論只用延胡索一味治心
痛○僕詳此方大能治血氣腰腹痛藥簡功專治
疾有效

草捲圓

治婦人無時月水來腹痛

下

草捲鹽炒

蒲黃兩各炒

右為細末

煉蜜圓如梧桐子大每服三四圓

食後用鹽米飲吞下

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脈虛損故

也衝任之脈為經脈之海手太陽小腸之經也手

少陰心之經也此二經為表裏主下為月水若勞

傷經脈衝任氣虛故不能制經血令月水不斷也

凡月水不止而合陰陽則冷氣上入於臟令人身

體面目痿黃亦令絕子不產也

牡丹圓若結候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛

其脈沉細此因寒熱邪氣容於胞中衝任不調此

非虛弱蓋邪氣伏留滯於血海譬如積之人下

利不定有所去即愈

牡丹皮
大黃蒸
茯苓
吳茱萸
川芎
乾薑兩各半

牡丹皮
附子炮

葶藶炒
苦楝

當歸
製厚朴

川椒炒出
人參

北柴胡
桂心

細辛半兩
黃虫頭五足十箇炒去

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十圓未知漸加至二十圓以知為度
續斷圓 治婦人月水不斲口乾心煩四肢羸瘦飲食無味漸加之弱

川續斷

當歸

烏賊骨

黃耆

牛角鯁燒

五味子

甘草

龍骨煨研

赤石脂

熟地黃

地榆

艾葉

附子

乾薑

川芎

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前

溫酒下

禹餘糧圓

治婦人久冷月水不斲面色痿黃四肢

瘦弱心神虛煩飲食減少

禹餘糧

鹿角膠

紫石英

續斷

赤石脂

熟地黃

川芎

乾姜

黃耆

艾葉

栝葉炒

當歸炒

人參

白茯苓

兩各半

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心米飲下

牡蛎圓

治婦人血海虛損月水不斲

牡蛎粉

赤石脂

代赭石

阿膠

川芎

當歸

鹿茸

續斷

乾姜

兩各一

各三

甘草 一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前
温酒下

療經血不止

黃芩 五分

當歸

柏葉

蒲黃

各四分

生姜

二分

艾葉

四分

生地黄 四分

伏龍肝

一分

右吹咀用水二升煎取八合分為二服

療經血不止

詩曰 出婦人經驗方已試有效

婦人經血正淋漓

舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字自然安藥更無疑

又一方

藥疑集誤

蓮蓬殼

拒霜苞

右二味等分為末每服二錢空心米飲調服

婦人殺血心痛方論第十四

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多
而心痛甚者亦然

烏賊魚墨炒醋湯調下

此莫腹內有墨汁過見人過必吐其墨以

身蔽其

崩暴下血不止方論第十五

論曰支婦人崩中者由臟腑傷損衝脈任脈血氣
俱虛故也衝任之脈為經脈之海血氣之行外循
經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調
適經下依時若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之

氣虛不能約制其經血故忽然暴下謂之崩中暴下診其寸口脈微遲尺脈微絃寸口脈微遲為寒在上焦但吐爾今尺脈微絃如此即小腹痛引腰背痛者必下血也若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則煩甚者至於昏悶其脈數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則流散暑地熱則經水沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿加陀圓

小薊湯

小薊莖葉

洗一切所取汁

生地黃汁 一盞

白朮

剉

右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

阿加陀圓

胡椒

紫擅

鬱金

茜根

小蘗皮

乃山石榴皮也

右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下二圓

琥珀散 治崩暴下血

陳總領方

赤芍藥

香附子

荷葉

男子髮

皂莢洗

當歸

棕櫚

烏紗帽

是氣

紗頭巾取

炒焦

右等方除棕外其餘並切麤片新瓦上煨成黑炭存性三分為細末每服三五錢空心童子小

便調下如人行十里再進一服不過七八服即止如產後血去多加米醋京墨麝少許親戚黃守正鄉為和劑局日丙子凌夫人忽苦此疾危殆百藥不效偶得此方旋即安愈張聲道云大字治血崩先用此譬如治痢有積不先去之徒服新下藥一時暫止久則毒氣愈深甚至危殆血崩乃經脈錯亂不循故道滲溢妄行一二日不止便有積瘀之血凝成窠臼更以藥滋住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投一二服次服靈脂散及順氣藥去故生新自能平治此切當之說

五靈脂散

治婦人血山崩及治丈夫脾積氣 張

氏云治血崩諸藥不能止者妙

好五靈脂炒令為末每服一錢溫酒調下此藥

兼能解菜毒及蛇蝎蜈蚣咬塗傷處立愈

方每服三錢水酒童便各半盞煎至八分通口

服名抽刀散治產後

有病服三服散惡血或心腹脇肋脚痛不可忍

者或只用童子小便尤佳或中風即入草烏頭

半錢重同煎此鄧知縣方 張氏云亦治腸風

下血如不能飲酒者煎烏梅柏葉湯調下如心

煩口乾渴者加蒲黃炒減半用一方燒存性霹

靨酒調下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙

又一方

五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓
澄清再煎成膏入神麴二兩為末和圓如指
桐子大每服二三十圓溫酒下

荆芥散

治婦人崩中連日不止夏太君娘娘方

用荆芥穗於燈盞多著燈心好麻油點燈就
上燒荆芥焦色為細末每服三錢童便調下

獨聖散

治婦人血山崩不止出經驗方

防風去文 蘆

右不以多少為細末酒煮白麩清調下二錢空
心食前日二服更以麩作糊酒投之極驗
已上三方似非止血之藥如靈脂荆芥防
風皆是去風之藥然風為動物衝任經虛

傷被風所侵致左崩中暴下僕因覽許學士
傷寒脉歌曰脉浮而大風傷榮榮血也而
用此藥方悟古人見識深奧如此

一方

熟艾子如雞 阿膠半兩 乾姜一錢

右為粗末用水五盞先煮艾姜至二盞半入膠
消洋溫分二服空心服一日服盡

又一方

牛角鯁 烏賊骨各二分 麝香一分

右為細末入麝香令停酒調下錢七一日
三服

神應散

治婦人血崩不止

桂心不以多少其鍋內煨微存性為末每服
一二錢米飲調下

一方治崩中下血出本方

黃芩不以多少為細末每服一錢麝香酒調
下許學士云崩中多是用止血藥補血藥此
是也治陽乘於陰前所值夜暑地熱經水滯
山崩其時暑月藥箭中只有一大順散一西
知冷調服施即委效亦妙

金華散

治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效

者

延胡索

瞿麥穗

當歸

乾葛

牡丹皮

石膏

桂心

蒲黃

歲靈仙

右為細末每服二錢水一盞煎至六分空心溫

服日二服凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同

不可一藥用藥僕常療一婦人崩漏暴下諸醫

投姜桂附子等藥服之愈甚召余診之六脉緊

數遂用此藥兼局方龍腦雞蘇圓散服即安本

車方單用黃芩者亦此意也

如聖散

治婦人血山崩

性 棕桐

烏梅 各一

乾姜

一兩燒過存

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服

久患者不過三服即愈

一方用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方用棕櫚燒存性為末湯破酒合淡調下三錢
空心服

一方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服
治婦人血崩屢效方

當歸 白芍藥 乾姜
棕櫚 各等分

右各煨存性礮為細末秤過醋湯調以有節朱
筋左攪四十九轉食前服

千金翼治婦人崩中血不止

大小薊根一斤用酒一斗漬五宿任意服之
千金方有白茅根六兩半酒煮服

縮砂散 治血崩

細恐縮

新細砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末
米飲調下三錢

方用益智炒為細末鹽米飲調下

如神散治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥 各等分

右為細末每服二錢鹽一捻水一盞煎至七分
溫服無時候日二服十服見效

一方

用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二
錢放溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如
山崩不可止者亦能解之米飲調亦可○許學士
云治下血不止或成五色崩漏常服資血調氣

是婦人仙藥也已上並出婦

養附散

治婦人室女一切血氣經脈不調脘腹疔

痛面色痿黃心怔乏力腹脹腸痛頭暈惡心飲食

減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治之度

心腹餅自見其功爾小異上三方同

香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙碾

為末醋煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓米

飲送下無時候婦人數墮胎由氣不下降所以

胎氣不固此藥尤妙一方有艾同煮亦可

治血崩方

夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候

治崩中下血不止小腹痛

芍藥

一兩半

柏葉

六兩

右水一升煎取六合入酒三合再煎取七合空

心分為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿

角膠等分炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶

脘腹疼痛面黃瘦悴出千金方

治崩中下血久不止或赤或黑脘下痛

側柏炒

芍藥

龜甲炙

桑耳

各六分

乾地黄

黃耆

續斷

各五分

當歸炒

艾葉

牛角腮

各四分

禹餘糧

十分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎黃
香湯空心下

上之上有已字

治崩中晝夜不止醫不能治

芍藥

生地黃汁

先用酒五升煮芍藥一升去滓下地黃汁煎
三二沸分為三服不耐者漸進小豆方酒者水

又方

丁香二兩為細末用酒三升煮取一升空心
頓服必效方用丁香百顆酒煎服梅師

治急患崩中血不止結作血片如雞肝色碎爛

芍藥

阿膠

青竹茹

續斷

地榆

小菊根

當歸

生地黃

伏龍肝

右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此

藥後服補藥圓子

阿膠

龜甲

川芎

當歸

赤石脂

丹參

續斷

甘草

鹿茸

龍骨

龜甲

地榆

烏賊骨

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓

日二服常煮小菊汁服之尤佳

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥

白芷

黃耆

龜甲

川芎

烏賊骨

各八分

乾地黃 不止
乾姜 右十
桂心
五色龍骨
附子 炮五

又一方 右為細末空心酒調方寸匕

白芷
牡蛎 干六
赤石脂
龍骨 下二十圓
阿膠

當歸
烏賊骨
川芎
人參 各六
薑甲
艾葉 四方
乾薑

黃耆 各五
訶子 四方
乾薑

右為細末空心酒調方寸匕
竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下 鄧元老方

當歸

蠶蛻 煨

地榆

白茯苓

牡蛎 煨

赤石脂 煨 三

白朮

墨棕刷 煨

竹茹

粉草

絲子 煨 各

青木香

川山甲 煨 各

川芎

血餘 煨

熟地黃 四兩

右七味煨藥用絲子裏定入瓶子內用塩泥固濟用炭則半煨存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心温酒吞下
經驗方治崩暴下血

百草霜二錢狗膽汁一處拌停分作兩服當
歸酒調下

如聖無比散

治血山崩

晚蠶沙 一百 伏龍肝 半兩

同為細末酒調二錢匕

千金治崩中去血不止

一方金翼無茅根 小菊根

白茅根 二斤

小菊根 五斤

右二味細切用酒五升煮取四升去滓分温四服

婦人崩中無問久近悉皆治之

伏龍肝 介

小菊根

桑寄生

續斷

地榆

艾葉 兩各三

阿膠

當歸

赤石脂 厚朴 兩各二

生薑 五兩

右十味切以水一斗煮取三升絞去滓分作三服

服忌如常法

崩中帶下方論第十六

論曰崩中帶下者何若曰其患有五夫病之中人

皆有受處因起之候復尽心講究竊尋方書佳言

帶下有色之與此不參先賢醫中之理也且五

崩是婦人極重之患療之最難後之學者莫識其

習

源 既 幼胃醫方濟衆服餌當極濟人之道徧以思

慮於茲彌久其功頗有精妙夫此病者起於風氣

寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入

於胞門或中經脈流傳臟腑而發下血名爲帶下

若傷足厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少

陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經其
色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如
爛臥若傷足少陰腎之經則其色黑如衄血此為
其因也○問曰風邪氣之所中是人皆受之何為
婦人獨患此病答曰五臟六腑男女雖同其中細
微各有差別緣婦人有胞門子臟風冷中之則為
所病若男子則為它病矣○又問何以名為帶下
復有冷熱者何答曰脈有數經名字不同奇經八
脈有帶在腰如帶之狀其病生於帶脈之下其有
冷熱者即隨其性也又號崩中者二帶之下別名
也諸君子有留心於醫存志備急者以此推之萬
不失

崩中漏下生死脈方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈
虛損故也衝脈任脈為經脈之海皆起於胞內而
手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上
為乳汁下為月水婦人經脈調適則月水依時若
勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而下淋瀝
而不斷謂之漏下也○致五臟傷損五臟之色隨
臟不同若五臟皆虛損者則其色隨血下診其脈
寸口弦而大弦則為藏大則為花藏則為寒花則
為虛虛寒相搏其脈為牢婦人即半產而漏下又
云尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下
赤又漏下赤白不止脈小虛滑者生脈大緊實數

者死也又漏血下赤白日下血數射脉急疾者死
遲者生也又云尺寸脉虚者漏血漏血脉浮不可
治也

鹿茸圓

治經候過多其色疾黑甚者崩下吸吸少

气臍腹冷極則汗出如兩尺脉微小由衝任虚衰

為風冷客乘胞中气不能固可灸關元百壯在當

中三

鹿茸

煇去毛

赤石脂

烏餘糧

製各

艾葉

柏葉

附子

炮各

熟地黄

洗焙

當歸

續斷

各二

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心温酒下三

十圓

問

柏葉散

治婦人崩中漏下不閉年月遠近

柏葉

統斷

川芎

當歸

生乾地黄

龜甲

鼈甲

各一

烏餘糧

二兩

阿膠

赤石脂

牡蛎

地榆

艾葉

鹿茸

各一

右為末每服二錢食前粥飲調下○一方有丹
參如鹿茸數煉蜜丸如梧桐子大服三四十圓
空心温酒吞下

益母草散

治赤白惡露下不止

益母草閔老時採陰乾為細末空心温酒調

二錢日三服

療帶下赤白年月深久不差

乾薑 半兩 白芍藥 二兩

右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服

張氏方

乾薑

芍藥 等方又云加香附子等

甘草 減半

各炒黃色同為末空心米飲調

下方寸匕

白芷散

治婦人赤白帶下

白芷 兩

海螵蛸 燒一筒

胎髮 一團

右為細末空心溫酒調下二錢

乳香散

治赤白帶下

草菓 一箇 裹火炮 焦皮 入乳香 一小塊 用麩餅 和麩 用之

右為細末每服二錢陳米飲調下

三重者

栝葉散

治赤白帶下

破故紙

石菖蒲 等分 並

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調服更入班猫

五方 同炒 去翅頭足 糯米

搗鼻香

治子宮久冷赤白帶下

牡蛎 煨

黃狗頭骨 煨

紫稍花

韶腦

母丁香

蛇床子

破故紙

桂心 等方

右為細末煉蜜圓如鷄頭大臨事用一粒

白礬圓

治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖

血海

地礬四兩 大附子二兩 黃狗頭骨四兩

右為末粟米粥為圓如梧桐子大每服三十圓醋湯吞下或飯飲亦可空心日三服忌生冷毒

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘵

多困乏力

棕攔不以盆蓋燒灰火性 伏龍肝於錫竈

屋梁上塵懸長者如無以竈

右三味等分碾和令停入甑腦麝香各少許每

服二錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月

可安面一黃肌瘦髮黃枯槁語聲嘶服諸菜無

兼博婦教 白濟方 礬圓服之 愈散 丹藥服之 皆不作 疫僕遂合

茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定

赤白帶下崩中不止面色痿黃胎氣多損三方出

白茯苓 青木香 杜仲

菖蒲 乾地黄 栝子仁

秦芫 青皮 兔絲子

訶子皮 當歸 艾葉

青石脂 五加皮 牛角鯁

烏賊骨等分

右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫抄藥一錢相和喫下後喫餘粥或有胎息用

鯉魚糯米粥下

治冷白帶下

桑寄生

桑耳

乾地黄

右為細末空心用飯飲調下二錢七

治白崩中不絕

牡蛎

黃皮

統斷

赤石脂

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心

芍藥

禹餘糧

烏賊骨

右為細末空心用飯飲調下二錢七

禹餘糧

阿膠

白芷

白石脂

梧桐子大

每服四十圓空心

柏葉

吳茱萸

烏賊骨

當歸

烏賊骨

龍骨

當歸

龍骨

龍骨

溫酒下

治帶下

不積茅花

煎身耳草節

右為細末空心酒調方寸匕以酒下三十六歲

治赤白帶下骨空者

地榆洗切用水三升煮至一半去滓再煎如

稠錫絞漚空心服三合日二服

聖惠方治漏下五色亦治嘔血

地榆

不通

思交

十日合陰陽日患病八日小腹寒痛九日子門閉

沸去滓食前稍熱服一合
治婦人漏下不斲方
亂髮燒為末水洗空心温酒調下一錢

又一方
鹿角燒灰細研食前温酒調下二錢

又一方
桃仁燒灰細研食前温酒調下二錢

千金温經湯治女人曾經小產或帶下三十六病

腹長唇口乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時泄利經脉不調久不懷孕

芎藭 芍藥 當歸 白芍藥 麥門冬 半夏 阿膠 桂心 牡丹皮 去心

右為粗末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓空心食前温服忌生冷羊肉生葱海藻菘菜

等○千金方同

紫金散治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不

斷腰腹重痛凡是五色帶疾並皆治之

赤石脂 煨 龍骨 煨 白芍藥 熟地黃

川芎 附子 乾薑 炮 肉桂

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空

心食前一日二服

文仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方

禹餘糧煨研

赤石脂煨研

牡蛎無研

桂心

烏賊骨去皮

伏龍肝炒研

右等分為末溫酒調下方寸七日二服忌生葱

又一方

鹿茸

酥炙

當歸

兩

蒲黃

炒

右三味為末溫酒調下五分七日三服

又一方

京墨為末二七若燒露蜂房為末三指撮酒

調服

又一方常灸指腎食之

千金療婦人白崩中方

乾地黄

四兩

芍藥

四兩

阿膠

二斤

桂心

一斤

赤石脂

一斤

小薊根

兩

伏龍肝

七枚

雞子

七枚

右七味功以六升水四升煮取三升去滓入膠

沉香牡丹圓

治婦人血海久虛經候不利赤白帶

下血氣衝心多發刺痛四肢困煖博濟方

沉香

三斤

牡丹皮

去心

赤芍藥

一斤

當歸

一斤

桂心

一斤

川芎

一斤

黃耆

去蘆

一斤

人參

一斤

茯苓

一斤

山藥

一斤

白芷

一斤

橘紅

一斤

吳茱萸

泡七炒

白巴戟

去心

木香

牛膝

酒洗

枳殼

去穢炒

肉荳蔻

製厚朴

生乾薑

白朮骨

各半

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心

溫酒下若心腹痛煎白芷酒下

廣消治帶下病方

芍藥

七兩

為末每服三錢以酒調下

千金治帶下方脈數者可用

拘杞根

一斤

生地黄

五斤

右二味以酒一斗煮取五升分為三服蒸酒

白芷暖官圓暖血海寬衝任治子宮虛弱風寒客

滯因而劫緒不成孕育及數嘗墮胎或帶下赤白

漏下五色頭目虛暈吸吸少氣胸腹苦滿心下煩

悸膈腹刺痛連引腰背下血過多兩脇卒急嘔吐

不食面色青黃肌膚瘦痺寢常自汗

禹餘糧

製

白姜

炮

芍藥

各一斤

白芷

川椒

製

阿膠

粉炒

艾葉

製

川芎

各三

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓米飲

下或溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣

光澤顏色消散風冷退除百病自成孕有性平

不熱

竹茹圓

治婦人赤白帶下

方見崩下

地黃圓

治婦人月經不調每行數日不止兼有白

帶漸漸瘦瘁飲食少味累年無子龐母常方

熟地黃一兩 山茱萸各一 燕美仁各一

乾姜三方 白芍藥微炒 代赭石各一

白殭蠶厚朴各三

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下

五十圓日三服許學士云凡婦人有白帶是此

此扁鵲所以專為帶下醫也

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養

水火不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主

水而閉竅在陰陰為澁便之道胞冷腎損故有白

濁白淫宜服局方金鎖正元丹或因心虛而得者

宜服平補鎮心丹降心丹威喜圓若因思慮過當

致使陰陽不分清濁相于而成白濁者然思則傷

脾故也宜用四七湯吞白圓子此藥極能分利方

簡易更宜小烏沉湯每貼加茯苓一錢重益智二

十枚去殼碾鹽煎服

薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃兩二 大附子兩炮二 赤芍藥

柳桂 紅藍子 三稜各半

牡丹皮 芫花醋浸 木香

郁李仁去皮 沒藥各一

右為細末每服一錢 煎服如腹痛用當歸沒

藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服

婦人天癸過期經脈不調方論第十九

當歸散 許學士云婦人天癸過期而經脈不調或

三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損

七益謂女子七七數盡而經脈不依時者血有餘

也不可止之但令得依時不腰痛為善並宜服之

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

白朮

山茱萸肉

右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷

者去黃芩加桂心一兩

茱萸鹿茸圓 補氣固血治水臟因虛生寒月經行

多或來不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸

五味子

茯苓

杜仲

赤石脂

吳茱萸

附子乾姜

黑龍骨

肉豆蔻

白茯苓

乾地黃

右為細末酒煮麩糊為圓如梧桐子大空心食

前熱米飲吞下五七十圓一月後血氣已安

香骨加兩可以常服中年已後婦人最宜服此藥

婦人血分腫痛方論第二十

夫婦人腫滿若先因經水斷絕後四肢浮腫小

便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水

矣宜椒仁圓若先因小便不利後身面浮腫致經

治血分椒仁圓

椒仁

附子

五靈脂

延胡索

信砂

虻青

皮湯下

治經脉不利即為水

血方其候與水相類

必用人參

甘遂

郁李仁

當歸

芫花

膽礬

黃頭

右為細末麪作糊為圓如豌豆大每服一圓橋

水流走四肢悉皆腫滿谷曰

非也宜此方養生

當歸

大黃 濕熱下蒸

續隨子

黑牽牛

吳茱萸

石膏

班猫

去米不用

右為細末麪作糊為圓如豌豆大每服一圓橋

皆腫滿谷曰

非也宜此方養生

米熟去

赤芍藥

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五

圓至二三十圓

葶藶圓

治水分

葶藶

乾葶藶末

右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓並篇竹

湯下如大便利者減續隨子葶藶各一分加白

朮半兩

又有腸覃臃脹脾氣血氣血盡水盡石盡血瘦數出

證亦與並見後拾遺門四卷二十

新編婦人大全良方卷之六
天麻湯
天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛

本草

新編婦人大全良方卷之六
天麻湯
天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛

本草

新編婦人大全良方卷之六

天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛
天麻湯治風濕痺痛

本草

本草

本草

本草

本草



