

傷寒論

冊二



註解傷寒論卷第二

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無已註

明汪濟川校正

傷寒例第三

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也

春夏爲陽春溫夏熱者陽之動始於溫盛於暑故也秋冬爲陰秋涼而冬寒者以陰之動始於清盛於寒故也

冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳

冬三月純陰用事陽乃伏藏水冰地坼寒氣嚴凝當是之時善攝生者出處固密去寒就溫則不傷

於寒其涉寒冷觸冒霜雪爲病者謂之傷寒也

其傷於四時之氣皆能爲病

春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣

以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也

熱爲陽陽主生寒爲陰陰主殺陰寒爲病最爲肅

殺毒厲之氣

中而卽病者名曰傷寒不卽病者寒毒藏於肌膚至

春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也

內經曰先夏至日爲溫病後夏至日爲暑病溫暑

之病本傷於寒而得之故太醫均謂之傷寒也

是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致

非時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時

應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而

反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

四時氣候不正爲病謂之時行之氣時氣所行爲病非暴厲之氣感受必同是以一歲之中長幼之病多相似也

夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之

四時正氣者春風夏暑秋濕冬寒是也時行者時行之氣是也溫者冬時感寒至春發者是也疫者暴厲之氣是也占前斗建審其時候之寒溫察其邪氣之輕重而治之故下文曰

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而爲雨水故也

至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼

冬寒春溫夏熱秋涼為四時之正氣也

從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

九月十月寒氣尚微為病則輕十一月十二月寒

冽已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕

此以冬時不調適有傷寒之人即為病也此為四

時正氣中而即病者也

其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大

異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同證

如後章

此為時行之氣前云冬時應寒而反大溫者是也

從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱

爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病

此爲溫病也內經曰冬傷於寒春必病溫

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尙弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

此爲疫氣也是數者以明前斗曆之法占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也

至節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲

然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也

疑漏或有至而不去此一句按金匱要略曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此爲未至而至也以得甲子而天未溫和此爲至而不至也以得甲子天大寒不解此爲至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此爲至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病卽是觀之脫漏明矣但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳內經曰陰陽者天地之道清陽爲天動而不息濁

陰爲地靜而不移天地陰陽之氣鼓擊而生春夏
秋冬寒熱溫涼各正一氣也

是以彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒
春暖爲夏暑從生而至長也秋忿爲冬怒從肅而
至殺也

是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一
陽氣下一陰氣上也

十月六爻皆陰坤卦爲用陰極陽來陽生於子冬
至之後一陽爻升一陰爻降於卦爲復言陽氣得
復也四月六爻皆陽乾卦爲用陽極陰來陰生於
午夏至之後一陽氣下一陰氣上於卦爲姤言陰
則遇陽也內經曰冬至四十五日陽氣微上陰氣
微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下

斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也

陽生於子陰生於午是陰陽相接故曰合陽退於

酉陰退於卯是陰陽相背故曰離內經曰氣至之

謂至氣分之謂分至則氣同分則氣異

陰陽交易人變病焉

天地陰陽之氣既交錯而不正人所以變病內經

曰陰陽相錯而變由生也

此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也

內經曰養生者必順於時春夏養陽以涼以寒秋

冬養陰以溫以熱所以然者從其根故也

小人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣留在何經而發

何病詳而取之

不能順四時調養觸冒寒溫者必成暴病醫者當

在意審詳而治之
是以春傷於風夏必殮泄夏傷於暑春必病瘡秋傷
於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病溫此必然之道可
不審明之

當春之時風氣大行春傷於風風氣通於肝肝以
春適王風雖入之不能即發至夏肝衰然後始動
風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能
外發故攻內而爲殮泄殮泄者下利米穀不化而
色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於肺
肺以秋適王濕雖入之不能即發至冬肺衰然後
濕始動也雨淫腹疾則當發爲下利冬以陽氣內
固濕氣不能下行故上逆而爲咳嗽當夏之時暑
氣大行夏傷於暑夏以陰爲主內暑雖入之勢未

能動及秋陰出而陽爲內主然後暑動傳陰而爲
痰瘧痰者二日一發瘧者一日一發當冬之時寒
氣大行冬傷於寒冬以陽爲主內寒雖入之勢未
能動及春陽出而陰爲內主然後寒動傳陽而爲
溫病是感冒四時正氣爲病必然之道

傷寒之病逐日淺深以施方治

內經曰未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄
而已

今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹
困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜
臨時消息制方無不効也今搜採仲景舊論錄其證
候診脈聲色對病真方有神驗者擬防世急也

仲景之書逮今千年而顯用於世者王叔和之力

也

又土地溫涼高下不同物性剛柔飡居亦異是黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也

東方地氣溫南方地氣熱西方地氣涼北方地氣寒
西北方高東南方下是土地溫涼高下不同也
東方安居食魚西方陵居華食南方濕處而嗜酸
北方野處而食乳是飡居之異也東方治宜砭石
西方治宜毒藥南方治宜微針北方治宜灸炳是
又四方醫治不同也醫之治病當審其土地所宜
凡傷於寒則爲病熱熱雖甚不死

苦內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱是傷寒爲病熱也鍼經曰多熱者易已多寒者

難已是熱雖甚不死

若兩感於寒而病者必死

表裏俱病者謂之兩感

尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脈上連

風府故頭項痛腰脊強

太陽爲三陽之長其氣浮於外故尺寸俱浮是邪

氣初入皮膚外在表也當一二日發風府穴名也

項中央太陽之脈從巔入絡腦還出別下項是以

上連風府其經循肩膊內俠脊抵腰中故病頭項

痛腰脊強

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻

絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥

陽明血氣俱多尺寸俱長者邪併陽明而血氣淖

溢也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其
脈俠鼻者陽明脈起於鼻交頤中絡於目陽明之
脈正上頤頰還出繫目系身熱者陽明主身之肌
肉鍼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾者
經中客邪也不得臥者胃氣逆不得從其道也內
經曰胃不和則臥不安
尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脅
絡於耳故胸脅痛而耳聾
內經曰陽中之少陽通於春氣春脈弦尺寸俱弦
者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少
陽是當三四日發胸脅痛而耳聾者經壅而不利
也

此三經皆受病未入於府者可汗而已

三陽受邪為病在表法當汗解然三陽亦有便入府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾

陽極則陰受之邪傳三陽既遍次乃傳於陰經在陽為在表在陰為在裏邪在表則見陽脈邪在裏

只則見陰脈陽邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而脈尺寸俱沉細也自三陽傳於太陰是當四五日發

也邪入於陰則漸成熱腹滿而噎乾者脾經壅而成熱也

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

少陰腎水也性趣下少陰受病脈尺寸俱沉也四

五日太陰之邪不已至五六日則傳於少陰也是少陰病當五六日發人傷於寒則爲病熱謂始爲寒而終成熱也少陰爲病口燥舌乾而渴邪傳入裏熱氣漸深也

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮

緩者風脈也厥陰脈微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於風也當六七日發以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也

此三經皆受病已入於府可下而已

三陰受邪爲病在裏於法當下然三陰亦有在經者在經則宜汗故云已入於府者可下而已經曰臨病之工宜須兩審

若兩感於寒者一日太陽受之卽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之卽與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讖語三日少陽受之卽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行府藏不通則死矣

陰陽俱病表裏俱傷者爲兩感以其陰陽兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽兩經俱傳也始得一日頭痛者太陽口乾煩滿而渴者少陰至二日則太陽傳於陽明而少陰亦傳於太陰身熱讖語者陽明腹滿不欲食者太陰至三日陽明傳於少陽而太陰又傳於厥陰耳聾者少陽囊縮而厥者厥陰水漿不入不知人者胃氣不通也內經曰

五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故云不知人三日其氣乃盡故死矣謂三日六經俱病榮衛之氣不得行於內外府藏之氣不得通於上下至六日府藏之氣俱盡榮衛之氣俱絕則死矣

其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也

六日傳遍三陰三陽之氣皆和大邪之氣皆去病

人精神爽慧也

若過十三日以上不間尺寸陷者大危

間者瘳也十二日傳經盡則當瘳愈若過十三日已上不瘳尺寸之脈沉陷者卽正氣內衰邪氣獨勝故云大危

若更感異氣變爲他病者當依舊壞證病而治之若脈陰陽俱盛重感於寒者變爲溫瘧

異氣者爲先病未已又感別異之氣也兩邪相合變爲他病脈陰陽俱盛者傷寒之脈也難經曰傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀦經曰脈盛身寒得之傷寒則爲前病熱未已再感於寒寒熱相搏變爲溫瘧

陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變爲風溫

此前熱未歇又感於風者也難經曰中風之脈陽浮而滑陰濡而弱風來乘熱故變風溫陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒溫毒為病最重也

此前熱未已又感溫熱者也陽主表陰主裏洪數實大皆熱也兩熱相合變為溫毒以其表裏俱熱故為病最重

陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變為溫疫以此冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說

此前熱未已又感溫氣者也溫熱相合變為溫疫凡人有疾不時即治隱忍冀差以成痼疾

凡覺不佳急須求治苟延時日則邪氣入深難可復制千金曰凡有少苦似不如平常即須早道若

隱忍不治冀望自差須臾之間以成痼疾此之謂也

小兒女子益以滋甚

小兒氣血未全女子血室多病凡所受邪易於滋

蔓

時氣不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者

腠理者津液腠泄之所文理縫會之中也金匱要略曰腠者是三焦通會元貞之處爲血氣所注理者是皮膚藏府之文理也邪客於皮膚則邪氣浮淺易爲散發若以時治之罕有不愈者矣金匱玉函曰主候長存形色未病未入腠理針藥及時服將調節委以良醫病無不愈

患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制此爲家有患備慮之要

邪在皮膚則外屬陽而易治邪傳入裏則內屬陰而難治內經曰善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也昔桓侯怠於皮膚之微疾以至骨髓之病家有患者可不備慮

凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾卽宜便治不等早晚則易愈矣

千金曰凡始覺不佳卽須治療迄至於病湯食競進折其毒勢自然而差

若或差遲病卽傳變雖欲除治必難爲力

傳有常也變無常也傳爲循經而傳如太陽傳陽

明是也變爲不常之變如陽證變陰證是也邪既傳變病勢深也本草曰病勢已成可得半愈病勢已過命將難全

服藥正如方法縱意違師不須治之

內經曰拘於鬼神者不可與言至德惡於針石者不可與言至巧病不許治者病必不治治之無功矣

凡傷寒之病多從風寒得之

凡中風與傷寒爲病自古通謂之傷寒千金曰夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛偏隔周身不通而病

始表中風寒入裏則不消矣

始自皮膚入於經絡傳於藏府是也

未有溫覆而當不消散者

風寒初客於皮膚便投湯藥溫暖發散而當者則無不消散之邪

不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之

先解表而後下之則無復傳之邪也

若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除

表證雖罷裏不至大堅滿者亦未可下之是邪未

收斂成實下之則裏虛而邪復不除猶生寒熱也

若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下

之雖四五日不能爲禍也

夫外無表證裏有堅滿爲下證悉具外臺云表和裏

病下之則愈下證既具則不必拘於日數

若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩燥諸變

不可勝數輕者困篤重者必死矣

下之不當病輕者證猶變易而難治又矧重者乎
夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則
愈下之則死

表爲陽裏爲陰陰虛者陽必湊之陽盛之邪乘其
裏虛而入於府者爲陽盛陰虛也經曰尺脈弱名
曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱者是矣下之
除其內熱而愈若反汗之則竭其津液而死陰脈
不足陽往從之陽脈不足陰往乘之陰邪乘其表
虛客於榮衛之中者爲陽虛陰盛也經曰假令寸
口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒
者是矣汗之散其表寒則愈若反下之則脫其正
氣而死經曰本發汗而復下之此爲逆也本先下

之而反汗之爲逆

夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶之機應若影響豈容易哉

神丹者發汗之藥也甘遂者下藥也若汗下當則夫吉汗下不當則凶其應如影隨形如響應聲

況桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡

桂枝湯者發汗藥也承氣湯者下藥也金匱玉函曰不當汗而強與汗之者令人奪其津液枯槁而死不當下而強與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死

死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日

投湯不當則災禍立見豈暇計其日數哉

此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其

禍至速而醫術淺狹懵然不知病源爲治乃誤使病者殞歿自謂其分至今冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉

兩感病俱作欲成不治之疾醫者大宜消息審其先後次第而治之若妄意攻治以求速效者必致傾危之敗

凡發汗溫服湯藥其方雖言日三服若病劇不解當

促其間可半日中盡三服若與病相阻即便有所覺
重病者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在
故當復作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若
汗不出者死病也

發汗藥須溫暖服者易爲發散也日三服者藥勢
續也病勢稍重當促急服之以折盛熱不可拘於
本方設藥病不相對湯入即便知之如陰多者投
以涼藥卽寒逆隨生陽多者飲以溫劑則熱毒卽
起是便有所覺晬時者周時也一日一夜服湯藥
盡劑更看其傳如病證猶在當復作本湯以發其
汗若服三劑不解汗不出者邪氣大甚湯不能勝
必成大疾千金曰熱病脈躁盛而不得汗者此陽
脈之極也死

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之忽然大汗出是爲自愈也

熱在上焦則爲消渴言熱消津液而上焦乾燥則生渴也大熱則能消水熱少不能消之若強飲則停飲變爲諸病至七八日陽勝氣溫向解之時多尚生大渴亦須少少與之以潤胃氣不可極意飲也若飲而腹滿小便不利若喘若噦者爲水飲內停而不散不可更與之忽然陽氣通水氣散先發於外作大汗而解

凡得病反能飲水此爲欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者乃強與飲之因成其禍不可復數

小渴者爲腹中熱少若強與水水飲不消復爲諸飲病也

凡得病厥脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈證也

動數之脈邪在陽也湯入而變遲者陽邪愈也浮大之脈邪在表也而復減小者表邪散也病初躁亂者邪所煩也湯入而安靜者藥勝病也是皆爲愈證

凡治溫病可刺五十九穴

五十九穴者以瀉諸經之溫熱鍼經曰熱病取之

諸陽五十九穴刺以瀉其熱而出其汗實其陰而
補其不足所謂五十九刺兩手內外側各三凡十
二瘡五指間各一凡八瘡足亦如是頭入髮際一
寸旁三分各三凡六瘡更入髮三寸邊五凡十瘡
耳前後口下各一項中一穴凡六瘡巔上一顛會
一髮際一廉泉一風池二天柱二又內經曰熱俞
五十九頭上五行行五者以瀉諸陽之熱逆也大
杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也氣衝
三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也雲門
髑骨委中髓空此八者以瀉四支之熱也五藏俞
旁五此十者以瀉五藏之熱也凡此五十九穴者
皆熱之左右也

又身之穴三百六十有五其三十九穴灸之有害七

十九穴刺之爲災并中髓也

穴有三百六十五以應一歲其灸刺之禁皆肉薄骨解之處血脈虛少之分鍼灸并中髓也

凡脈四損三日死平人四息病人脈一至名曰四損脈五損一日死平人五息病人脈一至名曰五損脈六損一時死平人六息病人脈一至名曰六損

四藏氣絕者脈四損五藏氣絕者脈五損五藏六府俱絕者脈六損

脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑

內經曰脈者血之府也脈實血實脈虛血虛寒則傷血邪併於血則血盛而氣虛故傷寒者脈盛而身寒熱則傷氣邪併於氣則氣盛而血虛故傷暑者脈虛而身熱

脈陰陽俱盛大汗出不解者死

脈陰陽俱盛當汗出而解若汗出不解則邪氣內勝正氣外脫故死內經曰汗出而脈尚躁盛者死千金曰熱病已得汗脈尚躁盛此陽脈之極也死脈陰陽俱虛熱不止者死

脈陰陽俱虛者真氣弱也熱不止者邪氣勝也內經曰病溫虛甚者死

脈至乍疎乍數者死

為天真榮衛之氣斷絕也

脈至如轉索者其日死

為緊急而不軟是中無胃氣故不出其日而死

識言妄語身微熱脈浮大手足溫者生逆冷脈沉細者不過一日死矣

讖言妄語陽病也身微熱脈浮大手足溫爲脈病相應若身逆冷脈沉細爲陽病見陰脈脈病不相應故不過一日而死難經曰脈不應病病不應脈是爲死病

此以前是傷寒熱病證候也

辨瘧濕暍脈證第四

傷寒所致太陽瘧濕暍三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之

瘧當作瘧傳寫之誤也瘧者惡也非強也內經曰肺移熱於腎傳於柔瘧柔爲筋柔而無力瘧謂骨瘧而不隨瘧者強也千金以強直爲瘧經曰頸項強急口噤背反張者瘧卽是觀之瘧爲瘧字明矣太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧

千金曰太陽中風重感寒濕則變瘧太陽病發熱無汗爲表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感於寒爲瘧病也以表實感寒故名剛瘧

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧

太陽病發熱汗出爲表虛則當惡寒其不惡寒者爲陽明病今發熱汗出而不惡寒者非陽明證則是太陽中風重感於濕爲柔瘧也表虛感濕故曰柔瘧

太陽病發熱脈沉而細者名曰瘧

太陽主表太陽病發熱爲表病脈當浮大今脈反沉細既不愈則太陽中風重感於濕而爲瘧也金匱要略曰太陽病其證備身體強几几然脈反沉遲此爲瘧括萸桂枝湯主之

太陽病發汗太多因致瘥

太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脈緊急而成瘥也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搖卒口噤背反張者瘥病也

太陽中風爲純中風也太陽傷寒爲純傷寒也皆不作瘥惟是太陽中風重感寒濕乃變爲瘥也身熱足寒者寒濕傷下也時頭熱面赤目脈赤風傷於上也頭搖者風主動也獨頭搖者頭爲諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦爲之動搖手足爲之搖擗此皆內挾寒濕故頭搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩若風寒相搏則

口噤而不時開此皆加之風濕故卒口噤也足太陽之脈起於目內眥上額交巔上其支別者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客於經中則筋脈拘急故頸項強急而背反張也

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便

金匱要略曰霧傷皮腠濕流關節疼痛而煩者濕氣內流也濕同水也脈沉而細者水性趣下也痺痛也因其關節煩疼而名曰濕痺非脚氣之痺也內經曰濕勝則濡泄小便不利大便反快者濕氣內勝也但當利其小便以宣泄腹中濕氣古云治太濕之病不利小便非其治也

濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃

身黃如橘子色者陽明瘵熱也此身色如似熏黃
卽非陽明瘵熱身黃發熱者梔子蘘皮湯主之爲
表裏有熱則身不疼痛此一身盡疼非傷寒客熱
也知濕邪在經而使之脾惡濕濕傷則脾病而色
皆見是以身發黃者爲其黃如煙熏非正黃色也
濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早
則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中
有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也

濕家有風濕有寒濕此寒濕相搏者也濕勝則多
汗傷寒則無汗寒濕相搏雖有汗而不能周身故
但頭汗出也背陽也腹陰也太陽之脈夾脊抵腰
太陽客寒濕表氣不利而背強也裏有邪者外不

惡寒表有邪者則惡寒欲得被覆向火者寒濕在表而惡寒也若下之早則傷動胃氣損其津液故致噦而胸滿小便不利下後裏虛上焦陽氣因虛而陷於下焦爲丹田有熱表中寒乘而入於胸中爲胸上有寒使舌上生白胎滑也藏燥則欲飲水以胸上客寒濕故不能飲而但口燥煩也

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

濕家發汗則愈金匱要略曰濕家身煩疼可與麻黃加朮四兩發其汗爲宜若妄下則大逆額上汗出而微喘者乃陽氣上逆也小便自利或下利者陰氣下流也陰陽相離故云死矣內經曰陰陽離缺精氣乃絕

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

值天陰雨不止明其濕勝也內經曰陽受風氣陰受濕氣又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之風濕相搏則風在外而濕在內汗大出者其氣暴暴則外邪出而裏邪不能出故風去而濕在汗微微而出者其氣緩緩則內外之邪皆出故風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

病有淺深證有中外此則濕氣淺者也何以言之
濕家不云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣不流
關節而外客肌表也不云發熱身似熏黃復云發
熱面黃而喘是濕不干於脾而薄於上焦也陰受
濕氣則濕邪爲深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽
而不客於陰也濕家之脈當沉細爲濕氣內流脈
大者陽也則濕不內流而外在表也又以自能飲
食胸腹別無滿痞爲腹中和無病知其濕氣微淺
內藥鼻中以宣泄頭中寒濕

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷
於汗出當風或久傷取冷所致也

一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出
當風而得之者則先客濕而後感風若久傷取冷

得之者則先傷風而後中濕可與麻黃杏仁薏苡仁甘草湯見金匱要略中

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡寒身熱而渴者中暍也白虎加人參湯主之見金匱要略中方

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此亦夏月傷冷水行皮中所致也

經曰脈虛身熱得之傷暑身熱脈微弱者暍也身體疼重者水也夏時暑熱以水灌洗而得之一物瓜蒂散主之見金匱要略中方

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細乳遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口開

前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

病有在表有在裏者有表裏俱病者此則表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者表中暍也脈弦細芤遲者中暑脈虛也小便已灑灑然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足也小有勞身即熱者謂勞動其陽而暍即發也口開前板齒燥者重有熱也內經曰因於暑汗煩則喘暍口開謂喘暍也以喘暍不止故前板齒乾燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫針助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內虛而膀胱燥故淋甚

辨太陽病脈證并治法上第五

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮者太陽受病太陽受病太陽主表
爲諸陽主氣脈浮頭項強痛而惡寒者太陽表病
也

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風
風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中
風榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗
出不惡寒而惡風以衛爲陽衛外者也病則不能
衛固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脈緊
傷風脈緩者寒性勁急而風性解緩故也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰
陽俱緊者名曰傷寒

經曰凡傷於寒則爲病熱爲寒氣客於經中陽經
怫結而成熱也中風卽發熱者風爲陽也及傷寒

云或已發熱或未發熱以寒為陰邪不能即熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣病者則麻血病大者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆者榮中寒也經曰脈盛身寒得之傷寒脈陰陽俱緊者知其傷寒也

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳頗欲吐若燥煩脈數急者為傳也

太陽主表一日則太陽受邪至二日當傳陽明若太脈氣微而不傳陽明胃經受邪則喜吐寒邪傳裏者則變熱如頗欲吐若煩燥脈急數者為太陽寒邪變熱傳於陽明也

傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也

傷寒二三日無陽明少陽證知邪不傳正在太陽經中也

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病

發熱而渴不惡寒者陽明也此太陽受邪知爲溫病非傷寒也積溫成熱所以發熱而渴不惡寒也若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘈瘲若火熏之一逆尙引日再逆促命期

傷寒發汗已則身涼若發汗已身灼熱者非傷寒爲風溫也風傷於上而陽受風氣風與溫相合則傷衛脈陰陽俱浮自汗出者衛受邪也衛者氣也風則傷衛溫則傷氣身重多眠睡者衛受風溫而

氣昏也鼻息必齟語言難出者風温外甚而氣擁不利也若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也內經曰膀胱不利為癰不約為遺溺癰者小便不利也太陽之脈起目內眥內經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕小便不利直視失溲為下後竭小津液損藏氣風温外勝經曰欲絕也為難治若被火者則火助風温成熱微者熱瘵而發黃劇者熱甚生風如驚癎而時瘈瘲也先曾被火為一逆若更以火熏之是再逆也一逆尚猶延引時日而不愈其再逆者必致危殆故云促命期

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

陽爲熱也陰爲寒也發熱而惡寒寒傷陽也無熱而惡寒寒傷陰也陽法火陰法水火成數七水成數六陽病七日愈者火數足也陰病六日愈者水數足也

太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明使經不傳則愈

傷寒自一日至六日傳三陽三陰經盡至七日當愈經曰七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽之邪再傳陽明鍼足陽明爲迎而奪之使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳至未上

巳爲正陽則陽氣得以復也始於太陽終於厥陰六經各以三時爲解而太陽從巳至未陽明從申

至戌少陽從寅至辰至於太陰從亥至丑少陰從子至寅厥陰從丑至卯者以陽行也速陰行也緩陽主於晝陰主於夜陽三經解時從寅至戌以陽道常饒也陰三經解時從亥至卯以陰道常乏也內經曰陽中之太陽通於夏氣則巳午未太陽乘王也

風家表解而不了了者十二日愈

中風家發汗解後未全快暢者十二日火邪皆去

六經悉和則愈

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

皮膚言淺骨髓言深皮膚言外骨髓言內身熱欲得衣者表熱裏寒也身寒不欲衣者表寒裏熱也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

陽以候衛陰以候榮陽脈浮者衛中風也陰脈弱者榮氣弱也風并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出也經曰太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛強者是也嗇嗇者不足也惡寒之貌也淅淅者灑淅也惡風之貌也衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮膚緩腠理疎是亦惡風也翕翕者熛熛然而熱也若合羽所覆言熱在表也鼻鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風邪也

桂枝湯方

傷

寒

論

卷二

五
一
中華書局聚

桂枝

三兩去皮
味辛熱

芍藥

三兩味苦
酸微寒

甘草

二兩炙
味甘平

生

薑

三兩切
味辛溫

大棗

十二枚擘
味甘溫

內經曰辛甘發散為陽桂枝湯辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風淫所勝平以辛佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝為主芍藥甘草為佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之是以生薑大棗為使也

右伍味㕮咀以水柒升微火煮取三升去滓適寒溫服壹升服已須臾飲熱稀粥壹升餘以助藥力溫覆令壹時許遍身熱熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病必不除若壹服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一

劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至貳叁劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

頭痛者太陽也發熱汗出惡風者中風也與桂枝湯解散風邪

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

几几者伸頸之貌也動則伸頸搖身而行項背強者動則如之項背几几者當無汗反汗出惡風者中風表虛也與桂枝湯以和表加麻黃葛根以祛風且麻黃主表實後葛根湯證云太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之藥味正與此方同其無汗者當用麻黃今自汗出恐不加麻黃但加葛

根也

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

太陽病屬表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳裏若氣上衝者裏不受邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪爭邪氣已傳裏也故不可更與桂枝湯攻表

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

太陽病三日中曾經發汗吐下溫鍼虛其正氣病仍不解者謂之壞病言為醫所壞病也不可復與

桂枝湯審觀脈證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之
桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也

脈浮發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脈浮緊發熱不汗出者傷寒也可與麻黃湯常須識此勿妄治也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘酒客得之則中滿而嘔

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

太陽病爲諸陽主氣風甚氣擁則生喘也與桂枝

湯以散風加厚朴杏仁以降氣

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

內熱者服桂枝湯則吐如酒客之類也既亡津液又爲熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺痿金匱要略曰熱在上焦爲肺痿謂或從汗或從嘔吐重亡津液故得之

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

太陽病因發汗遂汗漏不止而惡風者爲陽氣不足因發汗陽氣益虛而皮腠不固也內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則出小便難者汗出亡津液陽氣虛弱不能施化四肢者諸陽之本也四肢微急難以屈伸者亡陽而脫液也鍼經曰液

脫者骨屬屈伸不利與桂枝加附子湯以溫經復陽

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

脈來數時一止復來者名曰促促爲陽盛則不因下後而脈促者也此下後脈促不得爲陽盛也太陽病下之其脈促不結胸者此爲欲解此下後脈促而復胸滿則不得爲欲解由下後陽虛表邪漸入而客於胸中也與桂枝湯以散客邪通行陽氣芍藥益陰陽虛者非所宜故去之陽氣已虛若更加之微惡寒則必當溫劑以散之故加附子

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲

愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

傷寒八九日則邪傳再經又遍三陽欲傳三陰之時也傳經次第則三日傳遍三陽至四日陽去入陰不入陰者爲欲解其傳陰經第六日傳遍三陰爲傳經盡而當解其不解傳爲再經者至九日又遍三陽陽不傳陰則解如瘧發作有時也寒多者爲病進熱多者爲病退經曰厥少熱多其病爲愈寒多熱少陽氣退故爲進也今雖發熱惡寒而熱多寒少爲陽氣進而邪氣少也裏不和者嘔而利今不嘔清便自調者裏和也寒熱間日發者邪氣深也日一發者邪氣復常也日再發者邪氣淺也

大日二三發者邪氣微也內經曰大則邪至小則平
言邪甚則脈大邪少則脈微今日數多而脈微緩
者是邪氣微緩也故云欲愈脈微而惡寒者表裏
俱虛也陽表也陰裏也脈微爲裏虛惡寒爲表虛
以表裏俱虛故不可更發汗更下更吐也陰陽俱
虛則面色青白反有熱色者表未解也熱色爲赤
色也得小汗則和不得汗則得邪氣外散皮膚而
爲痒也與桂枝麻黃各半湯小發其汗以除表邪
太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却
與桂枝湯則愈

煩者熱也服桂枝湯後當汗出而身涼和若反煩
不解者風甚而未能散也先刺風池風府以通太
陽之經而泄風氣却與桂枝湯解散則愈

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

經曰如服一劑病證猶在者故當復作本湯服之

與服桂枝湯汗出後脈洪大者病猶在也若形如瘧

六日再發者邪氣客於榮衛之間也與桂枝二麻黃

一湯解散榮衛之邪

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加

人參湯主之

大汗出脈洪大而不渴邪氣猶在表也可更與桂

枝湯若大汗出脈洪大而煩渴不解者表裏有熱

不可更與桂枝湯可與白虎加人參湯生津止渴

和表散熱

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不

可更汗宜桂枝二越婢一湯方

桂枝二越婢一湯方

桂枝皮去

芍藥

甘草各十

生薑三兩

大棗四枚

麻黃十八銖

石膏碎綿裹

胃為十二經之主脾治水穀為卑藏若婢內經曰

脾主為胃行其津液是湯所以謂之越脾者以發

越脾氣通行津液外臺方一名越脾湯即此義也

右柒味咬咀以五升水煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取二升去滓温服一升本方當裁為越婢湯桂

枝湯合飲一升今合為一方桂枝二越婢一服桂枝

湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛

小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮湯主之

頭項強痛翕翕發熱雖經汗下爲邪氣仍在表也
心下滿微痛小便利者則欲成結胸今外證未罷
無汗小便不利則心下滿微痛爲停飲也與桂枝
湯以解外加茯苓白朮利小便行留飲

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與
桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐
逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者
更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和讖語
者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯
主之

脈浮自汗出小便數而惡寒者陽氣不足也心煩
脚攣急者陰氣不足也陰陽血氣俱虛則不可發
汗若與桂枝湯攻表則又損陽氣故爲誤也得之

便厥咽中乾煩燥吐逆者先作甘草乾姜湯復其
陽氣得厥愈足温乃與芍藥甘草湯益其陰血則
脚蹻得伸陰陽雖復其有胃燥識語少與調胃承
氣湯微漙以和其胃重發汗爲亡陽加燒針則損
陰內經曰榮氣微者加燒針則血不流行重發汗
復燒針是陰陽之氣大虛四逆湯以復陰陽之氣
甘草乾薑湯方

甘草四兩炙 乾薑二兩炮

內經曰辛甘發散爲陽甘草乾薑相合以復陽氣
右咬咀以水叁升煮取一升五合去滓分温再服

芍藥甘草湯方

芍藥四兩 甘草四兩炙

芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以收之甘以

緩之酸甘相合用補陰血

右二味咬咀以水叁升煮取一升半去滓分温再服

之

調胃承氣湯方

大黃

四兩去皮清酒浸

甘草

二兩炙

芒硝

半斤味鹹苦大寒

內經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒

以除熱大黃苦寒以蕩實甘草甘平助二物推陳

而緩中

右三味咬咀以水叁升煮取一升去滓內芒硝更上

火微煮令沸少少温服

四逆湯方

甘草

二兩炙

乾薑

一兩半

附子

一枚生用去皮破八片辛大熱

內經曰寒淫於內治以甘熱又曰寒淫所勝平以辛熱甘草薑附相合爲甘辛大熱之劑乃可發散陰陽之氣

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩

問曰證象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讖語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩燥陽明內結讖語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其讖語故知病可愈

陽旦桂枝湯别名也前證脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂枝湯證相似是證象陽旦也與桂枝湯而增劇得寸口脈浮大浮為風邪大為血虛即於桂枝湯加附子温經以補虛增桂令汗出以祛風其有治之之逆而增厥者與甘草乾薑湯陽復而足温更與芍藥甘草湯陰和而脛伸表邪已解陰陽已復而有陽明內結讖語煩亂少與調胃承氣湯微瀉泄以和其胃則陰陽之氣皆和內外之邪悉去故知病可愈

釋音

清涼

正上反七

疫

役音

愈

孚切吻

疹

之忍切也

殄泄

下上音薛

顛

信音

痲

音皆也

頤頰

下上音拙面骨也

逮及音代也

中病衆上音

沓徒合

瘳愈音抽病也

狹懵下上莫戶甲切

疔羽軌

痊一充至切惡也

几几飛音几短也

晡布胡

佛佛音

淅思歷

藜汗直出立貌切

砭悲廉也

之長掌音

俱見現音

痼固音粉

殞羽粉

膺於陵切

暍暑音謁傷

攣力全

灑蘇狼貌切

軀息音汗臥

焯許酷切

脛胡定切

焯如劣

噓咽音益也

迄許訖切

碎祖對切

髑虞音偶又音

瘞巨井切

內藥納上音

惡寒上烏

癢隆音

歡昌悅

註解傷寒論卷第二

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

淋瀝

註解傷寒論卷第三

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無已註

明汪濟川校正

辨太陽病脈證并治第六

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

太陽病項背強几几汗出惡風者中風表虛也項

背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌

表實宜發汗是以葛根湯發之也

葛根湯方

葛根兩四

麻黃去三節兩

桂枝去皮兩

芍藥二兩

甘草炙二兩

生薑切三兩

大棗枚十二擘

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風

表實故加二物於桂枝湯中也

右柒味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須
啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

傷寒有合病有併病本太陽病不解併於陽明者
謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病
者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽少陽合病
太陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰
則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪
氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛
故必下利與葛根湯以散經中甚邪

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主

之

邪氣外甚陽不主裏裏氣不和氣下而不上者但
下利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不下利
與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣

葛根加半夏湯方

葛根

兩四

麻黃

去三兩黃汁去節

湯乾稱

泡

生薑

切三兩

甘草

炙二兩

芍藥

二兩

桂枝

去二兩皮

大棗

枚十二

半夏

洗半斤

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內
諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗
太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解
也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之
經曰不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利桂枝

證者邪在表也而反下之虛其腸胃為熱所乘遂利不止邪在表則見陽脈邪在裏則見陰脈下利脈微遲邪在裏也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出而喘也即邪氣外甚所致喘而汗出者為因喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表邪除裏熱

葛根黃芩黃連湯方

葛根 半斤

甘草 二兩炙

黃芩 二兩味苦寒

黃連 三兩味苦寒

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二

升去滓分温再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

此太陽傷寒也寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛者自汗出而惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃湯方

麻黃

三兩味甘温去節

桂枝

二兩去皮辛熱

甘草

一兩炙味甘平

杏仁

七十箇湯去皮尖味辛温

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草

開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥
餘如桂枝法將息

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主
之

陽受氣於胸中喘而胸滿者陽氣不宜發壅而逆
也心下滿腹滿皆爲實當下之此以爲胸滿非裏
實故不可下雖有陽明然與太陽合病爲屬表是
與麻黃湯發汗

太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸
滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯
十日以去向解之時也脈浮細而嗜臥者表邪已

罷也病雖已和解之若脈但浮而不細者則邪氣但在表也與麻黃湯發散之

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也

此中風見寒脈也浮則爲風風則傷衛緊則爲寒寒則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛者爲榮弱衛強寒并於榮者爲榮強衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不汗出而煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若脈微弱汗出惡風者爲榮衛俱虛反服青龍湯則必亡陽或生厥逆筋惕肉瞤此治之逆也

大青龍湯方

麻黃

味六兩去節
味甘溫

桂枝

味二兩去皮
辛熱

甘草

味二兩炙
甘平

杏仁

味四十分
尖味苦甘溫
去皮

生薑

味三兩切
辛溫

大棗

味十二枚
甘溫

石膏如鷄子大

碎味甘
微寒

辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發辛甘相合

乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發

散榮中之寒桂枝薑棗以解除衛中之風

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉

撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不

得眠也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大

青龍湯發之

此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故身不

疼中風者身重此以兼風故乍有輕時不發厥吐
利無少陰裏證者爲風寒外甚也與大青龍湯以
發散表中風寒

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利
或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之
傷寒表不解心下有水飲則水寒相搏肺寒氣逆
故乾嘔發熱而欬鍼經曰形寒飲冷則傷肺以其
兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行此之謂也與
小青龍湯發汗散水水氣內瀆則所傳不一故有
或爲之證隨證增損以解化之

小青龍湯方

麻黃

味三兩去節
甘兩溫

芍藥

酸三兩微寒
味寒

五味子

半兩升
酸溫味

乾薑

辛三兩熱
味熱

甘草

味三兩平
甘平

桂枝

味三兩去皮
辛熱

半夏

半升湯洗
味辛微温
細辛
辛温
兩味

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以行水氣而潤腎欬逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升

加減法

若微利者去麻黃加薏花如鷄子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利薏花下十二水水去利則止

若渴者去半夏加括蕒根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥津液非渴者所宜故去之括蕒味苦而生津液故加之

若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人卽餒加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐虵去麻黃惡發汗

若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行爲小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄畜水於下加所當也

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

傷寒心下水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者

此寒去欲解也小青龍湯主之

欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表證未罷也與小青龍湯發表散水服湯已渴者裏氣溫水

氣散為欲解也

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

脈浮弱者榮弱衛強也

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁

湯主之

下後大喘則為裏氣太虛邪氣傳裏正氣將脫也

下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也

與桂枝湯以解外加厚朴杏仁以下逆氣

太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外者

宜桂枝湯主之

經曰本發汗而復下之爲逆也若先發汗治不爲逆

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之

經曰柴胡湯證具而以他藥下之柴胡湯證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆則其類矣

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

脈浮緊無汗發熱身疼痛太陽傷寒也雖至八九日而表證仍在亦當發其汗既服溫暖發散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也邪氣不爲汗

解鬱而變熱蒸於經絡發於肌表故生熱煩肝受血而能視始者氣傷榮寒既變熱則血爲熱搏肝氣不治故目瞑也劇者熱甚於經迫血妄行而爲衄得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

風寒在經不得汗解鬱而變熱衄則熱隨血散故云自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在

腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也

太陽病未解傳併入陽明而太陽證未罷者名曰併病續自微汗出不惡寒者爲太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未罷者爲表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明之經循面色緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從出擁甚於經故燥煩也邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更發汗則愈內經曰諸過者切之濇者陽氣有餘爲身熱無汗是

以脈瀋知陽氣擁鬱而汗出不徹

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

經曰諸脈浮數當發熱而灑淅惡寒言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脈實者則下後裏虛邪氣乘虛傳裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也

鍼經曰奪血者無汗尺脈遲者爲榮血不足故不

可發汗

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯

青浮爲輕手得之以候皮膚之氣內經曰其在皮者汗而發之

脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

浮則傷衛數則傷榮榮衛受邪爲病在表故當汗散

病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯

風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮不病者爲榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮腠是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和

榮衛則愈

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

其藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病汗之則愈所謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

傷寒脈浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚於經迫血妄行因致衄也

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清

者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必鞭
不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便
清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解
外若頭疼不已爲表不罷鬱甚於經迫血妄行上
爲衄也

傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂
枝湯主之

煩者熱也發汗身涼爲已解至半日許身復熱脈
浮數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自
愈

重亡津液則不能作汗必待陰陽自和乃自愈矣
大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之

得小便利必自愈

因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津液足小便利必自愈也

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血振寒者陽氣微也脈微細者陰血弱也

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

下之虛其裏汗之虛其表既下又汗則表裏俱虛陽王於晝陽欲復虛不勝邪正邪交爭故晝日煩燥不得眠夜陰王陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴者裏無熱也身無大熱者表無熱也又

無表證而脈沉微知陽氣大虛陰寒氣勝與乾薑
附子湯退陰復陽

乾薑附子湯方

乾薑

辛熱兩味

附子一枚

生用去皮破
八片味辛熱

內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒大甚是以辛熱
劑勝之也

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩
人參三兩新加湯主之

汗後身疼痛邪氣未盡也脈沉遲榮血不足也經
曰其脈沉者榮氣微也又曰遲者榮氣不足血少
故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參
以益不足之血

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之

發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁湯汗出則喘愈今汗出而喘為邪氣擁甚桂枝湯不能發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣甚也發無大熱者表邪必甚也與麻黃杏仁甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩去節杏仁五十箇去皮

甘草二兩炙石膏半斤碎綿裹

內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪

外甚故以純甘之劑發之

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升去滓溫服一升本云黃耳椽

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

發汗過多亡陽也陽受氣於胸中胸中陽氣不足故病叉手自冒心心下悸欲得按者與桂枝甘草湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方

桂枝四兩去皮甘草二兩炙

桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而緩中

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發

動也腎之積名曰奔豚發則從少腹上至心下為腎氣逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓

半斤味甘平

甘草

二兩炙味甘平

大棗

十五枚味甘平

桂枝

四兩去皮

茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之無力取不助腎氣也

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之
吐後腹脹與下後腹滿皆為實言邪氣乘虛入裏
為實發汗後外已解也腹脹滿知非裏實由脾胃
津液不足氣滯不通壅而為滿與此湯和脾胃而
降氣

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴

半斤去皮炙味苦温

生薑

半斤切味辛温

半夏

半斤洗味辛平

人參

一兩味温

甘草

二兩炙味甘平

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴之
苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑
之辛以散滯氣

右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服
傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈

沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸表虛陽不足起則頭眩脈浮緊為邪在表當發汗脈沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣陽氣外虛則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以和經益陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓四兩味平

桂枝三兩去皮味辛熱

白朮二兩味甘温

甘草二兩味甘平

陽不足者補之以甘茯苓白朮生津液而益陽也

裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

右四味以水六升煮取三升去滓分温參服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗病解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩味酸微寒 甘草三兩炙味甘平
附子一枚炮去皮破

芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而補衛甘草之甘調和辛酸而安正氣已上三味以水伍升煮取一升伍合去滓分溫服疑非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

發汗若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽

氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁

與茯苓四逆湯以復陰陽之氣

茯苓四逆湯方

茯苓 甘六兩 平 味

人參 甘一兩 溫 味

甘草 二兩 甘 平 炙

乾薑 味一兩 辛 熱

附子 破一枚 生用 去皮 味辛 熱

四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰

右伍味以水伍升煮取三升去滓溫服七合日三服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃

氣與調胃承氣湯

汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏

實也經曰汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃

承氣湯和胃氣

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

發汗已解胃中乾煩燥不得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脈浮者表未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微熱消渴者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏

五苓散方

猪苓

十八銖味甘平去皮

澤瀉

一兩六銖味甘酸鹹

茯苓

十八銖味甘平

桂枝

半兩去皮味辛熱

白朮

十八銖味甘平

淡者一也口入一而為甘甘甚而反淡甘緩而淡滲猪苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液鹹

味下泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘發散為陽桂枝之辛甘以和肌表

右伍味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

發汗已脈浮數者表邪未盡也煩渴亡津液胃燥也與五苓散和表潤燥

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

傷寒汗出而渴者亡津液胃燥邪氣漸傳裏也五苓散以和表裏若汗出不渴者邪氣不傳裏但在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合衛

茯苓甘草湯方

茯苓 二兩 味甘 平

桂枝 二兩 味甘 辛 熱 去皮

生薑 三兩 味甘 辛 溫 切

甘草 一兩 味甘 平 炙

茯苓甘草之甘益津液而和衛桂枝生薑之辛助陽氣而解表

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

中風發熱至六七日則當解若不解煩者邪在表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能消水水入則不吐裏熱少則不能消水停積不散飲而吐水也以其因水而吐故名水逆與五苓散和表裏散停飲

未持脈時病人手叉自冒心師因教試令效而不效

者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

發汗多亡陽胸中陽氣不足者病人手叉自冒心師見外證知陽氣不足也又試令欬而不即欬者耳聾也知陽氣虛明矣耳聾者陽氣虛精氣不得上通於耳故也

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

喘肺疾飲水多喘者飲冷傷肺也以冷水灌洗而喘者形寒傷肺也

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止發汗後水藥不得入口爲之吐逆發汗亡陽胃中虛冷也若更發汗則愈損陽氣胃氣大虛故吐下不止

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之

發汗吐下後邪熱乘虛客於胸中謂之虛煩者熱也胸中煩熱鬱悶而不得發散者是也熱氣伏於裏者則喜睡今熱氣浮於上煩擾陽氣故不得眠心惡熱熱甚則必神昏是以劇者反覆顛倒而不安心中懊懣而憤悶懊懣者俗謂鶻突是也內經曰其高者因而越之與梔子豉湯以吐胸中之邪梔子豉湯方

梔子

十四枚擘
味苦寒

香豉

四合綿裹
味苦寒

酸苦湧泄爲陰苦以湧吐寒以勝熱梔子豉湯相合吐劑宜矣

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一

升半去滓分爲二服溫進一服得吐者止後服若少
氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主
之

少氣者熱傷氣也加甘草以益氣嘔者熱煩而氣
逆也加生薑以散氣少氣則氣爲熱搏散而不收
者甘以補之可也嘔則氣爲熱搏逆而不散者辛
以散之可也

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

陽受氣於胸中發汗若下使陽氣不足邪熱客於
胸中結而不散故煩熱而胸中窒塞與梔子豉湯
以吐胸中之邪

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲
解也梔子豉湯主之

傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱去心
胸空者爲欲解若大下後身熱去而心結痛者結
胸也身熱不去心中結痛者虛煩也結胸爲熱結
胸中爲實是熱氣已收斂於內則外身熱去虛煩
爲熱客胸中未結爲實散漫爲煩是以身熱不去
六七日爲欲解之時以熱爲虛煩故云未欲解也
與梔子豉湯以吐除之

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之
下後但腹滿而不心煩卽邪氣入裏爲裏實但心
煩而不腹滿卽邪氣在胸中爲虛煩旣煩且滿則
邪氣壅於胸腹之間也滿則不能坐煩則不能臥
故臥起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿

梔子厚朴湯方

梔子十四枚 擘厚朴四兩 姜炙 苦温

枳實四枚 水浸去穢 炒 味苦寒

酸苦湧泄梔子之苦以湧虛煩厚朴枳實之苦以

泄腹滿

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分二服温

進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑

湯主之

丸藥不能除熱但損正氣邪氣乘虛留於胸中而

未入深者則身熱不去而微煩與梔子乾薑湯吐

煩正氣

梔子乾薑湯方

梔子十四枚 擘乾薑二兩 味辛 熱

苦以湧之梔子之苦以吐煩辛以潤之乾薑之辛以益氣

右貳味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之
病人舊微溏者裏虛而寒在下也雖煩則非蘊熱故不可與梔子湯內經曰先泄而後生他病者治其本必且調之後乃治其他病

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之

發汗不解仍發熱邪氣未解也心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者汗出亡陽也裏虛爲悸上虛爲眩經虛爲身瞤振振搖與真武湯主之溫經復陽

咽喉乾燥者不可發汗

津液不足也

淋家不可發汗發汗必便血

膀胱裏熱則淋反以湯藥發汗亡耗津液增益客

熱膀胱虛燥必小便血

瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則瘡

表虛聚熱則生瘡瘡家身疼如傷寒不可發汗發

汗則表氣愈虛熱勢愈甚生風故變瘡也

衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能眴

不得眠

衄者上焦亡血也若發汗則上焦津液枯竭經絡

乾澀故額上陷脈急緊諸脈者皆屬於目筋脈緊

急則牽引其目故直視不能眴眴瞬合目也鍼經

四曰陰氣虛則目不瞑亡血爲陰虛是以不得眠也
亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

鍼經曰奪血者無汗奪汗者無血亡血發汗則陰
陽俱虛故寒慄而振搖

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸
闕

汗者心之液汗家重發汗則心虛恍惚心亂奪汗
則無水故小便已陰中疼

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

病人有寒則當溫散反發汗損陽氣胃中冷必吐
蚘也

本發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本
先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆

病在表者汗之爲宜下之爲逆病在裏者下之爲宜汗之爲逆經曰陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏者以裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒爲卒也

病發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

發熱頭痛表病也脈反沉者裏脈也經曰表有病者脈當浮大今脈反沉遲故知愈也見表病而得裏脈則當差若不差爲內虛寒甚也與四逆湯救其裏

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後復下之

冒者鬱也下之則裏虛而亡血汗之則表虛而亡陽表裏俱虛寒氣拂鬱其人因致冒金匱要略曰亡血復汗寒多故令鬱冒汗出則拂鬱之邪得解則冒愈金匱要略曰冒家欲解必大汗出汗出表和而裏未和者然後復下之

太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽

脈微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯主之

脈陰陽停無偏勝者陰陽氣和也經曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等此脈陰陽爲和平雖劇當愈今陰陽旣和必先振慄汗出而解但陽脈微者陽不足而陰有餘也經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脈微者陰不足而陽有餘也經曰陽盛陰虛下之則愈

太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯

太陽中風風併於衛則衛實而榮虛榮者陰也衛者陽也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪

調和榮衛

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或效者與小柴胡湯主之

病有在表者有在裏者有在表裏之間者此邪氣在表裏之間謂之半表半裏證五六日邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日也玉函曰中風五六日傷寒往來寒熱卽是或中風或傷寒非是傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表

則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胸脇苦
滿知邪氣在表裏之間未至於心腹滿言胸脇苦
滿知邪氣在表裏也默默靜也邪在表則呻吟不
安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默
者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食
邪在裏則不能食不欲食者邪在表裏之間未至
於必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩
滿而嘔煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未
有定處則所傳不一故有或為之證有柴胡證但
見一證便是即是此或為之證

小柴胡湯方

柴胡半斤味苦微寒

黃芩三兩味苦寒

人參三兩味甘溫

甘草三兩味甘平

半夏半升味辛溫

生薑三兩味辛溫

大棗十三枚 味甘 温 擘

內經曰熱淫于內以苦發之柴胡黃芩之苦以發
傳邪之熱裏不足者以甘緩之人參甘草之甘以
緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半夏
以除煩嘔邪半在表則榮衛爭之辛甘解之薑棗
以和榮衛

右柒味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
温服一升日三服

後加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括萋實一枚

胸中煩而不嘔熱聚而氣不逆也甘者令人中滿
方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半
夏之辛温熱宜寒療聚宜苦括萋實苦寒以泄胸

中蘊熱

若渴者去半夏加人參合前成肆兩半括萇根肆兩
半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括萇根苦
而涼徹熱生津二物爲當

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

去黃芩惡寒中加芍藥以通壅

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣肆兩

甘令人中滿痞者去大棗之甘鹹以熯之痞鞭者

加牡蠣之鹹

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓肆兩

飲而水畜不行爲悸小便不利內經曰腎欲堅急

食苦以堅腎則水益堅故去黃芩淡味滲泄爲陽

茯苓甘淡以泄伏水

若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈

不渴者裏和也故去人參外有微熱表未解也加桂以發汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩欬者氣逆也甘則壅氣故去人參大棗內經曰肺欲收急食酸以收之五味子之酸以收逆氣肺寒則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之人之氣血隨時盛衰當月郭空之時則爲血弱氣盡腠理開疎之時也邪氣乘虛傷人則深鍼經曰

月郭空則海水東盛人血氣虛衛氣去形獨居肌肉減皮膚緩腠理開毛髮殘瞠理薄垢落當是時遇賊風則其入深者是矣邪因正虛自表之裏而結於脇下與正分爭作往來寒熱默默不欲飲食下爲自外之內經絡與藏府相連氣隨經必傳於裏故曰其痛下痛一作病邪在上焦爲邪高邪漸傳裏爲痛下裏氣與邪氣相搏逆而上行故使嘔也與小柴胡湯以解半表半裏之邪

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之
服小柴胡湯表邪已而渴裏邪傳於陽明也以陽明治之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者

與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫則邪氣在半表半裏未爲實反二三下之虛其胃氣損其津液邪蘊於裏故不能食而脇下滿痛胃虛爲熱烝之熏發於外面目及身悉黃也頸項強者表仍未解也小便難者內亡津液雖本柴胡湯證然以裏虛下焦氣澁而小便難若與柴胡湯又走津液後必下重也不因飲水而嘔者柴胡湯證若本因飲而嘔者水停心下也金匱要略曰先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食穀者物皆聚而噦皆非小柴胡湯所宜二者皆柴胡湯之戒不可不識也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯主之

身熱惡風頸項強者表未解也脇下滿而渴者裏不和也邪在表則手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足温者知邪在表裏之間也與小柴胡湯以解表裏之邪

傷寒陽脈澁陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

脈陽澁陰弦而腹中急痛者當作裏有虛寒治之與小建中湯温中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表之裏裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除傳裏之邪

小建中湯方

桂枝

三兩去皮 味辛熱

甘草

三兩炙 味甘平

大棗

十二枚 味甘溫

芍藥

六兩 味酸微寒

生薑

三兩切 味辛溫

膠飴

一升 味甘溫

建中者建脾也內經曰脾欲緩急食甘以緩之膠飴大棗甘草之甘以緩中也辛潤散也榮衛不足潤而散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收也泄也正氣虛弱收而行之芍藥之酸以收正氣右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

柴胡證是邪氣在表裏之間也或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬但見一證便宜與柴胡湯

治之不必待其證候全具也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

邪在半表半裏之間爲柴胡證卽未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不爲逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也正氣勝陽氣生却復發熱汗出而解也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒二三日邪氣在表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣搏所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先建其裏

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證

仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

日數過多累經攻下而柴胡證不罷者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡湯疾證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡者是也嘔止者表裏和也若嘔不止鬱鬱微煩者裏熱已甚結於胃中也與大柴胡湯下其裏熱則愈

大柴胡湯方

柴胡半斤 味甘平 味

黃芩三兩 味苦寒

芍藥三兩 味酸微寒

半夏半升 味辛溫 洗

生薑五兩 味辛溫 切

枳實四枚 味苦寒 炙

大棗十二枚 味甘溫 擘

大黃二兩 味苦寒

柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣辛甘和

也薑棗之辛甘以和榮衛

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方用大黃二兩若不加大黃恐不爲大柴胡湯也

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之

傷寒十三日再傳經盡當解之時也若不解胸脇滿而嘔者邪氣猶在表裏之間此爲柴胡湯證若以柴胡湯下之則更無潮熱自利醫反以丸藥下之虛其腸胃邪氣乘虛入府日晡所發潮熱熱已而利也潮熱雖爲熱實然胸脇之邪未已故先與

小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消以下胃熱
傷寒十三日不解過經讖語者以有熱也當以湯下
之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫
以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反
和者此爲內實也調胃承氣湯主之

傷寒十三日再傳經盡謂之過經讖語者陽明胃
熱也當以諸承氣湯下之若小便利者津液偏滲
大便當鞭反下利者知醫以丸藥下之也下利脈
微而厥者虛寒也今脈調和則非虛寒由腸虛胃
熱協熱而利也與調胃承氣湯以下胃熱
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其
外不解者尙未可攻當先解外外解已但少腹急結
者乃可攻之宜桃核承氣湯方

太陽膀胱經也太陽經邪熱不解隨經入府為熱
結膀胱其人如狂者為未至於狂但不寧爾經曰
其人如狂者以熱在下焦太陽多熱熱在膀胱必
與血相搏若血不為畜為熱迫之則血自下血下
則熱隨血出而愈若血不下者則血為熱搏畜積
於下而少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下熱
散血內經曰從外之內而盛於內者先治其外後
調其內此之謂也

桃核承氣湯方

桃仁

五十箇去皮
尖味甘平

桂枝

二兩去皮
味辛熱

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩炙

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下
焦畜血散以桂枝辛熱之氣寒以取之熱甚搏血

故加二物於調胃承氣湯中也

右伍味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下水先食溫服伍合日三服當微利

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽經之時下之虛其裏而熱不除胸滿而煩者陽熱客於胸中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也讖語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯以除胸滿而煩加龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以逐胃熱止讖語加桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪斯悉愈矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏 二合洗

大棗 六枚

柴胡 四兩

生薑 一兩半

人參 一兩半

龍骨 一兩半

鈆丹 一兩半

桂枝 去皮一兩半

茯苓 一兩半

大黃 二兩

牡蠣 煨一兩半

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一二沸去滓温服一升

傷寒腹滿讖語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱

刺期門

腹滿讖語者脾胃疾也浮而緊者肝脈也脾病見

肝脈木行乘土也經曰水行乘火木行乘土名曰

縱此其類矣期門者肝之募刺之以瀉肝經盛氣

傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出

小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

傷寒發熱嗇嗇惡寒肺病也大渴欲飲水肝氣勝也傷寒也玉函曰作大渴欲飲酢漿是知肝氣勝也傷寒欲飲水者愈若不愈而腹滿者此肝行乘肺水不得行也經曰木行乘金名橫刺期門以瀉肝之盛氣肝肺氣平水散而津液得通外作自汗出內爲小便利而解也

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讖語十餘日振慄自下利者此爲欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也太陽病二日則邪在表不當發躁而反躁者熱氣

行於裏也反熨其背而發汗大汗出則胃中乾燥
火熱入胃胃中燥熱躁煩而讖語至十餘日振慄
自下利者火邪勢微陰氣復生津液得復也故爲
欲解火邪去大汗出則愈若從腰以下不得汗則
津液不得下通故欲小便不得熱氣上逆而反嘔
也欲失溲足下惡風者氣不得通於下而虛也津
液偏滲令大便鞭者小便當數經曰小便數者大
便必鞭也此以火熱內燥津液不得下通故小便
不數及不多也若火熱消津液和則結鞭之便得
潤因自大便也便已頭卓然而痛者先大便鞭則
陽氣不得下通既得大便則陽氣降下頭中陽虛
故卓然而痛穀氣者陽氣也先陽氣不通於下之
時足下惡風今陽氣得下故足心熱也

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齋頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讖語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治

風爲陽邪因火熱之氣則邪風愈甚迫於血氣使血氣流溢失其常度風與火氣謂之兩陽兩陽相熏灼熱發於外必發身黃若熱搏於經絡爲陽盛外熱迫血上行必衄熱搏於內者爲陰虛內熱必小便難若熱消血氣血氣少爲陰陽俱虛血氣虛少不能榮於身體爲之枯燥三陽經絡至頸三陰至胸中而還但頭汗出齋頸而還者熱氣炎上搏陽而不搏於陰也內經曰諸脹腹大皆屬於熱腹

滿微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內發上爲口
乾咽爛者火熱上熏也熱氣上而不下者則大便
不鞭若熱氣下入胃消耗津液則大便鞭故云或
不大便久則胃中躁熱必發讖語內經曰病深者
其聲噦火氣大甚正氣逆亂則噦內經曰四肢者
諸陽之本也陽盛則四肢實火熱大甚故手足躁
擾捻衣摸牀擾亂也小便利者爲火未劇津液未
竭而猶可治也

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

傷寒脈浮責邪在表醫以火劫發汗汗大出者亡
其陽汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內
迫則心神浮越故驚狂起臥不安與桂枝湯解未

盡表邪去芍藥以芍藥益陰非亡陽所宜也火邪錯逆加蜀漆之辛以散之陽氣亡脫加龍骨牡蠣之澁以固之本草云澁可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝三兩 去皮

甘草二兩 炙

生薑三兩 切

牡蠣五兩 熬 味酸鹹

龍骨四兩 味 甘平

大棗十二枚 擘

蜀漆三兩 洗去 脚味辛平

右爲末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必讖語弱者發熱脈浮解之當汗出愈

形作傷寒謂頭痛身熱也脈不弦緊則無傷寒表

脈也經曰諸弱發熱則脈弱為裏熱故云弱者必渴若被火氣兩熱相合搏於胃中胃中躁煩必發讖語脈弱發熱者得脈浮為邪氣還表當汗出而解矣

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名為火邪

此火邪迫血而血下行者也太陽病用火熏之不得汗則熱無從出陰虛被火必發躁也六日傳經盡至七日再到太陽經則熱氣當解若不解熱氣迫血下行必清血清廁也

脈浮熱甚反灸之此為實實以虛治因火而動必咽燥唾血

此火邪迫血而血上行者也脈浮熱甚為表實醫

以脈浮爲虛用火灸之因火氣動血迫血上行故咽燥唾血

微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也微數之脈則爲熱也灸則除寒不能散熱是慎不可灸也若反灸之熱因火則甚遂爲煩逆灸本以追虛而復逐熱爲實熱則傷血又加火氣使血散脈中氣主响之血王濡之氣血消散不能濡潤筋骨致骨焦筋傷血散而難復也

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也

脈浮在表宜以汗解之醫以火灸取汗而不得汗邪無從出又加火氣相助則熱愈甚身半以上同

天之陽半身以下同地之陰火性炎上則腰已下陰氣獨治故從腰以下必重而痺也

欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也

煩熱也邪氣還表則爲煩熱汗出而解以脈浮故爲邪還表也

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩

燒針發汗則損陰血而驚動心氣針處被寒氣聚而成核心氣因驚而虛腎氣乘寒氣而動發爲奔豚金匱要略曰病有奔豚從驚發得之腎氣欲上乘心故其氣從少腹上衝心也先灸核上以散其

寒與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣
火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主
之

先火爲逆復以下除之裏氣因虛又加燒針裏虛
而爲火熱所煩故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣
湯以散火邪

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝 一兩

甘草 二兩

牡蠣 二兩 熬

龍骨 二兩

辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪
澁可去脫龍骨牡蠣之澁以收斂浮越之正氣
右爲末以水伍升煮取二升半去滓溫服八合日三

服

傷

寒

論

卷二

太陽傷寒者加溫針必驚也

寒則傷榮氣微者加燒針則血留不行驚者溫針損榮血而動心氣金匱要略曰血氣少者屬於心

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆

惡寒發熱爲太陽表病自汗出不惡寒發熱者陽明證本太陽表病醫反吐之傷動胃氣表邪乘虛傳於陽明也以關脈細數知醫吐之所致病一二日爲表邪尙寒而未成熱吐之則表寒傳於胃中胃中虛寒故腹中飢而口不能食病三四日則表

邪已傳成熱吐之則表熱乘虛入胃胃中虛熱故
不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐也朝食暮吐者晨
食入胃胃虛不能剋化卽知至暮胃氣行裏與邪
氣相搏則胃氣反逆而以胃氣尙在故止云小逆
太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近
衣此爲吐之內煩也

太陽表病醫反吐之傷於胃氣邪熱乘虛入胃胃
爲邪熱內煩故不惡寒不欲近衣也

病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者此以發汗
令陽氣微隔氣虛脈乃數也數爲客熱不能消穀以
胃中虛冷故吐也

陽受氣於胸中發汗外虛陽氣是令陽氣微隔氣
虛也數爲熱本熱則合消穀客熱則不能消穀因

發汗外損陽氣致胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胸中痛當責邪熱客於胸中大便反澹腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上中二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃爲實非柴胡湯所能去調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血

乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

太陽經也膀胱府也此太陽隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時脈微而沉邪氣在裏之脈也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胸中若不結於胸中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞭滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

小蛭

三十箇熬味鹹苦寒

蝨蟲

三十箇熬去翅味苦微寒

桃仁

二十箇去皮尖味苦甘平

大黃

三兩酒浸味苦寒

苦走血鹹勝血蝨蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩

結苦泄熱桃仁大黃之苦以下結熱

右四味爲末以水伍升煮取三升去滓溫服一升不
下再服

太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者爲無血也
小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

身黃脈沉結少腹鞭小便不利者胃熱發黃也可
與茵陳湯身黃脈沉結少腹鞭小便自利其人如
狂者非胃中瘀熱爲熱結下焦而爲畜血也與抵
當湯以下畜血

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也
當下之不可餘藥宜抵當丸

傷寒有熱少腹滿是畜血於下焦若熱畜津液不
通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行小便

自利者乃爲畜血當與桃人承氣湯抵當湯下之
然此無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故
不可餘駛峻之藥也可與抵當丸小可下之也

抵當丸方

水蛭

二十箇
味苦寒

蝨蟲

二十五箇
味苦微寒

桃仁

二十箇
去皮尖

大黃

三兩

右四味杵分爲四丸以水一升煮一九取七合服之
晬時當下血若不下者更服

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必
苦裏急也

飲水多而小便自利者則水不內畜但腹中水多
令心下悸金匱要略曰食少飲多水停心下甚者
則悸飲水多而小便不利則水畜於內而不行必

苦裏急也

釋音

內諸藥上音納

見風脈上音現

芘柴音

人復下音參

更衣改音庚

又女江痛悔亂

眴音縣目

嘿音墨

蒸諸仍火

諦音帝

駘峻上音決下思

啜粥上音昌悅切

漬疾智切

瞑音冥視

啞咀上音父下才

沫末音

窒塞栗切

慄音栗

但見下音現

募墓音

水蛭質音

協熱上音挾

虻中音長入腹

悸其季切

與豆與豆切

懊懺上下刀切

擗脾入切

蘊紆問切

飴音怡

滲色蔭切

蝨音育

悍音汗

鈞
賢音

註解傷寒論卷第三

傷寒

論卷三

三
中華書局聚