



10. 12. 1911

31080/A

R





LIBELLUS
PHARMACEUTICUS

COMPOSITA ET PRAEPARATA
PRAECIPUA PRAEPARANDI MO-
DUM ET ENCHEIRESES
EXHIBENS

cui accedunt

T A B U L A E

pro

compositionum pharmaceuticarum
prospectu faciliori

edidit


JOANNES BERNARDUS KEUP

Medicinae Doctor, Urbis & Satrapiae Solingensis, in Ducatu
Montensi, Medicus ordinarius.

Duisburgi ad Rhenum

in Commisſis Fratrum Helwing.

MDCCLXXXIX.



250777 92171
100
100



100 100 I

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Illustrissimo,
Excellentissimoque Domino,

Domino

Francisco Carolo

S. I. R. Comiti de Nesselrode in Ehreshoven
Serenissimi atque potentissimi Caroli Theodori
Electoris palatino bavarici,

in regimine splendidissimo ducatus Iuliacensis ac Montensis
Cancellario supremo, eminentissimoque, summi dicasterii
belli, redituumque curam gerentis, ut & summe venerabilis
appellationum Tribunalis Praesidi sapientissimo, nec non
Satrapiae Steinbach Praefecto supremo, longe gravissimo,
ordinisque Sancti Huberti Equiti, &c. &c. &c.

Musarum Protectori ac Promotori

Domino suo Gratosissimo

in publicum Pietatis ac venerationis fan-
tissimae documentum

libellum huncce

submissa mentis devotione

cum voto perpetuae incolumitatis ardentissimo

D. D. D.

Joannes Bernardus Keup

Medicinae Doctor.

Excellens...
D... ..

Francisco Carolo

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



Praefatio.

Quae circa libelli huius pharmaceutici editionem praefanda habeo, pauca sunt. Plerisque Germaniae medicis hucusque in usu & quasi liber symbolicus erat Pharmacopoea Wirtembergica. Eadem

ego quoque per plures annos usus, ut nova emendaretur editione, saepe saepius optavi, mecumque optaverunt a multis retro annis alii permulti. Prodiit quidem tandem Lausannae 1785 editio nova; sed immutata plane, omnibus superfluis — superstitiosis, non amplius usitatis medicamentorum compositorum formulis referta spem omnium pessime fefellit. Denique ex perillustri Baldingeri promptuarii novi 1787. vol. IX. parte VI. p. 533. Stutgardiae novam pharmacopoeae Wirtembergicae editionem 1786 in lucem prodidisse, video. Verum enim vero quum

in

in earafura eboris — unguulae alcis — corallia rubra & alba — margaritae — cranium humanum & talia plura medicamentorum compositorum formulas adhuc ingrediuntur*), quid de ea tenendum fit, nemo non facile mecum perfpiciet. Quare, dum praefentem libellum fecundum Wir-

A 3

tem-

*) Pulchre reformavit *famosum pulverem marchionum*, quem supra dicta ingrediuntur, Hoffmannus Wimarenfis fequentem in modum: Rec. magnesiae ex fale anglico ℥iijss. pulv. rhei ℥ss visci querni-foliorum aurantium aa ℥i f. p. subtilissimus, adde fol. auri Nr. V. —

tembergicae pharmacopoeae ordinem digestum typorum beneficio publici iuris fecerim, non inutilem me suscepisse laborem spero. Addidi simul, antehac ab illustri Baldingero in diarii sui vol. II. parte V. 1785 Germanice traditas pro compositionum pharmaceuticarum prospectu facilliori tabulas. Insignem earum utilitatem iam dudum eruditi statuerunt omnes. Habent namque tali ratione medici & pharmacopoei nostro usuri libello plurimarum compositionum pharmaceuticarum naturae penitus indagandae occasionem facillimam, agendorumque normam quasi brevissimi-

vissimam. Nullum hinc ipsis locum adsignari aptiorem, convenientioremque potuisse, firmiter mihi persuasum erat. Operam dedi praeterea, ut earum a me instituta in linguam latinam versio nervosum ubique summi Baldingeri sensum exprimeret rite, ut clara sic, intellectuque facilis evaderet omnibus. Tandem, aequos doctosque censores serena fronte hunc accepturos libellum, maximopere spero; sique corrigenda corrigant, addenda ut addantur, reiicienda ut reiiciantur, moneant, doceantque, indeque maiorem ipsi concilient utilitatem, id

gratissimo agnoscere animo, iustissimum mihi & iucundissimum erit officium.

Scripti Solingae in Ducatu
Montensi ipsis Iannuarii idibus
MDCCLXXXIIX.


Dr. J. B. Keup.



TABULAE

pro

pharmaceuticarum compositionum
prospectu faciliori.





Tabulae pro meliori compositionum pharmaceuticarum prospectu.

SECTIO PRIMA.

Salia media.

In genere praevis notandum est, ex alcali puro & acido puro composita salia media, salia media perfecta vocari. Salia media imperfecta dicuntur, si una pars constitutiva solummodo salinae, altera autem, sicuti v. g. in alumine, terreae est
in-

indolis. Sic dantur salia metallica, si acidum saturatur partibus metallicis. Salia media imperfecta audiunt quoque salia anomala. Sal medium appellatur etiam: Sal neutrum, si enim plenarie saturatum est, tunc neque acidum est, neque alcali, sed generis neutrius — inde quoque salia enixa, vel salia falsa, quoniam cum uno sale, alterum quasi salitum est, nominantur. Ex sale, sali admixto, novum producit sal. Omne alcali minerale vel vegetabile, fixum, volatileque, cum omni triplicis naturae regni acido salis mediæ genus evadit, mox in sicca solida forma, plus, minusve solubile — mox sal medium volatile, difficulter, vel plane non in siccam redigendum formam. Notum porro est, omne sal medium, si sua sponte in crystallos abeat, proprias crystallosum adsumere figuras, encheireses crystallos reddere pulchriores, ipsasque crystallos, manente vera salis natura, quoad figuram mutari posse. Sic saturata salium mixtio ad plenariam siccitatem, celeriter inprimis, evaporata informem exhibet massam salinam. Quaedam salium genera, uti tartarus tartarizatus, nullas abeunt in crystallos, sed terrae potius similia conspiciuntur — inter quae terra quoque foliata tartari numeratur. Quaedam in pauca sol-

Solvuntur aqua, deliquescunt facile, quemadmodum modo dicta. Alia maiorem menstrui portionem, eamque requirunt fervidam.

Omnia salia media ex alcali fixo minerali constantia cubicam amant figuram. Maximas, pulcherrimasque crystallos largitur sal polychrestum Seignette. Ex alcali fixo vegetabili, acidoque vitriolico composita salia media parvas dant, firmasque crystallos, difficulter in aqua solubiles. Alcali autem vegetabile fixum, aceto vel tartari acido saturatum, in sal medium facile solubile abit.

Alcali animale fluidum acido salis communis saturatum, sal ammoniacum fixum commune largitur, reliquis autem acidis mineralibus impraegnatum salia dat media volatilia. Pelluciditatem crystallis aqua dat sic dicta crystallisationis admixta, hac perdita, crystalli in farinam collabuntur. Crystallorum uncia dimidia plus salis tunc continet, quam si crystallisationis aqua adhuc est admixta. Unica una sic callapsi salis Glauberi fortius purgat, quam si crystallisationis aquam nondum amisit.

Usita.

que dosi maiori datum relaxat. Vires concoctrices eius abusu debilitantur, totumque corpus cachecticum reddi potest. Hanc ob rationem in veris febribus putridis plus damni adfert, quam propter vim suam anteputridinosam prodest. Irritat quoque, & auget in pleuritide — haemoptysi tussim, unde noxium potius, quam utile. Sistet in his morbis remedium.

c) Salis communis.

Sal digestivum seu febrifugum
Sylvii

Obtinetur tanquam residuum & tanquam productum secundarium,

*) primo, si sal ammoniacum & cineres clavellati in retorta vitrea sicci commisceantur & ad sublimationem reponuntur, ubi alcali fixum, volatile ex sale ammoniaco expellit, fixumque cum residuo acido salis communis in sal febrifugum Sylvii mutatur, quod a sale communi propter solum alcali differt. Sal commune ex alcali minerali fixo, Sal Sylvii ex alcali vegetabili fixo constat. Acidum in utroque idem est.

***) Si Sali ammoniaco & cineribus clavellatis liquidum affunditur, obtinetur productum volatile, spiritus salis
ammo-

ammoniaci — spiritus urinosus h. e. alcali volatile in forma fluida, sicut in priori processu in forma sicca — idemque residuum seu sal febrifugum Sylvii remanet.

2) Vegetabili

a) aceti producit

terram foliatam tartari, seu arcænum tartari, haec requirit proprie alcali ex tartaro & acidum aceti vini aridum tartari, quod prius fermentatione & destillatione concentratius factum etiam partes continet oleosas.

Westendorf ex destillato vini aceto & alcali minerali sali Seignette simile sal parabat, unde acidi vitriolici ope tunc concentratum aceti acidum pro sua naphtha expellebat.

b) tartari praebet

tartarum tartarifatum.

Pretiosum adeo sal tartari non requiritur, cineres clavellati depurati idem praestant, dum tartari crystallis saturantur.

Nunc autem in cremore tartari iam latet tartarus tartarifatus, ex alcali tartari & acido vini — nisi, quod acidum praedominetur — igitur ad plenariam huius acidi saturationem additamentum adhuc alcalinum necessarium est — ubi hic pro minuendo producti pretio, cineres clavellati

depurati eliguntur. Cryſtalli tartari autem praeterea admixtam continent terram. Hinc tartarus tartarifatus proprie ſequentes habet partes conſtitutivas,

- 1) acidum tartari
- 2) alcali tartari
- 3) alcali cinerum clavellatorum
- 4) terram in cryſtallis tartari latentem
- 5) partes oleoſas tartaro iunctas,

ſicuti terra foliata tartari partes oleoſas ex aceto habet.

Uterque ſal ſub improvida ad ſiccitatem evaporatione facile comburitur. Neceſſaria igitur haec cautela eſt, ut lento ad ſiccitatem evaporetur modo, ne comburatur, perdaturque. Ambo ſunt ſalia media oleoſa — vera ſalia ſaponacea — unde prae reliquis viribus ſuis reſolventibus eminent — parem praestant effectum, viliorique pretio conſtans tartarus tartarifatus non minori exhibetur cum emolumento, quam multo pretioſior terra foliata.

- c) Citri largitur
tartarum citratum.

Sal medium rari uſus. Huc quoque pertinent abſorbentia citrata, ſi ſcilicet oculi cancrorum, teſtae concharum praeparatae citri ſucco vel aceto ſaturantur.

Alcali volatile

(ex animali regno, cornibus, ossibus,
unguibus, urina)

producit cum

- 1) acido minerali,
 - a) Salis communis,
sal ammoniacum

forma sicca — tam sublimando, quam
crystallifando. Omnia reliqua salia am-
moniacalia magis amant fluidam formam,
neque operae pretium est, abstrahere
fluidum.

- b) vitrioli

sal ammoniacum secretum Glauberi.

Nullius est in medicina usus. Spiritus vi-
trioli cum spiritu quodam urinoso potest
misceri. —

- c) nitri

nitrum flammans seu volatile.

Quoque non est in usu.

- 2) acido vegetabili

- a) aceti

spiritum Mindereri,

Inventum medici Scoti Minderer. Sal vola-
tile cornu cervi, aut salis ammoniaci cum
aceto vini saturatum, aut spiritus cornu
cervi &c. spiritus salis ammoniaci cum
aceto vini simplici, destillato — spiritu
aceti, similia evadunt producta, earun-
dem virium. Sive menstruum est spiri-

tuosum, aut aquosum, est solummodo varietas producti, quoad effectum sibi similis. Medicina recentioribus temporibus usitatissima.

b) tartari, fit

tartarus solubilis;

qui longe fluidior, solubilior, quam communis tartarus tartarifatus, a quibusdam etiam tartarus solubilis dictus, quia sponte saepius liquescit, aut pauca solummodo pro sui solutione indiget aqua.

c) Citri evaderet sal medium fluidum tartaro citrato simile.

Huc quoque locus assignandus liquori cornu cervi succinato, ex alcali volatili cornu cervi, acido succini saturato.

Medicus salibus usus mediis nullam aliam observandam habet differentiam, quam, an crassiora, vel teneriora, solubilia, aut minus solubilia — magisque sint refrigerantia. Tenerrima, subtilissimaque sunt terra foliata tartari & deinde tartarus tartarifatus.

Valde solubile, temperans, bilis acridinem corrigens est sal polychrestum Seignette, gallis adeo gratum, dolendum, quod ita pretiosum sit, unde inferioris fortis homines sali mirabili Glauberi, tartaroque vitriolato oportet esse contentos, solis quippe divitibus salia media pretiosiora

fiora praescribi possunt. Quilibet medicus aegrotis inferioris, infimique ordinis formulas praescribendas tam viles pretio, quam fieri potest — facere debet.

Ast summe saltem ridiculae perillustri Baldingero omnes illae medicorum formulae videntur, quae sal mirabile Glauberi cum sale Seignette, aut tartarum vitriolatum, arcanum duplicatum & sal polychrestum Glaeseri simul praescripta continent. Ex proposito & iusta indicatione saepius omnino adhuc duo inter se miscentur salia, v. g. cum cremore tartari nitrum, aut tartari cremor cum sale ammoniaco, ast tunc scopus & ratio iubent, probantque hanc mixtionem. In chronicis ab obstructione viscerum natis morbis praecipue terrae foliatae tartari, tartarique tartarifati usus continuatus laudatur.

Liquor terrae foliatae tartari proprie vocari deberet, si hoc sal in tanta aquae copia solvitur, quanta pro eius solutione sufficit. Igitur etiam terrae foliatae tartari drachma una, diluta in aquae libra una, liquor est — ast debilior, quam ut magna inde expectari efficacia posset. Terra foliata tartari in tinctura rhei soluta, egregium est — varium in finem — mixtum. Comode etiam amarum resolventibus extractis admiscetur, sicuti in elixirio viscerali Hoff-

manni aut Kleinii. Tartarus tartarifatus cum pulvere rhei, flavedine corticum aurantiorum, oleoque caiaputi dat Kleinii solamen hypochondriacorum. Idem sal melle mixtum aqua dilutum est remedium Muzelii, quod in melancholia atrabilaria praestantissimum est medicamentum. Pariter cum taraxaci extracto &c. mixtum summa cum utilitate praescribitur. Praeter resolventium salium usum Boerhavius simul ptyšanas suadebat aperientes, aut amararum herbarum decocta. Sic certum est, quaedam efficacissimorum remediorum coniunctim, continuatoque usu adhibita, pertinacissimos vincere posse morbos. Sal mirabile Glauberi, salia fontana, sal Seignette ad unciam unam sumta, congrua sunt laxantia. Tamarindi aut cassia commodissime cum tartari cremore miscentur, quoniam illorum acidum sibi non est dissimile. Cum tamarindis mannam miscere, ineptum est & taediosum — at manna, tartarique foliata terra convenienter miscentur. Cum rhabarbaro salia optime infunduntur.

Salia media fixa — ad solvendas primarum viarum suburras, easque mobiles reddendas in omni febrium, chronicorumque morborum genere, antequam purgans exhibetur, parvis dosibus tanquam

quam digestivum — propinari solent. Ipecacoannhae, rheo, Jalappae, evacuandi scopo tanquam adiuvens, salis medii fixi scrupulus unus additur.

Nitrum, tartarusque vitriolatus non amplius in pulveris forma secundum Stahlii scopum miscentur, qui, nitrum sanguinem condensare credens, illi tartarum vitriolatum addendum tuebatur, ut sic — quantum nitrum condensando — tantum hoc diluendo ageret.

Mediorum salium abusus in fine relaxando nocet, ut omnium medicamentorum abusus nocere solet.

Recentiorum temporum sal epsoniense arte factum est. Caput mortuum vitrioli cum sale communi coquitur, filtratur, evaporatur, ideoque salis mirabilis Glauberi partes constitutivas habet.

Salia anomala.

Primaria sunt.

1) Borax,

qui constat ex alcali fixo minerali & sic dicto sale sedativo Hombergii, quod hic acidi sustinet vires. Omne acidum vegetabile vel minerale admixtum separat sal sedativum & coit cum alcali fixo boracis, unde diversae indolis sal medium oritur,

B 4

prout

prout ad separandum sal sedativum aliud acidorum genus fuit adhibitum — sic si vitrioli acidum adderetur, sal mirabile Glauberi emergeret &c.

2) Alumen.

constat ex terra aluminosa specifica & acido vitriolico.

3) Saccharum.

constat ex acido sacchari & partibus oleosis mucilaginosi.

Salia metallica.

1) Vitriolum martis.

constat ex ferro & acido vitriolico.

2) Vitriolum cupri.

constat ex acido vitrioli & cupro.

3) Vitriolum Zinci seu album.

constat ex Zinco & acido vitrioli.

4) Tartarus chalybeatus.

constat ex tartari acido & ferro.

5) Aurum fulminans.

si aurum in aqua regis solutum per alcali volatile praecipitatur. Si autem cum sale ammoniaco parata fuit aqua regis, ad praecipitationem alcali fixum sumitur.

6) Lapis infernalis

Argentum in aqua forti solutum, fusum & in formas effusum,

7) Flores salis ammoniaci martiales.
 Ferrum aut lapis haematites cum ammo-
 niaco sale sublimatum.

8) Saccharum saturni.
 Plumbum aceto nuptum.

9) Butyrum antimonii.
 Regulus antimonii cum acido salis com-
 munitis iunctus.

10) Salino mercurialia
 videatur mercurius.

SECTIO SECUNDA.

Acida.

A) Mineralia.

1) vitrioli largitur

a) cum alcali fixo minerali, sal mira-
 bile Glauberi.

b) cum magnesia, Bittererbe, salia
 fontana amara.

c) cum alcali fixo vegetabili, tarta-
 rum vitriolatum, arcanum duplicatum.

d) cum alcali volatili animali, sal
 ammoniacum secretum Glauberi.

e) cum ferro, vitriolum martis.

f) cum cupro, vitriolum cupri.

g) cum Zinco, vitriolum Zinci seu
 album.

h) cum mercurio, turpethum mine-
rale.

i) cum terra aluminosa, alumen.

k) cum spiritu vini, pro diversitate
ponderis reciproci, sola mixtione

*) aquam Rabelii.

***) elixir acidum Dippelii.

****) elixir acidum Halleri.

*****) aquam sclopetariam Thedenii.

& destillationis ope

α) liquorem anodynum mineralem Hoff-
manni

β) naphtham vitrioli & sic porro.

*) Acidum sulphuris producit,

1) cum alcali fixo vegetabili, tartarum vitriolatum volatilem Stahlii.

2) cum alcali nitri, sal polychrestum
Glaseri.

3) si cum nitro $\frac{1}{2}$ sulphuris funditur,
sal prunellae, nitrum non nihil decom-
positum cum pauxillo sulphuris acido
mixtum.

4) sulphur & nitrum largiuntur deto-
nationis in retorta ope clyssum sulphuris.
Si eodem modo detonantur antimonium
& nitrum, oritur clyssus antimonii, quippe
antimonium continet sulphur a communi
non differens sulphure.

2) Ni-

2) Nitri

ex hoc oritur

a) cum alcali fixo vegetabili, nitrum ordinarium & regeneratum.

b) cum alcali fixo minerali, nitrum cubicum.

c) cum alcali volatili, nitrum flammans seu sal ammoniacum nitratum.

d) cum spiritu vini, naphtha nitri & spiritus nitri dulcis, requiritur autem spiritus nitri fumans i. e. spiritus nitri per oleum vitrioli expulsus. Si vitrioli calcinati ope acidum est expulsus, oritur aqua fortis.

e) Aqua fortis & argentum constituunt lapidem infernalem.

f) Acidum nitri cum carbonum pulvere detonando expulsus vocatur clyffus nitri. v g.

Alcahest Glauberi, si nitrum detonationis & ignis ardentis vi in alcali causticum mutatur.

Liquor nitri fixi, si alcahest Glauberi in aqua dissolvitur.

3) Salis communis constituit

a) cum alcali fixo minerali, sal commune & regeneratum.

b) cum alcali fixo vegetabili, sal digestivum seu febrifugum Sylvii.

c)

c) cum alcali volatili, sal ammoniacum vulgare.

d) cum acido nitri, aquam regis.

e) cum regulo antimonii, butyrum antimonii.

f) cum mercurio, mercurium sublimatum corrosivum & mercurium dulce.

g) cum solutione mercurii in spiritu nitri, mercurium praecipitatum album.

h) cum stanno, spiritum salis fuman-tem Libavii.

i) cum spiritu vini, spiritum salis dulce & naphtham salis communis.

B) Acida vegetabilia.

1) Tartari exhibet

a) cum alcali fixo vegetabili, tartarum tartarifatum.

b) cum alcali minerali fixo, speciatim sale sodae, sal Seignette.

c) cum alcali volatili, tartarum solubilem.

d) cum ferro, martem tartarifatum.

e) cum antimonii partibus regulinis, tartarum emeticum.

2) Aceti facit

a) cum sale tartari, terram foliatam tartari.

b)

b) cum alcali fixo minerali v. g. soda, sali Seigneute, vel terrae foliatae simile sal.

c) cum spiritu vini, naphtham aceti.

d) cum saccharo, oxysaccharum.

e) cum melle, oxymel simplex, squilliticum, colchicum &c.

f) cum camphora, acetum camphoratum.

g) cum alcali volatili, spiritum Mindereri.

h) cum lithargyrio, acetum lithargyrii, saccharum saturni, extractum saturni Goulardi.

i) cum cupro, viride aeris.

3) Sacchari praebet

cum spiritu vini, naphtham sacchari.

SECTIO TERTIA.

Metalla & semimetalla largiuntur

I) Aurum,

aurum fulminans, de quo iam supra.

II) Argentum,

lapidem infernalem. vid. acidum nitri.

III) Cuprum.

a) cum aceto viride aeris & unguentum aegyptiacum,

b)

b) cum acido vitrioli, vitriolum cupri.

c) vitriolum cupri cum spiritu falis ammoniaci, specificum antiepilepticum Weismanni v. Pil. coerul. Edimburgens.

d) Cuprum cum spiritu falis ammoniaci, spiritum coeruleum ophthalmicum.

IV) Ferrum

a) cum antimonio, aethiopem martis Lemery.

b) cum sale ammoniaco, flores falis ammoniaci martiales.

c) cum acido vitrioli, vitriolum martis factitium, seu sal martis anglorum.

d) cum acido tartari, tartarum chalybeatum.

e) cum succo pomorum borsdorffianorum, Tincturam martis pomatam.

f) vitriolum martis cum tartari cremore, tincturam martis Clauderi.

g) — cum terra foliata tartari, tincturam martis Zwoelfferi

h) cum succo hellebori, tincturam martis helleboratam Wedelii.

i) cum aceto maceratum, tincturam antiphtificam Grammanni, vid. Crell, n. Entd. X, §, 91.

V) Plumbum.

a) si per se calcinatur, minium.

b) si cum aceto maceratur, cerussam.

c) si cum aceto decoquitur, Lithargyrium, medicamenta Goulardiana & ex cerussa in aceto soluta, saccharum Saturni.

VI) Antimonium.

Praeparatorum antimonialium copia facile comprehenditur, si sequens schema generale rite animadvertitur.

1) Antimonium constat ex parte regulina & sulphurea.

2) Ergo eius praeparata vel regulum, vel sulphur continent.

3) Partes constitutivae plus, minusve a se invicem sunt disiunctae, aut earum proportio reciproca magis est mutata.

4) In quibusdam praeparatis pars regulina ignis vel menstrui ope in calcem est conversa.

5) Additamenta praeparatis antimonialibus obtinendis addita mox magis in sulphuream, mox magis agunt in partem regulinam. Quaedam mere separando agunt, suamque in hanc vel illam antimonii partem exserunt efficaciam, fortiusque cum ea combinantur, quam ipsae inter se antimonii partes; sic ut una eius
pars

pars cum additamento se coniunxerit, altera parte manente libera. Tali modo alcali & ferrum separant ab antimonio partem sulphuream, regulumque liberum relinquunt. Ferrum enim & alcali cum antimonii sulphure intimius iunguntur, quam cum regulo sulphur combinatum erat. Additamenta plus, minusve antimonium mutant, prout eorum proportio reciproca aliter eligitur.

Nitri puri & antimonii partes aequales coeunt fusionis ope in tigillo in massam, quae a colore hepar antimonii vocatur. Nitrum mutatur in alcali & cum antimonii sulphure, sulphuris hepar componit, hoc autem ut menstruum agit simul in regulum, eumque solutum in se recipit. Est igitur haec massa mixtum ex sulphuris hepate, antimoniique partibus regulinis — aut mutato sermone: hepar sulphuris, quod regulum in se continet solutum. Quando autem antimonii partes duae, nitri partes tres recipiuntur, detonatione & calcinatione sulphur antimonii destruitur & expellitur, parsque regulina mutatur in calcem. Productum hoc antimonium diaphoreticum dicitur, melius autem vocaretur calx antimonii. Ustulatio sola iam destruit antimonii sulphur, illudque tandem in calcem mutat. Acidum salis communis

munis quoque antimonii calcem producit, quae lota sub nomine pulveris Algarothi nota est.

Ferrum, similiter ac alcali, additum sulphure privat antimonium. Ferro obtentus antimonii regulus, regulus antimonii martialis appellatur. Si accurate tantum ferri additur, quantum ad plenariam sulphuris a regulo separationem requiritur, regulus ipse ne unicum ferri granum continet. Si autem plus ferri, quam necessarium erat, additur, omnino aliquid ferri in regulum transit, & sic revera ferrum in se continet.

6) Omnis igitur diversorum praeparatorum antimonialium diversitas sequentibus nititur fundamentis: — partes constitutivae antimonii

a) plus, minusve a se invicem sunt disiunctae,

b) plus minusve mutatae, aliamque assumptas naturam, mox in scorias. — mox plus, minusve in calcem aut in vitrum conversae. — Unum praeparatum pluribus sulphureis — alterum pluribus regulinis gaudet partibus.

Pro antimonii regulo — proprio antimonii metallo, perfecte liberando, repetita saepius cum alcali puro fusio requiritur. Sub fusione pars gravior metallica mecha-

nice ex antimonii hepate fundum petit — producit infra regulum, supra scorias & sulphur. Regulus iteratis viribus separatus, novoque alcali puro fusus, purior tandem evadit.

7) Iam autem diversa antimonii præparata magis, minusve in acidis sunt solubilia — haec plures vel pauciores in se recipiunt partes regulinas — inde emeticorum antimonialium differentia — in tartaro emetico, vinoque emetico observata — dependet potissimum:

Diversus ignis gradus præparata antimonialia vario mutat modo. Pro fortiori, mitiorique ignis gradu calx antimonii, vitrum antimonii mox minus pellucidum, minusque solubile, mox pellucidius, solubiliusque largitur — unde vinum emeticum, tartarusque emeticus modo fortiorem, modo leniorem emefin excitandi vi pollent. Hac ratione antimonialium præparatorum prospectus erit facilior.

I) Sulphurea, sunt:

1) Sulphur antimonii auratum. Si hepar antimonii aqua fervida solvebatur & tunc affuso aceto præcipitabatur. Omne quidem acidum præcipitat sulphur auratum — hinc quoque aeque promte vi-

trioli

trioli acidum &c. Ast iam Huxhamius acido minerali factam pertimescebat praecipitationem.

Si praecipitatio crystallorum tartari ope instituebatur, hoc sulphur auratum olim panaceae Konderdingianae, & si solummodo spiritus vini sumebatur, panaceae Gläuberi nomine insigniebatur.

Non ignotum est, binas priores praecipitationes nimis fuisse drasticas, igiturque dosis solummodo parva determinata tertiae praecipitationis mox ad vomitum excitandum, mox ad resolvendum, ea adhuc longe minor, porrigebatur.

Cel. Götting admixto sulphure partes regulinas ita involvendas nuper docuit, ut iam praecipitatio prima secure praescribi possit *).

Sulphuris aurati, mercuriique dulcis partes aequales mixtae, subtilissimeque tritae, pulvis alterans Plummeri vocantur.

C 2

2) Ker-

*) Idem quoque cel. Selle in sua medicina clinica p. 638 docuit, addens, remedii huius usitatissimi pretium longe vilius futurum, si omnibus tribus praecipitationibus tantum sulphuris communis adderetur, ut earum agendi vis inde secura evaderet.

2) Kermes minerale, seu pulvis Carthusianorum. Si alcali causticum, antimoniumque in pulverem redactum aqua coquuntur, colantur & haec coëtionis operatio addito novo alcali caustico, liquore nitri fixo, repetitur, ut tandem, hoc iam 1734 ita docente Geoffroy, totum antimonium in Kermes mutatur, quod in colato liquore, pulveris tenerrimi instar, praecipitatur. — Cum sulphure regulus subtilissime ab alcali dissolutus inque sulphur auratum, regulinis impraegnatum partibus, est mutatus.

3) Sulphur antimonii auratum liquidum Jacobi,

Act. acad. mog. T. I. p. 231.

Gericke Dissertat. de sulphure aurato antimonii liquido 1776 recusa in perill.

Baldingeri sylloge Dissertationum practicarum, inque germanicam translata linguam 1784. 8.

Si ex reguli antimonii scoriis cum alcali fixo lixivium paratur saturatum, illique oleum expressum recens v. g. amygdalarum dulcium admiscetur, ex oleo & alcali sapo oritur, sulphure simul impraegnatus. Hic sapo solvitur in spiritu vini, & tali ratione sulphur auratum liquidum, vera tinctura antimonialis, obtinetur.

II) Regulina.

Cum sufficienti alcali fusum antimonium in hepar antimonii abit. vid. supra. Hic sulphureae & regulinae partes adhuc sunt coniunctae.

Si in mortario contunditur & aqua edulcoratur hoc hepar, pulvisque tunc ficatur, crocus metallorum vel terra sancta Rulandi.

Si croco metallorum affunditur vinum, oritur vinum emeticum, seu aqua benedicta Rulandi.

Si eidem saccharum additur, habetur Syrupus emeticus Glauberi, Angeli salae Zwoelfferi.

Si cum saccharo acetum ipsi admiscetur, Oxyfaccharum emeticum Schroederi vocatur.

Si hepatis antimonii recenti in mortario calefacto contuso super affunditur alcohol, digerendo provenit

Tinctura antimonii tartarifata.

In his itaque praeparatis a sulphureis partes regulinae nondum plenarie sunt disiunctae.

Verus antimonii regulus, a sulphure scilicet purgatum antimonii metallum — triplici acquiritur modo.

1) Fusione

requiritur, ut parum alcali, multumque antimonii combinetur, partes enim aequales nullum producant regulum, sed hepar

Si alcali loco nitrum eligitur, eiusque copia parva magnae additur antimonii portioni, oritur regulus, si nitri copia istam antimonii superat, calx oritur antimonii.

Alcali fixi loco, calcis vivae ope ex antimonio quoque regulus obtineri potest, calx namque eodem agit modo, quo alcali agere solet.

Regulus antimonii simplex dicitur, si mediante fusione cum alcali producitur, sique copia maior antimonii, quam alcali sumpta fuit, & massa haec aëri exposita non deliquescit, neque vomitum creat, regulus hic antimonii medicinalis nominatur.

Parva alcali copia magnae antimonii portioni addita, taliter hoc in fusione mutat, ut supra scoriae orientur, regulus infra deponatur, si massa in conum effunditur fusorium.

Si per additum ferrum, scilicet eius partem unam ad antimonii partes duas regulus a sulphure secernitur, regulus antimonii martialis vocatur.

Fer-

Ferrum hic est secretionis remedium, non transiens in regulum, nisi iusto maior eius copia fumeretur.

Similis regulus ille est, unde tinctura metallorum praeparatur, ubi regulus antimonii cum cupro & stanno mixtus cum nitro detonatur — addita namque metalla solum auferunt sulphur.

Ex scoriis reguli antimonii martialis sic dictus crocus martis antimoniatu praeparatur. Stabilius hoc medicamentum amabat, hodie non amplius usitatum.

2) Detonatione

sumitur fluxus crudus i. e. aequales nitri & tartari partes. Ad unam partem antimonii duae partes fluxus crudi faciunt tantummodo $\frac{1}{3}$ reguli totius antimonii ponderis. Scoria superior est hepar antimonii. Basilius Valentinus hanc methodum iam descripsit in curru triumphali antimonii.

3) Reductione ex calce antimonii per additum phlogiston. Reductio fieri potest

a) ex citro antimonii

b) ex pulvere Algarothi. Hic regulus Wallerio audit regulus antimonii aculeatus

c) ex antimonio diaphoretico, si addito ferro & cupro regulus praeparatus erat,

rete vulcanum vocatur.

Omnia metalla sulphure privant antimonium.

Ut perfecte purgetur regulus, pluries cum alcali recenti est fundendus.

Si cum nitri puri partibus aequalibus fusus antimonii regulus cum spiritu vini digeritur, oritur Tinctura antimonii regulina seu acris, secundum Stablii praescriptum, Boerhavius enim utebatur regulo antimonii martiali.

Haec tinctura proprie neque sulphur antimonii, neque alcali continet, sed est tinctura caustico alcalina. Idem valet de Tinctura metallorum Modelii tinctura antimonialis est tinctura regulina, ubi nempe regulo calido liquoris nitri fixi portio aequalis affunditur.

III) Calces partis regulinae antimonii.

Salium & acidorum efficacia sub encheiresi varia destruit antimonii partem regulinam, eamque convertit in calcem. Calcem antimonii praeparandi methodi usitatissimi sunt ustulatio antimonii, detonatio cum nitro aut menstrua acida.

Anti-

Antimonii & nitri partes aequales fusione dant hepar antimonii. Sed ab una parte antimonii & duabus vel tribus partibus nitri simul detonatis, destruitur sulphur & pars regulina mutatur in calcem. Nominatur haec calx antimonium diaphoreticum, & quidem non ablutum, si solummodo refrigerationi exponitur — ablutum, si cum aqua abluatur, usque dum omnes ipsi adhaerentes particulae salinae sunt separatae. Si haec aqua evaporatur, largitur

- 1) Nitrum antimoniatum.
- 2) Sal polychrestum Glaseri

quod ex alcali nitri & acido sulphuris antimonii tanquam productum oritur.

Si antimonium diaphoreticum in aqua solutum affuso acido praecipitatur, oritur materia perlata Krügneri.

Si cum tribus nitri partibus antimonii regulus tractatur, oritur cerussa antimonii & bezoardicum minerale, iterataque repetitione habetur Poudre de la chevalle-ray.

Si aequales antimonii & ferri partes fusae cum tribus nitri partibus detonatione destruuntur, calx oritur rubiginosa, diaphoreticum martiale aut pulvis cachecticus Ludovici dicta.

Huxham adhuc laudabat hoc remedium. Huius loco Kleinius crocum martis antimoniatum exhibebat.

Ex antimonii diaphoretici, crystallorum tartari & diacrydii pondere aequali fit pulvis comachinus, cerberus quoque triceps dictus.

Si reguli antimonii partes sex, stanni partes duae cum nitri triplo detonantur, oritur antihecticum Poterii.

Pulvis Iacobi in anglia sub nomine James poudre notus, est calx duplex ex antimonio & mercurio.

Vid. Samml. für praktische Aerzte
5. B. St. 2.

Quando antimonii butyrum, h. e. partes antimonii regulinae in acido falis communis solutae — aqua abluitur, pulvis fundum petit, qui mercurius vitae, vel etiam pulvis Algarothi vocatur.

Liquor residuus erronee spiritus vitrioli philosophicus vocabatur, Spielmann p. 283.

Si veteri methodo ex antimonio & mercurio sublimato butyrum antimonii conficiebatur, oriebatur adhuc productum secundarium, utpote cinnabaris antimonii a cinnabari factitia nullatenus discrepans. Oriebatur ex antimonii sulphure & mercurio mercurii sublimati — sicuti binae aliae

aliae partes constitutivae, regulina scilicet & acidum salis communis in butyrum antimonii coniungebantur.

Si antimonii butyro acidum admisce-
tur nitrosum, pars regulina quoque prae-
cipitatur, largiturque antimonium diapho-
reticum aut sic dictum bezoardicum mi-
nerale. Calx antimonii calcinata fortiori
ignis tractata gradu vitrum dat antimonii.

Ab ignis regimine pendet, num vi-
trum hiacynthinum adquirat colorem,
pellucidum & in acidis facile solubile, aut
album, opacum, nullo in acido solubile,
obtineatur. Per se calcinatum, vel cum
nitro in calcem redactum antimonium vi-
trum dat antimonii, nec non regulus in
acido minerali solutus, sponte praecipita-
tus facili negotio in vitrum funditur.
Adhibetur antimonii vitrum vino antimo-
niato Huxhamii, tartaroque emetico prae-
parandis.

Porro vitrum antimonii ceratum inde
conficitur, si cerae drachma una fusa,
pulverisque vitri antimonii uncia una
mixtae, perpetuoque agitatae, per dimi-
diam horam leni igne calcinantur.

Tartarus emeticus. Accuratissima
eius idea haec est, tartarum emeticum esse
genus quoddam salis metallici, ex reguli-
nis antimonii particulis & acido tartari com-
posi-

positum. Tota huius producti differentia in diversa partium regularum ab acido tartari extractarum quantitate consistit. — Sicuti similiter in vino emetico, quod mox ex metallorum croco, mox ex antimonii vitro maioris — minorisve solubilitatis paratur. Eodem modo diversa ratione praeparatur tartarus emeticus, quando tartari cremori aliud atque aliud productum regulinum additur, alia miscendorum quantitas reciproca, aliaque praeparationis methodus eligitur, dum vel evaporando, vel crystallizando praeparatur.

Tartarus emeticus conficitur.

1) Ex anatica croci metallorum & cremoris tartari portione, vel etiam maiori cremoris tartari additione in aqua vel diutius vel brevius coctis, deinde mox inspissando, mox crystallizando.

2) Vel ex vitri antimonii & cremoris tartari diversa quantitate reciproca. Cel. Hoepfner recipit vitri antimonii unciam unam, pulveris crystallorum tartari uncias duas, aquae communis libras duas per horam coquendo, spatula lignea agitando perpetuo, filtrando & inspissando.

3) Ex pulvere Algarothi secundum Bergmanni praescriptum.

Rec.

Rec. Pulveris Algarothi, Uncias duas,
drachmas duas.

Cremoris tartari uncias quinque
per dimidiam horam in aqua coquendo,
debite evaporando & crystallifando.

Restat adhuc productum secunda-
rium, si nempe antimonium cum nitro in
retorta tabulata detonatur, obtinetur anti-
monium diaphoreticum, acidumque ex-
pulsus, quod in receptaculum excipitur,
clyffus antimonii vocatur.

Idem obtinetur productum, si anti-
monium, additum sulphur & nitrum inter
se mixta in retorta tabulata ad acidum ex-
cipiendum, detonantur, quod detonatione
aperta avolat in aërem.

Inter composita simplicia adhuc no-
tandus venit:

Aethiops antimonialis Huxhamii, ex
antimonio, mercurio & sulphure tritu-
rando mixtus.

Sulphur ideo additur, quo plus mer-
curii ingrediatur mixtionem. Ferrum
cum antimonio dat aethiopem martialem
Lemery.

Pulvis alterans Plummeri ex sulphure
aurato antimonii mercurioque dulci, vid.
supra.

Mixtura tonico nervina Stahlii. Ex
tincturae antimonii acris partibus duabus
&

& spiritus cornu cervi rectificati parte una
inter se mixtis.

Tabula Saunderi, de productis antimo-
nialibus ex diversa acidorum in regu-
lum actione ortis.

Acidum.

I) Mineralia.

1) Vitrioli largitur

Antimonium vitriolatum Werlhofii
Mercurium vitae coelestem Klau-
nigii.

2) Nitri

Bezoardicum minerale.

3) Salis communis

butyrum antimonii

oleum antimonii

causticum antimoniale, Pharm.

Londinensis

mercurium vitae seu pulverem Al-

garothi.

II) Vegetabile

Sapam vomitoriam Sylvii

Vinum antimoniatum Huxhamii

Tartarum emeticum.

VII) Mercurius.

Vid. summi Baldingeri additamenta
Pharmacopoeae Edimburgensis, eius-
que

que historiam mercurii medicam nec non praesentem Pharm. Würtemb. editionem nostram hinc inde.

VIII) Zincum

cuius tantummodo pauca praeparata medicis sunt usualia

1) calx Zinci, seu flores Zinci, qui sub calcinatione Zinci, tigilli lateribus sublimati quasi adhaerent. Interne adhibentur.

2) Pompholix, Nihil album, & Nihil Gryseum seu tutia sunt purorum, impurorumque Zinci sublimatorum species, medicamentisque admiscuntur externis.

3) Vitriolum Zinci seu vitriolum album ex Zinco & acido vitriolico. Externis, internisque usibus inservit. Cavendum maximopere, ne ad obtinendos Zinci flores plumbo fucatum adhibeatur Zincum.

IX) Sulphur.

Sulphur ex acido vitrioli & phlogisto constat — phlogiston namque paucum ex carbonibus candentibus in acidum vitriolicum transiens mutat illud iam in acidum sulphuris.

Per

Per synorifin & diacrifin Stahlius olim sulphuris partes constitutivas iam docebat. Sulphuris pars una cum alcali fixi partibus duabus mediante fusione abeunt in hepar sulphuris fixum.

Sulphur cum alcali volatili fufum transit in hepar sulphuris volatile, quod priori fluidius est.

Proportio phlogifti ad acidum vitriolicum reciproca, ordinarie ut 3 : 50 determinatur. Hepar sulphuris in aqua solubile est. Quando sulphuris hepatis in aqua fervida soluto, acidum v. g. acetum &c. admiscetur, ovis putridis similis oritur odor, praecipitatumque lac sulphuris audit.

Antimonium cum alcali & nitro fufum hepar dat antimonii. Huic in aqua ferventi soluto si affunditur acetum, sulphur habetur antimonii auratum. Vid. supra Antim.

Quum igitur ex alcali & acido vitrioli cum phlogisto constet sulphuris hepar; hinc ex hepate sulphuris ustulatione leni, qua phlogiston expellitur, produci potest tartarus vitriolatus. Massa salina aqua soluta & crystallifata verum offert tartarum vitriolatum, phlogisto namque expulso, vitrioli acidum & alcali fixum — partes ut pote

pote tartari vitriolati constitutivae remanserunt. Vid. Spielm. Ch. ed. ult. p. 126.

Vice versa ex Stahlī praescripto ex tartari vitriolati & salis tartari partibus aequalibus hepar sulphuris produci potest, si carbonum pulvis, quorum phlogiston cum vitrioli acido se coniungit, admiscetur.

In hoc experimento sulphur generatur. Idem fit, si certis sub encheiresibus, oleum vitrioli, therebinthina, resinae &c. miscentur. Spielm. l. c. p. 142.

Sal mirabile Glauberi quoque sine addito alcali, solummodo cum carbonum pulvere in hepar sulphuris abit, funditur facile — continet iam alcali & acidum vitriolicum, nihilque — nisi phlogisto eget. Similiter sulphur & sal sodae, nec non sulphur & calx viva hepar dant sulphuris.

Sulphur in vase clauso sublimari potest, ubi purum tantummodo adscendit sulphur, impurae autem eius partes in fundo remanent.

Purum sublimatum sulphur sub florum sulphuris nomine prostat.

Sulphur per sublimationem res alias secum in altum trahit. Sic si sub sublimatione additur myrrha, flores sulphuris myrrhati oriuntur.

Fusione sulphur septem mercurii partes in se recipit, trituratione sola cum tribus

solummodo mercurii partibus iungitur. Hoc productum vocatur *aethiops mineralis vulgaris*, sive per triturationem, sive per fusionem paratus

Sulphur, antimonium & mercurium triturando oritur *aethiops antimonialis Huxhamii*.

Sulphuris pars una, mercurii partes septem triturando mixtae & recenter sublimatae, largiuntur cinnabarim. $\frac{4}{3}$ mercurii & $\frac{1}{2}$ sulphuris faciunt cum hepate sulphuris intra dimidiam horam, cinnabarim pulcherrimam. vid. Morveau.

Hepar sulphuris volatile cum mercurio sine sublimatione praebent cinnabarim. Neumann Ch, p. 462.

De cinnabari sine igne parata vid. Apotheker - Calender 1780 p. 166.

Sulphuris $\frac{1}{2}$ mediante fusione cum nitro, dat sal seu lapidem prunellae

Sulphuris & nitri partes aequales detonando, successivis dosibus in tigillum iniecti, aut nitro antea fuso successive additum sulphur, solvendo, filtrando, crystallizando largitur sal polychrestum Glaferi.

Sulphuris acidum & alcali volatile dant tartarum vitriolarum Stahlii volatilem.

Sulphur cum oleis remixtum dat balsama sulphuris, ab admixto oleo nomina obti-

obtinencia. Olei unguinosi partes tres pro sulphuris solutione sufficiunt, oleorum aethereorum partes decem requiruntur, olei anisi autem solummodo partes quatuor.

Incensi sulphuris vapor sub campana vitrea exceptus spiritus sulphuris per campanam vocabatur.

Quum autem adeo facile a phlogisto in acidum sulphuris convertitur vitrioli acidum, methodus ista iam obsoleta est & inusitata. Ex tartaro vitriolato volatili, olei vitrioli (gravioris quippe) ope spiritum sulphuris separare Stahlius iam docuit.

Sulphuris libra una largiebatur tantummodo spiritus sulphuris per campanam unciam unam.

Clyffus sulphuris dicitur, si sulphur & nitrum in retorta tabulata detonantur.

Per detonationis quandam speciem, omne vitrioli oleum hodiernis temporibus in anglia ex sulphure paratur. Vid. Webers Magaz. 1 B p. 30. Ferber p. 324. Apotheker - Calender 1780. p. 38.

Consueto fortiorem obtinendi sulphuris spiritum, duas Sehl descripsit methodos.

1) Ex hepate sulphuris per additum vitrioli oleum, destillando.

2) Ex lixivio caustico calcis vivae, cui alcali, sulphur & vitrioli oleum adduntur.

Grave vitrioli oleum expellit acidum sulphuris levius.

Sulphur, nitrum, carbonumque pulvis mixta, abeunt in pulverem pyrium: Quem omnino interne exhiberi posse, indicat excellentissimus consiliarius intimus Baldinger, sicuti iam illum in sua medicina castrensi proposuit Krüger.

A.

Acetum Lavendulae.

Rec. Florum Lavendulae ℥℞.

Aceti vini boni ℥iii.

reponantur ad usum.

Odoramentis & Epithematibus inservit.

Acetum Lithargyrii.

Rec. Lithargyrii triti ℥i

Aceti vini destillati ℥iv

coquantur lento igne in vase figulino probe vitreato, spatula lignea perpetuo agitata, donec acetum probe sit saturatum, quod per chartam filtratum servetur.

Ad inflammationes, ulcera maligna exsiccanda & affluxum prohibendum applicari solet.

Acetum hystericum.

Rec. fol. rutae hortensis ℥i

Gummi Galbani ℥℞

Asae foetidae

castorei optimi ʒii

misce, contusis & concisis affunde

Aceti vini optimi ℥i

D 3

digere

digere per dies aliquot ad sufficientem extractionem, tunc liquor filtratus servetur.

Adhibetur in clysteribus insigni cum emolumento; datur etiam interne a ℥i ad ℥ii in vehiculo aquoso.

Acetum camphoratum.

Solvitur camphorae v. gr. ℥i
guttulis aliquot ~ vini & terendo sensim
admisceantur

Aceti vini ℥x.

Est antisepticum insignis virtutis.

Acetum colchicum.

Videatur sub descriptione oxymellis colchici huius aceti praeparatio.

Acetum Scilliticum.

Rec. Scillae praeparatae & exsiccatae ℥viii

Aceti vini albi acerrimi ℥viii

Scillae radices minutim incisae macerentur
in aceto per plures dies, acetum per pan-
num colatum servetur ad usus.

Adhibetur in pectoris infarctu viscido
expediendo, tussi difficili, asthma humido:
gravitatem auditus a pituita ortam,
gargarizatione emendat. dosis a ℥i ad ℥ss.

Acetum

Acetum vini destillatum.

Rec. Aceti vini fortis. q. l.

destilletur e cucurbita vitrea magna lento igne; prodit primo phlegma, quod sequitur, acetum est. Continuetur destillatio usque dum a XII vel XV ℥ vix ℥i℥ restet.

Adhibetur ad diversa opera chemica, ad internum usum acetum simplex merito praefertur.

Aes viride Crystallisatum.

Rec. aeruginis five viridis aeris in pulverem triti ℥i

Aceti vini destillati ℥vi

immittantur cucurbitae vitreae, macerentur in loco calido, acetum tinctum per inclinationem vasis effundatur, novumque affundatur. Hoc fit aliquoties, & tandem in vase cupreo aes viride, addita sufficiente aceti quantitate, coquatur, ut solvatur. Tincturas omnes per filtrum traiectas leni calore evaporari permitte ad cuticulam & ad crystallisandum in locum frigidum repone. Crystallinos inter chartam lenissimo calore exsiccatas ferva,

Ad unguenta mundificantia adhibetur; nuper a cel. Lieb, in Baldingeri illustris promptuario, ad internum commendabatur usum.

Alumen Saccharinum.

Rec. Aluminis crudi vulgaris ℥vi
 Cerussae venetae albae ℥vi
 Vitrioli albi ℥iii
 Sacchari albi canariensis ℥i℥.

fiat omnium pulvis subtilissimus, qui albumine ovorum & aceti destillati aequali portione in mellis liquidi consistentiam diluatur, probeque agitatus formis chartaceis parvis, conicis infundatur & ficcetur.

Detergit, carnemque aufert luxuriantem, laudatur in collyriis.

Alumen draconisatum.

Rec. Aluminis crudi partes II
 super igne in cochleari ferreo fufis admisce sanguinis draconis partem I. ex massa adhuc liquida commode formantur pilulae.

Ex illustris Baldingeri additamentis Pharm. Edimb. addere hoc volui medicamentum, cuius in haemorrhagiis uterinis egregios effectus saepissime effectus sum,

Alumen ustum.

Rec. aluminis vulgaris albi q. v.
 liquescat igne in vase ferreo vel fictili, donec ebullitio desinat. Ad dentifricia & absumendam carnem luxuriantem solet adhiberi.

Iuatur, ut leuior ac subtilior a graviori separetur, quem edulcoratum atque leni calore siccatum serua.

Tonum ventriculi roborare & intestinorum, cachecticis, ictericisque prodesse perhibetur & a multis adhuc medicis praescribitur. Quare licet secundum illustrem Baldingerum nulla praestabit miracula, neque unquam mihi in usu fuerit, tamen omittere nolui, ut illis satisfacerem, qui magnos sibi inde promittunt effectus.

Antimonium diaphoreticum simplex.

Rec. minerae antimonii purissimae ℥i
 nitri crudi, crystallini, siccissimi ℥iii
 exacte mixta in crucibulo magno per vices ingesta detonentur. Agitentur spatula ferrea inter detonationem, ut materia aequaliter deflagret & calcinetur. His peractis massa albicans sufficienti quantitate aquae dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosa affusa aqua diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quae edulcorata atque siccata usui seruetur. Est vera reguli Antimonii calx. Si aqua falsa, nitrum antimoniatum continens, non decantatur, sed una cum calce evaporando exsiccatur, Antimonium diaphoreticum non ablutum dicitur.

Absor-

Abforbentes, alexipharmicae, diapnoicae, sanguinem purificantes vires illi tribuuntur, non ablutum incidens, expectorans & in cutaneis morbis utile habetur.

Dosis a granis XV ad XXX.

Aquae destillatae simplices.

Earum ingens numerus in Dispensatorio Wurtembergico recensetur, pleraeque superfluae, nulliusque sunt efficaciae. Optimae ex plantis odoriferis, oleo aethereo dotatis destillantur. Huc pertinent Aquae destillatae chamomillae, melissae, menthae, pulegii &c. Pluribus enumerandis non inhaerebo; nam plerisque in casibus, aqua communis destillata satisfacit scopo medentum.

Aqua Anbaltina.

Rec. Rad. Galangae minoris
 flor. Anthos $\bar{a}\bar{a}$ ʒvi
 sem. foeniculi
 Baccar. Lauri $\bar{a}\bar{a}$ ʒʒ
 caryophyllorum aromaticorum
 cubebarum
 Nucum Moschatarum
 cinamomi acuti
 mastiches $\bar{a}\bar{a}$ ʒvi
 thuris $\bar{z}\bar{i}$

therebinthinae venetae libram dimidiam.

in

in pulverem contrita infundantur in
 Vini rectificati libris VI & digesta per
 dies VI addita Aquae fontanae libra una
 destillentur lenissimo balnei calore li-
 brae V.

Laudatur quidem in Dispensatorio
 Wurtembergico tanquam roborans &
 diureticum. Magis autem in externum
 vocanda est usum, ubi non nunquam in-
 signes praestat effectus.

Aqua calcis vivae.

Rec. Calcis vivae ℥℥
 superfundantur ∇ae fontanae ℥V, post
 ebullitionem decantetur ∇a supernatans,
 atque servetur.

Notatu dignum est, ∇ calcis vivae
 etiam decimae, vigesimae &c. infusionis
 eiusdem esse virtutis, ac primae; cum de-
 monstratum sit, quod calcis in ∇a solu-
 bilis pars una, vel 1500 partes aquae im-
 praegnare valeat. Usus est tam externus,
 quam internus in diversis chronicis morbis,
 ubi saepe cum lactis aequali vel maiori
 copia miscetur.

Aqua chamomillae anisata.

Rec. flor. chamom. recentium libras IV

sem. Anisi libras II

Vini albi generosi libras XXVIII

post

post digestionem aliquot dierum destillentur ad dimidias.

Tanquam roborans & carminativum insignis virtutis laudari meretur.

Aqua cinnamomi cydoniata.

Rec. Succi cydoniorum expressi & vinosam indolem, mora temporis, nacti libras VI

cinnamomi elect. ℥iv

fiat infusio per triduum, postea destillentur ex vesica, donec tertia pars solum restet.

Aqua cinnamomi spiritiuosa.

Rec. cinnamomi acuti ℥xvi

Vini albi spiritiuosi ℥xii

spiritus vini rectificati ℥iiss

infusa per biduum destillentur ex vesica, lentissimo igne, & liquoris spiritiuosi lactescentis ℥viii proliciantur.

Aqua cinnamomi vinosã.

Rec. cinnamomi elect. ℥ix

minutim concisis superfundantur vini albi generosi ℥xii.

macerentur in vase clauso, postea destillentur ad dimidias.

Aqua

Aqua cinnamomi sine vino.

Rec. cinnamomi acuti ℥viii

Aquae cerasorum nigrorum ℥xii
 misceantur, digerantur per triduum, de-
 stillentur ex vesica, donec tertia pars so-
 lum restet.

Omnes aquae cinnamomi sunt ana-
 lepticae, nervinae, roborantes, gratae.
 Si adhibentur, ratio liquoris, quocum
 Aqua destillata fuerit, habenda est.

Aqua corticum aurantiorum cum vino.

Rec. cort. ☉ recentium ℥i

conciſi, in vini albi ℥viii
 infundantur & destillentur ad dimidias.

Stomachica, roborans & carminativa
 est, gratissimumque exhibet vehiculum.

Aqua diuretica e nucleis.

Rec. Amygdalarum amararum

Nucleorum persicorum

cerasorum \bar{a} ℥ii

flor. Sambuci ℥vi

Vini generosi ℥viii

contusa digerantur per biduum in loco
 calido, dein destillentur ad dimidias.

Usus nomen indicat.

Aqua

Aqua fortis.

Rec. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati

nitri purissimi ꝑ̄ ℥ii

trita misceantur & destillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, iuncturis luto probe obturatis, cui aquae fontanae ℥i ante sit infusa.

Rarissimus — si unquam ullus — in medicina usus, chemicis, aliisque artificum inservit laboribus.

Aqua Grisea.

Rec. ☿rii vivi

▽ fortis ꝑ̄ ℥i

reponantur in locum calidum, ut solvantur ☿; solutioni adde Decoctum sequens.

Rec. rad. chelidoni maioris

Aristolochiae longae

Wae Rutae hortensis

scordii

flor. Rosarum ꝑ̄ ℥i

coque in ▽ fortanae ℥ix

ut post colaturam remaneant ℥viii

misceantur calide & statim abibunt in mixturam grisei coloris.

Convenit cum liquore Bellostii ad ulcera phagedaenica & ad Synoriam commendatur.

Aqua

Aqua Reginae Hungariae.

Rec. herbae & florum Rorismarini una
 collectorum ℥iv

herbae & florum Salviae ℥℥

Zinziberis ℥ii

parum incisa infundantur

∧ Vini rectificati ℥xii

▽ fontanae ℥ii & destillatione ex
 vesica, leni igne ℥xi eliciantur. Si ∧
 prolectus denuo cohobetur de novis flori-
 bus, odoratui se magis commendabit. Usus
 eius est varius in chirurgicis morbis.

Aqua ophthalmica confortans.

Rec. Aquae chamom. s. v. ℥viii

cxii. hni

∧ vini camph. ℥ ℥ii

vitrioli albi ℥i

misce, detur ad usum.

In epiphora & lippitudine a debilitate
 laudatur a celeberrimo Selle,

Aqua ophthalmica resolvens.

Rec. Aquae chamom. s. v. ℥vi

— — bened. Rut. ℥ii

Ess. Aloes

liquaminis mirrhæ ℥ ℥ii

misce, detur ad usum.

In maculis corneae & staphylomatibus, quotidie guttatim oculo infusa, tanquam efficacissima medicina describitur ab eodem Archiatro Selle.

Aqua sclopetaria Thedenii.

Rec. Aceti vini
 Λ vini rectif. ꝑ̄ ꝑ̄iii
 sacch. albi ꝑ̄i
 Λ vitrioli ꝑ̄x
 misce, detur ad usum.

Non solum antiphlogisticum, sed etiam antisepticum est insignis virtutis, hinc in ulceribus scorbuticis, inflammationibus putridis, decubitu, aliisque laudatur morbis.

Aqua phagadaentica.

Rec. Aquae calcis vivae ꝑ̄xvi
 in quibus solve
 mercurii sublim. corrosivi grana XXIV
 serva.

Ad exulcerationes externas, carnem luxuriantem & foeda imprimis ulcera venerea mundificanda & consolidanda adhibetur.

Huius loco a celeb. Selle in sua medicina clinica, ob rationes ibidem p. 547. allegatas proponitur solutio ꝑ̄rii in acido niri,

ri, pro rerum circumstantiis, aqua de
stillata diluta.

Aqua Regis;

Rec. Aquae fortis ℥vi

⊖ ❄ci albi ℥i

mixta ferventur.

Quae de Aqua forti diximus, de Aquā
regia quoque valent.

Arcanum duplicatum.

Rec. vitrioli hungarici ℥ii

solve in ▽ calidae fontanae ℥viii vel x

nitri fixi tantumdem in ▽ fon-
tanae ℥v soluti

ambas solutiones filtratas sensim misce,
nitri fixi solutionem vitrioli lente infun-
dendo; praecipitabitur terra metallica cum
quodam effervescentiae indicio, affunda-
tur solutio alcalina ad punctum saturatio-
nis usque; filtretur postea permixtus li-
quor. Terra praecipitata eluatur affusa ▽
calida, ut omnis extrahatur falsedo. Eva-
porentur permixti liquores ad cuticulam &
ad crystallisationem reponantur.

Nota. Parari plerumque solet hoc
Arcanum duplicatum ex residuo Aquae for-
tis, vehementissimo igne calcinato & suffi-
cienti quantitate ▽ soluto. Si affusa por-
tione

zione quadam liquoris nitri fixi residuae forsan metallica vitrioli particulae penitus fuerint praecipitatae, filtratione & crySTALLI-
satione aequae securum, minorisque pretii praebet arcanum duplicatum, ac superior praescriptio.

In febribus, malo hypochondriaco, obstructionibus & detergendis ventriculo atque intestinis egregios praestat effectus. Laudatur imprimis in illustris Baldingeri Promptuario a cel. Ackermanno.

*Arcanum Tartari, seu Terra foliata
Tartari.*

Rec. Salis Tartari albiissimi ℥iv

Aceti vini destillati ℥vi

misceantur, evaporetur † in vase figulino probe vitreato ad siccitatem, in fine lenissimum ignis gradum adhibendo. Si non satis forsan alcali ab aceto saturatum fuerit, quod gustu deprehendetur, denuo acetum vini destillatum affundatur, usque dum nulla amplius effervescentia oriatur, atque eodem tractetur modo. Remanentia salina aqua fontana frigida solvantur atque solutio per chartam bibulam filtrata, rursus ut antea dictum, evaporetur & siccata in vitro probe clauso, loco calido, ne liquescat, servetur. Est medicina blanda, resolvens, incidens, abstergens, saponaria,
alvum

alvum & urinam movet. Pro vario medentis scopo a ℥i ad ℥i & ultra in vehiculo aquoso exhiberi potest.

B.

Balsamum Arcaei.

Rec. Therebinthinae venetae

Gummi Elemi

sevi cervini ℥ā ℥ii

olei Hyperici ℥i

sandali rubri ℥i

Gummi Elemi in Therebinthina lenissimo igne solvitur, quibus successive adduntur sebum & oleum Hyperici, in alio vase liquata.

Tanquam digestivum & vulnerarium feliciter in vulneribus adhibetur.

Balsamium anodynum.

Rec. Opii puri ℥i

saponis albi hispani ℥v

camphorae ℥ii

olei stillatitii Rorismarini ℥ss

℞. vinosi rectificati ℥ii

digere opium & saponem in ℞ triduum; dein, liquori colato, adice camphoram & oleum, diligenter agitans.

E 3

Ufus

Ufus huius balsami, qui tantummodo
externe adhibetur, ex nomine patet.

Balsamum commendatoris de Perne.

Rec. balsamici Indici sicci ℥i
styracis in granis ℥ii
benzoes electae ℥iii
olibani electi ℥℥
trita solvantur in ∟ Vini rectificatissimi ℥xv

solutio per chartam filtrata fervetur.

seorsim infundantur in

∟ Vini rectificatissimi ℥x
radicis Angelicae
HBae millefolii
Aloes soccotrinae
myrrhae electae ℥ā ℥℥.

digesta & sufficienter extracta exprimantur; Essentia pariter per chartam filtrata, superiori solutioni addatur & optime per digestionem mixta fervetur.

In Vulneribus, & ulceribus a chirurgis adhibetur. Usus eius internum minime utilem esse omnes perspiciunt medici.

Balsamum Locatelli.

Rec. olei olivarum ℥vi
cerae citrinae ℥iv
Vini canariensis ℥v.

leni igne ad consumptionem vini coctis adde
 Therebinthinae veterae clarae ℥vi
 Balsami peruviani ℥ii
 sandali rubri ℥ss

ad vulnera, laesiones varias, contusiones
 externas & internas laudatur. Internum
 autem eius usum fere superfluum, ma-
 xime circumspēctum suaderem.

Balsamum vitae Hoffmanni.

Rec. Olei destillati Lavendulae
 maioranae
 caryophyllorum
 macis
 cinnamomi aa ℥i
 Rutae
 Succini albi aa ℥ss
 olei citri ex corticibus recens ex-
 pressi ℥i

Ambrae griseae ℥ss
 olea cum Ambra & balsami peruviani ℥i
 misceantur atque in \wedge vini tartarisati recti-
 ficatissimi ℥x solvantur.

Externe in diversis morbis tanquam
 roborans, nervinumque vel per se vel ca-
 taplasmatibus aliis admixtum laudatur.

Boli Armenae praeparatio.

Bolus Armena pulverisata, aqua fon-
 tana diluitur, aqua turbida, tenuissimis
 E 4 boli

boli particulis mixta leni inclinatione separetur a spisso, novaque aquae quantitas toties affundatur & effundatur leniter, donec praeter arenulas & crassiores partes nihil remaneat. Bolus, quae paulatim in aqua decantata subsedit, effusa illa, servetur exsiccata.

Solent chirurgi nostri externis epithematibus & cataplasmatibus tanquam adstringens admiscere, ubi non raro perutilem invenit locum.

Butyrum Antimonii. Videatur Antimonii Butyrum.

C.

Ceratum Saturninum Goulardi.

Rec. Lithargyrii ℥iv

Aceti vini ℥xvi

coque invicem per integram horam sub perpetua agitatione cum spatula lignea, solutionem decanta & filtra, quae ab auctore vocatur *Extractum Saturni*. Huius extracti si ℥ii miscentur cum ∇ communis ℥ii, Auctori vocatur Aqua vegeto mineralis.

Jam recipe

olei olivarum ℥iv

cerae ℥i

mixta

figulino, dissolvantur & fervens adhuc decoctum traiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, crystallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam, cremoris nomine notam, qui cum crystallo frigida aqua fontana abluatur & exsiccatus, super porphyrite in pulverem albissimum conteratur. Si solutio huius cremoris tartari conchis, vel creta saturatur, ope \wedge vitrioli inde paratur sal essenziale acidum tartari.

Vires cremoris Tartari notissimas recensere superfluum duco.

Crocus metallorum.

Rec. Antimonii crudi

Nitri purissimi \bar{a} ssii

separatim trita & bene commixta iniiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione materia metallica rubescens a crusta albicante separetur & teratur in pulverem, qui saepius abluatur aqua calida, donec insipidus sit.

Vehemens est emeticum, raro per se dandum. Praeparatur ex eo Aqua benedicta Rulandi a cel. Selle valdopere laudata, ut & tartarus emeticus.

E.

Electuarium anthelminticum Stoerkii.

Rec. Salis polychresti Glaferi
pulv. rad. Jalapp.

valerianae \bar{a} \mathfrak{z} i

fiat cum oxymellis scilicet \mathfrak{z} iv Electuarium.

Perillustris Archiater Stoerk sum-
mopere laudat vires huius Electuarii an-
thelminthicas, quae teste cel. Willich
adhuc valdopere augentur, si sem. *cynae
levanticae* drachma una admiscetur.

Electuarium Theriacae Andromachi.

Quia descriptio consueta huius The-
riacae in Dispensatorio Wurtembergico
nimis longa est, multaque superflua,
inutilia, & inefficacia continet, Lectori-
bus meis breviorē, huius loco; Theria-
cam sive Electuarium Thebaicum phar-
macopoeae Edimburgensis commendo,
cuius compositio est sequens.

Rec. Nucis moschatae

cardamomi minoris

Zingiberis \bar{a} \mathfrak{z} ii

Radicis serpentariae virginianae in
pulverem tritae \mathfrak{z} iii

opii in vini albi hispani quantitate
sufficiente diffusi \mathfrak{z} iii

Mellis

Mellis despumati triplum pondus
pulverum.

misce fiat Electuarium supplens Theriacae
Edinensis vices.

Virtutes huius Theriacae ex ingre-
dientibus nemo non facile perspiciet.
Ubique Theriacae vulgaris vices abunde
supplet.

Elixir acidum Halleri.

Ex aequalibus partibus spiritus vini &
olei vitrioli inter se mixtis constat.
dosis est a guttulis VI ad X. ex vasculo
aqua repleto. Laudatur a celeb. Zimmer-
manno in epilepsia, chorea sancti Viti,
haemoptysi, fluxu mensium nimio, febribus
biliosis & morbis nervorum; magnos
saepe in scabie effectus inde videre mihi
contigit.

*Elixir balsamicum stomachicum tempe-
ratum Hoffmanni.*

Rec. Extracti Absynthii
cardui benedicti
centauri minoris
gentianae aa ℥i

flavedinis corticum aurantium amaro-
rum, ab omni albedine mundatorum ℥iv

affunde vini hungarici optimi ℥ii

△ corticum ☉ rectificati ℥ii

stent

stent per triduum infusa in digestionem,
postea filtrata reponantur.

Viennenses extractis adhuc addunt
Salis Tartari ℥i.

Elixir idem a beato Kleinio emendatum.

Rec. corticum aurantium rec. ℥i℥ con-
tunde in mortario, adde

Extr. card. bened.

cent. min.

gent. rubr.

c. cascarill. aquos.

myrrhae aquos. ℥ā ℥ii

arcani tartari ℥℥

miscere & digere c. vini hisp. aut aquae
menthae vinos. ℥ii.

fiat Elixir, cuius dosis guttas 60 ad 100.

Hypochondriacis imprimis utilem ha-
bet hoc Kleinii Elixir illustr. Baldinger.
Tonum ventriculi roborat, appetitum &
concoctionem auget.

Elixir Roberti Whytt.

Rec. pulv. cort. peruv. opt. ℥iv

rad. gent. rubr.

flaved. cort. ☉ ℥ā ℥i℥

∧ vini Gallici ℥iv

digere per sex dies, balneo arenae, cola.

Est

Est stomachicum praestantissimum, mihi usitatissimum. Unde inelytus Archiater Baldinger: est hoc medicamentum tantae, inquit, virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim.

Elixir antiscorbuticum Sellei.

Rec. Extr. trifol. fibr. }
cent. min. } aquos,
fumar. }
graminis }
aa ℥℞

solve in ▽ fl. chamom. ℥iv.
adm.

∧ cochleariae ℥ii
olei vitrioli alb. ℥iii

huius medicinae praestantissimae usum titulus docet.

Elixir resolvens Sellei.

Rec. Salis tart. dep. ℥i

Satura

cum aceti scillit. q. s.

admisce

extr. fumariae }
cent. min. } aquos,
trifol. fil. }
gent. rubr. }
aa ℥℞

Aquae

Aquae chamom. s. v. ℥iv
 Tinct. Antimonii Jacobi
 martis aperitivi ꝑ ℥i

misce.

In cachexiis, hydrope, obstructionibus viscerum abdominalium cum magna laxitate, omni bishorio cochlear dimidium huius remedii utiliter datur.

Elixir Guaiacinum volatile.

Rec. Gummi Guaiac ℥iv
 bals. peruv. ℥ii
 olei stellatitii sassafras ℥ss
 ℞ ⊖ *ci vinosi ℥ss

macera dies sex in phiala clausa, & cola.

Specificum in Podagra & Arthritide habetur, propter calida autem eius ingredientia non promiscue, sed summa cum cautione ex debita indicatione exhibendum est.

Emplastrum adhaesivum.

Rec. Empl dyach. simpl. ℥ss
 picis burgundicae ℥iii

misce, liquescant, ut fiat Emplastrum. Pro uniendis absque futura vulnerum labiis expetitur.

Em-

baccis optime immisceatur, tandem oleum destillatum cymini addatur & Emplastrum, vesicae bubulae involutum, reponatur.

Resolvit, flatus discutit, roborat, tympaniticis & hystericeis prodest.

Emplastrum diachylon cum Gummatibus.

Rec. Empl. diachyli simpl. ℥i
 adde Gummi ❄ci
 Galbani in aceto soluto-
 rum āā ℥i
 croci pulverisati ℥i℥

misce.

Emollit, maturat, digerit abscessum fientem, iam vero facti atque rupti reliquam duritiem resolvit, ac emollit egregie.

Emplastrum diachylon simplex.

Rec. mucilaginum foeni graeci
 lini
 rad Altheae āā ℥i
 olei clari olivarum ℥iii
 Lithargyrii in subtilissimum pulverem
 triti ℥ii

coque oleum & lithargyrium leni igne, perpetua agitatione, semper ℥i aut ii aquae fontanae instillando, ad solutionem

Lithargyrii & Emplastri albi, subgrisei consistentiam. Postea addantur mucilagines, & continuata lenta coctione, ad iustam emplastri consistentiam redigantur.

Iuvat maturationem tumorum durorum, ad suppurationem tendentium.

Emplastrum Diaphoreticum Mynsichti.

Rec. cerae flavae ℥xi
 colophonii
 bdellii āā ℥iv
 succini citrini ℥iii
 Gummi ✕ci
 terebinthinae purae āā ℥ii
 Galbani
 sandarachae āā ℥i
 mastiches
 thuris electi āā ℥℞

cera cum colophonio liquetur & coletur, quibus ab igne sepositis & semifrigeratis, terebinthina & reliqua in pulverem contrita immiscendo, fiat secundum artem Emplastrum.

Potenter discutit, in ischiatico malo, tumoribus oedematosis pedum aliisque malis utiliter adhibetur.

Emplastrum diapompholygos.

Rec. olei solani ℥iiss
 cerae albae ℥xxx
 cerussae
 plumbi usti āā ℥ss
 pompholygos
 olibani āā ℥iv

cerussa & oleum lenissimo igne una cum
 ▽ solani ℥i coquantur ad unguenti spif-
 sioris consistentiam; quibus addatur cera
 alba, & cum sub perpetua fere agitatione
 refrixerint, reliqua subtilissime trita, ad-
 misceantur.

Refrigerat, exsiccat, dolores lenit.

Emplastrum de Galbano crocatum.

Rec. Gummi Galb. in † soluti
 Empl. de meliloto
 diachyli simpl. āā ℥iii
 cerae
 terebinthinae āā ℥i
 croci orientalis pulverisati ℥vi
 misce fiat Emplastrum.

Tumores duros emollit, resolvit, sup-
 purationem promovet, doloresque miui-
 gat.

Emplastrum hystericum.

Rec. Gummi Galbani colati ℥i
 Asae foetidae colatae
 cerae flavae āā ℥ss
 Resinae albae ℥iii

liquescant simul, leni igne, ut fiat Em-
 plastrum.

In doloribus hystericis abdomini im-
 positum saepe utilissimum invenitur.

Emplastrum de Hyoscyamo.

Rec. olei e seminibus expressi seminum
 hyoscyami
 succi herbae hyoscyami āā ℥i
 coquantur ad humiditatis consumptionem;
 colaturae adde
 cerae citrinae ℥xv
 terebinthinae ℥iss
 pulveris herbae hyoscyami ℥ii
 misceantur, fiat Emplastrum.

Ad rheumaticos dolores, tumores
 glandularum atque splenis affectus lau-
 datur.

Emplastrum resolvens Schmuckeri.

Rec. Gummi ❄ci ℥iii
 Asae foetid. ℥i
 sap. venet. ℥ss

solve

solve in \dagger vini s. q. inspissa leniter ad
 consistentiam Emplastri in tumoribus &
 stagnationibus a causis spasmodicis, nec
 non in tumoribus articularum egregie
 conducit.

Emplastrum vesicatorium.

Rec. cereae flavae $\mathfrak{z}\text{x}$
 tereb. venet.
 olei olivarum aa $\mathfrak{z}\text{iii}$
 pulveris cantharid. $\mathfrak{z}\text{viii}$

m. f. Empl.

Si nimia adest irritabilitas, ante ap-
 plicationem utiliter cum camph. miscetur,
 unde etiam interdum applicationem se-
 quens praecavetur stranguria.

Emplastrum vesicatorium perpetuum.

Rec. pulv. cantharid. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 ——— Gummi Euphorb. $\mathfrak{z}\text{i}$
 ——— ——— mastich.

Terib. venet. aa $\mathfrak{z}\text{iv}$

m. f. Empl.

Scopo rubefaciendi adhibetur. Sic
 in morbis catharralibus, oculorumque in-
 flammationibus egregias exserit vires, in-
 primis cum camphora mixtum si fuerit.
 Nec non loca a vesicatoriis suppurantia, in
 suppuratione retinendi vim habet.

Essentia Asae foetidae.

Rec. Gummi Asae foetidae ℥ii
 ^ vini rectific. ℥i

digere, cola

In affectibus hysteriis, pro re nata ad ℥i
 usque exhiberi potest haec Essentia.

Essentia Alexipharmaca Stablii.

Rec. Rad. Angelicae
 — imperatoriae
 — Helenii $\bar{a}\bar{a}$ ℥i
 — carlinae
 hirundinariae
 pimpinellae $\bar{a}\bar{a}$ ℥i

HB Scordii ℥iii

^ vini rectificati ℥iiss

post sufficientem extractionem, exprī-
 mantur & per filtrum trajecta Essentia ser-
 vetur.

Praescribitur a multis adhuc medicis
 ad ventriculum roborandum, flatu dissi-
 pandos, urinam & transpirationem pro-
 movendas, nec non in febribus malignis,
 catharralibus, intermittentibus, Lymphae,
 sanguinisque vitiis, a 40 ad 50 guttas.

Essentia Castorei.

Rec. Castorei moscov. minutim incisi ℥iii
 ^ vini rectificati ℥xv

per

per octiduum macerentur, exprimantur
& postea filtretur Essentia.

Ad affectus hystericos interne, uti &
ad odoratum exhibetur. Dosis interne
sumatur a guttis 30 ad 50.

Essentia carminativa Wedelii.

Rec. Rad. Zedoariae ℥iv

carlinae

calami

Galangae aa ℥ii

flor. chamaemeli rom.

sem. canisi

caryi aa ℥i

caryophyllorum aromaticorum

Baccarum lauri aa ℥vi

macis ℥ss

cort. Citiorum ℥i

concisa, contusa grosso modo maceren-
tur in

∧ cort. citri ℥ivss

∧ nitri dulcis ℥iiss per vi dies. Ex-
pressa & filtrata Essentia usui servetur.

Communis est muliercularum Solin-
gensium medicina, quam evidenti cum
usu sine praescriptione medici sibi ex offi-
cinis accersunt. Neque etiam effectus car-
minativus huius Essentiae revera est sper-
nendus.

a guttis 50-60 & ultra dari potest.

Essentia chinae chinae simplex.

Rec. corticum chinae chinae pulverisato-
rum ℥iii

∧ vini rectificati ℥xii

digere aliquamdiu, postea Essentia bene saturata expressa filtretur.

Non modo in febribus, sed etiam, ubi tonum relaxatum roborandi scopus est, convenit.

Dosis a guttis 60 ad 80.

Essentia chinae composita Helwig.

Rec. cort. peruviani ℥iii

rad serpentariae virginianae ℥ii

contraiervae ℥i

in pulverem tritis, affunde.

∧ vini rectificati ℥xvi

post sufficientem extractionem exprimantur & Essentia per chartam bibulam filtrata, reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica, carminativa iure habetur.

Dosis, guttae 50 ad 70.

Essentia corticum aurantium spirituosae.

Rec. cort ☉ curassavicornum, ab albedine interiori separatorum ℥i

affunde ∧ vini rectif. ℥iiii

post

post sufficientem extractionem exprime & per chartam emporeticam filtra.

Egregium est stomachicum, carminativum & tonicum.

Dosis, guttae 30 ad 60.

Essentia lignorum.

Rec. Rasurae ligni Sassafras

cum cortice ℥ii

— Sancti ℥iii

— Rhodii ℥℥

— Sandali rubri

— — citrini aa ℥i

affundantur \wedge vini ℥ii

per octiduum digerantur, postea exprimantur & filtrentur.

Sanguinis & Lymphae purificans corrigensque habetur.

Dosis a guttis 30 ad 70 in idoneo vehiculo.

Essentia Pimpinellae albae.

Rec. Rad. Pimpinellae albae ℥iii

\wedge vini rectificati ℥xv

macerentur per aliquot dies, ut extrahatur Essentia, filtranda & servanda.

Diaphoretica, alexipharmaca, diuretica in doloribus colicis torminosis, Lymphae vitiis corrigendis & in angina cathar-

rali sine vehiculo deglutita efficax habetur, ut & Gargarismis non sine utilitate additur.

Dosis a guttis 50 ad 60.

Essentia Scillae.

Rec. salis tartari ℥℥
 aceti scillitici, per infusionem aceto
 destillato parati & probe saturati ℥xii
 misce & evapora † leni igne ad mellis
 spissitudinem ex vase figulino probe vi-
 treato. Massa salina residua dissolva-
 tur in

∧ vini rectificatissimi ℥vi
 digere per aliquot dies, postea clarum a
 spisso per inclinationem vasis separa &
 serva.

Antasthmatica, resolvens, diuretica
 censetur, & in hydrope utiliter adhibetur.

Dosis a guttis 40 ad 60.

Essentia terrae Catechu.

Rec. terrae seu potius succi Catechu ℥i
 ∧ cydoniorum ℥iv
 solutione per digestionem peracta fil-
 tretur.

In haemoptysi, atque nimis hae-
 morrhagiis, diarrhoea, vel ubi adstrictione
 opus est, convenit.

Dosis a 30 ad 50 guttas.

Essen-

Essentia Valerianae composita.

Rec. Rad. valerianae,
 serpent. virg. \mathfrak{z} i
 camphorae \mathfrak{z} i
 infundantur in \wedge vini rectificati \mathfrak{z} viii
 post sufficientem extractionem exprimatur
 & filtretur Essentia.

Vires sunt alexitericae, uterinae,
 commendatur ab Hermanno epilepticis.

Dosis, guttae 40 ad 60.

Extractum Absynthii.

Rec. Summitatum Absynthii, in
 umbra siccatarum, vel potius re-
 centium \mathfrak{z} i

concisae macerentur in

∇ fontanae \mathfrak{z} vi, vel saltem iv
 per quatrimum, in loco calido, postea
 leniter ebulliant, exprimantur, liquor inde
 expressus & colatus coquatur igne lento ad
 iustam extracti consistentiam.

Vires habet stomachicas, tonicas,
 Anthelminticas. Dosis a \mathfrak{z} ss ad \mathfrak{z} i.
 Probe notandum, quod ex vegetabilibus,
 non modo gummosis, sed etiam resinosis
 partibus constantibus, extracta longe me-
 liora obtineantur, si aquae, in qua ma-
 cerentur, portio quaedam \wedge vini v, g. \mathfrak{z}
 singulis, \mathfrak{z} ii addantur.

Eodem modo parantur.

Ex.

Extracta *cardui benedicti.*

fumariae.

cochleariae.

Tanaceti.

Trifolii febrini.

aliaque, quorum ingens in Dispensatorio Wurtembergico habetur numerus.

Extractum aconiti.

Aconiti folia recentia contundantur & sacco cannabino inclusa prelo comprimantur valide, ut succum praebeant, qui in vasis repandis aquae ferventis fervore calefactis illico exhaletur ad mellis spissioris crassitudinem, sub finem assidue agitans.

In arthriticis morbis, in sero acri vitioso per sudorem, urinam vel alvum eliminando, in tumoribus glandularum scirrhosis resolvendis, & in ulceribus refractariis consolidandis laudatur.

A minima dosi v. g. $\frac{1}{4}$ grani parte incipiendum esse suadent Medici.

Eodem modo parantur.

Ex-

Extracta *Belladonnae.*
flammulae Jovis,
hyoscyami.
stramonii.

quae in canore, acredine humorum, diversis oculorum morbis, convulsionibusque varia ex indicatione adhibentur, quaeque omnibus lectoribus iam dudum nota suppono.

Extractum Aloes gummosum.

Rec. Aloes succotrinae optimae ℥vi
 redige in pulverem ac in cucurbita
 vitrea affunde ∇ font. ℥ii
 in vase tecto, loco calido, tres dies digere, ut solvatur; solutionem a faecibus separatam, leni igne ad extracti consistentiam evapora.

Alvum laxat, menses & haemorrhoides pellit, unde cautus sit, oportet, eius usus.

Extractum foliorum cicutae.

Cicutae floescentis foliorum & caulium succo, ut aconiti expresso & ad mellis liquidioris spissitudinem exhalato; iamque refrigerato, adde foliorum cicutae efficcatorum & in pulverem tritorum, quantum

tum sufficiat, ut fiat massa formandis pilulis apta. Curandum autem, ut exhalatio eo tandem procedat, ut pulveris quinta circiter pars admisceri possit.

Vires cicutae tot contrariis nituntur opinionibus & experimentis, ut fere nihil certi determinari de iis possit. Nihilominus in scrophulosis, scirrhisque tumoribus resolvendis, in gonorrhoea, fistulis, ulceribus aliisque malis summo saepe cum fructu adhibetur. A minima semper dosi incipiendum, & paulatim adscendendum esse suadet Stoerckius aliique.

Extractum gentianae.

Rec. Rad. gentianae q v.
concisae & contusae affunde

Aquae quadruplum. Decoque ad medietatem & exprimens valide cola. Decoctum illico vaporet in vasis aquae ferventis vapore calefactis ad mellis spissitudinem. Est roborans, antifebrile, stomachic m & anthelminticum insigne. —

Extracta Radicum bellebori nigri.

foliorum pulsatillae nigricantis.

— rutae.

Eodem parantur modo.

Ex-

Extractum Jalappae.

Rec. Rad. Jalappae ℥i
 ℞ vini rectif. ℥iv
 Aquae libras II

digere in vase clauso dies viii & cola. Colatum destilla ex retorta ad medietatem; dein reliquum in vasis apertis vapore fermentis; Aquae calefactis exhaletur ad mellis spissitudinem; sub finem assidue aqua, ut uniformis sit & sine grumis. Usus omnibus notus.

Extractum corticis peruviani & ligni campechensis.

Eodem modo paratur, adhibito tantum loco ℞ vini rectificati & aquae, ℞ vinoso tenuiore. Utriusque vires roborantes, antifebriles, subadstringentes omnibus notae sunt.

Extractum martis pomatum.

Rec. Limaturae ferri purissimae ℥i
 superfunde succi pomorum acidorum
 rec. expressi & depurati ℥iv
 stent in digestionem calida in cacabo ferreo,
 per plures dies. Postea coquantur, spatula perpetuo agitata, lento igne ad dimidiae partis consumptionem clarum a spisso
 co-

colando separetur, & ad extracti consisten-
tiam inspissatum reponatur.

Tonicum egregium est, hypochondriacis, cachecticis, ac ubi vermium suspicio est, convenit.

Extractum myrrhae aquosum.

Rec. Myrrhae rubrae electae pulveri-
satae ℥℥

irrosa

liquoris nitri fixi ℥i

& spatula lignea probe misce. Repone in
cellam per dies xiv. Tandem affunde
aquam fervidam, agita massam; dein
quieta relinquatur, donec crassius sedimen-
tum deposuerit. Clarum decantetur. Re-
siduo aquam fervidam denuo affunde,
donec tingi desinat. Tandem aqua omnis
myrrha impraegnata moderato calore ad
debitam consistentiam evaporetur.

Est uterinum, pectorale, balsami-
cum, vulnerarium. Dosis gr. V ad X. —

Extractum Nicotianae.

Folia nicotianae integra exsiccata per
noctem in aqua fontana (scilicet ℥i Nico-
tianae in ∇ ℥vi) macerentur; mane in-
fundantur cribro, ut aqua effluat; Folia ita
macerata atque aqua abluta in ℥x. ∇ fon-
tanae

anae magna ebullitione ad dimidiae partis consumptionem coquantur. Decoctum albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione ad consistentiam extracti inspissetur.

Commendatur in tussi pectorali & phtyfica diuturna mitiganda & cohibenda. A granis V vel VI exhibitum nonnunquam per superiora & inferiora fortiter purgat.

Extractum pachymagogum.

Rec. Scammonii aleppensis ℥i
 Rhabarbari veri
 sem. Ebuli āā ℥vi
 Agarici albi ℥vii
 Turbith. resinosi
 hermodactylorum āā ℥v
 hellebori nigri ℥℔
 Fol. Sennae ℥ii
 colocynthidis ℥x.

Rhabarbarum, hermodactyli, helleborus & folia Sennae minutim incisa infundantur in ▽ font. bullientis ℥ii macerentur per XXIV horas, atque, post unicam ebullitionem exprimantur, in expresso solvantur Aloes socotr. ℥iii atque seorsim ferventur. Reliqua vero, scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & colo-

Кеуп, pharmac.

G

cyn-

cynthis per repetitam affusionem \wedge vini rectificati s. q. extrahantur, extractiones per chartam emporeticam filtratae, cum solutione aloes colata misceantur, atque \wedge in balneo abstrahatur, residuum vero leni igne ad extracti consistentiam redigatur.

Praescribitur a multis adhuc medicis & pro purgante universali habetur.

Dosis a granis X ad XV.

F.

Flores Benzoes.

Rec. Benzoes tritae q. v.

indatur in ollam figulinam; cui, adaptato prius orae eius cucullo chartaceo amplo, subiice lenem ignem, ut flores sublimentur. Si oleo inquinati sunt, solutione in ∇ calida, crystallizatione purificentur.

Laudantur ad asthma & omnes pulmonum affectus; coagulum Lymphae mucido-ferosae solvunt & sudorem movent.

Dantur grana II ad IV ex ovo sorbili.

*Flores \ominus *ci simplices.*

Rec. Salis ammoniaci q. l.

solvatur in ∇ calida, solutio filtretur, postea in locum frigidum mittatur, & flores in li
quore

quore subsidentes exsiccentur; liquor vero remanens pro ulteriori florum collectione per exhalationem concentretur.

Scopo resolvendi, incidendi in viscerum obstructionibus, febribusque intermittentibus dantur a ℥i ad ℥ss & ℥i.

Flores ☉ Martiales.

Rec. Limat. martis subtiliss. tritae ℥iv
Salis Martis contusi ℥viii

in pulverem redacta & optime mixta ac aliquamdiu loco frigido reposita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenae gradatim aucto; primo destillabit liquor salinus penetrantissimus, tandem satis intenso, sublimantur in collum retortae flores.

Incidendi, dissolvendi, tonicam ac anodynam habere virtutem dicuntur. In teneriori aetate non ultra granum dimidium aut integrum, in adultioribus ad V-VIII-X ascendere licet.

Flores sulphuris.

Rec. Ferris communis in frustra dissecti q. l

iniice in cucurbitam terream, vitreatam & imposito alembico amplo vitreo, ex arena sublima igne non nimium intenso, ne flores sublimati fluant, qui mutatis saepe

alembicis sunt colligendi & denuo ☿ris subinde aliquid cucurbitae immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

Ad pectoris morbos, scabiem expellendam, ulceraque foetida laudatur. Datur a granis XII ad XX.

Flores Zinci.

Rec. Zincum. q. l.

& per se in olla vitreata sublimetur.

Praeter externum eorum in collyriis usum praecipue in morbis convulsivis, ipsa Epilepsia & tussi infantum convulsiva mire profunt. Dosis a grano dimidio incipienda.

H.

Hepar ☿ris.

Rec. flor. vel ☿ris purissimi flavi ℥iv fluant in vase figulino vitreato & successive admisceantur

⊖ ☿ri siccissimi ℥ii optime spatula agitata & ab igne remota serva.

Laudatur in scabie a cel. Wendt, inservit praeterea lacti ☿ris parando.

I.

Jalapium e camphora acetosum.

Rec. camphorae ℥i
 Gummi arabici ℥ii
 Sacchari finissimi ℥℥
 aceti vini ℥i

misc.

In febris malignis, nervosisque
 praestans est medicina.

Infusum Ipecacuanhae Caroli Gianella.

Rec. Pulv. rad. Ipecac. ℥i℥
 cort. ☉ curassav. ℥ii
 crem. Tartari ℥℥.

Ebulliant cum ℥iv aquae fontanae, cola-
 turae adde

oxymellis squillitici ℥℥

cochleatim exhibitum illud infusum, pri-
 marum viarum fordes, bilem eliminat per
 vomitum & per urinae vias, hinc in omni
 genere febrium acutarum remittentium,
 intermittentium, optima est medicina, &
 non raro praeventit exanthemata cutis,
 quae sunt cum febre, & ab impura collu-
 vie primarum viarum gigni solent. Saepi-
 sime miratus est celeberrimus Baldin-
 ger, opem praestitisse illico hoc infusum
 in recensitis morbis. Ictera saepius egregie

medetur idem remedium, & tussim sanat stomachicam, asthma depellit humidum, menstrua revocat infusum ex Ipecacuanha. Quare egregiam hanc formulam ex illustribus Baldingeri additamentis Pharm. Edimb desumptam, saepius a me evidentissimo cum effectu praescriptam, omittere nolui.

K.

Kermes minerale, sive pulvis carthusianorum.

Rec nitri fixi ℥iij
 solve in ▽ font. ℥xv
 solutionem filtratam seorsim serva.

Rec. antimonii crudi hungarici grossiori modo contusi ℥ii
 superaffunde

liquoris alcalini modo praescripti ℥vii, coque in figulino vase igne per unam vel alteram horam leniter continuato, postea liquorem affunde & filtra. Tandem reliquam liquoris portionem antimonio affunde, coque & filtra, uti dictum.

Liquor per filtrum ita colatus requiescat XXIV vel plures horas, sic pulvis rubicundus fundum petet, qui postea affusa ▽ calida saepius edulcoretur & usui ser-

fervetur. Ad obtinendum autem Kermes
 minerale mitius praefertur illa methodus,
 qua antimonii in grossum pulverem com-
 minuti ꝑi cum subquadrupla saltem por-
 tione salis alcalini fixi in ∇ ꝑi soluti per
 IV horas coquitur (eandem semper ∇
 quantitatem fervendo) postea lixivium
 hoc hepatis antimonii fervidum filtratur,
 in locum frigidum ponitur, ut pulvis
 ruber sponte fundum petat, subdecuplum
 circiter antimonii assumti pondus aequans
 aqua edulcorandus. Liquor superstans
 antimonio residuo reaffunditur, addita
 per evaporationem amissa ∇ portione, de-
 nuo coquitur, sicque labor aliquoties dicto
 modo iteratur. Mitissimum acquiritur ⚗
 antimonii, si Kermes ipsum iam praepa-
 ratum cum duplo alcali larga ∇ quantitate
 denuo coquitur, tum enim ex ∇ filtrata
 & refrigerata, purius, metalli parte ma-
 gis privatum, descendit. Dosis a grano I
 ad VI in morbis sub sulphure aurato anti-
 monii nominatis.

L.

Lapis calaminaris praeparatus.

Rec. Lapidis calaminaris ꝑi
 candesciat ter vel quater in crucibulo, at-
 que toties in ∇ rosarum extinguatur,

G 4

postea

postea siccatus in subtilissimum pollinem teratur, atque super marmore laevigetur.

Ufus est externus in collyriis, unguentis, Emplastris, siccatur & adstringit.

Lapis causticus.

Rec. cinerum clavellatorum ℥i

calcis vivae recentis ℥ss

addita s. q. aquae coquantur invicem in sartagine ferrea, lixivium adhuc dilutum decantetur, vel per filtrum transfundatur, tum clarum denuo coquatur usque dum solidescat. Sal alcalinum sacerrimum remanens spatula ferrea eximitur, vase vitreo exacte clauso, in loco calido asserandum.

Est cauterium potentiale, & ad abscessus aperiendos, excrescentias destruendas &c. adhibetur.

Lapis divinus.

Rec. vitrioli de Cypro

nitri purissimi

aluminis crudi ℥̄ss ℥̄iii

optime contusa & pulverisata liquescant in vitreo vase calore arenae, quibus liquefactis adde

camphorae tritae ℥̄ss

mixta & refrigerata massa servetur, adhibetur in collyriis ad oculorum affectus.

Lapis

Lapis infernalis.

Rec. Argenti purissimi ℥ii
 solve in \wedge nitri ℥vi
 evaporetur solutio ad IV partis consumtionem, atque ad crySTALLIFICATIONEM reponatur. CrySTALLI colligantur, liquor denuo evaporetur & labor repetatur, donec omnis liquor in crySTALLOS vel salem abierit. Has crySTALLOS crucibulo satis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde subsidebit, tandem ignis gradu auēto olei instar fluēt, quam effunde in canalem ferreum cylindricum prius calefactum & sevo illitum. Massa nigra & compacta esse debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit in vitro clauso probe servanda.

Lapis medicamentosus.

Rec. vitrioli albi ℥iv
 Salis ammoniaci ℥℞
 cerussae
 boli arminae \overline{aa} ℥i
 Aceti vini ℥i
 coquantur in figulino vase ad siccitatem.
 Desiccet, mundat, partes relaxatas roborat. Modus adhibendi est, ut ℥i solvatur in ∇ pluviae ℥i; solutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta

G 5 im=

imponantur, vel liquor ipse syringae ope iniiciatur.

Laudanum liquidum Sydenhamii.

Rec. vini hispanici ℥i
 opii puri ℥ii
 croci ℥i
 cinnam. acuti
 caryoph. arom. ā ℥i

infusa stent in digestionem, calore modico per aliquot dies. Colatura fervetur. Dosis a guttis XV ad XXV. continet remedii huius drachma, quantum ex opii Scrupulo dimidio solubile.

Liquor anodynus mineralis, aether. Naphta vitrioli, oleum vitrioli dulce.

Rec. olei vitrioli. per rectificationem omni phlegmate orbati ℥i
 ℞ vini rectificatissimi, qui ne vestigium aquae continet ℥vi

oleum vitrioli instillatur successive & per vices ℞ vini, quod cum strepitu, non secus, ac si ferrum candens in ▽ frigidam iniiceretur, fit, mixtura incalescit, colorem acquirit rubeum, odorem gratum, stent, vel digerantur in vitro probe clauso per aliquot dies; postea instituaturs destillatio igne arenae lenissimo, e cucurbita fatis

satis alta; primo prodit \wedge vini vix mutatus, separatim remoto excipulo servandus, quem sequitur fragrantior, eo usque lenissimo igne destillandus, donec phlegmaticus, sulphuris odorem eructans, (cum tantillo olei) insequatur, cuius mixtio cum priori fragrante provide cavenda. Sistatur destillatio, quando mixtura tandem in fundo cucurbitae in offam nigram abire incipit, si enim destillatio phlegmatis sulphurei igne auctiori continuatur, facile fit, ut omnis massa illa nigra subito & ex improvviso alembicum transcedat. Residuo in cucurbita affundatur

\wedge vini rectificatissimi nova $\text{ff} \text{ij}$, addito simul \wedge , qui primum prodiit vix mutatus, antea separatim servatus. Facta post digestionem desullatione denuo spiritus fragrans obtinetur cum priori miscendus & vitro probe obturato servandus.

Quodsi spiritum primum a secundo separare non placuerit, sed confusi invicem manserint, tum aequè bonus obtinetur liquor, si omne destillatum spirituosum residuo oleo vitrioli reaffunditur & igne leni cohobatur.

Liquor hic virtute sua anodyna, antispasmodica, carminativa, diuretica, & sudorifera se commendans a guttis XXX ad LX datur.

Pro

Pro diversa ratione olei vitrioli & alcoholis, diversa obtinentur producta. Si enim olei vitrioli & alcoholis, praecipue tartarifati partes aequales, singulorum ℥vi, recipiuntur, de alcohole non mutato nihil, de secundo spiritu fragrante circiter ℥ii & olei vitrioli dulcis largior quantitas obtinetur. Sunt, qui ad nobiliorem unionem \wedge vini cum oleo vitrioli, & maiorem quantitatem olei vitrioli dulcis obtinendam, destillatum hoc reaffundunt & iterum destillant, similemque laborem cum novo \wedge vini repetunt, optimo cum successu. Si alcoholis ℥ii olei vitrioli fortissimi ℥i admiscetur, spiritus citra mutationem primum destillans, nonam in circa partem, oleum vitrioli dulce, fragrantissimum, pellucidum, secundo liquori supernatans, ab omni acido adhaerente privatum, XVIII partem ponderis liquorum assumptorum aequare observatum est, remanente subtriplo olei vitrioli, quod erat receptum. Quoniam post suavissimum, secundum liquorem, igne continuato & auctiore liquor stillaret fortissimum ¶ ris odorem eructans, \wedge vitrioli volatilis, ideo ille & ab hoc, & ab eo, qui primus destillavit, mutato subinde excipulo, provide separandus & asservandus est.

Quamvis

Quamvis enim continuata destillatione cum spiritu vitrioli volatili & phlegmate acido sulphureo oleum ulterius expelli possit, ut gravius, magis tinctum & foriissimo odore sulphureo inquinatum, hoc tamen, (sicut etiam liquor anodynus acido sulphureo inquinatus) non, nisi additione aquae & salis alcali & iterata destillatione depuratum pro oleo vitrioli dulci venditari potest. Praestat, obtento spiritu secundo ab ulteriori destillatione desistere & sic facilem materiae descensum praecavere.

Materies a destillatione reliqua, nigerrima, tenax, ita potius in usum convertatur, ut ipsi aqua, ne filtrum arrodant, adiciatur, per filtrum traiecta aeri libero, usque dum odor sulphureus evanescat, exponatur, deinde per rectificationem condensetur, sicque oleum vitrioli remanens obtineatur, dictis laboribus, imprimis, si nova portio olei vitrioli additur, denuo inserviens.

Patet ex indicatis fundamentum & Encheiresis, acidum vitriolicum dulce sub varia forma & quantitate obtinendi.

Spiritus supra dictus secundus ex anatica vel dupla portione Alcoholis, cum oleo vitrioli mixti obtentus, alcohole ipso levior, tardius cum aqua coiens, hinc
su-

super eam, si accendatur, ardens, vocari solet Aether. Oleum descriptum vitrioli dulce, aethere adhuc levius, Naphtae nomen accipit, cum aqua plane non miscetur, flammam, in viciniam vasis, quo continetur, collocatam, per vapores, quos emittit, arripit & quasi attrahit. Solutioni auri, si admiscetur, concutiendo, ex aqua Regis eripit metallum, quamvis in aggregato ponderosissimum, ut supernatet.

Aether, sive Naphta, cum portione resinae sub destillatione remanentis, elotae, digestionem coloratus, liquorem Manchini constituit.

Vires Aetheris & Naphtae sunt adhuc validiores, quam liquoris anodyni. Frigoris sensum cuti, si instillentur, imprimunt. Summa volatilitate egregios, in moderando fluidi nerve motu effectus praestant.

Liquor cornu cervi succinatus.

Rec. spiritus c. c. aliquoties rectificati ℥vi

Salis volatilis Succini q. s. ad saturationis punctum. Misceantur & digerantur per aliquot dies in vase probe clauso, postea per chartam emporeticam filtrata serventur.

Dia-

Diaphoreticae, diureticae, antispasmodicae vires adversus motus convulsivos epilepticos puerorum, hystericos affectus & hemicraniam efficaces habentur.

Liquor cornu cervi succinatus albus.

Rec. Salis volatilis cornu cervi & succini depuratorum portionem anaticam, vel quantum unius, ad saturationem alterius sufficit. Solve in aquae cerasorum nigrorum ℥viii filtra, serva.

Colore albicat, odore non est adeo empyreumatico, viribus iisdem.

Liquor probatorius.

Rec. Auripigmenti ℥i
 calcis vivae recentis ℥ii
 pulverisata coque cum aquae s. q.
 in vase figulino, dimidio quadrante horae, ut ℥ii liquidi filtrandi possint decantari.

Ad detegendum mangonium vini Lythargirio inquinati adhibetur. In vino sincero guttatim instillatus deponit sedimentum citrinum, Lithargyrii autem vel Sacchari Saturni admixtio proditur, si liquor est recens paratus, quam primum in-

instilletur vino, nigrescit & nigrum sedimentum ponit.

Liquor terrae foliatae Tartari.

Rec. Terrae foliatae Tartari siccissimae ℥ii

superaffunde

℥ vini optimi rectificatissimi ℥viii
digerantur per aliquot dies, spiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus per chartam filtratus servetur.

In omnibus ab obstructione natis morbis egregium est remedium, imprimis si Tinctura Rhei admiscetur.

Liquor, sive liquamen Myrrhae.

Rec. Gummi Myrrhae ℥i
c. s. q. vitell. ovor. solve in
Aquae florum Sambuci ℥vi
misc.

In ulceribus & vulneribus, ubi solidae partes nimis laxae sunt, nec non in oculorum morbis egregie conducit.

Loch de Farfara.

Rec. Rad. Farfarae rec. q. l.
coque ad mollitiem, contunde in mortario lapideo & per cribrum traice.

Huius Pulpae ℥i
adde mellis despumati ℥ii

coquan-

coquantur ad superfluae humiditatis consumptionem, postea ferventur.

Acrimoniam humorum involvit, abstergit & mundificat. Nuper Farfara & eius Loch in cel. Baldingeri Promptuario ad scrophulas ut specificum, laudabatur.

M.

Magnesia alba.

Rec. Salis cathartici amari

Salis lixivii pondera aequalia
separatim aquae calidae duplo solvantur, & vel colentur, vel aliter a faecibus purificentur, dein misce & protinus adde aquae ferventis octuplum. Bulliat liquor paulisper super ignem & simul agitur, quo facto quietum relinque, donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magnesia, quae aqua pura lavetur, donec prorsus insulsa sit.

Virtute gaudet absorbente & in maiori dosi alvum laxat & evacuat.

Magnesia usta.

Magnesia in crucibulo posita ab igne rubescat duas horas, dein in vasis vitreis

Keup, pharmac.

H

obtu-

obturatis fervetur. Scopo absorbendi minori
dosi, quam praecedens, efficax est.

Mel despumatum simplex.

Rec. Mellis ℥iv
aquaе fontanae ℥viii
ebulliant, despumentur, & per pannum
colatum mel fervetur.

Mel rosatum.

Rec. fol. Ros. rec rubr. ℥vi
macerentur per XXIV horas in vase
figulino, exprimantur & colentur. Cola-
turae adde mellis optimi purissimi tantun-
dem. Despumentur & coquantur ad con-
sistentiam melle liquidiorē paulo.

Ad gargarismata, collutiones, inie-
ctiones detergentes inservit. Additur etiam
digestivis & quando ulcera a vesicatoriis
inducta purganda & detergenda sunt.

Mercurius dulcis.

Rec. mercurii sublimati corrosivi in morta-
rio vitreo triti ℥iv
mercurii crudi ℥iii℥
terantur in mortario vitreo, evitato pul-
vere volatili, donec globuli mercuriales
non amplius appareant. Indatur pulvis in
phialam oblongam, cuius tertia pars tan-
tura

tum impleatur. Deinde ex arena sublima, Sublimatione peracta, contractaque phiala, pulverem rubentem circa fundum & albicantem circa collum reijce, tum massa mercurialis reliqua ter aut quater rursus sublimetur & tandem in pulverem tenuissimum teratur.

Rite praeparati mercurii dulcis signum & criterium est, si insipidus atque omnis saporis metallici sit expers, & ex quo, si coquatur aqua fervida, plane nihil solvitur, quod oleo Tartari per deliquium praecipitari potest.

Varium cumque egregium in arte medica usum lippis & tonsoribus notum, omitto.

Mercurius praecipitatus albus.

Rec. ℥rii subl. corrosivi q. l.

Solvatur aqua calida & solutioni paulatim instilla $\wedge \ominus \times$ donec desinat deici pulvis albus, qui saepius abluatur aqua calida.

Ad lichenes, scabiem, top hos venereos externe adhibetur.

Mercurius praecipitatus ruber.

Rec. ℥rii vivi ⚄

solve in aquae fortis s. q.

destilla ex retorta in arena ad siccitatem,

igne fortissimo in fine administrato, sic ut retorta ubique carbonibus obruatur; post refrigerationem in fundo haerebit pulvis ruber, qui, si non colore rubro pulchre splendet, leniter in patina ulterius calcinetur ad auferendas excrescentias, carnem luxuriantem, cancos venereos aliaque ulcera maligna mundificanda adhibetur.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Facillima methodus eum praeparandi, est, si $\frac{1}{2}$ c. oleo vitrioli in massam albam salinam redactus cum salis communis aequali pondere sublimatur. Ordinario modo autem sic praeparatur:

Rec. hydrargyri
 acidi nitrosi tenuis \mathfrak{ss} \mathfrak{z} iv
 Salis marini calcinati
 vitrioli calcinati \mathfrak{ss} \mathfrak{z} v

solvatur $\frac{1}{2}$ in acido nitroso & vaporetur solutio in massam albam penitus siccam; dein adde salem marinum & vitriolum. Bene contrita & commixta indantur phialae, quam fere dimidiam impleant, & ex arena, primum leni igne, postea sensim aucto, sublimentur.

Inter praeparata mercurialia iure princeps habendus. De usu eius interno, quando de pilulis maioribus Hoffmanni vel eius

solutione in \wedge frumenti loquemur, sermo erit. *Archiater monasteriensis Hoffmann Zi* ζ rii huius in ∇ comm. vel alius destillatae, bene odorac, ζ viii solvendum & in scabie & venereis diversis malis externe ad lavandum commendat, quae methodus inter praecipua recentiora inventa primarium tenet locum.

Mucilago ζ rialis Plenki.

Rec. ζ rii vivi purissimi Zi

Gummi arabici Ziij

misce, tere in mortario lapideo, affunde sensim aliquam portionem syr. de cich. c. rheo, usque dum omnis ζ rius in mucilaginem sit redactus.

Haec mucilago vel aqua diluitur vel cum mica panis in formam pilularem redigitur & ita datur, ut omni mane & vesperi grana X sumantur. Pro gargarismate vel fomentatione in ophtalmia venerea cum lacte misceatur. Dantur adhuc multa alia praeparatorum mercurialium genera; sic *Selle* habet mercurium nitrosum ex ζ rio in acido nitri soluto, quem summopere laudat, & alium adhuc, sic dictum mercurium tartarisatum, qui ex accurata tritura ζ rii vivi p. I. & cremoris tartari p. II. conficitur, quemque commendat, si cum venereo malo simul cacochymia adest scorbutica.

N.

Nitri Naphtha.

Rec. \sphericalangle vini rectificatissimi, in maiori
vitro contenti \mathfrak{ss} .

affunde per vices.

\sphericalangle nitri concentrati \mathfrak{ss} ;

liquores tranquille coeunt. Elapsis aliquot
horis, \mathfrak{ss} circa \sphericalangle nitri affunde denuo,
idque post VI vel VIII horas similiter re-
pete, usque dum in liquoribus mixtis in-
testinum morum, qui tandem satis vehe-
mens fit, videas oriri. Post quaslibet
autem affusiones vitrum exactissime debet
claudi, & in loco frigido, vel aqua frigi-
dissima detineri. Sub motu isto intestino
videbis oleum viridescens superficiem li-
quoris petere & sensim sensimque augeri.
Separatur hoc oleum & liquori residuo de-
nuo aliquot drachmae acidi affunduntur,
& quod inde secedit oleum, viridi colore
conspicuum separatur. Continuatur ita
commixtio acidi, usque dum nullum a
superaddito acido ulterius oleum secedit.

Oleum collectum affusa aqua & ad-
dito alcali urinoso, (quod purpureo hinc
tingitur colore) ab acido adhaerente edul-
coratum iterumque separatum usui serve-
tur in loco frigido & vitro bene munito,
sub

sub titulo Naphtae nitri, quae ita rectificata pondus subtripulum alcoholis ad laborem recepti solet aequare. Vires cum Naphta vitrioli conveniunt.

Nitrum Crystallisatum & depuratum,

Solvatur nitrum in aquae fontanae s. q. leni calore; liquor per pannum colatus ad crystallisationem reponatur. Crystalli longae, pyramidales colligantur & serventur.

Inter salia media temperantia praecipuum habet locum, si iusta ex indicatione datur.

Nitrum Saturninum,

Rec. nitri crudi crystallisati ℥iii
Sacchari Saturni ℥ii

solvantur in aquae rosar. s. q. & in vase vitreo ad pulpam crassioris consistentiam evaporentur, postea leni calore penitus siccantur.

Gargarismatibus & collyriis non sine fructu additur.

O.

Oleum absynthii per infusionem.

Rec. olei olivarum ℥iii
 comarum absynthii recentis con-
 tularum ℥xxiii
 Rosarum rubr. ℥i

macerentur per triduum in loco calido, deinde leni igne coquantur ad humiditatis consumptionem, exprimantur & oleum colatum fervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhoea & ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodest.

Oleum expressum amygdalarum amararum.

Fiat eadem ratione, qua sequens. Resolvit, discutit, contra susurros & tinnitus aurium aliquot guttae auribus instillantur; interne raro vel nunquam praescribitur.

Oleum expressum amygdalarum dulcium.

Rec. Amygd. recentium q. v.
 in mortario lapideo contusas sacco cannabino include & oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

Est emolliens, stricuras dolorificas relaxans, hinc in doloribus post partum, colicis

colicis diversis, nephritide calculosa aliisque convenit morbis.

Eodem etiam parantur modo

Oleum seminum Lini,

cuius virtus emolliens notissima, uti &

Oleum Ricini.

Cuius vires anthelminticae a multis extolluntur, ab aliis in dubium vocantur, laudatur etiam in colica saturnina.

Oleum hyoscyami.

Rec. seminum hyoscyami, q. v. confundantur, torreantur, & exprimantur.

Est paregoricum & affluxum nirium cohibet. Ad Emplastrum de hyoscyamo requiritur.

Oleum hyperici.

Rec. florum hyperici ad maturitatem seminis fere accedentium, contusorum ℥iii

vini albi ℥℥

croci ℥iv

olei clari ℥ii

post factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis consumptionem,

H 5

postea

postea exprimantur & expressum misceatur cum

Terebinthinae clarae ℥i
 Vulnerarium & paregoricum praebet egregium, in affectibus nervorum a convulsione & luxatione ortis, nulli cedit.

Oleum ovorum.

Rec. ova recentia, coque ut indurentur, postea vitellos exime, contritos, atque in sartagine, donec rubescant & pinguedinem quandam emittant, leniter assatos adhuc ferventes & forti sacco inclusos exprime.

Est oleum blandum, demulcens, interim cavendum, ne in usum vocetur, quod vetustate acrimoniam rancidam contrahit.

Oleum absynthii destillatum.

Rec. Summitatum Absynthii, cum semine maturitati proximo, in umbra siccatarum, ℥xxv
 incisae & conquassatae macerentur per tri-
 duum in

Aquae fluviatilis ℥i xxv
 additis salis communis ℥iij;
 destillentur postea e vesica ad tertiam partem repleta, & oleum aquae innatans separetur.

Eodem

Eodem modo parantur olea destillata
sequentia :

Oleum chamomillae
lavendulae
Maioranae
melissae
menthae
pulegii
Sabinae
Tanaceti.

Oleum Anethi.

Rec. sem. Anethi contusi ℥iv
infusum ▽ fluviatilis ℥xvi
ac per triduum, addita
Salis ℥i

maceratum, destilletur e vesica, & oleum,
ut moris, ab aqua separetur.

Eadem encheiresi destillantur reliqua
olea ex feminibus :

Oleum anisi
carvi
coriandri
cumini
foeniculi
iuniperi e baccis
lauri e baccis.

Oleum

Oleum caryophyllorum aromaticorum.

Rec. caryophyllorum ℥ii
 tritis affunde

Aquae pluviae ℥xvi

adde Salis communis ℥iv;

stent per sex dies in loco calido, postea
 destilla e vesica, sic prodit una cum aqua
 oleum caryophyllorum, omnis coloris
 expers, quod fundum petit.

Pari modo parantur;

Oleum cardamomi

cinnamomi

macis

nucis moschatae

piperis.

Oleum animale Dippelii.

Quoniam pauci Pharmacopoei ipsi hoc
 oleum praeparant, prolixam praeparandi
 methodum Disp. Wurtemb. omitto, pau-
 cisque tantum moneo, quod, si oleum
 cornu cervi foetidum per se leni igne de-
 stilletur, primo prodeat Δ . c. c. parva
 quantitas, dein sequatur hoc oleum album,
 penetrans, volatile.

Usus eius in nervorum morbis, &
 imprimis in epilepsia dudum notus & saepe
 effi-

efficacissimus fuit. A paucis incipiendum guttis & tandem ad 20. 30. 40 usque ascendere licet.

Oleum cerae.

Rec. cerae flavae odoratissimae ℥i.

Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortae orificio commode possint immitti, eaque repleti ad dimidium. Tum infundatur arenae purissimae tantum, quantum capit venter retortae; calefiat tunc lente retorta, donec cera liquefcens arenam sibi permiscuerit, & imbibetur satis: imponatur furno arenae, instituat, applicato excipulo, destillatio: adhibito primo leni ignis gradu prodire solet aqua acidula, foetens, pauca, una cum spiritu; calore dein aucto, adscendet sensim oleum tenue, dum destillat, in excipulo, instar butyri concrefcens; hoc ubi ultra prodire negat, maior adhibendus est ignis, & quidem fortis suppressionis, cuius ope adscendet mox tota massa cerae in excipulum, sub forma butyri. Butyrum hoc cerae, sine ulla additione ex retorta, lenissimo ignis gradu iterum destillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyrosum seorsim excipi

Ad mala papillarum nervosarum, quae in cute extrema denudata sunt, ad
fissu-

fissuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades, tumores & perniones a frigore inductos, tendinesque contractos laudatur.

Oleum Terebinthinae.

Rec. Terebinthinae pellucidae q. v.

▽ fontanae sextuplum

destillantur lento igne ex vesica, sicut alia olea destillata; post destillationem oleum ab aqua separetur ac servetur.

Residuum in vesica praebet Terebinthinam coctam, vel ulteriori coctione absque aqua instituta, in colophonium reducitur.

Calidum est, hinc ab usu interno caveatur. Usus externus multiplex est, ad vulnera & puncturas membranarum, tendinum & nervorum, si calidum instilletur, praebet anodynum & consolidans. In haemorrhagiis ex arteriarum, venarumque vulneribus promptum est stypticum, modo calidum applicetur & splenis appressis ad locum detineatur.

Oleum vitrioli.

Per destillationem \wedge vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicetur oleum acerrimum, concentratum,

pono

ponderosum, quod rectificati debet per retortam.

E centenariō vitrioli Goslariensis X ℥ olei prodeunt & circiter ℥ XX ʒ & phlegmatis.

Adhibetur ad chemicos & pharmaceuticos usus varios.

Oxymel ex allio.

Rec. Allii in tenues lamellas dissecti ʒiſſ
sem. cumini
foeniculi d. aa ʒii
mellis despumati ʒx
aceti vini ʒxii

coque semina contusa cum aceto vini in vase figulino vitreato, sensim adde allium, tege vasculum opereculo accurate & postquam refrixerint, exprimatur liquor & in eodem in calore balnei dissolvantur mellis ʒx.

Non solum ad pectoris affectus, sed etiam adversus vermes intestinorum efficaciter interdum est remedium.

Oxymel colchicum.

Rec. Rad. colchici rec. in principio aestatis collectae, succulentae, in tenues taleolos sectae ʒi
Aceti vini ℥i

haec

haec lento igne in phiala vitrea invicem digere per XLVIII horas, saepius tamen phialam agitando, dein colaturam leviter exprime.

adde huius aceti colchici rite parati ℥i
mellis puri ℥ii

misce & supra leni igne, saepius agitando cochleari ligneo coque ad mellis consistentiam.

Oxymel hoc grate acidum saporis leviter adstringentis tuto interne datur. Convenit ubique, ubi serum abundans per urinae vias expelli debet. Promovet sputa, tussim mitigat & respirationem liberam reddit.

Datur a ℥i sensim scandendo ad ℥ii vel ℥iii de die. —

Oxymel Scilliticum.

Ex mellis despumati ℥iv ac
aceti scillitici ℥ii

in vase figulino vitreato ad iustam consistentiam coquitur.

Ad pulmonum affectus pituitosos, hydropicis & asthmaticis commendatur a ℥iii ad vi pro dosi.

Oxymel

Oxymel simplex.

Rec. mellis despumati ℥i
aceti vini ℥℥

coque in vase figulino probe vitreato ad
syrupi consistentiam, servetur in vase
vitreo.

Non solum tanquam resolvens & tem-
perans interne assumitur cum emolumento,
sed etiam in gargarismis adhibetur.

P.

Pilulae alterantes Plummeri.

Rec. ℥rii d. r. ppt
⚞ ⊙ antimonii ultimae praecipita-
tionis ℥vi
extracti Glycyrrhizae ℥℥

trituro miscetur cum sulphure anti-
monii mercurius intime, dein adde Extra-
ctum Glycyrrhizae & mucilagine Gummi
arabici fiat massa, formandis pilulis apta.

In morbis veneris, aliisque rebellibus
a pituitae & Lymphae impuritatibus ortis,
egregie conducunt. Mane & vesperi per
tempus gr VIII ad XII cum decocto ligno-
rum, vel alio congruo sumantur.

Pilulae aloeticæ.

Rec. aloes socotrinae tritæ
 extracti gentianæ ʒii
 Salis polychr. triti ʒß
 misce & cum melle despumato fiant massa
 pilularis. —

Aperiunt alvum, profunt in chlorosi,
 cachexia, febribus inveteratis, præcipue
 quartana.

Dosis pro indicationis scopo facile de-
 terminari potest.

Pilulae anthelminticæ purgantes.

Rec. aloes socotrinae
 resinae Jalappæ
 mercurii d. r. præp. ʒii
 pulveris sem. Sabadileos ʒi
 misce fiant pilulae gr II c. Ess Rhab. con-
 sperge pulvere liquiritiæ. D. ad usum.

Usum docet titulus, dosis pro ætatis
 ratione a IV ad VIII & X. —

Pilulae antihystericæ Sellei.

Rec. Gummi Galbani
 — — Assæ foetidæ
 Extracti angelicæ ʒii
 castorei
 croci ʒi
 opii puri ʒß

eam essentia castorei fiant pilulae granorum II consperge pulvere liquiritiae. D. ad usum.

In pilulis VI, continetur opii gr. ℞, dantur V vel VI mane & vesperi in spasmis hystericis.

Pilulae balsamicae Selle.

Rec. Extracti rad. helleb. nigri
aloes dep.

flor. \ominus ❄️ci martialium \bar{a} ℥℞

croci orientalis ℥ii

opii thebaici ℥i

misce fiant pilulae c Eff Rhab. ponderis granorum II consperge pulvere liquiritiae. D. ad usum.

In mensibus, haemorrhoidibusque pellendis sine noxa, adhibentur a VIII ad XII cum utilitate.

Pilulae balsamicae Mortoni.

Rec. Millepedum ℥iii

Gummi ammoniaci ℥ii℞

Florum Benzoes ℥i

croci orientalis

Balsami peruviani \bar{a} grana XV

misce cum sufficiente quantitate Balsami sulphuris anisati, fiat massa.

Ad tussim chronicam, serophulosam
& phtylicam, pulmonibus phlegmate
viscoso infarctis, scirrhis, commendantur.

Dosis grana X ad XVI bis, terve de
die, decocti convenientis haustum super-
bibendo.

Pilulae cachecticae.

Rec. Gummi ammoniaci ℥vi
extracti aloes gummosi ℥℥
chalybis in alcohol redacti ℥v
olei destillati caryophyllorum
anisi ℥℥
misce cum sufficienti quantitate spiritus
vini, fiat massa.

Resolvunt obstructiones, fibris laxa-
tis conciliant tonum, prosunt in cachexia,
chlorosi, ictero, mensium vitiis, hypo-
chondriacoque malo.

Dosis grana XV ad XXX.

Pilulae ſtriales.

Rec. Extracti panchymagogi
Resinae Jalappae
ſtrii d. r. ppt.
diacrydii ℥℥ ℥i
Essentiae ligni Sassafras. q. s.
fiat massa.

Quotidie

Quotidie a plebe, scopo laxandi, in
diversis expetuntur morbis.

Dosis grana XII ad XV.

*Pilulae Scilliticae secundum additamenta
Pharm. Edimburgensis cel. Baldinger.*

Rec. Gummi ammoniaci

Scillae recentis $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{z}}$ ß

contunde simul in mortario & adde

cardam. minor. trit. $\overline{\text{z}}$ ß

fiat massa pilularis cum s. q. balsami co-
paivae.

Inter resolventia primarium hae pi-
lulae locum obtinent, hydropicis praecipue
conveniunt. Laudantur in hunc finem
ab illustri Baldingero in suis, Pharm. Edimb.
adiectis, doctissimis additamentis.

Pilulae resolventes Tissoti.

Rec. Saponis albissimi $\overline{\text{z}}$ vi

extr. taraxaci $\overline{\text{z}}$ iß

Gummi ammoniaci $\overline{\text{z}}$ i

mellis. q. s. ut fiat massa.

In obstructionibus viscerum utiliter adhi-
bentur. Laudantur in modo laudatis
Summi Baldingeri additamentis.

Pilulae physagogae Ludolffi.

Rec. pulveris rad. Scillae ℥℔
 ☿ ⊙ antimonii tert. praecip.
 ⊖ volat Succini ꝑꝑ ℥i
 extracti Elater. ℥℔
 olei destill. anisi guttas aliquot.

fiant cum Succo liquir. pilulae grani
 unius.

In hydrope utilissimas & efficacissimas
 has Pilulas esse, saepius me expertum esse,
 gaudeo; laudantur ab illustri Baldingero
 in suis additamentis Pharm. Edimb. Vali-
 dam esse vim illarum, mixtio docet, sed
 iusta dosis drastica non est.

Dantur a granis V ad X ascendendo.

Pulpa cassiae.

Rec. fistularum cassiae ponderosa-
 rum. q. l.

aperiantur & pulpa cum seminibus deli-
 genter eximatur, in aquae calidae s. q.
 dissolvatur & per cribrum traiciatur;
 lento igne ad mellis consistentiam reda-
 ctae ꝑꝑ tantumdem sacchari albi adicia-
 tur & ad iustam coquantur consisten-
 tiam.

Eodem modo praeparatur:

miscere pro dosi. Oleum caiaputi pluries saccharo pulverisato ad guttas III vel V commiscuit, spasmis & flatibus urgentibus.

Repetitus huius pulveris usus permultis, teste summo Baldingero, hypochondriacorum symptomatibus medetur. Abstergit nimirum bilem rancidam, & acidam corrigit, leniter purgat & motum peristalticum restituit.

Pulvis opthalmicus Baldingeri.

Rec. Sacchari albi
boli albae vel rubrae
cremoris tartari aa quantum lubet.

miscere fiat pulvis subtilissimus.

Applicetur absque irritatione & absque flatu inprimis, quotidie parva portio huius pulveris, oculo. Sanat certissime continuato usu, ad miraculum sane, oculum panno crassiori obscuratum, & visum restituit. Iuvit saepe in casu desperato, ubi vix expectasset celeberrimus Archiater. —

Pulvis ad partum.

Rec. Boracis ℥ss
 castorei moscov.
 croci orient. ℥ā ℥iſs
 olei cinnamomi guttas VIII
 succini guttas VI

misce fiat pulvis.

Usus titulus docet, datur a granis
 XX ad XXX.

Pulvis pectoralis Balsamicus Wedelii.

Rec. Rad. liquiritiae ℥i
 iridis florentinae ℥ii
 florum sulphuris ℥ss
 Benzoes ℥i
 Sacchari canti albi ℥ii
 olei anisi
 foeniculi ℥ā guttas X.

misce fiat pulvis.

Demulcet, resolvitque. Dosis ℥i
 ad ℥ii.

Pulvis pectoralis Sellei.

Rec. pulveris florum Arnicae
 nitri antimoniati per inspissationem
 parati ℥ā ℥i
 opii thebaic. grana IV
 camphorae gr. X.

misce fiat pulvis.

In phytisi incipiente, si congestiones sanguinis in pectore adsunt, quotidie cochlear parvum (Theelöffel) exhibetur.

Pulvis sudorificus Doveri.

Rec. tartari vitrilati ℥ivss

opii puri

rad. Ipecacuanhae tritae aa ℥ss

misce fiat terendo pulvis.

Vim eius eximiam discutientem & lenientem, neque vomendi conatum, neque vim narcoticam, sed potius blandam diaphoreticam observavit illustr. Baldinger, adeoque in malo ischiatico, ab illo aliisque magnis laudatur viris.

Dosis grana X - XV - XX pro indicatione diversa.

Pulvis saccharatus mirrhæ.

Rec. Extracti mirrhæ aquosæ ℥i

Sacchari canariensis ℥ii

misce fiat pulvis.

Pectoralis est & vere balsamicus.

Dosis grana XX - XXX quater de die.

Pulvis Scillæ compositus Stablii.

Rec. Rad. Scillæ recentis ℥i

vincetoxici, sive hirundinariae ℥iv.

Squilla

Squilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pulvem contundenda, cui additur vincetoxici radix ficcata & recens pulverisata, impastentur postea; leni calore exsiccata rursus pulverisentur.

Laudatur tanquam resolvens praestantissimum in Asthmate humido, catarrho suffocativo, oedematibus & cachexia

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum quinque, commode miscetur Pilulis.

Pulvis sternutatorius.

Rec. foliolorum Asari partes III
maioranae partem I
misce fiat pulvis.

Cuius usus ex nomine patet.

Pulvis contra vermes.

Rec. pulveris seminis Cynae levanticae ℥ii
extracti cort. peruv. aquosi
vitrioli martis puri ꝑ̄ss ℥i
camphorae gr. X.

misce fiat pulvis.

Cuius dosis bis de die gr. XXX pro adulto, pro aetate varianda.

R.

Resina Gialappae.

Rec. Rad. Gialappae q. l.

crassiuscule contusis affundatur \wedge vini optime rectificatus, ut tres vel IV digitos superemineat. Stent infusae in loco calido per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque \wedge vini non amplius tingatur; tandem coniunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, qua ad fundum praecipitatur resina, magisterii nomen inde nata & \wedge vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappae in fundo cucurbitae haerens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso ad picream consistentiam redigatur, atque in cylindros contortos efformata fervetur.

Pari methodo conficitur

Resina Scammonii.

Ambarum vis purgans omnibus est nota.

Dosis pro aetatis & indicationis ratione est diversa. In robustissimis multo mucrobrutis raro grana XX excedere debet. Quibus autem hae resinae & sub quibus con-

convenient conditionibus nimis amplum foret, hoc loco monere.

Roob berberum.

Rec. Succi Berberum depurati ℥iv
Sacchari albi ℥i
coquantur in vase figulino ad mellis consistentiam.

Additur Julapiis & electuariis. Refrigerat, sitim sedat & bilem refraenat.

Roob Juniperi.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum recentium, conquassatarum ℥viii
coquantur in aqua communi, decoctum per setaceum coletur, & ad consistentiam mellis, cum sacchari albi ℥i lento igne redigatur.

Est diureticum & sudoriferum, a Swietenio in hydrope maximopere laudatur.

Roob sambuci.

Rec. succi baccarum sambuci maturarum partes VI
Sacchari albi partem I
coque igne leni, cavendo empyreuma, ad consuetam consistentiam.

Virtus eius, diaphoretica, omnibus est nota,

S.

Saccharum lactis.

Rec. lactis rec. vaccini ℥x;

reponantur per XXIV horas, auferatur cremor & residuum lac lento igni exponatur, ut caseosum praecipitetur. Serum per colatorium separatum, & per chartam bibulam filtratum, in vase figulino vitreato, igne lento ad sextae partis remanentiam evaporetur & ad crystallisationem reponatur. Crystalli collectae aqua frigida abluantur & in loco tepido inter chartas siccentur, atque loco sicco temperato, in vitro asserventur.

Est demulcens pectorale antispasmodicum. Debet esse recens paratum, si etenim sit rancidum, nocebit certo plus, quam proderit.

Saccharum Saturni.

Rec. Cerussae q. l.

inde cucurbitae & affunde

Aceti destillati quantum IV digitos supereminet.

digerè in arena, donec acetum dulcescat: post subsidentiam hoc separetur, novumque toties affundatur, donec dulcescere desinat. Tum liquores omnes per subsiden-

dentiam defaecati in vase vitreo evaporentur ad spissitudinem mellis liquidioris; dein sepone in locum frigidum, ut concrecant crysalli in umbra siccandae. Reliquum iterum exhalet & reponatur in locum frigidum, ut novae concrecant crysalli; totiesque iteretur evaporatio, donec nullae amplius apparent.

Refrigerat, mundificat, adstringit, siccat. Usus eius autem tantummodo est externus, valdeque in chirurgia multifarius.

Sal herbarum.

Rec. HBae absynthii, vel herbae cuiuslibet alius, quantum vis.

In sartagine ferrea super carbones iusto calore calefacta redigatur lente & successive, novam semper herbae portionem addendo, in carbonem. Violentia autem ignis & flamma arcentur, inposito sartagini operculo.

In fine combustionis virga ferrea movendi sunt cineres, ut aequaliter calcinentur, atque omnes carbones in cineres albos abeant, qui aqua frigida elixivientur, novam adiciendo aquam, usque dum ultima a cineribus redeat insipida. Lixivium leni calore evaporando, sal alcalinum fixum
ulteriori

ulteriori in aqua solutione, filtratione & evaporatione album, & methodo hac tacheniana per lentam incinerationem non adeo acre remanet, fusione autem, qua quidquid carbonacei sali adhaesit, comburitur, fortius reddendum.

Ex quocumque fuerit vegetabili paratum, imprimis si ab oleo empyreumatico fuerit depuratum, nulla adest differentia pro scopo medendi.

Acidum infringit, humores crassos resolvit, incidit, urinam & alvum movet.

Sal ammoniacum volatile.

Rec. Salis ammoniaci ℥i

cretae purissimae siccissimae ℥ii

misce bene & sublima ex retorta igne forti.

Ufus est externus ad olfaciendum in variis morbis omnibus notis.

Sal volatile anglicum siccum.

Ex tempore parari potest, si

Salis ammoniaci partes II

Salis tartari pars I

olei lavendulae vel alius odoratae

guttis aliquot misceantur.

Кеур, pharmac.

K

Non

Non solum ad olfaciendum exhibetur, sed etiam fumigationibus volatilibus parandis inservit, quorum usus & applicandi modus notissimus est.

Sal cornu cervi volatile.

E cervi cornubus, in segmenta mediocria dissectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato & iuncturis optime clausis, una cum \wedge & oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori segregatur, rectificatione postmodum e cucurbita vitrea, arenae igne admodum leni a \wedge quoque ac phlegmate separatur, & ossium calcinatorum, vel cretae albae IVplo mixtum sublimatur, itaque ad puritatem desideratam & candorem gratum deducitur.

Salia volatilia animalia sunt alcalinae naturae, insigni gaudent penetrabilitate, resolvunt, tonum excitant, sicque secretiones omnis generis promovent, atque opem ferre possunt, ubi motus excitandi sunt; e contra ab usu eorum abstinendum, ubi iam per se nimis intensi.

Dantur a granis III ad XII. —

Sal essentielle acetosae & acetosellae.

Paratur, succum acetosellae, vel per subsidentiam, vel addito albumine ovi per ebullitionem clarificando in vitro vel olla vitreata ad III vel IV partis remanentiam, lenissimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: sic plerumque spatio XXIV horarum sal concrevit & ad fundum vasis descendit, quod vel siccare, vel in aqua fontana rursus dissolvi, coagulari & tali modo depurari potest.

Est acidum gratum, mixturis & iulapiis additur & delendis maculis linteaminum atramentosis inservit.

Sal catharticus Glauberi.

Salem post destillationem \sphericalangle salis marini residuum solve in aqua, per chartam cola & in crystallos redige.

Incidit, detergit, stimulat, urinam & alvum movet. Constat ex alcali salis communis & acido vitrioli. —

=====

Sal polychrestus e nitro ℥ ♀.

Rec. nitri in pulverem triti
 florum sulphuris \bar{a} partes aequa-
 les.

bene commixta iniiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta deflagratione frigescat sal, qui purior evadit, si aqua calida solvatur; coletur, & in crystallos redigatur.

Hic sal ex alcali nitri & acido sulphuris constans, arcano duplicato est analogus earundemque cum ipso virium, licet in aqua solubilior.

Sal polychrestus de Seignette.

Rec. Sodae hispanicae ℥i
 dissolve in

Aquae fontanae ferventis ℥iii
 solutio per chartam filtretur & in vase figulino ebulliat, inter bulliendum inspergatur crystallorum tartari in pulverem tritarum, quantum lixivium sodae capere potest; sufficiunt plerumque ℥vi vel VII. —

Mox post additionem crystallorum tartari, oritur effervescentia, quae per intervalla cessat & renascitur. Tandem praecipitatur pulvis levis, cineritii coloris.

Li-

Liquor supernatans per chartam filtratus ad tertias lento igne evaporatur, atque ad crySTALLISATIONEM reponitur.

Vix determinari potest pondus certum crySTALLORUM tartari. Soda enim non eadem semper est, & vel maiorem vel minorem quantitatem salis alcali continet. CrySTALLORUM Tartari igitur tantum addere necesse est, usque dum effervescentia cesset, quod signum est saturationis.

Cum tartaro solubili vel tartarifato convenit & easdem habet vires. Loco Salis anglici cathartici a ℥ii ad ℥vi in aqua solutus exhiberi potest. Urinam ciet & alvum absque molestia movet.

Sal Tartari fixum.

Tartarus in vase terreo non vitreato reverberatur, ad albedinem usque; tum, aqua communi solutus filtratur & in sal coagulatur, quod repetita solutione & coagulatione, purius redditur.

Est Salium alcalinorum omnium optimum ac purissimum, in medicina non minus, quam ad chemicos labores inservit.

Ad evolutionem aeris fixi cum acidis, nec non ad purgantium debiliorum, utpote

rhabarbari & foliorum Sennae vires excitandas adhibetur.

Sal volatile oleosum Sylvii.

Rec. olei destillati anisi

caryophyllorum

cinnamomi $\overline{\text{aa}}$ $\text{ʒ}\beta$

macis $\text{ʒ}i$

Zedoariae

Succini $\overline{\text{aa}}$ $\text{ʒ}\beta$

Salis ammoniaci volatilis, vinosi $\text{ʒ}ix$
digerantur in vase optime clauso & fermentur.

Carminativas, stomachicas & aperitivas vires habet.

Dosis guttae XXX ad XL.

Scillae exsiccatio.

Scillam ablato externo cortice, transversim in taleolos tenues seca & leni calore exsicca. Recte exsiccatae indicium est, quod friabilis reddita amaritiam & acrimoniam retinet.

Vires habet resolventes, incidentes, diureticas, hinc in diversis hydropibus specificè agit, nec non in Asthmate humido, cachexia aliisque morbis. Conti-

nua.

nuatum eius usum autem ventriculus non potest perferre. Optime vino infusa cum aromatibus exhibetur a granis XXX ad ℥i & ultra in ℥i vini in substantia grana II-III ad summum V una dosi exhiberi possunt.

Species Decocti carminativi.

Rec. Seminum anisi

Dauci,
cumini,
carvi,
foeniculi aa ℥ii

Glycyrrhizae

florum chamomillae vulgaris aa ℥vi

Passularum ℥vi

incisa misceantur.

Huius decocti usus est in clysteribus pro adulto specierum ℥ii coquantur. In aquae ℥xv ad ℥i remanentiam pro clystermate.

Species emollientes.

Rec. Radicum Altheae ℥iv

herbarum V emollientium aa ℥ii

florum chamomillae vulgaris ℥iii

incisa, contusa misceantur.

Interviunt pro clysteribus.

K 4

Coqui-

Coquitur ℥iſſ in aquae ℥iſſ, ut reſtet ℥i, pro clysmate una vice adulto iniiciendo.

In pulverem tritae etiam cataplasmati conficiendo ſunt aptae.

Species Decocti lignorum.

Rec. Ligni Guaiaci ℥iſſ

Iuniperi ℥x

Radicum chinae

Bardanae ℥ā ℥ii

liquiritiae ℥iſſ

Seminum Anifi

foeniculi ℥ā ℥ſſ

incifa, contuſa ſerventur.

Ad veneream luem, ſcabiem, aliosque Lymphae morbos conducit hoc decoctum.

Dofiſ pro diverſitate morbi variat. Ordinarie ad menſuram I aquae ſumuntur ſpecierum ℥ii. —

Species decocti pectoralis demulcentes.

Rec. Herb. Malvae

Tuffilaginis

Rad. Altheae

liquir. ℥ā ℥iv

ſem. anifi ſtelligati ℥ſſ

m. ſ. ſpecies pro decocto theiformi.

Earum

Earum vis demulcens ex nomine patet; profunt in tussi catharrali, & in phtysi ad leniendam tussis ferociam.

Species pectorales resolventes Sellei.

Rec. florum chamomillae vulgaris ℥iv
 Arnicae verae
 herbae millefolii
 rad. liquiritiae āā ℥ii
 sem. anisi stell. ℥i

m. f. species pro thea.

In resolvendo sanguine congrumato vel mucositate coacervata usum habent.

Species purificantes Sellei.

Rec. Ligni Juniperi
 Rad. Graminis
 — Taraxaci
 — cichorei āā ℥iv
 — Senegae
 sem. foeniculi
 petroselinii
 Baccarum Juniperi āā ℥β Misc

concreta, contusa ferventur.

Virtus medica ex titulo patet, conveniunt cum speciebus decocti lignorum,

& ubi Lignum Guaiaci propter acredinem perferri non posset, his foret utiliter utendum.

Species pro Ptisana Baldingeri.

Rec. radicum Graminis
 Taraxaci
 cichorei ana
 sem. foenic. q. v.

conciſa miſce.

Non ſolum in febris, ſed etiam ubi Lymphæ vitia adſunt; nec non in venereis morbis, aliisque in caſibus hæc ptisana acrimoniam involvendo, ſanguinem purificando & diluendo, egregie agit. In Ictero, morbisque bilioſis ab obſturbatione hepatis ortis inprimis utilem obſervavi, ſi pro quotidiano potu uterentur aegri.

Celeberrimus inventor adiicit nonnunquam ſtipites dulcamaræ, aut ligni Saffaſras, Guaiaci, Juniperi, aliquam copiam.

Spiritus anifi.

Rec. feminis anifi contuſi ℥℥
 ⁊ vini ℥iv℥
 macerentur per octiduum, & lege artis
 ⁊ eliciatur.

Car-

Carminativus habetur & pectoralis;
Aqua & saccharo temperatus bibitur.

Spiritus Anthos.

Rec. florum rorismarini recens collecto-
rum ℥vi
macerentur & destillentur cum spi-
ritus vini rectificati ℥ii
Est cephalicus & nervinus, fomentationi-
bus additur & pro odoratu exhibetur.

Spiritus cornu cervi.

Uno eodemque labore, quo sal vola-
tile cornu cervi, obtinetur, & ab oleo
empyreumatico separari & rectificari de-
bet. Antispasmodicum, aperitivum, diu-
reticum ac diaphoreticum effectum habere
tenetur. Dosis ℥i ad ʒß.

Spiritus Juniperi.

Rec. Baccarum Juniperi conquassata-
rum ℥iv
vini non dephlegmati ℥viii
destillentur ad dimidias.

Remedium est carminativum, diure-
ticum & sudoriferum, imprimis in hydropse
laudabiles exserit effectus.

Spi-

Spiritus Lavendulae.

Rec. florum lavendulae ℥i
 ℞ vini non rectificati ℥iv
 digestionem per triduum facta, destillentur
 ad dimidias.

Externe ad membra paralytica confor-
 tanda, sugillationes resolvendas & ad odo-
 ratum adhibetur.

Spiritus Mindereri.

Rec. Aceti vini optimi, quantum lubet;
 adde per vices,

Salis alcali volatilis ex sale ammo-
 niaco parati, quamdiu effervescentia inde
 oritur, ut tandem alcali accurate reddatur
 neutrum.

Summus Baldingerus statuit in suis
 Pharm. Edimb. additamentis, semper prae-
 stare, si vehiculum affundatur, sequen-
 tem in modum.

Rec. Aquae melissae vel fontanae ℥i
 Salis volatilis cornu cervi ℥i vel ℥ii
 Aceti vini optimi q. s. ad satura-
 tionem.

Mellis ℥i adiecta temperat acorem saporis
 & tanquam adjuvans non inepte, ut cele-
 berrimo quidem Baldingero videtur, ad-
 iici solet.

Est

Est liquor salinus penetrantissimus, aperiens, attenuans, diaphoreticus.

Dosis pro ratione vel additi, vel non adiecti vehiculi aquosi variat, quam quilibet facile determinare poterit.

Spiritus nitri acidus.

Rec. Nitri purissimi ℥i

Boli rubrae ℥vi

pulverifata promte misceantur, humectentur s. q. aquae fontanae atque e massa formantur globuli parvi, qui rursus exsiccati immittantur retortae lapideae, aut vitreae, probe loricatae & igne gradatim administrato, in receptaculum valde capax, cui ℥ss aquae simplicis antea immissa fuit, destillentur, donec rubri vapores cessent. Spiritus prolectus rectificetur, atque a phlegmate separetur. Plurimum ad chemicos expetitur usus; externe ad verrucas, aliasque excrescentias praeternaturales auferendas eo chirurgi utuntur.

Spiritus Nitri concentratus, sive fumans.

Rec. Nitri crystallini siccissimi ℥ii

olei vitrioli ℥i

immittatur nitrum pulverisatum & optime exsiccatum retortae satis capaci, siccae, antea



antea calefactae; superfunde oleum vitrioli & adaptato amplo recipiente ex arena destillationem institue, vasorum iuncturis probe clausis, leni igne: ita \wedge sub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro epistomio vitreo clauso, servandus.

Obtinetur ita acidum concentratum purissimum nitri, & ad spiritus nitri dulcis praeparationem inservit.

Curiosum est experimentum, quod cum oleo caryophyllorum genuino, terebinthinae, aliisque instituitur: quando scilicet \wedge huic fumanti nitroso instillantur guttae aliquot praedictorum oleorum, flamma erumpit, citra accessum ignis elementaris, luculentissime exploratur sinceritas \wedge , addendo tantillum solutionis lunae, utpote per quam acidum vitrioli, vel salis communis, quod \wedge nitri admixtum esset, cum luna ad fundum praecipitatur, sicque depuratur \wedge Nitri.

Spiritus Nitri dulcis.

Rec. \wedge Nitri fumantis ℥iſſ
Vini rectificatissimi ℥i

\wedge Nitri succellive instilletur \wedge Vini & post digestionem aliquot dierum, in loco
fri-

frigido, lento igne e cucurbita vel retorta destillentur.

Criterion dulcificationis est, si \wedge cum instillato oleo tartari in deliquium nullam excitet effervescentiam.

Cum vehiculo aquoso in colica flatulenta egregium effectum anodynum & carminativum exserit.

Scopo diuretico etiam a guttis XL ad LX sufficienti aqua dilutus, dari potest.

Spiritus salis ammoniaci simplex.


Rec. salis ammoniaci

cinerum clavellatorum partes aequales.

immittantur cucurbitae vitreae, atque asfundatur quintuplum ponderis aquae fontanae. Alembico superimposito & iuncturis probe lutatis leni igne instituaturn destillatio, ut proliciaturn \wedge , quousque fortis & sale probe impraegnatus fuerit, qui seorsim fervetur. Si mutato recipiente destillatio continuetur, quamdiu aliquid salis volatilis odore sese manifestat, posterior hic \wedge debilior novis eiusmodi praeparationibus reservari potest.

Vires sunt, sali alcalino purissimo, ab omni oleo empyreumatico depurato, competentes.

Spi-



Spiritus salis ammoniaci succinatus.

Rec. Succini flavi odorati ℥ii
pulverifato affunde

℥i vinosi ℥vi

digerantur in vitro probe clauso, in loco tepido, per aliquot tempus, postea clarum a spisso, per inclinationem separetur & servetur.

Nobile est ac egregium cephalicum, anticatharrale, stomachicum, antihystericum & diureticum.

Dosis, guttae XV ad XL.

Spiritus salis ammoniaci vinosus.

Rec. Spiritus salis ammoniaci caustici ℥iv

Spiritus vinosi rectificati ℥viii

misce.

Est sal volatile liquidum, urinosum purissimum & in morbis partium solidarum ab atonia ortis, scopo tonico bonam praestat opem, egregium est diureticum & resolvens.

Datur interne a guttis XX ad XXX externe ad resolvendum cum aliis nervinis spiritibus mixtus dolentibus illinitur partibus.

Spi-

*Spiritus Salis ammoniaci volatilis
urinosus.*

Rec. Calcis vivae recens combustae ℥xii
Salis ammoniaci ℥iv
Aquae fontanae ℥ii
calci vivae & sali ammoniaco; singulis
seorsim in pulverem redactis, & cucur-
bitae vitreae immixtis, superfundatur aqua
fontana, & iuncturis, imposito alembico,
probe lutatis, statim leni igne instituat
destillatio & ℥viii proliciantur, qui in
vase optime clauso servandus.

Debilior, qui in destillatione sequi-
tur, seorsim potest servari, & novae de-
stillationi loco aquae addi.

Penetrantior est illo, cum cineribus
clavellatis destillato & conservari vix
potest.

Uusus ut plurimum est externus ad ex-
citandos sopore profundo sepulto, nari-
bus epileptico um e iam admovetur, sub
ipso paroxismo; additur spiritibus nervi-
nis, ad fricanda paralytica membra.

*Spiritus Salis communis concentratus
sive Glauberianus.*

Rec. Salis communis ℥i;
humeſcetur
Aquae fontanae ℥iii vel vi
L immit-

immittatur cucurbitae vitreae, atque successive superaffundantur

olei vitrioli ℥vi vel vii
superimposito alembico & iuncturis optime clausis, leni igne arenae instituatur destillatio. Spiritus prolectus fumans, volatilis e cucurbita rectificari potest & in vitro epistomio vitreo clauso, asservari.

Virtute gaudet refrigerante & diuretica; additur iulapiis, appetitum excitat, cruditates biliosas praecipitat, alvum & urinam movet. Pectori inimicus est, nec etiam ubi suspicio ulceris renalis adest, adhiberi debet. Dari potest a guttis III ad VIII in vehiculo aquoso copioso.

Externe putredini potenter resistit, in pustulis oris gangraenosis, aqua dilutus, specificus est, penicillo applicandus. Cum \wedge vini rectificatissimo mixtus in ulceribus cancris valde prodesse perhibetur.

Spiritus salis dulcis.

Rec. \wedge salis concentrati ℥iſſ
vini rectificatissimi ℥xii
digerantur, postquam \wedge salis vini spiritu successive instillatus est, per aliquot dies, in vase probe clauso, & postea destillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Aperitivus, stomachicus & diureticus est. Datur a guttis XXX ad XL,

Spi-

Spiritus vini camphoratus.

Rec. \wedge vini optime rectificati ℥i
camphorae ℥vi

stent in digestionē paucarum horarum spatio, atque sic a soluta camphora \wedge vini impraegnatum habebis.

Usus est externus, roborat, inflammationes, congestiones dolorificas dissipat & in affectibus spasticis bonum edit effectum.

Additur quandoque dupla, quin tripla camphorae portio.

Spiritus vini rectificatus.

E vesica cuprea per alembicum stanneum destillatur & a phlegmate foetido separatur; & si delicatior, atque ab omni foetore liber expetitur, denno bis vel ter, addita tertia parte aquae fontanae, destillatio repetenda. Cui nihil phlegmatis aquosi adest, *spiritus rectificatissimus*, *Alcohol vini*, vocatur.

Ad ambusta, sugillata, luxationes & ad haemorrhagias externe adhibetur, imprimis inservit ad Essentias & Tincturas parandas.

Spiritus vitrioli simplex.

Destillatur e vitriolo ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam,

recipiente capacissimo munitam, cui aquae quarta pars, respectu ponderis vitrioli, ad hoc opus assumti, insit, igne aperto, primum leni, tum aucto gradatim & successive igne ad candescentiam usque retortae, donec omnes nebulae, simulque \wedge cessant. Tum recipientem caute separa, ocysime obtura; \wedge prolectos e retorta vitrea, arenae igne rectifica.

Additur iulapiis & potionibus ut acido imbuantur sapore ad sitim & aestum sanguinis nimium imminuendum.

Spiritus mercurialis Swietenii.

Rec. mercurii sublimati corrosivi gr. VI
 \wedge frumenti ℥i

in phiala vitrea stent in digestionem, filtra & ad usum serva.

Est remedium usitatissimum in morbis venericis, capitis exanthemate rebeli chronico, canoro, morbis ossium.

Dosis est cochlear unum mane & vespere, sed bibat illico aegrotus ptisanæ cuiusdam libram saltim unam, sive graminis, sive compositæ cuiusdam, aut hordei decoctum.

Sulphur auratum antimonii.

Scoriae Reguli antimonii simplicis, vel residuum a tinctura antimonii, affusa aquae

aquae simplicis fontanae aut pluviae ea quantitate, quae sufficere videtur, solvantur, & solutio per chartam emporeticam coletur. Filtratae huic solutioni seu lixivio, ex quo sub refrigeratione & mora aliquot dierum, sulphur maiori portione reguli foetum sponte iam subsedit, post cautam decantationem in vitro aut olla munda debite vitreata, inspergatur acetum vini, unde praecipitabitur ingens sulphuris quantitas, quae ope chartae bibulae, a lixivio separetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inspergatur, & demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem a lixivio separatum, seorsim serva. Denique eidem lixivio iterum novum & multum acetum adde & praecipitabitur pulvis levissimus aurantio — pallidi coloris, qui edulcorandus & sub inscriptione sulphuris antimonii tertiae praecipitationis, servandus; primae praecipitationis sulphur vim plerumque habet emeticam, & hinc rarus eius usus est.

Secundae praecipitationis autem adultioribus.

Tertiae vero etiam tenerae aetati praebere potest.

Cel. Selle hanc divisionem nimis incertam tenet, ideoque putat, melius fore, si omnes tres praecipitationes commisce-

rentur & tunc earum vis indagaretur, ubi, si adhuc nimis emeticae essent, sulphuris communis sufficiens quantitas adderetur. Sic quoque longe viliori hoc remedium constaret pretio.

Insignes sunt vires huius sulphuris aurati bene praeparati ad contumaces & chronicas affectiones, praesertim, quae ex stagnatione & corruptione lymphae proveniunt; ad pertinaces glandularum tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interposito decocto diluente & sanguinem depurante; ad asthma potro convulsivum, tussim ferinam infantum; peripneumoniam, affectus spasmodicos, catharros suffocativos, hemicraniam, febres intermittentes, obstructions viscerum, hydropes, scabiem malignam ipsamque veneream luem.

Augentur vires, si cum mercurio dulci administratur, unde pulvis Plummeri, de quo iam suo loco diximus.

Dosis pro indicatione variat & pro aetatis ratione a grano I ad II-III-IV-X.

Sulphur auratum antimonii liquidum.

Rec. solutionem scoriarum Reguli Antimonii;
 dimidiam eius partem evaporationi subiice,
 donec

donec ovum illi innatare possit, tum vero statim admisce

aequalem quantitatem

olei expressi papaveris vel amygdalarum

& leniter coque, donec oleum non amplius conspiciatur & massa digito facillime obediens prodeat; postea alteram lixivii sulphurati partem successive affunde, coctionem continua, usque dum alcalini saporis nihil deprehendatur, nec oleum amplius sibi relictum appareat. Puls haec saponacea probe desiccetur & in mortario lapideo cum Tinctura antimonii acri per abstractionem \wedge ad dimidium redacta, ad eminentiam III digitorum affusa per horas aliquot probe tere, postea cucurbitae indita per XXIV horas digere. Ita prodibit peramoena, omnis acredinis expertis Tinctura, quae totum saponem una cum sulphure antimonii solutum sistit, nullo in cucurbita residuo relicto.

Virtus eius resolvens & sanguinem purificans insignis ex indole saponis medicati & sulphuris antimonii facile elucescit, eaque in forma soluta magis penetrans.

Dosis guttae XXX - XL & ultra cum decocto convenienti. —

Resolvit, detergit & purgat pulmo-
nes; eleganter confert inveteratis affecti-
bus, a crassa & lenta pituita ortis; nec
non in Asthmate specificè perhibetur con-
ferre.

Dosis per se ℥ss — ℥vi ad ℥i.

Syrupus de cichorio cum Rheo.

Rec. Rad. cichorei ℥iiss
coque in aquae fontanae ℥iiss
ad remanentiam ℥ss, huic adde
Rhabarbari minutim incisi ℥i
Salis Tartari grana XX
ebulliant igne lento, exprimantur,
in expresso dissolve
Sacchari albi ℥xvi
clarificato & colato Syrupo adde
Aquae cinnamomi ℥sae ℥i
servetur.

Bilem leniter subducit; pueris neo-
natis ad educendum meconium, nec non
adultioribus commode datur, aliisque ad-
ditur laxantibus.

Dosis a ℥i — ad ℥i pro aetatis & scopi
ratione.

Syrupus colchici.

Rec. Rad. colchici recentis, succulentae,
 in taleolos tenues sectae ℥i
 Aceti optimi ℥i
 Sacchari purissimi ℥xxvi
 digere radicem in aceto biduum, vas sub-
 inde agitans, dein leniter exprimens cola.
 Liquori colato adde Saccharum contritum
 & coque paululum ut fiat Syrupus.

Convenit cum oxymelle colchico,
 quo tamen gratior est, inprimis illis utilis
 erit, qui mel perferre nequeunt.

Syrupus corticis peruviani.

Rec. cort. peruv. pulverifat. ℥iv
 cinnamomi electi ℥i
 vini rubri generosi ℥ii
 macerentur in vitro probe clauso saepius
 vitrum movendo, per biduum; postea
 exprimantur & colentur, in colatura unica
 ebullitione dissolve Sacchari albi ℥xxxii.

Fiat Syrupus, qui per pannum cola-
 tus fervetur.

Analepticus, roborans, antifebrilis
 & stomachicus est. Delicatiores inpri-
 mis, qui corticem peruvianum alio modo
 adsumere nequeunt, utilis est, nec non
 in

infantibus medicamenta reformidantibus.
Dosis ℥ss ad ℥i & ultra pro ratione scopi.

Syrupus mororum.

Rec. Succi mororum maturorum ℥xx
Sacchari albissimi ℥xxxii
fiat Syrupus.

Refrigerans est, sitim mitigat & aestum. Laudatur imprimis ad oris & linguae asperitatem & inflammationem, ad aphtas & ad anginam. Miscetur tunc vel cum aceto vel cum aliis linctibus & decoctis, prout indicatio hoc determinat.

Syrupus Papaveris erratici.

Rec. florum Papav. erratici ℥ii
infundantur in ▽ ferventis purae ℥iii
macerentur per XXIV horas, exprimantur,
& cum Sacchari albissimi ℥v & ℥iv
fiat Syrupus.

Est blandissimum anodynum, demulcensque, additur iulepis, electuariis, decoctis.

Syrupus

Syrupus rosatus solutivus.

Rec. florum rosarum pallidarum ℥iv
infundantur in

Aquae fontanae calidae ℥viii, stent
per XXIV horas in digestionem, postea co-
lentur & exprimantur. In colatura denuo
rosarum eadem quantitas infundatur, id-
que tertium repetatur, tandem in in-
fusi ℥ix solvendo

Sacchari albi ℥xvi fiat Syrupus
alvum blande subducit, tam neonatis,
quam adultioribus & adultis a ℥i ad ℥i ex-
hibetur & additur aliis potionibus laxanti-
bus. —

Syrupus rubi idaei.

Rec. Succo baccarum rubi idaei depu-
rati ℥xx

Sacchari albi ℥xxxii

fiat Syrupus.

Saporē & odore delectat, analepticus
est & refrigerans.

Syrupus Scilliticus.

Rec. Aceti Scillitici ℥iſſ

cinnamomi acuti ℥iſſ

digere per triduum, cola & adde

Sacchari albi purissimi ℥iſſ

solvatur leni calore Saccharum, ut fiat Sy-
rupus.

Gra.

Gratior est oxymelle Scillitico, cum quo ratione virium convenit. Dosis ℥ii — ℥ss ad ℥i pro ratione aetatis & indicationis.

Syrupus violarum.

Rec. violarum recentium ℥i
 Aquae bullientis ℥iii
 Sacchari purissimi ℥vii cum quadrante

Macera violas in aqua horas XXIV in vase vitreo, vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, & liquori colato adde Saccharum contritum, ut fiat Syrupus.

T.

Tartari oleum per deliquium.

Brevissime paratur:
 Salis tartari ℥i in
 aque fontanae calidae ℥v
 solvendo & filtrando.

Non solum pharmaceuticis & chemicis inservit usibus, sed etiam si acidum primarum viarum abundat aqua dilutum utiliter exhibetur. —

Tar-

Tartarus emeticus.

Rec. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti ℥vi
 crystallorum Tartari tritarum ℥iv
 misce, & proiice paulatim in aquae super arenam in vase vitreo bullientis congiuum unum. Pergat bullire leniter horas sex, suppleta semper aqua vaporando absumta; dein liquor refrigeratus coletur & in crystallos vaporetur.

Alii duplam crystallorum tartari, & unam vitri antimonii partem & pro singula uncia crystallorum Tartari aquae ℥vi sumunt, & per X horas novam semper affundendo aquam decoquunt. Deinde non in crystallos evaporant, sed lixivium decantatum & filtratum ad siccitatem pulveris, coquendo, redigunt. Hac ratione multo certius & securius agere perhibetur.

Secundum Bergmanni praescriptionem ex

pulveris Algarothi ℥ii — ℥ii
 crem. Tartari ℥v

per dimidiam horam coquendo, vaporando & crystallifando etiam bonus obtinetur Tartarus emeticus. Datur vel alterandi, vel resolvendi vel vomendi scopo, dosibus pro indicatione diversis. Scopo

vomendi infantibus granum I adultioribus II — vel grana II — adultis vero grana III — IV. V exhiberi possunt. Optime datur scopo vomendi, si grana IV — V. in aquae communis ℥iii solvantur & successivis dosibus, cochleatim, usque ad effectum porriguntur.

Tartarus Tartarizatus.

Rec. salis Tartari ℥i vel q p.
dissolvatur in aquae fontanae ℥iii vel IV ebullienti iniciantur per vices

Crystallorum Tartari in pulverem tritarum quantum ad saturationem salis alkali sufficit, & usque dum a novis crystallis adiectis nulla ulterius excitetur effervescentia.

Liquor filtratus per chartam bibulam evaporetur ad siccitatem.

Virtute resolvente, diuretica & leniter purgante gaudet.

Datur pro vario hoc scopo a granis XXX ℥i ad ℥i. Externe ulceribus sordidis mundificandis prodest.

Tartarus vitriolatus.

Rec. salis Tartari in aqua fontana soluti
& purificati ℥iv

huic \wedge vitrioli guttatim instilletur, donec
effervescentia cessat. Postea humiditate
lento calore evocata, exsiccentur.

Est digestivus, resolvensque. Prodest
hypocondriacis, lienosis, cachecticis,
ictericis, nec non in febribus utilissi-
mus est.

Dosis ℥i ad ℥iv & ultra.

Terebinthina cocta.

Coquitur Terebinthina veneta in s. q.
aquae fontanae ad spissitudinem, quae
cum refrigescit, duritiem acquirit.

In gonorrhoea & ulceribus internis lau-
datur a nonnullis a ℥ss ad ℥iij exhibita.

Tinctura aloes.

Rec. Aloes soccotrinae ℥ii

\wedge vini rectificati ℥x

digerantur ad sufficientem extractionem;
postea filtrata servetur.

Interne vix unquam, sed tanquam
mundificans & vulnerarium a chirurgis
expetitur.

lue non sine fructu datur. Dosis guttae
XXX — XL in vehiculo aquoso.

Tinctura antispastica Lentini.

Rec. Radicis valerianae ℥i
liquoris anodyni m. H. ℥iv
digere in calore modico dies XIV in phiala
alta, vesica tecta, in fine digestionis fer-
vescant, & postquam refrigererint, de-
cantentur.

De utili valerianae cum liquore ano-
dino combinatione in voluminis septimi,
parte quarta promptuarii sui agit illustris
Baldingerus, valeriana per se ingrata hac
combinatione grata evadit medicina, in
morbis nervorum & convulsivis motibus
efficacissima. In colica flatulenta haec
Tinctura cum corticum aurantium Es-
sentia mixta & omni semihora ad guttas
XL vel L exhibita miros teste celeb. Wil-
lich praestat effectus.

Hic vir doctissimus in promptuarii
supra laudati voluminis IX parte tertia se-
quentem proponit Tincturam.

Rec. Rad. valerianae ℥v
flaved. cort. ☉ curassavicornum ℥i
digere methodo supra descripta cel. Lentini
cum liquoris anodyni m. H. ℥xxiv
M 2 Prae-

Praestantiam huius Tincturae nemo non facile perspiciet; *posset Tinctura antispasmodica Lentino-Willichiana appellari.*

Tinctura Antimonii Tartarificata.

Rec. Salis Tartari ℥i

Antimonii elect. ℥℥

pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, postea massa in mortarium calidum effunditur citissime & ignita adhuc in pulverem contunditur. Pulveri in phiala,

∧ vini rectificatissimi ℥i

affunditur & ad digestionem reponitur. Liquor rubineo colore tinctus, a faecibus separatur, atque residuo

∧ vini rectificatissimi ℥℥

denuo affunditur, qui tinctus, uti prior decanetur.

E residuo sulphur antimonii praeparari potest.

Resolvit, sanguinem purificat, attenuat, urinam movet.

Dosis guttae XL ad LXX.

Tinctura

Tinctura cantharidum.

Rec. cantharidum ℥ii

camphorae ℥i

∧ vini rectificatissimi ℥iſſ

digere leni calore per biduum. Colatura
ſervetur.

Externe in paralyſi, nec non ad ver-
rucas & condylomata venerea efficax eſt
remedium. Datur etiam a nonnullis in
pertinaci Gonorrhœa inveterata, & in hy-
drope. A paucis incipiendum guttis,
aqua dilutis; vidi ſic ſæpius inſignes effe-
ctus abſque ullo incommodo.

Tinctura gingivalis balsamica.

Rec. Terræ laponicæ, ſeu meliori no-
mine, Succi catechu

myrrhæ electæ ꝑā ℥i

in pulverem trita irrorentur

balsami peruviani ℥i

ſuperfundantur

∧ cochleariæ

vini rectificati ꝑā ℥iſſ

digerantur & per chartam filtrata Tinctura
ſervetur.

Ad ſcorbutum oris, laxitatem & pu-
rulentam Gingivarum affectionem, cum
melle roſato mixta applicari ſolet.

Tinctura martis cydoniata.

Rec. Limaturae martis purissimae ℥i
affunde

Succi cydoniorum recens ex-
pressi ℥iii

stent per aliquot dies in digestionem, postea
lento igne in cacabo ferreo, ad dimidiae
partis consumptionem, coquitur; ab igne
remotis adde

Aquae cinnamomi spirituosae ℥iii
probe mixta filtrentur & serventur.

Vires habet cum aliis adstringentibus
martialibus similes. Roborat tonum visce-
rum, atque in cachexia, hypochondriaco
affectu, anomaliis mensium utiliter dari
potest.

Dosis ℥i ad ʒβ in vehiculo conve-
nienti.

Tinctura martis pomata.

Eodem paratur modo, atque easdem
possidet vires.

Tinctura martis cum vino malvatico & pomis aurantiis.

Rec. Limat. martis purissimae ℥iv

Pomorum aurantiorum amarorum succulentorum numero IV

excorticentur poma aurantia & a fungosa albedine & seminibus liberentur, postea cortices & succulenta caro in mortario lapideo cum limatura martis impastentur; Pasta reponatur in vitro, ampliore collo, ad digerendum per biduum, donec affundantur

vini malvatici ℥x

^ corticum aurantiorum ℥ii

digesta & expressa filtrentur.

Virtutes habet leniter adstringentes, balsamicas, carminativas, stomachicas.

Dosis ℥ss ad ℥ii.

Tinctura Rhabarbari aquosa.

Est decoctum Rhei aquosum. Sumitur

Rhei optimi ℥i

aquae communis ℥i & additur plerumque Salis tartari copia parva. Semper ex tempore paranda est haec Tinctura.

In ictero, febribusque biliosis & nimio ventriculi muco utilis est.

Datur pro vario, vel alterandi, vel laxandi scopo a ℥i ad ℥i & ultra dosibus successivis cochleatim sumendis. —

Tinctura Rhei composita.

Rec. Rhei optimi ℥i
 Gentianae ℥i℥
 Serpentariae virginianae ℥i
 ^ vini
 vini generosi aa ℥℥

miscantur & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus biliosis, hypochondriacis & ipsa dysenteria.

Dosis guttae L ad LXXX.

Tutiae Praeparatio.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo calefiat, singulis vicibus in aqua extingatur, tum demum trita in marmore laevigetur.

Usus est in collyriis, unguentis & Emplastris exsiccantibus.

V.

Vinum antimoniatum Huxhamii.

Rec. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti ℥i

affunde

Vini ex insula Madera, vel hispanici ℥xxiv

digere agitando saepius per dies XII. Quiescat per XLVIII horas, tunc decanta & filtra per chartam emporeticam.

Guttatim exhibitum, ne vomitum moveat, stimulo suo leniori medetur multis morbis ab obstructione natis.

Dosis pro aetatis ratione a guttis X — XX — XXX ad LXXX.

Vinum Scilliticum, secundum formulam Richardi de Hautefierck,

Rec. Scillae ℥i
corticum aurantiorum
calami aromatici ꝑ̄ ℥ii

infunde cum vini albi ℥ii
digere per triduum.

Colat. adde

oxymellis Scillitici ℥ii

Prin;

Princeps chronicorum morborum, hydro-
pis, oedematum, &c. remedium Scilla
est, modo non adsint feri inflammatio,
spasmus vehemens & scirrhī exulcerati.

Addita aromata & vinum efficiunt,
ne ventriculi imbecillitatem Scilla produ-
cat, eius usum aliter facile insequentem.

Dosis esto cochlear unum, ter, qua-
terve de die.

Vinum Scilliticum nostrum.

Rec. Scillae rec. ℥iii
cinnamomi ℥v

infunde in vini rhenani generosi ℥xxviii
stent per XXIV horas in digestionē calida,
colatura edulcoretur

Syrupi corticis peruviani ℥ii

Dosis ter — quaterve per diem cochlear
unum.

Vitriolum martis.

Rec. Limaturae ferri purae ℥vi
acidi vitriolici ℥viii
aquae ℥ii

misce & peracta effervescentia stet mix-
tura aliquamdiu super arenam calidam;
dein

dein liquorem effusum per chartam cola & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur,

Adstringit, roborat, lumbricis, praesertim latis, adversatur; utiliter datur cachecticis & mensium vitio laborantibus.

Dosis granum I — II — III pro aetatis ratione.

Vitrum antimonii ceratum.

Rec. cereae flavae ℥i

vitri antimonii ℥i

cerae in vase ferreo liquefactae iniice vitrum pulverisatum. Calcina igne leni horam dimidiam, spatula assidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quae frige facta teratur in pulverem.

In Dysenteriiis omnibus specificus, & omni aetati utilis venditur a medicis Edinburgensibus. In aliis quoque evacuationibus nimis & haemorrhagiis variis, varie laudant.

Dosis a granis II ad X — XII. Nolim autem eius usum promiscuum suadere, si unquam eius assumptio conveniet.

U.

Unguentum aegyptiacum.

Rea. aeruginis ℥iii
 mellis puri ℥viii
 Aceti vini acerrimi ℥iv

aerugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne ad mellis consistentiam redigitur.

Vim habet desiccandi & mundificandi septicam, hinc in ulceribus malignis scirrosis & sphacelo utiliter chirurgi exhibent; cum melle rosato mixtum Gingivis putridis & ulcerosis conducit.

Unguentum album camphoratum.

Rec. Axungiae porcinae ℥i
 cerussae venetae pulverisatae ℥viii
 camphorae ℥vi

misce.

Desiccatur, refrigeratur, inflammationibus levioribus medetur.

Cave vero in Erysipelate applices.

Unguen-

omnia, laudatissimā & efficacissima medicamina, frustra tentaveram.

Unguentum digestivum.

Rec. Terebinthinae venetae ℥ss
 solve & misce cum
 Vitellis ovorum, numero IV
 adde olei hyperici ℥iſs
 pulveris olibani
 myrrhae ꝑ̄ ℥iii
 misce.

Digerit & suppurationem promovet
 in vulneribus ac abscessibus.

Unguentum de hyoscyamo.

Rec. foliorum hyoscyami recentium ℥i
 contundantur cum
 axungiae porcinae ℥x
 coquantur ad humiditatis consumptionem,
 exprimantur & expresso addantur
 olei hyoscyami e semine ex-
 pressi ℥ii
 mixta ferventur.

Anodynum & emolliens est, ad dolores haemorrhoidum sedandos utile.

Unguen-

quet. Laudatur, si omni mane & vesperi
caput illo illiniatur. —

Unguentum neapolitanum.

Rec. ℥ rii crudi ℥ iv

Terebinthinae venet. ℥ ii

misce exacte, ut ℥ rius extinguatur, ad-
misce

Axungiae porcinae ℥ x

misce fiat Unguentum.

Ufus est in bubonibus venereis, nec
non ad salivationem in lue venerea exci-
tandam.

Unguentum nervinum.

Rec. Unguenti Althaeae ℥ viii

liquoris c. c. Succinati

Tincturae cantharidum ℥ i

olei destillati chamomillae

— — — menthae

— — — Baccarum lauri lu-

niperi ℥ i

misce fiat Unguentum.

Ad frigidos nervorum adfectus, pa-
ralysin & similes commendatur.

Unguentum ad Scabiem.

Rec. vitrioli albi

florum sulphuris partes aëticas
subtilissime pulverifata misceantur cum
axungiae porcinae s. q. ut fiat unguentum.

Primo descriptum est hoc unguentum
a chirurgo Jasser, qui illius praeparationem
a vidua adepti obtinuit. Addit ille adhuc
*pulverem baccarum lauri, oleum laurinum &
loco axungiae oleum lini.* Celeberrimi viri
Schmucker, Buchholz, Ackermann & pri-
mus descriptor Jasser omnes in hoc un-
guento adversus scabiem laudando conve-
niunt. Applicatur volae manus quantum
fabae minoris magnitudo aequat, vel pro
circumstantiarum ratione plantis pedum
portio dupla, bis de die mane & vesperi
& sic scabiem brevi tempore sanare obser-
vatum est.

Unguentum ad Scorbutum oris.

Rec. Mellis Rosarum ℥ii


liquaminis myrrhae ℥ss

∧ vitrioli ℥ii

misce fiat unguentum.

Docet usum Titulus.





Addenda & suo loco supplenda.

B.

Balsamum vitae externum.

Rec. Saponis veneti ficcati libram I
olei terebinthinae libras II
Salis tartari ℥iii

misce, & solve.

Resolvit tumores frigidos, nec non in paralyfi, rheumatismis chronicis &c. valdopere prodest; si v. g. ℥i soluta in aquae libra I fomenti, aut stillicidii instar adhibetur.

Balsamum saponaceum Plenckii.

Rec. spiritus vini rectificati libras IV
saponis albi hispanici ℥x

solve leni igne, adde

camphorae tritae ℥ii

olei stillatitii rorismarini

origani ana ℥℞

misce agitando.

In tumoribus cysticis discutiendis, in doloribus rheumaticis, articulorum rigiditate &c. guttae XXX saepius per diem illinitae haud spernendi sunt emolumenti.

C.

Collutorium odontalgicum Plenckii.

Rec. Rad. Pyrethri ℥ii

salis ammoniaci ℥i

opii puri gr. II

aceti vini

aquae stillatitiae lavendulae ana ℥ii

misce, digere per horam vase clauso in balneo mariae, colatura fervetur.

In dentibus cariosis dolentibus aut a rheumate dolentibus saepius per diem uti-

liter cochlear I huius collutorii ore tenetur.

E.

Essentia aconiti.

Rec. herbae aconiti pulv. ℥i

affunde

liquoris anod. m. H. ℥iiss

digere frigide, concutiendo crebrius vitrum & filtra.

Exhibentur guttae XX — XXX aliquoties de die. Kaempfer laudat in suo de infarctibus libello hanc essentiam in glandularum mesentericarum obstructione, nec non in arthritide & rheumatismis.

G.

Gargarisma mercuriale Plenckii.

Rec. mercurii vivi ℥ss

Gummi arabici ℥iiss

Syrupi diacodii ℥ss

mercurii c. gr. VI

misce terendo in mucilaginem,

adde

adde Decocti flammulae Iovis libras II
 mellis rosati ℥i
 Essentiae myrrhae ℥i
 misce ut fiat Gargarisma.

Sanat ulcera venerea maligna, lardacea palati, fauciumque. In Ozaena venerea utiliter naribus iniicitur.

L.

Liquor tartari solubilis Vogleri.

Rec. Spiritus salis Ammoniaci aquosi fortissimi (ex sale ammoniaco, cineribus clavellatis & aqua compositi) q. v. inspergatur pulvis tener crystallorum tartari paulatim & tamdiu, donec nulla amplius effervescentia oriatur. Reponatur per aliquot dies in loco calido & subinde agitur. Postea clarum a sedimento per filtrum separetur.

Resolvens est & diureticum egregium & a Kaempfero inter optima remedia visceralia numeratur.

 M.

Mars solubilis seu tartarizatus Vogleri.

Rec. Limaturae martis ope magnetis depuratae partem I

crystallorum tartari pulveratarum partes II

misceantur, aqua fervida humectentur & exsiccentur aliquoties, ut ferrum exacte resolvatur. Massa tandem contundendo, per cribrum & linteum traiciendo redigatur in pulverem tenerrimum.

In roboranda primarum viarum atonia, imprimis, si adhuc aliqualis saburra in illis moretur, laudat Kaempf.

P.

Pulvis anticancrosus Bernardi.

Rec. cinnabaris artefactae ℥ii
cinerum e calceis antiquis combustis gr. VIII

Sanguinis draconis gr. XII
arsenici albi ℥ii

misce fiat pulvis.

Pulvis hic cum addita aqua in pulvem redigendus penicilli ope omni ulceris cancrofi

crofi superficiei duodenarii crassitie applicatur, cui deinde superimponitur agarici portio. Plerumque dolor & inflammatio sequuntur; quae tamen non adeo magni momenti habentur. Post aliquot dies crusta decidit, remanetque ulcus purum, benignumque. Ante pulveris huius applicationem purgans aegrotto exhibetur, illeque sub usu eiusdem diaetam lacteam servare debet. In ulceribus solummodo faciei cancriosis opem praestare perhibetur, in illisque eo confidentius adhiberi poterit, quum paucissima haecenus remediorum genera in hoc foedo malo vix aliquid iuvare visa fuerint.

S.

Sapo antimonii cum resina Jalappae.

Rec. hepatis antimonii ℥ii & ℥ii
alcali mineralis caustici ℥vi

solve in aquae destillatae ℥vi

huic solutioni filtratae admisce in mortario serpentino resinae jalappae ℥iiii & ℥ii.

Reponatur hoc mixtum in locum calidum & saepius agitetur. Die sequenti solvatur sapo hic circiter combinatus in

N 5

aquae

aquae destillatae libris III & evaporetur in vase vitreo, igne leni sub perpetua agitatione ad spissitudinem mellis. Si iam adhuc aliquid nondum plenarie solutum, neque tamen sapor causticus amplius inveniatur; solvatur in aquae destillatae Mensura I hic sapo, & solutione fervide filtrata, inspissetur ad consuetam saponis duritiem.

Sapo antimonii resinofus cum Gummi ammoniaco.

Rec. hepatis antimonii ℥iij & ℥iij

alcali mineralis caustici ℥i & ℥i

solve in aquae destillatae calidae ℥viii cum hac solutione filtrata misce, ut supra factum est,

Gummi ammoniaci puri ℥v.

Si plenarie solverentur & sapor adhuc remaneret causticus, adhuc Gummi ammoniacum addi deberet, sin minus, ex residuo in filtro determinari posset, quantum Gummi ammoniaci solutum fuerit; tunc praecedentis saponis cum resina Jalappae tantum additur, ut quantitas Gummi ammoniaci reciproca ad resinam Jalappae sit, ut 4:1.

Haec

Haec determinata proportio in sapone cum Gummi ammoniaco praeparando non ubique adplicabilis est, dum in uno gummate mox plus ad saturationem requiritur, mox ad intimiorem combinationem longiori opus sit labore. Proportio in sapone cum Afa foetida convenit cum Gummi ammoniaco, in sapone antimonii autem cum Guaiaco praecipue ad saturationem erit respiciendum,

De hoc antimonii sapone Kaempfer assertit, se nullum nosse remedium praestantius in solvendo sanguinis coagulo, in corrigenda lymphæ & referenda minimorum vasculorum obstructione; tunc in reliquis febrium, in viscerum & glandularum obstructionibus, indeque orto hydrope, in tussi convulsiva, febre quartana & scrophulis specificè agere contendit. Augetur huius remedii efficacia, si mercurius dulcis, extractum aconiti &c. pro re nata adduntur. Optat Kaempfer, ut cum hoc sapone mercurio iuncto in clysteribus experimenta instituerentur.





