

冊後公法


醫國統正脈
十二

漢書門	一	二	九
類	二	七	四
號	三	九	二
函	二	九	二
架	三	二	九
冊	二	九	二

四十六

內閣文庫	三	二	九
漢書	二	七	四
類	八	三	二
號	二	九	二
冊	三	二	九
架	二	九	二

內閣文庫	番號	漢	12974
	冊數	32	(12)
	函號	301	58



丹溪先生心法卷二

明新安吳勉學校

斑疹七

斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息
當以微汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一
身火遊行於外所致宜補以降於陰証略例中求之
發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下
之非理 疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出
汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消
息之 癩疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癩

同治

同治

也發則多痒或不仁者是兼風兼温之殊色紅者兼火化也 黃瓜水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出卽收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

附錄斑疹之病其爲証各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹 又傷寒陽証發斑有四惟温毒發斑至重紅赤者爲胃熱也紫黑者爲胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病發

班也以玄參升麻白虎等藥服之

陰証發斑

出背胸又出手足亦稀少而微紅若作熱証投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胸中上獨薰肺傳於皮膚而爲斑點但如蚊蚋虱蚤咬形狀而非錦紋也只宜調中温胃加以茴香芍藥或以大建中之類其火自下斑自消退可謂治本而不治標也

入方

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼朮

一錢半

陳皮

一錢

砂仁

藿香

芍藥炒

甘草炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼

川芎

麻黃

桂枝

各半錢

右咬咀姜二片水煎服

消毒犀角飲子 治斑及癰疹

牛蒡子

六錢

荆芥

防風

各三錢

甘草

一錢

右咬咀水煎

通聖散

出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

黃芩

石膏

桔梗

一兩

滑石

二兩

荆芥

梔子

白朮

二錢半

甘草

右剉水煎服

如身疼加蒼朮羌活

痰嗽加半

夏每服細末三錢生姜三片搗細盪起煎沸服之

玄參升麻湯 痲在身故汗下吐後毒不散表虛裏

實發於外甚則煩燥譫妄

玄參

升麻

甘草

一分

右咬咀水煎

化癍湯 治傷寒汗吐下後癍發脉虛

白虎湯加人參守真再加白朮

右咬咀時時煎服

大建中湯

黃芪

當歸

桂心

芍藥各二

錢

人參

甘草

各一錢

半夏

黑附

炮去皮各二錢半

右咬咀每服五錢水二盞姜三片棗二枚煎食前

服

癰八

癰疾有風

暑

食

痰

老癰

癰母

大法風

當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄

也 惡飲食者必自飲食上得之 無汗者要有汗

散邪為主帶補 有汗者要無汗正氣為主帶散

一日一發者受病一月 間日一發者受病半年

三日一發者受病一年 二日連發任一日者氣血

俱病 癰病感虛者須以人參白朮一二貼托住其

氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰

外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服

久癰不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮白朮一方加

柴胡葛根川芎一補一發不可直截 老癰病此係

風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎

撫芎

紅花

當歸

炒栢

白木

蒼朮

甘草

白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

先案瘧在陰分須微起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血

中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截瘧常山飲

穿山甲炮

草果

知母

檳榔

烏梅

甘草炙

常山

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順 一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加原朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡

草果

常山

知母

貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前一時服
又治瘧母此藥消導

青皮

桃仁

紅花

神麴

麥芽

醋煮

三稜

莪木

海粉

香附

並用醋煮

右為末丸如梧子大每服五七十九丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參

白朮

黃芪

黃芩

黃連

山梔

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

右咬咀水二鍾姜二片煎服

又治瘧病發局

生草

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

石根

炒栢

生耳草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿 半斤

冬瓜葉

官桂

馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發
之前一時服盡 又云青蒿一兩冬青葉二兩馬

韮草二兩桂二兩未知孰是姑兩存之以俟知者
截癰

檳榔

陳皮

白朮

常山三錢

茯苓

烏梅

厚朴

各一錢半

右咬咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一
日一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮

半夏一兩

黃連

半兩

白芍

三錢

陳皮

半兩

右為末粥丸梧子大每服六十九丸姜湯下

附錄世用砒霜等毒不可輕用俗謂肥寒此藥名
而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒
况其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧毋必
用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽
熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰
溫瘧此言是但三陰經說不明作於子午卯酉日
者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未
日者太陰瘧也
○瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦
有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於

虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

○瘧又名疟疾者其証不一素問又有五臟瘧六腑瘧詳矣初得病勢正熾一二發間未宜遽截不問寒熱多少且用清脾飲或草果飲或二陳湯加草果半錢或平胃加草果半錢柴胡半錢又或養胃湯加川芎草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯服後寒仍多者養胃湯加附子桂枝各半錢獨寒尤宜不効則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚者則以五苓散入辰砂少許獨熱無寒

亦與小柴胡湯孰雖劇不甚渴者本方加桂四分或以柴胡桂姜湯候可截則截之 久瘧 毋不愈者宜四獸飲間服山甲湯

附方

清脾湯

青皮

厚朴

白朮

草果

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草

炙寸分

右剉水二盞生姜三片棗一枚煎息生冷油膩

七棗湯

附子

一箇包又以鹽水浸再炮如此七次去皮
附子又方川烏代附子以水調陳壁土為爛
浸七次

右剉分作二服水二鍾姜七片棗七枚煎七分當
發日早溫服

驅瘧飲

前胡

柴胡

桂心

桔梗

厚朴

半夏

黃芪

乾姜

甘草

炙各二兩

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎

山甲湯

川山甲

木鱉子

等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

人參

白朮

茯苓

甘草

半

陳皮

草果

半夏

棗子

烏梅

生姜

等分

右剉同姜棗以鹽少許淹食頃厚皮希裹以水潤
濕慢火煨令香熟焙乾每服半兩水煎未發前併
進數服

○有汗要無汗正氣為主 小柴胡加桂或白朮
加桂 ○無汗要有汗散邪為主帶補 桂枝加黃

芪知母石膏湯或人參柴胡飲子 熱多寒少目痛多汗脉大以大柴胡湯微利為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪

六和湯

人參

知母

草果

貝母

烏梅

白芷

檳榔

柴胡各一

錢用酒拌

常山一錢

右剉水煎姜三片棗一箇

秘方清脾丸 治癰三日一發或十日一發

姜黃三錢

白朮一兩半 人參

檳榔

草果

莪朮

醋炒

厚朴

各半兩

黃芩

半夏

青皮

各一兩

甘草

三錢

右為末飯丸如梧子大每六十九丸食遠白湯下日

二服

紅丸子 消食瘧

胡椒

阿魏

醋化

莪朮

三稜

一伏時各二兩

青皮

炒三兩

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸梧子大炒土硃為衣每服七十九丸姜湯下

二陳湯

見中風類

草果飲子

草果

川芎

紫蘇葉

白芷

良姜

炙甘草

青皮

去白炒

陳皮

去

右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去渣
溫服留查兩服併一服當發日進三服不以時
人參養胃湯

平胃散加人參茯苓半夏草果霍香生姜烏梅

蘇飲

陳皮

去白

枳殼

麸炒

桔槓

甘草

木香

各半兩

半夏

乾葛

蘇葉

前胡

人參

茯苓

各七錢半一方不用木香

右剉每服五錢水盞半生姜七片棗一箇煎微熟
服

五苓散

見中暑類

柴胡桂姜湯

柴胡

八兩

桂枝

黃芩

各二兩

括萎根

四兩

牡蠣

二兩

甘草

炙二兩

乾薑

一兩

右剉水煎日三服煩汗出愈

小柴胡湯

柴胡

八兩

黃芩

人參

甘草

炙各

丹溪心法

卷二

十一

三兩
半夏 三兩

右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服不拘時

白虎加桂枝湯 治溫瘧

知母 六兩
甘草 炙 二兩
石膏 四兩 碎
桂枝 一兩
粳米 六合

右剉水煎日三行出愈

小柴胡加桂湯

本方去人參加桂一兩

一枝加黃芪知母石膏湯

本方加黃芪知母石膏各四錢半

大柴胡湯

柴胡 八兩
黃芩
枳實 半兩 搗炒
赤芍 各 三兩
太黃 一兩

半夏 兩半

右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服無時

白芷石膏三物湯

白芷 一兩
知母 一兩
石膏 四兩

右為粗末每半兩水一盞半煎一盞溫服

痢九

痢赤屬血 白屬氣 有身熱 後重 腹痛

血 身熱挾外感小柴胡湯去人參 後重積
墜下之故兼升兼消宜木香檳榔丸之類不愈
秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁黃連枳殼若大腸
盛可作丸服 保和丸亦治因積作後重者五日後
不可下蓋脾胃虛故也 後重窘迫者當和氣木香
檳榔 腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實者以
劉氏之法下之虛則以苦梗開之然後用治痢藥氣
用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛
或用溫藥薑桂之屬 下血四物為主 下血多主
食積與熱或用朴硝者 青六九治血痢効一

初得一二日間以利爲法切不可便用止澁之劑
實者調胃承氣大小承氣三乙承氣下之有熱先退
熱然後看其氣病血疾加減用藥不可便用參朮然
氣虛者可用胃虛者亦用之 血痢久不愈者屬陰
虛四物湯爲主涼血和血當歸桃仁之屬 下痢久
不止發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥
下痢大孔痛者因熱流於下也以木香檳榔黃連黃
芩炒乾薑 噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用
香連丸蓮肉各一半共爲末米湯調下又方人參二
分薑炒黃連一分爲末濃煎終日細細啣之如吐則

再服但一啣下咽便開人不知此多用溫熱藥其味
此以火濟火以滯益滯 封臍引熱下行用田螺肉
搗碎入麝香少許盒臍內 下痢不治之証下如魚
腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如
屋漏水者死下如竹筒注者不治 赤痢乃自小腸
來白痢乃自大腸來皆濕熱為本赤白帶濁同法
下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也
有濕傷血宜行濕清熱 內經所謂身熱則死寒則
生此是大槩言必兼証詳之方可今豈無身熱而生
寒而死者 脈沉小留連或微者易治若久按者難

在也脾宜滑大不宜弦急 中利可溫有五
可下者十法或解表或利小便或清其血已然分易
治難治不治之証至為詳密但與然同立論不分
者當辨之 大孔痛一曰溫之一曰清之按久病身
冷脈沉小者宜溫暴病身熱脈浮洪者宜清宜補有
可吐者亦有可汗可下者 初得之時元氣未虛必
推蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實
初病宜下虛弱衰老久病宜升之 先水瀉後膿血
此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪
易愈 下痢如豆汁者濕也蓋脾腎為水穀之海經

物不受常兼四藏故五色之相雜當先通利此迎而
專之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆
如傷冷物者或可用宜謹 又有時疫作痢一方一
家之內上下傳染相似却宜明逆氣之勝復以治之
戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱
治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

入方

- 黃連 滑石 生干 白芍
- 蒼朮 白朮 當歸 青皮
- 參苓

右剉水煎藥急後重炒連瀉石加桃仁煨榔
大黃嘔者用薑汁半夏

又方

- 乾薑 一錢 當歸 一錢半 烏梅 二錢 黃柏 一錢
- 黃連 一錢

右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳
殼

又方

- 治熱痢 黃連 黃芩 黃柏
- 枳殼 當歸 芍藥 滑石

桃仁

甘草

白朮 等分

右爲末或湯調或作丸用麩糊或神麩糊丸服
一本云誤服熱藥瀝藥毒犯胃者當明審以往其
毒

治白痢

蒼朮

白朮

神麩

茯苓

地榆

甘草

右剉水煎

治赤痢

地黃

芍藥

黃柏

地榆

白朮

右剉水煎 腹痛加枳殼厚朴 後重加滑石木
香檳榔 有熱加黃芩山梔

又治痢方

滑石 一兩

蒼朮 半兩

川芎 二錢

桃仁 活

用法

芍藥 半兩炒

甘草 一錢

右爲末薑一片搗細煎滾服

又方 孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮

白朮

厚朴

茯苓

滑石

丹溪心法 卷二
右咬咀水煎下保和丸 又云加炒麴甘草

又方 痢後脚弱漸細者

蒼朮 酒苓 白芍 各二兩半 酒栢 炒

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎送下

又方 痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍 各一錢 茯苓

蒼朮 當歸 酒苓 各半錢 白朮

甘草 各二錢

右咬咀作一服薑煎食前

又方 治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮 白朮 黃苓 滑石

白芍 茯苓 甘草 陳皮

神曲 炒

右咬咀水煎下保和丸

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和餅用
蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑三片煎 其或腹痛
後重小水短下積此為裏証宜和中疏氣用炒枳殼
製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎 其或下墜異常積

中有紫黑血而又痛甚此爲死血証法當用搗細桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜執手熨盪是名挾寒即加乾薑其或下墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔一枚其或在下則纏住在上則嘔食此爲毒積未化胃氣未平証當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補毒解積下食自進其或力倦自覺氣少惡食此爲挾虛証宜加白朮當歸身虛甚者加人參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自止其或氣行血和積少但虛坐努責此爲無

血証倍用當歸身尾却以生芍藥生芩生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安其或纏墜退減寸之七八穢積已盡糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未宜退用蓋固腸丸有去濕實腸之功其或利後精粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中作痛切不可驚恐當以白朮陳皮各半煎湯和之自安其或久痢後躄虛氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子肉豆蔻白礬半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮爲佐

丹溪心法 卷二
恐大泄亦能作痛又甚者灸天樞氣海 右前方用
厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性大溫而散氣久服大
能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡則用炒枳殼陳
皮然枳殼亦能耗氣比之朴稍緩比陳皮稍重滯氣
稍退當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白有補
瀉之功若爲參朮之佐亦純作補藥用 凡痢疾腹
痛必以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲佐惡寒痛者
加桂惡熱痛者加黃柏達者更能參以歲氣時令用
藥則萬舉萬全豈在乎執方而已哉

附錄痢有氣虛兼寒熱有食積有風邪有熱有濕

有陽氣下陷而感受不一當分治瀉輕痢重諸有
積以肚熱纏痛推之諸有氣以肚如蟹渤驗之究
其受病之源決之對病之劑大要以散風邪行滯
氣開胃脘爲先不可遽用肉豆寇訶子白朮輩以
補住寒邪不可投米殼龍骨輩以閉滯陽邪得
補而愈盛故証變作所以日夕淹延而未已也
若升散者以胃風湯防風芍藥湯神朮散蒼朮防
風湯敗毒散皆可汗之 攻裏若有濕者用導水
丸蕪鬱承氣湯和中丸若積滯用聖餅子脾積丸
冷積用局方蘇感丸若濕熱甚者宜宣明玄青膏

若後重窘迫用木香檳榔丸色白者屬氣赤白者屬氣血受病赤黑相兼屬濕熱青綠雜色是風與火濕 下血者當涼血當歸主芫赤者屬血保命集四物湯加樛花黃連米殼醋炒 下利脈沉弱而腹痛用薑附湯加對五苓理中又機要漿水散若青色者寒蕪風 若陽氣下陷者以升陽益胃湯加桔梗醋沃南星用梅葉外貼眉摺極効起泡便止 下痢若濕盛勝濕者以平胃散對五苓散最可或麴芍丸 老人奉養大過飲食傷脾為脾泄機要白朮芍藥湯濕勝仙木炒用 若陰虛不

分當滲泄以五苓之類或單用茅苡實炒為末水飲調二錢 若氣血俱虛神弱者以人參白朮當歸芍藥炒茯苓少加黃連服之或錢氏白朮散又或十補湯佳 若暑痢而脈虛者香薷飲或清暑益氣又或六和湯藿香正氣各加木香半錢名木香交加散 若白痢下如凍膠或與涕此屬冷痢宜除濕湯加木香一錢虛弱者亦與十補湯 赤痢發熱者以敗毒散加陳倉米一撮煎 下痢小便不通者黃連阿膠丸為最

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒
下如豆汁或瘀血

人參 茯苓 川芎 常歸

桂 白朮 白芍 等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香
噤口痢

石蓮肉 日乾

右為末服二錢陳倉米湯調下便覺思食仍以日
照東方壁土炒真橘皮為末薑棗煎佐之
蘇人木香檳榔丸

木香 檳榔 香皮 陳皮

廣木 枳殼 黃連 黃柏

大黃 各半兩 丑末 香附 各二兩

右為末水丸梧子大每五六十九煎水下量虛實
與之○緝珠多三稜黃芩當歸分兩不同
調胃承氣湯

芒硝 半斤 甘草 炙二兩 大黃 四兩去皮酒洗

右剉每服臨期斟酌多少先煮一二味熟去渣下硝
上火煮二三沸頓服之

大承氣湯

大黃 匹兩如棋子

厚朴 八兩 枳實 大者

芒硝 二合

每服看証斟酌多少先煮一二物至七分去渣內大黃煮八分去渣內芒硝煎一二沸溫服

小承氣湯

大黃 匹兩 厚朴 二兩 枳實 大者三枚炒

右剉看証斟酌多少用之

防風芍藥湯

防風 芍藥

右咬咀每服半兩水煎服

神木散

蒼木 一斤 藁本 川芎 各六兩 羌活 四兩

粉草 細辛 一兩六錢

右為粗末每服三錢薑三片煎薑出汗加葱白

蒼木防風湯

蒼木 二兩 防風 一兩

薑七片煎

敗毒散

羌活 獨活 人參 甘草

柴胡 前胡 茯苓 枳殼

卷二

卷二

卷二

川芎

桔梗 等分

右剉每服四錢水一盞薑三片薄荷五葉煎服
寒多則熱服熱多則溫服傷濕加白朮脚痛加天

神芎導水丸

大黃

黃芩 二兩

丑末

滑石 四兩

右為末滴水丸每四五十九丸溫水下

和中丸

白朮 二兩 四錢

厚朴 二兩

陳皮 各六兩

半夏 四兩

檳榔 五錢

枳實

甘草 四兩

木香 二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅為丸每二十九丸溫水下
食遠

聖餅子

黃芩 二錢

定粉 三錢

密陀僧 二錢 舶上硫

黃三錢

輕粉 少許

右為細末入白麵四錢滴水為指尖大捻作餅
子陰乾食前漿水磨化服之大便黑色為妙
蘇感丸

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟米大每五

丸淡薑湯空心下

宣明玄青膏

黃連

黃柏

大黃

芩蔞

芫花

醋拌炒

大戟

各半兩

五頭末

二兩

輕粉

二錢

青黛

一兩

右為末水丸小豆大初服十丸每服加十丸日三

以快利為度

保命集四物湯

本方內加槐花黃連御米殼等分

薑附湯

理中湯

並見中寒類

五苓散

見中暑類

漿水散

半夏

易洗

附子

半兩炮

乾薑

一作乾

桂

甘草

炙各五錢

良薑

二錢半

右為細末每服三五錢漿水二盞煎至半盞和滓

熱服

升陽益胃湯

羌活

獨活

防風

各半兩

柴胡

白朮

茯苓

滑勿用

澤瀉

各三錢

黃芪

二兩

人參

半夏

甘草

各一兩

黃連

一錢

陳皮 四錢

白芍 五錢

右咬咀每服三錢水煎入薑棗溫服

麴蘗丸

川芎

神麴

白朮

附子

等分

右為細末麴糊丸梧子大每服三五丸溫米飲

下此藥亦治殮泄

機要白朮芍藥湯

白朮

芍藥 各一兩 甘草 五錢

右剉每服一兩水煎

錢氏白朮散

人參

白茯苓

白朮

木香

甘草

藿香 各一兩 乾薑

右為粗末水煎

香薷飲

清暑益氣湯

正見中暑類

六和湯

見霍亂類或加香薷厚朴

藿香正氣散

見中風類

黃連阿膠丸

阿膠 炒二兩 黃連 三兩 茯苓 二兩

右水燻阿膠膏搜和二末為丸米飲下

固腸丸 見婦人類

除濕湯 見泄瀉類

十全大補湯 見諸虛類

泄瀉十

泄瀉 有濕 火 氣虛 痰積 濕用四苓散加

蒼朮甚者蒼白二木同加炒用燥濕兼滲泄 火用

四苓散加水通黃芩伐火利小便 痰積宜豁之用

海粉青黛黃芩神麴糊丸服之 在上者用吐法

在下陷者宜升提之用升麻防風 氣虛用人參白

朮炒芍藥升麻 食積二陳湯和澤瀉蒼朮白朮山

查神麴川芎或吞保和丸 瀉水多者仍用五苓散

久病大腸氣泄用熟地黃半兩炒白芍知母各三錢

升麻乾薑各二錢炙甘草一錢為末粥丸服之仍用

艾炷如麥粒於百會穴灸三壯 脾瀉當補脾氣健

運復常用炒白朮四兩炒神麴三兩炒芍藥三兩半

冬月及春初用肉寇代之或散或湯作餅子尤佳

食積作瀉宜再下之神麴大黃作丸子服 脾泄已

久大腸不禁此脾已脫宜急澀之以赤石脂肉豆寇

乾薑之類

戴云凡瀉水腹不痛者是濕飲食入胃不住或完穀不化者是氣虛腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火或瀉時或不瀉或多或少是痰腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積

入方

一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩 炒半兩 白朮 炒二兩 白芍 酒拌炒 半夏 各一

兩 神麴 炒 山查 炒各一兩等

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白

湯下

一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日前証俱減獨小便不利以益元散與之安

治痛泄

炒白朮 三兩 炒芍藥 二兩 炒陳皮 兩半 防風 一兩

又瀉加升麻六錢

右剉分八貼水煎或丸服

止瀉方薑麴丸

隔年陳麥麴作麴二兩炒又茴香五錢生薑二兩又

右為末或丸每服五七錢白湯下

又方

肉豆寇五兩滑石夏一二兩半秋二兩

右為末飯丸或水調服

清六丸 去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同用並

不單用兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦

治血痢

六一散紅曲炒半兩活血又云二兩半

右為末飯丸梧子大每五七十丸白湯下

又方 治泄瀉或嘔吐

右以六一散生薑汁入湯調服

附錄寒泄寒氣在腹攻刺作痛洞下清水腹內雷

鳴米飲不化者理中湯或吞大已寒丸宜附子桂

香丸畏食者八味湯 熱瀉糞已赤黃肛門焦痛

糞出穀道猶如湯澆煩渴小便不利宜五苓散吞

香連丸 濕瀉由坐卧濕處以致濕氣傷脾土不

克水梅雨久陰多有此病宜除濕湯吞戊己丸佐

以胃苓湯重者木附湯 傷食瀉因飲食過多有

傷脾氣遂成泄瀉其人必噫氣如敗卵臭宜治中
 湯加砂仁半錢或吞感應丸尤當 有脾氣久虛
 不受飲食者食畢即腸鳴腹急盡下所食物纔方
 寬快不食則無事俗名錄食瀉經年不愈宜快脾
 丸三五粒 因傷於酒每晨起必瀉者宜理中湯
 加乾葛或吞酒萸黃連丸 因傷麪而瀉者養胃
 湯加蘿蔔子炒研破一錢痛者更加木香半錢瀉
 甚者去藿香加炮薑半錢 有每日五更初洞瀉
 服止瀉藥並無効米飲下五味丸或專以五味子
 煎飲亦治脾腎瀉雖省鄙飲食忌口但得日間止

半夜無事近五更其瀉復作此病在腎俗呼為脾
 腎瀉分水飲下二神丸及椒朴丸或平胃散下小
 茴香丸病久而重其人虛甚宜椒附湯 暑瀉因
 中暑熱者宜胃苓湯或五苓散加車前子未少許
 甚効 世俗類用瀉藥治痢與瀉若積久而虛者
 或可行之初得之者必變他疾為禍不小殊不知
 多因於濕惟分利小水最為上策

附方

四苓散

即五苓散內去桂

五苓散

益元散

並見中暑類

理中湯 見中寒類

六已寒丸

苾櫟

各六兩

肉桂

各四兩

乾薑

炮

高良薑

右為末水煮麵糊丸梧子大每二十九空心米飲

吞下

八味湯

吳茱萸

湯洗七次

乾薑

炮各二兩

陳皮

人參

各一兩

肉桂

丁香

人參

右剉每四錢水一盞煎七分溫服

香蓮丸

黃連

去鬚十兩用吳茱萸五兩同炒赤色去茱萸不用

木香

二兩

右為末醋糊丸梧子大每二十九空心米飲下

升陽除濕湯

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓

蒼朮

陳皮

甘草

大麥蘖麴

右作一服水煎飯後熱服○胃寒腸鳴加益智仁

半夏各半錢薑棗煎非腸鳴不用

戊巳丸 治胃經受熱泄痢不止

黃連

吳茱萸

去梗

白芍

各五兩

右為末麴糊丸梧子大每三十九米飲下

胃苓湯 夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散

平胃散

右合和薑棗煎空心服

木附湯

和劑

甘草 二兩炙

白朮

四兩

附子

炮

一兩半

右剉每服三錢薑五片棗一枚煎空心服

治中湯

感應丸

出室

木香

肉豆寇

丁香

各一兩

乾薑

一兩

巴豆

七

心膜剉出油

杏仁

四兩

薑湯浸去皮尖研

右前四味為末外入百草霜二兩研與巴豆杏仁

七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去

粗更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出待

酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用春夏修合用清油

一兩銚內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化

成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清
油一兩半同煎煮熟成汁和勻藥末成劑分作小
錠子油紙裹旋丸服之每三十丸空心薑湯下
保和丸 見積取類

酒蒸黃連丸

黃連

半斤淨酒二升浸以瓦器
置甕上蒸至爛取出晒乾

右爲末滴水丸每五十丸食前溫水下

養胃湯

見瘧類

五味子散 治腎泄

五味子 一二兩

吳茱萸

右二味炒香熟爲度細末每服二錢陳米飲下
一親識每五更初曉時必溲泄一次此名腎瀉服
此愈

椒附丸

微義

椒紅炒

桑螵蛸 炙

龍骨

山茱萸

取肉

附子 炮

鹿茸

酒蒸

右爲末酒糊丸每六十空心

二神丸

破故紙

炒四兩

肉豆蔻

二兩生

右爲末以大肥棗四十九箇生薑四兩切同煮

爛去薑取棗肉研膏入藥和丸每五十丸鹽湯下

燥結十一

○燥結血少不能潤澤理宜養陰

入方治大腸虛秘而熱

白芍一兩

陳皮

生芩

歸身一兩

條芩

甘草二錢

右為末粥丸白湯下七八十丸

附錄凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大

腸大腸所以司出而不納也今停蓄結滯不得

疎導何哉抑有由矣邪入裏則胃有燥釜三焦

熱則津液中乾此大腸挾熱然也虛人臟冷而血

脈枯老人臟寒而氣道澁此大腸之挾冷然也亦

有腸胃受風涸燥秘澁此証以風氣蓄而得之若

夫氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其証矣

東垣諸論原附於此今節不錄觀者宜於東垣

書中求之

附方理宜節去姑存以便閱者

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開

噎塞不便燥祕氣不得下治在幽門以辛潤之

歸身

升麻

桃仁泥

錢各一

生芩

熟苧各半 甘草炙 紅花各三分

右作一服水煎食前調檀榔末半錢或加麻仁泥一錢○加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻 生苧各二錢 歸梢 生甘草

大黃煨 熟苧 桃仁泥 麻仁各一錢

紅花半錢

右除桃仁麻仁另研作一服水煎次下桃仁麻仁煎空心熱服

血潤燥丸 治大便風秘血秘常常燥結

歸梢一錢 防風二錢 大黃煨 羌活一錢

桃仁二兩研如泥 麻仁二兩五錢研 皂角仁

燒存性一兩五錢其性得溫則滑溫滑則燥結自通

右除二仁另研外餘為末後和勻蜜丸梧子大空心服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻子粥每日早晚食之大便不致結燥以磁器盛之紙封無令見風

半硫丸 治冷秘風秘結老人秘

透明硫黃研 半夏洗七次等分

右為末生薑糊丸梧子大服二十九丸薑湯下或用

一葱白一條薑三片煎入阿膠二片溶開食前空心

送下

麻仁丸 治大便秘風秘脾約

郁李仁

麻子仁

各六兩 另研

大黃二兩

半以

山藥

防風

枳殼炒

半錢

檳榔五錢

羌活

木香各五

半錢

右為末蜜丸梧子大服七十九丸白湯下

脾約丸

麻仁一兩

枳實

厚朴

芍藥

大黃四兩

杏仁

去皮麩炒一兩

右為末煉蜜丸梧子大服三五十九丸溫水下

○凡諸秘服藥不通或兼他証又或老弱虛極不

可用藥者用蜜熬入皂角末少許作以導之冷

秘生薑亦佳

霍亂十二

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減
作吐以堤其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽
不升陰不降垂隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入
口即死必待吐瀉過二三時直至饑甚方可與稀粥

食之脉多伏欲絕 見成吐瀉不徹還用吐提其氣
起 或用樟木煎湯吐之亦可 大法生薑理中湯
最好不渴者可用如渴者用五花散有吐者以二陳
湯探吐亦有可下者 轉筋不佳男子以手挽其陰
女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也 轉筋皆屬
乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服 乾霍
亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極
是良法世多用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所
逼有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可
用涼藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加

川芎

蒼朮

防風

白芷

又云白朮

右剉薑五片煎服

治霍亂方

蒼朮

厚朴

陳皮

葛根

錢半

滑石

二錢

白朮

二錢

木通

錢

甘草

炙

右判入薑煎湯下保和丸四五十丸

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

附錄霍亂之候揮霍變亂起於倉卒多因夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是其候也偏陽則多熱偏陰則寒卒然而來危甚風燭其濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐利而盡泄出則止故死者少也夫上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關格陰陽其死者多霍亂熱多而渴者五苓散 寒多而不飲水者理中湯 或有寒腹痛滿而痛四肢拘急轉筋下利者以理中湯加生附子官桂 中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢冷冷汗出腳轉筋用霍香散

云轉筋者用理中湯加火煨石膏 若霍亂吐瀉心腹疴痛先以鹽湯探吐後服藿香正氣加木香半錢若頻欲登圜不通者更加枳殼一錢 人於夏月多食瓜果多飲冷乘風以致食留不化因食成痞隔絕上下遂成霍亂以六和湯倍加藿香煎服皆要藥也

附方

六和湯

- 砂仁
- 半夏
- 杏仁
- 人參
- 甘草 炙各一兩
- 赤茯苓
- 藿香
- 扁豆 炒

木瓜 各二兩

右剉每服五錢水二鍾生薑三片棗一箇煎溫服
一本有香薷厚朴各四兩

二陳湯 見中風

五苓散 見中暑

理中湯 見中寒

藿香正氣散 見中風

通脈四逆湯 治霍亂多寒身冷脈絕

吳茱萸 炒二兩 附子 炮一兩 桂心 通草

細辛 白芍 甘草 炙各半兩 當歸 二錢

右咀每四錢水酒各半加生薑煎

木瓜湯 治霍亂吐下舉躄轉筋入腹則悶絕

乾木瓜 一兩 吳茱萸 半兩 茴香 炙甘草

各一錢

右咀每服四大錢薑三片蘇十葉煎

痰十三

○脈浮當吐 久得脈滯卒難開也必費調理 大

凡治痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多 濕

痰用蒼朮白朮 熱痰用青黛黃連芩 食積痰用

神麩麥芽山查 風痰用南星 老痰用海石半夏

瓜蒌香附五倍子作丸服 痰在膈上必用吐法瀉
亦不能去 風痰多見奇証 濕痰多見倦怠軟弱
氣實痰熱結在上者吐難得出 痰清者屬寒二
陳湯之類 膠固稠濁者必用吐 熱痰挾風外証
爲多 熱者清之食積者必用攻之兼氣虛者用補
氣藥送 痰因火盛逆上者以致火爲先白朮黃芩
軟石膏之類 內傷挾痰必用參芪白朮之屬多用
薑汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝 中氣不足加參
朮 痰之爲物隨氣升降無處不到 脾虛者宜清
中氣以運痰降下二陳湯加白朮之類兼用升麻提

起 中焦有痰則食積胃氣亦賴所養卒不便虛若
攻之盡則虛矣 痰成塊或吐咯不出兼氣鬱者難
治 氣濕痰熱者難治 痰在腸胃間者可下而愈
在經絡中非吐不可吐法中就有發散之義焉假如
癰病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也血氣入
在舍而拒其神不能歸焉 血傷必用薑汁傳送
黃芩治熱痰假其下火也 竹瀝滑痰非薑汁不能
行經絡 五倍子能治老痰佐他藥大治頑痰 二
陳湯一身之痰都治管如要下行加引下藥在上加
引上藥 凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山

梔川芎桔梗芽茶生薑薑汁之類或用瓜蒂散 凡
風痰病必用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片苓
薑蠶豬牙皂角之類 諸吐法另具于后

○凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何
物吐下後方用藥 許學士用蒼朮治痰成窠囊一
邊行極妙痰挾痰血遂成窠囊 眩運嘈雜乃火動
其竅用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類 噫氣吞
酸此食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君南星半夏爲
臣橘紅爲使熱多加青黛 痰在脇下非白芥子不
能達 痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可導達

在四肢非竹瀝不開 痰結核在咽喉中燥不能出
入用化痰藥加鹹藥軟堅之味瓜萹仁杏仁海石桔
梗連翹少佐朴硝以薑汁蜜和丸驗服之 海粉卽
海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入
丸子末子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝墻壁 小
胃丹治鬲上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食
積痰實者用之不宜多

○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕
者用瓜萹葷氣實必用荆瀝 天花粉大能降鬲上
熱痰 痰在膈間使人顛狂或健忘或風痰皆用竹

丹溪心法 卷二
瀝亦能養血與荆瀝同功治稍重能食者用此二味
効速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰必
佐以薑汁 薑汁治血滯不行中焦有飲自然汁冷
突兩三銀盞必胸中煩燥不寧後愈 參萸丸能消
痰

入方

青礞石丸

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切作片用白礞末五錢水浸一二日曬乾 又云一兩

半夏

一兩湯泡切作片以皂角水浸一日曬乾

黃芩

薑汁炒

茯苓

枳實

炒各一兩

看虛實作湯使

又方

治濕痰喘急止心痛

半夏

一味不拘多少香油炒

又方

右爲末粥丸梧子大每服三五十九薑湯下

黃芩

香附

半夏

薑制

貝母

已上治濕痰加瓜蒌仁青黛作丸子治熱痰

又方

燥濕痰亦治白濁因痰者

南星

半夏

各一兩

蛤粉

二兩

右爲末神麩糊丸如梧子大青黛爲衣每服五十

丸薑湯下○濕痰加蒼朮

食積痰加神麩麥芽

山查 熱加青黛

中和丸 治濕痰氣熱

蒼朮

黃芩

半夏

香附等分

右爲末粥丸梧子大每服五七十丸薑湯下

又方 治痰嗽

黃芩

酒洗一兩半

貝母

南星

各一兩

滑石

白芥子

去殼各半兩

風化硝

二錢半取其輕浮速降

右爲末湯泡蒸餅丸服

導痰湯

法製硝

同菜菔水煮化去蒿綿濾令結入

礞石

二兩槌碎煅硝二兩同入小砂罐內燒片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟曬乾火煨紅候

出冷取

右爲末神麩糊丸梧子大每服三五十九丸湯下

○一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作

湯使

一本礞石南星各一兩無枳實

又方

半夏 二兩

白朮 一兩

茯苓 七錢半

黃芩

礞石 一兩 風化硝 二錢

右為末同煎

潤下丸 降痰甚妙

南星 一兩 半夏 二兩各依橘紅製 黃芩

黃連 各一兩 橘紅 半斤以水化鹽五錢 甘草 炙

一兩

右為末蒸餅丸如菉豆大每服五七十九白湯下

○一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾

焙燥為末入甘草末一兩炊餅同上丸亦好去膈

隔有痰兼嗽上熱加青黛有濕加蒼朮或加參

南星 炮一兩 橘紅 去白一兩 赤茯苓 去皮一兩 枳殼 去

麩炒 一兩

甘草 炙半兩又 半夏 四兩又

右水煎生薑五片食前服

干縉湯 治喘

半夏 七箇泡製每 皂角 去皮炙一寸

甘草 炙一寸

右阻作一服生薑如指大煎

小胃丹

芫花 好醋拌勻過一宿瓦器不任手攪炒令黑

甘遂

濕麵裹長流水浸半日再水洗曬乾又
水浸冬七春秋五日或水煮亦可

大戟

長流水煮一時再水洗曬乾各半兩

大黃

濕紙裹煨勿焦切焙乾再酒潤炒熟焙
一兩半

黃栢

三兩焙炒

右為末粥丸麻子大每服二三十九丸臨卧津液吞

下或白湯一口送下取其鬲上之濕痰熱積以意

消息之欲利則空心服○又方甘遂大戟成三分

廢丸一方加木香檳榔各半兩
蒸餅丸每服七八丸至十丸止

治酒痰

青黛

瓜萸

右為末薑蜜丸噙化救肺

治鬱痰

白殭蠶

杏仁

瓜萸仁

訶子

貝母

五倍子

右為末糊丸梧子大每服五十九丸白湯下

導痰丸

吳茱萸

三錢制

茯苓

一兩

黃連

半兩

滑石

七錢半

蒼朮

泔浸一兩

右為末糊丸梧子大每服八九十九薑湯下

茯苓丸

出千金方百一選方同

半夏 四兩 茯苓 二兩 枳殼 一兩

風化硝 半兩

右為末蒸餅或神麩薑汁糊丸糊子大每服三十

丸薑湯下

又方 治食積痰火并瀉胃火

軟石骨不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十九白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎 七錢 黃連 瓜蒌仁 白朮

神麩 麥芽 各一兩 青黛 半兩

人中白 二錢

右為末薑汁蒸餅丸服

久吐痰喘

杏仁 去皮尖生用 來復丹 炒

右等分為末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸

半夏 一兩 黃連 一兩 吳茱萸 湯洗一錢半

桃仁 二十四箇研 陳皮 半兩

右為末麩糊丸菉豆大每服一百丸薑湯送下

白玉丸

丹溪心法

卷二

四十五

巴豆 三十箇 夫油 南星

半夏

滑石

輕粉 各三錢

右為末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸薑

湯下

黃瓜羹丸 治食積痰壅滯喘急

瓜羹仁

半夏

山查

神麩 各炒

等分

右為末瓜羹水丸薑湯竹瀝送下一三十九

又方

瓜羹仁

半夏

蒼朮

香附仁

半

黃芩

黃連

又方

瓜羹仁

黃連

半夏

右為末糊丸梧子大服五十九

抑痰丸

瓜羹仁

半夏

貝母

右為末蒸餅丸如麻子大服一百丸薑湯下

清膈化痰丸

黃連

黃芩

黃栢

山梔

香附

蒼朮

丹溪心法

卷二

四十六

右爲末蒸餅丸白湯下

搜風化痰丸

人參

槐角子

殭蠶

白礬

陳皮去白

天麻

荊芥各一兩

半夏四兩

薑汁炒

辰砂半兩另研

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十九薑湯下

墜痰丸 治痰飲

黑丑頭末二兩

枳實炒一兩半

白礬二錢估

朴硝

風化

枳殼半兩炒

猪牙皂角二錢酒炒

右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸雞鳴時服

右爲末則有痰

沿濕痰

蒼朮三錢

白朮六錢

香附一錢

白芍酒浸

炒二錢半

右爲末蒸餅丸服

治肥人濕痰

苦參

半夏各錢半

白朮二錢

陳皮一錢

右咀作一服薑三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬 一兩

防風 二兩

川芎

猪牙皂

角

鬱金 各一兩

蜈蚣 二條用赤脚黃

右為末蒸餅丸梧子大每服三十九丸食前茶湯下
春以芭焦湯探吐痰

上焦風痰

瓜萇

黃連

半夏

牙皂

薑汁浸炊餅丸

痰氣方

片苓 炒

半夏 半兩

白朮

白芍

茯苓

陳皮 三錢

右為末蒸餅泡薑汁丸服

利膈化痰丸

南星

蛤粉 研細

半夏

瓜萇仁

貝母

去心治胸膈痰氣最妙

香附

半兩童便浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏

仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入

前藥搜和再入薑汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛為

衣每服五十丸薑湯下

清痰丸

專清中管熱痰積

烏梅

枯礬

黃芩

蒼朮

陳皮

滑石

青皮

枳實

山查

南星

半夏

神麩

山查

乾生薑

香附

各一兩

右為末湯浸蒸餅丸服

附錄凡痰之為患為喘為欬為嘔為利為眩為
心嘈雜怔忡驚悸為寒熱痛腫為痞隔為壅塞
胸脇間轉轉有聲或背心一片常為冰冷或四
肢痺不仁皆痰飲所致善治痰者不治痰而
氣順則一身之津液亦隨氣而順矣又嚴氏

氣道貴乎順順則津液流通決無

方治痰飲用汗吐下溫之法愚見不若

先分導次之又王隱君論云痰清白者為寒

濁者為熱殊不知始則清白久則黃濁清白

瀆於上黃濁稠粘凝於下嗽而易出者清而

欬而不能出則黃濁結滯也若咯唾日久濕熱

鬱上下凝結皆無清白者也甚至帶血血敗則

痰為閉格異病人所不識又清白者氣味淡日久

者漸成惡味酸辣腥臊焦若不一百病中多有

兼痰者世所不知也凡人身中有結核不痛不

丹溪心法 卷二
紅不作膿者皆痰注也 治痰法實脾土燥脾濕
是治其本也

附方

二陳湯

見中風

瓜蒂散

見疸

三補丸

見虛損

參萸丸

見秘方

青金丸

蒼莎丸

並見咳嗽

按丹溪治病以痰為重諸病多因痰而生故
前諸方間有別出者亦其平日常用謹不另錄
於附錄觀者詳焉

哮喘十四

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋
不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可
吐者 一法用二陳湯加蒼木黃芩作湯下小胃丹
看虛實用

入方 治寒包熱而喘

半夏

枳殼炒

桔梗

片苓炒

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

右水煎服○天寒加桂枝

治哮治積方

用雞子一箇略敲殼損膜不損浸尿缸內三四日

夜取出煮熟喫之効蓋雞子能去風痰

紫金丹 治哮喘須三年後可用

用精猪肉二十兩一作三兩切作骰子塊用信一兩

明者研極細末拌在肉上令勻分作六分用紙

黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭火於無

烟出盡為度取放地上一宿出火毒研

湯浸蒸餅丸如菉豆大食前茶湯下大人一

小人七八丸量大小虛食與之

喘十五

病 氣虛 陰虛 有痰 凡久

宜扶正氣為主已發用攻邪為王 氣虛短氣而喘

甚不可用若寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加干縉

湯有痰亦短氣而喘 陰虛自小腹下火起衝於上

喘者宜降心火補陰 有火炎者宜降心火清肺金

有痰者用降痰下氣為主 上氣喘而躁者為肺

脹欲作風水証宜發汗則愈有喘急風痰上逆者大

全方干縉湯佳或導痰湯加干縉湯 有陰虛挾痰

喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火諸喘不止者用

劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火治火劫藥

以椒目研極細末一二錢生薑湯調下止之氣虛不

用 又法蘿蔔子蒸熟爲君皂角燒灰等分爲末生薑汁煉蜜丸如小豆子大服五七十九丸喻化止之氣虛者用人參蜜炙黃栢交門冬地骨之類 氣實人因服黃芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣 若喘者須用阿膠 若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子補之 若新病氣實而發喘者宜棗白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩擷項喘而不休火炎上喘

者乍進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘及大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導冰元利五六次而安

入方

痰喘方

南星

半夏

杏仁

瓜蒌子

香附

陳皮 去白

皂角炭

蘿蔔子

右爲末神麩糊丸每服六七十丸薑湯下

又方

蘿蔔子

蒸半兩

皂角

半兩

海粉

一兩

南星

一兩

白礬

一錢半薑汁浸晒乾

心用瓜萹仁薑蜜丸噙化

劫喘藥

好銅青

研細

號丹

少許炒轉色

右爲末每服半錢醋調空心服

附錄肺以清陽上升之氣居五臟之上通榮衛合

陰陽升降往來無過不及六淫七情之所感傷禽

食動作臆氣不和呼吸之息不得宣暢而爲喘急
亦有脾腎俱虛躄弱之人皆能發喘又或調攝失
宜爲風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而爲喘
又因痰氣皆能令人發喘治療之法當究其源如
感邪氣則驅散之氣鬱即調順之脾腎虛者溫理
之又當於各類而求凡此証脉滑而手足溫者生
脉瀉而四肢寒者死 風傷寒者必上氣急不得
卧喉中有聲或聲不出以三拗湯華蓋散九寶湯
神祕湯皆可選用 若痰喘以四磨湯或蘇子降
氣湯 若虛喘脉微色青黑四肢厥小便多以活

人書五味子湯或四磨湯 治嗽與喘用五味子
為多但五味有南北若生津止渴潤肺益腎治勞
嗽宜用北五味若風邪在肺宜用南五味

附方

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

五味

萊白皮

茯苓

甘草 炙

草果

腹皮

陳皮

桔梗 各

分

紫蘇 減半

右每服五錢水二鐘薑三片入鹽少許煎空
心服 秘湯 治上氣喘急不得卧

陳皮

桔梗

紫蘇

五味

人參 等分

每服四錢用水煎食後服

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急

人參

檳榔

沉香

台烏

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸温服

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘
急

上甘草

麻黃 節 不去

杏仁

不去皮尖等分

右服五錢水一鐘半薑五片煎服

小青龍湯 治水氣發喘尤捷

麻黃

芍藥

甘草 炙

肉桂

細辛

乾薑 炮各三兩

半夏 炮七次二兩半 五味 二兩

右咀每三錢煎七分食後服

導痰湯 千緡湯

並見痰類

華蓋散 治感寒而嗽胸滿聲重

蘇子

陳皮

赤茯苓

桑白皮

麻黃 各一兩

甘草 五錢

或那杏仁

右爲末每服二錢水煎食後服

九寶湯 治欬而身熱發喘惡寒

麻黃

薄荷

陳皮

肉桂

紫蘇

杏仁

甘草

桑白皮

腹皮 各等分

右咀薑蔥煎服

蘇子降氣湯

見氣類

活人書五味子湯

五味 半兩

人參

麥門冬

杏仁

陳皮

生薑 各二錢半

棗三箇

右咀水煎

導水丸

見痢類

咳嗽十六

附肺痿肺癰

○咳嗽有風寒 痰飲 火 勞嗽 肺脹 春

作是春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類 夏是

火氣炎上最重用芩連 秋是濕熱傷肺 冬是風

寒外寒以藥發散之後用半夏逐痰必不再來 風

寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁 逐痰

飲降痰隨証加藥 火主清金化痰降火 勞嗽宜

四物湯加竹瀝薑汁補陰為主 乾咳嗽難治此係

火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補

陰降火之劑四物加炒栢竹瀝之類不已則成勞此

不得志者有之倒倉法好 肺虛嗽甚此好色腎虛

者有之用參膏以陳皮生薑佐之大棗有痰加痰藥

上半日多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃

火 午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒栢知母

降火 黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用涼藥宜五

味子五倍子欽而降之 五更嗽多者此 胃中有

食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降肺火

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病

宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物湯加桃

仁訶子青皮竹瀝薑汁之類 嗽而脇下痛宜疎肝

氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯
加南星香附青黛青皮薑汁 血礙氣作嗽者桃仁
去皮尖大黃酒炒薑汁丸服 治嗽多用生薑以其
辛散故也 痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰
以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽 治
嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也
治痢亦同 勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火
傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收
斂降火之功佐以海石童便浸香附瓜蔓青黛杏仁
半夏麩之類薑蜜調喻化必以補陰為主 治嗽多

天突穴肺膈穴大瀉肺氣肺膈穴在三椎骨下兩傍
各一寸五分

○肺云陰分嗽者多屬陰虛治之 有嗽而肺脹壅
遏不得眠者難治 肺痿專主養肺氣養血清金
嗽而肺氣有餘者宜瀉之乘白皮為主半夏茯苓佐
之瀉其有餘補其不足 肺燥者當潤之屬熱者桔
梗大力知母雞清 聲啞者屬寒宜細辛半夏生薑
辛以散之肺虛者人參膏阿膠為主陰不足者六味
地黃丸為要藥或知母茯苓湯為妙陰虛氣喘四物
湯加陳皮甘草些小以降其氣補其陰白芍藥須用

酒浸晒乾 濕痰帶風喘嗽者不可一味苦寒折之
如干縉湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎薑
汁丸噲化 濕痰帶風以干縉湯墜痰丸固捷 痰
積嗽非青黛瓜萆不除有食積人面青白黃色不常
面上有如蟹瓜路一黃一白者是 欬逆嗽非蛤粉
青黛瓜萆貝毋不除 口燥咽乾有痰者不用半夏
南星用瓜萆貝毋飲水者不用瓜萆恐泥膈不鬆快
知毋止嗽清肺滋陰降火 杏仁瀉肺氣氣虛久
嗽者一二服劫止 治酒嗽青黛瓜萆薑蜜丸噲救
肺 食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君瓜萆蘿蔔

子爲臣青黛石減爲使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰
少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺
脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰
出嗽止五者火槩耳亦當明其是否也

入方 治痰嗽

杏仁 去皮尖 蘿蔔子 各半兩

右爲末粥丸服

清化丸 治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝毋 杏仁 青黛

右為末沙糖入薑汁泡蒸餅充如彈大噲化
治久嗽風入肺

鴛管石

雄黃

欒金

欵花

右為末和艾中以生薑一片安舌上灸之以烟入
喉中為度

○飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜
羹杏連丸

治欵嗽劫藥

五味子

五錢

甘草

二錢

五倍子

風化餅

各四錢

右為末蜜丸噲化

又云乾噲

治欵嗽聲嘶者此血虛火多

青黛

蛤粉

右為末蜜調噲化

治嗽喘去濕痰

白朮

半夏

蒼朮

貝母

香附

各一兩

杏仁

去皮尖炒

黃芩

各半兩

右為末薑汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛

瓜蒌仁

香附

童便浸晒乾

右爲末薑蜜調噲化

治一人風熱痰嗽

南星

海粉各二兩

半夏一兩

青黛

黃連

瓜蒌子

石減

蘿藦子

各半兩

皂角炭

防風各三錢

右爲末神麴糊丸服

治勞嗽吐紅

人參

白朮

茯苓

百合

紅花

細辛

五味

阿膠

黃芪

半夏

甘草

白芍

天門冬

右對水煎○若熱去桂芪用桑白皮麻黃入
杏仁不去皮同煎

又方 治嗽血

紅花

杏仁去皮尖

枇杷葉去毛

紫花露

鹿茸炙

木通

桑白皮又云加大塊

右爲末煉蜜丸噲化

嗽烟筒 治痰嗽久遠者

佛耳草

款花二錢

鴛管石

雄黃半錢

右爲末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子

百藥煎

荊芥穗

右為末薑蜜丸噙化

又方 治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服

清金丸 治食積火鬱嗽劫藥

貝母

知母

各半兩

巴豆

去油膜半錢

右為末薑泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下
一云青黛為衣

清金丸一名與點丸與清化丸同用為肺火降

熱痰斤子黃芩

炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧子大服五十丸

清化丸 與清金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能

燥濕熱輕能治上

燈籠草

炒

右為末蒸餅丸○又細末醋調敷咽喉間痛

又方 治痰嗽

礞石

半兩

風化硝

二錢

半夏

二兩

白朮

一兩

茯苓

陳皮

各七錢半

黃芩

半兩

右為末粥丸

又方 治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟殼 四兩蜜炒
去蒂膜

烏梅 一兩

人參 半兩

欬花 半兩

桔梗 半兩

兜鈴 一兩

南星 姜制

兩

右為末蜜丸彈子大含化

蒼蒞丸 調中散鬱

蒼朮

香附 各四兩

黃芩 二兩

右為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食後薑湯下

人參清肺散 治痰嗽咽乾聲不出

人參 一錢半

陳皮 一錢半

半夏 一錢

桔梗

麥門冬 半錢

五味 十箇

茯苓 一錢

甘草

桑白皮 一錢

知母 一錢

地骨皮 一錢

枳殼 一錢

貝母 一錢半

杏仁 一錢

欬花 七分

黃連 一錢

右水煎生薑三片

六味地黃丸

見諸虛

千縉湯 墜痰丸

見痰類

○肺痿治法在乎養血養肺養氣清金 曾治一婦人二十餘歲胸膈間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附錄金匱方論曰熱在上焦者因欬而肺痿得之
或從汗出或從嘔吐或消渴小便利數或從便難
又被快藥下利重亡津液故寸口脉數其人欬口
中有濁唾涎沫者為肺痿之病其人脉數虛者是

附方

海藏紫苑散 治欬中有血虛勞肺痿

- 人參 一錢
- 紫苑 半錢
- 知母 半錢
- 貝母 半錢
- 桔梗 一錢
- 甘草 半錢
- 五味 十五箇
- 茯苓 一錢

阿膠 炒半錢

右咬咀水煎

知母茯苓湯 治欬嗽不已往來寒熱自汗肺痿

- 甘草 各一兩
- 茯苓 各一兩
- 知母 五錢
- 人參 半夏
- 薄荷 柴胡
- 白朮 欬花
- 桔梗 麥門冬
- 黃芩 各半兩
- 川芎 二錢
- 阿膠 三錢

右水煎生薑三片

○肺癰已破入風者不治○用醫壘元戎搜風湯吐
之 或用太乙膏成丸食後服 收欬瘡口止有合
歡樹皮白斂煎飲之合歡即槿樹皮也又名夜合
附錄肺癰為何口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脉

反滑數或數實者此為肺癰也

附方

桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大小便赤澀

桔梗 貝母 當歸 酒洗 瓜蒌仁

枳殼 炒 桑白 蜜炙 薏苡仁 炒 防己 兩

甘草節 生 杏仁 炒 百合 炙各 兩 黃芪 兩

右咬咀每服五錢生薑五片水煎大便秘加大

小便秘加木通

團參飲子 治七情及饑飽失宜致傷脾肺欬

血漸成勞瘵

人參 紫苑 阿膠 蛤粉 百合

細辛 欵花 經霜棠葉 杏仁 炒

天門冬 去心 半夏 五味 各一 兩 甘草 兩

右每服四錢水煎生薑五片

○氣嗽加木香 唾血而熱加生地黄 唾血而

寒加鍾乳粉 疲極嗽加黃芪 損肺欵血加

沒藥藕節 嘔逆腹滿不食加白朮 欵而小便

多者加益智 欵而面浮氣逆加沉香橘皮

勞瘵十七

○勞瘵主乎陰虛痰與血病 虛勞漸瘦屬火陰

銷燂卽是積熱做成始健可用子和法後若羸瘦四物湯加減送消積凡不做陽虛 蒸蒸發熱積病最多勞病四物湯加炒栢竹瀝人尿薑汁大補爲上肉脫熱甚者難治

入方

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一斗入猪膽汁七枚再熬數沸甘草末收之每用一匙白湯調服

附錄勞瘵之証非止一端其始也未有不因氣體虛弱勞傷心腎而得之以心主血腎主精精竭血

則勞生焉故傳變不同骨蒸殭瘵復連尸疰夫疰者注也自上至下相傳骨肉乃至滅門者有之其証藏中有虫嚙心肺間名曰瘵疾難以醫治傳屍勞瘵寒熱交攻久嗽咯血日見羸瘦先以三拗湯與蓮心散煎萬一不失

附方

蓮心散 治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參

白茯苓

蓮肉

白朮

甘草

白扁豆

薏苡

桔梗

乾葛

黃芪

當歸

桑皮

丹溪心法 卷二 五

半夏麴 百合 乾薑 炮 山藥 炒

五味 木香 丁香 杏仁 炒

白芷 神麴 炒各一兩

右剉每服五錢生薑三片棗同煎空心溫服

樂令建中湯 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將

成勞瘵此藥退虛熱生血氣

前胡 一兩 細辛 黃芪 人參

橘皮 麥門冬 桂心 青歸

白芍 茯苓 甘草 半夏 錢七

右剉每服四錢薑三片棗一枚水煎服

黃芪驚甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心

悸盜汗減食多渴欬嗽有血

生芩 三兩 桑白 半夏 三兩 天門冬

驚甲 五兩 醋煮 紫苑 二兩 秦艽 三兩

知母 三錢 赤芍 黃芪 各三兩

人參 半兩 肉桂 桔梗 二兩

白茯苓 六錢 地骨皮 柴胡 三兩

甘草 二兩半

右剉每服三錢水煎服

清骨散 治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

朱一 六

北柴胡

生芩 各二兩

人參

防風

熟芩

秦艽 各一兩

赤苓 一兩

胡黃連

兩半

薄荷 七錢半

右每服四錢水煎溫服

三拗湯

見喘類

附錄葛可久先生勞症十藥神書內摘書七方

夫人之生也稟天地氤氲之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四體康健若曰不養真元不固根本疾病由是生焉且真元根本則氣血精液也余嘗聞先師有言曰萬病莫若勞症最為難治

蓋勞之由因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命酒色是貪日夜耽嗜無有休息以致耗散真元虛敗精液則嘔血吐痰以致骨蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡况醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以大熱之藥妄為施治絕不取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第于後用藥

之法如嘔吐咯嗽血者先以十灰散過住如甚者須以花蕊石散止之 大抵血熱則行血冷則凝見黑必止理之必然止血之後其人必倦其體次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五六分後服諸藥

保和湯止嗽寧肺 保真湯補虛除熱

太平丸潤肺除痰 消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之 保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之 餘無加用服藥之法每

日仍濃煎薄苛湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次嚼一丸緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥必流入竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消化丸一百丸吞下次又依前嚼嚼太平丸令其仰面卧而睡服前七藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有餘暇煮此服之亦可續煮白鳳膏食之固其根源完其根本病可之後方可合十環丸服之此為收功起身之妙用也

十灰散 治勞症嘔血咯血嗽血先用此過之

丹溪心法 卷二 六十九

大薊 小薊 栢葉 荷葉

茅根 茜根 大黃 山梔

牡丹皮 棕櫚灰

右等分燒灰存性研細用紙包碗蓋地上一夕出火毒用時先以白藕搗碎絞汁或蘿蔔搗絞汁亦可磨真京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之效

又方

花蕊石 燒過存性研如粉

右用童子小便一盞煎醋調末三錢極甚者五

食後服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半一處調藥立止其瘀血化為黃水服此藥後其人必躄解其病体却用後藥而補

獨參湯 治勞症後以此補之

人參 一兩去蘆

右吹咀水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之

保和湯 治勞嗽肺燥成痿者服之决效

知母 貝母 天門冬 麥門冬

款花 各三錢 天花粉 薏苡 杏仁 各炒

錢 五味 粉草 炙 瓊鈴

丹溪心法 卷二 六十九

紫苑

百合

桔梗

各一錢

阿膠

炒

當歸

生苻

紫蘇

薄荷

各

半錢

○一方無地黃有百部

右以水煎生薑三片入飴糖一匙入藥內服之每

日三服食後進加減于後

○血盛加蒲黃茜根藕節大薊茅花

痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實延胡索

喘盛加桑皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子

熱盛加山梔子炒黃連黃芩黃柏連翹

風盛加防風荆芥金沸草并菊細辛香附

寒盛加人參芍藥桂皮五味蠟片

保真湯 治勞症体虛骨蒸服之决補

當歸

生苻

熟苻

黃芪

人參

白朮

赤苓

白苓

各

半錢

天門

麥門

赤芍

知母

黃栢炒

五味

白芍

柴胡

地骨

甘草

陳皮

各

二錢

蓮心

半錢

右以水煎生薑三片棗一枚食後服

○驚悸加茯神遠志栝子仁酸棗仁 淋濁加草

蘇台烏藥褚苓澤瀉 便澁加木通石韋篇蓄

遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子 燥熱加滑石石膏

青蒿鱉甲 盜汗加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

太平丸 治勞症欬嗽日久肺痿肺壅並宜驗服

天門 麥門 知母 貝母

款花 杏仁 各二錢 當歸 生苧

黃連 阿膠 炮各 蒲黃 京墨

桔梗 薄芎 各一兩 北蜜 四兩 射香

一方有

右將蜜煉和丸如彈子大食後濃煎薄芎湯先溫

漱喉中細嚼一丸津唾送下上床時再服一丸如

痰盛先用飴糖拌消化丸一百丸送下後即驗

此丸仰面睡後其流入肺竅

消化丸

白茯苓 二兩 枳實 一兩半 青礞石 煨黃金

白礬 枯 橘紅 二兩 牙皂 二兩 半夏 二兩

南星 二兩 枳殼 一兩半 薄荷葉 一兩

右爲末以神麩打糊丸如梧桐子大每服一百丸

上床時飴糖拌吞次嚼嚼太平丸二藥相攻痰嗽

掃迹除根

潤肺膏

羊肺一具

杏仁一兩研

柿霜

真酥

蛤粉各一兩 白蜜二兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中
白煮熟如常服食與前七藥相間服之亦佳

吐血十八

○吐血陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之勢而
上出脉必大而芤大者發熱芤者血滯與失血也
大法補陰抑火使復其位用交趾桂五錢為末

謂服 山梔子最清胃腕之血 吐血覺胸中氣塞

上吐紫血者桃仁承氣湯下之 先吐絕後見痰嗽

多是陰虛火動痰不下降四物湯為主加痰藥火藥

先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急 痰嗽

涎帶血出此是胃口清血熱蒸而出重者梔子輕者

藍實 或暴吐紫血一碗者無事吐出為好此熱傷

血死於中用四物湯解毒湯之類 吐血挾痰積吐

一二碗者亦只補陰降火四物加火劑之數 挾痰

若用血藥則泥而不行只治火則止吐血火病也

大吐紅不止以乾薑炮末童便調從治 喉腕痰血

用荆芥散 舌上無故出血如線不止以槐花炒末
乾糝之 若吐血一方童便一分酒半分檮栢葉濕
飲非酒不行 嘔吐血出於胃也實者犀角地黃湯
主之虛者小建中湯加黃連主之

入方

二黃補血湯 治初見血及見血多宜服

熟棗一分 生芩五分 當歸七分 柴胡五分

升麻一分 白芍二錢 牡丹皮一分 川芎七分

黃芪五分

以水煎服 血不止可加桃仁半錢酒大黃

量虛實用之內即去柴胡升麻

又方 治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一錢 黃芪三錢 五味十二 芍藥

甘草五分 當歸五分 麥門冬五分

右咬咀水煎服 加玉金研入亦可

又方

人參一錢 白朮一錢 茯苓一錢 半夏麩

川芎五分 陳皮一錢 甘草五分 青皮二分

神麩二分

右咬咀水煎服 如胃不和加藿香 如渴者加

葛根半錢 若痰結塊者加貝母一錢黃芩半錢
 去白陳皮半錢 若小便赤色加炒黃柏半錢
 若大便結燥加當歸七分心煩加黃連酒拌曬乾
 半錢 若小便滑加煨牡蠣 如見血多去半夏
 恐燥加生芩一錢牡丹半錢桃仁三分 若胃中
 不足飲食少進加炒山梔子仁八分 若血溢入
 濁道留聚隔間滿則吐血宜蘇子降氣湯加人參
 阿膠各半錢 上膈壅熱吐血者以四物湯加荆
 芥阿膠各半錢更不止於本方中加大黃滑石各
 半錢 胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛各半錢

此是飲酒傷胃也吐血不止用生茜根為末二錢
 水煎放冷食後服良 白芨末調服治吐血

已上諸方雖非丹溪所出以其藥同故錄於前
 附錄凡血証上行或唾或嘔或吐皆逆也若交而
 下行為惡痢者順也上行為逆其治難下行為順
 其治易故仲景云畜血証下血者當自愈也與此
 意同若無病人忽然下痢其病進也今病血証上
 行而復下行惡痢者其邪欲去是知吉也 諸見
 血身熱脉大者難治是火邪勝也 身涼脉靜者
 易治是正氣復也故脉訣云鼻衄吐血沉細宜忽

然浮大即傾危

附方

四生丸 治吐血陽乘於陰血熱妄行服之良

生荷葉 生艾葉 生柏葉 生地黃

等分

右爛研如鷄子大服一丸水三盞煎一盞去滓服

大阿膠丸 治肺虛客熱欬咽乾多唾涎沫或有

鮮血勞傷肺胃吐血嘔血並可服

麥門冬去心 茯神 柏子仁 百部根

杜仲炒 丹參 貝母炒 防風

兩半 山藥 五味 熟芩

阿膠炒各一兩 遠志 人參各二錢半 茯苓

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水煎六分

相服

犀角地黃湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣湧

泄為衄血或清道閉塞流入胃腹吐出清血如鼻

衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更

宜服之

犀角鎊 生芩 白芍 牡丹等分

右咬咀每服五錢水煎溫服實者可服

桃仁承氣湯

芒硝 二錢

甘草 一錢半

大黃 一兩

桂 二錢

桃仁 半兩去皮尖

右吹咀每兩入薑同煎

解毒湯 見中暑

荆芥散

荆芥穗 半兩 炙草 一兩

桔梗 二兩

右吹咀薑煎食後服

小建中湯

桂枝

甘草 炙二錢

大棗

白芍

生薑 一錢

阿膠 炒一合

齋子降氣湯

見氣類

理中湯

見中寒

咳血十九

衄血 火升

痰盛

身熱多是血虛四物湯加

減用戴云欬血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔

全血者是咯血者毋欬出皆是血疔瘡衄血者鼻

中出血也溺血小便出血也下血者大便出血也

惟有名色分六俱是熱証但有虛實新舊之不

同或妄言為寒者誤也

入方

丹溪心法

卷二

七十六

青黛

瓜蒌仁

訶子

海粉

山梔

右為末以蜜同姜汁丸嚙化欬甚者加杏仁去皮尖後以八物湯加減調理

附方

黃芪散 治欬血成勞

甘草 四錢

黃芪

麥門冬

熟芋

桔梗

白芍 各半兩

右咬咀每服半兩水煎服

代苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致

黃五心煩熱咳嗽唾血

茯苓

半夏

前胡

紫蘇

人參

枳殼 炒

桔梗

甘草

葛根

各半兩 當歸 二兩

川芎

七錢半

陳皮

白芍

各二兩 熟芋

右咬咀水姜棗煎

嘔血二十

○嘔血火載血上錯經妄行 脉大發熱喉中痛者是氣虛用參芪蜜炙黃柏荆芥當歸生地黄用之嘔血用韭汁童便姜汁磨鬱金同飲之其血自清

火載血上錯經妄行用四物湯加炒山梔童便姜汁服
又方山茶花童便姜汁酒服 又鬱金末治吐血入姜汁童便良
又方用韭汁童便二物合用鬱金如細研和服
又方治吐血或衄血上行用鬱金無用山茶花代姜汁童便和好酒調服即止後以犀角地黃湯加鬱金
怒氣逆甚則嘔血暴瘴內逆肝肺相搏血溢鼻口但怒氣致血証者則暴甚故經曰抑怒以全陰者是也否則五志之火動甚火載血上錯經妄行也用柴胡黃連黃芩黃芪地骨生熟苧白芍以水煎服虛者以保命生地黃散再加天門冬拘

杞甘草等分水煎服

附方

治嘔血

黃栢 蜜炙

右搗爲末煎麥門冬湯調二錢七立瘥

聖惠方 治嘔血

側栢葉

右爲末不計時以粥飲調下二錢七

保命生地黃散

生苧

熟苧

拘杞

地骨皮

天門冬

黃芪

白芍

甘草

黃芩

右咬咀水煎食前

咯血二十一

附痰涎血

○咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類 咯唾血出於腎以天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃柏遠志熟莘牡礪姜桂之類 痰涎血出於脾以葛根黃芪黃連芍藥當歸甘草沉香之類主之

八方 治痰中血

白朮

一錢半

當歸

一錢

芍藥

一錢

牡丹皮

半一錢

桃仁

一錢研

山梔

炒黑八分

桔梗

貝母

一錢

黃芩

五分

甘草

三分

青皮

五分

右以水煎服

又方

治痰中血

白朮

一錢半

牡丹皮

一錢

貝母

一錢

芍藥

一錢

桑白

一錢

山梔

炒黑一分

桃仁

一錢研

甘草

三分

又方

治痰中血

橘紅

二錢

半夏

五分

茯苓

一錢

甘草

三分

白朮

一錢

枳殼

一錢

桔梗

一錢

五味

五分

桑白 一錢 黃芩 一錢 人參 五分

右以水一鍾生姜三片煎服 或加青黛半錢

又方

橘紅 一錢半 半夏 一錢 茯苓 一錢 甘草 五分

牡丹 一錢 貝母 一錢 黃連 七分 桃仁 一錢

大青 五分

右以水煎生姜三片

又方

荷葉 不以多 少焙乾

為末米湯調二錢匕

初虞世方 治咯血并肺癆多痰

防已 葶藶 等分

右為末稷米飲調下一錢

又方 治咯血及衄血

白芍 一兩 犀角末 二錢

右為末新汲水服一錢七血止為限

天門冬丸 治咯血并吐血又能潤肺止嗽

阿膠 炮各 半兩 天門冬 一兩 牡草 杏仁 炒

貝母 白茯苓 各半兩

右為末密丸如彈大服一丸

又方 治咯血

桑皮 一錢半

半夏 一錢

知母 一錢

貝母 一錢

陳皮 一錢

山梔 一錢

茯苓 一錢

阿膠 炒半錢

桔梗 七分

生苧 一錢

山梔 七分

甘草 五分

杏仁 五分炒

生苧 一錢

山梔 七分

炒

榔桂 二分

榔桂之枝條也宜入上焦

右以水煎生姜三片

衄血二十二

○衄血涼血行血為主大抵與吐血同 用山茶花

為末童便姜汁酒調下 犀角生地黃湯入爵金同

用如黃芩升麻犀角能解毒 又以爵金末童便姜

汁并酒調服 經血逆行或血腥或吐血或唾血用

韭汁服之立効 治血汁血衄以人中白新瓦上火

逼乾入麝香少許研細酒調下經驗人中白即溺盆

白淫秋石也 衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩

芍藥生地黃紫苑丹參阿膠之類主之 原病式曰

衄者陽熱拂鬱于於足陽明而上熱則血妄行故鼻

衄也

附方

河間生地黃散 治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞

柴胡

黃連

地骨

丹毒八法
天門冬

白芍

甘草

黃芩

黃芪

生芩

熟芩

等分

右咬咀湯煎服

若下血加地榆

又方 治衄血

伏龍肝 半升

右以新汲水一大碗淘取汁和蜜頓服

茜根散 治鼻不止

茜根

阿膠

蛤分炒

黃芩

各一兩

甘草

炙半兩

側柏葉

生芩

右以水一鍾姜三片煎服

黃芩芍藥湯

治鼻衄不止

黃芩

芍藥

甘草

各等分

右以水煎服

或犀角地黃湯如無犀角以升麻

代之○鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出凡

鼻衄並以茅花調止衄散特進浙二泔仍令其以

麻油滴入鼻或以蘿蔔汁滴入亦可又茅花白芍

藥對半充穩 外迎法以井花水濕紙頂上貼之

左鼻以線札左手中指右出札右手俱出兩手俱

札 或炒黑蒲黃吹鼻中又龍骨末吹亦可

止衄血

黃芪 六錢
赤茯苓
白芍
當歸

生芩 各三錢
阿膠

右為末每服二錢食後黃芪湯調服

芎附飲

川芎 二兩
香附 四兩

右為末每服二錢茶湯調下

又法 治心熱吐血及衄血不止

百葉榴花 不以多少

右乾為末吹出鼻中立瘥

溺血二十三

溺血屬熱 用炒山梔子水煎服或用小蘗琥珀
有血虛四物加牛膝膏 實者用當歸承氣湯下之
後以四物加山梔

入方

小蘗飲子治下焦結熱血淋

生芩 小蘗 滑石 通草

淡竹葉 蒲黃 炒 藕節 當歸 酒

梔子 炒 甘草 炙各 半兩

右以水煎空心服

附錄溺血痛者為淋下痛者為溺血溺血先與生

料五苓散加四物湯若服不効其人素病於色者此屬虛宜五苓散和膠艾湯吞鹿茸丸或辰砂香散四物加生地黄牛膝 或四物加黃連棕灰又六味地黄丸為要藥莖中痛用茸草稍血藥中少佐地榆陳皮白芷棕灰 切劑用瑞竹堂蒲黃散或單用蒲黃 或煎葱湯調鬱金末服之 又文蛤灰入煎劑妙 大抵小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難甚痛者謂之淋不痛者謂之溺血並以油頭髮燒灰存性為末新汲水調下妙 又方以車前子為末煎草草葉調二錢服

附方

許令公方 治尿血

生地黄 汁一升 生姜汁 一合

右以二物相合頓服瘥

當歸承氣湯

當歸 厚朴 枳實 大黃

芒硝

生料五苓散 見中著

膠艾湯

阿膠 川芎 甘草 各二兩 川歸

丹溪心法

卷二

八十四

艾葉炒各二兩

熟苧

白芍各四兩

右咬咀每三錢水酒煎空心熱服

鹿茸丸

鹿茸一兩蜜炙

沉香

附子炮各半兩

兔絲子

制一兩

當歸

故紙炒

回香炒

胡蘆巴炒各半兩

右為末酒糊丸每七十九空心鹽酒下

沉砂妙香散

射香一錢另研

山藥姜汁炙一兩

人參半兩

木香煨

半錢

茯苓

茯神

黃芪各

桔槩半兩

甘草炙半兩 遠志炒

辰砂三錢

右為末每二錢溫酒下

六味地黃丸見諸虛

瑞竹堂蒲黃散

故紙炒

蒲黃炒

千年后灰炒

右等分為細末每三錢空心熱酒調下

下血二十四

○下血其法不可純用寒涼藥必於寒涼藥中加辛味為佐久不愈者後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸

丹溪心法
炒涼藥如酒煮黃連丸之類寒因熱用故也 有熱
四物加炒山梔子升麻秦艽阿膠珠去大腸濕熱
屬虛者當溫散四物加炮乾姜升麻 凡用血藥不
可單行單止也

人方

白芷

五倍子

右爲末粥丸梧子大服五十丸米湯下

附錄下血當別其色色鮮紅爲熱以連蒲散又若
內蘊熱毒毒氣入腸胃或因飲酒過多及啖糟蕪
炙博引血入大腸故下血鮮紅宜黃連丸或一味

黃連煎餘若大下不至者宜四物湯加黃連槐花
仍取血見愁少許生姜搗取汁和米大服於血見
愁草中加入側柏葉與生姜同搗汁尤好毒暑入
腸胃下血者亦宜加味黃連槐花入煎服血色瘀
者爲寒血逐氣走冷寒入客腸胃故上瘀血宜理
中湯溫散若風入腸胃純下清血或濕毒並宜胃
風散加枳殼荆芥槐花 擷撲損惡血入腸胃下
血濁如瘀血者宜黑神散加老黃茄爲末酒調下
內經云下血爲內傷絡脈所致用枳殼一未服
又方用黃連二兩枳殼二兩槐花八兩炒上一米

去槐花不用止以二味煎服立効以解絡脉之結也

附方

血餘灰

鞋底灰

猪牙皂角灰

等分

右爲末酒調三錢七

又方

治下血劫劑

百藥煎

一兩取半燒爲灰

右爲末糊丸如梧子大服六十九空心米湯下

槐花散

治腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

各一兩

槐花

一兩

甘草

半兩

烏梅

右以水煎空心服

又方

治下鮮血

梔子仁

燒灰

右爲末水和一錢七服

又方

治糞前有血面色黃

石榴皮

右爲末煎加子枝湯調一錢七

又方

治糞後下血不止

艾葉

不以多少

子孫心去

卷二

八七

一右以生薑汁三合和服

又方

槐花

荆芥穗

等分

右爲末酒調下一錢匕仍空心食豬血炒

又方 治臟毒下血

苦練炒令黑

一右爲末蜜丸米飲下二十九丸炒

又方 治卒下血

赤小豆一升楊碎水二升絞汁飲之

烏梅丸 治便血下血

烏梅

三兩燒
灰存性

右爲末醋糊丸梧子大空心服七十九丸未湯下

酒煮黃連丸

見泄瀉類

黃連丸

黃連 二兩

赤茯苓 一兩

阿膠 一兩

右用黃連茯苓爲末調阿膠衆子丸每三十丸食

後飲下

黃連香薷飲

見中暑

理中湯

見中寒

胃風湯

見下痢

黑神散

丹溪心法

卷二

八十八

百草霜

右用酒調下

腸風臟毒二十五

○腸風獨在胃與大腸出 若兼風者蒼朮秦艽芍

藥香附

人方

黃芩

秦艽

梔子

升麻

青黛

治腸風下血

滑石

當歸

生苧

黃芩

甘草

蒼朮 等分

右以水煎服 或以蒼朮生苧不犯鉄器為末丸

服

又方

茄蒂

燒存性

梔子

炒

右為末搗飯丸如梧子大每服空心一百丸米湯

下

又方 便血久遠傷血致虛并麻風癰見前者

龜板 二兩 酥炙

升麻

香附

各五錢

芍藥

一兩

五錢

側柏葉

椿根皮

七錢五分

右爲末粥丸以四物湯加白朮黃連甘草陳皮作末湯調送下丸藥

又方 脉緩大口渴月經紫色勞傷挾濕

白朮 錢五

黃栢 炒

生芩

白芍 各

錢

地榆 錢二

黃芩 錢二

香附 錢二

右爲末蒸餅丸服

又方 治積熱便血

蒼朮

陳皮 一兩 錢五

黃連

黃栢

条芩 各七錢 五分

連翹 錢五

右爲末生芩膏六兩丸如梧子大每服三十九

白湯下

又方

腸風脫露以車荷鳴五七箇焙乾燒灰醋調搽仍忌濕麪酒辛熱物

附錄腸胃不虛邪氣無從而入人惟坐臥風濕醉飽房勞生冷停寒酒麪積熱以致榮血失道滲入大腸此腸風藏毒之所由作也挾熱下血清而色鮮腹中有痛挾冷下血濁以色黯腹中畧痛清則爲腸風濁則爲臟毒有先便而後血者其來也遠有先血而後便者其來也近世俗冀前糞後之說

非也治法大要
先當解散腸胃風邪熱則用敗毒散冷者與不換金正氣散加川芎當歸後隨其冷熱而治之
芎歸湯一劑又調血之上品熱者加茯苓槐花冷者加茯苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣靖為大腸下血大抵以胃藥收功以四君子湯參苓白朮散枳殼散小烏沉湯和之胃氣一回血自循於經絡矣○腸風者邪氣外入隨感隨見 臟毒者蘊積毒久而始見三因方五痔腸風臟毒辨之甚詳 前二証皆以四物湯加刺蝟皮

附方

蒜連丸

一名金屑萬應膏

獨頭蒜 十箇

黃連

不以多少

右先用獨蒜煨香熟和藥杵勻丸如梧子大空心米湯下四十九

又方 治腸風

香附

一兩炒

枳殼

七錢五分炒

當歸

五錢

川芎

五錢

槐花

炒

甘草

各二分

右為粗末每服三錢水煎生姜三片棗一箇

敗毒散

見瘡痍

不換金正氣散

厚朴 姜制

藿香

甘草 炙

半夏

蒼朮

木耳浸

陳皮

去白

右等分姜三片棗二箇煎食前熱服

芎歸湯

川芎

當歸

右等分水煎

參苓白朮散

見脾胃類

枳殼散

枳殼

大炒去穰

槐子

微炒黃

荆芥穗

各五錢

右為末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二里

再用粥壓下日進二三服

小烏沉湯

香附

二十兩

烏藥

十兩

荳蔻

炙一兩

右為末湯調下

痔瘡二十六

○痔瘡專以涼血為主

入方

人參

黃芪

生苧

川芎

當歸

和血

升麻

条芩

枳殼

實

槐角涼血生血黃連

一方無黃連

熏浣

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮房加

荆芥

煎湯先熏後洗又冬瓜藤亦好 又大腸熱腫者

用木鱉子伍倍子研細末調傅 痔頭向上是大

腸熱甚收縮而上用四物湯解毒加枳殼白木槐

角秦艽

附錄痔者皆因臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉

飽交接多慾自殘以故氣血下墜結聚肛門宿滯

不散而衝突為痔也 其肛邊發露肉珠狀如鼠

乳時時滴瀆膿血曰牡痔 肛邊生瘡腫痛突出

一枚數日膿潰即散曰牝痔 腸口大顆發癩且

痛且痒出血淋瀝曰脉痔 腸內結核有血寒熱

往來登溷脫肛曰腸痔 若血痔則每遇大便清

血隨而不止 若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫痛

而流血 若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫

痛大便艱難強力則肛出而不收矣此諸痔之外

証也 治法總要大抵以解熱調血順氣先之

熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入大腸此其所以為痔也諸痔久不愈必至穿久為漏矣

附方 治諸痔瘡

槐花 四兩 皂角刺 一兩 胡楸 十粒 川楸 一兩

右用獾猪肚一箇入藥在內扎定口煮熟去藥空心食猪肚

心丸 素問云諸痛痒瘡皆屬於心心主血熱此

藥主之 黃連 一兩 茯神 赤苓

右為末煉蜜丸如梧子大每一百丸食前米湯下

清涼飲 治諸痔熱甚大便秘結

當歸 赤芍 甘草 大黃

右等分為末每服二錢新水調下

槐角丸 治諸痔及腸風下血脫肛

槐角 一兩 防風 地榆 當歸

枳殼 黃芩 各半兩

右為末糊丸如梧子大空心米湯下二十九

蠟皮丸 治諸痔出裏急疼痛

槐花 炒 艾葉 炒 枳殼 地榆

當歸

川芎

黃芪

白芍

白朮枯

貫衆

蝟皮一兩 炙

頭髮燒

三錢

豬後蹄重甲十枚 炙焦

皂角一 大

錢錢多黃 去皮

右為末煉蜜丸梧子大服五十九丸食前米湯下

豬甲散 治諸痔

豬懸蹄甲不以多少

右為末陳米湯調二錢空心服

芎歸丸 治痔下血不止

川芎

當歸

黃芪

神麴炒

地榆

槐花炒各 半兩

阿膠炒

荆芥

木賊

頭髮燒灰各 一錢半

右為末煉蜜丸梧子大服五十九丸食前米湯下

乾葛湯 治酒痔

乾葛

枳殼炒

半夏

茯苓

生芩

杏仁各半兩

黃芩一錢 半

甘草同

右剉每服三錢黑豆一百粒薑三片白梅一箇煎

服

橘皮湯 治氣痔

橘皮

枳殼炒

川芎

槐花各

子溪心去

卷二

九五

半

檳榔

米香

桃仁炒

去

紫蘇莖葉

附

甘草各

二分

右剉每服八錢薑棗煎服

熏洗方

槐花

荆芥

枳殼

艾葉

又方

土礬末一錢

木鱉子七箇取

仁研

右以水煎薰洗三兩次

如肛門腫熱以杵硝末

水調淋之良

方 治腸痔每大便常有血

右以蒲黃末方寸匕米飲調下日三頓瘥

又方

搗桃葉一斛蒸之內小口器中以下部榻上坐虫

自出

地黄丸 治五痔滋陰以用之

地黄

酒蒸熟一兩六錢

槐角

炒

黃栢

炒

杜仲

炒

白芷

各一兩

山藥

炒

山茱萸

獨活

各八錢

澤瀉

牡丹

炒

茯苓

各

錢

黃芩

一兩半

白附子

二錢

右煉蜜丸如梧子大空心服五十九丸米湯下

薰痔方

用無花果葉煮水薰少時再洗 又好醋沃燒新
磚如法坐薰良

又方

大黃三錢

牡礪一兩

右為末作十服空心服

又方

大蒜一片頭垢捻成餅子先安頭垢餅於痔上
外安蒜艾灸之

翻花痔

荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鱉子鬱金研
末入龍腦些少水調付 又方熊膽片腦和勻
貼之

漏瘡二十七

○漏瘡先須服補藥生氣血用參朮芪芎歸為主大
劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸
漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可使痛乾則
易之則再研如末作餅再灸如困則止來日再灸直
至肉平為効亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之

尤妙 痔漏凉大腸寬大腸 用枳殼去穰入巴豆
鐵線纏煮透去巴豆入藥用丸子則爛搗用煎藥乾
用寬腸 澁竅用赤石脂白石脂枯礬黃丹腦子
漏竅外塞用童子小便煨爐茸石牡礪粉
入方

黃連散 元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛
作膿就在痔孔出作食積注下治

黃連

阿魏

神麩

山查

桃仁

連翹

槐角

犀角分

右為末以少許置掌心時時砥之津液咽下如消

三分之二止後服

附錄漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蠅瘻結瘻蜂
瘻蚰蟬瘻蠟瘻浮蛆瘻轉筋瘻古所謂九瘻是
爾析而言之三十六種其名目又不同焉大抵外
傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染觸蠢動含靈
之毒未有不變為瘻瘡穿孔一深膿汁不盡得冷
而風邪併之於是消涓而成漏矣然有近年漏者
有久年漏者近則帶淡紅或微腫或小核久則上
而槁白內而黑爛淫垂惡臭生焉

附方

猪腎丸 通行漏瘡中惡水自大腸中出

黑牽牛碾細末二錢半入猪腎中以線扎青竹葉包慢火煨熟空心温酒嚼下

乳香丸 治冷漏

乳香二錢 牡礪粉一錢二分半

右為末雪糕糊丸麻子大每服三十九薑湯空心

生地黄膏 治漏瘡通用

露蜂房炙 五倍子 木香三錢 乳香一錢
輕粉一字

右為末用生地黄一握搗細和為膏攤生絹上貼

蛇蛻散 治漏瘡血水不止

蛇皮焙焦 五倍子 龍骨各一錢半 續斷五錢

右為末入射香少許津唾調傅

薰漏瘡方

艾葉 五倍子 白膠香 苦練根

分等

右剉碎燒香法置長桶內坐熏瘡處

洗漏瘡方 治漏瘡孔中多有惡穢常須避風一淨

露蜂房白芷煎湯洗 或大腹皮苦參煎湯洗

右洗畢候水出拭乾先用東向石榴皮晒為末乾

摻以殺淫虫少頃傳藥

久癢方

九孔蜂房 炙黃

右為末臘月猪脂研傳候收汁以龍骨降香節末入些乳香硬瘡

漏瘡 或腿足先是積熱所注久則為寒

附子破作兩片用人唾浸透切成片安漏孔上

艾炷

又方

川芎 生兩

細辛

白芷梢 一錢

右為末每日作湯服之病在下食前服在上食後服瘡大小討隔年黃麻根刮去皮撚成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

丹溪先生心法卷二

丹溪先生心法

卷二

右為未臘月猪肺何種收汁以無名

入此乳香檀藥
滑瘡 或腿足先是積熱所注久則為癰
附子破作兩片用 人唾浸透切或片安瓶孔上

丹中在人不共限且氣於膏藥胡之

那骨節大小情副平黃和雞脂去烈丸露干人

或濕未每日非患難之亦不食前難在土食

