

醫方類聚卷之四十

傷寒門 十四

永類鈴方 二

陽明經

脉

病證

陽明為津液之主中風則喜飲傷寒則不食

治

二日陽明受病陽明者胃中寒是宜桂枝

也

湯

太陽病發汗汗出復不解其不

麻黃湯

解者轉屬陽明也



外證身熱汗出而不惡寒但惡小柴胡湯

浮緊

中風頭痛口苦腹滿而喘發熱桂枝麻黃湯

中寒不能食小便不利手足濇然汗出欲作堅癥者胃中水氣湯

谷不化也

能食下之不解乃不能食攻其半夏湯

熱必噦胃中虛冷也

遲

發熱頭眩小便難欲作穀疸下小柴胡湯

病當多汗而反無汗身如虫行木附湯

冬陽明反無汗但小便利吐而建中湯

浮緊

冬陽明病必發潮熱其脉浮者黃芩湯無汗小便不利心中熱壅必發茵陳湯黃也

被火灸其額上微汗出小便不利必發黃

口乾但嗽水不欲嚥者必鼻衄黃芩芍

也藥湯

若小便少者津液當還入胃中茯苓湯

凡發汗大過令小便難

心下堅滿不可下之半夏湯

不吐不下者調胃承

人雖汗出不惡寒體重短氣氣湯

腹滿而喘有潮熱者外欲解人承氣

可攻手足濇然汗出為大便湯

已堅者脉必遲

汗出多微發熱惡寒外未解其小承氣

熱不潮未可下若腹滿不通湯和其

胃氣

有潮熱大便堅也

若有結燥乃徐攻之若無壅承氣湯

滯不可攻攻必腹滿不食飲

水即噦必發熱腹堅脹

小承氣

湯和之

不轉失

氣不可

攻

多汗津液外出胃中乾燥大便承氣湯

必堅則譫語

滑疾

譫語妄語發潮熱或大便微鞭

大承氣

湯不鞭

浮緊

咽乾口苦腹滿汗出喘不惡寒梔子豉

勿與

反惡熱心燥譫言不得眠下湯

之胃虛客熱舌燥

發熱渴而飲水小便不利

朱苓湯

表熱裏寒下利水谷

四逆湯

胃中虛冷能食飲水即噦脉浮

黃芩湯

發鼻燥能食者必衄

汗出多渴不可與朱苓湯汗多朱苓湯

浮遲

者胃燥也汗少者

利其小

下之其外有熱手足温心中煩

便

壅飢不能食頭汗出

梔子湯

潮熱大便溏小便自可胸脅煩

小柴胡

滿不止

湯

脅下堅滿大便秘而嘔口燥

小柴胡

湯

浮大

中風心痛氣短鼻乾不得汗身小柴胡  
黃小便難潮熱而噦身腫利湯

遲浮

之小差外若不解

汗出多微惡寒為表未解

桂枝湯

無汗其人必喘須發汗

麻黃湯

其人喜忘必有蓄血為本有瘀

抵當湯

發熱大便必秘

承氣湯

發熱汗出此為熱退不能發黃

茵陳湯

但頭汗出身無汗小便不利

茵陳湯

渴欲引水此瘀熱在裏必發

承氣湯

黃又七八日身黃小便不利

承氣湯

辨別四十一

實

腹微滿

煩熱汗出解如瘧日晡發熱當

承氣湯

下之

脈虛浮當汗之

桂枝湯

發作有時汗不解腹滿痛

承氣湯

陽明少陰合病自利脈浮者為

承氣湯

順滑數者有宿食

發熱無汗表不解渴欲飲水

白虎湯

潮熱大便溏小便自可胸脅滿

小柴胡

浮

或不大便而嘔舌上白胎宜

湯上焦

津液得

下胃和

汗出解

少陽經

脈

病證

三日少陽受病口苦乾燥目眩煩

嘔或渴或腹痛或心悸小便

不利或不渴身有微熱或欬

治

巴木並

屢小柴

胡湯隨

或脇下堅滿乾嘔不能食往  
來寒熱若未吐下脉弦緊若  
已吐下發汗則譫語服小柴  
胡湯不解此欲作狂病者脇  
痛有水者  
謹施治  
此表解  
藥不可  
汗

中風耳聾目赤胸中煩滿不  
可吐下吐下則悸而驚

頭痛發熱脉弦細此屬少陽  
少陽病不可發汗汗則譫語  
調胃承

弦細

屬胃和即愈不和即煩而悸  
三日無大熱其人煩燥此為  
陽去入陰  
氣湯  
茯苓湯

太陰經

脉病證

四日太陰受病腹滿吐食下之益

甚時時腹痛心胸堅滿

若脉浮者可發汗宜  
枳枝湯

沉實者宜攻裏  
承氣湯

治

陽微  
陰長

中風四肢煩疼應脈為欲愈  
利而不渴其藏有寒宜溫之

青龍湯  
四逆湯

手足自溫是在太陰小便不利  
病當發黃

茵陳湯

病不解雖暴煩下利十餘行而  
自止者脾實腐穢去也

橘皮湯

下後腹滿時痛宜

桂心芍

若大實腹痛

藥湯桂

枝大黃

少陰經

湯或承  
氣湯下  
之

脈 病證

治

微細

五日大陰受病但欲寐欲吐而不

龍骨牡

煩五日自利而渴者為陰虛故

礪湯

引水自救小便白而利者下焦

虛寒不能制水而便白



欬而下利譫語是心藏有積熱故小便必難

朱苓湯

數細沉

病在裏不可發其汗

承氣湯

下利止惡寒而蹇手足溫者可

建中湯

治

惡寒而蹇時時自煩不欲厚衣

大柴胡湯

一身手足盡熱熱在膀胱必便

黃芩湯

血也

其人吐利手足不逆及發熱者葛根半

夏湯

始得病二三日

麻黃附

子湯微

汗之

始得反發然脉沉者

麻黃細

辛附子

良醫重脈平風寒

湯

手足厥者

去麻黃

沉

身體重痛手足寒

細辛加  
乾姜

下利膿血宜

四逆湯  
桃花湯

吐利手足逆煩燥或頭痛嘔  
涎

吳茱萸  
湯

下利咽痛胸滿心煩

朱苓湯

咽痛者

甘草桔  
梗湯

微

下利宜

利止後厥逆無脉煩燥者

白通湯  
白通猪

四肢心腹痛小便不利或咳嘔

膽湯

此有水氣

真武湯

微欲  
絕

下利清穀手足厥冷發熱惡寒

四逆湯

其人面赤或腹痛或乾嘔或

咽痛或時利止而脉不出者  
或沉者急温之

弦薄	下利咳而嘔煩渴不得眠	朱苓湯
	口燥咽乾或心痛急下之	承氣湯
	下利清水色青者心下必痛口	大柴胡
	乾燥者	湯
	其人腹滿不大便者急下之	承氣湯
	飲食則吐心中溫溫欲吐不能	瓜蒂散
	手足寒此胸中實不可下	吐之
	膈上有寒飲乾嘔者不可吐當	四逆湯
	溫之	

厥陰經	治
-----	---

脉	病證	治
六日厥陰受病脉微浮為欲愈不	浮為未愈	建中湯
渴欲飲水宜		朱苓湯
煩滿囊縮毒氣在臍可下而	愈	承氣湯
身體熱惡風頸項強脇下滿手		小柴胡
足溫而渴		湯

陽瀆 陰弦 當腹中急痛洗與

建中湯

發汗吐下後虛煩不得眠劇者  
心神顛倒

不差小  
柴胡湯  
梔子湯

已汗下後胸脇滿大腸微結小  
腸不利而不嘔但頭汗出潮  
熱而煩

柴胡桂  
枝湯

發熱微惡寒肢節煩疼心中支

柴胡桂

滿外證未解

枝湯

大下後身熱不去心中結痛此  
為欲解

梔子湯

下後胸滿煩驚小便不利譫語  
一身不可轉側

小柴胡  
湯

六日不解熱結在裏但熱時時  
惡風大渴舌乾煩燥

白虎湯

風濕相搏身體疼痛不能轉側

朮附湯

六日後至八日九日如瘧熱多

浮虛  
而漉

類聚 卷之十 十一

寒少一日再發脉微緩者欲桂枝麻  
愈脉微惡寒者為陰陽俱虛黃湯  
不可再吐下發汗面赤有熱  
者為欲愈

痙亦作痙痙惡也痙風強病也

浮大

風為散氣發熱有汗不惡寒大陽證具  
為柔痙

沉緊

寒泣血發熱無汗而惡寒大陽證具為  
剛痙

沉細  
熱消氣為痙縱大筋纒短拘急  
濕溢血為緩弱小筋弛長痿頓

渴暑病也

弦細  
大陽中渴發熱惡寒身重痛手足逆冷

微弱  
孔遲

夏月傷冷水水行皮膚中身熱疼痛

中熱渴汗出惡寒身熱而渴

傷寒可汗證治通見傷寒雜病自汗門

大法春夏可發汗但令手足周徧發熱

然不欲流離病若不解當可復汗汗多則亡陽虛則不得重發汗也凡發汗中病便止不必盡劑也

病證

治法

浮脉

太陽病頭痛發汗出惡風若惡寒

常自汗出者榮和衛不和也或

發熱汗出榮弱衛強也

病人藏無他病時發熱自汗出

而不愈榮衛不和也

已上並以

浮數

發汗解半日許復熱煩可更解

其汗

桂枝

浮弱

外證未解不可下下之為逆當

以汗解

湯和

浮

初服桂枝湯反煩而不解先刺

風池風府再服

此湯

先發汗不解復下之脉浮者不

愈浮為在表而反下之故不

於甘

愈今脉浮故知在表須解其

勿用

外

病下之微喘者桂枝厚朴杏仁湯若下之氣上撞者

吐後必吐膿血

陽浮 陰濡

病中風齎齎惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔汗出

病不解熱結膀胱其人如狂血下自愈者愈外未解尚未可攻先解其外宜桂枝湯外已解但小腹急結宜桃核承氣

湯攻之

大下後復發汗心下痞惡寒者

不可攻痞先解表宜桂枝湯

後攻痞大黃黃連瀉心湯

已上並以

厥陰病下之清穀不止身疼痛

先救裏宜四逆湯後身疼痛

清便自調急救表宜桂枝湯

湯和之

霍亂吐利止身痛不休以桂

枝和之

類聚四十一

不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小便清者知不在裏可汗愈

陽明病汗出多微惡寒表未解也

大陰病脉浮可汗

傷寒無汗發熱身疼八九日不解表證在當汗服麻黃湯微除後發煩目瞑劇者必衄乃

遲

浮緊

解陽氣重故也仍以桂枝和之

燒針令其汗針處被寒起赤核桂枝加少腹氣上撞心者灸核上一桂湯壯次與

服桂枝大汗出與桂枝若形似瘡一日再發者麻黃一

項背強几几反汗出惡風宜桂枝葛湯

洪大

類聚四十一



類聚四十一

若無汗

根湯葛根湯

浮緊

傷風傷寒榮衛俱病骨節煩疼

麻黃湯

或無汗其人必喘者皆宜

傷寒六七日發熱微惡寒才去

柴胡桂枝湯

者

枝湯

浮細

太陽病十日以去嗜臥此為外

小柴胡湯

解若胸滿脇痛與

湯麻黃

脈浮屬

湯

而大弦浮短

陽明中風胃滿心脇痛鼻乾喜

臥身黃小便難潮熱時噦耳小柴胡

腫外不解病過十日脈再浮湯麻黃

與湯

但浮無餘證者

太陽病頭痛發熱身不疼腰疼

麻黃湯

骨節疼惡風無汗而喘

太陽陽明合病喘而胸滿不可麻黃湯

大下也

風發熱惡寒食飲不大青

浮緊

大陽中風發熱惡寒身疼痛不大青龍湯

心下有水氣咳喘發熱不渴乾嘔或渴或利或小便不利小青龙湯

身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龙湯

浮緩

傷寒四五六日後潮熱惡風頭

項強胸脇溫滿不食心煩喜並小柴胡湯

促

或脇痞堅心下悸或小便不利或不渴熱咳

小便不利微熱而渴

大陽陽明合病自利不嘔

大陽陽明合病不下利但嘔

桂枝證反下之利不止喘而汗

出當表解

五苓散  
葛根湯  
葛根半  
夏湯  
葛根黃  
連黃芩  
湯

類聚四十

十一

類聚四十

十一

小陰腎經亦可汗如用附子復使麻黃則知小陰亦自大陽出厥陰用桂自小陽出明矣及二陽鬱閉皆當自陽明出

傷寒不可汗證治

脉

病證

治

數沉細  
少陰病在裏喘家裏傷寒發汗有四難強汗動經動證厥逆凡發熱頭疼有汗氣在上下左虛煩下而非無汗惡風之

右

利清穀非惡寒例發其汗

瘡家身雖痛冬月之汗不止為漏風間

汗則成瘡時咽中有發而為瘡者此

淋家汗則便閉燥汗分外證發汗之一

血而小助脈家難也至於發熱頭

衄血家汗則痛尺脉遲者為榮

額上陷身體虛血少不可發汗

疼痛惡寒熱發熱頭痛脉弦細

太陽病發熱惡寒熱屬少陽不可汗汗

浮緊

尺中微遲弱

類聚三十一  
三十一

大多寒少亡陽也則譫語此分脉發

傷寒頭痛翕翕發熱汗之二難也動氣

中風狀微汗自嘔在左不可汗汗則

少陽病頭痛反發熱頭眩汗不止則筋

咳而小便利傷肉瞶動氣在右

熱常消穀飲食反吐不可汗汗則衄而

足太陰濕温證兩脛渴心煩飲則吐水

逆冷腹滿頭目痛動氣在上不可汗

妄言汗則氣冲心動氣

太陽少陽併病頭項在下不可汗汗則

強痛或眩冒時如無汗心煩骨節疼

結胸心下痞堅此分內證發汗之

太陽病八九日如瘧三難也春宜汗不

發熱惡寒不嘔清可大發以陽氣尚

便咳而小便利微冬不可大汗以

少陰證咳而下利譫陽氣伏藏汗之必

語者此火劫小便吐利口爛生瘡此

必難知時發汗之四難

頁三十一

類聚四十一  
十一

少陰證但厥無汗而也仲景分列不可  
強之汗者三十餘條本

傷寒熱病之類同病事所載南史著範

異名同脉異經病雲欲預慶錫命召

雖傷於風其人自徐文伯輕劫其汗

有固疾則不得同乎雖然冬時嚴寒

法其人素傷於風非感非冒未重傷

固復傷於熱風熱於足太陽膀胱經

相搏則發風温四或未發而先有寒

肢不收頭疼身熱或已發熱須惡寒  
當汗出譫言獨語而頭疼更加體疼  
此少陰厥陰證脉浮而無汗脉或  
尺寸俱緊者此為

正傷寒當正發其  
汗仲景論服麻黃  
湯只云覆取微似  
有汗不須啜粥論  
服桂枝湯却云服

類聚四十  
三十一

湯已須臾，毀熱稀粥以助藥力。溫服一時許，使遍身藥。熱微似有汗者，益佳。不可使如水流。離病必不除。若一服汗出，差不可再。盡劑，其不輕於劫汗如此，其謹審也。

傷寒可下證治

大法秋宜下，凡可湯勝，圓中病便止，不必盡之。巢氏云：傷寒欲下之，其脉半實宜。摸視手掌澀澀汗出者，便可下。大便已鞭也。

脉

病證云

治

大陽病十餘日，汗下吐後，四五日柴胡證在，先與小柴胡。嘔不止，云嘔止小安。

類聚四十

三十一

陰微

心下急鬱微煩為未解

病未解脉陰陽俱停必先

振慄汗而解但脉陰微者

一云陰實

病發熱汗出不解心中痞

嘔吐下利

傷寒十餘日熱結在裏往來

寒熱者

陽明病汗多者急下之

已上並

屬大柴

胡湯本

方無大

黃欲下

者加大

黃

難淨

實

少陰病下利清水心下痛口

乾者宜大柴胡大承氣湯

腹中滿痛又傷寒後脉沉者

內實也下之

傷寒六七日目中不了了睛

不和無表裏證大便難身

微熱

煩熱汗出則解又如瘧潮熱

不可下若脉虛浮宜汗

遊

陽明病雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘潮熱外欲解可攻裏且手足汗出者大承氣主之若汗多微熱惡寒外未解宜桂枝以熱不潮未可下若腹大滿不通且與小承氣微和胃氣勿令大泄下潮熱大便微鞭者或下之心

病微者宜小承氣湯故云微和之勿大

下懊憹而煩有燥屎可攻若腹微滿初鞭後溏不可攻又陽明病不吐而心煩者可下

泄也病甚者

病譫語潮熱反不能食者胃中有燥屎若能食但鞭耳病下血譫語者熱入血室但頭汗出者刺期門汗出愈若汗出譫語者有燥屎在

氣湯故云下之攻之外臺本無



類聚四十  
三四

胃中此為風須過經乃可  
下下之早言必亂以表虛  
裏實也可下

二陽併病大陽證罷但潮熱  
手足汗出大便難譫語者  
下之愈

下後六日不大便煩不解腹  
滿痛陽明少陽合病下利  
不欲食又寸口脉浮大按

芒硝

弱

之反濇尺中微而濇者皆  
宿食也下之即和

得病二三日無大陽柴胡證  
煩燥心下鞕至四五日雖  
能食以少小承氣和之小  
安至六日可下也

發汗不解腹滿痛急下之  
小便不利大便乍難乍易時  
有微熱喘胃不能臥者胃

已上並  
小大承  
氣湯

有燥屎

少陰病二三日口燥咽乾急下之又病六七日腹脹不大便者又病自利清水色青心下必痛口燥者皆可下

下利三部脉皆平心下鞣者又下利脉遲而滑者內實也利未欲止又下利脉反

滑當有所去皆可下又下利差復發者病不盡也可下

脉雙弦而遲者必心下鞣脉大而緊陽中有陰可下也

大陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解尚未可攻當先解其外湯外解已但小腹結者

桃核承氣

微沉

大陽病六七日表證續在反  
不結胸其人發狂此熱在  
下焦小腹堅滿小便自利  
太陽隨經瘀血在裏

抵當湯  
若身黃小便不利為無血

陽明病發熱汗出此為熱越  
不能發黃身無汗但頭汗  
小便不利渴欲飲水此瘀  
熱在裏又七八日身如橘  
黃小便不利腹微滿者

茵陳蒿湯

陰經亦可下如大陰經腹滿  
時痛溫燥不行亦當溫利  
自陽明出溫脾圓用大黃  
是也少陰可下見前厥陰  
舌卷囊縮急下之

大陽中風下利嘔逆表解可  
攻其人熱兼汗出發作有  
時頭痛心下痞硬引脇下  
痛乾嘔短氣汗出不惡寒

十棗湯

類聚四十  
三

者此表解裏未和

大陽病頭痛發熱盜汗反惡

寒表未解反下之膈痛胃

虛氣動而煩燥心下懊而

鞭為結胸者大陷胸湯但

若頭汗小便不利必發黃

傷寒六七日結胸熱實脉沉

緊心下痛按之石鞭

但結胃無大熱者此為水結

沉緊可用  
浮大可用  
不可

在胸脇但頭微汗出

大陽病重發汗而下之不大

便五六日舌燥渴潮熱從

心至小腹鞭滿而痛不可

近

傷寒五六日嘔而發熱柴胡

湯證而下之證仍在與柴

胡湯蒸蒸而振却發熱汗

出而解若心下滿而鞭痛

已上並

大陷胸

湯

此為結胸

傷寒不可下證治

脉

病證

諸外實內虛	中風汗出煩燥	動氣在上
諸虛大虛太	為陽微脉濡弱	下左不厥
陽病有外證	結胸證脉虛大	與逆無陽
咽中閉塞	陽明病心下牢	陰強而堅
	滿或自汗太陰	
	病腹滿吐食	

濡弱

傷寒病陽氣不足下之則心下痞津液

內渴咽燥鼻乾

浮緊

傷寒榮衛俱病骨節煩疼可汗不可下

大陽陽明合病喘而胸滿

大陽少陽并病心下痞堅頭項強而眩

傷寒五六日不結胸腹濡伏厥者

虛

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐不

弦遲

能始得之手足寒胸中實

厥陰病消渴氣上冲心中疼熱飢不欲

食甚則欲吐

少陽病心下堅滿下之利不止者死

傷寒可吐證治

寸微

大法春夏宜吐頭不疼項不强胃痞堅

氣上撞咽不得息胸有痰可吐

手足厥冷脉乍緊心滿而煩飢不能食

結在胸中

胃上諸實胸中鬱鬱而痛不能食有涎

唾下利日十餘行吐之利即止

反遲  
寸口滑

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐不

能吐宿食在上也

傷寒不可吐證治

四肢厥逆 虛家 新產 脉微

太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣

吐之必內煩也

太陽病皆惡寒而反不惡寒發熱今自

汗出反不惡寒發熱此吐之過也

若得病二日吐之腹中飢不能食三

關細  
數

類聚四十一

三

食甚則欲吐

少陽病心下堅滿下之利不止者死

傷寒可吐證治

寸微浮

大法春夏宜吐頭不疼項不强胃痞堅

氣上撞咽不得息胸有痰可吐

手足厥冷脉乍緊心滿而煩飢不能食

結在胸中

胃上諸實胸中鬱鬱而痛不能食有涎

反遲寸滑

唾下利日十餘行吐之利即止

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐不能吐宿食在上也

傷寒不可吐證治

四肢厥逆 虛家 新產 脉微

太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣吐之必內煩也

關細數

太陽病皆惡寒而反不惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱此吐之過也若得病二日吐之腹中飢不能食三

四日吐之欲食冷物朝食暮吐吐之致也此為小逆

少陰病飲食入則吐心中溫欲吐不能始得之手足寒鬲上有寒飲不可吐下宜溫之

傷寒可溫證治

大法冬可溫藥

傷寒病下之反得下利清谷不止腹滿身疼痛或嘔吐當救裏與治中四逆

等湯

反沉

凡發熱頭痛身體疼痛宜溫其表又太陰證自利不瀉

大陽病下利不渴其藏有寒

沉

少陰病下利不欲食或脈遲下利痛不

弦遲

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐不能始得之手足寒乾口有寒飲又下利脈遲緊為痛未止脈浮大為虛脈



浮革自腹鳴若渴與水必噦皆宜溫之

傷寒可水證治

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈但令不足

太陽病汗後若汗出胃中當稍與之令胃中和則愈

發熱汗出復惡寒不嘔心

下痞渴五苓散主之

傷寒能飲水為欲愈若不渴強與之因此成渴

傷寒不可水證治

傷寒大吐下後外氣怫鬱不可與水與

胃中氣也發汗後尤不可水必噦嘔喘

不可水

發熱惡寒濡弱相搏藏氣不可水漬布

衰微胸中苦煩非結也冷貼之

寸濡

寸浮

誤下後寒氣相搏腸鳴得不可水令汗

水即成餉音噎食不下也 大出水

陽明病潮熱誤下腹滿不皆不可水

能食或胃中虛冷不能

食

浮大而革

下利脉浮大不可水當溫

之

傷寒結胸無熱證者宜平和藥若與水

益令熱不得出當汗而不汗則煩假

令汗出後腹中痛亦服和氣之藥  
傷寒可灸證治

微或促

傷寒六七日無脉手足厥 灸厥陰不溫

煩燥 發喘者死

諸下利 灸足大都五

壯商丘陵泉

各三壯

少陰病吐利手足不逆反

發熱或三日雖口中和灸少陰七壯

類聚 四十

背惡寒

微澁

少陰下利即嘔

灸厥陰五十壯

陰毒陽虛汗出腹脹腸鳴灸關元

面黑指甲青

傷寒不可灸證治

凡微數之脉不可灸因熱為邪必致煩逆有傷筋枯血之患若欲解者當發其汗

太陽病被火必清血陽明必怵惕少陰必小便難若強作之虛煩不得眠咽燥發黃中結下血譫語

太陽病脉浮以火劫其汗血氣流洑潮熱發黃陽盛即衄陰虛即小便難陰陽俱虛渴燥頭汗出腹滿喘口乾咽爛或不大便而噦手足躁擾心下滿小便利可治小便不利不可治也

傷寒可刺證治

類聚 四十

三十四

太陽少陽并病頭痛項強大杼一間肺  
而眩時如結胸心下痞  
肝俞  
堅

婦人中風發熱惡寒經適  
來得之七八日熱除脉刺期門  
遲身涼熱入血室

胸下滿如結胸狀譫言刺期門  
太陽病初服桂枝湯反煩先刺風池風  
而不解者府次服桂枝

頭痛至七日當愈傳經  
已竟也若不愈再傳當  
氣不傳而出  
湯

針  
太陽少陽并病誤汗譫語  
脉弦五日不止  
刺期門  
少陰病下利便膿  
當刺

婦人妊娠七月腹滿不得  
小便腰下重如有水氣  
以利小便  
刺勞營關元

心下實

傷寒喉痺小指後動脈針刺風厥  
入三分補之

傷寒不可刺證治

病與相逆者 大渴 大飽 大飢

新內 大怒 大勞 大醉 大驚

漉漉之汗熇熇之熱渾渾之脈身熱  
甚陰陽交爭

傷寒熱病不可治形證

三部脈陰陽俱虛熱不止者不治陰陽俱  
盛大汗出不解者脈至乍數乍踈者譫言  
身熱脈浮大手足溫者生脈沉細手足逆  
冷者不治欬而上氣脈散者得汗脈沉  
小者生脈浮大者不治譫言直視而喘者  
下利厥逆燥不能卧者發熱下利至厥不  
反者惡寒踈而利手足逆者五六日脈微  
細沉但欲卧汗出不煩時自吐利復煩燥  
不得卧者六七日喘息高者發汗不出若

大瀉發者泄而腹滿甚者目不明熱不已者老人小兒熱而腹滿者汗不出嘔血者舌本爛熱不已者欬血而衄汗不出出而不至足者髓熱者熱而瘕首熱病腰折瘕瘕齒噤者下利後脉絕手足厥者四逆惡寒脉不至不熱而躁者熱病而脉代者一日死二三日身熱腹痛頭痛飲食如故脉直而疾八日死三四日熱病腰以下不汗脉大疾者生脉細小者熱病四五日頭不

熱腹不痛而吐脉微細者十二日死熱病七八日脉微小便如墨口乾脉代舌焦乾黑者或便血口中乾一日半死或脉不躁不數後三日中有汗三日不汗者死熱病七八日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉來壘壘按不彈手時大心下堅者至十七日不治熱病脉盛躁得汗者生已得汗脉尚躁盛陰之極也死若脉常盛躁而不得汗者陽之極也死熱病已得汗體

熱不去者熱病而瀼瀼大熱脈細小者熱病下利不止腹痛甚者皆不治

傷寒熱病兩感證候

傷寒熱病或愈或死其死皆以六七日間其愈皆以十日以上何也夫大陽爲諸陽主氣其脈連於風府傷於寒爲熱病熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死夫兩傷於寒病者一日則太陽膀胱經與少陰腎經俱病故頭痛口乾煩滿而渴二日足陽

明胃經曲足太陰脾經俱病則腹滿體熱不食譫語三日則足少陽膽經與足厥陰肝經俱病則耳聾囊縮水漿不入不知人六日而死是表裏臟腑俱病故曰兩感然三陽有合病併病三陰無合病人皆不知五運時行民病脈病證治圖

五運六氣乃天地陰陽運行升降常道也天有六氣寒暑燥濕風火之化人以三陰陽而上奉之地有五行金木水火土之形

人以五藏五府而下應之五運流行故有  
 大過不及之異六氣升降則有逆從勝復  
 之差凡不合於德化政令者則有災青東  
 方生風風生木其德敷和其皆能病人隨  
 化生榮其政舒啓其令風也  
 人藏氣為病之謂時氣與感冒中傷天行  
 疫疹不同前知聖天地有餘不足違戾之  
 氣民病所感各以五味所勝調和以平為  
 期

陽六壬六戊六甲六庚六丙歲乃木八

火七 土十 金九 水六 大過為五運先

天對化從  
標成數

陰六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木三  
 火二 土五 金四 水一 不及為五運後  
天正化從  
本生數

丁六丁天時歲氣燥氣乃行生氣不政涼雨  
 壬歲歲木 而實木  
 氣不及地氣 民病肝木受邪病則胠脇滿小



木之化圖

六壬天時

歲木

大過地氣

腹痛腸鳴湧泄 肺金勝肝木  
火為木子來復克金反寒濕瘡  
傷癰腫咳血夏則大熱濕變為  
燥草木枯下體再生

歲氣風氣流行生氣淳化萬物  
以榮其變震拉摧拔

民病脾土受邪病殮泄食減體  
重腸鳴腹痛脇滿 肝木克脾  
土金為土子來復能勝木反脇

戊癸歲火氣化之圖

戊六戊天時

癸歲火

歲大過地氣

痛而吐甚則衝陽絕者死

歲氣陰氣內化其變則炎烈沸  
騰

民病肺金受邪發瘧少氣喘咳  
血溢泄瀉胸脇滿身熱背脊骨  
痛 心火克肺金水為金子來  
復能勝火反狂妄喘咳血溢泄  
瀉甚則大淵絕者死

六癸天時 歲氣寒乃盛行火令不政物生

類聚四十一  
四十一

歲火 不及地氣 不長陽氣屈伏蟄虫早藏  
民病心火受邪胸脇肩背痛鬱  
冒暴瘖臂痛 腎水勝心火土  
為火子來復能克腎反寒中泄  
注腹痛攣痺

注腹痛攣痺

甲六甲天時 歲氣雨濕流行至陰內實物化

己歲土 充成其變震驚飄驟崩潰

歲大過地氣 民病腎水受克腹脹清厥體重  
甚則中滿足痿脚痛四不肢舉

氣

土化之圖 六己天時 歲氣風寒大作雨乃愆期草木  
秀而不實 脾土克腎水木為水了來復克  
土反溇泄甚則大谿絕者死

歲土地氣 民病脾土受邪飧泄亂體重

腹痛肌骨痠 肝木克脾土

金為土子來復克水反胸脇暴

痛下引小腹

六乙天時 歲氣炎火盛行生氣乃用燥石

流金

乙庚歲金地氣民病肺金受邪背肩脊重鮑血

歲金不及血便注下心火克肺金水為

金子來復能勝火反心腦頂痛

發熱口瘡

化六庚天時歲氣燥行天氣潔池氣明湯氣

之歲金隨陰肅殺凋零

圖人過地氣民病肝木受邪腹脇痛引小腹

口赤身重耳聾甚則喘逆肩背

足膝痛肺金克肝木火為木子  
復克金反心痛肱脇痛咳逆大  
衝絕死

丙六丙天時歲氣天地寒凝其變冰霜雪雹

辛歲水地氣民病心火受邪熱躁陰厥甚則

歲火過腹脹脛腫喘咳腎水克火脾

為火子來復克水反溇泄甚則

神門絕者死

化六辛天時歲氣水泉減草木茂

類聚四十一  
四十二

之歲水地氣  
圖不及

民病腎水受邪腫重泄瀉腰膝  
痛陰厥跗腫腎氣不行 脾土  
克水木為水子來復克土反面  
色時變筋肉瞶瘈心膈痛

六氣時行民病脉病證治圖

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有  
紀地利之應標本不同悉應異象逆順變  
生太過不及悉能病人皆天氣運動之所  
為也但推之曆日依節交氣此迺地之陰

陽靜而守位者常為每歲之主氣曰地氣  
又曰本氣其寒暑燥濕風火者六氣之常  
紀也氣應之不同者又有天之陰陽動而  
不息者輪行而居主氣之上曰天氣又曰  
客氣乃行歲中之天命其所至則又有寒  
暑燥濕風火之化主氣則祇奉客之天命  
客勝則從主勝則逆二者有勝而無復矣  
今先次地理本氣然後以天氣加臨為標  
隨氣主治則悉見病源矣

木	大寒後至	為一主氣	春分至小	為二主氣
厥陰風木	風氣流行	滿	君德之象	少陰君火
氣	春分	萬物發生	不司炎暑	
圖	暑	小暑至大	少陰相火	大暑至秋
		為三主氣	分	為四主氣
		暑化用事	炎暑乃行	濕化用事
		陽明燥金	太陽寒水	雲雨蒸濕

秋分至小為五主氣小雪至大為六上氣  
 雪 燥化用事 雪 寒化用事  
 清涼乃行 嚴凝乃行

凡一氣所管六十日八十七刻半上以天  
 之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下  
 合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵  
 源不可不深明之蓋天氣始於少陰終於  
 厥陰經曰少陰所謂標厥陰所謂終也地  
 氣始於厥陰終於太陽經曰顯明之右君

火之位者其緒是也所謂六氣之源同六氣之緒則異不同之緒乃天真坤元二氣相因而成也

大陽

天氣 本氣

天時 氣早暖草早

初氣少陽火加厥陰

榮瘟疫至

司天 木

民病 身熱頭疼嘔

吐肌湊瘡瘍

二氣陽明金加少陰

天時 天涼反至草

辰火

乃遇寒火氣遂抑

民病 氣鬱中滿風腫

戊三氣太陽水加少陽

天時 寒熱不時寒

火

氣間至熱爭冰雹

民病 寒反熱癰疽

歲

注下 心熱悶吐利

四氣厥陰木加大陰

天時 風濕交爭雨

氣土

生保虫木盛生風雨

摧拔

類聚四十一  
四十五

寒

化五氣少陰火加陽明

金

圖

太陰終氣太陰土加太陽

水

民病 大熱少氣足

痿注下赤白血滯成

癰

天時 濕熱而寒客

行主令

民病 民氣乃舒血

熱妄行肺氣壅

天時 地氣正濕令

行凝陰寒雪

泉在

陽明

天司

卯

初氣太陰土加厥陰木

治用甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝三因靜順湯

民病 悽慘孕死脾更濕肺肚腎衰

大時 陰凝氣肅水

乃冰寒雨化花開遲

民病 下克上病熱

脹面目浮腫衄噎嘔

吐小便赤甚則淋

類聚四十一

四十五

酉二氣少陽火加少陰天時 此臣居君位

涼風間發大熱早行

歲 民病 疫病大至善

暴死

氣 三氣陽明金加少陽天時 燥熱交合涼

風間發

燥 民病 上逆下冷瘧

利心煩悶不食

天時 早秋寒雨害

化 四氣太陽水加太陰民病 下克上必暴

仆妄言少氣咽乾心

圖 土之氣之氣其氣

痛瘡瘍寒瘧骨痿便

血絲

五氣厥陰木加陽明天時 春令反行草

木盛生雨生介虫

民病 氣和熱行包

陰太 絡面浮上壅



在泉

終氣少陰火加太陽水

天時氣候反溫蟄虫出流水不冰此下克上

民病伏邪溫毒季春發疫

治用鹹寒以柳火辛苦以助金汗之清之散之安其運氣

少陽

初氣少陰火加厥陰氣流行

天時熱風傷人時

司天

木

寅火 二氣太陰土加少陰

民病溫氣七血溢目赤欬逆頸疼血崩脇滿膚瘡

天時時雨至火反鬱風不勝濕

民病熱鬱咳逆嘔吐頭疼身熱胸中不利昏憤瘡膿

天時暴熱草痿河

申三氣少陽火加少陽

乾濕化炎布大旱

火

民病熱聾瞑血溢

歲

膿瘡欬逆鼻衄發渴

喉痺目赤善暴

氣四氣陽明金加太陰

天時涼風至炎暑

土

未去風雨及時

民病民氣和平身

重中滿脾寒泄瀉

五氣太陽水加陽明

天時陽去寒來雨

化金

降木凋

民病民避寒邪君

子周密病則骨痠目

赤痛

天時地氣正寒風

飄揚萬物反生寒氣

至雨生鱗虫

民病代關節不禁心

厥陰

終氣厥陰木加太陽

泉在

水

腹痛陽氣不藏

治法鹹寒平其上辛溫治其內宜酸滲  
之泄之漬之發之三因升明湯

大陰

初氣厥陰木加厥陰  
天時 大風發榮雨  
生毛虫

天司

民病 血溢筋絡拘  
強關節不利身重筋  
痛

二氣少陰火加少陰  
天時 大火至天下

丑火

疵癘以其得位行令

未

若溫蒸相搏雨時降  
民病 瘟疫盛行遠  
近咸若  
天時 雷雨電雹地

歲火

氣騰濕氣降  
民病 身重胛腫胸  
腹滿感寒濕氣

氣

天時 炎熱沸騰地  
氣升天氣否膈濕化

類聚四十一

五十九

濕四氣少陽火加太陰

不流

土

民病 腠理熱血暴

化

溢患瘡心腹膜脹甚

火

則浮腫

圖五氣陽明金加陽明

天時 大涼霜早降

金

寒及體

太陽

民病 皮膚寒

陽終氣太陽水加太陽

天時 大寒凝冽

水

民病 關節禁固腰

泉主

土

腫痛

治用酸以平其上甘溫治其下以苦燥

之溫之甚則發泄之三因備化湯

少陰

初氣太陽水加厥陰

天時 寒風切列霜

天司

木 厥少創火厥心

雪水冰蟄復藏

子

民病 關節禁固腰

腫痛中外瘡瘍

天時 風雨時寒雨

二氣厥陰木加少陰

生羽虫

午

火原烈劍木增少烈

民病也淋氣鬱於上

而熱令人目赤寒雨

天時大火行熱氣

特生羽虫不鳴燕百

舌杜宇之類

民病厥熱心痛寒

熱更作咳喘目赤

天時大雨時行寒

熱互作

歲

三氣少陰火加少陽

火原大烈木增少烈

氣

四氣太陰土加太陰

土

熱	化金	圖	明陽
五氣少陽火加陽明	天時 溫氣乃至初	天時 燥寒動切火	終氣陽明金加太陽
民病 黃疸鼻衄隘	冬尤暖萬物乃榮	春為瘧	尚慾毒寒暴至
乾吐飲	民病 康安伏邪於	天時 燥寒動切火	民病 上腫咳喘甚

泉在

則血逆溢下連小腹  
而作寒中

治用鹹以平其上苦熱以治其內鹹以  
奠之苦以發之酸以收之正陽湯

厥陰

初氣陽明金加厥陰天時 寒始肅客行

木

主合殺氣方至

民病 寒居右脇氣

滯脾虛胃壅

天司

二氣太陽水加少陰天時 寒不去霜雪

巳火

冰殺氣施化草焦寒

雨數至

民病 熱中氣血不

升降

三氣厥陰木加少陽天時 風雨大作雨

火除大劍上生羽虫

民病 淚山耳鳴掉

眩

歲

四氣少陰火加太陰

天時 熱氣反用山

氣土

澤浮雲暴雨溽濕

風

民病心受邪黃疸而為肘腫

化金

天時燥濕更勝沉陰乃布風雨乃行

圖

民病寒氣及體肺受風脾受濕發為瘡

陽少水

天時畏火司令陽乃火化蟄虫出現流

終氣少陽火加大陽

泉在

水不冰草木乃生

民病瘟癘心腎相

制

治用辛涼平其上鹹寒調其下畏火之氣無妄犯之三因敷和湯

疫

疫病四時皆有不正之氣春夏有寒清時秋冬有暄熱時一方長幼春三月其源從厥陰肝涉足少陽膽之氣始

發少陰腎之氣始衰陰陽怫鬱於腠理腑  
 臟受厲而生病發熱腰痛強脚縮不伸目  
 眩增寒復熱項直筋急背強眼赤黃欲轉  
 名青筋牽腑虛則為陰邪所傷故發熱藏  
 實則為陽毒所損故憎寒三因方見治法  
 夏三月病從少陰太陽之氣相搏則榮衛不  
 通皮肉痛起大陽發動少陰淫邪之氣因  
 而作癘則臟腑隨時受夏疫病也腑虛則  
 為陰邪所傷則寒戰若藏實為陽毒所侵

則肉熱三因見治法戰掉肉熱口舌乾破  
 咽塞聲嘶名赤脉攢

四季各十八戊巳日其病從大陰陽明相格  
 寒濕不調關節格滯頭重頸直有結核起  
 於喉中布熱毒於皮肉之中熱不斷名  
 黃肉隨腑虛則皮肉強痺藏實則布毒熱  
 於皮膚三因見治法

秋三月源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣  
 病乍寒乍熱損肺傷氣暴咳嘔逆或作熱



癸斑喘咳引氣名白氣狸腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱癸斑三因見治法

冬三月源從足太陽少陰相搏瀉積壅塞病裏熱外寒喜受火而反引飲腰痛如折胸脇切痛不得轉仄熱彭彭服冷多則洞泄名黑骨溫腑虛為陰毒所傷則裏熱外寒藏實為陽毒所損則彭彭發熱三因見治法

料簡諸疫證治

凡春分以前秋分以後天寒當清寒反溫暖民病溫疫春分以後秋分以前天氣合溫熱反清寒民病寒疫治之不可拘日數汗下此且據方論一體而分既有寒溫二疫風濕亦當論之昔京師大疫汗下皆死服五苓散而愈蓋濕疫也如冬當寒而溫暖春必患溫疫春合溫而清涼夏必患燥疫夏合熱而寒秋必病寒疫秋合清而反淫雨冬必病溫疫矣

况疫之作皆始於穢惡或地多死氣溝渠熏  
 蒸世謂獄温墓温廟社温山温海温家温竈  
 温歲温天温地温等古有辟禳法 三因屠  
 蘇酒 太乙流金散燒熏 人參敗毒散方  
 論 應夢人參散方論 聖散子方論治寒  
 疫 喝起散 五苓散 香蘇散

傷寒頭痛

三陽經受風寒伏留不去所致然傷寒頭  
 痛雖屬三陽惟大陽經獨多蓋大陽為病

屬表而頭痛專為主表雖有傷寒六七日  
 頭痛不大便有熱者而與承氣湯下之者  
 却云若小便清者知熱不在裏仍在表是  
 知頭痛屬乎表者明矣太陰少陰二經之  
 脉從足至胸而還不上循頭故無頭痛簡  
 易云少陰亦有頭痛連齒之證以腎所自  
 生也若厥陰頭痛甚或痛甚入連於腦而  
 手足寒者又為真病矣大陽頭痛汗出惡  
 風為中風頭痛無汗惡寒為傷寒內因頭

痛作止有時外所因頭痛常常有之直須傳入裏實方罷

脉

病證

治

浮緩大陽證

傷風頭痛汗出發

桂枝湯解肌輕

熱惡風不惡寒

者柴胡桂枝湯

敗毒散獨活散

浮緊

傷寒頭疼無汗發

麻黃湯發汗輕者

熱惡寒不惡風

桂枝麻黃各半湯

麻黃葛根湯人參

浮

風

自汗服桂枝不中

桂枝湯

衄後脉

病桂枝病尚在

已微不可用桂枝

必頭疼甚必致湯

衄小衄而脉尚

浮者

若已發汗或未汗

連鬚葱白湯不止

頭痛如破者

者葛根葱白湯

或浮而沈

中風下利吐逆表

十棗湯表未解

已解不惡寒身慎不可用又當用  
熱頭疼心下痞大柴胡湯  
滿脅疼乾嘔短  
氣汗出裏未和  
也

尺寸

風溫證頭疼身熱宜萎蕤湯若身灼  
自汗身重息喘熱者知母乾葛湯  
其形不仁嘿嘿加渴其括樓根湯  
欲眠治在少陰脉浮身重汗出漢

俱浮

厥陰不可汗汗防已湯  
者死

寒傷寒頭項痛無汗桂枝湯去桂加茯  
苓翕發熱小便苓白朮  
不利

浮細

頭項強痛惡寒十脉若但浮者麻黃  
日已去脉浮細湯脉若沉細欲寐  
而嗜臥此太陽少陰証也四逆湯  
證已解設胸滿若身重喜眠唇瘡

浮長陽明經

腹痛者小柴胡作狐惑證治之湯

頭疼有熱不惡寒調胃承氣湯陽明

反惡熱或不人氣實故攻頭

便胃實也

大陽陽明頭疼有宜桂枝湯汗之若

熱不大便六七頭痛必衄尚屬桂

日是裏證可下枝湯

小便却清是仍

浮

沈細

在表未可下

若心下滿不食大

便硬當下而頭

汗出微惡寒手宜小柴胡湯

足冷却當汗此

兩證俱見是半

表半裏

頭疼身熱二三四

五日熱氣深方

沉伏按之而滑熱為裏有

發厥至半日却白虎湯 承氣湯

潮熱或畏熱飲隨證施治

水煩躁不眠大

便秘小便赤外

證多昏憤者熱

厥也

十日後頭重如戴用竹葉石膏湯頭

千斤乍冷乍熱輕唇暖咽鬲通暢

氣塞脣寒面青得汗解

虛

浮長

累日不食或作王自正道士得効

陰證欲服桂枝

者忽神明耳報

太陽陽明頭疼身

熱口燥但嗽水升麻湯

不欲入咽者必

大

若無表證無寒

熱腹滿唇燥但輕犀角地黃湯甚

有嗽水瘀血必則抵當湯黃芩湯  
發狂

長浮大而

太陽陽明合病必升麻湯汗之不惡

下利其頭疼腰寒反惡熱大便不

痛肌熱耳痛秘又以白虎湯解

葛根湯又鼻乾利之

不得臥尚惡寒

當以

若不惡寒反惡熱

大便秘或譫語調胃承氣湯下之  
此胃實也

弦細少  
陽經或  
緊

頭疼發熱或口苦小柴胡湯主之不

咽乾目眩或脉可汗汗則譫語是

細頭疼嘔而發屬陽明為胃不和

熱此太陽病未加煩躁調胃承氣

解轉入少陽膽湯此少陽陽明也

虛亦頭疼

弦浮大而

太陽少陽合病自黃芩湯嘔加半夏

太陰 經少 陰

下利頭疼胸滿 或寒熱往來 生姜

頭不疼身不熱 有反發熱而無頭 疼

傷寒一日大陽少 陰合病頭疼口 乾煩滿而渴 若下利不止身疼 當救裏四逆湯若 身疼痛小便清當 救表桂枝湯

微緩厥 陰經

有頭疼而無發熱 若頭疼乾嘔吐而嘔屬陽明宜小 柴胡湯

霍亂頭痛發熱身 疼欲飲水 五苓散寒多不用 水者理中圓

洪盛 暑

夏月發熱惡寒頭 疼肢節重痛 有汗桂枝湯 石膏湯無汗麻黃 湯加煩躁大青龍 湯冬月正初可用



正方

然春末夏初藥  
須帶涼三者見  
加減否則不無  
發黃出斑之失  
石膏二兩或加升  
麻半兩蓋桂枝麻  
黃性熱南方地暖  
非西北方之比

洪盛

夏月頭疼惡寒心  
五苓散

下煩躁不快

夏至前頭疼發熱  
惡寒身體痛此  
乃冬傷於寒春  
暖而發名曰溫  
病非疫也  
升麻湯解肌湯柴  
胡桂枝最良熱多  
小柴胡湯不渴微  
熱小柴胡加桂枝  
嗽者小柴胡加五  
味子或煩渴不惡  
寒虛煩並竹葉石  
膏湯

陽濡弱  
陰小急  
濕

頭目疼痛兩脛逆木附湯白虎加蒼  
冷胸腹滿妄言木湯不可汗汗出  
多汗者此傷濕不能言名曰重暍  
中暑治在太陰者死  
為濕溫證

細緩

脚氣證頭疼身熱治法見風濕脚氣  
肢節痛大便秘門  
或吐逆脚弱  
頭中寒濕頭疼鼻瓜蒂末口含水以

沈細  
弦疾

塞而煩眩暈  
一字許搐其鼻出

陰毒證頭疼腰重灸氣海關元  
腹痛眼睛疼四用葱熨法白木  
肢冷身倦額上散附子散正陽散  
手背冷汗不止等藥  
煩渴恍惚

緩弱

陰陽易證頭重不  
舉眼花四肢拘當歸白木湯乾姜

急小腹絞痛手湯  
足攣裏急熱上

冲胸

緊而不

非次頭疼胸滿發瓜蒂末乙錢煖水

寒熱此膈上有調下吐涎愈

痰

人迎平  
和氣口  
緊盛

傷食頭疼發熱惡膈實嘔吐者食在

寒而身不痛此胃上腕宜吐之心

脾胃伏熱因食腹滿痛宜下之

不消發熱似傷  
寒却身不痛為  
異

治中湯五積散  
黑神丸可選用

傷寒頸項強 附項背強

太陽脉起於目內眥上額交巔入腦還出  
別下項循肩臂內俠脊抵腰太陽經感受  
風寒則頸項強急者表證也

脉

病證

治

沉遲

太陽病項背強几

類聚四十一

弦細

凡<sup>殊音</sup>汗出惡風桂枝加葛根湯無發熱為表虛可麻黃

解肌

太陽病項背強几桂枝湯加葛根麻几無汗惡寒為黃表實可發汗

太陽中風項強口柔痙小續命湯去噤背反張發熱麻黃又桂枝加若汗出不惡寒葛根湯

浮細

心下硬痛為柔剛痙桂枝加葛根痙若無汗惡寒去麻黃為剛痙

太陽病頭項強惡寒嗜臥外已解麻黃湯

傷寒無汗翕翕發桂枝湯去桂加茯苓熱頭項強痛小苓白朮便不利

類聚四十一

六十七

沉遲

傷寒四五日身熱

惡寒頸項強腹小胡柴湯

下滿手足溫而

渴

陰毒手足冷背強陰毒甘草湯

咽痛腹痛知氣

四肢厥吐嘔下白朮散附子散

利身痛

身重背強腹中痛桂枝加芍藥生姜

反沈遲

咽喉不利或汗人參新加湯

後身痛作陰毒

太陽病項背強几

几然此為瘧雖桂枝加枳椇湯

背項強然太陽

病表證皆當發

散

結胸病亦項強下之則和火陷胸

如柔痙狀湯

沉緊

傷寒眩暈

傷寒頭眩者或謂眩暈或謂眩冒或謂昏  
冒即頭眩也少陽與太陽併病頭項強痛  
或眩冒者責其虛也皆發汗吐下後所致  
是知其陽虛也經云上虛則眩下虛則厥  
眩雖為虛而風家亦有眩風主運動故也  
少陽為病口舌咽乾目眩以少陽居表裏  
之間表邪所傳漸行於裏表中陽虛故時  
時目眩也陽明中風但頭眩不惡寒者故

能食而欬其人必咽痛是風亦主頭眩而  
非逆也逆則發汗劇者言亂目眩者死矣

脉

病證

治

傷寒發汗多頭眩防風白朮牡蠣湯

汗出筋惕肉瞤次服建中湯

為逆

諸嘔噦心下堅痞小半夏茯苓湯赤

鬲有水痰眩悸茯苓湯

頭疼眩暈鼻塞而瓜蒂散

煩此頭中寒濕

太陽病發汗不解

發熱心悸頭眩真武湯弱甚去芍

身瞤動欲擗地藥少與之

者或虛弱人微

汗或過汗即身

瞤動搖

若惡熱藥或有熱

證真武湯去附茯苓桂枝白朮甘

子依本方加減草湯

若吐下後心逆

氣冲頭眩脉沉

緊發汗則動經

身為振搖

傷寒目疼

目決其凹者為兌皆屬少陽近鼻上為外

皆屬太陽下為內皆屬陽明赤脉從上下

者太陽病從下上陽明病從外走內者少

陽病此三陽病不可混也

脉

病證

治

太陽陽明病頭疼

腰痛肌熱目疼升麻湯

鼻乾尚惡寒

不惡寒反惡熱

白虎湯解利

大便不秘

調胃承氣湯

大便若祕譫語

者

陽明病身熱目疼

鼻乾不得臥

二證見頭痛門

濕溫病頭目痛

目運心煩骨節疼先服大橘皮湯

煩惡寒食即吐吐止後服小建中

湯

目眩發煩必衄及

目直視不能瞬二證見鼻衄門

不得眠而衄



下利頭疼腰痛肌見頭痛門

熱目疼

少陽病兩耳聾目

赤胸滿而煩為

中風口苦咽乾

目眩為傷寒

少陰病目不能閉

嘿嘿欲眠其聲見活人一百門

噎或咽乾為狐

沉細弦疾

蠲證

頭疼腰重腹痛眼宜辛熱之藥見頭

睛疼四肢冷疼門

汗不止煩渴

眼中生花身熱頭

重四肢急小腹三因燒裊散等

滿手足拳名陰

陽易

傷寒耳聾

耳者腎之所候腎氣實則精氣上通聞五音而聰矣精氣虛則風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷候其顴頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽脉動厥而聾者耳中輝輝焯焯也手大陽脉動厥而聾者耳內氣滿也熱壅加之出血出膿則成停耳底耳氣厥耳聾尚易治精脫耳聾不易藥治也

脉

病證

治

浮

大陽病七八日惡無熱人用甘草芍風反發汗氣虛藥附子湯素有熱耳聾陰陽俱虛人黃芪建中湯

少陽病兩耳聾目赤胸滿而煩為胡湯少陽證具用小柴

中風

少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥此兩感證

短尺寸沉

厥陰榮衛不通耳

聾囊縮不知人承氣湯

危矣

陽濡弱

濕溫語治在太陰

不可汗汗則不

能言耳聾不知

病處

陰小急

身青面色變名曰白虎湯加蒼朮

重暍

傷寒口噤

附口不仁口燥舌乾

口燥

口者足太陰脾經所主五味入口藏於脾胃運化津液以養五藏之氣氣或偏勝諸疾生焉且鹹則為寒酸為停滯澁則因燥淡則由虛熱則從苦從甘

脉

病證

治

沉細

太陽病柔痙則發仰面而臥為陰小

熱搖頭口噤背續命湯二痙通治

反張汗出不惡或去麻黃加乾葛

類聚

七十三

弦遲

寒

剛痺則癩癢口仰目者為陽大承  
禁胸滿無汗惡氣湯熱而瘧者必  
寒臥不著席脚死

攣急咬齒

陽明病渴欲飲水

白虎加人參湯咽

口噤舌乾

乾不可汗

少陽病口苦舌乾

小柴胡湯

若三陽合病無

沈伏而滑

熱厥應下而反發

大熱背惡寒口

中不仁口燥舌

皆當白虎加人參

乾或汗而譫語湯

下之而額汗手

足冷自汗

病不解發渴口燥

而煩欲飲水或五苓散

小便不利

滑實沉  
遲

汗必口傷爛赤  
承氣湯

此頭上有汗手  
雖冷爪却溫

少陰病表裏多無

熱背惡寒口中  
附子湯或灸之

和以此別之

若發熱脉沉

麻黃附子甘草湯  
或麻黃細辛附子  
湯小發其汗

沉緊而  
數

少陰病口燥舌乾

為裏有熱急下  
大承氣湯或薤白

之或二三日口  
湯 四逆散

燥咽乾或腹滿

不大便成下利

清水心下痛口

乾有積証

口不欲食頭汗出

惡寒手足冷心有表裏證

細

下滿大便反鞭

為陽微結

血證病人如熱狀

煩滿口燥反無

詳見腹脹滿門

熱為陰伏

傷寒口瘡以其表

裏俱虛熱不已

毒氣熏上焦

傷寒舌

舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒  
 三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或  
 燥或澁或黃或黑是數者熱氣有淺深不  
 同邪氣在表舌上即無胎在裏則津液結  
 而舌生胎或邪在半表半裏或邪客胸中  
 舌上胎白而滑者經云此丹田有熱胸上  
 有寒邪初傳入裏者也

脉

病證

治

少陽明病脅下脹小柴胡湯邪在半

滿不大便而嘔表半裏也  
舌上白胎

太陽病若下之則梔子豉湯邪客胸  
胃中空虛客氣中也

動膈心中懊憹  
舌上胎

藏結宜若可下若  
舌上胎滑未可  
攻此邪未全成

熱猶帶表寒及  
邪傳為熱則舌

胎不滑而澁經  
云傷寒七八日

不解熱結在裏  
表裏俱熱時時

惡風大渴舌燥  
而煩欲飲水數

升者是熱耗津

液而滑者乾澀

矣  
白虎加人參湯

若熱聚於胃則

舌黃是熱已深

金匱曰舌黃未

下者下之黃自

去若舌上色黑

者又熱之極經

曰熱病口乾舌

陽浮

關小

沉緊

黑者死以心君  
不開竅於舌黑為  
部也  
腎水見心火之

部也  
當效藥

凡舌捲焦黑內外

結熱鼻中如烟

見鼻衄門

舌上盡白唇黑有

瘡齒無色四肢

桃仁湯黃連犀角

湯雄黃銳散



重喜眠名醫病

傷寒唇

唇者脾之所主其經起於鼻環於唇其支  
脉絡於脾脾受邪則唇病風勝則動寒勝  
則揭燥熱勝則乾裂氣鬱則生瘡血少則  
瀦汁也而無色內則理脾外當敷藥

脉

病證

治

不發寒熱胸滿唇  
口燥嗽水不欲

微而沉

入咽必衄證也

並見衄門

不發寒熱唇燥小  
腹滿小便反利  
大便黑身黃發  
狂

唇黑有瘡舌白四

支重喜眠

見舌門

沉細

陰證胸膈滿而色理中湯加青皮陳  
及唇皆無色澤手皮 枳實理中元

足冷

傷寒咽乾 附咽喉疼痛

陽明病有口燥咽乾少陽病有口苦咽乾少陰病有口燥舌乾咽痛毒氣上熏或生瘡咽喉先痛次下利作腎傷寒治

脉

病證

治

腹滿咽乾手足自口燥咽乾腹滿不温 <small>見腹滿門</small>	大便 <small>見腹滿門</small>
口苦咽乾脇下滿腹滿咽乾或口燥	

發熱 見脅滿門

舌乾而渴 見腹滿門

口苦咽乾目眩 見目疼門

咽乾煩燥厥逆嘔吐 見嘔吐門

口燥咽乾渴欲飲水 見渴門

頭疼胸滿口苦咽乾寒熱而嘔 見嘔吐門

欲眠目不閉其聲喑或咽乾 見目門

發躁狂言面赤咽痛身斑如錦 見下利門

手足冷腹痛咽喉痛吐利 見腹門

汗出咽痛吐利熱四肢拘攣厥逆惡

寒 見自汗門

面赤斑如錦紋咽喉痛唾膿血下利  
赤黃陽毒証 陽毒升麻湯 大  
黃散

手足厥冷或吐利而咽中痛此少陰

証不可汗 甘草湯 桔梗湯

通脉四逆去芍藥加桔梗湯 麻

黃升麻湯

傷寒面赤 附面垢面赤

難經云人面獨能耐寒者以諸陽之脉皆  
上至頭黃帝於面焦髮墮獨言陽明不言  
諸陽者蓋陽明之脉維絡於面也

脉 病證 治

大陽証小發汗面

色赤者汗出不麻黃湯  
徹也

洪實浮

陽毒証發躁狂言 亭歷苦酒湯陽毒  
面赤咽痛身斑 升麻湯 梔子仁

下利赤黃

湯酸苦之藥

沉微而身微熱煩燥面赤

身微熱者裏寒也煩躁者陰盛也面赤戴陽下

四逆加葱白

虛也

面赤身痒有熱

桂枝麻黃各半湯

微弱

中暑背寒面垢如塗油著塵手足

沉疾而細

微冷煩渴口燥白虎湯  
四肢倦怠却不重痛

面赤指甲青黑或鄭聲陰毒証

傷寒鼻乾

附鼻衄出血通見傷寒蓄血門

鼻衄者鼻中出血是也雜病衄者真熱在裏傷寒衄者實熱在表何以言之病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅於鼻血得熱

則散隨氣從鼻中出爲衄是雜病者責在裏熱也經曰傷寒脉浮緊不發汗因致衄者宜麻黃湯傷寒不大便六七日頭痛有熱與小承氣湯其小便清知不在裏仍在表也當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯以此知傷寒衄者責其表熱也然以桂枝麻黃二湯治衄者非治衄也卽是發散經中邪氣耳若邪氣不得發散擁逼經血因致衄矣卽非桂枝麻黃湯專治衄也

千金翼曰吐血有三種一曰肺疽二曰傷胃三曰內衄吐血家旣云內衄則鼻中出血可謂外衄是經絡之血妄行也然衄血皆由陽盛如經曰少陰病但厥無汗而強汗之必動其血或從口鼻目中出是名下厥上竭爲難治衄家雖爲邪熱在經而又不可發汗若但頭汗出身無汗又汗出不至足者死

脉

病證

治

浮弦大陽明中風短氣腹

滿心脅痛鼻乾

不得汗喜卧身

黃小便難潮熱

而噦

小柴胡加茯苓

大陽陽明合病必

下利頭疼腰痛葛根湯

肌熱目痛鼻乾

陽毒証鼻中如烟

洪大

浮緊

煤內外結實舌

卷焦黑

大陽病發衄者欲

解也凡脉浮緊

無汗服麻黃湯

不中病發煩目

瞑劇者必衄小

衄而脉尚浮緊

者

新井花水漬布洗

之

宜再與麻黃湯

後脉微不可服

浮

若脉浮自汗服桂

枝湯不中病必宜再與桂枝湯

頭疼甚而致衄後脉微不可服

小衄而脉尚浮

脉已微者黃芩芍

藥湯犀角地黄茆花湯

湯衄不止者

若衄而渴心煩飲先服五苓散次服

則吐水竹葉湯

浮緊

血家法不可汗脉

微故也當和解

之汗則必額陷小柴胡和解之

目直視不得眠

但當

陰陽俱

風濕病自汗身重萎蕤湯

多睡鼻息如鼾

傷寒四肢疼

附逆冷向急厥逆手足逆冷手足攣拳

脉

病證

治

沉弱

太陽病發汗多四肢微急難以屈桂枝加附子湯  
 伸惡風小便難桂枝湯  
 自汗

厥陰病大汗出或小陰咽痛復吐利熱不去內拘急四肢疼下痢四逆湯  
 厥逆惡寒

沉疾

陰毒四肢厥逆腹臍痛身如被杖或吐利急灸臍復其陽  
 甘草乾姜附子以

陰証四肢厥逆額上背冷汗出者亡陽也  
 四肢沉重唇黑有瘡或如傷寒四見欲眠門



肢沉重忽忽喜眠

少陰証四肢沉重

疼痛嗽咯小便真武湯

不利或自下利

而咳

四肢拘急吐利汗

出發熱惡寒手四逆湯

足厥逆

風溫証四肢不收

嘿嘿欲眠頭疼萎蕤湯

身熱自汗體重

而喘

四肢厥逆腹中痛四逆散加五味子

或泄利而咳或卓姜

悸或小便不利

手足逆冷或熱多

厥小或厥多熱熱多寒少門

微細

沉遲

少

手足冷大小便利

白通湯

鄭聲

表熱裏寒手微厥

四逆湯通脈四逆

下利清谷

湯

手足逆冷吐利煩

吳茱萸湯

燥欲絕

下後額上生汗手足逆冷或自汗

白虎加人參湯

少陰證手足厥冷甘草湯桔梗湯通

或吐利而咽中脈四逆去芍藥加

痛 桔梗湯麻黃升麻

湯

少陰病手足寒飲

食入口則吐心四逆湯

中溫溫欲吐不

能吐

陽濡弱  
陰小急

兩脛逆冷腸腹滿

寸浮大  
浮為風  
大為虛

多汗頭目痛苦  
白虎加蒼朮  
妄言

風生微熱虛則兩  
不可服桂枝用芍

脛攣小便數汗  
藥甘草湯補虛退

出為津液少  
熱

脚氣証兩脛腫滿  
見脚氣門

行起忽倒屈弱

四肢逆冷足攣惡  
見惡寒門

寒

緩弱

身熱衝胸頭重不乾姜湯  
當歸白

舉眼眩四肢拘木湯  
竹茹湯

急小腹痛手足燒禪散

拳

筋惕肉瞤發汗後  
真武湯

頭眩汗出

下証悉具而失下

血氣不通四肢  
見頭汗門

便厥

沉伏按之而滑

熱炆深發厥為裏

熱畏熱飲水揚白虎湯 升氣湯

手擲足煩燥不或頭面有汗指甲

得眠大便秘小温急下之

便赤多昏憤為

陽厥

有正汗相逼一手

無脉手足厥冷細辛甘草湯

面不澤

心下怔忡而厥為

有水脉緊為在

裏

發厥十八日身冷

名藏結難治

手足厥冷脉緊邪

結胸中心滿而

煩

飢不能食

又當吐之

傷寒四逆者四肢逆而不溫逆比於厥爲輕積冷成寒積溫成熱非一朝夕之故傷寒始在皮膚當太陽陽明受邪之時則一身盡熱當少陽太陰受邪之時則手足自溫此是表邪漸緩而欲傳裏至邪傳少陰爲裏証已深雖未至厥而手足又加之不溫若至厥陰則手足厥冷矣經曰少陰病四逆或欬悸或小便不利或腹痛或泄利下重者四逆散主之是用寒冷之藥以主四

逆之病是知四逆非虛寒之証也又有四逆湯亦治四逆手足寒方用熱藥厥有旨哉若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之若始得之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之大須識此勿令誤也四逆與厥相近而非也四逆而吐利煩燥者死傷寒厥者手足逆冷甚於四逆厥有陰陽氣不順按陽氣內陷熱氣逆伏也經曰傷寒

一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深熱亦深厥微熱亦微是知內陷者爲厥矣少陰病但厥無汗而強發之必動其血從口鼻目中出是名下厥上竭亦是言發動其熱也先熱後厥者熱伏於內也先厥後熱者陰退而陽氣得復也若始得之便厥者則是陽氣不足而陰勝也大抵厥逆爲陰所主寒者多矣又有進退之別經曰病厥五日熱亦五日至六日當復

厥不厥者自愈發熱四日厥反三日厥少熱多病亦自愈厥四日熱反三日復厥五日寒多熱少陽氣退其病爲進病至厥陰傳經盡也當是之時厥少熱多陽復勝陰則愈若厥多熱少陰勝而陽不復則逆至於下利先厥後熱者利自止見厥復利厥者復爲熱亦陽氣之復利亦自止熱者復爲厥是陰陽還勝復下利矣少陰病惡寒身倦而利手足厥冷者死

傷寒腰痛

素問云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣  
雖屬腎虛亦涉三因其外因者太陽經得  
之痛引項脊尻骨如重中寒所致陽明經  
得之痛不可顧顧則如有所見善悲中燥  
濕少陽經得之痛如針刺不可俯仰中風  
熱太陰經得之煩熱腰下如有橫木居其  
中甚則遺溺中燥濕少陰經得之痛引脊  
內多因中寒厥陰經得之腰中強急如張

弩弦中風熱

脉

病證

治

太陽病發熱惡寒

頭疼腰痛傷風 見頭疼門

傷寒看有汗無

汗

長浮大而

太陽陽明合病必

下利而頭疼腰 葛根湯

痛肌熱目疼鼻

類聚四十一  
九十三

乾

病差後腰以下有

水氣者

腰脊強發熱惡寒

頭疼

腰脊疼痛頭疼身

體拘急惡寒無

汗寒多熱少面

色慘手足指末

牡蠣澤瀉散

見頭疼門

麻黃湯桂枝麻黃

尺寸浮

浮

微厥不煩燥

傷寒脅痛

脇滿痞滿鞭滿見傷寒脹滿門

脉

病證

治

浮細

太陽十日已去嗜

卧外已解設胸

小柴胡湯

滿脇痛

太陽病轉入少陽

小柴胡湯或咳者

往來寒熱脇胸

去人參大棗加五

滿痛

味子乾姜

弦緊

類聚四十一

九十三



表解後不惡寒身

涼汗出頭疼心

痞脇疼乾嘔短

氣宜

十棗湯

長大而弦

陽明少陽合病下

利身熱胸脇痛

小柴胡湯甚則大

滿乾嘔往來寒

熱

傷寒筋惕肉瞤皆由傷寒發汗過多亡陽津

液枯少陽氣大虛筋肉失所養故惕瞤而

跳動也大陽病脈微弱汗出惡風者不可

服大青龍湯服之必厥逆而惕瞤此為逆

也大陽病發汗不解仍發熱頭眩身瞤動

振振欲擗地者真武湯去之發汗而亡陽

表虛治以溫經益陽可也或吐下發汗後

表裏俱虛有此証者又非若但發汗後所

可同也經曰傷寒吐下後發汗虛煩脈甚

微八九日心痞脇痛氣冲咽喉眩冒筋脈

動傷者久而成痿此為逆之甚者太陽病汗下之後表裏俱虛復加燒針因胸煩面色黃膚暍者難治

傷寒身痛

身體拘急身班麻疹

太陽少陰厥陰皆由身體痛當以証脉分辨之

脉

病證

治

浮緊

太陽病發熱胸滿麻黃湯而喘表未解身

浮緊

體痛若尺脉遲先以小建中湯養不可汗蓋血少之榮氣不足

太陽傷風發熱惡

寒身疼痛無汗大青龍湯而煩燥

而煩燥

太陽病自汗四肢桂枝加附子小便

拘急難屈伸若數不可服用芍藥

小便難甘草湯

緊澁

頭疼身體拘急惡

寒無汗寒多熱 麻黃湯 桂枝麻

少面慘腰脊痛 黃各半湯

手足指末發厥

不煩

盛

三陽合病腹滿身

重難轉側口中 白虎加人參湯

不仁面垢譫語

遺尿不可汗若

洪緊

夏月發熱惡寒頭

疼身體肢節重 見頭疼門

痛

夏至已前發熱惡

寒頭疼身體痛 見頭痛門

太陽中濕一身盡

痛發熱身黃小 麻黃加白朮湯

便不利因而傷 小便自利朮附湯

洪緊

自汗

風風濕相搏一

身痛而重

若寒多為痛為

腫

若風多為煩熱

為流走拘急

風濕証身腫肢體

煩疼重痛汗出門

足逆冷或自汗

小野自味木州

非黃麻白木葛

非附子桂朮不能

去

非麻黃薏苡仁烏

頭不能去

見腫及小便不利

沉

陰証自利身體痛

當救裏

若大便如常而

身體痛者急

當救表

陰毒身重背強腹

中絞痛咽喉不

利身如被杖或

發汗後身疼痛

四逆湯

真武湯以溫之

附子湯

桂枝加芍藥生姜

人參即小建中湯

若四肢冷吐利灸

氣海關元陰毒甘

沉遲

霍亂頭疼發熱身

五苓散

疼痛欲飲水

草湯

霍亂吐瀉止身疼與少桂枝湯

痛不休者

厥陰病大汗出熱

不去內拘急四逆湯

肢疼或下利厥

逆

沉疾

身冷煩燥而不飲霹靂散躁止得睡

水陰盛隔陽汗出差

脚氣証頭疼肢節

痛身熱舉體轉橫榔散

筋酸痛胸滿氣

急

瘡家雖身體痛不

可發汗汗出作

瘡

虛汗流

八九日風濕相搏 桂附湯 若大便  
身煩疼不得轉 鞭小便自利去桂  
仄不嘔不渴 加白朮

夏月身發黃斑出白虎雖可用然治  
中暑與汗後一解表藥耳未能驅  
逐表邪况夏月陰氣在內或患熱  
病而氣虛人妄投白虎遂成結胸  
以其性寒非傷寒藥也

數加

中暑作熱病治之

而發黃斑出邪 桂枝石膏湯發汗  
氣未入藏 粟小味亦中與

春初肌肉發癢疹葛根橘皮湯黃連  
如錦紋或咳嘔橘皮湯 入路土下  
心悶吐清汁 煎了其內熱已熱

溫毒熱病發斑俗 不可用表藥蓋表  
謂之麩瘡素問 虛裏實也  
謂之疹 夏月

狂燥妄言身斑面 見面赤門 夏月

赤咽乾陽毒証 山斑見發黃門  
或下利赤黃

傷寒發黃 發黃 發黃

經云濕熱相交民當病瘴瘴者黃也單陽  
而無陰也傷寒發黃為熱已甚內熱已盛  
復被火者亦發黃也陽明病被火額上汗  
出而小便不利者必發黃此由內有熱被  
火而致陽明病無汗小便不利心中懊懣  
者必發黃此由陽明熱盛所致傷寒發汗

已身目為黃此寒濕在裏不解不可下當  
於寒濕中求之濕家之黃身似熏黃雖黃  
而色暗不明熱盛而致黃身黃如橘子色  
甚者染著衣正黃如黃蘗色此濕與熱可  
辨在此經云治濕不利小便非其治也大  
抵黃家屬大陰脾土脾經受濕與熱則色  
見於外若內熱盛而已自汗出小便利則  
不發黃矣必也頭汗出身無汗小便不利  
渴引水漿此瘀熱在裏身必發黃若寸口

近掌無脉鼻炁出冷形體如烟熏直視播  
頭爲心絕環口鰲黑柔汗發黃爲脾絕不  
治寒濕在裏熱蓄於脾瘀熱與宿穀相薄  
鬱蒸不消故發黃與瘀血外證及脉相似  
但小便不利爲黃若小便自利爲瘀血然  
發黃者心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而  
緊數若瘀血証卽若狂大便必黑爲異

脉

病證

治

身體發熱頭面汗生研五苓散末煎

出身無汗劑頸茵陳湯調以利小  
而止渴引水漿便如皂莢汁赤爲  
小便不利身必病減  
發黃大便黑瘀  
熱在裏

傷寒欲發黃者急梔子蘘皮湯 麻  
用瓜蒂末口含黃連翹赤小豆湯  
水搐一字入鼻可選用  
中出黃水甚驗



夏日有桂枝麻黃  
証不加黃芩服  
白虎湯患熱  
之轉助其熱即  
人不可輕用  
發黃出斑

白虎與發黃証  
相近但遍身汗  
出為熱越白虎  
証也

多浮滑

大陽中濕一身盡

緊數

大弦浮而

痛發熱身黃成  
木附湯  
小便自利

若小便不利大  
甘草附子湯  
便反快當利小  
五苓散  
便詳見身痛門

少陽中風短氣腹  
滿心脇痛按之  
忡不通鼻乾不  
得汗喜臥身目  
疸三黃丸  
小柴胡湯吐血黃

類聚四十一

百三

俱黃小便難有

或三黃丸

潮熱時咳嗽不

小樂時結血黃

身黃小腹鞭小便

自利其人如狂 抵當湯下之

為下焦畜血

沉結

傷寒身腫

附水腫

通見脹滿門

劉河間論水腫引經云勝濕則濡泄甚則水閉附腫所謂太陰脾土濕氣之實甚也又口諸腹脹大皆屬於熱又云諸附腫疼

酸驚駭皆属于火又曰熱勝則附腫皆所謂心火實熱安得言脾虛不能制腎水之實乎故水腫者濕熱之相兼如六月濕熱甚而庚物隆盛也水腫之象明矣黎景仁云心腎火生脾肺土樞機運化內安平火虧真土無滋養相制纔偏水妄行亦有意也

脉

病證

素問稱面腫曰風足脛腫曰水本方謂四肢皆腫為水

治

類聚四十一

百五

但腹脹四肢  
不腫為蠱

傷寒飲水過多小五苓散 大陷胸

便不利小腹滿元

或裏急溢於皮

膚為腫

浮

風濕相搏支體重麻黃杏子薏苡甘

痛不可轉側額草湯防已黃芪湯

上微汗不欲去桂枝附子湯桂枝

被或身微腫但白朮湯朮附湯身

微汗則風濕俱 腫甘草附子湯加

去大汗則風去 防風

濕不去

痺濕其寒証多者 通見濕與五痺門

為痛為腫 非附子桂朮不能

去也

傷寒脹滿 有鼓脹非  
此蠱字

胸脇滿者謂隔間脇肋下氣脹滿悶也邪  
氣自表傳裏必先自胸脇已次經心腹而

入胃入胃為入府也是知胸滿多帶表証  
 脇滿多帶半表半裏証也經云下後脉促  
 胸滿桂枝去芍藥湯又曰陽明病喘而胸  
 滿不可下宜麻黃湯是胸滿屬表須發汗  
 知胸中至表猶近及脅者更不言發汗但  
 和解而已又曰少陽病脇下鞅滿乾嘔不  
 食往來寒熱脉沉緊小柴胡湯主之是知  
 胸滿屬半表半裏明矣若邪氣留胸中聚  
 而為實非湧吐不可經云病在胸中當吐

之

脉

病證

治

傷寒十三日不解先服小柴胡湯以  
 胸脇滿而嘔日解其外後以柴胡  
 晡潮熱而微利加芒消湯下之  
 以丸藥下之非  
 其治此陽明胃  
 實也

沉緊

傷寒中風胸脇滿

不食往來寒熱小柴胡湯  
心煩喜嘔

傷寒五六日已發  
汗復下之胸脇  
滿小便不利渴  
柴胡桂枝乾薑湯  
而不嘔頭汗出  
往來寒熱心煩  
表未解也

嘔而發熱胸脇滿  
小柴胡去黃芩加

心下怔忡小便茯苓  
不利

邪蒸留胸中為實  
梔子豉湯吐之  
當吐發汗若下  
之而煩熱胸中  
窒者虛煩客熱  
也

胸中痞鞭炁上忡  
瓜蒂散吐之吐藥  
咽喉不得息胸  
自有輕重

中宿寒痰實也

寒中太陰誤下之

胸膈愈不快腹

脹或吐或利不

可川食藥

婦人傷寒發熱經

水適來熱入血速與小柴胡湯

室不犯胃炁熱及

上二焦

理中湯加青皮陳

皮及枳實理中

元

若行湯遲熱入胃

胃燥成血結胸

當針期門

若熱犯胃氣則譫

用抵當湯無表証

太語喜忘小腹滿

可用

小便不利

胸脅痞滿脅下鞭

滿

太陽証頭項強痛

而無寒胃滿脇小柴胡湯

淨

痛

太陽病桂枝証反

下之利不止脉葛根黄芩黄连湯

促喘而汗出表

未解

太陽病下後胃滿桂枝去芍藥湯若

積聚氣痞

微寒加附子

太陽陽明合病胃麻黃湯

滿而喘不可下

長大而

陽明少陽合病下

利身熱胃脇痛小柴胡湯甚者大

滿乾嘔往來寒柴胡湯

熱

太陰証胃滿多痰

瓜蒂豉梔等湯

可吐之

少陰病時時自煩

惡寒而倦不欲大柴胡湯去大黃

厚衣

大

沉緊

太陽病轉入少陽

脇下鞭滿乾嘔 小柴胡湯

不食往來寒熱

上未吐者

若已吐汗下柴

胡証罷為壞病 以法治之

知犯何逆

陽明病脅下硬滿 小柴胡去半夏加

不大便而嘔舌 人參栝樓根

弦

上白胎

少陽病口苦咽乾

脇下滿發熱而 小柴胡湯愈此矣

嘔往來寒熱

傷寒四五日身熱

惡風頭痛項強 小柴胡湯

脇下滿手足溫

而渴

心下滿者謂正當心下高起滿鞭者是也不



經下後而滿者則有吐下之殊下後滿者  
又有結胃痞氣之別經云病人手足厥冷  
脉緊邪結胃中心滿而煩飢不能食當吐  
之脉浮大心下反鞭有熱屬藏者攻之不  
令發汗屬府者不令攻之此二者未經下  
而當吐下者也至如陽明病雖心下鞭滿  
又未可攻攻之利不止者死亡者愈此表  
邪傳裏未全結實不可下但吐之可也若  
未應下而強下之邪氣乘虛結於心下邪

之實者脉沉緊鞭滿而痛爲結胃邪之虛  
者脉浮而緊滿而不痛爲虛痞病發於陽  
表邪未罷反下之胃中空虛陽氣內陷心  
中因鞭爲結胃須陷胃湯丸攻之病發於  
陰傷寒中風反下之心下痞鞭而滿醫言  
病不盡復下之胃中空虛客忝上逆爲痞  
須瀉心湯散可也結胃雖爲實邪當下之  
或脉浮大是猶帶表邪不可下下之重虛  
則死結胃証悉具而加煩燥者不可治胃

氣勝能施布藥力始能溫汗吐下以逐邪  
氣胃氣絕神丹不可救矣

脉

病證

治

細

傷寒五六日頭汗  
出惡寒手足冷  
心下滿不食大  
便鞭為陽微結  
有表裏証脉沉  
亦有裏也

沉

心下妨悶非痞也  
謂之肢結心下  
滿而不痛此痞  
也傷寒本無痞  
身冷反下之

半夏瀉心湯  
桔梗枳殼湯

病發於

關脉浮者有熱也

大黃黃連黃芩瀉  
心湯

陰下之

若惡寒汗出

附子瀉心湯

早為痞

汗出表解噫臭

生姜瀉心湯胃不

屬瀉心証

心下痞鞭有水利也

无腹鳴下利

發渴口燥小便五苓散

不利用

甘草瀉心湯服瀉

下後復下痞甚

心湯不愈用陷胃

丸下之陷胃湯不

若協熱而利表桂枝人參湯

裏不解

傷寒發熱汗出

不解心下痞嘔大柴胡湯

吐下痢

表解後不惡寒

身涼汗出頭疼十棗湯為裏有水

心下痞滿脇疼未和也

乾嘔短氣

若發汗吐下後

心下痞噫炁不旋覆代赭湯

除者

或咳逆氣虛先四逆湯

服

胃寒者先服

理中丸次服旋覆代赭湯

心下緊滿應汗而反下之遂成結胃

心下痞或鞭附見

病發於傷寒心下緊滿無

陽下之

大熱但頭汗出小柴胡去棗加牡

此為水結在胃蠓湯茯苓湯

脇

早為結

以頭汗出別其

小半夏加茯苓湯

為水結証

胃屬陷

傷寒心下痞滿按

枳實理中元為良

之石鞭而痛下

之早故痞結若先理其氣

胃証

無熱証為寒實

寸口浮	若胸中煩燥心 內懊憹舌燥 渴脉沉滑皆 熱實証	大陷胸丸
關尺皆	若誤轉未成結 胃	以理中丸解之
沉或沉	若大轉損有厥 証	兼與四逆湯
	若傷寒未退日	

緊名曰	數足可下却承氣湯再下之 用	
結胃然	若不按而痛脇 連臍腹堅鞭	大陷胃丸最稔大 陷胃湯有甘遂
脉浮也	或潮熱為大 結胃	大峻
大皆不 可下脉	若按之心下痛 此為小結胃	小陷胃湯
	脉浮滑	

浮尚有表証也

陰毒漸深四肢厥冷腹痛心下滿脹結硬燥渴虛汗不止咽喉不利脉沉細而疾

灸氣海關元二三百壯服正陽散白朮散附子散等以復其陽大汗即解

藏結証陽浮關脉細小沉緊無陽証不往來寒熱其人反靜舌上

滑胎脇下有痞連在臍旁痛引小腹入陰陽者名臍結不治發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞

五苓散

腹滿者俗謂肚脹也華佗曰傷寒一日在

皮二日在膚三日在肌四日在胷五日

可下

如

猶未全入裏者雖腹滿為裏証亦有淺深之分經曰表已解而內不消非大滿猶生寒熱是其未全入府若大滿大實堅有燥屎可除下之寒邪入腹是裏証已深故腹滿乃可下者多矣如經曰其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯發汗不解腹滿加者急下之本大陽証反下之因血腹滿時痛桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝

未可下

急下之

有實

有虛

陽熱

陰寒

加大黃湯主之少陰病腹脹不大便者急下之此皆為裏証雖曰腹中滿痛者此為實也當下去之然腹滿不減者則為實言當下也若腹滿時減復如故者此虛寒從下上也當以溫藥和之蓋虛氣亦為之脹但比之實者不至堅痛也大抵腹滿屬太陰脾土也陽熱為邪者則腹滿而咽乾陰寒為邪者則腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛也又發

汗後 汗吐下後因而成腹滿者皆邪氣乘虛而所主又各不同發汗後腹滿者邪氣在表因發汗胃氣虛津液不能敷布諸氣壅滯而為脹滿是當溫散厚朴生姜甘草半夏人參湯主之吐後腹滿者邪氣在胃者可吐之邪氣去則安吐後邪氣不去加以腹脹滿者是胃中之邪下傳入胃作實故脹滿當下之調胃承氣湯主之下後腹滿者邪氣在表未傳入

脉 府而妄下之邪自表乘虛而入鬱於胃中為虛煩氣上下不得通利者腹為之滿臥起不安當吐之梔子厚朴湯主之

脉 病證 治

陽瀉陰

太陽病反下之腹脹滿詳見前	桂枝加厚朴生姜半夏甘草人參湯
滿時痛是表裏証詳見前	小建中湯大實痛者桂枝加大黃湯
大陽病發汗後腹脹滿詳見前	厚朴生姜半夏甘草人參湯



沉結而

太陽病熱蓄膀胱

大下焦有熱小腹

滿應小便不利抵當湯

而小便反利無氣湯輕者犀角地

表証者下血証黃湯

也或犯胃氣譫

語喜忘

陽明病不大便恐小承氣湯

有燥屎法少與

浮大而

少陽中風短氣腹

脹脇下及心痛

鼻乾不得汗者

臥身目皆黃小

腹中轉失氣者

可下也若不

轉失氣者不

可攻攻之必

腹滿不食而

大柴胡湯

小柴胡湯

瓜人參湯

芍藥白干

白朮葛根

腹滿脹屬陽明慎如此

小柴胡湯

便難潮熱而嘔  
或耳聾目赤而  
煩

小柴胡湯

滑實

三陽合病腹滿身

白虎湯然不可汗

重口中不仁面

若或自汗 白虎

垢譫語遺尿

加人參湯

緊細

陽明與大陰俱病

腹滿身熱不欲

大柴胡湯

食譫語為兩感

小柴胡湯

証

發汗後表不解發小青龍去麻黃加

熱飲水多咳而茯苓

微喘小腹滿小

便不利

潮熱惡寒尚有表小承氣湯微和其

証若腹大滿不胃氣

通

潮熱實也脉亦

若弦

若浮

沉數

必實當下以潮熱屬陽明故可下脉虛則宜

桂枝湯

傷寒始得病外証

承氣湯下之吐後

口燥咽乾腹滿

滿調胃承氣湯

而渴屬裏

傷寒噦而腹滿視

後部調胃承氣湯

其大小便何部

前部朱苓湯

不利

關實

陰弦陽濇

腹痛發汗不解腹滿痛為實急下之

大柴胡湯 大承氣湯

腹滿大便秘按之而痛實痛也

桂枝加大黃湯黃連湯大承氣湯

腸鳴泄利腹中急

小建中湯先煎芍

痛先與

藥十餘沸治冷痛不差小柴胡

去黃芩加芍藥

此治熱痛

太陰病腹滿咽乾

四逆湯

手足溫或自利

溫之

不渴或腹滿時

痛

腹滿脉浮可用

桂枝腹痛桂枝加大黃湯

枝加芍藥痛

甚

腹滿脉大多痰

瓜蒂梔豉等

吐之脉大而桂枝麻黃湯

無吐証可汗

而已

太陰病腹滿發汗

後汗不止為漏桂枝附子湯

風

太陰寒中胸膈不

快膜滿閉寒胸  
青手足冷少情  
緒腹痛下為飧  
泄久為腸癰不  
可投食藥

理中湯加青皮橘  
皮并枳實理中  
丸五積散

大

寒毒入胃臍下必  
寒腹脹滿大便  
或黃青黑或下  
利清谷

四逆湯理中湯白  
通湯加附子四  
逆散加薤白

少陰病六七日口

燥咽乾潮熱腹  
滿而喘或譫語  
大便鞭或下利  
清水心下痛皆  
積証也

大承氣湯

少陰腎傷寒口燥

舌乾而渴固當  
下大抵腎傷寒

亦多表裏無熱增損四順湯有熱  
 但苦煩憤嘿嘿者四逆散  
 不欲見光明有  
 時腹痛其脉沉  
 細或下利手足  
 冷

裏証有心胸連臍  
 腹大段疰悶腹小承氣漸解之  
 中痛喘急坐臥

不安

沉細而陰毒証手足厥逆

臍腹築痛咽喉  
 四逆湯 通脉四

疾或或  
 疾尺小

疼嘔吐下利身  
 逆加芍藥陰毒

可大

如被杖冷汗煩  
 甘草湯 白朮

渴又頭疼腰重  
 散附子散

睛疼體倦心下

脹結額上身背

冷汗不止

陰証腹痛小便不利

真武湯

脾胃不和及有積聚腹痛

五積散

沉遲

腹痛面青手足冷

順元散

中濕中氣為堅滿為癰閉

非甘遂葶藶枳朮不能泄也

陽濡弱

濕熱相搏則發濕温兩脛冷胸腹

白虎加蒼朮治在

陰小急

滿多汗頭痛妄言

大陰不可汗

脚氣入心則小腹不仁令人嘔吐死在旦夕

腹間有築觸動氣

見自汗門

微緩沉短

傷寒六七日煩滿

囊縮陰毒入藏

承氣湯下之

為厥陰証

小腹滿者臍下滿也下焦所治當膀胱上

口主分別清濁若胸中滿心下滿皆氣  
非正氣  
爾即無物也及腹滿者有燥屎為之者

至於小腹滿者非正氣也必有物聚於  
此而為滿也故身半已上同天之陽身  
半已下同地之陰經云清陽出上竅濁  
陰出下竅是在上而滿者氣也在下而  
滿者物也所謂物溺與血爾若從心下  
至小腹皆鞭滿而痛者是邪實也須大

血溺與

解表

可下

陷胃湯下之若但小腹鞭滿而痛應小  
便不利今反利者是畜血也小腹鞭滿  
小便不利者是溺澀也小便自利其人  
如狂血証審矣經曰太陽病熱結膀胱  
當汗不汗其人如狂血自下者愈其外  
未解未可攻用桂枝湯外先解矣但小  
腹急結者可攻之桃仁承氣湯主之

脉

病證

治

太陽病熱畜膀胱



小腹滿小便反利無表証者下血證

見腹滿門

發汗後發熱飲水

小腹滿咳喘小便不利

見腹滿門

熱畜下焦小腹痛

小便不利或裏五苓散有燥尿法少與

腫

脚氣入心小腹痛

仁令人嘔吐不治

醫方類聚卷之四十