

科卷一

幼科總論 賦稟附稟心誠賦 初延效護 初生護持  
調變 看病訣 至要口訣 治法疑論 診脈法 摱括脈要  
紋形 辨閑紋法 面圖 辨色 辨色分証 審色寒熱  
五臟所屬之証 簡切辨証 壽大辨 變蒸闡謬  
勿輕服藥 藥餌之誤 神奇外治法

卷二 金匱啟鑰

臍風證 用火口訣 集成神大歌 宜用火者

忌用火者 大圖 四生艾火胎病 外感 發熱 嘘吐噦 咳嗽  
解顛 目病 口瘡 舌病

澠江黃朝坊妙山輯著

總論

小兒古謂啞科。以其病不能達全憑醫者臆度耳。兼之臟腑脆弱。藥餌不可過峻。況近來氣運寢薄。幼兒賦形受氣。不啻水漚竹露。然果關於氣運乎。寢由人之自取也。古昔盛時。人心渾噩。後起聲色日縱。膏粱恣慾。精氣附身。日剝而日削。愈耗而愈衰。譬之釀酒。斗酒上升。水則濃而耐窖。斗酒下倍水。則薄而難貯。人情甚澆。縱慾無度。精氣妄洩。邪火曰炎。真陽曰憊。幸而受孕。能如古禮。妻將生子。夫居側室。

猶有幸也。乃仍不節。盜洩母氣。嗚呼。人之生也。需父之精。賴母之血。彼夫未孕之前。長夜縱慾。父精已竭於當初。及其當孕當生。又復馳情。母血又洩於在孕。終始相剝。而且回摧。幼子之生。所受父精母血者幾何。今日之人。大皆如是。秉受羸弱。何往不然。然而藜藿之家。衣食是計。朝耘夜績。忘苦形勞。荆釵襦布之前。祇此商飢論飽。何暇縱欲。娛情。吁。如是者。父精無傷於往日。母氣完固於妊娠。比其生子。往從性先體壯。不畏風霜。不遭病苦。鮮夭札之傷。寡不育之患。以此驗之。秉受攸殊。果在氣運之薄乎。寔人氣之自薄耳。由是以觀。則凡治幼病。必以培本扶弱爲定論矣。胡乃受病之家。苟知自己。行持之醫。

不知。辨賞。當家。三金。火。方。卷。十一。  
醫者治之。不察稟受之厚薄。不辨脈証之虛實。不分疾病之寒熱。但見發熱啼哭。輒以驚風名。夫驚風前賢闡之詳矣。乃執迷不悟。猶以開驚鎮墜。散風化痰。消食降火之藥。雜然並進。自稱穩當。在虛寒者。药下而愈。見痰壅煩燥。危已及矣。彼猶曰。病重药輕。極苦大寒。羅而用之。有識者曰。毋乃大寒涼乎。彼反謂純陽之子。受之無害。不知病已虛寒。妄用寒涼。則真火就衰。陽衰則陰無主。而失所生。人非水火不生活。勢必底於夭殞。而後已。良可慨也。誠如是也。嬰兒之病。不幾無從療治乎。曰。有定論。使學者玩索。有得。尋源以治。心誠以求。所謂

啞科者庶乎不啞所謂天札者庶幾同登仁壽矣。

夫人之生也。秉而大以成形。稽陰陽而賦命。是故頭圓象天。足方象地。五行運於內。二曜明於外。乃至精神魂魄知覺靈明。何者。非陰陽之造就。與氣化相盛衰。然天地之氣化有古今。斯賦稟由之分厚薄。上古元氣渾龐。太和洋溢。八風正而寒暑調。六氣匀而雨暘若。人情敦茂。物類昌明。當是之時。有情無情。悉歸於厚。非物之厚。由氣厚也。及開闢既久。人物繁植。發洩過傷。攘竊天元。雕殘太樸。世風漸下。人性澆漓。故水旱有不時之擾。流災有比戶之侵。生物不蕃。民用日促。值此之際。有知無知。咸歸於薄。非物之薄。由氣薄也。然則今之愛氣。

於父母者。其不能不薄也。可知矣。况有膏藜異養。貲賤殊形。醫術稱仁。顧可視爲不經之務。夫膏粱者。形樂氣散。心蕩神浮。口饜甘肥。身安華屋。頤養過厚。體質嬌柔。而且珠翠盈前。婉妍列侍。縱熊羆之叶夢難桂。柏以參天。復有癡由貪起。利令志昏者。有雪案蠻牕。剗心噴血者。有粟陳貧朽。握手持籌。不覺形衰氣瘦者。有志高命蹇。妄念鎖營。以致心倦神疲者。凡此耗本傷元。壞胎之植。安保其深根固蒂也。乃若藜藿之家。形勞志逸。願足心安。守益廩瓶倉。對荆釵裙布。乃其神志無傷。反得胎嬰自固。以此較比。得失判然矣。若夫怒傷元氣。勞役形骸。迅雷烈風。嚴寒酷暑。日月薄蝕。病體初安。醉飽傷神。落紅未

浮躁率之由。斯愈薄矣。又成於人所不覺者。故人之稟受十有九虛。  
究其所因。多半率由於是。業斯道者。當知氣化厚薄。人事澆醇。因以  
察其胎元之受於父母者之盛衰堅脆。庶幾近焉。若但以上古成方  
而治。今時薄弱。膠柱鼓瑟。究歸無當。泥而不通。未可以言達於理也。



欲保赤子。全仗心誠。口不能言其疾苦。脈難以決其浮沉。外感六淫。  
風寒火邪易襲。內因諸証。心肝脾臟為多。欲觀氣色。先分部位。左頰  
屬木。為肝。右頰屬金。為肺。天庭高。為心火之位。承漿低。為腎水之區。  
脾土中央。鼻為通氣。肝青腎黑。水木之色。主驚寒。肺白心紅。金火之  
色。為虛熱。土色黃現。疳食証多。欲窮其變。再察五官。鼻雖中央。肺竅  
通聲。重鼻塞。風寒可見。唇雖赤色。脾氣應燥。腫生瘡。脾熱自詳。舌乃  
心苗。紅滑順而乾黑者。熟目為肝竅。赤腫熱而有神者。生胃流注於  
雙頤。風熱內攻。則紅腫腫開竅於兩耳。腎元虧損。則黑枯繞耳經絡。

足少陽。暴聾紅腫。其過在胆牙床經絡。二陽明齒遲枯燥。病歸乎腎。  
再觀其外。以知其內。紅氣現而熱蒸。青色露而驚悸。如煤之黑兮。中  
惡之因似橘之黃兮。脾虛之謂白。乃迫勞紫爲熱極。青遯口角扁鵲  
難醫。黑掩太陽。盧醫莫治。年壽赤光兮。多生膿血。山根青色兮。頻見  
災危。瀉利而戴陽難防。咳嗽而拖藍可畏。疼痛方殷。面青唇撮。眉自  
蹙。驚風欲發。面赤目直。睡多驚火。光燄燄。外感風寒。白氣浮浮。中臟  
癖積。乍黃乍白兮。疳熱連綿。又赤又青兮。風邪緊急。察之若精。治之  
得理。鴉聲魚口。枉費精神。肉折皮乾。空勞氣力。氣色顛移。形容各異。  
氣乏則脾冷。腎虛則滯。面目虛浮。定腹脹而氣喘。眉毛頻蹙。則肚

扁而何益。手如數物兮。肝風將發。面若塗硃兮。心火已炎。坐卧愛冷。  
兮煩熱之攻。伸縮就暖兮。風寒之畏。肚大腳細兮。脾欲困而成疳。曉  
目張口兮。熟已危而必斃。弄舌脾熱解顎腎憊。重舌本舌兮。虛熱積於  
心脾。硬氣喘氣兮。寔火浮於肝肺。齦宣息露。必是牙疳。哺露丁奚。多  
緣食積脣乾白。作渴腸鳴必自利。夜啼分爲四証。變蒸周於一歲。心  
熱欲言而不能。脾虛無時而好睡。病后失音者。腎怯。咳嗽失音者。肺  
痿。肚痛而清水流出者。虫。腹痛而大便酸臭者。積。口頻振而虛寒舌  
長伸而火熾。廻胸兮。肝火乘於肺膈。寇背兮。腎風入於骨髓。鼻乾黑

燥兮火盛。金衰。肚大青筋兮木强。土瀆。丹瘤瘡疥。皆胎毒之運。綿吐  
瀉瘡痢。乃食積之滯。不能啖乳者。熱在心脾。常欲俯卧者。火蒸肺  
胃。喜視燈火者。煩熱在心。愛吃泥土者。疳熱在脾。腹痛寒侵。口瘡熱  
積。臍風忌於一月。火再畏於一週。驚自熱生。癇因痰致。吐瀉而精神  
敗者。則危。瘡痢而飲食絕者。則卒。驚本心生。風由肝致。搐合左右兮。  
訛有順逆。药分補瀉兮。病有虛實。急驚也。由於積熱之深。涼瀉偏宜。  
慢驚也。得於大病之後。溫補爲貴。頭搖目攢。而氣喘兮。上工莫醫。口  
噤鼻張而氣冷兮。神丹何濟。閉目兮無魂。狂叫兮多祟。不知吞吐者  
死。反加悶亂者危。且如病則熱起。熱則驚生。或制熱以熱。或攻熱以

久成瘧。瘧久成癬。驚久成癇。未致留連。攻之宜速。已見沉痼。分治之。宣緩。腸胃秘結兮。急瀉而已。氣血虛乏兮。急補而安。此皆指南之活法。何疑治病之不萬全也哉。



小兒初生或不能發聲謂之夢生多不知救深爲可憫切勿斷臍帶。速用明火將胞衣炙煖使煖氣入兒腹更以熱湯盪洗臍帶卽取猫一隻以布袋裹其頭足使伶俐婦人拿住猫頭向兒耳邊以口噉猫耳猫必大呌一聲兒卽醒而開聲方可翦斷臍帶。

又有因難產或冒風寒遲久方下兒氣欲絕不能啼者亦以前法溫暖之令煖氣入腹氣回卽甦更令父母之真氣呵而接之

凡斷臍帶世俗皆以刀剪斷之最爲不妥但以大紙撲蘸香油燃火於臍帶上燒之令斷蓋所以補接其陽氣不但爲回生起死之良法

且後日無傷寒泄瀉之患。

初生腎縮乃受寒氣所致。用硫黃吳茱萸各三錢研極細末。搗葱取汁。調藥塗臍腹。另以蛇床子燒烟熏之。卽伸。

悶臍生者。兒糞門有一膜。悶住兒氣故不能出聲。拍之則膜破而呴矣。又有用輕巧婦人以銀簪輕輕挑破爲甚便。或不能挑急以暖衣繫包。勿令散放。以熱水浸其胞衣。寒天則以火炙之久。則熱氣入腹。而氣內鼓。其膜自破。其聲自出。

又有生下無穀道者。乃肺熱閉於肛門。急以金銀或玉簪看其端的。則穿之。或以火針刺穿。但不可深。以油紙撲套住。免其再合。

兒初生遍身無皮俱紅肉急以早米粉乾撲之候其皮生至則止  
初生大小便不通腹脹危急者急令婦人口含熱水吮兒之前後心  
並磨下手足心共七處每一處吮吸七口以肉色紅赤爲止須臾卽  
通又一方以生葱汁人乳各半調勻抹兒口中須臾卽通

初生不尿以葱一根切碎人乳半杯同煎去葱取乳分作四次服卽  
尿不吮乳者服此卽吮乳



嬰兒初生。肌膚未寔。宜用舊絮護其背。亦不可大煖。更宜素見風日。  
則血氣剛強。肌肉緻密。若藏於重幃密室。或厚衣過暖。則筋骨軟弱。  
不任風寒。多易致病。衣衫當隨寒熱加減。但令背暖爲佳。亦勿令其  
汗出。恐致表虛。風邪易入。乳哺亦不宜過飽。所謂恐三分飢。喫七分。  
飽。頻操肚少洗澡。皆至言也。又須令乳母預慎。六淫七情。蓋兒初生。  
藉乳爲命。善爲乳母者。夏不欲熱。熱則致兒吐逆。冬不欲寒。寒則致  
兒咳嗽。怒乳則上氣顛狂。醉乳則身熱腹痛。新房而乳。則瘦瘠交脛。  
不能行。新浴而乳。則發吐傷神。冷熱不調。停積胸膈。結爲痰飲。遂成

壯熱壯熱不已。乃成風癇。兒啼未定。劇以乳哺。氣逆不消。因成乳癖。  
有孕而乳。致兒黃瘦。肚大腳小。名曰駁<sup>音</sup>病。搃之乳母能慎寒暑。恚  
怒厚味炙燂。庶乳汁清和。兒不致疾。否則陰陽偏勝。氣血沸騰。乳汁  
敗壞。必生諸病。若屢服藥餌。則臟腑陰損。多變敗証。不可不知。

初誕之時。有於頭額之上。髮際之間。灸之。又有以燈火遍身燒之。彼  
以爲能截風路。不知寔足以大開風門。蓋火攻由兒有病不得已而  
用之。無故而用。伐及無辜。諸病自茲始矣。戒之戒之。

凡浴時須調和湯水。試看冷熱。若不得所。令兒怖畏。况冬浴久。則傷  
寒。夏浴久。則傷熱。其浴兒當護兒背。恐風寒從背而入。

方可衣之。有鳥名天地女。又名隱飛鳥。最喜陰雨夜過飛鳴徘徊。其鳥純雌無雄。善落羽毛於兒衣中。令兒作病。不可不謹。

凡當春夏月間。宣令其地卧。使不逆生長之氣。如遇秋冬。宜就溫和。使不逆收藏之令。凡在春天。勿與護項裹足。足以致陽氣不舒。因多發熱。卽至年長。下體勿令過暖。蓋十六歲前。血氣方盛。如日方升。惟真陰未足。下體主陰。得清涼則陰易長。溫暖則陰易消。故曲禮云。童子不衣裘裳。

夫人以脾胃爲主。故乳哺宜節。節則調養脾胃。過則損傷脾胃。夏天

忌蒸乳。冬月忌寒。乳皆宜捏去之。而後與之。凡食後不可與乳。乳後不可與食。小兒脾胃怯弱。乳食並進。難於消化。初得成積。久則成癖。成疳。皆乳母不慎之過。

凡塞則加衣。熱則減衣。過寒則氣滯而血凝。過熱則汗洩而腠理疎。以致風寒易入。疾病乃生。更忌解脫當風。易於感冒。然風和日暖。又當抱出遊戲。如陰地草木。不見風日。未有能堅持者。又不可曰置地間。令肚着地。以致脾宮受寒。腹痛泄瀉。慎之慎之。

小兒初生飲食未開。胃氣未動。廓然清虛之府。宜乘此時。加意調燮。  
於兒未啼之時。令精巧婦女。輕指探兒口。控去汚血。隨以甘草湯。用  
軟帛裹指蘸湯。拭去口中涎沫。然後看兒面色。若身面俱紅。唇舌紫  
赤。知其必有胎毒。每日用鹽茶。但不可大鹹。以帛蘸洗其口。去其粘  
涎。日須五六次。此法至神至異。世所不知。蓋兒之胎毒。藏於脾胃。口  
中多有精涎。其馬牙鷺口。重舌木舌。皆從此起。每日洗拭。則毒隨涎  
去。病從何來。而且至簡至易。何忽視而不爲。倘胎毒重。直須洗至週  
歲。方可此有毒者之調燮也。倘兒面唇淡紅。此爲胎寒。不可用茶。惟

以淡薑湯洗拭每日一二次足矣。蓋薑能開胃而且和中最宜於時用者。至於古方之用黃連大黃硃砂輕粉開口之法。此時斷不可用。今時稟受十有九虛苦寒尅削最不相宜。如嬰兒初誕如蟄蟲出戶草木萌芽卒遇暴毒嚴霜未有不爲其殞折者。以苦寒而入初誕之口亦若是也。每見三朝七日必有肚疼嘔乳泄瀉夜啼之証。是皆苦寒傷胃之害。其孰能知之。或曰子言苦寒不可用於初誕之口。何以後之沉瀝丹及瀉青丸有三黃大黃得無矛盾乎。曰彼胎毒已現外証可憑。有病當何大黃之足畏。今初誕開口未辨毒之有無。即使有毒尙然未發。深藏潛伏聲臭俱泯。程鳳雖有言。正四開口無事。此

毒發而畏苦寒是有寇不誅鄉原之仁烏乎可也

晚發白帝城。朝辭白帝彩雲間。千里江陵一日還。

两岸猿聲啼不住。輕舟已過萬重山。

小兒初生。欲知其有病無病。以手捻其頭。摸其頤領不作聲者爲無病。以手指探其口。雖發聲而從容啞指者。有病亦輕。若急發聲不啞指者。面色青紅帶紫。或牙關緊急。不納乳汁。此落地受寒之甚。風邪入足太陽。及足陽明而然也。須急治之。庶可平復。初生之兒。肥胖色嫩。目覺好看者。此其根本不堅。甚非佳兆。且最易感冒風寒。邪入腑者。近在第二三日見之。其証吐乳夜啼腹鳴。此皆胎風之類。然証猶淺。而易治。宜用全身燈火。十不失一。若邪之入臟。遠在六七日見之。此卽齶風噤口撮口風之候。若口噤舌太痠壅者。皆不治。蓋病傳入。

臟係心脾肺三經也。此風氣甚盛無所發洩便形見於喉口牙閨聲音也。

凡生下時身破裂者死。陰囊白者死。陰不起者死。無糞門者死。股間無生肉者死。開口如鴟聲者死。粉白花色者死。皮肉不光者死。泣不出聲者死。舌如猪肝色者死。面無彩色者夭。臍帶短大紫色者夭。生下渾身銀白色者夭。生下有齒者大凶。夭傷父母不然必傷自身生下未裹卽撒尿者殺父母。蕩家產在世終身勞苦。

凡臨病家。診視小兒。無論病之輕重。証之順逆。稍長者。令其本身忌口。孔子卽令乳母忌口。嚴禁。羣酒油膩酸鹹辛辣。但可香茶白飯。稍用蜜餞餽食而已。蓋乳房爲胃經所主。飲食入胃。腐化精微而爲榮血。貯於衝脈。衝脈載以上行。遂變赤爲白。而爲乳汁。小兒賴此以爲命。與乳母氣候相閉。吉凶共際。是以母食熟子受熟。母食寒子受寒。母食毒子中毒。又惟羣酒油膩甘肥凝滯之物爲尤甚。故凡小兒有病。但得乳母忌口。卽不药亦能自愈。不覲窮鄉僻壤。藜藿單寒之家。所育之子。肥寔壯健。而且少病。病亦易愈。人但云他人之子。何以易

育。不知他家無甘肥凝膩。口腹清淡。所以病少而易育。自家乳母。縱口飲啖。葷酒不忌。醫雖用藥得法。其如乳汁不清。胃口油膩。不能宣布。藥力所以多病難醫也。此至緊。至要。閑頭醫者。不爲切戒。其咎在醫。至於病家。每多自誤。凡孔子有病。其母於房勞食飲。寒暑喜怒。一毫不慎。惟責效於醫之草根樹皮。詎知刀頭圭角。能勝其無情之相火。能制其有質之油膩耶。徒令醫者勞心。病兒受苦。深可悲憫。復有婦人姑息之愛。切要提防。昔予一堂弟。年八歲。因病傷寒。幾死。得遇明者保全。稍能步履。醫囑嚴禁葷腥。予伯母覲面承諾。私以爛蹄花一碗與之。病人見肉。登時食盡。時予目覩其事。夜即變証。四肢厥冷。

由因詢曾食何物。伯母堅辭無有微風不露。予亦莫敢直言。醫者無可下手。遂辭去。予取山楂肉炒研細末。以濃薑湯調灌數次。益山楂多服。最能通利。五更大瀉數行。所下油膩膠滯之物。內有膚肉。猶存人事條清。伯見所下之物。始知肉食生變。痛罵其母幾至反目。幸予在側。開解之令予調理。予爲暢脾而安此等曖昧。苟非予之目擊。伯母必不直告。卽至真死。彼亦不言。醫者亦不知其何以變証而死。可見婦女誤事爲禍。如此其烈也。凡類此者。以天下之大。又豈特一人而已。故凡遇膏藥宦室。不可不諱切言之。以杜其姑息之害。

小兒在胎之時。衝脈運血以養之。及其產下。衝脈載血以乳之。乳爲血化。所以兒之眸目獨與此乳汁相融合。其他則皆非所宜矣。凡小兒一週二歲止可飲之。以乳切不可餌以谷食。蓋谷食有形之物堅。難消。兒之脾氣未強。不能運化。每多因食致病。倘乳少。必欲借谷食調養者。須以早米炒熟磨粉。微入白糖。滾湯調服。不致停滯。至於肉食。尤爲有害。凡小兒五歲之內能忌肉食。終身無脾病。無柰愚夫愚婦。莫可理喻。見兒病稍愈。即以肉食飼之。謬云虛補不如寔補。謂弱補爲虛。內補爲寔。不知此語出於何經。妄誕無知。眞堪唾罵。及其脾胃凝滯。兒病復作。始爲倉惶懊悔。是誰之咎。故小兒病後。必不可

亥用葷腥只可素食調理或一月半月待其脾氣已健始可畧與澆  
湯仍不得過用甘肥。蓋甘肥之物非但不能益兒適足以致病。醫者  
能知此意治病必不掣肘。病家能依禁忌。斷無反悔之虞。此非模擬  
之辭。寔知之深見之確。端本澄源。莫切於此。予雖未學。臨証有年。病  
家之弊。無不周知。故不得不剖心相告。庶後賢知所提飭云。



稽凡治病之法舉不外乎望聞問切。以別表裏虛實陰陽大法。若此於幼何獨不然。而歷考前明治幼定規其要在辨指紋。蓋指紋者與寸關尺同一脈也。按內經十二經絡始於手太陰。其支者從腕外出次指之端而交於手陽明。宋人創之而錢仲陽則以食指分爲三關。寅曰風關卯曰氣關辰曰命關。其訣謂風輕氣重命危。言雖未必悉驗。而其義可取。後出惡醫謬撰驚風門類專從指上辨別。遇青紋則謂是四足驚。黑因水撰赤因火炎。則謂是八驚。紫色成鴉或兼土黃。則謂是雷驚。是紋之青黃赤黑皆驚之所致。而小兒之內傷外感。麻

痘等証虛寔寒熱。豈無所辨乎。乃悉以驚風治之可乎。噫。仲陽宋之明人也。以孝見稱。豈故出此謬妄之說。豈肯造此殺幼之罪。其由異徒假名而造孽也。明甚。然不有喻氏嘉言。陳氏飛霞二先生饒特識而力闢之。不至爲其所貽害者。幾希矣。雖然。指紋原屬大陰之旁支。與大淵無異。療幼兒者。焉可闢而不用。但當以浮沉分表裏。紅紫定寒熱。淡滯定虛寔。而尤必兼憑脈斷。第兒童幼小。三部之地位不寬。診切何從下手。古法以一指定三。其候仍不外定浮沉。有力無力。病之吉凶。亦從此驗。歌詳於後。可熟諳之。是故辨紋定法。切脈定規。明斯二者。思過半矣。又何容多論哉。然形色尤不可不觀也。聲音尤。

渴聲粗便閉者。其証皆屬寢。面白露睛。及形衰聲微。神恍便溏者。其証皆屬虛。而尤必視小兒向徃之好尚。與父母身體之強弱。詢乳母飲食之厚薄。性情之溫燥。與夫懷抱遊玩之地。及其供樂適情之物。且情意與何人相契。必問得病在何時地。必詢合而驗之。則病情無不瞭然。或溫或清。操卷可得。至假虛假寢。切要尤在脈之有力無力。心領神會。臨証用藥。庶無貽誤。所謂躋天傷於仁壽者。始此謂也。

附  
診脈法

小兒三五歲。原非大方可比。然亦可以診視。第手腕短促。三部摸分。

惟以一指候之。誠非易易。內經曰：診視小兒者，必察氣口之脈面部之色。呼吸之聲。或兼察手魚。亦可。診脈不必多歧。但以緩急大小爲準。余不避僭越。體其意。竟易爲浮沉遲數。而以有力無力。定其表裏。虛寔似比大。卽浮洪。小。卽沉細緩。緩。卽遲急。數。卽數爲明悉。後賢其體之類也。

附四脈主病

浮主表。病在外。沉主裏。病在內。遲主臟。病爲寒。數主腑。病爲熱。

四至五至爲遲。爲寒。爲不足。

浮遲外寒沉遲內寒  
有力寔寒無力虛寒

七至八至爲數。爲熱。爲太過。

浮數表熱沉數裏熱  
有力寔熱無力虛熱

附診脈主病歌

痰食害。

痰凝食滯  
結於裏也

沉沉無力氣凝胸。

氣滯於中  
不運化也

避而有力多爲痛。

浮

外痛沉  
遲內痛

無力虛寒氣血窮。

氣弱血衰  
至虛之候

數脈熱多終有力。

數而有力  
寒熱無疑

瘓無力熱虛攻。

陰血受傷  
虛熱所致

附 摠括脈要歌

大淵一指定安危。六至中和五至虧。七八至熱多三四至冷浮沉遲。  
數貴詳推。有力爲陽爲蹇。虛寒無力裏何疑。若能留意於中取。何致亡羊泣遠岐。

附

脈証宜忌歌

脈浮身熱汗之鬆。陽邪居表，不可攻代。咳嗽正嫌浮帶數。浮緩爲宜。浮數大忌。細沉腫脹定知凶。脾胃虛寒，氣不運化。沉遲下利方爲吉。血虛傷最。洪大偏宜痘疹逢。陰陽充足，毒不能留。腹痛不堪，浮有力。二陰受病浮嫌洪數。洪大偏宜痘疹逢。陰陽充足，毒不能留。腹痛不堪，浮有力。二陰受病浮洪吐衄。總無功。陽火大盛，陰血愈虛。


陶節菴曰：診脈之要，無論浮沉遲數，但於有力無力中分。有力者爲陽，爲寔；無力者爲陰，爲虛；爲寒，至哉斯言也。後賢無忽。

附病熱生死論

病熱脈懸小者。陽証見陰脈，本爲大忌。但小而緩者，邪之微，其愈易小而急者，邪之甚，可慮也。手足溫則生，寒則死。夫以稱陽之體，而加病熱脈，不當小若脈體雖小，手足溫者，以四肢爲諸陽之本，陽猶在也。故生者，四支未冷，此言側。

陽去矣故死。日風寒附體則肩者脈復大而緩則中於陽分而喘鳴息。肩者脈當寢大但大而緩則氣存邪漸退故生寢而急則真臟見病日進則死。

# 指紋三關圖



附 紋形主病歌

腹痛紋入掌中心。彎內風寒次第侵。紋向外彎痰食熱。水形肺肺兩

傷陰。

掌心包絡所主紋入掌中邪侵內臟由中氣寒也故腹痛紋若彎弓內外有別其紋彎向中指爲內爲順証爲外感風寒易治

彎向大指爲外爲逆証爲內傷飲食難治形如水字脾肺不足食塞天陰中氣怯弱脾不運化故也或問指紋止一線安有水字之形曰不觀大淵之脈亦止一線何以陽維陰維陽蹠陰蹠皆左右彈石豈非水字之形乎脈有左右安知紋無左右觸頰旁通無徃非理也

附

三關部位歌

初起風關証未央。氣關紋現急須防。乍臨命位誠危急。射甲通關病勢彰。

凡看指紋以我大指側面推兒食指三關若覆指而推紋必變色蓋

愈推愈出。大損肺氣可不慎乎哉。陳飛龍曰。指紋之法。起於宋孝子  
錢仲陽。以食指分爲三關。其法診食指之第一節寅位爲風關。第二  
節卯位爲氣關。第三節辰位爲命關。位則自下而上。邪則自淺而深。  
証則自輕而重。紋見寅關。邪氣初入。紋見卯關。邪氣正盛。紋見辰關。  
邪氣布散。透關射甲。則邪無所容。如亢龍之象矣。又當以浮沉分  
表裏。紅紫辨寒熱。淡滯定虛實。殆用之不盡也。夫乳子非無脈可診。  
虛寢不易定耳。然亦當以指紋之可見者。又診之於脈。互相印証。而  
聞聲察色。是固然也。

附浮表沉裏辨

指紋紅黃隱隱。孔子無病之診。指紋若浮。邪尚在表。速宜疏散。使邪隨微汗而解。指紋若沉。邪已入裏。但入有淺深之別。若指紋半沉往來寒熱。則邪尚在經。治宜解肌瀉火。指紋極沉。則邪已入府。急需攻下救裏。若見身熱。猶以風藥治之。此病在內。而治其外。不特邪不能服。適足躁其陰血。愈增其困耳。

附紅寒紫熱辨

指紋紅鮮。由血滯也。此寒邪初入皮毛之應。無論內寒外寒。初病久病。一見此紋。摠以寒証施治。若紋色淡瑩。中氣弱也。淡而兼紅。虛寒

必見紫。紫爲熱盛。千古定論也。至若肝膽受邪。指紋必青。此傷風候也。此可以風熱目之。不可云驚風以誤人。若紫而兼青者。是爲傷食。蓋飲食有形之物。阻抑中焦。壅遏脾氣。不能宣布。故風乘其因而侮。之所以痰氣上逆也。疎通壅滯。令其流利。則病愈矣。若青而兼黑者。此風痰寇熱。固結中焦。脾氣抑鬱之至急。宜攻下。庶有生機。誤認驚風。百無一救。

附 淡虛滯塞辨

小兒稟賦陽虛。面色晃白。脣舌淡瑩者。指紋四時皆淡。即有病之時。

亦止淡紅淡青淡紫而已。淡紅爲虛寒。淡青爲虛風。淡紫爲虛熱。無論新病久病。抱歸於虛。誤投攻伐。覆水難收。戒之慎之。若指紋滯滯全無活潑流利之象。此由飲食風熱相搏。是爲寔証。急宜蕩滌去其菀革。則易愈矣。若三關純黑。推之不動。不可治也。

附看驚紋辨生死歌

虎口有三關。 風氣命相參。

青風驚急病。

黃黑水傷餐。 紫色生驚曲。

紅青熱在肝。

閨中尋五色。 節節見紋斑。

已過三關節。

神仙不可扳。


右頰肺金左頰肝脾通鼻準定中央。印堂心位承醬腎就簡  
刪繁便覽着。

面圖式



面色部位圖

五臟所屬



察兒形色先分部位

欲辨形之强弱堅脆色之光澤枯榮必先分上  
下左右之部定五行四象之位然後按部察色

以定証

左頰青龍屬肝右頰白虎屬肺

蓋五行之位木旺在卯金旺

經曰左右者陰陽之道路也

亡安危

在酉天地之氣陽從

左升陰從右降故以左頰配肝

右頰配肺非謂

左頰卽是肝右頰卽是肺不過以生殺之理配木金龍虎之位以候

其臟氣之

天庭高而離陽心火地角低而坎陰腎水

周易以東震西

兌南離北坎定

強弱爾

子午卯酉之四正蓋後天之用有形者無不由之故以心配離

南之

午火於天庭腎

配坎

北之子水於地角亦陽上陰下之義第據其理

而言之非謂額上卽心唇下卽腎窮矣幼科

未識淵源刻舟求劍

未可向痴人而說夢也

鼻在面中脾應唇際

內經

爲中土

經曰中與黃色入通於脾開竅於口又曰脾胃倉廩之本其

華在唇四白故曰脾應唇際亦中州受納之地也或問既五臟之經

脈未行於面何以又從面部而察五臟之証能無幻耶

曰望色察証

金匱要略

卷一 方斗

辨色

七

內經之傳第軒岐大聖天人之學後世莫能效法所以據五行四象  
列以部位庶望色者有所憑依耳又曰布列雖按五行恐內臟之氣  
不應奈之何哉曰五臟之脈寔未行於面而藏象論曰十二經脈三  
百六十五絡其氣血皆上於面而走空竅蓋人上下九竅而七竅在  
面目二耳二鼻二口一故目爲肝竅耳爲腎竅鼻爲肺竅口爲脾竅  
舌爲心竅有此諸竅而後三百六十五絡之氣皆通於面故曰氣血  
走空竅由是按部察色以決其吉凶亦猶於脈之兩手六部分左心  
小腸肝胆腎右肺大腸脾胃命火兩手惟一肺脈耳他臟何涉亦前  
哲按八卦方位以手太陰一經巧分六部以候十二經臟氣之盛衰  
然則脈之隱微莫覩尙可候其成敗而色之一望顯然者獨不可推  
其吉凶乎醫理至微後賢幸勿忽畧紅色見而熟痰壅盛青色露而肝風忼忼此概言  
色通面爲足陽明胃經所主胃經鬱熱面必淡紅熱搏津液定化爲痰而壅滯風邪衝併面必見青心神不安則爲忼忼驚悸如煤  
之黑爲痛中惡逆傳似橘之黃食傷脾虛吐利面見黧黑至凶之候  
中惡之徵盜因惡毒之氣從鼻而入肺先受之沮遏正氣隧道不通  
所以腹痛邪盛不能自出反至子乘母位而難傳如橘肺脾運

都是水氣黃言其源黃也脾化失職所以食墮太陰脾氣凝滯故深黃上面必致有吐瀉之虞上乃肝勞紫爲熱熾白屬肺氣虛子傷累母所以脾必困而爲泪

日角難醫黑掩太陽不治

此下逐部分言之諸書皆誤爲日角不知面部無口角之位不但無此位証亦全不

符蓋小兒中氣強者唇不變色中氣虛寒者十有九青此爲常候非難醫之証今正之日角左額也猶日之東升而爲青色遮蔽爲木蔽陽光病則必有疑難之慮太陽左右兩額也太陽爲眾陽之宗屬火旺夏氣色宜紅今黑色掩映將有水來尅火之象定見傷殘故曰不治年壽赤光多生膿血山根青黑每多災異年壽鼻梁也爲氣之門戶赤光侵位肺必受傷氣不流行則血必凝滯將有膿血之災山根足陽明胃脈所起大凡小兒脾胃無傷則山根之脈不現倘乳食過度胃氣抑鬱則青黑之紋橫截於山根之位必有延綿啾唧故曰從異朱雀貫於雙瞳火入水鄉青龍達於四白肝乘肺位朱雀赤脈也雙瞳腎水也赤脈貫瞳火垂水位治宜瀉心補腎青龍肝木也四白肺金也白珠見青肝風侵肺治宜保肺

平肝瀉痢而戴陽須防咳嗽而拖藍可忌

瀉屬脾病病屬腎病脾腎兩臟既傷先後二天並弱面宜

憔悴今反面見紅赤知爲虛陽上泛故曰須防咳嗽肺病也青者肝色也由其肺氣已虛肝無所畏木乘金位恐其生火以尅金故曰可忌

疼病方殷面青而唇口撮肝風欲發面赤而曰竄視

疼痛腹痛也寒氣侵脾內

臟無火

一派陰冷阻抑陽和故面青而唇撮也竄視目直視也幼時指爲肝病其寔太陽經本証蓋太陽之脈繫目上納血虛受寒則上

網繫急故目直視今

指爲肝風必用風藥

紅其津液反成不救能知養血其病自瘳

火光焰焰外感風寒金氣

浮浮中藏積滯

通面火光風寒傷胃陽明拂鬱表未解也乍黃乍白

瘡積連綿又赤又青

風邪癰癧黃爲脾虛陽明運化無功久成積也

瘡積連綿又赤又青

風邪癰癧黃爲脾虛陽明運化無功久成積也

赤爲火色青爲風色

風火相乘榮血

枯燥筋脈牽強甚則搘搦而爲痙矣

以運乳食難消輕則爲積久則爲疳

小兒羸弱精髓不足者

平日腦髓未充賴氣以充之今大病之後中氣下陷安保其頤不或坑耶髮乃血之餘血染則髮黑今頤毛如草

血枯焦也。肝氣用火用涼用涼用涼用涼用涼用  
傷脾則渙冷熱傷肝則渙熱脾主汗脾氣虛冷不能  
收攝故津液妄泄而滯於頤間誤爲脾熱禍不旋踵。面目虛浮定腹  
脹而上喘眉毛頻蹙必腹痛而多啼。肺脾兩虛中宮寒肅以致氣不歸源反逆而之上則上氣喘急面目虛浮因知其內必腹脹小兒知識未開於七情六欲毫不相  
閉何頻蹙之有亦由臟寒腹痛所以不時啼哭而頻蹙不樂也。左右兩頰俱左  
右兩頰似青黛知爲忤客風氣二池如黃土無乃傷脾。青客忤之証  
由小兒神氣怯弱陽和未充外邪客氣得以乘之從鼻而入忤其正  
氣則口吐青黃白沫面色變異不常腹痛喘急者是也風池氣池眉  
上眼下也風池屬肝氣池屬胃如黃土之色由木勝土覆所以眞臟色見  
吉昏暗危爲風門黑主疝青爲風方廣光滑  
風門者耳前也少陽經所主黑則爲寒爲疝青則爲燥手如數物兮肝風將發面若朱兮心火燃眉。邪熱傷神手如數物謂十指屈伸不定如數物

之狀速宜疎解熱邪斷無肝風之發淡紅爲陽明胃經表熱深紅爲少陰心經裏熱面若塗朱知爲心熱心不可瀉惟瀉小腸丙火一清丁火坐卧愛煖風寒之入伸縮就冷煩燥何疑

凡小兒偎入母懷蕭

惡風寒也由風寒初入未能化熱所以坐卧愛煖邪已入裏則掀衣揭覆揚手露面偃臥仰卧口渴燥煩由其內外皆熱所以欲就溝涼

肚大脚小脾欲困而成疳目瞪口張勢似危而必斃

脾不運化而肚大肌肉消削而

脚小甚脾主肌肉由其乳食失節所以脾困而成疳膀胱絕而目瞪脾氣絕而口張其勢已危必無可生之理

噫五體以頭爲尊一面惟神可恃况聲之輕重不同啼之乾溼頓異呵欠連綿知

病之欲作忽然驚叫識火之將熒此察証之規繩辛拳拳而不諍

頭

元首故以爲尊面分五位惟神是賴神存則生神亡則死蓋指眼光

而言也况聲有輕重啼有乾溼安得無辨凡聲微者知其氣不足聲

壯者知其氣有餘哭而無淚者寔哭而多淚者虛呵欠連綿爲陰陽交引升降不前知其病之將至忽然大叫則相火熱裏神

是圖自不致有望洋之嘆矣

金居園

卷一

方言

二

夏禹鑄曰。望聞問切。固醫家之不可少一者也。在大方脈則然。而小兒科惟以望爲主。問繼之。聞則次。而切則無矣。經云。切而知之。之謂巧。夫小兒以脈未全。切之無可切。而巧亦無所用其巧。問而知之。謂工。小兒於未言時。問之無可問。卽於能言者。問之多不以寔對。是問不必問。而工亦無所用其工。聞而知之。之謂聖。小兒初病時。聲音或不失其常。至病久。而氣喪。氣喪而聲失。聞之無可聞。而聖又何所見其聖。况書曰。哭聲不嚮。赴陰君。而亦有不赴陰君者。何無非擬其聲。不得肺之絕與不絕故也。吾故曰。以望爲主。曰五臟之屬體。隱而

全圖卷之二  
理微。望從何處。曰體固隱矣。而發見於苗竅顏色之間者。用無不周。理固微矣。而昭著於四大五官之外者。無一不顯。中庸所謂費而隱。微之顯者。不可引之相發明哉。故小兒病於內。必形於外。外者內之著也。望形審竅。自知其病。按病用藥。見效之速。未有不如嚮之應聲者。內有臟。曰心。曰脾。曰肺。曰腎。曰肝。五臟不可望。惟望五臟之苗與竅。舌乃心之苗。紅紫心熱也。腫黑心火極也。淡白虛也。鼻準與牙床。乃脾之竅。鼻紅燥脾熱也。慘黃脾敗也。牙床紅腫熱也。破爛胃火也。唇乃脾之竅。紅紫熱也。淡白虛也。黑者脾將絕也。口右扯肝風也。左扯脾之疾也。鼻孔肺之竅。乾燥熱也。流清涕寒也。耳與齒乃腎之竅。

正陽氣利也。正清勝腎也。齒如豆也。閉氣也。七日乃愈。視而睛轉者風也。直視而睛不轉者肝氣將絕也。以目分言之。又屬五臟之竅。黑珠屬肝。純見黃色凶証也。白珠屬肺。色青肝風侮肺也。淡黃色。肺有積滯也。老黃色。乃肺受濕熱証也。瞳人屬腎。無光彩。又兼發黃。腎氣虛也。大角屬大腸。破爛。肺有風也。小角屬小腸。破爛。心有熱也。上胞屬脾。腫則脾傷也。下胞屬胃。青色胃有風也。睡而露睛者。脾胃虛極也。面有五位。五臟各有所屬。額屬心離火也。左腮屬肝震木也。右腮屬肺兌金也。口下屬腎坎水也。鼻准月屬坤土也。五臟裏也。六腑表也。小腸心之表。小便短黃澁痛心熱也。清長而利心虛也。

胃乃脾之表。唇紅而吐。胃熱也。唇慘白而吐。胃虛也。唇色平常而吐。  
作傷胃論。大腸肺之表。閉結肺有火也。肺無熱而便秘。血枯也。不可  
攻下。脫肛。肺虛也。胆乃肝之表。口苦。胆火也。聞聲作驚。肝虛也。膀胱  
腎之表。筋腫筋痛。腎之寒氣入膀胱也。面有五色。一曰紅。紅病在心。  
面紅者熱。一曰青。青病在肝。面青者痛。一曰黃。黃病在脾。面黃者脾  
傷。一曰白。白病在肺。面白者中寒。一曰黑。黑病在腎。面黑而無潤色。  
腎氣敗也。望其色若異於平日。而苗穀之色與面色不相得。則臟腑  
虛寢。無有不驗者矣。

肝者足厥陰木也。寢則目赤。大叫呵欠頓悶。虛則呵欠咬牙。有風則目連劄。有熱則目直視。成疳則白膜遮睛。至怒則性急大叫哭甚。則卵腫。熱則大小便難。手尋衣領。手亂撓物。甚則撮空摸床。此喪魂丙也。兒病時目睛視物不轉。或目合不開。或目開不合。或哭而無淚。或不哭而淚出。皆肝絕也。

心者手少陰火也。寢則叫哭發熱飲水。虛則困卧悸動不安。心血足。則面色紅潤易養。心血虧則面色晄黯難養。熱甚則津液乾而病渴。神亂而卧不安。喜伏卧。舌破成瘡。又爲重舌木舌舌出不收之病。凡

病丹瘤斑疹。龍驤虎骨虫疥。燒瘻皆心之証也。如心病久。汗出髮潤。或舌出不收。暴瘡不語。或神昏潰亂。或斑疹變黑。此皆心絕也。

脾者足太陰土也。爲水穀之海。寢則困睡。身熱飲水虛則吐瀉生風。陽溼則爲腫。爲脹。爲黃。爲吐瀉。故脾痛則腹痛。脾疳則肚大青筋。脾熱則口臭唇瘡。飲食不爲肌膚。吐舌弄舌。口乾飲水寒則口角流涎。謂之滯頸。氣不和則口頻撮。虛則肉削而瘦。不喜飲食。傷食則成積。積久則成疳。成癖。如脾久病。大肉消削。肚大青筋。或遍身虛腫。或吐瀉不止。飲食不入。或多食而瘦。或虫出於口。或唇蹇而縮。皆脾絕之証也。

之衣薄受寒也。又曰。熱傷肺。由兒之衣厚鬱熱也。凡兒寒熱傷肺。則氣逆而爲喘。爲咳。肺受風則噴嚏而流清涕。受寒則鼻塞。呼吸不利。受熱則鼻乾。或爲衄血。成疳則鼻下赤爛。喘不止。則面腫。咳不止。則胸骨高。謂之龜胸。燥則渴不止。好飲水。謂之膈消。如肺久病。咳嗽連綿。喘息不休。或肩息。或龜胸。或咳血不止。或鼻孔黑燥。或鼻孔開張而喘。或渴痢不休。大孔如筒。或面目虛浮。上喘氣逆。皆肺絕也。腎者。足少陰水也。虛則目畏明。目中白睛多。其顱卽解。色㿠白。骨髓不滿。兒必畏寒。多爲五軟之証。尻骨不成。則坐遲。髀骨不成。則行遲。

真陽不足。則齒遲。血脈不榮。則髮稀。心氣不足。則語遲。熱則耳中出膿。生瘡。如腎病久。身下竄。目中如鬼狀。或骨痿弱。卧不能起。或二便遺失。此腎敗也。

附簡切辨証

小兒熱証有七

面腮紅 大便秘 小便黃 渴不止 上氣急  
足心熱 眼紅赤 此皆寃熱証忌用溫補

小兒寒証有七

面胱白 痰青白 口虛張 眼珠青 上高無熱

附壽天辨

頭者諸陽之會。髓之海也。凡兒頭角豐隆。髓海足也。背者五臟六腑  
俞穴。皆附於背脊。背平滿。臟腑寔也。腹者水谷之海。腹皮寬厚。水谷  
盈也。目爲肝竅。耳爲腎竅。鼻爲肺竅。口爲脾竅。七竅無闕。形象至矣。  
故知肉食者脾足。筋强者肝足。骨堅者腎足。不妄言笑者心足。不多  
啼哭者肺足。哭聲連續者肺寔。不久眠睡者脾寔。兼之脚健而壯。項  
長而肥。囊小而黑。根株固也。肌肉溫潤。營衛和也。而更腮妍如桃。髮  
黑似漆。表氣寔也。小便清長。大便滋潤。裏氣寔也。已上皆爲壽相。其

兒無病易養。

諸陽皆起於頭。顱破項軟者。陽衰於上。諸陰皆起於足。腨小腳蹠者。陰衰於下。鼻孔乾燥肺枯。脣縮流津脾冷。髮稀者血衰。項軟者柱折。青紫之筋散見於面者多病。風熱兼之形枯色灰者表虛。渴利無時者裏虛。瘡疥啼哭及多笑語者皆屬陽火妄動之候。已上皆爲天相。其兒多病者難看。

凡聲音清亮者壽。有回音者壽。哭聲澀者病。散而無聲者夭。

變蒸之說。自古無之。至西晉王叔和始創其論。謂嬰兒生下三十二日一變。六十四日一蒸。爲究其義。則謂變者。變生五臟。蒸者。蒸養六腑。長益氣血。而生精神。益智慧。凡五百七十六日而畢。每當其候。惟有身熱耳。冷驚惕而已。別無他病。稽其制治下方。則或曰令母服小柴胡湯。或則用硫銀丸。是無論其變蒸之無。卽其用藥已大逆天地。生育之機矣。而况乎一言昌之後。議雜出。或則以天一生水。徵其變。或則以木火相生。定其蒸。不但此也。且有以木金相尅爲言者焉。噫。今日之幼兒。異日之強壯也。考夫生生之道。人身爲一小天地。人之

生也。本陰陽自然運化之理，在人身。本父母精血而成，陰陽化之精，血育之。必化育其內外五官五臟六腑百骸之無缺，而乃生。苟有之不具，則斷其無生長之日。卽生長之，亦終爲廢人。是則小兒初生，百體無不具。卽有不具，亦不過增長之而已。何待乎變？抑何待乎蒸？縱或有所謂變，有所謂蒸，其說宜有定論。又何至各執一見，紛然逞爲異說哉？則變蒸之無其說也。有斷然者，况後之明達若張氏、景岳、陳氏、飛霞，歷有定論。卽予醫數十年，療治小兒，不可勝數，從未見有一如所謂變蒸之期，而依候而發熱者。有之，或前乎其期數十日，或後乎其期數月，是豈變蒸也乎？故敢執鄙見而化之曰：「小兒無常之症。」

貽悞遲延。殺人於無形也。有心保赤者。其信然乎。

附 勿輕眼藥

初誕之兒。未可輕藥。蓋無情草木氣味不純。原非嬌嫩者所宜。且問切無因。惟慾望色粗疏之輩。寒熱二字。且不能辨。而欲其識証無差。未易得也。凡有微疾。不用倉忙。但令乳母嚴戒油膩葷酒。能得乳汁清和。一二日間。不药自愈。所謂不药爲中醫。至哉言也。每見愚人。兒稍不快。卽忙覓醫。練達者或不致悞。疏畧者。惟以通劑。驚風。藥治之。此無事之中。生出有事。伐及無辜。病反致重。父母見其無效。是必更

醫卒無善手。相與任意揣度。曰風。曰痰。曰驚。曰熱。前藥未行。後藥繼至。甚至日易數醫。各爲臆說。湯丸疊進。刻不容緩。嗟乎。藥性不同。見識各異。嬌嫩腸胃。豈堪此無情惡味。擾攘於中。不必病能傷人。而藥即可以死之矣。予每見不聽勸戒。艾薺妄投者。百無一救。哀哉。馮楚瞻曰。凡爲幼科。猶宜參看方脈諸書。蓋幼稚名曰啞科。疾病痛苦。多能告人。全賴治者細心詳察。况幼科諸書。理淺言畧。難明病源。惟以小兒不節飲食爲執。見最重消磨。更以純陽之子爲定論。恣投寒苦。孰知易停滯者。脾氣必虛。若圖見小效於目前。則便遺大害於日後。况小兒易虛易寢。言虛者。正氣易於虛也。言寢者。邪氣易於虛也。

吉不預測上同之指掌石部風之急切。其氣。

不敗者幾而如寒傷營也。溫養營陰。風傷衛也。惟辛調衛氣。但使營衛和平而宣行。則客邪不攻而自散。使正氣自行逐賊。則邪氣退而正氣安然。如浮雲一過。天日昭明也。若耑投與氣血無情之猛劑。客邪雖散。正氣亦傷。乘虛之邪。將接踵而至矣。豈知正氣不至。空虛邪。必不能發而爲寢。至於云純陽者。以無陰而謂。乃穉陽耳。其陽幾何。陰氣未全。而復敗其陽。將何以。善其生長耶。况天地之氣化。日薄男女之性情。日漓。幼穉之稟。受日弱。有稟父之陽氣不足者。多犯氣虛中滿。有稟母之陰血不足者。多犯陰虛。發熱。患痘。則多犯腎虛。內

潰之証。此皆先天不足所致。近來比比皆然。若徒效上古尅削寒涼。如肥兒丸蘆薈丸之類。則千中千死。莫能挽也。至云小兒陽火有餘。不知火之有餘。寔由水之不足。壯水以制陽光。先賢至論。服寒涼。百不一生。古哲格言。以不生之药。投欲生之兒。心何忍哉。凡小兒脾胃。自能消穀。今偶有停滯。則脾胃受傷。祇健其脾胃。而穀自化矣。故方有助脾消化推蕩。谷氣者。有稟命門火衰。補火生土者。有一消一補者。有以補爲消者。誠恐寬一分。卽耗一分元氣也。夫人有<sub>火弱</sub>。在此一氣易虧難復。何可輕耗。况幼穉之稟。尤爲易虧。惟必根<sub>氣虛</sub>。<sub>脾虛</sub>。之薄弱。而從方脈諸書。求源探本。以爲治。斯能補救。當代赤子。安之良計。後

幼科淺畧方論。則猶灌漑樹木者。不顧根本。而惟洒潤枝葉。欲望其生長。未之有也。而况復加剗削者乎。

附  
莉餌之誤

小兒氣血未充。一生盛衰之基。全在幼時。此飲食之宜調。而莉餌尤當慎也。今舉世幼科。既不知此大本。又無的確明見。而惟苟完目前。故凡遇一病。則無論虛實寒熱。但用海底兜法。而悉以散風消食清痰降火。行滯利水之劑。揔不出二十餘味。一套混用。謬稱穩當。何其誕也。夫有是病。而用是藥。則病受之。無是病。而用是藥。則元氣受之。

小兒元氣幾何。能無陰受其損而變生不測。此當今幼科之大病。而醫之不可輕任者。正以此也。又見有愛子者。因其清瘦。每以爲慮。而詢之庸流。則不云痰火。必云食積。動以肥兒丸保和丸之類。使之常服。不知肥兒丸。以苦寒之品。最敗元陽。保和丸。以消導之物。極損胃氣。謂其肥兒也。適足以瘦兒。謂其保和也。適足以違和耳。卽如抱龍丸之類。亦不可輕易屢用。予嘗見一富翁之子。每多痰氣。或時驚叫。凡遇疾作。輒用此丸。一投而愈。彼時以爲神丹。如此者。不曾十餘次。及其長也。則一無所知。凝然一痴物而已。豈非暗損元神所致耶。凡此尅伐之劑。最當慎用。故必有真正火証。府熱。乃宜肥兒丸。及寒涼。

抱龍丸及化痰等劑。卽用此者亦不過中病則止。非可過也。倘不知此而徒以肥兒保和等名。乃欲藉爲保障。不知小兒之元氣無多。病已傷之。而醫復伐之。其有不痿敗者鮮矣。

附神奇外治法

疎表法。小兒發熱。不拘風寒食飲時行痘疹。並宜用之。以葱一握。搗爛取汁。少加麻油在內。和勻。指蘸葱油。摩運兒之五心頭面項背諸處。每處摩擦十數下。運完。以厚衣裘之。蒙其頭。畧疎微汗。但不可令其大汗。此法最能疎通腠裏。宣行經絡。使邪氣外出。不致

久羈榮衛而又不傷正氣誠良法也。

清裏法。小兒發熱至二三日。邪已入裏。或乳食停滯。內成鬱熱。其候五心煩燥。睡卧不寧。口渴多啼。胸滿氣急。面赤唇焦。大小便祕。此爲內熱。以雞蛋一枚去黃。取清以碗盛之。入麻油。剉與蛋清等。再加雄黃細末一錢。攪極勻。復以婦女亂髮一團。蘸染蛋清於小兒胸口。拍之。寒天以火烘煖。不可冷用。自胸口拍至臍輪止。須拍半時之久。仍以頭髮敷於胸口。以布蒙之。炷香久。取下不用。一切諸熱皆能退去。蓋蛋清能滋陰退熱。麻油雄黃拔毒涼肌故也。此身有熱者用之。倘身無熱。惟啼哭焦煩。神志不安者。不必蛋清。

草此用本草者。其氣也。但取用口自服安。則此法多能危院之。  
証功難殫述。

解煩法 凡小兒寢熱之証。及麻疹毒盛。熱極。其候面赤口渴。五心  
煩熱。啼哭焦擾。身熱如火。上氣喘急。揚手擲足。一時藥不能及。用  
水粉一匙。以雞蛋清調勻。畧稀。塗兒胃口。及兩手掌心。復以釀酒  
小麵十數枚。研爛。熟酒和作二餅。貼兩足心。布紮之。少頃。其熱散  
於四肢。心內清涼。不復啼擾。

開閉法 凡小兒風癆閉塞。昏沈不醒。藥不能入。甚至用艾火灸之。  
亦不知痛者。蓋因痰塞其脾之大絡。截其陰陽升降之隧道也。原

非死証用生菖蒲生艾葉生薑生葱各一握共入石臼內搗如泥。以麻油好醋同前四味炒熟布包之從頭頂背胸四肢乘熱往下熨之其痰一豁然而醒此方不特小兒凡閉証皆效。

引痰法 凡小兒痰嗽上氣喘急有升無降喉中作牽錐聲須引而下行用生白礬一兩研末少入麵粉米粉亦可蓋生凡見醋卽化成水入麵粉取其膠黏故也好醋和作二小餅貼兩足心布包之一宿其痰自下。

煖痰法 凡小兒胸有寒痰不時昏絕醒則吐出如菉豆粉濃厚而帶青色此寒極之痰前法皆不能化惟以生附子一枚生薑一兩。

同治御醫卷之三 方脉前編 卷之三 飲食方

口良久其痰自開。

納氣法 凡小兒虛脫大証。上氣喘急。真氣浮散。不得歸元。諸藥莫效。用吳茱萸五分。胡椒七粒。五精子一錢。研極細末。酒和作餅。封肚臍。以帶繫之。其氣自順。

通脈法 凡小兒忽爾手足厥冷。此蓋表邪閉其經絡。或風痰阻其榮衛。又或大病之後。陽不布散於四肢。速用生薑煨熟搗汁半小杯。畧入麻油調勻。以指蘸薑油摩兒手足。往下磋挪揉捩。以通其經絡。俟其熱回。以紙拭去之。 凡小兒指紋帶濶。推之不動。卽以

此法推諳之益此法不論陰陽虛實用之皆效

定痛法 凡小兒胸中飽悶。臍腹疼痛。一時不能得藥。用食鹽一碗。鍋內炒極熱。布包之。向胸腹從上熨下。蓋走血分最能軟堅。所以止痛。冷則又炒。又熨。痛定乃止。凡男婦氣痛。皆同此法。

以上九法。非古書所有。寔予異授心傳。經驗既久。神應無方。筆之於書。以公世用。

濂江黃朝坊妙山輯著

臍風證論

臍爲百風總竅。五臟寒門。道家謂之下丹田。爲人身之命蒂。兒在胎時。口鼻未通。呼吸惟臍間真息。隨母之呼吸爲呼吸。及其下地。因底一聲氣通口鼻。而胎元之一息。不復爲用矣。遂寄於臍內一寸三分。中虛一穴。左青右白。上赤下黑。中央黃色。八脈九竅。經緯聯絡爲真息往來之路。坎離交會之鄉。凡修鍊仙胎。皆從此處立基。所以謂之命蒂。故小兒初生。惟臍之平。係最重。斷臍之時。不可不慎。或剪臍帶。

大短或結束不緊致外風侵入臍中或浴兒時卒動臍帶水入生瘡客風乘虛而入內傷於腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺蘊蓄其毒發爲臍風其証面赤喘叫者心病手足微搐者肝病唇青口撮瘦澀壅塞者脾病牙閑緊急者腎病喘哭不止者肺病五臟之證畧見一二者猶可治悉見者不治然其症亦不止此也有曰臍風曰噤口曰鎖肚者雖皆臍症而寒熱自別試詳別之免滋悞夫所謂臍風者由斷臍後爲水濕風寒所乘入於臍而流於心脾令肚腹脹滿吮乳口鬆多啼不乳此初起之時速用火攻散之若至氣息喘急啼聲不出或肚上青筋吊注作漏比附毒火風邪水氣卦用火攻對此皆當

七氣湯若崩脣舌腫口不開。天門緊閉。口噤目瞑。凡此皆是。不治。所謂噤口者。其症眼閉口噤。啼聲漸小。舌上聚肉如粟米狀。吮乳不得。口吐白沫。大小便不通。遇此先看其上齶有點子。即以指甲輕輕刮破。以木香白蔻仁各五分。煎湯化下。沉澁丹利動臟腑氣順。自愈。所謂鎖肚者。由胎中熱毒壅盛。結於肛門。大便不通。即令婦人溫水漱口。吮兒之前后心並臍下。及手足心共七處。凡四五次。外以輕粉五分研末。蜂蜜少許。溫水調服。以通爲度。如更不通。以葱白三五寸長。用油抹潤。輕透穀道。納入二寸許。以通爲快。若至七日不通者。死。古人之論脣風。皆謂由於水濕風冷所致。予則以爲古論猶未

盡也。蓋臍風有內外二因。有可治不可治之別。外因者。風濕所傷。內因者。稟父之真陽不足也。予嘗見一婦。產育十數胎。皆男。盡殞於七日內之臍風。無一存者。若謂外邪所傷。何以獨傷此家之兒。又豈無一兒能避之者。此內因之顯而易見者也。凡男子之命門真陽不足者。右尺脈必細澁無神。生子必有臍風。此予察之詳見之確。非耳聞者比也。其外因者。病發於二三四五日之間。病生於六府。故可治。內因者。必發於六七日之間。病生於五臟。故不可治。曩者夏禹鑄有預防臍風之訣。謂三朝一七看兩眼角黃。必有臍風。不知稟受厚者。生下卽滿面紅黃。乃爲吉色。誤認臍風。其害不小。此法不唯難于學。而且難于用。

多而不發臍風者亦有。徒執此法未必皆合。又必看小兒或不時噴嚏。更多啼哭。吮乳口鬆。是真候也。急宜治之。第臍風之治無一成法。可遵。雖有疎風攻下之法。莫能濟急。獨予異授。燈火無論臍風症。插以及凶危險證。用藥不能挽回者。此火可以生之。久經效驗。未肯輕傳。因見幼科不知火穴。往往錯誤用之。反致引動風邪。蔽固火毒。致兒身熱。不退。火毒內攻。每多不救。故不忍隱秘。蓋行吐露以公諸世。世之幼科治病。輒曰剪風。曰截風。夫剪者。邀遏之謂也。截者。堵塞之謂也。以火攻用於中宮任脈所行之地。豈非堵遏其邪。而犯閨門逐

益之戒乎。不知風邪之在人身。善行數變。無形無聲。欲除其害。無如疎散條達而去之。不使久羈於營衛經絡。則善矣。而仲景治傷寒而立汗吐下三法。邪之在表者。汗而散之。邪之在上者。吐而越之。邪之深入者。下而奪之。總欲其邪盡而后已。未聞有邀截之爲也。今幼科不但爲逐邪。而反閉關絕險。阻其去路。使邪氣進不可退。不能猖狂躑躅。欲其不倒刃相攻。斬關逆犯者。不可得也。此皆爲治者釀成之禍。於邪何尤。凡邪之傷人。未有不從三陽而入。驅除之法。亦必使其從三陽而出。故此火穴。亦惟三陽有之。蓋欲引其出表。斷不使之

臍爲命蒂。臟寒門百風總竅。此爲宗口。鼻未通在胎候。呼吸隨母相送。巡產則氣纏逼鼻口。胎元一息寄臍中。一寸三分中虛一穴。五色湏從五處分。八脈九竅均聯絡。坎離交會。息最真。兒在初生。臍最重。斷時宜慎。莫輕心外風侵入。緣何故剪臍大短。結束鬆。或爲浴兒臍帶動水入生瘡。病適成客氣乘虛內傷腎。肝心脾肺轉相循蘊。蓄其毒。臍風發症分五臟可推尋。面赤啼叫爲心病。四肢微搐乃肝病。脾病。瘡瘍澁多壅塞。更兼口撮與唇青。病在腎者牙閉緊。肺病必多啼哭。聲症見一二。猶堪治。諸病同生醫術窮。更有三症分寒熱。噤口鎖肚。

台腑風。腑風病起。斷脣後。風寒水溫并相乘。初起口鬆兼腹滿。多啼不乳。火宜攻。啼聲不出。氣喘急。吊疝作痛。見青筋火。攻治外。藥治內。括迷七氣湯最工。口噤眼閉。啼聲小。舌上聚肉粟米同。口吐白沫難。吮乳。又兼大小便難通。上膩有点輕刮破。木香白蔻仁湯吞沉澀丹。

靈鎮肚大便閉緣胎毒壅結。肛門是病根。急令婦人溫水漱口。吮兒

七處。前心手足心及膀胱四五巡。輕粉五分。蜜少許。溫水調便通病自寧。倘

更不通。何法治。油抹擦白三四寸長法宜遵。輕透穀道湏納入。二十許通則

快。今否則凶。諸症製方傳自古。古法雖詳。卒未精。脣風原有內外二因。辨莫執水溫風冷論。外因本屬風濕。人稟仗陽弱。是內因。胸膈熱。外因

辨莫執水溫風冷論。外因本屬風濕。人稟仗陽弱。是內因。胸膈熱。外因

命門真陽弱右尺細濶必無神。生子必有脣風症。予曾目見豈無憑。  
外因可治病由府。內因難治由臟。生尙謂脣風鬼兩眼角黃預爲防

救命遭傾乳內小孩亦難定湏。將真候細心評。不時噴嚏多啼哭。吮  
乳口鬆真候臨。斯時論治無成法。異投燈火醫要明。時醫誤用多貽  
害。剪風截風技殺人。疎散風邪方爲美。譬治傷寒可引伸。去邪法分  
汗吐下。剪截由來我未聞。今不逐邪偏閉塞。邪將猖獗禍彌深。不知  
邪自三陽入。驅邪之法必相從。火穴亦惟三陽有。引邪出表定回春。

方

沉瀣丹

川芎酒

炒

莊黃

酒

黃芩酒

炒

黃柏酒

炒各

卜荷四分

半

渭石水飛

六分

枳壳

麴炒四分

不半

連翹去心膈

六分

芍藥炒六分

不

牽牛頭末

取

六分

枳榔童便洗服

七分

不半

不半

不半

連翹去心膈

六分

芍藥炒六分

不

牽牛頭末

取

右爲細末。蜜丸芡實大月內之兒服一丸。稍大者二丸。用茶湯化服。乳母切忌油膩。但覺微有泄瀉。病即減矣。如不泄再服。重病日三服。以愈爲度。此方斷不峻厲。毋疑畏。惟胎寒怯面青白者。

忌之。

法下 肉桂 公丁香 益智仁

石菖東水煎。母子同服。

辰砂殼蠶散 治撮口脣風鎖肚。

辰砂水飛五分殼蠶炒一小分天竺黃五分

蚌珍珠三分真射香一分

右爲末。每用少許蜜調抹兒口內。

龍胆湯 治身熱脣風撮口。

龍胆草

鈎藤鈎

北柴胡

片黃芩炒六分

京赤芍

炙甘草

芽枯梗

白茯苓各五分

川大黃紙包煨一分

右大棗一枚水煎溫服

治撮口用牛黃一分研末竹瀝調滴入口中

一方取蝎虎一個卽壁虎也裝瓶內用硃砂細末亦入瓶內封其口月餘

令食砂取出其身赤色陰乾爲末每二分酒調下

一方用穿山甲用尾上甲三片羊油炙極黃色蝎梢七個共爲細末入乳汁調塗乳上

令兒吮之用厚衣裹包湏與汗出卽愈

保生湯 治胎風鎖肚口噤

北防風七分

陳只壳五分

小橘紅四分

白茯神三分

荆芥穗三分

遠志肉四分

製南星五分

芽桔梗三分

炙甘草二分

燈芯引

紅飯豆

淡豆豉

天南星

白芨

名

右爲末用芭蕉自然汁少加香油調藥敷處四傍得小便自下即

愈。

龍骨散 治臍瘡。

石龍骨

真輕粉

川黃連

白芨

右爲末乾掺。

一方用大紅羊絨燒灰爲末敷之效。

臍證簡便方

小兒初生犯撮口臍風荷包風鴛口風等項并齒根邊生白點名馬牙。啼哭不吮乳。卽看口內堅硬之處。或牙相邊白點。將針挑破出血濃煎薄荷湯磨京墨調勻。以指攬過再以產母亂髮蘸墨滴口搽之。仍用新青布蘸溫水展口。卽愈。

小兒臍風撮口用完全生葱二根搗爛取汁。又以直殼蚕三個炒去絲研細末。以葱汁調勻塗母乳頭上。令兒含之。或灌兒口內亦可。小兒臍風撮口以艾葉燒灰填臍上。以帛綁之。若臍帶已落。用蒜切蒲片貼臍上。以艾火灸之。候口中有艾氣。即愈。

小兒臍風初生口噤不乳。單兒十四日。故全消。尾註洗肚方。尾注十四

小兒撮口。但看舌上有瘡如粟米者是也。以蜈蚣炙焦研末敷之撮口。噬風面黃色氣喘聲不出。由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強脣青聚口發噤。用直殼桑二枚去嘴略炒爲末蜜調納兒口中。

小兒十日內口噤不乳。取大蜘蛛一枚去足炙焦研細末入猪乳一小杯和勻分作三次徐徐灌之。神效無比。

小兒臍瘡出血及膿。用海螵蛸胭脂共爲末。以油潤瘡乃搽藥。

通鑑卷之二

通鑑卷之二

通鑑卷之二

通鑑卷之二

夫嬰兒全身燈火。誠幼科第一捷徑。寔有起死回生之功。火共六十四。陰符易數。能疎風散表。行氣利痰。解鬱開胸。醒昏定搐。一切凶危之候。火到病除。用火之時。倘值寒冬。必於房中燃燒明火。使兒不致受寒。燈草大小適中。以麻油染呴。令老練婦人抱兒。解衣去帽。從左耳角孫起。總依后之歌訣用之。凡用火不可姑息。勿謂火數太多。憫其難受。蓋小兒受病。由其經絡凝滯。臟氣不舒。以火散之。正欲使其大叫大哭。方得臟氣流通。渾身得汗。營衛宣暢。立時見功。此火暗合周天。不可減少。少則不效。若救臍風。非此不可。火穴圖歌並列於后。

銅集成神火圖



銅人

面

背

人

壯骨

慤脈

肺俞

合谷

肺俞

合谷

陽陵泉

身神至筋脊命陽腰  
枉道陽縮中門閨俞

長強

承山

崑崙

陽陵泉

附集成神火歌

仙傳神火天然理。始自角孫瘛脈起。凡用燈火無論男嬰女嬰皆從左邊用起角孫在耳尖上瘛脈

在耳听宮曲鬓本神旁。次及天容仍右取。听宮在耳門前曲鬓在鬓后根

脚旁本神在額角天容在耳輪根下左邊已完右亦如之

頸會承漿左肩井。曲池合谷期邪屏。

頸會卽頸門承漿在下唇宛宛中肩井在肩上宛宛中從左起

故曰左肩井曲池在肘灣上廉屈縫處合骨在虎口近火骨處氣闔已過至神門右亦如之昏可醒

氣閔在食指第二節神門在掌后下廉銳骨之端左完右亦如之

左乳根中七燻始。右亦如之何待齒。

自左乳根下起從上至下脣下七燻止右乳根亦如之

陰交續命關。平平三點凶危止。

陰交在肚臍下

青中身柱王長強筋俞。陽陵泉承山當下九椎至長強穴止。肺俞在兩飯匙骨縫中。陽陵泉在膝外邊下三寸。承山在脚肚盡處。崑崙解谿邱墟穴。湧泉右亦效之良。崑崙在外踝骨后。解谿在繫鞋帶處。邱墟在外踝骨前。湧泉在腳底中心。左脚燋完右亦如之。



一平素產子有臍風。則胎胎不爽於產下。第二日勿待其發先以此火散之。百不失一。

一胎嬰生下多暗不乳。噴嚏呵欠。吮乳口鬆。是卽臍風作發。急以此火散之。

一凡兒病面青面黑。扭項搖頭。仰身擦面。或眼青怒視。或左右斜視。或上下窺視。或兩目連劄。或頭項牽強。跪舌露睛。噓風撮口。啼哭咬人。或手如數物。或兩手牽引。或兩足跳掣。忽擾忽亂。失張失志。但覺神情與常有異者。由從前表裏不清。將欲作痘。此火最妙。

一傷寒已痙角弓反張眼目斜視左右搐搦并中惡客忤癇症與食墮太陰及一切風閉火閉疫閉氣閉乍然卒死者此火最神

一食傷脾胃肚大青筋於端午日午時用全身燈火復於青筋開火處以火截之一火一點其肚自消

一風寒疫氣閉塞之症此火寔有神功凡用燈火既完俟兒啼哭已定卽用金粟丹半丸薑湯化服服后以衣裹之蒙其面目令之安卧片時以復其神志其病如失

附忌用火者

一小兒四時傷風感冒身熱自汗大小便調唇舌如常口不生渴七

表病輕。詳地疎解之。則愈。愚人妄用。是謂制病重治。反爲不祥。

一小兒邪已入裏。身熱面赤。口渴大小便秘。唇焦舌紫。眼紅或手足心熱。夜熱焦煩。舌上黃胎。揚手擲足。掀衣揭覆。此裏症內熱也。清利之。自愈。不可用火。如強用之。不特不能使熱邪從裏以達表。適足以助熱而耗陰。致身熱不退。在夏秋燥令尤爲大忌。


一小兒大病久病。身體怯弱。面耳青黃。唇舌白瑩。搖頭斜視。昏睡露眼。形骸消瘦。聲息輕微。自汗盜汗。或一切嘔吐瀉利痘癰瘡癰。此皆虛極之症。切忌火攻。慮其升散故也。

一一切久熱消渴症證。形體黑瘦。毛髮焦枯。由陰虧血弱虛熱所爲。

全圖醫鏡 卷二 幼科  
誤用燈火。愈增其病。慎之。

一燈火爲幼科切要。今醫家不特不明火穴。而併不辨寒熱虛實。不當用而用之。反爲大害。惟依前以定法。則用無不當矣。

附夏禹鑄臍風火圖



夏禹鑄曰。臍風初發。吮乳必口鬆。兩眼角挨眉心處。忽有黃色。宜急治之。治之最易。黃色到鼻。治之仍易。到人中。承漿治之。稍難。口不振。微有吹噓。猶可治也。至唇口收束。鎖緊舌頭。強直不必治矣。一見眉心鼻準有黃色。即用燈火於額門一燋。人中承漿兩手大姆指端少商各一燋。臍輪達臍六燋。臍帶未落於帶口一燋。既落於落處一燋。共一十三燋。風便止而黃即退矣。

按古今燈火惟上全身火。有經有府。有理有法。無有出其右者。第火穴多。恐倉卒之際。在嫾熟者。不難。倘素未經練者。一時不能用。故附夏氏臍風火於此。庶忙迫之時。可以應急。此火亦會疊忘第。

回生艾火

以前全身燈火。皆爲寔邪升散之用。併一切怪證。莫可名狀者。無不奏功。倘涉久病。體虛忽然精神潰亂。人事昏沉。前火則爲不宜。湏用面生艾火。挽之。蓋此火能回散失之元陽。收歸氣海。固其根蒂。免致離散。其法以生薑切爲紙厚。大如指甲。貼尾間穴。脊骨命門穴。在腰盡處。脊間。正對肚臍。以艾絨捲緊。如菉豆大。安薑片上。用火炙之。每穴以三炷爲度。灸完。另以薑片貼臍下陰交穴。如前灸之。此火不特小兒可用。凡男婦一切中風中疫。氣厥陰症。虛寒竭脫凶危之候。咸宜用之。有起死

回生之功。幸勿輕視。

凡小兒中惡。客忤以及痰閉火閉風閉。乍然卒死。卽以全身燈火醒之。倘一時未有其人。卽以大指掐其人中穴。病輕者一掐卽啼哭而醒。猶不應掐合谷。又不應掐中衝。若再不應。其病至重。則以艾丸如蘿蔔子大。於中衝穴灸之。火到卽活。蓋中衝一穴爲厥陰心包絡之脈所出。其經與少陰心臟相通。此火一燃。則心中陽然而覺。倘此火全然不知。則百中不能救一矣。

圖生艾火





兒之初生有病亦惟胎弱胎毒二者而已矣。胎弱者稟受於氣之不足也。子於父母一體而分而稟受不可不察。如稟肺氣爲皮毛。肺氣不足則皮薄怯寒。毛髮不生。稟心氣爲血脈。心氣不足則血不華色。面無光彩。受脾氣爲肉。脾氣不足則肌不生。手足如削。受肝氣爲筋。肝氣不足則筋不束骨。機闊不利。受腎氣爲骨。腎氣不足則骨節軟弱。久不能行。此皆胎稟之病。隨其臟氣而求之。所謂父強母弱。生女孩羸。父弱母強。生兒必弱。故小兒有頭破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不齊髮生不黑。行住坐立。須人扶掖者。此皆胎稟不

足之故也。胎毒者，卽命門相火之毒也。命門者，男子以藏精，女子以  
繫胞。道家謂之下丹田也。夫二五之精，妙合而凝，純粹之精，鎔液而  
成胎。活佚之火，蓄之則爲胎毒矣。蓋人生而靜，天之性也。感物而動，  
人之欲也。成胎之後，其母之關係尤繁。凡思慮火起於心，恚怒火生  
於肝，悲哀火鬱於肺，甘肥火積於脾。活縱火發於腎，五欲之火，隱於  
母胞，遂結爲胎毒。凡胎毒之發，如虫疥流丹，濕瘡癰癧，結核重舌，木  
舌，鵝口口瘡，與夫胎熱胎寒，胎搐，胎黃之類。三朝之臍風，百日之瘻  
噉，半歲之真搐，一週之流丹，此又毒之至酷至烈，而不可解者也。所  
謂胎寒者，母娠時患熱病，多服寒涼之药，又或過食生冷，令胞受之。

冷手足踰曲不伸。腹痛啼叫不止。此生后受寒得之。治宜温散。括迷七氣湯助胃膏爲佳。胎熱者。母娠時喜食辛熱炙焯之物。或患熱病。失于清解。使兒受之。生后目閉面赤。眼胞浮腫。弩身。呢呢作聲。或啼或驚。煩遍身壯熱。小便黃澁。此胎熱也。若不早治。則丹瘤瘡癧。由此而至。宜集成沉澁丹。徐服解之。以平爲度。胎搐者。母娠時曾因驚恐。氣傳于子。生后頻頻作搐。其後身熱面青。手足搐掣。牙關緊閉。腰直身僵。睛邪目閉。多啼不乳。此乃胎癇不治之症。如因身有熱而作者。必先啼叫。雖曰胎病。由外因也。宜天麻丸。后以六味地黃湯滋其化。

源多服自愈。盤腸氣者，幼科稱內吊者是也。皆因胎氣鬱積壅結營衛，五臟六腑無一舒暢。其氣不能升降，篤隘腸胃之間，抵心而痛。其聲輒輒如猫吐惡乾啼。口開手足皆冷，宜疎散通氣。調中散及木香丸。脣哭者，小兒多啼所致也。脣之下爲氣海，啼哭不止，則觸動氣海，氣動于中，則脣哭于外。其狀哭出光浮，如吹起者，捏之則微有聲。用亂髮燒灰枯芩等分爲細末，敷哭脣上，以膏藥貼之，自消。不乳者，小兒生下二三日間，忽然不乳，當詢問之，勿以不乳作脣風治。蓋脣風有多啼撮口之症，此則無之。但不乳耳。有吐乳，乳之又吐者，或因舐口不淨，惡穢入腹也。宜用辰郁沐香甘草散，服之即止。

臘痛也。亦胎寒之症。宜才香丁香乳香當歸。有湯。其月如年。上諸症無故不乳。宜問其母之乳汁多少。乳多者傷乳也。宜少節之。不久自思乳矣。乳少者必有他症。細心察之。胎黃者。兒生下面目渾身皆黃如金色。或目閉。身上壯熱。大便不通。小便如梔子汁。皮膚生瘡。不思乳食。啼哭不止。此胎中受濕熱也。宜茵陳地黃湯。母子同服。以黃退爲度。胎肥者。兒生下遍身肌厚。肉色通紅。面色亦紅。而黑睛多時時生痰。自滿月之后。漸漸肌瘦。五心熱而大便難。白睛粉紅色。此名胎肥。是亦在胎時。母食甘肥。濕熱大過。流入胞中。以致形質虛肥。血分壅熱也。加減大連翹飲。外以浴體法浴之。胎怯者。生下面無

精光肌肉瘦薄大便白而身無血色目無精彩時時哽氣多噦者此卽胎怯也。非育于父母之暮年。卽生于產多之孕婦成胎之際元精既已澆薄受胎之后氣血復難長養以致生來怯弱若后天調理得宣者十可保全一二調元散補之

証治歌

小兒胎病寔難堪。胎弱胎毒兩大綱。稟受不足名胎弱。五臟攸分可類觀。稟肺不足皮膚薄毛髮不生更怯寒。心爲血脈稟如弱。血不華兮面不光。愛脾不足肌如削筋不束骨弱在肝腎主骨兮稟不足骨

胎稟弱。再將胎毒細推詳。父母命門中相火。母則胞繫父精藏氣凝  
二五精純粹。豈容活火蓄相干。蓄則胎中多結毒。母成胎后最宜防。  
思慮心頭多火起。怒生肝火勢難降。肺爲悲哀多火鬱。脾中火積壓  
肥甘。火發于腎因活縱。五欲臟胞毒結團。毒發虫癆流丹病。癰癧生  
來與湿瘡。鵝口口瘡重。舌木舌胎寒。胎搐胎熱并胎黃。臍風痠噦借  
真搐。周歲流丹病足傷。胎寒因母貪生冷。藥過寒涼兩受戕。兒生鴻  
白還多睡。內因莫作外邪看。若未百日忽戰慄。口冷肢踶吳異常。  
生后受寒尋治法。括迷七氣湯。助胃膏。將胎熱因母餐辛熱。或因熱病

尖清涼兒生目閉胞浮腫面赤弩身壯熱揚聲作呢呢溺黃澁驚煩  
啼叫勢倉皇早治庶無瘡癧患丹投沉降使平安胎搐兒生頻作搐  
祇因母孕受驚惶身熱面青肢搐掣牙緊腰直並身僵目閉睛斜啼  
不乳病名胎癧久膏肓若屬外因身有執先多啼叫病症商天麻丸  
進后滋補怡宜六味地黃湯盤腸氣原稱內吊胎氣鬱結營衛傷臟  
腑並無舒暢候氣多築隘在胃腸痛底心吟聲轆轤乾啼吐惡口開  
張股冷統宜疎散藥散用調中丸木香陳矣起自多啼哭觸動氣海  
臍故昂突狀光浮如吹起拽之聲作亦微茫髮灰簪末敷臍上外將

膏藥貼之良不乳兒生瘻敷日勿作擠風房等量擦風後帝杵服日  
此四物丸與通乳散同用可去胎氣也

何药。木香甘草與枳榔。啼哭不乳。原腹痛。此亦胎寒治宜諳。煎湯甘草丁香乳。香木香當歸可共嘗無故。不乳尋其母乳多。宜節自安康。乳少必然他症現。醫宜細察以求方。胎黃遍體如金色。目閉尤兼身熱腸大便不通。溺如梔子汁。哭不思乳。瘡肆殃。此係胎中受溫熱。茵陳地黃湯擅長。胎肥肌厚。睛多黑肉。面俱紅時有疫。彌月而后漸羸瘦。五心熱兮。大便難。白睛不異粉紅色。甘肥因母孕時貪。溫熱大過流胞內。形質虛肥。血熱探治宜加減。大連翹飲外遵浴體法最減。胎怯生下。肌肉薄。大便白兮。目無芒。時時哽氣還多喊。此由先天受其

傷若欲后天調理善。調元散進壽而昌。

方

助胃膏

白扣 肉扣麌包煨去油 人參 木香 丁香 蘭香 犀芩

白芷 青桔 西砂 紫草 陳皮 沉香 山藥

右爲末蜜丸芡實大每一丸炒米煎湯化服

天麻丸

天麻姜 法夏 防風 羌活 胆星 獬齒 金蝎

右爲末蜜丸芡實大每服一丸約乘易下

熟地九蒸晒  
四兩

茯苓乳蒸晒  
二兩

山藥乳蒸晒  
三兩

棗皮炒研  
二兩

丹皮酒炒  
一兩

澤瀉鹽水炒  
焦一兩

調中散

右爲末和地黃膏蜜丸一錢一顆半週一歲用一丸三五歲二丸空心益湯化下煎服亦可

青木香 川練 没薑 茯苓 肉桂 青皮

枳榔

只壳

炙草

萊菔子

右加葱白食鹽少許煎服

金匱要略  
卷二十一  
茵陳地黃湯

生地 赤芍 川芎 當歸 花粉 茶葉  
豬苓 茵陳 漢鴻

右水煎母子同服

大連翹飲

連翹 聿麥 滑石 牛子 車全 木通 防風 枝仁  
黃芩 芥穗 當歸 柴胡 赤芍 蟬蛻 炙草

右加竹葉 十片燈芯水煎熱服

答體法

射香分

右研勺每用三錢水三碗桃枝一握同煎十沸溫熱浴之但勿浴  
背

調元散

人參

白朮

茯苓

橘紅

當歸

枸杞

炙草

陳梗米炒一握

右爲末龍眼煎湯調下

木香丸

黃連

木香

厚朴

製

夜明砂

隔紙炒各二分

诃子肉

炒一  
分

右爲細末飯爲丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

沈瀝丹

均見  
臍風

括迷七氣湯

外感者。外感冒乎風寒之六淫也。或謂孔子純陽。陽盛外邪難入。而不知質弱體薄。皮毛鬆散。骨節嫩脆。臟腑未滿。血氣未充。其冒風寒暑濕之邪也。較老弱與病衰之人爲更易。且幼稚不知自保。寒熱不能自言。全賴父母之顧復。偶失調衛。邪乘而人病。斯作矣。及其病作。雖風寒小恙。需治較急於強壯。苟姑待之。虛弱夭傷立至。何也。嫩脆未充之體。傳經既易。戕伐難勝。譬之以拳擊壯。雖甚可以強忍。乳子能不斃乎。是故幼稚病患。爲父母者不得輕忽。以留日後之悔。承療治者。尤當審慎。免蹈殺人之愆。辨症固宜詳明。下藥更當誠謹。辨症。

雖的病猶忌猛。蓋以幼子質薄。非同強壯可比也。考古上工治法。昭明其要。舉不外審症慎藥二者而已。彼夫外感治法。當春之際。症見鼻塞發熱。紋浮紅鮮。而脈浮者。此邪在表。治宜正柴胡飲。若兼咳嗽。宜參蘇飲。氣粗者。香蘇飲。兼嘔者。解肝煎。或兼腹痛者。二柴胡飲。更兼寒熱者。加桂枝。若兼諸症。其脈不浮不沉。此半表半裏之症。宜柴芩湯。其秉體素虛弱。外邪難解者。宜十味人參散。今日幼兒如是。有八九。此方乃當時治幼發散之妙品也。因類以推。又豈此外感爲然也哉。抑豈定執此方爲規也哉。合病施方。因體加參。活潑權宜。何

盡露前症。不可以前药概施。意惟用六和湯加入蘇葉。頗爲合宜。然猶必辨果係中熱否也。果係中熱。必用竹葉石羔湯。小便色黃而兼腹痛者。宜五苓散。若因悞用風药。致神昏心燥者。須速用却暑丹。更有體冷氣短。神倦無力。此陰暑之症。治當急進四君子湯。理中湯。甚至桂附亦所必進。甚勿謂暑月不可燥攻。且勿謂純陽小子。不可熱治也。幸明者。治暑熱平。必用調元參脈散。以扶其脈。庶免病后瘦削。致元氣虛耗。而成羸弱也。夫春夏治矣。不尤有秋熱生風。秋金生濕。風溫相搏而爲病者乎。其爲症也。初與春候無異。將以春治之法而

治之乎。然不可不因時以驅邪也。倘遇秋時外感。治宜以海藏神丸散。加白朮爲主。或加味五苓散。或柴苓湯。均可隨宜擇用。更有異三。冬之月。以小兒柔脆之體。不能耐寒。忽爾渾身壯熱。神昏疲倦。治宜速以桂枝防風湯。遲治無及。倘以驕風調治。亦危也已。若或藏身母懷。伏頭躲面。是畏風寒爲表症也。治宜解肌。亦以桂枝防風湯爲主。又或出頭露面。揚手躡足。煩渴便閉。是寒邪入內爲裏症也。治宜攻裏。以大柴胡湯爲主。若或頭額手足冷汗不止。氣冷色淡。是寒鬱也。亦爲裏症。宜以理中湯爲主。如若表裏皆熱。大渴而汗。治宜柴胡白虎湯。以上等病。若因症施藥。均絕無效。則宜辨證。以分治焉。

大陰分利陰益氣。煎邪火。啜分陽氣而附中益氣。治外感而內寒者。益氣。治外感而內寒者。益氣。柴胡飲氣虧八味養中散。氣血兩虛邪閉莫達。則用五柴胡飲。更有夾食而兼風寒者。治宜加味消痞飲。若大便酸臭且兼腹脹。連綿不解者。用大柴胡湯以下之。若體素怯弱者。則宜以惺惺散分別等症。制治惟宜醫者省之。赤子其保全矣。

証治歌

小兒外感冒風寒。勿云乳子是純陽。陽盛外邪難以入。何由邪賊致悲傷。豈知體質原薄弱。受邪尤易邁尋常。病作風寒雖小恙。治須較急於剛強。苟從姑待吝醫藥。虛羸立至豈無妨。嫩脆未充傳經易雞。

肋何容拳賦戕。父母輕忽留后悔。醫師療治症宜詳。辨症雖的藥忌  
猛。考古治法甚昭彰。當春鼻塞兼發熱。紋脈均浮作表觀。醫人療治  
用何藥。正柴胡飲可煎嘗。若兼咳嗽參蘇飲。氣粗香蘇飲。嘔解肝煎  
腹痛二柴胡飲。寒加桂枝半表半裏柴芩湯。外邪難解因虛弱。十味  
人參散莫忘。此方治幼雖妙品。因類而推莫執方。夏天感冒多兼暑。  
六和加入紫蘇減。辨症果然是中熱。竹葉石羔莫畏涼。五苓散藥治  
何病。腹痛必兼小便黃。昏燥原因風熱悞。速投却暑丹。免驚惶體冷  
氣短陰暑症。四君子湯兼及理中湯。干甚至桂附所必進。勿謂暑月

力。惟當暑熱死乎。唐夫派。周元參辰散。至元。馬之仁。

溫相搏致病。殃初症與春雖無異。因時驅逐。有章程。神丸散加白朮。  
主柴苓湯。加味五苓散。堪冬月小兒體柔脆。受寒壯熱。神杳茫。桂枝  
防風湯。宜速進。確風調治必危亡。伏頭躲面風寒畏。表症解肌亦桂  
枝。防風湯。煩渴便閉。寒入裏。出頭露面手足揚。大柴胡湯爲主宰。裏  
攻病解自平。康令汗不止。氣色淡。寒鬱理中湯。必速將。表裏皆熱。大  
渴汗。柴胡湯。白虎妙無量。邪入陰分。補陰益氣。煎陽分氣。陷補中益  
氣湯。良血弱。四柴胡飲甚美。氣虧八味養中散。安氣血兩虧五柴胡  
飲。夾食消痞飲。加減商賈。腹痛連綿。大柴胡飲下。此因大便氣臭酸。體  
素怯弱惺惺散。辨症制治。有主張。醫人首識其中法。保全赤子後裔。

昌

方

正柴胡飲

柴胡

防風

陳皮

白芍

乾薑

甘草

右咬咀煎服。各味隨兒大小加減。但柴胡生用半歲用一二錢。週

歲用二三錢。輕不發表。

參蘇飲

紫蘇

前胡

陳皮

半夏

姜水炒

干葛

茯苓

只壳

桔梗

人參

十五

新加葛根湯

香蘇飲

香附炒

紫蘿

陳皮去白

甘草

右加薑葱煎服。

解肝煎

厚朴

姜水炒

法夏

陳皮

白芍

茯苓

紫蘇

砂仁

十味人參散

人參

白朮

茯苓

陳皮

法夏

乾葛

柴胡

白芍

黃芩

炙草

柴芩湯

人參

柴胡

黃芩

法夏

白朮

茯苓

猪芩

澤鴻

肉桂

炙草

右加薑棗煎。熟服。

六和湯

砂仁

藿香

厚朴

杏仁

法夏

扁豆

木瓜

人參

白朮

茯苓

甘草

右加薑棗煎。服。

竹葉石羔湯

石羔

人參

炙草

麥冬

法夏

右加粳米一撮。薑三片。煎服。

五苓散

猪苓

茯苓

白朮

澤瀉

肉桂

右咬咀爲末。每服三錢。煎服。

却暑丹

白朮

黃芩

茯苓

澤瀉

猪苓

辰砂

肉桂

黃連

炙草

右爲末。蜜丸如芡實。量兒大小。加減服之。麥冬湯下。煎服亦可。

金匱要略  
卷二十一  
四君子湯

人参

白朮

茯苓

炙草

右加薑棗煎服

理中湯

人参

白朮

乾薑

炙草

右水煎服

調元參脈散

蜜芪

麥冬

五味

人参

炙草

右加薑棗煎服

蒼朮裏 防風 甘草

右加薑葱煎服。如太陽症發熱惡寒，脈沉緊者，加羌活、浮緊帶洪者，是兼陽明加黃芩；浮緊帶弦，是兼少陽加柴胡。

加味五芩散

內桂 薤香 白朮 猪苓 茶荳 澤鴟 木瓜 砂仁

右加薑棗燈芯煎服

桂枝防風湯

白芍 防風 桂枝 甘草

右加薑棗水煎熱服

大柴胡湯

柴胡

大黃

赤芍

法夏

枳實

右加薑棗煎服

柴胡白虎湯

石參

知母

甘草

柴胡

粳米

人参

右水煎溫服。

補陰益氣煎

柴胡

山藥

陳皮

升麻

人參

熟地

桑白皮

補中益氣湯

人參 當歸 陳皮 升麻 柴胡 薑芪 白朮 炙草

右加薑東煎服

四柴胡飲

人參 當歸 柴胡 炙草

右加薑煎服

八味養中湯

人參 白朮 茯苓 黃芪 柴胡 紫蘇 肉桂 乾薑

五柴胡飲

白朮 陳皮 當歸 芍藥 柴胡 熟地 黃芪 甘草

惺惺散

桔梗 細辛 人參 白朮 甘草 瓜蔞根 茯苓 卜葜

加味消痞飲

人參 白朮 茯苓 麥芽 柴胡 厚朴 法夏 甘草

右加薑煎服。積重加神龜肉食。加山楂。

二柴胡飲

細辛不可重用 法夏 柴胡 陳皮 厚朴 乾薑 炙草

發熱論

陰勝則寒。陽勝則熱。重寒則熱。重熱則寒。經言之詳矣。第統之曰。熱而各有表裏虛實氣血晝夜之別。內熱潮熱。內傷外感之分。且各有臟腑之所由發。言治者必別之明。而下藥乃能無悞。治法既均。起沉原易。試歷泰明。詳分症治。稽夫風寒而發熱者。其症喜人懷抱。多畏縮。惡風寒。不欲露頭出面。且面帶慘色。便清不渴。吮乳而口不熱。或鼻塞流涕。或噴嚏而渾身拘急。此爲表熱。初起一汗可解。可用桂枝湯加柴胡。葛根。熟服取汗即效。若元氣怯弱者。四君子湯加防風。柴胡。葛根。若發熱時。喜出頭面。愛仰卧。揚手足。去衣被。渴欲飲水。吮乳。

不休。且口熱。小便赤。大便閉。此爲裏熱。宜解利之。用導赤散送瀉青丸。發熱面赤。腮燥鼻乾。喜就冷。或合面卧。或仰面卧。露出手足。揭去衣被。大渴不休。大小便閉。此爲寃熱。宜微下之。可用集成沉鬱丹。若大病之后。或溫熱。或潮熱。或渴或不渴。大小便如常。此爲虛熱。當補之。宜用竹葉調元湯。不但此也。且有傷風發熱者。其症自汗身熱。呵欠目赤。多睡。惡風喘急。此因解換。被窓受風所致。治宜柴葛解肌桂枝湯。但熱退后。宜略滋陰。抑有傷寒發熱者。其症無汗身熱。呵欠頓悶。項急面赤。喘急惡寒。氣中熱氣。此因脫換。受寒所致。治宜惺惺散。熟退微服沉鬱丹以治內熱。更有非傷風寒發熱而兼吐鳴者。此

肺胃虛怯不可發散治宜五苓散送理中丸然而傷方虛裏固熱而  
傷於暑與熱者豈無發熱者乎嘗考傷熱發熱者多在夏月其症身  
熱自汗作渴昏睡手足俱熱此因天氣過熱包裹過厚而受其熱也  
治宜人參白虎湯以解其熱次以調元參脈散以扶其元傷暑發熱  
者亦在夏月有之其症身熱自汗作渴昏睡惟手足獨冷此由高垂  
廣廈陰涼大過中氣受傷所致治宜先以調元參脈散以補其氣次  
以四君子湯以防吐瀉又有夜熱旦止者是爲血虛發熱治宜六味  
地黃湯加龜板歸芍他若傷寒無汗服表藥而汗出其熱不退又下  
之熱仍不退此其熱也爲表裏俱虛氣不歸元陽浮於外乃虛熱之

候治宜急用四君子湯加炮薑。庶乃陽氣收，胃氣和，而熱自退。苟進  
寒涼治無及矣。有所謂疳熱者。其症色形黃瘦。食不長。肌骨蒸盜汗。  
瘧鴻無恒。肚大腳小。多起於大病之後。失於將息。又或傷飢食飽。脾  
氣受傷。治宜六君子湯加歸芍。有所謂壯熱者。其症一向熱而已。  
此由氣血壅塞。五臟生熱。鬱蒸於內。睡卧不安。精神恍惚。蒸發於外。  
則表裏俱熱。急喘氣盛。甚則搐搦。治宜以導赤散送瀉青丸。若大小  
便閉者。以集成沉澑丹下之。有所謂煩熱者。其症煩擾不安。五心煩  
燥。四肢溫壯。小便赤濇。此心經有熱。治宜導赤散加麥冬。棗仁。有所

謂積熱者。其症面赤口瘡。大小便黃赤。此為表裏俱寔。或因內傷酒

此治宜沉澁丹。若夫汗下大過津液枯竭。或大病之後元氣受傷。皆能生熱。此其熱也爲虛熱。其症困倦少力。面色青白。虛汗自出。神漫氣竭。四肢軟弱。手足厥冷。是爲氣虛發厥。血虛發熱。大虛之症。治宜四君子加炮薑。甚則加附子。熱退以平劑調之。然而大虛之熱。不尤有所謂客熱者乎。其症乍有乍無。無熱邪陷於心。則熱形於額。其熱故先起於頭面。而后身熱恍惚多恐。聞聲則惕。此爲正氣虛而熱邪勝。邪正交爭。故發熱無定。乍進乍退。如客之往來莫測也。治宜導赤散。先澈其邪。后以圓參散以護其正。吁。發熱之症雖繁矣。而從此究治。

抑豈有遺悞哉。雖然上所論治皆言發熱等症。若熱如潮水之對時而作。所謂潮熱。熱由內臟之達外而發。所謂內熱者。詎可等於一治乎。特治雖有別。總不外乎虛寔之辨。我嘗考之心經之熱。發在巳午之候。其症心煩咽乾。熱發嘗蒸焉。有如火之熾。然自畏而人不覺者爲寔。治宜導赤散。人知而自不覺者爲虛。治宜秘旨安神丸。肝經之熱。發在寅卯辰刻。其症脈息多弦。時忽驚恐。指紋滯者爲寔。治宜柴胡清肝散。指紋淡者爲虛。治宜六味丸。腎經之熱。發在亥子丑時。肺家之熱。輕試則有重試則無。發逢日酉之候。則甚。其症必喘咳。審

係寔用瀉白散虛用秘旨保肺湯脾土之熱。遜夜則長。日則短。情疲倦。不思飲食。審係寔用瀉黃散。虛用補中益氣湯。虛中有熱。人參黃芪散。若夫甚熱發於午前。此非心熱。乃氣虛之候。人參清飢湯。發於午后。則非肺脾之熱。乃血熱之症。白朮除濕湯。若渴而便閉。并爲寔熱。四順清涼飲。發熱口渴而便如常。此屬血虛之症。治宜四物湯。若大小便血。此陰虛夾熱之病。治宜保陰煎。而或血熱妄行。皮膚下熱。外按却無。此宜清化飲。或三焦火盛。用徙薪飲。小便熱痛。用大分清飲。他若寔熱之症。下后陰虛。孤陽無附。大熱煩渴。治宜四物湯。加參芪。有汗后陽虛。陰失所主。亦大熱煩渴。治宜四物湯。若汗下之。

后煩渴面赤此血虛也。治宜當歸補血湯兼見驚搐者此血虛生風也。治宜四物湯加天麻鈎藤總之汗后血虛者六神散。汗氣厥者補

中益氣湯陰虛者六味丸或理陰煎陽虛者保陰湯或八味丸溫之

補之熱仍不退脈息滑大者須進五福飲加地骨皮知母雖然治幼

之法在離乳之兒專從幼治若乳下之嬰必兼調母藥無論湯散務

子母均服庶乃藥易入而力易至不然數月嬰兒一服難完一匙其

藥之入也甚少而爲力也至微其取效也不亦難乎此治幼之要法

也并宜誌之

病生發熱症。糲糲寒。舌陰陽。計內經。未嘗屬之。此一脉。當分潮熱內熱。湏明辨。內傷外感。莫朦朧。更有臟腑所由。發湏當觸類以明論。倘因風寒而發熱。喜人懷抱。多畏驚。頭面欲隱。風寒惡色。慄不渴。便必清。吮乳口冷。鼻流涕噴嚏。拘急在渾身。此爲表熱。汗可解。桂枝湯。柴胡粉葛增元氣。怯弱四君子湯。柴胡粉葛與防風。若逢發熱。愛仰卧。喜出頭面手足伸。吮乳不休。渴欲飲。口熱。大便閉小便。紅此爲裏熱。宜解利散。用導赤送鴻青丸。發熱面赤。喜就冷。鼻乾腮燥。渴不停卧。或合面或仰面。露出手足。揭衣衾。二便不通。均濕熱。微下丹投集成沉澁工。病后或渴或不渴。或爲潮熱。或爲溫。二便如常。

爲虛熱。竹葉調元湯奏功。傷風惡風自汗喘。目赤多睡呵欠伸。柴葛解肌桂枝湯進。熱若退后卽滋陰。傷寒無汗惟身熱。喘急惡寒呵欠形面赤。喘急氣中熱。脫換受寒是病因。治法宜用惺惺散。熱退沉澁丹可庸。風寒并傷兼吐瀉。五苓散可送理中湯。夏月發熱因傷熱。肢熱汗渴睡昏昏。人參白虎湯除熱。調元參脈散回春。傷暑發熱亦惟夏。手足獨冷諸症同。高垂廣廈陰涼過。中氣受傷病故生。調經參脈散先補氣。吐瀉宜防繼四君。子湯夜熱且止血虛發。六味地黃丸。板歸芍憑他。若傷寒無汗症。任醫汗下熱猶存。此爲表裏俱虛症。氣不歸元陽外行。炮薑加入四君子。陽收胃和熱始寧。瘡色形黃且

瘦盜汗。泄濁兼胃寒。則小腹因病而作痛。有時  
虧調理。六君子湯加歸芍。任和勺壯熱不已。由五臟氣血壅塞鬱氣  
凝。睡卧不安。神恍惚。表裏俱熱。喘急頻盛。則橘搗宜導赤。散送下濁  
青丸最神。二便不通。宜沉瀝。此方通閉效無倫。煩熱五心多煩燥。小  
便赤澑。四肢烘。心經有熱。導赤散加入枝仁與麥冬。積熱二便皆黃  
赤。更兼面赤口瘡。生表裏俱寢。因過煖或傷酒麴病厥躬。或食煎炒  
與炙燙。或投峻補以貽凶。治法仍宜投沉瀝。管教熱退。起沉瀝汗下。  
大過津液竭。或因病後元氣傾。此爲虛熱。面青白。困倦少力。虛汗淋  
神。漫氣竭。四肢弱。手足厥逆。勢幾窮。血虛發厥氣虛熱。四君子湯加

入炮薑辛甚則更宜加附子。熱退調養以和平乍有乍無客熱形於額邪隕心先起頭面后身熱恍惚多恐怯有聞撤邪先用導赤散後須護正以固參。散發熱已詳明且切潮熱內熱宜精核已午時

發熱爲心心煩咽乾如火炙虛不覺熱用安神丸寔自畏熱宜導赤

散寅卯辰熱屬肝經脈息多弦時恐怯指紋帶爲寔紫胡清肝散紋

淡爲虛六味丸。協亥子丑熱屬腎經脈息多繁唇青黑虛宜六味地

黃湯寔宜清腎散多潤澤肺熱輕試有重試無日西則甚症喘咳秘

旨保肺湯療虛寔者散宜投鴻白。逢夜則甚熱在脾困倦不思飲食

啜溫用鴻黃湯

虛補中

益氣湯人參黃芪湯治虛中熱午前甚熱難

由心氣虛人參清肌湯。擇午后非由肺與脾血熱。白朮湯除濕渴而便閉寢。熟徵四順清涼飲解厄。發熱口渴便如常。血虛四物湯可。則陰虛夾熱保陰煎。何憂大小便多。血皮膚下熱並妄行。外按却無清化煎。三焦火盛用徙薪小便。熱痛分清飲散。寢熱下后熱渴煩。孤陽無附陰虛竭。治宜四物加參芪。有汗陽虛症同。散陰無所主。用伺方四物葛歸湯。精切汗下面赤煩渴生。血虛當歸補血湯。切薦搐生風。因血虛四物湯。天麻鈎藤列。汗后血虛散六神。汗氣陷者補中益氣湯。得陰虛六味丸。理陰煎。陽虛保陰煎。八味九變。若投溫補熱依然更兼消大堪憑脈。五福飲加地骨皮。知母同煎是良策。總之治幼法。

宜詳用藥并母均調攝良方保赤而詳披莫昧大海將蠡測

方

導赤散

生地

不通

甘草

右加竹葉七片煎好以硃砂一分調服治喘哭再加黃芩心

秘旨安神丸

人參

棗仁

法夏

甘草炙

茯神

當歸

白芍

陳皮

五味

右爲細末蜜丸生薑湯下

山梔炒

柴胡

人參

川芎

桔梗

連翹

甘草

瀉黃散

石羔  
煅

防風

甘草多

藿香

梔仁炮

右水煎半飢服

瀉白散

桔梗

陳皮

桑皮

地骨皮

五味

甘草多

右煎熟服加山梔杏仁名加味瀉白散，

秘旨保肺湯

蘇葉

防風

山藥

茯苓

杏仁

霍香

百部

黃芩

白蘆蟲

炒百合

桔梗

五味

人參黃芪散

黃芪

桔梗

秦艽

茯苓

柴胡

桑皮

知母

紫苑

鼈甲

人參清肌散

曰朮

茯苓

法夏

當歸

赤芍

乾葛

甘草

右加薑棗煎服若午前潮熱服此更效

四順湯茶飲

赤芍 富歸 大黃

甘草

四物湯

當歸 熟地 芍藥 川芎

五福飲

人參

熟地

當歸

白朮

甘草炙

右加生薑煎食遠服

清化飲

芍藥

麥冬

丹皮

茯苓

黃芩

生地

石斛

右煎食遠溫服

清腎散

卽清化飲內加車前滑石甘草梢瞿麥卽名清腎散

理陰煎

熟地

當歸

甘草

乾薑

右水煎熱服

保陰煎

生地

熟地

芍藥

黃芩

黃柏

山藥

續斷

甘草

徒薪飲

陳皮 黃芩 蔡華 大蒜 黃柏 石膏 大川

右煎食遠溫服

大分清飲

猪苓 袪苓 枳壳 車前 木通 山梔 澤瀉

當歸補血湯

黃芪炙 當歸

右加炒米薑棗煎服

六神散

人參 白朮 袪苓 甘草炙 山藥 扁豆

八味丸

熟地 淮藥 杂皮 丹皮 茶荳 澤鴻 肉桂 附子

右煉蜜爲丸煎服亦可

保陰湯

熟地 柏杞 當歸 山藥 茯苓 附子炮肉桂 甘草炙

除湿湯

法夏 蒼朮 厚朴 茯苓 陳皮 薤香 甘草 白朮

右加葛根煎食遠服

桂枝半

白芍仁

生薑半

大棗五

炙草一

右水煎熱服取微汗不可大汗

鴉青丸

羌活

川芎

黑枝仁

胆草

當歸

防風各

一兩

大黃五

錢

右爲末蜜丸青蠻爲衣如大壹大每服一二丸茶清下

竹葉調元湯

人參

黃芪

黃芩

白朮

白芍

麥冬

炙草

竹葉

右等分水煎服

柴葛解肌桂枝湯

柴胡  
生葛  
桂枝  
白芍  
炙草

右加生薑大棗煎服

人參白虎湯

人參一  
熟石羔二  
知母不  
炙草一  
晚梗米五

右水煎熱服口渴甚加麥冬五味

六君子湯

人參  
白朮  
茯苓  
陳皮  
法夏  
炙草

右加薑棗水煎服

卷之三

人參　當歸

右爲末用犢猪心一個切作三片每以末藥一錢用猪心一片煎湯調服

四君子湯

惺惺散

五苓散

理中丸

調元參脈散

補中益氣湯

均見外感

沉澑丹

見臍

六味地黃湯

見胎

升陽除湿湯

升麻

猪苓　神曲

澤下各

防風

一錢

陳皮　桑炙草

五錢

柴胡

不　荳蔻

五錢

右加姜棗水煎服若胃寒腸鳴加益智半下各不

嘔吐噦論

嘔吐噦分三症。甚不可執一以視也。稽夫有聲有物爲嘔。有物無聲爲吐。有聲無物爲噦。區已別矣。而究其致病之由。根於脾胃之虛寒。經言歷歷人皆知之。而嘔由於胃虛。吐由於脾虛。噦因于久嘔病后。異途分出。往往昧之。遇嘔之病。治脾必兼涉胃。遇吐之病。治胃必兼涉脾。治噦必扶元氣者。大皆如是。然此猶未失所主也。乃有遇嘔者。固統之曰脾胃。遇吐者亦統之曰脾胃。遇噦者則統之曰嘔吐。先后莫分。主客失令。若此者又不知幾何人也。不但此也。嘔吐之作。多係寒症。間有熱症。亦由寒爲之解。而醫治者。往往不遵陳法。本屬寒症。

必故意從熱治之以標新奇以爭特識。噫。果係辨症之無差。猶可恕也。吾見其貽悞者十有八九。其亦可憐而足傷也已。識者曰。是亦未諳先賢論著耳。予因不揣考閱羣書輯編要法。稽夫嘔吐作而煩渴相因。且熱而脈洪大。貪食炙燭。心思百味者。此虛寒之候也。宜五苓散治之。而或脩症發於夏月。是爲寒候。治者莫不因時察症。而以熱治矣。而不知寒從春伏。暑燥寒生。縱是熱候。不過因熱觸發。治宜仍以寒攻。意以五苓散加藿香。庶幾寒熱兩解。或治之不效。以藿連湯主之。斷無不安。若僅見吐。則以理中湯調六一散主之。然而冒家火盛。嘔吐亦作竹茹湯。此宜速進。疫食火併。嘔吐由生。二陳湯勿作緩。

圖至石羔黃連杏仁麥芽等味則又在因病而酌加若夫脾胃原虛  
因火熾而嘔吐行此則又非可專從寒治也治宜橘皮竹茹湯若或  
氣緩神倦額頭汗出脈息沉微此爲陰寒之候輕用五君子煎或參  
香散重則必用四味回陽飲或復陽丹庶乃陽長陰生垂危可振若  
或血虛燥嘔用五君子煎加當歸若陰寒大過元陽將脫陰格其陽  
陽虧不納急用理中湯加猪胆汁更入童便少許服之自安更有食  
滯不化壅而作嘔者宜以養中煎切忌攻伐相殘若或食滯成積吐  
酸嗳醸外症面色微黃眼胞浮腫脈弦蹇滑治宜消積丸或參香散  
其有面白唇紅者此爲蛇虫上逆宜以椒梅理中湯或溫臟丸而或

外症未形。莫辨爲寒爲虫之候。則惟以扶陽湯。而或寒或虫。諸無不效。更有嘔吐。而渴欲水者。湏先以扶陽湯。繼進來復丹。嘔渴即止。有吐而兼噦。或因噦而吐者。此痰凝之症。宜二陳湯。有因乳多而嘔者。節理而安。雖然嘔吐之作。於孔子也。子之病。多由母使之然。爲尋厥由。有母過厚味而致子嘔者。用加味清胃飲。有因醇酒而致子嘔者。用解醒湯。若因燒酒而致。則用冷米醋。有因怒動肝火。抑鬱傷脾土。傷血熱。遂致吮乳作逆者。是宜加味歸脾湯。或加味逍遙散。若因停食滯血。乳化醋餽。遂致吮之嘔逆。此則子與異功散。母服大安丸。兩相交治。自爾平安。若因勞役。有傷脾胃。則均服補中益氣湯。若或乳

母久病兒發乾嘔此因其母血衰乳閼草傷此皆不治之症王氏製米泔飲治乾嘔解毒飲治中毒嘔亦保嬰兒之一法也不可不知

### 証治歌

脾胃虛寒三症生。嘔吐噦。分辨湏精。吐由脾虛。嘔由胃。噦因久嘔要分明。症固有寒兼有熱。熱亦由寒。治法微。嘔吐作時煩渴。有熱其脈大而洪。心思百味。貪炙燙。虛寒散合用五苓。卽在夏月。疑爲熱。豈知寒伏在於春。仍用五苓。藿香丸。不效湯用藿連湯。工吐而無嘔理中湯妙散將六一。共調陳。胃火盛。兮嘔吐作竹茹湯。投火不蒸。疫食火

併生嘔吐。二陳湯進莫逡巡。因病酌加石羔入黃連麥芽杏子仁。脾胃原虛火復熾。因生嘔吐病厥躬徒從寒治亦多誤。橘皮竹茹湯合情氣緩神疲頭額汗脈息沉微。寒屬陰重用復陽丹四味回陽飲輕。

用參香飲合五君。

子煎

血虛燥嘔五君子。

煎

加入當歸效不羣。陰寒

大過陽將脫。陰格其陽症最凶。

理中湯加猪胆汁調藥還須便用童

食滯不化而生嘔養中煎進戒寇攻食滯成積吐且噯。

面色微黃眼

腫形脈弦蹇滑宜何药消積。

丸

參香散

積自融面白唇紅虫上逆

梅理中湯溫臟丸同爲寒爲虫症未現扶陽湯進豈朦朧嘔吐兼渴

湯

扶陽湯好來復丹宜步後塵吐或因嗽或兼嗽此是痰凝進二陳

湯

扶陽湯

好來復丹宜步後塵吐或因嗽或兼嗽此是痰凝進二陳

乳多而嘔宜節理病源由母更須諭母食厚味宜清胃母食醜泄宜  
解醒若因燒酒而成病令米醋進自清新子吮乳逆皆因母肝脾血  
熱是病因歸脾湯與逍遙散均宜加味令肝平乳化醪酸緣食滯母  
服大安丸子異功散若因勞役傷脾胃補中益氣湯服宜均乳母久  
病兒乾嘔或因藥毒或乳窮乾飢傷臟均成嘔此皆不治藥無庸王  
氏曾製米泔飲解毒飲投亦保嬰古人成法皆詳列好將保亦效渠  
心。

藿連湯

方

黃連

姜汁炒

厚朴

姜汁炒

霍香葉

右加薑棗煎服

五苓加薑香散

猪苓

茯苓

澤瀉

白朮

肉桂

薑香

六一散

滑石研

甘草

二陳湯

陳皮

法夏

茯苓

甘草炙

右加薑棗煎熟服，加枳壳桔梗名枳桔二陳湯。

吳功散

人參

白朮

雲苓

陳皮

甘草炙

右加葛根煎服

消積丸

砂仁酒炒

公丁香

烏梅

巴豆去油

右研細末糊丸蒙豆大每服三丸白湯送下

養中煎

人參

山藥

扁豆

甘草炙

茯苓

乾薑

右加蓮肉煎食遠溫服

五君煎

人參

白朮

茯苓

乾薑

甘草炙

四味回陽飲

人參

附子

炮薑

甘草炙

復陽丹

附子

炮薑

胡椒

五味

甘草

白麪炒

右爲末和勻入溫湯搗丸每服一錢隨症用藥引下

溫臟丸

人參

白朮

當歸

芍藥

茯苓

川椒

右爲細末神麃糊丸梧子大白湯送下

加味歸脾湯

人參

黃芪

白朮

茯苓

棗仁

遠志

當歸

木香

甘草

丹皮

枝仁

右加枝元煎食遠服

來復丹

硝石

硫黃

青皮

陳皮

大陰元精石

五靈脂

右先將硝石硫黃爲末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結砂子火

不可大恐傷藥力再研極細餘藥均爲細末共和勻醋糊丸空

心米飲下

大安丸

神麃

陳皮

法夏

茯苓

楂肉

連翹

蘿蔔子

炒白朮

右爲細末粥糊丸米飲下

清胃散

生地

升麻

當歸

丹皮

黃連

右加柴胡梔仁卽名加味清胃飲

附子

炮薑

川椒

茯苓

白朮

武夷

參香散

人參

沉香

藿香

木香

公丁香

右爲細末木瓜湯調下

椒梅理中湯

人參

白朮

乾薑

甘草炙

川椒

烏梅

橘皮竹茹湯

橘皮

竹茹

生薑

甘草

人參

大棗

加味逍遙散

當歸 白朮 白芍 柴胡 茵苓 甘草炙 山梔 丹皮

右加煨薑卜荷煎服

竹茹湯

法夏姜水  
炒乾葛 甘草

右加薑棗並竹茹一握同煎溫服

米泔飲

大棗一枚 砂仁一粒 老薑三片

右藥抖碎裹煨用米泔三升煎滾入微淡薑汁一升泡服

解毒飲

甘草

銀花

豬胆汁

薑汁

右用米泔煎服

一方治熱嘔用枇杷葉去毛炙以五加皮煎湯熱服立止。

一方神怯氣弱是寒吐用生薑一大塊直切片勿斷層層摻鹽用麻  
緊扎草紙七層包之水浸漫火熗熟去麻將薑搗早米煎湯下。

一方用胡椒菉豆量兒大小多少煎湯服自效。

一方小兒初生三五日吐乳用丁香三粒陳皮三分生薑三片煎服  
自止。

方小兒吐逆不拘冷熱諸藥不效用硫黃五錢水銀一錢同研至  
不見星薑汁打米糊丸小豆大陰陽湯下。

補中益氣湯

理中湯見外感

五苓散見外感

有聲無痰爲咳。有痰無聲爲嗽。有聲有痰爲咳嗽。咳嗽之分。昔已詳矣。究所由來。總不外乎乳食之促。風寒之賊也。第有虛症陰陽宜別。表裏臟腑宜分。稽厥病源。寢熱者。則面赤鼻乾而喘。虛寒者。則喘滿面白而涕。晨嗽者。屬火。午前嗽者。則發自胃。午后嗽者。則爲陰虛。黃昏嗽者。火浮於肺也。五更嗽者。胸有積滯也。久嗽不已者。則必傳肺。大約均與成人之嗽無異。有所未及。參觀互用。一應通行。然則此可以不必再述所治矣。然治有不同。用藥不可過峻。試再詳陳之。考厥治法。因于寒者鼻塞身重。氣壅喘促。聲濁無汗。治宜參蘇飲。身重無

疫者。茯苓補心湯。嗽而多疫者。六安煎。氣粗無疫者。阿膠補肺散。或金水六君煎。四物湯。皆可擇用。但必均加桔梗、杏仁。面白有疫者。爲肺家之本病。宜清肺飲。咳甚者。葶苈丸。面赤聲啞者。乃肺兼心病。宜清寧散。咳兼喉痛者。沉鬱丹。面黃吐疫者。此肺兼脾病。宜橘皮湯。面青壅滯者。此肺兼腎病。宜金粟丹。面黑疫鹹者。專係腎家之病。宜入仙長壽丹。緊兼衄者。乃肺家虛熱。宜人參、麥冬、花膏。久咳不止者。肺必被傷。補肺而咳自止。宜人參、五味湯。咳而胸高。有如龜狀者。乃肺虛作燥。宜清燥救肺湯。若胸痛吐膿。則成癰矣。宜桔梗湯。或杏仁煎。咳嗽治法大約如此。更有哮喘一病。乳幼恒多尋其病源。亦不外。

乎風寒之閉。大法。沉丸。寶丹。但宜生肺。大安丸。后道子細。法。然。有所因。不可不分治焉。因宿食停滞。疫癥橫結而致者。症形內熱。口燥。治宜草薢丸。久病。五味湯。因體虛敗。忽作大喘者。治宜貞元飲。不應。則理陰煎。內加人參、鹿茸。若因胸膈移熱。心火亢熾。炎壅大喘者。此名馬脾風。其症原名難治。速宜以牛黃奪命丹投之。其有乳子百日內發瘡嗽者。名百晬嗽。其病多因出胎之際。或浴時及解脫襟裳。與出懷喂乳之候。暴受風寒。由外傷而致。又或因乳汁過多。吞嚥不及。嗰促而成。或啼哭未寧。乳嗰氣逆。由於內傷而然。遇此者。汗下之劑。不可驟用。治法惟令乳母禁口。戒葷酒油膩酸鹹辛辣及一切。

發物但食香茶白飯少佐橘餅橙片以清其乳而兒嗽自愈然亦不可執一以言治也。發散清涼之劑芪朮參歸之屬異功散補肺散之類。因症下方亦未嘗不可。是在醫者運用之妙云。

証治歌

有痰爲嗽無爲咳總由乳促風寒賊虛寒陰陽更宜分表裏臟腑亦宜核。喘滿面白屬虛寒而赤鼻乾爲溫熱火浮於肺嗽黃昏晨嗽有火各分域午前爲胃後陰虛胸有積滯五更凥久嗽不已肺必傳此與成人無甚別用藥可同戒峻攻其有不同可伸說。鼻塞身重飲參

蘇身重無疫。茯苓補心湯切嗽而無疫六安煎氣粗無疫四物湯協。

阿膠補肺。六君高升丸。石斛丸。  
葶苈丸解厄。肺兼心病面必紅。聲啞清寧散可則。咳兼喉痛用何方。  
沉瀣丹進自清冽。面黃吐疫病兼脾。橘皮湯進是良策。肺兼肝病面  
必青。壅擣金粟丹非拙。病如在腎疫必鹹。八仙長壽丹。醫面黑聲緊。  
兼衄肺熱成。人參冬花膏奏捷。久咳不止肺必傷。人參五味湯補肺。  
克咳而胸高狀如龜。清燥救肺湯無失。胸痛吐膿桔梗湯。桔梗杏仁  
煎同列。更有哮喘乳幼多病源總屬風寒客。大法蘇沉丸。大安  
煎。千緝湯。先后按。內熱口渴必有因。宿食停滯疫橫結。治法宜投葶  
虧丸。久病五味湯調攝。大喘忽作原本虛。貞元飲投無差忒。不應則

進理陰煎。人參鹿茸加莫缺大喘病名馬脾風痰壅移熱在胸膈此症由來不易瘳。牛黃奪命丹救危迫。百日咳症熟兼風參觀上法原同轍異功散補肺散療氣虛。醫師莫謂緒餘竊。

方

茯苓補心湯

人參 柴蘇 乾葛 前胡 法夏 茯苓 藤皮 甘草  
枳壳 桔梗 木香 熟地 白芍 川芎 當歸

右加薑棗煎服

六安煎

甘草子

陳皮 法夏

茯苓 十首

卷之二

右加薑煎服

補肺阿膠散

阿膠蛤粉炒 杏仁去皮尖

甘草炙

馬瓈鈴

牛蒡子炒

糯米

金水六君煎

當歸

熟地

陳皮

法下

茯苓

甘草炙

右加生薑煎食遠溫服

清肺飲

前胡 柴胡 桑皮 只壳 知母 貝母 卜荷 茯苓

桔梗 麥冬 荆芥 炙草 阿膠

右煎熱服忌食油膩

葶藶丸

甜葶藶 黑牽牛 炒 杏仁 去皮尖炒  
黃色另研

防己 炒

右爲細末入杏仁泥和蒸棗肉爲丸菉豆大每服五七丸薑湯下

清寧散

桑皮 蜜炒 葶藶 微炒 赤芩 酒炒

車前

甘草 炙

右爲細末每服五錢生薑大棗湯調服

人參五味湯

人參 白朮 茯苓 五味 麥冬 甘草

右加薑棗煎溫服

清燥救肺湯

桑皮

石羔

人參

胡麻仁 炒

阿膠

麥冬 去心

甘杞葉

刷去毛蜜炙用

杏仁

去皮尖

炙草

右疫多加川芎貝母瓜蔞仁血虛加生地熟甚加犀角羚羊角

桔梗湯

桔梗

當歸

貝母

瓜蔞皮

防已

杏仁

枳壳

苡仁

生芪

桑葉

元參

右用苦蘂嫩根三錢爲引水煎熱服

蘇沉九寶丹

麻黃

陳皮

卜荷

桂

蘇葉

桑皮

大腹皮

杏仁

甘草炙

右加薑煎以童便少許對服

人參冬花膏

人參

天冬

麥冬

冬花

貝母

桑皮

金井橘皮

桔芩

當歸

五味

甘草炙

右爲細末煉蜜爲丸燈芯湯下

集成全集

胆星

天麻

白附

全蝎

乳香

猪石

煅醋

僵蚕

少云  
絲

射香

金箔

梅花片

右爲細末煉蜜爲丸金箔爲衣每服一丸薑湯化下但虛寒之痰無根之氣絕脫之症均不可用

杏仁煎

大黃

酒  
蒸

天冬去心

杏仁尖

去皮  
木通

桑皮

葶苈

石羔

右煎臨卧服

橘皮湯

法夏製

茯苓

陳皮

細辛

人参

桔梗

只克

甘草炙

旋覆花

八仙長壽丹

熟地

山藥

茯苓

丹皮

澤瀉

棗皮

五味

麥冬

半緝湯

銀杏

金吾

赫婆散

法夏製

皂角炙

生薑

甘草炙

牛黃每命散

右研末加蜜一匙白湯調下

貞元飲

熟地

當歸

甘草炙

右煎熱服

補肺散

人參 黃芪 五味 紫苑 熟地 桑皮

右水煎入蜜少許食遠溫服

一方治咳嗽紫苑炒研杏仁去皮火炒共爲細末蜜丸五味七粒煎

湯送下。

一方治肺寢。用葶藶隔紙焙爲末。棗肉爲丸。白湯下。

一方以蕁藶隔紙焙知母炒共爲末。白糖糊丸。白湯下。

一方治嗽無痰。用沙參濃煎熱服。

一方治百日嗽。用貝母薑湯潤濕飯上蒸過。甘草半生半熟共爲末。沙糖爲丸。米飲下。

一方治喘。用雪梨汁。生薑汁。蜂蜜。卜荷研末。共入器內。煮湯溫服。

一方治喘並嗽。用種瓜燒存性。研末。棗肉爲丸。薑湯下。

一方治吃醋嗆喉成哮。用甘草三兩去皮劈開。猪胆汁浸三日炙乾。

研末蜜丸臨卧茶送下

參蘇飲見外感

四物湯

理陰煎均見發熱

大安丸

異功散均見嘔吐

沉瀉丹見癥風

聖祖  
計見

聖祖  
御批

聖祖  
御批

聖祖  
御批

解顙論

附顙填

顙陷

天柱骨

天柱骨

顙者人之頂門也。解顙者頭縫開解如塊然而合而不相粘也。此症由先天虧弱。稟受不足而成。蓋人在胎中諸竅尙閉。惟此竅獨開。逼氣過脹。均係於此。此乃人身閑鍵要處。全賴父母精血化成。稟受不足。故有解之之患焉。此症總歸之一虛。治法內湏久服六味地黃丸。外用封顙法封之。若目多白見。久病不愈。其症難治。不但此也。更有顙門高腫。名顙填焉者。此由乳食不調。氣血不和。或衣覆過厚。陽氣被遏而致。治法皆用封顙法主之。然其填亦有寒熱之因。因熱而填者。鴻青丸。因寒而填者。參蘇飲。且有顙門下陷如坑。名顙陷者。

焉。此其病多由病後氣血衰枯而致。若枕骨與之同陷。此則血氣衰竭。腎元俱敗。原名不治。斯時下藥。必峻用參芩白朮散。或八味地黃湯。皆妙劑也。須酌而用之。

程天

尤有天柱骨倒。頭垂不起者焉。此形雖

肥壯。是爲陽氣弱極。外強中乾之候也。然亦有風濕邪入。與肝部相  
搏而致者。治法宜小柴胡湯加歸芍。千葛主之。有因瀉泄日久。元氣虛極。陽陷陰格。致頸項軟瘻不振者。始宜速救本元。須急進十全大補湯加鹿茸主之。且宜以生筋等藥敷塗。從外培之。然有自生下而卽軟者。此由腎元不足。治宜以補腎地黃丸主之。總之此症因別三端。而要不外培補爲主。醫者試細思之。

小兒解頸果何爲。總屬先天稟受虧。治法外用封頸法。內將六味地黃丸培頸門。高腫頸填別。乳食不調氣血違。或由厚煖陽氣退。治法皆從封頸推填因寒者參蘇飲。填因熱者瀉青丸。規頸陷如坑。名頸陷多由病后氣血衰。枕骨有時同頸陷。虛衰已極最堪危。峻用參苓白朮散。八味地黃湯。以挽頸天柱骨倒陽氣弱。外強中剛頭下垂。肝部或爲邪熱勝。小柴胡湯加干葛芍藥。當歸泄渴日久頸項癰。陽陷陰格元氣催。救宜十全大補進。加入鹿茸庶可追生筋等藥敷從外。生下卽軟更堪悲。六味地黃丸主治總宜培補自春回。

方

小柴胡湯

法夏

人參

黃芩

柴胡

甘草

封顛法

天南星

右用薑汁拌南星炒乾。研極細。以醋調。攤於絹帛上。烘熱貼於顛

生筋散

蓖麻子

去壳

木鼈子

右共爲末先宜抱頭兩手摩頂以口內熱津調敷

補腎地黃丸

熟地  
山藥  
棗皮  
丹皮  
澤瀉  
棗苓

五味  
牛膝  
鹿茸  
補骨脂

右研末蜜丸淡鹽湯送下

十全大補湯

人參  
白朮  
茯苓  
甘草  
當歸  
川芎  
熟地  
白芍  
黃芪  
肉桂  
加薑煎服

參芩白朮散

人參

白朮

茯苓

山藥

桔梗

苡仁

蓮肉

甘草炙

右研末薑棗湯調下

鴻青丸

羌活

川芎

梔仁炮

胆草

當歸

防風

莊黃

右爲未蜜丸，青黛爲衣，茶清化下。

一方用生附去皮、南星去皮以生薑搗爛貼項軟之處立效。

六味丸

胎

八味丸

均見

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

熟

半

目爲肝竅。而五臟之精神。俱係焉。是以五臟客邪。皆能上爲目病。則欲治目病。不得專求之目。且不得專求之肝矣。考厥辨治。目赤者。心熱也。治宜導赤散。加黃連防風。目黃者。脾熱也。治宜瀉黃散。胞腫者。風熱也。亦宜瀉黃散主之。若或目之上下左右。有如風吹而莫能開。則爲丹風。而角俱緊。珠不能運。青而直視。則爲肝熱。二者均宜瀉青丸治之。黑白分明。視物不見。肺熱也。治宜桑白皮散。目閉覺見火光閃灼如電。而開視則如見黑影者。腎熱也。宜生地黃湯。目乾無淚。閉若飛蚊集舞者。腎虛也。宜六味地黃丸。治之生下數月。忽不見物者。

肝虛也。謂之雀眼。治宜六味丸。以猪肝煮熟。取汁壓下之。又有初生目閉不開者。此乃胎中受熱。宜內服生地黃湯。外用胆草湯洗之。抑有久瞓之後。忽眶黑而珠如血者。此謂之血眼。治宜內服鴻白散。外用生地黑豆糊膏貼之。若或羞光喜暗。是感風熱之常病。以清陽散火湯主之。更有初生目內出血。閉而不開。眼眶浮腫或不腫。此因胎中受熱。內服導赤散合黃連解毒湯。外用真金散点之。自爾光明無患。目若腎之開竅。則爲耳。其爲治也。專求之於腎乎。而不然也。有因內損而生病。卽有因外損而爲病者。安得專治其腎。彼其耳成膿流汁。因腎熱而成者固多。因沐浴散水入耳而成者。亦正不少。制治。

自止。抑有耳珠前后生瘡者。是爲腎疳俗名蝕瘡。內服消毒散。外宜以黃柏散搽之。或用地骨皮末和香油搽之。又有耳外生毛。忽長寸許。粗硬如髮者。是爲腎風。用松香散搽之。服藥宜六味地黃湯加白芷。生黑豆薑皮之屬。更有耳中大痛。狀如虫走。或出血。或不出血者。宜以虫蠅散吹之。且有耳旁忽然赤腫者。內服消毒散。外用敷毒散貼。其腫自消。有耳內腫塞無聞。久之潰敗。流濃出水不乾者。未潰之時。照前旁腫治法治之。既潰以石榴花吹之。若或無腫無痛。忽聾閉無聞。是因風邪入腦。氣閉而然。治宜導赤散加防風。或通竅丸主之。

若非因風邪係先天稟弱腎元虛虧此當以培補爲本宜服六味丸或十全大補湯若因中氣不足宜服補中益氣湯此則治耳病之大畧也。病

耳

天耳之前不有鼻乎。鼻亦恒多病也。顧鼻爲肺竅治雖不必

事於肺要亦不可離其本是故鼻竅閉塞不聞香臭者以川芎膏開

之。鼻流青涕者以細辛散收之尤可異者鼻竅一症膿涕結聚香臭

不聞是宜萬金膏主之以上三症均有所蔽而成踈利惟通氣散概

宜用之更有名鼻漏者常流腥臭穢莫能者此症多因其母抱卧胸前鼻氣

有初生鼻塞出入息阻吮乳莫能者此症多因其母抱卧胸前鼻氣

吹入顙門或因沐浴不避風寒致風寒之邪乘入爲殃治宜以通閑

吹之不但此也。且有鼻疳一症。鼻頭破爛。此乃肺家熱毒所致。以杏仁丸吹治自愈。又有瘡瘍蝕鼻者。此以五倍子燒灰存性。研末和猪油塗之。自效。他若鼻流黃水。謂之鼻癰。非控腦丹莫治。若或鼻被破傷。久而不愈。湏以貓頭毛。以口津調而敷之。不然亦足爲患也。總之治耳目鼻病。治小兒之法。與治成人大同小異。治有所遺。不妨參用。然有不可拘執者。醫者省之。

### 証治歌

目爲肝竅。本先天。五臟精神。俱係焉。病則邪從五臟入。專求肝木已。

多偏目赤心熱導赤散防風加入並黃連目黃脾熱鴻黃散胞腫風  
熱治同前肝風兩目難開闢肝熱直視難轉旋丸號鴻青均堪選。自  
然清白目光圓黑白分明視不見桑白皮散肺熱宣目閉見光開見  
黑生地黃湯腎熱捐目乾閉目如蚊集腎虛六味地黃丸填雀眼兒  
生瘡數月忽不見物病堪憐肝熱宜投九六味壓以猪胆汁古方傳  
初告閉爲胎熱生地黃湯膽草湯內外煎久嗽眶黑珠如血內服鴻白散最  
便外將黑豆兼生地抖膏貼目自安全羞光喜暗爲風熱清陽散火  
湯最妍初生眶腫或不腫目閉更出血漣漣黃連解毒導赤散金針  
散點痛不延耳爲腎竅治法辨若事求腎則多愆或因內損或外損

治法尤宜內外權。內服蔓荆子散。好擦用龍骨散和研腎痛。瘡生耳  
前后。消毒散。服毒不淹。外搽香油和地骨。或用黃柏散亦瘻。耳外生  
毛長寸許。搽用松香法。古賢地黃湯加生黑豆。棗皮白芷可同煎。耳  
中大痛如虫走。虫蛻散吹痛可拈。耳旁赤腫。消毒散外將敗毒散貼。  
耳邊腫壅無聞久而潰。未潰治法可相沿。既潰石榴花吹入。更或臍  
受風邪牽。無腫無痛亦難開。導赤散加防風通竅丸。若非風熱先天  
弱。腎元虛損補爲先。十全大補湯丸六味。中氣不足補中益氣湯。恬  
鼻爲肺竅治宜悉。閉塞不開膏用川芎。若流青涕細辛散。鼻竇尤異  
可申言。香臭無聞膿涕結。萬金膏好解倒懸。三症均宜通氣散疎通

其破是真詮。常流腥臭穢難近。辛夷散可醫鼻渊。初生鼻塞氣息阻。吮乳莫能是母讐。願受風寒或沐浴通閑散。服自安眠。鼻衄外用吹鼻散。內服地黃湯。病不纏。鼻疳症屬肺家熱。杏仁丸吹是鍼砭。瘡瘍飲鼻燒五倍。猪油和塗虫自癥。鼻癰控腦丹最善。何憂黃水似流泉。陳編。

方

控腦丹

紫貝子

各南蛇牙齒。粵人呼狗皮螺。取二三枚。火煅醋淬爲末。紙包放地上。去火燄。

右每服一錢。以絲瓜藤煎湯調空心服。

杏仁丸

杏仁

去皮尖搗碎以紙包壓去油成粉爲度二小

輕粉一

右共研和勻吹患處。

松香散

黃丹一

松香八

輕粉一

右爲細末香油調抹。

桑白皮散

桑白皮

郁李仁

赤茯苓

木香

防已

大腹子

蘇子

木通

枳榔

青皮

右每服三錢，薑三片，水煎服。

黃連解毒湯

炒黃連

炒黃柏

炒枝仁

炒葛根

右等分水煎服。

生地黃湯

生地

赤芍

川芎

當歸

甘草炙

天花粉

酒

右加燈芯十莖，長流水煎，熱服。

胆草湯

右治小兒胎毒初生目閉煎湯洗之一日七次

活陽散火湯

荆芥穗

条芩

防風

連翹

梔仁

炮黑

當歸尾

羌活

甘草炙

石羔煅

川芎

右加燈芯十莖水煎食后服

蔓荆子散

蔓荆子

粉葛

赤芍

前胡

木通

生地

桑白皮

麥冬

茯苓

升麻

甘草炙

右加燈芯十莖煎服

龍骨散 治小兒聾耳流膿出汁

石龍骨 煅 白簪 煅 真鉛丹

胭脂 當門子

右爲細末以綿展乾耳內膿水用竹管吹藥入耳內

黃柏散

黃柏 甘草  
枯芩 滑石 石龍骨 海螵蛸

右研細末瘡溫乾搽瘡乾猪油調搽

蟲蛇散

蟲蛇

右燒灰存性研末用鵝管吹入耳

通竅丸

雄磁石 煙 真射香

右爲細末以棗研爛和丸如棗核大綿裹塞耳中又以生鐵一小塊熱酒泡過含口內湧臭氣即通

消毒散

羌活 防風 黃芩 連翹 人參 川芎

當歸

柴胡

甘草

桔梗

右加生薑燈芯煎服

敷毒散

菉豆粉

右以醋調成膏敷腫處乾則易之

川芎膏

川芎膏

細辛

藁本

白芷

甘草炙

梅花片

杏仁尖

去皮

當門子

右爲末蜜丸龍眼核大每服一丸燈芯湯化下

細辛散

人參

前胡

細辛

人耳防風

川芎

甘草炙

萬金膏

羌活

川芎

細辛

木通

麻黃

石菖蒲

右爲末、每服一錢、以蜜和勺、薑湯化服、

通氣散

羌活

獨活

蒼朮

防風

升麻

荆芥穗

乾葛

白芷

川芎

木通

麻黃

細辛

甘草炙

右加薑棗煎食後服、

辛夷散

辛夷

白芷

卜荷

黃連

蒼耳子

右爲末每服一錢葱湯調下

通鼻散 治小兒鼻塞不能吮乳

香附

川芎

薑蚕

細辛

猪牙皂

荆芥穗

右爲細末以葱白搗成膏和勻攤軟帛上臨卧烘熱貼額門上

加減地黃湯

生地

黃芩

梔仁

炮

赤芍

白茅根

右水煎空心服

吹鼻散

梔仁炮

亂油髮燒存

右爲細末吹入鼻中

真金散

當歸

赤芍

杏仁去皮尖

川連

黃柏

右剉細以乳汁浸一宿飯上蒸過取濃汁點眼內

一目生努肉及雲翳。取雄麻雀屎用水飛過晒乾研細以乳汁調點。取雀屎法。豎者爲雄。倒者爲雌。

一赤眼腫痛用朴硝一撮放豆腐上飯上蒸之俟硝化去腐不用取

汁點之。

一風熱火眼。用生南星五錢。紅飯豆五錢。共爲末。取生薑自然汁調作二餅。貼兩大陽穴。

一火眼痛。急用大紅棗肉五六枚。葱三四莖。共搗如泥。作一小餅。閉目貼之。

一爛弦風眼。用鮮色銅綠三錢研細。以生蜂蜜濃調塗粗碗內。將碗覆轉。下用陳艾葉燒烟薰之。焦黑爲度。刮取令冷。以乳汁調勺飯上蒸過。搽眼皮上。爛弦處此方最神。百不失一。

一眼毛倒睫不起。用五倍子爲末。蜜調敷眼皮上。又方。以無名異爲

末紙捲作燃點火吹滅閉目薰之

一赤眼腫痛不消。以猪眼睛肉切一片如指甲大。洗净其血貼於眼  
反上。良久易一片即消。

一方用生地大黑豆共浸一宿。取出搗爲膏。貼眼皮上。其血自散。血  
淚既出。腫自消。

一耳內腫痛流膿出水。用虎耳草搗取汁灌入耳中。此治耳聾之妙  
藥。畧加枯箬更佳。

一耳內膿水不乾。用千層石榴花焙乾爲末。吹入耳內。  
一耳后生瘡爲腎疳。以地骨皮研末。香油調搽。並煎水洗。

一諸虫入耳。取貓尿滴入耳中。其虫自出。若用麻油滴之。則虫死難出。取貓尿法。以生薑搽貓鼻。尿即出。或用稻草燒灰淋汁亦可。  
一鼻流濁涕。名鼻淵。用蛇床子炒辛夷仁白芷卜荷等分爲細末。臨卧葱湯下。

一鼻被破傷。急以貓頭上毛剪碎。以口中津唾調敷之。自愈。

一瘡瘍蝕鼻。破爛不堪。用五倍子燒灰存性研末。以腊猪油調和塗之。

導赤散

鴻黃散

鴻白散均見  
發熱

鴻青丸見解

六味九

地黃湯

即六味地黃  
湯見胎病

十全大補湯

見解

補中益氣湯

見外  
感

口瘡論

咽喉

脾土之氣。上通於口。脾有所傷。口病作焉。是故治口之病。不能不求其故於脾矣。而亦未可概論也。有因外傷者。有因內生者。豈得拘泥從治哉。彼夫滿口赤爛。乃口瘡也。其故在脾乎。寔由奉養過溫。或多着焰燥衣裳。積熱薰蒸。有以致之耳。治法宜內服沉澁丹。外用地虱插水搽之。蒲口白屑如刺者。乃魏口癥也。治宜以保命散吹之。內仍服沉澁丹。若生瘡潰爛而痛。是謂之口糜。此因膀胱積熱移於小腸。治宜導赤散。合五苓散。若蒸熱如火。反畏寒冰。投涼藥不效。此因肝脾不足。虛火上升。治宜理中湯。有上齶腫癰癩者。治宜以針刺之。使

去惡血。而後服沈瀝丹。吹以碧雪散。其效如神。又有脾虛中氣不足。致口頻撮者。是宜補脾。湏進異功散。若面青多哭而口撮者。此陰寒之故。治宜用理中湯以溫之。若兩頤流涎。是脾胃之寒。治宜溫脾丹。有急欲吮乳而口難吮者。是必舌硬。乃脾熱之故。治宜瀉黃散主之。此治口之大暑也。

至如齒也。生有定期。而有過期不生者。是體虛而髓弱也。治宜六味地黃丸。若牙床疼痛。用涼膈散。必加知母石羔升麻。若牙齦腫者。湏知用針刺去其惡血。繼用鹽湯洗之。自愈。或以黃柏研末敷之。亦宜。若潰爛腥臭。內服沈瀝丹。外用荆瀝薑汁和漱之。或牙疳初則。臭不可聞。次則染牙黑色甚。而齦爛血流。是熱火也。

治宜內服沉瀝丹。外以如聖散敷之。又有夢中咬牙者。此係風熱相搏。治宜宣風散。亦有因病戰慄而咬者。此宜培本補元。自爾無患。那有齒落不生。因牙齦頑厚之故者。此宜先行針刺。次用鳳骨散治之。  
喉若夫狹口而進。則爲咽喉。咽喉者。乃水谷之道。人身之要區者。病則更宜速治。是故有積熱而喉閉者。宜苦桔湯。重則化毒湯。若係諸骨所梗。用鵝毛掃之。卽化骨小能下食者。用海上方治之。顧咽喉爲病。大小不甚相異。其病繁矣。茲但姑指一二。蓋前男雜病內已詳列之。遇有病症可參觀一例同治。故不贅云。

### 誕治歌

小兒脾傷口病作。國手醫脾占先着。然亦未可概論焉。外傷內生宜揣度。蒲口赤爛有何因。積熱薰蒸衣焰焰治法。內服沆瀣丹。地蠶漁。榴水搽卽脫。白屑如刺。蒲口生鵝口瘋。病症亦惡。治宜保命散吹之。內服沆瀣功最碩。生瘡爛痛名口糜。膀胱移熱小腸絡。導赤散投合五苓散。熱清口愈。古方博。蒸熱如火。反畏寒。虛火上升。理中湯。豁針刺出血。何症宜此。是懸癰腫上齶。沆瀣丹。服碧雪散。吹其效如神。人自樂。又有脾虛致困疲。中氣不足。口頻撮。補脾用散。進異功。脾扶氣復。起羸弱。面青多哭。口撮頻。陰寒理中湯。吉可卜。兩頤流涎脾胃寒。

溫脾丹。造天工。奪舌硬有乳。口難吮。脾熱渴黃是大畧。齒生有定已。

過期。

重本丸

無阻遏。牙床疼痛。膈散宜。知母石

羔升

麻加配合。

齦腫。

清火丸

去血淋。繼用益湯。勤洗濯。外將黃柏研末敷。熱退毒消。齦

自若。潰爛腥臭。

沉瀝丹

荆瀝薑汁口含咯。又有牙疳一症。生齦爛血

流熱火灼。

沉瀝丹

內服如聖散。敷夢中咬牙風熱搏宣。風散進莫遲。

遲因病戰慄本元薄。

鼠骨散

治頑厚牙。服之無患。齒久落。積熱喉閉。

何藥療。

甘桔湯

化毒。自優渥。諸骨所梗海上方。症治分明。宜玩索。

方

保命散

治小兒鵝口瘡

箭頭砂

枯白礬

明牙硝

右爲細末吹之

溫脾丹

南木香 半夏 炮薑 白朮 陳皮 青皮

右爲末蜜丸龍眼核大每服一丸米飲下

如聖散

人中白煅烟 銅深 射香

右爲末先以蜡樹葉浸米泔水洗净后擦此藥

涼膈散

連翹 桔梗 炮  
大黃 卜荷 黃芩 芒硝

甘草 淡竹葉

右加燈芯十莖煎入蜜少許對服

宣風散

枳榔 陳皮 甘草

黑牽牛頭末炒取

右爲末每服一二錢蜜湯調空心服

風骨散

雄鼠骨炙 柑橘 射香

右研細末先針刺去其血后以此藥搽其刺處良久以薑湯漱之

甘桔湯

桔梗

粉甘草

右以净水煎曬之

化毒湯

桔梗

卜荷

硼砂

荆芥穗

甘草炙

芒硝

山豆根

馬牙硝

明雄黃

鏡面砂

右爲細末、每服一錢、白湯調下、仍以此藥末、吹入喉中、

海上方

金鳳花根

右搗碎以米醋濃煎用有嘴瓶盛之、口鄒瓶嘴仰面吸藥吞之、其

脣卽下吞。勿令沾牙。又方以玉簪花根亦可。

碧雪散

蒲黃

青黛

硼砂

牙硝

甘草

右爲細末吹之

一治口瘡破爛。并治咽喉喉癰。喉瘡用鳳凰衣。微火炙黃。橄欖燒存性。兒茶共爲末。加冰片少許研匀。口瘡搽患處。喉痛吹之。卽進食。一口瘡久不愈。虛火也。用生附子一個切焙爲末。醋和作餅。男左女右。貼脚心引火下行。自愈。

一口角流涎瘡爛。以亂髮燒灰存性。米飲調服。外卽以此敷之。又方。

蒸飯時收瓶上流下氣水搽之卽愈。  
一。口唇腫黑癢痛不可忍。先以磁鋒砭去惡血。以古銅錢磨猪油塗之。

一。治走馬牙疳及各樣口疳。多年田野中白螺蛳壳研爛少加兒茶爲細末吹患處卽愈。

一。口瘡瘍及咽喉痛。用吳茱萸研末加麪粉醋調作二餅貼兩足心以布扎之過夜卽愈。

一。牙齦潰爛諸藥不效。用鹽欖二三個火燶存性。如水片少許研勻搽之神效。

一走馬牙消臭爛出血。用紅棗三枚去核以明雄研末填滿棗內。新瓦盛之火煅存性研末搽之。

一方用鳳凰衣未見水者焰黃少加枯礬研末搽之。

一喉閉乳蛾。用雞內金勿洗陰乾燒存性研末吹入卽破而愈。

一喉內生瘡鼻孔亦爛若作喉風治立死。用白霜梅一個燒存性枯礬穿山甲炙枯爲末吹喉中卽效。

一喉瘡已破瘡口疼痛難進乳食用猪腦髓蒸熟薑醋調和服之愈。

一喉中結核水食不通危困欲死用百草霜蜜和爲丸白湯化開灌之甚者不過二次卽愈。

一。恨不得吞金銀銅鉄多服米餉，久之自出。至銅錢用生慈菰搗汁多飲，自然消化。又方以鹽欖燒灰存性研末水調下，自出神驗。

一。猪骨硬咽不下，用咸靈仙煎湯嚥之，其骨節軟如綿而下。或取狗涎嚥之亦化。取狗涎法，將狗倒吊而涎自出，倘狗涎中帶微血，加砂糖半盞調服。

導赤散

鴻黃散

均見  
發熱

沉瀝丹

見臍  
風

五苓散

理中湯

見外感

吳功散

見吐  
嘔

六味丸

見胎  
病

舌病論

重舌

木舌

吐舌

弄舌

綽舌

舌乃心苗。抑屬脾系。心脾積熱。舌病生焉。彼其爲病。不一。有名重舌者焉。其候舌根下腫。短小似另生一舌。是積熱甚盛。內服沉澀丹。外用針刺出血。繼以蒲黃黃柏末搽之。主有名木舌者焉。其候舌腫漸長。塞口不能飲食。不能言語。此症雖亦由心脾之熱上衝。而不從速治之。十難二生。治法服藥針刺。均與重舌同例。倘照服不效。可用碧雪散加竹瀝調敷清之。主有名吐舌者焉。其候舌長出。不能反縮。此症與舌生瘡渴欲飲冷一候。同爲心脾積熱而成。鴻黃散可卽獲效。主抑有名弄舌者焉。其候舌微露。而時出時縮。卽出卽收。如弄

物然且有似蛇舌出入俗名蛇絲觴此症因心脾虧損治法宜進溫補之劑卽夾有熱用瀉黃散亦宜輕下等分如服之不應以四君子湯主之若渴欲飲水以七味白朮散主之如午后甚者此又係脾血虛壅宜急進參苓白朮四物湯若仍不效卽宜扶脾補胃補中益氣湯當速進焉此症若係病後見之最爲危候速進十全大補湯庶可保全。且有名絆舌者焉其候舌根下有筋一條絆其舌尖致舌斷續不能吮乳細視之乃見有筋如絲絆其舌尖此症亦因熱甚而然治法外用針輕輕挑斷其絲切忌致傷舌根內以瀉黃散主之甚矣。一舌也而爲病不一醫之不可不精也有如此哉。

証治歌

舌爲脾系與心苗。心脾積熱是病繇。舌根下腫爲重舌。積熱甚盛流瀉丹饒。外將針刺繼用搽。蒲黃末與黃柏交。木舌漸長致塞口。不從速治生難聊。醫治均同重舌法。不效碧雲散。竹瀝調舌長。難縮吐舌症。鴻黃散。好治法昭。弄舌微露時出縮。蛇絲驚症俗名標。心脾虧損宜溫補。醫師臨症莫輕佻。夾熱可用鴻黃散。不效四君子可療。渴欲飲水宜七味。白朮散。午后更甚脾血稠。急進參苓白朮散。四物湯投效可邀。不效補中湯益氣。扶脾補胃莫辭勞。此病苦從病后見。十全大補湯最超。絳舌舌斷難吮。乳根下如絲筋一条。此症原來因熱甚。針

金匱要略 卷之二十一  
將絲斷貴輕挑。倘傷舌根難挽救。內服瀉黃散。自消治法如斯頗詳。  
悉。豈嫌饒舌太嘵嘵。

方

七味白朮散

人參 白朮

茯苓

千葛

甘草

藿香

南木香

右等分水煎服

一舌或脹大腫。鞭卽時氣絕。名翠舌。用皂凡不拘多少。新瓦上火燬。變紅色爲度。放地上候冷。研細搽舌上立愈。重舌木舌皆效。

一舌腫滿不能出聲以梅花冰片研細敷之或食鹽百草霜爲末并  
花水調敷卽效。

一舌斷重生用活蟹一隻炙乾爲末數之此方至神至驗。

沆瀣丹

見臍風

鴻黃散

四物湯

見孫熱

四君子湯

補中益氣湯

見外感

參苓白朮散

十全大補湯

見解

碧雪散

見口瘡