

土

精東醫寶鑑

上海千頃堂書局印行
劉仲祺題



瘧瘧

瘡病之源 內經曰夏傷於暑秋為痳瘧○夏暑汗不出者形弱而氣燥穴俞以開發為風瘡(內經)○風氣盛於皮膚之內內不得通外不得泄腠理間則洒秋必病瘡蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而深瘻泄於外邪氣內行至秋而發為瘡也(保命)○瘡之發亦有非暑因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在氣則發早在血則發晏漫則日作深則間日或在太陽則一也(東垣)○大法風暑當發汗夏月多在如凌虐人之狀又曰瘡有凌虐之狀在傷寒久則為瘻登丘內易久則為旁聚寒則成瘡矣(東垣)

之源內經曰夏傷於暑秋為痴瘈○夏暑汗不出者秋成風瘈(內經)○秋善病風瘈又曰魄汗未盡形弱而氣燭穴俞以開發為風瘈(內經)○風成為寒熱又曰困於露風乃生寒熱(內經)○風氣盛於皮膚之內內不得通外不得泄腠理間則洒然寒閉則熱而悶名曰寒熱(內經)○夏傷於暑秋必病瘈蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而深瘈瘈者久瘈也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄於外邪氣內行至秋而發為瘈也(保命)○瘈之為病以暑舍於營衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在於陰則發寒並則病作離則病止作止故有時在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日或在頸項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一也(東垣)○大法風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也(丹心)○病氣如凌虐人之狀又曰瘈有凌虐之狀在傷寒久則為壞證在內傷久則為勞瘵然則宜美疾哉(入門)

瘡疾形證 (瘡之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓領腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲令
領巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外
熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲也 (內經) ○夫瘡之始發也陽氣並於陰當是之時陽
虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復並於外則陰虛而陽實故先熱而渴
夫瘡氣者並於陽則陽勝並於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱 (內經) ○衛虛則先寒慄虛則先熱表
邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等 (入門) ○人之榮衛晝行於陽 (陽則表也) 夜行於
陰 (陰則裏也) 荣衛行到病所不通乃作寒戰鼓振頭領中外皆寒腰脊俱痛此邪氣入於內也寒戰
俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷煩滿欲吐自汗此邪氣發於外也 (丹心)
○暑瘡單熱濕瘡多寒寒瘡先寒後熱風瘡先熱後寒餘皆先寒後熱 (入門)

脈法

瘡脈自弦，弦數多熱，弦遲多寒。弦小緊者宜下之，弦遲者可溫之。弦緊者可攻之，弦遲者可補之。瘡脈自弦，微則為虛，代散則死。脈經者風發也，以飲食消息止之。（要略）○瘡脈自弦，微則為虛，代散則死。（脈經者風發也，以飲食消息止之）

一
禁

○瘡脈自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之(要畧)○瘡脈自弦微則為虛代散則死(脈經)○瘡脈自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷(脈訣)○瘡脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可也(丹心)○弦短者傷食弦滑者多痰

虛微無力為久瘧(醫鑑)○

寒熱先後 (瘡先寒而後熱者由夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘡(內經)○先熱而後寒者由先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘡(內經)○其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲呴名曰瘡瘍瘍謂熱也(內經)

寒熱往來 痘有酒浙惡寒而復發寒者何也曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之何謂陽不足假令寸脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則酒浙惡寒何謂陰不足假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也(仲景)○陽微則惡寒陰微則發熱大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰氣上入陽中則惡寒(仲景)○陽不足則陰邪出表而與陽爭乃陰勝而為寒也陰不足則陽邪入裏而與陰爭乃陽勝而為熱也若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏則寒熱相等乍往乍來而間作也(入門一瘡者少陽也少陽者東方之氣也逆行則發寒順行則發熱故分之氣異往來不定也(東垣)○身後為太陽太陽者膀胱水寒也身前為陽明陽明者大腸金燥也少陽之邪在其中近後膀胱水外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣(直指)

瘡發日數多少 夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之外因秋遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作(內經)○衛氣與邪相並則病作與邪相離則病休其並於陰則寒並於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而並合則復病也(綱目)○其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原也其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也(內經)○時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘡者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴(內經)○三日一發者受病一年間日一發者受病半年連日發者受病一月二日連發住一日者氣血俱受病也又曰三日一發陰經受病也最重(丹心)○陽為府邪淺與榮衛並行一日一發○陰為藏邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積乃發或三四日一發久則必為瘡母(入門)

瘡發有晝夜早晏之異 帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循督而下衛氣一日一理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稱晏也其出於風府日下一節二十五日至脈骨二十六日入於脊內注於伏背之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣曰高故作日益早也(內經)○陽為晝發邪淺榮衛晝行背與脊故也○陰為夜發邪深榮衛夜行胸與腹故也○陽為子時

移時分定陰陽然後陽瘡截住陰瘡升散（入門）○從卯至午發者邪在外也

從午至酉發者邪在內也從酉至子發或至寅發者知邪在血分也（保命）

六經瘡

（夏傷於暑秋必病瘡初不知何經受病隨其受而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣之證各殊在太陽經者謂之寒瘡治多汗之在陽明經者謂之熱瘡治多下之在少陽經者謂之風瘡

治多和之此三陽受病皆謂暴瘡發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者則不分三陰皆謂之溫瘡其發在處暑後冬至前此乃傷之重者遠而深也疫瘡者老瘡也故謂之久瘡（保命）○傷寒餘熱未淨重感於寒而變瘡名曰溫瘡亦曰風瘡此為傷寒壞病真證先熱後寒（入門）○瘡屬三陽宜汗宜吐瘡屬三陰宜下宜和宜溫（正傳）○太陽瘡宜桂枝羌活湯麻黃羌活湯○陽

明瘡宜人參白虎湯柴芩湯（一方並見寒門）○少陽瘡宜柴胡桂枝湯柴胡加桂湯○三陰溫瘡宜白虎桂枝湯麻黃白朮湯或小柴胡合四物湯名曰柴胡四物湯○太陽陽明合病桂枝芍藥湯桂枝

石膏湯三陽合病宜桂枝

黃芩湯以和之（保命）

桂枝羌活湯

（治太陽瘡自汗頭項痛腰脊強桂枝羌活防風）

麻黃羌活湯

（治太陽瘡無汗即前方去桂枝加

麻黃也割法服法同上（綱目）

柴胡桂枝湯

（治少陽瘡寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五分右剉一貼入薑三叢二水煎服（入門）

柴胡加桂湯

（治少陽瘡往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右剉作一貼入薑三叢二水煎服（入門）

白虎桂枝湯

（溫瘡者其脉如平身無寒但熱骨節頗疼時便難朝發暮解暮發朝解此藥主之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢搜米一合右剉作一貼水煎服（正傳）○一名加減桂枝湯

（得效）

麻黃白朮湯

（治風瘡麻黃桂枝青皮陳皮川芎白芷半夏礪紫蘇葉赤伏苓白朮桔梗細辛檳榔甘草各七分右剉作一貼入薑三叢二水煎服（直指）

柴胡四物湯

（治三陰溫瘡瘡或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當歸赤芍藥各一錢右剉作一貼入薑三叢二水煎服

桂枝芍藥湯

（治瘡寒熱大作此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各二錢

右挫作一貼水煎服（保命）

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病間日瘡熱多寒少石膏知母各三錢
黃芩二錢桂枝一錢右剉作一貼水煎服之(入門)

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽陽明少陽合病也宜用此和之柴胡二錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服(保命)

瘡晝發夜發宜分治

氣虛晝發宜六君子湯(方見痰門)補中益氣湯(方見內傷)加半夏黃芩○血虛夜

發宜柴胡四物湯

(方見上)桃仁承氣湯(方見寒門)麻黃黃芩湯柴胡芍藥湯(諸

方)

麻黃黃芩湯

治夜發瘡麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢半桂心一錢桃仁十五枚右剉作一貼水煎臨卧服○桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燔經所謂肝苦急急食甘以緩之桃仁散

血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪

此麻黃芩湯乃發散血中風寒之劑也(綱目)

柴胡芎歸湯

治夜發陰瘡引出陽分而散後服人參葛根各一分桔梗當歸芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分右剉作一貼入薑三瓣二梅一水煎

服(回)

春)

諸瘡證治

瘡有風瘡寒瘡熱瘡濕瘡疚瘡食瘡勞瘍鬼瘡疫瘡瘡瘍老瘧(諸方)

風瘡汗則宜散邪湯

有汗則得先熱後寒宜麻黃白朮湯無

寒瘡自感風而得之

汗則宜散邪湯(方見寒門)交

寒瘡因暑勝熱多得之一名瘡瘍亦曰暑瘡宜人參白虎湯柴

熱瘡(一方見寒門)柴胡知母湯爭功散龍虎湯(入門)

濕瘡因冒襲雨濕汗出濕浴得之寒熱相半小便不利

濕瘡宣五苓散(方見寒門)加蒼术川芎羌活(入門)

疫瘡因外感內傷鬱聚成瘍頭痛肉跳吐食嘔沫甚則昏迷卒倒宜柴胡陳湯加草果或四獸飲冷附湯久不

止以露臺飲散之(入門)○有人忽得瘡疾嘔吐異常以二陳湯(方見痰門)加入參縮砂倍用白豆蔻進一二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能清

能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也(直指)

食瘡(一名胃瘡因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱熱已復寒寒熱交併苦飢而不能食食則吐痰經日

寒熟善飢而不能食食已支滿腹脹病以日作名曰胃瘡是也宜平陳湯加枳實白朮山楂子神麴青

皮或清脾飲小清脾湯又二陳湯加

青皮擴柳縮砂白豆蔻亦佳(諸方)

勞瘡

(即久瘡也)寒熱微微寒中有熱熱中有寒最難調治由表裏俱虛真氣未復疫雖暫止小勞復來經年不差宜芎歸籠甲散常山飲五勞丸六和湯烏頭七棗湯露靈養胃湯十將軍丸一補一發丹辰砂丸熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷寒戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯(方見內傷)

諸證悉愈若投清脾散

瘡多致不起(醫鑒)

鬼瘡

因感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖宜辟邪

丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻中(入門)

疫瘡

一方長幼相似或染時行變成寒熱須參運氣用藥宜不換金

瘡瘍

正氣散(方見寒門)如意丹五瘟丹瘡痘丸(三方見瘟疫)

扶山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷因發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無南方多

瘻瘍

此宜雙解飲子地龍飲羌活蒼朮湯瘻疽丸(方見疽門)觀音丸(諸方)

瘻瘍

蓋老瘍也以其隔三日一發繙縫不去也(綱目)○三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘍也作於寅申巳亥日者厥陰經瘍也作於辰戌丑未日者太陰經瘍也瘍得於暑當以汗解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與參术等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗

而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆(丹心)○老瘍係風暑之邪入在

陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻劑恐非所宜(丹心)○若病感極深雖得大汗所感之邪必自藏傳出至府其發無時必亂而失期若發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸趨早亦是

佳兆故治此病春夏為易秋冬為難非有他也以汗之難易為優劣也(丹心)○凡瘍經年不差謂之老瘍必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛乃瘍母也雖內虛非常山楂榔決不能除但須製

熟則不損胃老瘍丸是也血虛者宜鼈甲丸有水癖者暫用消癖丸以補脾化痰湯藥輔之且量

虛實用老瘍飲(入門)

○老瘍宜七棗湯鼈甲飲子參歸鼈甲散祕方清脾丸經效瘧丹黃甲丸

散邪湯

治風瘡初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘇葉羌活各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三葱白三莖煎露一宿早晨溫服(醫鑒)

正氣湯

治風瘡同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬橘榔草果青皮赤伏苓各一錢桂枝甘草各五分右剉作一貼入薑三聚二水煎服(醫鑒)

交解湯

治寒瘡即雙解飲子也(方見下一)

黑附湯

治脾寒瘡疾面青振寒草果附子炮各二錢半右剉作一貼入薑七聚二水煎服(入門)

草果飲治寒瘡草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉
甘草各一錢右剉作一貼水煎服(直指)

甘草各一錢右剉作一貼水煎服(入門)

柴胡桂薑湯治邪在半表裏寒熱往来極驗柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天

花粉黃芩各一錢乾薑甘草各八分右剉作一貼水煎服(入門)

柴胡知母湯治熱瘡及瘻瘍柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘草炙
七分右剉作一貼入鹽三梅二水煎清服服午前又一服久瘡加人參當歸(節癆)

半功散治熱瘡多效知母貝母柴胡常山桔子檳榔地骨皮甘草各一錢等退二七個

右剉作一貼入桃柳枝各五寸煎服未效加過路萬藤五寸同煎服(得效)

龍虎湯治熱瘡火盛舌卷唇焦鼻如煙熏六脉洪緊石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母
黃柏各一錢瓶子八分半夏七分粳米百粒右剉作一貼入鹽三棗二水煎服(醫鑒)

柴陳湯治瘧瘡柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤伏苓各一錢甘草五分右剉作一貼鹽三棗二水煎服(入門)

錢甘草五分右剉作一貼鹽三棗二水煎服(入門)

四獸飲治七情聚瘧五臟氣虛瘡久不已人參白朮白伏苓陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗各一錢
右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包裹水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進數帖

即安(得效)

冷附湯治瘧疾無過是瘧實而脾胃弱停於胸膈所以五更冷服使藥下達壯脾胃去瘧實也大附子
一個炮去皮臍右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一宿五更初冷服(得效)

露薑飲治瘧瘡生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約明日當發隔夜安排將
紗片蓋露一宿五更初澄者一上飲之或有痰吐任之即安(得效)

平陳湯治食瘧營木半夏各二錢厚朴陳皮赤伏苓各一錢三分半甘草七分右剉一貼鹽三棗二水煎服(入門)

分半甘草七分右剉一貼鹽三棗二水煎服(入門)

清脾飲治食瘧柴胡半夏黃芩草果白朮赤伏苓厚朴青皮各一錢甘草五分右剉作一貼入鹽三棗二
水煎服○此方乃小柴胡平胃二陳合而為一也一方加常山二錢煎之露服五更藏瘡令人不

吐為妙○一名

清脾湯(入門)

小清脾湯治胃瘧厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑各一錢草
果甘草各五分右剉作一貼鹽三棗二水煎服(得效)

治勞瘧常山知母草果各一錢半良薑一錢烏梅肉甘

芎歸鱗甲散治勞瘧鱗甲二錢川芎當歸赤芍藥半夏陳皮青皮
各一錢烏梅一個右剉作一貼入鹽五棗二水煎服(入門)

常山飲治勞瘧常山知母草果各一錢半良薑一錢烏梅肉甘

常山飲治勞瘧常山知母草果各一錢半良薑一錢烏梅肉甘

五勞丸

治肉二兩半右日乾為末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十丸(直指)

六和湯

治瘡久不愈常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅橘核柴胡各一錢右剗作一貼入薑三棗二酒水相半同煎露宿臨發日服之(丹心)

烏頭七棗湯

治勞瘡及寒瘡大川烏頭一個以鹽水浸泡七次去皮臍右剗分貼每貼入薑七東七葱白三水煎稍冷先吃薑乃服藥(直指)

露薑養胃湯

治久瘡三五日一發者先以生薑四兩搗取自然汁露一宿次早將人參養胃湯(方見寒門)一貼入薑二梅一同煎去滓和薑汁空心溫服(醫鑑)

十將軍丸

治久瘡及瘧母縮砂欖榔常山草果各二兩三稜蓬木青皮陳皮烏梅半夏各一兩右先將常山草果酒醋各一碗浸一宿後入八味同浸至晚炭火煮乾為末酒醋各半打糊和丸梧子大

白湯下三四十九日二服

服至八兩即除根(丹心)

一補一發丹

治久瘡內傷挾外感間發內治瘡外發汗赤伏苓一兩半夏陳皮柴胡黃芩蒼术葛根各七錢常山三錢右為末糊丸梧子大白湯下七十九(入門)

辰砂丸

治久瘡不損元氣辰砂阿魏真者各一兩右研勻稀米糊和丸皂角子大空心以人參湯化下一丸(得效)

養胃丹

治久瘡二三年不愈者蒼术常山酒蒸各二兩半夏陳皮厚朴各一兩半赤伏苓蘆香草果各一兩甘草炙五錢烏梅四十九個取肉右為末淡薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十九(醫鑑)

辟邪丹

治風瘡鬼瘡菉豆雄黑豆各四十九粒信砒半錢另研黃丹一錢朱砂二錢右為末滴水和勻分作三十粒每一粒取東南桃枝七枚研汁和井華水早晨日出時而東吞之虛人慎勿用(河間)

雄朱丹

治久瘡大黑豆四十九粒約五錢重端午日以冷水浸從早至已時去皮晒乾研入信砒末一錢再研勻麪糊和勻作丸少壯人梧子大老人黃豆大小兒菉豆大雄黃朱砂為衣晒乾收貯臨發

五更面東井水下丸(入)

門二一名瘡靈丹(醫鑑)

雙解飲子

治癰瘡及寒瘡神效肉豆蔻草豆蔻各二個一個研一個生厚朴二寸一寸薑汁浸吳一寸生用甘草大者二兩一半炙一半生生薑二塊一塊一生右各對合分二貼入東二梅一水煎空

心溫服(局方)○一名交

解飲又名生熟飲(類聚)

地龍飲

治癰瘡大熱煩躁生地龍大者三條研細入薑汁薄荷

羌活荳朮湯

治感冒風瘡成寒瘡羌活一錢半荳朮柴胡黃芩枳實橘紅半夏川芎甘草各一錢右剗作一貼入薑五片水煎服(節齋)

觀音丸

治療瘡半夏生烏梅肉母丁香巴豆肉各十枝晒右為末鹽汁糊丸麻子大每五丸臨卧冷水下有人於海角遇白衣人授之因名馬（直指）

老瘡丸

治癆瘍久不差頤痛有母與上十將軍丸同常山草果各二兩餘八味各一兩剖法服法並同上(入門)

鼈甲丸

治癰瘡有癰母久不差，鹽甲醋煮一兩三枚，蓮木香附子、青皮、桃仁、紅花、神薑各五錢，右為末，醋糊作丸梧子大，白湯下五十七丸（入門）。○一名瘡母丸（丹心）。○加芎歸赤芍藥治

夜翰齋名陰
瘧丸(入門)

消癬丸治痃瘞彌年經汗吐下禁衛虧損邪氣伏藏腸間結為癩瘕腹脇堅痛名曰瘞母○花炒朱砂各等分右為末蜜丸小豆大每十九丸棗湯下去癩須用芫花大戟破水之劑得效○一名芫花丸

門入

老瘡飲 治老瘡結成癰癧在腹脇諸藥不愈蒼朮草果桔梗青皮陳皮良薑各七分白芷赤芍芩半夏枳殼桂心乾薑甘草各五分紫蘇葉川芎各四分右剉作一貼入鹽少許水煎空心服(入門)。○一

名疫瘧錄

名疫

七棗湯 治五藏氣虛陰陽相勝作為痰瘡不問遠近悉主之附子
七次去皮臍右剉作一貼入鹽七棗七水一椀煎至半空一個炮裂以鹽水浸再煖如此
心溫服仍吃棗三五枚(得效)

鼈甲飲子

老瘡眼中絲癰癬名曰瘡母鑿甲一錢白木黃芩草黑糖桃川芎陳皮甘草五分右剉入蠶三隻二海一水煎服(綱目)白芍蜜酒各一錢甘草五分右剉入蜜一升水煎服(本草綱目)

復歸醫甲飲治老瘧腹脇有塊成瘕母蠭甲醋煮一錢三分黃芩蜜水炒青皮當歸白芍等白朮厚朴川芎香附子各八分人參縮砂山楂子枳實各五分甘草三分右剉作一貼入蓋三棗二梅一

水煎空心服(回春)

祕方清脾飲

治瘡三日一發成十日一發白朮一兩半半夏青皮黃芩各一兩人參檳榔草蔻蓮子肉各五錢黃甘草各三錢右為末飯丸梧子大白湯下六七十九丸

經效瘡丹

瘡母結癧寒熱無已真阿魏雄黃各二錢半朱砂一錢半右沸湯泡阿魏研雄朱為末和勻糊和丸梧子大每一丸人參湯冷服空心瘡瘍桃仁煎湯冷服臨發磨一丸付口鼻畔直

指

黃甲丸 治癰

母成塊久不愈朱砂阿魏穿山甲酥吳嶺榔各五錢雄黃木香各一
烏宋桂仁蘇木白芷各一錢苦子大空心蘿蔔下五十九

卷之三

瘡寒熱不歇有根癥之寒熱不歇者有根在也根者何曰飲水而敗血暑毒隨證而疏利之則寒熱自除矣○凡瘡皆因停蓄黃水或於脇間結癖惟癖為能生寒熱若取下毒水去其病根則寒熱自解所以瘡劑多用常山蓋水在上則吐之水在中下則亦能破其癖而下其水故

也(直指)

寒熱似瘡帝曰人熱復惡寒發熱有如瘡狀或一日發或間日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節瘡亦同法(內經)○感冒之人忽覺毛寒股慄百骸鼓搘嘔不能食未幾轉而發熱皆似瘡證不必脉弦但隨證施治熱多小柴胡湯寒多人參養胃湯和解之內傷虛者補中益氣湯(方見內傷)加山楂麥芽白豆蔻扶脾

自此矣(入門)

瘡疾治法

(內經主於暑風局方主於傷食丹溪主於瘡雖三因雜至錯亂氣血然捷徑以祛暑消瘡為要通

(二陳湯(方見瘡門))

○無汗加葛根柴胡氣虛加參术熱甚加芩連寒多加草果口渴加烏梅

(入門)○無汗者要有汗散邪為主帶補有汗者要無汗扶正氣為主帶散邪宜散邪湯正氣湯(丹

無汗須用柴胡升麻川芎汗多須用白朮烏梅以散之(入門)○先熱後寒宜小柴胡湯先寒後熱宜

柴胡加桂湯多熱但熱宜白虎桂枝湯多寒但寒宜柴胡桂苓湯(綱目)○瘡瘍熱多者投以半冷半

熱解散分陰陽藏寒熱之剷度其所作之日先一時進以抵截之藥去其痰水則收效矣寒多者投以半生半熟壯脾進食之劑次以抵截之药則疾癖去而疾愈矣須令慎飲食謹起居則無復攻之患矣

(得效)○桂枝湯治太陽白虎湯治陽明小柴胡湯治少陽意甚明顯挾痰合二陳湯食積合平胃散

尿滌合五苓散便閉合大柴胡湯無汗加乾葛蒼朮有汗加黃耆白朮夜發加枳仁赤芍药日久加常

山楂柳吐之治瘡

之法盡矣(入門)

柴平湯

治諸瘡柴胡蒼朮各二錢厚朴陳皮半夏黃芩各一錢人參甘草

(各五分右剉入薑三棗二梅一煎服)

○一名平胡飲子(入門)

草果平胃散

治脾虛作瘡不問寒熱先後宜服蒼朮二錢厚朴陳皮青皮大腹皮橘

(榔草果各一錢甘草五分右剉作一貼)

入薑三棗二水煎服(得效)

加減清脾湯

治諸瘡即小柴胡湯與人參養胃湯合和也寒多熱少多用小柴胡湯(一方並見寒門)寒熱勻則平用每貼入薑五棗二桃柳枝各二寸水煎空心服(得效)

四將軍飲

(治瘡作時仆厥攢腋不省是中心抑鬱陰陽交戰所致宜服此附子一兩炮飼子四個煨去核陳皮四個全者甘草四分炙右剉分作二貼每貼入薑棗各七水煎漸漸灌下四服頓甦(得

驅瘡湯 治諸瘡久瘡草果青皮陳皮人參赤茯苓半夏厚朴蒼术白术檳榔各一錢良薑甘草各五分右剉作一貼入薑五棗二梅一水煎服(直指)

驅邪湯 治諸瘡柴胡二錢白朮一錢半乾葛一錢三分蒼朮一錢陳皮七分甘草五分右剉作一貼水煎服空心(必用)○一名柴胡二朮湯(俗方)

人蔭竹懸飲 治虛瘡昏倦汗多瘦盛舌大語濫脉虛無力白伏苓人參白朮當歸生地黃酸棗仁炒麥門冬知母陳皮白芍葛根各一錢甘草三分右剉作一貼入棗二梅一水煎調竹懸薑汁服(回春)

(春)

治瘡須用分陰陽之藥 瘡疾者陰陽交爭寒熱互作用約須半生半熟半冷半熱乃收十全之功○諸云無瘡不成瘡蓋半生半熟所以分陰陽解寒熱也(得效)

知瘡將差

少陽證知可解者寒熱日不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之於晏晏移之於早

(瘡將差也)

(醫鑒)

截瘡法

凡瘡數發之後便宜截而除之久則中氣虛弱病邪已深而難治世有硫丹等截藥大毒不可輕用(正傳)○若用截竊吐出黃膠水者瘡自愈也不可一二日早截早則邪氣閉塞而成壞證又不可

(遏)

遏則元氣衰憊而成虛法當在三四日就截為好須待熱退身涼方可飲食也切不可帶熱飲食

(忍)

不消而成痞痞散成鼓者有之矣(回春)○凡瘡須分利陰陽柴苓茶湯(方見寒門)最微甚者截而

(除)

除之不二飲勝金丸之類截之不愈乃氣大虛要扶胃氣為本露薑養胃湯養胃丹之類(方見上)又

(有)

經歲久瘡汗吐下不愈柴薑虧損邪氣伏藏腸間結為癰瘡謂之瘡母瘡瘍飲黃甲丸之類(方見

(上)○醫鑒)○在陰分者用葛根起陽分方可用截方(丹心)○截瘡宜截瘡常

山飲截瘡七寶飲

子人參截瘡飲鬼哭丹藤金丹參歸養榮湯(諸方)

截瘡常山飲

常山草果檳榔知母烏梅穿山甲炮甘草吳各一錢右剉作一貼酒水相半

得吐為順(正傳)

截瘡飲子

治久瘡不愈一服便差永不發如神常山一錢半檳榔一錢丁香半錢烏梅一個

右剉作一點好酒一盞浸一宿臨發日清晨溫服

○即正傳截瘡方也(正傳)

人蔭竹懸飲

治久瘡不愈人蔭竹懸宜用一切瘡並可截人參白朮白伏苓當歸青皮厚朴柴胡黃芩知母常山酒浸

烏梅下約切忌雞魚豆腐鈣食熱物 (回春)

鬼哭丹

治瘡瘍常山一斤剉醋浸春五夏七冬十日晒乾檳榔各四兩半夏貝母各二兩右為末

鬼哭丹

雜子清和糲入薑末拌勻作丸梧子大每三十丸隔夜臨睡冷酒吞下次日早再一服 (丹心)

勝金丹

治諸瘡久不愈可歲之常山四兩酒蒸乾檳榔一兩為末醋和糊丸菉豆大於隔夜臨

勝金丹

治諸瘡疾一劑截住神效雞心檳榔要一雌一雄若重二錢則餘藥各二錢常山知母貝母各等分右剉作一點酒一鐘煎至八分不可過熟熟則不效露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎薦

不二飲

治諸瘡疾一劑截住神效雞心檳榔要一雌一雄若重二錢則餘藥各二錢常山知母貝母各等分右剉作一點酒一鐘煎至八分不可過熟熟則不效露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎薦

(醫鑒)

○一名止

瘡散

(十三方)

勝金丸

治一切瘡能截去常山四兩酒浸一宿晒乾蒼术泔浸晒檳榔草果各二兩右為末將浸常山餘

酒煮糊和丸梧子大每服五十九前一日臨卧時溫酒送下便卧至當發日雞鳴時服七十丸忌

生冷熱物

(醫鑒)

復歸養榮湯

瘡疾截住後以此調養氣血人參白朮白芍苓當歸陳皮縮砂厚朴山藥

蓮肉白芍炙地黃甘草各八分右剉作一點入東二水煎服 (回春)

禳法

宜用神仙碧霞丹斷瘡如

聖丸治一切瘡 (諸方)

神仙碧霞丹

東方巴豆去皮油別研○南方官桂別末○中央雄黃別研○西方白礐別研○北方青黛

別研○右各三錢五月五日早朝修治各盛盤依方排定勿令猶大婦人見之至其日午時

取五家襟夫和勻丸如棗子大令患者綿裹一丸當發日

早朝塞於男左女右鼻中仍清靜將息勿離飲食 (類聚)

斷瘡如聖丸

信磁二錢大歸身三個雄黑豆四十九粒右為末滴水和丸如芡實大如米發今日發今夜北

斗下先獻過次早以綿裹一丸於男左女右耳內塞之立愈如神一丸可救二人 (河間)

禁忌法

凡瘡大忌飽食遇發日食飽病愈加重 (正傳) ○凡瘡發時切不可帶熱飲食恐不消而成瘡塊也

回春) ○凡瘡方來與正發不可服藥服藥在於未發兩時之先否則薦病交爭轉為深害 ○服藥

富於未發以前兩時之先或遇發日凌晨空心與服 (直指) ○仍節飲食避風

寒遠酒色慎起居無不愈 (丹心) ○患瘡人切忌食豬肉牛肉必再發 (本草)

難治不治證

大凡陽瘡易治陰瘡難治 (入門) ○久瘡而復作虛浮不食者未之有瘳 (得效) ○瘡

病久腰脊強急換瘦者不可治 (醫鑒) ○寒熱脫形而脉堅搏是為逆死不治 (靈樞)

單方

凡十九種

有脾寒

牛膝 治老瘧久不愈取肥大牛膝一握
對酒水相半煎服三劑差(本草)

茵陳 治瘧瘧煎湯服之又煮羹
作羹並可食之(本草)

葛根 治瘧瘧取一兩煎湯服之(本草)

烏梅 治寒瘧煩渴(本草)

酒飲(本草)

麻黃 治溫瘧無汗煎湯
服發汗差(本草)

虎頭骨 治溫瘧取黃為末溫酒下二錢又
取肉煮食之又取皮覆身上(本草)

知母 治瘧瘧煎湯服
主熱瘧(本草)

狸糞 治寒瘧燒灰和酒服又煮肉食之又
頭骨亦主瘧用如虎骨法(本草)

半夏 治痰瘧取一兩煎湯
和薑汁服之(本草)

狐肉 治寒瘧取五藏及腸治如食
法和五味煮食之(本草)

松蘿 治溫瘧煎湯服
為吐瘧(本草)

燕屎 治瘧疾取屎二錢和酒一升盛碗中令病人
於發日朝兩手捧碗當鼻下熏氣妙(本草)

蛇蜕 治瘧當發日取皮塞兩耳
又手持少許良(本草)

夜明砂 治瘧疾取屎也治五瘧搗為末每取
一錢冷茶調下立效(本草)

鼈甲 治溫瘧老瘧取甲灸為末每二錢
溫酒調下連三服無不斷(本草)

小蒜 治瘧取蒜研極爛和黃丹作丸梧子大每
七丸桃柳枝煎湯吞下名脾寒丹(類聚)

蜈蚣 治溫瘧瘧灸為末調
溫酒服半錢(本草)

鍼灸法 治瘧之旦發也陰陽之旦移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處審候見之在經絡

修熏蒸而未成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讐而成之者世謂獄溫湯溫瘧溫廟溫
社溫山溫海溫家溫竈溫歲溫天溫地溫等不可不究(三因)○謂用三棱針刺絡出血也(正傳)○凡瘧必先問其病之所先發
者先刺之○久瘧不愈大歸先針後灸三七壯或云第三骨節○諸瘧而脉不見刺十指間出血血去
必已先視身之赤如小豆者盡取之○凡瘧取間使為妙○瘧脉緩大虛便宜用藥不宜用針(綱目)

瘧疫

瘧疫之因 (內經)曰冬傷於寒春必溫病○冬不藏精者春必病溫(內經)○斯疾之召或溝渠不泄穢惡不
修熏蒸而未成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讐而成之者世謂獄溫湯溫瘧溫廟溫
社溫山溫海溫家溫竈溫歲溫天溫地溫等不可不究(三因)○疫氣之發大則流行天下次則一方
次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發有勝有復遷正退位之所致也(正傳)○凡時行病者春應
暖而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長幼

鼠婦 治寒瘧取三枚研和溫
酒服(本草)

酒飲(本草)

白葵花 治寒瘧取花陰乾搗為
末酒調服一錢(本草)

酒飲(本草)

聚也（類）

瘟疫形證

冬令寒反暖春發溫疫其證發熱腰痛強急脚絰不伸脈中欲折目中生花或濤濤增寒復熱○春令暖反涼夏發燥疫其證身體軟掉不能自禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶○夏令熱反寒秋○發寒疫其證頭重頭直皮肉強痺或瘡而結核起於咽喉頸項之側布熱毒於皮膚分肉之中○秋令涼反陰雨發溼疫其證乍寒乍熱損傷肺氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣（三因）○感四時不正之氣使人痰涎壅盛煩熱頭疼身痛增寒壯熱頭強睛疼或飲食如常

起居依舊甚至聲啞或赤眼口瘡大小腮腫喉痺咳嗽稠粘噴嚏（醫鑒）

脉法

尺膚熱甚脉盛躁者病溫也（靈樞）○時疫之脉無定據隨時審思乃得未可輕議（得效）○陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沉之散泄惟有溫病脉散諸經各隨所在不可指名（脉訣）○陽脉濡弱陰脉弦緊更遇溫氣變為瘟疫○溫病二三日體熱腹滿頭痛飲食如故脉直而疾八日死○溫病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二日死○溫病八九日頭身不痛目不赤色不變而反利肺來泄按之不足舉時大心下堅十七日死○溫病汗不出出不至足者死○厥逆汗自出脉堅強急者生虛軟者死（麻法）○溫病癟瘍大熱脈細小者死○溫病下利腹中痛甚者死（醫鑒）○熱病得汗脉安靜者生躁急者死及大熱不去者亦死○熱病七八日當汗反不得汗脉絕者死（醫鑒）○熱病脈靜汗已出脉盈一逆也死不治（靈樞）

瘟疫治法

溫熱病者夏至前發為溫病夏至後發為熱病謂之伏氣傷寒所謂冬傷於寒春必病溫是也（丹心）○治法切不可作傷寒正治而大汗大下但當從平中治而用少陽陽明二經藥少陽小柴胡

湯陽明升麻葛根湯（一方並見寒門）加減治之（正傳）○春發溫疫宜葛根解肌湯夏發燥疫宜調中湯秋發寒疫宜蒼朮白虎湯（方見暑門）冬發溼疫宜甘桔湯（方見咽喉）表證用荆防敗毒散半

表裏證用小柴胡湯裏證用大柴胡湯（方見寒門）宜補宜散宜降用人中黃丸（入門）○溫病初證

未端的先以敗毒散治之看歸在何經隨經施治（正傳）○九味羌活湯治瘟疫初感一二日間服之取效如神（方見寒門）○又有大頭瘟蝦蟆瘡鷄驚瘧別有條在下○瘟疫宜用聖散子十神

湯柴胡升麻湯解飢渴散芎芷香蘇散（方見寒門）十味芎蘇散雙解散（方見寒門）

清熱解毒散加味敗毒散神授太乙散五瘟丹茵陳丸人中黃丸如意丹黑奴丸（諸方）

葛根解肌湯

治春疫發熱而渴葛根三錢麻黃芩芍藥一錢甘草一錢甘草八分右剉作一貼入薑三乘二水煎服

（入門）

調中湯

治夏發燥疫口乾咽塞大黃一錢半黃芩芍藥葛根桔梗赤茯苓茶本白朮甘草各一錢右剉作一貼水煎服（活人）

荆防敗毒散

治瘟疫及大頭瘟羌活獨活柴胡前胡赤芍芩人參枳壳桔梗

聖散子

治疫癘流行不問陰陽表裏連服取差又治風溫溼溫等證草豆蔻榧榔猪苓石菖蒲赤伏苓良薑獨活赤芍芍附子麻黃厚朴棗本枳壳柴胡澤瀉細辛防風白术藿香半夏吳茱萸蒼术甘草各

朝煮一盞老幼各飲一盞則時氣不入(活人)○平

十神湯

治時令不正瘟疫妄行葛根二錢赤芍芍升麻白芷川芎陳皮麻黃紫蘇葉香附子甘草各一錢右剝作一貼入盞五葱白二煎服(正傳)○此方乃升麻葛根湯合芷川芎香蘇散加麻黃發汗之

剝也

(入門)

柴胡升麻湯

治時行瘟疫頭痛壯熱柴胡前胡葛根赤芍芍荆芥石膏各一錢桑白皮黃芩各七分升麻五分右剝作一貼入盞三豆豉十粒水煎服(入門)

香蘇散

治四時瘟疫香附子三錢紫蘇葉二錢半陳皮一錢半蒼朮甘草各一錢右剝作一貼入盞三葱白二水煎服(得效)○昔有白髮老人授此方與一富人家令其合施城中大疫病者服此皆愈

清熱解肌湯

治天行瘟疫頭痛壯熱葛根三錢黃芩赤芍芍各一錢半甘草一錢右剝作一貼水煎服(丹心)一名解肌湯(得效)

瘦鬼問富人富人以實告鬼曰此

老教三人矣稽颡而退(局方)

十味芎蘇散

治溫熱瘟疫病川芎一錢半半夏一錢一分赤伏苓紫蘇葉柴胡乾葛各一錢陳皮枳壳甘草各七分桔梗五分右剝作一貼入盞三片棗二枚水煎服(丹心)

清熱解毒散

治暑之月民病天行瘟疫熱病宜清熱解毒氣羌活二錢白芍芍人參石膏各一錢二分半黃芩知母並酒炒升麻乾葛各一錢甘草七分黃連酒炒生地黃酒洗各五分右剝作一貼

薑三水煎

服(節齋)

加味敗毒散

治瘟疫及發斑羌活獨活前胡柴胡川芎枳壳桔梗赤伏苓人參防風荆芥蒼朮白术赤芍芍當歸生地黃各六分薄荷甘草各三分右剝作一貼入盞三棗二水煎服(正傳)

神授太乙散

治瘟疫流行不問陰陽兩感頭痛寒熱赤芍芍羌活蒼朮細辛青皮川芎白芷桔梗枳壳柴胡陳皮香附子蒼朮防風棗本甘草各七分乾葛升麻紫蘇葉各三分右剝作一貼入盞七

東醫寶鑑

卷之三

煎服(類聚)

五益丹

治流行瘟疫及傷寒熱病熱瘡○黃連屬火戊癸年為君○黃柏屬水丙辛年為君○淡芩屬金庚辰年為君○白芍屬土丁壬午為君○紫蘇葉各一兩為君者倍入

右皆生用冬至日製為末用錦紋大黃三兩濃煎湯去渣敷成膏和丸彈子大朱砂雄黃末為衣再貼金箔每一丸井華水磨服(回春)

茵陳丸治時行瘟疫及瘡癰黃疸溫熱病即黃疸

紅丹代之或以朱砂

痘丸治四時痘癰大黃黃連黃芩人參桔梗蒼术防風滑石香附子人中黃各等分右為末神鈞榔當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆霜二錢半右擇吉日於不間雞大處淨室修合為末煉蜜和丸梧子大朱砂為衣每五丸或七丸溫水下(入門)○此方乃溫白丸加橘榔當歸也

黃為衣亦好(入門)

如意丹車治瘟疫及一切鬼祟伏尸勞瘵癲狂失志山嵐瘴氣陰陽二毒五瘡五疳八痢誤吞銅鐵金石

藥毒不伏水上等證川烏炮八錢橘榔人參柴胡吳茱萸川椒白茯苓白蘿蔔黃連紫苑厚朴肉桂

當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆霜二錢半右擇吉日於不間雞大處淨室修合為末煉蜜和丸梧子大朱砂為衣每五丸或七丸溫水下(入門)○此方乃溫白丸加橘榔當歸也

黑奴丸治瘧疾熱病脉洪數大熱狂走渴甚藥為

死人幹開口灌藥下咽即活(方見寒門)

大頭瘟證(大頭病者感天地四時非節瘟疫之氣所著以成此疾至於潰裂膿出而又染他人所以謂之疫

癟大抵足陽明邪熱太甚資實少陽相火為熾溼熱為腫木盛為痛多在少陽或在陽明陽明為

邪首大腫少陽為邪出於耳前後海藏)○大頭病者頭痛腫大如斗是也大率多是天行時疫病也

(綱目)○天行一種名曰大頭病俗呼為裡頭瘟從耳前後腫起名曰蝦蟆瘟從頭頸腫起名曰鵝鴨

瘟甚為凶惡治此者十死八九宜推運氣治之(正傳)大頭腫又名雷頭風其證頭面腫痛充塞甚則

咽喉堵塞害人最速冬溫後多有此病(入門)○大頭瘟亦謂之時毒初發狀如傷寒五七日之間乃

能殺人其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根今

人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不留咽喉閉塞(精義)

大頭瘟治法敗毒散裏證多者防風通聖散(方見寒門)加惡實元參俱用酒炒微微下之(入門)○服鈎

鉤仰卧使藥氣上行(入門)○東垣善濟消毒飲子最妙人中黃丸亦妙(入門)○治法當先緩而後急先緩者邪見於無形之處至高之分當用緩緩徐徐服之寒藥則酒浸酒炒皆是也後急者邪氣入

於中有形質之所此為客邪當急去之(海藏)○大頭病此熱氣在高頭之上切勿用降藥宜羌活酒

芩酒大黃(丹心)○大頭瘟俗謂之時毒常於鼻內搐通氣散取十粒噙作效若搐藥不噙者不可治

也如噙出膿血者治之必愈每日用噙為三五次以泄毒氣此是良法左右看病之人日日用噙藥噙

之必不傳染(精義)○經三四日不解者宜荆防敗毒散至七八日大小便通利頭面腫起高赤者宜

托裏消毒散(方見寒門)兼針砭出血泄其毒氣十日外不治自愈若五日前精神昏亂咽喉閉塞

語聲不出頭面大腫食不知味者必死(精義)○大頭瘟宜用既濟解毒湯人連消毒飲牛蒡芩連湯

漏蘆散二黃湯消毒丸僵黃丸二聖救苦丸
加味僵黃丸清涼救苦散通氣散(諸方)

普濟消毒飲子

(治天行大黃瘟黃芩黃連並酒炒各五錢人參三錢陳皮桔梗元參柴胡甘草各二錢鼠黏子馬勃板藍根(無則用青黛)連翹各一錢升麻白僵蚕各五分右為末取一半白湯調和時時呷之留一半僵丸彈子大每一丸細嚼熟水送下或加防風薄荷川芎當歸剉取一兩水煎分二三次服之腫甚宜砭刺出血(東垣)○泰和二年四月民多疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫甚目不能開上喘嗰唯不利舌乾口燥俗云大頭火行染之多死東垣曰身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭面而為腫甚遂製一方名曰普濟消毒飲子服之皆愈人謂之仙方謂天仙所製也遂

刻諸石以傳永久(東垣)

既濟解毒湯

(治天行大頭瘟頭面赤腫而痛大黃酒煨黃芩黃連並酒炒桔梗甘草各一錢升麻柴胡連翹當歸身各五分右剉作一貼水煎服(丹心)

芩連消毒飲

(治天行大頭瘟咽喉腫痛黃連黃芩柴胡桔梗川芎荆芥防風羌活枳壳連翹射干白芷甘草各七分右剉作一貼入薑三片水煎又入牛蒡子一撮再煎入竹懸薑汁調服(人問)

牛蒡芩連湯

(治大頭瘟兼治喉瘡黃芩酒洗二錢黃連薑汁炒桔梗大黃酒蒸石膏各一錢連翹惡實元參甘草各一錢荆芥防風羌活各五分右剉作一貼入薑三水煎徐徐服之(回春)

漏蘆散

(治時毒疮瘡頭面洪腫咽喉堵塞水絶不下藍葉元參各二兩水浸大黃散大黃升麻大黃黃芩各一兩右為粗末每三錢水煎徐徐服(綱目)

二黃湯

(治大頭瘟初起黃芩黃連並酒炒甘草生各一錢水煎小小呷服再用酒浸大黃散大黃散大黃升麻大黃黃芩各一兩水煎入芒硝等分亦時時細呷之(正傳)

消毒丸

(治時毒疮瘡惡證大黃牡蠣殼白僵蚕炒各一兩右為末蜜丸彈子大每一丸新井水化下(綱目)

僵黃丸

(治大頭病及喉瘡歌曰人間治疫有仙方一兩僵蚕二大黃薑汁和丸彈子大井華調蜜便清涼(易老)○乃白僵每一兩大黃二兩為末薑汁和丸彈子大井水研服一丸也(易老)

二聖救苦丸

(大黃四兩酒蒸猪牙皂角二兩右為末芻柏和丸蜜豆大每五七十九以蜜豆湯送下汗出為效○萬歷丙戌余寓大渠屬瘟疫大作士民多斃甚至滅門其證增寒壯熱頭面頸項赤腫咽喉腫痛昏憒名曰大頭瘟余發一秘方名二聖救苦丸用牙皂以開關竅而發其表用大黃以瀉諸火而通其裏一服即汗一汗即愈真仙方也羸壯者百發百中虛弱者先服荆防敗毒散若未愈用

牛蒡芩連湯

亦效(回春)

加味僵黃丸

(治大頭瘟及蝦蟆鷄鷄等瘟大黃酒蒸四兩白僵蚕二兩蟬退六錢半蜜黃三錢半右為末蜜汁糊和勻每一兩作十九大人一丸小兒半丸蜜水調下立愈(回春)○御內府仙方也

清涼救苦丸治大頭瘟面鼻耳目腫癰芙蓉葉白芨白芍車前草大黃黃連黃柏白芷

芷雄黃赤小豆芒硝各等分右為末蜜水調敷於腫處頻頻掃上(回春)

通氣散治天行大頭瘟頭面赤腫或咽喉閉塞用此取嚏七八遍泄出毒氣則差看病之人用此取嚏亦不傳染也玄胡索一錢半皂角川芎各一錢蒺藜五分薑躅花二分牢石為末用紙搘蘸藥線入

鼻中取嚏日三

五次(精義)

禳法(別傳云)禳疫熾發可於州治六令處穿地深至三尺澗亦如之取淨砂三斛實之以醇酒三升沃

其上俾使君祝之斯亦消除疫癘之良術也所謂太歲六合者歲泄氣之所在故以厭禳也(得效)

辟瘟疫預防法(凡疫病初起取正氣散或香蘇散(一方見寒門)煎一大錫每服一椀可以預防必用

○常於雞鳴時淨心存誦四海神名三遍則辟百鬼及瘟疫火災甚效○東海神名阿明南海神名祝融西海神名巨乘北海神名禹(音碓)強(類聚)○蘇合香丸每取九丸浸一瓶清酒中時

時飲之最辟鬼疫之氣又絳囊盛三丸當心嚼之亦妙(類聚)○辟瘟疫宜用居蘇飲老君神明散務成子螢火丸太倉公辟瘟丹李子建殺鬼丸宣聖辟瘟丹

神聖辟瘟丹七物虎頭丸七物赤散(太乙流金散諸方)

屠蘇飲(辟疫氣令人不染瘟病白术一兩八錢大黃桔梗川椒桂心各一兩半虎杖根一兩二錢川烏六錢右剉盛絳囊十二月晦日中沈井中正月朔日早曉出藥入二瓶清酒中煎數沸東向飲之從

少至老飲一盃其滓還沈
井中取水飲之(千金)

老君神明散(辟疫氣川烏炮四兩附子炮白术各二兩桔梗細辛各一兩右為粗末絳囊盛帶之一里人皆無病若有疫氣溫酒服一錢覆取汗得吐即差若經三四日取三錢七水一椀煮服之

三服差(活人)

務成子螢火丸(辟

疫氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠍諸毒五兵白刃盜賊凶害雄黃雌黃各二兩螢火鬼箭羽葵芥子白芷燒各一兩羚羊角假電灰鐵鏈柄取入鐵處各二錢半右為末以雞子黃

並雄雞冠血一具和之如杏仁大綠三角絳囊盛五丸帶左臂上又可挂於戶上○昔冠軍將軍劉子南受得此方後於北界與虜戰敗被圍矢下如雨未至子南馬數尺矢皆墜地虜以為神人解圍而去

故一名冠軍

丸(千金)

太倉公辟瘟丹

(辟却瘟疫並散邪氣蒼术八兩烏藥黃連白术羌活各四兩川烏草烏細辛紫草防風獨活藁本白芷香附子當歸荆芥天麻桂皮甘松三棱子白芍藥甘鹽麻黃皂角甘草各二兩麝香三錢半右為末蒸熟取肉和

丸彈子大每取一丸燒之(回春)

李子建殺鬼丸

辟瘟殺鬼除一切鬼魅魍魎三兩虎頭一兩半雄黃鬼血天雄皂莢
蕪荑各五錢右為末蜜丸皂子大熱病時氣燒一丸安床頭(類聚)

宣聖辟瘟丹

臘月二十四日平朝取升華水盛淨器中量人口多少浸乳香至歲朝五更湯令溫從少至大每人以乳香一小塊飲水一二呷咽下則二年不患時疫(醫鑑)

神聖辟瘟丹

歌曰神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚一炷四季保平安○蒼术二兩羌活獨活白芷香附子大黃甘松三樣子赤箭雄黃各一兩右為末麪糊和丸彈子大黃丹為衣晒乾正朝早晨

焚一炷

七物虎頭丸

辟瘟殺鬼除一切疫氣虎頭骨朱砂雄黃各一兩半鬼臼皂莢蕪荑雌黃各一兩右為末熔蠍和丸彈子大以紅綢袋盛一丸繫男左女右臂上又懸屋四角如值近境疫作晦望夜半

各家當戶燒一丸晨起各人吞下

小豆大一丸則不致傳染(寶鑑)

七物赤散

辟瘟疫毒氣丹砂別研川烏炮各一兩瓜簷根七錢半細辛羊蹄蹠乾薑炮白
术炒各五錢右為末每服半錢溫酒調服汗出解若未解增至一錢服(寶鑑)

太乙流金散

大辟瘟疫雄黃一兩半羚羊角一兩雌黃碧石鬼箭羽各七錢半右為粗
末三角絳囊盛一兩帶心前並挂戶上又青布覆少許中庭燒之(類聚)

不傳染法

凡瘟家自生惡氣聞之即上泥丸散入百脉轉相傳染若倉卒無藥以香油抹鼻端及以紙撫採及臨卧時點之(得效)○凡入瘟疫家先令開啓門戶以大鍋盛水二斗置堂中心取蘇合香丸二十丸煎之其香能散疫氣凡病者各飲一甌後醫者却入診視不致相染(得效)○凡入疫家以紙撫採

香油並雄黃朱砂末擦入耳鼻內最能辟穢毒之氣遍滿鄉村善用如意丹亦妙(入門)○凡入疫家行動從容而入男子病穢氣出於口女人病穢氣出於陰戶其相對坐立之間必須識其向背既出以紙撫採鼻中噴嚏為佳(回春)○雄黃丸最妙(易老)○傷寒熱病傳染者因聞大汗穢毒以致傳染故聖惠方曰大汗出則懸杓於戶解其穢囊無使傷於人也親屬侍奉之人勞役氣虛而為變亂何以知其傳染者脉不浮是也治法自汗者蒼朮白

虎湯無汗者益元散合涼膈散熱散而退(類聚)

雄黃丸

治瘟疫令不相染雄黃一兩赤小豆炒丹參鬼箭羽各二兩右為末蜜丸梧子大每日空心溫水吞下五丸可與病人同衣床亦不相傳染(易老)

瘴疫

嶺南春秋時月人惑山嵐瘴霧毒氣為病瘡寒熱此毒氣從口鼻內入也宜升麻蒼朮湯(方見溼門○節齋)○南方疫癘挾嵐瘴濕氣蒸毒之氣其狀熱乘上焦病發來時令人迷困甚則發躁狂妄亦有啞而不能言者皆由敗血瘀於心毒延聚於脾所致宜

加味紫胡湯(醫鑑)○瘡痘宜三仙湯太無神木散(諸方)

加味柴胡湯

柴胡二錢黃芩半夏人參枳壳大黃甘草各一
錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服(醫鑒)

三仙湯

治山嵐瘴氣時行瘟疫蒼朮四錢乾地黃二錢牛膝一錢右剉作一貼水煎服或為末醋糊和丸桔子大空心酒下三十九(經驗)

太無神木散

治四時瘟疫專主山嵐瘴氣之妙劑也蒼朮三錢陳皮厚朴各二錢石菖蒲藿香甘草各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服(正傳)○一方無菖蒲有香附子一錢名曰神木散氣

散(正)

瘟疫熱病不治證

熱病不可刺者有九○一曰汗不出大額發赤噦者死○二曰泄而腹滿甚者死○三曰目不明病不已者死○四曰老人嬰兒熱而腹滿者死○五曰汗不出嘔下血者死○六

曰舌本爛熱不已者死○七曰欬而衄汗不出出不至足者死○八

曰髓熱者死○九曰熱而瘡者死瘡者腰折與癰齒噤斂也(靈樞)

單方

九種(凡二十)

朱砂

辟瘟疫取一兩細研以白蜜和丸如麻子大正朝早晨一
家大小勿食諸物面向東立水吞三七丸永無疫(本草)

蚯蚓汁

主天行熱疾取生地龍塗鹽化成水取飲之(本草)

臘雪水

治天行瘟疫熱盛取飲之(本草)

苦參

治天行壯熱取一兩剉醋煮飲之當吐即愈(本草)

藍葉汁

主天行熱狂取葉搗取汁飲一盞(本草)

生葛根汁

主天行瘟疫熱疾取根搗取汁飲之(本草)

水中細苔

主天行熱渴取根搗取汁飲之(本草)

青黛

治大頭瘟毒面赤腫真龍花三錢燒酒一鍾雞子清一個打勻吃下腫即消真神方也(回春)

蛇莓

治天行熱盛口中生瘡蛇莓自然汁搗絞取一斗煎取五升稍飲之(本草)

竹懸

治時氣瘟疫熱盛躁竹懸半盞新水半盞和服之(本草)

生藕汁

治熱病煩渴取汁一盞入蜜一合服之(本草)

臘月鼠

燒之辟惡氣又於正旦所居處理之辟瘟疫氣(本草)

蟾蜍

食之不患熱病生搗絞汁服或燒為末和水服並主瘟疫發斑(本草)

桃葉

主天行病汗不出桃葉多取濃煎湯置床下坐其上衣被蓋之須臾當汗便差又取桃枝剉煮湯洗浴

(本草)

赤小豆 辟溫疫病取亦小豆新布囊盛之正旦置井中三日出之舉家服男十枚女二十枚無不效 (本草)

温蕪菁汁 辟瘟氣立春後初庚子日取温蕪菁汁正月之節食五辛以辟屬氣一曰蒜二合家大小人並服之可理時疾 (本草) 蒜曰慈三曰韭四曰薤五曰薑也

人屎 主天行病大熱狂走取乾者沸湯漬飲之或燒灰作末和水服又納淨土坑中新水調和登清取飲之 (本草) ○即野人乾也取乾者淨沙覆之取清飲之治熱病最佳

人中黃 大治疫毒取大竹筒兩頭留節一節中作一竅納大甘草於中仍以竹木釘塞其竅置大糞廁中浸一月取出晒乾用○曆月取淡竹去青皮於廁中浸滲取汁飲之大治天行熱疾發狂即糞清

也丹

牡猪糞 極療天行熱病溫毒大熱取乾者水漬取清飲之 (本草)

赤馬蹄 辟瘟疫作屑二兩絳囊

盛帛男左女右 (本草)

獺肉 主瘦氣癰病煮肉取

汁停冷飲之 (本草)

白粳米 半升連鬚蕊二十根煮成粥湯加入好醋半椀再煮一滾服取汗即愈 (種杏)

天行病後食熟菜

雄狐尿

燒之去瘟疫病取肉煮食亦可 (本草)

芥菜子

治疫氣傳染初覺頭痛取子為末填臍中以熱物隔夜一層臍之即汗而愈 (種杏)

芥菜

治疫氣傳染初覺頭痛取子為末填臍中

芥菜

頃表明 (本草)

針法 治熱病五十九刺者○頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也頭中行謂上星顙會前項百會後項五穴也兩旁謂承光通天絡却玉枕天柱十六也又兩旁謂臨泣目窗正營承靈腦空十六也○太杼膺俞(即中府穴)缺盆背俞(即風門穴)此八者以瀉胃中之熱也○氣街三里巨虛上下廉此八者以

俞(即中府穴)缺盆背俞(即風門穴)此八者以瀉胃中之熱也○雲門鶯骨(即肩鶯穴)委中髓空(即腰俞穴)此八者以瀉四支之熱也○五歲俞旁五此十者以瀉五

旁五此十者以瀉五

藏之熱也 (內經)

邪祟

邪祟形證 視聽言動俱妄者謂之邪祟甚則能言平生未見聞事及五色神鬼此乃氣血虛極神光不足或病或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠啖食糞穢或裸體露形或晝夜遊走或嗔罵無度 (千金) ○人為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉枉言驚怖向壁悲啼夢寤喜懼或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食 (病源) ○人之精神不全心志多恐遂為鬼物所擊或附着沈沈默默妄言

高沙陷如履平地或悲泣呻吟不欲見人如醉如狂其狀萬端(續目)○人見五色非常之鬼皆自己精神不守神光不完故耳實非外邪所侮乃元氣極虛之候也(正傳)○夢寐不祥多生恐怖為祟惑

行效

十症五戶人死三年之外，鬼神因作風淫著人。成病曰風症，寒症，氣症，生症，涼症，酒症，食症，水症，尸症，蓋症者住也。言其連滯停住，又注易旁人也。(千金)○又曰：十症者，氣症，勞症，鬼症，冷症，生人症，死人症。

五尸 人死三年之外魂神因作風壓著人成病曰風疰寒疰氣疰生疰涼疰酒疰食疰水疰尸疰蓋疰疰尸疰食疰水疰土疰也(千金)○又曰十疰者氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人故號爲尸疰也(千金)○傳疰者挾邪精鬼怪之氣而作也經曰人有逢年月之厄感鬼物之精無處不惡沈默而不能的知所苦積歲漸至委頓既往復傳疰旁人須用通神明去惡氣等劑療之或者創

磨剝岸驅伐邪惡飛丹燒石引
內清如盞為戶庭設也（直指）

脉來遲伏或如雀啄乃邪脉也

脉來遲伏或如雀啄乃邪脉也若脉來弱綿綿遲伏或綿綿不知度數而顏色不變此邪病也脈來乍大乍小乍長乍短為禍脉也兩手脉浮浮細微綿綿不可知但有陰脉亦細綿綿此為陰蹠陽蹠之脉

此亡人在福也。脉沉大弱者，病革也。脉来沉涩，涩而重者，土耗也。脉来如豆，细而弱者，阳衰也。脉行阳者，血也。脉行阴者，气也。脉搏四脉俱微，或一脉微者，虚也。脉搏四脉俱盛，或一脉盛者，实也。脉搏四脉俱长，或一脉长者，生也。脉搏四脉俱短，或一脉短者，死也。脉搏沉者，肾虚也。脉搏沈者，肾寒也。脉搏沉长者，肾虚而湿也。脉搏沉短者，肾虚而热也。脉搏沉大者，肾虚而湿也。脉搏沉小者，肾虚而热也。脉搏沉定者，肾虚而湿也。脉搏沉定者，肾虚而热也。脉搏错者，肾虚而湿也。脉搏错者，肾虚而热也。

雜不倫(得效)○乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂(丹心)○乍疏乍數乍大乍小或促或結

皆邪脉也（脉經）○症脉浮大可治細數難治（永類）○有人得病之初便譖言或發狂六部無脉然亦大指之下寸口之上即有物脉者比之謂鬼脉乃邪祟為之也不須服藥但宜將就治之（回春）○

若脉沈沈澤澤四肢不仁者亡祟也或大而搦搦者社祟也脉來乍大乍小乍短乍長者鬼祟也一精

義

邪祟尸疰治藥 邪祟宜用桃奴丸辟邪丹殺鬼五邪丸紫金錠蘇合香丸還魂湯
(方見救急) ○尸疰宜用十疰丸八毒赤散太乙神精丹(諸方)

治邪祟尸疰忤麁夢不

桃仁十四個，炒去皮，右為末，入安息香膏和火燄實大

陰乾蜜器封固淨室安置人參湯研下一丸(正傳)

治癆惡邪祟怪疾及山谷間九尾狐精淫惑人參亦供神迷志身骨枯石髓白木齧不害蟲名
耶丹一兩桃奴五錢雄黃朱砂各三錢牛黃麝香各一錢右為末酒糊和丸龍眼大金箔為衣每一丸
臥以木香湯化下諸邪不敢近體更以
絳囊盛五七丸懸床帳中尤妙（入門）

殺鬼五邪丸

治邪祟鬼魅鬼箭利二兩半丹砂另研雄黃另研龍骨鬼白吳赤小豆各一兩半桃仁五十個另研羌青三十個炒去翅足右為末蠟溶化和丸彈子大絳囊盛一丸繫臂上又另用煉

蜜和丸梧子大水飲吞

下一丸至三丸(類聚)

紫金錠

治感鬼邪成鬼胎溫酒化下半錠至一錠方(見解毒)○一女子為邪魅所交腹中作痞服此藥隨下惡物其邪仍至又邪半錠更燒三錠為氣滿屋邪不復至(入門)

蘇合香丸

治疰忤鬼氣一切邪祟及鬼魅狐狸等病(方見氣門)○蜡紙裹一丸如彈子大當心帶

十症丸

治十種尸疰鬼氣雄黃巴豆霜各一兩參麥門冬細辛桔梗附子炮皂莢川椒甘草各五錢右為末蜜丸梧子大溫水下五丸(千金)

八毒赤散

治人染著神鬼謂之鬼疰病雄黃礬石朱砂牡丹皮附子炮藜蘆巴豆霜各一兩蛇災一條右為末蜜丸小豆大冷水吞下十丸○即李子漿八毒赤丸方也(綱目)

太乙神精丹

治客忤霍亂尸疰惡氣癲狂鬼語蟲毒妖魅溫瘧一切惡毒無所不治丹砂曾青雌黃雄黃磁石各四兩金牙二兩半右六味內丹砂雌黃雄黃以釀醋浸曾青以好酒浸以布密封日

中暴百日然後各研如細粉以釀醋拌使乾溼得所納土釜中六一泥固濟安鐵腳環子上高一尺五寸一以漸放大其火勿令近火底至一狀時止候冷出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色者次

一色者下但光明皎潔如雪最佳若飛不盡更著火如前以雞羽掃取聚膏和丸如黍粒平旦空腹服

一丸漸加一丸以知為度○舊不用磁石金丹今加之○服此者五服內必吐利過則自定○初服如

黍粒漸加一丸至如小豆大而止不得更大○若服藥悶亂煮木防己湯飲之即定○若欲解殺藥吃

蠣煮肥豬肉○久瘡變腫垂死者服一丸即吐差瘥母亦差○癥瘕積聚服一丸以漿飲送下○諸卒

死心下微煩者韓開口以漿飲調一刀圭服之○以絳囊盛丸刀圭散繫男左女右臂上辟瘡瘻時氣

最妙(千金)○作土釜法取兩個瓦盆可受二斗許者以甘土塗其內令極乾○作六一泥法赤石脂

牡蠣滑石黃芩幽土(無則以土代之)蚯蚓屎各二兩右以釀醋和甘土為泥裹石脂等四種火煅一

伏時取出與鹵土蚯蚓同為末醋糊如稠粥用(千金)○凡合此約以四時旺相日天晴明齋戒沐

浴合之(千金)○予修合太乙神精丹一料家中一婦夢中鬼魘覺後心痛不可忍

昏悶不省取三丸服之即痛止神醒已無病矣後施於人無不應驗如神(本事)

驗尺症法

若是症則髮粘著紙此症氣引之也非症則

髮不著紙也(永類)

禳法

凡邪祟鬼疰宜用糞以禳之回春辟邪丹李子建殺鬼丸皆可○蘇合香丸浸酒服之又或蠟紙畜心

胸帶之邪鬼不敢近(方見氣門)○一女人感邪交通取雄黃末一兩松脂二兩熔化以虎爪攬為丸

彈子大焚之用培籠令女坐於其上以被蓋

之只留頭耳不過三丸真邪自斷(壽域)

回春辟邪丹
虎頭酒二兩朱砂雄黃朱砂白蘆粉雞頭粉
燒各一兩白芷川芎當歸大黃蘇
一切邪鬼不最近又療婦人與鬼交通者兼辟瘟疫

(春)

李子建殺鬼丸
辟一切鬼魅罔兩及邪祟尸疰鬼疰

每取一丸安床頭燒之(方見瘟疫)

導引法
(定神叩齒三七遍轉呞氣二七遍如此三百通乃止)

二十日邪氣悉去百日伏尸皆去面體光澤(永類)

單方
(凡三十種)

朱砂
殺精魅邪惡鬼氣作末和溫水服

雄黃
殺精物惡鬼邪氣治尸疰辟百邪以一塊繫頭

一錢又常帶之辟邪氣(本草)

上妙又佩之鬼邪不敢近作末和溫水服一錢

尤佳(本草)

半天河水
殺鬼精顏狂取與飲

代赭
殺精物辟鬼魅常取帶之

敗天公
主鬼疰精魅燒灰為末酒服之(本草)

古鑑
辟一切邪魅女人鬼交燒赤淬酒中飲之(本草)

青蒿子

治鬼氣戶疰取搗為末酒服之(本草)

艾實子
主百惡鬼邪氣取實和乾薑作末蜜丸梧子大飲下三十九其邪氣即去(本草)

鐵槌柄

主鬼打及強鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭為末作丸服之(本草)

忍冬草
汁日二三服(本草)

衛矛

主百邪鬼魅惡症取燒之又煎湯服之(本草)

無患子
辟鬼邪惡氣取燒之又取中仁食之(本草)

蠶退紙

主發狂悲泣呻吟此為邪祟取紙燒為末酒服二錢(本草)

穿山甲
每一錢酒水任下(本草)

桃梟

殺百鬼精物百毒不祥取為末和溫酒服之(本草)

烏鵲骨
治鬼魅燒為灰和酒服之(本草)

桃仁

主十症五尸鬼邪病取五十枚去尖皮水煮取汁頓服

(主邪魅及野狐取肉炙食之又

燒為末酒服尤妙(本草)

鷹肉
主邪魅及野狐燒為末酒服尤妙(本草)

鶴骨
主五尸疰毒取脚骨及背燒為末和溫酒服之(本草)

鵲巢

主顛狂鬼魅取多年者燒為末和溫酒服之仍呼祟物名號（本草）

羖羊角

辟惡鬼邪魅及辟虎狼取燒之又燒作末和酒服下鬼胎（本草）

牛屎

辟邪惡氣取塗門戶又常燒之（本草）

虎肉

辟三十六種精魅煮食之良○虎眼睛虎頭骨虎爪並辟鬼邪常帶之或置左右（本草）

狐肉

主狐魅凡人染著狐狸精走巡山野或以手有禮見人或於靜處獨語或裸形見人或祇揖無度或緊合口以手坐禮度過常尿屎亂放取肉炙食或取腸肚作羹食之○又取狐狸皮鼻端黑處為末

酒調服最效○又狐頭狐尾

屎燒之并辟邪惡（本草）

獺肝

主五戶鬼疰相染一門患者取肝一具陰乾為末水服一錢日再亦治鬼魅（本草）

針灸法

百邪所病針有十三穴一名鬼宮（即人中穴）○二名鬼信（在手大指爪甲下入肉二分）○三名鬼壘（在足大指爪甲下入肉二分）○四名鬼心（即太淵穴）○五名鬼路（即申脉穴）○六名鬼枕（在大額入髮際一寸）○七名鬼床（在耳前髮際宛宛中垂耳下五分）○八名鬼市（即承漿穴）○九名鬼路（即勞宮穴）○十名鬼室（即上星穴）○十一名鬼藏（在陰下罐女人玉門頭）○十二

名鬼臣（即曲池穴）○十三名鬼封（在舌下鍼針刺貫出舌上）○又鬼邪發狂灸十指端去爪一分

名曰鬼城（扁鵲）○治鬼魅狐惑恍惚振嘯以患人兩手大指相並縛定用大艾炷於兩甲角及甲後

肉四處騎縛著火灸之若一處不著火即無效○七壯病者哀告我自去神效此秦承祖灸鬼法也即

鬼哭穴（入門）○五戶疰乳後三寸男左女右各二七壯又令兩大拇指頭七壯（得效）○一切症先

仰卧灸兩乳邊斜下三寸第二肋間隨年壯（得效）○卒狂言鬼語以帶急合縛兩手大指便令左右

脇下對屈肋頭兩處各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐問之乃解其縛（得效）○卒中邪魅恍惚灸

鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾炷半右爪上半在肉上各七壯不止十四壯（得效）○卒狂

鬼語針足大拇指爪甲下即止（得效）○狐魅兩手大指合縛灸合間三七壯當狐鳴即差（得效）

癰疽

麝香

辟惡氣殺鬼精物除百邪常帶身上妙又取少許和酒服（本草）

鹿角

主男女夢與鬼交取角屑一錢和酒服即出鬼祟（本草）

豹肉

主鬼魅邪神煮食良取鼻煮服主孤魅（本草）

狸肉

主諸尸疰邪氣取肉作羹臍食之又取頭骨燒為末酒服二錢妙家裡亦好（本草）

鹿角

主鬼魅邪神煮食良取

麝香

辟惡氣殺鬼精物除百邪常帶身上妙又取少許和酒服（本草）

野猪黃

主鬼疰邪氣取研和水服之（本草）

野豬黃

主鬼疰邪氣取研和水服之（本草）

浮盛下臨肌膚筋脈枯內連五藏血氣竭筋骨良肉留無餘故命曰疽（靈樞）○六府不和目留為癰又云三陽發病下為癰腫二陽乃足太陽膀胱經即腦疽背癰腎癰之類是也（內經）○癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脈內氣行脈外周流不息寒溼搏之則凝滯而行遲火熱搏之則沸騰而行速氣得邪而鬱滯液稠結為癰為飲積久滲久脈中血為之濁此陰滯陽而為癰血得邪而鬱滯道阻隔或溢或結積久溢出脉外氣為之亂此陽滯於陰而為疽（丹心）○癰者壅也疽者沮也

血氣壅沮寒熱不散陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽所發無定處也○六府癰熱滯出於膚肉之間其發暴盛腫而光軟皮薄以澤侵展廣大者為癰五藏癰熱攻敝乎筋骨之內其發停蓄狀如瘡癰皮厚以堅淡白焦枯者為疽（直指）○癰發於六府若燎原之火外潰肌肉疽發於五藏若陶室之隧

內銷骨髓（入門）○凡鬱抑傷心及久患消渴必發癰疽丁瘡宜慎之（丹心）

癰疽欲發之候（凡發熱憎寒頭痛惡心筋脉拘牽氣急煩悶或病渴多年是皆欲發癰疽之證也（直指）○癰疽名狀（一寸至二寸為癰二寸至五寸為疽五寸至一尺為疽一尺至二尺為癰）○未潰色紫黑堅硬已潰深陷如巖為癌男則多發於腹女則多發於乳也四畔生如牛唇黑硬為癰多見於手指之間或生於口齒肚臍其無頭面色淡紅為瘤大概丁瘡起類也（入門）○徑一寸二寸為癰三寸五寸腫圓赤為癰八寸為疽（得效）○熱發於皮膚之間浮腫根小至大不過一二寸者癰也（東垣）○癰有頭小瘡也疼

浮小癰疼也（河間）

癰疽腫痛瘡之因（癰疽只是熱勝血（丹心）○熱勝則腫註云熱勝則陽氣內鬱故洪腫暴作甚則帶氣逆於肉理聚為癰膿（內經）○癰疽之證皆能為痛瘡先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故其痛多焉膿潰之後腫退皮寬痛必漸減而反痛者此為虛也未潰而痛瀉之已潰而痛者補之其有微氣所觸者宜和解風冷所逼者宜溫散（丹心）○形傷則痛氣傷則腫腫痛並作氣血俱傷癰疽不可不痛亦不可大痛（入門）○皮膚微高起而堅厚或痛或瘡謂之腫有因風寒而得則腫硬色白有因熱毒而得則城腫色赤（東垣）○凡痛瘡瘡癰疽瘡氣結核拂鬱甚者皆屬火熱蓋人近於火微熱則瘡熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也○人之瘡腫皆由寒熱毒氣客於經絡使血澀而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根壅結成則為膿矣瘡有痛癰痛則為實瘡則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也（河間）○疽發深不痛者胃氣太虛必死蓋肉多而不知痛也（丹心）

癰疽輕重淺深之辨

癰者其皮上薄以澤疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮此其候也(靈樞)○微按即

獨在經脈之中而專攻乎外故初發時自表便發熱患處便如盃如盆高腫而痛甚緣下陷氣

內固不散受故或便祕或降渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五藏終不傷也○疽之邪淺其稽留壅遏

壅遏內連五藏而不專攻乎外故身體或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如

墨多死也(綱目)○凡癰疽惡核男以左邊為重女以右邊為重(直指)○癰疽證以有熱無熱為死

生妙訣蓋陽證有熱則氣血行而生肌陰證無熱則氣血滯而不散是以有實熱者易治虛寒者難治

(入門)○初發時身體便熱患處亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為外發雖大如盆盃必

生初發時身體無熱患處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不痛低陷而壞爛破後肉色紫黑此

為內發必死蓋未發之前藏府已先瀆爛矣(得效)○癰疽腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於

筋脉肉色不變者

發於骨髓(東垣)

定癰疽死之部分

身有五部伏兎一(穴名一腓二(腓者膕也)背三五藏之俞四項五此五部有癰疽者死

(靈樞)○腦髮鬟頤四處亦為癰疽必死之地(海藏)○不可患癰者七處眼後虛處死

頤接骨處○陰根上毛間膀胱尻骨接處○耳門前後車骨接處○諸因小腹風水所成癰疽○領骨

下近耳後虛處○鼻骨中並能害人惟眼後虛處最險(治子)○發腦發鬟發眉發頤發背謂之五發

至險凡眼不見瘡皆惡(入門)○發於喉舌頭面腦項肩背胸腹四肢大節女子奶乳數者為險他處

為緩(直指)○俗以癌瘤癰付於癰疽之列豈知瘡與癌瘤不過癰疽之一物乎(直指)○背雖膀胱

督脈所主然五藏皆系於背或醇酒厚味或鬱怒房勞以致水枯火炎痰凝氣滯與毒相搏隨處發生(入門)

癰疽當分內外

癰疽發於內者當審藏府如中府隱隱而痛者肺癰也巨闕屬心期門屬

肝掌門屬脾京門屬督中脘屬胃天樞屬大腸閥元屬小腸冉田屬上焦若有上證皆倣此

辨之(靈樞)○發於腔子之內者曰內疽曰肺癰心癰肝癰腎癰胃脘癰腸癰發於腔子之外者曰腦

發背發鬟發眉發頤發腮頤發腋發穿當發(下部也)腿發喉齶齶跨馬癰囊癰乳癰也(正傳)

傳一

惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以具多氣少血也其血本少肌肉難長癰久

癰疽

脉數脉不時則生惡瘡也（仲景）○癰疽浮數恐寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而疼者陽不

數不熱不疼陰疼發癰之脉弦洪相搏沈細而直肺肝俱數（脉訣）○陰滯於陽則發癰陽滯於陰

則發疽此二毒發無定處當以脉別之浮洪滑為陽微沈緩滿為陰（精義）○脉數身無熱內有膿

（二作癰）也一云腹無積聚身無熱脉數此為陽中有膿（脉經）○脉滑而數數則為熱滑則為實滑

則主榮數則主衛禁衛相干則結為癰熱之所遇則為膿也（脉經）○癰疽之人膿血大泄而脉滑大

散者難治也凡癰疽多或如清泔脉滑大散而寒熱發渴者治之無功也（精義）○患肺癰者咳吐膿

血脉見洪滑治之難痊矣（精義）○癰疽已決去其膿而煩疼尚未全退其脉共粗又難

為力（直指）○癰疽脉來滯澀但得和緩為平若洪粗則銳毒不收鮮有濟也（直指）

癰疽難治不治證

凡癰疽初發腫硬而高者毒氣初淺其證屬陽雖急而易治若初發如粟粒如豆許與肉俱平或作赤色時覺癢痛慎勿爪破此乃為疽其證屬陰毒氣內蓄勢雖緩而難治（仲

景）○始發便熱腫大作痛此為外發雖大如盆百治百活自始發不熱不痛低陷而壞爛此為內發

難治必死（精要）○癰者壅也為陽屬六府易治疽者沮也為陰屬五臟難治（入門）○難治有六證

兩臉紅如胚染心病深○得之久全不腫痛乃藏府受病深○病處硬如牛鎖皮又如石榴狀用薦不

軟者病深○病人無時喜笑乃神氣奪病深○瘡口小內漏常出青白膿汁不痛者內壞病深○貼膏

約後出鮮血黑血間雜色病深（得效）○癰疽

有實熱者易治虛寒有邪熱者難治（醫鑒）

癰疽辨膿有無及淺深

諸癰疽欲知有膿無膿以手按腫上熱者為有膿不熱者為無膿（仲景）○按而後

痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而即復者有膿按之強而不復者無膿（

得效）○按之堅硬未有膿也按之半軟半硬已有膿也宜急破之半軟謂中央膿處半硬謂四方腫

肉（精要）○用手按之熱則有膿不熱則無膿重按乃痛膿之深也輕按即痛膿之淺也按之不甚痛

者未成膿也按之即復者有膿也按之不復者無膿也非也必是水也（入門）○以手掩上大熱者膿

成自軟也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也若患瘰疬核寒熱發渴經久不消

者其人面色萎黃被熱止蒸已成膿也（入門）○血熱肉敗榮衛不行必將為膿（內經）○瘡癰皆為

火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熟極腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也熱勝血則為膿也

（河間）○腫硬膿稠者為實腫軟膿稀者為虛敗膿不（醫鑒）
去加白芷不可用白朮蓋白朮能生膿故也（醫鑒）

癰疽發暈

俗以腫痕所至為暈非真暈也暈生於瘡口之旁狀如紅暈二暈三暈尚可四暈五暈者死（入

暈五暈是藏府蘊受銳門一○真暈生於口之旁如紅筋之狀纔見暈則非美證矣一暈二暈以至三暈尚可措手若四

癰疽死證

癰發於嗌中名曰猛疽不治化為膿瘍不瀉塞咽半日死○發於頸名天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內重肝肺十餘日而死○陽氣大發消腦溜項名曰腦樂痛如針刺煩心者死不可治○發於胸名曰并疽狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死○發於膺

名曰甘疽色青狀如穀實瓜瓠常苦寒熱不急治十日死死後出膿○發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死○發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日死○發於足旁名曰厲疽其狀不大初從小指發急治之去其黑者黑不消斂益不治百日死○發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不衰急斬之否則死○諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於

陽者百日死發於陰者三十日死陽謂諸節之背陰謂諸節之臍部間應者內發透外也(靈樞)

癰疽善惡證

癰疽破潰後善證有五惡證有九○動息自甯飲食知味一善也○神彩

緊小一惡也○不能飲食納药而嘔食不知味二惡也○腹滿渴甚三惡也○肩背不便四肢沉重四惡也○聲嘶色脫唇鼻清黑面目四支浮腫五惡也○煩躁時嗽泄利無度小便如淋六惡也○膿血

大泄噦痛尤甚膿色敗臭氣不可近七惡也○喘粗短氣恍惚嗜卧八惡也○未潰先黑陷下面青唇黑便污者九惡也五善見則吉九惡見六即危(精要)○眼白睛黑眼小是一逆也納药而嘔是二逆

也腹痛渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也聲嘶色脫是五逆也無此五者為順(靈樞)

○更有氣噫痞塞咳嗽身冷自汗無時目瞪耳聾恍惚驚慄言語顛倒皆是惡證(精要)

治癰疽大法

初覺則散腫內消已潰則排膿欬毒膿盡則去腐內塞惡肉盡則生肌付痂此定則也(直指)

歲者速潰也○疽之初發當以流注法為主補填藏府令實勿令下陷之邪蔓延外以火灸引邪透出使有穴歸著而不亂則可轉死回生變凶為吉矣(綱目)○內疏黃連湯千金漏蘆湯主陽癰散腫向外內托復煎散淵然奪命丹治陰疽毒蘊於中(丹心)○瘡癰者火之屬須分内外若脉沈實當先疏

其內以絕其源透脉滯大當先托裏恐邪氣入內有內外之中者邪氣至甚遇絕經絡故發癰腫治法

大要須明托裏疏通行榮衛三法(易老)○癰疽初發氣實者急服五香連翹湯千金漏蘆湯年少壯

實者可服五利大黃湯化毒丹取通利一二行若膿成敗潰宜服五香湯托裏散(精義)○外證宣表散宜黃連消毒散內托羌活湯內證宜疏導宜內疏黃連湯仙方活命飲輕者清熱消毒飲若發毒攻裏兼行宜防風通聖散(方見風門)五香連翹湯(入門)○血得溫則流行氣得溫則和暢服餅貼付藥用和平(直指)○大凡癰疽惟藉有熱則發熱則氣血行冷則氣血滯遇有熱者切不可退熱但用溫药以微涼少濟之(直指)

內疏黃連湯

治癰疽脉洪(一作沈)實發熱煩躁藏府祕澀當先通利宜用此大黃二錢連翹赤芍藥各一錢木香薄荷桔梗甘草各五分右剗作一貼水煎服

千金漏蘆湯 治癰疽發背熱毒惡腫大黃二錢漏蘆連翹麻黃升麻赤芍葛根芩芍

白飲白芨甘草各八分右剉作一貼水煎服以通利為度(回春)

內托復煎湯 治陰疽結於內恐侵藏府須內托以救其裏使榮衛俱行邪氣不令內侵

浸蒼术八兩防風一兩地骨皮黃芩赤芍藥人參白朮黃芪桂皮當歸防己甘草各五錢右剉先將蒼

术水五升煎至三升去水入諸藥再煎至三四盞作三四次終日飲之又煎蒼术澤如前再煎諸藥津服之(正傳)

淵然真人奪命丹 專治一切發背陰疽疔瘡惡瘡無名腫毒服之便起發有頭不痛者服之便痛已成者

血竭膽礬寒水石各一錢輕粉麝香龍腦各半錢蠍牛二十個連壳用蜈蚣一條酒炙右為末蠍牛研作泥和丸蜜豆大若丸不就以酒煮麪糊和為丸朱砂末二錢為衣每服只二丸先以葱白三寸病

人嚼爛吐在手心男左女右將丸藥在葱內以熱酒三四盞送下衣服蓋覆約人行五里久再

以熱酒數盞助火力發熱汗大出為度如無汗再服二丸(耳心一〇一名飛龍奪命丹(醫鑒)

五香連翹湯 治癰疽瘡癰癰結核一切毒腫大黃一錢連翹射干獨活升麻桑寄生沈香

五利大黃湯 治年少壯患癰疽氣血或多一便祕泄大黃煨二錢黃芩升麻

梔子芒硝各一錢二分右剉作一貼水煎服以利為度(精義)

化毒丹 治百種惡瘡毒腫初覺宜服草烏醋浸泡浮石燒赤醋杵七次別研各一兩乳香沒藥各五錢別

研巴豆去皮四十九個別研右末醋糊和丸如豌豆大冷酒下五丸或七丸以利為度(精義)

托裏散 治癰疽潰後久未收斂以此補托人參黃芪各二錢白芨陳皮當歸

熟地黃白芍葛根各一錢半甘草一錢右剉作一貼水煎服

黃連消毒散 治癰疽發背腫毒微發麻木不痛宜先灸之服此药黃連羌活各一錢二分黃芩黃柏

景本防己桔梗各七分生地黃知母獨活防風連翹當歸尾各六分人參甘草各五分蘇木陳皮澤泻黃芪各四分右剉作一貼水煎服(入門)〇元好門嗜酒腦下項上出小瘡不痛瘡四日後

腦項麻木腫勢外散熱毒微發夜不得寐邀東垣治之先灸艾百壯始覺痛次製此藥服之而愈一名

黃連消毒散 治足太陽經分尻脣發癰疽堅硬腫痛羌活黃柏酒製各二錢黃芪一錢半防風景本當歸

陳皮澤泻黃芪各一錢半乳香貝母天花粉白芷赤芍葛根各五分肉桂三分右剉作一貼水二盞酒一盞同煎服(東垣)

仙方活命飲 治一切癰疽毒腫未成者內消已成者即潰排膿止痛消毒之聖藥也大黃五錢金銀花三

錢當歸尾皂角刺陳皮各一錢半乳香貝母天花粉白芷赤芍葛根各五分防風七分

飲(東垣)

內托羌活湯 治足太陽經分尻脣發癰疽堅硬腫痛羌活黃柏酒製各二錢黃芪一錢半防風景本當歸

陳皮澤泻黃芪各一錢半乳香貝母天花粉白芷赤芍葛根各五分防風七分

沒藥五分穿山甲三片燒別研右剉作一貼用好酒入瓦罐封口煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒二三盃側卧而睡忌酸物鐵器○如在背宜角刺為君在腹白芷為君在四肢金銀花為君(入門)

清熱消毒飲

治癰疽陽證腫痛熱渴金銀花二錢赤芍藥生地黃川芎各一錢半當歸黃連山梔連翹甘草各一錢右剉作一貼水煎服(入門)

癰疽內托法

癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固而以經行活血為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也(正傳)○一切瘡腫始覺患起高腫五七日忽平陷者是內攻之候急以內托散及內補湯藥墳補臟腑令實最怕透膈膜穿十無一生矣(劉消子)○

癰疽初生

一二日便覺脉沈細而煩悶邪毒猛暴恍惚不甯外證深沈者宜用托裏散(方見上)內托散(精義)○癰疽發於外根盤不深形證在表其脉多浮非氣盛則必侵於內急須內托宜復煎散

方見上

○除溼散藥使胃氣和平禁衛俱行則邪氣不能內侵也(河間)○托裏宜用十宣散加味十宣散千金內消散托裏消毒散千金托裏散芎歸托裏散內托千金散仙傳化毒湯托裏黃耆湯托裏芩湯穿山甲散祕方奪命散○癰疽經久不差氣血漸衰膿汁清稀瘡口不合外證不明並宜托裏

膿未成者

使膿遠成膿已潰者使新肉早生血氣虛者補之陰奇散千金內托散加白芍藥一錢(精義)

陽不知者

調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證矣(精義)

十宣散

治一切癰疽瘻瘍已成者速潰未成者速散敗膿自出惡肉自去止痛排膿生肌其效如神人參黃耆鹽水浸蒸培當歸酒洗厚朴鹽製桔梗肉桂川芎防風白芷甘草各等分為末每三錢溫酒

調服不飲酒者

木香湯調下(精要)○一名千金內托散(醫鑑)○一名排膿內補散

一名護壁

都尉服之去舊生新(得效)○冬寒宜用夏月內托復煎散為佳(入門)

內托散

治癰疽潰後內虛或氣弱人生瘡即上十宣散加白芍藥一味也(精義)

元帥即上

十宣散加乳香沒藥各等分右為末每三錢溫酒調服不飲酒麥門冬湯調下○一名固疊

元帥即上

升陽益胃散治癰疽已成未成服之內消或年歲氣弱者尤宜當歸肉桂人參黃耆川芎白芷防風桔梗香沒藥二味也(得效)

升陽益胃散

治癰疽背癰一切惡瘡能內托連翹二錢羌活藁本黃耆炙甘草各一錢半知母生地黃黃芩桔梗生甘草各一錢澤瀆七分獨活防風黃連黃柏人參陳皮當歸梢蘇木酒附己各五

分右剉作

立消作膿者立潰此方陽藥七分陰藥三分勝十宣散○一名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

東垣

一〇此方與黃連散略同(東垣)

消毒散

治癰疽及腸癰肚癰便毒初起即消已癰即潰血從大便中出大黃三錢金銀花二錢當歸

甘草節五分穿山甲三大片蛤粉炒右剉作一貼酒水
相半煎服(醫鑑)○此方與仙方活命飲異同(醫鑑)

托裏消毒散 凡癰疽服此則未成即消已成即潰能壯氣血使毒氣不致內攻肌肉易生金銀花陳皮各三錢黃耆鹽水炒天花粉各二錢防風當歸川芎白芷桔梗厚朴穿山甲炒焦皂角刺炒各

一錢右剉作二貼每一貼酒水相半煎服病在下只用水煎(醫鑑)

內托千金散 治一切癰疽惡瘡能內托金銀花人參黃耆赤芍藥當歸川芎瓜萎根白芷桂皮桔梗防風甘草各一錢右剉作一貼水煎去滓入酒半盞調服日三服後瘡口有黑血出或遍身汗出

是药之功效也(丹心)

仙傳化毒湯 治癰疽發背乳癰一切無名腫毒未成立消已成立潰金銀花天花粉各一錢二分防風黃芩甘草節白芍藥赤茯苓貝母連翹白芷各一錢半夏七分乳香沒藥各五分右剉作一貼

酒水相半煎(回春)

托裏黃芪湯 治癰疽潰後膿多出內虛人參當歸黃耆桂皮白茯苓遠志

麥門冬五味子各一錢右剉末水煎服或煎湯服(精義)

托裏茯苓湯 治同上白茯苓當歸黃耆各一錢二分白芍藥防風桔梗五味子川芎

麥門冬桂皮熟地黃甘草各七分右剉作一貼水煎服(精義)

穿山甲散 治癰疽托毒排膿及五毒附骨在藏府托裏出毒氣止痛內消蜂房一個蛇退穿山甲油髮灰各二錢半石為末每服二錢入乳香末五分慢酒調下(直指)

祕方奪命散 治一切癰疽無名惡瘡能內托令自消天花粉二錢穿山甲蛤粉炒赤芍藥甘草節各一錢

祕方奪命散治防風白芷皂角刺金銀花陳皮各七分當歸尾貝母乳香各五分右剉作一貼好酒一大碗

前服(丹心)

陰疽起發法 凡背發大瘡惟發熱則謂之背若不發熱皆癰也其有陰證於五臟內發者却又沈晦無熱(直指)

○疽者上之皮腫堅硬如牛領之皮(靈樞)○癰疽陰證頭平向內沈黯不痛渾身及患處不熱宜服當歸酒以排膿內補散(即十宣散)加味不換金正氣散(方見下)為佐兼以米鋪楮蹄膏肉為養蕃麥麪能發起可煮食之如更不發起可用穿山甲頭切片蘸醋焦炒生人牙齦各二錢

半右為末分兩貼用辣桂當歸麻黃酒煎調服外取薑汁和麪厚塗患處(直指)○陰疽宜服仙方活命飲祕方奪命散仙傳化毒湯(三方見上)雞血散狗寶九賽帝丹外用四虎散付之

當歸酒 治陰疽散桂五錢當歸四錢木香白芷各二錢右剉分

二貼每取一貼酒煎去滓入乳香末五分調服(直指)

雞血散

(治癰疽陰證赤堆雞剪去冠尖少許倒提滴血瘡上血盡再換不過五
六難痛止毒消其瘡自愈內以人參六兩分六貼盡日煎服)

狗寶丸

(專治癰疽發背附骨諸惡腫將發時先覺口中煩渴四支沉重遍身壯熱乃其候也此約主之
粉霜黃蠟各三兩硝砂五錢蟾酥輕粉雄黃狗寶(癰狗腹中得之)乳香烏金石(即石炭)沒藥

各一錢麝香一分金頭蜈蚣七條黑狗胆臘月者一個初男乳一合右為末先將

乳汁蠟放在罐內慢火化開次將各藥末和成剉丸如菉豆大每三丸至五丸用白丁香七個研爛和

新汲水送下少頃以熟慈白粥投之权被盜定汗出為效如無此藥以調然真人奪命丹(方見上一代

之丹心)

○一名寸金丹二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丹六名來甦丸七名知命

丸八名得道丸各有瘡身末燭服三丸則便活如

噤口幹開牙闊研下三丸立生非人勿示

(精義)

賽命丹

(治癰疽發背疔瘡魚口便毒一切無名腫毒賽飛龍奪命丹(方見下一蟾酥朱砂雄黃膽卷
血竭乳香沒藥各三錢蜈蚣麝香各五分細辛全蝎蟬退穿山甲白僵蚕猪牙皂角各六錢白芨

以信石少許同枯去信石片腦各五分右為末端午日以酒糊和丸菉豆大

每三丸以箋酒一小鐘吞下被蓋出汗或吐或不汗再服白粥調理)

(入門)

四虎散

(治癰疽腫硬如牛頭皮按之方痛天南星草烏半夏生狼毒各等分右為末醋蜜調付留頭出毒氣)

(直指)

癰疽五發證

(發腦發髮發眉發頤發背是為五發至險其證皆令人頭痛惡心寒熱氣急拘攣宜五香散五
得破穴急破出膿不害○腦疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可○腦癰初起如橫木色青黑

如鉗度大硬不見膿難愈○左右髮生癰疽是為髮發亦危篤左右額角及太陽穴生皆同○左右眉

棱發為發眉亦重○鼻下人中及下頤發為發頤亦曰發齷亦害人○背後五臟俞分生癰疽是為發

背最重(涓子)

○究其病源有風有氣有食有藥毒有勞損(即房勞)風則多癰氣則多痛食則發寒

熱藥毒則堅硬勞損則瘦弱風氣食三種易癰宜三香散(藥勞損二者難醫直指)

○外因四氣宜服黃甘散連翹散毒散荅木復煎散(方見上)

○內因七情宜遠志酒獨勝散○不內外因藥毒房勞

宜國老膏槐花酒○金石藥毒之發則堅硬如石不痛宜甘豆湯(方見解毒)端碧丸○虛勞瘦弱禁

衛否泄患虛重著如負石不可用香燥疏泄之藥宜腎氣丸(方見虛勞)

○托裏散(方見上○丹心)

○五發證如腫作痛煩渴引冷宜黃連消毒散(方見上)

○若腫痛口渴好飲熱湯為腎虛陽火熾宜托裏消毒散(方見上)

○托裏益氣湯腎氣丸○若色黯不濟不飲為

陰精消涸名腦瘻不治○發髮因怒火宜柴胡清肝湯鬱怒者十六味流氣散(方見氣門)甚者仙方

活命散(方見上○入門)

○發頤最險毒氣灌注頭面腫大可畏牙齒亦脫宣內疎黃連湯千金漏蘆

湯(二方見上○入門)

○通用元靈散(活心)

五香散

治陰陽之氣鬱結不消結核腫病或似癰者使人寒熱頭痛木香丁香沈香乳香麝香各等分為粗末每取三錢水煎服○一方無麝香有藿香(周方)

五香湯

凡癰疽因血凝氣滯而生氣血鬱香則行故用此透達經絡木香沈香丁香乳香麝香甘草各五分人參黃芩陳皮各一錢右剉作一貼水煎服或為末點服(綱目)

二香散

治癰疽因風氣食三證而生通用此調暢胃氣益智仁縮砂仁各三錢木香藿香白芷黃芩半夏趨厚朴陳皮蒼朮甘草各一錢半丁香七分半右為粗末每服三錢薑五片棗二枚同水煎

服(直指)

黃甘散

治外因四氣生癰疽大黃半生半熟甘草節各等分右為末每二錢空心酒調服以利為度(丹心)

連翹敗毒散

治癰疽初發憎寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒四五日前二三服輕者自消若不消宜服仙方活命飲羌活獨活柴胡前胡桔梗川芎赤芍芩金銀花枳壳連翹防風荆芥薄荷甘草各七分右剉作一貼入

薑三片水煎服(醫鑒)

遠志酒

治七情內鬱成癰疽遠志泔浸去心為末溫酒一盞調末三錢澄清取飲以滓傅患處○有死血陰毒在中則不痛而傅此即痛○有七情七鬱則痛不可忍兩傅此即不痛○或燃熱內善則手不可近傅此必

清涼(三因)

獨膝散

治癰疽結硬聚毒作痛蓋此疾多因怒氣得之宜服此膏附子杵去皮毛淨薑汁浸一宿晒乾為末每二錢白湯調下或甘草紫蘇葉煎湯調下數服腫硬自消有膜即出(精義)

國老膏

治癰疽能消腫逐毒使不內攻大甘草二斤槌碎河水浸一宿搾全漿汁臘盡去筋津用鍋濾過以銀石器慢火熬成膏分六次溫酒或白湯調下能疏導惡毒(綱目)

槐花酒

治百腫瘡毒初覺五發癰疽雖有大勢服此即退槐花四兩炒香

(入門)

蠟燭丸

治癰疽發背癰瘡惡瘡衝護內膜驅解諸毒自然內消如因藥毒發疽非此莫治黃蠟二兩入明白蠟末四兩眾半和勻作丸梧子大每三十丸溫酒或熱水下日三服內疽癰尤妙(入門)

當歸羌活湯

治五發癰疽膏深熱帶者最宜當歸黃芩黃連並酒製各一錢半酒黃柏連翹防風羌活橘子甘草各七分獨活藁本各五分澤瀉三分右剉作一貼水浸半日入酒一匙煎熱服日二次三日盡六服却將藥清汁調

下木香桔梗各一錢(入門)

託裏羌氣湯

治癰疽肉色不變或潰而不斂一切虛證白朮二錢人參白茯苓貝母陳皮各一錢桔梗甘草各五分右剉作一貼水煎服(入門)

柴胡清肝湯治鬱疽及肝胆三焦風熱怒火以致耳頭胸乳腸肋腫痛寒熱柴胡二錢施子一錢半

黃芩人參川芎青皮各一錢連翹桔梗各八分甘草五分右剉作一貼水煎服(入門)

立靈散(治五發癰疽及諸般疔腫魚臍惡瘡腫毒稀薑草一兩細七個燒灰乳

破於上薄皮剥起者即當用破頭代針之剉安其上
膿出之後乃用搜膜化毒之藥取效如神矣(精義)
在故上經一宿取用白丁香硝砂沒藥乳香各一字右細末入糯米研匀丸如黍粒大每用一粒用津貼瘡頭即破膿出若膿滯不快則取一粒納瘡口使膿不滯好肉易生(精要)

晉針丸(治同上白丁香二十粒硝砂沒藥陳蒼米各一字右研勻以未飯和九粟米大點瘡上即潰膿出(三因)
透膜散(治諸癰瘡及附骨疽不潰者不用針刀一服即破出膿取出城蘭殼燒存性
好酒調下一時許便出瘡口眼一枚出一口服兩枚由兩口神效(入門)

麝香散(治癰疽已結而頭不破白丁香研一錢斑貓去頭足翅一錢半龍膽麝香各少許右為末醋調少許點瘡頭上立破急以黃連湯洗去之(直指)
涌泉膏(治癰疽軟而瘡頭不破或已破而瘡頭腫結無膿者斑貓去毒焙右為末研和蒜膏如小豆許點在膏藥中准瘡口處貼之少頃膿出即去藥(直指)

射膜丸(白堊灰一錢黃丹一字砒霜五分右末麵糊和撈作錠子粘在瘡頭上膿自潰出(入門)

打膜散(治癰疽不放膿出大黃五錢芒硝一錢半金銀花黃芩黃連黃柏當歸尾各五分甘草節穿山甲集各三分半木蠶子虛者三個實者五個右剉作一貼水煎五更服大便見膿小便見血為效(入門)

隔皮取膿法(驢蹄肉焙蕎麥粉炒各一兩白鹽五錢草烏四錢右為末水調作餅慢火炙微黃色去火毒末為醋調成膏摊厚紙上貼患處水自毛孔而出其腫自退諸般腫毒皆效(入門)
追毒餅(諸惡瘡因針後又閉合服痛不忍用此放入瘡中永不閉膿水自由雄黃雌黃朱砂各一錢砒霜五分輕粉少許右細末糯米糊丸丸麥子大根瘡口中膿水自由瘡自乾好(得效)

去水膏(癰疽破穴後誤入諸毒水以致舉痛砂糖糯米粉各七錢半甘草生末二錢半右入

熱水少許為膏攤綢上貼之毒水自出驢馬汗及尿糞一切毒水皆治之(直指)

治同上。露蜂房白芷苦參川椒右煎湯溫洗如熱敷加荆芥穗（直指）

湯溫洗如熱厥加荆芥穗（直指）

癰疽排膿生肌法

癰疽潰後氣血大虛惟恐毒上一托裏和中湯等歸托裏

陷托裏之法不可一日缺也宜用十宣散托裏散二方見
散托裏消毒飲加味十全湯神效托裏散聖愈湯蓋托裏則

氣血壯而脾胃盛，膿穢自排毒氣自解，死肉自去，新肉自生。瘡口自微安，入日瘡肉不爛。由於肌肉不生，肌肉不由於筋肉不去，腐肉不去。由於脾胃不壯，氣血不旺，必以補托為主，而佐以行經活

血之藥則斬肉自生死肉自潰又何待於點刺耶（入門）○凡膿血出多陰陽兩虛十全大補湯（方見虛勞一補氣血進飲食有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見墮平

痛寬還以為安，懵不知者無補養，詳攝之，無後虛證復見，因而轉成他病者多矣。（丹溪）

托裏和中湯 治癆症清傷氣虛飢食少思寒嘔吐泄濁不快每服一錢白芷根一錢陳皮半夏各一錢木香甘草炙各五分右剉作一點入薑三片棗二枚水煎服(入門)

芎歸托裏散 托裏排膿生肌川芎當歸白芍藥酒炒白薇芩柏香白芷各一錢二分人參羚桂丁香甘草生各七分右剉作一貼水煎服或為末每二錢米飯調下 **(一直指)**

加味十全湯 治癰疽瘍瘍後補氣血進飲食排膿生肌黃芩酒蒸熟地黃當歸川芎人參白朮芍藥炒白朮陳皮烏藥五味子桂心甘草各八分右剉作一貼入薑一棗二水煎服(得效)

神效托裏散 治癰疽腫毒能托裏排膿。黃芪忍冬草各三錢，當歸二錢，甘草一錢，右割作一貼酒水煎服。(正傳)

聖愈湯治癰疽膿水出多心煩少睡能托裏補氣血熱地黃生地黃芩入參各二錢當歸黃芪各一錢右剝作一貼水煎服（東垣）

1

托裏消毒飲 治癰疽膿後元氣虛弱久未收斂乃去腐生新之良藥也又治陰疽不癰發入參黃芩白芍藥當白朮白茯苓陳皮連翹金銀花各一錢白芷甘草各五分右剉作一貼水煎服 (入門)

癰疽瘡口深大方 深山黃牛糞塞滿瘡內藤紙貼上三四日後去之最妙。深山黃牛吃百草，故入藥。○又白芷大腹皮露蜂房煎湯淋洗拭乾，以黃連葉拭為細末散撲其中，當假越膜內補散。

(即十宣散)。飲醇酒食肥肉自然生肌易合(直指)

卷去惡肉方 瘰疽惡瘡中有惡肉若不去則好肉不生瘡口不合宜用藥消散之翠靈散(方見諸瘡)巴豆膏追毒丹去惡散消散虎角散雄黃散皆可○瘰疽惡瘡有死肉不去者白丁香霜梅

巴豆去殼炒焦研如膏如發背中央肉死塗之即腐未死塗之生肌惡瘡癰瘍久不收斂肉有毒根以紙擦薰染納之根去即效如元氣虛弱毒氣散漫中央肉死急服大補之劑中塗三四寸許

至五六日毒點之界自裂如刀割狀中央漸清若

脾胃大虛肉不知痛急補脾胃多復生（入門）

追毒丹治癰疽黑陷者用針開瘡口納此丹使之漬然後去敗肉排臍隨證治之巴豆七个去皮心不去油研細白丁香輕粉各一錢雄黃黃丹各二錢右為末和白麵三錢清水尤如枣桂大針後納其

中點以膏藥追出臍血毒物漏瘡四壁死肌不去則

不可治亦以此追毒去死肌乃養肉全愈（得效）

去惡散治癰疽及諸瘡有惡肉不能去者雄黃一錢巴豆一个右同研如泥入乳香沒藥末各少許又再研勻每取少許點上惡肉即去（入門）○諸瘡有惡肉者膏藥內入巴豆雄黃不傷良肉只去惡

肉有死肌不去白

丁香上之（東垣）

消蝕散消蝕惡肉淫虫朽骨先用洗瘡方然後付此藥白礬桔一兩綠礬枯雄黃

乳香胭脂遠志各一錢右為末蜜水研膏付惡肉上麻油調亦得（直指）

鹿角散

主癰疽瘡腫去惡肉生好肌鹿角細末醋熬為糊貼之

當頭上開孔被膠急撮臍自由盡惡肉亦去矣（本草）

雄黃散

去諸瘡中惡肉雄黃末一錢巴豆一个不去皮研如泥入乳香沒藥各少許再研細點上惡肉
自去○凡膏藥內入雄黃已五少許不傷好肉只去惡肉諸瘡有惡肉者皆可去（海藏）

癰疽湯洗法

瘡家藏府生熟熱蒸其血敗則肉腐肉腐則成膿當臍血凝聚之時所賴朝夕洗瘡以外舒

其毒氣才覺有膿即燒醋蘸熨而破之才見破肉即煮藥溫射而去之精或稽延不反掌而侵
蝕筋骨矣（直指）○夫湯洗之法宣通肌表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有盪滌之功凡瘡腫初生
一二日須用藥湯淋射之在四肢者漏瀉之在腰腹背者淋射之在下部委曲者浴瀉之如藥二兩用
水二升煎取一升半以淨布或新綿蘸藥水稍熱溫瀉患處稍涼則急令再溫勿用冷者日用五七次
以腫消痛止為驗（精義）○初作宜宣熱拔毒外以洗襟角付以敏其葷已瀉則排膿止痛朝夕洗滌

以舒毒氣膿盡則生肌付每次第施治（得效）

○猪蹄湯解毒湯洗毒湯乾艾湯選用（入門）

猪蹄湯

凡瘡有口用此湯洗猪蹄兩隻水三升煮軟將汁分為兩次澄去上油及下滓却將白芷生甘

洗惡物令淨避風冷及觸氣觸冒

（精要）○一名肉汁湯（入門）

解毒湯

治癰疽未破已破皆洗如成膿瀉爛最要洗淨然後用藥捲貼黃柏澤蘭甘草荆芥赤芍藥大黃
白芷當歸獨活各二錢右細剉入葱白五莖大棗五枚水二升同煎去滓乘溫熏洗如瀉爛入猪

蹄一隻同煎用可免乾痛

○一名水師精明（得效）

洗毒湯半在剗作一貼水煎服汁溫洗日二精義

精義

乾艾湯

取湯逐日溫洗仍以白膠香燒烟薰之神異膏貼之（方見雜方○精義）

桑灰水

去瘡中膿血毒水桑灰水汗浸洗（俗方）

鹽湯

溫洗癰疽毒腫日二三次最妙（俗方）

癰疽捲貼法

凡瘡腫初生似有頭者即貼溫熱藥引出熱毒火就燥之義也於四畔赤嫩處貼生寒藥折伏勢熱驅逐邪惡乃捲火之義也腫皮厚者以故軟帛或紙花子塗藥貼之腫皮薄者用疎紗或

薄紙塗藥貼之乾則換易新者宜用

乳香膏圓藥鐵井欄水澄膏沈水膏三神膏洪寶膏妙勝散（精要）○貼膏藥之法瘡口有膿血不淨痂癥閉礙須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼後復有黃

水膿血由流用紙揩從倒畔出一日一換黃水膿血止二三日一換貼至愈宜用神異膏萬應膏靈應

膏太乙膏雲母膏應膏糯米膏妙勝散桃花散紅玉散生肌散木香檳榔散竹筒吸毒方（得效）○凡付貼之藥須是細

末則不痛（直指）

乳香膏

治背瘡初發赤腫而高乳香一兩青薄荷葉四兩右研勻罨患處青絹蓋之如乾薪水潤之令熱毒消散減疼免牽引（涓子）

園藥

南星草烏黃柏白芨各二兩五倍子一兩炒右末水調敷糊隨四圍匝如牆壁可移險處於不險處如神（綱目）

鐵井欄

治一切癰疽腫毒以此圍定不復畔開芙蓉葉重陽日前採蒼耳葉端午前採燒存性為末蜜水調敷（入門）

水澄膏

治癰疽熱毒腫痛黃連黃柏白芨白蔹各四錢雄黃一錢乳香沒藥各五分右末水調雞羽掃上腫處（丹心）

沈水膏

治癰疽發背排膿致毒天南星七錢半白芨白芷赤小豆半夏生貝母各五錢木鼈子仁乳香沒藥各二錢半雄黃一錢右為末蜜水調付

妙勝散

消腫敗毒排膿落地茜花去白黃蜀葵花去心並善日乾右為末井水稀調雞羽掃付患處乾則再付或收毒平散或破潰出膿神效如瘡口開用末粉亦斂毒不急澀（直指）

洪寶膏

治一切腫毒散血消膿天花粉三兩白芷赤芍藥各二兩粉全一兩右為末茶調塗患處乾則換新（回春）

妙勝散

消腫敗毒排膿落地茜花去白黃蜀葵花去心並善日乾右為末井水稀調雞羽掃付患處乾則再付或收毒平散或破潰出膿神效如瘡口開用末粉亦斂毒不急澀（直指）

神異膏治發背癰疽及諸般惡毒瘡癰貼之其效如神○膏藥甚多效驗無由于此（方見雜方）

萬應膏治一切瘡疽初發焮腫或老瘡不差亦令收斂早合貼之神效（方見雜方）

靈應膏治五發瘡疽惡瘡癰癰結核乳癰貼之則未成膿者自消已成膿者便清惡肉易去新肉早生其效如神（方見雜方）○一名麥飯石膏（精要）

太乙膏治五發瘡疽一切惡瘡及蛇虎犬蝎並湯火刀斧打擗損傷可內服外貼○若作丸服之則蛤粉為衣○一名神仙太乙膏（方見雜方）

雲母膏治一切癰疽惡瘡腫毒折傷癰癰骨疽內疽乳癰肺癰腸癰並可外貼內服（方見雜方）○凡五穀米膏及發背外以敗蒲煎水洗瘡貼之又取一兩作丸梧子大溫酒吞下三十九粒瘡骨疽亦如之

（腸癰作丸甘草湯吞下下臘血即愈）

切瘡疽外貼立差忌食羊血（局方）

善應膏治諸般腫毒惡瘡發背腦疽癰癰打擗閉肋金瘡杖瘡蛇虫犬馬咬齋

（癰等疾並外貼內服○內疽肺癰腸癰作丸如上法服（方見雜方）

糯米膏淨糯米三升入磁盆內於端午前四十九日以冷水浸之一日兩度換水勿令米碎至端午日取

出用絹袋盛之風乾每旋取少許炒黑為末令水調成膏量瘡大小貼之絹帛包定直候瘡愈滿

度乾則換常全

（溫為妙（入門）

飲瘡散軟滑石煅花藥石煅雞內金各五錢白芨三錢半白斂

二錢半黃丹乳香各一錢右為末乾株神效（○直指）

桃花散治一切瘡久不合白芨白斂黃柏黃連乳香麝香黃丹

各等分右極細末滲瘡上二三日生肌平滿（丹心）

紅玉散治諸瘡生肌肉寒水石不必多少鹽泥包裹火煅右為末入黃丹少許

（粉上（丹心）○諸惡瘡血出不止寒水石細末穆之立止（東垣）

生肌散寒水石（滑石龍骨）無則狗頭骨代之烏賊魚骨各一兩定粉蜜陀僧白礬灰乾胭脂各五錢右為極細末穆之（精要）○一方老狗頭生鷹骨碎煅桑白皮斬者一兩當歸二錢半右極細末油

（細末新水調塗濕則乾穆膏梁熱瘡所宜用○一方加黃丹（局方）

木香檳榔散（治癰疽瘡節瀆後膿水不生不斂木香檳榔黃連各等分右各等分

細末新水調塗濕則乾穆膏梁熱瘡所宜用○一方加黃丹（局方）

（調付或乾穆（直指）

則同者十數沸乘仍簡熟以手按於瘡上候膿血水滿自然脫落不

然用手拔脫更換新筒如此三五次其毒盡消即付生肌膏(丹心)

內外分癰疽內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而向裏非于腸胃肓膜也謂之內疽者以其視之不見故名焉(綱目)○發於內者曰肺癰

心癰肝癰腎癰胃脘癰腸癰腹癰○發於外者曰臂癰乳癰臂癰懸癰便癰鼻癰付骨疽流注骨疽疔疽○內疽施點陰膠法次服仙方活命散(一方見上)內消沃雪湯(綱目)○內疽用內托之藥外以針

開之而愈先用四物湯(方見血門)加桔梗香附生薑煎

服漬後亦用四物調理雲母膏太乙膏作丸兼服(丹心)

點陰膠法

欲知內疽所在點陰膠少許於口中即知藏府所起直達至住處知痛足可醫也陰膠即是久用飴中氣垢也○雷公云知瘡所在口點陰膠(本章)

肺癰

中府(六名)隱隱而痛者肺疽上肉微起者肺癰也(靈樞)○肺之癰喘而兩胠滿肺癰吐膿如搘米粥咽燥振寒(內經)○振寒發熱寸脈滑數咳嗽膿血其人飲食起居如故此為癰腫膿在胸中為肺

癰其脈聚數為膿未成累去仍聚故膿已成(仲景)○肺癰吐膿後其脈短而澀者自痊浮大者難治其面色白而反赤者此火之剋金不可治(丹心)○大凡肺癰當咳喘短氣胸滿時唾血膿久如搘米粥者難治其嘔膿而自止者自愈(精義)○始萌可救膿成多死(仲景)○肺癰乃風寒之氣內舍

於肺而作先須發表宜參蘇飲(方見寒門)○肺癰咳而胸膈隱痛時出渴溼腥臭者先投參蘇飲四貼虛者先投小青龍湯四貼(方見寒門)○得效○肺癰口燥咽乾胸中隱痛二便赤澀咳嗽膿血

腥臭置之水中則沈宜用桔梗湯消膿飲葦葉湯黃芩湯五香白朮飲牡丹皮湯參朮補肺湯參朮補脾湯(入門)○肺癰之證男子以氣為主得之十載二三婦人以血為主

得之十全七八歷試屢驗(得效)○雲母膏作丸服太乙膏亦可(入門)

桔梗湯

治肺癰桔梗貝母各一錢二分當歸爪葦薏苡仁各一錢枳壳桑白皮防風黃芪各七分杏仁百合甘草節各五分右剉作一貼入薑五片水煎服(正傳)

消膿飲

治肺癰咽喉南星地丁蟲射干桔梗天門冬薄荷紫蘇葉杏仁半夏防風各七分半知母貝母阿膠川芎生乾地黃桑白皮白芨白芷甘草各五分右剉作一貼薑七片烏梅一個水煎服(入門)

葦葉湯

治肺癰心胸中錯亥喘煩熱葦苡仁冬瓜仁桃仁各二錢剉先以葦葉一握水二盞煎取一盞去滓入三藥煎至六分去滓食後服吐膿血勿怪(得效)

黃芩湯

治同上瘦合樹皮一掌大水煎服即合散皮也(本草)

五香白朮散

治肺癰生肺益脾土進飲食人參白朮山藥白朮荳蔻苡仁白扁豆桔梗縮砂蓮肉白朮甘草各二錢沈香木香乳香丁香藿香各一錢右為末每三錢蘇鹽湯調下大棗湯亦可

牡丹皮湯

治肺癰胸乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭牡丹皮升麻桔梗薏苡仁地榆黃芩赤芍藥甘草生各一錢三分右剗作一貼水煎服（得效）

一方

（一少婦膺門清一竅口中所嘯膿血與竅相應而出宜大補氣血以參芪當歸加退熱排膿藥多服兼取雲母膏作丸甘桔湯吞下而愈（丹心）

參芪補肺湯

治肺癰咳吐膿血發熱作湯熟地黃一錢半牡丹皮一錢入參黃芪白朮白茯苓陳皮山茱萸當歸山藥五味子麥門冬各七分甘草吳茱萸五分右剗作一貼薑三水煎服（入門）

參芪補脾湯

治肺癰吐膿血久不愈脾弱不食此藥能補脾生肺黃芪二錢入參白朮各一錢半陳皮當歸白茯苓各一錢麥門冬七分桔梗六分甘草五分五味子四分升麻三分右剗作一貼薑

三水煎服

（入門）

心癱

巨閼（穴名）隱隱而痛者心疽上肉微起者心癱也（靈樞）○心癱者心經有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成熱凝滯而生先用涼血飲次服加味十奇散（方見上○得效）○心癱者於胸乳間生蜂窩癰

發靈樞經所謂一名井疽狀如丘大三四日起不早治則入於腹七日死

急用

疏導心火之藥宜用清心丸

各五錢右為末蜜丸梧子大米飲下百丸（入門）

涼血飲

治心癱及癰疽熱證遠志赤茯苓赤芍藥生乾地黃麥門冬知母甘草生各一錢右剗作一貼入薑三棗二水煎服加黃連尤佳（入門）

內固清心散

治心癱及癰疽惡瘡煩躁以此解毒神效辰砂赤茯苓入參白豆蔻雄黃葛豆朴硝甘草皂角各一錢龍腦麝香各一字右為末每一錢蜜水調下（入門）

漏心湯

治心癱及癰疽毒盛躁渴大黃一錢半黃連黃芩山楂子漏蘆澤蘭連翹蘇木各七分右剗作一貼水煎服（入門）

肝癰

期門（穴名）隱隱而痛者肝疽上肉微起者肝癰也（靈樞）○發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石其堅而不瀉者為馬刀疾癰急治之（靈樞）○脇癰由肝心火盛宣柴胡清肝湯（方見上）瀉後方

可清熱托裏忌熱藥（入門）○肝癰兩時滿卧則驚不得小便（內經）○小柴胡湯隨證加減用（方見寒門）

腎癰

（京門（穴名）隱隱而痛者腎疽上肉微起者腎癰也（靈樞）○發於腋下至小腹滿（內經）○腎癰乃與內腎相對皆由腎氣衰敗而成尖起皮赤者易安陷入皮黑者難瘥宜用加減八味丸（方見虛門）加味十奇散（方見上○得效）五藏癰疽俱宜十六味流氣飲或托裏散

（方見上○得效）

十六味流氣飲 肉桂白芍藥檀榔白芷厚朴紫蘇葉烏藥甘草各六分右剝作一貼水煎服（入門）

胃脘癰

帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脈其脈當沈細沈細者氣逆也逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也（內經）○中脘（穴名）

（院胃隱隱痛者胃脘癰也（靈樞）○脈洪數者癰已成也設脈遲緊雖癰未就已有瘀血也宜急治之

（精義）○此多因飲食及七情大鬱復感風寒使熱濁之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脈沈細惟

寒氣所隔故人迎緊盛有此二脈真胃脘癰也（入門）○外證寒熱如癰胃濁則肺金失養故身皮甲

錯或咳或嘔或唾膿血射干湯主之千金內消散（方見上）內消沃雪湯東垣托裏散皆可服又重母

青作丸以桔梗甘草湯吞

下太乙膏亦佳（入門）

射干湯

治胃脘癰赤芍藥二錢半射干梔子赤茯苓升麻各一錢半白朮一錢右剝作一點水煎去滓入生地黃汁一合蜜半合再煎一沸溫服（河間）

內消沃雪湯

治胃脘癰及肚癰內疽神效當歸身白芍藥甘草節黃耆射干連翹白芷貝母陳皮皂角刺天花粉穿山甲全銀花木香青皮乳香沒藥各五分大黃酒製一錢半右剝作一貼酒水相

半煎服

（醫鑑）

東垣托裏散

治胃脘癰內疽及一切惡瘡始發腫痛脈洪數弦實將欲作膿者三服消盡全銀花當歸各三錢大黃牡蠣瓜蔓根皂角刺連翹朴硝各六分赤芍藥黃芩各四分右剝作一貼酒水相

半煎服

（精義）

御醫忠勤貞亮庵 聖功臣崇祿大夫陽平居臣 許浚奉 教撰

癰疽下

腸癰腹癰開元（穴名）屬小腸天樞（穴名）屬大腸丹田（穴名）屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者為癰也（靈樞）○腸癰為病小腹腫而強按之則痛小便數似淋時時汗出發熱而復惡寒身反甲雖腹皮急如腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或燒臍生瘡膜從瘡出或有出臍中者惟大便下腹血者自愈（仲景）○濕熱鬱積腸內成癰臍邊緊者宜大黃牡丹湯或五香連翹湯（方見上）下之脈芤澀者四物湯（方見血門）加桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者三仁湯小腹疼尿澀者臍滿也宜牡丹散（入門）○腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加菝葜甚者敗醬散小腹痞堅按之痛身有熱乃結熱所成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯（方見寒門）黃黑散（入門）○腸癰冷熱證雲母膏為丸牛膝湯吞下利去癰臍即愈或蠟燭丸亦佳（方見上）○腹癰者生於肚腹皮裏膜外左闊散洪數而腹痛甚者是也治法同腸癰（入門）

脈法腸癰難知脈滑可推疎而下熟腸癰何疑遲緊未歲可下之大黃芒硝各一錢半牡丹皮桃仁瓜萎仁各二錢半右剝作一貼水煎服（入門）○一名薏苡仁（三因）

榮滑上升 榮衛相干

榮滑上升 榮衛相干

大黃牡丹湯治腸癰脈遲緊未歲可下之大黃芒硝各一錢半牡丹皮桃仁瓜萎仁各二錢半右剝作一貼水煎服有膿即下膿無膿即下血○一名大黃湯一方有冬瓜仁無瓜萎仁神效（千金）

金）

三仁湯治腸癰腸中病痛繼非癰疑似間便可服薏苡仁二錢冬瓜仁二錢半桃仁二錢半橘皮各二錢右剝作一貼水煎服（入門）○一名薏苡仁（三因）

牡丹散治腸癰冷證服軟而痛時下膿血牡丹皮入參天麻白茯苓黃芩薏苡仁桃仁白芷當歸川芎各一錢官桂甘草各五分木香三分右剝作一貼水煎服（入門）

敗醬散治腸癰身無熱度濡冷薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子炮五分右剝作一貼水煎服小便當下膿血而愈（入門）○一名薏苡附子敗醬散（仲景）

黃黑散治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢牛蒡子一兩取末一錢黑牽牛子一兩取末二錢右和勻分二貼每服一貼蜜水調空心服以利為度（丹心）

腸癰治驗

婦腹痛百方不效孫兆齡曰腹痛脈當沈細令反滑數此腸癰也雲母膏作丸溫酒吞下服

金一

臂癰臂上手陽明經分生癰此得之八風之變者傷

於風者上先受之宜服白芷升麻湯(入門)

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢酒紅花甘草各五分右剉分二貼酒水各半煎服每取一貼(東垣)

臂癰

臂居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰多血氣運不到血亦罕來中年後不可

生癰燒有腫痛參之脈證但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之禱如指諸掌(丹心)○臂癰初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法欲作膿者內托羌活湯(方見上)

飲(二方見上)腫硬者托裏消毒飲(方見上)潰後宜加味十全湯(方見上)尻臂生癰堅硬腫痛宜

內托羌活湯

(方見上)

(即愈)

(入門)

即愈(入門)

國老膏

治懸癰橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山澗長流水一椀文武火慢慢蘸水炙自早至午乾則投前水再炙直待水盡看甘草中心潤透為度細剉好酒二升煎取一升空心隨量飲之三日一

服

二三服可保無虞此藥雖不即消過二十日後必

盡消有人患此癰已破服兩貼瘡即合甚妙(精要)

便癰

俗名便毒實血病也一名跨馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經多血故又名血病或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成初發疏利之即散變膿後如常用宜托裏

內補之藥(正傳)○便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩者之中也(直指)○便癰生於腿膀小腹之間或一邊腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散(方見寒門)加大黃或雙解散復元通氣散(方見

氣門

一痛甚者仙方活命飲(方見上)仍戒房室行動(入門)○偏癰宜蘇方散牡蠣大黃湯千金內消散黃黑散五香連翹湯(三方見上)消毒飲玉燭散神奇散○便毒取大蜘蛛一個研細熱酒調下

(山居)○便毒初起射干三子生薑如指大搗細順流水煎服心渴為度因用阿膠醋煮塗患處(丹

心)○生山藥砂糖同搗塗上即消又生薑一塊蘸米醋磨取千步峰泥付腫處即消千步峰即人家

是也（得效）

蘇方散

治便癰木蠶子當歸尾赤芍藥白芷川芎射干大黃金銀花穿山甲沒藥蘇木甘草各八分右剉作一貼酒水各半煎服（正傳）

牡蠣大黃湯

治同上大黃牡蠣殼各二錢半甘草一錢黃瓜薑一個右剉作一貼水煎服（正傳）

消毒飲

治偏毒三四日可消皂角刺金銀花防風當歸大黃瓜薑仁甘草各一錢三分右剉作一貼水酒各半煎服仍頻提掣項中髮立效（丹心）

玉燭散

治偏毒腫痛大黃芒硝各三錢川芎當歸赤芍藥生地黃甘草各一錢右剉作一貼水煎空心服（正傳）

神奇散

治便毒魚口瘡（便毒潰破者即魚口瘡也）牡蠣大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿山甲三片土炒木蠶子三個去壳黃蠅三兩右剉作分二貼酒水各半煎服（得效）

雙解散

治偏毒大黃黑丑炒頭末各一錢半官桂白芍藥澤瀉桃仁各一錢甘草七分右剉作一貼薑五片水煎服空心先小便快是熱從小便出也後大便利皆是稠毒（得效）

囊癰

此濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開翠丸懸掛水出以缺戾衣付之外以紫蘇葉包裏仰卧養之

○癰疽入囊者曾治數人悉以濕熱入肝經處治而用補藥佐之雖膿潰皮脫翠丸懸掛者

皆不死○取紫蘇葉焙乾付之如燥者油潤之皮脫者青荷葉包之其皮自止（丹心）

附骨疽

按之亦無益○白虎飛尸亦能作膿著骨而生及其腐潰碎骨出盡方愈然同是一病但其淺深不同耳（三因）○附骨疽筋骨之内痛如錐刺外則全無赤腫突起初因露臥風冷或乘涼浴水寒濕襲

深初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱為熱變而為膿膿成即用火針使毒不得內潰（入門）○初起

宜漏蘆飲子五香連翹湯（方見上）次用內消升麻湯在尻脣宜內托羌活湯（方見上）在腿內羌活防己湯在外托裏黃連消毒飲黃蓍湯（方見上）潰後久不愈宜蟾蜍膏赤朮丸平肌飲（入門）○初起大痛而肉色不變名附骨疽三生散最妙兼用青皮甘草節

二味煎服（綱目）○附骨疽與緩疽石疽風相類宜辨而治之（入門）

緩疽石疽風辨

緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間其熱緩慢積日不潰久乃紫黑皮肉俱爛故名曰緩疽○腫與皮肉相似疼而堅硬如石故謂之石疽生商陸根橘榔和鹽少許塗付日

換即軟○風由風邪搏於骨髓故其痛亦微晝遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失治

始發預防法（環跳穴痛不已附骨疽急用青草蒼柏湯服此不愈加麻黃一錢用二三貼又不效恐則變為掣曲偏枯○緩疽石疽宜服補虛托裏溫熱之劑（入門）

血暢而愈

(入門)

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服他惡瘡初起亦可服大黃一錢半漏蘆白薇黃芩
黃枳實升麻赤芍藥朴硝甘草各一錢右剝作一貼水煎服(入門)

內消升麻湯

治附骨疽疎下後服此大黃升麻當歸黃芩赤芍藥枳
實各一錢半甘草一錢右剝作一貼水煎服(精義)

羌活防己湯

治附骨疽發於太陽厥陰太陰分者羌活川芎蒼朮各一錢二分防己木香連翹
射干白芍藥木通當歸尾蘇木甘草各七分右剝作一貼酒水各半煎服(正傳)

蟾蜍膏

治附骨疽久不差膿汗敗壞或骨從瘡口出大蟾蜍一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪脂
煎二物令稠去滓凝如膏貼之先以桑白皮烏豆煎湯淋瘡口拭乾然後却貼之(得效)

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當歸尾一錢七分柴胡一錢半白芷一錢半白芷
黃柏升麻甘草各五分右剝作一貼酒水各半煎服(正傳)

赤朮丸

治附骨疽久不差赤朮一斤泔浸去油用川椒葱白同煮黑色焙乾茴香破故紙
川棗子炒赤苓苓白芷桃仁各一兩右為末蜜丸梧子大溫水下百丸(得效)

平肌散

治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煅露蜂房亂髮灰各二錢半新桑白皮末
一錢二分半右為末入輕粉麝香各少許濕則乾攪乾則油調付之(直指)

三生散

治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房燒退亂髮各等分燒存性為末每取三錢溫酒調下空心(保命)

青草蒼柏湯

治附骨疽始作宜預防青皮一錢半甘草節五分蒼朮黃柏各三錢右剝作
一點水煎和薑汁三匙空心飲之冬加桂枝夏加條芩體虛加牛膝(入門)

流注骨疽

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素有痰火或感風寒邪氣流行至其癥注之處而發多
生四肢或胸腹腰臀關節之處初起宜葱熨法(方見下)實者十六味流氣散(方見上)兼服竹

瀝達痰丸

(方見痰門)通用榮衛返魂湯合二陳湯(方見痰門)令其自消自潰若青俊久不斂宜以
托裏為主更佐以豆豉餅琥珀膏(方見雜方)爛成以火針破之(入門)○流注起於傷寒傷寒表未

盡遺毒於四肢經絡澀於所滯而後為流注也蓋流注者傷寒之餘毒骨疽者流注之敗證也(回春)

○痰飲流注於胸背頸項腋脇腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不

熱堅如石破之無膿或有薄血或出清水或如紫汁又有壞肉如敗絮或又如瘰癧在皮肉之間如雞
卵可移動軟活不硬破之亦無膿血針口努肉突出惟覺咽喉痰塞作寒作熱榮衛返魂湯主之
鑑)○骨疽者由瘡潰後氣血不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方愈蓋人身有正骨附骨傅合成
形附骨出則愈後如常正骨腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則必出碎骨外用附子餅

榮衛返魂湯主一切瘡毒在患專治瘡腫又去癰疽發背流注腫毒亦可藥木通白芷何首烏枳壳回香

散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之並加恩冬藤（入門）○凡氣血逆於內理令壅結為癰疽此藥大能順氣勻血自然榮衛通順不生變證尤合內疽（入門）○虛加炮附子實加大黃痰盛加南星半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃葱白全蝎穿山甲流注加獨活流注者氣血凝滯加獨活則可以動一身血脉血脉既動豈復有流注乎（入門）○此藥治流注癰疽發背至於較壞病活死肌弭患於未萌之前拔根於既愈之後大能順氣勻血蓋氣陽也血陰也只調陽不和陰則氣耗而凝肌必不活如五香連翹之類是也只和陰不調陽則血旺而氣弱病必再作如內補十宣之類是也此藥兼之

真神仙妙劑

也（醫林）

疔瘡發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日死○發於足旁名曰厲疽其狀不大初從小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不衰急斬之否則死（靈樞）○膏肓之變足生大丁（內經）○疔瘡初發突起如針蓋故謂之疔近世多見因食自死牛馬禽獸之肉而發或感襲天地暴滲之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發其形有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺人於一二日之內此之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍

疔其毒尤甚（入門）○疔瘡發無定處在乎足頭面胸背節骨間最急其餘處為緩（正傳）

疔瘡形證

逆為難治（三因）○瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉為黑點點如珠（指直）○或不痛癢只麻木寒熱眼中流大牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐○諸證中嘔吐最危○以針刺瘡不痛無血是其候也

又中陷如釘蓋攝之有根是疔也（精義）

疔瘡法

凡疔瘡毒氣攻心欲死以針刺瘡心若覺痛有血下錠子若無刺至心則皆不痛無血者急刺

百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶活三四宜用迴瘡錠子碧霞錠子迴瘡

蟾酥錠子（精義）○又法急又艾炷灸之針釘四邊皆令血出以迴瘡錠子細之上用膏藥貼之因服

五香連翹湯千金漏蘆湯（一方見上）疎下之若針之不痛無血者以猛火燒鐵針通赤於瘡上烙之全如焦炭取痛為效亦細前錠子經一二日膿漬根出服托裏湯散以瓦平復（精義）○治法急用飛龍奪命丹或雄黃丸下之去其毒熟次服化毒丸及二活散（正傳）○膏者初服賽命丹（方見上）三

丸以葱酒發表虛者服保生錠子以解毒（入門）○通治紫金錠返魂丹

一捻金神效奪命丹蟾酥丸獨蟾丸五聖湯退魂散千金消毒散選用

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香等膏

於正瘡內塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹必至危殆（綱目）○疔主兩足多有

紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面部多有紅絲入喉者俱難治急針其絲出血以泄其毒方可保生（入門）

魚臍疔

又有二種瘡頭黑深形如魚臍破之滲出黃水四畔浮紫謂之魚臍疔其毒尤甚絲瓜葉連臍葉在左脚貼左跨在右脚貼右跨在身中貼心臍并以帛縛住喉肉下紅絲皆白則安矣或蛇退燒灰雞子清調付內服神仙解毒丸（丹心）

脫疽疔

內經曰膏梁之變足生大疔蓋因膏梁酒色蘊積惡毒或久患消渴之餘多有此瘡靈樞經所謂發於足旁名曰屬疽發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不疾急斬之否則死正謂此也謂之脫疽以其指節黃爛脫去也（入門）○輕者色赤自潰先用隔蒜吳內服仙方活命飲（方見上）及補藥庶可保生○甚者赤變為黑急須還魂散重者色暗不痛先用隔蒜灸更服賽命丹（方見上）及補藥庶可保生○甚者赤變為黑急須

在指則斬在肉則割否則黑延上足必死外治用桐油及無名異煎一沸入川椒一勺看瘡大小剪葵葉在內同煎浸七日後單以此葉點瘡上即安（入門）

一方

治療疽危竈二服即愈輕者一服效土蜂房一窠蛇脫全者一條右盛器中黃泥固濟火煅存性為細末每一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止而其瘡已化為黃水矣因服五聖湯（瑞竹）疔疽死證疔瘡含蓄毒氣突岀寸許痛癢異常一二日間害人甚速是尤在癰疽之上也（直指）○疔毒入心則口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危證也萬病解毒丹（即紫金錠也）以黃連當歸煎湯化下或賽命丹淵然真人奪命丹皆可服（入門）○疔毒入心腹則煩悶嘔逆恍惚痴眠其弊可立待也（直指）○疔瘡走黃過心者難治若太重則嘔逆者難治姑用乳粉托裏散（方見下一止之三因）○疔瘡出冷汗者死（三因）○人有暴死者多是疔毒急

以燈照遍身若有小瘡急灸之并服賽命丹亦有復甦者（入門）

拔疔法

疗瘡有毒根在內須拔去乃可救黑壯牛牽於石上必撒糞候糞上生菌取焙乾與蓆葵草葉等分為末用竹筒兩頭去節套在疔上陷入肉內以線繫繩取藥末一起滴水和之放於筒內少時藥液起則疔自拔起未效則漸加度數其疔必拔拔去後以金銀白芷散調之（正傳）○宜用迴瘡鏡子或保生鏡子四聖旋疔散拔去疔根調治（精義）○蒼耳莖葉燒灰醋調塗疔上乾則易不過十度塗疔上根自出（資生）○一云蜈蚣於心腹下度取之其肉稍白點疔上根出即愈（本草）○斑蝥一枚搗破以針刺疔上封之根即出○取黑虱十枚置疔上以荻箔繩作炷灸風上即根出○白狗屎燒存性和酒服又塗疔上根自出○苦苣取莖中白汁塗疔上出根○馬齒莧和燒垢擣爛附疔上根出（本草）

○白頭蛇治八九條擂爛和酒滌去滓飲之其洋塗疔四圍留頭出毒氣○大蜘蛛一個放疔上自墮其毒連易三五個其毒自敗以蜘蛛入水不傷蜘蛛又兼用鍼針法（方見下○種痘）

紫金錠（一名萬病解毒丹治癰疽發背諸腫諸瘤疔瘡及惡瘡一切腫毒（方見解毒）每取半錢淡酒化下重者一定外以涼水調塗患處一日數次即效惟已潰出膿血者忌服（入門）

返魂丹（治十三種疔瘡危惡者雄黃白礬枯各二錢朱砂胆礬各一錢半蟾酥血竭銅綠各一錢輕粉沒藥乳香各五分麝香一字蝎牛生不拘多少右為末以蝎牛蟾酥研細和凡艾實大每一丸令病

人先嚼葱白三十許放在掌心將藥丸裹在葱內以熱酒一盞吞下（下坡處汗出為效○內經曰汗之則瘡已蓋此藥能化毒為汗也（瑞竹）

一粒金（治疔瘡即賽命丹（方見上）為末每服二三分溫酒調下如服賽命丹後毒未盡起再用此藥惟之服此藥後身涼者即死（入門）

神效奪命丹（治疔瘡惡瘡及破傷風昏沈危急者朱砂三錢半為衣輕粉血竭各二錢枯白礬蟾酥各一錢銅綠一字蝎牛二十个右為末用初男乳汁和九梧子大朱砂為衣患人自嚼生葱白數根吐出裏藥一丸以溫酒吞下如吐逆以熱酒壓下遍身汗出毒氣自消（丹心）

蟾酥丸（治疔瘡惡瘡無名腫毒朱砂雄黃各三錢麝香一字右未端午日取蟾酥和九泰米大葱酒下三丸（醫鑑）

五聖湯（治疔瘡皂角刺一兩大黃金銀花甘草各五錢瓜萎一个右剉酒二升同煎至八分溫服（入門）

還魂散（治疔瘡及癰疽能令內消去毒化為黑水從小便出萬無一失知母貝母白芨半夏天花粉皂角刺乳香金銀花穿山甲各一錢右剉作一點好酒一碗同煎至半碗去滓乘溫服將渣搗爛加芙蓉葉一兩蜜水和付瘡上如乾以蜜水潤之過一夜自消（醫鑑）

千金消毒散（治疔瘡發背一切無名惡瘡腫毒初發脈洪數強實欲作膿者當歸金銀花各二錢大黃芒硝連翹黃芩赤芍藥各一錢皂角刺牡蠣天花粉各五分右剉作一點酒水各半煎服（回春）

（春）

迴瘡錠子（治疔瘡及惡瘡不覺痛銅綠一兩硼砂二錢蟾酥一錢右末飯治療瘡頭至痛見血用此錠綿入以膏藥貼之重者於瘡四圍綿之二三日疔根自拔出（精義）○

（一名迴生錠
子丹心）

碧霞錠子（治疔瘡及惡瘡不覺痛銅綠一兩硼砂二錢蟾酥一錢右末飯和作錠子先針刺疔心出血以錠子綿之用膏貼之（精義）

迴瘡蟠酥錠子 治疔瘡天牛星致冬花巴豆肉黃丹硫礦各一錢獨活五分班貓七个右細末用新蟠酥和勻如泰末大作錠子先以針刺疔頭有血出下錠子以膏藥貼之膿出自差（精義）

飛龍奪命丹 治疔瘡及惡瘡朱砂三錢硫霜一錢半硼砂硼砂乳香沒藥黃丹血竭各二錢麝香一錢二分半南星半夏各一錢斑貓十二个去足翅巴豆十二个去皮油石為末蟠酥汁和丸紅豆大五分內取一分加入班貓四个然後捲成錠子如小麥大先用針刺疔心下錠子用飯粘紙封口用前四分內一丸噙在舌上涼水送下（丹心）

雄黃丸 治疔同上雄黃鬱金皂角金燭各一錢巴豆肉十四個麝香少許右末滴水為丸菉豆大茶清下二十九（正傳）

化毒丸 治疔同上朱砂硼砂雄黃各一錢龍臘麝香各五分輕粉一字蟬脫二十枚右為末蟾酥和丸菉豆大每用一丸放於舌上取涎而愈（正傳）

二活散 治疔瘡羌活獨活當歸烏藥赤芍藥金銀花天花粉連翹白芷甘草歸各二錢紅花蘇木荆芥蟬脫乾葛各一錢半檀香一錢右為末每三錢蒼耳煎湯調下（正傳）

獨蟾丸 治疔瘡及一切惡瘡蟠酥取得丸如菉豆大一蟾或作一丸多者作二丸每取一丸置舌上卧片時其苦水滿口即嚥下或針刺疔頭納一丸於中紙貼護之神效（正傳）

保生錠子 治疔瘡蟠酥三錢雄黃二錢為末用青桑皮生者二兩同搗如泥六分重捲作錠子朱砂為衣陰乾以冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯吞下外用針刺疔頭將錠子插人被蓋出汗二日爛出

即愈體虛清貴人及婦女胎前後毒淺者最宜（入門）

神仙解毒丸 治疔瘡魚臍瘡諸般惡瘡初發白繭不必多少鎔化作丸如菉豆大朱砂為衣每十九葱白煎湯送下一服立消（醫鑑）

金銀白芷散 治疔瘡金銀花二錢皂角刺一錢半黃耆當歸白芷甘草各一錢檳榔川芎防風天花粉各五分右為末分三貼每取一貼酒水各半煎連渣服（正傳）

四聖旋疔散 治疔瘡生於四肢勢微者先用醋調此未塗疔上次眼托裏之藥其疔自出巴豆肉五分輕粉硼砂白僵蠶各二錢半右為細末醋調用之（精義）

癰疽雜證 有癰疽寒熱有癰疽作痛有癰疽泄瀉

癰疽煩渴熱毒方盛或發大渴此乃毒氣攻心令舌乾煩渴但用補心氣藥內補即止（渭子）○癰疽發渴乃氣血兩虛八物湯（方見虛門）加黃耆麥門冬山茱萸五味子（回春）○加減八味丸

（方見虛門）治癰疽渴疾首尾通用最佳老人尤宜得效○清心竹葉湯竹葉黃芩湯人參黃耆湯黃耆六一湯金銀花散五味子湯忍冬九忍冬湯（二方見下）選用（諸方）

癰疽嘔逆 未潰時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當陰虛補之若年老人潰後嘔不能食宜用參苓白朮膏（方見內傷）補之河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵於胃也宜倍白朮（丹心）○癰疽及疔瘡惡瘡

毒氣攻心則多嘔逆宜乳粉托裏散生薑甘桔湯○食不能下服藥而嘔
六君子湯（方見瘦門）加木香縮砂（回春）○或用駕參湯即愈（丹心）○

癰疽發盛門一○瘻盛喘急六君子湯加薑裏煎服或補中益氣湯（方見內傷）加麥門冬五味子桑白

皮煎服

（回春）

癰疽寒熱癰疽未愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止或連日或間日宣服加味不換金正氣散（得效）○

癰疽虛證寒戰明乳香研細半兩每一錢熟水調下戰發於肝乳香著肝而溫之寒戰隨止（直指）

（指一）

癰疽作痛癰疽不可不痛亦不可大痛未潰前痛者為熱毒便祕者內疏黃連湯（方見上）膿脹痛者針其熱若寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒虛而痛者補之實而痛者瀉之（精義）○膿潰之後反痛者虛也宣補之機氣所觸者宜和解之風冷所逼者宜溫散之補者當歸黃耆之類和解者乳香芍藥之類溫散者防風桂枝之類（綱目）○膿血既泄腫痛尤甚入參黃耆湯或十全大補湯（方見虛門）加麥門冬五味子（回春）○止痛當歸湯二仙散香靈散選用

癰疽泄瀉癰疽泄瀉宜乳粉托裏散以木香白茯苓煎湯調下加味不換金正氣散佐之（直指）○

清臍竹葉湯治癰疽煩渴竹葉升麻黃葛根麥門冬各一錢生地黃黃芩赤芍藥人參知母白茯苓甘草炙各七分半右剝作一貼入棗二枚水煎服（精義）

竹葉黃芪湯治癰疽惡瘡發渴竹葉生地黃各一錢半黃耆麥門冬當歸川芎黃芩赤芍藥人參半夏石膏甘草各七分半右剝作一貼入薑五片水煎服（入門）

人參黃芪湯治癰疽潰後少食不眠煩熱黃芪蜜炙人參白朮各一錢升麻六分陳皮蒼朮門冬當歸神麪甘草各五分黃柏四分右剝作一貼水煎服（入門）

黃芪六一湯治癰疽煩渴黃芪蜜炙六兩甘草炙一兩右剝每三錢入薑三棗一煎服此藥大治湯瘻常服可免癰疽之患（得效）○一方黃耆六兩半生用半鹽水潤蒸三次粉草一兩半生半炙右末每二錢白朮末每二錢白朮湯點服（精要）

金銀花散治同上金銀花四兩甘草炒一兩右

五味子湯癰疽口瘻舌乾此腎水竭也此藥治之五味子黃蓮生人參
麥門冬甘草各一錢右作一貼水煎日服三五次（精要）

乳粉托裏散治癰疽惡瘡毒氣攻心迷妄嘔吐舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥最能逐出毒氣不致內陷集玉粉四錢乳香一錢右為末每二錢甘草湯調時時呷下一方新水調服（入門）

○一名內托散一名護心散一名內托香粉散（綱目）○一方癰疽疔瘡疽須服此預防毒氣攻心菜豆粉四兩乳香一兩朱砂三錢右為末每二錢甘草湯調下名曰乳香護心散（丹心）

生薑甘桔湯治癰疽毒氣上衝咽膈壅塞嘔吐不已桔梗一兩甘草生薑各五錢右剉作井水煎服（直指）

加味不換金正氣散治癰疽寒熱往來或挾風邪或內氣虛餓蒼朮橘紅半夏蔻仁厚朴各一錢二分半甘草吳一錢白茯苓川芎各七分半木香五分右剉作一貼入薑五錢二水煎服

止痛當歸湯治癰疽穿潰疼痛人參黃芪當歸白芍藥生地黃官桂甘草各一錢右粗末水煎服日三（精義）

二仙散治癰疽疼不可忍用白芷○木漬用二兩已煮用五錢○貝母未漬用五錢已漬用一兩○右剉每七錢半作一貼酒水相半煎服（醫鑑）

香靈散治癰疽腹痛桂枝二錢半木香白芍藥五靈脂各一錢二分半右粗末每三錢入薑棗煎服（直指）

托裏溫中湯治癰疽陽氣下陷腹痛泄瀉咳嗽逆嘔附子炮二錢乾薑羌活各一錢二分半甘草炙一錢益智丁香沈香木香回香陳皮各五分右剉作一點入薑五片水煎服（入門）

癰疽通治藥千金漏蘆湯五香連翹湯仙方活命飲升陽益胃散千金內消散仙傳化毒湯榮衛返魂湯

千金漏蘆湯治五發癰疽及疔瘡內疽一切

五香連翹湯癰疽瘡癰瘡結核乳癰內疽一惡瘡毒腫皆治之（方見上）

仙方活命飲一切癰疽惡瘡毒腫皆治之（方見上）

升陽益胃散五發癰疽及內外一切惡瘡毒腫皆治之（方見上）

千金內消散五發癰疽及背癰內疽一切惡瘡毒腫

仙傳化毒湯癰疽發背內疽乳癰一切無名瘡毒皆治之（方見上）

擎衛返魂湯 凡氣逆於內理令癰結為癰疽毒腫此藥大能順氣勻血調和擎衛通治一切諸癰

紫金錠 治內外癰疽惡瘡疔瘡無名腫毒乳癰便毒(方見上)

賽命丹 治內外癰疽發背疔瘡乳癰魚口便毒一切無名腫惡瘡(方見上)

淵然真人奪命丹 五發癰疽發背疔瘡惡瘡無名腫毒皆治之(方見上)

飛龍奪命丹 治五發癰疽發背疔瘡惡瘡乳癰附骨疽 一切無名腫毒(方見上)

忍冬丸 通治一切癰疽諸瘡消渴後發痘尤宜服此忍冬草不以多少根莖花葉皆可用右入瓶內好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許搗為細末以所浸酒打麯糊和丸梧子大每服百丸酒煎下

(鉗任下)
(精要)

忍冬酒 治一切癰疽惡瘡背癰乳癰不問發在何處初發便當服此百發百中忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和塗付四圍中心留一口又取五兩搗碎甘草生一兩剉入砂盆內水二碗文武火煎至一碗入好酒一大碗煎數三沸分三服田父野老最服此(丹心)

忍冬湯 治一切癰疽內發外發乳癰腸癰常服托裏消毒支加黃芪當歸各二兩元妙方與上忍冬酒方同(入門)

癰疽針法 (鉗針者末如劍鋒以取大膿)○夫癰氣之息者宜以針開除去之註云息與痘同死肉也

癰疽針法 (內經)○癰疽成膿以馬卸鐵作針形如韭菜兩面皆利可以橫直開裂以取膿血(精要)○癰疽如板眼數十粒或如蜂窠逢房而膿出痛不除宜以鉗針橫直裂之則毒血挾膿出而愈(綱目)○

癰疽住膿若不針烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不針烙反攻其內欲望其生豈可得乎癰皮薄惟用針以決其膿血不可烙也(精義)○凡近筋脈骨節處不得亂行針烙○癰疽皮厚口小膿水出不快者宜用針烙(精義)○大抵用針只欲引膿出如針刺無膿是氣伏也不可用針烙(涓子)

蜞針法 癰癰初發大以溫紙一片搭瘡上其一點先乾處即是正頂先以水洗去人定鹹取大筆管一個安於正頂上却用大水蛭一條安其中頻以冷水灌之蛭當吮其正穴膿血皮繖內自是毒散

無不差如毒大蛭小須用三四條方見效若吮著正穴蛭必死用水救活累試奇效如血不止以鴉節上泥塗之(得效)○蜞針一法可施於輕小證候若癰疽大毒積在藏府徒喝其血於外無益也(丹心)

癰疽烙法或問烙法何如曰臘或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴者不用烙以開竅脈臘何由出○臘本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則毒侵淫而好肉亦化為膿腐此所以烙法有功乎清瘡也（涓子）○癰疽成膿宜烙可用銀鑄大二分長六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得臘為效（精要）○近代良醫只以金銀鐵鉛其樣如針者以木炭熟火猛燒通赤蘇油烙之尤妙隨針烙出臘者順也如膿不出實者撲髮為好虛者以紙為帷於帷上蘸藥紙入針孔引出臘毒如腫不退疼不除急服排膿托裏湯藥以助其勢○臘色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出（精要）

癰疽灸法凡癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內熱若於生發之處艾灸以散其毒治之於早可以移謀為淺改重於輕諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法一方見針灸一尤滿切要此消患於未形之策（丹心）○癰疽已覺微漫腫硬皮不變色脈沈不痛者當外灸之引邪氣出而方止經曰陷下者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸如有膿水亦不可灸當針之（保命）○癰疽初覺腫痛先以濕紙覆其上視之先乾處是頭也大蒜切片安頭上以大艾炷灸之二壯即換一蒜痛者灸之不痛不痛者灸至痛乃止大概以百壯為準最要早覺早灸為上如有頭則不必紙覆也（三因）○若十數箇作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於餅上灸之（三因）○初發小點一二日急以蒜片貼其中心以小艾炷灸五壯而止（直指）○始發一二日十灸十活三四日六七活五六日三四活（綱目）○灸法所以暢達拔引鬱毒此從治之意也譬如盜入人家必開門逐之使出萬一門不開無從而出必傷主乃已（綱目）○頭為諸陽之會若有發宜灸艾炷宜小壯數宣少三五壯而已腹背則多灸為妙（精義）○多灸則內服乳粉托裏散防火氣入心（丹心）○有善治癰疽者皆於瘡上灸至二三百壯無有不愈但艾炷小作之小則人不畏灸多創作故必矣一資生○隔蒜灸法豆豉餅灸法桑枝灸法附子灸法硫黃灸法土餅灸法並治癰疽惡瘡腫毒（詳見針灸）

艾灸治驗一人發背醫療逾月勢益甚有張生者教以艾火灸其上至一百五十壯知痛乃止明日鑷去黑痂膿盡潰肉理皆紅不復痛乃以膏藥貼之日一易易時剪去黑爛月餘乃平復（李事）

灸石燶法堅硬不滑名曰石燶當上灸

百壯石子當碎出（資生）

灸發頤法此瘡最險頭面腫大牙齒亦脫解開頭髮尋項螺中

灸二十一壯如不達灸至四十九壯而止（直指）

灸疔疽法大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之

以燙為度不燙難愈灸百壯無不愈（正傳）

灸便毒法用細草隨患者左手右手中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指盡則住不量爪甲切斷却將此草於手腕橫紋量起引草向臂當中草盡處即是穴艾炷如麥大灸二三壯腫散痛止即

調理及禁忌法 擦痘患時將理法避風邪○少睡卧○勿驚憂○勿嗔怒○徐行動○省言語○戒閨房○絕思慮○防觸織○聽好事○瘡潰洗○藥常助○鹽漱聞香○二便順序○擇飲食肉充○無飢飽失度○付藥選掉屈伸瘡口常加愛護○妄用惡草愈激其毒○不忘飲食反害其瘡(直指)○惡肉去盡瘡口收斂欲平之際尚忘起立行步揖待賓客酒肉宴會瞋怒沐浴勞動等事直待瘡痂平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯(精義)○瘡痘最宜節慎飲食其熱毒方或或發大渴多飲冷水及水漿之類此乃毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣兼內補臟腑即止矣(丹心)○凡瘡疽勿食羊雞牛鵝魚麵煎燶炙炒法酒等味犯之必發熱蓋厚味能引起宿火之熱此誠富貴奉養口腹者所宜謹守若冬寒與虛老人罕無權法乎畧加滋味以補胃氣庶易收效(丹心)○膿瀆之後氣血虛弱則可食羊肉鵝羹(善華)鳳齊肺病軟飲若肌肉新生思想滋味則宜食白熟酥餅蕭粥羹湯熟軟溫和令勿大飽(精義)○諸痛癢瘡瘍皆屬於心如扶苓扶神遠忘益智石菖蒲等葦須當佐助於其間抑使病人不得憂愁慳慤精疲神有觸於心尤開利害(直指)○背疽之人難於應几用菉豆十餘斗作一大袋隱伏則自然心涼身安(精要)○瘡瘍面赤雖伏火熱禁不得攻裏宣發表以去之○瘡瘍鬱冒俗呼昏迷慎不可下汗之創愈(東垣)

單方 有陶潛膏

凡三十七種

也(入門)

煉石 諸惡腫及發背取石子火燒赤醋淬一錢度取屑

甘菊 治癰毒及疔腫垂死葉搗取汁飲一升神驗
又取莖葉塗付疔上亦效名曰陶潛膏(醫鑑)

野菊花 治醉睡覺痛定熱除(入門)

生地黃 治一切癰腫地黃搗為泥糊布上捲木香末

生地黃於中再捲地黃泥貼腫上三度差(本草)

(本草)

伏龍肝 諸瘡疽發背一切腫毒以雞子黃和童之
或醋調或大蒜同研貼之並佳(本草)

治療瘡野菊花葉煎為末酒調

白鳳仙花 治惡處後付藥一日一換如神(回春)

(本草)

黃芪 治瘡痘久敗瘡排膿止痛潰煎服之

薜荔 治背癰取葉爛研取汁和蜜微敷以滓付瘡忍冬藤葉生搗燒酒調服(直指)

(本草)

耳一握生薑四兩搗取汁入酒和服治疔毒入心嘔逆者效(入門)

蒼耳

主疔瘡取莖葉燒存性醋調塗疔上當出根加雄黃尤妙○又方蒼耳一握生薑四兩搗取汁入酒和服治疔毒入心嘔逆者效(入門)

白芷 治發背乳癰能止痛生肌蝕膿○
敗膿不去加白芷即去(丹心)

茅針 麻疽惡瘡不作頭酒煎茅針取汁服
一針一孔二針二孔必穿穴(本草)

大黃 治癰疽熱毒大黃酒洗剉二錢甘草
錢煎服脉實膏梁之人宜服(綱目)

黃藥 取根莖搗付腫毒癰上即
消水煎服亦效(俗方)

槐花 治百疊瘡毒槐花四兩炒香入酒三
椀二三沸去滓盡服即消(入門)

黃桑葉 療疽瘡口成大窟不斂經霜黃桑葉
為未頻移瘡中或煎湯洗之(本艸)

乳香 止痛長肉令諸瘡內消○凡血渴則氣壅經絡
痛腫乳香能破宿血消腫止痛為瘡家奇藥也(入門)

黃桑葉 療疽瘡口成大窟不斂經霜黃桑葉
為未頻移瘡中或煎湯洗之(本艸)

皂角刺 治癰疽能鑽至痛處亦能宣毒燒
存性為末蓮酒調下一錢(綱目)

槲木皮 煎湯洗諸敗爛瘡及乳
癰諸瘡最佳(本草)

生蠶刺 取血塗瘡疽腫毒
即消神驗(俗方)

蜘蛛 治懸瘡取大者一個研爛調
服隨病左右側卧良(醫林)

脂麻油 治癰疽發背毒瘡初作便脈使毒氣不內攻
和勻分五次溫服一日夜服盡此神仙截法(直指)

甜瓜子 主腹內結聚破潰膿血最消腸胃腹
痛(本草)

雄雀屎 一名白丁青治癰疽已有膿未潰出以醋
調雀屎如小豆大付之即穿出膿(本草)

胡荽子 內癰要藥為末酒下二三錢(本草)

蜀葵花 諸癰瘡不可忍葵花根搗爛貼之立效
○黃蜀葵花葉入鹽研爛付左效(綱目)

胡搗麻油 調和厚付瘡上乾則易神效(本草)

人口中唾 凡癰瘡微有紅頭隱疼者急用不語津唾
人人口中唾頻頻塗之自消飲酒了不可用(綱目)

猪胰蹄 治癰疽潰爛取猪蹄濃

商陸 治癰疽付惡瘡○一切熱毒腫商
陸根和少鹽搗付日一易效(本草)

芒根 癰疽發背未成膿者些根葉熟搗
付上日數易腫消即差(本草)

醋 消癰腫歌曰發背疔瘡者稀醋磨京墨燒四
圍生薑猪胆同塗上天明恰似鬼神移(種痘)

赤小豆 消熱毒癰腫作末雞子清調塗之
即差亦治一切腫毒作痛(本草)

芙蓉 治發背瘡癰諸般腫毒及杖瘡芙蓉花及葉並葉
乾為末醋調付杖瘡雖白清調白蓮尤佳(丹心)

人屎 瘡疽發背欲死取野人屎燒存性醋和如泥付腫
上乾則易甚良又治療腫封其上一日根爛(本草)

荆芥 捣爛和醋付疔腫甚妙又水
煎取濃汁服之亦可(本草)

大風瘡

脈風成為癰瘍者紫衛熱腐其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚也者內經○大風之源有三種死五死一種風水二種傳變三種者自不調攝○五死者一曰皮死麻木不仁二曰肉死割切不痛三

曰血死潰爛成臘四曰筋死手足脱落五曰骨死鼻梁崩塌眼瞼唇翻聲啞○又曰一風者肺受病先落眉毛二風者肝受病面起紫瘡三風者腎受病脚底先穿四風者脾受病遍身如癬五風者心受病先

先損其目○或有攻墓居址風水不吉或父母夫妻家人適相傳染或在外不謹囊坑房室床鋪衣被橋上樹下歇息去處命值委死凶星遭此惡疾宜服消風散追風散磨風丸兼用洗藥敷藥（脩然子）

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癩風者以其酷烈暴悍可憲也得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物蟲積於較道中出所出雖有上下之殊然皆不外乎陽明一經蓋陽明者胃與大腸無物不受乃肺二藏之府也肺主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也（丹心）○服藥下衄積後用防風通聖散（方見風門）調之重者又與換肌散夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心罕能免此若遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務悉宜屏去（丹心）○此疾雖治得愈若不絕味斷歎皆不免再發而終於不救孫真人曰嘗治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無人能守禁忘耳（丹心）○初起白屑紫雲如癩風然或有遍身白皮脫落如蛇蛻狀（得效）○起白屑者白花蛇丸眉鬚落者三蛇丹鼻崩者換肌散補氣瀉榮湯通用凌霄花散加味苦參丸換骨丸大麻風丸紫雲風丸返魂追命再造散烏蛇苦參丸可選用（諸方）○治瘡以蒼耳葉為君更以酒煮烏龜魚代蛇補之或研為末糊丸梧子大茶清下七八十九丸更入紫草尤捷數月而安（丹心）○服藥瘳後終身不得食牛馬驥驥等肉犯者復發必死（得效）

消風散

（第一日服白芷全蝎人參各一兩右為末每二錢勿食晚飯次日空心溫酒調下身上微燥為效（類聚）

追風散（第二日服蕩血追虫綿紺大黃六兩鬱金蟬肚者一兩八錢炒皂角刺一兩半右為末初服五錢或六錢入大風油一錢半朴硝少許入內好溫酒一碗調化五更空心服之直待辰時又如前調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水盐漱淨然後服藥必以蜜解口切不可卧良久痛渴數次不妨以薄粥補之○此藥老弱者難治五十以下者可治精壯者十日內三服謂如正月初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸又加此周而復始瘦弱者十日內一服（類聚）

磨風丸

（第三日服日進二次當歸羌活獨活川芎天麻細辛防風荆芥威靈仙麻黃何首烏蔓荊子牛蒡子草前子細面草（即豨莶也）蒼耳草各一兩右晒乾為末酒麵糊和丸梧子大溫酒下五七十丸日二服仍用後藥

熏洗移付（類聚）

洗藥

（治滿身瘡爛地骨皮荆芥苦參細辛各二兩右剉以河水煎用大桶盛浸浴薰洗通身出血為效（類聚）

敷藥治瘡瘍遍身黑狗膏（即黃藥也）寒水石硫磺白礬桂各二
兩蛇床子一兩朴硝五錢右為末臘猪脂調付妙（類聚）

浴法治遍身瘡瘍桃柳桑槐楮五般枝多水濃煎湯盛大桶浸坐沒頭一日俟湯如油安矣（正傳）

醉仙散治大風瘡瘍胡麻牛蒡子枸杞子蔓荆子各一兩

同炒白蒺藜苦參瓜萎根防風各五錢右細末每十五錢末入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭

黃連薄荷燒炙之物只吃淡粥及煮熟時菜并烏蛇白花蛇淡酒煮熟食之以助藥力（丹心）

魚肉油膩燒炙之物只吃淡粥及煮熟時菜并烏蛇白花蛇淡酒煮熟食之以助藥力（丹心）

通天再造散治同上皂角刺黑大者一兩半大黃根一兩白牽牛頭末三錢炒三錢生蠔金五錢右為末

每二錢或三錢早晨面東好酒調下當日利下惡物或膿或虫（入門）○服藥後泄出虫視其色如虫黑色乃是多年赤色是為近年三四日後又進一服直候無虫乃止

後取防風燒聖散（方見風門）加苦參天麻蟬脫煎服調理痛斷滋味（丹心）

換肌散治大風年深毛脫鼻塌深重者取效如神烏蛇白花蛇地龍各一兩當歸細辛白芷天麻蔓荆子

威靈仙荊芥穗甘菊苦參紫參沙參木誠不灰木甘草炙白蒺藜天門冬赤芍藥赤箭何首烏石

菖蒲胡麻子草烏蒼朮木鼈子川芎各三錢半右為末每五

錢溫酒調下酒多為妙其中紫參不灰木雖無不妨（正傳）

補氣瀉榮湯治癰風先砭瘡上令惡氣消盡後服此藥速翹升麻各六分桔梗五分黃芩生地黃各四分

黃耆蘇木黃連地龍全竭當歸各五分白芷葛根各二分甘草一分半胡桐液一分麝香

少許桃仁三個為泥蕊蟲炒水蛭炒各三個為末右剉除梧桐液麝香蟲水蛭另末外都

作一貼水二盞酒一盞煎至一盞去滓入細末藥煎至七分早飯後午飯後服之（東垣）

凌霄花治癰風神效蟬殼地龍炒白僵蠶全蝎炒各七個

凌霄花五錢右為末每二錢熱酒調下（丹心）

加味苦參丸治大風瘡苦參四兩防風荆芥蒼耳子胡麻子皂角刺各二兩半蔓荆子牛蒡子枸杞子何

大麻風丸治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒麻木證苦參一斤羌活白芷白芍白蒺藜天花粉何首烏各一兩三錢皂角刺當歸各二兩七錢右為末別用皂角一斤剉水煎五日去滓熬

門八

換骨丸治癰風苦參浮萍各一兩半大黃槐花白芷川芎各一兩二錢半蒼朮一兩乳香沒藥沈香木香各三錢麝香五分右為末以麻黃五斤煎膏和丸彈子大每一丸溫酒下化忌風二三日（入門）

大麻風丸治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒麻木證苦參一斤羌活白芷白芍白蒺藜天花粉何首烏各一兩三錢皂角刺當歸各二兩七錢右為末別用皂角一斤剉水煎五日去滓熬

紫雲丸雨半慈實羌活獨活白芷細辛生地黃防己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥荳蔻各一兩右為末

酒糊和丸梧子大溫酒或米飯下七十九(入門)

返魂追命再造散治大風癩皂角刺一兩半大黃一兩右為末每二錢冷酒調下瀉蟲出(直指)○一方

返魂追命再造散治大風勢重不可救者皂角刺一二斤九蒸九晒研為末食上濃煎大黃湯調下一錢

一句鬚髮再生肌膚悅潤眼明倍常其效如神(本草)

烏蛇苦參丸治癩風及惡瘻苦參一斤半烏蛇肉八兩石菖蒲

白癩瘡(初起白屑剝落又一種每朝瘡上逕白皮一升許如蛇蠍宜服解毒雄黃丸(方見咽喉)兼服白芷丸(得效)

吞下五十九

日二(入門)

白癩瘡(初起白屑剝落又一種每朝瘡上逕白皮一升許如蛇

白花蛇酒法治大風癩瘡白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先安酒麯次將蛇以絹袋盛之頓於麯上然後以糯飯和勻搗於蛇上以紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每溫酒一

益調蛇末一匙服之仍以酒腳并糖做餅食之○烏蛇釀酒法亦同上(本草)

八十九(入門)

白花蛇酒法治大風癩瘡白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先安酒麯次將蛇以絹袋盛之頓於麯上然

後以糯飯和勻搗於蛇上以紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每溫酒一

益調蛇末一匙服之仍以酒腳并糖做餅食之○烏蛇釀酒法亦同上(本草)

針法(癩風者素刺其腫上已刺以銑針針其處接出其惡氣腫盡乃止常食方食無食他食(靈樞)○病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止針(內

經)○癩風以三棱針看肉紫黑處及委中(穴名)

紫脈出死血但不可令出太過恐損真氣(正傳)

天疱瘡(一名楊梅瘡與癩大同多由肝脾腎風濕熱之毒因男女房室傳染形如楊梅城紅濕爛癢痛者屬心多生乳腸○形如鼓釘黃豆者屬脾多生滿面○形如綿花者屬肺多生毛髮○形如紫葡萄按之繫痛者屬肝腎多叢生於尻脣兩陰筋骨之處○形如魚瘡內多白水按之不堅者謂之天瘡瘡乃此類之輕者(入門)○初起即服防風通聖散一貼去麻黃以去內毒再用一貼去硝黃發汗以去外

毒以後用加減通聖散丸多服之此方為首尾要藥輕者一劑重者十劑後宜服化毒散三日却用吹藥三日瘡乾欲落欲落再服化潔散三日後量用通聖散加減（入門）○失治久則風毒流入經絡而成頑癬或氣血虛敗而成漏或誤服水銀輕粉而成風堆腫爛流膿出汗病至於此治之尤難亦有亂傷眼鼻腐爛玉立攀掣肢體與癰無異（入門）○初起宜服消風散加減通聖散加減通聖丸從壯皮起者裏熱發於外連服防風通聖散（方見風門）○成頑癬者宜皂根丸○成腫塊者宜仙遺根丸西聖復煎丸消腫遺報湯○筋骨痛宜香鱠湯通仙五寶丹仙遺根湯換骨散回生保命丹扶苓湯○成漏宜象牙丸○通治宜用活魂丹水硃丸六六九天疮丸三黃散毒散輕粉法○外治宜洗方擦方熏鼻方吹藥方照藥方滅癥法禁忌法鴟掌癬（治方）

加減通聖散（治楊梅瘡初起牛蒡子一錢二分防風白鮮皮赤芍藥達翹黃芩各一錢金銀花五分橘子仁當歸尾各七分荆芥槐花各六分白僵蠶甘草各四分右剉作一貼水煎服（入門）

加減通聖丸（治同上即前方去半斤再加苦參半斤右為末酒

糊或蜜丸和梧子大酒飲任下七十九（入門）

化毒散（治楊梅瘡重者生大黃一兩（解熱毒）穿山甲五錢（解毒）白僵蠶三錢（去風）蜈蚣一條（去頭）當歸尾五錢（破血）右為末每二錢溫酒調下日二服（入門）

清風敗毒散（治天疮楊梅瘡初起當歸尾川芎赤芍藥升麻乾葛黃芩生地黃各一錢黃連黃柏連翹黃芩各五錢白芥子四錢當歸身七錢右為末蜜丸梧子大酒飲任下五七十丸或浸酒服忌生

冷鮮豬魚煎炒

後勿用○右剉作一

貼水煎服（回春）

等物（入門）

皂根丸

（治楊梅瘡成頑癬當歸二兩黃耆一兩半人參陳艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩右為末蜜丸梧子大土茯苓湯下五十九（入門）

仙遺糧丸

（治楊梅瘡後腫塊成癰土茯苓一斤防風木通薏苡仁防己白朮苓金銀花木瓜白鮮皮皂角刺各五錢白芥子四錢當歸身七錢右為末蜜丸梧子大酒飲任下五七十丸或浸酒服忌生

冷鮮豬魚煎炒

等物（入門）

西聖復煎丸

（治楊梅瘡後腫塊經年破而難愈百方不效用此如神乳膏沒藥孩兒茶丁香各一兩白花蛇阿魏血竭各四錢俱為末白麵炒一斤蜂蜜六兩煉香油四兩煎熟大棗二十枚去皮核

右和勻搗千杵丸如彈子大每一丸土茯苓二兩水二碗煎至一碗入藥丸再煎至半去滓溫服（回春）

消腫遺糧湯

（治楊梅瘡後腫塊土茯苓十五兩木通薏苡仁防風防己赤朮苓金銀花木瓜白鮮皮皂角刺各五錢白芥子炒研四錢當歸身七錢右剉分作二十貼每一貼水煎服朝夕兩服（丹舟）

香鱗湯 治楊梅瘡
同炒成珠乳香一錢在剉分作一貼每一貼薑蔻各五水煎服二三貼即愈 (回春)

通聖五寶丹 治楊梅天疤綿花等瘡潰爛見骨或筋骨疼痛或遍身光磨或成赤白癩癩掌瓣或皮破肉

半右細末每服五釐另入飛白霜二分半炒過合作一貼每日取土茯苓一斤水煎取汁十碗以湯一
碗入藥一貼攪勻晨服其茯苓湯須一日服盡不可別用湯水服一料即愈神驗乃治楊梅天下古今

第一仙方也 (回春)

○飛白霜疑是輕粉

仙遺糧湯 治楊梅風毒或誤服輕粉以至癰瘡筋骨疼痛毀肌傷骨者服此除根永無後患土茯苓七錢

溫者一兩) 防風木瓜木通薏苡仁白鮮皮金銀花各五分皂角刺四分右剉作一貼水煎日

三服 (入門)

換骨散 治天疤瘡筋骨疼痛土茯苓四兩皂角刺一兩半天花粉當歸荆芥麻黃梔子連翹各一
兩乳香沒藥各一錢半右剉分作十貼每貼一貼水三碗煎至一碗分二次服之醫鑑

回生保命丹 治楊梅天疤頑瘡及輕粉毒筋骨腫痛不拘新久皆效槐花一兩輕粉四錢二分朱砂四錢

川芎白芷雄黃各三錢當歸炒二錢丁香血竭孩兒茶各一錢乳香沒藥各五分牛黃四分

右為末粟米入末粉打糊和丸黍米大用土茯

苓一兩子皂半个同煎湯吞下日三服 (醫鑑)

茯苓湯 治遠近楊梅天疤瘡毒甚至腐爛肌肉濃汁流出真不可聞痛不可忍薏苡仁皂角刺木瓜白芷
當歸尾黃柏生地黃牛膝白芍藥防風各一兩皂角川椒紅花各五錢甘草節羌活各七錢金銀

花二兩土茯苓四兩右剉分作十五貼

貼每一貼水煎服日二次 (醫鑑)

象牙九 治楊梅瘡成漏象牙三錢鼈甲獨皮並燒各一個右為末粟米和丸櫻桃大每

一九空心以童尿化下茶清亦可七日後取三味末猪胆汁調付瘡上 (入門)

活魂丹 治楊梅天疤瘡潰爛喉穿鼻崩膿血淋漓血竭乳香沒藥白芷桔黃丹穿山甲燭焦各一錢
輕粉蟾酥各五分麝香一字右細末蠅牛研如泥和丸菉豆大每一丸重者二丸細嚼葱白裏藥

熱酒送下空心 (正傳)

水硃丸 治年久楊梅積瘡不愈者水花硃 (即輕粉也) 一錢桔白礬硃砂各一錢半右為末
用全蝎酒煎膏和勻分作六丸分三日服云羊肉鮮魚等湯送下九日全愈 (入門)

六六丸 治天疤楊梅瘡輕粉一錢三分黃丹八分硃砂雄黃各五分乳香麝香各三分右為末
糊和勻分作六丸每日茶清下一丸 (治疤痕方)

天疤丸 治同上輕粉一錢半硃砂雄黃陳石灰各半錢右為本陳米飯和九蒸豆大每三九茶清吞下(治疤方)

三黃敗毒散 通治天疤楊梅等瘡防風荆芥連翹白芷當歸赤芍藥黃芩黃連桔子地骨皮五加皮白芍皮木瓜苦參蟬退金銀花薏苡仁白僵蠶皂角刺黃柏白蒺藜川芎(上部倍用)木通(下部倍用)木通(下部倍用)

作二十五貼每取一貼水煎服日二(醫鑑)

取輕粉法 取出服內輕粉之毒可免後應用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下三粒即利輕粉於椒內從大便出洗起川椒服至椒內無輕粉乃止(入門)

仙道根 善治久病天疤楊梅癰漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨疼痛者能收其毒而祛其風補其虛仙道根古一味為末蜜丸倍子大川椒煎湯吞下五十九鼻崩眉落筋緩骨牽者皆效但初起肺熱便祕者勿服

(入門)

一方 治楊梅天疤諸瘡香油二斤入水一盞煎至白烟起收匙每用黃酒一鐘入油一盞溫服日三次服盡全愈○又方鴨一隻鐵二日只與白水飲之用輕粉一兩粳米飯四兩拌勻喂鴨待吃盡以葦根槌碎泡水令鴨食之解去輕粉之毒待鴨毛落盡煮鴨食之(種舌)

洗藥方 治楊梅瘡爛防風荳耳子地骨皮荆芥苦參細辛各三兩剉以河水煎盛大桶浸浴熏洗通身出汗出血為效(醫鑑)○又方苦參蛇床子白礬荆芥濃煎湯浸洗(得效)○又桃柳桑槐楮濃煎湯浸浴亦妙(入門)○又用干

佳(入門)

搽藥方 治楊梅瘡乳香沒藥血竭雄黃杏仁十四枚針桃火上燒半生半熟輕粉一錢片腦二錢為末猪胆汁或香油調搽(入門)○又野菊花棗木根煎湯洗後防風通聖散同蚯蚓糞為末畧炒蜜調付之極

金散麝香輕粉散

千金散 治楊梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢輕粉孩兒茶白礬枯各五分胆壁三份先以猪胆汁洗瘡後搽上(醫鑑)

麝香輕粉散 錢麝香五分右為末每取少許搽付之(治疤痕)

熏鼻方 治楊梅天疤瘡熏鼻甚奇黑鉛水銀各一錢朱砂乳香沒藥各五分血竭雄黃沈香各三分右為未和勻捲作線燃七條用香油點燈放床上令病人放兩脚包住上用草被通身蓋之口噙涼水頻換則不損口頭初日用三條後日每用一條熏之(丹心)○又方水銀白錫百草霜各一錢先將錫

次三日九次愈痊（醫鑑）

吹藥方 治楊梅天疮瘡黑鉛八分熔化入水銀一錢同結成餅銀珠（即輕粉）一錢半炒白礬雄黃各一錢為末裏肉搏勻分作六丸每取一丸放火籠內命病人以巾包頭口吹眼看其藥丸待烟盡即

止當日早午晚各吹一丸次日早午吹二丸第三日只早吹一丸吹後三五日或口流涎以黃連姜豆煎湯解之又服化毒散（方見上）三日後以加減還聖散丸（方見上）調理斷根（入門）

照藥方 服後芩湯後次用照藥水銀黃丹炒白錫各一錢血竭末五錢京香三分無麝香者去為末用熟艾鋪紙入藥在中捲作條放盞內入香油一碗將藥條作燈芯點火安木桶內四圍用單被圍住勿泄氣明看燈口噙涼水熱

則換水盡藥條為度（醫鑑）

滅癩法 治天疮楊梅瘡愈後癩痕紅黑用大黃白礬茶油膾平熱等物痛斷酒色鹽宜炒食（回春）

鵝掌鱗 治天疮楊梅瘡服輕粉愈後手掌上發癩退皮一層生生不絕名曰鵝掌鱗亦曰鵝掌風宜服蒼耳散擦玉脂膏（醫鑑）○一方猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定煮爛食之次日用白鮮皮皂角雄黃各五分鉛炒水銀三分為末臨卧以鵝脂薑汁調擦次早以磁鋒磨括去粗皮服蒼耳散擦玉脂膏更免勞宮或內關穴斷根（入門）○又方黃丹輕粉等分為末猪油調擦○川烏草烏何首烏天花粉赤芍藥防風荆芥蒼朮地丁各一兩艾葉四兩煎水熏洗立效（回春）

蒼耳散 治鵝掌瘡猪牙皂角土茯苓甘草各一錢蒼耳子全銀花皂角刺防風荆芥連翹各一錢天麻前胡蛇床子各五分右剉作一貼薑一片川椒一撮同煎服（醫鑑）

玉脂膏 同上牛乳柏油（無則搗脂代之）香油黃蠟各一兩熔化乃入胡粉二錢輕粉

瘻癩 瘰癩之證內經謂之結核是也生頸前項側核結如大豆如銀杏曰瘰癩生胸腹腋下堅硬如石形如馬刀蛤曰馬刀（入門）○蟠核連續者為瘰癩形長如蛤者為馬刀（綱目）○繞項起核名曰蟠蛇癩

多生肩項或赤或白或沈或浮初生如豆久似核年月經久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或生六七是也用性努力思慮過久則疼痛赤腫早治為上（綱目）○流注應者婦人多有之其性急躁其氣怫鬱真熱著初生在項破後流注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或流濃汁是也又名千歲瘻化氣調經湯主之（綱目）○瘰癩始起於少陽不守禁忘延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積皆此二端招引變換以其屬脾經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若用經行寒熱不作則可生稍久轉為潮熱危矣自非斷然絕慮食淡雖神聖不可治也（丹心）○胆與肝

合且主筋病則筋累累如貫珠寒熱微痛乃肝氣動而為病也當清肝火為主宜清肝益榮湯（方見五藏一茶胡清肝湯）○肝燥火動而筋掣補中勝毒餅為主多怒火膽斑貓為王滲泄小便以渴心火立應散是也然性甚峻服後量體調治實者宣熱丹虛者托裏益氣湯（方見癰疽）○入門○療癰之毒莫不有根地胆斑貓製度如法能使其根從小便中出或如榆片或如塊血或如爛肉皆其驗耳但毒根之行小便必澀當以木通滑石輩導之然是毒必從小便出者何哉蓋諸痛癰瘍皆屬於心故也（直指）○通治宜化氣調經湯貓頭丸海藻散堅丸宣熱丹三聖丸小犀角丸散腫清堅湯內消丸琥珀散蠟蠅丸天花散夏枯草散○瀉肝胆火宜梔子清肝湯○瀉毒宜立應散薄荷丹白蛇丹四聖散○補虛補中勝毒餅益氣養榮湯○馬刀瘡百連翹散堅湯消癰湯柴胡通經湯（諸方）

化氣調經湯（通治流注癰瘍橘皮二兩香附子酒浸製羌活白芷各一兩牡蠣粉

目）

天花粉皂角刺甘草各五錢右為末每二錢清酒調下日三（細目）

梔子清肝湯治肝胆火盛耳後頸項胸乳等處結核腫痛寒熱柴胡二錢梔子酒炒牡丹皮各一錢三分

赤茯苓川芍赤芍藥當歸牛蒡子各一錢青皮甘草炙各五分右判作一貼水煎服（入門）

補中勝毒餅治瘰疬馬刀瘡黃芪一錢半連翹一錢防風升麻柴胡甘草各五分當歸生地黃熟地黃白

芍藥陳皮人參各三分右為末湯浸蒸餅調和捏作一餅子晒乾每一餅搗為末白湯調下

門一

夏枯草散（大治療瘰疬結氣有補養厥陰血脈之功夏枯草末六錢甘草末一錢右和勻每二錢茶清調

下○又取一雨水煎服虛者多服益善兼服十全大補湯（方見虛門）加香附遠志貝母治瘰

癰馬刀退寒熱之聖藥也（入門）

猫頭丸（治療癰馬刀已破未破皆效猫頭骨一个炙蝙蝠一个以硃砂三錢填入腹內瓦上

炙焦南星白朮各一兩右為末黃蠅蛤化丸（桑豆大臨半米飲下三十丸（入門）

海藻散堅丸（治療癰馬刀堅硬形瘦朝熟東治癰氣神曲四錢海藻昆布草龍胆蛤粉通草貝母白朮桔

梗各三錢半夏二錢右為末蜜丸菉豆大葱白湯下三十九或取末二錢溫酒調服（入門）

門一

宣熱丹（解瘰疬風熱之毒自小便出薄荷皂角連翹何首烏蔓荆子三錢荆芥各一兩

右為末熱醋浸丘鼓二兩半搗膏和丸梧子大熱水下三十九日一服（入門）

三聖丸（通治瘰疬丁香五十粒斑貓十个去毒炒麝香一錢右為末鹽鼓五十粒易浸研如泥和丸菉豆

小犀角丸

治諸癰應故如神常服去根黑丑半生半炒取頭末犀角青皮陳皮各一兩連翹五錢右為食

下三十九食

後服(綱目)

散瞳清堅湯

治療癰及馬刀瘡堅而或潰或潰出膿水黃芩一錢酒洗半生半炒草龍胆酒洗六分瓜萎根酒洗黃柏酒炒知母酒炒桔梗昆布海藻各七分柴胡六分炙甘草三錢酒洗蓬朮酒炒連翹各五分葛根白芍藥當歸梢各四分黃連酒洗升麻各三分右剉作一貼水浸半日煎服食後去枕低頭而卧含一口作十次咽下徐徐服之另搗一料為細末蜜丸大每取百丸以煎藥湯送下

(東垣一)

內消丸

治療癰結核熱毒鬱滯服之內消黑丑八兩取頭末青皮陳皮各二兩右為末以薄荷皂角各三兩煮爛取汁熬膏和丸菜豆大以荊芥茶清吞下三十九食後服(精義)

琥珀散

治療癰結核內消神效白丑頭末滑石白僵蠶黃芩各一兩木通連翹各七錢枳壳赤芍藥柴胡各五分班蝥三錢去翅足炒甘草三錢琥珀二錢右剉分作六貼水煎服(回春)

天花散

治療癰潰爛疼痛金銀花二錢赤芍藥一錢七分天花粉一錢五分穿山甲一錢二分白芷當歸各一錢貝母七分沒藥五分乳香二分右剉作一貼水酒煎服(醫鑑)

立應散

治療應馬刀瘡連翹赤芍藥川芎當歸滑石甘草各五錢黃芩班蝥去毒炒各三錢白丑頭末生土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾各二錢半川烏尖七个右為末每一錢濃煎木通湯調下臨卧服毒

(從小便出如粉片血塊是也未效再服班蝥性毒濟以烏尖或衝上麻悶嚼葱白茶清下

(以解之如尿澀益元散或五苓散燈心煎湯調下宣毒後繼服薄荷丹解其風熱(入門)

薄荷丹

解瘰癧毒服藥從小便出後常服此薄荷皂角連翹河首烏蔓荆子三錢荊芥各一兩右為末攻二兩半以熱醋海故令軟研為糊和九梧子大熟水下三十九(直指)

白蛇散

治療癰馬刀瘡寒熱作痛白花蛇肉二兩青皮黑丑頭末半生半炒各五錢犀角二錢半右為末每一錢入輕粉五分研勻五更以糯米飲調下已時利下惡物乃病根也十日後再服後用四

(聖散補之永
斷根(入門)

四聖散

治療癰用白蛇散取轉後用此補之海藻石決明煅羌活瞿麥各一兩右為末每二錢米飲調下日三服下清水盡為妙(得效)

蠟燭丸

治療癰馬刀瘡傷護內膜驅解諸毒自然內消神妙(方見癰疽)

益氣養榮湯 治懷孕傷寒流注日晡發熱或渴而不敏黃芩一錢半人參白朮各一錢當歸酒洗川芎白芍桑白皮炒生地黃陳皮香附子貝母各七分桑胡桔梗地骨皮甘草炙各五分右剉作

一次(醫鑑)

連翹散堅湯 治馬刀瘻癰流注遍體作核作瘡柴胡一錢半草龍胆酒炒四次土瓜根酒炒各一錢二分五分黃連酒炒蒼朮各四分右剉作一貼水浸半日乃煎去枕仰卧一口作十次咽之留一口送下九藥另取一劑為細末蜜丸裹立大每百丸以煎藥水送下更以龍渠散塗之(正傳)

消腫湯 治馬刀瘻連翹二錢生黃芩柴胡各一錢二分天花粉黃耆各一錢當歸梢

甘草各七分鼠黏子黃連各五分紅花二分右剉作一貼水煎服(正傳)

(回春)

一方 治瘻癰烏雞卵一枚穿項納班貓一個紙封其裏蒸熟去

一方 豬日一服煎五積散方見寒門送下四五枚即效(入門)

外治法 凡瘻癰馬刀往苒日久內必成膿若腫高消軟其人面色萎黃皮膚壯熱止蒸膿已成也可以針決核中用追毒蝕肉錠子研之用膏貼之(精義)○治法以火針刺入核中納蟾酥膏於中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿盡取去核外繩膜先破初起之核一枚以絕其源服藥則後出者皆愈或不能收如銀瘻者盡皆開了用藥取之其自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治法用鐵烙燒赤烙去其破核猶存者併內

潰處次用金寶膏追去蠶蟲之根遂能長肉而愈(正傳)

蟾酥膏 蟾酥如大豆許白丁香十五枚巴豆肉五粒蜜水石寒食麵各少許右各另研合和再研

蜜丸裹立大每一丸或二丸三丸納入針囊中如膿未盡再納數丸以膿盡為度(正傳)

金寶膏 枝三味同研細生地黃二兩硃砂一錢輕粉麝香各半錢右將灰汁下鍋煎濃下甲末等及地黃

汁候焦乾加麝香次下輕粉次下硃砂候將成膏下炒石灰末一兩以成

塊子收入罐內勿見風每取付核上再付即去舊藥餅醫即效(正傳)

人有此患不惟懨惄其於飲食百味宜

一切戒之(直

繫貼藥凡癰瘡瘻馬刀惡瘡宜用蠱藥散猫蝠散代灸散龍泉散蝎半散燒灰散生蠍散燒用○初起未破者為末敷患處外以水紙掩之(一夕而退)○又方未破者蜜峰二十一個蛇蛻七分半蜈蚣二條端午前收右用香油四兩同熬成入光粉二兩以桑枝七條急燒候冷出火氣七日收贮每用擦紙上貼患處○此二方不須服藥只貼

上五七日可便消(細目)

蠶蠅散治療瘻蠶滿三個白朮研碎各一錢右並火煅為末炒爛肉上三日其核即下(入門)

貓蝠散治療瘻多年不愈神效猫頭骨一個端蝠一個右一味俱撒黑豆上同燒存性研為末乾炒(入門)

代灸散治療瘻潰爛臭不可聞鉛粉雄黃各一錢輕粉五分麝香二分右為末用槐皮一斤搗汁密密制孔置瘻上上捲藥一撮以炭火炙熱其藥氣自然達入瘻中痛熱為止二三次全愈(醫鑑)

龍泉散治療瘻鉛粉龍泉粉炒(即磨刀礪上粉也)昆布蓬朮三錢各五錢三味酒浸炒乾研極細末熱水調塗瘻上即效○瘻癰先出一个用四楞鐵環定住不令出移破作口了以油紙擦燃鮮之勿

合了以絕其瘻源其效至速如瘻不破或病人不肯破龍泉散塗之三日一易(細目)

蠅牛散治療瘻潰與未潰皆可蠅牛不拘多少以仔畜貫穿瓦上晒乾燒存性為末入輕粉少許取猪骨髓調勻摊紙花貼瘻上(三因)○一方蠅牛肉七個丁香七粒用如上法得效

燒灰散治療同上大田螺并殼肉燒存性為末

燒灰散治療同上生獾一個取四足臍尾嘴并兩耳右燒存性為末油調先洗瘻後塗之立效(類聚)

洗傳方治療瘻白芷荆芥煎湯溫洗拭乾貼膏藥臍汗出盡後治半夏南星血竭各一錢輕粉少許為末垂調付(得效)

難治可治證帝曰寒熱瘻應生於頭腋者何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣留於腋而不去者也

一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈不下貫瞳子者可治也○(靈樞)○婦人患瘻應經調及經閉無潮熱者可治經閉有潮熱或咳者死玉燭散(方見胞門)治療瘻

通經日服一貼七八日自消○男子患瘻應有潮熱有咳乃瘻瘻傷證之標也故勞瘵類有曰腹中有塊頭上有核最為難治(入門)○瘻瘻延及胸中中府雲門肺經部分者死(得效)

灸法治療瘻以手仰置肩上微舉肘取之肘骨尖上是穴腫邊灸七壯或二七壯神效(得效)○又法於掌後手腕盡處橫紋量起向臂中心直上三寸半是穴灸三壯即效(丹心)○被法肩大肘尖二穴即

蒸餅和丸散五味白湯下八十九丸

回春

又方 治項後少陽經中疙瘩結核或赤硬腫痛生山藥一塊去皮取研勻酒貼如神丹心。

又方治瘻核疙瘩商陸根主南星合搗爛塗之立消（種杏）○又方南星草烏等分

為末薑汁調塗立消（回春）○又大蜘蛛研爛好酒浸去滓臨卧溫服甚效（綱目）

癰瘤

人身氣血凝滯結為癰瘤癰則憂恚所生多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大漫長堅硬不可移者名曰石癰肉色不變名曰肉癰筋脈凝結名曰筋癰亦厥交經名曰血癰隨憂恚而減初作梅李

曰氣癰五癰皆不可決發決破則膿血崩潰多致天柱（三因）○瘤亦氣血凝滯結聚而減初作梅李皮皺而光漸如孟卯瘤名有六骨瘤肉瘤膿瘤血瘤石瘤脂瘤亦不可決潰內瘤尤不可破則殺人惟脂瘤決去其脂則愈（三因）○癰瘤總皆氣血凝滯結成惟憂恚耗傷心肺故癰多著頭項及肩也勞倦抑氣乘經之虛而住故瘤隨處有之（入門）○通治癰瘤蠅糞丸久服則自然消縮最妙（方見癰疽）○五癰六瘤並軟或硬無痛無癢宜破結散人參化癰丹海帶丸（方見上）紙掌散神效開結散治脂瘤方枯瘤方化瘤膏南星膏（諸方）○服治癰瘤藥先須斷厚味（丹心）○凡癰瘤疣贅等至年歲皆自內潰理於年壯可無後憂也（精義）○癰瘤初起通用

十六味流氣飲（方見癰疽）單味丸方久服蠅糞丸外付南星膏（入門）

破結散 治五癰及瘤即上海漆散堅丸也（濟生）○有人生癰大如疖子潮熱形瘦百

破結散 治不效得此方去松蘿代真桑寄生一倍服三五日其癰自消散而愈（正傳）

人參化癰丹 治癰瘤海帶海藻蛤粉昆布上四味皆焙澤瀉炒連翹各一兩猪臘羊臘（即猪羊外腎）

人參化癰丹 薑中之卵也○各十枚切片焙乾右為末蜜丸艾晝大食後噙化一丸日三（綱目）○癰瘤

多用昆布海藻海帶誠能

軟堅之藥治之（醫鑑）

紙掌散

治癰海藻黃連各一兩右為末取少許置掌中時時舐之津液咽下如消三分之二止藥（正傳）○一方海藻海帶昆布蓬朮青鹽等分禹母蜜丸彈子大噙化噙下日三（丹心）

神效開結散 治癰瘤皆效沈香二錢木香二錢陳皮四錢真珠四十九粒火煅猪臘肉子○生豬項下喉嚨系一枚如棗大微扁色紅者○四十九个瓦上焙乾右為末每二錢卧時冷酒調和徐徐

噙下輕者三五服效重

者一料全愈（入門）

治脂瘤方 一種脂瘤粉紅色全是痰結用針決去脂粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點其蒂俟落即用生肌膏貼之防其出血（入門）

枯瘤方 破爛硝砂黃丹雄黃輕粉各一錢班蝥三十個朱砂乳香沒藥各一錢右為末糯米粥和丸捏作碩子樣裹先灸三壯於瘤頂以藥餅蓋上以黃柏末水調貼之數日自然枯落（綱目）

化瘤膏

治內中腫起生瘡漸大白蕊一兩大黃川芎赤芍藥黃芩黃連當歸白芷各五錢吳茱萸二錢半右為末雞子黃調勻攤帛貼之

(類聚)

南星膏

治癰瘤生天南星大者一个細研滴醋三五點為膏先將針刺瘤上却以藥攤紙上貼之頻點取效如無生者乾者為末醋調用之

(得效)○又方南星草烏為末蜜汁調付之亦佳(醫鑑)

又方

治氣瘤針砂浸水缸中平日飲食皆用此水十日一換針砂服半年自消(直指)○凡海中藥皆

(本草)

○夏枯草散癰結氣水煎服即愈(本草)○松蘿治癰瘤水煮服之

(本草)

○治癰瘤大蜘蛛一個擂酒頓服

(入門)○羊麝鹿麝酒清多含噙汁七日差(本草)

灸法

治癰灸天突三七壯又灸肩髃男左十八壯女右十八壯左十七壯妙(得效)

瘡瘻

漏者諸瘻之滑漏也狼瘻鼠瘻蠅蛆瘻蜂瘻增瘻浮疽瘻療瘻轉筋瘻是為九瘻其證穿孔一深膿汗不盡風冷併入涓涓而成漏矣(直指)○漏喜發於項脰及陰僻肛門之間療治失節即

生寒熱凡癰疽諸發苟有宿膿朽骨停蓄真間皆為之漏(直指)○內經曰陷脈為瘻留連肉瘻者是也可用附子灸法蒜餅灸法(方見針灸一灸之瘻口絆翠霞散或翠霞錠子絆之外貼膏華(精義)

○治法溫散風冷為急宜溫解散內塞散○收水次之宜牽牛酒○生肌又次之宜龍骨牡蠣入齒大牙加血竭乳麝髮灰内外相雜生肌必矣或平肌散(方見癰疽)入牙散蜂房散選用○通治宜加味

蠅蠍丸內生肌丸乳麝雲母膏溫經丸○外治宜截瘡散雄黃膏黑靈散○熏方洗方取久漏中朽骨方治心漏方取漏穴法禁忌法

溫解散

治漏瘻散風冷蒼虎厚朴陳皮藿香半夏川芎白芷細辛各一錢官桂白薑甘草炙各七分右剉作一貼入姜三乘二水煎服

(得效)

內塞散

治瘻瘻久不差入參黃耆當歸白茯苓防風白芷桔梗川芎遠志厚朴官桂赤小豆甘草炙各五錢附子炮一個右為末每取二錢溫酒調下(精義)

牽牛酒

引漏瘻中惡水自大腸出黑牽牛頭末二錢入猪腰子內以線扎博濕紙包漫火燶熟空心細管溫酒送下(入門)○一名揩腎酒夫水屬腎也腎虛水溢則滲濾於漏瘻行腎之水無如黑牽牛

(取細末入猪腎腹之則倍入腎兩得其便惡水即泄則不復淋漓矣(直指)

人牙散

治漏瘻惡瘻能肌入牙潰油髮灰灰雄雞內金各等分右為末入麝香輕粉各少許和勻濕則乾擦乾則油調付之(直指)○一名齒髮散(入門)

蜂房散

治久年漏瘻露蜂房炙黃七錢半穿山甲焦龍骨各二錢半蜜各二錢半研末臘猪脂調付之(入門)

加味蠅蠍丸

治久新諸漏象牙五錢露蜂房白僵蠍蛇退燒血竭木香各三錢乳香二錢白礬

內生肌丸十九粒治漏瘡枯白攀癰角屑脂麻各一兩為末蜜丸梧子大溫酒下

乳麝雲母膏治漏瘡穿山甲一百片蚌粉同炒候焦起泡去粉取甲為末四兩入乳香末一錢麝香末半錢夾和雲母膏十五點和丸梧子大溫酒下三十九丸(直指)

溫經丸治陷脈久瘻附子二兩醋浸泡七次去皮臍厚朴官桂白朮乾薑木香甘草炙各一兩右為末蜜丸梧子大米飯下三十九丸(精義)

截疳散治年深疳瘻瘡白芨白芨黃丹蜜陀僧各二分右為末乾擦或絞之(東垣)

雄黃膏治久年冷瘻油髮灰黃蠅各五錢雄黃未硫黃未各二錢半

黑靈散通治漏瘻露蜂房五錢牡蠣粉黃丹硫黃研各一錢半右同炒烟盡為末入油髮灰二錢半麝香少許右和勻擦之(直指)

翠霞散治漏瘻急瘻去毒生肌滑石五錢銳粉黃丹硫黃研各一錢半

翠霞錠子治久冷漏瘻內有死肉銅線寒水石煅滑石各三錢白芷輕粉硫黃母石各一分半右極細未合糊為錠子如麻黃粗細量瘻深淺剉之上貼膏藥(精義)

熏漏瘻方艾葉五倍子白膠香苦棟根右等分剉如燒青法置長桶內坐其上熏之(入門)

洗漏瘻方凡漏瘻孔中多有蟻惡常須避風洗淨白芷露蜂房或大慶皮苦參煎湯熏洗找乾取東向石榴根皮為末乾搗以殺溼蟲(入門)○凡諸瘻切忌生水洗(得效)

取久漏中朽骨方久疽及痔漏中有朽骨宜取去之烏骨雞胫骨砒礦實之鹽泥固濟火燬通紅取

取漏蟲法蟲活鱈魚數條令盤屈以竹簽串定香油塗上下覆瘻上以布巾繫定良久覺癢痛不可忍取

取漏蟲法蟲入水中有蟲如線出馬未盡再覆蟲盡後以艾湯入白芷洗淨黃連檳榔末付擦治瘻瘻亦

妙(入門)

禁忌法凡漏切忌七情房勞尤戒怒氣不

單方鳥金散

橡斗子

(治漏瘡瘻瘻取十二個一實黃丹一實白礬兩藥相合定麻皮
鑿了燒存性研細入麝香少許洗淨捲之名曰烏金散(濟生)

蟠蟲已下至蛇肚治皆同上剪去兩頭安瘡口上以火炙灸之七壯一易不過七枚無不效(東垣)

蠶鼠燒銀膏塗之

(本草)

鯉魚腸瘻開看虫出差(本草)

(本草)

鰐鱗魚取膏塗之并食其肉甚效(本草)

松脂

(煉填瘡口令滿日三易即效(本草)

(本草)

熟犬肉取汁塗之

(本草)

蝮蛇膽取汁塗之(本草)

(本草)

鰐鱗魚取膏塗之并食其肉甚效(本草)

松脂

(煉填瘡口令滿日三易即效(本草)

(本草)

熟犬肉取汁塗之

(本草)

灸法

(久漏瘡足內踝上一寸灸三壯在上則灸肩井膕尾(東垣)○冷漏多在腿足之間先雖積熱所注久則為寒宜用附子灸法硫黃灸法(一法並見摩疽)久瘡成漏臘水不絕者亦宜灸(丹心)

疥癬

(疥瘻有五
一曰乾疥皮枯屑起宜吳茱萸散○二曰濕疥皏腫作痛流汁淋漓宜一上散○三曰砂芥

細如砂子或痛或癢宜剪草散○四曰蟲疥瘻不知痛易於傳染宜硫黃餅○五曰膿疥含榮潤膿色

厚嫩痛宜三黃散○癬瘻亦有五一曰濕癬狀如蟲行搔之汁出○二曰頑癬全然不知痛痒○三曰

風癬又名乾癬搔生白屑○四曰牛癬如牛領皮厚且堅○癬瘻皆血分

熱燥以致風毒犯於皮膚浮淺者為疥瘻沈音為癬疥多挾熱燥多挾濕疥狀如被介甲癬狀如走苔

鮮大概相同(入門)○治疥宜升麻和氣散一撮散神異膏如聖散油調立效散○治癬宜麻丘膏竭

貓膏胡粉散連粉散○通治疥癬宜一上散祕傳一擦光當歸飲子何首烏散蘆薈散浮萍散(諸方一〇)凡疥癬甚加寒水石擦加黑狗膏微擦加蛇床子有虫加雄黃喜溫熱加硫黃(丹心)

吳茱萸散

(治乾疥及春月發者以此開鬱蛇床子三錢寒水石二錢半白礬吳茱萸各二錢黃柏大黃硫黃輕粉各一錢樟腦五分僧柳一個右為末香油調付(入門)

掌中擦藥令熱鼻中嗅二三次却擦瘡上一擦即愈(丹心)

剪草散

(治砂瘀蛇床子三錢寒水石蕪荑各二錢剪刀草枯白礬吳茱萸柏各一錢蒼耳厚朴雄黃各五分輕粉一錢右為末香油調付(入門)

硫黃餅

(治蟲疥及喜湯火灸覺者鑿製硫黃一兩為末用水調成餅貼磁碗底覆轉用熱艾一兩川椒三錢為末大燃熏乾硫黃臨用先以藥湯水洗拭後用麻油調硫黃末擦之(入門)

三黃散

(治膿瘻疥瘻治熟為王黃芩黃連大黃各三錢蛇床子寒水石各二錢白礬(治膿瘻各五分再名吳白芷木香各二錢白礬)

升麻和氣飲 治癆瘡痛癢乾葛二錢陳皮甘草各一錢半升麻葛根桔梗各一錢青芩藥七分半大黃五分

服八門

一歸散 治一切瘡瘍藜蘆皮三錢蚌粉鉛粉各一錢半雄黃七分輕粉一錢右
為末方用大鯽魚一個入香油煎候去魚撈冷調藥擦瘡(得效)

神異膏 治同上全歸七個皂角二錢巴豆去皮七個蛇床子末三錢雄黃另研三錢輕粉一字清油一兩
黃蠟半兩右先用全歸皂角巴豆入油煎變色去三味入燈熔化放冷入雄黃蛇床輕粉和勻成

膏先以漿水洗瘡拭乾後

乃上藥擦之神效(得效)

如聖散 治肺藏風變生瘡瘍浸展胡粉一兩黃連七錢半蛇
床子五錢水銀二錢半右為末生麻油調塗(局方)

油調立效散 治濕疥浸淫久不差輕粉綠礬黃柏硫黃各
等分右為末生麻油調洗瘡後塗擦(局方)

麻豆膏 治諸癬麻油二兩入巴豆肉各十四粒斑蝥七粒熬煎至枯黑色去滓却入白蠟五
錢蘆薈末三錢攪勻成膏塗擦之(入門)○遍身生癬獨蘆羊蹄根另搗白礬末以米醋調成膏

塗擦之加輕粉黃

丹丸妙(丹心)

蝎窟膏 治牛皮癬全歸斑蝥各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三物了乃
入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮肉(細目)○一方治遍身牛皮癬川烏草烏何首烏白
芷蘇木各等分右粗剉入臘猪脂同熬至白芷焦色

去滓候冷入鹽少許常桃一匙空心酒調下(得效)

胡粉散 治癬神效胡粉硫黃雄黃各二錢半研霜一錢二分半大草烏生一個斑蝥一個蝎
梢七枚麝香少許右為末先以羊蹄根蘸醋擦勻患處次用藥少許擦之(得效)

連粉散 治風癬濕瘡黃連胡粉黃柏黃丹枯白礬各五錢輕
粉龍骨爐甘石各五分右為末乾擦或油塗(丹心)

秘傳一擦光 治疥癬及諸般惡瘡神效白礬枯六錢蛇床子苦參蘆薈各五錢雄黃硫磺
川椒大風子肉各一錢半輕粉樟腦各一錢右為末生楮脂調付(正傳)

當歸散 治遍身疥癬腫瘡流膿當歸赤芍藥川芎生地黃防風荊芥白蒺藜各一
錢二分何首烏黃耆甘草各七分右剉作一點入臺三片水煎服(入門)

何首烏散 治遍身疥癬瘡荆芥穗威靈仙蔓荆子阿城草即歸蕓草何
首烏防風甘草各等分右為末每取二錢溫酒調下(丹心)

蕪荑散治疥無間新久亦治癬白蕪荑一兩核榔吳茱萸各五錢硫礦二錢右為末猪脂或香油調擦之(本事)

浮萍散

治諸疥癬及癩瘡浮萍四兩當歸川芎赤芍藥荆芥穗麻黃甘草各二錢右剉分作二貼入葱白三莖豆豉六十個同煎服出汗(醫鑑)

洗藥治疥癬瘡癰生瘡細辛荊芥白芷川芎黃芩防風地骨皮甘草各等分右粗末每取二兩水一大碗煎十餘沸乘溫淋漏患處名曰八仙散(精義)○何首烏陳艾等分濃煎浸洗治遍身疥癬(本草)

○冬瓜藤煎湯浸洗亦佳(本草)○溫泉浴最妙(本草)

單方
凡十
二種

硫黃生用治疥癬及惡瘡喚其臭不止可愈疥瘡(本草)

雄黃治疥癬殺蟲為末竹之(本草)

水銀淬研臘豬脂擦殺蟲立效(得效)

藜蘆治疥癬作末生麻油調塗(本草)

羊蹄根治疥癬爛搗和醋付之妙(本草)

槿樹皮治疥癬加巴豆班鵝油少許為末水調付(丹心)

腊麻生取油付疥癬及惡瘡甚妙(本草)

久皮鞋底牛皮癬燒灰少許油調付(入門)

田螺煮熟取肉用酒醉炒熟食除一生瘡疥(回春)

臘豬脂生蠻杏仁加輕粉少許搗擦治疥癬妙(細目)

鵝鴨治久患瘡疥食之甚良(本草)

蛇床子治遍身疥癬硫黃白藥各二錢水銀淬三錢右為末薑汁調擦立效(回春)

針灸法治瘡疥頑癬取絕骨三里間使解谿委中或針或灸(細目)○手瘡取勞宮灸大陵(細目)○渾身瘡疥取曲池合谷三里絕骨行間委中(細目)○治癬八月八日日出時全患人正當東向戶長

跪舉兩手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛兒中左右兩火俱下灸七壯七日愈(資生)○一女子兩股間濕癬下至膝瘡痛流黃水百藥不效戴人六針當瘡時刺百餘處血出盡煎鹽湯洗之四次方除蓋濕淫於血不可不針也(子和)

瘡頭瘡頭上生瘡如癩防風通聖散(方見風門)為末酒浸焙三次食後白湯調服日三(丹心)○湯調洗一上散(方見上)付之久不愈者神效(丹心)○頭瘡宜服酒歸飲外用雄黃水銀等分為末臘猪脂半生半熟調付之濕燶者燕窠土黃柏為末乾膠(入門)○白堯頭瘡宜神應膏(醫鑑)○頭面瘡竈陀僧流黃各二錢輕粉少許右為末猪脂調付(丹心)○又方臘月馬脂油塗擦極妙(丹心)

又方松皮灰五錢黃丹白膠香各一錢半枯白礬大黃黃柏各一錢二分在為末熟油調付（丹心）○又方爛木耳為末蜜調付○又炭燒紅淬長流水令熱洗之○又胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為末油調付連床散如聖散膏亦佳（丹心）○又鬼繩子或蒺藜子煎湯洗之

（一本草一

酒歸飲治頭瘡酒當歸白朮各一錢半酒芩酒芍藥川芎陳皮各一錢酒天麻蒼朮蒼耳各七分半酒黃柏酒甘草各四分防風三分右剉作一貼水煎日三服慢穩睡片時（入門）

神應膏治白禿頭瘡羊糞燒存性為末用

雁油調塗一二次即愈（醫鑑）

連床散治小兒癩頭瘡及身上諸瘡黃連五錢蛇床子五倍子各二錢半輕粉少許石為末荆芥湯洗後油調付（丹心）

如聖墨膏治小兒白禿頭瘡豆豉半升草龍胆蘚蕘各二錢半右燒存性為末香油半斤熬至四兩下藥調勻付之神效（得效）

人面瘡多生膝上亦有臂上生者古書云冤業所生須清心悔過內服十六味流氣飲（方見癰疽）久者大皆具昔有一人左膊上生瘡以物食之皆能食灌以酒則面赤色醫者教以歷試諸藥皆無苦至月母其瘡乃聚眉閉目其人喜曰可治即取貞母末和水灌入口中數日處痂而愈（本事）

大苦參丸治人面瘡及臍瘡苦參二兩防風荆芥白芷川烏生赤茯苓白芷藜黃蓍羌活附子各五錢草烏炮一錢半右為末水煮麵糊和丸梧子

大每服五七十九空心酒
下不飲酒以茶代（入門）

陰蝕瘡夫陰瘡大概有三等一曰濕陰瘡二曰姤精瘡三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡也○濕陰瘡者由腎虛風濕邪氣乘之癢癉成瘡浸淫出汁狀如疥癬○姤精瘡者由壯年久曠房室思色動慾以致敗精流入口莖內陰上生瘡赤腫潰爛作白痛癢好悶○陰蝕瘡者由熱積下焦經絡澀滯或婦人子宮有敗精停留或月水未斷與之交合房勞後又不洗浴邪穢留滯遂令陰莖連翠九腫痛小便如淋經久潰爛侵蝕肌肉膿血不止遂成下疳瘡久不愈則必成楊梅瘡宜服仙遺糧湯（方見上）預防之寒熱尿澀宜八正散（方見小便）濕熱甚則腫痛尿澀莖中癢痛或出白津宜龍膽瀉肝湯（方見前陰）腫痛後八物湯（方見虛勞）加柴胡梔子知母久服（入門）○下疳瘡日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤俗云瘡瘡未已便毒復來生也（醫鑑）○陰頭腫痛生瘡名為下疳乃督任衝三脈之會其瘡一生則便毒厲風瘡次第而來先宜升麻葛根湯（方見寒門）發出繼服涼血解毒丸即愈不必服輕粉毒藥（醫鑑）○姤精瘡初發在陰頭如粟拂之即痛甚出清膜作白孔蝕之大痛婦人有生於玉門內

正似疳瘡但不痛為異（醫鑑）○治法以大豆甘草湯潰之洗毒散煎湯浴之磨風膏溫潤之（精義）○通用消疳敗毒散涼血解毒丸（回春）

涼血解毒丸（治下疳瘡苦參四兩黃連二兩連翹一兩半大黃一兩二錢半慈實生乾地黃白芷各一兩防風石膏各五錢右為末荆芥煎湯打糊和九梧子大空心溫水下百丸（回春）

消疳敗毒散（專治下疳瘡柴胡一錢半黃柏赤芍藥赤茯苓木通草龍胆各九分連翹荆芥黃連蒼朮知母各七分防風獨活各六分甘草三分右剉作一點燈心一團水煎服（回春）

洗瘡藥（凡下部諸瘡帶須藥湯淋洗以去膿汗惡水宜洗疳湯大豆甘草湯洗毒散洗下疳方（諸方）

洗疳藥（治下疳瘡川棟子黃連瓦松川椒葱根艾葉右等分煎水以青布蘸洗立效（醫鑑）

大豆甘草湯（治陰蝕下疳瘡甘草一兩赤皮葱三莖黑豆一合槐條一握右濃煎取清候溫浸浴日二（精義）

洗毒散（治陰蝕瘡及諸般惡瘡蛇床子地骨皮大蘗麻黃荆芥防風桔白礬各三錢葱白三莖煎湯溫洗（丹心）

洗下疳瘡方（黃柏黃連當歸白芷獨活防風朴硝荆芥各三錢八銅錢五十文烏梅五個鹽一匙同煎取湯日洗四五次乃止（醫鑑）

移付藥（藥水淋洗後乃用移付之藥宜柏蛤散津調散鳳衣散早螺散截疳散（方見上）珍珠散瘡風膏或膠或付（諸方）

柏蛤散（治下疳濕瘡黃柏以磁鋒刮取末蛤粉右末等分移上即愈蓋黃柏去熱蛤粉燥濕也（入門）

津調散（治如精瘡黃連欽冬花等分右為末先以地骨皮蛇床子煎水洗拭乾乃津調付（入門）

鳳衣散（治下疳鳳凰衣煅（即雞抱卵）設黃丹各粉片脣各少許右為末乾移支鴨子清調付（入門）

旱蝶散（治同上白田蝶殼煅入腦麝輕粉各少許右為末香油調搽（入門）○治如精瘡溪港中陳久設為妙（得效）

珍珠散（治下疳黃連黃柏乳香沒藥孩兒茶輕粉鉛粉五倍子炒珍珠粉各等分為末以米泔洗後移上（醫鑑）

磨風膏（治陰蝕瘡蛇床子五錢大風子十四個杏仁二十個桔白礬樟腦各二錢川椒輕粉水銀各三錢雄黃一錢半銀硃一錢右為末生麻油和丸彈子大每用少許呵津遍擦之（入門）

一方（治下疳瘡并玉茎做了盡用此藥也長出來如初只小元首耳黑鉛五錢化開投汞二錢半研不見星入寒水石三錢半輕粉二錢半硼砂一錢右為極細末先以葱艾做煎水洗患處乾擦之亦治舌

又方 治少年陽道興強當泄不泄不泄強泄腰斷嫩皮切如針眼畏疼不敢泄刮日久連坐責爛痛楚日甚用荆芥黃柏甘草生葱地骨皮煎水洗去膚膿以詞子燒灰入麝香少許乾擦患處仍斷房事臨

睡吃冷水勿令陽道興起張
斷瘡醫堅自安矣(得效)

又方 (並頭三五孔小漏瘡出血微膿油髮灰津垂調付仍未飲調服一錢甚妙(直指))○外腎疳瘡難卯殼黃輕粉為末香油調塗(得效)○如清瘡陰蝕瘡油髮青黛麝香少許右為末或繖或津唾調

付(精義)○陰莖上生瘡取月經布燒灰蜜調塗即愈(入門)
○下疳瘡牛焰乾枯白礬為末濕則乾繖或油調付(回春)

不治證(下疳瘡重者心中疔痛)

絕虛煩甚者不治(入門)

謙瘡(生於兩脚腫爛臭蟲步履艱辛此瘡生於臍骨為重以其骨上肉少皮薄故難愈治法當先取蟲然後外貼膏藥內服蠍蠍丸(方見癰疽)之類須翹足端坐勿多行履庶可全愈(醫鑑)○謙瘡生兩膝上初起燥腫作痛三陰虛也宜八物湯(方見虛勞)若患處黑黯惡寒少食屬肝腎虛宜八味丸(方見虛勞)久不愈者大苦參丸(方見上)○外謙瘡先以葱湯洗次貼龍骨膏或馬齒膏濕熱者蜜土膏○內謙瘡先以鹽湯洗次貼蠍蠍散○內外通用爐灰膏(方見雜方)一點去瘀肉後貼黃蠍膏(入門)○謙瘡及脚膝生瘡局方虛損門黃耆丸(方見虛勞)服之即愈(海藏)○內外謙瘡宜粉麝散神捷膏馬齒膏翠玉膏白膠香散貼藥三方針法洗法取蟲法(諸方)

貼藥三方針法洗法取蟲法(諸方)

龍骨膏(治外謙瘡龍骨乳香沒藥蜜陀僧各二錢海螵蛸一錢半皂角子五個燒存性右為末用綿紙兩重以針插亂孔香油調藥夾內燙貼瘡上隔日翻貼之(入門)

馬齒膏(治謙瘡馬齒莧煎取汁一釜入黃)

蠍蠍五兩再熬成膏塗之(入門)

蠍蠍紙(治外謙瘡神效綿紙壹十二重看瘡大小剪成方片以紙撲釘住另用麻油二兩入川椒四十九門)○竈心土以燥濕清熱黃柏之半以散火
和乳香沒藥以散瘀血可謂十全矣(丹心)

前紙令油滲透勿令焦黃取起貼時先以藥水洗拭用紙齊齊貼
以上以巾繫縛周時取下近瘡紙一重候紙取盡則瘡全愈(入門)

黃蠟膏治內外臙瘡香油一兩入油髮如梅大熬消化入白膠香三錢黃蠟一兩熔化入龍骨赤石脂血竭末各三錢攪勻候冷盛磁器每用搘作薄片貼瘡上綢帛縛定三日後翻過貼之(入門)粉麝散治外臙瘡臭爛數十年不愈生蛆殼一个醋一碗塗矣醋盡為度火燬放冷右為末入輕粉麝香各一錢和勻先以葱湯洗後塗上(得效)

神捷膏治內外臙瘡久年不愈清油半斤先煎入黃蠟一兩松脂五錢蒸至凝珠候冷入乳香沒藥輕粉血竭孩兒茶枯白礬龍骨煅各三錢川椒四錢右為末攪勻收贮先以藥水洗淨用油紙以針刺

孔撒藥貼瘡上一日換三次二日後
日換一次每換藥必洗淨貼上(醫鑑)

翠玉膏綠治臙瘡混青四兩黃蠟銅線各五錢沒藥三錢右將香油半斤同黃蠟混青於火上熔化次下銅線沒藥末旋旋攪勻成稠將藥傾冷水中看瘡大小捻作餅子貼之以帛繫定三日一易(綱目)

白膠香散治內外臙瘡白膠香赤石脂枯白礬各五錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢右為末乾炒或油調付(入門)

單方種(凡六)

黃蠟一兩猪胆一个輕粉二錢右熔化和
勻蘸油紙上貼之治臙瘡(丹心)

羯羊屎治同上燒存性五錢石膏二錢半赤石脂一錢
二分右沸末香油調付以巾包定除根(丹心)

鹿角灰治臙瘡油浸灰乳香為
末清油調付(得效)

砂糖屑(賺瘡成白久不乾津調塗
付日二次三日愈(得效)

紅絹白麵各一分右為末黃蠟二兩熔化調勻貼之神效(回春)

針法(臙瘡色紫黑先以三棱針刺去惡血冷水洗淨乃貼膏藥忌日光
火氣陽氣如有黑腫未盡可再出血以紫黑血盡為度(細目)

熏洗方治臙瘡臭爛先以油桐皮石榴皮煎湯洗後牛蒡子半兩研為末燒熏之無害桐皮則
地骨皮代之(得效)○槐枝煎白川椒煎湯或茶清淋洗掙乾後乃貼膏藥得效

取蟲方久臙瘡宜取蟲生鱈魚數條以清油塗腹下置瘡上盤曲以帛繫定少頃覺痒不可思然後取視
腹下有小蟲皆蟲也未盡再付却用死人腳胫骨燒灰油調付(得效)○久臙瘡蟲魚腸以五味

火上炙貼蟲出
即去之(本草)

初起兩足時熱脚跟作痛多於內脛或膝上生瘡如癩漸大失治則延及脛股遍身者有之以臂

○四生散末每取二錢入猪腎內煨熟空心服湯嚼下尤妙（入門）○血風瘡藥留瘡外用之
陰經風熱鬱火血燥所致瘡瘍不常腹水淋漓潮熱盃汗宣四物湯（方見血門）加浮萍黃芩或當歸
指痛傷（方見足部）外治磨風膏（方見上）大馬齒膏塗之（入門）○下症瘡亦與腎藏風瘡相類生
於脚脰或打摟而成其瘡口狹皮內極開皮薄如竹膜極癢痛黃水淋漓積年不愈又染易他人患者
煩忌房室取韭菜地地龍糞為末入輕粉清油調付或白夭血塗之又

付檳榔散（入門）○腎藏風宜服活血驅風散外用雞心散（得效）

大馬齒膏（治兩足血風瘡馬齒莧焙乾五錢黃丹黃柏枯礬孩兒茶各三錢輕粉一錢
右為末桐油或麻油調勻摊油紙上先以藥水淋洗搘乾後乃貼之（入門）

檳榔散（治足上生瘡潰爛臭穢全蝎七錢斑蝥十四個巴豆肉十四粒檳榔一個香油一兩半右慢火煎
先入蝎次入斑蝥次入巴豆肉十四粒檳榔一個香油一兩半右慢火煎

錢雄黃硫黃丹黃海螵蛸各一錢白膠香黃連杏仁輕粉各半錢右為末入蠟油中調勻藥水洗瘡付之立效（得效）

活血驅風散（治腎藏風瘡癢痛此由肝腎虛為風濕所侵也）蒼朮炒杜仲鹽汁炒肉桂天麻薏苡仁橘紅
檳榔厚朴枳殼各六分當歸川芎白芷細辛白蒺藜炒桃仁白芍藥半夏五靈脂甘草各五

分右剉作一貼薑五片裹二枚同煎入乳香末少許空心服（得效）

雞心散（治腎藏風瘡疥瘍瘻瘍各半錢青黛各半錢麝香少許右和勻磁器收贮每用少許清油調抹兩掌掩外腎女掩兩乳各睡至

醒次日又用之
經驗（得效）

單方（凡一）

石榴根皮（腳肚上生瘡潰大爬癩不已癢不可忍者取濃汁稍冷拂瘡上冷如冰雪即成痂（得效）

浸淫瘡（初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至遍身用苦棟根燒存性為末猪脂調付濕即乾捲先用苦參大腹皮煎湯洗之（入門）○浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治

（仲景）○小兒浸淫瘡
宣用苦棟散（綱目）

苦瓠散（苦瓠二兩蛇蛻燒灰蜂房微炒各五錢梁上塵一合右為末油調攤帛貼之（綱目）

單方（凡五種）

胡麻子得浸淫瘡不早治周身則

小蘗已下四種治皆同上
新水調付乾則易(本草)

秫米(熬黃杵末水調)

雞冠(本草)

燕窠土(本草)

(本草)

凍瘡(冬月凍傷成瘡流水俗呼為凍瘡宜用生附散白殼散如禪散臘享膏(諸方))

○凍耳瘡爛貝母末乾糰之(入門)○足凍爛生瘡黃丹猪脂調付(得效)○足凍爛瘡潰破以葱梗煎湯洗刮去腐肉針刺

出血馬勃末調牛骨髓付之(綱目)○凍瘡雄雉雞腦一枚入黃蠟等分清油

減半熟膏塗之(入門)○五倍子煎湯洗後取兔腦髓雀腦髓付之(本草)

生付散(治凍瘡爛痛生附子為末麵水調付之(綱目))

白殼散(治凍耳成瘡黃柏白殼各五錢右為末鹽湯洗後油調付之(得效))

如神散(治凍瘡皮爛不可忍大黃細末新水調塗瘡上痛止立效(綱目))

臘享膏(治凍瘡猪脂瑞油各二兩半香油二合半海松子油一合松脂黃蠟各三兩七錢半右各煉去滓和合成膏先以藥水洗後塗之(俗方))

湯火瘡(凡湯火燒傷初時強忍痛急向火炙強忍一時即不痛慎勿以冷物搗之使熱毒不出免爛入筋骨用寒水石三兩半黃柏黃連黃芩桔子大黃赤石脂各五錢片膿少許右為末噙子清調付酒調亦可(入門))○湯火瘡宜赤石脂散保生救苦散黃柏散冰霜散四黃散(諸方)○火燒以好酒洗之以

鹽付上○皮脫者酒熟牛皮膠付之○湯傷者以淋遍第二次灰漬付之○熱酒傷者橘米粉炒黑末酒調付之(丹心)○湯火燒瘡大黃當歸油調付(丹心)

赤石脂散(治湯火傷瘡赤石脂寒水石大黃各等分右為末新水調塗之(丹心))

保生救苦散(治湯火熱油所傷皮肉痛寒水石朴硝青黛牡蠣殼各分右為末生麻油調塗或乾擦(東垣))

黃柏散(治同上雞子殼黃柏朴硝大黃寒水石各等分右為末新水調塗之(得效))

冰霜散(治湯火熱油所傷皮肉痛寒水石朴硝青黛牡蠣殼各五分右為末新水或油調塗之(丹心))

四黃散 治同上大黃芩黃連黃柏白芨各等分右為末新水調塗之(丹心)

單方種

凡八

黃蜀葵花湯火瘡為末油調付妙矣

桑葉以下至生白礬治皆同上取經霜者焙為末香油調付(正傳)

側柏葉搗爛如泥冷水調塗以帛繫定二三日愈(本草)

生梨切片點之不爛止痛(本草)

生胡麻膏(燒爛如泥付)

生白礬(薑汁為末香油調塗(醫鑑)

白蜜湯火傷及熱油傷塗之竹中白膜貼之日三痛立止即愈(本草)

醋泥治同上付之無痕豆醬汁付之妙(本草)

翻花瘡(翻出一肉突如菌或如蛇形長數寸雄黃為末付之內服十全大補湯或八物湯(二方並用虛勞)

倍參芪歸朮外用藜蘆為末猪脂調塗日一易候元氣漸復腫毒將盡時塗之則易向自入否則雖

入復出若設用針力鍛炙必危慎之(入門)○中品錠子專治翻花瘡(入門)○一名綿花瘡一名廣

東瘡川芎天花粉各五錢輕粉二錢半朱砂雄黃各一錢二分半麝香五分右為末蒸餅和丸菉豆大

每服七丸至九丸溫酒下(正傳)

中品錠子(專治翻花瘡及癰瘡白礬三兩八錢半乳香沒藥各五錢半朱砂三錢牛黃七分半硼砂五分熟五分生砒硝一兩半火煅黑烟止用淡青烟右為末麵糊和丸捲作錠子量瘡插入(入門)

單方種

凡二

馬齒莧(治翻花瘡燒灰猪脂調付)(本草)

枝柳葉(治同上濃煎作膏蜜之(本草))

漆瘡(人有惡漆者因見漆中毒生瘡面癢而腫遍身煩痛生蟹頭黃瘡之(得效)○石蠟取汁頻塗之(本草)

○臘茶末油調付柳枝葉煎湯洗(入門)○芒硝湯浸冷洗之(千金)○鐵礬類洗即差(本草)

○井中苔搗汁之(本草)○川椒煎湯洗之即愈(本草)○生薑真汁付之亦可(丹心)○雞子黃塗之(本草)○韭菜研付之(本草)○紫蘇葉搗爛擦之(細目)

軟癩(瘡小病也世謂之熱癩大如酸棗或如豆色赤而內有膿血也(細目)○宜用猪頭散三物散大黃膏

○雞泡卵殼燒灰入輕粉少許油調付之(得效)○大枳殼一枚去瓢磨令口平以稠麵糊塗四層覆

貼癩上自破膜出甚妙(得效)

豬頭散

治軟癆治而復作野蜂房二三個燒為末另用巴豆肉三七粒清油煎三沸去豆取油調蜂房末付之立效○又枯白礬末油調付亦效此方療病有效人以豬頭為謝故名之（得效）

三物散

治醫邊生軟癆名發癆有數年不愈用此極妙諸頭上毛髮頭上毛各燒存性各一撮鼠屎一枚右為末加輕粉少許清油調付（得效）

大黃膏

治軟癆大黃黃柏當歸各等分右為末以生地黃汁調塗之（俗方）

有名無名諸惡瘡

前蜀瘡天行斑瘡月蝕瘡內疳瘡走皮瘡白蛇蠍瘡魚目瘡熱毒瘡火斑瘡此皆有名瘡也○此外皆無名諸惡瘡也○又有洗瘡法殺虫法生肌法諸瘡中風水作痛法

蒲萄瘡

瘡頭如蒲萄色四圍腫起先透膿盡次用冰梅罨之神愈（細目）

天行斑瘡

人身發天行斑瘡一身周匝如火瘡皆戴白漿不治則數日必死差後瘡癰黯一歲方減此惡毒之氣所為取好蜜煎升麻數錢洗拭塗之（本草）○又煮葵葉以蒜薑啖之數日即止之

（細目）

月蝕瘡

小兒多有之生耳後隨月盛衰胡粉炒黃枯白礬黃丹黃連輕粉各二錢乾胭脂一錢半研成膏塗之（入門）○又黃連枯礬未付之妙（本草）

內疳瘡

生於口上脣初發如蓮花根蒂小而下垂乃大治法以鉤刀決其根燒鐵烙以止其血次以雄黃輕粉粉霜白芷白薇為末付之以槐枝作枕支其牙頰間母使口合一兩時許瘡癰定合口自便

次日出膿生肌散付之（入門）

癰瘡

生手足間相對如新茶葉疼痛折裂有孔如蠅久不愈杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各二錢

走皮瘡

生滿頸項發如丘梅蔓延兩耳流汁濕爛先用桑寄生（無則秦耳代之）桑根皮各一握白芷黃連各少許煎湯洗之候血盡次用皂莢竹筍皮燒存性黃柏白芷藍葉等分為末清油調塗

神效（入門）○手瘡瘡先角枯礬輕粉黃連為末付之（入門）○小兒胎瘡頭

生紅餅瘡

先以艾葉白芷大腹皮葱白煎湯洗後生藍葉生艾葉入蜜搗付（入門）

蛇蠍瘡

身上生瘡有頭尾狀似蛇形初起宜隔蒜於頭上灸之雄黃為末醋調付之又酒調服之（入門）○遍身生瘡狀如蛇頭取蠍藥丸方見癩疽每服百丸大有神效（入門）

魚目瘡

遍身生瘡如魚目稱謂又名征瘡升麻剉水浸煎入蜜二三匙搗紗蘸拭洗瘡（得效）

熱毒瘡

遍身生熱毒瘡痛而不痒耗晝夜不得睡菖蒲作末厚布席上遂卧其間不五七日其瘡如失應手神驗（本草）○家用紫草膏葵花散（諸方）

火斑瘡 人常近火則多火斑瘡出汁痛痒黃柏薄荷葉爲末擦之即安或煎湯洗亦佳（得效）

諸般惡瘡 諸般遍身瘡及惡瘡出膿血痛痒宜涼血飲又平血飲合人參敗毒散（方見寒門）連翹飲疏風解毒散合掌散松脂貼散二黃膏貝母膏金華散爐灰膏青金錠子一掃先生肌散黃蠟膏

洗藥方 殺虫方生肌方諸瘡中風水方單方（諸方）

紫草膏 治熱毒瘡紫草黃柏黃連漏蘆各五錢赤小豆末菜五粉各一合右爲末猪脂或清油調日三付（直指）

葵花散 治一切熱瘡鬱金黃連黃柏梔子葵花各等分右爲末冷水調膏貼之神效（得效）

涼血飲 治血熱生瘡赤芍藥黃芩川芎荆芥生芍麥門冬天花粉丹草各一錢右剉作一貼入燈心十莖竹葉十片煎服（得效）

平血飲 治諸瘡遍身出膿血痛痒即升麻葛根湯（方見寒門）加天麻蟬殼也右剉與人參敗毒散合和加生姜薄荷生地黃麥門冬煎服（得效）

連翹飲 治惡瘡遍身痛痒及血風瘡連翹赤芍藥當歸荆芥防風惡實川芎梔子黃芩瞿麥木通生乾地黃瓜萎根麥門冬甘草各七分右剉作一貼入燈心一塊水煎服（得效）

疏風解毒散 治遍身瘡養痛白芷細辛蒺藜子炒麻黃板榔當歸鬚生乾地黃川芎赤芍藥獨活白牽牛微秦白皮炒蒼朮炒枳殼甘草炙七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生薑五片

片同煎服

（直指）

合掌散 治遍身生瘡百藥不效橘榔五個爲末硫黃生研五錢輕粉五分右爲末每一分錢安手掌內油調夜卧時塗外腎不得洗手但擦手令乾一二日即愈（得效）

松脂貼散 治一切惡瘡及無名瘡黃柏黃連松脂（明者）膩粉土蜂窠（以泥做者）甘草各一錢右爲末另取水銀一錢放在掌心以唾擦爲泥入磁器中和藥末及清油令如稀餳先以藥水洗瘡拭

（乾塗之即愈治所尤妙（得效）

二黃膏 治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉二十粒微黑色去豆入黃蠟一兩熔化又入硫黃雄黃各一錢和勻成膏以藥水洗瘡後擦付二三次神效（得效）

月母膏 治諸惡瘡貝母三錢半黃丹一錢半雄黃一錢半右爲末水調付或乾擦（直指）

金華散 治一切濕熱惡瘡亦療小兒黃丹一兩黃柏黃連各五錢輕粉一錢右爲末藥水洗後擦之貼之（丹心）

爐灰膏 治一切惡瘡除去瘀肉最妙（方見雜方）

青金鉗子 治諸惡瘡膿出不快及多年瘡瘍白丁香銅綠硝砂粉霜輕粉各五分麝香龍腦各一字右為末麵糊和擦作錠維入瘡中或擦付亦可（精義）

一掃光 治小兒頭瘡及多年風子搔痒成瘡膿水不止細茶水銀各一錢同研細牙皂川椒各二錢右為末油調擦上（回春）

生肌散 治一切瘡破口大放寒水石煅滑石各一兩烏賈骨龍骨各五錢蜜陀僧枯白礬乾胭脂定粉各二錢半右為末乾膠瘡中妙（精義）

黃蠟膏 治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分右熔化待凝馳之加油髮灰尤妙（俗方）

洗藥方 治諸般惡瘡黃柏茵陳荆芥葱白薑香煎水淋洗為妙（得效）○洗諸般惡瘡毒艾葉細茶葱白桃枝柳枝川椒濃煎湯入鹽頻洗（回春）

殺蟲方 治惡瘡有虫胆礬輕粉乳香各一錢硝砂雄黃土蜂房各二錢半麝香五分片腦一字右為末藥水洗後付之神效（海藏）○諸瘡殺虫辰柳五錢黃連二錢半穿山甲五片燒灰麝香一字右為末茶清調塗（

山甲五片燒灰麝香一字右為末茶清調塗（
得效）○諸惡瘡有虫須用斑蝥蘆（入門）

生肌方 凡治惡瘡令生肌宜用生肌散翠霞散黃蠟膏（三方見上）○凡看瘡內黑肉色勿上生肌散宣用消食之藥直待黑肉去盡方可上生肌散（入門）○如開瘡口用生砒去死肉用燉砒生好肉

去皮加枯白礬（入門）

諸瘡中風水發腫痛凡瘡癰未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急宜慎之（三因）○諸瘡

入皂角水及惡水熱痛不止皂角子燒存性研二錢半砂糖末五錢勻和如膏點瘡上（本草）○諸瘡中風水疼痛鯉魚目燒灰研付汁出即愈諸目並得（本草）○又方川川椒一升和麵作餅灰火煨熟斷開口封合瘡上冷則易出水即差（本草）○又方桑柴灰淋汁瀆之冷復易（本草）

草一〇又方葱白蓮鬚煮湯洗之或連莖葉煨研晝付（本草）〇又方薤白搗爛火炙令熱付瘡上以帛裹定冷則易出水即差（本草）

單方 四種

生胡麻油 治惡瘡及諸瘡塗之妙
生麻油亦可（本草）

馬齒莧 治同上搗爛付上便愈（本草）○一婦人臍汁百治不差有人教先以溫水洗拭取馬齒莧四兩青黛一兩同研

二十日全愈（本草）

熊胆汁 治同上塗之妙大
胆亦可(本草)

蛇蛻度 久遠惡瘡不差燒灰
猪脂調付(本草)

佳 (本草)

獵猪脂 治惡瘡和雄黃輕
粉付之妙(正傳)

蠅 (本草) 治同上取經霜者為
未香油調付(丹心)

雄黃 治惡瘡為第
一(本草)

月母 諸惡瘡末入雄黃
少許糊之(本草)

蟾蜍 燒灰油調付諸惡
瘡甚妙(本草)

朝生暮落花 一名鬼蓋(即朝蘭也) 生糞穢處如菌
作末和油塗惡瘡甚佳牛糞上黑菌尤

蜈蚣 一切惡瘡取十枚端午日
乾作末油調付(本草)

鼴鼠膏 妙(本草)

石灰 淋取汁溫洗惡
瘡妙(本草)

硫黃 功效同上
(本草)

子也。故其後不復有此。○人謂子瞻之詩如行雲流水，蓋其筆氣雄放，不以句為意，故能如是。○人謂子瞻之詩如行雲流水，蓋其筆氣雄放，不以句為意，故能如是。

子瞻之詩，固已絕矣。○人謂子瞻之詩如行雲流水，蓋其筆氣雄放，不以句為意，故能如是。

子瞻之詩，固已絕矣。○人謂子瞻之詩如行雲流水，蓋其筆氣雄放，不以句為意，故能如是。