

瀕湖脈學

李時珍曰宋有俗子杜撰脈訣鄙陋純繆醫學習誦以為
權輿逮臻頌白脈理竟昧戴同父常刊其誤先考月池
翁著四診發明八卷皆精詣奧室淺學未能窺造珍因撮
粹擷華僕撰此書以便習讀為脈指南世之醫病兩家咸
以脈為首務不知脈乃四診之末謂之巧者漏上士欲會
其全非備四診不可

明嘉靖甲子上元日謹書於瀕湖過所

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

浮陽

浮脈舉之有餘按之不足。經如微風吹鳥背上毛。厭厭聳聳。輕汎。

如循榆莢。索如水漂木。崔如捻葱葉。黎

浮脈法。天有輕清在上之象。在卦為乾。在時為秋。在人為肺。又謂之毛。太過則中堅傍虛。如循雞羽。病在外也。不及過則氣來毛微。病在中也。尋之如太過乃浮魚洪緊之象。非浮脈也。

體狀詩。浮脈惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。三秋得令知無恙。久病逢之卻可驚。

相類詩。浮如木在水中浮。浮大中空乃是孔。拍拍而浮是洪脈。來時雖盛去悠悠。浮脈輕平似捻葱。虛來遲大豁然空。浮而柔細方為濡。散似楊花無定蹤。

浮而有力為洪

浮而遲大為虛

虛甚為散

浮而無力為芤

浮而柔細為濡

濡而有力為澀

主病詩浮脈為陽表病居遲風數熱緊寒拘浮而有力多風熱無力而浮是血虛寸浮頭痛眩生風或有風痰聚在胸闢上土衰薰木旺尺中溲便不流通

浮數脉主表
浮芤失血
浮散勢極

有力表實
浮緊風寒
浮洪虛熱

無力表虛
浮緩風濕
浮洪虛熱

浮遲中風
浮緩風濕
浮虛陽暑

沉陰

沉脈重手按至筋骨乃得經脈如綿裹砂內剛外柔楊如石投水必極其底

沉脈法地有淵泉在下之象在卦為坎在時為冬在外為腎又謂之石亦曰營太過則如彈石按之益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在中也。脈訣言緩度三關狀如蠟綿者非也沉有緩數及各部之沉蠟綿乃弱脈非沉也

體狀詩水行潤下脈來沉筋骨之間與滑匀女子寸兮男子尺四時如此號為平

相類詩沉幫筋骨自調匀伏則推筋着骨尋沉細如綿真弱

脈絃長實大是牢形

沉行筋間 伏行骨上 守大有力
弱細無力

主病詩沉潛水畜陰經病數熱遲寒滑有瘧無力而沉虛與
氣沉而有力積并寒 寸沉痰鬱水停胸關主中寒痛不通
尺部濁遺並泄痢腎虛腰及下元痛

沉脈主裏 有力裏實 無力裏虛 沉則為氣
又主水畜 沉遲淌冷 沉數內熱 沉滑痰食
沉濡氣鬱 沉弱寒熱 沉緩寒濕 沉緊冷痛
沉牢冷積

遲 陰

遲脈一息三至去來極慢

經脈

遲為陽不勝陰故脉來不及。脉訣言重手乃得是有沉
無浮一息三至甚為易見而曰隱隱曰狀且難是濡脉矣
其謬可知

體狀詩遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表
裏消陰須益火之原相脉來三至號為遲小駛於遲作緩持
遲細而難知是濡浮而遲大以虛推

三至為遲 有力為緩 無力為濡 有止為絃
遲甚為敗 浮大而濡為虛 弱宜別之 小而實緩大而慢遲為陰或陽衰緩為衛盛營

主病詩遲司臟病或多瘻沉痼瘕瘕子細看有力而遲為冷

痛遲而無力定虛寒 寸遲必是上焦寒關主中寒痛不堪

尺是腎虛腰脚重溲便不禁疝丸

遲脈主臟

有力冷痛

無力虛寒

浮遲表寒

沉遲裏寒

无力虛寒

無力虛寒

浮遲表寒

數陽

數脉一息六至。經脉流薄疾素
數為陰不勝陽故脉未大過。浮沉遲數脉之綱領素問
脉經皆為正脉脉訣立七表八裏而遺數脉止譯於心臟問
其妄甚矣。

體狀詩數脉息間常六至。陰微陽盛必狂煩。浮沉表裏分虛
實惟有兒童作吉者。

相類詩數比平人多一至緊米如數似彈繩數而時止名為
促數見關中是動形。

數而絃急為緊

流利為滑

數見關中為動

數而有止為促

數甚為極

主病詩數脉為陽熱可知只將君相火來醫實宜涼瀉虛溫

補肺病秋深却畏之。寸數咽喉口舌瘡。吐紅欬嗽肺生癟。

當關胃火并肝火。尺屬滋陰降火湯。

數脉主腑。有力實火。無力虛火。浮數表熱。
沉數裏熱。氣口數實肺癰。數虛肺痿。

滑脈往来前卻流利。展轉替替然如珠之應。指經濡濡如欲脫。

滑為陰氣有餘。故脉來流利如水。脉者血之府也。血盛則脈滑。故腎脉宜之。氣盛則脉濇。故肺脉宜之。脈訣云。按分浮滑沉。滑尺寸之滑也。今正之。

體狀相類。詩滑脉如珠。替替然往来流利。卻還前莫將滑數為同類。數脉惟看至數間。

滑則如珠。
數則六至。

主病詩滑脉為陽元氣衰。瘻生百病。食生炎上。為吐逆下畜血。女脈調時定有胎。寸滑腸瘻生。嘔吐吞酸舌強。或欬嗽。

當關宿食肝脾熱渴痢癩淋看尺部

滑短宿食 滑數瘧火

浮滑風瘧

沉滑食瘧

滑數瘧火

脈訣言關滑胃寒尺滑脣似水與脈經言關滑胃熱尺滑血畜婦人經病之旨相反其謬如此

濡陰

濡脉細而遲往来難短且散或一止復來

脈參伍不調素如輕

刀刮竹狀如雨沾沙通真如病蠶食葉

濡為陽氣有餘氣盛則血少故脉來蹇滯而肺宜之。脈

訣言指下尋之似自舉之全無與脉經所云絕不相干

體狀詩細遲短濡往来難散止依稀應指間如雨沾沙容易散病蠶食葉慢而艱

相類詩參伍不調名曰濡輕刀刮竹短而難微似秒芒微稟甚浮沉不別有無間

浮細遲短散時一止曰濡 極細而稟重按若絕曰微

浮而柔細曰濡 沉而柔細曰弱

主病詩濡緣血少或傷精反胃亡陽汗雨淋寒濕入營為血

痺、女人非孕即無經。寸濶心虛痛對胸、胃虛脇脹察關中。

尺為精血俱傷候、腸結溲淋或下紅。

潘主血少精傷之病女人有孕為胎病無孕為敗血
光庭云濶脉獨見尺中形同代為死脉

杜

虛陰

虛脈遲大而與按之無力隱指豁豁然空

崔紫虛云形大力薄其虛可知。脉訣言尋之不足舉之
有餘止言浮脈不見虛狀楊仁齋言狀似柳絮散漫而遲
滑氏言散大而與皆是散脉非虛也

體狀相類詩舉之遲大按之鬆脈狀無涯類谷空莫把芤虛
為一例芤來浮大似慈葱。

虛脈浮大而遲按之無力芤脈浮大按之中空
芤為脫血虛為血虛浮散二脉見浮脉

主病詩脈虛身熱為傷暑自汗怔忡驚悸多發熱陰虛須早
治、養營益氣莫蹉跎。血不禁心寸口虛關中腹脹食難舒。
骨蒸痿痺傷精血卻在神門兩部居。

經曰 血虛脉虛曰氣來虛微為不及病在內日久病脉虛者死

實陽

實脉浮沉皆得脉大而長微絃應指幅幅然經脉幅幅堅實貌。脈訣言如繩應指來乃緊脉非實脉也

體狀詩浮沉皆得大而長應指無虛幅幅強熱蘊三焦成壯火通腸發汗始安康。

相類詩實脉浮沉有力強緊如彈索轉無常須知牢脉幫筋骨實大微絃更帶長。

浮沉有力為實 絃急彈人為緊沉而實大微絃而長為牢

主病詩實脉為陽火鬱成發狂譖語吐頻頻或為陽毒或傷食大便不通或氣疼 寸實應知面熱風咽疼舌強氣填胸

當關脾熱中宮滿尺實腰腸痛不通

經曰血實脉實者水穀為病曰氣來實強是謂太過之說何反繫古不知其譏訣為虛寒藥用薑附愈誤矣

長陽

長脉不大不小迢迢自若

朱氏

如循長竿末稍為平如引繩如

循長竿為病素

長有三部之長一部之長在時為春在人為肝心脉長神
強氣壯腎脉長蒂固根深經曰長則氣治皆言平脉也體狀相類詩過於本位脉名長絃則非然但滿張絃脉與長

爭較遠良工尺度自能量

實半絃緊皆魚長脉

主病詩長脉迢迢大小引反常為病似牽繩若非陽毒癲癇病即是陽

明

熱勢深

長主有
餘之病

短陰

短脈不及本位，訣脉應指而迴，不能滿部。經脈戴同父云：短脈只見尺寸，若關中見短，上不通，尺是陰陽絕脉，必死矣。故關不許短。黎居士云：長短未定，體諸脉舉，按之間過於本位者為長，不及本位者為短。脈屬肺，宜於秋；但許肝長，不及本位者為短。

體狀相類，詩兩頭縮縮，名為短濶。短遲遲細，且難短濶而浮。秋喜見，三春為賊，有邪干。

皆魚短脈

主病詩：短脈惟於尺寸尋，短而滑數酒傷神浮為血澀沉為病，寸主頭疼尺腹疼。

經曰短則氣病
主不及之病

洪陽

洪脈指下極大經來盛去衰際來大去長通真子

洪脈在卦為離在時為夏在人為心素問謂之大亦曰鈎滑氏曰來盛去衰如鈎之曲上而復下應血脉來去之象

萬物數布下垂之狀著炎舉言如環珠者非脈訣云李夏宜之秋李冬季發汗通腸俱非洪脈所宜蓋誤也

體狀詩脈來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時若在春秋冬月分升陽散火莫狐疑

相類詩洪脈來時拍拍然去衰來盛似波瀾欲知實脉參差處舉按絃長幅幅堅

洪而有力為實
實而無力為洪

主病詩脉洪陽盛血應虛相火炎炎熱病居脹滿胃翻湏早

治陰虛洩痢可愁如。寸洪心火上焦炎。肺脉洪時金不堪。

肝火胃虛關內察。腎虛陰火尺中看。

洪主陽盛陰虛之病。洩痢失血久嗽者忌之。經曰形瘦脈大。多氣者死曰脉大則病進。

微陰

微脉極細而與按之如欲絕若有若無。繫細而稍長。

戴氏素問謂之
小氣血微則脉微

體狀相類。詩微脉輕微。臂臂乎。按之欲絕有如無。微為陽弱。細陰弱。細比於微畧較粗。

輕診即見重按如欲絕者微也。仲景曰脉臂臂如柔上肥者陽氣微繁縝如蠶絲細者陰氣衰長病得之死卒病得之生。

主病詩氣血微兮脉亦微。惡寒發熱汗淋漓。男為勞極諸虛候。女作崩中帶下醫。寸微氣促或心驚。關脉微時脹滿形尺部見之精血弱。惡寒消痺痛呻吟。

微主久虛血弱之病陽微惡寒陰微發熱 脉訣云崩中
日久為白帶漏下多時骨亦枯

緊陽

緊脈來往有力左右彈人手素如轉索無常仲景數如切繩經脉
如紗草線丹溪

緊乃熱為寒束之脉故急數如此要有神氣索問謂之急
脈訣言寥寥入尺來崔氏言如線皆非緊狀或以浮緊為
絃沉緊為牢亦近似耳

體狀詩舉如轉索切如繩脉象因之得緊名總は寒邪來作
冠內為腹痛外身疼

相類詩見絃實

主病詩緊為諸痛主于寒喘欬風癇吐冷痰浮緊表寒湏發
越緊沉溫散自然安寸緊人迎氣口分當關心腹痛沉沉

尺中有緊為陰冷、定是奔脈與疝疼。

諸緊為寒為痛人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食尺緊
痛居其腹沉乃疾在其腹 中惡浮緊歎噯沉緊皆主死

緩 陰

緩脉去來小駛于遲經脈一息四至戴如絲在經不卷其軸應

指和緩往來甚匀張太素

如初春楊柳舞風之象

楊上操

如微風

輕颶 柳稍

滑伯仁

緩脉在卦為坤在時為四季在人為脾陽寸陰尺上等浮大而與無有偏勝者平脉也若非其時即為有病緩同而和匀不浮不沉不疾不徐不微不弱者即為胃氣故杜光庭云欲知死期何以取古賢推定丘般土陽土潤知不杜細數詳玉函經過陰陰土遇陰當

體狀詩緩脉阿阿四至通柳稍裊裊颶輕風欲從脉裏求神氣只在從容和緩中。

相類詩脉見遲

主病詩緩脈營衰衛有餘或風或濕或脾虛上為項強下痿
痺分別浮沉大小區寸緩風邪項背拘關為風眩胃家虛
神門濡泄或風秘或是蹣跚足力迂

浮緩為風緩大風虛緩濡脾虛
沉緩為濕緩細濕脾緩弱氣虛
脉訣言緩主脾熱口臭反胃齒痛夢鬼之病出自杜撰與
緩無關

芤陽中陰

芤脉浮大而裏按之中央空兩邊實經中空外實狀如慈蕙
芤慈蕙也素問無芤名劉三點云芤脉何似絕類慈蕙指
下成窟有邊無中截同父云營行脉中脉以血為形芤脉
中空脫血之象也○脉經云三部脉芤長病得之生卒病
溼氣入小腸與失血之候相反誤世不小

體狀詩芤形浮大裏如葱按之旁有中央空火犯陽經血上
溢熱侵陰絡下流紅

相類詩中空旁實乃為芤浮大而遲虛脉呼芤更帶絃名曰
草血亡芤草血虛虛

主病詩寸芤積血在於胸關內逢芤腸胃癰尺部見之多下

血赤淋紅痢漏崩中

絃
陽中陰

絃脈端直以長索如張弓絃脈按之不移綽綽如按琴瑟絃

狀若箣絃訛從中直過挺然指下

誤刊

如絃脈在卦為震在時為春在人為肝輕靈以滑者平實滑勁為太過絃緊而細為不及戴同父云絃緊而硬其病重○脉訛言時時帶數又言脈緊狀繩牽皆非絃象
之

體狀詩絃脈迢迢端直長肝經木王土應傷怒氣滿胸常欲
味翳蒙瞳子淚淋浪

相類詩絃來端直似絲絃緊則如繩左右彈緊言其力絃言

象牢脉絃長沉浮間

又見長脉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

主病詩絃應東方肝膽經飲瘧寒熱瘧經躬浮沉遲數湏分別大小單雙有重輕寸絃頭痛膈多瘧寒熱癥瘕察左關

關右胃寒心腹痛尺中陰疝脚拘攣

絃為木盛之病浮絃支飲外溢沉絃懸飲內痛瘧脉自絃

絃數多熱絃遲多寒

絃大主虛

絃細拘急

若不食者木來克土必難治

單絃厥婢

雙絃寒痼

沉絃懸飲內痛瘧脉自絃

草陰

草脈絃而芤仲如按鼓皮期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

期

仲景曰絃則為寒芤則為血失精婦人半產漏下脉經曰三部脉草長病得之死卒亡諸家脉書皆以為牢脈故或有草芤半有牢無草混清皆異也○人按甲乙絕經不同而死者謂脉未渾草至如涌泉病進而危猝其去如絃絕不反也王叔以爲溫脉與此不同

體狀主病詩草脉形如按鼓皮芤絃相合脉寒虛女人半產并崩漏男子營虛或夢遺

相類詩牢見芤

牢 陰中陽

牢脈似沉似伏實大而長微絃

經脈

扁鵲曰牢而長者肝也仲景曰寒則牢堅有牢固之象沈氏曰似沉似伏牢之位也實大絃長牢之體也。脉訣不言形狀但云尋之則無按之則有云脉入皮膚辨息難又以牢為死脉皆孟浪謬誤

體狀相類詩絃長實大脉牢堅牢位常居沉伏間草脉芤絃自浮起草虛牢實要詳看。

主病詩寒則堅牢裏有餘腹心寒痛木乘脾疝癩瘕何愁也失血陰虛卻忌之。

守主寒實之病本實則為痛扁鵲云要為虛牢為實失血者脉宜沉細反浮大而牢者死虛病見實脉也。脉訣言骨間疼痛氣居于表池氏以為腎傳于脾皆謬妄不經

濡陰即弱字

濡脈極弱而浮細如帛在水中輕手相得按之無有經如水上浮漚

帛浮水中重手按之隨手而沒之象。脈訣言按之似有舉還無是微脉非濡也

體狀詩濡形浮細按湏輕水面浮綿力不禁病後產中猶有藥平人若見是無根
相類詩浮而柔細知為濡沉細而柔作弱持微則浮微如欲絕細來沉細近于微

浮細如綿曰濡

浮而極細如絶曰微沉細如綿曰弱沉而極細不斷曰細

主病詩濡為亡血陰虛病髓海丹田暗已虧汗雨夜來蒸入

骨血山崩倒濕侵脾。寸濡陽微自汗多。關中馬奈氣虛何。
尺傷精血虛寒甚。溫補真陰可起疴。

濡主血虛之病又為濡濕

弱 脈

弱脈極與而沉細按之乃得舉手無有經脈
弱乃濡之沉者脉訣言輕手乃得黎氏曰譬如浮漚皆是謂久病病後老弱見之順平人少年見之逆

體狀詩弱來無力按之柔柔細而沉不見浮陽陷入陰精血
弱白頭猶可少年愁

相類詩脉見濡

主病詩弱脉陰虛陽氣衰惡寒發熱骨骼萎多驚多汗精神
減益氣調營急早醫。寸弱陽虛病可知。關爲胃弱與脾衰。
欲求陽陷陰虛病須把神門兩部推。

筋弱主氣虛之病仲景曰陽陷入陰故惡寒發熱人云弱主
陽虛尺弱陰虛關弱胃虛

散脈

散脈大而散有表無裏經脈渙漫不收產無統紀無拘束至數

不齊或來多去少或去多來少渙散不收如楊花散漫之象柳氏

戴同父曰心脈浮大而散肺脈短濶而散平脈也心脈與
散怔忡肺脉與散汗出肝脉與散溢飲脾脉與散腑腫病
脉也腎脉與散諸病脉代散死脉也難經曰散脈獨見則
危抑氏曰散為氣血俱虛根本脫離之脉產婦得之生孕
墮久病逢之不必醫

體狀詩散似楊花散漫飛去來無定至難齊產為生兆胎為
墮久病逢之不必醫

相類詩散脈無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲大為虛
脉芤脉中空有兩邊

主病詩左寸怔忡右寸汗溢飲左關應與散右關與散脈腫

附散居兩尺魂應斷

細陰

細脈小於微而常有細直而與若絲線之應指經脉
素問謂之小王啓玄言如荔蓬狀其柔細也。脉訣言往

來極微是微反大於細矣與經相背體狀詩細來繚繚細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱不利秋冬老弱卻相宜

相類詩見微

主病詩細脉繁繁血氣衰諸虛勞損七情非若濕氣侵腰
腎即是傷精汗洩來一寸細應知嘔吐頻入關腹脹胃虛形
尺逢定是丹田冷洩痢遺精號脫陰

脉經曰細為血少氣衰有此證則順否則逆故吐衄得沉
細者生憂勞過度者脉亦細

伏陰

伏脈重按着骨指下裁動細脉行筋下誤刊

脉訣言尋之似有定
息全無殊為舛謬

體狀詩伏脈推筋着骨尋指間裁動隱然深傷寒欲汗陽將
解厥逆脅疼證屬陰

相類詩牀見說

主病詩伏為霍亂吐頻頻腹痛多緣宿食停蓄飲老淡成積
聚散寒溫裏莫因循食鬱胸中雙寸伏欲吐不吐常兀兀

當關腹痛困沉沉關後疝疼還破腹

傷寒一手脈伏曰單伏兩手脈伏曰雙伏伏不可以陽證
見陰為診乃大邪內鬱不得發越陽極似陰故脈伏必有

大汗而解正如久旱將雨六合陰晦雨後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復感寒陰盛陽衰四脉衝陽逆六脉沉伏須投薑附及灸關元脈乃復出也若太溪元賓曰伏脈不可發汗

劉

脉訣言徐徐發汗潔古以附子細

動 汗

動乃數脉見於關上下無頭尾如豆大厥厥動搖

仲景曰陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發寒此三焦傷也成無己曰陰陽相搏則虛者動故陽虛則陽動陰虛則陰動龍安常曰關前三分為陽後三分為陰關位半陰半陽故動隨虛見。脈訣言尋之似有舉之還無不離其處不往不來三關沉沉含糊安詳殊非動脈詹氏言其形鼓動如鈞如毛者尤謂

體狀詩動脈搖搖數在關無頭無尾豆形圓其原本是陰陽

陰

搏虛者搖兮勝者安

主病詩動脈專司痛與驚汗因陽動熱圓絰或為洩痢拘攣

病男子亡精女子崩

仲景曰動則為痛為驚素問曰陰虛陽搏謂之崩又曰婦人手少陰脉動甚者妊娠也

促陽

促脈來去數時一止復來

脈經但言數而止為促脈訣乃云并居寸口不言時止者

氏謂矣數止為促緩止為結何獨寸口哉

體狀詩促脈數而時一止此為陽極欲亡陰三焦鬱火炎炎
盛進必無生退可存

相類詩

見代脈

主病詩促脈惟將火病醫其固有五細推之時時喘歎皆痰
積或發狂斑與毒疽

促主陽盛之病○促結之因皆有氣血痰飲食五者之別

一有留滯則脉必見止也

結 脈

結脈往來緩時一止復來

經取

脈訣言或來或去聚而却還與結無間仲景有繫繫如循長芋曰陰結藪藪如車蓋曰陽結脈絃又有如麻子動搖旋引從收聚散不常者曰結死此三脈名同實異也

體狀詩結脈緩而時一止獨陰偏盛欲亡陽浮為氣滯沉為積汗下分明在主張

相類詩脉代

主病詩結脈皆因氣血凝老瘻結滯苔沈吟內生積聚外癰腫症瘕為殃病屬陰

結主陰盛之病越人曰結甚則積甚結微則氣微浮結外有痛積伏結內有積聚

代脈動而中止不能自還因而復動仲脉至還入尺良久方
來氏吳脉合四十五大息五止

代陰

代脈瘦而他臟動之數謂肺心肝腎五臟之氣皆足五十息
而止肝氣不能至則三十六動一止蓋一臟之氣衰
代脈爲脉之氣代至也經曰代則氣衰消伯仁曰若無病羸
薄脉代者復脉而氣血乍弱氣不續者稱為病羸
不可辨死心生代之生死

代脈瘦而他臟動之數謂肺心肝腎五臟之氣皆足五十息
而止肝氣不能至則三十六動一止蓋一臟之氣衰
代脈爲脉之氣代至也經曰代則氣衰消伯仁曰若無病羸
薄脉代者復脉而氣血乍弱氣不續者稱為病羸
不可辨死心生代之生死

代脈動而中止不能還復動因而作代看病者得之猶可
療平人卻與壽相關

體狀詩動而中止不能還復動因而作代看病者得之猶可
療平人卻與壽相關

相類詩數而時止名為促緩止湏將結脉呼止不能回方是

代結生代死自殊塗

促結之止無常數或二動三動一止即求代脈之止有常數必依數而止還入尺中良久方來也

主病詩代脈元因臟氣衰腹冷洩痢下元虧或為吐瀉中宮病女子懷胎三月今

脈經曰代數者死主淺及便濃血

五十不止身無病數內有止皆知定四十止一臟絕四年之後多亡命三十止即三年二十一止二年應十動一止一年姐更觀氣色兼形證兩動一止三四日三四動止應六七五六一止七八朝次第推之自無失

戴同父曰脈必滿五十動出自難經而脈訣五臟訶皆以四十五動為準乖于經旨○柳東陽曰古以動數候脉是以喫緊語湏候五十動乃知五臟缺失令人指到腕臂即云見了夫五十動豈彈指間事耶故學者當詮脈問證聽聲詮而無失

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.